

**HUBUNGAN ANTARA ASUPAN ZAT BESI, PROTEIN, VITAMIN C
DAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA ANAK
JALANAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2023**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan
Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Alifya Nurul Izzha Deddy

70200118106

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Hubungan Antara Asupan Zat Besi, Protein, Vitamin C Dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan Di Kota Makassar Tahun 2023*” yang disusun oleh ALIFYA NURUL IZZHA DEDY NIM: 70300118106,, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 23 Februari 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, Maret 2024
Syaban 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati., Sp. OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Syarfaini, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Syamsul Alam, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: A. Syamsiah Adha, S.Gz., MPH	(.....)



Disetujui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
NIP: 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kendala apapun. Sholawatserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau merupakan sosok seorang pemimpin bagi seluruh umat sampai saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis. M.A, Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Prof. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag., Wakil Rektor II, Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A., Wakil Rektor III, Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd., Wakil Rektor IV Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc, M.Ag, yang telah membina dan memimpin UIN Alauddin Makassar sebagai tempat bagi penulis untuk memperoleh ilmu.
2. Dr. dr. Dewi Detiawati, Sp. OG., M. Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar para Wakil Dekan I Dr. Isriani Ismail, S.Si., Apt., M.Si., Wakil Dekan II Dr H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil Dekan III Prof. Dr. Patimah, S.Kep, Ns, M.Kes., yang telah membina penulis selama menempuh studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
3. Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Dr. Bs. Titi Haerana, SKM., M.Kes selaku Sekretaris Jurusan

Kesehatan Masyarakat. memberikan masukan dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Syamsul Alam, SKM., M.Kes selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. A. Syamsiah Adha, S.Gz., M.PH selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Syarfani, SKM., M.Kes selaku Penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. H. M. Dahlan, M. Ag selaku Penguji II yang telah memberikan masukan khususnya pada integrasi keislaman dalam skripsi ini.
8. Kepada Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan wawancara.
9. Kepada Orang Tua dan Keluarga yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangat kepada penulis.
11. Pengelola Seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.
12. Teman-Teman tercinta angkatan 2018 (Endspil) Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

13. Teman-Teman tercinta Peminatan Gizi yang telah menjadi teman seperjuangan.
14. Teman-Teman tercinta Peminatan Gizi yang telah menjadi teman seper
Terkhusus Ilham Arif , Mutmainnah, Anita, Muh.Taufiq AJ, Nur Azizah, Andi
Desna Ratu Esa, Widya Astuti, dan teman-teman lain yang telah membantu
saya serta memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian
skripsi ini.
15. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan. Semoga kebaikan dan kemurahan hati semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,penulis berharap akan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Aamiin.

Makassar, 10 Oktober 2023

Penulis

Alifya Nurul Izzha Deddy

NIM. 70200118106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Hipotesis	7
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian	18
G. Manfaat Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Tentang Anemia	21
B. Tinjauan Hubungan Zat Besi, Vitamin C, Protein dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia	43
C. Tinjauan Tentang Anak Jalanan	51
D. Kerangka Teori.....	55
E. Kerangka Konsep Penelitian.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
C. Populasi dan Sampel.....	58

D.	Metode Pengumpulan Data.....	60
E.	Instrumen Penelitian.....	53
F.	Teknik Pengolahan, Analisis Data dan Penyajian Data.....	63
1.	Pengolahan Data	63
2.	Analisis Data.....	64
3.	Penyajian Data	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		67
A.	Gambaran Umum Daerah Penelitian	67
B.	Hasil Analisis Univariat.....	69
C.	Hasil Analisis Bivariat.....	75
D.	Hasil Analisis Multivariat.....	78
E.	Pembahasan.....	79
BAB V PENUTUP.....		109
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		111



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	9
Tabel 1.2 Tabel Sintesa.....	12
Tabel 2.1 Batasan Anemia Menurut WHO.....	22
Tabel 2.2 Derajat Anemia Menurut WHO.....	22
Tabel 2.3 Zat Besi Dalam Makanan.....	46
Tabel 2.4 Angka Kecukupan Gizi Protein.....	47
Tabel 2.5 Kandungan Vitamin C Dalam Beberapa Bahan Makanan.....	48
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Domisili Responden.....	69
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Responden.....	70
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Responden.....	70
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua.....	70
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Orang Tua.....	71
Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Anemia.....	72
Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Zat Besi.....	73
Tabel 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Protein.....	73
Tabel 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Vitamin C.....	74
Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi.....	75
Tabel 4.11 Hubungan Asupan Zat Besi Dengan Kejadian Anemia.....	68
Tabel 4.12 Hubungan Asupan Protein Dengan Kejadian Anemia.....	69
Tabel 4.13 Hubungan Asupan Vitamin C Dengan Kejadian Anemia.....	70
Tabel 4.14 Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia.....	70
Tabel 4.15 Hasil Analisis Multivariat Uji Regresi Logistik Berganda Variabel Independen Dengan Kejadian Anemia.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teori.....	55
Gambar 2. 2 Kerangka Konsep	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anemia merupakan isu kesehatan masyarakat yang paling umum terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di kalangan Wanita Usia Reproduksi (RAW). Tidak hanya terbatas pada negara-negara berkembang, tetapi juga sering ditemui di negara-negara maju, permasalahan ini terkait dengan anemia. Anemia, yang ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin, masih merupakan isu kesehatan yang signifikan saat ini dan merupakan bentuk malnutrisi yang umum terjadi secara global. Fakta ini diperkuat oleh laporan Beban Penyakit Global tahun 2004, yang mencatat sekitar 1,159 miliar kasus anemia, setara dengan sekitar 25% dari populasi dunia, yang terpengaruh oleh kondisi tersebut (Tania, 2018).

Angka kejadian anemia secara global dapat dilihat dari prevalensi sekitar 53,7% di negara-negara yang berkembang pada kelompok usia remaja, mencakup sekitar lebih dari setengah populasi remaja. Pada tahun 2019, sekitar 29,9% remaja di seluruh dunia mengalami anemia, jumlahnya mencapai lebih dari setengah miliar remaja dalam rentang usia 15-49 tahun. Anemia menyumbang sekitar 9% dari tahun ke tahunnya. Anemia berdampak pada sekitar 2 miliar penduduk di seluruh dunia, dan dampaknya tidak hanya terbatas pada kesehatan individu tetapi juga merasakan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi (Fitriani, 2021).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, prevalensi anemia pada anak usia 1-4 tahun, 5-14 tahun, dan 15-24 tahun berturut-turut adalah 28,1%, 26,4%, dan 18,4%. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan prevalensi jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada tahun 2007, di mana prevalensi anemia untuk kelompok usia 1-4 tahun, 5-14 tahun, dan 15-24 tahun adalah berturut-turut 27,7%, 9,4%, dan 6,9%. Menurut data dari hasil Riskesdas tahun 2013, remaja perempuan yang mengalami anemia mencapai 37,1%, dan mengalami peningkatan menjadi 48,9% pada Riskesdas 2018, dengan proporsi anemia terjadi pada kelompok usia 15-24 tahun dan 25-34 tahun (Hutomo et al., 2022). Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 33,7% remaja yang menderita anemia (Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020). Di Kota Makassar, anemia pada anak usia 5-12 tahun memiliki tingkat prevalensi sebesar 37,6% (Sudarman et al., 2020).

Kelompok anak jalanan memiliki risiko tinggi mengalami anemia, seperti yang terungkap dalam beberapa penelitian di Kota Makassar. Dari 18 anak yang diteliti, sebanyak 52,9% dari mereka masih mengalami anemia. (Nur Rahmi, 2014). Anak jalanan termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap anemia. Mereka seringkali terkait dengan kondisi kemiskinan, memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, dan aktivitas mereka yang tinggi di jalanan dapat mengurangi asupan makanan yang sehat. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengeksplorasi korelasi antara infeksi cacing dengan asupan zat besi (Fe)

pada kejadian anemia yang terjadi kepada anak-anak jalanan di Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Faktor utama yang berkontribusi pada tingginya prevalensi anemia adalah kehilangan sel darah merah yang signifikan melalui perdarahan, seperti dalam kasus wasir, infestasi cacing, dan menstruasi. Anemia dapat muncul karena berbagai faktor, termasuk kurangnya asupan zat besi dalam pola makan sehari-hari, penyerapan zat besi yang tidak efisien dari makanan, infeksi parasit dalam tubuh, dan peningkatan kebutuhan akan zat besi akibat pertumbuhan, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja yang memerlukan pasokan zat besi yang lebih besar (Wijayanti, 2011). Karakteristik tingkat energi yang tinggi pada masa remaja dapat menghasilkan peningkatan aktivitas tubuh, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan nutrisi. Penyerapan zat besi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat seperti fitat, oksalat, dan tanin (seperti yang terdapat dalam teh dan kopi). Sebaliknya, faktor-faktor pendorong seperti vitamin C dan protein hewani juga berperan dalam memengaruhi proses tersebut (Tiasuti, 2018).

Hasil penelitian (Noviandari, 2016) menunjukkan bahwa sekitar 50% remaja di SMA Batik 1 Surakarta menderita anemia, yang dapat terhubung dengan korelasi antara kondisi gizi mereka dan siklus menstruasi (Trisnawati, 2019). Anemia dapat mengakibatkan penurunan dalam kinerja fisik, produktivitas di tempat kerja, dan kapasitas kognitif. Tambahan, kondisi anemia juga dapat mengurangi kekebalan tubuh sehingga individu

lebih rentan terhadap infeksi. Selain zat besi, protein juga memiliki pengaruh terhadap anemia, seperti yang disebutkan dalam penelitian oleh Paputungan et al. pada tahun 2018 di Manado, Menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat konsumsi protein dan insiden anemia pada remaja, Studi yang dilakukan oleh Trisnawati pada tahun 2019 juga mengkonfirmasi adanya hubungan antara tingkat konsumsi vitamin C dan insiden anemia. Ketika konsumsi vitamin C lebih tinggi, tubuh akan menyerap lebih banyak zat besi, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kejadian anemia.

Anemia dapat mengakibatkan berkurangnya kinerja fisik, produktivitas kerja yang menurun, serta menurunnya kapasitas berpikir. Selain itu, kondisi anemia juga dapat mengurangi sistem kekebalan tubuh, yang membuat individu lebih rentan terhadap infeksi. Di Indonesia, masalah anemia pada anak semakin meningkat secara signifikan, ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kasus yang sangat tinggi. Kondisi ini menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut. Jika tidak ditangani secara berkelanjutan, situasi ini berpotensi memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak, mengancam kesejahteraan mereka, berpotensi mengganggu kesehatan anak, mempengaruhi kehidupan pribadi mereka, dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengatasi permasalahan ini, karena generasi anak-anak Mereka akan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang (Wijayanti, 2011).

Anemia pada anak terjadi ketika jumlah sel darah merah dan hemoglobin dalam tubuh anak berada di bawah tingkat normal. Hemoglobin, sebuah protein dalam sel darah merah, memiliki peran krusial dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen yang dibawa oleh hemoglobin sangat diperlukan untuk fungsi optimal sel-sel dalam tubuh anak. Anemia pada anak dapat menghambat pertumbuhan fisik, melemahkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit, berpotensi menurunkan tingkat kecerdasan yang seharusnya, serta dapat mengurangi prestasi dalam hal belajar, pekerjaan, dan olahraga (Zulkhan, 2021).

Anak-anak jalanan umumnya mengadopsi gaya hidup yang tidak terstruktur, memiliki tingkat kebersihan dan sanitasi yang rendah karena jarang mandi, tinggal di bangunan ruko yang kurang layak, dan aktif sepanjang hari. Mereka menghadapi kondisi lingkungan yang tidak higienis dan sanitasi yang buruk, seringkali memiliki kebiasaan kesehatan yang kurang baik, serta kurang menjaga kebersihan makanan mereka. Hal ini dapat meningkatkan risiko mereka terkena infeksi penyakit dan infeksi cacing. Untuk anak jalanan, makanan menjadi sarana untuk bertahan hidup, dan mereka memiliki berbagai aktivitas harian yang beragam. Kondisi ini memperburuk asupan nutrisi mereka, terutama zat besi, protein, dan vitamin B12, yang seringkali sangat rendah. Anemia dapat semakin diperparah oleh proses menstruasi dan pengaruh dari asupan makanan yang tidak mencukupi. Dikarenakan hidup di jalanan, anak-anak jalanan sering memiliki pola makan yang tidak teratur, yang menjadi pemicu utama

perubahan perilaku makan yang tidak sehat. Dikarenakan keterbatasan daya beli, mereka sering memilih makanan yang kurang bergizi dan cenderung mengonsumsi junk food karena harganya lebih ekonomis. Akibatnya, tingkat konsumsi mereka mendapatkan makanan dengan kualitas rendah dan kurang mengandung zat gizi (A Buchari, 2018).

Komunitas anak jalanan seringkali tidak memprioritaskan kesehatan hidup dan umumnya bermukim di wilayah yang tidak memadai dengan sanitasi lingkungan yang tidak memadai.. Kondisi ini secara signifikan meningkatkan risiko mereka terkena anemia (Rahmi, 2014). Kota Makassar, sebagai ibu kota Provinsi dan salah satu kota metropolitan utama di Indonesia, mengalami peningkatan yang mencolok dalam jumlah anak jalanan. Pada tahun 2017, sebanyak 332 anak jalanan berhasil dirazia. Kemudian, pada tahun 2018, terjadi penurunan yang signifikan, dengan hanya 232 anak jalanan yang dirazia. Selanjutnya, pada tahun 2019, jumlah anak jalanan yang dirazia menurun menjadi 191 orang. Pada tanggal 31 Agustus 2020, jumlah anak jalanan yang dirazia mencapai 185 orang. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah anak jalanan yang dirazia dari tahun 2017 hingga 2020, seperti yang dilaporkan oleh Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2021. Kemudian, berdasarkan data Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) tahun 2022, terdapat sekitar 170 anak jalanan yang sedang mendapatkan bimbingan.

Dengan dasar penjelasan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki korelasi antara asupan zat besi, protein, vitamin C, dan status gizi dengan tingkat kejadian anemia pada anak jalanan di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks yang telah diuraikan, pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana hubungan antara konsumsi zat besi, protein, vitamin C, dan status gizi dengan tingkat kejadian anemia pada anak-anak jalanan di Kota Makassar pada tahun 2023?”

C. Hipotesis

- a. Hipotesis Nol (H_0)
 - a) Tidak ada hubungan antara asupan zat besi dengan kejadian anemia pada anak jalanan di Kota Makassar.
 - b) Tidak ada hubungan antara asupan protein dengan kejadian anemia pada anak jalanan di Kota Makassar.
 - c) Tidak ada hubungan antara asupan vitamin c dengan kejadian anemia pada anak jalanan di Kota Makassar.
 - d) Tidak terdapat korelasi antara kondisi gizi dan insiden anemia pada anak-anak jalanan di Kota Makassar.
- b. Hipotesis Alternatif (H_a)
 - a) Terdapat korelasi antara konsumsi zat besi dan insiden anemia pada anak-anak jalanan di Kota Makassar.
 - b) Terdapat korelasi antara konsumsi protein dan insiden anemia pada anak-anak jalanan di Kota Makassar dapat teramati.

- c) Terdapat korelasi antara konsumsi vitamin C dan insiden anemia pada anak jalanan di Kota Makassar.
- d) Terdapat korelasi antara status gizi dan insiden anemia pada anak jalanan di Kota Makassar.



D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Tabel 1. 1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Variabel	Defenisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Kriteria Objektif	Skala
Independen Asupan Zat Besi	Asupan zat besi merujuk pada jumlah makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak jalanan yang mengandung zat besi. Pengukuran ini dilakukan secara kuantitatif melalui metode pengingatan makanan selama 24 jam, dan hasilnya dibandingkan dengan Angka Kebutuhan Gizi (AKG). Berikut kebutuhan asupan zat besi sesuai dengan umur anak: 4-6 tahun: 10mg/hari 7-9 tahun: 10mg/hari 10-12 tahun: 8mg/hari 13-15 tahun: 11-15g/hari (Angka Kecukupan Gizi, 2019)	Wawancara dan <i>Food recall 2x24 jam</i>	<i>Kusioner Food recall</i>	<ol style="list-style-type: none"> Cukup: Apabila asupan fe anak jalanan umur 4-6 tahun ≥ 10 mg, kebutuhan fe anak jalanan umur 7-9 tahun ≥ 10 mg, kebutuhan fe anak jalanan umur 10-12 tahun ≥ 8 mg, kebutuhan fe anak jalanan umur 13-15 tahun $\geq 11-15$ mg. Kurang: Apabila asupan fe anak jalanan umur 4-6 tahun < 10 mg, kebutuhan fe anak jalanan umur 7-9 tahun < 10 mg, kebutuhan fe anak jalanan umur 10-12 tahun < 8 mg, kebutuhan fe anak jalanan umur 13-15 tahun $< 11-15$ mg. 	Nominal

Independen Asupan Protein	Pemakaian protein mencakup semua jenis makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak jalanan yang mengandung protein, diukur secara kuantitatif melalui metode pengingatan makanan selama 24 jam, selama 2 hari berturut-turut, dan hasilnya dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dalam satuan gram (g). Berikut kebutuhan asupan protein sesuai dengan umur anak: 4-6 tahun: 25g/hari 7-9 tahun: 40g/hari 10-12 tahun: 50-55g/hari 13-15 tahun: 65-70g/hari (Angka Kecukupan Gizi, 2019)	Wawancara dan <i>Food recall</i> 2x24 jam	<i>Kusioner Food recall</i>	1. Cukup: Apabila asupan protein anak jalanan umur 4-6 tahun $\geq 25g$, kebutuhan protein anak jalanan umur 7-9 tahun $\geq 40g$, kebutuhan protein anak jalanan umur 10-12 tahun $\geq 50-55g$, kebutuhan protein anak jalanan umur 13-15 tahun $\geq 65-70g$. 2. Kurang: Apabila asupan protein anak jalanan umur 4-6 tahun $< 25g$, kebutuhan protein anak jalanan umur 7-9 tahun $< 40g$, kebutuhan protein anak jalanan umur 10-12 tahun $< 50-55g$, kebutuhan protein anak jalanan umur 13-15 tahun $< 65-70g$.	Nominal
Independen Asupan Vitamin C	Konsumsi vitamin C mencakup semua makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak jalanan yang mengandung vitamin C, diukur secara kuantitatif melalui metode pengingatan makanan selama 24 jam, selama 2 hari berturut-turut, yang hasilnya dibandingkan dengan AKG dalam satuan gram (g). Kebutuhan vit c pada anak	Wawancara dan <i>Food recall</i> 2x24 jam	<i>Kusioner Food recall</i>	1. Cukup: Apabila asupan Vit c anak jalanan umur 4-6 tahun ≥ 45 mg, kebutuhan vit c anak jalanan umur 7-9 tahun ≥ 45 mg, kebutuhan vit c anak jalanan umur 10-12 tahun $\geq 50mg$, kebutuhan vit c anak jalanan umur 13-15 tahun $\geq 65-75$ mg. 2. Kurang: Apabila asupan Vit c anak jalanan umur 4-6 tahun < 45 mg, kebutuhan vit c anak jalanan umur 7-	Nominal

	sesuai dengan umurnya sebagai berikut: 4-6 tahun: 45mg/hari 7-9 tahun: 45g/hari 10-12 tahun: 50mg/hari 13-15 tahun: 65-75mg/hari (Angka Kecukupan Gizi, 2019)			9 tahun <45 mg, kebutuhan vit c anak jalanan umur 10-12 tahun <50mg, kebutuhan vit c anak jalanan umur 13-15 tahun <65-75 mg.	
Independen Status Gizi	Proporsi tubuh anak jalanan, yang dipengaruhi oleh asupan makanan dan penggunaan zat gizi, dievaluasi melalui perhitungan Indeks Massa Tubuh (IMT) digunakan untuk menilai status gizi dengan membandingkan berat badan dalam kilogram terhadap tinggi badan dalam meter kuadrat.	Pengukuran berat badan dan tinggi badan kemudian lakukan perhitungan IMT/U	Berat Badan (Timbangan) dan Tinggi Badan (Alat Ukur Multifungsi)	1. Gizi kurang jika $z < -3 \text{ SD}$ sd $< -2 \text{ SD}$ 2. Gizi baik jika $z > -2 \text{ SD}$ sd $+1 \text{ SD}$ 3. Gizi lebih jika $z > +1 \text{ SD}$ sd $+2 \text{ SD}$ 4. Obesitas jika $z > +2 \text{ SD}$	Nominal
Dependen Anemia	Anemia pada anak jalanan adalah situasi ketika mereka memiliki tingkat hemoglobin dalam darah yang rendah, yang terutama disebabkan oleh defisiensi gizi. Hal ini dapat diidentifikasi melalui pengukuran kadar hemoglobin menggunakan metode cyanmethemoglobin dengan satuan dalam gram per desiliter (g/dL).	Pemeriksaan langsung dengan metode <i>Finger Prick</i>	<i>Hematology Analyzer</i>	1. Anemia terjadi ketika tingkat hemoglobin anak jalanan berusia 5-11 tahun kurang dari 11,5 g/dl, dan pada anak jalanan berusia 12-18 tahun kurang dari 12 g/dl. 2. Tidak mengalami anemia terjadi ketika kadar hemoglobin anak jalanan berusia 5-11 tahun lebih dari 11,5 g/dl dan anak jalanan berusia 12-18 tahun lebih dari 12 g/dl.	Nominal

E. Kajian Pustaka

Tabel 1. 2 Tabel Sintesa

No.	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Metodologi			Hasil Penelitian	
		Subjek	Jenis/Pendekatan	Variabel		Instrumen
1.	<p>Pengaruh Intervensi Perilaku Jajan Sehat terhadap Pencegahan Anemia Gizi pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kota Makassar (Sudarman dkk., 2020)</p> <p>file:///C:/Users/inspektorat%202/Downloads/1143-Article%20Text-2122-1-10-20200907.pdf</p>	<p>Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian siswa anemia di Sekolah Dasar Kota Makassar</p>	<p>Desain Quasy Eksperiment melalui pretest-post-test with control group design</p>	<p>Variabel independen : perilaku jajan sehat Variabel dependen: kejadian anemia</p>	<p>Wawancara konsumsi makanan (food frequency questionnaire).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan jajan ($p=0,000$), sikap jajan ($p=0,000$), tindakan jajan ($p=0,000$) bermakna terhadap perilaku pencegahan anemia. Kesimpulan diperoleh bahwa ada perbedaan perilaku jajan setelah intervensi pada kelompok perlakuan dan kelompok control</p>
2.	<p>Hubungan Antara Asupan Zat Besi, Protein dan Vitamin C Dengan Kejadian Anemia Pada Anak</p>	<p>Sampel yaitu sebanyak 75 orang</p>	<p>Crosssectional yang bersifat analitik.</p>	<p>Variabel independe: zat besi, protein dan vitamin C Variabel</p>	<p>Pemeriksaan kadar hemoglobin dan wawancara food frequency</p>	<p>Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki asupan zat besi, protein, dan vitamin C yang mencukupi, yaitu sebanyak 70,7% untuk zat besi, 84% untuk protein, dan 80%</p>

	<p>Sekolah Dasar di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado (Isbach dkk., 2013)</p> <p>file:///D:/ANEMIA%20ANAK/ALLENFINA-OLIVIA-TADETE-091511128.pdf</p>			<p>dependen: kejadian anemia</p>	<p>questionnaire.</p>	<p>untuk vitamin C.</p>
3.	<p>Hubungan Kecukupan Asupan Zat Besi dan Kadar Timbal Darah Dengan Kadar Hemoglobin Anak Jalanan Usia Kurang Dari 8 Tahun di Kawasan Pasar Johar Semarang (Ati dkk., 2014)</p> <p>https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6602890/pdf/nxz046.pdf</p>	<p>Sampel yaitu sebanyak 23 anak</p>	<p>Desain penelitian Cross Sectional</p>	<p>Variabel bebas dalam penelitian ini adalah asupan zat besi dan kadar timbal, sedangkan variabel terikat adalah kadar hemoglobin</p>	<p>Formulir FFQ semi kuantitatif</p>	<p>Sebagian besar peserta penelitian (64,8%) memiliki konsumsi zat besi di bawah tingkat kecukupan. Kadar hemoglobin (Hb) pada enam responden (31,8%) menunjukkan tingkat rendah. Sebanyak 73,7% dari responden memiliki kadar timbal yang tinggi, sementara 26,3% memiliki kadar timbal yang sangat tinggi. Ditemukan korelasi positif antara kecukupan asupan zat besi dengan kadar hemoglobin ($r=0,580$; $p=0,009$), dan juga ditemukan korelasi negatif antara kadar timbal dengan kadar hemoglobin ($r=-0,552$; $p=0,014$).</p>

4.	<p>Hubungan Antara Asupan Protein, Zat Besi dan Vitamin C dengan Kadar Hb pada Anak Umur (7-15) Tahun di Desa Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo (Yoni Astuti., 2010</p> <p>file:///D:/ANEMIA%20ANAK/1581-4353-1-PB.pdf</p>	<p>Sebanyak 61 anak (kelas 4-6 sekolah dasar)</p>	<p>Desain Penelitian cross sectional – retrospectif</p>	<p>Variabel independen: asupan protein, vitamin C dan zat besi Variabel dependen: Kadar Hb</p>	<p>Kuesioner, Hb Sahli, obyek glass, pengukur tinggi badan, timbangan berat badan,</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan rerata asupan protein, zat besi dan vitamin C berturut-turut adalah sebesar $25,064 \pm 10,055$ gram (38,9% RDA (Recommended Daily Allowance), $6,523 \pm 2,635$ mg (56,33% RDA), dan 69,5% RDA. Rerata kadar hemoglobin sebesar $10,3 \pm 1,2$ gram/dl.</p>
5.	<p>Hubungan Gaya Hidup dan Kebiasaan Makan Dengan Kadar Haemoglobin (hb) Pada Anak Jalanan di Kota Medan (Ginta Siahaan., 2017)</p> <p>http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/jspui/bitstream/123456789/2400/1/document%2862%29.pdf</p>	<p>Seluruh anak jalanan di Simpang Lampu Merah Titi Kuning, Aksara, Juanda, Pringgan, Simpang Petisah serta Terminal Amplas,</p>	<p>Penelitian ini bersifat Observasional dengan desain Cross Sectional</p>	<p>Variabel independen: Gaya Hidup dan Kebiasaan Makan Variabel dependen: kadar hemoglobin</p>	<p>Wawancara dengan menggunakan kuesioner</p>	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gaya hidup anak jalanan adalah untuk memiliki kategori kurang dari 36 orang (50%), dan kebiasaan makan anak jalanan yang paling banyak adalah kurang kategori 28 orang (38,9%) sedangkan untuk kadar hemoglobin (Hb) anak jalanan paling banyak memiliki kategori rendah sebanyak 42 orang (58%), untuk melihat hubungan antara uji statistik dengan Uji Chi-Square, dimana ada hubungan yang bermakna ($p= 0,000 < 0,05$) antara gaya hidup dengan kadar hemoglobin (Hb), sedangkan tidak ada hubungan yang signifikan ($p= 0,096 > 0,05$) antara</p>

		dan Pinang Baris di kota Medan yang berjumlah 300 orang.				kebiasaan makan dengan tingkat hemoglobin (Hb).
6.	Perilaku Sarapan Pagi Kaitannya Dengan Status Gizi dan Anemia Pada Anak Sekolah Dasar (Utama dkk., 2018) https://pdfs.semanticscholar.org/143d/2b01f3327912da176e6f81515ff56244331f.pdf	Sampel yaitu sebanyak 645 siswa	Penelitian ini menggunakan desain cross sectional	Variabel: status gizi dengan indikator TB/U , pada perilaku kebiasaan sarapan pagi dan anemia pada anak	Kuesioner	Ditemukan perbedaan yang signifikan antara sekolah negeri dan swasta dalam hal status gizi, yang dapat dilihat dari indikator TB/U dan kebiasaan sarapan pagi. Prevalensi anemia pada siswa sekolah dasar di Kota Kupang mencapai 27%, yang diukur melalui kadar hemoglobin dalam darah. Siswa yang memiliki kebiasaan sarapan pagi memiliki kontribusi yang lebih tinggi dalam jumlah saudara, jenis kelamin, dan usia. Perbedaan pada variabel status gizi dengan indikator TB/U memiliki nilai $p = 0,034$, sedangkan perilaku kebiasaan sarapan pagi memiliki nilai $p = 0,002$.

7.	<p>Pengaruh Pola Makan terhadap Kadar Hemoglobin Pada Anak Pra Sekolah (Rosalinna dkk., 2020)</p> <p>file:///C:/Users/inspektorat%202/Downloads/document.pdf</p>	<p>Sebanyak 428 sampel</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Observational Research dengan pendekatan cross sectional.</p>	<p>Variabel Independen : pola makan Variabel dependen: kadar hb</p>	<p>Food record selama 7 hari berturut-turut menggunakan food list.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kadar hemoglobin anak-anak adalah 10,18 (0,99). Hasil uji terhadap asupan energi ($\rho = 0,820$), asupan zat besi ($\rho = 0,300$), dan asupan vitamin C ($\rho = 0,300$) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan kadar hemoglobin. Namun, asupan protein ($\rho = 0,007$), variasi diet ($\rho = 0,000$), dan frekuensi konsumsi ($\rho = -0,035$) memiliki hubungan yang signifikan dengan kadar hemoglobin. Analisis multivariat menunjukkan bahwa variasi dalam pola makan secara signifikan mempengaruhi kadar hemoglobin pada anak-anak pra-sekolah ($\rho = 0,000$, $r = 0,0636$; $R^2 = 0,405$).</p>
8.	<p>Kejadian Anemia pada Siswa Sekolah Dasar (Sirajuddin dkk., 2015)</p> <p>file:///C:/Users/inspektorat%202/Downloads/pengetahuan,%20sikap%20dan%20tindakan%20remaja.pdf</p>	<p>Sampel sebanyak 120 siswa</p>	<p>Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang</p>	<p>Variabel independen: zat besi, pola konsumsi, kebiasaan sarapan pagi. Variabel dependen: kejadian anemia</p>	<p>Kuesioner food frequency questionnaire (FFQ)</p>	<p>Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi penentu kejadian anemia meliputi status kecacingan (nilai $p = 0,007$), kebiasaan sarapan pagi (nilai $p = 0,002$), pola konsumsi makanan sumber heme (nilai $p = 0,004$), dan pola konsumsi makanan penghambat zat besi (nilai $p = 0,016$).</p>

9.	<p>The Relationship between Iron Intake and Anemia in Elementary School Children in the Working Area of the Air Beliti Public Health Center, Musi Rawas Regency (Meliyanti et al., 2021)</p> <p>file:///D:/ANEMIA%20ANAK/jurnal%20inter%20.pdf</p>	<p>Sampel dalam penelitian ini adalah 80 anak SD</p>	<p>penelitian observasional analitik dengan desain penampang</p>	<p>Variabel independen: asupan zat besi Variabel dependen: kejadian anemia</p>	<p>Hb Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan tes cepat diagnostik strip dan asupan nutrisi data dikumpulkan melalui lembar observasi pada recall diet 24 jam</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, itu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara zat besi asupan dan kejadian anemia pada anak sekolah. Anak-anak dengan asupan zat besi yang rendah adalah 6,198 kali lebih mungkin untuk menderita anemia. Oleh karena itu, dianjurkan bagi orang tua untuk menjaga keseimbangan asupan gizi dan makanan kaya zat besi untuk mencegah timbulnya anemia pada anak.</p>
10.	<p>hubungan kebiasaan makan pagi dengan kejadian anemia pada murid sd negeri 3 manado (Tandirerung dkk., 2013)</p>	<p>Sampel berjumlah 344 orang</p>	<p>observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional study.</p>	<p>Variabel bebas dalam penelitian ini ialah kebiasaan makan pagi, sedangkan variabel terikat anemia.</p>		<p>Dari hasil penelitian terhadap 83 murid, ditemukan bahwa 58 murid (69,9%) memiliki kebiasaan sarapan pagi, dan sebanyak 74 murid (89,2%) tidak mengalami anemia. Analisis statistik menunjukkan nilai $p = 0,019 (\leq 0,050)$.</p>

Dari tinjauan literatur jurnal, banyak penelitian telah dilakukan mengenai korelasi antara asupan zat gizi mikro dan makro, pola makan, kebiasaan makan, dan gaya hidup dengan kejadian anemia. Sebagian besar jurnal fokus pada anemia yang umumnya terjadi pada remaja perempuan. Penelitian sebelumnya merekomendasikan untuk menitikberatkan pada dampak konsumsi zat gizi mikro dan makro terhadap insiden anemia pada anak jalanan. Selain itu, penelitian yang menyelidiki secara serentak tentang zat gizi mikro dan makro dengan memasukkan variabel status gizi masih merupakan hal yang kurang umum. Dalam penelitian ini, akan dilakukan klasifikasi terhadap konsumsi zat gizi makro dan mikro, di mana zat gizi mikro (vitamin C dan zat besi), zat gizi makro (protein), dan status gizi akan diidentifikasi sebagai indikator kejadian anemia pada anak jalanan. Inilah yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian lainnya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Asupan Zat Besi, Protein, Vitamin C Dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan Di Kota Makassar Tahun 2023”.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menginvestigasi korelasi antara konsumsi zat besi, protein, vitamin C, dan status gizi dengan fenomena anemia yang terjadi pada anak jalanan di Kota Makassar tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendapatkan pemahaman tentang hubungan antara konsumsi zat besi dan insiden anemia yang terjadi pada anak jalanan di Kota Makassar.
- b. Untuk mendalami pemahaman mengenai korelasi antara konsumsi protein dan insiden anemia yang terjadi pada anak jalanan di Kota Makassar.
- c. Untuk memahami korelasi antara konsumsi vitamin C dan insiden anemia yang terjadi pada anak jalanan di Kota Makassar.
- d. Untuk memahami korelasi antara keadaan gizi dan insiden anemia pada anak jalanan di Kota Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas pemahaman ilmiah tentang faktor-faktor yang menyebabkan insiden anemia pada anak jalanan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Responden

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada mereka yang mengalami anemia untuk lebih memperhatikan

pengonsumsi zat besi, protein, vitamin, dan meningkatkan status gizi mereka.

b) Institusi Pendidikan

Sebagai bahan referensi di perpustakaan, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai anemia pada anak serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai kondisi anemia pada anak.

c) Bagi Peneliti

Untuk memperluas perspektif dan pengetahuan penulis dalam mengadakan penelitian di bidang kesehatan, terutama dalam konteks anemia pada anak. Selain itu, ini juga akan menjadi panduan yang berguna untuk menerapkan metode penelitian yang telah dipelajari.

d) Bagi Pihak Terkait

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam upaya untuk merangsang, mendeteksi, dan melakukan intervensi awal terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, penelitian ini juga membantu dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan anemia pada anak. Hal ini akan membantu dalam pelaksanaan tindakan yang lebih efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anemia

1. Pengertian Anemia

Anemia adalah suatu kondisi dimana jumlah Hemoglobin (Hb), hematokrit, dan sel darah merah di dalam darah ada di bawah nilai normal. Dengan kata lain, terjadi penurunan jumlah sel darah merah atau kadar Hemoglobin (Hb) di bawah ambang batas normal (Tiasuti, 2018). Pernyataan tersebut sejalan dengan definisi anemia menurut World Health Organization (WHO) tahun 2021. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah 10 mg/dL, sehingga oksigen dalam darah atau jumlah sel darah merah tidak memenuhi kebutuhan tubuh.

Anemia tidak menunjukkan adanya penyakit atau disfungsi dalam fungsi tubuh. Dari segi fisiologis, anemia terjadi ketika kurangnya jumlah hemoglobin yang dibutuhkan untuk membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh (Choirunissa et al., 2019). Perempuan lebih rentan anemia daripada laki-laki, hal ini signifikan selama bertahun-tahun karena wanita mengalami kehamilan dan menstruasi (Indrawati, 2015). Setiap bulan, perempuan mengalami menstruasi yang secara alami mengakibatkan pelepasan darah dari tubuh mereka. Oleh karena itu, perempuan memerlukan zat besi untuk mengembalikan tubuh mereka ke kondisi semula setelah menstruasi (Choirunissa et al., 2019).

Menurut WHO dalam (Adiyani et al., 2018), batasan anemia yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Batasan Anemia Menurut WHO

Kelompok	Batas Normal
Anak Balita	11 g %
Anak usia Sekolah	12 g %
Wanita Dewasa	12 g %
Laki-laki Dewasa	13 g %
Ibu Hamil	11 g %

Sedangkan Derajat anemia menurut WHO dalam (Adiyani et al., 2018) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Derajat Anemia Menurut WHO

Derajat Anemia	Kadar Hemoglobin (g/dL)
Ringan	10-12
Sedang	7-9
Berat	<7

2. Faktor-Faktor Penyebab Anemia

a. Asupan Zat Besi

1) Zat Besi (Fe)

Besi merupakan unsur elemen yang memiliki peran sangat vital dalam pembentukan sel darah merah. Di samping itu, besi juga memiliki beberapa peran penting di dalam tubuh, antara lain sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh, berperan sebagai pembawa elektron di dalam sel, dan menjadi komponen utama dalam berbagai reaksi enzimatik di dalam jaringan tubuh. (A Buchari, 2018).

Pada perempuan, terjadi lebih banyak ekskresi zat besi dari tubuh jika dibandingkan dengan laki-laki. Selain kehilangan basal, terdapat juga kehilangan melalui mekanisme lain. Tiap bulan, wanita dewasa mengalami siklus menstruasi dan rata-rata kehilangan sekitar 28 mg zat besi setiap kali siklus menstruasi. Karena menstruasi terjadi sekali sebulan, ini berarti bahwa rata-rata wanita mengeluarkan sekitar 28 mg zat besi setiap hari selama menstruasi. Oleh karena itu, wanita mengeluarkan hampir dua kali lipat lebih banyak besi dari tubuh mereka jika dibandingkan dengan laki-laki dewasa. Apabila remaja perempuan mengalami peningkatan kebutuhan akan zat besi tetapi tidak memperoleh asupan yang memadai, mereka berpotensi mengalami anemia karena defisiensi zat besi. (Restuti & Susindra, 2017).

Penyerapan zat besi tergantung pada beberapa faktor, termasuk ketersediaan makanan yang dapat memperlancar atau menghambat penyerapan. Dengan demikian, penyerapan zat besi dari makanan harian dapat berfluktuasi (Denistikasari, 2016) mengindikasikan bahwa konsumsi makanan harian dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

- a) Penyerapan zat besi yang minim, sekitar 5%, berasal dari kebiasaan makan yang tidak bervariasi.

Makanan yang umumnya terbuat dari bahan-bahan seperti beras, ubi, atau jagung, jarang mengandung daging, ikan, atau

vitamin C. Makanan jenis ini juga biasanya mengandung serat atau komponen makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Sebagai hasilnya, penyerapan zat besi dari makanan semacam ini cenderung rendah, sekitar 5%. Kebiasaan makan dengan tingkat penyerapan zat besi yang minim seperti ini lebih umum terjadi di keluarga-keluarga berpendapatan rendah pada negara-negara yang sedang berkembang.

b) Absorpsi zat besi yang sedang atau setara dengan 10 %

Rutinitas makan ini melibatkan komponen-komponen seperti beras atau biji-bijian lain, yang disertai dengan daging dan sumber protein hewani lainnya, dan juga melibatkan konsumsi vitamin C setiap hari. Pola makan semacam ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan tingkat kemampuan finansial yang lebih baik di negara-negara yang sedang berkembang.

Absorpsi zat besi dari jenis pola makan ini mencapai sekitar 10%, atau dapat dikategorikan sebagai tingkat sedang (moderat).

c) Absorpsi zat besi yang tinggi atau setara dengan 15%

Pada negara-negara industri seperti Eropa, Amerika, dan negara maju lainnya, pola makanya seringkali terdapat konsumsi tinggi daging dan berbagai sumber protein hewani dalam menu harian. Sebagai hasilnya, penyerapan zat besi dari makanan tersebut mencapai sekitar 15%, atau dianggap tinggi.

2) Vitamin C

Salah satu nutrisi yang dikenal karena perannya yang penting untuk meningkatkan penyerapan zat besi yaitu Vitamin C. Vitamin C bisa menaikkan penyerapan zat besi non-hemoglobin hingga empat kali lipat. Ini terjadi dengan cara mengubah zat besi feri yang kemudian menjadi zat besi fero di usus halus, sehingga meningkatkan efisiensi penyerapan zat besi. Tak hanya itu, Vitamin C juga menekan pembentukan hemosiderin, yang sulit melepaskan besi saat diperlukan. Vitamin C biasanya ditemukan dalam makanan yang berasal dari tumbuhan, termasuk berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, terutama yang memiliki cita rasa asam, seperti jeruk, nenas, rambutan, papaya, gandaria, dan tomat. (Nuryanto & Riziqo, 2016).

3) Protein

Protein yang terdapat dalam darah memiliki fungsi khusus sebagai pengantar atau carrier zat besi menuju sel-sel mukosa. Protein ini dikenal sebagai transferin, yang dihasilkan oleh hati dan berperan dalam mengangkut zat besi melalui aliran darah untuk digunakan dalam proses pembentukan hemoglobin. Ketika asupan protein dalam makanan berkurang, sintesis transferin dapat terganggu, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan kadar transferin dalam darah. Kadar transferin yang rendah dapat

menghambat transportasi zat besi secara efisien, dan akibatnya, kadar hemoglobin akan menurun (Tadete et al., 2018).

Protein memegang peran penting dalam proses pengangkutan zat besi di dalam tubuh. Kekurangan asupan protein dapat mengakibatkan kelambatan dalam transportasi zat besi, yang akhirnya dapat menyebabkan defisiensi zat besi. Selain itu, makanan yang kaya protein, terutama yang berasal dari sumber seperti daging, ikan, dan unggas, seringkali juga mengandung zat besi dalam jumlah yang cukup (Arifin et al., 2018).

b. Perilaku Makan dan Minum

1) Perilaku Sarapan Pagi

Sarapan adalah istilah yang merujuk pada makanan yang dikonsumsi sebelum memulai aktivitas, termasuk makanan utama dan hidangan pendamping atau camilan. Porsi yang biasanya dikonsumsi sekitar sepertiga dari total asupan makanan sehari. Menurut (Rahmi, 2014), kebiasaan tidak sarapan pagi bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti hilangnya nafsu makan, rutinitas yang tidak melibatkan sarapan, atau kurangnya waktu yang tersedia untuk sarapan. Selain itu, penyebab lainnya dapat berkaitan dengan makanan yang kurang menggugah selera sehingga tidak mengundang hasrat makan.

Sarapan di pagi hari memberikan dampak signifikan pada remaja karena dapat meningkatkan tingkat konsentrasi mereka saat

belajar di sekolah. Ketika seseorang sarapan, gula darah dalam tubuhnya meningkat karena perut diisi kembali setelah periode puasa selama delapan hingga sepuluh jam. Manfaat dari makan pagi adalah menjaga daya tahan tubuh, memungkinkan untuk bekerja atau belajar dengan efektif, meningkatkan fokus dan kemampuan belajar, serta memastikan asupan gizi yang cukup. Sebaliknya, jika seseorang tidak sarapan pagi, dampaknya bisa berupa kelemahan fisik karena kekurangan zat gizi yang dibutuhkan untuk energi, kinerja yang menurun di pagi hari, kesulitan berpikir dengan jernih, dan kecenderungan untuk menjadi malas atau kurang produktif (Denistikasari, 2016).

2) Kebiasaan Minum Teh dan Kopi

Tradisi minum teh telah menjadi unsur integral dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Selain air putih, teh merupakan minuman yang paling sering dikonsumsi oleh manusia. Secara rata-rata, setiap individu mengonsumsi sekitar 120 mL teh per hari. Tannin, sejenis polifenol yang terdapat dalam teh, kopi, serta beberapa jenis sayuran dan buah, mempunyai kemampuan menghambat penyerapan zat besi dengan cara mengikatnya. Jika kadar zat besi dalam tubuh tidak berlebihan, disarankan untuk menghindari mengonsumsi teh atau kopi selama makan (Sirajuddin & Masni, 2015).

Konsumsi teh, jika diminum setidaknya satu jam sebelum atau sesudah makan, dapat mengurangi penyerapan zat besi oleh sel darah merah sekitar 64%. Penurunan daya serap zat besi ini jauh lebih signifikan dibandingkan dengan efek yang sama yang disebabkan oleh minum kopi setelah makan, yang hanya mengurangi penyerapan sekitar 39%. Dalam teh, pengurangan penyerapan zat besi disebabkan oleh kandungan tannin. Di samping tannin, teh juga mengandung berbagai senyawa lainnya seperti kafein, polifenol, albumin, dan vitamin. Tannin memiliki dampak pada penyerapan zat besi dari makanan, khususnya terhadap jenis zat besi non-heme yang ditemukan dalam biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan (Nursari, 2019).

c. Kehilangan Darah

1) Penyakit Infeksi

Penyebab utama anemia melibatkan penyakit infeksi, seperti cacingan, tuberkulosis (TBC), dan malaria. Penyakit anemia gizi dapat menjadi lebih serius ketika terjadi bersamaan dengan infeksi cacing tambang. Cacing tambang melekat pada dinding usus dan menyerap darah, mengakibatkan kehilangan darah pada penderita karena gigitan dan hisapan cacing tersebut. Sehari-hari, satu cacing tambang dapat menyerap sekitar 0,03 ml hingga 0,15 ml darah, sehingga diperkirakan sekitar 2000 ekor cacing diperlukan untuk menyebabkan anemia. Selain itu, cacing gelang juga dapat

menyebabkan defisiensi zat besi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengurangi nafsu makan dan mengganggu penyerapan zat besi akibat perubahan pada permukaan villi usus. (Fitriani, 2021).

2) Menstruasi

Menstruasi (haid) adalah proses perdarahan berkala dan berulang yang berasal dari rahim, yang juga melibatkan pengelupasan lapisan endometrium. Perdarahan menstruasi ini mengikuti pola siklus yang biasanya berlangsung selama 25-31 hari. Siklus menstruasi yang normal terjadi bulanan, menandakan bahwa siklus menstruasi pada wanita usia reproduksi adalah sekali setiap bulan. Jika frekuensi menstruasi lebih dari sekali dalam sebulan, dengan siklus kurang dari 25 hari, keadaan ini dikenal sebagai polimenore (Nursari, 2019).

Evaluasi pola menstruasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan volume darah yang dikeluarkan, frekuensi perdarahan, dan durasi menstruasi. Menilai jumlah darah menstruasi secara akurat dalam satuan kuantitas adalah tugas yang sangat sulit. Bahkan bagi seorang wanita, mengukur atau mengidentifikasi apakah aliran menstruasi mereka tidak normal merupakan hal yang sulit dilakukan. Sebagai acuan, perdarahan menstruasi dianggap tidak normal jika berlangsung selama lebih dari enam hari dan memerlukan lebih dari 12 potong pembalut dalam satu periode

menstruasi. Ketidakmampuan remaja putri untuk mempertahankan jumlah zat besi yang cukup dapat terjadi karena mereka mengalami menstruasi dengan volume yang lebih besar dan durasi yang lebih panjang dari rata-rata (Trisnawati, 2019).

d. Sosial Ekonomi

1) Pengetahuan Gizi

Evaluasi pola menstruasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan volume darah yang dikeluarkan, frekuensi perdarahan, dan durasi menstruasi. Mengukur jumlah darah menstruasi secara akurat dalam satuan kuantitas merupakan tugas yang sangat sulit, bahkan bagi wanita itu sendiri. Identifikasi apakah aliran menstruasi abnormal juga dapat menjadi tugas yang sulit. Sebagai patokan, perdarahan menstruasi dianggap tidak normal jika berlangsung selama lebih dari enam hari dan memerlukan lebih dari 12 potong pembalut dalam satu periode menstruasi. Remaja putri yang mengalami menstruasi dengan volume dan durasi yang lebih besar mungkin mengalami peningkatan kehilangan zat besi di atas rata-rata (Pradanti et al., 2019).

Pengetahuan gizi merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengingat dan memahami informasi mengenai kandungan gizi dalam makanan, sumber-sumber gizi, dan manfaat zat gizi yang berada di dalam tubuh. Pengetahuan gizi melibatkan cara berpikir kognitif yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi gizi

dengan pola makan yang sesuai, dengan tujuan membangun pemahaman yang kuat tentang gizi dan dampaknya terhadap kesehatan. Pemahaman seseorang tentang gizi dapat mempengaruhi keputusan makanan yang diambilnya, yang pada akhirnya akan berdampak pada status gizi individu tersebut (Fitriani, 2021).

2) Pendidikan Orangtua

Pendidikan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai cara menjaga kesehatan, cara menghindari potensi risiko kesehatan, serta langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi masalah kesehatan, termasuk mengetahui tempat mencari perawatan medis saat sakit. Faktor pendidikan memberikan pengaruh terhadap status anemia seseorang terkait dengan pilihan makanan yang mereka konsumsi. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang gizi dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah (Trisnawati, 2019).

Tingkat pendidikan ibu memiliki peran yang signifikan dalam menentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ibu dalam menentukan makanan untuk keluarganya. Umumnya, peran ibu memiliki dampak besar dalam membentuk kebiasaan makan anak-anak, termasuk perencanaan menu, pembelian bahan makanan, proses memasak, dan penyajian makanan. Pendidikan dan

pengetahuan ibu memegang peran kunci dalam menentukan kualitas hidangan yang disiapkan. Jika seorang ibu memiliki pemahaman gizi yang lebih baik, maka kecenderungan untuk memiliki sikap positif terhadap perencanaan makanan juga meningkat. Semakin meningkat pengetahuan gizi ibu, semakin baik sikap ibu terhadap kualitas gizi makanan yang dipersiapkan, sehingga asupan gizi keluarga menjadi lebih baik (Tania, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nursari pada tahun 2019, ada dua potensi hubungan antara pola konsumsi makanan pada keluarga dan tingkat pendidikan orang tua, yaitu:

- a) Pendidikan orang tua memiliki potensi untuk mempengaruhi kondisi rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kondisi rumah tangga tersebut dapat berdampak secara signifikan pada pola makan keluarga.
 - b) Pendidikan istri, selain memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi keluarga, juga berpengaruh pada perencanaan pola makan keluarga.
- 3) Pekerjaan Orangtua

Jenis pekerjaan seseorang bisa berpengaruh pada tingkat pendapatan mereka, dan selain itu, faktor-faktor seperti durasi kerja baik di rumah maupun di luar rumah, serta jarak antara tempat kerja, juga memiliki dampak pada pola makan keluarganya. Orangtua yang memiliki pekerjaan tetap, meskipun pendapatannya mungkin

rendah, cenderung memberikan stabilitas sosial yang lebih baik bagi keluarganya jika dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak menentu dengan pendapatan yang tidak menentu (Nursari, 2019).

4) Pendapatan Orangtua

Kebiasaan makan keluarga secara umum berkaitan dengan aspek ekonomi, di mana semakin tinggi pendapatan keluarga, semakin beragam pola makanan yang biasa mereka konsumsi. Pekerjaan dan sumber pendapatan keluarga merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Ketika pendapatan meningkat, seringkali terjadi peningkatan dalam penyediaan hidangan yang lebih berkualitas. Tingkat pengeluaran yang dapat diketahui oleh anak sering tercermin melalui uang saku yang mereka terima dari orangtua mereka (Pradanti et al., 2019).

Perubahan pendapatan secara langsung mempengaruhi perubahan dalam konsumsi makanan keluarga. Peningkatan pendapatan meningkatkan kemungkinan untuk membeli makanan dengan kualitas dan jumlah yang lebih baik. Sebaliknya, penurunan pendapatan dapat menyebabkan penurunan pembelian makanan, yang berpotensi mengakibatkan kekurangan zat gizi, termasuk zat besi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan anemia (Fitriani, 2021).

e. Status Gizi

Status gizi merupakan hasil keseimbangan bentuk variabel tertentu atau representasi zat gizi yang berbentuk variabel tertentu. Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah suatu alat yang mudah digunakan untuk mengawasi status gizi. Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan pengukuran berat badan seseorang yang diperhitungkan dalam hubungannya dengan tinggi badan, dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter yang telah dikuadratkan. Dalam mengevaluasi status gizi individu berusia 10-14 tahun, IMT digunakan dengan mempertimbangkan faktor usia dan jenis kelamin (Pradanti et al., 2019).

c. Jenis-jenis Anemia

Menurut (A Buchari, 2018), anemia dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya menjadi berbagai jenis, antara lain::

a. Anemia karena defisiensi besi

Anemia defisiensi besi adalah keadaan anemia yang timbul akibat berkurangnya simpanan besi dalam tubuh. Gejala kondisi ini mencakup penurunan saturasi transferin serta rendahnya kadar feritin atau hemosiderin di sumsum tulang. Langkah-langkah laboratorium yang dapat mencerminkan defisiensi besi termasuk hal-hal berikut:

- 1) Berkurangnya cadangan besi dalam tubuh.
- 2) Penurunan kadar Feritin dalam serum.

- 3) Penurunan kadar besi dalam serum dengan peningkatan kadar transferin dalam serum.
- 4) Peningkatan Red Cell Distribution Width (RDW).
- 5) Berkurangnya Mean Corpuscular Volume (MCV).
- 6) Penurunan kadar hemoglobin..

Anemia-anemia tersebut bisa diatasi dengan mengonsumsi makanan dan suplemen dengan zat besi yang tinggi, seperti daging kambing atau sapi, kacang panjang, sereal yang dipenuhi zat besi, dan berbagai jenis kacang-kacangann.

b. Anemia karena defisiensi vitamin B12 dan Asam Folat

Ketidakcukupan kedua vitamin ini bisa mengakibatkan pembentukan sel darah merah yang memiliki ukuran yang sangat besar. Meskipun begitu, dimensi sel tersebut bukanlah penanda utama kapasitasnya membawa banyak oksigen. Anemia tipe ini bisa diatasi melalui pemberian suntikan vitamin B12, sedangkan kekurangan folat umumnya bisa diatasi dengan mengonsumsi suplemen folat. Makanan yang terdapat float dan vitamin B12 meliputi produk susu dan daging yang telah diolah.

c. Anemia karena penyakit kronik

Anemia kronis adalah jenis anemia yang memiliki tingkat keparahan ringan hingga sedang, disebabkan oleh infeksi kronis, peradangan, trauma, atau penyakit neoplastik yang berlangsung selama periode 1-2 bulan. Kondisi ini tidak melibatkan masalah pada organ

seperti hati, ginjal, atau sistem endokrin. Anemia jenis ini dicirikan oleh gangguan metabolisme besi, yang menyebabkan penumpukan besi di dalam makrofag dan terjadinya hipotermia. Secara umum, patogenesis anemia penyakit kronis menekankan dua kelainan utama:

- 1) Eritrosit memiliki umur yang lebih singkat karena mengalami lisis lebih awal.
- 2) Terdapat respons dari sumsum tulang yang terganggu karena penurunan produksi eritropoetin dan gangguan dalam penggunaan kembali besi.

d. Anemia Aplastik

Sumsum tulang merupakan organ yang memainkan peran krusial pada pembentukan sel darah merah. Fungsi sumsum tulang melibatkan produksi berbagai jenis sel darah, seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit (sel pembeku darah). Jika sumsum tulang mengalami kegagalan dalam melaksanakan fungsinya ini, dapat mengakibatkan terjadinya anemia aplastik yang memiliki tingkat kematian yang tinggi. Umumnya, infeksi dan perdarahan merupakan penyebab utama kematian pada anemia aplastik. Dalam situasi yang parah, kesembuhan pasien mungkin tercapai melalui transplantasi sumsum tulang dan perlu menjalani pengobatan seumur hidup dengan obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh (imunosupresan). Pada kasus yang lebih ringan, terapi kombinasi dengan imunosupresan seperti steroid dan siklosporin bisa menjadi pilihan. Perlu dicatat bahwa

dalam anemia aplastik, transfusi darah dapat memberikan bantuan dalam mengatasi gejala, namun hanya bersifat simptomatik dan tidak mengatasi akar permasalahan, sehingga anemia dapat kembali muncul.

e. Anemia Hemolitik

Anemia hemolitik adalah suatu kondisi anemia yang disebabkan oleh peningkatan dalam proses pemecahan sel darah merah. Secara umum, masa hidup sel darah merah sekitar 120 hari. Tetapi, jika jumlah sel darah merah itu berkurang hingga dua kali lipat, organ-organ seperti sumsum tulang, limpa, dan hati dapat mendeteksi penurunan tersebut dan berusaha untuk menghancurkannya. Apabila suatu penyakit menyebabkan hemolisis, yaitu penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari biasanya, sumsum tulang berupaya menggantinya dengan meningkatkan produksi sel darah merah baru. Proses ini bisa mencapai kecepatan hingga 10 kali lipat dari tingkat normal. Akan tetapi, jika tingkat penghancuran sel darah merah melebihi kapasitas pembentukan sel darah merah baru, maka anemia hemolitik akan terjadi. Terdapat juga obat-obatan tertentu, seperti rifampisin (sejenis antibiotik golongan kuinolon) yang digunakan untuk pengobatan tuberkulosis, yang dapat merangsang terjadinya anemia hemolitik dengan cara mengikat pada sel darah merah dan menyebabkan penghancuran mereka (lisis).

f. Anemia Bulan Sabit (sickle cell anemia)

Anemia jenis ini merupakan varian anemia yang bersifat diwariskan (herediter). Kendala terletak pada struktur sel darah merah, di mana pada saat kondisi normal, sel darah merah umumnya memiliki bentuk yang bulat dan fleksibel. Namun, pada individu dengan sickle cell anemia, sel darah merah mengalami perubahan bentuk menjadi tidak teratur dan menyerupai sabit. Bentuk sel yang tidak teratur ini cenderung mengalami kematian prematur, yang mengakibatkan kondisi defisiensi sel darah merah secara kronis. Kelompok etnis Afrika dan Arab lebih sering mengalami kasus penyakit ini.

d. Pencegahan Anemia

Tindakan untuk mencegah dan mengatasi anemia pada dasarnya bertujuan untuk mengatasi akar penyebab dari kondisi tersebut. Pencegahan dan penanganan anemia dapat diimplementasikan melalui langkah-langkah berikut:

a. Perbaiki konsumsi makanan yang kaya nutrisi

- 1) Mengonsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi, bisa berasal dari produk hewani (seperti ayam, daging, ikan, hati, dan telur) ataupun produk nabati (seperti sayuran berwarna hijau tua, biji-bijian, dan kacang-kacangan), dapat menjadi tindakan pencegahan anemia yang efektif.
- 2) Mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin C tinggi, seperti daun katuk, jambu, tomat, jeruk, dan nanas, dapat

secara positif meningkatkan penyerapan zat besi dalam sistem pencernaan.

Sebagaimana dengan firman Allah swt. dalam QS. An-An'am/ 6: 95 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir (padi-padian) dan biji (buah-buahan). Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah (kekuasaan) Allah. Maka, bagaimana kamu dapat dipalingkan?”. (Al-Qur'an dan terjemahan Departemen Agama RI).

Berdasarkan penafsiran Al-Jalalain, dijelaskan bahwa (Sesungguhnya Allah menumbuhkan) menjadikan (butir) tunas tetumbuhan (dan biji) dari pohon kurma. (Dia mengeluarkan yang hidup dan yang mati) seperti manusia dan unggas yaitu berasal dari air mani dan telur (dan mengeluarkan yang mati) yakni air mani dan telur (dari yang hidup, yang demikian itu) artinya yang menumbuhkan dan yang mengeluarkan (ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling) mengapa kamu masih berpaling juga dari keimanan padahal bukti-buktinya telah ada.

Allah menjelaskan bahwa segala bentuk kehidupan berasal dari Pencipta kehidupan, yaitu Allah. Allah menciptakan reproduksi segala jenis tumbuhan dari benih atau biji-bijian kehidupan, baik yang

berupa butiran atau benih. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman manusia sesuai dengan pengetahuan umum yang dimiliki oleh mereka, termasuk segala bentuk kehidupan yang dalam ilmu pengetahuan dapat diklasifikasikan sebagai tumbuhan yang berkembang biak melalui spora atau pembelahan sel yang mungkin hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Semua ini berkembang biak sesuai dengan hukum sebab dan akibat yang telah ditentukan oleh Allah.

Dari ayat tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan bumi sebagai penyedia sumber makanan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan juga sebagai tempat yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kehidupan mereka. Allah SWT menciptakan tumbuhan dari biji dan butiran, yang menghasilkan buah-buahan. Semua ini merupakan karunia dari Allah SWT sebagai bentuk anugerah kepada manusia agar mereka bersyukur. Dari perspektif kesehatan, ayat tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan dan buah-buahan yang kaya akan vitamin dan mineral memiliki peranan penting dalam pemeliharaan dan pertumbuhan jaringan tubuh manusia.

Makanan yang bervariasi memberikan berbagai nutrisi yang saling mencukupi. Sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan dan biji-bijian mengandung sejumlah besar zat besi juga vitamin lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Memastikan asupan makanan bervariasi dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat membantu mencegah

terjadinya anemia akibat kekurangan zat besi. Tetapi, menjaga keseimbangan gizi tetap menjadi sesuatu yang esensial, sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-A'raf/7:31:

يَبْنِيَّ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. (Al-Qur'an dan terjemahan Departemen Agama RI).

Menurut penafsiran Al-Muyassar, ayat ini menyampaikan pesan bahwa saat akan melaksanakan shalat, kita seharusnya memastikan diri dalam keadaan berhias sesuai syariat, dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat, menjaga kebersihan, serta memperhatikan kesucian dan hal-hal lainnya. Selain itu, kita diingatkan untuk makan dan minum dari rezeki yang baik-baik yang telah diberikan Allah, dan ditekankan agar tidak melampaui batas kewajaran dalam hal tersebut. Allah tidak menyukai perilaku yang berlebihan dan melampaui batas, baik dalam makanan, minuman, maupun hal-hal lainnya. Memakai pakaian yang layak dalam konteks ini berarti menggunakan busana yang memenuhi syarat-syarat hijab dan menutupi aurat dengan baik. Lebih disukai jika pakaian tersebut selain bersih dan sesuai, juga estetis dan dapat meningkatkan kesolehan seseorang saat beribadah kepada Allah. Ini serupa dengan bagaimana seseorang

berdandan dan mengenakan pakaian yang menarik saat menghadiri acara-acara istimewa atau undangan. Oleh karena itu, ketika pergi untuk beribadah dan menyembah Allah, sebaiknya menggunakan pakaian yang pantas dan bahkan dianjurkan. Namun, ini juga bergantung pada kemampuan dan kesadaran individu. Jika seseorang hanya memiliki satu pakaian yang cukup untuk menutupi aurat selama beribadah, itu sudah mencukupi. Tetapi jika ada lebih banyak pilihan pakaian yang tersedia, maka lebih baik jika yang digunakan adalah yang berkualitas.

Maksudnya adalah kita perlu memperhatikan apa yang kita makan dan minum agar tidak melebihi atau kurang dari kebutuhan tubuh. Kita seharusnya mengonsumsi makanan dengan porsi yang sesuai dan tidak melewati batas yang diizinkan oleh agama. Mengonsumsi makanan dan minuman dalam jumlah berlebihan atau kurang dari yang diperlukan oleh tubuh dapat mengakibatkan penyakit. Salah satu contohnya adalah anemia gizi besi atau anemia defisiensi yang terjadi karena kurangnya zat besi didalam tubuh.

- b. Meningkatkan kadar zat besi (fe) dalam tubuh menggunakan Tablet Penambah Darah (TPD).
- c. Mengatasi penyakit pemicu maupun memperburuk anemia, antara lain infeksi cacing, malaria, dan tuberkulosis, merupakan langkah penting. Dengan mengobati penyakit-penyakit tersebut, risiko terjadinya anemia dapat diminimalkan.

B. Tinjauan Hubungan Zat Besi, Vitamin C, Protein dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia

1. Hubungan Asupan Zat Besi dengan Kejadian Anemia

Zat besi (Fe) adalah mikromineral yang memiliki peranan yang sangat vital dalam fungsi tubuh manusia. Peran utamanya terletak pada proses hematopoiesis, utamanya dalam proses pembentukan hemoglobin (Hb). Fungsi utama zat besi adalah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh serta berpartisipasi dalam pengangkutan elektron pada proses produksi energi sel. Dalam rangka mengangkut oksigen, zat besi harus berikatan dengan protein, membentuk hemoglobin di dalam sel darah merah, dan juga myoglobin di dalam serat otot. Disamping itu, ketika berinteraksi dengan protein dalam sel, zat besi juga memainkan peran penting dalam sejumlah reaksi enzimatik yang mendukung pembentukan energi sel. Sebagai hasilnya, zat besi cenderung terkonsentrasi di dalam sel darah merah, yang memberi warna merah pada darah (A Buchari, 2018).

Kekurangan asupan dan penyerapan zat besi dapat menjadi penyebab anemia, seperti mengonsumsi makanan yang memiliki kualitas zat besi rendah, seperti makanan tinggi serat, rendah vitamin C, dan rendah daging. Selain itu, anemia dapat disebabkan oleh mengonsumsi minuman seperti teh dan kopi yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Makanan yang kurang bernutrisi, seperti junk food, juga dapat berkontribusi terhadap anemia karena biasanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kandungan

kalsium, besi, riboflavin, asam folat, vitamin A, dan Vitamin C. Makanan jenis ini cenderung tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan natrium (Tadete et al., 2018).

Kebutuhan zat besi dalam tubuh seseorang dapat bervariasi berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Wanita, terutama yang berusia subur, bayi, anak-anak, dan remaja, memiliki risiko yang tinggi akan terkena anemia akibat kekurangan zat besi (fe) dibandingkan dengan kelompok lain. Wanita membutuhkan zat besi lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor menstruasi (Tania, 2018). Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi gizi seseorang dalam hal zat besi mencakup jumlah zat besi yang dikonsumsi melalui makanan, jumlah yang diserap oleh saluran pencernaan, cadangan zat besi dalam jaringan tubuh, kebutuhan tubuh, dan proses ekskresi. Dalam umumnya, hati, daging, dan ikan merupakan sumber terbaik zat besi, sementara sayuran juga adalah sumber terbaik dari tanaman.

Sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. An-Nahl/ 16:10-11 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan)

tumbuhan yang dengannya kamu menggembalakan ternakmu (1) Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir (2)”. (Al-Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI).

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Allah mencatat nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada mereka, termasuk hewan ternak dan melata. Allah mulai menyebutkan nikmat-Nya dengan turunnya hujan dari langit, yang membawa air minum juga berbagai kenikmatan dunia bagi mereka dan hewan-hewan mereka.

Tujuan dari ayat tersebut adalah untuk memberikan pengingat kepada manusia agar bersyukur kepada Allah SWT dan menggunakan anugerah-anugerah-Nya dengan baik. Allah, yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, telah menurunkan air hujan dari langit untuk kepentingan manusia. Sebagian air tersebut menjadi minuman yang menyegarkan, sementara sebagian lainnya menyebabkan tumbuhnya tumbuhan yang menjadi pakan bagi hewan ternak manusia. Dengan pakan ini, manusia dapat merawat ternak mereka sehingga ternak tersebut dapat memberikan susu, daging, dan bulu yang bermanfaat bagi manusia (Shihab, 2002). Sementara itu, ayat ke-11 menyajikan informasi lebih lanjut mengenai tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat atau populer di masyarakat Arab, tempat di mana Al-Qur'an diturunkan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, dengan kehendak-Nya, menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman melalui hujan yang telah disebutkan sebelumnya. Tanaman-tanaman tersebut meliputi zaitun, yang dikenal dengan umur

panjangnya, kurma yang dapat dikonsumsi baik dalam kondisi mentah maupun matang, mudah untuk dipetik, memiliki nilai gizi yang tinggi, dan kaya akan kalori. Selain itu, disebutkan anggur juga dapat berfungsi sebagai makanan yang halal atau minuman yang dianggap haram, bersama dengan berbagai jenis buah lainnya yang tidak tercantum sebelumnya. Semua ini menunjukkan secara jelas bahwa Allah, Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, mengatur segalanya dengan sempurna melalui proses curahan hujan dan efek-efeknya. Tanda ini memberikan pelajaran bagi mereka yang berpikir. Faktanya, meskipun sumber air dan tanah tempat tumbuhnya sama, ragam dan rasa buah-buahan yang tumbuh dari tanah tersebut berbeda-beda (Shihab, 2002).

Berbagai sumber zat besi dalam makanan hewani, tumbuhan, dan produk olahan dapat ditemukan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Zat Besi Dalam Makanan

Bahan makanan	Zat besi (mg/100g)
Hati	6,0-14,6
Daging sapi	2,0-4,3
Ikan	0,5-1,0
Telur ayam	2,0-3,0
Kacang-kacangan	1,9-14,0
Tepung gandum	1,5-7,0
Sayur daun hijau	0,4-18,0
Umbi-umbian	0,3-2,0
Buah-buahan	0,2-4,0
Beras	0,5-0,8
Susu sapi	0,1-0,4

Sumber: (Davidson, dkk 1973 dalam Jannah, 2010)

2. Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Anemia

Protein adalah substansi yang memiliki peran pengaturan yang krusial dalam fungsi tubuh manusia. Pada anak balita, protein memiliki kebutuhan yang sangat penting untuk menjaga dan meregenerasi jaringan tubuh, mengontrol perubahan komposisi tubuh, serta berpartisipasi dalam pembentukan jaringan baru. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai sumber energi, menyumbang sekitar 4 kalori energi per gramnya, jumlah yang setara dengan yang dihasilkan oleh karbohidrat. Struktur protein terdiri dari berbagai jenis asam amino, termasuk yang bersifat esensial dan non-esensial, masing-masing dengan peran yang unik. Protein juga memegang peran kunci sebagai prekursor untuk banyak koenzim, hormon, asam nukleat, dan molekul-molekul lain yang menjadi komponen penting dalam kehidupan (Nuryanto & Riziqo, 2016).

Kekurangan zat besi bisa terjadi akibat asupan protein yang memiliki kualitas rendah, artinya protein tersebut tidak mengandung asam amino esensial. Jenis protein dengan kualitas rendah ini biasanya ditemukan dalam banyak produk protein nabati, kecuali kedelai. Dalam sistem tubuh, protein memegang peranan krusial dalam memfasilitasi penyerapan zat besi dengan berinteraksi dengan rantai protein lainnya, membantu dalam transportasi elektron yang berperan penting dalam proses metabolisme energi. Jumlah protein yang diperlukan dalam aspek kebutuhan gizi dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi individu dan tingkat aktivitas fisik yang dilakukan, dapat diakses pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Angka Kecukupan Gizi Protein

Kelompok Umur	Protein (gram)
0-5 bulan	9
6-11 bulan	15
1-3 tahun	20
4-6 tahun	25
7-9 tahun	40
10-12 tahun	50
13-15 tahun	70
16-18 tahun	75

Sumber: AKG, 2019

3. Hubungan Asupan Vitamin C dengan Kejadian Anemia

Untuk meningkatkan penyerapan zat besi (fe), vitamin C berperan penting yang bertugas menghambat pembentukan hemosiderin, yang sulit melepaskan besi saat dibutuhkan. Beberapa penelitian juga telah menunjukkan bahwa kejadian anemia dapat terkait dengan konsumsi vitamin C. Untuk remaja, mendapatkan cukup vitamin C sangat penting karena vitamin ini berperan sebagai agen pereduksi, mempertahankan zat besi dalam bentuk ferro dalam saluran pencernaan sehingga dapat lebih mudah diserap (Trisnawati, 2019).

Tabel 2. 5 Kandungan Vitamin C Dalam Beberapa Bahan Makanan

Bahan makanan	Kandungan Vitamin C (mg/100g)
Kentang	17
Singkong	30
Ubi rambat	20
Hati sapi	30
Bayam merah	80
Daun melinjo	150
Daun kelor	220
Jambu biji	95
Papaya	78
Nanas	24
Rambutan	85
Manga muda	65

Sumber: DKBM (2005)

4. Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia

Status gizi adalah kondisi yang mencerminkan sejauh mana seseorang mendapatkan dan memanfaatkan nutrisi yang memengaruhi kesehatannya. Status gizi individu pada dasarnya adalah hasil dari seimbang antara asupan nutrisi yang dikonsumsi dan kebutuhan nutrisi yang dimilikinya (Tania, 2018).

Keadaan gizi seseorang dipengaruhi oleh asupan makanan. Status gizi yang optimal terjadi ketika tubuh menerima jumlah yang cukup dari berbagai zat gizi dan menggunakan zat gizi secara efisien adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan fisik yang optimal, perkembangan otak yang baik, kemampuan kerja yang optimal, dan kesehatan yang baik. Sebaliknya, status gizi kurang terjadi saat tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial. Di sisi lain, status gizi yang berlebihan terjadi ketika tubuh menerima zat gizi dalam jumlah berlebihan, yang dapat menghasilkan efek toksik atau berbahaya. Kondisi status gizi yang tidak seimbang, baik itu kurang atau berlebihan, dapat menyebabkan gangguan kesehatan (Nuryanto & Riziqo, 2016).

Terdapat beragam pendekatan yang bisa diterapkan untuk mengevaluasi status gizi individu. Metode-metode ini mencakup wawancara tentang pola makan, Metode-metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi status gizi melibatkan pencatatan makanan selama 24

jam, pengisian kuesioner frekuensi konsumsi makanan (FFQ), analisis riwayat makanan, pencatatan harian makanan, pengamatan langsung, penilaian konsumsi makanan oleh keluarga, pemeriksaan klinis, pengukuran antropometri, dan pemeriksaan biokimia (Dani, 2017).

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau *Body Mass Index* (BMI) merupakan metode yang sangat sederhana untuk mengevaluasi status gizi remaja. Prosedur ini melibatkan pengukuran tinggi badan dan berat badan remaja. Tinggi badan diukur menggunakan peralatan khusus seperti mikrotoise. Para peserta diminta untuk berdiri tegak tanpa alas kaki, dan mikrotoise yang sudah diatur setinggi 2 meter ditarik turun untuk mengukur tinggi badan mereka, dengan hasil pengukuran dicatat. Bobot badan diukur dengan menggunakan timbangan injak digital. Peserta diminta untuk naik ke atas timbangan tanpa alas kaki, mengamati angka yang ditunjukkan oleh timbangan, dan mencatatnya (Adiyani et al., 2018).

Setelah data tinggi dan berat badan telah diperoleh, langkah berikutnya adalah menggunakan rumus menghitung IMT sebagai berikut :

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi Badan (cm)} \times \text{Tinggi Badan (cm)}}$$

Hasil perhitungan menggunakan rumus di atas kemudian dianalisis dengan membandingkannya dengan tabel interpretasi yang telah disusun oleh WHO (2005) untuk menetapkan kategori status gizi yang sesuai. Kategori ini mencakup:

1. Gizi Kurang ketika nilai z berada di antara -3 SD hingga -2 SD.

2. Gizi Baik ketika nilai z berada di antara -2 SD hingga +1 SD.
3. Gizi Lebih ketika nilai z berada di antara +1 SD hingga +2 SD.
4. Obesitas ketika nilai z lebih dari +2 SD

C. Tinjauan Tentang Anak Jalanan

1. Definisi Anak Jalanan

Menurut Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001), anak jalanan merujuk kepada anak-anak yang sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk mencari penghasilan atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Sebagian dari mereka mungkin melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan secara sukarela, tetapi banyak juga anak-anak yang terpaksa melakukannya karena tekanan dari orang di sekeliling mereka, termasuk orang tua ataupun anggota keluarga lainnya, akibat sulitnya kondisi ekonomi. Anak jalanan memiliki rentang usia dari 6 hingga 18 tahun dan menghabiskan lebih dari 4 jam setiap harinya di jalanan, mengerjakan banyak hal atau hanya berkeliaran di sana. Penampilan mereka umumnya terlihat kusam, pakaian mereka tidak terawat, dan tingkat mobilitas mereka tinggi (Zulkhan, 2021).

Selain itu, menurut Departemen Sosial RI (2001), indikator anak jalanan berdasarkan usianya adalah anak yang berusia antara 6 hingga 18 tahun. Anak jalanan dalam konteks ini mengacu pada individu yang berusia di bawah 18 tahun dan menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di tempat umum seperti jalanan, pusat perbelanjaan, pasar, alun-alun, taman kota, stasiun dan terminal. Mereka terlibat diberbagai kegiatan tersebut

dengan tujuan untuk mencari mata pencaharian atau memenuhi kebutuhan hidup mereka. (Isbach, 2014).

Anak jalanan adalah kategori anak-anak dengan usia 5-18 tahun, yang mencakup baik laki-laki ataupun perempuan, dan sebagian besar menghabiskan waktu mereka di jalanan. Mereka memiliki tingkat komunikasi yang sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali dengan keluarga mereka, serta kurangnya pengawasan, perlindungan, dan bimbingan yang memadai. Situasi ini membuat mereka rentan terhadap masalah kesehatan dan tantangan psikologis (Rahmi, 2014).

2. Karakteristik Anak Jalanan

Ciri dan karakteristik unik anak jalanan, menurut Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, mencakup aspek-aspek berikut ini: 1). Rentang usia anak jalanan berkisar antara 6 hingga 15 tahun, 2). Mereka telah meninggalkan keluarga mereka, 3). Anak-anak ini terlibat dalam kegiatan tertentu yang menjadi rutinitas bagi mereka, 4). Mereka sudah tidak bersekolah. Penelitian dan pengalaman dalam menangani anak jalanan di beberapa kota besar mengidentifikasi dua kategori anak jalanan. Pertama, ada kelompok "children of the street" yang hidup dan tinggal di jalanan, telah terputus hubungan dengan keluarga mereka. Dalam lingkungan anak jalanan, mereka sering disebut sebagai gelandangan, gembel, tekyan, dan sejenisnya. Kelompok ini umumnya tidak memiliki pekerjaan ataupun tempat tinggal yang stabil, sehingga kebanyakan di antara mereka terjerumus dalam

tindakan pencurian, aktivitas kriminal, dan pemakaian NARKOBA (Narkotik, Alkohol, Obat, dan Bahan Adiktif).

Kelompok kedua adalah "children on the street" yang juga dikenal sebagai anak-anak pekerja. Di Indonesia, mereka sering disebut sebagai pekerja anak jalanan, yakni anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka bekerja di jalanan atau tempat umum untuk mendukung kebutuhan keluarga. Umumnya, mereka bekerja untuk mencari penghasilan dan oleh karena itu, cenderung memiliki waktu luang yang terbatas untuk aktivitas lain seperti penggunaan Narkoba (Rahmi, 2014).

3. Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Anak Jalanan


Sejumlah faktor yang mendorong anak-anak untuk hidup di jalanan mencakup Situasi ekonomi keluarga yang sulit, konflik keluarga dalam rumah tangga, dan masalah konflik orang tua dan anak merupakan faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi anak jalanan. Menurut laporan UNICEF, sekitar 75% dari 100 juta anak yang tinggal di negara berkembang yang bekerja di jalanan kembali ke rumah mereka setiap malam, sementara 25% sisanya tidak bisa kembali ke rumah karena banyak alasan. Anak-anak jalanan ini terpapar pada lingkungan yang berpotensi membawa berbagai risiko, termasuk pelecehan seksual, serta kondisi kesehatan, gizi, dan kebersihan yang buruk (Zulkhan, 2021).

Banyak pihak meyakini bahwa faktor utama yang mendorong anak-anak untuk hidup di jalanan adalah kemiskinan. Faktor-faktor lainnya seringkali muncul sebagai akibat dari atau terkait erat dengan kondisi

kemiskinan, atau dapat ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor tersebut. Beberapa faktor ini meliputi kekerasan dalam keluarga, tekanan dari keluarga, keinginan untuk merasakan kebebasan, keinginan untuk memiliki penghasilan sendiri, serta pengaruh dari teman-teman sebaya (Rahmi, 2014).



D. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber: modifikasi peneliti dalam Husaini (1989), Dillah Nursari (2019), Fitriani (2021).


Berdasarkan landasan teori diatas kerangka konsep penelitian terbagi atas 2 variabel yaitu:

1. Variabel Independen
 - a. Asupan zat besi
 - b. Asupan protein
 - c. Asupan vitamin C

d. Status gizi

2. Variabel Dependen

Kejadian Anemia pada anak jalanan



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, suatu penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk angka dan kemudian menganalisisnya menggunakan metode statistik (Prof. Dr. Ir. Raihan, 2017). Hasil analisis tersebut kemudian dipergunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian observasional analitik yang menerapkan pendekatan cross-sectional study. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara faktor-faktor independen, seperti asupan zat besi, vitamin C, protein, dan status gizi, dengan faktor dependen, yaitu kejadian anemia, diamati atau diukur secara simultan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di area Binaan Komunitas Peduli Anak Jalanan di Kota Makassar. Lokasi penelitian mencakup Adiyaksa, BTP, Kerung-Kerung, Manggala, Telkomas, dan Unhas.

2. Waktu penelitian

Penelitian berlangsung di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mulai tanggal 8 Januari hingga 8 Februari 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi mengacu pada keseluruhan subjek atau objek yang mendapat perhatian atau sedang menjadi fokus penelitian (Prof. Dr. Ir. Raihan, 2017). Seluruh anak jalanan yang menerima bimbingan di berbagai lokasi yang dikelola oleh KPAJ di Kota Makassar termasuk dalam populasi penelitian ini, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 170 anak jalanan.

2. Sampel

Merupakan subset dari semua item yang sedang diselidiki dan dianggap mencerminkan keseluruhan populasi. Sampel penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive sampling), berdasarkan pertimbangan khusus seperti karakteristik atau atribut yang sudah diketahui sebelumnya pada populasi (Notoadmojo, 2010). Responden yang menjadi subjek penelitian adalah anak-anak yang bekerja di sektor informal selama penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022.

Berdasarkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus slovin,

$$n = \frac{n}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{170}{1 + 170 \times 0,05 \times 0,05}$$

$$n = 119,29 = 120$$

Oleh karena itu, didapatkan jumlah responden minimum yang diperlukan untuk penelitian ini adalah 120 orang.

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel (0,05)

Pemilihan sampel mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebagai berikut:

a. Kriteria inklusi

- 1) Bersedia diwawancarai
- 2) Bersedia dilakukan pengukuran antropometri (BB/TB).
- 3) Bersedia pengambilan darah

b. Kriteria eksklusi:

- 1) Tidak bersedia diwawancarai.
- 2) Tidak bersedia dilakukan pengukuran antropometri (BB/TB).
- 3) Tidak bersedia pengambilan darah

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang diambil terdiri dari data asli (primer) dan data yang sudah ada (sekunder). Dalam jenis penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Informasi yang diperoleh secara langsung dari responden melalui pengisian kuesioner merupakan data primer. Tujuan penggunaan kuesioner ini adalah untuk menghimpun informasi mengenai konsumsi zat besi, protein, vitamin C, dan kondisi gizi.

Proses pengumpulan data primer melibatkan penjelasan singkat kepada responden mengenai kuesioner, pengisian kuesioner oleh responden, pengumpulan kuesioner oleh peneliti, dan pemeriksaan kelengkapan data tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari Komunitas Peduli Anak Jalanan terkait jumlah anak jalanan di Kota Makassar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat pengumpulan data, yakni Kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam konteks penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah:

1. Kuisisioner

Kuesioner Food Recall 2x24 jam digunakan untuk merepresentasikan pola makan, termasuk asupan zat besi, protein, dan vitamin C. Dalam langkah ini, pewawancara bertanya kepada responden mengenai jenis makanan yang mereka konsumsi selama dua hari secara berurutan.

2. *Hematology Analyzer* digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin responden.

1) Alat Ukur Tinggi Badan

Pengukuran tinggi badan dan panjang badan pada balita dilakukan dengan memanfaatkan alat pengukur tubuh yang bersifat multifungsi, memiliki kapasitas pengukuran 2 meter, dan tingkat ketelitian sebesar 0,1 cm. Prosedur pengukuran tinggi badan pada anak-anak dilakukan dengan:

- a. Melakukan pemasangan alat ukur dengan cara menggabungkan setiap bagian alat, lalu lakukan penguncian.
- b. Letakkan alat ukur secara tegak lurus di permukaan lantai dan dinding rumah yang datar.
- c. Sampel yang diukur harus membuka alas kaki, dan penutup kepala.
- d. Sampel yang diukur mengambil posisi dengan cara berdiri tegak di atas alat ukur dan membelakangi alat tersebut.
- e. Pastikan bahwa titik kuping telinga dan ujung mata membentuk garis imajiner yang tegak lurus terhadap dinding belakang. Selanjutnya, batang alat pengukur harus ditempatkan di tengah-tengah bagian belakang sampel.
- f. Lima bagian tubuh, yakni kepala, punggung, pantat, betis, dan tumit, diletakkan di atas alat pengukur. Jika tidak mungkin, minimal tiga bagian yang harus bersentuhan dengan alat pengukur, yaitu punggung, pantat, dan betis.
- g. Pengukur ditempatkan di bagian depan atau sebelah kiri dari sampel yang sedang diukur.

- h. Geser alat hingga menyentuh bagian kepala.
- i. Kunci panel alat geser, sampel dapat diminta untuk turun dari alat ukur.
- j. Pengukur membaca hasil pengukuran dengan cara membaca angka yang tepat berada pada garis jendela baca

2). Timbangan Digital

Pengukuran berat badan anak dilakukan menggunakan timbangan digital dengan hasil satuan kilogram (kg). Prosedur penimbangan pada anak yang dapat berdiri:

- a. Mengaktifkan alat timbangan dengan cara tekan power on/off
- b. Sampel yang diukur harus membuka aksesoris yang digunakan.
- c. Sampel diinginkan untuk berdiri tegak di atas alat timbangan, dengan posisi kaki yang tepat di tengah alat, namun tanpa menutupi jendela baca. Pandangan sampel harus sejajar ke depan.
- d. Akan muncul hasil penimbangan pada jendela baca.
- e. Pengukur membaca hasil penimbangan tersebut

3). Alat tulis dan Ponsel

Ponsel dipakai untuk mendokumentasikan kegiatan, sementara alat tulis dipakai untuk menulis informasi penting terkait penelitian.

F. Teknik Pengolahan, Analisis Data dan Penyajian Data

1. Pengolahan Data

Pemrosesan data merupakan tahap dari serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang telah dikumpulkan diolah melalui prosedur-langkah berikut:

a. Editing

Data yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, atau pengamatan lapangan harus mengalami tahap penyuntingan terlebih dahulu. Penyuntingan merupakan proses dimana peneliti mengevaluasi data untuk memeriksa kelengkapannya. Peneliti akan memeriksa kuisisioner yang telah diisi oleh responden, memastikan tidak ada pertanyaan yang terlewat atau jawaban yang ambigu, serta memastikan bahwa responden memahami cara mengisi kuisisioner dengan baik. Proses penyuntingan ini biasanya dilakukan di lokasi pengumpulan data.

b. *Coding* (Kode)

Coding adalah langkah mengubah data yang diperoleh dari responden menjadi representasi berbentuk angka. Pada tahap ini, Peneliti memberikan penanda numerik pada hasil pengukuran, observasi, dan data yang diperoleh dari sumber data primer. Tujuannya yaitu untuk mempermudah proses perhitungan dan analisis data.

c. *Rekapitulasi*

Peneliti mengumpulkan informasi yang telah didapatkan mengenai variabel-variabel dalam sebuah format kerja. Kemudian, data ini dikumpulkan pada *spreadsheet* Excel.

d. *Processing*

Proses pengolahan data dimulai dengan memasukkan (mengentri) data dan memilih metode penyajian data. Data dimasukkan ke dalam perangkat lunak SPSS 16.0, dan peneliti memilih uji beda non-parametrik Chi-Square. Setelah mendapatkan hasil pengolahan data, peneliti memilih metode penyajian data melalui pembuatan tabel.

e. *Out Put*

Setelah proses *processing* data selesai, hasilnya dicetak dalam bentuk lembar cetak (Print Out) dan kemudian diinterpretasikan. Setelah itu, hasil tersebut disajikan dalam bentuk cetakan dan dijilid.

2. Analisis Data

a. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan dengan tujuan menguraikan atau menjelaskan karakteristik dari setiap variabel penelitian. Metode analisis univariat akan disesuaikan dengan tipe data yang digunakan. Pada data numerik, proses perhitungan seperti mean (rata-rata), median, dan standar deviasi akan digunakan. Dari analisis tersebut, akan

dihasilkan distribusi frekuensi serta persentase untuk setiap variabel. Analisis akan mencakup hubungan antara asupan zat besi, vitamin C, protein, dan status gizi dengan kejadian anemia pada anak jalanan.

b. Analisis Bivariat

Studi ini menerapkan pendekatan analitis dengan metode cross-sectional dan menggunakan skala data yang bersifat nominal dan ordinal. Untuk menguji hipotesis dan memahami hubungan antar variabel, studi ini akan menggunakan uji *chi-square* yang rumus telah ditentukan yaitu:

$$\chi^2 = \sum \left[\frac{(fo - fe)^2}{fe} \right]$$

Keterangan :

χ^2 : nilai khai-kuadrat

Fo : frekuensi observasi/pengamatan

Fe : frekuensi ekspektasi/harapan

Pengujian ini dipakai untuk mengevaluasi korelasi antara variabel independen dan kejadian anemia yang terjadi pada anak jalanan. Tingkat kepercayaan yang diterapkan adalah 95%, dengan nilai signifikansi. Berdasarkan konsep ini, apabila nilai $p > 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) akan diterima, sedangkan jika $p < 0,05$, maka H_0 akan ditolak.

3. Penyajian Data

Data akan dipresentasikan dalam tabel dan dijelaskan melalui interpretasi teks.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ)

Sebuah kelompok pemuda yang dikenal dengan nama KPAJ Makassar, yang merupakan singkatan dari Komunitas Peduli Anak Jalanan, didirikan pada tanggal 1 Maret 2012 dan masih aktif hingga tahun 2023. Saat ini, anggota Komunitas Peduli Anak Jalanan berjumlah 197 orang, mayoritas di antaranya adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, serta terdiri dari ASN, dosen, dan para profesional muda. Semua anggota ini memiliki ikatan yang kuat dan tidak terputus, yaitu kepedulian mereka terhadap anak-anak jalanan.

Komunitas Peduli Anak Jalanan berawal dari Ahmad Yani, SS, seorang alumni Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia (UMI), yang memiliki semangat religius tinggi dan aktif dalam berorganisasi. Pada awalnya, Ahmad Yani, SS, memiliki ide untuk menyelenggarakan kegiatan bagi anak jalanan, yang kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi dengan fokus utama pada kegiatan sosial, khususnya membantu anak-anak jalanan. Ahmad Yani, SS, memiliki tekad yang kuat untuk mendirikan sebuah komunitas yang peduli terhadap anak-anak jalanan di Kota Makassar. Ini muncul dari perasaan empatinya ketika melihat bagaimana anak-anak jalanan, sebagai sesama warga negara, terpinggirkan oleh kerasnya kehidupan perkotaan dan

peradaban zaman. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak kenal takut, dia berusaha dengan sungguh-sungguh, mengajak individu yang merasa tergerak hatinya untuk bersatu dalam usaha membangun komunitas ini. Usaha ini dilakukan melalui media sosial, yaitu halaman penggemar Facebook dengan nama "Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar".

Setelah itu, anggota yang telah bergabung dengan Komunitas Peduli Anak Jalanan mulai merancang berbagai aspek kegiatan dan mengimplementasikannya. Mereka menghadapi berbagai tantangan dengan semangat yang terus berkobar. Dengan persiapan yang teliti, mereka memulai melakukan survei di berbagai daerah yang akan menjadi perhatian utama dari KPAJ (Komunitas Peduli Anak Jalanan). Hasil survei menunjukkan bahwa daerah-daerah yang menjadi pusat perhatian mencakup anak jalanan di bawah flyover dengan 19 anak yang menjadi binaan, anak jalanan di BTP dengan 40 anak yang menjadi binaan, area Pampang dan Terminal Lama dengan 30 anak yang menjadi binaan, serta anak jalanan di sekitar Masjid Al-Markaz Kota Makassar dengan 20 anak yang menjadi binaan. Mereka tinggal di rumah-rumah yang cukup sederhana. Seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa mengajar di bawah flyover tidak begitu efektif, sehingga akhirnya flyover dihapuskan dan fokus beralih ke area kerung-kerung. Saat ini, daerah binaan melibatkan Telkomas, Unhas, BTP, Adyaksa, Manggala, dan kerung-kerung.

2. Letak Georafis

Kantor pusat Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) terletak di Jalan Sultan Alauddin 2, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Koordinat persis kantor pusat Komunitas Peduli Anak Jalanan adalah 5 derajat lintang, 10 menit, 55,6 detik dari selatan, dan 119 derajat bujur, 26 menit, 13,9 detik dari timur.

B. Hasil Analisis Univariat

1. Karakteristik Responden

a. Domisili

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Domisili Responden

Alamat Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Adiyaksa	21	17,5
BTP	16	13,3
Kerung-Kerung	21	17,5
Manggala	21	17,5
Telkomas	20	16,7
Unhas	21	17,5
Total	120	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan data bahwa dari 120 responden, alamat responden yang paling banyak yaitu Adiyaksa, Kerung-Kerung, Manggala, dan Unhas sebanyak 21 responden (17,5%) sedangkan alamat responden lebih sedikit yaitu di BTP sebanyak 16 responden (13,3%).

b. Usia

Tabel 4.2

Distribusi Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
6 tahun	5	4,2
7 tahun	8	6,7
8 tahun	22	18,3
9 tahun	16	13,3
10 tahun	29	24,2
11 tahun	32	26,7
12 tahun	6	5
13 tahun	2	1,7
Total	120	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 120 responden, usia responden yang paling banyak yaitu usia 11 tahun sebanyak 32 responden (26,7%) jumlah responden yang berusia 13 tahun lebih rendah, yakni hanya terdapat 2 responden (1,7%).

c. Pendidikan

Tabel 4.3

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Responden

Pendidikan Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Belum Tamat SD	66	55
Putus Sekolah	2	1,7
Tamat SD	15	12,5
Tidak Sekolah	37	30,8
Total	120	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan data bahwa dari 120 responden, pendidikan responden yang paling banyak yaitu belum tamat SD sebanyak 66 responden (55%) sedangkan pendidikan responden paling sedikit yaitu Putus Sekolah sebanyak 2 responden (1,7%).

d. Pekerjaan Orang Tua

Tabel 4.4

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua

Pekerjaan Orang Tua	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tukang Las	8	6,7
Servis Elektronik	19	15,8
Pemulung	93	77,5
Total	120	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan data bahwa dari 120 responden, pekerjaan orang tua yang paling banyak yaitu pemulung sebanyak 93 responden (77,5%) sedangkan pekerjaan orang tua lebih sedikit yaitu tukang las sebanyak 8 responden (6,7%).

e. Pendapatan Orang Tua

Tabel 4.5

Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Orang Tua

Pendapatan orang tua	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Rp 500.000- Rp 900.000	110	91,7
Rp 1.000.000- Rp 1.500.000	10	8,3

Total	120	100
--------------	-----	-----

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan data bahwa dari 120 responden, pendapatan orang tua yang paling banyak yaitu Rp.500.000-Rp.900.000 sebanyak 110 responden (91,7%) sedangkan pendapatan orang tua lebih sedikit yaitu Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 sebanyak 10 responden (8,3%).

2. Analisis Univariat

a. Anemia

Tabel 4.6

Distribusi Responden Berdasarkan Anemia

Anemia	Frekuensi (n)	Persentase (%)	Mean
Cukup	24	20	12,51
Kurang	96	80	
Total	120	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 120 responden, Responden yang tidak mengalami anemia berjumlah 96 orang (80,0%), sementara yang mengalami anemia sebanyak 24 orang (20,0%). Rata-rata nilai sampel adalah 12,51.

b. Asupan Zat Besi

Tabel 4.7

Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Zat Besi

Asupan Zat Besi	Frekuensi (n)	Persentase (%)	Mean
Cukup	6	5	6,24
Kurang	114	95	
Total	120	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 120 responden, frekuensi asupan zat besi kurang sebanyak 114 responden (95,5%) sedangkan asupan zat besi cukup sebanyak 6 responden (5,0%). Rata-rata asupan zat besi adalah 6,24 mg. Asupan protein yang dianjurkan menurut AKG Kemenkes RI 2019, anak berusia 6-13 tahun membutuhkan sekitar 10-15 mg/hari.

c. Asupan Protein

Tabel 4.8

Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Protein

Asupan Protein	Frekuensi (n)	Persentase (%)	Mean
Cukup	26	21,7	24,83
Kurang	94	78,3	
Total	120	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 120 responden, frekuensi asupan protein kurang sebanyak 94 responden (78,3%) sedangkan asupan protein cukup sebanyak 26 responden

(21,7%). Rata-rata persen konsumsi vitamin c sebesar 24,83 mg. Asupan protein yang dianjurkan menurut AKG Kemenkes RI 2019, anak usia 6-9 tahun sekitar 25-40 g/hari dan remaja usia 10-13 tahun sekitar 50-70 g/hari.

d. Asupan Vitamin C

Tabel 4.9

Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Vitamin C

Asupan Vitamin C	Frekuensi (n)	Persentase (%)	Mean
Cukup	46	38,3	
Kurang	74	61,7	25,14
Total	120	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 didapatkan data bahwa dari 120 responden, frekuensi kurangnya asupan vitamin C terjadi pada 74 responden (61,7%) sedangkan asupan vitamin C cukup sebanyak 46 responden (38,3%). Rata-rata konsumsi asupan vitamin c sebesar 25,14 mg. Asupan vitamin c yang dianjurkan menurut AKG Kemenkes RI 2019, anak usia 6-13 tahun membutuhkan sekitar 45-75 mg/hari.

e. Status Gizi

Tabel 4.10

Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi

Status Gizi	Frekuensi (n)	Persentase (%)	Mean
Gizi Kurang	12	10	-0,24
Gizi Baik	95	79,2	
Gizi Lebih	13	10,8	
Total	120	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 didapatkan data bahwa dari 120 responden, jumlah responden yang memiliki status gizi kurang adalah sebanyak 12 orang (10%), status gizi baik sebanyak 95 responden (79,2%) sedangkan status gizi lebih sebanyak 13 responden (10,8%). Rata-rata nilai sampel sebesar -0,24.

C. Hasil Analisis Bivariat

1. Hubungan Zat Besi dengan Kejadian Anemia

Tabel 4.11
Hubungan Zat Besi dengan Kejadian Anemia

Zat Besi	Anemia				Total	P Value
	Tidak Anemia		Anemia			
	n	%	n	%		
Cukup	4	66.7	2	33.3	6	0.014
Kurang	20	17.5	94	82.5	114	
Total	24	20	96	80	120	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diamati dari Tabel 4.11 di atas bahwa dari total 120 responden, 4

responden (66,7%) dengan tingkat konsumsi zat besi yang memadai tidak mengalami anemia. Sementara itu, 96 responden (82,5%) dengan tingkat konsumsi zat besi yang kurang mengalami anemia. Hasil analisis statistik Chi-Square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,014 ($p < 0,05$), yang mengindikasikan adanya hubungan signifikan antara konsumsi zat besi dan kejadian anemia.

2. Hubungan Protein dengan Kejadian Anemia

Tabel 4.12
Hubungan Protein dengan Kejadian Anemia

Protein	Anemia				Total	P Value
	Tidak Anemia		Anemia			
	N	%	N	%		
Cukup	21	80.8	5	19.2	26	0.000
Kurang	3	3.2	91	96.8	94	
Total	24	20	96	80	120	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diperhatikan pada Tabel 4.12 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, sebanyak 21 responden (80.8%) dengan kategori konsumsi protein yang cukup tidak mengalami kejadian anemia, kemudian responden dengan kategori konsumsi protein yang kurang sebanyak 91 responden (96.8%) mengalami kejadian anemia. Berdasarkan hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai p value= 0.000 ($p < 0.05$) sehingga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara konsumsi protein dengan kejadian anemia.

3. Hubungan Vitamin C dengan Kejadian Anemia

Tabel 4.13
Hubungan Vitamin C dengan Kejadian Anemia

Vitamin C	Anemia				Total	P Value
	Tidak Anemia		Anemia			
	n	%	N	%		
Cukup	11	23.9	35	76.1	46	0.398
Kurang	13	17.6	61	82.4	74	
Total	24	20	96	80	120	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diperhatikan pada Tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa dari 120 responden, sebanyak 35 responden (76.1%) dengan kategori konsumsi vitamin c yang cukup mengalami kejadian anemia, kemudian responden dengan kategori konsumsi vitamin c yang kurang sebanyak 61 responden (82.4%) mengalami kejadian anemia. Berdasarkan hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai p value= 0.398 ($p > 0.05$) sehingga menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara konsumsi vitamin c dengan kejadian anemia.

4. Hubungan Status Gizi terhadap Kejadian Anemia

Tabel 4.14
Hubungan Status Gizi terhadap Kejadian Anemia

Status Gizi	Anemia				Total	P Value
	Anemia		Tidak Anemia			
	n	%	n	%		
Gizi Kurang	8	66,7	4	33,3	12	0.277
Gizi Baik	76	80	19	20	95	
Gizi Lebih	12	92.3	1	7,7	13	
Total	96	80	24	20	120	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diperhatikan pada Tabel 4.13 di atas bahwa dari total 120 responden, sebanyak 76 responden (80%) dengan status gizi baik mengalami anemia, sementara responden dengan status gizi lebih sebanyak 12 responden (92,3%) juga mengalami anemia. Hasil uji statistik Chi-Square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,277 ($p > 0,05$), menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara status gizi dan kejadian anemia.

D. Analisis Multivariat

Analisis multivariat dilakukan dengan menerapkan uji regresi logistik ganda pada tingkat kepercayaan 95%. Pada langkah ini, variabel independen kandidat dievaluasi dan dipilih berdasarkan hasil analisis bivariat dengan p-value $< 0,05$, termasuk status gizi, protein, vitamin C, dan zat besi. Langkah selanjutnya melibatkan seleksi variabel dengan menggunakan uji regresi logistik sederhana. Jika nilai signifikansi dari variabel tersebut lebih besar dari 0,25, dianggap tidak berpengaruh secara signifikan dan tidak memenuhi kriteria untuk melanjutkan ke uji multivariat. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,25, dianggap berpengaruh dan memenuhi kriteria untuk dilanjutkan ke uji multivariat. Variabel independen yang memenuhi syarat kemudian akan diuji menggunakan analisis regresi logistik multivariat untuk menentukan variabel dengan pengaruh paling signifikan berdasarkan nilai OR (rasio odds). Berikut ini adalah hasil analisis multivariat yang telah dilakukan:

Tabel 4.15 Hasil Analisis Multivariat Uji Regresi Logistik Berganda Variabel Independen terhadap Kejadian Anemia

No.	Sub variabel	P (Sig)	OR	CI 95%
1	Protein	0.000	129.935	26.867 – 628.399
2	Zat Besi	0.931	0.900	0.083 – 9.703
	Konstanta	0.000	0.002	

Sumber: Data Primer, 2023

Dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa keberadaan protein memiliki pengaruh yang signifikan pada terjadinya anemia, dengan nilai $p < 0,25$, dan menjadi variabel yang dominan dengan nilai OR (odd ratio) sebesar 129.935. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel protein memiliki pengaruh sebanyak 129.935 kali terhadap kejadian anemia.

E. Pembahasan

1. Analisis Univariat

a. Usia

Usia adalah ukuran kronologis atau periode waktu yang mengindikasikan seberapa lama seseorang atau sesuatu telah ada atau eksis dalam dunia ini. Secara khusus, usia sering kali merujuk pada jumlah tahun, bulan, hari, dan jam yang telah berlalu sejak saat kelahiran individu atau objek tersebut. Dalam konteks biologi, usia manusia dihitung berdasarkan waktu sejak kelahiran. Dalam hal ini,

usia memiliki nilai penting dalam memahami perkembangan fisik, kognitif, dan sosial seseorang (Yuwono *et.al*, 2020).

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yang merupakan anak jalanan berusia antara 5 hingga 10 tahun, yaitu sebanyak 87 orang (57,5%). Sebtalesy (2019) menyatakan bahwa ketika anak berusia 5-10 tahun tidak memperoleh cukup asupan zat besi, protein, dan vitamin C, sehingga risiko terjadinya anemia dapat meningkat. Kekurangan zat besi dan protein dapat menghambat pembentukan hemoglobin dan mempengaruhi kinerja sel darah merah, sedangkan kekurangan vitamin C dapat menghambat penyerapan zat besi yang diperlukan.

Dengan merujuk pada hasil penelitian, peneliti mengasumsikan bahwa sebagian besar anak jalanan yang berusia 5-10 tahun berisiko mengalami kekurangan zat besi. Zat besi memiliki peran penting dalam pembentukan hemoglobin, yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Defisiensi zat besi bisa mengakibatkan anemia, yang dapat memberikan efek negatif pada pertumbuhan, perkembangan kognitif, dan daya tahan tubuh anak-anak.

b. Pendidikan

Pendidikan dapat dijelaskan sebagai suatu upaya sadar yang dilakukan oleh individu atau sistem untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi

berikutnya. Proses pendidikan tidak terbatas pada lingkungan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi, melainkan juga dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti keluarga, komunitas, tempat kerja, dan melalui pengalaman sehari-hari. Tujuan utama pendidikan adalah membantu individu menjadi lebih sadar, kritis, dan berpengetahuan dalam menghadapi tantangan kehidupan, serta berkontribusi positif pada perkembangan masyarakat dan dunia sekitarnya (Nurmalasari *et.al*, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa mayoritas anak jalanan yang menjadi responden mempunyai pendidikan belum tamat SD yakni sebanyak 66 (55%) responden. Menurut Sari (2020) Pendidikan memainkan peran yang penting dalam membentuk perilaku dan kebiasaan masyarakat, termasuk pola makan dan pemahaman tentang gizi. Ketika tingkat pendidikan rendah, berbagai faktor yang memengaruhi pola makan dan asupan nutrisi anak menjadi lebih kompleks dan berpotensi berdampak negatif terhadap kesehatan mereka.

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti berasumsi bahwa Anak jalanan dengan pendidikan rendah mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang gizi dan nilai makanan yang sehat. Hal ini bisa mengakibatkan mereka cenderung mengonsumsi makanan yang tidak seimbang secara gizi dan kurang memperhatikan kebutuhan nutrisi tubuh.

c. Pendapatan Orang tua

Pendapatan orang tua mengacu pada jumlah uang atau sumber daya finansial yang diperoleh dari orang tua atau pihak yang memiliki tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti gaji atau upah dari pekerjaan, bisnis, investasi, atau tunjangan lainnya. Pendapatan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan anggota keluarga, termasuk biaya pendidikan, makanan, perumahan, pakaian, dan berbagai keperluan sehari-hari (Aziza & Mil, 2021).

Pendapatan orang tua sering digunakan sebagai indikator dalam analisis ekonomi dan sosial. Ketersediaan pendapatan yang memadai memungkinkan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik, dan juga memberikan stabilitas finansial dalam menghadapi situasi tak terduga (Wandani *et.al*, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa mayoritas pendapatan orang tua anak jalanan yang menjadi responden sebesar Rp. 500.000-Rp. 900.000 dalam sebulan. Hal menggambarkan bahwa pendapatan orang tua anak jalanan yang

rendah jika dibandingkan dengan harga bahan pokok yang saat ini melambung tinggi. Menurut Sirajuddin & Rauf (2020) Ketika keluarga mengalami pendapatan rendah, terdapat peluang yang lebih besar bagi anak-anak di dalam keluarga tersebut untuk mengalami masalah gizi. Salah satunya adalah kekurangan zat besi, yang memiliki peran penting dalam membantu pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Anak-anak yang kekurangan zat besi berisiko mengembangkan anemia, kondisi di mana tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen dengan efisien, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelelahan, penurunan energi, dan gangguan kognitif.

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti berasumsi bahwa Anak-anak dalam keluarga dengan pendapatan rendah cenderung menghadapi risiko lebih besar untuk mengalami masalah gizi.

d. Anemia

Anemia merupakan suatu kondisi medis di mana konsentrasi hemoglobin dalam darah berada di bawah ambang batas normal. Hemoglobin, sebuah protein yang terdapat dalam sel darah merah, memiliki fungsi mengikat dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kadar hemoglobin yang rendah mengakibatkan kurangnya kemampuan darah untuk membawa oksigen secara memadai ke jaringan tubuh (Onyoneho *et.al*,2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa mayoritas Anak Jalanan yang menjadi responden mengalami anemia yakni sebanyak 96 (80%) responden. Menurut Mantadakis *et.al* (2020) Anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12 atau asam folat, gangguan produksi sel darah merah, kerusakan sel darah merah yang lebih cepat dari biasanya, dan masalah genetik. Gejala anemia mencakup kelelahan berlebihan, sesak napas, kulit yang pucat, detak jantung yang cepat, dan kelemahan umum. Pengobatan anemia akan disesuaikan dengan penyebabnya, seperti pemberian suplemen zat besi, vitamin B12, atau asam folat, dan terapi khusus mungkin diperlukan jika ada kondisi penyakit yang mendasarinya.

Dari hasil tersebut, dapat diasumsikan bahwa anak jalanan mungkin menjalani gaya hidup dan pola makan yang tidak teratur. Asumsi ini didasarkan pada kemungkinan bahwa mereka mungkin mengonsumsi makanan yang rendah nutrisi atau tidak seimbang, yang berpotensi menyebabkan kekurangan nutrisi penting seperti zat besi dan vitamin.

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan Asupan Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan

Asupan zat besi mengacu pada kandungan zat besi yang dicerna melalui makanan dan minuman dalam pola makan sehari-

hari. Zat besi merupakan mineral penting yang diperlukan oleh tubuh untuk menjaga fungsi normal dan kesehatan. Peran utama zat besi terletak dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selain itu, zat besi juga terlibat dalam berbagai proses biologis lainnya, seperti produksi energi, pertumbuhan sel, dan dukungan sistem kekebalan tubuh (Armitage & Moretti, 2019).

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dinyatakan bahwa mayoritas anak jalanan yang menjadi subjek penelitian mengalami defisiensi asupan zat besi, yakni mencakup 114 responden (95%).

Menurut Hurrell (2021) kekurangan asupan zat besi dapat menyebabkan anemia, suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah menjadi rendah. Anemia dapat menimbulkan gejala seperti kelelahan, kelemahan, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi karena kurangnya pasokan oksigen yang memadai ke seluruh jaringan tubuh.

Sumber utama zat besi dalam pola makan mencakup makanan seperti daging merah, unggas, ikan, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau tua, dan biji-bijian. Agar dapat memastikan asupan zat besi yang memadai, penting bagi seseorang untuk mengonsumsi beragam jenis makanan yang mengandung zat besi dan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan

zat besi, seperti mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C bersamaan dengan sumber zat besi (Armitage & Moretti, 2019).

Melalui pemahaman tersebut, peneliti mengasumsikan bahwa sumber utama zat besi dalam pola makan, seperti daging merah, unggas, ikan, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, dan biji-bijian, mungkin kurang terpenuhi dalam pola makan anak jalanan. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa kebiasaan makan anak jalanan yang cenderung berada di luar ruangan dan memiliki keterbatasan akses terhadap makanan yang menjadi sumber zat besi, dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kekurangan asupan zat besi pada mereka.

Zat besi adalah mikronutrien yang memiliki peranan sangat signifikan dalam tubuh, dibutuhkan terutama dalam proses pembentukan darah, seperti proses sintesis hemoglobin. Sisa zat besi disimpan dalam protein feritin dan hemosiderin, yang disimpan di sumsum tulang belakang, hati, serta area lain di dalam sistem otot dan limfatik. Defisiensi zat besi dapat menyebabkan penurunan tingkat feritin, yang selanjutnya diikuti oleh pengurangan kejenuhan transferin atau peningkatan protoporfirin. Apabila situasi ini terus berlanjut, dapat mengakibatkan anemia defisiensi besi, di mana konsentrasi hemoglobin menurun di bawah ambang batas normal (Lestari et al., 2018).

Zat besi (Fe) merupakan elemen penting yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan hemoglobin, dan juga merupakan komponen krusial dalam sistem enzim pernapasan. Dalam proses metabolisme besi, perlu dipahami komposisi dan distribusi besi dalam tubuh, cadangan besi tubuh, siklus besi, absorpsi besi, dan transportasi besi (Syarfaini et al., 2017).

Salah satu kendala utama dalam mencukupi kebutuhan zat besi adalah rendahnya tingkat penyerapan zat besi dalam tubuh, terutama pada sumber zat besi dari tumbuhan yang hanya diserap sekitar 1-2%. Kekurangan asupan zat besi sering terjadi pada individu yang memiliki pola makan yang kurang bervariasi. Faktor-faktor seperti keterbatasan ketersediaan makanan, distribusi makanan yang tidak merata, kondisi ekonomi yang kurang baik, kurangnya pengetahuan tentang gizi, dan kebiasaan mengonsumsi makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi (seperti minum kopi dan teh) bersamaan dengan waktu makan juga dapat menyebabkan penyerapan zat besi yang rendah (Fitriani, 2021).

Defisiensi besi dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan dan perkembangan otak, gangguan saluran pencernaan, serta penurunan kestabilan sistem kekebalan tubuh. Kekurangan zat besi sejak dini juga dikaitkan dengan gangguan fungsi saraf dan perkembangan saraf, yang dapat memengaruhi refleksi neurologis. Pada anak sekolah, kekurangan besi dapat berdampak negatif pada

kemampuan belajar matematika. Makanan yang mengandung zat besi dalam bentuk heme, seperti daging, ikan, dan unggas, merupakan sumber zat gizi besi yang diperlukan oleh tubuh. Di sisi lain, zat besi dalam bentuk non-heme, yang biasa terdapat pada biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan, dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang memfasilitasi atau memperlambat penyerapan zat besi ketika dikonsumsi pada saat bersamaan. (Lestari et al., 2018).

Sebagaimana dengan firman Allah swt. dalam QS Ghafir/ 40:79 yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾

Terjemahnya :

"Allahlah yang menjadikan hewan ternak untukmu. Sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi untuk kamu makan." (Al-Qur'an dan terjemahan Departemen Agama RI).

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan binatang ternak dalam ayat ini adalah unta, karena sifat-sifat yang disebutkan pada ayat tersebut sesuai dengan karakteristik unta. Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa yang dimaksud melibatkan unta, sapi, dan kambing. Unta memiliki berbagai manfaat seperti dapat dimanfaatkan sebagai sumber daging, susu, alat transportasi untuk membawa barang berat, dan kendaraan perjalanan. Sapi dapat dimanfaatkan untuk konsumsi daging, pemerahan susu, dan penggunaan tenaga untuk membajak tanah. Kambing, pada sisi lain,

dapat dimakan dagingnya dan diperah susunya. Selain itu, semua binatang tersebut memberikan manfaat tambahan melalui pemanfaatan bulu, kulit, dan rambutnya.

Allah menciptakan binatang ternak untuk manusia, sebagian di antaranya untuk digunakan sebagai alat transportasi dan sebagian lagi untuk dijadikan sebagai sumber makanan. Hal ini mencakup hewan seperti sapi, kambing, dan ayam dikenal dengan tingginya zat besi heme, yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-heme dalam tubuh manusia. Meskipun demikian, zat besi heme seringkali memiliki harga yang tinggi, yang membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhan harian, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu.

Salah satu faktor risiko terjadinya anemia adalah kurangnya simpanan zat besi. Zat besi merupakan salah satu nutrisi mikro yang memiliki dampak signifikan dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Pentingnya asupan zat besi menjadi krusial, terutama pada bayi dan anak selama periode pertumbuhan. Asupan zat besi mengacu pada jumlah zat besi yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jika asupan zat besi tidak mencukupi, cadangan besi dalam tubuh dapat menjadi rendah atau terjadi kehilangan darah yang cukup besar, yang kemudian dapat menyebabkan timbulnya anemia dengan cepat (Trisnawati, 2019).

Dalam rangka studi ini, terdapat 20 anak jalanan, mewakili sekitar 17,5% yang mengalami kurangnya asupan zat besi namun tidak mengalami anemia. Faktor ini dapat dijelaskan oleh adanya asupan protein yang cukup pada anak-anak jalanan tersebut, sehingga asupan protein yang memadai dapat mencegah terjadinya anemia pada mereka. Ini menunjukkan bahwa kurangnya asupan zat besi tidak langsung mengakibatkan anemia. Perlu diperhatikan bahwa perkembangan anemia terjadi bertahap sejalan dengan penurunan konsentrasi zat besi di dalam darah, namun banyaknya sel darah merah tetap stabil. Apabila penurunan konsumsi zat besi terus berlangsung tanpa perhatian, hal ini dapat menyebabkan pengurangan keseluruhan kandungan zat besi yang kemudian dapat mengakibatkan anemia karena kekurangan zat besi atau anemia gizi besi beserta tanda-tandanya.

Dengan memakai metode *food recall 2x24 jam* dan *food frequency*, wawancara dilakukan terhadap anak jalanan yang diambil sebagai sampel, terlihat bahwa mayoritas dari mereka memiliki pola konsumsi yang kurang variasi, khususnya dalam mengonsumsi sayuran dan buah. Pola konsumsi makanan juga terlihat kurang bervariasi, dengan menu yang dikonsumsi pada pagi hari seringkali diulang pada siang dan malam hari. Selain itu, mayoritas dari mereka cenderung kurang mengonsumsi makanan yang berasal dari sumber heme (produk hewani) dibandingkan

dengan makanan dari sumber non-heme (produk nabati). Ini bisa terjadi karena ketersediaan dan harga yang lebih terjangkau dari bahan makanan nabati seperti tempe dan tahu sebagai opsi menu harian. Meskipun frekuensi konsumsi sering, namun porsi yang sedikit juga dapat berdampak pada asupan zat besi.

Kemudian, pada rangkaian penelitian ini dicatat juga bahwa konsumsi dari sumber zat besi yang cukup mencapai 33,3%, dengan 2 orang mengalami anemia. Penyebabnya mungkin terletak pada fakta bahwa walaupun asupan zat besi termasuk dalam kategori baik, banyak dari mereka yang mengalami anemia juga cenderung mengonsumsi makanan yang mungkin menghambat penyerapan zat besi. Karena itu, walaupun asupan sumber zat besi tergolong memadai, kecenderungan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung zat penghambat penyerapan zat besi dapat berkontribusi menyebabkan terjadinya anemia, karena tubuh tidak dapat menyerap zat besi dari makanan akibat adanya penghambat yang dikonsumsi.

Dalam studi ini, dengan menganalisis Recall 2x24 jam, terungkap bahwa banyak responden mengalami kekurangan asupan zat besi. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar responden cenderung lebih sering mengonsumsi hidangan nabati yang mengandung zat besi dalam bentuk non-heme dibandingkan dengan hidangan hewani yang mengandung zat besi dalam bentuk heme.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa asupan zat besi oleh responden masih berada di bawah tingkat Kecukupan Gizi (AKG), dengan rata-rata asupan zat besi sekitar 6,24, sementara kebutuhan AKG untuk anak-anak berkisar antara 10-15 mg/hari.

Dalam konteks penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan yang signifikan secara statistik ($p < \alpha = 0,05$) menunjukkan korelasi antara asupan zat besi dan kejadian anemia. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa rendahnya konsumsi zat besi meningkatkan risiko terjadinya anemia. Temuan ini menyoroti pentingnya peran zat besi dalam pembentukan sel darah merah. Hasil ini sesuai dengan temuan yang dilaporkan oleh Paputungan, Kapantow, dan Rattu (2018) pada siswi kelas VIII dan IX di SMPN 8 Manado, yang juga menyatakan bahwa kekurangan asupan zat besi merupakan salah satu penyebab anemia pada anak-anak (Paputungan et al., 2018). Dalam studi yang dilaksanakan oleh Yoni Astuti (2020) terhadap anak-anak berusia 7-15 tahun di Desa Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo, disebutkan bahwa partisipan yang mengalami kekurangan asupan zat besi memiliki risiko 1,22 kali lebih tinggi untuk menderita anemia dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan asupan zat besi yang mencukupi (Astuti, 2020).

b. Hubungan Asupan Protein Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan

Asupan protein mengacu pada jumlah protein yang seseorang konsumsi melalui makanan dan minuman mereka setiap hari. Protein adalah salah satu nutrisi makro yang sangat penting bagi tubuh manusia karena digunakan dalam berbagai fungsi biologis. Protein terdiri dari rantai asam amino yang berperan dalam membentuk struktur sel, enzim, hormon, dan jaringan tubuh lainnya (Anasilo & Domili, 2019).

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa sebanyak 94 (78,3%) dari anak jalanan yang menjadi responden mengalami kekurangan asupan protein.

Menurut Wadhani & Wijaya (2021) penting untuk memperhatikan bahwa kebutuhan protein dapat berbeda antara individu tergantung pada faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, dan tujuan nutrisi. Beberapa kelompok, seperti atlet atau orang yang sedang dalam proses pemulihan setelah cedera, mungkin memerlukan asupan protein yang lebih tinggi.

Selain itu, menurut Aritonang et.al (2020) dalam mengelola asupan protein, penting untuk mencari keseimbangan dengan asupan nutrisi lainnya, seperti karbohidrat dan lemak, serta memperhatikan kualitas sumber protein yang dikonsumsi. Mengenali sumber protein berkualitas tinggi dan memasukkannya

ke dalam pola makan sehari-hari dapat berkontribusi pada kesehatan dan keseimbangan gizi secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa Mayoritas anak jalanan dalam penelitian ini mengalami kekurangan asupan protein. Ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam akses mereka terhadap makanan yang kaya protein. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor sosioekonomi, seperti akses terhadap makanan bergizi, dapat menjadi penyebab utama kekurangan asupan protein ini.

Protein memiliki peran signifikan dalam tubuh, tidak hanya sebagai penyedia energi tetapi juga sebagai zat yang membangun dan mengatur. Peran penting protein melibatkan regulasi transportasi zat besi dalam tubuh. Kekurangan asupan protein dapat menghambat proses transportasi zat besi, yang kemudian dapat menyebabkan defisiensi besi (Mohammad I Djihu & Nova, 2016).

Protein dapat dijumpai dalam banyak macam makanan, mau yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Bahan makanan yang berasal dari hewan cenderung memiliki kandungan biologis protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan (Tadete et al., 2018). Mengonsumsi lauk pauk seperti daging, ikan, seafood, telur, susu, dan produk-produk susu adalah bagian dari kelompok makanan yang menyediakan protein yang berperan sebagai bahan pembentuk tubuh. Allah SWT telah

menjelaskan perintah untuk mengonsumsi lauk pauk seperti daging, ikan, atau seafood.

Sebagaimana dengan firman Allah swt. dalam QS An-Nahl/ 16: 14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

“Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.” (Al-Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI).

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa melalui ayat ini, Allah yang menundukkan lautan (untuk kalian), agar kalian dapat memakan darinya daging yang segar (ikan), dan kalian mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kalian pakai; dan kalian melihat bahtera berlayar padanya dan supaya kalian mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kalian bersyukur.

Pada ayat tersebut, Allah kembali menegaskan bahwanya tentang lautan yang luas dengan gelombangnya yang menggelegar, yang telah dikuasai-Nya. Allah juga menunjukkan kebaikan-Nya kepada hamba-Nya dengan menguasai lautan untuk dapat menjelajahnya. Dia menciptakan berbagai jenis ikan di dalamnya,

yang diizinkan-Nya untuk hamba-Nya untuk mengonsumsi dagingnya, baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati, baik dalam keadaan tidak berihram maupun saat berihram.

Dari penelitian yang telah dilakukan pada 120 orang anak jalanan, mayoritas anak jalanan memiliki asupan protein yang kurang dengan mengalami anemia yakni sebanyak 91 (96.8%) anak jalanan. Hal tersebut dapat demikian karena memang mayoritas anak jalanan juga mengalami kekurangan zat besi yakni sebanyak 94 (82.5%) responden dan begitupun juga mayoritas anak jalanan juga mengalami kekurangan vitamin C yakni 61 (82.4%) responden. Sehingga hal tersebut juga menjadi faktor penunjang terjadinya anemia selain asupan protein yang kurang.

Ini terjadi karena sebagian besar responden lebih cenderung mengonsumsi makanan protein nabati seperti tahu dan tempe dibandingkan dengan protein hewani seperti daging yang kandungan besinya lebih tinggi. Kekurangan jumlah protein dalam sumber protein nabati inilah yang menyebabkan kurangnya asupan protein pada responden. Defisiensi asupan protein dapat menghambat pengangkutan zat besi, yang berpotensi menyebabkan defisiensi zat besi. Proses penyerapan zat besi di usus halus didukung oleh molekul pengangkut protein seperti transferin dan feritin. Transferin bertanggung jawab membawa besi dalam bentuk

ferro dan berperan dalam mengangkut besi ke sumsum tulang belakang untuk proses pembentukan hemoglobin.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara asupan protein dan kejadian anemia. Penelitian ini mengindikasikan bahwa kurangnya asupan protein dapat meningkatkan risiko menderita anemia. Protein menjadi sumber primer zat besi dalam makanan, dan proses absorpsi zat besi di usus halus diperbantukan oleh molekul pengangkut protein seperti transferin dan feritin. Transferin mengandung besi dalam bentuk ferro, berfungsi dalam mengangkut besi ke sumsum tulang belakang untuk pembentukan hemoglobin (Wandasari, 2019).

Dalam studi yang dilakukan oleh Yoni Astuti pada tahun 2020, diungkapkan bahwa ada hubungan positif antara konsumsi protein dan insiden anemia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa remaja dengan defisiensi protein memiliki risiko 3,48 kali lebih besar untuk mengalami anemia dibandingkan dengan remaja yang mendapatkan asupan protein yang memadai (Astuti, 2020).

Studi pada murid sekolah dasar di Kelurahan Bunaken, Kota Manado, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat konsumsi protein hewani dan kadar hemoglobin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko terkena anemia meningkat pada anak-anak yang asupan protein hewani-nya kurang dari 14,4% dari standar pola pangan harapan (PPH) (Tadete et al., 2018).

c. Hubungan Asupan Vitamin C Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan

Asupan vitamin C mengacu pada jumlah vitamin C yang masuk ke tubuh melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang. Vitamin C, yang juga dikenal sebagai asam askorbat, merupakan nutrisi esensial yang larut dalam air dan tidak dapat dihasilkan oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, sumber vitamin C harus diperoleh melalui konsumsi makanan dan penggunaan suplemen (Mandiri, 2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa mayoritas anak jalanan yang menjadi responden dalam penelitian ini mengalami asupan vitamin C yang kurang yakni sebanyak 74 (61,7%) responden.

Menurut Thamrin & Masnilawati (2021) Peran vitamin C sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Sebagai seorang antioksidan, vitamin C membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, yang dapat berperan dalam penuaan dini dan penyakit kronis. Selain itu, vitamin C juga berfungsi dalam pembentukan kolagen, suatu protein yang esensial untuk kesehatan kulit, pembuluh darah, tulang, dan jaringan ikat lainnya. Vitamin C juga berperan dalam penyerapan zat besi dari makanan nabati, yang membantu mencegah anemia. Makanan yang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi meliputi buah-buahan

seperti jeruk, stroberi, kiwi, mangga, dan pepaya, serta sayuran seperti paprika, brokoli, tomat, dan bayam. Kebutuhan vitamin C seseorang dapat bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan penyakit skorbut, yang ditandai dengan gejala seperti lemas, nyeri sendi, masalah gusi, dan penyembuhan luka yang lambat. Vitamin C memiliki peran penting dalam meningkatkan penyerapan zat besi, karena vitamin C mengubah zat besi dari bentuk feri menjadi fero terlebih dahulu, sehingga memudahkan penyerapan zat besi oleh tubuh (Rusmin et al., 2014).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa kekurangan vitamin C ini dapat berdampak buruk pada kesehatan anak jalanan. Vitamin C memiliki peran penting dalam menjaga integritas sel-sel tubuh dan mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penuaan dini, gangguan kulit, gangguan pembuluh darah, dan penyerapan zat besi yang buruk, yang dapat berkontribusi pada masalah anemia.

Vitamin C menjadi elemen yang penting bagi tubuh dalam pembentukan sel-sel darah merah. Vitamin C berperan dalam menghambat pembentukan hemosiderin yang sulit dilepaskan, sehingga memungkinkan pelepasan besi ketika diperlukan. Vitamin C dalam makanan menciptakan suasana asam yang mendukung

perubahan zat besi dari bentuk ferri menjadi ferro, yang lebih mudah diserap oleh usus halus. Dalam konteks ini, penyerapan zat besi non-heme dapat meningkat hingga empat kali lipat ketika vitamin C hadir (Wandasari, 2019).

Memberikan suplemen besi dan vitamin C kepada anak-anak yang mengalami anemia akan memberikan hasil peningkatan kadar hemoglobin yang paling efektif dibandingkan dengan pendidikan gizi saja atau pemberian suplemen tunggal. Vitamin C juga berfungsi dalam meningkatkan pelepasan besi yang tidak larut, serta merangsang pelepasan besi dari cadangan feritin di dalam sel-sel retikuloendotelial. Hal ini memungkinkan besi digunakan dalam pembentukan sel darah merah. Selain itu, vitamin C membantu mengubah besi dari bentuk feri yang tidak larut menjadi ferro yang larut, memfasilitasi penyerapan besi oleh usus halus (Tiastuti, 2018).

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi penyerapan zat besi dalam tubuh, baik secara positif maupun negatif. Pentingnya mengonsumsi buah-buahan yang kaya vitamin C terletak pada peningkatan penyerapan zat besi non-heme hingga empat kali lipat. Sebaliknya, beberapa faktor yang dapat menghambat penyerapan zat besi mencakup tannin dalam teh, fitat, fosfat, dan serat yang terdapat dalam makanan (Pradanti et al., 2019).

Dari 120 responden, mayoritas anak jalanan, khususnya sebanyak 61 orang (82,4%), mengalami defisiensi vitamin C dan

mengalami anemia. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena sebagian besar anak jalanan juga memiliki kekurangan asupan protein, yakni sebanyak 91 orang (96,8%), yang juga berkontribusi pada kejadian anemia. Selain itu, mayoritas anak jalanan juga mengalami kekurangan zat besi yakni sebanyak 94 (82.5%). Sehingga hal tersebut juga menjadi faktor penunjang terjadinya anemia selain asupan vitamin C yang kurang.

Dari penuturan responden, terlihat bahwa mereka kurang sering mengonsumsi buah dan sayur, bahkan sebagian dari mereka tidak memiliki selera untuk makan sayuran. Jenis jajanan yang tersedia juga tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak-anak. Dalam 35 responden yang mengalami anemia, walaupun asupan vitamin C seharusnya mencukupi, terdapat kesalahan dalam pengisian food recall. Beberapa di antaranya cenderung suka minum teh, yang dapat menghambat penyerapan zat besi dan vitamin C.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara asupan vitamin C dan kejadian anemia pada anak jalanan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alif Erva Deswita Wandasari pada tahun 2019, di mana secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asupan vitamin C dan kejadian anemia (Wandasari, 2019). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi yang

dilakukan oleh Roziqo dan Nuryanto pada tahun 2016, khususnya pada anak-anak sekolah dasar, di mana ditemukan bahwa asupan vitamin C memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian anemia pada kelompok tersebut (Nuryanto & Riziqo, 2016).

d. Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan

Status gizi mencerminkan kondisi tubuh seseorang berdasarkan kesejajaran asupan gizi dengan kebutuhan tubuh. Status gizi mengindikasikan apakah seseorang menerima asupan nutrisi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Status gizi dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, kadar hemoglobin, dan lainnya. Status gizi yang baik menunjukkan bahwa seseorang mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan, sementara status gizi buruk dapat menunjukkan defisiensi atau kelebihan nutrisi tertentu (Apriyanti, 2019).

Status gizi merupakan indikator keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak, yang dapat dilihat dari berat badan dan tinggi badan mereka. Status gizi juga dapat diartikan sebagai kondisi kesehatan yang timbul dari keseimbangan antara kebutuhan nutrisi dan asupan nutrisi (Sarfaini et al., 2018).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa mayoritas anak jalanan yang menjadi responden dalam

penelitian ini mengalami gizi yang baik yakni sebanyak 95 (79,2%) responden.

Memonitor status gizi anak secara rutin, terutama saat masa pertumbuhan kritis, sangat penting. Peran orang tua, pendidik, dan tenaga medis adalah penting dalam mendukung pola makan sehat dan gaya hidup aktif untuk mendukung status gizi yang optimal. Dengan mengatasi masalah status gizi pada anak, kita dapat membantu mereka tumbuh dengan sehat dan mencegah risiko masalah kesehatan yang mungkin muncul di masa depan (Anasiru, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa pemantauan rutin terhadap status gizi anak sangat penting, terutama selama masa pertumbuhan kritis. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan status gizi anak dapat terjadi seiring pertumbuhan mereka, dan pemantauan yang teratur akan membantu mendeteksi perubahan tersebut lebih awal. Asumsi ini menyarankan perlunya pengembangan program pemantauan gizi yang terjadwal dan terarah, terutama untuk populasi anak jalanan yang rentan.

Status gizi adalah representasi dari keseimbangan tertentu dalam bentuk variabel atau pengekspresian nutrien dalam bentuk variabel tertentu. Salah satu metode penilaian untuk mengevaluasi kondisi gizi adalah melalui status gizi. Pada remaja, pengukuran

status gizi dapat dilakukan menggunakan Indeks Masa Tubuh/Umur (IMT/U) (Restuti & Susindra, 2017).

Ini disebabkan oleh mayoritas partisipan yang memiliki status gizi yang baik. Evaluasi status gizi, yang didasarkan pada indikator Indeks Masa Tubuh/Umur (IMT/U), lebih dipengaruhi oleh asupan zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Energi utama bagi tubuh diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan protein. Jika jumlah energi yang masuk lebih sedikit daripada kebutuhan tubuh dalam suatu periode waktu, hal ini dapat menyebabkan penurunan status gizi. Sebaliknya, konsumsi energi yang seimbang dapat membantu menjaga status gizi pada tingkat normal. Sementara itu, asupan energi yang berlebihan atau penurunan aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko kegemukan. Kandungan energi yang lebih rendah dalam zat gizi mikro tidak mempengaruhi penilaian status gizi berdasarkan IMT/U. Kekurangan zat gizi mikro kemungkinan telah berlangsung dalam periode yang lama (Tiasuti, 2018).

Kebiasaan makan yang kurang tepat pada remaja juga dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan nutrisi dan status gizi mereka. Contohnya, remaja sering mengonsumsi junk food yang memiliki tinggi energi tetapi rendah dalam kandungan vitamin dan mineral, sehingga meskipun status gizi mereka normal, mereka masih berisiko mengalami defisiensi zat besi atau mineral tertentu.

Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat memicu anemia pada remaja, termasuk penyakit infeksi yang bersifat kronis, perdarahan menstruasi yang berlebihan pada remaja perempuan, perdarahan tiba-tiba seperti dalam kasus kecelakaan, serta jumlah makanan yang tidak mencukupi atau penyerapan nutrisi yang buruk (Adiyani et al., 2018).

Sebagaimana dengan firman Allah swt. dalam QS Abasa/ 80: 24 yang berbunyi:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

“Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” (Al-Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI).

Berdasarkan penafsiran An-Nafahat Al-Makkiyah,

dijelaskan bahwa melalui ayat ini, Allah mengajarkan kepada manusia untuk merenungkan tentang urusan mereka terkait makanan, dan bagaimana makanan tersebut mencapai mereka melalui proses yang bervariasi. Allah menyampaikan bahwa Dia mampu menurunkan air dari awan ke bumi, lalu air itu mengalir dan menumbuhkan berbagai jenis tanaman, seperti gandum dan syair. Allah juga menumbuhkan berbagai jenis anggur yang lezat, serta sayuran hijau seperti selada, parsley, daun mint, dan jarjir. Di bumi, Allah juga menumbuhkan pohon zaitun dan kurma, serta

menciptakan kebun-kebun dan ladang-ladang dengan berbagai jenis pohon. Allah juga menghasilkan berbagai macam buah-buahan, dan melalui semua itu, rumput pun tumbuh.

Menurut hasil penelitian, mayoritas anak jalanan mengalami Gizi yang baik namun, mengalami anemia yakni sebanyak 76 (80.0%) responden. Adapun yang menyebabkan mayoritas anak jalanan mengalami gizi yang baik tapi mengalami anemia disebabkan karena mayoritas anak jalanan memiliki zat besi yang kurang yakni 94 (82.5%) anak jalanan, jadi meskipun anak jalanan memiliki status gizi yang baik tetap bisa mengalami anemia karena alasan asupan zat besi yang kurang, dimana salahsatu faktor yang menyebabkan terjadinya anemia adalah asupan zat besi yang kurang.

Dari hasil penelitian, analisis data mengenai hubungan antara status gizi dan kejadian anemia menunjukkan nilai Sig (0,28) > (α) 0,05 dengan koefisien korelasi sebesar 0,277. Ini menandakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dan kejadian anemia. Beberapa faktor yang dapat memicu masalah gizi pada anak, seperti kebiasaan makan yang tidak tepat, pemahaman yang keliru mengenai gizi, di mana tubuh yang langsing dianggap sebagai idaman para remaja sehingga kebutuhan gizi tidak terpenuhi, dan kecenderungan untuk terlalu menyukai beberapa makanan saja, misalnya makanan cepat saji.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil studi Adiyani, Heriyani, dan Rosida (2018) pada siswi remaja perempuan di SMAN PGRI 4 Banjarmasin. Studi tersebut menarik kesimpulan bahwa terdapat korelasi antara status gizi dan kejadian anemia pada remaja putri. Semakin rendah status gizi pada remaja, semakin tinggi probabilitas terjadinya anemia pada remaja putri (Adiyani et al., 2018).

3. Analisis Multivariat

a. Pengaruh Protein terhadap kejadian anemia

Menurut Zhang et.al (2021) Protein merupakan komponen penting dalam nutrisi yang memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan tubuh. Dalam konteks kejadian anemia, yang ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah, protein memainkan peran yang sangat penting dalam beberapa aspek yang berkontribusi terhadap pembentukan dan fungsi sel darah merah.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari protein terhadap kejadian anemia, dengan nilai signifikansi $p < 0,25$, dan protein diidentifikasi sebagai variabel utama dengan nilai $OR = 129.935$. Ini berarti bahwa variabel protein memiliki pengaruh sebanyak 129.935 kali lebih besar terhadap kejadian anemia.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permasari & Soviana (2022) yang menyatakan bahwa aspek utama

peran protein terhadap kejadian anemia adalah keterkaitannya dengan pembentukan hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah dan bertugas untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Defisiensi protein dalam pola makan dapat menghambat pembentukan hemoglobin, sehingga jumlah hemoglobin yang diperlukan untuk mengangkut oksigen menjadi tidak mencukupi. Dampaknya, sel darah merah tidak dapat berfungsi secara optimal, menyebabkan penurunan kemampuan tubuh dalam mengangkut oksigen yang diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa pentingnya konsumsi protein yang cukup dalam diet sehari-hari untuk mencegah kejadian anemia. Kekurangan protein dapat menghambat pembentukan hemoglobin dan mengganggu fungsi sel darah merah dalam membawa oksigen, yang dapat menyebabkan penurunan kapasitas tubuh dalam membawa oksigen yang diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Angka prevalensi anemia yang terjadi pada anak jalanan di Kota Makassar mencapai 19,2%. Terdapat korelasi yang signifikan secara statistik ($p < \alpha = 0,05$) antara asupan zat besi dan kejadian anemia pada anak jalanan.
2. Terdapat hubungan yang bermakna antara asupan protein dengan kejadian anemia pada anak jalanan.
3. Tidak ada hubungan yang bermakna antara asupan vitamin C dengan kejadian anemia pada anak jalanan.
4. Tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada anak jalanan. Status gizi pada anak dengan persentase tertinggi yaitu pada status gizi baik yaitu sebanyak 95 (79,2%), responden yang kategori status gizi kurang yaitu sebanyak 12 (10,0%) dan responden yang kategori status gizi lebih 13 (10,8%) sehingga menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara status gizi dengan kejadian anemia.

B. Saran

1. Bagi Instansi Kesehatan

Disarankan untuk menjalani pemeriksaan kadar hemoglobin oleh Puskesmas setempat setidaknya setiap enam bulan sekali.

2. Bagi Pihak Pengurus Binaan KPAJ

Disarankan agar pihak pengurus memberikan edukasi untuk mencegah anemia pada anak-anak. Materi penyuluhan yang dapat disampaikan

mencakup data mengenai jenis dan jumlah makanan yang tinggi kandungan zat besi, protein, dan vitamin C sesuai dengan kebutuhan para remaja. Selain itu, juga bisa disampaikan data mengenai jenis dan jumlah makanan atau minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi, protein, dan vitamin pada anak-anak. Perlu ditekankan peningkatan konsumsi zat besi, protein, dan vitamin C, khususnya pada remaja perempuan yang mengalami masalah menstruasi.

3. Peneliti selanjutnya

Sebaiknya jika peneliti ingin melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan variabel asam folat, vitamin B12, gaya hidup dan riwayat penyakit yang dapat mempengaruhi kejadian anemia pada anak jalanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiyani, K., Heriyani, F., & Rosida, L. (2018). Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri di SMA PGRI 4 Banjarmasin. *Homeostasis*, 1(1), 1–7. <http://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/hms/article/view/459>
- Arifin, S. U., Mayulu, N., & Rottie, J. (2018). Hubungan Asupan Zat Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *ejournal keperawatan (e-Kp)*, 1(1), 1–8.
- Astuti, Y. (2020). Hubungan antara Asupan Protein, Zat Besi dan Vitamin C dengan Kadar Hb pada Anak Umur (7-15) tahun di Desa Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo. *Mutiara Medika*, 10(2), 172–179. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mm/article/view/1581>
- Arifin, S. U., Mayulu, N., & Rottie, J. (2018). Hubungan Asupan Zat Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Ejournal keperawatan (e-Kp)*, 1(1), 1–8.
- Astuti, Y. (2020). Hubungan antara Asupan Protein, Zat Besi dan Vitamin C dengan Kadar Hb pada Anak Umur (7-15) tahun di Desa Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo. *Jurnal Mutiara Medika*, 10(2), 172–179. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mm/article/view/1581>
- Aziza, N. A., & Mil, S. (2021). Pengaruh pendapatan orang tua terhadap status gizi anak usia 4-5 tahun pada masa pandemi COVID-19. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 6(3), 109-120.
- Anasiru, M. A., & Domili, I. (2019). Pengaruh Asupan Energi dan Protein, Pola Asuh, dan Status Kesehatan Terhadap Kejadian Stunting pada Anak usia 12-36 bulan di Puskesmas Tilango Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. *Health and Nutrition Journal*, 4(1), 8-15. <https://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JHN/article/view/132/85>.
- Aritonang, E. A., Margawati, A., & Dieny, F. F. (2020). Analisis pengeluaran pangan, ketahanan pangan dan asupan zat gizi anak bawah dua tahun (BADUTA) sebagai faktor risiko stunting. *Journal of nutrition college*, 9(1), 71-80.
- Apriyanti, F. (2019). Hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri SMAN 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2019. *Jurnal Doppler*, 3(2), 18-21.
- Armitage, Andrew E., and Diego Moretti. "The importance of iron status for young children in low-and middle-income countries: a narrative review." *Pharmaceuticals* 12.2 (2019): hal.59,

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6631790/pdf/pharmaceutical-s-12-00059.pdf>.

- Choirunissa, H., Rahmawati, A., Marianingsih, E. (2019). *Skripsi Gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil Tentang Anemia Di Puskesmas Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2019*, 14-24 <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2328/1/awal%20%281%29.pdf>.
- Dani, I. W. (2017). Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri di SMA 1 Negeri Gamping Sleman Yogyakarta. *In Publikasi Ilmiah Unisa*, 1-5.
- Denistikasari, R. (2016). Hubungan Antara Asupan Protein, Zat Besi (Fe) dan Vitamin C Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi SMK Penerbangan BINA Dhirgantara Karanganyar. *In Publikasi Ilmiah*, 2-9.
- Engidaw, M.T., 2018. Anemia and Associated Factors among Adolescent Girls Living in Aw-Barre Refugee Camp, Somali Regional State, Southeast Ethiopia. *PLoS ONE*, Vol. 13, Issue 10, hal.9. Doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205381>
- Fitriani. (2021). Penambahan Kurma Sukkari dan Suplementasi Fe Dalam Meningkatkan Kadar hemoglobin Pada Remaja Putri dengan Anemia, 2-4 http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6190/2/P102191001_tesis%201-2.pdf.
- Hutomo, W. M. P., Rahman, I., & Ruhukail, P. P. (2022). Terapi Modalitas Senam Anemia pada Anak Panti Asuhan Bukit Hermon Kota Sorong. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 519–524. <https://doi.org/10.54082/jamsi.278>
- Hurrell, Richard F. "Iron fortification practices and implications for iron addition to salt." *The Journal of Nutrition* 151.Supplement_1 (2021), 3-14.
- Indrawati, S. (2015). Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Dengan Kejadian BBLR di Wilayah Puskesmas Minggir Kabupaten Sleman. *In Publikasi Naskah Program Studi Bidan Pendidik Jenjang D Iv Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta*, 7-10.
- Isbach, I. D. D. (2014). Gambaran Status Gizi Anak Jalanan Di Kota Makassar. *In Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar*, 1-7.
- Kumar, A., Goyal, A., Verma, N., dan Mahesh, A. 2018. Study of Anemia among Adolescent School Girls and Young Adults. *International Journal of Advances in Medicine*, Vol. 5, Issue 4, Juli-Agustus 2018, hal.4. Doi: <http://dx.doi.org/10.18203/2349-3933.ijam20182753>
- Lestari, I. P., Lipoeto, N. I., & Almurdi, A. (2018). Hubungan Konsumsi Zat Besi dengan Kejadian Anemia pada Murid SMP Negeri 27 Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 6(3), 507. <https://doi.org/10.25077/jka.v6i3.730>
- Mantadakis, E., Chatzimichael, E., & Zikidou, P. (2020). Iron deficiency anemia in

children residing in high and low-income countries: risk factors, prevention, diagnosis and therapy. *Mediterranean journal of hematology and infectious diseases*, 12(1), *Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases*, 2-12
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7340216/pdf/mjhid-12-1-e2020041.pdf>.

Mandiri, A. (2019). Asupan Zat Besi, Asam Folat, dan Vitamin C pada Remaja Putri di Daerah Jatinangor. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 4(4), 170-174.

Mohammad I Djihu, N. M., & Nova, K. (2016). Hubungan Antara Asupan Protein Dengan Kadar Hemoglobin Pada Anak Umur 1-3 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Ranomuut Kota, *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado*, 000, 1-5.

Noviandari, I. (2016). Hubungan Antara Status Gizi dan Anemia Dengan Siklus Menstruasi Pada Remaja Putri di SMA Batik 1 Surakarta. *In Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2-17.

Notoadmojo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. rineka cipta.

Nursari, D. (2019). Gambaran Kejadian Anemia Pada Remaja Putri SMPN 18 Kota Bogor Tahun 2019. *Skripsi Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 13-30.

Nuryanto, & Riziqo, I. O. (2016). Hubungan Asupan Protein, Zat Besi, Vitamin C, dan Seng Dengan Kadar Hemoglobin Pada Balita Stunting. *Journal of Nutrition College*, 5(4), 360-367.

Nurmalasari, Y., Anggunan, A., & Febriany, T. W. (2020). Hubungan tingkat Pendidikan ibu dan pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada anak usia 6-59 bulan. *Jurnal Kebidanan*, 6(2), 205-211.

Onyeneho, Nkechi G., Benjamin C. Ozumba, and S. V. Subramanian. "Determinants of childhood anemia in India." *Scientific reports* (2019) 9:16540, 2-5.

Permatasari, D., & Soviana, E. (2022). Hubungan Asupan Protein Terhadap Kejadian Anemia pada Remaja Putri. *Indonesian Journal of Nutrition Science and Food*, 1(2), 8-13.

Paputungan, S. R., Kapantow, N. H., & Rattu, A. J. . (2018). Hubungan Antara Asupan Zat Besi Dan Protein Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Smp N 5 Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Farmasi Pharmacon*, 5(3), 348-354.

Angka Kecukupan Gizi, 3 1 (2019), 6-14.

Pradanti, C. M., Wulandari, & Hapsaru, S. (2019). Hubungan Asupan Zat Besi (Fe) dan Vitamin C dengan Kadar Hemoglobin pada Siswi Kelas VIII SMP Negeri 3 Brebes. *Jurnal Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 4(1), 24-29.
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jgizi/article/view/1414>

- Prof. Dr. Ir. Raihan, M. S. (2017). Metodologi Penelitian. In *Metodologi Penelitian* (hal. 85). Universitas Islam Jakarta.
- Rahmi, N. (2014). Hubungan Asupan Zat Besi (Fe) dan Infeksi Kecacingan terhadap Kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014. *Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 1-8. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2186/1/nur_rahmi.pdf.
- Rahma, N. A., Zanaria, T. M., Nurjannah, N., Husna, F., & Putra, T. R. I. (2020). Faktor risiko terjadinya kecacingan pada anak usia sekolah dasar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 29-33.
- Restuti, A. N., & Susindra, Y. (2017). Hubungan Antara Asupan Zat Gizi Dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri di SMK Mahfilud Durror II Jelbuk. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 16(3), 74–80. <https://doi.org/10.25047/jii.v16i3.305>
- Riawan, A. (2023). Hubungan antara Asupan Zat Gizi dengan Kadar Hemoglobin pada Anak Sekolah Dasar di Cijeruk, Bogor. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 23(1), 85-89.
- Rusmin, M., Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, B., Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, K., Kunci, K., Gizi, Z., Tempe dan Modifikasinya, J., Makanan Tambahan, P., & Abstrak, B. (2014). Identifikasi Kandungan Zat Gizi Pada Jus Tempe dan Modifikasinya Sebagai Alternatif Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pada Balita. *Gedung FKIK Lt.1 UIN Alauddin Makassar*, VI(2), 2086–2040.
- Sebtalesy, C. Y., & Kristanti, L. A. (2019). Hubungan Status Gizi Anak Usia Sekolah Dengan Kejadian Anemia Di SDN Purworejo 03 Kec. Geger Kab. Madiun. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 10(1), 4-6.
- Sari, M., Sitoayu, L., Gifari, N., Nadiyah, N., & Nuzrina, R. (2020). Analisis Asupan Energi, Zat Gizi Makro, Vitamin C, Zat Besi, Seng, dan IMT/U Berdasarkan Tingkatan Kognitif Siswa Kelas 5 di SD Negeri Duri Kepa 13 Pagi Jakarta Barat. *Media Gizi Mikro Indonesia*, 12(1), 39-52.
- Sirajuddin, S., Rauf, S., & Nursalim, N. (2020). Asupan Zat Besi Berkorelasi Dengan Kejadian Stunting Balita Di Kecamatan Maros Baru. *Jurnal Gizi Indonesia*, 43(2), 109-118.
- Sirajuddin, S., & Masni. (2015). Kejadian Anemia pada Siswa Sekolah Dasar. *Kesmas: National Public Health Journal*, 9(3), 264–269. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i3.574>
- Sudarman, S., Hadi, A. J., Manggabarani, S., & Ishak, S. (2020). Pengaruh Intervensi Perilaku Jajan Sehat terhadap Pencegahan Anemia Gizi pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kota Makassar The Effect of Healthy Snack Behavior Intervention on the Prevention of Nutritional Anemia in Elementary School-

- Age Children in Makassar City. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 67-68.
- Syarfaini, Satrianegara, M. F., & Alam, S. (2017). Analisis Kandungan Zat Gizi Biskuit Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L . Poiret) Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Di Masyarakat. *Public Health Science Journal*, 9, 138–152.
- Syarfaini, Satrianegara, M. F., & Astari, A. R. A. (2018). Pengaruh Pemberian Nugget Tempe Dengan Subtitusi Ikan Gabus Terhadap Status Gizi Anak Sekolah Dasar Di Mis Ddi Ainus Syamsi Kel.Lette, Kota Makassar. *Public Health Science Journal*, 8(2), 151–160.
- Tadete, A. O., Malonda, N. S. H., & Basuki, A. (2018). Hubungan antara Asupan Zat Besi, Protein, dan Vitamin C dengan Kejadian Anemia pada Anak Sekolah Dasar di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado. *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat UNSRAT*, 1–7. <http://fkm.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/ALLENFINA-OLIVIA-TADETE-091511128.pdf>.
- Thamrin, H., & Masnilawati, A. (2021). Hubungan antara Pengetahuan, Tingkat Konsumsi Protein, Zat Besi, dan Vitamin C dengan Kadar Hemoglobin pada Mahasiswi Kebidanan. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12, 30-33.
- Tania, L. E. (2018). Hubungan Asupan Zat Besi, Protein Dan Vitamin C Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri Di Smk Yamas Jakarta Timur Tahun 2018. *Skripsi Kesehatan Masyarakat Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan Jakarta*, 1(3), 39-45.
- Tiastuti, S. E. (2018). Hubungan Asupan Zat Besi, Vitamin C dan Status Gizi dengan Kadar Hemoglobin pada Remaja Putri Kelas X di SMA Negeri 1 Teras Kabupaten Boyolali. *Skripsi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta* 1–11.
- Trisnawati, I. (2019). Hubungan Asupan Fe, Zinc, Vitamin C Dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri Di Smp Negeri 4 Batang. *Publikasi Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 3-9.
- Wandasari, A. E. D. (2019). Hubungan Asupan Protein, Vitamin C Dan Kebiasaan Sarapan Dengan Kadar Hemoglobin Pada Mahasiswi Gizi Its Pku Muhammadiyah Surakarta. *Skripsi Muhammadiyah Surakarta*, 10-23.
- Wandani, Z. S. A., Sulistyowati, E., & Indria, D. M. (2021). Pengaruh Status Pendidikan, Ekonomi, dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Status Gizi Anak Balita di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *Jurnal Kedokteran Komunitas (Journal of Community Medicine)*, 9(1), 3-5.
- Wadhani, L. P. P., & Wijaya, S. M. (2021). Konsumsi Protein, Vitamin A dan Status Gizi serta Kaitannya dengan Hasil Belajar Anak Sekolah Dasar. *Journal of Nutrition College*, 10(3), 181-188.
- Wijayanti, Y. (2011). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia Pada

Remaja Putri Siswa SMK An Nuroniyah Kemadu Kec. Sulang Kab.Rembang Tahun 2011. *Skripsi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang*, 57-59.

Yuwono, E., Suryawan, I. W. B., & Sucipta, A. A. M. (2020). Faktor - faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada anak usia 6-59 bulan di RSUD Wangaya, Denpasar, Bali, Indonesia tahun 2019. *Intisari Sains Medis*, 11(1), 75-80.

Yunita, F. A., Parwatiningsih, S. A., Hardiningsih, M., Yuneta, A. E. N., Kartikasari, M. N. D., & Ropitasari, M. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Konsumsi Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Di Smp 18 Surakarta. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, 8(1), 36-47.

Zhang, Q., Lu, X. M., Zhang, M., Yang, C. Y., Lv, S. Y., Li, S. F., ... & Geng, S. S. (2021). Adverse effects of iron deficiency anemia on pregnancy outcome and offspring development and intervention of three iron supplements. *Scientific reports*, 11(1), 1347.



L

A

M

P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

N

Lampiran 1

INFORMED CONSENT

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Telah Mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai :

1. Penelitian yang berjudul **"Hubungan Antara Asupan Zat Besi, Protein, Vitamin C Dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan Di Kota Makassar Tahun 2022"**
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian
4. Bahaya yang akan timbul
5. Prosedur Penelitian

Dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Gowa, 10 November 2022

Peneliti

Responden

Alifya Nurul Izzha Deddy

Lampiran 2

LEMBAR PERMOHONAN UNTUK MENJADI RESPONDEN

Kepada
Yth.saudara(I)
Di
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifya Nurul Izzha Deddy
Nim : 70200118106
Alamat: Btn Bonto Ramba Blok D no.1 Kec. Tamalanrea

Adalah mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), akan melakukan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana kesehatan masyarakat pada program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui **"Hubungan Antara Asupan Zat Besi, Protein, Vitamin C Dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan Di Kota Makassar Tahun 2022"**. Untuk itu saya memohon ketersediaan Bapak (i) saudara (i) untuk menjadi responden dalam penelitian ini, kerahasiaan dan identitasnya akan saya jaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaan Bapak (i) saudara (i),saya mengucapkan banyak terima kasih.

Makassar, Juli 2023

Peneliti

Lampiran 3

LEMBAR SURAT PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Responden :
Jenis kelamin/umur :
Alamat :

Menyatakan bersedia menjadi subjek (responden) dalam penelitian dari :

Nama : Alifya Nurul Izzha Deddy

Nim : 70200118106

Alamat: Btn Bonto Ramba Blok D no.1 Kec. Tamalanrea

Judul : **Hubungan Antara Asupan Zat Besi, Protein, Vitamin C Dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan Di Kota Makassar Tahun 2022**".

Setelah mendengar penjelasan dan membaca surat permohonan menjadiresponden penelitian yang diajukan peneliti, saya memahami bahwa penelitian ini akan menjunjung tinggi hak-hak saya selaku responden. Saya berhak tidak melanjutkan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini apabila suatu saat penelitian ini akan merugikan saya. Saya sangat memahami bahwa penelitian ini sangat besar manfaatnya bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat. Dengan menandatangani lembar persetujuan ini berarti saya bersedia ikut berpartisipasi dalam penelitian ini secara ikhlas tanpa paksaandari siapapun.

Makassar, Juni 2023

Responden

(.....)

Lampiran 4



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 12777/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.
Lampiran : - Ketua KPAJ Kota Makassar
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 1104 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022 tanggal 29 November 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ALIFYA NURUL IZZHA DEDDY
Nomor Pokok : 70200118106
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" A HUBUNGAN ANTARA ASUPAN ZAT BESI, PROTEIN, VITAMIN C DAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 s/d 31 Desember 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 01 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Lampiran 5



KOMUNITAS PEDULI ANAK JALANAN (KPAJ)

KOTA MAKASSAR

Sekretariat : Kompleks Hartaco Indah, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar
Telp. 082154740809, Email: kpapeduli.makassar@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/A/PI/KPAJ/MKSR/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Alifya Nurul Izzha Deddy
Tempat/Tanggal Lahir : Salubarani/ 31 Mei 2000
NIM : 70200118106
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat : BTN Bontoramba Permai Blok D No. 1

Adalah benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar terhitung mulai tanggal 8 Januari s/d 8 Februari 2023 dalam rangka penelitian skripsi dengan judul **“Hubungan Antara Asupan Zat Besi, Protein, Vitamin C dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan di Kota Makassar Tahun 2022”**

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Pengurus Harian

KPAJ Kota Makassar

Tahun 2022 – 2023

Rijal Amin Svarif S.I.

Ketua Umum

Lampiran 6

KUESIONER

I. IDENTITAS ANAK

Petunjuk : Anda diminta untuk memberikan data-data berdasarkan identitas diri anda :

1. Nama :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Umur : Tahun
4. Berat Badan : kg
5. Tinggi Badan : cm
6. Pendidikan :
7. Alamat :
8. Penghasilan orang tua :

I. KARAKTERISTIS ORANG TUA

1. Berapa banyak jumlah anggota rumah tangga dalam keluarga anak :Orang
2. Keberadaan orang tua kandung :
 - A. Ayah : 1. Masih hidup
 2. Meninggal
 3. Cerai
 - B. Ibu : 1. Masih hidup
 2. Meninggal
 3. Cerai

Jika cerai dan atau kedua orang tua meninggal dengan siapa anak tinggal bersama:

1. Ayah kandung
 2. Ibu kandung
 3. Ayah kandung dan ibu tiri
 4. Ibu kandung dan Ayah tiri
 5. Kakek/Nenek
 6. Keluarga lainnya
3. Jumlah saudara : orang
 4. Pendidikan Ayah :
 1. Tidak sekolah
 2. Tamat SD/MI
 3. Tamat SMP/MTs
 4. Tamat SMA/MAN
 5. Tamat Sarjana
 5. Pendidikan ibu :
 1. Tidak sekolah
 2. Tamat SD/MI
 3. Tamat SMP/MTs

4. Tamat SMA/MAN

5. Tamat Sarjana

6. Pekerjaan Ayah :

1. Tidak Bekerja
2. PNS/TNI/Polri/
3. Pegawai Swasta
5. Petani/ buruh tani
6. Nelayan
7. Sopir/tukang ojek
8. Buruh harian
9. Lainnya:

7. Pekerjaan Ibu :

1. Tidak Bekerja
2. PNS/TNI/Polri/
3. Pegawai Swasta
5. Petani/ buruh tani
6. Nelayan
7. Sopir/tukang ojek
8. Buruh harian
9. Lainnya:

III. FOOD RECLL 24 JM

Petunjuk : Anda diminta memberikan keterangan tentang apa saja yang dimakan dari pagi hingga malam pada hari sebelumnya (kemarin). Jika tidak melakukan makan pagi atau ngemil pada malam hari atau lainnya, silahkan kolom tersebut dikosongkan saja. Pada kolom jenis makanan ditulis nama makanan yang dimakan seperti nasi, ayam goreng, sayur sawi dan lainnya. Pada kolom bahan dasar ditulis bahan dasar pada makanan tersebut, seperti jenis makanan gulai ayam, maka bahan dasarnya adalah menggunakan satuan yang umum digunakan seperti sendok, gelas, piring dan lain-lain.

Hari Pertama

Waktu makan	Menu	URT	Gram
Pagi/Jam			

Selingan Pagi/jam			
Siang/Jam			
Selingan Siang/Jam			
Malam/Jam			
Selingan Malam/Jam			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Lampiran 7

Output Uji Univariat dan Bivariat

Uji Univariat

ALAMAT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ADYAKSA	21	17.5	17.5	17.5
	BTP	16	13.3	13.3	30.8
	KERUNG-KERUNG	21	17.5	17.5	48.3
	MANGGALA	21	17.5	17.5	65.8
	TELKOMAS	20	16.7	16.7	82.5
	UNHAS	21	17.5	17.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

USIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6 tahun	5	4,2	4,2	4,2
	7 tahun	8	6,7	6,7	10,8
	8 tahun	22	18,3	18,3	29,2
	9 tahun	16	13,3	13,3	42,5
	10 tahun	29	24,2	24,2	66,7
	11 tahun	32	26,7	26,7	93,3
	12 tahun	6	5,0	5,0	98,3
	13 tahun	2	1,7	1,7	100,0
	Total	120	100.0	100.0	

PENDIDIKAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BELUM TAMAT SD	66	55.0	55.0	55.0
	PUTUS SEKOLAH	2	1.7	1.7	56.7
	TAMAT SD	15	12.5	12.5	69.2
	TIDAK SEKOLAH	37	30.8	30.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Pekerjaan Ortu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tukang Las	8	6.7	6.7	6.7
	Servis Elektronik	19	15.8	15.8	22.5
	Pemulung	93	77.5	77.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

PENDAPATAN ORANG TUA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	500.000 Rp-900.000 Rp	110	91.7	91.7	91.7
	1.000.000 Rp-1.500.000 Rp	10	8.3	8.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

STATUS GIZI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Gizi Baik	95	79.2	79.2	79.2
	Gizi Kurang	12	10.0	10.0	89.2
	Gizi Lebih	13	10.8	10.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

PROTEIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup	26	21.7	21.7	21.7
	Kurang	94	78.3	78.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

VITAMIN C

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup	46	38.3	38.3	38.3
	Kurang	74	61.7	61.7	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

ZAT BESI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup	6	5.0	5.0	5.0
	Kurang	114	95.0	95.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

ANEMIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Anemia	24	20.0	20.0	20.0
	Anemia	96	80.0	80.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Statistics

		ZAT BESI	PROTEIN	VITAMIN C	STATUS GIZI	ANEMIA
N	Valid	120	120	120	120	120
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		6.24	24.83	25.14	-.24	12.51
Std. Error of Mean		.119	1.188	2.633	.108	.191
Median		6.10	20.55	6.70	-.01	12.55
Mode		6	20	0	0	12
Std. Deviation		1.302	13.018	28.841	1.179	2.097
Variance		1.695	169.465	831.802	1.390	4.399
Range		7	65	127	5	11
Minimum		4	11	0	-3	7
Maximum		11	75	127	2	19
Sum		749	2980	3016	-29	1501

Uji Bivariat

Zat Besi dan Anemia

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	8.596 ^a	1	.003		
Continuity Correction ^b	5.800	1	.016		
Likelihood Ratio	6.574	1	.010		
Fisher's Exact Test				.014	.014
Linear-by-Linear Association	8.525	1	.004		
N of Valid Cases	120				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.20.

b. Computed only for a 2x2 table

Protein dan Anemia

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	76.608 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	71.836	1	.000		
Likelihood Ratio	68.069	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	75.970	1	.000		
N of Valid Cases	120				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.20.

b. Computed only for a 2x2 table

Vitamin C dan Anemia

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.714 ^a	1	.398		
Continuity Correction ^b	.372	1	.542		
Likelihood Ratio	.703	1	.402		
Fisher's Exact Test				.483	.269
Linear-by-Linear Association	.708	1	.400		
N of Valid Cases	120				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.20.

b. Computed only for a 2x2 table

Status Gizi dan Anemia



Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	2.564 ^a	2	.277
Likelihood Ratio	2.693	2	.260
Linear-by-Linear Association	.305	1	.581
N of Valid Cases	120		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.40.

Uji Multivariat

Variables in the Equation

Step		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
1 ^a	PROTEIN	4.867	.804	36.630	1	.000	129.935	26.867	628.399
	ZAT BESI	-.105	1.213	.008	1	.931	.900	.083	9.703
	Constant	-6.112	2.264	7.289	1	.007	.002		

a. Variable(s) entered on step 1: PROTEIN, ZAT BESI.

Lampiran 8







196



Mastel Tabel

No.	Nama	Domisili	Tanggal lahir	Umur	BB	TB	Pendikan	Pekerjaan Ortu	Pengasilan Ortu
1	Azizah 1	Adiaksa	03/01/2017	6 tahun	12,9	99,9	Belum tamat SD	servis elektronik	900.000
2	fajar	Kerung-Kerung	08/01/2012	11tahun	24,2	123	Belum tamat SD	pemulung	900.000
3	Aji	Kerung-Kerung	22/02/2015	8 tahun	17,8	114	Belum tamat SD	pemulung	500.000
4	Abrianti	telkomas	02/01/2017	6 tahun	14,1	100	Belum tamat SD	pemulung	600.000
5	fatir kecil	Unhas	24/01/2016	7 tahun	12,4	95,1	Belum tamat SD	servis elektronik	900.000
6	Rifal	telomas	09/02/2015	8 tahun	20,5	121,5	Belum tamat SD	pemulung	700.000
7	Amran	telkomas	22/02/2013	10 tahun	25	128,1	Belum tamat SD	pemulung	500.000
8	Aerul kecil	Adiaksa	08/01/2016	7 tahun	16,5	114	Belum tamat SD	tukang las	900.000
9	Bajang	Kerung-Kerung	06/04/2012	11 tahun	30,5	134	Belum tamat SD	pemulung	500.000
10	rani	BTP	16/01/2016	7 tahun	15,3	110,8	Belum tamat SD	servis elektronik	1.000.000
11	akbar	Kerung-Kerung	22/01/2017	6 tahun	16,5	113,4	Belum tamat SD	pemulung	500.000
12	ijal	Manggala	02/04/2015	8 tahun	20,2	115,7	Belum tamat SD	pemulung	700.000
13	faisal	telkomas	14/01/2015	8 tahun	19,9	112,5	Belum tamat SD	servis elektronik	1.200.000
14	faril 1	Adiaksa	05/01/2016	7 tahun	20,4	114,7	Belum tamat SD	pemulung	600.000
15	bagas	Manggala	07/03/2017	6 tahun	22	117,6	Belum tamat SD	tukang las	900.000
16	asma	Manggala	22/02/2016	7 tahun	15,3	113,1	Belum tamat SD	pemulung	500.000
17	fatir besar	Unhas	19/03/2015	8 tahun	20	115,6	Belum tamat SD	pemulung	700.000
18	anang	Unhas	21/01/2016	7 tahun	13,9	96,3	Belum tamat SD	tukang las	900.000
19	ilham	BTP	09/03/2017	6 tahun	18,6	97,9	Belum tamat SD	pemulung	800.000
20	amran	Adiaksa	20/01/2014	9 tahun	23,9	123,8	Belum tamat SD	pemulung	500.000
21	AS	Unhas	01/04/2015	8 tahun	21,3	118,5	Belum tamat SD	pemulung	600.000
22	SF	telkomas	24/01/2016	7 tahun	15,1	94,9	Belum tamat SD	pemulung	700.000
23	EE	Adiaksa	12/03/2012	11 tahun	20,8	124,6	Belum tamat SD	pemulung	500.000
24	DF	Kerung-Kerung	18/01/2012	11 tahun	21	124	Belum tamat SD	tukang las	900.000
25	RT	BTP	14/01/2015	8 tahun	17,1	112,7	Belum tamat SD	servis elektronik	1.300.00
26	GH	Kerung-Kerung	11/02/2013	10 tahun	20,5	113,1	Belum tamat SD	pemulung	800.000

27	YY	telkomas	23/03/2012	10 tahun	23,1	124,1	Belum tamat SD	pemulung	500.000
28	JH	Manggala	13/03/2013	10 tahun	16,1	98,4	Belum tamat SD	pemulung	400.000
29	UU	Manggala	29/01/2012	11 tahun	19,3	120,7	Belum tamat SD	pemulung	300.000
30	KK	Manggala	05/02/2013	10 tahun	18,6	110,5	Belum tamat SD	pemulung	500.000
31	UY	Unhas	05/03/2011	12 tahun	23,4	125,5	Belum tamat SD	pemulung	600.000
32	LK	Kerung-Kerung	06/03/2011	12 tahun	24,7	125	Belum tamat SD	pemulung	500.000
33	WD	BTP	05/01/2012	11 tahun	23,7	119,6	Belum tamat SD	pemulung	400.000
34	HH	Adiaksa	02/02/2014	9 tahun	20	124,4	Belum tamat SD	pemulung	600.000
35	FR	telkomas	26/03/2012	11 tahun	21,8	123,3	Belum tamat SD	servis elektronik	1.500.000
36	TT	BTP	25/01/2012	11 tahun	18,5	99,1	Belum tamat SD	pemulung	400.000
37	FR	Kerung-Kerung	13/03/2013	10 tahun	22,4	112,2	Belum tamat SD	servis elektronik	1.200.000
38	EE	telkomas	28/03/2013	10 tahun	27,7	128,2	Belum tamat SD	pemulung	400.000
39	GH	telkomas	03/02/2012	11 tahun	20,4	114,8	Belum tamat SD	pemulung	500.000
40	FR	Adiaksa	07/02/2012	11 tahun	28,7	130,2	Belum tamat SD	pemulung	400.000
41	DD	Adiaksa	03/04/2011	12 tahun	22,2	121,2	Belum tamat SD	pemulung	500.000
42	DF	Manggala	10/01/2013	10 tahun	22	123,6	Belum tamat SD	tukang las	1.500.00
43	RR	Telokomas	17/02/2011	12 tahun	20,4	115,4	Belum tamat SD	pemulung	300.000
44	WE	Unhas	28/01/2011	12 tahun	27,1	123,6	Belum tamat SD	pemulung	500.000
45	WW	Kerung-Kerung	19/03/2010	13 tahun	43,9	145,6	Belum tamat SD	pemulung	600.000
46	QQ	telkomas	28/02/2010	13 tahun	43,2	148,9	Belum tamat SD	servis elektronik	1.200.000
47	GH	telkomas	21/06/2015	8 tahun	16	113	Belum tamat SD	pemulung	400.000
48	DD	Manggala	21/03/2012	11 tahun	22,9	112,8	Belum tamat SD	pemulung	500.000
49	SD	Unhas	01/03/2014	9 tahun	19,3	119	Belum tamat SD	pemulung	600.000
50	DD	Adiaksa	19/03/2012	11 tahun	30,5	133,6	Belum tamat SD	servis elektronik	900.000
51	BB	Manggala	06/01/2012	11tahun	45,3	141,5	Belum tamat SD	pemulung	700.000
52	RT	Manggala	25/01/2013	10 tahun	23,8	122,3	Blum tamat Sd	pemulung	500.000
53	VC	Unhas	02/03/2012	11 tahun	41,7	145,6	Belum tamat SD	pemulung	600.000
54	XC	Unhas	01/04/2014	9 tahun	19,8	118,6	Belum tamat SD	servis elektronik	900.000
55	ZZ	Adiaksa	04/03/2013	10 tahun	35,8	130	Belum tamat SD	tukang las	1.200.000

56	XX	Unhas	24/02/2012	11 tahun	35,8	132	Belum tamat SD	servis elektronik	1.400.00
57	AS	BTP	05/03/2014	9 tahun	28,1	137,6	Belum tamat SD	pemulung	600.000
58	SS	Kerung-Kerung	28/01/2013	10 tahun	34,2	134,7	Belum tamat SD	pemulung	700.000
59	XX	BTP	12/03/2012	11 tahun	26,7	130,5	Belum tamat SD	pemulung	800.000
60	AX	BTP	07/01/2014	9 tahun	18	113	Blum tamat Sd	servis elektronik	900.000
61	XX	Manggala	23/02/2015	8 tahun	22,6	124,6	Belum tamat SD	servis elektronik	1.200.000
62	XX	Manggala	15/01/2015	8 tahun	24,8	117,1	Belum tamat SD	pemulung	400.000
63	CX	Unhas	30/01/2013	10 tahun	23,1	115,7	Belum tamat SD	pemulung	500.000
64	ZZ	Kerung-Kerung	05/02/2015	8 tahun	15,3	97,2	Belum tamat SD	pemulung	700.000
65	VB	Adiaksa	24/02/2012	11 tahun	36,9	138,2	Belum tamat SD	pemulung	500.000
66	SC	Adiaksa	12/02/2014	9 tahun	34,5	135,9	Belum tamat SD	pemulung	600.000
67	XC	telkomas	10/02/2011	12 tahun	20,7	122,4	tidak sekolah	pemulung	400.000
68	VX	telkomas	25/01/2014	9 tahun	20,5	119,9	tidak sekolah	pemulung	500.000
69	ZZ	Adiaksa	03/04/2015	8 tahun	18,4	119,8	tidak sekolah	pemulung	600.000
70	SD	BTP	27/01/2015	8 tahun	17,8	98,3	tidak sekolah	tukang las	900.000
71	JH	Manggala	29/01/2012	11 tahun	31,3	132,4	tidak sekolah	pemulung	700.000
72	HK	BTP	24/02/2013	10 tahun	29,9	126,2	tidak sekolah	pemulung	500.000
73	OP	Kerung-Kerung	06/04/2014	9 tahun	22,8	123,7	tidak sekolah	pemulung	600.000
74	PL	Kerung-Kerung	01/04/2012	11 tahun	32,4	133,5	tidak sekolah	pemulung	400.000
75	MN	telkomas	07/04/2013	10 tahun	19,8	116,9	Tamat SD	pemulung	500.000
76	LK	Adiaksa	16/03/2015	8 tahun	21,7	115,2	Tamat Sd	pemulung	600.000
77	KK	Unhas	06/02/2013	10 tahun	28	121,4	Tamat SD	servis elektronik	900.000
78	KL	BTP	06/04/2012	11 tahun	41,3	144,9	Tamat Sd	pemulung	700.000
79	LK	telkomas	23/03/2013	10 tahun	21,4	119	Tamat SD	pemulung	500.000
80	LJ	BTP	08/03/2013	10 tahun	23	122,7	Tamat Sd	pemulung	600.000
81	LN	Manggala	03/01/2015	8 tahun	17,6	98,9	Tamat SD	pemulung	400.000
82	LM	Kerung-Kerung	21/02/2014	9 tahun	16,6	96	Tamat Sd	pemulung	500.000
83	LN	Unhas	26/02/2012	11 tahun	28,6	133,7	Tamat SD	pemulung	600.000
84	LJ	BTP	23/02/2015	8 tahun	17,3	119,4	Tamat Sd	servis elektronik	900.000

85	LK	Manggala	20/02/2013	10 tahun	15,4	92,1	Tamat SD	pemulung	700.000
86	PI	Manggala	15/03/2015	8 tahun	24,1	129,5	Tamat Sd	pemulung	500.000
87	OR	Kerung-Kerung	20/03/2016	7 tahun	14,1	98,4	Tamat SD	pemulung	600.000
88	YT	Adiaksa	30/01/2012	11 tahun	32,9	135,3	Tamat Sd	pemulung	400.000
89	UY	Adiaksa	17/02/2015	8 tahun	20,8	116,4	Tamat SD	pemulung	500.000
90	IJ	Unhas	12/01/2015	8 tahun	25,6	128,8	Tidak sekolah	pemulung	600.000
91	KN	Manggala	21/02/2012	11 tahun	37,1	147,7	tidak sekolah	tukang las	900.000
92	IG	Unhas	08/04/2015	8 tahun	20	120,2	tidak sekolah	pemulung	700.000
93	JH	Kerung-Kerung	03/01/2012	11 tahun	33,2	130,2	tidak sekolah	pemulung	500.000
94	KF	Kerung-Kerung	29/01/2014	9 tahun	30,8	132,5	tidak skolah	pemulung	600.000
95	KL	BTP	09/02/2014	9 tahun	29,2	134,8	tidak sekolah	pemulung	400.000
96	NB	Adiaksa	08/03/2011	10 tahun	33,3	136,8	tidak sekolah	pemulung	500.000
97	HG	Kerung-Kerung	25/01/2015	8 tahun	21	113,8	tidak sekolah	pemulung	600.000
98	FG	Unhas	23/01/2014	9 tahun	28,7	129,1	tidak sekolah	servis elektronik	900.000
99	DG	Unhas	19/01/2015	8 tahun	16,4	97,1	tidak sekolah	pemulung	700.000
100	BV	BTP	18/01/2011	10 tahun	38,6	140	tidak sekolah	pemulung	500.000
101	IU	Unhas	03/01/2012	11 tahun	37	138,3	tidak sekolah	pemulung	600.000
102	TY	Kerung-Kerung	17/01/2012	11 tahun	36,2	137,4	tidak sekolah	pemulung	400.000
103	RT	Adiaksa	02/02/2013	10 tahun	21,6	122,8	tidak sekolah	pemulung	500.000
104	ER	Adiaksa	02/02/2011	10 tahun	37,7	138	tidak skolah	pemulung	600.000
105	ER	Unhas	11/02/2014	9 tahun	21,3	122	tidak sekolah	servis elektronik	900.000
106	GF	Adiaksa	03/02/2014	9 tahun	22,9	123,1	tidak sekolah	pemulung	700.000
107	DF	telkomas	08/04/2014	9 tahun	23	122,5	tidak sekolah	pemulung	500.000
108	GF	Kerung-Kerung	17/03/2011	10 tahun	37	146,6	tidak sekolah	pemulung	600.000
109	HG	Adiaksa	18/03/2011	10 tahun	40,1	142,4	tidak sekolah	pemulung	400.000
110	RE	Kerung-Kerung	01/04/2012	11 tahun	35,6	138,9	tidak sekolah	pemulung	500.000
111	AQ	Manggala	26/01/2011	10 tahun	36,8	137,1	tidak sekolah	pemulung	600.000
112	SZ	Manggala	04/04/2011	10 tahun	36,4	137,4	tidak sekolah	servis elektronik	900.000
113	DX	telkomas	26/02/2012	11 tahun	33,7	134,7	tidak sekolah	pemulung	700.000

114	FC	Manggala	30/01/2011	10 tahun	40,8	141,9	tidak sekolah	pemulung	500.000
115	GV	Unhas	11/03/2012	11 tahun	31,9	136,4	tidak sekolah	pemulung	600.000
116	HB	telkomas	05/03/2012	11 tahun	37	138,6	tidak sekolah	pemulung	400.000
117	JN	telkomas	01/01/2012	11 tahun	35,6	136,7	tidak sekolah	pemulung	500.000
118	KM	Manggala	25/01/2012	11 tahun	32,6	134,6	tidak sekolah	pemulung	600.000
119	LM	BTP	14/02/2011	10 tahun	35,8	139,3	Putus sekolah	servis elektronik	900.000
120	QW	Unhas	08/04/2011	10 tahun	37,7	141,1	Putus sekolah	pemulung	700.000

Fe1	Fe 2	Rata2	Kategori	P 1	P 2	Rata2	Kategori	Vit C 1	Vit C 2	Rata2	Kategori	IMT/U	Status gizi	Kadar HB	Kategori
8,1	8,8	8,45	kurang	67,4	83,5	75,45	cukup	0	0	0	kurang	-2,12	Gizi kurang	9,2	anemia
6,5	7,8	7,15	kurang	55,6	54,6	55,1	cukup	43,5	41,1	42,3	kurang	-0,55	gizi baik	12,5	anemia
6,1	7,8	6,95	kurang	15,6	16,4	16	kurang	20,1	21,1	20,6	kurang	-1,6	gizi baik	14,6	anemia
5,6	6,7	6,15	kurang	32,6	34,1	33,35	cukup	46,1	45,8	45,95	cukup	-0,82	gizi baik	12,1	anemia
10,2	10,4	10,3	cukup	43,6	45,6	44,6	cukup	59,1	58,2	58,65	cukup	-1,53	gizi baik	12,6	anemia
7,8	6,7	7,25	kurang	41,8	43,1	42,45	cukup	55,6	67,1	61,35	cukup	-1,43	gizi baik	13,7	anemia
6,1	6,7	6,4	kurang	53,7	52,1	52,9	cukup	68,7	52,5	60,6	cukup	-0,74	gizi baik	15,1	anemia
8,6	6,8	7,7	kurang	17,2	17,4	17,3	kurang	55,6	66,4	61	cukup	-2,48	Gizi kurang	9,1	anemia
7,8	7,6	7,7	kurang	19,7	19,1	19,4	kurang	3,2	4,1	3,65	kurang	0,09	gizi baik	13,9	anemia
7,5	6,7	7,1	kurang	17,6	17,4	17,5	kurang	51,3	56,7	54	cukup	-2,26	Gizi kurang	8,2	anemia
5,6	6,2	5,9	kurang	21,3	21,2	21,25	kurang	4,5	4,1	4,3	kurang	-1,88	gizi baik	13,6	anemia
6,7	7,4	7,05	kurang	20,1	22,6	21,35	kurang	11,4	10,2	10,8	kurang	-0,41	gizi baik	12,5	anemia
6,1	4,6	5,35	kurang	46,9	44,5	45,7	cukup	61,2	54,2	57,7	cukup	-0,01	gizi baik	13,7	anemia
4,5	6,5	5,5	kurang	42,7	45,1	43,9	cukup	0,4	0,6	0,5	kurang	0,01	gizi baik	11,4	anemia
5,7	7,8	6,75	kurang	28,9	26,7	27,8	cukup	0,6	8,2	4,4	kurang	0,45	gizi baik	13,3	anemia
6,7	5,4	6,05	kurang	20,9	10,1	15,5	kurang	27,8	21,4	27,8	kurang	-2,76	Gizi kurang	9,2	anemia
5,6	7,8	6,7	kurang	45,9	41,2	43,55	cukup	3,9	4,2	4,05	kurang	-0,51	gizi baik	14,2	anemia

7,5	7,1	7,3	kurang	41	45,1	43,05	cukup	51,7	55,7	53,7	cukup	-0,36	gizi baik	12,5	anemia
4,5	6,7	5,6	kurang	32,3	30,1	31,2	cukup	5,5	4,1	4,8	kurang	2,48	gizi lebih	13,4	anemia
5,6	6,1	5,85	kurang	52,8	52,4	52,6	cukup	3,5	4,2	3,85	kurang	-0,27	gizi baik	13,7	anemia
10,2	10,5	10,35	cukup	47,9	48,1	48	cukup	42,1	41,1	41,6	kurang	-0,36	gizi baik	14,2	anemia
7,5	7,6	7,55	kurang	30,1	30,4	30,25	cukup	44,5	41,3	42,9	kurang	0,75	gizi baik	12,3	anemia
4,9	7,1	6	kurang	50,4	51,2	50,8	cukup	46,1	51,6	48,85	cukup	-2,57	Gizi kurang	9,1	anemia
4,3	4,6	4,45	kurang	13,4	12,1	12,75	kurang	45,1	46,4	45,75	cukup	-2,36	Gizi kurang	8,2	anemia
4,8	5,7	5,25	kurang	40,2	40,1	40,15	cukup	45,4	65,4	55,4	cukup	-1,5	gizi baik	12,2	anemia
6,7	7,1	6,9	kurang	52,4	53,2	52,8	cukup	0,6	0,4	0,5	kurang	-0,22	gizi baik	12	anemia
4,2	5,6	4,9	kurang	50,3	50,1	50,2	cukup	3,5	5,4	4,45	kurang	-1,15	gizi baik	13,1	anemia
4,3	5,7	5	kurang	53,8	52,7	53,25	cukup	66,5	56,5	61,5	cukup	0,06	gizi baik	14,4	anemia
6,7	7,8	7,25	kurang	13,9	15,4	14,65	kurang	21	24	22,5	kurang	-2,5	Gizi kurang	8,3	anemia
3,5	4,6	4,05	kurang	51,9	51,3	51,6	cukup	62,1	56,7	59,4	cukup	-0,75	gizi baik	13,4	anemia
5,6	7,4	6,5	kurang	21,6	20,4	21	kurang	3	4,1	3,55	kurang	-1,62	gizi baik	8,4	anemia
5,6	7,6	6,6	kurang	20,2	20,1	20,15	kurang	11,4	3,2	7,3	kurang	-0,93	gizi baik	7,3	anemia
4,3	5,1	4,7	kurang	53	52,1	52,55	cukup	56,7	67,5	62,1	cukup	-0,21	gizi baik	9,4	anemia
7,2	7,5	7,35	kurang	20,9	21,6	21,25	kurang	0,4	0,2	0,3	kurang	-2,57	Gizi kurang	10,2	anemia
6,7	7,1	6,9	kurang	52,9	51,1	52	cukup	0,6	0	0,3	kurang	-1,69	gizi baik	9,3	anemia
4,5	6,7	5,6	kurang	53,9	54,2	54,05	cukup	0	0	0	kurang	0,89	gizi baik	14,1	anemia
5,6	7,6	6,6	kurang	21,5	20,2	20,85	kurang	5,1	7,1	6,1	kurang	0,58	gizi baik	7,9	anemia
4,8	5,6	5,2	kurang	20,2	20,6	20,4	kurang	56,1	65,1	60,6	cukup	0,17	gizi baik	13,8	anemia
3,5	4,1	3,8	kurang	20,6	22,6	21,6	kurang	5,7	6,2	5,95	kurang	-0,89	gizi baik	8,9	anemia
7,2	4,6	5,9	kurang	22,6	21,2	21,9	kurang	0,4	0,1	0,25	kurang	0,02	gizi baik	9	anemia
4,8	5,1	4,95	kurang	21,2	23,6	22,4	kurang	60,1	56,7	58,4	cukup	-1,42	gizi baik	13,4	anemia
6,1	7,2	6,65	kurang	23,6	22,1	22,85	kurang	5,7	0,1	2,9	kurang	-1,29	gizi baik	9,7	anemia
8,1	8,9	8,5	cukup	22,4	20,1	21,25	kurang	3,4	3,2	3,3	kurang	-1,34	gizi baik	10	anemia
6,5	5,7	6,1	kurang	11,2	11,2	11,2	kurang	3,1	4,2	3,65	kurang	0,12	gizi baik	7,8	anemia
4,9	6,1	5,5	kurang	23,3	22,1	22,7	kurang	54,1	45,6	49,85	cukup	1,02	gizi lebih	13,7	anemia
7,3	6,7	7	kurang	11,9	20,2	16,05	kurang	45,6	76,5	61,05	cukup	0,57	gizi baik	9,6	anemia

3,3	6,1	4,7	kurang	23,7	20,6	22,15	kurang	3,5	5,4	4,45	kurang	-2,76	Gizi kurang	9,3	anemia
8,8	9,2	9	cukup	21,5	22,6	22,05	kurang	56,7	76,5	66,6	cukup	0,57	gizi baik	9,4	anemia
7,5	7,8	7,65	kurang	23,4	21,2	22,3	kurang	45,6	45,7	45,65	cukup	-1,84	gizi baik	11	anemia
4,9	4,6	4,75	kurang	24,3	23,6	23,95	kurang	45,8	54,7	50,25	cukup	0,13	gizi baik	15,6	anemia
4,8	7,4	6,1	kurang	23,2	22,1	22,65	kurang	56,7	45,6	51,15	cukup	2,04	gizi lebih	11,7	anemia
3,5	7,6	5,55	kurang	19,6	20,1	19,85	kurang	5,7	4,3	5	kurang	-0,31	gizi baik	12,7	anemia
7,2	5,1	6,15	kurang	50,1	50,2	50,15	cukup	0,4	0,2	0,3	kurang	1,23	gizi lebih	14,6	anemia
4,8	7,5	6,15	kurang	18,2	24,1	21,15	kurang	50,4	59,3	54,85	cukup	-1,41	gizi baik	12,5	anemia
3,5	7,1	5,3	kurang	19,6	20,6	20,1	kurang	5,7	5,4	5,55	kurang	1,7	gizi lebih	11,5	anemia
8,1	9,3	8,7	cukup	17,4	18,7	18,05	kurang	50	50,2	50,1	cukup	1,25	gizi lebih	14,2	anemia
6,5	7,6	7,05	kurang	15,2	14,6	14,9	kurang	60	55,1	57,55	cukup	-0,8	gizi baik	13,6	anemia
4,9	5,6	5,25	kurang	23,3	23,6	23,45	kurang	45,6	65,1	55,35	cukup	1,17	gizi lebih	15,7	anemia
7,3	4,1	5,7	kurang	19,9	20,1	20	kurang	47,7	46,7	47,2	cukup	-0,7	gizi baik	15,4	anemia
3,3	4,6	3,95	kurang	19,7	20,4	20,05	kurang	3,5	3,4	3,45	kurang	-1,24	gizi baik	12,5	anemia
11,2	10,5	10,85	cukup	13,5	12,6	13,05	kurang	50,3	50,1	50,2	cukup	-0,85	gizi baik	12,3	anemia
7,5	7,2	7,35	kurang	12,4	13,5	12,95	kurang	45,1	45,6	45,1	cukup	1,32	gizi lebih	12,4	anemia
4,9	7,8	6,35	kurang	13,3	14,6	13,95	kurang	46,7	56,4	51,55	cukup	0,45	gizi baik	13,4	anemia
7,7	4,6	6,15	kurang	13,5	14,6	14,05	kurang	90	50,2	70,1	cukup	0,31	gizi baik	13,5	anemia
7,5	7,4	7,45	kurang	12,4	13,5	12,95	kurang	110	55,1	82,55	cukup	1,09	gizi lebih	14,6	anemia
3,4	7,6	5,5	kurang	10,7	11,5	11,1	kurang	70	65,1	67,55	cukup	1,15	gizi lebih	14,5	anemia
5,4	5,1	5,25	kurang	13,5	12,4	12,95	kurang	80	46,7	63,35	cukup	-2,54	Gizi kurang	10,1	anemia
4,7	7,5	6,1	kurang	19,3	22,1	20,7	kurang	184,3	45,8	115,05	cukup	-1,29	gizi baik	13,2	anemia
7,8	7,1	7,45	kurang	19,9	20,6	20,25	kurang	50	58,2	54,1	cukup	-2,47	Gizi kurang	10	anemia
7,5	6,7	7,1	kurang	10,7	11,2	10,95	kurang	60	67,1	63,55	cukup	1,29	gizi lebih	12,2	anemia
6,5	7,6	7,05	kurang	13,5	13,7	13,6	kurang	196,9	52,5	124,7	cukup	0,47	gizi baik	13,2	anemia
4,6	5,6	5,1	kurang	18,2	19,1	18,65	kurang	188,2	66,4	127,3	cukup	0,94	gizi baik	14,3	anemia
5,6	4,1	4,85	kurang	19,6	20,1	19,85	kurang	50	50,1	50,05	cukup	-0,74	gizi baik	14,2	anemia
6,6	4,6	5,6	kurang	22,1	20,9	21,5	kurang	0,4	0,1	0,25	kurang	0,47	gizi baik	12,1	anemia
6	5,1	5,55	kurang	15,2	15,7	15,45	kurang	4,2	3,2	3,7	kurang	-1,28	gizi baik	12,4	anemia

5,6	7,2	6,4	kurang	19,6	20,1	19,85	kurang	4,4	4,2	4,3	kurang	0,4	gizi baik	13,3	anemia
7,5	6,7	7,1	kurang	19,3	20,2	19,75	kurang	10	4,2	7,1	kurang	1,23	gizi lebih	12,1	anemia
5,5	6,7	6,1	kurang	19,9	20,6	20,25	kurang	5,7	5,2	5,45	kurang	1,01	gizi lebih	12,3	anemia
7,7	6,8	7,25	kurang	20,7	21,7	21,2	kurang	0,4	4,2	2,3	kurang	-0,81	gizi baik	13,4	anemia
7,6	7,6	7,6	kurang	15,2	15,7	15,45	kurang	0,6	6,4	3,5	kurang	-0,68	gizi baik	12,3	anemia
6,6	6,7	6,65	kurang	19,6	19,5	19,55	kurang	3,5	7,2	5,35	kurang	1,27	gizi lebih	12,1	anemia
7,5	6,2	6,85	kurang	20,6	20,1	20,35	kurang	5,2	5,1	5,15	kurang	0,91	gizi baik	13,9	anemia
6,9	7,4	7,15	kurang	13,5	14,5	14	kurang	7,2	8,1	7,65	kurang	-0,58	gizi baik	14,5	anemia
7,4	4,6	6	kurang	18,2	18,9	18,55	kurang	7,4	9,1	8,25	kurang	-2,71	Gizi kurang	10	anemia
6,4	6,5	6,45	kurang	15,2	16,1	15,65	kurang	6,4	2,2	4,3	kurang	0,89	gizi baik	12,3	anemia
5,6	7,8	6,7	kurang	19,6	19	19,3	kurang	6,4	5,6	6	kurang	-0,79	gizi baik	14,1	anemia
6,5	5,4	5,95	kurang	13,3	13,5	13,4	kurang	10,2	8,1	9,15	cukup	-0,52	gizi baik	11,3	anemia
6,5	7,8	7,15	kurang	15,2	15,6	15,4	kurang	6,4	7,2	6,8	cukup	0,33	gizi baik	12,1	anemia
6,4	7,1	6,75	kurang	18,8	19	18,9	kurang	5,4	4,5	4,95	cukup	-0,25	gizi baik	12,2	anemia
5,4	6,7	6,05	kurang	14,6	15,6	15,1	kurang	7,5	6,2	6,85	kurang	-0,14	gizi baik	13,7	anemia
6,1	6,1	6,1	kurang	18	20,2	19,1	kurang	5	0,1	2,55	kurang	0,07	gizi baik	12,7	anemia
7,2	6,7	6,95	kurang	19	20,6	19,8	kurang	6,5	3,2	4,85	kurang	-1,44	gizi baik	14,6	anemia
3,3	6,7	5	kurang	13,9	12,2	13,05	kurang	7,5	4,2	5,85	kurang	0,9	gizi baik	11,5	anemia
7,4	6,8	7,1	kurang	22,1	21,2	21,65	kurang	6,5	4,2	5,35	kurang	0,7	gizi baik	18,5	anemia
7,5	7,6	7,55	kurang	21,9	20,1	21	kurang	6,5	5,2	5,85	kurang	0	gizi baik	14,2	anemia
4,9	6,7	5,8	kurang	20,2	21,1	20,65	kurang	6,5	4,2	5,35	kurang	0,17	gizi baik	12,6	anemia
4,3	6,2	5,25	kurang	21,6	20,6	21,1	kurang	6,3	6,4	6,35	kurang	0,3	gizi baik	15,7	anemia
4,8	7,4	6,1	kurang	20,7	22,6	21,65	kurang	7,3	7,2	7,25	kurang	0,55	gizi baik	15,4	anemia
3,2	4,6	3,9	kurang	22,5	21,2	21,85	kurang	6,3	5,1	5,7	kurang	0,98	gizi baik	15,5	anemia
4,2	6,5	5,35	kurang	18,6	23,6	21,1	kurang	5,1	8,1	6,6	kurang	0,65	gizi baik	12,3	anemia
4,3	7,8	6,05	kurang	21,3	22,1	21,7	kurang	4,1	9,1	6,6	kurang	0,82	gizi baik	12,4	anemia
1,8	5,4	3,6	kurang	24,9	23,5	24,2	kurang	5,2	2,2	3,7	cukup	0,77	gizi baik	13,4	anemia
3,5	7,8	5,65	kurang	18,7	21,4	20,05	kurang	6,1	5,6	5,85	kurang	-1,33	gizi baik	13,5	anemia
2	7,1	4,55	kurang	52	50,7	51,35	cukup	4,1	8,1	6,1	kurang	0,96	gizi baik	14,6	anemia

1,7	6,7	4,2	kurang	19,6	20,2	19,9	kurang	5,2	7,2	6,2	kurang	-1,07	gizi baik	14,5	anemia
4,3	6,1	5,2	kurang	20,6	20,6	20,6	kurang	9,2	4,5	6,85	kurang	-0,54	gizi baik	15,6	anemia
7,2	6,7	6,95	kurang	13,5	12,3	12,9	kurang	7,2	6,2	6,7	cukup	-0,43	gizi baik	13,2	anemia
2,3	6,7	4,5	kurang	21,5	21,2	21,35	kurang	6,4	0,1	3,25	kurang	-0,1	gizi baik	12,1	anemia
1,5	6,8	4,15	kurang	15,2	14,6	14,9	kurang	10,2	3,2	6,7	kurang	0,99	gizi baik	12,2	anemia
2,2	7,6	4,9	kurang	19,6	19,1	19,35	kurang	6,4	4,2	5,3	kurang	0,78	gizi baik	13,2	anemia
4,8	6,7	5,75	kurang	20,1	20,2	20,15	kurang	5,4	4,2	4,8	cukup	0,88	gizi baik	14,3	anemia
3,5	6,2	4,85	kurang	15,2	16,7	15,95	kurang	7,5	5,2	6,35	kurang	0,57	gizi baik	14,2	anemia
7,2	7,4	7,3	kurang	12,8	22,6	17,7	kurang	5	4,2	4,6	kurang	0,59	gizi baik	12,1	anemia
4,8	4,6	4,7	kurang	22,2	21,2	21,7	kurang	6,5	6,4	6,45	kurang	0,85	gizi baik	12,4	anemia
3,5	6,5	5	kurang	20	19,7	19,85	kurang	7,5	7,2	7,35	kurang	0,15	gizi baik	15,3	anemia
7,1	7,8	7,45	kurang	12,9	12,3	12,6	kurang	6,5	5,1	5,8	kurang	0,84	gizi baik	15,1	anemia
6,5	5,4	5,95	kurang	13,9	20,6	17,25	kurang	6,5	8,1	7,3	kurang	0,95	gizi baik	12,3	anemia
4,9	7,8	6,35	kurang	18,4	22,6	20,5	kurang	6,5	9,1	7,8	kurang	0,53	gizi baik	13,4	anemia
7,3	7,1	7,2	kurang	21,9	21,2	21,55	kurang	6,3	2,2	4,25	kurang	0,45	gizi baik	12,3	anemia
3,3	6,7	5	kurang	20,2	19,1	19,65	kurang	7,3	5,6	6,45	kurang	0,45	gizi baik	12,1	anemia