

**EPIDEMIOLOGI KEJADIAN DBD DAN UPAYA PENCEGAHAN  
MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SULI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Program Studi Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**Apriani Wardhana Nur**  
**NIM : 70200119045**

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
2023  
M A K A S S A R

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Apriani Wardhana Nur  
Nim : 70200119045  
Tempat/Tanggal Lahir : Larompong, 27 April 2001  
Jurusan : Kesehatan Masyarakat  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Ds. Komba, Kec. Larompong, Kab. Luwu  
Judul : Epidemiologi Kejadian DBD dan Upaya Pencegahan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Suli

Menyatakan dengan sungguh dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 29 November 2023  
Penyusun,



**Apriani Wardhana Nur**  
NIM: 7020019045

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Status Kesehatan Mental dengan Kualitas Hidup Narapidana di Lapas Kelas II A Bulukumba Tahun 2023*" yang disusun oleh Nurfaizah Yusuf, NIM: 70200119112, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 11 September 2023  
24 Shafar 1445 H

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Yessy Kurniati, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Rusmin Abd Rauf, Lc., M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Rimawati A. I. Sadarang, SKM., M.PH	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Berkah, Rahmat dan Hidayah -Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradaban umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis dihadapkan dengan berbagai rintangan-rintangan, namun banyaknya dukungan dan doa di setiap proses dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini sehingga penulis sampai pada titik ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta ibu Nur Aning, S.Pd terima kasih telah menjadi pahlawan yang selalu hadir memberikan kasih sayang yang tulus, do'a tiada tepi, dan semangat tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saudara-saudari penulis Husti Rahmadhani Nur, Muh. Iqbal Shadiqin, dan Kurnia Mutmainnah Nur terima kasih atas dorongan, motivasi dan segala *support* yang telah diberikan.

Penulisan skripsi juga tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Beserta Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A, Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd, dan Wakil Rektor IV Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.

2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I Ibu Dr. Isriani, S.Si., Apt., M.Si, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Patimah, S.Kep., Ns, M. Kes.
3. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes, Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ibu Dr. BS Titi Haerana, SKM., M.Kes Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Emmi Bujawati, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dian Ihwana Ansyar, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis sejak awal penelitian hingga dengan selesainya penulisan skripsi ini.
5. Dr. BS Titi Haerana, SKM., M.Kes selaku Penguji Kompetensi dan Ibu Prof. Dr. Muliaty Amin, M.Ag selaku Dosen Penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Azriful, SKM., M.Kes selaku Dosen Penasehat Akademik yang memotivasi dalam hal akademik dan organisasi.
7. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
8. Syahrir, S.Kep, Ns selaku Kepala UPTD Puskesmas Suli beserta seluruh staf Puskesmas Suli, terkhusus Penanggung Jawab Program DBD yang telah banyak memberikan bantuan dan petunjuk demi kelancaran penelitian.

9. Seluruh Responden penelitian yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan informasi dan menjadi subjek dalam penelitian.
10. Sahabat-sahabat peminatan Epidemiologi 2019, sobat-sobat kesmas A 2019 dan teman-teman Gramost 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala bantuan, dukungan, semangat dan mewarnai keseharian di dunia kampus.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Samata-Gowa, Oktober 2023

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Apriani Wardhana Nur

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat .....	6
E. Definisi Operasional (DO) dan Kriteria Objektif (KO).....	7
F. Kajian Pustaka .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Tentang Demam Berdarah Dengue (DBD) .....	17
B. Tinjauan Tentang Sosiodemografi.....	30
C. Tinjauan Tentang Lingkungan.....	34
D. Tinjauan Tentang Pencegahan dan Pengendalian Vektor.....	39
E. Kerangka Teori .....	44
F. Kerangka Konsep.....	45
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu .....	46
C. Populasi.....	46
D. Sampel.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Instrumen Penelitian .....	47
G. Pengolahan Data .....	47
H. Analisis Data .....	48
I. Penyajian Data .....	49
J. Etika Penelitian .....	49

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
B. Hasil Penelitian .....	52
C. Pembahasan.....	61
1. Gambaran Kejadian DBD Berdasarkan Karakteristik Orang .....	61
2. Gambaran Kejadian DBD Berdasarkan Tempat .....	69
3. Gambaran Kejadian DBD Berdasarkan Waktu.....	73
4. Gambaran Upaya Pencegahan DBD .....	79
D. Keterbatasan Penelitian.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. 1** Kajian Pustaka Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD)
- Tabel 4. 1** Gambaran Distribusi Kasus Konfirmasi DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023
- Tabel 4. 2** Gambaran Distribusi Kasus DBD Berdasarkan Karakteristik Orang di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023
- Tabel 4. 3** Distribusi Pertanyaan Tentang DBD Kepada Kasus Konfirmasi DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023
- Tabel 4. 4** Gambaran Distribusi Upaya Pencegahan DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023
- Tabel 4. 5** Gambaran Distribusi Tingkat Pencegahan DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023


## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2. 1** Siklus Hidup Nyamuk *Aedes Aegypti*
- Gambar 4. 1** Peta Administrasi Kecamatan Suli
- Gambar 4. 2** Peta Kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022- Mei 2023
- Gambar 4. 3** Grafik Kepadatan Penduduk Terhadap IR DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022- Mei 2023
- Gambar 4. 4** Peta *Overlay* Kejadian DBD Berdasarkan Kepadatan Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022- Mei 2023
- Gambar 4. 5** Grafik Min-Max Kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2018-Mei 2023



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2** Surat Rekomendasi Pengambilan Data Awal
- Lampiran 3** Surat Keterangan Layak Etik
- Lampiran 4** Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5** Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 6** Tabel Master
- Lampiran 7** Output SPSS
- Lampiran 8** Titik Koordinat Rumah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**Nama : Apriani Wardhana Nur**

**NIM : 70200119045**

**Judul : Gambaran Epidemiologi Kejadian DBD dan Upaya Pencegahan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Suli**

---

---

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) merupakan penyakit menular diakibatkan oleh *agent* penyakit berupa virus *dengue* yang masuk kedalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk betina *aedes aegypti* ataupun *aedes albopictus*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran epidemiologi kejadian DBD dan upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Suli. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini seluruh penderita DBD pada tahun 2022-Mei 2023 di Wilayah Kerja Puskesmas Suli dengan 23 sampel menggunakan *total sampling*.

Hasil Penelitian menunjukkan kasus DBD tertinggi pada umur 5-14 dan 15-44 tahun (39,1%), lebih banyak terjadi pada perempuan (52,2%) dibandingkan laki-laki (47,8%), pendidikan terbanyak yaitu belum tamat SD (26.1%), terjadi pada sebagian besar mahasiswa/pelajar 50% dan pada responden memiliki pengetahuan yang baik 56,5%. Secara wilayah, sebaran tertinggi terjadi di Desa Cimpu dengan 19 kasus DBD. Waktu kejadian tertinggi tahun 2022 pada bulan Desember dan tahun 2023 pada bulan Januari. Masyarakat memiliki perilaku pencegahan yang masih kurang 60,9%.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan kepada pihak puskesmas untuk mengaktifkan kembali gerakan 1 rumah 1 jumanik agar PSN pada setiap rumah dan lingkungan sekitarnya dapat terlaksana secara optimal.

**Kata kunci: DBD, Epidemiologi, Pencegahan**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Isu penyakit menular masih menjadi salah satu tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit menular adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur yang bisa menular dari individu yang terinfeksi kepada individu yang sebelumnya sehat, mengakibatkan mereka jatuh sakit seperti individu yang pertama. Contoh penyakit menular yang masih menjadi permasalahan di masyarakat Indonesia adalah Demam Berdarah *Dengue* (DBD).

Penyakit DBD merupakan jenis penyakit menular yang cenderung menyebar dengan cepat dan sering dijumpai di daerah-daerah tropis dan subtropis, diantaranya yaitu Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus *dengue* yang dapat memasuki tubuh manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* ataupun *Aedes albopictus*. Keberadaan vektor DBD berhubungan dengan lingkungan manusia sehingga mengakibatkan penularan DBD dengan cepat (Syamsir et al., 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, DBD telah menyebar secara luas di berbagai wilayah di seluruh dunia. Menurut laporan dari *World Health Organisation* (WHO) pada tahun 2021, sekitar 390 juta individu di seluruh dunia terinfeksi virus dengue setiap tahun. Di 128 negara yang berbeda, hampir 3,9 miliar penduduk memiliki risiko tertular virus dengue, dengan risiko tertinggi mencapai 70%, terutama terjadi di wilayah Asia. Filipina memimpin daftar negara dengan tingkat kasus DBD tertinggi, mencapai 52%. Thailand menduduki peringkat kedua dengan 30%, sementara Indonesia berada di peringkat ketiga

dengan 29% dari jumlah populasi yang terinfeksi virus dengue di kawasan Asia (WHO, 2021).

Indonesia salah satu negara beriklim tropis yang terletak di kawasan Asia dan memiliki endemisitas terhadap DBD. Saat ini, penyebaran kasus DBD di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan dalam masyarakat, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius. Konsekuensi sosial mencakup kepanikan di kalangan keluarga, penurunan harapan hidup masyarakat, dan bahkan kematian anggota keluarga. Sedangkan dampak ekonomi yang muncul, meskipun tidak langsung, melibatkan biaya pengobatan serta biaya tambahan seperti transportasi dan akomodasi selama perawatan sakit (Kemenkes RI, 2017).

Menurut Data Profil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, terdapat 116.127 kasus DBD yang tercatat di Indonesia, dengan jumlah kematian mencapai 1.023 orang. Dalam tahun yang sama, kasus maupun kematian akibat DBD mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, terdapat 73.518 kasus DBD dengan 705 kasus kematian akibat DBD. Angka Insiden Rate (IR) DBD di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 42,25 per 100.000 penduduk, dan tingkat Case Fatality Rate (CFR) adalah 0,88%. Provinsi Kepulauan Riau memiliki IR tertinggi, yaitu 80,9 per 100.000 penduduk, diikuti oleh Kalimantan Timur dengan IR 78,1, dan Bali dengan IR 59,8 per 100.000 penduduk. Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat ke-10 dari total 34 provinsi, dengan IR sebesar 40 per 100.000 penduduk (Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022).

Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat 2.714 kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di wilayah tersebut. Angka *Insiden Rate* (IR) untuk DBD di Sulawesi Selatan pada tahun tersebut adalah 29,6 per

100.000 penduduk, yang artinya terdapat sekitar 29-30 orang penderita DBD dalam setiap 100.000 penduduk di Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa merupakan kabupaten dengan jumlah kasus DBD tertinggi, mencapai 457 orang, sedangkan Kabupaten Maros melaporkan 361 kasus. Jumlah kematian akibat DBD di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebanyak 27 orang, dengan rinciannya adalah 7 orang di Kabupaten Maros, 6 orang di Kabupaten Gowa, 4 orang di Kabupaten Sidrap dan Enrekang masing-masing, 3 orang di Kabupaten Soppeng, 2 orang di Kabupaten Jeneponto, dan 1 orang di Kabupaten Bone (Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020).

Angka kejadian DBD di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam angka kejadian DBD. Pada tahun 2020, Kabupaten Luwu mencatat jumlah kasus DBD yang paling rendah di Sulawesi Selatan, yaitu hanya 6 kasus, dengan angka *Insiden Rate* (IR) sebesar 0,016 per 100.000 penduduk. Namun, pada tahun 2021, kasus DBD mengalami peningkatan, mencapai 31 kasus dengan satu kasus kematian. Kemudian, pada tahun 2022, kasus DBD di Kabupaten Luwu kembali meningkat, mencapai 72 kasus dengan dua orang yang meninggal akibat DBD. Puskesmas Suli merupakan Puskesmas dengan jumlah kasus DBD tertinggi pada tahun 2022, dengan total 11 kasus DBD dan satu kasus kematian (Profil Daerah Kabupaten Luwu, 2022).

Penularan DBD dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, termasuk aspek fisik, kimia dan biologi. Beberapa dari faktor-faktor lingkungan yang dapat memengaruhi reproduksi nyamuk, terutama di dalam lingkungan rumah, meliputi tingkat kelembaban udara, cahaya yang masuk, keberadaan tempat penampungan air (TPA) yang berjentik serta penggunaan kawat kasa pada ventilasi rumah (E. Sari et al., 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sucipto et al., 2015) bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian DBD di Kabupaten

Semarang meliputi faktor lingkungan dan faktor perilaku responden itu sendiri. Faktor lingkungan yang memiliki hubungan signifikan dan risiko terhadap kejadian DBD yaitu kelembaban udara ( $OR:4,2, p:0,004$ ) dan keberadaan tempat penampungan air (TPA) yang berjentik ( $OR:8,8, p:0,0001$ ) sedangkan faktor perilaku responden seperti kebiasaan memakai obat anti nyamuk atau *repellent* ( $OR: 5,4, p: 0,036$ ).

Penyakit DBD juga dapat disebabkan oleh perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan sekitar mereka. Hal ini terkait dengan keberadaan wadah-wadah air sebagai tempat vektor berkembang biak, seperti bak mandi, tempayan, ember, kaleng bekas, vas bunga, dan sebagainya. Faktor-faktor ini juga memiliki dampak signifikan dalam penularan DBD dan menjadi perhatian dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, upaya untuk pemberantasan sarang nyamuk dilakukan dengan mengubah perilaku masyarakat, meningkatkan kebersihan lingkungan, dan melakukan pencegahan di tempat-tempat nyamuk berkembang biak (Yuningsih, 2018).

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw sebagai petunjuk bagi seluruh ummat manusia. Diturunkannya Al-Qur'an menjadi sebuah pedoman hidup manusia dalam menata kehidupan untuk memperoleh keselamatan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup berisi banyak pelajaran termasuk sejarah di masa lalu yang bisa dipetik hikmahnya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Q.S Yunus/10: 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Terjemah:

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al-qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi suatu (penyakit) yang terdapat dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukimin” (QS. Yunus/10: 57)

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbāh mengatakan bahwa ayat diatas mengandung empat fungsi, pengajaran, obat, petunjuk serta rahmat. Dari penjelasan di atas, bahwa selain berfungsi sebagai petunjuk, Al-Qur'an juga fungsinya sebagai obat bagi penyakit jiwa, yang menghinggapi hati orang-orang yang beriman.

Pada tahun 2022, Puskesmas Suli menepati urutan pertama dengan kasus DBD tertinggi di Kabupaten Luwu dengan 11 kasus dan 1 orang meninggal akibat DBD dengan angka IR sebesar 0,054% per 100.000 penduduk. Sebelumnya seluruh desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas Suli tidak termasuk daerah endemis DBD dikarena dalam kurun waktu 4 tahun berturut-turut tidak ada laporan kasus DBD yang dilaporkan. Distribusi kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Suli dari bulan Januari hingga bulan Desember berjumlah 11 orang yang tersebar di Desa Murante (1 orang), Kelurahan Suli (1 orang) dan Desa Cimpu (9 orang). Laporan kasus terus bertambah hingga bulan Mei 2023.

Hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada petugas bagian pelaksana program DBD Puskesmas Suli bahwa salah satu faktor penyebab kejadian DBD yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Suli yaitu faktor lingkungan dan perilaku masyarakat setempat, untuk itu dilakukan penelitian untuk melihat gambaran epidemiologi kejadian DBD berdasarkan orang, tempat dan waktu serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat setelah terjangkit penyakit DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli, Kabupaten Luwu tahun 2022- Mei 2023.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran epidemiologi

kejadian DBD serta tindakan pencegahan yang diterapkan oleh masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Suli periode dari tahun 2022 hingga Mei 2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran epidemiologi kejadian DBD dan upaya pencegahan masyarakat terhadap penyakit DBD di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu tahun 2022- Mei 2023.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui gambaran penyebaran kejadian DBD berdasarkan orang (jenis kelamin, umur, pekerjaan, tingkat pendidikan dan pengetahuan) di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023.
- b. Mengetahui gambaran penyebaran kejadian DBD berdasarkan tempat di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023.
- c. Mengetahui gambaran penyebaran kejadian DBD berdasarkan waktu di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023.
- d. Mengetahui gambaran upaya pencegahan DBD yang dilakukan masyarakat setelah terjangkit DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023.

### **D. Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Ilmiah**

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan informasi yang berguna serta menjadi landasan untuk

penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian DBD di Kecamatan Suli.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan terkait dengan upaya pencegahan DBD. Informasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut untuk mengendalikan penyakit DBD di Kabupaten Luwu, khususnya di Kecamatan Suli.

## 3. Manfaat bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai landasan bagi masyarakat untuk menilai dan memperbaiki tingkat pengetahuan serta sikap positif mereka terkait upaya pencegahan DBD. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat secara mandiri meningkatkan taraf kesehatan mereka.

### **E. Definisi Operasional (DO) dan Kriteria Objektif (KO)**

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai batasan variabel yang digunakan atau mengenai aspek yang diukur oleh variabel tertentu dalam sebuah penelitian.

#### 1. Kejadian DBD

Temuan kasus penyakit DBD akibat virus *dengue* yang di buktikan dengan hasil uji lab dan klinis secara positif dan tercatat pada rekam medis puskesmas setempat dalam kurun waktu tahun 2022- Mei 2023.

#### 2. Umur

Umur adalah usia seseorang pada saat menderita penyakit DBD berdasarkan data yang tercatat pada akta kelahiran.

Kategori Umur:

- a. <1 Tahun
- b. 1-4 Tahun
- c. 5-14 Tahun
- d. 15-44 Tahun
- e. >44 Tahun

3. Jenis Kelamin

Karakteristik Jenis kelamin berdasarkan data yang dibuktikan dari Akta Kelahiran dan catatan pada laporan kasus DBD.

Kriteria Objektif:

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

4. Pekerjaan

Sebuah pekerjaan atau tugas yang memungkinkan seseorang mendapatkan imbalan berupa barang atau jasa.

Kriteria Objektif:

- a. Tidak Bekerja
- b. Petani
- c. IRT
- d. Petani
- e. Pedagang
- f. lainnya

5. Pendidikan

Jenjang pendidikan formal terakhir yang ditempu oleh responden untuk mendapatkan ijazah.

Kriteria Objektif:

- a. Belum Sekolah
- b. Belum Tamat SD
- c. SD
- d. SLTP/Sederajat
- e. SLTA/Sederajat
- f. Perguruan tinggi

#### 6. Pengetahuan

Tingkat pengetahuan dasar masyarakat tentang penyakit DBD (Sumber penyakit, penularan penyakit dan pencegahan). Pengetahuan diukur menggunakan kuesioner.

Kriteria Objektif:

- a. Kurang: Apabila jawaban responden mendapatkan nilai  $< 4.00$
- b. Baik : Apabila jawaban responden mendapatkan nilai  $\geq 4.00$

#### 7. Distribusi berdasarkan tempat

Penyebaran penyakit berdasarkan desa maupun kelurahan dimana penderita DBD tinggal dan menetap yang tercatat pada buku laporan Puskesmas.

#### 8. Distribusi berdasarkan waktu

Jumlah penderita DBD dalam satuan waktu tertentu yaitu per bulan yang tertera dalam buku laporan kasus DBD Puskesmas Suli tahun 2022- mei 2023.

#### 9. Perilaku Pencegahan DBD

Berbagai tindakan telah dijalankan untuk menghindari penyebaran DBD, dan salah satu strateginya adalah menerapkan Prinsip PSN 3M Plus.

- a. Menguras adalah tindakan membersihkan atau mengosongkan tempat-tempat yang sering digunakan sebagai wadah penyimpanan

air, seperti bak mandi, kendi, toren air, drum, dan wadah air lainnya.

- b. Menutup adalah upaya menutup erat wadah-wadah penyimpanan air, seperti bak mandi atau drum, agar tidak ada akses bagi nyamuk.
- c. Mengubur atau membuang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk demam berdarah.

Adapun unsur “Plus” yang dimaksud adalah bentuk upaya pencegahan tambahan seperti berikut:

- a. Membudidayakan ikan yang memakan jentik nyamuk.
- b. Menggunakan obat anti nyamuk
- c. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi
- d. Mengadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan.
- e. Menaruh pakaian bekas dalam wadah yang tertutup.
- f. Menggunakan larvasida pada tempat penyimpanan air yang sulit dikuras.
- g. Melakukan perbaikan pada saluran air dan talang yang tidak lancar
- h. Menanam tanaman pengusir nyamuk

Kriteria Objektif:

- a. Kurang: Apabila jawaban responden mendapatkan nilai  $< 6.00$
- b. Baik : Apabila jawaban responden mendapatkan nilai  $\geq 6.00$

## F. Kajian Pustaka

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka Kejadian Demam Berdarah *Dengue* (DBD)

No	Penulis, Sumber dan Tahun	Judul	Variabel Penelitaian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Sury et al., 2021)  Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal) Volume 9, Nomor 6, November 2021	Gambaran Epidemiologi Kejadian Demam Berdarah Dengue: Karakteristik Penderita, Waktu Dan Faktor Lingkungan Di Kecamatan Tembalang Tahun 2019	<b>Variabel Bebas:</b> karakteristik penderita, waktu kejadian dan faktor lingkungan <b>Variabel Terikat:</b> Kejadian DBD	observasional deskriptif	Persentase penderita DBD terbanyak sebesar 61,5% pada jenis kelamin laki-laki, sebesar 59% pada usia 4-12 tahun (usia TK- SD) dan 63,1% pada musim hujan. Lingkungan KecTembalang mempunyai suhu udara 30,08°C, ketinggian wilayah 91,5 mdpl, curah hujan 921 mm/tahun, penggunaan lahan 198,86 ha dan kepadatan penduduk 46,51 jiwa/ha.
2	(L. Novitasari et al., 2018)  Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal) Volume 6, Nomor 5, Oktober 2018 (ISSN: 2356-3346) <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/in">https://ejournal3.undip.ac.id/in</a>	Hubungan Faktor <i>Host</i> , Faktor Lingkungan, Dan Status Gizi Dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue Di Wilayah Kerja Puskesmas Kayen Kabupaten Pati	<b>Variabel Bebas:</b> Pengetahuan, praktik 3M, keberadaan TPA, keberadaan kawat kasa, keberadaan jentik dan status gizi <b>Variabel Terikat:</b>	Penelitian observasional analitik	Pengetahuan (p=0,643), keberadaan kawat kasa (p=0,554), dan status gizi (p=0,126) tidak memiliki hubungan yang bermakna. Sedangkan variabel Praktik 3M (p=0,015) dan

No	Penulis, Sumber dan Tahun	Judul	Variabel Penelitaian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<a href="http://dex.php/jkm">dex.php/jkm</a>		Kejadian DBD		keberadaan jentik nyamuk (p=0,012) memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian DBD
3	(Imresah & Marlianto, 2022) Thaksin University Online Journal 2022; 2022(5): INTER-014(77) <a href="http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/TSUOJ">http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/TSUOJ</a>	<i>Associated Factors Of Dengue Hemorrhagic Fever In Phc Of Beringin Raya</i>	<b>Variabel Bebas:</b> Pengetahuan, sikap dan pemberantasan sarang nyamuk denagn 3M  <b>Variabel Terikat:</b> Kejadian DBD	<i>Survey method with a case control approach</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa lebih dari 72 responden, 40 orang (55,6%) memiliki pengetahuan cukup, 25 orang (34,7%) memiliki Sikap Kurang Baik dan memiliki perilaku PSN dengan 3M Plus kurang sebanyak 31 orang (43,1%). Analisis bivariante menunjukkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan Nilai (p = 0,009). Nilai Sikap (p= 0,001) dan perilaku PSN dengan 3M Plus Value (p= 0,017) dengan kejadian DBD.

No	Penulis, Sumber dan Tahun	Judul	Variabel Penelitaian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	(Liza et al., 2015) <i>Jurnal Kedokteran Syiah Kuala</i> , 15(3), 135–141. Desember 2015	Hubungan Tingkat Pengetahuan, Pendidikan Dan Sikap Dengan Partisipasi Ibu Rumah Tangga Dalam Pencegahan Wabah DBD Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.	<b>Variabel Bebas:</b> Pendidikan, pengetahuan dan sikap <b>Variabel Terikat:</b> Pencegahan Wabah DBD	Analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.	Terdapat hubungan tingkat Pendidikan (85,7%), pengetahuan (68,3%) dan Sikap (64,2%) dengan partisipasi ibu rumah tangga dalam pencegahan wabah DBD di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.
5	(Monintja et al., 2021) Elsevier, Tahun 2021 <a href="https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii">https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii</a>	Analysis of temperature and humidity on dengue hemorrhagic fever in Manado Municipality	<b>Variabel Bebas:</b> Suhu dan Kelembaban <b>Variabel Terikat:</b> Kejadian DBD	Deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional	Suhu tertinggi pada bulan Agustus (28, 7°C), kelembaban tertinggi pada bulan Januari (88%), dan kejadian DBD terbanyak pada bulan Januari (409 kasus). Ada hubungan yang signifikan antara suhu dan prevalensi DBD ( $p = 0,000$ , $r = -0,845$ ). Kelembaban dengan prevalensi DBD ( $p = 0,000$ , $r = 0,873$ )
6	(Putra & Ellina, 2020) Open Access Health Scientific Journal Vol. 1 No. 2 August 2020, pp. 45-51	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Puskesmas	<b>Variabel Bebas:</b> Kebiasaan mengantong baju, frekuensi pengurasan bak mandi,	Kuantitatif dengan pendekatan cross sectional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan menggantung baju ( $p$ -value 0,000), frekuensi

No	Penulis, Sumber dan Tahun	Judul	Variabel Penelitaian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<a href="https://oahsj.org/index.php/oahsj">https://oahsj.org/index.php/oahsj</a>	Suruh Trenggalek	keberadaan larva <b>Variabel Terikat:</b> Kejadian DBD		pengurusan bak mandi (p-value 0,000) dan keberadaan larva (p-value 0,000) dengan kejadian DBD. Hasil uji simultan juga menunjukkan adanya pengaruh semua variabel terhadap kejadian demam berdarah dengue dengan p-value $0,000 \leq 0,05$ .
7	(Nastiti et al., 2020)  Jurnal Kesehatan Prima, Volume 15, Edisi. 2, Agustus 2021p-ISSN:1978-1334 <a href="http://jkp.poltekkesmataram.ac.id/index.php/home/index">http://jkp.poltekkesmataram.ac.id/index.php/home/index</a>	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Puskesmas Klagenserut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun	<b>Variabel Bebas:</b> Pengetahuan, sikap, persepsi, fasilitas kesehatan, dan dukungan kader  <b>Variabel Terikat:</b> Kejadian DBD	Penelitian kuantitatif dengan desain penelitian metode survey Analitik dengan pendekatan case control	Sikap (p= 0,045), persepsi (p=0,022), fasilitas kesehatan (p=0,008) dan dukungan kader (p= 0,045) memiliki hubungan yang berarti dengan kejadian DBD, dan tidak ada hubungan pengetahuan (p= 0,053) dengan kejadian DBD.
8	(Marwanty & Miko Wahyono, 2019)  Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia Vol. 1, No. 2, Juni 2018	Faktor Lingkungan Rumah dan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kota Palopo 201	<b>Variabel Bebas:</b> Keberadaan breeding places dan resting places, kebiasaan tidur siang, mobilitas, penggunaan obat anti	Studi analitik dengan rancangan kasus kontrol	Umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, kebiasaan tidur pada pagi dan sore hari, mobilitas, riwayat DBD dalam keluarga, serta

No	Penulis, Sumber dan Tahun	Judul	Variabel Penelitaian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>nyamuk, kebiasaan menggantung pakaian, riwayat DBD keluarga.</p> <p><b>Variabel Terikat:</b> Kejadian DBD</p>		<p>praktik PSN berhubungan dengan kejadian DBD. Faktor lingkungan rumah secara tunggal tidak berhubungan dengan kejadian DBD, namun interaksi antara lingkungan rumah yang berisiko dengan tingkat pendidikan rendah akan meningkatkan risiko kejadian DBD sebesar 2,87 kali setelah dikontrol oleh variabel konfounder umur. Proporsi kejadian DBD yang dapat diakibatkan oleh adanya interaksi antara pendidikan dan faktor lingkungan sebesar 5,4%</p>
9	<p>(Akbar &amp; Maulana Syaputra, 2019)</p> <p><i>The Indonesian Journal of Health Promotion</i> (September,</p>	<p>Faktor Risiko Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Indramayu</p>	<p><b>Variabel Bebas:</b> Pendidikan, praktek 3 M di rumah, kebiasaan menggantung pakaian</p>	<p>Penelitian observasional analitik</p>	<p>Terdapat pengaruh antara praktek 3 M di rumah nilai (<math>p=0,020</math>, <math>OR=2,778</math>; 95% <math>CI:1,174-6,574</math>) dan kebiasaan menggantung</p>

No	Penulis, Sumber dan Tahun	Judul	Variabel Penelitaian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	2019) Vol. 2. No. 3 ISSN 2597– 6052 <a href="https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3">https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3</a>		<b>Variabel Terikat:</b> Kejadian DBD		pakaian (p=0,015), OR=3,470; 95% CI:1,271-9,472) sehingga 2 hal tersebut merupakan faktor risiko kejadian DBD.
10	(Mardhatillah et al., 2020)  MESINA, Vol.1, Oktober 2020, 23-32	Gambaran Kejadian Demam Berdarah Dengue (Dbd) Di Wilayah Kerja Puskesmas Dempo Kota Palembang	<b>Variabel Bebas:</b> Container Index, Angka House Index, Frekuensi PHBS, Praktik Buang Sampah dan Tingkat Stress <b>Variabel Terikat:</b> Kejadian DBD	Deskriptif observasiona	Jumlah kasus berdasarkan kelompok usia penderita <15 tahun yaitu 86,2% dan kelompok usia 15 tahun ke atas sebesar 13,8%. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebesar 57,4% dan perempuan sebesar 42,6%. Penyuluhan kesehatan, kerja bakti 3M, Kunjungan rumah, kegiatan fogging, pemantauan jentik berkala, dan PSN merupakan upaya Puskesmas Dempo Kota Palembang untuk memberantas DBD.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Tentang Demam Berdarah Dengue (DBD)***

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) adalah sebuah kondisi penyakit yang disebabkan oleh virus *dengue* yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. DBD telah menyebar dengan cepat di seluruh dunia, terutama di wilayah-wilayah yang merupakan anggota WHO pada akhir-akhir tahun ini. Virus *dengue* umumnya disebarkan oleh nyamuk betina, terutama oleh spesies *Aedes aegypti* dan dalam tingkat yang lebih rendah oleh *Aedes albopictus*. DBD menyebar secara luas di wilayah-wilayah tropis dan tingkat risikonya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti curah hujan, suhu dan perkembangan perkotaan yang tidak terencana (WHO, 2021).

Penyakit demam berdarah merupakan penyakit yang sering kita jumpai di sebagian besar daerah tropis dan subtropis, terutama di wilayah Asia Tenggara, Amerika Tengah, Amerika Latin, dan Karibia. *Host* alami DBD adalah manusia, agennya adalah virus *dengue* yang termasuk ke dalam *famili flaviridae* dan *genus flavivirus*. Penyakit DBD terdiri dari empat serotipe, yaitu Den-1, Den-2, Den-3, dan Den-4. Penularan virus kepada manusia terjadi melalui gigitan nyamuk yang telah terinfeksi, terutama nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, yang ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia (Candra, 2010).

Penciptaan seekor nyamuk disebutkan dalam Al-qur'an bahwa hewan sekecil nyamuk diciptakan di muka bumi ataupun hewan yang lebih kecil dari nyamuk. Seekor nyamuk diciptakan sebagai media penularan penyakit salah satunya yaitu demam berdarah *dengue* yang dibawa oleh virus *dengue* di dalam tubuhnya. Firman Allah swt dalam QS Al-Baqoroh/2:26

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۚ ٢٦

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan ada pula yang diberikan-Nya petunjuk, tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik” (QS Al-Baqoroh/2: 26).*

Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan menceritakan tentang penciptaan seekor hewan seperti *بَعُوضَةً* yang merupakan nyamuk atau serangga kecil yang dapat membahayakan. Dalam ayat ini, hewan diciptakan dalam bentuk kecil namun dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Kata *al-baudhoh* yang berarti nyamuk, ternyata merupakan nyamuk betina yang memiliki resiko membawa penyakit dibandingkan nyamuk jantan. Nyamuk betina mengisap darah untuk memperoleh makanannya dan membutuhkan protein dari darah untuk bertelur, sedangkan nyamuk jantan memperoleh makanannya dari sari bunga dan tidak memiliki organ yang dapat berfungsi melubangi kulit. Dengan begitu nyamuk betina yang dapat menyebabkan seseorang sakit melalui perantara virus menjadi penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, diturunkannya Al-Qur'an sebagai pengingat untuk umat manusia agar tidak mengabaikan hal kecil dari ciptaan Allah.

Demam berdarah terus menjadi isu kesehatan di tengah masyarakat Indonesia, dengan peningkatan jumlah penderita dan penyebarannya yang terus meluas. Penyakit ini dapat muncul sepanjang tahun dan menjangkit berbagai kelompok usia, sementara hubungannya dengan faktor-faktor lingkungan dan perilaku masyarakat sangat signifikan (Kemenkes RI, 2020).

Infeksi *dengue* merupakan penyakit infeksi virus akut, penyebabnya yaitu virus *dengue* yang masuk ke dalam tubuh manusia dengan gejala demam 2–7 hari disertai dengan manifestasi perdarahan, penurunan trombosit (*trombositopenia*), adanya hemokonsentrasi yang ditandai kebocoran plasma (peningkatan *hematokrit, asites, efusi pleura, hipoalbuminemia*). Infeksi *dengue* bisa ditandai dengan gejala umum yang tidak spesifik seperti sakit kepala, nyeri otot dan tulang, ruam kulit, atau nyeri di bagian belakang mata (Kemenkes RI, 2020).

### **1. Etiologi**

Penyakit DBD disebabkan oleh virus *dengue* yang termasuk dalam *family flaviviridae* dan *genus flavivirus*. Virus ini memiliki empat serotipe yang dikenal dengan DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Keempat serotipe virus ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia dan menyebabkan gejala yang berbeda saat menginfeksi manusia. Pengamatan dan penelitian mengenai virus *dengue* telah dilakukan sejak tahun 1975 dan hasilnya menunjukkan bahwa keempat serotipe ini tersebar setiap tahun. DEN-3 dianggap sebagai serotipe yang paling sering menyebabkan infeksi berat di Indonesia dan diyakini berkontribusi pada manifestasi klinis yang lebih parah (Sukohar, 2014).

### **2. Epidemiologi**

Proses terjadinya sebuah penyakit dalam Teori trias epidemiologi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu *host* (atau individu yang terinfeksi DBD), *agent* (virus *dengue* yang menjadi penyebab DBD) dan lingkungan sekitar. Perubahan dalam faktor lingkungan dapat memengaruhi perilaku *host*, yang pada gilirannya dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang dapat mempengaruhi individu maupun keseluruhan populasi. Ketidakseimbangan

dalam interaksi antara *host*, *agent* dan lingkungan dapat mengakibatkan peningkatan angka kejadian DBD (Rismawati & Nurmala, 2017).

a. *Agent*

*Agent* penyakit DBD yaitu virus *dengue* yang termasuk dalam kelompok arbovirus (*Arthropod-borne virus*) tipe B. Virus *dengue* terdiri dari empat serotipe yang berbeda, yaitu dengue tipe 1, 2, 3, dan 4. Penularan virus *dengue* ke manusia terjadi melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* yang merupakan vektor utama dan *Aedes albopictus* yang berperan sebagai vektor pendamping. Kedua spesies nyamuk ini termasuk dalam genus *Aedes* dalam *famili culicidae*. Secara morfologis, keduanya memiliki kemiripan yang signifikan, tetapi dapat dibedakan oleh adanya strip putih pada skutum (bagian tengah belakang) tubuhnya. Skutum (bagian tengah belakang tubuh) pada nyamuk *Aedes aegypti* memiliki dua strip putih sejajar di bagian tengahnya yang diapit oleh dua garis lengkung berwarna putih sedangkan *Aedes albopictus* juga berwarna hitam hanya memiliki satu strip putih yang tebal di bagian tengah skutumnya (Knowlton et al., 2009).

b. *Host*

*Host* alami penyakit DBD adalah manusia. Pengetahuan dan perilaku manusia memiliki dampak yang signifikan pada penyebaran DBD. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang memadai atau pengetahuan yang lebih mendalam tentang penyakit tersebut cenderung memiliki sikap yang benar dan tindakan yang sesuai. Pengetahuan memainkan peran penting sebagai pemicu awal bagi individu untuk berperilaku sejalan dengan pencegahan DBD.

c. Lingkungan (*Environment*)

Menurut penelitian oleh (Dinata & Dhewantara, 2012) faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi penyebaran kasus DBD meliputi:

- 1) Aspek lingkungan fisik yang mempengaruhi epidemiologi DBD melibatkan faktor-faktor seperti musim, iklim, dan karakteristik geografis suatu daerah.
- 2) Lingkungan biologis melibatkan pertumbuhan tanaman yang memiliki kemampuan untuk menampung air di daun, pelepah, atau batang, serta tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah tertentu.
- 3) Faktor lingkungan sosial-ekonomi mencakup perilaku masyarakat yang mungkin tidak memprioritaskan kebersihan lingkungan, terutama perilaku dalam pemberantasan sarang nyamuk salah satunya menguras bak atau penampungan air, perilaku dalam pengelolaan sampah rumah tangga serta penggunaan insektisida di rumah tangga.

### **3. Cara Penularan**

Virus *dengue* masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk betina yang telah terinfeksi, terutama oleh nyamuk *Aedes aegypti*. Meskipun spesies lain dalam *genus Aedes* juga memiliki peran sebagai vektor, kontribusinya dalam penyebaran virus ini relatif kecil dibandingkan dengan *Aedes aegypti*. Nyamuk *Aedes aegypti* setelah mengambil darah dari individu yang terinfeksi lalu virus mengalami perkembangan di bagian tengah usus nyamuk sebelum menyebar ke bagian lainnya, termasuk kelenjar ludah. Periode yang diperlukan dari saat nyamuk mengambil virus hingga saat virus ditransmisikan ke inang baru disebut sebagai periode inkubasi ekstrinsik (EIP), yang biasanya berlangsung selama sekitar 8-12 hari pada suhu sekitar

25-28°C. Perbedaan dalam periode inkubasi ekstrinsik tidak hanya dipengaruhi oleh suhu, akan tetap terdapat faktor lain seperti fluktuasi suhu harian, genotipe virus, dan konsentrasi virus awal, yang semuanya dapat memengaruhi waktu yang diperlukan bagi nyamuk untuk menularkan virus tersebut. Nyamuk yang telah terinfeksi dapat menjadi sumber penularan virus selama sisa hidupnya (WHO, 2021).

Virus *dengue* akan mengalami perkembangan dan penyebaran dalam beberapa jaringan tubuh nyamuk, seperti dalam kelenjar ludah nyamuk. Kira-kira seminggu setelah mengisap darah dari seorang penderita, nyamuk tersebut akan menjadi mampu untuk menularkan virus kepada orang lain (periode inkubasi ekstrinsik). Virus ini akan tetap ada dalam tubuh nyamuk selama sisa hidupnya. Sehingga nyamuk *Aedes aegypti* yang telah mengisap virus *dengue* menjadi pembawa virus yang dapat menularkannya sepanjang masa hidupnya. Proses perpindahan virus *dengue* terjadi ketika nyamuk menusuk atau menggigit, sebelum mengisap darah nyamuk akan melepaskan air liur melalui alat tusuknya (*proboscis*) untuk mencegah pembekuan darah. Melalui air liur inilah virus *dengue* ditularkan dari nyamuk ke manusia yang menjadi inang selanjutnya (Masriadi, 2017).

Penularan virus *dengue* dari manusia ke nyamuk terjadi melalui gigitan nyamuk yang telah terinfeksi oleh seseorang yang memiliki tingkat *viremia* (jumlah virus dalam darah) tinggi akibat infeksi virus *dengue*. Ini mencakup individu yang mengalami infeksi dengue dengan gejala yang terlihat, orang yang belum menunjukkan gejala penyakit (pra-gejala), dan bahkan individu yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit sama sekali (*asimtomatik*). Penularan virus *dengue* oleh manusia ke nyamuk terjadi hingga 2 hari sebelum seseorang menunjukkan gejala penyakit dan hingga 2 hari setelah demam


mereda. Risiko infeksi nyamuk meningkat seiring dengan tingginya tingkat viremia dan demam yang dialami oleh pasien. Sebaliknya, tingkat antibodi spesifik terhadap virus dengue yang tinggi dapat mengurangi risiko penularan virus ke nyamuk. Biasanya, orang tetap viremia selama berkisar 4-5 hari, meskipun viremia dapat berlangsung hingga 12 hari dalam beberapa kasus.

#### **4. Siklus Hidup Nyamuk *Aedes Aegypti***

Nyamuk *Aedes aegypti* mengikuti siklus kehidupan yang melibatkan empat tahap dimulai dari telur, jentik, pupa hingga menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk jenis ini mengikuti siklus hidup yang disebut sebagai siklus hidup sempurna. Telur nyamuk ini biasanya diletakkan secara individu pada permukaan air yang bersih dan tidak terkait dengan tanah (Susanti & Suharyo, 2017). Pada awalnya, nyamuk *Aedes aegypti* lebih umum ditemukan di kota-kota pelabuhan dan wilayah dataran rendah, lalu menyebar ke daerah pedalaman. Perlu dicatat bahwa penyebaran nyamuk *Aedes aegypti* terutama dipengaruhi oleh aktivitas manusia, mengingat nyamuk ini memiliki jarak terbang yang terbatas, sekitar 40 hingga 100 meter. Meskipun nyamuk *Aedes aegypti* memiliki potensi untuk terbang hingga sejauh 2 kilometer, namun jarang sekali mereka terbang sampai jarak tersebut. Hal ini disebabkan karena tiga faktor kunci yang diperlukan untuk berkembang biak yaitu tempat perindukan, sumber darah dan tempat istirahat yang cenderung ditemukan dalam satu lokasi yang sama, seperti di dalam rumah.

Proses perkembangan jentik melibatkan empat tahap yang dikenal sebagai instar. Pertumbuhan dari instar pertama ke instar keempat memerlukan sekitar 5 hari. Selanjutnya, Larva akan mengalami transformasi menjadi pupa setelah mencapai tingkat keempat dari perkembangannya, dan pada tahap ini pupa memasuki fase dorman. Pupa dapat tetap dalam fase

dorman selama kurang lebih 2 hari sebelum akhirnya menetas menjadi nyamuk dewasa. Secara keseluruhan, proses perkembangan dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 hari, walaupun bisa lebih lama jika kondisi lingkungan tidak mendukung. (Susanti & Suharyo, 2017), berikut merupakan morfologi nyamuk:



Gambar 2. 1 Siklus Hidup Nyamuk *Aedes Aegypti*

a. Telur

Setelah telur nyamuk *Aedes* dikeluarkan, awalnya memiliki warna putih, tetapi dalam waktu 30 menit, telur-telur tersebut berubah menjadi berwarna hitam. Telur-telur diletakkan secara individual dekat permukaan air dengan jarak sekitar 2,5 cm dari tempat perindukan nyamuk. Telur nyamuk *aedes* mampu bertahan selama berbulan-bulan pada suhu antara 2°C hingga 4°C, tetapi akan menetas dalam waktu 1 hingga 2 hari jika terkena kondisi kelembaban yang rendah. Faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan telur untuk menetas meliputi suhu, pH air tempat perindukan, paparan cahaya, serta kelembaban, selain faktor fertilitas dari telur itu sendiri.

Struktur telur nyamuk *Aedes aegypti* berpola garis-garis mirip dengan kasa berwarna hitam yang diletakkan satu persatu pada dinding

tempat perkembangan larva. Ukuran telur ini sekitar 1 mm berbentuk bulat oval atau memanjang memiliki ketahanan hidup beberapa bulan pada suhu antara 2°C hingga 42°C dalam keadaan kering. Telur tersebut menetas apabila kelembaban yang rendah dalam kurung waktu 4 atau 5 hari. Telur Ciri-ciri nyamuk *Aedes aegypti* memiliki ciri-ciri yaitu berwarna hitam, dengan ukuran  $\pm 0,08$  mm, dan bentuk yang menyerupai sarang tawon.

b. Larva

Telur yang telah menetas akan mengalami tahap perkembangan membentuk larva atau jentik. Selama tahap ini suhu, tingkat keasaman (pH) air di lokasi perkembangan larva, ketersediaan sumber makanan, paparan cahaya, kepadatan larva, kondisi lingkungan sekitar, dan adanya predator berpengaruh terhadap kelangsungan hidup larva. Menurut (Aradilla, 2009) Larva mempunyai karakteristik seperti kepala yang lumayan besar, serta thorax dan abdomen yang terlihat jelas. Di sisi thorax, terdapat duri panjang berbentuk melengkung, serta pada bagian kepala terdapat rambut. Di permukaan air, larva bergantung untuk mengakses oksigen dari udara. Selain itu, larva juga menyaring mikroorganisme dan partikel-partikel lain dalam air.

Larva berkembang dengan baik pada suhu ideal yaitu antara 25°C–30°C. Larva mengalami metamorfosis menjadi pupa dalam jangka waktu 4 hingga 9 hari melalui empat fase perkembangan yang dikenal sebagai instar. Perubahan dari instar I ke instar II memakan waktu sekitar 2 hingga 3 hari, kemudian dari instar II ke instar III dalam waktu 2 hari, dan terakhir, dari instar III ke instar IV dalam waktu 2 hingga 3 hari. Larva dibagi menjadi empat tahap (instar) berdasarkan perkembangannya:

1. Instar I : Larva memiliki ukuran yang sangat kecil, sekitar 1-2 mm.
2. Instar II : Larva memiliki ukuran antara 2,1 hingga 3,8 mm.
3. Instar III : Larva memiliki ukuran kira-kira 3,9-4,9 mm.
4. Instar IV : Larva memiliki ukuran 5-6 mm.

c. Pupa (Kepompong)

Terdapat sebuah kantong udara yang terletak di antara bakal sayap nyamuk dewasa. Selain itu, terdapat sepasang sayap pengayuh yang tumpang tindih, memungkinkan pupa untuk melakukan gerakan menyelam cepat dan melakukan serangkaian lompatan sebagai respons terhadap rangsangan. Stadium pupa tidak memerlukan asupan makanan. Nyamuk dewasa muncul setelah selongsong pupa sobek oleh gelembung udara yang dihasilkan oleh gerakan aktif pupa. Dalam waktu sekitar 1-2 hari, pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa yang baru. Keseluruhan siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti*, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa, memerlukan waktu sekitar 7-10 hari. Terdapat Pertumbuhan pupa nyamuk jantan dan betina, nyamuk jantan memerlukan waktu 2 hari, sedangkan nyamuk betina waktu lebih dari 2 hari. Perkembangan pupa akan berjalan dengan baik pada suhu yang optimal berkisar antara 28°C hingga 32°C (Aradilla, 2009).

d. Nyamuk Dewasa

Setelah keluar dari pupa, nyamuk akan berhenti sejenak di dalam selongsong pupa untuk mengeringkan sayapnya. Nyamuk betina dewasa menggunakan darah sebagai sumber makanan, sedangkan nyamuk jantan hanya mengonsumsi cairan dari buah-buahan dan bunga. Setelah melakukan perkawinan, nyamuk betina akan menghisap darah, dan sekitar tiga hari kemudian akan meletakkan sekitar 100 butir telur atau lebih.

Nyamuk kemudian akan mencari makanan berupa darah lagi setelah itu (Aradilla, 2009).

Terdapat 3 bagian utama tubuh Nyamuk *Aedes aegypti*, yaitu kepala, dada, dan perut. Bagian kepala memiliki sepasang mata majemuk dan antena berbulu. Nyamuk betina termasuk jenis penusuk dan juga pengisap (*piercing-sucking*) serta cenderung mengonsumsi darah manusia (*anthropophagus*), sedangkan nyamuk jantan mempunyai alat mulut yang lebih lemah dan tidak dapat menembus kulit manusia, sehingga mereka lebih suka mengonsumsi cairan dari tumbuhan (*phytophagus*). Nyamuk betina memiliki antena tipe *pilose*, sedangkan nyamuk jantan memiliki antena tipe *plumose*. Nyamuk *Aedes aegypti* mampu berkembang dengan baik dalam kisaran suhu antara 24°C hingga 39°C, dan jika terpapar suhu sekitar 6°C, mereka akan mati dalam waktu 24 jam. Nyamuk dapat bertahan hidup pada suhu antara 7°C hingga 9°C. Rata-rata umur hidup nyamuk betina *Aedes aegypti* adalah sekitar 10 hari.

## 5. Gejala Klinis

Gejala DBD yang umumnya terjadi meliputi munculnya bintik-bintik merah pada kulit, suhu tubuh yang melebihi 38°C, kelemahan dan kelesuan tubuh, gelisah, perasaan dingin dan berkeringat, nyeri di daerah ulu hati, serta muntah. Pada beberapa kasus, gejala yang muncul juga melibatkan perdarahan, seperti mimisan dan buang air besar yang bercampur darah. Selain itu, jumlah trombosit dalam darah dapat turun hingga mencapai 100.000/mm<sup>3</sup>. Menurut *World Health Organization* (WHO) tahun 2012, demam *dengue* dapat mengalami tiga fase yang berbeda, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan.

### a. Fase Demam

Suhu tubuh melebihi  $39^{\circ}\text{C}$  dan tetap pada tingkat tersebut selama 2-7 hari. Tanda dan gejala awal yang muncul akan semakin memburuk dengan adanya demam yang terus-menerus, sakit kepala, nyeri perut yang parah, muntah, muntah darah, tinja berwarna gelap (melena), rasa gelisah, kelemahan, dan munculnya bercak memar pada kulit.

Setelah mengalami demam selama 2-7 hari, terjadi penurunan suhu tubuh yang cepat, seringkali disertai gejala gangguan peredaran darah dengan intensitas yang berbeda-beda. Pasien biasanya mengalami keringat, kegelisahan, perubahan suhu ekstremitas yang lebih rendah, serta terdapat perubahan dalam denyut nadi dan tekanan darah. Pada saat fase perubahan dari demam menjadi fase tanpa demam, pasien yang tidak mengalami peningkatan permeabilitas kapiler kemungkinan tidak akan mengalami fase kritis. Akan tetapi, ketika demam tinggi mulai mereda, pasien yang mengalami peningkatan permeabilitas kapiler mungkin akan menunjukkan tanda-tanda bahaya, yang paling sering adalah kebocoran plasma.

#### b. Fase Kritis

Pada fase kritis, suhu tubuh akan menurun menjadi sekitar  $37^{\circ}\text{C}$  -  $38^{\circ}\text{C}$  atau bahkan lebih rendah, terjadi pada hari ke-3 hingga ke-8 sejak awal penyakit. Pada kasus yang parah, terdapat perubahan kondisi umum pasien yang terlihat saat atau beberapa saat setelah suhu tubuh turun antara hari ke-3 hingga ke-7. Pasien dapat mengalami tanda seperti kegagalan sirkulasi, kulit terasa dingin dan lembab terutama di ujung jari kaki, sianosis di sekitar mulut, gelisah, peningkatan denyut nadi yang cepat, tekanan darah yang melemah dan mungkin tidak teraba, serta ditandai oleh penurunan suhu tubuh. Selama fase ini, permeabilitas kapiler meningkat

dan terjadi kebocoran plasma, yang umumnya berlangsung selama 24-48 jam. Kebocoran plasma seringkali mendahului oleh penurunan jumlah sel darah putih yang progresif dan penurunan jumlah trombosit hingga di bawah  $100.000/\text{mm}^3$ . Pasien juga mungkin mengalami nyeri perut saat akan mengalami syok. Banyak pasien pulih pada fase ini dengan terapi cairan dan elektrolit, meskipun pada kasus yang parah, kehilangan plasma dapat berkembang menjadi syok dan berakibat fatal jika tidak ditangani dengan benar.

#### c. Fase Penyembuhan

Tahap terakhir adalah fase penyembuhan. Setelah pasien melewati fase kritis selama 24-48 jam, proses reabsorpsi dari kompartemen ekstrasvaskuler secara perlahan terjadi dalam 48-72 jam. Pada tahap ini, pasien menunjukkan perbaikan dalam keadaan umum, nafsu makan yang kembali normal, perbaikan gejala gastrointestinal, dan status hemodinamik yang stabil.

Berdasarkan Kemenkes RI (2013) penderita penyakit DBD pada umumnya mengalami gejala sebagai berikut:

- a. Gejala awal dari DBD meliputi demam selama 2-7 hari, seringkali disertai dengan sakit kepala, nyeri otot, nyeri persendian, dan sakit belakang mata.
- b. Manifestasi pendarahan seperti uji torniket positif, bintik pendarahan, mimisan, gusi berdarah, dan tinja berdarah.
- c. Penurunan jumlah trombosit  $100.000/\text{mm}^3$ .
- d. Tanda-tanda kebocoran plasma bias berupa peningkatan hematocrit  $\geq 20\%$  dari nilai baseline, efusi, ascites dan hyproprotinemia hipo albuminemia.

Menurut (Candra, 2010) derajat keparahan penyakit demam berdarah dengue, dibagi menjadi 4 derajat yaitu:

- a. Derajat I : Demam disertai gejala tidak khas dan satu – satunya manifestasi perdarahan yaitu uji tourniquet positif.
- b. Derajat II : Seperti derajat I, disertai perdarahan spontan di kulit atau pendarahan lain.
- c. Derajat III : Tanda kegagalan sirkulasi meliputi nadi yang cepat dan melemah, penurunan tekanan nadi hingga  $\leq 20$  mmHg, hipotensi dengan tekanan sistolik menurun hingga  $\leq 80$  mmHg, sianosis di sekitar mulut, kulit ekstremitas yang terasa dingin dan lembab, serta rasa gelisah.
- d. Derajat IV : Syok berat ( profound shock), nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak teratur.

### **B. Tinjauan Tentang Sosiodemografi**

Faktor risiko dalam kasus DBD sangat dipengaruhi oleh sosiodemografi. Ini disebabkan oleh keterkaitan yang erat antara faktor sosiodemografi dengan karakteristik individu atau kelompok. Sosiodemografi adalah bidang studi yang fokus pada aspek-aspek populasi di suatu wilayah, termasuk jumlah penduduk, struktur penduduk (komposisi), dan bagaimana populasi tersebut berkembang atau mengalami perubahan. Sosiodemografi menganalisis distribusi geografis, komposisi, dan dinamika populasi, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), migrasi (perpindahan penduduk), dan mobilitas sosial (perubahan status) (Ismah et al., 2021).

#### 1. Usia

Usia adalah salah satu komponen sosiodemografi yang memiliki dampak signifikan terhadap kejadian DBD di negara-negara tropis. Sebagai

informasi umum, kelompok usia muda cenderung lebih rentan terhadap DBD. Di negara-negara tropis, yang sering kali memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, risiko wabah DBD juga semakin meningkat (Suryani, 2018) di kota blitar, bahwa kelompok usia 5-14 tahun merupakan kelompok yang paling banyak terkena demam berdarah. Kelompok usia di bawah 12 tahun memiliki risiko 19,06 kali lebih tinggi untuk terjangkit DBD dibandingkan dengan kelompok usia 12 tahun ke atas. Penyebab dari perbedaan risiko ini adalah karena kelompok usia di bawah 12 tahun cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia 12 tahun ke atas.

Usia merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan tingkat kerentanan terhadap infeksi virus *dengue*. Infeksi virus *dengue* dapat terjadi pada semua kelompok usia, bahkan termasuk bayi yang baru beberapa hari lahir. Saat epidemi *dengue* pertama kali masuk di Indonesia, sebagian besar kasus DBD terjadi pada anak-anak dalam kelompok usia 5-9 tahun. Dalam periode antara tahun 1968 hingga 1973, hampir 95% kasus DBD dialami oleh anak-anak di bawah usia 15 tahun.

Risiko tinggi terhadap DBD ditemui pada anak-anak di bawah usia 15 tahun, terutama bila mereka tinggal di lingkungan lembap dan padat di daerah pinggiran kota. Tidak semua individu yang terinfeksi virus *dengue* akan mengalami kasus DBD. Beberapa orang mungkin hanya mengalami demam ringan dan sembuh tanpa perlu pengobatan, atau bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali. Meskipun demikian, setiap individu yang terinfeksi virus *dengue* akan membawa virus ini dalam tubuh mereka selama sekitar satu minggu, sehingga mereka dapat menjadi sumber penularan virus kepada

nyamuk yang menggigit mereka. Nyamuk yang telah terinfeksi akan terus menularkan virus *dengue* ke orang lain (Widoyono, 2011).

## 2. Jenis Kelamin

Sistem kekebalan tubuh pada laki-laki dan perempuan mengalami perbedaan ketika memasuki masa reproduksi. Perbedaan ini disebabkan oleh *hormon estrogen* yang dominan pada perempuan dan dapat meningkatkan produksi antibodi seperti IgG dan IgA. Peningkatan produksi IgG dan IgA ini berkontribusi pada kekebalan tubuh perempuan terhadap infeksi virus. Meskipun beberapa penelitian telah mengamati pengaruh jenis kelamin terhadap risiko infeksi virus dengue, hasilnya bervariasi. Dengan demikian, risiko terkena DBD pada individu laki-laki dan perempuan dianggap sebanding karena keduanya memiliki potensi yang setara untuk digigit oleh nyamuk *Aedes aegypti* yang merupakan vektor penular virus *dengue*.

## 3. Status Gizi

Status gizi mencerminkan kondisi kesehatan yang timbul akibat interaksi antara asupan zat-zat gizi oleh tubuh manusia dan cara tubuh memanfaatkannya, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pola makan. Status gizi dapat dilihat melalui variabel tertentu, seperti berat badan, tinggi badan, dan indikator lain yang mencerminkan kondisi kesehatan dan asupan zat-zat gizi oleh individu (Candra, 2010).

Status gizi yang tidak memadai meningkatkan risiko terkena infeksi virus *dengue*. Ketika seseorang dengan status gizi yang buruk terinfeksi virus *dengue*, respon antigen dan antibodi dalam tubuhnya dapat memperburuk keparahan infeksi. Produksi interferon (IFN) oleh makrofag dalam tubuh yang terinfeksi mungkin tidak cukup efektif dalam menghambat perkembangan dan penyebaran virus ke sel-sel yang belum terinfeksi. Selain itu, adanya antibodi

yang tidak cukup spesifik terhadap antigen virus DEN bisa mengakibatkan interferon (IFN) yang dihasilkan oleh makrofag menjadi tidak mampu menghentikan reproduksi virus dengan baik. Di samping itu, antibodi terhadap virus DEN dalam tubuh juga dapat memicu fenomena yang dikenal sebagai *Antibody-Dependent Enhancement* (ADE), yang memperburuk infeksi virus dan mengakibatkan gejala yang lebih berat (A. Novitasari et al., 2015).

#### 4. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari proses "mengenali" yang terjadi setelah seseorang menggunakan panca inderanya untuk memahami suatu objek tertentu. Panca indera manusia yang digunakan dalam pengenalan objek mencakup penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan tentang DBD menjadi sangat relevan untuk diketahui oleh masyarakat, bahkan sampai tingkat keluarga. Kurangnya pengetahuan berkorelasi dengan peningkatan risiko terkena DBD. Oleh karena itu, jika keluarga memiliki pemahaman yang memadai tentang DBD, maka mereka dapat mengurangi risiko terkena penyakit ini. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik lebih mungkin memahami pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan anggota keluarganya. Keterbatasan pengetahuan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya tindakan pencegahan dan penanggulangan DBD, seperti 3M 1 plus, penggunaan abate, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah, juga merupakan hambatan yang signifikan (Lawira, 2015).

#### 5. Mobilitas penduduk

Mobilitas penduduk memainkan peran yang sangat penting dalam proses penularan virus *dengue*, dan hal ini berdampak signifikan pada penyebaran epidemi virus *dengue*. Seiring dengan meningkatnya urbanisasi,

penyakit DBD yang awalnya hanya terbatas pada wilayah perkotaan, kini menyebar ke daerah pedesaan. Ini disebabkan oleh peningkatan kemudahan penyebaran virus, yang menjangkiti lebih banyak manusia, sebagian besar karena peningkatan mobilitas penduduk. Penyediaan transportasi yang semakin baik, baik dalam kota maupun antar daerah, telah memberikan kontribusi besar terhadap penyebaran virus *dengue*.

Isu mobilitas penduduk yang tinggi adalah suatu permasalahan yang memerlukan perhatian serius, baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah. Hal ini terutama relevan dalam konteks pencegahan penyakit DBD, di mana mobilitas penduduk yang tinggi, didukung oleh infrastruktur transportasi yang baik, dapat memfasilitasi penyebaran penyakit DBD. Penyakit ini dapat menyebar baik melalui kendaraan maupun karena penduduk yang telah terinfeksi virus yang dapat ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti*. Oleh karena itu, upaya untuk mengendalikan mobilitas penduduk perlu menjadi fokus dalam strategi pencegahan penyakit DBD.

### C. Tinjauan Tentang Lingkungan

Dalam penyebaran penyakit menular terutama DBD, lingkungan berperan sangat penting. Secara umum, lingkungan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Sebagaimana

Allah SWT bersabda dalam surah QS Al-Rum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  
٤١

Terjemahnya:

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S Al-Rum/30:41).*

Ayat di atas dalam Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa sebuah isyarat tentang kerusakan lingkungan dimana telah nampaknya kerusakan di darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan di laut seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena perbuatan tangan mana yang durhaka, hingga akibatnya Allah mencicipkan yaitu merasakan sedikit kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

#### 1. Lingkungan fisik

- a. Pengurusan tempat-tempat penampungan air perlu dilakukan secara berkala, setidaknya setiap seminggu sekali, guna mencegah berkembangnya nyamuk *Aedes aegypti*. Jika semua anggota masyarakat berpartisipasi dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) untuk mencegah DBD, maka populasi nyamuk ini dapat dikendalikan hingga tingkat yang sangat rendah, sehingga risiko penularan DBD dapat diminimalkan bahkan tidak terjadi lagi.
- b. Ketersediaan penutup pada kontainer merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi jumlah nyamuk yang bisa berkembang biak di dalamnya, terutama pada kontainer yang menjadi tempat favorit bagi nyamuk *Aedes aegypti*.
- c. Nyamuk *Aedes aegypti* memiliki jarak terbang yang pendek, hanya sekitar 100 meter, sehingga nyamuk ini lebih sering ditemukan di sekitar rumah-rumah penduduk. Jika rumah-rumah penduduk berdekatan satu sama lain, nyamuk *Aedes aegypti* dapat dengan mudah berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya.

## 2. Lingkungan biologi

a. Faktor risiko penularan DBD terkait dengan kepadatan vektor, yaitu nyamuk *Aedes aegypti*. Kepadatan nyamuk ini diukur menggunakan Angka Bebas Jentik (ABJ), yang biasanya disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota. Semakin tinggi kepadatan nyamuk *Aedes aegypti*, semakin besar risiko masyarakat terkena penyakit DBD. Dengan kata lain, jika daerah tertentu memiliki tingkat kepadatan nyamuk *Aedes aegypti* yang tinggi, dan terdapat seorang penderita DBD di daerah tersebut, maka masyarakat di sekitar penderita tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tertular penyakit DBD.

b. Tempat penampungan air di dalam dan sekitar rumah adalah lokasi utama untuk berkembang biaknya nyamuk *Aedes aegypti*. Nyamuk ini menggunakan kontainer-kontainer ini sebagai tempat perindukan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa tempat-tempat seperti kontainer ini, yang dapat menyimpan air untuk keperluan sehari-hari atau barang-barang lain yang dapat mengakibatkan air tergenang dan tidak terserap oleh tanah, merupakan lingkungan yang ideal bagi nyamuk *Aedes aegypti* untuk berkembang biak.

1) Wadah-wadah yang digunakan untuk menyimpan air sehari-hari, seperti bak mandi, WC, tempayan, drum, dan sebagainya.

2) Tempat-tempat yang bukan digunakan untuk menyimpan air (non TPA), yang dapat menyebabkan air tergenang, seperti tempat minum burung, vas bunga, pot tanaman air,

barang bekas seperti kaleng, ban bekas, botol, tempurung kelapa, dan sejenisnya.

3) Tempat-tempat penampungan alami, seperti lubang di potongan bambu, celah-celah di pohon, lubang di batu, pelepah daun, tempurung kelapa, cangkang kerang, atau pangkal daun pisang (Kemenkes RI, 2011).

c. Keberadaan larva nyamuk dalam kontainer dapat dikenali berdasarkan berbagai faktor seperti lokasi, jenis, material, warna, bentuk, volume, dan tutup kontainer. Nyamuk *Aedes aegypti* betina cenderung memilih tempat bertelur berdasarkan karakteristik kontainer, termasuk asal air yang terdapat di dalamnya. Keberadaan kontainer memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kepadatan populasi nyamuk *Aedes aegypti*. Semakin banyak kontainer yang tersedia, maka semakin banyak tempat perindukan yang ada, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepadatan populasi nyamuk *Aedes aegypti*. Peningkatan kepadatan populasi nyamuk *Aedes aegypti*, risiko penularan virus DBD juga akan meningkat.

### 3. Lingkungan sosial

a. Kepadatan populasi nyamuk *Aedes aegypti* di dalam rumah merupakan masalah serius. Nyamuk ini memiliki tingkat aktivitas yang tinggi dalam mencari makan, sehingga mereka dapat menggigit banyak orang dalam waktu singkat. Jika ada seseorang di dalam rumah yang terinfeksi DBD, maka risiko penularan penyakit ini kepada penghuni rumah yang lain juga menjadi tinggi. Hal ini membuat kepadatan hunian rumah

nyamuk *Aedes aegypti* menjadi faktor risiko yang signifikan dalam penyebaran penyakit DBD.

- b. Dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan memiliki potensi untuk memengaruhi perubahan perilaku individu. Kegiatan yang rutin dilakukan, seperti fogging, pemeriksaan jentik secara berkala, dan pemberian abate, merupakan bagian dari upaya pemberantasan sarang nyamuk DBD. Pelaksanaan program ini, peran kader kesehatan dan tokoh masyarakat juga sangat penting. Mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD. Bantuan mereka, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melawan DBD dapat ditingkatkan.
- c. Pengalaman mendapatkan penyuluhan kesehatan merujuk pada proses penyuluhan kepada individu atau masyarakat. Tujuan dari penyuluhan kesehatan adalah menciptakan pemahaman, kesadaran, pengetahuan, serta motivasi yang memungkinkan individu atau masyarakat untuk tidak hanya mengerti, tetapi juga mau dan mampu menjalankan anjuran yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya dalam konteks Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD.

Menerapkan pola hidup bersih dan sehat merupakan hak yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Membersihkan lingkungan tempat tinggal dianjurkan bagi muslim untuk menciptakan kesehatan diri maupun lingkungan agar tetap bersih dan nyaman bagi yang tinggal di lingkungan tersebut, karena

Allah menyukai orang-orang yang berperilaku bersih seperti dalam hadis berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , تَطْيِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ , جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ , فَتَطْفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan, bersih (suci) dan mencintai kebersihan, Mulia dan mencintai kemuliaan, bagus dan mencintai kebagusan, bersihkanlah rumahmu*” (H.R.Tirmidzi dari Saad).

Suatu penyakit dapat muncul karena kondisi lingkungan yang tidak sehat, yang menciptakan habitat untuk penyakit vektor seperti nyamuk *Aedes aegypti* yang dapat membawa virus *dengue*. *Fiqh al-bi'ah* adalah ilmu yang mempelajari cara manusia harus peduli terhadap lingkungan di mana mereka tinggal, di mana makhluk hidup saling mempengaruhi satu sama lain. Ilmu fikih lingkungan, atau *Fiqh al-biah*, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia tentang tanggung jawab mereka dalam merawat, melindungi, dan menjaga alam semesta agar terhindar dari kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang membahayakan makhluk hidup lainnya.

#### **D. Tinjauan Tentang Pencegahan dan Pengendalian Vektor**

Terdapat faktor perilaku lain yang memiliki pengaruh pada kejadian DBD. Faktor perilaku ini merupakan elemen utama yang dapat memengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Dalam pandangan Notoatmodjo (2007), perilaku kesehatan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

##### 1. Perilaku pemeliharaan kesehatan (*Health maintenance*)

Perilaku pemeliharaan kesehatan mencakup tindakan atau usaha yang dilakukan oleh individu untuk menjaga kesehatannya dengan tujuan mencegah penyakit, serta tindakan yang diambil ketika seseorang sedang sakit.

## 2. Perilaku pencarian dan penggunaan sistem fasilitas dan pelayanan kesehatan (*Health seeking behavior*)

Perilaku pencarian dan pemanfaatan fasilitas serta layanan kesehatan adalah tindakan individu yang dilakukan ketika seseorang mengalami penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Tindakan ini mencakup usaha untuk mencari dan menggunakan layanan kesehatan guna pengobatan atau perawatan.

## 3. Perilaku Kesehatan Lingkungan

Perilaku ini mencakup bagaimana seseorang merespons lingkungan sekitarnya untuk mencegah dampak negatifnya terhadap kesehatan individu maupun komunitas. Ini berarti individu memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungan mereka dengan baik sehingga kesehatan tidak terganggu.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengembangkan program secara hierarkis yang dijalankan melalui pendekatan bertingkat, dimulai dari level nasional hingga mencapai level lokal, seperti provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Program dengan pendekatan hierarkis ini dirancang untuk secara serempak mengelola dan mengendalikan penyebaran DBD di berbagai tingkatan dengan menggabungkan elemen-elemen seperti pemantauan epidemiologi, pengendalian populasi vektor, kampanye kesehatan masyarakat, serta pendidikan, pelatihan, dan penelitian.

Langkah-langkah pencegahan terhadap penyebaran DBD melibatkan tindakan untuk memutus rantai penularan DBD, yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Pendekatan yang paling efektif melibatkan Pemberantasan

Sarang Nyamuk (PSN) dengan prinsip "3 M" (Menguras, Menutup, Mengubur) bersama dengan tindakan ekstra (3M+) yang meliputi upaya pengendalian larva dan penggunaan asap (*fogging*) (Kemenkes RI, 2016).

#### 1. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3 M Plus

Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M Plus meliputi:

- a. Menguras secara berkala pada wadah-wadah penyimpanan air, seperti bak mandi, toilet, drum, dan lain sebagainya minimal setiap minggu.
- b. Menutup wadah penyimpanan air seperti gentong atau tempayan dan sejenisnya.
- c. Mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menampung air seperti botol plastik, kaleng, atau ban bekas, atau membuangnya pada tempat pembuangan yang sesuai.

Selain itu, upaya lainnya "Plus" juga mencakup berbagai cara seperti:

- a. Menganti air vas bunga, minuman burung dan tempat-tempat lainnya setiap minggu.
- b. Memperbaiki saluran dan talang air yang tersumbat atau rusak.
- c. Menutup lubang-lubang pada potongan bambu, pohon, dan lainnya dengan tanah.
- d. Membersihkan tempat-tempat yang dapat menampung air seperti pelepah pisang atau tanaman lainnya.
- e. Mengeringkan tempat-tempat yang berpotensi menampung air hujan, seperti halaman, kebun, pemakaman, rumah-rumah kosong, dan sebagainya.
- f. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk seperti ikan cupang, ikan kepala timah, ikan tempalo, ikan nila, dan ikan guvi.

- g. Memasang kawat kasa
- h. Tidak menggantung pakaian di dalam rumah
- i. Menggunakan kelambu
- j. Mengatur pencahayaan dan ventilasi yang memadai.
- k. Menggunakan obat anti nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk.
- l. Melakukan larvasidasi dengan menambahkan larvasida, misalnya temephos, di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit mendapatkan air.
- m. Menggunakan tanaman pengusir nyamuk seperti: lavender, kantong semar, sereh, zodia, geranium dan lainnya.

Anjuran menutup bejana atau tempat-tempat air telah disebutkan dalam sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ.

Artinya:

“Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda *Tutuplah bejana-bejana kalian dan ikatlah wadah air karena pada sepanjang tahun, ada suatu malam akan turun wabah penyakit yang jika ia melewati bejana yang tidak ditutup atau wadah air yang tidak diikat niscaya wabah tersebut akan jatuh di dalamnya.*”

## 2. Larvasidasi

Larvasidasi adalah tindakan pengendalian terhadap larva (jentik) nyamuk yang dilakukan dengan menggunakan larvasida. Tujuan dari penggunaan larvasida ini adalah untuk mematikan larva nyamuk tersebut. Penggunaan larvasida memiliki kemampuan untuk mengurangi kepadatan

populasi larva nyamuk dalam kurun waktu sekitar 2 bulan. Terdapat berbagai jenis larvasida yang tersedia, seperti *temephos*, *piriproksifen*, *metopren*, dan *bacillus thuringiensis*.

### 3. Fogging


Pengasapan dengan insektisida (racun serangga) dapat digunakan untuk memberantas nyamuk dewasa. Namun, penting untuk diingat bahwa pengasapan saja tidak akan cukup, karena hanya nyamuk dewasa yang terbunuh dalam proses ini. Jentik nyamuk tidak akan terpengaruh oleh pengasapan. Oleh karena itu, selama jentik nyamuk tidak dieliminasi, nyamuk dewasa akan terus bermunculan setiap harinya dari tempat perkembangbiakan mereka.



### E. Kerangka Teori



Sumber: Modifikasi (Kemenkes RI, 2016), (Candra, 2010) dan (Dinata & Dhewantara, 2012)

**F. Kerangka Konsep**

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kejadian DBD berdasarkan karakteristik individu, lokasi, dan periode waktu di wilayah kerja Puskesmas Suli serta gambaran upaya yang dilakukan masyarakat untuk mencegah kembali penyakit DBD.

##### ***B. Lokasi dan Waktu***

Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Suli, Kabupaten Luwu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2023.

##### ***C. Populasi***

Populasi merupakan suatu kawasan umum yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk tujuan pengamatan dan pengambilan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, populasi mencakup seluruh kasus DBD yang tercatat di Puskesmas Suli.

##### ***D. Sampel***

Sampel adalah bagian dari seluruh objek yang ingin diteliti dan dapat dianggap mewakili keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil secara keseluruhan dari populasi yang disebut *total sampling*, dengan demikian sampelnya adalah seluruh kasus DBD yang tercatat pada buku register Puskesmas Suli periode Tahun 2022- Mei 2023 berjumlah 25 kasus.

##### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan data sendiri dari responden di lapangan, Data ini diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuisisioner kepada responden (anak dibawah 10 tahun didampingi oleh wali) serta Melakukan pemetaan kasus (*plotting*) berdasarkan alamat tempat tinggal dengan menggunakan perangkat GPS. Data yang dikumpulkan yaitu gambaran karakteristik responden (jenis kelamin, umur, pekerjaan, tingkat pendidikan dan pengetahuan), alamat penderita serta upaya yang dilakukan untuk mencegah DBD.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari data primer yang telah diolah atau data yang didapatkan dari orang lain dan bukan langsung dari peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait. Data sekunder tersebut adalah data dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dan laporan Puskesmas Suli terkait kasus DBD.

**F. Instrumen Penelitian**

Instrument penelitian yang digunakan sebagai alat dalam pengumpulan data yaitu lembar kuisisioner dengan pertanyaan untuk pengetahuan serta memastikan perilaku pencegahan sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan alat GPS untuk mendapatkan titik koordinat rumah setiap responden.

**G. Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan peneliti kemudian diolah dan dianalisis. Pada proses pengolahan data digunakan sistem komputerisasi seperti *microsoft excel* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengedit data (*Editing*)

*Editing* proses pengecekan ulang keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh atau dikumpulkan di lapangan. Dalam tahap editing ini, hal-hal yang diperiksa meliputi apakah kuesioner telah diisi dengan lengkap, apakah tulisan dapat terbaca dengan jelas, apakah jawaban sesuai dengan pertanyaan, dan apakah jawaban konsisten.

2. Mengkode Data (*Coding*)

*Coding* proses pemberian kode numerik terhadap data yang telah dikumpulkan peneliti dalam kuesioner sehingga memudahkan pada proses pemasukan/entry data.

3. Memasukan Data (*Entry*)

*Entry* data merupakan tahap penginputan data dari kuesioner yang telah diisi oleh responden.

4. Pembersihan Data (*Cleaning*)

*Cleaning* proses pembersihan data dengan pengecekan ulang data untuk mengidentifikasi potensi kesalahan pada kode atau entri data. Jika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian, langkah koreksi atau perbaikan akan dijalankan.

5. Pengelompokan Data (*Tabulating*)

Tabulasi merupakan proses pengelompokan data yang disusun dalam bentuk tabel berdasarkan sifa-sifat yang dimilikinya agar memudahkan dalam menganalisis data. Tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel frekuensi yang menggambarkan data dalam bentuk persentase.

## **H. Analisis Data**

Analisis univariat dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi distribusi dan frekuensi kejadian DBD berdasarkan karakteristik individu (jenis

kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan pengetahuan), waktu terjadinya kasus, serta upaya pencegahan yang diterapkan oleh masyarakat menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil nilai analisis dalam bentuk frekuensi (%) dan ditampilkan dalam bentuk grafik.

### **I. Penyajian Data**

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lokasi penelitian, kemudian dianalisis dan selanjutnya disajikan dalam format tabel, diagram serta peta, yang dilengkapi dengan penjelasan naratif untuk mengkomunikasikan temuan dari penelitian ini.

### **J. Etika Penelitian**

Penelitian ini telah diserahkan ke komisi etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan telah disetujui dengan nomor surat yang diberikan yaitu B.440/KEPK/FKIK/VII/2023.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Puskesmas Suli terletak di Jalan Poros Palopo-Makassar, Lingkungan Lempokasi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Wilayah kerja Puskesmas Suli meliputi Kelurahan Suli, Desa Tawondu, Desa Murante, Desa Lempopacci, Desa Botta, Desa Papakaju, Desa Buntu Kunyi, Desa Cimpu, Desa Cimpu Utara, Desa Malela, Desa Cakkeawo, Desa Padang Lambe dan Desa Kasiwiang dengan jumlah penduduk 21.225 jiwa (4.367 RT).

Luas wilayah kerja Puskesmas Suli adalah 97.0 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daerah pantai, persawahan dan pegunungan. Wilayah administrasi Kecamatan Suli berbatasan langsung dengan:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Belopa dan Kecamatan Bajo
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Larompong
- 3) Sebelah Timur : Teluk Bone
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Suli Barat


##### **2. Wilayah Administrasi**

Secara administrasi wilayah kerja Puskesmas Suli terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa yang terdiri dari 53 Dusun, yaitu:

- 1) Kelurahan Suli : terdiri dari 8 lingkungan
- 2) Desa Tawondu : terdiri dari 4 dusun
- 3) Desa Murate : terdiri dari 4 dusun
- 4) Desa Lempopacci : terdiri dari 4 dusun
- 5) Desa Botta : terdiri dari 3 dusun

- 6) Desa Papakaju : terdiri dari 4 dusun
- 7) Desa Buntu Kunyi : terdiri dari 4 dusun
- 8) Desa Cimpu : terdiri dari 4 dusun
- 9) Desa Cimpu Utara : terdiri dari 4 dusun
- 10) Desa Malela : terdiri dari 4 dusun
- 11) Desa Cakkeawo : terdiri dari 3 dusun
- 12) Desa Padang Lambe : terdiri dari 4 dusun
- 13) Desa Kasiwang : terdiri dari 3 dusun

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kecamatan Suli



Semua Wilayah kerja Puskesmas Suli dapat dijagkau dengan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

### 3. Sosial Ekonomi

Kondisi perekonomian Kecamatan Suli dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk Kecamatan Suli yang umumnya sebagian besar adalah petani dan sebagian juga nelayan.

## B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menggunakan analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran distribusi dari karakteristik responden, tempat kejadian DBD dan waktu kejadian DBD.

### 1. Distribusi Kasus Konfirmasi DBD Berdasarkan Karakteristik Orang

**Tabel 4. 1**  
**Gambaran Distribusi Kasus Konfirmasi DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023**

Kategori	Frekuensi (n=25)	Persen (%=100)
Sembuh	23	92.0
Meninggal	2	8.0

*Sumber: Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa kasus konfirmasi DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli tahun 2022-Mei 2023 sebanyak 25 orang dengan status sembuh sebanyak 23 orang (92.0%) dan dengan status meninggal sebanyak 2 orang (8.0%). Berikut gambaran distribusi kasus DBD dengan status sembuh berdasarkan karakteristik responden (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pengetahuan):

**Tabel 4. 2**  
**Gambaran Distribusi Kasus DBD Berdasarkan Karakteristik Orang di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023**

Karakteristik	Frekuensi (n=23)	Persen (%=100)
<b>Umur (Tahun)</b>		
1-4	4	17.4
5-14	9	39.1
5-44	9	39.1

<b>Karakteristik</b>	<b>Frekuensi (n=23)</b>	<b>Persen (%=100)</b>
>44	1	4.3
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	11	47.8
Perempuan	12	52.2
<b>Pendidikan</b>		
Belum Sekolah	5	21.7
Belum Tamat SD	6	26.1
SD	3	13.0
SMP/Sederajat	2	8.7
SMA/Sederajat	5	21.7
Perguruan Tinggi	2	8.7
<b>Pekerjaan</b>		
IRT	2	9.1
Mahasiswa/Pelajar	11	50
Petani	2	9.1
PNS	1	4.5
Wiraswasta	1	4.5
Tidak Bekerja	6	22.7
<b>Pengetahuan</b>		
Baik	13	56.5
Kurang	10	43.5

*Sumber: Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli tahun 2022-Mei 2023 paling banyak menyerang kelompok umur 5-14 tahun dan 15-44 tahun masing-masing sebanyak 9 orang (39.1%). Kasus DBD menurut jenis kelamin yaitu perempuan dengan jumlah penderita sebanyak 12 orang (52.2%) sedangkan pada laki-laki sebanyak 11 orang (47.8%). Pada tingkat Pendidikan, responden paling banyak yaitu belum tamat SD sebanyak 6 orang (26.1%), berdasarkan pekerjaan paling banyak terjadi pada pelajar/mahasiswa sebanyak 11 orang (50%). Responden memiliki pengetahuan yang baik terkait DBD sebanyak 13 orang (56.5 %) dan responden yang memiliki pengetahuan yang kurang sebanyak 10 orang (43.5%). Adapun distribusi pertanyaan pengetahuan tentang penyakit

DBD (Sumber penyakit, penularan penyakit dan pencegahan) sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Distribusi Pertanyaan Pengetahuan Tentang DBD Pada Kasus DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023**

Pertanyaan Pengetahuan	Benar		Salah	
	n	%	N	%
Penyakit demam berdarah ditularkan oleh?	23	100.0	0	0
Gejala apa yang dirasakan saat terinfeksi virus dengue?	4	17.4	19	82.6
Apakah ciri-ciri nyamuk penular demam berdarah?	10	43.5	13	39.1
Dimanakah biasanya nyamuk penular demam berdarah berkembang biak?	9	39.1	14	60.9
Nyamuk penular demam berdarah meletakkan telurnya pada?	6	26.1	17	73.9
Kapan waktu nyamuk penular demam berdarah biasa menggigit orang?	10	43.5	13	56.5
Bagaimana cara penyebaran penyakit demam berdarah?	12	52.2	11	47.8
Apakah yang dimaksud dengan Gerakan 3M?	8	34.8	15	65.2
Berapa kali kita harus mengurus tempat penampungan air, seperti bak mandi, drum bekas yang berisi air?	7	30.4	16	69.6
Jentik nyamuk penular demam berdarah dapat diberantas dengan?	0	0	23	100


Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa pengetahuan responden baik karena didapatkan hasil yang menjawab benar terkait penyakit demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk *aedes aegypti* dapat sebanyak (100 %), cara penyebaran DBD (52.2 %), waktu nyamuk *aedes aegypti* menggigit orang (43.5%), ciri-ciri nyamuk *aedes aegypti* (43.5%), tempat perkembangbiakan nyamuk *aedes aegypti* (39.1%),

gerakan 3M (34.8%), frekuensi mengukur TPA (30.4%) dan gejala saat terinfeksi virus *dengue* (17.4%).


## 2. Distribusi Kasus Konfirmasi DBD Berdasarkan Tempat Kejadian DBD

Distribusi sebaran kasus DBD berdasarkan tempat di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022- Mei 2023 dapat dilihat gambar dibawah ini:



Gambar 4. 2  
Peta Kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022- Mei 2023


Gambar 4.2 tentang sebaran kasus penderita DBD berdasarkan tempat di beberapa Wilayah Kerja Puskesmas Suli yaitu Desa Cimpu sebanyak 19 kasus (17 titik), Kelurahan Suli sebanyak 2 kasus (2 titik), Desa Murante sebanyak 1 kasus (1 titik), Desa Cimpu Utara sebanyak 1 kasus (1 titik), Desa Malela sebanyak 1 kasus (1 titik) dan Desa Kasiwiang sebanyak 1 kasus (1 titik). Kejadian DBD berdasarkan Kelurahan/Desa dan kepadatan penduduk Wilayah Kerja Puskesmas Suli dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4. 3  
Kepadatan Penduduk Terhadap IR DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023

Data yang diperoleh diplotkan kedalam peta wilayah kemudian menggunakan metode *overlay* untuk menggabungkan variabel penelitian yaitu kejadian DBD dengan kepadatan penduduk. Adapun peta *overlay* kejadian DBD berdasarkan kepadatan penduduk dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 4. 4  
Peta *Overlay* Kejadian DBD Berdasarkan Kepadatan Penduduk  
di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022- Mei 2023



Gambar 4.4 menunjukkan bahwa desa dengan angka IR DBD paling besar adalah Desa cimpu dengan IR per 10.000 penduduk sebesar 86,6% dan dengan kepadatan penduduk yang tinggi (646.9 jiwa per km<sup>2</sup>). Kategori kepadatan penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Suli tahun 2022-Mei 2023 pada gambar 4.4 bervariasi yaitu kategori rendah, sedang dan tinggi. Desa dengan kategori tinggi yaitu Desa Cimpu, Desa Cimpu Utara dan Kelurahan Suli dengan jumlah kasus DBD sebanyak 22 kasus. Desa dengan kategori sedang yaitu Desa Malela, Desa Kasiwang, Desa Murante dan Desa Lempopacci dengan jumlah kasus DBD 3 kasus dengan angka pravelensi sebesar 11,32% per 10.000 penduduk.

### 3. Distribusi Kasus Konfirmasi DBD Berdasarkan Waktu Kejadian DBD

Distribusi penderita DBD berdasarkan waktu (bulan) di Wilayah Kerja Puskesmas dapat dilihat gambar dibawah ini:



Gambar 4. 5

Grafik Minimum-Maksimum Kasus DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli

Berdasarkan gambar 4.5 menunjukkan bahwa nilai minimum dan maksimum diambil dari data DBD 2018-2022, sedangkan data yang diamati adalah

data jumlah kasus DBD tahun 2023. Diperkirakan telah terjadi KLB pada bulan Januari dan Februari dimana jumlah kasus DBD melebihi batas maksimum dengan jumlah kasus sebanyak 10 orang pada bulan Januari dan 3 orang pada bulan Februari.

#### 4. Gambaran Distribusi Perilaku Pencegahan DBD

**Tabel 4. 4**  
**Gambaran Distribusi Upaya Pencegahan DBD**  
**di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023**

Upaya Pencegahan	Ya		Tidak	
	n	%	n	%
Menguras Tempat Penampungan Air minimal 1x dalam seminggu	23	100.0	0	0
Menutup Tempat Penampungan Air dengan rapat	6	26.1	17	73.9
Mengubur/Mendaur Ulang Barang Bekas yang berada di sekitar rumah	14	60.9	9	39.1
Memperbaiki saluran dan talang air yang rusak/tidak lancer	0	0	23	100
Menggunakan obat anti nyamuk dalam bentuk lation/ spray /elektik /cair /kelambu untuk menghindari diri dari gigitan nyamuk	20	87.0	3	13.0
Menabur bubuk abate pada TPA ninimal 2-4 bulan sekali	7	30.4	16	69.6
Memelihara ikan pemakan jentik	1	4.3	22	95.7
Memasang kawat kasa untuk menghindari masuknya nyamuk pada lubang ventilasi	8	34.8	15	65.2
Mengkatung pakaian bekas pakai di dinding atau belakang pintu	15	65.2	8	34.8
Menanam tanaman-tanaman di setikar rumah yang dapat mengusir nyamuk	5	21.7	18	78.3
Ikut serta dalam kegiatan gotong royong	17	73.9	6	26.1

*Sumber: Data Primer, 2023*

Berdasarkan Tabel 4.4 tentang perilaku pencegahan DBD yang dilakukan masyarakat melalui Gerakan 3M-*plus* yaitu seluruh responden menguras TPA

minimal 1 kali dalam seminggu (100%), menutup tempat penampungan air sebanyak 6 orang (26.1%), mengubur/mendaur ulang barang bekas yang berada di sekitar rumah sebanyak 14 orang (60.9%), seluruh responden tidak memperbaiki saluran talang air apabila tidak lancar ataupun rusak (100%), menggunakan obat anti nyamuk untuk terhindar dari gigitan nyamuk sebanyak 20 orang (87.0%), menabur bubuk abate sebanyak 7 orang (30.4%), memelihara ikan pemakan jentik 1 orang (4.3%), penggunaan kawat kasa pada ventilasi rumah sebanyak 8 orang (34.8%), responden yang masih mengantung pakaian bekas sebanyak 15 orang (65.2%), menanam tanaman pengusir nyamuk sebanyak 5 orang (21.7%) dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan rumah sebanyak 17 orang (73.9%). Upaya pencegahan dikategorikan dalam tingkat baik dan kurang sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Gambaran Distribusi Tingkat Pencegahan DBD di Wilayah Kerja**  
**Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023**

<b>Kategori</b>	<b>Frekuensi (n=23)</b>	<b>Persen (%=100)</b>
Kurang	14	60.9
Baik	9	39.1

*Sumber: Data Primer, 2023*

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 23 penderita DBD yang memiliki tingkat perilaku pencegahan yang baik sebanyak 9 orang (39.1 %) dan responden yang memiliki tingkat perilaku pencegahan yang kurang sebanyak 14 orang (60.9%).

### C. Pembahasan

#### 1. Gambaran Kejadian DBD Berdasarkan Karakteristik Orang

##### a. Umur

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa kelompok usia 5-14 tahun dan 15-44 tahun adalah yang paling rentan terhadap kasus DBD, dengan masing-masing jumlah penderita sebanyak 9 orang. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Thailand oleh (Limkittikul et al., 2014) menunjukkan kasus DBD relatif lebih banyak pada individu berusia antara 5-14 tahun dibandingkan dengan individu yang berusia 15 tahun atau lebih. Dari pengamatan yang dilakukan di lapangan, kelompok usia 5-44 tahun teridentifikasi sebagai kelompok usia yang aktif di luar rumah, terlibat dalam berbagai aktivitas seperti berkebun, bersekolah, dan bermain di sekitar lingkungan rumah. Selain itu, waktu yang dihabiskan di luar rumah oleh kelompok usia ini juga bersamaan dengan waktu aktif nyamuk *Aedes aegypti*, yang meningkatkan risiko gigitan nyamuk dan penularan penyakit DBD.

Usia merupakan faktor dominan dalam meningkatkan risiko kejadian DBD. Individu yang berusia di bawah 15 tahun cenderung lebih rentan terkena infeksi virus, termasuk virus *dengue*, karena sistem kekebalan tubuh pada anak-anak di bawah usia 15 tahun masih dalam tahap perkembangan yang belum sempurna. Sementara itu, individu yang berusia 15 tahun ke atas memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih matang dan kompleks. Oleh karena itu, risiko terjadinya DBD cenderung lebih tinggi pada kelompok anak-anak. Faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi peningkatan risiko infeksi pada anak-anak termasuk kurangnya upaya perlindungan diri, baik dari segi imunitas

tubuh maupun pengetahuan yang memadai tentang kebersihan. Semua faktor ini dapat berkontribusi pada peningkatan risiko infeksi virus dengue pada anak-anak (Sury et al., 2021). Kelompok anak-anak tergolong rentan terhadap infeksi virus, dan ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi tingkat infeksi pada mereka. Salah satu faktor adalah kurangnya upaya perlindungan diri yang efektif, baik dari segi kekebalan tubuh maupun pengetahuan yang mencukupi mengenai praktik kebersihan. Kondisi ini dapat berkontribusi pada peningkatan kejadian infeksi virus *dengue* pada anak-anak, sehingga risiko mereka terinfeksi semakin tinggi. (Koibur et al., 2021).

Penelitian oleh (Mardhatillah et al., 2020) menunjukkan bahwa kejadian DBD di Puskesmas Dempo Kota Palembang lebih sering terjadi pada kelompok usia yang termasuk dalam kategori berisiko, yaitu usia di bawah 15 tahun. Kelompok usia di bawah 12 tahun cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih lemah dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua. Aktivitas mereka, seperti bermain atau bersekolah selama beberapa jam hingga hampir sepanjang hari, berada dalam kondisi dan waktu tertentu yang meningkatkan risiko terhadap gigitan nyamuk penular DBD. Hal ini juga dapat mengakibatkan risiko tambahan terhadap infeksi sekunder, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terkena DBD.

#### b. Jenis Kelamin

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa kejadian DBD di Kecamatan Suli terjadi pada 12 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya.. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sholihah et al., 2020) menunjukkan bahwa kasus

DBD paling banyak terjadi pada perempuan yaitu sebanyak 47 orang (59,5%) dan laki-laki sebanyak 28 orang (39,4%). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara jenis kelamin dan kejadian DBD di wilayah pesisir. Responden perempuan memiliki risiko yang 0,443 kali lebih rendah terkena penyakit DBD dibandingkan dengan responden laki-laki. Ini berarti bahwa jenis kelamin memiliki dampak proaktif pada kejadian DBD.

Penelitian (Tomia et al., 2020) tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu kasus DBD di Maluku Utara lebih banyak terjadi pada laki-laki dalam kurung waktu 2009-2018 sebanyak 507 orang sedangkan perempuan sebanyak 411 orang. Ini disebabkan oleh perbedaan faktor mobilitas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, yang pada akhirnya meningkatkan risiko mereka untuk digigit oleh nyamuk. (Kasman & Ishak, 2018). Berdasarkan data di Indonesia, DBD terjadi pada laki-laki sebanyak 53,11%, sementara perempuan sebanyak 46,89%. (Kemenkes RI, 2020).

Peneliti berasumsi bahwa bahwa perempuan dan laki-laki memiliki tingkat risiko yang serupa dalam terkena DBD, bergantung pada upaya individu untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Menurut penelitian (Umaya et al., 2013) Tidak terdapat korelasi antara jenis kelamin dan insiden DBD karena kebanyakan penyakit menular memengaruhi individu dari semua jenis kelamin. Hal ini mungkin karena nyamuk *Aedes aegypti* tidak membedakan jenis kelamin saat menghisap darah, sehingga penyakit DBD dapat menyerang baik laki-laki maupun perempuan (Pertiwi & Choiroel, 2016).

### c. Tingkat Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita Demam Berdarah *Dengue* di Kecamatan Suli berdasarkan tingkat Pendidikan yaitu; belum sekolah sebanyak 5 orang (21.7%), SD sebanyak 8 orang (34.8%), SLTA/Sederaja sebanyak 7 orang (30.4%) dan adalah tingkat perguruan tinggi sebanyak 3 orang (6,54%). Banyaknya penderita pada anak SD dapat dikarenakan masih kurangnya pengetahuan akan penyebab penyebaran penyakit DBD serta pencegahan yang harus dilakukan. Menurut (Pertiwi & Choiroel, 2016) salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari penularan DBD pada anak dengan tingkat pendidikan SD ataupun SMP yang rentan terhadap penularan DBD dengan gunakan *repllen* anti nyamuk, pada saat akan pergi ke sekolah dipagi hari dan sore hari saat bermain di lingkungan rumah agar dapat terhindari dari gigitan nyamuk *Aedes aegypti*.

Penelitian (Sholihah et al., 2020) bahwa tingkat pendidikan memiliki efek protektif terhadap risiko DBD. Individu dengan pendidikan rendah memiliki risiko 2,87 kali lebih tinggi terkena DBD dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mampu untuk menjaga kebersihan sekitar rumah mereka agar tidak tedapat tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*.

Tingkat pendidikan juga memiliki dampak pada tingkat pengetahuan seseorang, dan pengetahuan tentang kesehatan akan memengaruhi perilaku seseorang sebagai hasil jangka menengah dari pendidikan kesehatan. Selanjutnya, perilaku kesehatan akan berkontribusi pada peningkatan indikator kesehatan masyarakat sebagai

hasil dari pendidikan kesehatan (Putri & Naftassa, 2017), dengan begitu pendidikan mempengaruhi kesadaran baik pada diri sendiri maupun pada lingkungan yang dapat mendorong terhadap tindakan perilaku atau praktik pencegahan DBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya perilaku upaya pencegahan (60.9%) sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan responden tentang DBD dan penerapan PSN dengan Gerakan 3M *Plus* di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah.

#### d. Pekerjaan

Pekerjaan dapat berperan sebagai indikator dalam menilai status sosial ekonomi seseorang. Lebih dari itu, pekerjaan juga bisa menjadi faktor identifikasi risiko terkait dengan paparan *agen* penyakit tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit DBD paling banyak menyerang seorang yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa yaitu sebanyak 11 orang (50%). Penelitian ini sejalan dengan (Wahyuni dwi & M.Sabir, 2011) menunjukkan presentase penderita DBD yang terbanyak adalah berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 91 orang (44,4%).Tingginya kejadian DBD di kalangan pelajar disebabkan penularan penyakit yang bisa saja terjadi saat berada di lingkungan sekolah ataupun saat anak-anak bermain dengan temannya di sekitaran lingkungan sekolah sehingga sekolah dapat menjadi salah satu tempat yang berpotensi dalam penyebaran dan penularan penyakit DBD pada anak sekolah. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah dan waktu aktif nyamuk *aedes aegypti* untuk mengigit, mengisap dan menularkan virus *dengue* bersama serta nyamuk *aedes aegypti* yang bersifat *multiple bitter* (mengisap darah berpindah-pindah

berkali-kali) sehingga penularan DBD di kalangan anak sekolah dapat terjadi dengan mudah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ketaren & Wahyuni, 2017) di 22 SD Negeri di Kecamatan Medan Tuntungan menunjukkan bahwa sebanyak 77,27% sekolah memiliki jentik *Aedes sp.* yang ditemukan di bak mandi, ember, drum, dan kontainer. Keadaan lingkungan yang tidak memadai dapat meningkatkan tingkat kejadian DBD pada anak-anak sekolah dasar. Oleh karena itu, langkah sanitasi yang memadai perlu segera diambil oleh sekolah agar siswa-siswi terhindar dari penyakit DBD. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah melaksanakan kegiatan "Jumat Bersih" setiap minggu dengan menerapkan pendekatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang mencakup tindakan 3M, yaitu menguras, menutup, mengubur, serta menghilangkan wadah yang dapat mengandung air dan berpotensi menjadi tempat untuk nyamuk bertelur.

Allah SWT bersabda dalam QS Al-Isra'/17: 7.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئُوا وُجُوهَكُمْ  
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۗ

Terjemahnya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai” (QS Al-Isra'/17: 7).

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah ayat ini menjelaskan bahwa ditegaskanNya kepada mereka: Jika kamu berbuat baik yakni taat serta mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka itu berarti kamu berbuat baik bagi diri kamu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka bagi diri kamu sendiri juga, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua yang kamu lakukan dari kedua kejahatan yang telah Kami tetapkan dalam al-Kitab itu Kami datangkan orang-orang lain untuk menyiksa, membunuh dan menghina kamu sehingga akhirnya bekas dan dampak buruk apa yang mereka lakukan itu menyuramkan wajah-wajah kamu akibat kesedihan dan penderitaan yang kamu dan atau keluarga kamu alami dan mereka masuk ke dalam masjid yakni Bait al-Maqdis di mana terdapat bangunan peribadatan yang diselesaikan bangunannya oleh Nabi Sulaiman as. Mereka memasukinya sebagaimana mereka yakni musuh-musuh kamu memasukinya pada kali pertama guna menghancurkan dan menyiksa kamu akibat kejahatan pertama dan akibatnya mereka membinasakan apa yang terdapat di sana dengan pembinasaaan sempurna yakni menghancurkannya sampai habis.

e. Pengetahuan

Pengetahuan memiliki dampak yang signifikan pada perilaku seseorang dan kemampuan untuk mengenali gejala dan mengatasi masalah yang muncul. Dalam penelitian ini, pengetahuan dibagi menjadi dua kategori, yaitu tingkat pengetahuan yang baik dan kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian DBD cenderung terjadi pada orang yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik sebanyak 13 orang (56.5%) dan pengetahuan kurang baik sebanyak 10 orang (43.5%). Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2015)

menunjukkan menunjukkan bahwa dari 36 orang atau sekitar 10,78% dari masyarakat yang memiliki pengetahuan baik tentang DBD dan pernah mengalami kasus DBD. Tidak ada masyarakat yang memiliki pengetahuan kurang tentang DBD dan juga pernah terkena kasus DBD.

Peneliti berasumsi bahwa setiap individu memiliki potensi untuk terjangkit penyakit DBD tanpa memandang status mereka, terlepas dari apakah mereka memiliki pengetahuan yang kurang atau baik. Oleh karena itu, penyakit ini dapat menyerang siapa pun, kapan pun. Menurut (Waris & tri yuana, 2013) Pengetahuan yang memadai tidak selalu menjamin perlindungan total dari penyakit DBD, karena ada kemungkinan seseorang dengan pengetahuan yang memadai mungkin tetap melakukan tindakan yang bertentangan dengan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi individu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sehingga tindakan yang diambil sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki. Ketika pengetahuan tidak didukung oleh kesadaran yang kuat, tindakan individu tersebut mungkin tidak akan selaras dengan pengetahuan tersebut.

Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan tindakan seseorang. Hal ini dapat dilihat dari cara seseorang menerima perilaku baru yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap positif, maka perilaku akan berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang di antaranya terdiri dari pendidikan, media massa yang digunakan untuk mendapatkan informasi, pekerjaan, lingkungan, usia, pengalaman, sosial, budaya serta ekonomi (Notoatmodjo, 2012). Semakin banyak informasi yang diakses oleh seseorang, semakin bertambah pengetahuannya. Ketersediaan

informasi peran penting sebagai media pendidikan kesehatan, khususnya dalam menyampaikan informasi sehingga membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi kesehatan. Ketersediaan informasi ini memiliki potensi untuk memengaruhi perilaku, dengan harapan dapat meningkatkan sikap positif dan mengubah perilaku masyarakat. (Wirna et al., 2023).

## **2. Gambaran Kejadian DBD Berdasarkan Tempat**

Hasil penelitian pada gambar 4.3 menggambarkan sebaran jumlah penderita DBD periode tahun 2022- Mei 2023 berdasarkan kelurahan/desa yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Suli terdapat sebanyak 23 titik rumah dengan penderita DBD sebanyak 25 orang. Rumah dengan penderita yang lebih dari 1 orang penderita di hitung 1 titik. Kejadian DBD tertinggi berada di Desa Cimpu sebanyak 19 orang dengan jumlah titik koordinat rumah sebanyak 17 titik. Hal terjadi karena Desa Cimpu merupakan desa dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Suli, Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu wilayah, semakin banyak penduduk yang berada wilayah tersebut. Oleh karena itu, risiko penularan DBD juga meningkat di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk keseluruhan dengan luas wilayah di suatu wilayah. Kepadatan penduduk mempengaruhi penyebaran dan transmisi penyakit dari satu individu ke individu lainnya. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu wilayah, semakin memungkinkan perkembangbiakan virus, yang akhirnya mengakibatkan peningkatan kasus penyakit. Berdasarkan data (BPS Kab. Luwu, 2022) diketahui bahwa desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Cimpu, yaitu sebesar 646.9 jiwa per km<sup>2</sup>. Hasil penelitian pada gambar 4.4 peta overlaykejadian DBD berdasarkan kepadatan penduduk menunjukkan bahwa daerah dengan

kategori tinggi yaitu desa cimpu, desa cimpu utara dan kelurahan suli dengan jumlah kasus 22 orang, pada daerah dengan kategori sedang yaitu desa murante, desa malela, desa kasiwiang dan desa lempopacci dengan jumlah kasus sebanyak 3 orang. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kasus DBD di Desa Cimpu cukup tinggi, karena kepadatan penduduk yang tinggi membuat jarak antar rumah menjadi dekat, sehingga penularan penyakit DBD melalui gigitan nyamuk lebih mudah.

Menurut (C. Sari, 2005) penyakit DBD merupakan penyakit endemik yang tersebar luas di beberapa wilayah, termasuk di Indonesia. Beberapa faktor yang berperan dalam penularan DBD pada manusia mencakup: Kepadatan Penduduk, keberadaan populasi yang lebih padat dapat mempermudah penularan DBD, karena nyamuk yang membawa virus *dengue* memiliki jarak terbang yang terbatas, sekitar 50 meter. Selain itu Mobilitas Penduduk: Tingkat mobilitas penduduk juga memengaruhi penularan DBD, karena individu yang terinfeksi bisa dengan mudah membawa virus dari satu tempat ke tempat lain serta Kualitas Perumahan: faktor-faktor seperti jarak antar rumah, tingkat pencahayaan, bentuk rumah, dan bahan bangunan juga memiliki dampak pada penularan penyakit DBD. Semua faktor ini berkontribusi pada penyebaran penyakit DBD di berbagai daerah.

Penyakit DBD menjadi masalah kesehatan di tengah masyarakat yang sering kali menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan berpotensi untuk berkembang menjadi wabah. Rasulullah SAW telah bersabda tentang sebuah wabah yang terjadi pada suatu wilayah dan tindakan yang harus kita lakukan:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Artinya:

*“Jika kalian mendengar wabah berada di suatu kawasan, janganlah kalian datang kesana, dan jika terjadi di suatu kawasan yang kalian diami, jangan kalian meninggalkannya.”* (HR. Bukhari no. 5730).

Hadis Nabi tersebut memerintahkan untuk menghindari mereka yang terkena penyakit menular dan tidak memasuki kawasan tertentu agar tidak tertular. Ajaran Islam tidak saja mengajarkan pencegahan secara spiritual dengan berdoa melainkan juga berusaha dengan sungguh-sungguh secara fisik. Upaya tersebut menjadikan penyakit menular tidak akan merajalela dan lama berkembang di suatu kawasan. Pencegahan yang dilakukan adalah larangan memasuki wilayah yang terkena musibah baik orang luas ke dalam maupun sebaliknya orang dalam keluar daerah agar mobalitas penduduk pada daerah tersebut rendah sehingga penularan DBD dapat ditekan. Mobilitas penduduk yang tinggi dan didukung oleh transportasi yang baik memudahkan terjadinya penyebaran penyakit, baik yang terbawa kendaraan maupun penduduk yang telah terinfeksi virus yang ditularkan nyamuk *Aedes aegypti*. Larangan untuk masuk ke wilayah yang terjadi wabah ataupun menetap di wilayah yang sedang terjadi wabah menjadi langkah yang tepat agar tidak menjadi penular virus maupun tertular virus penyakit. Pematuhan secara ketat akan menuai keberhasilan yang cepat dengan melihat siklus yang ada. Pola ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu di mana wabah *Thaun* sedang merajalela.

Kepadatan penduduk juga berhubungan dengan penambahan jumlah penduduk, yang menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya alam. Ketidakseimbangan ini seringkali memengaruhi situasi sanitasi lingkungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penyebaran penyakit. Penelitian (Ayuningtyas, 2023) terlihat adanya korelasi positif yang signifikan antara kepadatan penduduk dan tingkat kejadian DBD di Provinsi Jawa

Barat, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepadatan penduduk, semakin tinggi pula tingkat kejadian DBD di wilayah tersebut, dan sebaliknya. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian (Chandra, 2019) bahwa daerah yang mengalami kasus demam berdarah *dengue* umumnya adalah daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, rumah-rumah yang berdekatan, pertumbuhan populasi yang terus meningkat, serta akses transportasi yang memudahkan penyebaran penyakit DBD jika langkah-langkah pencegahan terhadap perkembangan nyamuk *Ae. Aegypti* tidak dilakukan dengan baik.

Hasil survei di lapangan masyarakat Desa Cimpi masih kurang dalam upaya pencegahan DBD (47.8%). Masyarakat Desa Cimpu dapat dengan aktif berkontribusi dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian sarang nyamuk, contohnya dengan melaksanakan program *3M-Plus*. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi populasi nyamuk, terutama dalam situasi di mana masih ada banyak tempat berair yang dapat digunakan sebagai tempat berkembang biak nyamuk. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan DBD melibatkan tindakan *3M Plus*, yang mencakup menguras bak penampungan air, menutup wadah-wadah penyimpanan air, dan mendaur ulang barang-barang bekas, bersama dengan langkah-langkah tambahan lainnya. Hal ini melibatkan kolaborasi lintas program dan lintas sektor melalui Kelompok Kerja Operasional Demam Berdarah Dengue (Pokjanal DBD) dan melibatkan Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengendalian DBD dan mencegah peningkatan kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB), pentingnya peran Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dalam mengawasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar melaksanakan PSN dengan *3M Plus* sangat diperlukan (Kemenkes RI, 2016).

### 3. Gambaran Kejadian DBD Berdasarkan Waktu

Secara geografis, Indonesia terletak di antara Benua Asia, Benua Australia, Samudra Pasifik, dan Samudera Hindia, dan melintasi garis khatulistiwa. Ini mengakibatkan iklim tropis di Indonesia yang mengenal dua musim, yakni musim hujan dan kemarau. Kondisi iklim tropis ini memiliki dampak besar pada suhu, curah hujan, tingkat pencahayaan, kelembaban, serta pola angin yang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan beragam jenis hewan dan tumbuhan, termasuk vektor penyakit. Kondisi ini menyebabkan banyaknya vektor penyakit yang berkembang subur di wilayah ini dan menjadikan Indonesia sebagai daerah endemis bagi berbagai penyakit menular. Salah satu contohnya adalah penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD), yang disebabkan oleh nyamuk vektor *Aedes aegypti* yang telah terinfeksi virus *dengue* (Yuningsih, 2018).

Hasil penelitian diketahui bahwa kejadian DBD di wilayah kerja Puskesmas Suli pada tahun 2022 tercatat sebanyak 11 kasus dan tahun 2023 (Januari-Mei) sebanyak 14 kasus. Kejadian DBD tertinggi pada tahun 2022 terjadi di bulan Desember (9 kasus) dan tahun 2023 pada bulan Januari (10 kasus). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Mardhatillah et al., 2020) bahwa kejadian DBD di area yang dikelola oleh Puskesmas Dempo Kota Palembang selama periode tahun 2015-2018 mencapai puncaknya pada bulan Desember dan Januari. Kemungkinan, ini bisa disebabkan oleh fluktuasi musiman dengan meningkatnya kasus DBD terjadi selama musim hujan atau beberapa minggu setelah periode hujan. Dengan merujuk pada siklus musim hujan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa musim hujan biasanya berlangsung mulai dari bulan November hingga awal tahun di bulan Maret. Selama musim hujan, curah hujan yang tinggi dapat menjadi faktor peningkatan kejadian DBD. Oleh karena itu, untuk mencegah peningkatan kasus yang terjadi menjelang bulan

Maret, tindakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) harus dilaksanakan dengan baik untuk menghentikan perkembangbiakan nyamuk di tempat-tempat yang memiliki banyak genangan air.

Pengamatan unsur iklim berdasarkan bulan di Kabupaten Luwu, jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 860,3 mm (BPS Kab. Luwu, 2022). Hal ini dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya KLB di desa Cimpu, selain kepadatan penduduk yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan (Bone et al., 2021) di Manado pada periode 2015-2020 mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara curah hujan dan kejadian DBD. Hubungan tersebut memiliki tingkat kekuatan korelasi yang cukup dengan nilai  $r$  sebesar 0,322 dan arah korelasi yang positif. Hal ini menggambarkan bahwa meningkatnya curah hujan berhubungan dengan peningkatan kejadian DBD. Hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dapat menciptakan lebih banyak tempat perindukan bagi nyamuk *Aedes aegypti*, seperti wadah-wadah yang dapat menampung air, yang kemudian menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk *Aedes aegypti*.

Terjadinya penyakit dapat dijelaskan melalui teori segitiga epidemiologi, yang melibatkan interaksi antara tiga elemen utama: penajamu, *agen* penyakit, dan lingkungan. Dalam konteks lingkungan, cuaca dan iklim memiliki peran penting dalam memengaruhi patogenesis penyakit dengan cara yang bervariasi tergantung pada jenis penyakitnya. Salah satu dampak perubahan iklim adalah potensi peningkatan kejadian penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti penyakit DBD. Perubahan iklim mencakup kenaikan suhu, peningkatan kelembaban, serta peningkatan curah hujan, dan semua faktor ini dapat menjadi risiko yang berkontribusi terhadap tingkat kesehatan masyarakat yang buruk. (Raksanagara et al., 2016).

Allah Swt. Berfirman dalam QS Ar-Rum/30: 48.

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَيَنْزِلُ  
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٤٨

Terjemahnya:

*“Allahlah yang mengirim angin, lalu ia (angin) menggerakkan awan, kemudian Dia (Allah) membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya dan Dia menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, seketika itu pula mereka bergembira.” (QS Ar-Rum/30: 48)*

Ayat di atas dalam tafsir Al - Misbah menjelaskan kerja angin dalam konteks hujan serta proses turunnya hujan itu. Awan tebal bermula ketika angin atas Kuasa Allah menggiring atau mengarak kawanan awan kecil akan berkumpul. Pengarakan bagian-bagian awan itu menyebabkan bertambahnya kualitas (jumlah) uap dalam perjalanannya terutama di sekitar zona. Apabila dua awan atau lebih menyatu, maka arus udara yang naik di dalam awan akan bertambah secara umum, hal ini menyebabkan datangnya tambahan uap air dari bagian bawah dasar awan yang katanya menambah potensi yang terpendam untuk berakumulasi. Awan tebal bergerak ke mana saja sesuai arah gerakan angin yang dikehendaki Ya Allah, faktor akumulasi dan pembangunannya akan terus-menerus Sepanjang arus udara yang naik mampu membawa formasi awan dari titik titik air, atau butir-butir embun. Ketika angin tidak lagi mampu membawa formasi-formasi itu karena telah bergumpal-gumpal dan menyatu maka proses akumulasi terhenti dan hujan pun turun.

Turunnya hujan merupakan salah satu bukti kebesaran Allah SWT. Hujan merupakan peristiwa hidrologi yang melibatkan proses kondensasi, hingga air bisa turun ke bumi. Hujan yang turun ke bumi dapat menjadi sebuah pengingat serta peringatan bagi manusia. Hujan merupakan rahmat Allah dan berkah bagi

seluruh makhluk hidup dan benda mati yang berada di muka bumi ini. Namun hujan juga dapat menjadi sebuah peringatan bagi manusia apabila intensitas hujan yang berlebihan sehingga dapat menjadi sebuah bahaya seperti hadirnya bencana banjir dan penyakit lain salah satunya DBD. Intensitas hujan yang berlebihan dapat mengisi wadah-wadah penampungan air sekitar rumah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Terdapatnya wadah yang menampung air hujan tanpa disertai perilaku pencegahan seperti pengurasan TPA dan menyingkirkan wadah-wadah tersebut menjadikan wadah-wadah tersebut sebagai tempat munculnya jentik-jentik nyamuk yang dapat menambah kepadatan nyamuk sehingga mengakibatkan penularan penyakit DBD yang cepat di daerah tersebut. Hal tersebut menjadi sebuah peringatan bagi manusia untuk melakukan perilaku pencegahan DBD ketika turunnya hujan ke bumi.

Menurut (Faldy et al., 2015) Curah hujan yang tinggi akan meningkatkan jumlah tempat perindukan alamiah nyamuk. Tempat perindukan alamiah di luar rumah, seperti potongan bambu, daun-daunan, botol bekas, dan kaleng, seringkali ditemukan di lingkungan rumah penduduk desa. Hal ini karena potongan bambu, daun-daunan, dan barang-barang bekas tersebut dapat menampung air hujan, menciptakan kondisi ideal bagi nyamuk *Aedes aegypti* untuk bertelur. Namun, curah hujan juga memiliki potensi untuk menghilangkan tempat perindukan nyamuk. Hujan deras dan berkepanjangan dapat menyebabkan hilangnya tempat-tempat perindukan nyamuk *Aedes aegypti* dan mengurangi populasi nyamuk.

Penelitian yang dilakukan (Sury et al., 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019 di Kecamatan Tembalang, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara curah hujan dan kejadian DBD. Hal ini mungkin disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan dapat menyebabkan aliran air yang deras bahkan banjir, yang pada akhirnya dapat menghilangkan

tempat perindukan nyamuk vektor. Perubahan dalam lingkungan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkontribusi pada timbulnya dan penyebaran penyakit menular. Penelitian yang melibatkan perubahan iklim dan penyebaran virus *dengue* menunjukkan bahwa suhu rata-rata dan curah hujan memiliki dampak yang signifikan terhadap kejadian DBD (Bone et al., 2021). Variabilitas iklim, khususnya fluktuasi suhu udara menjadi faktor yang memengaruhi kejadian DBD. Ketika musim berganti dari hujan ke kemarau, suhu udara biasanya berada dalam kisaran 23-31°C yang merupakan suhu optimal untuk perkembangbiakan *Aedes aegypti*. Selain itu, periode pertumbuhan dan perkembangan nyamuk *Aedes aegypti* dari telur hingga dewasa berkisar antara 8 hingga 15 hari pada suhu tersebut. Oleh karena itu, suhu tersebut menciptakan kondisi optimal untuk perkembangan nyamuk sehingga meningkatkan kepadatan populasi nyamuk.

Virus *dengue* yang disebarkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* sangat responsif terhadap kondisi lingkungan seperti suhu, curah hujan, dan kelembaban. Faktor-faktor ini sangat krusial dalam memengaruhi kehidupan nyamuk, proses reproduksi, serta dapat berdampak pada keberadaan dan jumlah populasi nyamuk. Penelitian (Pertiwi & Choirel, 2016) menyatakan suhu optimal pertumbuhan nyamuk yaitu 25 – 27°C sehingga apabila suhu kurang ataupun lebih dari suhu optimum, nyamuk akan mengalami gangguan pertumbuhan sehingga berdampak pada kematian populasi nyamuk *aedes aegypti*. Berdasarkan (BPS Kab. Luwu, 2022) hasil pengamatan suhu udara di Kecamatan Suli suhu optimal pertumbuhan nyamuk *Aedes aegypti* yaitu berada pada bulan januari, februari, maret dan desember dengan rata-rata suhu yaitu 27°C sehingga kejadian demam berdarah di Kecamatan Suli ikut meningkat ketika suhu udara meningkat disebabkan suhu

udara yang berada pada suhu optimal yang berdampak pada proses fisiologis nyamuk *Aedes aegypti*

Faktor lingkungan lainnya yang dapat memicu timbulnya penyakit DBD yaitu kelembaban udara. Tingkat kelembaban berdampak signifikan pada kehidupan nyamuk, Penelitian (Sucipto et al., 2015) Mengatakan bahwa kelembaban di bawah 60% akan mengakibatkan umur nyamuk menjadi lebih singkat, sehingga nyamuk tersebut tidak dapat berperan sebagai vektor, karena virus tidak memiliki waktu cukup untuk berpindah dari lambung nyamuk ke kelenjar ludahnya. Sementara itu, kelembaban pada tingkat terendah, yaitu antara 71,9% hingga 83,5%, secara tidak langsung memberikan peluang bagi nyamuk untuk memiliki umur (*longevity*) yang lebih panjang, sehingga memungkinkan siklus pertumbuhan virus dalam tubuh nyamuk. Hasil pengamatan iklim berdasarkan data (BPS Kab. Luwu, 2022) menunjukkan kelembaban di Kabupaten Luwu menunjukkan Rata-rata kelembaban udara paling tinggi ada di bulan Januari yakni sebesar 87,7%. Semakin tinggi tingkat kelembaban maka akan diikuti dengan peningkatan kejadian DBD. Kelembaban udara dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup nyamuk. Menurut (Lahdji & Putra, 2017) kelembaban yang rendah memperpendek usia nyamuk, sementara kelembaban yang tinggi memiliki potensi untuk memperpanjang usia nyamuk. Pada kondisi kelembaban rendah, terjadi penguapan air dari dalam tubuh nyamuk, yang mengakibatkan kekeringan cairan dalam tubuh. Oleh karena itu, tingkat kelembaban memengaruhi berbagai aspek kehidupan nyamuk, seperti umur, jarak terbang, tingkat perkembangbiakan, perilaku menggigit, waktu istirahat, dan faktor-faktor lainnya.

Untuk menjaga masyarakat dari perubahan iklim pada tingkat kejadian DBD, diperlukan serangkaian langkah seperti mitigasi (upaya untuk mengurangi

penyebab dan dampak) dan adaptasi (penyesuaian terhadap risiko kesehatan). Sistem peringatan dini terhadap kejadian luar biasa DBD harus diimplementasikan di seluruh wilayah dengan mempertimbangkan tren perubahan faktor iklim. Selain itu, diperlukan peningkatan dalam hal perbaikan lingkungan yang harus ditemani oleh perubahan dalam perilaku dan pelayanan kesehatan (Raksanagara et al., 2016).

#### **4. Gambaran Upaya Pencegahan DBD**

Upaya pencegahan melalui kegiatan PSN dengan prinsip 3M Plus merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan tempat-tempat yang dapat menjadi sarang bagi nyamuk *Aedes aegypti*, sekaligus untuk menghindari kontak dengan vektor penyakit DBD. Jika perilaku ini dijalankan dengan konsisten, maka potensi penularan penyakit DBD dapat terputus dan terjadi penurunan kasus DBD. Bila seluruh masyarakat melaksanakan prinsip 3M dengan baik, maka jumlah nyamuk *Aedes aegypti* dapat dikendalikan hingga tingkat minimum, sehingga risiko penularan DBD dapat diminimalkan..

Upaya pencegahan dalam penelitian di bagi 2 kategori yaitu baik dan kurang. Hasil penelitian menggambarkan perilaku pencegahan responden dengan kategori baik sebanyak 9 orang (39.1%) sedangkan responden dengan perilaku pencegahan kurang sebanyak 14 orang (30.4%). Masih kurangnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh responden yang pernah menderita DBD dapat memberi peluang pada anggota keluarga yang lain ataupun dirinya sendiri terinfeksi virus *dengue* kembali sehingga diperlukan peningkatan kesadaran individu dan masyarakat untuk melakukan PSN. Penelitian (Akbar & Maulana Syaputra, 2019) bahwa praktek 3M di rumah dapat memengaruhi terjadinya kasus demam berdarah *dengue* (DBD). Oleh karena itu, praktek 3M di rumah di

Kabupaten Indramayu menjadi faktor yang berkontribusi pada risiko terjadinya penyakit DBD.

Perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup hal-hal seperti pengetahuan, kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi, dan lainnya. Faktor ini berperan dalam mengolah rangsangan yang berasal dari luar. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan aspek lingkungan sekitar, termasuk unsur fisik dan non-fisik seperti layanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi, unsur budaya, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2014). Partisipasi aktif kader jumantik dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk menjadi faktor penting dalam memotivasi masyarakat untuk melakukan perilaku pencegahan DBD yang baik. Dukungan dan keterlibatan petugas kesehatan juga berperan signifikan dalam mendorong kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya untuk berusaha menghilangkan sarang nyamuk. Semakin kuat dan proaktif dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan dalam bentuk penyediaan informasi, skrining, serta langkah-langkah pencegahan lainnya, maka semakin mungkin perilaku masyarakat dalam memberantas sarang nyamuk akan membaik (Wirna et al., 2023).

Allah memerintahkan umatnya untuk selalu berperilaku baik dan tidak berbuat kerusakan yang merugikan. Allah berfirman dalam surah QS. Al-

Qashas/28: 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ ۷۷

Terjemahnya:

*“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashas/28: 77).*

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa dalam pandangan al-Qur'an bahkan dalam pandangan ayat inipun, kehidupan dunia tidaklah seimbang dengan kehidupan akhirat. Perhatianpun semestinya lebih banyak di arahkan kepada akhirat sebagai tujuan, bukan kepada dunia, karena ia hanya sarana yang dapat mengantarkan ke sana. Larangan melakukan perusakan setelah sebelumnya telah diperintahkan berbuat baik, merupakan peringatan agar tidak mencampuradukkan antara kebaikan dan keburukan. Sebab keburukan dan perusakan merupakan lawan kebaikan. Penegasan ini diperlukan, walau sebenarnya perintah berbuat baik telah berarti pula larangan berbuat keburukan – disebabkan karena sumber-sumber kebaikan dan keburukan sangat banyak, sehingga boleh jadi ada yang lengah dan lupa bahwa berbuat kejahatan terhadap sesuatu sambil berbuat ihsan walau kepada yang banyak masih merupakan hal yang bukan ihsan.

Air memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung proses perkembangbiakan nyamuk, terutama sebagai media untuk bertelur. Nyamuk *Aedes aegypti* betina cenderung meletakkan telur-telurnya di atas permukaan air yang bersih dan jernih. Keberadaan wadah-wadah yang berisi air, baik yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah, memiliki korelasi yang erat dengan kehadiran larva nyamuk. Hasil survey menunjukkan banyaknya wadah penyimpanan air yang digunakan masyarakat untuk menadah air hujan digunakan sebagai kebutuhan hari-hari. Penelitian (Lagu et al., 2017) menunjukkan adanya korelasi positif antara jumlah tempat penampungan air (TPA) dan kehadiran larva nyamuk, yang berarti semakin banyak TPA yang ada, semakin tinggi kemungkinan bagi nyamuk untuk berkembang biak di dalamnya. Keberadaan wadah yang mampu menampung air, baik di dalam maupun di sekitar rumah, memberikan kesempatan bagi nyamuk untuk mereproduksi di tempat-tempat

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan usaha pemberantasan sarang nyamuk sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit DBD melalui praktik 3M *plus*.

Frekuensi menguras TPA berpengaruh dalam menghambat perkembangbiakan jentik, karena dengan pembersihan TPA menyebabkan daur hidup nyamuk terputus. Hasil penelitian menunjukkan seluruh responden yang melakukan pengurasan TPA minimal 1 kali dalam seminggu. Perilaku pencegahan ini dilakukan dengan baik oleh seluruh responden. Penggunaan TPA berbahan jenis plastik oleh sebagian besar responden seperti ember, drum sehingga responden dapat dengan mudah mengurasnya. Penelitian (Salawati et al., 2010) menunjukkan bahwa responden yang tidak secara teratur menguras TPA setiap minggu memiliki risiko 2,759 kali lipat lebih tinggi untuk terkena DBD dibandingkan dengan responden yang melakukan pengurasan TPA setiap minggu.

Menutup rapat tempat penampungan air memiliki arah yang positif dalam upaya pecegahan DBD. Menutup rapat wadah yang digunakan untuk menampung air sebagai keperluan sehari-hari seperti ember, drum bak mandi, tempayan dapat mencegah tempat perkembangbiakan nyamuk. Berdasarkan habitat perkebangbiakan nyamuk *aedes aegypti* yaitu air bersih yang tergenang. Hasil penelitian meunjukkan bahwa masih kurangnya masyarakat yang menutup TPA, sebanyak 17 orang (73.9%) yang tidak menutup rapat wadah penampung air. Hal ini disebabkan tidak tersedianya penutup wadah dan kesulitan responden dalam mengambil air sehingga tempat penampungan air dibiarkan terbuka begitu saja untuk memudahkan mengambil air dalam tempat tersebut. Namun, menurut responden perilaku pengurasan TPA yang maksimal 1 dalam seminggu yang dilakukan dapat menurunkan risiko perkembangbiakan nyamuk pada wadah tersebut. Penelitian (Jaya et al., 2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tindakan menutup dengan rapat tempat penampungan air,

seperti menutup rapat gentong, ember/baskom, dan bak mandi/WC, dengan keberadaan larva *Aedes aegypti*.

Mengubur dan menghilangkan barang bekas yang berpotensi sebagai tempat perindukan air, seperti kaleng bekas, potongan bambu, dan ban bekas, adalah praktik PSN DBD yang dapat diadopsi oleh seluruh masyarakat. Tidak mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air dapat mengakibatkan peningkatan tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti* di sekitar rumah, sehingga meningkatkan risiko tergigit oleh nyamuk tersebut. Hasil penelitian menunjukkan responden yang mengubur barang bekas sebanyak 14 orang (60.9%) dan yang tidak melakukan sebanyak 9 orang (39.1%). Berdasarkan hasil survei lapangan masyarakat tidak mengubur barang bekas yang dapat menampung air dengan mengubur disebabkan tidak adanya lahan kosong yang dapat digunakan untuk mengubur barang-barang bekas tersebut sehingga sebagian masyarakat menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat berpotensi menampung air dengan cara membakar barang-barang tersebut ataupun dengan mendaur ulangnya seperti dijadikan pot atau hiasan dinding.

Kawat kasa adalah salah satu alat pelindung yang terbuat dari besi dan digunakan untuk melapisi ventilasi rumah. Pemasangan kawat kasa pada ventilasi bertujuan sebagai langkah pencegahan penularan penyakit DBD dengan menghalangi nyamuk agar tidak dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah dan menggigit manusia. Hasil penelitian menunjukkan responden yang menggunakan kawat kasa pada ventilasi rumah sebanyak 8 orang (34.8%) dan yang tidak memasang kawat kasa sebanyak 15 orang (65.2%). Masih kurangnya langkah pencegahan DBD dengan cara memasang kawat kasa pada ventilasi rumah disebabkan perspektif masyarakat terhadap penggunaan kawat kasa yang kurang

efektif serta nyamuk yang berada dalam rumah masih dapat diatasi dengan menggunakan obat anti nyamuk ataupun kelambu pada malam hari.

Penelitian (Fini et al., 2021) Terdapat korelasi antara penggunaan kawat kasa dan kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Mamajang. Responden yang tidak menggunakan kawat kasa memiliki risiko 0,265 kali lebih tinggi untuk mengalami DBD dibandingkan dengan responden yang memasang kawat kasa pada ventilasi rumah. Ventilasi dianggap memenuhi standar kesehatan apabila jaring-jaring atau kawat kasa telah terpasang pada lubang ventilasi. Semakin banyak bagian ventilasi yang dilapisi kawat kasa, maka semakin sedikit populasi nyamuk, yang berarti mengurangi kemungkinan kontak antara nyamuk dan manusia di dalam ruangan (Astuti & Lustiyati, 2018).

Masyarakat umumnya menggunakan berbagai metode pencegahan untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk di rumah. Salah satu metode yang umum digunakan adalah penggunaan kelambu. Selain itu, obat anti nyamuk menjadi pilihan yang populer untuk menghindari gigitan nyamuk, termasuk berbagai jenis obat seperti obat anti nyamuk bakar, obat cair, obat anti nyamuk elektrik, serta produk *repellent* seperti lotion atau semprot. Obat anti nyamuk ini telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam upaya mencegah gigitan nyamuk, terutama dari nyamuk yang berperan sebagai vektor penyakit tropis seperti DBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 responden, 20 orang (87.0%) diantaranya menggunakan obat anti nyamuk untuk menghindari diri dari gigitan nyamuk. Pada kalangan masyarakat, umumnya menggunakan obat anti nyamuk seperti kelambu dan obat anti nyamuk semprot sehingga aktivitas dalam rumah menjadi lebih nyaman terhindar dari gigitan nyamuk. Penelitian dilakukan oleh (Sholihah et al., 2020) menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan obat anti nyamuk dengan kejadian DBD, pada responden yang tinggal di wilayah

pesisir berisiko 1,684 kali terkena DBD apabila yang tidak menggunakan anti nyamuk.

Upaya pemberantasan jentik dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang berbeda, yaitu metode fisik, kimia, dan biologi. Metode fisik, yang dikenal sebagai 3M Plus, melibatkan tindakan seperti menguras tempat penampungan air, menutup wadah-wadah penampungan air, serta mengubur barang-barang bekas. Program ini juga melibatkan kegiatan larvasidasi dan mempromosikan gerakan "satu jentik satu rumah." Sementara itu, metode pengendalian jentik secara kimia dilakukan dengan menggunakan insektisida yang dirancang untuk membunuh jentik, yang juga dikenal sebagai larvasida. Terakhir, pengendalian jentik secara biologi melibatkan pemeliharaan ikan pemakan jentik sebagai salah satu metode untuk mengurangi populasi jentik nyamuk (Kemenkes RI, 2020).

Pengendalian secara kimia dilibatkan dalam pemberian serbuk abate ke dalam tempat-tempat yang memiliki genangan air, seperti bak mandi dan pot bunga, untuk tujuan membunuh larva nyamuk dan mencegah mereka berkembang menjadi nyamuk dewasa, sehingga risiko wabah DBD dapat diminimalkan. Pemberian serbuk abate ini biasanya dilakukan secara berkala, sekitar dua hingga tiga bulan sekali, dengan takaran 10 gram abate untuk setiap 100 liter air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7 orang (30.4%) responden melakukan larvasida dengan menaburkan bubuk abate ke tempat penampungan air yang dibagikan oleh petugas puskesmas atau yang mereka beli di pasar ke TPA mereka, sedangkan 16 orang (69.6%) responden lainnya tidak melakukan pengendalian jentik dengan menaburkan serbuk abate. Hal ini dikarenakan jenis tempat penampungan air (TPA) yang digunakan, TPA tersebut mudah untuk dikuras sehingga responden tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli serbuk abate.

Menurut (Fitrianingsih, 2019) Penggunaan abate memiliki dua jenis, yaitu penggunaan dengan cara menaburkan dan dengan cara membungkus. Terdapat perbedaan dalam efek kematian larva antara penggunaan abate dengan cara menaburkan dan dengan cara membungkus. Kematian larva terjadi lebih cepat pada penggunaan abate dengan cara menaburkan karena bahan aktif temephosnya larut lebih cepat, sementara pada penggunaan abate dengan cara membungkus, bahan aktif temephosnya hampir tetap stabil dan tidak teroksidasi. Penggunaan abate dengan cara menaburkan sebaiknya diterapkan secara langsung di masyarakat, terutama di daerah-daerah endemis atau daerah yang memiliki sedikit penampungan air. Hasil pengamatan dilapangan, responden yang melakukan larvasida dengan menaburkan bubuk abate ke bak kamar mandi berjenis tabur yang didapatkan melalui petugas puskesmas saat melakukan penyelidikan epidemiologi.

Predator merujuk pada praktik memelihara ikan yang memakan larva *Aedes aegypti*, seperti ikan cupang atau jenis ikan pemakan jentik lainnya, dalam bak mandi, gentong, kolam ikan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah larva *Aedes aegypti* yang ada pada wadah air tersebut. Menggunakan ikan sebagai predator alami larva nyamuk merupakan metode pengendalian biologi yang dapat dengan mudah diterapkan oleh masyarakat. Pendekatan biologis ini relatif aman karena tidak melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Jenis ikan yang sering digunakan sebagai pemakan jentik meliputi ikan cupang, ikan cere, ikan nila, dan ikan mas. Berdasarkan penelitian (M. Sari & Novela, 2020) ikan cupang memiliki kemampuan lebih tinggi untuk memakan jentik dari ikan lainnya sehingga lebih efektif menjadi pemantau jentik nyamuk dan meningkatkan Angka Bebas Jentik (ABJ).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak memelihara ikan pemakan jentik pada TPA. Responden yang tidak memelihara ikan pemakan jentik sebanyak 22 orang (95.7%) dari 23 responden sedangkan 1 responden yang memelihara ikan hanya digunakan sebagai ikan hias. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat dari ikan tersebut. Hasil Intervensi yang dilakukan (Pangesti et al., 2021) pada warga Desa Talok dengan memberikan ikan cupang pada bak mandi warga, didapatkan hasil perbedaan jumlah jentik sebelum dan sesudah pemberian ikan cupang sehingga langkah pemanfaatan ikan pemakan jentik dalam meningkatkan ABJ di rumah dianggap efektif.

Hasil penelitian menunjukkan masih banyak responden yang memiliki kebiasaan menggantung pakaian pada dinding ataupun belakang pintu yaitu sebanyak 15 orang (65.2%) sedangkan responden yang tidak menggantung pakaian sebanyak 8 orang (34.8%). Kebiasaan menggantung pakaian juga dapat memengaruhi kepadatan nyamuk *Aedes aegypti*. Nyamuk lebih suka tempat istirahat yang gelap, lembab, dan tersembunyi di dalam rumah, dan salah satu tempat yang sering dijadikan tempat istirahat oleh nyamuk adalah baju bekas yang digantung. Responden yang menggantung pakaian bekas, seperti mukenah atau pakaian sekali pakai yang bisa digunakan lagi sehingga menciptakan lingkungan yang dihuni oleh nyamuk *Aedes aegypti*. Hal ini terjadi karena pakaian bekas yang telah dipakai mengandung beberapa zat, seperti asam amino, asam laktat, dan zat-zat lainnya yang berasal dari keringat manusia, yang menarik nyamuk untuk mendekat. Selain itu, nyamuk juga tertarik oleh aroma tubuh manusia yang mengeluarkan karbon dioksida melalui pernapasan dan menempel pada pakaian. Akibatnya, populasi nyamuk yang tinggal di dalam rumah meningkat (Dinata & Dhewantara, 2012).

Upaya menghindari kontak dengan vektor DBD pada masyarakat berfokus pada penggunaan obat anti nyamuk berjenis *repellent* seperti *lotion* atau spray (semprot) yang mengandung bahan kimia. Namun terdapat cara lain yang lebih ramah lingkungan untuk mencegah gigitan nyamuk yaitu dengan memanfaatkan tanaman anti nyamuk seperti bunga lavender, zodia, geranium, bunga rosemary, sereh wangi akar wangi dan selasih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang menanam tanaman pengusir nyamuk sebanyak 5 orang (21.7%) sedangkan 18 orang (78.3%) yang tidak menanam tanaman pengusir nyamuk. Jenis tanaman yang ditanam responden yaitu sereh dan selasih. Kurangnya penerapan perilaku ini disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dari manfaat tanaman-tanaman tersebut, masyarakat beranggapan bahwa tanaman tersebut hanya tanaman biasa yang dapat ditanam hias di pekarangan rumah atau dimanfaatkan untuk bahan dapur.

Hasil penelitian (Putro & Supriyatna, 2014) Minyak atsiri dari tanaman selasih, sereh wangi, lavender, dan limonene memiliki potensi sebagai pengusir nyamuk karena efektif dalam memberikan perlindungan selama 6 jam, meskipun tingkat proteksinya tidak mencapai lebih dari 90% setelah 6 jam. Bahan aktif yang terkandung dalam tanaman-tanaman tersebut mengganggu sistem sensori nyamuk, menghambat kemampuan nyamuk untuk mengenali bahan penarik yang berasal dari manusia. Sebagai akibatnya, minyak-minyak tersebut memberikan perlindungan bagi manusia yang berada di dekatnya dari gigitan nyamuk.

Transisi dari musim penghujan ke musim kemarau menjadi periode yang rentan terhadap peningkatan kasus demam berdarah, terutama disebabkan oleh adanya saluran talang air yang terletak di ujung atap rumah. Saluran talang air ini berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air hujan dari atap rumah ke tempat pembuangan air. Saluran talang air berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan

nyamuk karena dapat menampung air apabila tidak dilakukan pemeriksaan rutin dan memperbaikinya apabila tidak lancar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden tidak menerapkan langkah pencegahan ini karena tidak ada responden yang memasang saluran talang air pada atap rumah mereka.

Lingkungan rumah merupakan tempat di mana vektor penyakit demam berdarah berinteraksi dengan manusia dan berperan penting dalam penularan penyakit demam berdarah. Untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit di lingkungan rumah dapat dilakukan dengan kegiatan terintegrasi antara masyarakat dan pemerintah dalam bentuk gotong royong bersama menciptakan lingkungan yang sehat. Kegiatan gotong royong di lingkungan rumah guna menyingkirkan barang-barang yang diduga dapat berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk dapat mengurangi kepadatan nyamuk sehingga risiko terkena penyakit rendah. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 17 orang (73.9%) berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan 6 orang (26.1%) responden yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari responden bahwa kurangnya kegiatan kerja bakti yang diadakan pemerintah setempat sehingga warga juga ikut acuh terhadap lingkungan disekitarnya.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Kurangnya informasi yang didapatkan dari keluarga atau kerabat terdekat responden yang telah meninggal dunia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait gambaran epidemiologi kejadian DBD dan upaya pencegahan masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023, dapat ditarik kesimpulan bahwa:


1. Gambaran Epidemiologi Berdasarkan Orang
  - a. Mayoritas penderita DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli pada kelompok umur 5-14 tahun dan 15-44 tahun (39.1%)
  - b. Jenis kelamin penderita DBD Wilayah Kerja di Puskesmas Suli, Laki laki (47.8%) dan perempuan (52.2%)
  - c. Tingkat Pendidikan penderita DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli yaitu SD (34.8%)
  - d. Pekerjaan penderita DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli yaitu mahasiswa/pelajar (50%)
  - e. Tingkat pengetahuan masyarakat terkait DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli dikategorikan baik dengan persentase 56.5%
2. Gambaran persebaran kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli berdasarkan tempat sebagian besar terjadi di Desa Cimpu, jumlah kasus sebanyak 19 orang dengan jumlah titik lokasi kejadian 17 titik.
3. Gambaran kejadian DBD di di Wilayah Kerja Puskesmas Suli berdasarkan waktu tahun 2022 tertinggi terjadi pada bulan Desember dan tahun 2023 tertinggi terjadi pada bulan Januari.
4. Perilaku 3M *Plus* mengenai upaya pencegahan DBD dikategorikan kurang dengan persentase 60.9%.

## **B. Saran**

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu meningkatkan upaya surveilans kesehatan lingkungan penyakit DBD, terutama di daerah dengan kecenderungan tinggi untuk DBD dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Koordinasi intensif dan peningkatan kinerja proaktif dari petugas puskesmas yang bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan di kecamatan Suli sangat penting dalam upaya penanggulangan kasus DBD. Hal ini bertujuan untuk mengatasi faktor lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap kejadian DBD, mencegah penularan yang semakin meluas, dan menghindari terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).
2. Puskesmas Suli melakukan intervensi dengan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan angka bebas jentik DBD dengan mengaktifkan kemabali Gerakan 1 rumah 1 jumantik sehingga pemeriksaan jentik nyamuk setiap rumah tangga dapat terlaksana secara optimal.
3. Sektor Kesehatan bekerja sama dengan sektor pendidikan dalam upaya mencegah penularan DBD di lingkungan sekolah, dengan memanfaatkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan motivasi siswa dalam partisipasi upaya pencegahan DBD. Langkah ini termasuk melaksanakan pelatihan, seperti mengenai pemberantasan jentik nyamuk di Tempat Penampungan Air (TPA) yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk.
4. Bagi masyarakat Kecamatan Suli, khususnya Desa Cimpu agar tetap menjaga kebersihan lingkungan rumah dan menerapkan upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M *plus* dengan baik seperti melakukan pengendalian jentik pada TPA dengan menutup rapat tempat-tempat yang menampung air dan memelihara ikan penakan

jentik pada tempat yang menampung air untuk meningkatkan angka bebas jentik (ABJ).

5. Bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut faktor yang mempengaruhi kejadian DBD dan penatalaksanaan program DBD di Kecamatan Suli.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H., & Maulana Syaputra, E. (2019). Faktor Risiko Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Indramayu. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 2(3), 159–164.
- Aradilla, A. (2009). *Uji efektivitas larvasida ekstrak daun mimba (Azadirachta indica) terhadap larva Aedes aegypti*.
- Astuti, P., & Lustiyati, E. D. (2018). Hubungan Kondisi Lingkungan Fisik Terhadap Tingkat Kepadatan Larva Aedes Sp Di Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Kasihan, Bantul. Di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, November*, 9(November), 216–225.
- Ayuningtyas, A. (2023). Analisis Hubungan Kepadatan Penduduk Dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue (Dbd) Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 13(April), 419–426.
- Bone, T., Kaunang, W. P. J., & Langi, F. (2021). Hubungan Antara Curah Hujan, Suhu Udara Dan Kelembaban Dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue Di Kota Manado Tahun 2015. *Kesmas*, 10(5), 36–45.
- BPS Kab. Luwu. (2022). *Kecamatan Suli Dalam Angka*. BPS Kabupaten Luwu.
- Candra, A. (2010). Epidemiologi, Patogenesis Dan Faktor Risiko Penularan. *Aspirator*, 2(2), 110–119.
- Chandra, E. (2019). Pengaruh faktor iklim, kepadatan penduduk dan angka bebas jentik (abj) terhadap kejadian demam berdarah. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 1(1), 1–15.
- Dinata, A., & Dhewantara, P. W. (2012). Karakteristik Lingkungan Fisik , Biologi , Dan Sosial Di Daerah Endemis Dbd Kota Banjar Tahun 2011. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 11(4), 315–326.
- Faldy, R., Kaunang, W. P. J., & Pandelaki, A. J. (2015). Pemetaan Kasus Demam Berdarah Dengue Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Kedokteran Komunitas Dan Tropik*, 3(2), 73–81.
- Fini, K., Nur, N. H., & Syamsul, M. (2021). Risk Factors For Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Cases In The Working Area Of Mamajang Health Center, Makassar City. *Pancasakti Journal Of Public Health Science And Research*, 1(1), 13–21.
- Fitrianingsih, F. (2019). Survey Jentik Nyamuk Dan Pemberian Bubuk Abate Di Bak Mandi Warga Rt 03 Rw 03 Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Bio Educatio*, 4 (1)(April), 33–40.
- Imresah, O., & Marlianto, N. (2022). Associated factors of dengue hemorrhagic

fever in phc of Beringin Raya. *Thaksin University Online Journal*, 1–9.

Ismah, Z., Purnama, T. B., Wulandari, D. R., Sazkiah, E. R., & Ashar, Y. K. (2021). Faktor Risiko Demam Berdarah di Negara Tropis. *ASPIRATOR - Journal of Vector-Borne Disease Studies*, 13(2), 147–158.

Jaya, D. M., Ibrahim, E., & Anwar. (2013). Hubungan Pemberantasan Sarang Nyamuk ( Psn ) Dbd Dengan Keberadaan Larva Aedes Aegypti Di Wilayah Endemis Dbd Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar. *Kesehatan Lingkungan, FKM UNHAS*, 1–12.

Kasman, & Ishak, N. I. (2018). Analisis Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Kota Banjarmasin Tahun 2012-2016. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia The*, 1(2), 32–39.

Kemendes RI. (2016). *Petunjuk teknis implementasi PSN 3M-PLUS Dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik*.

Kemendes RI. (2020).

Ketaren, S. O., & Wahyuni, T. (2017). Analisa Keberadaan Jentik Aedes Sp. Di Sekolah Dasar Negeri (Sdn) Kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan Hidup*, 4002.

Knowlton, K., Solomon, G., & Rotkin-Ellman, M. (2009). *Fever pitch: Mosquito-Borne Dengue Fever Threat Spreading in the Americas* (Issue July).

Koibur, G., Satyarsa, A, Gustawan, I. W., Putra, I., & Utama, I. (2021). Lingkungan Tempat Tinggal Sebagai Faktor Resiko Infeksi Virus Dengue Pada Anak-Anak. *Indonesian Journal for Health Sciences*, 5(1), 1–7.

Lagu, A. M. H., Damayati, D. S., & Wardiman, M. (2017). Hubungan jumlah penghuni, jumlah tempat penampungan air dan pelaksanaan 3M Plus dengan keberadaan jentik nyamuk aedes sp di Kelurahan Balleangin Kecamatan Balocci Kab. Pangkep. *Higiene Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 3(1), 22–29.

Lahdji, A., & Putra, B. B. (2017). Hubungan Curah Hujan, Suhu, Kelembaban dengan Kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Semarang. *Syifa' MEDIKA*, 8(1), 46–53.

Lawira, A. M. (2015). Peran Keluarga dan Petugas Kesehatan terhadap Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Wilayah Puskesmas Talise. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(18), 867–876.

Limkittikul, K., Brett, J., & L'Azou, M. (2014). Epidemiological Trends of Dengue Disease in Thailand (2000–2011): A Systematic Literature Review. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 8(11).

Liza, A., Imran, & Mudatsir. (2015). Hubungan Tingkat Pengetahuan, Pendidikan Dan Sikap Dengan Partisipasi Ibu Rumah Tangga Dalam Pencegahan Wabah

DBD Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 15(3), 135–141.

Mardhatillah, S., Ambiar, R. I., & Erlyn, P. (2020). Gambaran Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas Dempo Kota Palembang. *Mesina*, 1(2), 23–32.

Marwanty, M., & Miko Wahyono, T. Y. (2019). Faktor Lingkungan Rumah dan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kota Palopo 2016. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 2(1), 19–26.

Masriadi. (2017). *Epidemiologi Penyakit Menular*. Rajawali Pers.

Monintja, T. C. N., Arsin, A. A., Amiruddin, R., & Syafar, M. (2021). Analysis of temperature and humidity on dengue hemorrhagic fever in Manado Municipality.

Nastiti, S. A., Ramadanintyas, K. N., & Marsanti, A. S. (2020). Factors Related to Incident Dengue Hemorrhagic Fever (DHF). *Jurnal Kesehatan Prima*, 14(1), 31–39.

Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.

Novitasari, A., Permatasari, D., & Ramaningrum, D. (2015). Hubungan Status Gizi, Umur, dan Jenis Kelamin dengan Derajat Infeksi Dengue pada Anak. *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*, 2(1), 24–28.

Novitasari, L., Yuliawati, S., & Wuryanto, M. A. (2018). 22023-44689-1-Sm. *Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6, 277–284.

Pangesti, M. Della, Wahyudi, Y., & Susila, W. D. C. (2021). Efektifitas Pemberian Ikan Cupang (*Betta Splendens*) Dalam Menurunkan Jumlah Jentik Sebagai Upaya Pencegahan Dbd Di Desa Talok Kec. Turen. *Health Care Media*, 5(2).

Pertiwi, P. I., & Choiroel, A. (2016). Gambaran Epidemiologi Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Tahun 2012 - 2016 ). *Keslingmas*, 37(3), 240–404.

*Profil Daerah Kabupaten Luwu*. (2022).

*Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*. (2020).

Putra, T. A., & Ellina, A. D. (2020). Factors Associated with the Incidence of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) at the Suruh Trenggalek Health Center. *Health Scientific Journal*, 1(2), 45–51.

Putri, R., & Naftassa, Z. (2017). Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat dengan Perilaku Pencegahan Demam Berdarah dengue di Desa Kemiri, Kec. Jayakerta, Karawang tahun 2016. *Magna Medika*, 1(4), 1–7.

- Putro, P., & Supriyatna, N. (2014). Perbandingan Daya Proteksi Losion Anti Nyamuk Dari Beberapa Jenis Minyak Atsiri Tanaman Pengusir Nyamuk. *Biopropal Industri*, 5(2), 79–84.
- Raksanagara, A., Arisanti, N., & Rinawan, F. (2016). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kejadian Demam Berdarah Di Jawa-Barat. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 1(1), 43–47. <https://doi.org/10.24198/jsk.v1i1.10339>
- Rismawati, S. N., & Nurmalia, I. (2017). Hubungan Perilaku Host dan Enviroment dengan Kejadian DBD di Wonokusumo Surabaya. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 5(3), 383–392.
- Salawati, T., Astuti, R., & Nurdiana, H. (2010). Kejadian Demam Berdarah Dengue berdasarkan faktor lingkungan dan praktik pemberantasan sarang nyamuk. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 6(1), 57–66.
- Sari, C. (2005). Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Penyakit Malaria. *Institut Pertanian Bogor*, 1–18.
- Sari, E., Wahyuningsih, N. E., & Murwani, R. (2017). Hubungan Lingkungan Fisik Rumah Dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(5), 609–617.
- Sari, M., & Novela, V. (2020). Pengendalian Biologi Dengan Daya Predasi Berbagai Jenis Ikan Terhadap Larva Aedes Aegypti Di Wilayah Kerja Puskesmas Tigo Baleh. *Jurnal Sehat Mandiri*, 15(1), 79–85.
- Sholihah, N. A., Weraman, P., & Ratu, J. M. (2020). Analisis Spasial dan Pemodelan Faktor Risiko Kejadian Demam Berdarah Dengue Tahun 2016-2018 di Kota Kupang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(1), 52–61.
- Sucipto, P. T., Raharjo, M., & Nurjazuli. (2015). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Dan Jenis Serotipe Virus Dengue Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 14(2), 51.
- Sukohar. (2014). Demam Berdarah Dengue ( DBD ). *Medula*, 2(2), 1–15.
- Sury, I. A., Martini, M., Yuliawati, S., & Hestningsih, R. (2021). Gambaran Epidemiologi Kejadian Demam Berdarah Dengue: Karakteristik Penderita, Waktu Dan Faktor Lingkungan Di Kecamatan Tembalang Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 9(November), 816–821.
- Suryani, E. T. (2018). Gambara Kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Blitar Tahun 2015-2017. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 6(3), 260–267.
- Susanti, S., & Suharyo, S. (2017). Hubungan Lingkungan Fisik Dengan Keberadaan Jentik Aedes Pada Area Bervegetasi Pohon Pisang. *Unnes*

*Journal of Public Health*, 6(4), 271–276.

- Syamsir, S., Daramusseng, A., & Rudiman, R. (2020). Autokorelasi Spasial Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 19(2), 119–126.
- Tomia, S., Hadi2, U. K., Soviana, S., & Retnani, E. B. (2020). Epidemiologi Kejadian Demam Berdarah Dengue. *Jurnal Veteriner*, 21(36), 637–645.
- Umaya, R., Fickry Faisya, A., & Sunarsih, E. (2013). Hubungan Karakteristik Pejamu, Lingkungan Fisik Dan Pelayanan Kesehatan Dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue (Dbd) Di Wilayah Kerja Puskesmas Talang Ubi Pendopo Tahun 2012. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 4(3), 262–269.
- Utami, R. S. B. (2015). Hubungan Pengetahuan Dan Tindakan Masyarakat Dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue (Dbd) (Studi Di Kelurahan Putat Jaya Surabaya Tahun 2010–2014). *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 3(2), 242–253.
- Wahyuni dwi, R., & M.Sabir. (2011). Karakteristik Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Januari-Desember 2010. *Inspirasi*.
- Waris, L., & tri yuana, W. (2013). Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Epidemiologi Dan Penyakit Bersumber Binatang*, 4(3), 144–149.
- WHO. (2021). *Dengue and severe dengue*.
- Widoyono. (2011). *Penyakit Tropis : Epidemiologi, Penularan, Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta, Erlangga.
- Wirna, S., Nursia, L. E., Jihad, F. F., & Nabela, D. (2023). Hubungan Pengetahuan Dan Informasi Petugas Kesehatan Dengan Tindakan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 11(1), 52–66.
- Yuningsih, R. (2018). The Policy of Dengue Hemorrhagic Fever Outbreak in Tangerang Regency. *Aspirasi: Jurnal Masalah Sosial*, 9(2), 260–273.

## LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

No. Responden:

Titik Koordinat rumah:

<b>A. Data Responden</b>		
A1	Nama	
A2	Alamat	
A3	Bulan terkonfirmasi DBD	
A4	Umur	
A6	Jenis Kelamin	<input type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan
A7	Agama	<input type="radio"/> Islam <input type="radio"/> Kristen <input type="radio"/> Budha <input type="radio"/> Hindu
A8	Pendidikan	<input type="radio"/> Tidak Sekolah <input type="radio"/> SD/Sederajat <input type="radio"/> SMP/Sederajat <input type="radio"/> SMA/Sederajat <input type="radio"/> Perguruan tinggi
A10	Pekerjaan	<input type="radio"/> Tidak Bekerja <input type="radio"/> Petani <input type="radio"/> Wiraswasta <input type="radio"/> PNS <input type="radio"/> Pelajar/Mahasiswa
<b>B. Pengetahuan Masyarakat</b>		
B1	Penyakit demam berdarah ditularkan oleh?	a. Nyamuk Aedes Aegypti b. Kuman c. Lalat d. Nyamuk Anopheles
B2	Gejala apa yang dirasakan saat terinfeksi virus dengue?	a. Batuk b. Demam tinggi c. Gatal-gatal d. Flu
B3	Apakah ciri-ciri nyamuk penular demam berdarah?	a. Warna coklat bintik-bintik putih b. Warna hitam tanpa bintik-bintik putih c. Warna coklat tanpa bintik putih d. Warna hitam bintik-bintik putih
B4	Dimanakah biasanya nyamuk penular demam berdarah berkembang biak?	a. Pakaian yang digantung b. Comberan c. Bak mandi d. Tempat sampah

B5	Nyamuk penular demam berdarah meletakkan telurnya pada	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanah yang tergenang air bersih</li> <li>b. selokan air kotor</li> <li>c. air payau</li> <li>d. air bersih yang tidak berhubungan dengan tanah</li> </ul>
B6	Kapan waktu nyamuk penular demam berdarah biasa menggigit orang?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dari pkl.10.00 sampai pkl.12.000</li> <li>b. Dari pkl.06.00-09.00 pagi</li> <li>c. Malam hari pkl.20.00 sampai pkl.05.00</li> <li>d. Dari 1 pkl.12.00 siang hingga pkl.15.00</li> </ul>
B7	Bagaimana cara penyebaran penyakit demam berdarah?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui gigitan nyamuk yang sebelumnya telah menggigit penderita demam berdarah</li> <li>b. Melalui gigitan nyamuk</li> <li>c. Melalui suntikan antar penderita</li> <li>d. Bersentuhan dengan penderita demam berdarah</li> </ul>
B8	Apakah yang dimaksud dengan gerakan 3M?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menguras, menutup dan mengubur barang-barang yang menampung air</li> <li>b. Membersihkan, mengalirkan dan mengeringkan parit/kolam yang menampung air</li> <li>c. Menjernihkan, memasak dan merebus air yang akan diminum</li> <li>d. Menguras, menutup dan menjernihkan</li> </ul>
B9	Berapa kali kita harus menguras tempat penampungan air, seperti bak mandi, drum bekas yang berisi air?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Paling sedikit dua minggu sekali</li> <li>b. Paling sedikit seminggu sekali</li> <li>c. Kalau sudah kotor saja</li> <li>d. Paling sedikit sepuluh hari sekali</li> </ul>

B10	Jentik nyamuk penular demam berdarah dapat diberantas dengan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan anti nyamuk</li> <li>b. Disemprot atau foging (pengasapan)</li> <li>c. Serbuk abate</li> <li>d. Diberikan sabun cair</li> </ul>
<b>C. Perilaku Pecegahan</b>		
C1	<b>Menguras Tempat Penampungan Air</b> Apakah anda membersihkan dan menguras tempat penampungan air anda setidaknya 2x dalam seminggu	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Ya</li> <li><input type="radio"/> Tidak</li> </ul>
C2	<b>Menutup Tempat Penampungan Air</b> Apakah anda menutup tempat penampungan air anda dengan penutup yang rapat	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Ya</li> <li><input type="radio"/> Tidak</li> </ul>
C3	<b>Mendaur Ulang Barang Bekas</b> Apakah anda mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas di sekitar rumah seperti: ban, kaleng, botol?	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Ya</li> <li><input type="radio"/> Tidak</li> </ul>
C4	<b>Memperbaiki saluran dan talang air</b> Apakah anda memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancer atau rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Ya</li> <li><input type="radio"/> Tidak</li> </ul>
C5	<b>Penggunaan Obat Anti Nyamuk</b> Apakah anda menggunakan obat anti nyamuk dalam bentuk lotion/ spray /elektik /cair /kelambu untuk menghindari diri dari gigitan nyamuk	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Ya</li> <li><input type="radio"/> Tidak</li> </ul>
C6	<b>Menabur Bubuk Abate</b> Apakah anda memberikan bubuk abate yang dilakukan 2-4 bulan sekali pada TPA yang digunakan untuk keperluan sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Ya</li> <li><input type="radio"/> Tidak</li> </ul>

C7	<p><b>Memelihara Ikan Pemakan Jentik</b></p> <p>Apakah anda memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan gabus, guppy, mujair nila pada tempat penampungan air anda?</p>	<p><input type="radio"/> Ya</p> <p><input type="radio"/> Tidak</p>
C8	<p><b>Memasang Kawat Kasa</b></p> <p>Apakah anda memasang kawat kasa untuk menghindari masuknya nyamuk pada lubang ventilasi?</p>	<p><input type="radio"/> Ya</p> <p><input type="radio"/> Tidak</p>
C9	<p><b>Menggantung Pakaian</b></p> <p>Apakah anda sekeluarga menggantung pakaian bekas pakai dalam rumah?</p>	<p><input type="radio"/> Ya</p> <p><input type="radio"/> Tidak</p>
C10	<p><b>Menanam Tanaman Pengusir Nyamuk</b></p> <p>Apakah anda memiliki tanaman-tanaman di setikar rumah yang dapat mengusir nyamuk untuk mencegah penyakit seperti pohon lavender/ kemangi/ serai?</p>	<p><input type="radio"/> Ya</p> <p><input type="radio"/> Tidak</p>
C11	<p><b>Gotong Royong</b></p> <p>Apakah anda Ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan?</p>	<p><input type="radio"/> Ya</p> <p><input type="radio"/> Tidak</p>

Lampiran 2: Surat Rekomendasi Pengambilan Data Awal

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS KESEHATAN**  
Alamat : Jl. Sawerigading, Kel.Sabe Kec.Belopa Utara KD. POS ; 91994  
**BELOPA UTARA**

---

Nomor : 361 /Dinkes/Sek/III/2023  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Pengambilan Data Awal

Kepada  
Yth. – Kepala Puskesmas Suli  
Di-  
T e m p a t

Dengan hormat,


Disampaikan bahwa Mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dibawah ini :

Nama : Apriani Wardhana Nur  
Nim : 70200119045  
Semester/T.A : VII (Tujuh)/2022-2023  
Fakultas : Kedokteran dan ilmu kesehatan/kesehatan masyarakat

Bermaksud melakukan pengambilan data awal dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan judul Skripsi “ *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian DBD di wilayah Kerja Puskesmas Suli*”

Demikian Rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Belopa, 06 Maret 2023  
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu

  
dr.Hj.Rosnawary Basir,M.Tr.Adm.Kes  
Pangkat : Pembina TK.I, IV/B  
Nip : 19800530 200604 2 019

## Lampiran 3: Surat Keterangan Layak Etik



**KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN**  
**HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: [kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id](mailto:kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id)

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
**DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION**  
**"ETHICAL EXEMPTION"**

No: B.440/KEPK/FKIK/VII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : APRIANI WARDHANA NUR  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"GAMBARAN EPIDEMIOLOGI KEJADIAN DBD DAN UPAYA PENCEGAHAN**  
**MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SULI KABUPATEN LUWU"**

**"EPIDEMIOLOGY DESCRIPTION OF DHF INCIDENCE AND COMMUNITY PREVENTION**  
**EFFORTS IN SULI PUBLIC HEALTH CENTER LUWU REGENCY"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024.

*This declaration of ethics applies during the period July 18th, 2023 until July 18th, 2024.*

July 18th, 2023  
Professor and Chairperson,

DR. Hj. Gemy Nustity Handayani, M.Si., Apt.

## Lampiran 4: Surat Izin Penelitian



### PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Rissaju No. 1, Belopa Telpun : (0471) 3314115

Nomor : 310/PENELITIAN/03.01/DPMPSTP/II/2023  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Puskesmas Suli  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : b-4132/Un.06/LP2M/PP.00.9/6/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Apriani Wardhana Nur  
Tempat/Tgl Lahir : Larompong / 27 April 2001  
Nim : 70200119045  
Jurusan : Kesehatan Masyarakat  
Alamat : Dsn. Muhajirin  
Desa Komba  
Kecamatan Larompong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

#### GAMBARAN EPIDEMIOLOGI KEJADIAN DBD DAN UPAYA PENCEGAHAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SULI KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di PUSKESMAS SULI, pada tanggal 10 Juli 2023 s/d 10 Agustus 2023

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal 10 Juli 2023  
Kepala Dinas

Drs. ANDI BASU TENRIESA, MPA, M.Si  
Rangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19661231 199203 1 091

#### Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa,
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa,
3. Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
4. Mahasiswa (i) Apriani Wardhana Nur,
5. Arsip.

## Lampiran 5: Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS SULI

Jl. Poros Palopo – Makassar, Lingk. Lempokasi, Kel. Suli, Kec. Suli, Kab. Luwu  
Kode Pos 91996, Email : puskesmas.suli77@gmail.com



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 3435 /PKM-S/TU/VIII/2023

Berdasarkan Surat Keterangan Penelitian Nomor : 310/PENELITIAN/03.01/DPMPTSP/VII/2023  
Tanggal 10 Juli 2023 Perihal Penyusunan Skripsi, maka yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : Apriani Wardhana  
Nik induk mahasiswa : 70200119045  
Alamat tempat tinggal : Larompong  
Studi : Kesehatan Masyarakat  
Lembaga : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Judul penelitian : **GAMBARAN EPIDEMOLOGI KEJADIAN DBD DAN UPAYA  
PENCEGAHAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS SULI KABUPATEN LUWU**  
Tempat penelitian : Puskesmas Suli Kab. Luwu  
Tanggal penelitian : 10 Juli 2023 s/d 10 Agustus 2023

Bahwa benar telah melaksanakan Penelitian di Puskesmas Suli Kab. Luwu. Demikian Surat ini  
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suli, 16 Agustus 2023  
Kepala UPTD Puskesmas Suli



**SYAHRIR, S.Kep. Ns**  
Nip. 19721220 199203 1 001

Lampiran 6: Tabel Master

Nama	Status	Umur	JK	Pendidikan	Pekerjaan	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
JH	Sembuh	29	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
MS	Sembuh	30	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
BS	Sembuh	31	LAKI-LAKI	SD	Bekerja	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
MT	Sembuh	3	Perempuan	Belum Sekolah	Tidak Bekerja	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
MM	Sembuh	9	LAKI-LAKI	SD	Bekerja	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
UH	Sembuh	20	Perempuan	Perguruan Tinggi	Bekerja	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
RA	Sembuh	3	LAKI-LAKI	Belum Sekolah	Tidak Bekerja	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
AA	Sembuh	8	Perempuan	SD	Bekerja	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
NQL	Sembuh	4	Perempuan	Belum Sekolah	Tidak Bekerja	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
HF	Sembuh	8	LAKI-LAKI	SD	Bekerja	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0
AR	Sembuh	10	Perempuan	SD	Bekerja	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
PA	Sembuh	11	LAKI-LAKI	SD	Bekerja	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
AN	Sembuh	17	Perempuan	SMA	Bekerja	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
MY	Sembuh	6	LAKI-LAKI	Belum Sekolah	Tidak Bekerja	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
MR	Sembuh	65	LAKI-LAKI	Perguruan Tinggi	Bekerja	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
SA	Sembuh	40	LAKI-LAKI	Perguruan Tinggi	Bekerja	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Q	Sembuh	8	Perempuan	SD	Bekerja	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
MNQ	Sembuh	14	LAKI-LAKI	SMA	Bekerja	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
PI	Sembuh	17	Perempuan	SMA	Bekerja	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
AYA	Sembuh	11	Perempuan	SD	Bekerja	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
JKS	Sembuh	32	LAKI-LAKI	SMA	Bekerja	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
MR	Sembuh	2	LAKI-LAKI	Belum Sekolah	Tidak Bekerja	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
NRB	Sembuh	27	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0
AS	Meninggal														
ARK	Meninggal														

M A K A S S A R



Lampiran 7: Output SPSS

**Status**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Meninggal	2	8.0	8.0	8.0
	Sembuh	23	92.0	92.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

**Umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-4 tahun	4	17.4	17.4	17.4
	5-14 tahun	9	39.1	39.1	56.5
	15-44 tahun	9	39.1	39.1	95.7
	>44 tahun	1	4.3	4.3	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

**Jenis\_kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	11	47.8	47.8	47.8
	Perempuan	12	52.2	52.2	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

**Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum sekolah	5	21.7	21.7	21.7
	Belum Tamat SD	6	26.1	26.1	47.8
	SD	3	13.0	13.0	60.9
	SMP/Sederajat	2	8.7	8.7	69.6
	SMA/Sederajat	5	21.7	21.7	91.3
	Perguruan tinggi	2	8.7	8.7	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

**Pekerjaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	2	9.1	9.1	9.1
	Mahasiswa/Pelajar	11	50	4.5	13.6
	PETANI	2	9.1	9.1	68.2
	PNS	1	4.5	4.5	72.7
	Tidak Bekerja	6	22.7	22.7	95.5
	Wiraswasta	1	4.5	4.5	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

## B\_Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	10	43.5	43.5	43.5
	Baik	13	56.5	56.5	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

### Soal1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Benar	23	100.0	100.0	100.0

### Soal2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	19	82.6	82.6	82.6
	Benar	4	17.4	17.4	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

### Soal3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	13	56.5	56.5	56.5
	Benar	10	43.5	43.5	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

### Soal4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	14	60.9	60.9	60.9
	Benar	9	39.1	39.1	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

### Soal5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	17	73.9	73.9	73.9
	Benar	6	26.1	26.1	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

**Soal6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	13	56.5	56.5	56.5
	Benar	10	43.5	43.5	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

**Soal7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	11	47.8	47.8	47.8
	Benar	12	52.2	52.2	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

**Soal8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	15	65.2	65.2	65.2
	Benar	8	34.8	34.8	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

**Soal9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	16	69.6	69.6	69.6
	Benar	7	30.4	30.4	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

**Soal10**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	23	100.0	100.0	100.0

**C2\_Menutup\_tempat\_penampungan\_air**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	17	73.9	73.9	73.9

### C3\_Mengubur\_atau\_mendaur\_ulang\_barabg\_bekas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	9	39.1	39.1	39.1
	Ya	14	60.9	60.9	100.0
	Total	23	100.0	100.0	
		23	100.0	100.0	
	Ya	6	26.1	26.1	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

### C4\_Memperbaiki\_saluran\_dan\_talang\_air

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	23	100.0	100.0	100.0

### C5\_Penggunaan\_obat\_anti\_nyamuk

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	3	13.0	13.0	13.0
	Ya	20	87.0	87.0	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

### C6\_Menabur\_bubuk\_abate

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	16	69.6	69.6	69.6
	Ya	7	30.4	30.4	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

### C7\_Memelihara\_ikan\_pemakan\_jentik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	22	95.7	95.7	95.7
	Ya	1	4.3	4.3	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

### C8\_Memasang\_kawat\_kasa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	15	65.2	65.2	65.2
	Ya	8	34.8	34.8	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

### C9\_Menggantung\_pakaian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	8	34.8	34.8	34.8
	Ya	15	65.2	65.2	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

### C10\_Menanam\_tanaman\_pengusir\_nyamuk

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	18	78.3	78.3	78.3
	Ya	5	21.7	21.7	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

### C11\_Melakukan\_gotong\_royong

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	6	26.1	26.1	26.1
	Ya	17	73.9	73.9	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

Lampiran 8: Titik Koordinat Rumah

Nama Responden	X	Y
R1	208321	9615271
R2	208006	9622238
R3	207409	9617255
R4	208383	9621214
R5	207008	9620663
R6	210745	9620149
R7	210986	9620000
R8	210924	9619926
R9	210921	9619892
R10	210956	9620001
R11	210977	9619999
R12	210910	9620002
R13	210910	9620002
R14	210895	9619979
R15	210921	9619892
R16	210912	9619905
R17	210912	9619905
R18	210933	9619956
R19	210860	9619828
R20	210906	9619868
R21	210935	9619824
R22	210925	9619904
R23	210084	9620237
R24	209190	9620453
R25	209896	9617669

Lampiran 9: Dekomentasi Kegiatan



Pengambilan Data Awal dan Survei Lokasi Penelitian



Pengisian Kuesioner



Pengambilan Titik Koordinat Rumah Menggunakan GPS dan Observasi TPA

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Apriani Wardhana Nur**, lahir di Larompong pada tanggal 27 April 2001, merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Anak kesayangan dari pasangan bapak (Alm) Abd. Salim Sabbe dan Ibu Nur Anting S.Pd. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 227 Larompong tahun 2007-2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Islam Nur-El-haq pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2016-2019 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi melalui jalur UM-PTKIN di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Kesehatan Masyarakat konsentrasi Epidemiologi pada tahun 2019-2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R