

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DETEKSI DINI KANKER
SERVIKS METODE *CERVISCAN* PADA PEKERJA WANITA
DI PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS TAHUN 2023**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

ALYA NURSAKINAH
70200119052

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alya Nursakinah
NIM : 70200119052
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 13 September 2000
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Btn Pao-Pao Permai, E1/6
Judul : Faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode CerviScan pada Pekerja Wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 30 September 2024
Penyusun



Alya Nursakinah
NIM : 70200119052

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023" yang disusun oleh Alya Nursakinah, NIM : 70200119052, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 03 Juli 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 23 September 2024

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati Muchsin, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, S.KM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Habibi, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rappe, S.Ag, M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Azriful, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Lilis Widiastuty, SKM., MKL	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati Muchsin, Sp. OG., M. Kes

NIM: 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang merupakan suri tauladan pembawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Aamiin.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul "**Faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023**" ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Terima Kasih atas rahmat dan karuniannya Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menjalani hidup dengan sebaik-baiknya dan selalu memberikan kesabaran dalam menghadapi semuanya.

Secara khusus penghargaan yang setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda tercinta Toto Sapturi, SE dan Ibunda tercinta Sukmawati yang selalu ada tanpa henti memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian, nasehat serta selalu memanjatkan doa disetiap langkah adinda. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara kandung saya Muh. Aqib Shaukany dan Adly

Baihaqi. Tak lupa juga penulis ingin berterimakasih kepada kakek, nenek serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat selama masa perkuliahan. Terima kasih doa dan dukungan selama ini tak pernah henti, tanpa dorongan berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I dalam hal ini Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag, Wakil Rektor II dalam hal ini Dr. H. Andi Andi Aderus, Lc., M.A, Wakil Rektor III dalam hal ini Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd, dan Wakil Rektor IV dalam hal ini Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Dr. Isriani Ismail, S.Si., Apt, M.Si selaku Wakil Dekan I, Dr. H.M. Fais Satrianegara, SKM., MARS selaku Wakil Dekan II, serta Dr. Patimah, S.Kep., Ns, M.Kes selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Abd. Majid Hr. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Dr. BS Titi Haerana, SKM., M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Emmi Bujawati, SKM., M.Kes selaku Pembimbing Akademik penulis.
5. Dr. Azriful, SKM., M.Kes selaku pembimbing I dan Ibu Lilis Widiastuty, SKM., MKL selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan,

saran serta arahan, waktu dan pikiran selama proses penelitian hingga dalam penyusunan hasil penelitian ini selesai.

6. Dr. Habibi, SKM.,M.Kes selaku penguji I dan Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd.I selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran serta arahan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah banyak memberikan bimbingan serta pengajaran yang sangat bermanfaat selama dibangku perkuliahan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi beserta staff telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Terima kasih kepada PT. Eastern Pearl Flour Mills yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian berlangsung.
10. Terima kasih kepada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
11. Teman-teman yang ikut membantu dalam proses penulisan skripsi terutama kepada Tim penelitian saya Afiah Alfina dan Windasari Putri, serta teman-teman yang lain : Rhosika Amaliah Rauf dan Alma Hapsari. Penulis ucapkan terima kasih atas kekompakan dan kerjasamanya selama masa kuliah ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) angkatan 2019, penulis ucapkan terima kasih atas kekompakan dan kerjasamanya selama masa kuliah ini.
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya yang banyak memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

14. Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang hingga berada pada titik ini, *proud of you* Alya.

Akhir kata, Semoga segala bentuk perhatian, kebaikan hati dan bantuan dari semua pihak mendapatkan balasan pahala dan rezeki dari Allah SWT. Peneliti juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh Pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Peneliti menyadari kesempurnaan suatu karya tulis ilmiah tidak semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan, saran kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu pengetahuan. Jangan berharap kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa-Samata, 03 Juli 2024
Peneliti



Alya Nursakinah
NIM : 70200119052

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Hipotesis.....	8
D. Definisi Operasional (DO) dan Kriteria Objektif (KO).....	12
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	21
G. Perbedaan Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan tentang Kanker Serviks.....	25
B. Tinjauan tentang Pencegahan Kanker Serviks.....	44
C. Tinjauan tentang Penggunaan APD.....	46
D. Tinjauan tentang Deteksi Dini.....	49
E. Tinjauan tentang Pemeriksaan Metode <i>CerviScan</i>	52
F. Tinjauan tentang Pekerja Wanita.....	56
G. Tinjauan tentang Pembuatan Tepung Terigu.....	57
H. Kerangka Teori.....	59
I. Kerangka Konsep.....	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	61

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	61
C. Populasi Penelitian.....	61
D. Sampel Penelitian.....	61
E. Jenis dan Sumber Data.....	62
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Instrumen Penelitian.....	63
H. Alur Penelitian	63
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
B. Hasil Analisis Univariat dan Bivariat.....	70
C. Pembahasan.....	99
D. Keterbatasan Penelitian	134
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN.....	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Sintesa	16
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Agama, Suku, Pendidikan Terakhir, Masa kerja, Unit Kerja, dan Status Pernikahan.....	70
Tabel 4.2	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Usia.....	72
Tabel 4.3	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	73
Tabel 4.4	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Suku	73
Tabel 4.5	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Agama	74
Tabel 4.6	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Status Pernikahan.....	74
Tabel 4.7	Faktor Reproduksi Responden Berdasarkan Usia Responden, Usia Pertamakali Menikah, Jumlah Paritas, Jumlah Anak, Riwayat Abortus, Riwayat Penyakit IMS, Vaksinasi HPV dan Hasil Pemeriksaan <i>CerviScan</i>	75
Tabel 4.8	Distribusi Berdasarkan Riwayat Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS).....	77
Tabel 4.9	Distribusi Berdasarkan Riwayat Keluarga yang Pernah Terkena Kanker Serviks.....	77
Tabel 4.10	Distribusi Berdasarkan Penggunaan Vaksinasi HPV	78
Tabel 4.11	Distribusi Berdasarkan Penggunaan Pembalut Menstruasi.....	78
Tabel 4.12	Distribusi Berdasarkan Penggunaan Pembersih Kewanitaan.....	79
Tabel 4.13	Distribusi Berdasarkan Usia Pertamakali Menikah	79
Tabel 4.14	Distribusi Berdasarkan Pemakaian Alat Kontrasepsi.....	80
Tabel 4.15	Distribusi Berdasarkan Jumlah Kehamilan (Paritas)	80
Tabel 4.16	Distribusi Berdasarkan Jumlah Anak	81
Tabel 4.17	Distribusi Berdasarkan Riwayat Abortus.....	81
Tabel 4.18	Distribusi Berdasarkan Unit Kerja	82
Tabel 4.19	Distribusi Berdasarkan Masa Kerja.....	82

Tabel 4.20 Distribusi Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Metode CerviScan.....	83
Tabel 4.21 Hubungan Usia dengan Deteksi Dini Kanker Serviks	84
Tabel 4.22 Hubungan Pendidikan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks.....	85
Tabel 4.23 Hubungan Status Pernikahan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks	86
Tabel 4.24 Hubungan Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks.....	87
Tabel 4.25 Riwayat Keluarga yang Pernah Terkena Kanker Serviks dengan Deteksi Dini Kanker Serviks	88
Tabel 4.26 Hubungan Vaksinasi HPV dengan Deteksi Dini Kanker Serviks.	89
Tabel 4.27 Hubungan Penggunaan Pembalut saat Menstruasi dengan Deteksi Dini Kanker Serviks	90
Tabel 4.28 Hubungan Penggunaan Pembersih Kewanitaan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks.....	91
Tabel 4.29 Hubungan Usia saat Pertamkali Menikah dengan Deteksi Dini Kanker Serviks	92
Tabel 4.30 Hubungan Pemakaian Alat Kontrasepsi dengan Deteksi Dini Kanker Serviks	93
Tabel 4.31 Hubungan Jumlah Kehamilan (Paritas) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks	94
Tabel 4.32 Hubungan Jumlah Anak dengan Deteksi Dini Kanker Serviks .	95
Tabel 4.33 Hubungan Riwayat Abortus (Keguguran) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks	96
Tabel 4.34 Hubungan Unit Kerja dengan Deteksi Dini Kanker Serviks	97
Tabel 4.35 Hubungan Masa Kerja dengan Deteksi Dini Kanker Serviks	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>CerviScan HPV-hr qPCR</i>	54
Gambar 2.2 Kerangka Teori.....	59
Gambar 2.3 Kerangka Konsep	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Informed Consent</i>
Lampiran 2	Kuesioner Penelitian
Lampiran 3	Master Tabel
Lampiran 4	Surat Keterangan Layak Etik (<i>Ethical Clearance</i>)
Lampiran 5	Surat Rekomendasi Izin Penelitian untuk PTSP Provinsi Sulawesi
Lampiran 6	Surat Persetujuan Izin Penelitian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan
Lampiran 7	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 8	Hasil Analisis Univariat dan Bivariat
Lampiran 9	Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

Nama : Alya Nursakinah

NIM : 70200119052

Judul : Faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Kanker serviks adalah pertumbuhan, perkembangan sel abnormal yang mengakibatkan kelainan fungsi organ reproduksi khususnya serviks, disebabkan oleh virus HPV (*Human Papilloma Virus*). Kesadaran masyarakat khususnya pekerja wanita untuk deteksi dini sangat rendah, selain itu masyarakat merasa pemeriksaan kanker serviks dianggap masih tabu, wanita merasa malu untuk melakukan pemeriksaan. Tingginya angka kematian disebabkan karena terlambatnya deteksi dini.

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang berhubungan dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional study*, jumlah sampel 32 pekerja wanita. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 4 pekerja wanita (12.5%) yang hasil pemeriksaan positif kanker serviks metode *CerviScan* dan 28 pekerja wanita (87,5%) yang hasil pemeriksaan negatif menggunakan metode *CerviScan*. Faktor yang berhubungan dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita yaitu usia (*p-value* 0.028), riwayat IMS (*p-value* 0.012), riwayat keluarga terkena kanker serviks (*p-value* 0.012), penggunaan pembalut (*p-value* 0.006), penggunaan pembersih kewanitaan (*p-value* 0.009), usia pertamakali menikah (*p-value* 0.047), Pemakaian alat kontrasepsi (*p-value* 0.003), Jumlah kehamilan (paritas) (*p-value* 0.025), Jumlah anak (*p-value* 0.002), Riwayat abortus (*p-value* 0.025) dan unit kerja (*p-value* 0.028). Sedangkan yang tidak berhubungan dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pekerja wanita yaitu pendidikan (*p-value* 0.566), status pernikahan (*p-value* 0.104), vaksinasi HPV (*p-value* 1.000), dan masa kerja (*p-value* 0.271).

Saran pada penelitian ini yaitu diharapkan pihak manajemen perusahaan mengadakan program pemeriksaan kesehatan terkait pentingnya deteksi dini kanker serviks dan pemberian Vaksin HPV (*Human Papilloma Virus*) untuk mencegah infeksi HPV khususnya pada pekerja wanita.

Kata kunci : Pekerja wanita, Deteksi Dini Kanker Serviks, Metode *CerviScan*.

ABSTRACT

Name : Alya Nursainah

NIM : 70200119052

Title : *Factors Associated with Early Detection of Cervical Cancer with the CerviScan Method in Female Workers at PT. Eastern Pearl Flour Mills in 2023*

Cervical cancer is the growth and development of abnormal cells that result in organ function abnormalities, especially the reproductive organs, especially the cervix, caused by the HPV virus (Human Papilloma Virus). Public awareness, especially among female workers, regarding early detection is very low, apart from that, people feel that cervical cancer examination is still considered taboo, women feel embarrassed to undergo examination. The high death rate is caused by late early detection.

This study aims to determine the factors associated with early detection of cervical cancer using the CerviScan method in female PT workers. Eastern Pearl Flour Mills. This research uses a quantitative type of research with a cross sectional study design, the sample size is 32 female workers. Data collection was carried out using a research questionnaire.

Based on the research results, it was found that there were 4 female workers (12.5%) whose examination results were positive for cervical cancer using the CerviScan method and 28 female workers (87.5%) whose examination results were negative using the CerviScan method. Factors associated with early detection of cervical cancer in female workers are age (p-value 0.028), history of sexually transmitted infections (STIs) (p-value 0.012), family history of cervical cancer (p-value 0.012), use of sanitary napkins (p-value 0.006), use of feminine hygiene (p-value 0.009), age at first marriage (p-value 0.047), use of contraceptives (p-value 0.003), number of pregnancies (parity) (p-value 0.025), number of children (p-value 0.002), history of abortion (p-value 0.025) and work unit (p-value 0.028). Meanwhile, those that are not related to early detection of cervical cancer using the CerviScan method for female workers are education (p-value 0.566), marital status (p-value 0.104), HPV vaccination (p-value 1.000), and length of service (p-value 0.271).

The suggestion in this research is that company management is expected to hold a health check program related to the importance of early detection of cervical cancer and administering the HPV (Human Papilloma Virus) Vaccine to prevent HPV infection, especially in female workers.

Keywords : *Workwoman, Early Detection of Cervical Cancer, CerviScan Method.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit yang terjadi saat ini telah mengalami transisi epidemiologi yang ditandai dengan munculnya secara bertahap penyebab kematian yang awalnya disebabkan oleh penyakit menular beralih ke penyakit tidak menular, diantaranya kanker. Salah satu penyakit umum yang sering menyerang wanita disebut kanker serviks. Kesehatan reproduksi mengacu pada kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang terlepas dari penyakit atau trauma dalam segala aspek kehidupan berkaitan dengan sistem reproduksi, termasuk fungsi dan prosesnya. Salah satu kondisi yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan organ reproduksi wanita adalah kanker serviks yang merupakan jenis kanker kulit di seluruh dunia (WHO, 2022).

Kanker Serviks adalah pertumbuhan dan penipisan sel yang menyebabkan tidak berfungsinya organ, terutama organ reproduksi yaitu pada serviks. Jenis kanker ini biasanya menyerang wanita berusia 30 tahun hingga 50 tahun, yang merupakan wanita paling produktif. Jenis kanker yang paling umum berkembang pada wanita setelah kanker payudara, kolorektal, dan kanker paru-paru disebut kanker serviks. Istilah “kanker serviks” mengacu pada jenis kanker yang berkembang di leher rahim vagina wanita. Hampir seluruh kasus kanker serviks (99%) yang dikaitkan dengan WHO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa perkiraan kejadian kasus kanker serviks adalah 604.000 kasus baru dan 342.000 kasus kematian sepanjang tahun 2020 (WHO, 2020).

Salah satu indikator utama kesehatan global, termasuk di Indonesia, adalah kesehatan wanita. Masalah kesehatan wanita masih menjadi perhatian pemerintah dan para ahli kesehatan karena meningkatnya angka kematian

wanita. Kanker serviks merupakan penyebab utama angka kematian perempuan. Data International Agency for Research on Cancer (IARC) pada tahun 2020 menunjukkan lebih dari 340.000 wanita meninggal akibat penyakit ini, sementara lebih dari 600.000 wanita di seluruh dunia terdiagnosis kanker serviks. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nam Hoang Dang Phan dkk tahun 2020, terdapat sekitar 315.346 kasus baru di Asia dan sekitar 168.411 kasus kematian. Sebagai contoh, Asia Tenggara menduduki peringkat ketiga, dengan total 62.456 kasus baru dan 35.738 kasus kematian. Di negara Asia Tenggara, lima besar dengan insiden tertinggi adalah Indonesia dengan 32.469 kasus, Thailand dengan 8.622 kasus, Filipina dengan 7.190 kasus, Myanmar 6.472 kasus dan Vietnam 4.177 kasus. Pada tahun 2020, Asia Tenggara menduduki peringkat ketujuh pada kejadian kanker serviks dan keenam untuk kematian dibanding negara lain di dunia.

Menurut data Statistik Kanker Serviks di Indonesia, jumlah kasus penyakit kanker pada wanita setelah kanker payudara dengan total 36.633 kasus, 89 wanita Indonesia dilaporkan mengidap kanker serviks setiap harinya, dengan rata-rata 21,003 wanita meninggal. 57 wanita di Indonesia kehilangan nyawa akibat kanker serviks setiap hari. Namun tingkat skrining sebesar 1,77% terjadi pada wanita usia subur (Profil Kesehatan Indonesia Kemenkes, 2021).

Menurut data Infodatin Kanker (2019), angka kejadian kanker serviks mencapai sekitar 19,12% dari seluruh kasus kanker wanita di Indonesia. Terdapat 21.000 kejadian kanker serviks di Indonesia setiap tahunnya. Kurangnya deteksi dini kanker serviks di Indonesia menjadi penyebab tingginya angka kejadian penyakit. Selain itu, 15.000 kasus baru kanker serviks dan angka kematian tahunan 7.500 kasus/tahun, berarti 52 juta

wanita Indonesia berisiko terkena kanker serviks. Sementara itu, 36% wanita yang menderita kanker yaitu penderita kanker serviks (Infodatin Kanker, 2019).

Di Provinsi Sulawesi Selatan, angka cakupan deteksi dini kanker serviks pada tahun 2018 hingga 2020 secara regional hanya sebesar 3,4%. Dengan cakupan deteksi dini terendah di Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan kini berada di peringkat ke-10 (Kementerian Kesehatan RI, 2015b). Di Sulawesi Selatan, persentase wanita usia 30 hingga 50 tahun yang mendapat diagnosis dini kanker serviks pada tahun 2019 sebanyak 104.360 (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020). Tahun berikutnya, terjadi penurunan tajam dalam cakupan ini. Pada tahun 2020, cakupan deteksi dini di Sulawesi Selatan hanya 21.484 wanita atau sekitar 0,85% (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021b).

Berdasarkan data awal, angka kejadian kanker serviks pada tahun 2019 sebanyak 75 orang, tahun 2020 sebanyak 17 orang, dan tahun 2021 sebanyak 53 orang berdasarkan data rekam medis Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. Wilayah Makassar, Gowa, Wajo, Bone, dan Luwu Utara memiliki konsentrasi penderita kanker payudara dan kanker serviks tertinggi pada tahun 2010. Terdapat 38 kematian terkait kanker serviks dan 429 kasus baru penyakit tersebut. Sementara itu, RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar menemukan 307 orang menderita kanker serviks pada tahun 2021. Berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Kota Makassar, terdapat 47 kasus kanker serviks di Makassar pada tahun 2020, terdiri dari 44 kasus baru dan 3 kasus meninggal dunia (Dinkes, 2020).

Seringkali, kanker serviks diketahui ketika sudah berkembang, padahal deteksi dini meningkatkan kemungkinan kesembuhan, sebuah proses yang

disebut tindakan *Preventif* (pencegahan). Deteksi dini dapat membantu menghindari kanker serviks. Pengobatan dapat dimulai lebih awal agar penyakit tidak bertambah parah. Kasus kanker serviks dimasa depan dapat dihindari jika lesi displastik ditemukan sejak dini dan segera diobati. Program skrining yang terkoordinasi untuk wanita, penciptaan sistem rujukan yang kuat di setiap tahap pemberian layanan kesehatan, dan pendidikan bagi profesional kesehatan dan perempuan usia subur semuanya diperlukan untuk identifikasi dini kanker serviks (Imelda & Santosa, 2020).

Upaya skrining dan pencegahan sangatlah penting. Di Indonesia, hampir 5% wanita melakukan pemeriksaan kanker serviks secara rutin. Karena kurangnya pengetahuan tentang skrining kanker serviks, sebagian besar wanita Indonesia tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit tersebut, dan setiap wanita di negara ini meninggal karena penyakit tersebut setiap jamnya (Sujiwati, 2019). Masyarakat beranggapan bahwa deteksi dini kanker serviks masih merupakan hal yang tabu dan wanita masih merasa malu untuk memeriksakan kesehatannya. Pengetahuan masyarakat juga dirasakan masih kurang mengenai pentingnya memeriksakan diri sejak dini. Saat penderita kanker serviks mengunjungi rumah sakit, 70% diantaranya sudah menderita penyakit pada stadium lanjut. Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menunjukkan bahwa sekitar 69,4% wanita yang terdiagnosis kanker belum pernah melakukan deteksi dini, berdasarkan fakta bahwa lebih dari 50% wanita tersebut belum pernah melakukan deteksi dini sebelumnya (Imelda & Santosa, 2020).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan wanita berusia diatas 30 tahun untuk melakukan tes HPV setiap 5–10 tahun sekali dan wanita yang mengidap HIV agar memiliki akses tes HPV setiap 3–5 tahun sekali. Setiap

tiga tahun sekali, Pap smear disarankan wanita berusia antara 25 dan 65 tahun. Sangat disarankan untuk tidak melakukan aktivitas seksual yaitu dua hari sebelum pemeriksaan pap smear, dan menunggu hingga lima hari setelah akhir siklus menstruasi (*American Cancer Society, 2022*).

Di era globalisasi saat ini, banyak perempuan yang menduduki peran sebagai pekerja selain laki-laki. Mengingat sebagian besar perempuan Indonesia adalah pekerja kantor, perusahaan, dan industri, maka masuk akal jika semakin banyak perempuan yang menderita penyakit terkait pekerjaan mereka (Pratiwi & Betria, 2021). Oleh karena itu, perusahaan farmasi Bio Farma menciptakan instrumen terbaru untuk membantu deteksi dini kanker serviks. CerviScan adalah nama perangkat yang dimaksudkan untuk membuat pemeriksaan wanita lebih nyaman. CerviScan adalah teknik skrining kanker serviks dini yang melibatkan pengumpulan urin dan menganalisisnya di laboratorium menggunakan instrumen PCR. Tujuan tes tersebut adalah untuk menemukan DNA HPV guna meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker serviks.

Alat ini bekerja dengan mendeteksi virus melalui sampel urine. Penggunaan sampel urine untuk melihat kehadiran *HPV DNA* adalah metode skrining yang paling akurat. Adapun perangkat diagnosis berbasis *ePCR* ini dapat melakukan deteksi terhadap 14 jenis HPV yang berisiko tinggi menjadi penyebab kanker leher rahim. Metode *CerviScan* untuk deteksi dini kanker serviks merupakan diagnostik kit berbasis *PCR* untuk deteksi dini terhadap *Human Papillomavirus (HPV)* yang merupakan penyebab kanker serviks dan metode ini efektif dalam deteksi dini (Andrijono, 2023).

Kota Makassar mempekerjakan banyak orang dan memiliki lahan industri yang cukup luas. Terletak di Jalan Nusantara Baru N.36 Makassar,

PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar adalah salah satu produsen tepung terigu terbesar di kota ini. Ada empat merk tepung terigu yang tergabung dalam PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar adalah Gunung, Kompas, Gerbang dan Gatotkaca. Dengan kapasitas penggilingan gandum harian sebesar 2800 ton, PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar adalah perusahaan pengelola gandum yang menciptakan tepung industri berkualitas tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi pekerja dalam proses produksi tidak lepas dari kualitas hasil.

Pekerja mempunyai hak atas pelayanan kesehatan, khususnya pekerja perempuan pada industri yang mempekerjakan orang. Selain itu, telah diketahui bahwa bahan kimia karsinogenik, seperti kalium bromat, dimasukkan pada tahap kerja akhir (pengepakan) dalam pembuatan tepung terigu. Kalium bromat diklasifikasikan sebagai karsinogen kategori 2B dan dilarang di sebagian besar negara maju karena sifat pengoksidasi kuat yang menyebabkan kerusakan sel. Menurut penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Arifin Achmad di provinsi Riau pada tahun 2020, mereka yang berusia 43 tahun keatas memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker serviks karena sistem kekebalan tubuh mereka yang lemah dan paparan karsinogen dalam waktu lama. Paparan seseorang terhadap karsinogen, atau zat penyebab kanker, meningkat seiring bertambahnya usia. Selain itu, sistem kekebalan tubuh seseorang menurun seiring bertambahnya usia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan penyebaran virus penyebab kanker serviks dalam tubuh (LISMANIAR et al., 2021).

Yayasan Kanker Indonesia (YKI) menyatakan bahwa faktor lingkungan yang terus menghasilkan bahan karsinogenik, seperti rokok, daging olahan, dan lainnya, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kasus kanker. Dan

juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kebiasaan makan yang berlebihan, kurang aktif, dan kebiasaan begadang larut malam. Suatu bahan kimia dianggap karsinogenik jika diketahui dapat mempercepat perkembangan sel kanker dalam tubuh, terutama bila tertelan atau terpapar secara berlebihan. Karsinogen ini dapat ditemukan pada bahan kimia yang ada pada lingkungan sekitar, radiasi lingkungan (seperti dari cahaya matahari), radiasi dari peralatan medis, virus, obat-obatan dan gaya hidup. Kerentanan tiap orang yang terpapar karsinogen dalam menyebabkan kanker juga tergantung dari faktor keturunan. Faktor keturunan memainkan peranan penting sebagai penyebab kanker. Selain itu, gaya hidup pekerja wanita yang sibuk, jarang makan di rumah, dan sering makan sembarangan juga memperbesar risiko mereka terkena kanker rahim (Suri, 2017).

Demi menjaga kesehatan para pekerja, karena mencegah itu lebih baik dari pada mengobati, maka selain alat perlindungan diri (APD) yang diberikan pada pekerja saat sedang bekerja juga diperlukan pemeriksaan kesehatan (deteksi dini). Hal ini perlu dilakukan untuk menilai apakah zat-zat kimia yang digunakan pekerja wanita pada pekerjaannya berisiko menyebabkan penyakit kanker serviks, sehingga kejadian penyakit kerja pada pekerja wanita dapat dihindari. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode *CerviScan* Pada Pekerja Wanita Di PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apa saja faktor yang berhubungan dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills ?”

C. Hipotesis

Hipotesis menggambarkan jawaban sementara dari rumusan masalah seperti yang diartikulasikan dalam pertanyaan penelitian. Dianggap sementaradikarenakan jawaban yang berikan masih bergantung pada teori yang relevan atau berdasarkan fakta empiris dari data yang dikumpulkan.

1. Hipotesis Nol (H0)

- a. Tidak terdapat hubungan antara Usia dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- b. Tidak terdapat hubungan antara Pendidikan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- c. Tidak terdapat hubungan antara Status Pernikahan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- d. Tidak terdapat hubungan antara Masa Kerja dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- e. Tidak terdapat hubungan antara Unit Kerja dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- f. Tidak terdapat hubungan antara Riwayat Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- g. Tidak terdapat hubungan antara Riwayat Keluarga yang pernah Terkena Kanker Serviks dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- h. Tidak terdapat hubungan antara Vaksinasi HPV dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- i. Tidak terdapat hubungan antara Penggunaan Pembalut Saat Menstruasi dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- j. Tidak terdapat hubungan antara Penggunaan Pembersih Kewanitaan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- k. Tidak terdapat hubungan antara Usia Saat Pertamakali Menikah dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- l. Tidak terdapat hubungan antara Pemakaian Alat Kontrasepsi dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- m. Tidak terdapat hubungan antara Jumlah Kehamilan (Paritas) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- n. Tidak terdapat hubungan antara Jumlah Anak dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- o. Tidak terdapat hubungan antara Riwayat Abortus dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Terdapat hubungan antara Usia dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- b. Terdapat hubungan antara pendidikan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- c. Terdapat hubungan antara Status Pernikahan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- d. Terdapat hubungan antara Masa Kerja dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- e. Terdapat hubungan antara Unit Kerja dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- f. Terdapat hubungan antara Riwayat Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- g. Terdapat hubungan antara Riwayat Keluarga yang pernah Terkena Kanker Serviks dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- h. Terdapat hubungan antara Vaksinasi HPV dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- i. Terdapat hubungan antara Penggunaan Pembalut Saat Menstruasi dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- j. Terdapat hubungan antara Penggunaan Pembersih Kewanitaan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- k. Terdapat hubungan antara Usia Saat Pertamakali Menikah dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- l. Terdapat hubungan antara Pemakaian Alat Kontrasepsi dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- m. Terdapat hubungan antara Jumlah Kehamilan (Paritas) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- n. Terdapat hubungan antara Jumlah Anak dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- o. Terdapat hubungan antara Riwayat Abortus dengan Deteksi Dini Kanker Serviks metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.

D. Definisi Operasional (D0) dan Kriteria Objektif (KO)

1. Karakteristik Individu Pekerja

Karakteristik pekerja dalam penelitian ini yaitu :

a. Usia

Usia adalah jumlah tahun yang dihitung sejak lahir sampai diadakan penelitian (Depkes, 2009).

Kriteria Objektif :

- 1) Tua : jika tenaga kerja berusia > 35 tahun.
- 2) Muda : jika tenaga kerja berusia ≤ 35 tahun.

b. Pendidikan Terakhir

Pendidikan adalah Pendidikan formal yang ditempuh responden sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Kriteria Objektif :

- 1) Tingkat Pendidikan Menengah : Tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan .
- 2) Tingkat Pendidikan Tinggi : Tamat Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor.

c. Status Pernikahan

Pernyataan responden mengenai status perkawinannya baik secara hukum maupun agama.

Kriteria Objektif :

- 1) Belum Menikah
- 2) Sudah Menikah

2. Faktor Reproduksi Wanita & Kehamilan

a. Riwayat Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)

Riwayat Pekerja wanita yang pernah mengalami infeksi menular seksual (Riksani, 2016).

Kriteria Objektif:

- 1) Ada riwayat infeksi menular seksual (IMS).
- 2) Tidak ada riwayat infeksi menular seksual (IMS).

b. Riwayat Keluarga yang Pernah Terkena Kanker Serviks

Riwayat keluarga yang pernah terkena kanker serviks, Misalnya ibu kandung dan saudara kandung (Imelda & Santosa, 2020).

Kriteria Objektif:

- 1) Ada keluarga yang mempunyai riwayat kanker serviks (Ibu Kandung/Saudara Kandung).
- 2) Tidak ada riwayat keluarga yang pernah terkena kanker serviks.

c. Vaksinasi HPV

Vaksin HPV (*Human Papilloma Virus*) untuk mencegah infeksi HPV dan pengendalian faktor risiko (Ramadhaningtyas & Besral, 2020).

Kriteria Objektif:

- 1) Sudah pernah pernah melakukan vaksinasi HPV.
- 2) Belum pernah melakukan vaksinasi HPV.

d. Penggunaan Pembalut saat Menstruasi

Mengganti Pembalut dalam waktu satu hari pada responden saat sedang Menstruasi (WHO, 2020).

Kriteria Objektif:

- 1) Jika mengganti pembalut dalam waktu satu hari > 5 Jam.
- 2) Jika mengganti pembalut dalam waktu satu hari ≤ 5 Jam.

e. Penggunaan Pembersih Kewanitaan

Menggunakan pembersih kewanitaan untuk merawat serta membersihkan alat kelamin(WHO, 2020).

Kriteria Objektif:

- 1) Ya: jika menggunakan pembersih kewanitaan untuk mencuci alat kelamin.
- 2) Tidak: jika tidak menggunakan pembersih kewanitaan untuk mencuci alat kelamin.

f. Usia saat pertamakali Menikah

Usia responden saat pertamakali Menikah (Mayanda, 2019).

Kriteria Objektif:

- 1) Jika Usia saat pertamakali Menikah ≤ 20 tahun.
- 2) Jika Usia saat pertamakali Menikah > 20 tahun.

g. Penggunaan Alat Kontrasepsi

Menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah atau menunda kehamilan (WHO,2020).

Kriteria Objektif:

- 1) Ya: jika menggunakan alat kontrasepsi
- 2) Tidak: jika tidak menggunakan alat kontrasepsi

h. Jumlah Kehamilan (Paritas)

Paritas adalah keadaan melahirkan anak baik hidup ataupun mati, tetapi bukan aborsi dan kelahiran kembar hanya dihitung sebagai satu kali paritas (Hidayat et al.,2014).

Kriteria Objektif:

- 1) Jika paritas > 3 kali
- 2) Jika paritas ≤ 3 kali

i. Jumlah Anak

Jumlah Anak adalah total anak yang masih hidup (Yuliani, 2016).

Kriteria Objektif:

- 1) Banyak : Jika anak berjumlah > 2
- 2) Kurang : Jika anak berjumlah ≤ 2

j. Riwayat Abortus (Keguguran)

Riwayat abortus merupakan jumlah keguguran waktu masih dalam kandungan (Shen et al., 2023).

Kriteria Objektif:

- 1) Jika Pernah melakukan abortus ≤ 1 kali
- 2) Jika Tidak Pernah melakukan abortus.

3. Faktor Pekerjaan

a. Masa Kerja

Masa kerja adalah jumlah tahun responden terhitung sejak tanggalmulai bekerja sampai dengan penelitian (Ratnasari & Toyibah, 2018).

Kriteria Objektif:

- 1) Jika tenaga kerja wanita bekerja > 5 tahun.
- 2) Jika tenaga kerja wanita bekerja ≤ 5 tahun.

b. Unit Kerja

Unit Kerja adalah tempat/divisi karyawan melakukan pekerjaannya.

Kriteria Objektif:

- 1) *Packing*
- 2) *Logistic*

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.1
Kajian Pustaka Deteksi Dini Kanker Serviks

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	2022	Fatikhah, Faradia Yuanita Fahmi.	Deteksi Dini Kanker Serviks dan Safari Keluarga Berencana di Eks Kawedanan Boja.	Penyuluhan, Deteksi Dini kanker serviks, Safari KB.	Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Jumlah akseptor 60 orang dengan alat kontrasepsi IUD 16 (26%), Implant 26 (43,3%) dan gagal 3 (8,3%), kegagalan pemasangan alat kontrasepsi ini disebabkan karena adanya radang pada serviks, Peserta pemeriksaan papsmer hasil negatif 14 orang (82,35%) sedangkan hasilnya positif sejumlah 3 orang (17,65%). Penyuluhan dapat meningkatkan pemahaman dan merubah perilaku WUS tentang deteksi dini kanker serviks serta pemasangan Implant dan IUD gratis pada akseptor lewat safari KB.
2.	2022	Nuari Andolina, Fitriani, Yossi Octavia Samosir.	Cegah Kanker Serviks dengan Tes Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).	Kanker Serviks, IVA Test, WUS.	Deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 20 responden (48%) dan untuk minat hanya 10 (10%) orang yang memiliki minat tinggi melakukan pemeriksaan IVA.

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	2021	Purwo Suwignjo, Sri Hayati, Erna Irawan, Delia.	Gambaran Pemeriksaan IVA Test pada wanita Usia Subur (WUS) di salah satu Puskesmas Kota Bandung	Pemeriksaan IVA test, IVA test, WUS	Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i>	Gambaran pemeriksaan IVA test pada WUS Di Puskesmas Kujangsari yang tidak melakukan pemeriksaan IVA sebanyak 65 atau sebagian besar (69,1%), yang melakukan pemeriksaan IVA sebanyak 29 atau hampir separuhnya (30,9%).
4.	2019	Agnes Purba, Eva Hotmaria Simanjuntak, Frida Liharis Saragih.	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim di Kampung KB Desa Percut Sei Tuan.	Deteksi Dini, IVA	Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i>	Kegiatan pemeriksaan IVA dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan kepada 21 orang ibu di Kampung KB Desa Percut Sei Tuan mendapat respon yang positif. Dari hasil pemeriksaan IVA ditemukan ibu yang tidak mengalami keganasan (normal) sebanyak 20 orang (95,2%) dan infeksi sebanyak 1 orang (1,5%).

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	2020	Netti Herawati, Enny Susilawati, Yuli Suryanti, Yasneli.	Faktor Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat.	Deteksi dini; kanker serviks; metode IVA test.	Kuantitatif menggunakan Studi <i>cross-sectional</i> .	Hasilnya, didapatkan 85% responden tidak melakukan IVA test, 67,5% responden memiliki pengetahuan kurang baik, 57,5% responden memiliki sikap kurang baik, 52,5% responden memiliki motivasi tinggi, 56,5% responden memiliki peran petugas baik dan 65% responden memiliki keterpaparan informasi yang baik. Didapatkan pula ada hubungan pemeriksaan skrining kanker serviks dengan pengetahuan, sikap, motivasi, peran petugas dan keterpaparan informasi.
6.	2020	Caroline Lefevre, Adeline Pivert, H�el�ene Le Guillou Guillemette, Fran�oise Lunel-Fabiani, Pascal Veillon, Anne-Sophie Le Duc-Banaszuk, Alexandra Ducancelle	<i>Urinary HPV DNA testing as a tool for cervical cancer screening in women who are reluctant to have a Pap smear in France.</i> (Tes DNA HPV urin sebagai alat skrining kanker serviks pada wanita yang enggan melakukan Pap smear di Prancis).	<i>Cervical cancer screening; HPV DNA detection; High-risk human papillomavirus; Self-sampling; Urine.</i> (skrining kanker serviks; Deteksi DNA HPV; human papillomavirus berisiko tinggi; Pengambilan sampel sendiri; Air seni).	<i>High-risk HPV (HR-HPV) detection was performed using a real-time PCR (Anyplex II HPV 28 Detection.</i> (Deteksi HPV (HR-HPV) risiko tinggi dilakukan menggunakan PCR waktu-nyata (Deteksi HPV 28 Anyplex II)	The participation rate was 15.4%. Out of the 1,915 analyzed specimens, 1,711 and 190 were negative and positive, respectively, for at least 1 HR-HPV genotype. HR-HPV genotypes other than HPV-16 or HPV-18 were mostly detected as HPV-53 (23.7%) and HPV-68 (14.2%). (Tingkat partisipasi adalah 15,4%. Dari 1.915 spesimen yang dianalisis, masing-masing 1.711 dan 190 negatif dan positif, untuk setidaknya 1 genotipe HR-HPV. Genotipe HR-HPV selain HPV-16 atau HPV-18 sebagian besar terdeteksi sebagai HPV-53 (23,7%) dan HPV-68 (14,2%).

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	2021	Richard Tagne imo, Christian amnang chakounte, rmel Hervé wabo amdje, Léonie arthe Ghomsi idje, Paul F. eke Etet, Phélixruno Telefo	<i>Cervical Cancer Awareness and Detection of Precancerous Lesions at Two District Health Centres in the West Region of Cameroon.</i> (Kesadaran Kanker Serviks dan Deteksi Lesi Prakanker di Dua Pusat Kesehatan Distrik di Wilayah Barat Kamerun).	<i>Awareness, cervical cancer, screening precancerous lesions.</i> (Kesadaran, skrining kanker serviks, lesi prakanker)	<i>a cross-sectional study with simple random selection of participants in two District Health Centres in Bafoussam.</i> (studi cross-sectional dengan pemilihan acak sederhana peserta di dua Puskesmas Kabupaten di Bafoussam dari Februari hingga Agustus 2017).	<i>The most represented age group was [25-35] (50.88%). Moreover, 72 participants (31.58%) had heard about cervical screening test, 48 (21.05%) and were aware about the existence of means of prevention. An incidence of 07.63% was obtained.</i> (Kelompok usia yang paling terwakili adalah [25-35] (50,88%). Selain itu, 72 peserta (31,58%) pernah mendengar tentang tes skrining serviks, 48 (21,05%) dan mengetahui tentang adanya sarana pencegahan. Didapatkan insiden sebesar 07,63%.
8.	2023	Andrijono, Dewi Wulandari, Indah S. Widyahening, Dicky Mahardhika, Neni Nurainy, Rini Mulia Sari, Indriastuti Soetomo, Revata Utama	<i>Diagnostic Performance of Urine-based HPV-DNA Test (CerviScan, Bio Farma) as Cervical Cancer Screening Tool in Adult Women.</i> (Performa Tes Diagnostik DNA-HPV berbasis Urine (CerviScan, Bio Farma) sebagai Alat Skrining Kanker Serviks pada Perempuan Dewasa)	<i>Cervical cancer, HPV-DNA test, HPV molecular tests screening, human papilloma virus, urine test.</i> (Human papilloma virus, kanker serviks, skrining, tes urin, uji HPV-DNA, uji molekuler HPV).	<i>The study design was a diagnostic study comparing the new HPV-DNA diagnostic kit (CerviScan, Bio Farma) with the standard diagnostic kit (COBAS® 6800 HPV, Roche Molecular system).</i> (Rancangan penelitian adalah studi diagnostik yang membandingkan kit diagnostik HPV-DNA baru (CerviScan, Bio Farma) dengan kit diagnostik standar (COBAS® 6800 HPV, Roche Molecular system).	<i>Urine-based HPV-DNA testing with CerviScan is a reliable tool to detect high-risk HPV subtypes. It could become an alternative method for HPV-DNA testing to improve the coverage of cervical cancer screening program.</i> (Pengujian HPV-DNA berbasis urin dengan CerviScan memiliki keandalan untuk mendeteksi subtype HPV risiko tinggi. Pemeriksaan ini dapat menjadi metode alternatif untuk pengujian DNA-HPV dalam memperluas program skrining kanker serviks.).

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9.	2020	Fayez Saud Alreshidi , Rania Abdeen Hussain Abdalla , Hussain Gadelkarim Ahmed	<i>Test for prevention and early detection of cervical cancer among Saudi women in Hail Region</i> (Uji pencegahan dan deteksi dini kanker serviks di kalangan Wanita Saudi di Wilayah Hail)	<i>Cervical cancer, Pap. Test, Human Papillomavirus, Saudi Arabia</i> (Kanker Serviks, Pa. Tes, Human Papillomavirus, Arab Saudi)	<i>The present descriptive study assessed the perception and acceptance of 200 Saudi women toward Pap. Test</i> (Studi deskriptif ini menilai persepsi dan penerimaan 200 wanita Saudi terhadap Pap. Tes)	<i>Only 23% of the participants have experienced a previous Pap. Test (most were in the age range 35-44 years). Most of the women did the test were at an age older than 35 years. About 33% out of 155 responses indicated that they have ever heard about Pap. Test.</i> (Hanya 23% peserta yang pernah mengalami Pap sebelumnya. Test (sebagian besar berada pada rentang usia 35-44 tahun). Sebagian besar wanita yang melakukan tes berada pada usia yang lebih tua dari 35 tahun. Sekitar 33% dari 155 tanggapan menunjukkan bahwa mereka pernah mendengar tentang Pap Smear.
10.	2020	Ridha Aprilia a, A. Arsunan Arsina, Masni	<i>Determinants of early detection of cervical cancer with visual inspection with acetic acid method among childbearing age women</i> (Determinan deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan visual dengan metode asam asetat pada wanita usia subur)	<i>Knowledge, attitudes, and cultural values are determinants which influencing WUS.</i> (Pengetahuan, sikap, dan nilai budaya merupakan determinan yang mempengaruhi WUS).	<i>The type of this research uses Case Control Study with observational approach.</i> (Jenis penelitian ini menggunakan Case Control Study dengan pendekatan observasional)	<i>The analysis uses univariate, bivariate (chi-square test) and multivariate analysis. The results showed that there was a dominant influence from husband (p = 0.000; OR = 52.8, 95% CI: 15.383-181.232) on the behavior of early detection.</i> (Hasil Analisis menggunakan analisis univariat, bivariat (uji chi-square) dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh suami yang dominan (p = 0.000; OR = 52.8, 95% CI: 15.383-181.232) terhadap perilaku deteksi dini)

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

i. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

b. Tujuan umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat faktor yang berhubungan dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

c. Tujuan khusus

- 1) Mengetahui hubungan usia dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 2) Mengetahui hubungan pendidikan terakhir dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 3) Mengetahui hubungan status pernikahan dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 4) Mengetahui hubungan masa kerja dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 5) Mengetahui hubungan unit kerja dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 6) Mengetahui hubungan riwayat penyakit infeksi menular seksual (IMS) dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- 7) Mengetahui hubungan riwayat penyakit infeksi menular seksual (IMS) dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 8) Mengetahui hubungan riwayat keluarga yang pernah terkena kanker serviks dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 9) Mengetahui hubungan vaksin HPV dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 10) Mengetahui hubungan penggunaan pembalut saat menstruasi dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 11) Mengetahui hubungan penggunaan pembersih kewanitaan dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 12) Mengetahui hubungan usia saat pertamakali menikah dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 13) Mengetahui hubungan penggunaan alat kontrasepsi dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 14) Mengetahui hubungan jumlah kehamilan (Paritas) dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- 15) Mengetahui hubungan jumlah anak dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.
- 16) Mengetahui hubungan riwayat abortus dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka kegunaan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Kegunaan Bagi PT. Eastern Pearl Flour Mills

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap bisa menjadi informasi bagi perusahaan terkait dengan metode *CerviScan* dalam mendeteksi dini kanker serviks sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan upaya pencegahan kanker serviks pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.

b. Kegunaan Bagi Pekerja Wanita

Memberikan kenyamanan dalam deteksi dini kanker serviks bagi pekerja wanita dalam melakukan upaya pencegahan kanker serviks, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan deteksi dini kanker serviks.

c. Kegunaan Bagi Institusi

Dengan dilaksanakan penelitian ini, peneliti berharap bisa menjadi bahan referensi, tambahan data, dan menjadi bahan studi pustaka bagi Universitas Islam Alauddin Makassar.

d. Kegunaan Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian serta dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang Kesehatan Masyarakat pada peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

G. Perbedaan Penelitian

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada subjek penelitian, metode pemeriksaan deteksi dini kanker serviks, variabel dan lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu subjek penelitiannya yaitu wanita usia subur (WUS) dan ibu rumah tangga sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pekerja wanita. Adapun pada penelitian terdahulu lokasi penelitian kebanyakan di Puskesmas dan Rumah Sakit, sedangkan pada penelitian ini untuk pertamakalinya dilakukan di Pabrik, yaitu di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode pemeriksaan terbaru dalam deteksi dini kanker serviks yaitu dengan metode *CerviScan*. Metode skrining kanker serviks dengan sampel urine ini dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan minat wanita Indonesia untuk melakukan skrining. Adapun manfaat metode ini yaitu mendeteksi virus HPV dari luruhan selserviks yang terdapat pada urine dan pengambilan sampel dapat dilakukan sendiri sehingga lebih mudah dan nyaman.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kanker Serviks

1. Pengertian Kanker Serviks

Menurut American Cancer Society (2016), kanker merupakan hasil dari proliferasi sel-sel tubuh yang tidak terkendali sehingga membentuk sel-sel baru yang mengganggu sel-sel sehat, serta menimbulkan masalah pada organ tempat tumbuhnya kanker. Dasar silinder rahim yang menghubungkan ke vagina disebut leher rahim. Batas bawah serviks, yang terhubung ke vagina, disebut *ostium eksterna*, dan bagian atas bertemu dengan badan rahim, yang dikenal sebagai *isthmus/ostium interna*. Secara anatomis, serviks dipisahkan menjadi endoserviks dan ektoserviks, yang dibatasi oleh dua kelenjar berbeda. Dimana kedua kelenjar ini bertemu di *Squamocolumnar Junction* (SCJ), ektoserviks dilapisi dengan epitel skuamosa sedangkan endoserviks dilapisi dengan epitel kolumnar (Imelda & Santosa, 2020).

Kanker serviks adalah tumor ganas yang tumbuh didalam leher rahim atau serviks yang terdapat pada bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Terjadinya kanker serviks sangat perlahan. Pertama, beberapa sel normal berubah menjadi sel-sel prakanker, kemudian berubah menjadi sel kanker. Perubahan ini disebut *displasia*. Kanker serviks adalah jenis tumor ganas yang mengenai lapisan permukaan (*epitel*) leher rahim atau mulut rahim (kementerian kesehatan republik indonesia, 2020).

Manusia akan diuji dalam kehidupannya baik dengan perkara yang tidak disukainya atau bisa pula pada perkara yang menyenangkannya.

Allah SWT berfirman QS. al- Anbiyaa": 35 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Terjemahnya :

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami-lah kamu dikembalikan.” (Kementerian Agama RI, 2022).

Berdasarkan ayat diatas, Sahabat Ibnu Abbas diberi keluasaan ilmu dalam tafsir al-Qur'an menafsirkan ayat ini: “Kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan.” (Tafsir Ibnu Jarir). Dari ayat ini, kita tahu bahwa berbagai macam penyakit juga merupakan bagian dari cobaan Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Namun di balik cobaan ini, terdapat berbagai hikmah yang bisa kita peroleh (Nugroho.E.G.Z,2020).

2. Epidemiologi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan terdapat 342.000 kematian terkait kanker serviks dan sekitar 604.000 kasus baru pada tahun 2020 (WHO, 2022). Dengan 1,16% kematian di seluruh dunia disebabkan oleh kanker serviks, Asia Tenggara berada di peringkat kelima. Negara-negara maju seperti Amerika Selatan (0,82%), Eropa Selatan (0,25%), dan Eropa Barat (0,22%) memiliki tingkat kematian yang lebih rendah. Beberapa negara Afrika memiliki angka kematian yang tinggi, antara lain Afrika Tenggara (2,21%), Afrika Timur (3,36%), dan Afrika Tengah (2,66%) (Globocan, 2020).

Berdasarkan laporan *The Global Cancer Observatory* tahun 2020, kanker serviks merupakan penyakit terbanyak kedua di Indonesia, setelah

kanker payudara. Diperkirakan terdapat 36.633 kasus baru kanker serviks (9,2%) pada wanita Indonesia, dan 21.003 kasus (9,0%) mengakibatkan kematian (Globocan, 2021). Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), terdapat 134.400.000 kasus kanker serviks di seluruh dunia pada tahun 2019 dari kasus tersebut, 843.000 kasus mengakibatkan kematian (WHO, 2021). Menurut informasi dari Pusat Informasi HPV, jumlah wanita di Indonesia yang terdiagnosis kanker serviks diperkirakan berjumlah sekitar 36.000, sementara angka kematian tahunan di negara ini adalah sekitar 21.000 (*HPV Information Centre, 2023*).

Kanker serviks masih menjadi permasalahan utama yang belum terselesaikan. Karena sulitnya mengakses layanan kesehatan, kurangnya pengetahuan tentang kanker serviks, dan program skrining dan pengobatan saat ini yang kurang memadai, lebih dari 80% wanita penderita kanker serviks mendapat diagnosis ketika penyakitnya sudah lanjut. Sekitar 47% kasus terjadi pada wanita berusia di bawah 35 tahun, dan 10% terjadi pada wanita berusia di atas 65 tahun. Usia terbanyak terkena kanker serviks adalah 47 tahun (WHO, 2022).

3. Faktor Penyebab Penyakit Kanker Serviks

Penyebab utama kanker serviks adalah infeksi virus HPV (*Human Papilloma Virus*). Tipe yang paling berbahaya adalah jenis HPV 16 dan 18 yang menyebabkan 70% penyakit kanker serviks. Virus ini menyebar melalui kontak seksual, HPV dapat menyerang semua perempuan disetiap waktu tanpa melihat usia dan gaya hidup. Banyak wanita dengan daya tahan tubuh baik mampu melawan infeksi HPV dengan sendirinya. Namun, terkadang virus ini berujung pada penyakit kanker (S. Rahayu et.al., 2018).

HPV adalah sekelompok virus yang menyebabkan serviks terinfeksi, hal ini merupakan faktor utama penyakit kanker serviks. Penularannya terjadi melalui kontak seksual. HPV (*Human Papiloma Virus*) juga biasa disebut *wart virus* (Virus kutil). Terdapat lebih dari 100 tipe HPV yang telah diidentifikasi, 40 tipe tersebut menyerang wilayah genital. Dari 40 tipe tersebut, 13 diantaranya merupakan tipe onkogenik dan dapat menyebabkan kanker serviks atau lesi prakanker pada permukaan serviks. Sedangkan tipe lain disebut sebagai tipe risiko rendah yang lebih umum menyebabkan kutil kelamin (*genital wart*).

HPV dapat dengan mudah ditularkan melalui aktifitas seksual dan beberapa sumber transmisi tidak tergantung dari adanya penetrasi, tetapi melalui sentuhan kulit di wilayah genital tersebut (*skin to skin genital contact*), dengan demikian setiap wanita yang aktif secara seksual memiliki risiko untuk terkena kanker serviks. HPV dibagi menurut risiko dalam menimbulkan kanker serviks, yaitu sebagai berikut: Risiko Rendah: tipe 6, 11, 42, 43, 44 disebut tipe non-onkogenik. Jika terinfeksi, hanya menimbulkan lesi jinak dan Risiko Tinggi: tipe 16,18, 31, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, 68 disebut tipe onkogernik (Imelda & Santosa, 2020).

4. Gejala Kanker Serviks

Gejala awal kondisi pra-kanker umumnya ditandai dengan ditemukannya sel abnormal. Sel abnormal ini berkembang menjadi kanker serviks barulah muncul gejala-gejala kanker serviks sebagai berikut;

- a. Nyeri dan pendarahan tidak normal, seperti pendarahan di luar siklus menstruasi, pendarahan di sela-sela menstruasi, menstruasi yang lebih lama dan lebih banyak dari biasanya, serta pendarahan setelah menopause.

- b. Keputihan yang tidak normal dan berlebihan.
- c. Nyeri panggul, sulit buang air kecil, dan pembesaran ginjal jika kanker sudah menyebar ke panggul (Dianti & Isfandiari, 2017).

5. Faktor Risiko Kanker Serviks

Setiap wanita memiliki risiko untuk terinfeksi penyakit kanker serviks (Kemenkes RI, 2017). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kanker serviks antara lain :

a. Usia

Wanita yang aktif secara seksual dan berusia antara 35-50 tahun lebih rentan terkena kanker serviks. Perubahan hormonal dan penurunan kesuburan mungkin menjadi penyebabnya. Populasi yang menua dan melemahnya sistem kekebalan tubuh yang terkena dampak berkontribusi signifikan terhadap kejadian kanker serviks dengan memfasilitasi berkembangnya lesi atau cedera lain pada serviks, yang memfasilitasi infeksi HPV. Usia >35 tahun dianggap aktif secara seksual, dan dalam rentang usia ini berisiko terkena kanker serviks. Perubahan hormonal dan gangguan kesuburan menjadi penyebabnya (Mayanda, 2019).

Keadaan ini merupakan proses alamiah yang telah menjadi sunnatullah Allah SWT. Inilah kebenaran firman Tuhan dalam QS. Al-Fath (48): 23 yang berbunyi:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

Terjemahnya :

“Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu”. (Kementerian Agama RI, 2022).

Dalam ayat ini, peristiwa alam adalah sunnatulloh yang tidak bisa diubah oleh manusia. Paling-paling kita hanya bisa berusaha agar kita tetap bisa berbuat baik sampai akhir hayat. Untuk itu kita harus tetap sehat

sampai akhir hayat. Semua organ tubuh pasti mengalami kemunduran atau kerusakan seiring bertambahnya usia. Kulit keriput, uban, gigi ompong, mata rabun, telinga tuli, lemah jantung dan pikun (Nugroho.E.G.Z,2020).

b. Pendidikan

Melalui pengajaran dan pelatihan, sikap dan perilaku sekelompok orang diubah dalam upaya membantu individu menjadi dewasa. Proses ini dikenal dengan sebutan pendidikan. Tingkat keahlian yang tinggi yang dimiliki seseorang akan sangat menentukan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sudah ada guna mendorong wanita yang lebih berpendidikan untuk mengambil peran aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Wanita yang berpendidikan tinggi cenderung lebih sadar akan kesehatan. Seorang wanita berpendidikan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kanker serviks (Theodora Parapat et al. ,2016).

Dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Alaq/96 : 1-5).

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Terjemahnya :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena.. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya” (Kementerian Agama RI, 2022).

Surah al-Alaq ayat 1-5 menyoroti pentingnya membaca, yang dikaitkan dengan amanat untuk merenungkan dan mengingat Allah dan ciptaan-Nya. Perpaduan ini akan menghasilkan formula kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, wahyu pertama juga mencakup sejumlah nilai pendidikan, salah satunya moralitas, yang akan mempengaruhi

penyesuaian perilaku, cara pandang, paradigma, dan tindakan sehari-hari terkait pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (Adib, M. A. 2022).

c. Faktor Genetik

Kelainan genetik berperan dalam karsinogenesis dan agresivitas tumor serviks sekitar 32-34%. Keluarga dengan riwayat kanker serviks dapat meningkatkan risiko dua sampai tiga kali lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan kanker serviks. Peningkatan risiko yang lebih besar untuk ibu kandung dan saudara kandung daripada saudara tiri dari wanita yang terkena dan tidak ada peningkatan risiko untuk kerabat nonbiologis (Imelda & Santosa,2020). Dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Terjemahnya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (Kementerian Agama RI, 2022).

Berdasarkan ayat diatas, asal-usul dan keberadaan manusia yang dekat sifat dengan orang tuanya menurut penjelasan ilmiahnya adalah karena sel reproduksi mengandung separuh jumlah kromosom yang terdapat dalam sel tubuh dan ditentukan untuknya. Adanya hukum berpasangan merupakan salah satu indikasi keagungan Allah SWT. , dalam menciptakan makhluk-Nya. Sebab, dengan bersatunya dua sel reproduksi pria dan wanita membentuk zigot, terpenuhinya jumlah kromosom yang ditentukan untuk spesies manusia. Genetika (ilmu hereditas) berkaitan dengan ilmu kehidupan yang mengkaji sifat genetik orang tua terhadap keturunannya. Padahal, masyarakat sudah lama mengetahui bahwa

sebagian besar anak memiliki kemiripan dengan orang tuanya, baik dari segi wajah, penyakit dan tingkah laku, maupun minatnya. Manusia makhluk ciptaan Allah yang dijadikan sebaik-baiknya (Sakinah, H.P, 2023).

d. Perilaku Seksual

Perilaku seksual terkait dengan usia awal melakukan hubungan seksual dan jumlah pasangan seksual atau pasangan dengan banyak pasangan seks. Hal ini berhubungan dengan kemungkinan serviks terpapar faktor karsinogen lebih tinggi dan lama. Wanita yang pertamakali melakukan hubungan seksual <20 tahun memiliki risiko lebih dibandingkan wanita melakukan hubungan seksual >20 tahun. Usia awal hubungan seksual <20 tahun mudah terinfeksi *Human Papiloma Virus*.

HPV ditransmisikan melalui hubungan seksual oleh karena itu, usia yang rentan terkena HPV adalah usia pada saat sistem reproduksi mulai berfungsi. Umumnya wanita yang terinfeksi oleh *Human Papiloma Virus* mengalami infeksi sesaat setelah aktif secara seksual dan dipengaruhi jumlah paritas, masa perkembangan kearah kanker serviks umumnya terjadi pada periode waktu 10 hingga 20 tahun. Kondisi tersebut dapat bertambah buruk mengarah pada kelainan sel dan pertumbuhan sel yang abnormal (Imelda & Santosa, 2020).

Usia <20 tahun juga dianggap belum matang untuk menjalani pernikahan atau hubungan seksual. Ukuran kematangan bergantung pada sel-sel mukosa yang terdapat di selaput kulit bagian dalam rongga tubuh. Umumnya sel mukosa baru akan matang setelah wanita berusia > 20 tahun. Jadi, hubungan seks usia <20 tahun memungkinkan terjadinya perlukaan pada serviks. Luka yang ditimbulkan menjadi media yang mudah untuk

mengalami infeksi, termasuk infeksi dari virus HPV yang menyebabkan kanker serviks (Karim et al., 2021).

Tuntutan Islam menuntut adab yang ditetapkan dalam Q.S An-Nur ayat 59 yang berbunyi :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Kementerian Agama RI, 2022).

Berdasarkan ayat diatas, Pendidikan seksual Islami mengandung dua aspek yang salah satunya berperan menyiapkan dan membekali seseorang dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis tentang masalah seksual. Para pendidik harus berusaha memberikan pengetahuan teoritis kepada anak tentang perubahan-perubahan seksual yang menyertai fase baligh, seperti pengetahuan tentang sperma, cara pembentukannya, tempat penyimpanannya, pengaruh hormon seks dalam pembentukan sperma, ovum dan hubungan antara sperma dan ovum. Kemudian, dijelaskan hukum-hukum fikih sesuai dengan kondisi (Ramaita, R. 2023).

e. Riwayat Terpapar Infeksi Menular Seksual (IMS)

Wanita yang pernah terkena infeksi menular seksual juga memiliki risiko yang tinggi terkena kanker serviks. Hal ini karena HPV bisa ikut tertular bersamaan dengan penyebab penyakit kelamin lainnya saat terjadi hubungan seksual. Kaitan antara perubahan abnormal serviks (dysplasia) dan kanker serviks yang berkaitan dengan HIV telah dikenal sejak tahun 1990 (Riksani, 2016).

f. Kontrasepsi

Kontrasepsi oral yang dipakai dalam jangka panjang yaitu lebih dari 5 tahun dapat meningkatkan risiko 1.53 kali. WHO melaporkan risiko relatif pada pemakaian kontrasepsi oral sebesar 1,19 kali dan meningkat sesuai dengan lamanya pemakaian. Kontrasepsi hormonal meningkatkan risiko relatif *neoplasia intraepitel* serviks bagi wanita dengan HPV. Diduga progesterone memicu efek karsinogenik dari HPV. Progesteron menyebabkan *hipersekrksi* kelenjar *endoservikal* serta *proliferasi* kelenjar *endoservikal*. Selain itu progesteron juga menyebabkan metaplasia dan displasia epitel portio dan selaput lendir dari *endoservikal* (WHO, 2020).

Syaikh Abu Muhammad bin Shalih bin Hasbullah dalam bukunya, mengatakan bahwa termasuk 'azl adalah alat atau segala macam sarana yang digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Baik itu berupa pil atau yang lainnya. Hukumnya boleh, dengan catatan, pencegahan ini hanya berlaku sementara (tidak selamanya), dan tidak karena takut miskin atau takut rizkinya menjadi sempit. pada dasarnya Islam membolehkan orang Islam ber-KB. Jika mengetahui dan memahami betul maksud dan hikmah Islam di balik pemberian keringanan atas pelaksanaan hubungan terputus pada berbagai kondisi darurat karena terinspirasi dari pemahaman yang sempurna bahwa seorang anak menjadi tanggung jawab yang sangat besar, dan wajib dipelihara dengan pemeliharaan yang sempurna dan kepedulian tinggi, atau karena alasan bahwa kelahiran seorang anak akan membahayakan sang ibu bahkan ancaman kematian (Gemi, G. 2017).

g. Penggunaan Pembalut saat Menstruasi

Menurut hasil riset WHO, pembalut berkualitas buruk merupakan salah satu penyebab utama kanker serviks di Indonesia. Setelah Tiongkok, Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus kanker serviks tertinggi kedua di dunia, dengan 62% kasus disebabkan oleh penggunaan pembalut wanita di bawah standar. Menggunakan celana dalam yang lembab, penggunaan pembalut >5 jam, dan tidak menggunakan pembalut yang steril dan aman adalah beberapa contohnya. Pembalut wanita yang mengandung pemutih atau pewangi buatan meningkatkan risiko alergi yang dapat menyebabkan peradangan, iritasi, dan infeksi selain keputihan yang tidak teratur. Sebanyak 107 bakteri per milimeter persegi ditemukan pada pembalut akibat kurangnya pengetahuan perempuan (WHO, 2020).

Pada masa Nabi Muhammad SAW, para shahabiyat mengenakan pakaian unik saat menstruasi. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, “Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk memakai izar, yaitu kain penutup tubuh bagian bawah dari pusar ke bawah, ketika salah satu dari kita sedang haid” (HR Muslim). Ketika memilih pembalut yang biasa mereka gunakan, biasanya mereka hanya mempertimbangkan harganya terjangkau dan nyaman digunakan, tanpa mempertimbangkan potensi bahayanya bagi kesehatan. Oleh karena itu, pembalut wanita dapat menjadi sarang bakteri berbahaya dan meningkatkan risiko kanker serviks. Bahannya berupa kain handuk penyerap darah yang bisa dicuci sesuai kebutuhan. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak perempuan yang menggunakan pembalut berbahan kapas atau bahan lain yang langsung dibuang setelah digunakan (Saribanon et al., 2016).

h. Penggunaan Pembersih Kewanitaan

Terlalu sering menggunakan pembersih kewanitaan untuk mencuci alat kelamin juga dapat memicu terjadinya kanker serviks. Oleh karena itu, hindari terlalu sering mencuci vagina dengan antiseptik, karena dapat menyebabkan iritasi di daerah serviks. Iritasi ini kemudian akan merangsang terjadinya perubahan sel. Kebiasaan mencuci vagina secara berlebihan dan saat tidak diperlukan menggunakan obat-obatan antiseptik maupun deodoran bisa mengakibatkan iritasi pada serviks yang bisa juga menimbulkan dan merangsang terjadinya kanker (WHO, 2020).

i. Faktor Reproduksi (Paritas)

Jumlah paritas yang lebih tinggi, usia dini pada kelahiran pertama dan jumlah persalinan menimbulkan trauma berulang pada serviks selama kelahiran anak menjadi faktor penyebab kanker serviks. Paritas adalah jumlah kehamilan yang menghasilkan janin hidup atau mati. Jumlah paritas berpengaruh dalam timbulnya penyakit kanker serviks. Pada wanita dengan paritas lebih dari 3 kali dan jarak kelahiran yang dekat sangat berisiko kanker serviks. Paritas yang berbahaya adalah dengan memiliki jumlah anak >3 orang atau jarak persalinannya terlampau dekat, dapat menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan sel-sel hormonal pada mulut rahim. Jika jumlah anak yang dilahirkan melalui jalan normal banyak dapat menyebabkan terjadinya perubahan sel abdominal dari epitel pada mulut rahim, dan dapat berkembang menjadi keganasan (Supardi, 2017).

Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an, seperti : Q.S. al-Baqarah/2 : 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Terjemahnya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban” (Kementerian Agama RI, 2022).

Berdasarkan ayat diatas, tentang pengaturan jumlah kehamilan. Sejak kelahiran para ibu diperintahkan untuk menyusukan anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Penyusuan selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan “bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” sehingga apabila ingin mempunyai anak lagi jarak kehamilannya tidak terlalu dekat (Tarigan,A.A.2022).

J. Abortus

Riwayat abortus merupakan salah satu faktor risiko kanker serviks. Praktek abortus yang tidak steril memicu terjadinya infeksi sehingga mudah memicu pertumbuhan sel-sel abnormal dapat mengakibatkan terjadinya kanker serviks. Wanita yang pernah melakukan abortus >1 kali berisiko 3.37 kali lebih besar menderita kanker serviks dibandingkan wanita yang tidak pernah melakukan abortus (Shen et al., 2023).

Aborsi tanpa uzur sama sekali, haram hukumnya. Apakah aborsi itu sebelum atau sesudah ditiupkannya roh pada janin.

Dalam QS. al-Baqarah (2): 195,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Kementerian Agama RI, 2022).

Berdasarkan ayat di atas, hukum haram dibenarkan dalam situasi dimana kondisi atau keadaan mendesak yang menimbulkan resiko fatal bagi ibu dan janin. Serupa dengan hal ini, hukum Islam mewajibkan untuk memilih tindakan yang paling kecil risikonya. Sesuai prinsip fiqh, pilihan dengan kerugian paling kecil harus dipilih ketika dua hal yang tidak diinginkan tidak dapat dihindari secara bersamaan (Tarigan, A.A. 2022).

j. Kebiasaan merokok

Risiko kanker dua kali lebih tinggi pada wanita yang merokok berat dan dalam jangka waktu lama. Produk samping tembakau dan bahan kimia penyebab kanker telah terdeteksi di mukosa serviks perokok, dan zat ini merusak DNA sel serviks. Rokok mengandung zat karsinogen atau zat yang dapat menyebabkan kanker. Zat tersebut merusak DNA sel serviks sehingga dapat memicu kanker serviks. Selain itu, merokok dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi HPV (Imelda & Santosa, 2020).

Rokok dalam bahasa arab disebut dengan “Sayajara”, dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk kudu, dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa indonesia mengenal rokok dan mengonsumsi rokok. Padahal sudah jelas diberitahukan bahwa rokok banyak

mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Tidak hanya kesehatan diri sendiri tetapi juga kesehatan orang lain yang ada disekeliling.

Ayat Al-Qur'an yang bersangkutan dengan zat yang merusak tubuh yaitu QS. An-Nisa'4:29 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Kementerian Agama RI, 2022).

Seperti yang dijelaskan dalam ayat diatas, merokok dapat membuat tubuh berisiko terserang sejumlah penyakit serius dan dapat menyebabkan kehancuran. Dengan kata lain, hal ini membahayakan setiap sistem dalam tubuh, termasuk sistem reproduksi, janin, pernafasan, pencernaan, dan kondisi kanker. Islam menjelaskan bahwa manusia harus memilih apa yang dimakannya, sesuai ketetapan Allah tentang makanan halal. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Allah tidak merestui obat-obatan yang membahayakan sistem tubuh (Musthofa, M.A. 2017).

k. Faktor Kemiskinan

Faktor kemiskinan dikaitkan dengan pendapatan rendah dan akses terbatas ke perawatan kesehatan. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan untuk mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan penting untuk menjaga serta meningkatkan daya tahan tubuh, terutama dalam menahan serangan infeksi virus dari luar. Selain itu, sosial ekonomi yang rendah juga menyebabkan wanita memiliki akses yang terbatas terhadap perkembangan dunia kesehatan, termasuk pentingnya melakukan skrining atau pendeteksian dini kanker serviks. Sosial ekonomi rendah bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kanker serviks. Wanita yang

berpendapatan rendah akan lebih sedikit memiliki akses pengetahuan tentang kanker serviks. Tingginya aktivitas seksual dan Minimnya pengetahuan yang dimiliki tidak mampu mengatasi pencegahan infeksi virus HPV sehingga mudah terinfeksi virus (Imelda & Santosa, 2020).

Sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh Allah SWT di dalam QS. Al-Balad/90:4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah”. QS. Al-Balad/90: 4. (Kementerian Agama RI, 2022).

Menurut tafsir dari Al-Quran Kementerian Agama (Kemenag), surat Al- Balad ayat 4 menjelaskan bahwa tiap fase kehidupan manusia pasti akan menemui kesulitan. Mulai dari dilahirkan hingga saat menemui kematian. Sehubungan dengan ayat tersebut diatas M. Quraish Shihab mengatakan bahwa bermacam-macam uraian yang dikemukakan tentang susah payah dan kesulitan yang dihadapi manusia. Manusia sejak dalam rahim ibunya sampai dengan kematian bahkan sesudah kematiannya tidak pernah luput dari kesulitan demi kesulitan (Faisal,H. 2023).

l. Masa Kerja

Menurut Suma'mur (1994), semakin lama seseorang dalam bekerja maka semakin banyak terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja, sehingga rentan terkena penyakit akibat kerja. Masa kerja berhubungan dengan kelelahan dimana semakin lama masa kerja maka pekerja akan semakin mudah Lelah, stamina tubuh akan berkurang, ketahanan tubuh menurun dan terkena penyakit serta mempercepat penyebaran penyakit. Terdapat hubungan antara masa bekerja dengan

kejadian lesi pranker serviks. Masa bekerja menunjukkan lamanya responden terpapar bahan kimia pabrik (Ratnasari & Toyibah, 2018).

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7 :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Terjemahnya :

"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh (urusan) yang lain," (Kementerian Agama RI, 2022).

Pada surah Al-Insyirah ayat 7, Allah SWT secara tegas memerintahkan manusia agar pandai memanfaatkan waktu, dan tidak membuang waktu secara sia-sia. Di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk bekerja. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kata amal dengan segala derivasinya diungkap di dalam AlQur'an. Paling tidak ada 602 kali kata amal yang diterjemahkan dengan kerja. Dalam bahasa Indonesia, kata "amal" ini dipersempit maknanya dengan ibadah. Beramal sama dengan beribadah. Sejatinya tidak demikian. Kata "amal" harus dikembalikan kepada makna asalnya yaitu kerja (Tarigan,A.A.2022).

6. Stadium Kanker Serviks

Stadium adalah istilah yang dipergunakan oleh ahli medis untuk menggambarkan tahapan kanker serta sejauh mana kanker tersebut telah menyebar dan menyerang jaringan di sekitarnya. Stadium kanker serviks menunjukan tahapan atau periode kanker serviks. Penetapan stadium ini merupakan upaya hati-hati guna mengetahui dan memilih perawatan yang terbaik untuk mengobati penyakit. Stadium pada kanker serviks tergantung pada tingkat invasi penyebaran kanker dibagian tubuh. Pada sistem ini, angka romawi 0 sampai IV menggambarkan stadium kanker. Semakin besar angkanya, maka kanker semakin serius dan dalam tahapan lanjut.

(Rahayu, 2015). *International Federation of Gynecologists and Obstetricians Staging System for Cervical Cancer* (FIGO) pada tahun 2012 menetapkan stadium kanker sebagai berikut :

a. Stadium In-Situ atau Stadium 0

Istilah "*carcinoma-in-situ*" juga mengacu pada stadium ini, yang diartikan sebagai "kanker yang ada di tempat" dan belum menyebar ke area lain. Stadium in-situ mengacu pada sel kanker yang masih memiliki penampakan dan pola pertumbuhan normal, artinya belum tampak menyimpang.

b. Stadium Awal

Tahap pertama ditandai dengan munculnya gejala yang berbeda, dimana sel kanker tumbuh lebih cepat dibandingkan sel sehat.

c. Stadium II

Ini sudah mulai meluas ke jaringan sekitarnya dari leher rahim. Namun, kanker belum menyebar ke ligamen atau otot dinding panggul. Vagina bagian atas telah terkena kanker pada stadium II.

d. Stadium III

Di luar leher rahim, kanker serviks telah menyerang struktur sekitar panggul. Ada kemungkinan keganasan ini sudah menyebar ke otot dan ligamen yang melapisi dinding panggul serta vagina bagian bawah. Kanker stadium III belum mencapai dinding panggul, namun sudah menyebar ke bagian bawah vagina.

e. Stadium IV

Organ selain rahim dan leher rahim telah terkena kanker. Kemoterapi, terapi radiasi, pembedahan, atau kombinasi ketiganya digunakan untuk mengobati kanker pada tahap ini. Selain itu, kanker telah berkembang ke organ lain termasuk kandung kemih.

Bagi penderita kanker, keadaan sakit harus disikapi secara psikologis dengan lahirnya kemauan dalam hati untuk mendekatkan diri kepada Maha Memberi Cobaan, Allah swt. Hubungan tersebut dapat dilihat pada ketaatan melaksanakan apa yang diyakini sebagai perintah atau kehendak Allah SWT. Pengaruh religiusitas terhadap kualitas hidup pasien kanker selanjutnya adalah meyakini bahwa Allah Maha Agung dan Maha Adil, sehingga pasti akan memberi balasan dan ganjaran sempurna pada suatu waktu yang ditentukan (Chabirah et al., 2020).

Proses terjadinya lesi pra kanker serviks

Masa proliferasi sel atau jaringan normal hingga menjadi abnormal atau kanker, tidak secepat yang dibayangkan. Artinya sebelum terjadi kanker, akan didahului dengan keadaan yang disebut dengan lesi pra kanker atau *Neoplasia Intraepitel Serviks* (NIS), perlu waktu sekitar 10-20 tahun sebelum berkembang menjadi kanker. NIS merupakan awal dari perubahan menuju karsinoma serviks (I. G. A. A. N. Dewi, 2017).

Proses metaplasia lapisan endoserviks menjadi epitel skuamosa area transformasi berkaitan erat dengan kanker pada usia kontak seksual pertama, yaitu kurang dari dua puluh tahun. Begitu virus HPV memasuki tubuh, ia menempel pada sel-sel di lapisan basal epitel serviks. DNA virus kemudian bergabung dengan DNA inang sehingga menyebabkan sel skuamosa yang mengalami metaplasia selama transformasi mengalami displasia dan berkembang menjadi lesi serviks yang bersifat prakanker. Setelah itu, sel-sel ini akan membelah secara tidak terkendali dan frekuensi lesi pra-kanker serviks akan meningkat jika pasien berusia >35 tahun, pertama kali melakukan hubungan seksual usia <20 tahun, memiliki empat

paritas, menggunakan pembersih vagina, dan pernah menggunakan alat kontrasepsi hormonal selama >5 tahun (I.G.A.A.N.Dewi, 2017).

Penyebaran Kanker Serviks

Penyebaran penyakit ini ada tiga macam, yaitu:

1. Melalui pembuluh limfe (limfogen) menuju ke kelenjar getah bening lainnya.
2. Melalui pembuluh darah (hematogen).
3. Penyebaran langsung melalui parametrium, korpus uterus, vagina, kandung kencing dan rectum.

Penyebaran melalui pembuluh darah dan pembuluh limfe terutama paru-paru, kelenjar getah bening, mediastinum dan supra klavikuler, tulang dan hati. Penyebaran ke paru-paru menimbulkan batuk darah (hemoptisis), dan nyeri dada, kadang disertai pembesaran kelenjar getah bening supraklavikula terutama sebelah kiri (Dalimartha, 1998: 13).

B. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Kanker Serviks

Menurut (WHO, 2020), Organisasi Kesehatan Dunia telah merekomendasikan target dalam strategi global untuk menghilangkan kanker serviks sebagai masalah kesehatan masyarakat yang meliputi upaya pencegahan kanker serviks dibagi atas 3 tahap yaitu :

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer yang diberikan seperti promosi kesehatan dan proteksi spesifik. Pencegahan primer bermaksud untuk menurunkan risiko, dapat dilakukan dengan cara pemberian edukasi terhadap bahaya kanker serviks, perilaku hidup sehat, perilaku seksual yang aman serta pemberian vaksin HPV (*Human Papilloma Virus*) untuk mencegah infeksi HPV dan pengendalian faktor risiko. Vaksinasi HPV di rekomendasikan kepada anak

perempuan usia 11-12 tahun atau wanita 13-26 tahun yang belum aktif secara seksual. Dosis yang dianjurkan adalah tiga dosis melalui injeksi intramuscular dalam waktu 6 bulan. Dosis kedua dan ketiga diberikan dua dan enam bulan setelah dosis pertama. Pengendalian faktor risiko dengan menghindari rokok, tidak melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kontrasepsi oral jangka panjang >5 tahun, serta menjalani diet sehat.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder melalui deteksi dini kanker serviks dengan tujuan memperlambat atau menghentikan kanker pada stadium awal. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan tes DNA HPV, Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), Pap Smear, pemeriksaan sitology, Colposcopy dan Biopsi. Pemeriksaan dengan metode *CerviScan* direkomendasikan karena lebih nyaman, cepat dan harganya lebih terjangkau. Melakukan Skrining wanita yang memenuhi syarat dua kali seumur hidup mereka (pada usia 35 dan 45), dengan pengobatan lesi pra-kanker.

3. Pencegahan Tersier

merupakan upaya peningkatan penyembuhan (*survival rate*) kualitas hidup dalam terapi kanker. Terapi ditujukan pada penatalaksanaan nyeri, paliasi dan rehabilitasi. Pencegahan tersier dilakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitatif di unit pelayanan kesehatan yang menangani kanker serta pembentukan kelompok *survivor* kanker di masyarakat.

Menurut Quraish Shihab pembicaraan literatur keagamaan tentang kesehatan fisik dimulai dengan meletakkan prinsip “pencegahan lebih baik daripada pengobatan”. Karena itu dalam konteks kesehatan ditemukan sekian banyak petunjuk Kitab Suci dan Sunah Nabi saw. yang pada dasarnya

mengarah pada upaya pencegahan yaitu membiasakan pola hidup sehat (Mia Fitriah Elkarimah, 2016). Menjaga kesehatan dari berbagai faktor penyebab penyakit dalam Islam yang melarang melakukan hal-hal yang berlebihan. Seperti dalam firman Allah SWT QS. Al-A'raf (7): 31 :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Kementerian Agama RI, 2022).

Berdasarkan ayat diatas diharapkan kita dapat mencegah penyakit dengan pola hidup sehat dan tidak berlebihan sehingga kesehatan tetap terjaga. Setiap wanita bisa mengkonsumsi makanan halal. Seperti kita tahu semakin meningkatnya penderita penyakit kanker di Indonesia, dan penyakit kanker merupakan penyebab kematian nomor dua setelah penyakit jantung (Tarigan.A.A.2022).

C. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Menurut OSHA (*Occupational Safety and Health Administration*), *personal protective equipment* atau alat pelindung diri (APD) didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (*hazard*) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya. Alat yang dipakai disini untuk melindungi sistem pernafasan dari partikel-partikel berbahaya yang ada diudara yang dapat membahayakan kesehatan. Perlindungan sitem pernafasan sangat diperlukan terutama bila tercemar partikel-partikel berbahaya, baik yang

berbentuk gas, aerosol, cairan, ataupun kimiawi. Alat yang dipakai adalah masker, baik yang terbuat dari kain atau kertas wol (Sirait, 2010).

Menggunakan APD seperti masker saat bekerja dapat mengurangi endapan debu yang dapat masuk, meskipun masker tidak sepenuhnya sempurna untuk melindungi tubuh akan tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan yang akan mungkin terjadi. Pekerja yang memiliki kebiasaan memakai APD, maka saluran pernafasannya akan terlindungi. Rasa kurang nyaman ketika menggunakan masker saat bekerja merupakan salah satu faktor utama pekerja enggan menggunakan APD. Teknik lain untuk mengurangi endapan debu masuk ke paru-paru adalah membuat ventilasi alami di ruang kerja serta mengharuskan pekerja untuk membelakangi arah angin ketika sedang bekerja (Ramadan, F. et al., 2021).

Menurut IOSH (Institute of Occupational Safety and Health) hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai masker mulut :

1. Masker mulut berbentuk datar walaupun memiliki hasil perlindungan, tetapi karena kurang melengkung dan tidak menempel rapat diwajah, hasilnya tidak sebanding dengan masker mulut berbentuk gelas.
2. Masker mulut sebaiknya digunakan sekali pakai saja, apabila perlu dipakai berulang kali, harus diperhatikan penyimpanan ditempat yang bersih. Tetapi untuk kondisi berikut ini pemakaian tidak boleh dilanjutkan : ada kecurigaan pencemaran, berlubang, berubah bentuk, kotor, berbau, hambatan untuk bernafas bertambah.
3. Pada saat melepas masker mulut harus menghindari tercemarnya masker mulut, juga menghindari terkena pencemaran dari masker mulut. Sebelum dan sesudah melepas masker mulut, harus mencuci tangan secara bersih.

4. Pada saat membuang masker mulut yang tercemar, harus menghindari tersebarnya kuman, dengan cara melipat masker kearah dalam, diletakkan kedalam kantong plastic yang ditutup rapat.

Penggunaan alat pelindung diri perorangan merupakan *alternative* lain untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya kesehatan, (Sumantri, 2017) Penyebab keselamatan K3 yaitu penggunaan alat pelindung diri, antara lain :

1. Alat pelindung kepala (*headwear*), untuk melindungi bagian kepala dari benda yang jatuh atau benturan misalnya topi keselamatan baik dari plastik, aluminium, atau fiber.
 - a. Topi pelindung (*safety Helmets*)
 - b. Tutup kepala
 - c. Topi (*hats/cap*)
2. Alat pelindung wajah (*face shield*), untuk melindungi percikan benda cair, benda padat atau radiasi sinar dan panas misalnya pelindung muka.
3. Alat pelindung mata (*eyes protection*), melindungi diri dari percikan benda, bahan cair, dan radiasi panas, misalnya kacamata keselamatan.
 - a. Kacamata (*spectacles*)
 - b. Goggles
4. Alat pelindung pernapasan (*respiratory protection*), melindungi dari bahan kimia, debu uap dan asap yang berbahaya dan beracun. Alat pelindung pernapasan sangat beragam seperti masker debu, masker kimia, respiratori dan *breathing apparatus* (BA).

5. Alat pelindung pendengaran (*ear muff*), melindungi organ pendengaran dari suara yang bising misalnya sumbat telinga (*ear plug*) dan katup telinga.
6. Alat pelindung badan (*body protection*), melindungi bagian tubuh khususnya dada dari percikan benda cair, padat, radiasi sinar dan panas misalnya apron dari kulit, plastic, dan abses.
7. Alat pelindung tangan (*hand protection*), melindungi bagian jari dan lengan dari bahan kimia, panas, atau benda tajam misalnya sarung tangan kulit, PVC, abses, dan metal.
8. Sabuk pengaman (*safety body harness*), untuk melindungi ketika terjatuh dari ketinggian misalnya ikat pinggang keselamatan (*safety body harness*), *harness*, dan jaring.
9. Alat pelindung kaki (*safety shoes*), untuk melindungi bagian telapak kaki, tumit, atau betis dari benda panas, cair, kejatuhan benda dan tertusuk benda tajam, misalnya sepatu karet, sepatu kulit, sepatu abses, pelindung kaki dan betis. Untuk melindungi dari kejatuhan benda. Sepatu keselamatan di lengkapi dengan pelindung logam dibagian ujungnya (*steel to cap*).

D. Tinjauan Umum Tentang Deteksi Dini

Deteksi dini kanker serviks merupakan intervensi kesehatan masyarakat digunakan pada populasi yang berisiko atau populasi target, tidak untuk mendiagnosa penyakit tetapi untuk mengidentifikasi individu yang kemungkinan menderita penyakit atau mengalami perkembangan penyakit. Deteksi dini kanker serviks dilakukan pada semua perempuan yang berisiko kanker serviks, termasuk yang tidak memiliki gejala yang

bertujuan untuk mendeteksi adanya prakanker yang bila tidak ditangani akan menyebabkan kanker (WHO, 2020).

Reaksi fisik yang ditimbulkan oleh kanker dapat menimbulkan dampak psikologis. Hal ini terlihat ketika seseorang didiagnosis mengidap penyakit kanker. Kekecewaan, kebingungan, kesedihan, ketakutan dan stres mulai bermunculan. Tidak hanya saat pertamakali mengetahui kondisi informan mengidap penyakit kanker, proses pengobatan mulai dari operasi hingga kemoterapi ternyata mampu menimbulkan efek samping baik secara fisik maupun psikis. Seorang penderita kanker yang mempunyai keinginan sembuh memerlukan beberapa cara untuk mengatasi kendala, baik psikologis maupun biologis (Azriful et al., 2021).

Deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan dengan melakukan skrining. Skrining adalah proses untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan, melalui tes yang dilakukan secara cepat pada lingkup yang luas. Melalui skrining, orang yang sehat dan sakit dapat dibedakan dengan jelas. Setiap wanita dapat melakukan deteksi dini kanker serviks tiga tahun, setelah aktif melakukan hubungan seksual atau pada usia 21 tahun. Pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dianjurkan minimal dilakukan 5 tahun sekali dan bila memungkinkan 3 tahun sekali. Deteksi dini berhenti jika wanita berumur ≥ 70 tahun yang hasil deteksi dininya secara berturut-turut tidak didapatkan gejala abnormal (WHO, 2020).

Beberapa alasan pentingnya untuk deteksi dini kanker adalah insiden dan prevalensi cukup tinggi di masyarakat. Meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks disebabkan karena terlambatnya deteksi dini, kunjungan ke tempat pelayanan kesehatan biasanya dilakukan pada stadium lanjut yaitu stadium IIB-IVB (Azriful et al., 2022).

Perkembangan penyakit yang cukup lama merupakan alasan selanjutnya dilakukan deteksi dini untuk mengetahui sejak awal supaya lebih mudah untuk diobati. Teknik pemeriksaan yang sensitif dan spesifik serta adanya cara pengobatan yang efektif dan pemeriksaan tidak invasif menjadikan deteksi dini sangat penting dilakukan (Kemenkes, 2015). Ditinjau dari pentingnya dilakukan deteksi dini kanker maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang berisiko terkena kanker serviks.

Deteksi dini kanker serviks menurut (Kemenkes RI, 2009) yaitu :

1. Tes HPV

yaitu teknik pemeriksaan molekuler melalui DNA yang terkait dengan HPV diuji dari sebuah contoh sel yang diambil dari leher rahim.

2. Tes Pap Smear

Yaitu metode pemeriksaan standar untuk mendeteksi adanya kanker serviks, baik yang prakanker ataupun kanker. Tujuan pap smear yaitu untuk menemukan sel yang abnormal dan mendeteksi perubahan sifat sel serviks yang dapat berkembang menjadi kanker. Pada wanita yang sudah menikah ataupun yang aktif secara seksual dilakukan dengan mengambil cairan serviks dan diperiksa keadaan sel-selnya. Pada prakanker ditandai dengan adanya sel-sel yang abnormal. Pap smear dilakukan setiap tahun pada usia 18-65 tahun, setelah hasilnya 3 kali/lebih berturut-turut normal, bisa dilakukan 3 tahun sekali. Sedangkan untuk usia 65 keatas akan dilakukan pap smear 5 tahun sekali.

3. IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat)

Inspeksi Visual dilakukan dengan cairan asam asetat. Tes IVA dilakukan dengan mengusap serviks dengan cairan asam asetat sebanyak 3-5% dan larutan iodium lugol dengan bantuan lidi wollen, lalu dilihat

perubahan warna dalam 1-2 menit dengan mata telanjang. Warna putih pertanda sel abnormal dan telah mengalami prakanker, jika warnanya tidak berubah berarti sel normal (Pradya, 2015).

4. Servikografi

Servikografi berupa tes menggunakan kamera khusus yang digunakan untuk memfoto leher rahim kemudian foto dicetak dan diinterpretasikan oleh tenaga ahli.

5. Kolposkopi

Kolposkopi adalah pemeriksaan visual bertenaga tinggi untuk melihat leher rahim bagian luar dan kanal bagian dalam leher rahim. Pemeriksaan serviks dengan kaca pembesar yang dimodifikasi dari servikografi. Kolposkopi akan dilakukan jika pap smear terdapat tanda adanya lesi saat prakanker atau kanker invasif, tes HPV positif dan bila adanya pembuluh darah pada serviks saat tes IVA (WHO, 2020).

E. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Metode CerviScan

1. Pengertian Pemeriksaan Metode CerviScan


Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun, mengolah data, keterangan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar. Pemeriksaan Metode *CerviScan* yaitu pemeriksaan/deteksi dini kanker serviks melalui urine. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dini DNA HPV dari luruhan serviks di urine. Cara ini dianggap mudah dan murah dengan harapan dapat menjangkau seluruh masyarakat, terutama kelompok yang ekonominya rendah.

Launching *CerviScan* ini bertepatan dengan Bulan Kesadaran Kanker Serviks yang jatuh di Januari, perempuan Indonesia harus lebih peduli untuk menjaga kesehatan diri. *CerviScan* yang merupakan inovasi produk

karya anak bangsa untuk deteksi dini virus *Human Papillomavirus* (HPV) penyebab kanker serviks. Hadirnya *Cerviscan* merupakan salah satu solusi bagi wanita dan para ibu yang ragu melakukan pemeriksaan karena rasa takut, sehingga dapat meningkatkan cakupan skrining kanker serviks. Kurangnya informasi mengenai kanker serviks dan ketakutan menjalani skrining menjadi hambatan dalam pencegahan dan penanganan kasus kanker serviks. Masyarakat dapat memperoleh layanan *CerviScan* dimulai pada Februari 2023 dengan mendatangi 21 Lab Biofarma Group menggunakan alat PCR (*POLYMERASE CHAIN REACTION*) yang tersebar di 5 Kota. Diantaranya Bandung, Semarang, Medan, Jakarta dan Makassar serta 43 Lab yang terdiri atas Labkesda dan Laboratorium Swasta yang terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia seperti Makassar, Mojokerto, Palembang, Banyuwangi dll.

Penggunaan sampel urine untuk melihat kehadiran HPV DNA. Perangkat diagnosis berbasis ePCR ini mampu melakukan deteksi terhadap 14 jenis HPV yang berisiko tinggi menjadi penyebab kanker serviks. Sulawesi Selatan sebagai salah satu kota terbesar di Sulawesi yang dinilai potensial untuk pemasaran pelayanan skrining kanker serviks dengan kit *CerviScan*. Untuk itu, Makassar juga menjadi daerah kedua menawarkan layanan kesehatan skrining kanker serviks ini setelah Bandung, Jawa Barat yang merupakan wilayah kantor pusat Bio Farma.

Layanan *CerviScan* akan hadir di dua laboratorium Kota Makassar, yakni Laboratorium Rinra Medical Center dan Laboratorium Kimia Farma. Biaya pemeriksaan akan berbeda di setiap klinik di setiap kota, namun dalam mengakses layanan *CerviScan* diperkirakan berkisar Rp.300.000 hingga Rp.500.000 per pemeriksaan.



Gambar 2.1 CerviScan HPV-hr qPCR

2. Kelebihan Pemeriksaan Metode *CerviScan*

Adapun kelebihan pemeriksaan metode ini yaitu :

- a. Metode yang dilakukan hanya dengan pengambilan sampel urine yang kemudian diperiksa di laboratorium menggunakan alat PCR dengan hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan metode pap smear.
- b. Metode ini lebih memberikan kenyamanan pada perempuan dan harga yang kompetitif.
- c. Self-sampling dianggap dapat diterima karena privasi, kemudahan, penghematan waktu dan tenaga, efektivitas biaya, kemudahan, kenyamanan (termasuk berkurangnya rasa malu, rasa sakit, dan kecemasan), kecepatan, keamanan, dan keramahan pengguna.

3. Syarat Melakukan Pemeriksaan *CerviScan*

Adapun syarat sebelum melakukan pemeriksaan yaitu :

- a. Tidak dalam kondisi Menstruasi.
- b. Tidak melakukan hubungan suami istri minimal 24 jam sebelum pengambilan sampel.
- c. Tidak mengonsumsi air atau minuman berlebih sebelum pengambilan sampel.

Teknik/Prosedur Pengambilan Sampel Urine

- d. Pengambilan Sampel Urine

- 1) Lakukan Screening pada pasien sebelum pengambilan sampel terkait keluhan yang dialami pasien.
 - 2) Pastikan Syarat pengambilan sampel sudah dilakukan.
 - 3) Sampel urine yang diambil sebaiknya urine pertama dipagi hari.
 - 4) Gunakan POT steril saat pengambilan urine. (Gunakan POT urine ukuran 100cc).
 - 5) Beri label nama, tanggal lahir, tanggal pengambilan sampel dan waktu pengambilan sampel pada POT Urine.
 - 6) Setelah urine disimpan didalam wadah, pastikan wadah tertutup rapat dan gunakan pula parafilm untuk memastikan bahwa wadah tertutup dengan rapat.
 - 7) Simpan urine di suhu 2-8° C.
 - 8) Sebelum mengirim sampel diharapkan klinik perujuk memastikan Kembali sampel yang dikirim dalam kondisi baik.
- e. Pemeriksaan PCR HPV DNA
- 1) Pemeriksaan HPV DNA selanjutnya akan diperiksa di Klinik Rinra Medika.
 - 2) Penerimaan sampel dari pukul 08.00-12.00 WITA.
- f. Hasil Pemeriksaan
- 1) Hasil akan dikeluarkan Pukul 18.00 WITA dengan menyertakan surat keterangan hasil yang dikeluarkan oleh klinik Rinra Medika.
 - 2) Hasil dinyatakan Positif (+) Apabila nilai CT <40 dan Negatif (-) apabila nilai CT >40. CT value (*cycle threshold value*) adalah suatu nilai yang muncul dalam pemeriksaan PCR.

F. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Wanita

Persamaan hak pekerja laki-laki dan pekerja wanita dijamin dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 D ayat (2) menegaskan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam hal ini negara menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap para pekerja, baik dalam jenis pekerjaan, penempatan jabatan dalam bekerja, maupun pemberian upah (Susiana, 2019).

Umumnya, wanita banyak menghadapi masalah psikologis karena adanya berbagai perubahan yang dialami saat menikah, yaitu perubahan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga, bahkan juga sebagai ibu bekerja. Keterlibatan wanita yang sudah tampak membawa dampak terhadap peran wanita dalam kehidupan keluarga. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin banyaknya wanita membantu suami mencari tambahan penghasilan, selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi diluar rumah agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga (Parlagutan & Pratama, 2017).

Bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah internal yang memiliki nilai ibadah lebih di mata Allah SWT. karena dengan bekerja, kita menunjukkan usaha kita untuk mendapatkan rezeki sebagaimana diatur oleh Allah SWT. (Dalam Islam, 2019). Kewajiban bekerja telah tertulis di dalam firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat (9) 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Kementerian Agama RI, 2022).

Tafsir Al-Misbah (Muhammad Quraish Shihab). QS. At-Taubah/9:105. Katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, Bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik serta melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala pekerjaan kalian, dan Rasulullah serta orang Mukmin akan melihatnya. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi dengan perbuatan itu. Kemudian setelah mati, kalian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin kalian, lalu mengganjar dengan perbuatan kalian setelah Dia memberitahu kalian segala hal yang kecil dan besar dari perbuatan kalian itu (Tarigan,A.A.2022).

G. Tinjauan Umum Tentang Proses Pembuatan Tepung Terigu

Proses pembuatan tepung terigu diperoleh dari hasil penggilingan biji gandum yang mengalami beberapa tahap pengolahan. Beberapa tahap pengolahan tersebut yaitu tahap persiapan dan tahap penggilingan

1. Tahap Persiapan

- a. *Cleaning*; gandum dibersihkan dari kotoran-kotoran seperti debu, biji-biji lain selain gandum (seperti biji jagung, kedelai), kulit gandum, batang gandum, batu-batuan, kerikil, logam, dan lain-lain. Kontaminan-kontaminan tersebut harus dipisahkan dari gandum sebelum proses penggilingan. Penggunaan ayakan kasar dan magnet dapat memisahkan benda-benda asing dan substansi logam yang terdapat pada gandum.

b. *dampening & conditioning*; Proses dampening adalah proses penambahan air agar campuran gandum memiliki kadar air yang diinginkan. Proses *dampening* tergantung pada kandungan air dari gandum, kepadatan, dan kekerasan biji gandum. Setelah melalui proses *dampening* selanjutnya gandum mengalami *conditioning* dengan menambahkan air pada gandum dan didiamkan selama waktu tertentu agar air benar-benar meresap.


2. Tahap Penggilingan

a. *Breaking*; Prinsip proses penggilingan adalah memisahkan endosperma dari lapisan sel aleurone/lapisan kulit. Diawali dengan proses breaking, endosperma dihancurkan menjadi partikel- partikel dalam ukuran seragam dalam bentuk bubuk seukuran tepung.

b. *Reduction, sizing & tiling*; yaitu endosperma yang sudah dihancurkan diperkecil lagi menjadi tepung terigu, untuk selanjutnya diayak.

Proses tepung yang baik umumnya menghasilkan 74-84% tepung terigu sedangkan bran dan pollard kira-kira 20-26%. Tepung hasil produksi dianalisis di laboratorium kendali mutu untuk dianalisis kandungan-kandungan dalam tepung terigu yang meliputi penetapan kadar air, kadar abu, kadar protein, dan kadar gluten, uji warna, dll. Memasuki tahap akhir pengolahan tepung terigu, akan ditambahkan kalium bromat ke dalamnya. Kalium bromat dikenal sebagai oksidator kuat yang merusak sel serta dianggap sebagai karsinogen kategori 2B yang dilarang disebagian besar negara-negara maju. Karsinogenik adalah suatu zat yang diketahui dapat memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh, khususnya jika dikonsumsi atau terpapar secara berlebihan (Purnama. 2017).


H. Kerangka Teori



Gambar 2.2 Kerangka Teori

Sumber : WJ, kibicho (2014), Nwobodo H (2015), Depkes RI (2013)

I. Kerangka Konsep



Gambar 2.3
Kerangka Konsep

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian menggunakan *cross sectional study* merupakan penelitian yang mempelajari dinamika hubungan atau korelasi antara faktor risiko dengan dampak atau efeknya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan November 2023.

C. Populasi

Populasi adalah seluruh objek yang menjadi pusat perhatian penelitian, dalam ruang lingkup dan waktu yang ditentukan menjadi target atau sasaran penelitian (Mustafa & Winarno, 2020). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja wanita di unit kerja *packing* dan *logistic* yang bekerja di PT. Eastern Flour Mills yang berjumlah 32 pekerja wanita.

D. Sampel

Sampel adalah bagian populasi atau sejumlah anggota populasi yang mewakili karakteristik populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang mana jumlah sampel sama dengan populasi (Mustafa & Winarno, 2020). Maka sampel pada penelitian ini ialah pekerja wanita sebanyak di unit kerja *packing* dan *logistic* 32 pekerja wanita.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperlukan oleh seorang peneliti yang diperolehnya dari sumber utama secara langsung. Data didapatkan dilokasi penelitian. Sumber data primer ini didapatkan melalui pembagian kuesioner kepada responden untuk dijawab. Setelah itu data yang diperoleh dikelola melalui aplikasi SPSS (Syahza & Riau, 2021).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi/perusahaan. Data ini berupa data yang dipublikasikan kepada pihak lain, dalam arti data tersebut siapa saja dapat menggunakannya. Data Sekunder yang diperoleh yaitu data jumlah pekerja wanita dan profil instansi PT. Eastern Pearl Flour Mills.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan instrumen kuesioner. Kuesioner disusun penulis sesuai dengan data yang digunakan sesuai dengan variabel dalam penelitian. Peneliti akan memilih sampel sesuai dengan kriteria dengan melihat jawaban yang diberikan oleh responden.


Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan analisis lanjutan pada penelitian ini dimulai dengan pencarian *literature review* sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya peneliti akan mengumpulkan data sesuai dengan tujuan yang akan dicapai untuk kemudian dianalisis sesuai kebutuhan dalam penelitian.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa instrumen dalam bentuk kuesioner/formulir pertanyaan terbuka. Dan deteksi dini kanker serviks dengan metode *ServiScan* di lab klinik Rinra Medika.

H. Alur Penelitian





I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu :

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah formulir diisi oleh responden, data dikelola dengan beberapa langkah. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. *Editing*

merupakan upaya untuk memeriksa kembali data yang dikumpulkandan kebenaran data yang terkumpul. *Editing* dilakukan saat data sudah terkumpul atau saat tahap pengumpulan. Penyuntingan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap kuesioner/ formulir. Tujuan dari editing adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh kuesionernya semua telah diisi, relevan dan dapat dibaca dengan baik.

b. *Coding*

merupakan langkah pemberian kode berupa angka yang digunakan untuk mempermudah pengelompokan data. Hasil jawaban setiap pertanyaan diberi kode sesuai dengan petunjuk coding. Pemberian kode dilakukan untuk menyederhanakan data yang diperoleh.

c. *Entry data*

merupakan proses pemasukan data kedalam komputer setelah pemberian kode. Dilakukan setelah penelitian selesai. *Cleaning & Tabulating*

merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang telah selesai dimasukkan atau dentry untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya. *Tabulating* dilakukan untuk penyusunan dan perhitungan data dari hasil *coding* untuk disajikan dalam bentuk tabel dan dilakukan observasi.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis ini hanya menampilkan distribusi frekuensi dan persentase masing-masing variabel.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk melihat korelasi atau hubungan antar variabel penelitian. Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Chi-Square dalam program SPSS. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai $p\text{-value} < 0,05$ maka dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya bahwa kedua variabel secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan.

3. Penyajian Data

Setelah dilakukan penelitian, data yang didapatkan kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan narasi pada setiap penjelasan tabel sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Eastern Pearl Flour Mills dan Produknya

Pabrik tepung terigu di Makassar didirikan pada tahun 1972 dengan status PMA (Penanaman Modal Asing) dengan nama PT. Prima Indonesia sampai dengan tahun 1984. Kemudian tahun 1984 menjadi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dengan nama PT. Berdikari Sari Utama Flour Mills, yang beralamat di Jalan Hatta no. 302 dan jalan Nusantara Baru 36 Makassar. Namun Sejak tahun 2000 PT. EPFM diambil alih oleh Investor Asing Interflour Group yang berkantor pusat di Swiss kemudian terakhir tahun 2004 berganti nama menjadi PT. Eastern Pearl flour Mills.

Total kapasitas terpasang pabrik untuk menggiling gandum sebesar 2.800 ton/hari. Dengan bahan baku pokok adalah biji gandum. Biji gandum diimport dari Australia, Kanada, Amerika Serikat dan Argentina. Secara umum gandum dibedakan menjadi 2 jenis yaitu hard wheat (gandum berprotein tinggi) dan softwheat (gandum berprotein rendah).

Produk utama PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar ada 4 merk terigu yaitu Merk Gunung, Kompas, Gerbang dan Gatotkaca, semua terigu yang dihasilkan merupakan kualitas utama. Tetapi biasanya dalam penggunaannya terdapat spesifikasi penggunaan yang berbeda.


2. Fasilitas Pabrik PT. Eastern Pearl Flour Mills

- 1) Unit milling
- 2) Penerimaan gandum
- 3) Silo gandum

- 4) *Flour* silo dan *packing* produk dan by produk
- 5) *Pelletizing* (Penggilingan Dedak yang diolah menjadi pakan)
- 6) Gudang tepung dan pellet silo
- 7) Energi meliputi Listrik dan Air
- 8) Laboratorium
- 9) *Office Seaside and Cityside*
- 10) Fasilitas lainnya : Work Shop, Masjid dan Mushola, Koperasi dan Kantor Serikat Pekerja, Kantin, dan Poliklinik.

3. Struktur Organisasi PT. Eastern Pearl Flour Mills

Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat kontrol serta pengawasan bahkan dapat menciptakan persatuan dan dinamika suatu perusahaan. Adapun struktur organisasi PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Struktur Organisasi PT. Eastern Pearl Flour Mills
Uraian jabatan manajemen PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar

Dengan melihat struktur organisasi perusahaan tersebut, maka dapat diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian.

1) *Personnel*

Merencanakan, memeriksa dan mengawasi langsung kegiatan administrasi personalia dalam hal pendataan dan pencatatan administrasi, melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan *recruitment* dan *training*.

2) *Production Development Quality Control Manager*

Merencanakan, mengkoordinasikan dan memastikan seluruh fungsi dan tanggung jawab PDQC berjalan secara efektif mencakup dari gandum yang masuk sampai produk tepung siap dikirim. Memastikan semua produk tepung yang keluar dari pabrik memenuhi kriteria kualitas sesuai dengan peruntukannya. Menentukan gandum yang akan digiling yang tepat sesuai ketersediaan gandum yang ada.

3) *Engineering and Utility Manager*

Bertanggung jawab pada program mutu yang disebarluaskan melalui kebijakan mutu, sistem mutu perusahaan dan seluruh kegiatan operasional divisi Pemanfaatan dan Pemeliharaan mesin pabrik.

4) *Production Manager*

Merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan dalam Departemen Produksi, seperti proses *cleaning* dan *milling*.

5) *Shipping Manager*

Mengkoordinasikan dan mengontrol harian kegiatan *shipping*, *loading* dan *unloading* untuk *incoming raw material* dan pengisian di silo.

6) *Quality Assurance*

Mengkoordinasikan pengembang aktifitas jaminan mutu yang ada di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

7) *Packing-Warehouse Manager*

Merencanakan produksi harian, pengambilan material dan mengontrol jalannya produksi dan kebersihan *area flour packing* serta menganalisa hasil produksi. Memastikan pencapaian hasil produksi sesuai dengan target yang telah direncanakan setiap bulan dan memastikan dalam pengoperasian mesin-mesin pendukung selalu dalam keadaan normal dan sesuai dengan batas toleransi yang diizinkan untuk pencapaian hasil produksi yang maksimal.

8) *Logistic Assistant Manager*

Menetapkan, merencanakan, memeriksa dan mengawasi semua kegiatan *personel logistic department*, mencakup proses pendistribusian produk dari pabrik hingga ke gudang *customer*.

9) *General Affairs Manager*

Merencanakan, mengarahkan serta mengendalikan langsung fungsi departemen *General Affairs, Cleaning and Hygiene* untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan.

10) *General Accounting Manager*

Merencanakan, mengarahkan serta mengendalikan semua pekerjaan departemen *accounting*, dimana di dalamnya tercakup pengumpulan dan penyusunan data serta, pelaporan semua kegiatan akuntansi dan keuangan.

11) *Cost Account Manager*

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi serta mengendalikan semua kegiatan untuk *Costing section*.

B. Hasil Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi, frekuensi dan karakteristik dari data hasil penelitian yang telah dilakukan.

a. Karakteristik Responden (Faktor Individu)

- 1) Usia, Agama, Suku, Pendidikan Terakhir, Masa Kerja, Unit Kerja dan Status Pernikahan

Tabel 4.1
Karakteristik Responden berdasarkan Usia, Agama, Suku, Pendidikan Terakhir, Masa kerja, Unit Kerja, dan Status Pernikahan Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Usia		Agama	Suku	Pendidikan Terakhir	Masa kerja	Unit Kerja	Status Pernikahan
Thn	(n)						
22	2	Islam Kristen	Makassar Toraja	Tamat D4 Tamat D4	1 tahun 1 tahun	<i>Packing</i> <i>Logistic</i>	Belum Menikah Belum Menikah
23	1	Islam	Makassar	Tamat S1	3 tahun	<i>Logistic</i>	Belum Menikah
24	2	Islam Tionghoa	Bugis Makassar	Tamat S1 Tamat D3	3 tahun 2 tahun	<i>Logistic</i> <i>Packing</i>	Belum Menikah Belum Menikah
25	2	Islam Islam	Bugis Bugis	Tamat S1 Tamat S1	2 tahun 4 tahun	<i>Logistic</i> <i>Packing</i>	Sudah Menikah Belum Menikah
26	3	Tionghoa Islam Islam	Makassar Bugis Jawa	Tamat D3 Tamat S1 Tamat D3	4 tahun 3 tahun 4 tahun	<i>Packing</i> <i>Logistic</i> <i>Packing</i>	Belum Menikah Belum Menikah Belum Menikah
29	1	Islam	Makassar	Tamat S1	3 tahun	<i>Logistic</i>	Belum Menikah
30	1	Islam	Makassar	Tamat S1	6 tahun	<i>Logistic</i>	Sudah Menikah
32	1	Islam	Bugis	Tamat S1	8 tahun	<i>Logistic</i>	Belum Menikah
33	3	Islam Islam Islam	Bugis Bugis Bugis	Tamat S1 Tamat S1 Tamat S1	10 tahun 12 tahun 12 tahun	<i>Logistic</i> <i>Logistic</i> <i>Logistic</i>	Belum Menikah Sudah Menikah Belum Menikah
35	2	Islam Islam	Bugis Makassar	Tamat S1 Tamat SMA	12 tahun 3 tahun	<i>Logistic</i> <i>Packing</i>	Sudah Menikah Sudah Menikah
38	1	Islam	Bugis	Tamat S1	13 tahun	<i>Logistic</i>	Belum Menikah
40	1	Katolik	Makassar	Tamat S1	15 tahun	<i>Packing</i>	Sudah Menikah
41	1	Islam	Bugis	Tamat S1	16 tahun	<i>Logistic</i>	Sudah Menikah
42	1	Islam	Makassar	Tamat S1	19 tahun	<i>Packing</i>	Belum Menikah
43	3	Islam Islam Islam	Makassar Makassar Bugis	Tamat D4 Tamat S1 Tamat SMA	15 tahun 20 tahun 10 tahun	<i>Packing</i> <i>Packing</i> <i>Packing</i>	Sudah Menikah Sudah Menikah Sudah Menikah
44	2	Islam Islam	Minang Makassar	Tamat S1 Tamat SMA	14 tahun 20 tahun	<i>Logistic</i> <i>Logistic</i>	Sudah Menikah Sudah Menikah
45	1	Islam	Bugis	Tamat SMA	18 tahun	<i>Logistic</i>	Sudah Menikah
46	1	Buddha	Makassar	Tamat SMA	25 tahun	<i>Packing</i>	Sudah Menikah
50	1	Islam	Bugis	Tamat S1	9 tahun	<i>Packing</i>	Sudah Menikah
54	2	Islam Islam	Bugis Makassar	Tamat SMA Tamat S1	28 tahun 6 tahun	<i>Packing</i> <i>Logistic</i>	Sudah Menikah Sudah Menikah
Total	32						

Sumber: Data Primer, 2023

Tabel 4.1, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan Usia pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar. Adapun responden yang usia 22 tahun yaitu 2 orang (6.3%), 23 tahun yaitu

1 orang (3.1%), 24 tahun yaitu 2 orang (6.3%), 25 tahun yaitu 2 orang (6.3%), 26 tahun yaitu 3 orang (9.4%). Adapun responden yang berusia 29, 30 dan 32 masing-masing 1 orang (3.1%), 33 tahun yaitu 3 orang (9.4%), dan 35 tahun yaitu 2 orang (6.3%). Sementara itu, responden usia 38, 40, 41 dan 42 tahun masing-masing 1 orang (3.1%), 43 tahun yaitu 3 orang (9.4%), dan usia 44 tahun yaitu 2 orang (6.3%). Adapun responden yang berusia 45, 46 dan 50 tahun masing-masing 1 orang (3.1%) serta responden yang berusia 54 tahun yaitu 2 orang (6.3%).

Tabel 4.1, distribusi frekuensi berdasarkan Agama pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar tahun 2023. Responden agama Islam yaitu 27 orang (84.4%), agama kristen 3 orang (9.4%), dan responden agama Katolik dan Buddha yaitu 1 orang (3.1%).

Tabel 4.1, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan Suku pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills sebagian besar responden bersuku Bugis yaitu 15 orang (46.9%), suku makassar yaitu 12 orang (37.5%), suku Tionghoa yaitu 2 orang (6.3%) sedangkan sebagian kecil suku Toraja, Jawa dan Minang yaitu 1 orang (3.1%).

Tabel 4.1, Distribusi frekuensi berdasarkan Pendidikan Terakhir pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu S1 dengan jumlah 20 orang (62.5%), tamat D4 yaitu 3 orang (9.4%), tamat D3 yaitu 3 orang (9.4%), sedangkan tamat SMA yaitu 6 orang (18.8%).

Tabel 4.1, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan Masa Kerja pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu responden yang memiliki masa kerja 1 dan 2 tahun masing-masing 2 orang (6.3%), masa kerja 3 tahun yaitu 5 orang (15.6%), masa kerja 4 tahun yaitu 3 orang (9.4%), masa kerja 6 tahun yaitu 2 orang (6.3%), masa kerja 8 dan

9 tahun masing-masing 1 orang (3.1%) dan 10 tahun yaitu 2 orang (6.3%). Adapun responden masa kerjanya 12 tahun yaitu 3 orang (9.4%), 13 dan 14 tahun masing-masing 1 orang (3.1%), 15 tahun yaitu 2 orang (6.3%), masa kerja 16, 18 dan masa kerjanya 19 tahun masing-masing 1 orang (3.1%), 20 tahun yaitu 2 orang (6.3%), 25 tahun yaitu 1 orang (3.1%) dan masa kerja 28 tahun yaitu 1 orang (3.1%).

Tabel 4.1, Distribusi frekuensi berdasarkan Unit Kerja pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 14 responden (43.8%) unit kerja *Packing* dan 18 responden (56.3%) unit kerja *Logistic*.

Tabel 4.1, Distribusi frekuensi berdasarkan status pernikahan pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 15 responden (46.9%) status belum menikah dan 17 responden (53.1 %) status sudah menikah.

2) Usia

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Usia Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Usia	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tua (> 35 tahun)	14	43.8
Muda (\leq 35 tahun)	18	56.2
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan usia pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Diperoleh kelompok usia tua sebanyak 14 responden (43.8%) dan kelompok usia muda sebanyak 18 responden (56.2%).

3) Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan
Status Pendidikan Terakhir Pekerja Wanita
PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Pendidikan Menengah (SMA, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, Madrasah Tsanawiyah)	6	18.8
Pendidikan Tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor)	26	81.2
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan status pendidikan pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills, ada 6 responden (18.8%) memiliki pendidikan menengah dan 26 responden (81.2%) memiliki pendidikan Tinggi.

4) Suku

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Suku
Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Suku	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Bugis	15	46.9
Makassar	12	37.5
Toraja	1	3.1
Tionghoa	2	6.3
Jawa	1	3.1
Minang	1	3.1
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan suku pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills tahun 2023, yaitu 15 responden (46.9%) suku Bugis, 12 responden (37.5%) suku Makassar, 1 responden (3.1%) suku Toraja, 2 responden (6.3%) suku

Tionghoa, 1 responden (3.1%) suku Jawa dan 1 responden (3.1%) suku Minang.

5) Agama

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Agama
Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Agama	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Islam	27	84.4
Kristen	3	9.4
Katolik	1	3.1
Buddha	1	3.1
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan Agama pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills, terdapat 27 responden (84.4%) agama Islam, 3 responden (9.4%) agama Kristen, 1 responden (3.1%) agama Katolik dan 1 responden (3.1%) agama Buddha.

6) Status Pernikahan

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Status
Pernikahan Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Status Pernikahan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Belum Menikah	15	46.9
Sudah Menikah	17	53.1
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan status pernikahan pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills, yaitu 15 responden (46.9%) belum menikah dan 17 responden (53.1 %) sudah menikah.

b. Faktor Reproduksi Wanita & Kehamilan

- 1) Usia Responden, Usia Pertamakali Menikah, Pemakaian Alat Kontrasepsi, Jumlah Kehamilan (Paritas), Jumlah Anak, Riwayat Abortus, Riwayat Penyakit IMS, Vaksinasi HPV dan Hasil Pemeriksaan *CerviScan*.

Tabel 4.7
Faktor Reproduksi Responden Berdasarkan Usia Responden, Usia Pertamakali Menikah, Jumlah Paritas, Jumlah Anak, Riwayat Abortus, Riwayat Penyakit IMS, Vaksinasi HPV dan Hasil Pemeriksaan *CerviScan* pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Usia responden	Usia saat pertama kali menikah		Alat Kontrasepsi	Paritas	Jumlah anak	Abortus	Riwayat Penyakit		Vaksinasi HPV	Hasil <i>CerviScan</i>	
	Thn	(n)					IMS	Keluarga yg ca.serviks			Positif (+)
45	20	1	(Oral)	2	2	-			-		
43	23	1	(Oral)	3	3	-	✓		-	+	
50	24	2	(Oral)	5	3	2	✓		-	+	
30			(Oral)	3	2	1					
33	25	4	(Oral)	2	2	-			✓		
35			-	3	3	-			-		
43			-	1	1	-			-		
25			-	-	-	-			-		
3	26	1	(Oral)	5	3	2		✓	-	+	
44	27	3	(Oral)	3	2	1			✓		
46			-	1	1	-			-		
35			-	1	1	-			-		
54	28	1	-	3	3	-			-		
54	29	4	(Oral)	2	2	-				+	
40			(Oral)	2	2	-					✓
44			-	3	3	-					✓
41			-	-	-	-					✓
		17									

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.7, menunjukkan distribusi frekuensi usia saat pertamakali Menikah pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills. Sebagian besar responden menikah usia 26-30 tahun yaitu 9 orang dan sebagian kecil responden menikah usia 20-25 tahun yaitu 8 orang. Responden yang menikah usia 20 tahun yaitu 1 orang (5.9%), usia 23 tahun yaitu 1 orang (5.9%), usia 24 tahun yaitu 2 orang (11.8%), usia 25 tahun yaitu 4 orang (23.5%),

usia 26 tahun yaitu 1 orang (5.9%), usia 27 tahun yaitu 3 orang (17.6%), usia 28 tahun yaitu 1 orang (5.9%) dan usia 29 tahun yaitu 4 orang (23.5%).

Tabel 4.7, menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan Pemakaian Alat Kontrasepsi pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 9 responden (28.1%) yang memakai alat kontrasepsi Oral dan 8 responden (25.0 %) tidak memakai alat kontrasepsi.

Tabel 4.7, menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan Paritas (jumlah kehamilan) pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills. Adapun responden yang paritas 1 kali yaitu 3 orang (20.0%), paritas 2 kali yaitu 4 orang (26.7%), paritas 3 kali yaitu 6 orang (40.0%), sedangkan paritas 5 kali yaitu 2 orang (13.3%).

Tabel 4.7, menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan Jumlah Anak pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills. Responden yang memiliki 1 anak yaitu 3 orang (20.0%), 2 anak yaitu 6 orang (40.0%), sedangkan yang memiliki 3 anak yaitu 6 orang (40.0%).

Tabel 4.7, menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan Riwayat Abortus pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills. Responden yang memiliki riwayat abortus 1 kali yaitu 2 orang (13.3%) dan riwayat abortus 2 kali yaitu 2 orang (13.3%).

Tabel 4.7, menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan riwayat infeksi menular seksual (IMS) pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 2 responden (6.3%) yang mempunyai Riwayat Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS). Adapun berdasarkan riwayat keluarga yang pernah terkena kanker serviks yaitu terdapat 2 responden (6.3%) yang ada riwayat keluarga terkena kanker serviks.

Tabel 4.7, menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan Penggunaan Vaksinasi HPV pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 4 orang (12.5%) sudah vaksin HPV dan 28 orang (87.5%) belum pernah vaksin HPV.

Tabel 4.7, menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan Hasil Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode *CerviScan* pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 4 orang (12.5%) yang hasil pemeriksaannya positif.

2) Riwayat Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)

Tabel 4.8

Distribusi Frekuensi Riwayat Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Riwayat IMS	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Ada	2	6.3
Tidak Ada	30	93.7
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.8, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan riwayat IMS pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 2 orang (6.3%) yang mempunyai Riwayat Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan terdapat 30 orang (93.7%) yang tidak mempunyai Riwayat Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS).

3) Riwayat Keluarga yang Pernah Terkena Kanker Serviks

Tabel 4.9

Distribusi Frekuensi Riwayat Keluarga yang Pernah Terkena Kanker Serviks Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Riwayat Keluarga Terkena Kanker Serviks	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Ada	2	6.3
Tidak Ada	30	93.7
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.9, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan riwayat keluarga yang pernah terkena kanker serviks pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills, 2 responden (6.3%) yang ada riwayat keluarga terkena kanker serviks dan terdapat 30 responden (93.7%) yang tidak mempunyai riwayat keluarga terkena kanker serviks.

4) Vaksinasi HPV

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Penggunaan Vaksinasi HPV Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Vaksin HPV	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Sudah Pernah	4	12.5
Belum Pernah	28	87.5
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan penggunaan vaksinasi HPV pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills, terdapat 4 responden (12.5%) yang sudah vaksin HPV dan terdapat 28 responden (87.5%) belum pernah vaksin HPV.

5) Penggunaan Pembalut saat Menstruasi

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Penggunaan Pembalut saat Menstruasi Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Penggunaan Pembalut saat Menstruasi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
> 5 Jam	10	31.3
≤ 5 Jam	22	68.7
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.11, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan penggunaan pembalut saat menstruasi pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 10 responden (31.3%), yang pada saat menstruasi menggunakan pembalut selama >5 jam

dan 22 responden (68.7%) yang pada saat menstruasi menggunakan pembalut selama ≤ 5 Jam.

6) Penggunaan Pembersih Kewanitaan

Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi Penggunaan Pembersih Kewanitaan Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Penggunaan Pembersih Kewanitaan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Ya	11	34.4
Tidak	21	65.6
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.12, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan penggunaan pembersih kewanitaan pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 11 responden (34.4%) menggunakan pembersih kewanitaan dan sebanyak 21 responden (65.6%) yang tidak menggunakan pembersih kewanitaan.

7) Usia saat Pertamakali Menikah

Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Usia saat Pertamakali Menikah Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Usia Pertamakali Menikah	Frekuensi (n)	Persentase (%)
≤ 20 tahun	1	3.1
> 20 tahun	16	50.0
Belum Menikah	15	46.9
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.13, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan usia saat pertamakali menikah pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 1 responden (3.1%) berusia ≤ 20 tahun, sebanyak 16 responden (50.0%) yang berusia > 20 tahun dan 15 responden (46.9%) belum menikah.

8) Pemakaian Alat Kontrasepsi

Tabel 4.14
Distribusi Frekuensi Pemakaian Alat Kontrasepsi Pekerja Wanita
PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Pemakaian Alat Kontrasepsi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Ya	9	28.1
Tidak	8	25.0
Belum Pernah (Belum Menikah)	15	46.9
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.14, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan pemakaian alat kontrasepsi pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 9 responden (28.1%) menggunakan alat kontrasepsi, sebanyak 8 responden (25.0%) tidak menggunakan alat kontrasepsi dan 15 responden (46.9%) belum pernah menggunakan alat kontrasepsi (belum menikah).

9) Jumlah Kehamilan (Paritas)

Tabel 4.15
Distribusi Frekuensi Jumlah Kehamilan (Paritas) Pekerja Wanita
PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Jumlah Kehamilan (Paritas)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
> 3 Kali	5	15.6
≤ 3 Kali	10	31.3
Belum Hamil	17	53.1
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.15, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan Jumlah Kehamilan (Paritas) pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 5 responden (15.6%) yang jumlah

paritasnya > 3 kali, sebanyak 10 responden (31.3%) yang jumlah paritasnya ≤ 3 Kali dan 17 responden (53.1%) belum hamil.

10) Jumlah Anak

Tabel 4.16
Distribusi Frekuensi Jumlah Anak Pekerja Wanita
PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Jumlah Anak	Frekuensi (n)	Persentase (%)
> 2 Anak	4	12.5
≤ 2 Anak	11	34.4
Belum Memiliki Anak	17	53.1
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.15, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan jumlah anak pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 4 responden (12.5%) yang memiliki > 2 anak, sebanyak 11 responden (34.4%) yang memiliki ≤ 2 anak dan 17 responden (53.1%) belum memiliki anak.

11) Riwayat Abortus

Tabel 4.17
Distribusi Frekuensi Riwayat Abortus Pekerja Wanita
PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Riwayat Abortus	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Pernah >1 Kali	4	12.5
Tidak Pernah	13	40.6
Belum Menikah	15	46.9
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.17, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan riwayat abortus pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 4 responden (12.5%) yang pernah mengalami abortus > 1 Kali, sebanyak 13 responden (40.6%) yang tidak pernah mengalami abortus dan 15 responden (46.9%) yang belum menikah.

c. Faktor Pekerjaan

1) Unit Kerja

Tabel 4.18
Distribusi Frekuensi Unit Kerja Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Unit Kerja	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<i>Packing</i>	14	43.7
<i>Logistic</i>	18	56.3
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.18, menunjukkan dari 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan unit kerja pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 14 responden (43.7%) pada unit kerja *Packing* dan 18 responden (56.3%) pada unit kerja *Logistic*.

2) Masa Kerja

Tabel 4.19
Distribusi Frekuensi Masa Kerja Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Masa Kerja	Frekuensi (n)	Persentase (%)
> 5 tahun	20	62.5
≤ 5 tahun	12	37.5
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.19, menunjukkan dari 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan masa kerja pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 20 responden (62.5%) yang masa kerjanya > 5 tahun dan 12 responden (37.5%) yang masa kerjanya ≤ 5 tahun.

3) Hasil Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode *CerviScan***Tabel 4.20****Distribusi Frekuensi Hasil Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode *CerviScan* Pekerja Wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023**

Deteksi Dini Kanker Serviks	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Positif (+)	4	12.5
Negatif (-)	28	87.5
Total	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.20, menunjukkan dari total 32 responden, distribusi frekuensi berdasarkan Hasil Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode *CerviScan* pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills yaitu 4 responden (12.5%) yang hasil pemeriksaannya positif dan terdapat 28 responden (87.5%) yang hasil pemeriksaannya negatif.

2. Hasil Analisis Uji Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian.

- a. Hubungan Usia dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.21
Hubungan Usia dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Usia	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total		<i>p- value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Tua (> 35 tahun)	4	28.6	10	71.4	14	100	0.028
Muda (≤ 35 tahun)	0	0.0	18	100.0	18	100	
Total	4	12.5	28	87.5	32	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.21 menunjukkan bahwa dari 32 responden, hasil deteksi dini kanker serviks (Positif) menggunakan metode *CerviScan* dengan kelompok usia kategori Tua (>35 tahun) yaitu 4 responden (28.6%), dan kelompok usia kategori Muda (≤35 tahun) yaitu 0 responden (0.0%), sedangkan hasil deteksi dini kanker serviks (Negatif) menggunakan metode *CerviScan* dengan kelompok usia Tua (>35 tahun) yaitu 10 responden (71.4%) dan kelompok usia Muda (≤35 tahun) yaitu 18 responden (100.0%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai $p < 0.05$ atau (0.028) menunjukkan, terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- b. Hubungan Pendidikan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.22
Hubungan Pendidikan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks
Menggunakan Metode *CerviScan* Pekerja Wanita
PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Pendidikan Terakhir	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total		<i>p-value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Pendidikan Menengah	0	0.0	6	100.0	6	100	0.566
Pendidikan Tinggi	4	15.4	22	84.6	26	100	
Total	4	12.5	28	87.5	32	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.22, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini kanker serviks (Positif) menggunakan metode *CerviScan* dengan tingkat pendidikan menengah yaitu 0 responden (0.0%) dan tingkat pendidikan tinggi yaitu 4 responden (15.4%), sedangkan yang hasil deteksi dini kanker serviks (Negatif) menggunakan metode *CerviScan* dengan tingkat pendidikan menengah yaitu 6 responden (100.0%) dan tingkat Pendidikan tinggi yaitu 22 (84.6%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai $p > 0.05$ atau (0.566) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- c. Hubungan Status Pernikahan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.23
Hubungan Status Pernikahan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan* Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Status Pernikahan	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total		<i>p-value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Sudah Menikah	4	23.5	13	76.5	17	100	0.104
Belum Menikah	0	0.0	15	100.0	15	100	
Total	4	12.5	28	87.5	32	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.23, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini kanker serviks (Positif) menggunakan metode *CerviScan* dengan tingkat status pernikahan sudah menikah yaitu 4 responden (23.5%) dan pada status pernikahan belum menikah yaitu 0 responden (0.0%), sedangkan yang hasil deteksi dini kanker serviks (Negatif) menggunakan metode *CerviScan* dengan status pernikahan sudah menikah yaitu 13 responden (76.5%) dan pada status pernikahan belum menikah yaitu 15 responden (100.0%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai $p > 0.05$ atau (0.104) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status pernikahan dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.

d. Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.24

Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan* Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Riwayat IMS	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total		<i>p- value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Ada	2	100.0	0	0.0	2	100	0.012
Tidak Ada	2	6.7	28	93.3	30	100	
Total	4	12.5	28	87.5	32	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.24, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini kanker serviks (Positif) menggunakan metode *CerviScan* dengan yang memiliki riwayat infeksi menular seksual yaitu 2 responden (100.0 %) dan tidak memiliki riwayat infeksi menular seksual yaitu 2 responden (6.7%), sedangkan yang hasil deteksi dini kanker serviks (Negatif) menggunakan metode *CerviScan* dengan yang memiliki riwayat infeksi menular seksual yaitu 0 responden (0.0%) dan yang tidak memiliki riwayat infeksi menular seksual yaitu 28 responden (93.3%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai $p < 0.05$ atau (0.012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat infeksi menular seksual dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- e. Hubungan Riwayat Keluarga yang Pernah Terkena Kanker Serviks dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.25
Hubungan Riwayat Keluarga yang Pernah Terkena Kanker Serviks dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan* Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Riwayat Keluarga Terkena Kanker Serviks	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total		<i>p-value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Ada	2	100.0	0	0.0	2	100	0,012
Tidak Ada	2	6.7	28	93.3	30	100	
Total	4	12.5	28	87.5	32	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.25, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini kanker serviks (Positif) menggunakan metode *CerviScan* dengan yang memiliki riwayat keluarga kanker serviks yaitu 2 responden (100.0%) dan yang tidak memiliki riwayat keluarga kanker serviks yaitu 2 responden (6.7%), sedangkan yang hasil deteksi dini kanker serviks (Negatif) menggunakan metode *CerviScan* dengan yang memiliki riwayat keluarga kanker serviks yaitu 0 responden (0.0%) dan yang tidak memiliki riwayat keluarga kanker serviks yaitu 28 responden (93.3%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai $p < 0.05$ atau (0.012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga yang terkena kanker serviks dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

f. Hubungan Vaksinasi HPV dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.26
Hubungan Vaksinasi HPV dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan* Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Vaksin HPV	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total		<i>p-value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Belum Pernah	4	14.3	24	85.7	28	100	1.000
Sudah Pernah	0	0.0	4	100.0	4	100	
Total	4	12.5	28	87.5	32	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.26, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini kanker serviks (Positif) menggunakan metode *CerviScan* dengan yang belum pernah vaksin HPV yaitu 4 responden (14.3%) dan pada responden yang sudah pernah vaksin HPV yaitu 0 responden (0.0%), sedangkan yang hasil deteksi dini kanker serviks (Negatif) menggunakan metode *CerviScan* dengan responden yang belum pernah vaksin HPV yaitu 24 responden (85.7%) dan yang sudah pernah vaksin HPV yaitu 4 (100%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai $p > 0.05$ atau (1.000) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan vaksin HPV dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.

M A K A S S A R

g. Hubungan Penggunaan Pembalut saat Menstruasi dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.27

Hubungan Penggunaan Pembalut pada saat Menstruasi dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Penggunaan Pembalut	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total	<i>p- value</i>
	Positif		Negatif			
	n	%	n	%		
> 5 jam	4	40.0	6	60.0	10	100
≤ 5 jam	0	0.0	22	100.0	22	100
Total	4	12.5	28	87.5	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.27, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini kanker serviks (Positif) menggunakan metode *CerviScan* dengan yang menggunakan pembalut (>5 jam) yaitu 4 responden (40.0%) dan pada responden yang menggunakan pembalut (≤ 5 jam) yaitu 0 responden (0.0%), sedangkan hasil deteksi dini kanker serviks (Negatif) metode *CerviScan* dengan yang menggunakan pembalut (>5 jam) yaitu 6 responden (60.0%) dan responden yang menggunakan pembalut (≤ 5 jam) yaitu 22 responden (100.0%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai $p < 0.05$ atau (0.006) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan pembalut dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- h. Hubungan Penggunaan Pembersih Kewanitaan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.28
Hubungan Penggunaan Pembersih Kewanitaan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan* Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Pembersih Kewanitaan	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total		<i>p- value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Ya	4	36.4	7	63.6	11	100	0.009
Tidak	0	0.0	21	100.0	21	100	
Total	4	12.5	28	87.5	32	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.28, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini kanker serviks (Positif) menggunakan metode *CerviScan* dengan responden yang menggunakan pembersih kewanitaan yaitu 4 responden (36.4%) dan pada responden yang tidak menggunakan pembersih kewanitaan yaitu 0 responden (0.0%), sedangkan yang hasil deteksi dini kanker serviks (Negatif) menggunakan metode *CerviScan* dengan responden yang menggunakan pembersih kewanitaan yaitu 7 responden (63.6%) dan yang tidak menggunakan pembersih kewanitaan yaitu 21 responden (100.0%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai $p < 0.05$ atau (0.009) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan pembersih kewanitaan dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- i. Hubungan Usia saat Pertamakali Menikah dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.29
Hubungan Usia saat Pertamakali Menikah dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan* Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Usia Pertamakali Menikah	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total	<i>p- value</i>	
	Positif		Negatif				
	n	%	n	%	N	%	
≤ 20 tahun	0	0.0	1	100.0	1	100	0.047
> 20 tahun	4	26.7	12	73.3	16	100	
Belum Menikah	0	0.0	15	100.0	15	100	
Total	4	12.5	28	87.5	32	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.29, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini kanker serviks (Positif) menggunakan metode *CerviScan* dengan kelompok usia (≤ 20 tahun) yaitu 0 responden (0.0%), usia pertamakali menikah (> 20 tahun) yaitu 4 responden (26.7%) dan pada kelompok usia belum menikah yaitu 0 responden (0.0%), sedangkan yang hasil deteksi dini kanker serviks (Negatif) menggunakan metode *CerviScan* dengan kelompok usia (≤ 20 tahun) yaitu 1 responden (100.0%), usia pertamakali menikah (> 20 tahun) yaitu 12 responden (73.3%) dan pada kelompok usia belum menikah yaitu 15 responden (100.0%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Likelihood Ratio)* didapatkan nilai $p < 0.05$ atau (0.047) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia pertamakali menikah dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- j. Hubungan Pemakaian Alat Kontrasepsi dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.30
Hubungan Pemakaian Alat Kontrasepsi dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan* Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Pemakaian Alat Kontrasepsi	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total	<i>p- value</i>
	Positif		Negatif			
	n	%	n	%	N	%
Ya	4	44.4	5	55.6	9	100
Tidak	0	0.0	8	100.0	8	100
Belum Pernah (Belum Menikah)	0	0.0	15	100.0	15	100
Total	4	12.5	28	87.5	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.30, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini (Positif) menggunakan metode *CerviScan* dengan responden yang memakai alat kontrasepsi oral 4 responden (44.4%), responden yang tidak memakai alat kontrasepsi 0 responden (0.0%) dan responden belum pernah memakai alat kontrasepsi (belum menikah) 0 responden (0.0%), sedangkan hasil deteksi dini (Negatif) menggunakan metode *CerviScan* dengan responden yang memakai alat kontrasepsi oral 5 responden (55.6%), responden yang tidak memakai alat kontrasepsi yaitu 8 responden (100.0%) dan responden yang belum pernah memakai alat kontrasepsi (belum menikah) 15 responden (100.0%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Likelihood Ratio)* didapatkan nilai $p < 0.05$ atau (0.003), terdapat hubungan yang signifikan antara pemakaian alat kontrasepsi dengan deteksi dini kanker serviks

menggunakan metode *CerviScan* pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- k. Hubungan Jumlah Kehamilan (Paritas) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*.

Tabel 4.31
Hubungan Jumlah Kehamilan (Paritas) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan* Pekerja Wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Paritas	Deteksi Dini Kanker Serviks Metod <i>CerviScan</i>				Total N	<i>p- value</i> %
	Positif		Negatif			
	n	%	n	%		
> 3 Kali	2	44.4	3	55.6	5	100
≤ 3 Kali	2	20.0	8	80.0	10	100
Belum Hamil	0	0.0	17	100.0	17	100
Total	4	12.5	28	87.5	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.31, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini (Positif) metode *CerviScan* dengan responden memiliki paritas (>3 Kali) yaitu 2 responden (44.4%), responden memiliki paritas (≤3 Kali) yaitu 2 responden (20.0%) dan responden belum hamil yaitu 0 responden (0.0%), sedangkan hasil deteksi dini (Negatif) metode *CerviScan* dengan responden yang memiliki paritas(>3 Kali) yaitu 3 responden (55.6%), responden yang memiliki paritas (≤ 3 Kali) yaitu 8 responden (80.0%) dan pada responden belum hamil yaitu 17 responden (100.0%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai $p < 0.05$ atau (0.025) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Jumlah kehamilan (paritas) dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

1. Hubungan Jumlah Anak dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*.

Tabel 4.32
Hubungan Jumlah Anak dengan Deteksi Dini Kanker Serviks
Menggunakan Metode *CerviScan* pada Pekerja Wanita
PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Jumlah Anak	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total	<i>p-value</i>	
	Positif		Negatif				
	n	%	n	%			N
> 2 Anak	3	75.0	1	25.0	4	100	0.002
≤ 2 Anak	1	9.1	10	90.9	11	100	
Belum memiliki Anak	0	0.0	17	100.0	17	100	
Total	4	12.5	28	87.5	32	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.32, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini (Positif) metode *CerviScan* dengan responden yang mempunyai >2 anak yaitu 3 responden (75.0%), responden yang mempunyai ≤2 anak yaitu 1 responden (9.1%) dan responden yang belum mempunyai anak yaitu 0 responden (0.0%), sedangkan yang hasil deteksi dini (Negatif) metode *CerviScan* dengan responden mempunyai >2 anak yaitu 1 responden (25.0%), responden mempunyai ≤ 2 anak yaitu 10 responden (90.9%), dan responden yang belum mempunyai anak yaitu 17 responden (100.0%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Likelihood Ratio)* didapatkan nilai $p < 0.05$ atau (0.002) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah anak dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

m. Hubungan Riwayat Abortus (Keguguran) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.33
Hubungan Riwayat Abortus dengan Deteksi Dini Kanker Serviks
Menggunakan Metode *CerviScan* Pekerja Wanita
PT.Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Riwayat Abortus	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total	<i>p- value</i>	
	Positif		Negatif				
	n	%	n	%	N	%	
Pernah > 1 Kali	2	50.0	2	50.0	4	100	0.025
Tidak Pernah	2	15.4	11	84.6	13	100	
Belum Menikah	0	0.0	15	100.0	15	100	
Total	4	12.5	28	87.5	32	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.33, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini (Positif) menggunakan metode *CerviScan* dengan responden yang pernah mengalami abortus (>1 kali) yaitu 2 responden (50.0%), responden yang tidak pernah mengalami abortus yaitu 2 responden (15.4%), dan responden yang belum menikah yaitu 0 responden (0.0%), sedangkan yang hasil deteksi dini (Negatif) menggunakan metode *CerviScan* dengan responden pernah mengalami abortus (>1 kali) yaitu 2 responden (50.0%), responden yang tidak pernah mengalami abortus yaitu 11 responden (84.6%) dan responden yang belum menikah yaitu 15 responden (100.0%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Likelihood Ratio)* didapatkan nilai $p < 0.05$ atau (0.025) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat abortus dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- n. Hubungan Unit Kerja dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.34
Hubungan Unit Kerja dengan Deteksi Dini Kanker Serviks
Menggunakan Metode *CerviScan* Pekerja Wanita
PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Unit Kerja	Deteksi Dini Kanker Serviks				Total	<i>p- value</i>
	Metode <i>CerviScan</i>					
	Positif	Negatif			N	
<i>Packing</i>	n 4	% 28.6	n 10	% 71.4	14	100
<i>Logistic</i>	0	0.0	18	100.0	18	100
Total	4	12.5	28	87.5	32	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.34, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini kanker serviks (Positif) menggunakan metode *CerviScan* dengan responden pada unit kerja *packing* yaitu 4 responden (28.6%) dan responden pada unit kerja *logistic* yaitu 0 responden (0.0%), sedangkan yang hasil deteksi dini kanker serviks (Negatif) menggunakan metode *CerviScan* dengan responden pada unit kerja *packing* yaitu 10 responden (71.4%) dan pada unit kerja *logistic* yaitu 18 responden (100.0%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai $p < 0.05$ atau (0.028) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara unit kerja dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

- o. Hubungan Masa Kerja dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan*

Tabel 4.35
Hubungan Masa Kerja dengan Deteksi Dini Kanker Serviks
Menggunakan Metode *CerviScan* Pekerja Wanita
PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

Masa Kerja	Deteksi Dini Kanker Serviks Metode <i>CerviScan</i>				Total		<i>p- value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
> 5 tahun	4	20.0	16	80.0	20	100	0.271
≤ 5 tahun	0	0.0	12	100.0	12	100	
Total	4	12.5	28	87.5	32	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.35, menunjukkan dari 32 responden yang hasil deteksi dini kanker serviks (Positif) metode *CerviScan* dengan responden yang masa kerjanya (>5 tahun) yaitu 4 responden (20.0%) dan pada responden yang masa kerjanya (≤ 5 tahun) yaitu 0 responden (0.0%), sedangkan yang hasil deteksi dini kanker serviks (Negatif) metode *CerviScan* dengan responden yang masa kerjanya (>5 tahun) yaitu 16 responden (80.0%) dan responden yang masa kerjanya (≤ 5 tahun) yaitu 12 responden (100.0%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai $p > 0.05$ atau (0.271) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* pada pekerja wanita PT. Eastern Pearl Flour Mills.

M A K A S S A R

C. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan data karakteristik responden, ditemukan bahwa mayoritas pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar pada tahun 2023 memiliki rentang usia antara 20-30 tahun dan >40 tahun yaitu 12 orang, yang mencapai persentase sebesar 37.5%. Usia adalah salah satu faktor demografi yang mempengaruhi persepsi dan kondisi kesehatan tubuh seseorang. Tidak ada batasan minimal seseorang untuk menjadi seorang pekerja, namun PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar menerima pekerja minimal yang telah menempuh pendidikan S1 atau *fresh graduate*.

Mayoritas Tingkat pendidikan yang ditempuh pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills memiliki tingkat pendidikan tinggi, yaitu S1 sebanyak 20 orang, dengan persentase mencapai 62.5%. Tingkat pendidikan formal memiliki peranan penting dalam mempengaruhi cara seseorang memberikan persepsi, respon, atau tanggapan terhadap situasi atau informasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kemungkinan persepsi dan respon yang lebih rasional terhadap hal-hal tertentu akan lebih besar dibandingkan dengan mereka memiliki pendidikan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kanker serviks tidak semata-mata berhubungan dengan tingkat pendidikan seseorang, dalam hal ini rendah atau tinggi tingkat pendidikan seseorang tidak berhubungan langsung terhadap kanker serviks, bisa jadi terdapat faktor lain yang bisa memicu hal tersebut seperti faktor keturunan ataupun gaya hidup (*life style*) yang tidak sehat. Terdapat beragam jenis suku dan agama yang dianut pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Adapun agama terbanyak yang dianut adalah agama Islam sebanyak 27 responden (84.4%),

sedangkan mayoritas suku yakni suku Bugis sebanyak 15 responden (46.9%). Terlepas dari adanya berbagai jenis suku dan agama, tidak menurunkan nilai loyalitas, gotong royong dan kerja sama antar pekerja, tetapi semakin mempererat nilai persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai toleransi beragama.

Para pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills memiliki lama kerja yang sama, yakni 8 jam/hari namun masa kerja yang berbeda-beda. Masa kerja terlama 25-30 tahun dari 2 orang pekerja wanita dan masa kerja 1-10 tahun pekerja terbanyak ada 18 orang. Pada pekerja wanita, mayoritas pada wanita yang sudah menikah sebanyak 17 orang (53.1%). Hal tersebut mendukung penelitian ini yang memprioritaskan wanita yang telah menikah untuk menjadi subjek namun tidak menutup kemungkinan wanita yang belum menikah untuk tidak dijadikan subjek karena terdapat faktor lain yang bisa saja berhubungan dengan penyakit kanker serviks.

Adapun usia saat menikah pekerja wanita yang sudah menikah diperusahaan ini yaitu >20 tahun sebanyak 17 orang dengan mayoritas jumlah kehamilan sebanyak 3 kali oleh 6 pekerja. Sedangkan mayoritas jumlah anak yang dimiliki pekerja wanita yaitu 2 anak oleh 6 responden. Peran ganda yang dimiliki seorang wanita yakni sebagai istri dan ibu tidak menghalangi wanita untuk berkecimpung di dunia kerja. Adapun istilah yang melekat pada wanita sejak dulu dimana wanita harus mengurus keluarganya saja dan dirumah, mengerjakan kegiatan rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak dan suami, membersihkan rumah dll.

2. Hubungan Usia dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai *p value* 0.028 ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara usia dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Sesuai dengan penelitian Destriani (2022) menemukan, responden usia >40 tahun berisiko terkena kanker rahim 5.86 kali lebih besar dibanding responden yang berusia ≤ 40 tahun, nilai *p value* 0.042. Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Zakka (2023), pada wanita di beberapa wilayah Nigeria Tengah-Utara bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia terhadap tingkat risiko kanker serviks, nilai *p value* 0.002.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori (Habtu et al., 2018), usia merupakan salah satu faktor biologis yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku seseorang. Usia tidak bisa dijadikan patokan untuk seseorang melakukan pencegahan kanker serviks namun dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang. Meningkatnya risiko kanker pada pekerja wanita usia lanjut merupakan gabungan dari bertambah lamanya waktu pemaparan oleh karsinogen serta semakin lemahnya sistem imunitas tubuh. Belum lagi pada periode ini masalah kesehatan berganti dengan gangguan kehamilan, kelelahan akibat merawat anak dan tuntutan karir, kegemukan, kanker, depresi dan penyakit serius tertentu mulai menggrogoti di usia ini.

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa usia seseorang juga mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga

pengetahuan yang diperolehnya semakin baik akan tetapi dengan bertambahnya usia maka juga bisa menurunkan daya pikir, pekerjaan dan masalah kesehatan lainnya ataupun pengalaman sebelumnya bisa menjadi penghambat seseorang untuk menerima pengetahuan yang baru. Pengetahuan yang buruk serta tidak pernah menerima informasi dan tidak secara aktif mencari informasi tentang kanker serviks secara bermakna mempengaruhi perilaku pencegahan dan pengendalian kanker serviks.

Kesehatan dalam Islam merupakan sesuatu yang penting dan wajib disyukuri karena tidak akan ada artinya kehidupan tanpa kesehatan. Islam menetapkan bahwa kehadirannya adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Sehingga tidak heran apabila banyak anjuran kesehatan dalam Islam, baik itu kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan merupakan nikmat besar kedua setelah iman oleh sebab itu sangat penting dan harus selalu dijaga. Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) khususnya dalam aspek pencegahan. Banyak manfaat dapat dirasakan dalam melakukan upaya pencegahan, contohnya mencegah kemungkinan terjangkitnya penyakit, mencegah terjadinya berbagai penyakit menular seksual seperti syphilis, HIV/AIDS serta infeksi HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks (Elkarimah, 2016).

Adapun hadis yang sejalan dengan penelitian ini yaitu kaitannya dengan usia seorang wanita dengan keterlambatan dalam mendeteksi dini kanker serviks. Semakin cepat seseorang mencari informasi tentang kanker serviks maka peluang dalam melakukan deteksi dini akan semakin besar. Adapun dampak dari keterlambatan dalam melakukan deteksi dini kanker serviks yaitu tingkat kesembuhan pada proses pengobatan akan semakin sulit apalagi jika terdeteksi pada stadium lanjut.

Rasulullah SAW bersabda :

نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Terjemahnya :

“Banyak manusia merugi karena dua nikmat; kesehatan dan waktu luang.”
(HR. Bukhari dari Ibnu Abbas).

Berdasarkan hadis diatas, terdapat dua kenikmatan yang Allah SWT. berikan namun sering dilupakan oleh hamba-Nya yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Banyak orang yang memiliki waktu luang tetapi badannya tidak sehat. Begitupun sebaliknya, memiliki badan sehat tetapi tidak memiliki waktu luang karena sibuk. Apabila keduanya dimiliki dan rasa malas lebih mendominasi seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah; maka dialah golongan orang-orang yang tertipu (Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari: 14/184).

Maka peneliti berpendapat bahwa Upaya untuk menghindari penyakit merupakan sesuatu yang lebih mudah dilakukan daripada menyembuhkan penyakit yang sudah terjadi. Adapun peribahasa “mencegah lebih baik daripada mengobati” sejalan dengan ajaran Islam. Dari Hadis diatas, dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan aspek pencegahan terhadap penyakit. Adapun alasannya karena biaya yang dikeluarkan untuk aspek pencegahan akan jauh lebih murah dibandingkan dengan pengobatan penyakit. Upaya preventif membuat seseorang tidak akan kehilangan waktu produktif, tidak merasa sakit, sedih dan khawatir secara berlebihan. Adapun semakin tua seseorang, semakin tinggi risiko terkena kanker serviks. Peningkatan risiko kanker serviks pada orang tua adalah kombinasi dari peningkatan dan paparan karsinogen yang berkepanjangan dan sistem kekebalan yang melemah.

3. Hubungan Pendidikan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai *p value* 0.566 ($p > 0.05$) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan bermakna antara pendidikan dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Hal ini sejalan dengan penelitian Istiqomah Risa (2019), dalam penelitiannya tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan pemeriksaan IVA, dengan nilai *p value* 0.575, tingkat pendidikan SMA berjumlah 19 orang (38%) yang periksa 10 orang (53%) sedangkan yang tidak periksa hampir sebagian responden yaitu 9 orang (47%). Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Bennur (2023), pada tingkat risiko kanker serviks pada wanita berusia 30-65 di Turki bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan terhadap tingkat risiko kanker serviks, nilai *p value* 0.237.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Dewi (2021), Pengetahuan seseorang tidak selalu dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Pengetahuan yang banyak diperoleh melalui media massa (televisi, koran, majalah, radio, dll) dan pembicaraan dari mulut ke mulut (perkumpulan sehari-hari). Masyarakat lebih mudah menerima informasi melalui media massa, seseorang yang tidak membaca dia dapat mendengar atau mendapat informasi dari televisi, radio, dan perkumpulan sehari-hari, sehingga dapat menerima informasi atau pesan-pesan kesehatan yang mengubah pemikiran dan persepsi mereka untuk meningkatkan derajat kesehatan yang lebih baik. Pekerja wanita yang melakukan pemeriksaan, kemungkinan bisa melakukan deteksi dini karena ikut-ikutan teman/saudara, dan karena disuruh orang, tanpa tahu tujuan dan manfaatnya (Dewi, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Izah (2022) dengan hasil $p = 0.25$ yang menyatakan ada hubungan antara Pendidikan dan pelaksanaan IVA. Pendidikan berpengaruh terhadap deteksi dini kanker leher rahim metode IV A. Ada beberapa hal yang menyebabkan pendidikan rendah tidak melakukan deteksi dini kanker leher rahim metode IV A seperti kondisi karakteristik masyarakat wilayah perdesaan dan sulitnya informasi (Yuni Nurul Izah, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa ketidaksesuaian hasil yang ada pada penelitian ini dengan hasil penelitian yang lain, berarti ada faktor risiko lainnya yang dapat memicu kejadian lesi pra kanker serviks. Kemungkinan adanya perbedaan karakteristik populasi dan sampel pada masing-masing tempat penelitian. Peningkatan Pendidikan/pengetahuan tidak mutlak didapatkan di pendidikan formal, akan tetapi dapat diperoleh pada pendidikan non formal. Tingkat pengetahuan seseorang tidak selalu bisa diukur melalui tingkat pendidikan. Pada umumnya seseorang yang memiliki pengetahuan baik akan ikut dalam suatu kegiatan atau program kesehatan.

Berdasarkan hadis dibawah ini, menurut Imam Ghazali, ilmu yang wajib dicari menurut agama adalah terbatas pada pelaksanaan kewajiban syari'at Islam yang harus diketahui dengan pasti. Dapat dilihat bahwa ajaran Islam juga mencakup tentang pendidikan sains yang notabennya adalah ilmu yang berguna bagi kehidupan (dunia) manusia. Tapi, disini, ilmu (sains) yang dipelajari haruslah bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menyejahterakan umat, mensyiarkan ajaran-ajaran agama Islam. Tidak dibenarkan, apabila ada orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat, mencari gelar, dan

keuntungan pribadi. Selain itu, ilmu yang telah didapat harus disebarakan (diajarkan kepada orang lain) dan diamalkan tingkah lakunya (Alpian dkk,2019).

Adapun hadis yang sejalan dengan penelitian ini yaitu agama islam mewajibkan seseorang untuk mencari ilmu, salah satu dasar (dalil) yang populer adalah hadis Rasulullah SAW, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

Terjemahnya:

“Rasulullah SAW. bersabda : “Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang islam baik laki-laki dan perempuan”.

Maka peneliti berpendapat bahwa pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia baik itu pendidikan formal dan non-formal , serta pengetahuan yang banyak diperoleh melalui media massa, ini berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang. Pendidikan tidak akan ada habisnya, Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Manusia di didik menjadi orang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa.

4. Hubungan Status Pernikahan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai *p value* 0.104 ($p > 0.05$) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status pernikahan dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wardhani, H. A., Moetmainnah, S., & Yazid, N. (2019) yaitu didapatkan *p value* = 0.649,

yang berarti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik status perkawinan dengan kejadian *carcinoma cervix uteri*. Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Adejo, D.S (2024), terkait infeksi Human *Papilloma virus* pada wanita di Negara bagian Kaduna Nigeria bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status pernikahan terhadap risiko kanker serviks, nilai *p value* 0.524. Berbeda dengan penelitian dari Nindrea (2019) bahwa terdapat hubungan antara perilaku seksual yang dilihat dari jumlah pasangan seksualnya ($p=0.001<0.05$).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Lisnadiyanti (2019), yang menyatakan bahwa status menikah memiliki hubungan bermakna dengan pencegahan dan penyembuhan kanker serviks. Status perkawinan dalam hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak faktor sosiodemografi yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Terutama penting dalam hal deteksi dini kanker serviks.

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa walaupun hal ini berlainan dengan yang dinyatakan dalam penelitian dan literatur lain, ketidaksesuaian hasil yang ada pada penelitian ini dengan teori yang ada berarti ada faktor risiko lainnya yang dapat memicu kejadian lesi pra kanker serviks. Kemungkinan adanya perbedaan karakteristik populasi dan sampel pada masing-masing tempat penelitian.

Adapun Menurut teori HL Blum terdapat 4 faktor yang memengaruhi status derajat kesehatan masyarakat atau perorangan. Faktor tersebut adalah lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Lingkungan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi

kesehatan dapat dikendalikan melalui perilaku sehingga menjadi suatu kebiasaan hidup. Meningkatnya prevalensi suatu penyakit misalnya kanker serviks juga tak terlepas dengan kebiasaan hidup yang tidak sehat, misalnya pola makan yang tidak sehat, minum minuman keras, dsb.

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pola hidup sehat dan bersih, dalam QS. *al-Muddatstsir* [74]: 1-5 :

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ ۱ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ ۲ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ ۳ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ ۴ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ ۵

Terjemahnya :

"1. Hai orang yang berkemul (berselimut) 2. bangunlah, lalu berilah peringatan 3. dan Tuhanmu agungkanlah 4. dan pakaianmu bersihkanlah 5. dan tinggalkanlah perbuatan dosa" (Kementerian Agama RI, 2022).

Dari ayat tersebut dipahami bahwa terdapat kata *thuhur* (*fa thahhir*) yang bermakna bersih atau suci. Selanjutnya pada ayat berikutnya terdapat kata *wa rrujza fahjur* yang bermakna perintah untuk meninggalkan segala hal yang mengotori jiwa. Membersihkan pakaian dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela sesungguhnya adalah bagian dari hidup sehat atau bersih. Dari ayat diatas sesungguhnya menggambarkan bahwa kesehatan dalam ajaran Islam bukan hanya berkenaan dengan hal hal yang bersifat fisik tetapi juga nonfisik. Kesehatan jasmani dan nafsani. Keduanya harus terjalin secara integral (Tarigan, A. A. 2022).

Maka peneliti berpendapat bahwa ditempatkannya kebersihan, kesucian, kesehatan sebagai perintah kedua setelah perintah membaca didalam AlQur'an menjadi bukti pentingnya ajaran kesehatan dalam Islam. Maka perintah untuk bersih dan sehat sesungguhnya menjadi dasar bagi seluruh ibadah Islam. Ibadah dalam Islam tidak dapat dilakukan dengan sempurna tanpa di topang kesehatan diri, lingkungan, dan sosial.

5. Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai *p value*= 0.012 ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit infeksi menular seksual (IMS) dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Melva, 2018) dalam penelitiannya menggunakan pemeriksaan IVA menyatakan wanita dengan riwayat penyakit kelamin memiliki risiko lebih besar untuk terkena kanker leher rahim, nilai *p value* 0.001. Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Zakka (2023), pada wanita di beberapa wilayah di Nigeria Tengah-Utara terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat IMS terhadap tingkat risiko kanker serviks, nilai *p value* 0.001.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Fadilah (2021), Secara biomedis bisa dijelaskan bahwa IMS kemungkinan berperan sebagai ko-faktor infeksi virus papilloma pada manusia. IMS kemungkinan menyebabkan terjadinya lesi pada leher rahim yang selanjutnya mempermudah masuknya virus HPV ke basal membran leher rahim. Selain itu, IMS pada wanita kemungkinan juga mempengaruhi daya tahan tubuh dan mempercepat berkembangnya infeksi virus HPV. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa risiko kanker serviks lebih tinggi dialami wanita yang pernah menderita penyakit menular seksual, seperti kutil kelamin, klamidia, gonore, dan sifilis.

Wanita yang sedang menderita penyakit menular seksual juga memiliki risiko tinggi untuk terkena kanker serviks. Hal ini karena infeksi HPV bisa muncul bersamaan dengan penyakit menular seksual. Salah satu

jenis penyakit infeksi menular seksual yang menjadi penyebab kanker serviks adalah klamidia. Klamidia adalah penyakit infeksi pada sistem reproduksi yang dapat disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini biasanya dapat menular melalui kontak seksual. Beberapa hasil studi menyebutkan bahwa bakteri penyebab klamidia dapat membantu virus HPV tumbuh pada area reproduksi sehingga meningkatkan risiko kanker serviks. Penyakit klamidia yang dialami wanita terkadang tidak menimbulkan gejala apa pun yang mencolok. Wanita mungkin tidak tahu kalau terkena klamidia sampai dilakukan pemeriksaan ke dokter. Selain klamidia, penyakit infeksi menular seksual lain penyebab kanker serviks, termasuk gonore, sifilis, dan HIV/AIDS (Fadila, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa setiap berhubungan seksual dengan satu pasangan baru, kesempatan untuk terkena penyakit akibat hubungan seksual semakin besar. Faktor yang paling mempengaruhi timbulnya kanker serviks adalah penyakit akibat hubungan seksual. Wanita dengan aktivitas seksual yang tinggi, dan sering berganti-ganti pasangan akan memungkinkan tertularnya penyakit kelamin, salah satunya penyakit HIV.

Adapun ayat Al-Qur'an yang sejalan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit IMS dengan cara tidak melakukan perbuatan zina. Sebagaimana Allah SWT bersabda dalam Q.S Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلٌ

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya berzina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Kementerian Agama RI, 2022).

Dari ayat tersebut dipahami tata susila seorang hamba Allah kepada Khaliknya. Sebab penyakit itu datangnya dari perbuatan manusia sendiri, seperti disebabkan pelanggaran pada norma kesehatan, maka serangan penyakit pada tubuh tidak dapat terelakkan (Tarigan, A. A. 2022).

Maka peneliti berpendapat bahwa meski demikian, kita harus juga menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit tersebut, salah satunya tidak bergonta-ganti pasangan sebagaimana Allah SWT bersabda dalam surat Al-Isra ayat 32. Ayat diatas mengisyaratkan bahwa Islam melarang segala jenis kegiatan mengarah pada perzinahan dan mengabaikan kesehatan.

6. Hubungan Riwayat Keluarga yang Pernah Terkena Kanker Serviks dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square* didapatkan nilai *p value* 0.012 ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat keluarga yang pernah terkena kanker serviks dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ananti & Sari, 2020) dengan hasil nilai *p value* 0.000 (nilai $p < 0.05$) berarti ada hubungan riwayat kanker dalam keluarga wanita usia subur dengan deteksi dini kanker serviks metode IVA. Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Siddig. E. E (2023), bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga dengan deteksi dini kanker serviks di kalangan wanita di negara bagian Khartoum, Sudan, dengan nilai *p value* 0.006.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Fahriani (2023), Riwayat keluarga merupakan salah satu faktor yang penting dari banyak faktor lainnya, mengingat kanker serviks bisa dipengaruhi oleh kelainan genetika.

Beberapa keluarga bisa jadi memiliki risiko lebih tinggi menderita kanker dibandingkan dengan keluarga lainnya (Fahriani, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa jika pekerja wanita mempunyai keturunan penyakit kanker dalam keluarga, kemungkinan berisiko untuk terkena penyakit kanker lebih besar. Dari hasil penelitian, variabel riwayat kanker dalam keluarga didapatkan hasil responden yang memiliki riwayat penyakit kanker dalam keluarga berpeluang lebih besar mendapatkan/ terkena kanker karena ada faktor genetik yang sudah ada didalam keluarga. Hal ini terjadi karena terdapat kecenderungan sistem imun yang sama dan kemungkinan terbawa secara genetik.

Prinsip yang digarisbawahi oleh Rasulullah dengan sabdanya yang artinya: *“Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman”*. Ayat tersebut mengandung tuntunan betapa urgensinya setiap keluarga untuk membangun kesehatan yang prima, sikap dan perilaku sehat mesti menjadi misi hidup dan kehidupan umat Islam, serta akan berdampak kepada keturunan, karena tidak hanya akan berdampak pada kesehatan fisik semata melainkan akan jauh berdampak pada intensitas pelaksanaan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Abidin, Z. 2012).

Adapun ayat Al-Qur’an yang sejalan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan memelihara diri (mensucikan diri). Dalam surah Al-Baqarah, ayat 222 Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

“Allah sangat mencintai hambanya yang suka bertaubat dan memelihara dirinya (mensucikan diri)”. (Kementerian Agama RI, 2022).

Prinsip yang digarisbawahi oleh Rasulullah dengan sabdanya yang artinya: *"Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman"*. Ayat tersebut mengandung tuntunan betapa urgensinya setiap keluarga untuk membangun kesehatan yang prima, sikap dan perilaku sehat mesti menjadi misi hidup dan kehidupan umat Islam, serta akan berdampak kepada keturunan, karena tidak hanya akan berdampak kesehatan fisik melainkan akan jauh berdampak pada intensitas pelaksanaan pengamalan ajaran Islam kedalam kehidupan sehari-hari (Abidin, Z. 2012).

Maka peneliti berpendapat bahwa ajaran Islam secara konkrit memotivasi dan membangun keluarga agar menjadi sehat secara fisik. Membina ummat tidak bisa dilepaskan dari membina kesehatan ummat. Dalam hal ini Rasulullah mengingatkan bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. Mengisyaratkan bahwa berawal dari binaan, pembelajaran, bimbingan dan arahan keluargalah kunci kesuksesan dalam mewujudkan misi Islam tentang prinsip hidup yang sehat secara paripurna. Tentunya hal ini sudah menjadi kesadaran setiap keluarga muslim agar terhindar dari penyakit.

7. Hubungan Vaksinasi HPV dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square* didapatkan nilai *p value* 1.000 ($p > 0.05$) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara vaksinasi HPV dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Liaran (2020), Dari hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,482$ yang berarti nilai $p > 0,05$, hal ini menunjukkan tidak ada hubungan antara riwayat vaksin HPV dengan kejadian kanker

serviks pada penderita. Dan sejalan dengan hasil penelitian Kusumawati, Y.,dkk (2019) yaitu hasil analisis hubungan yang dilakukan dengan uji *fisher exact* diperoleh nilai *p value* 0.113 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara vaksinasi HPV dengan kejadian kanker serviks di RSUD Sukoharjo. Dengan demikian meskipun tidak menunjukkan hubungan yang secara statistik signifikan, namun kondisi belum pernah melakukan vaksinasi HPV dapat berisiko terkena kanker serviks.

Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Siddig. E. E (2023), bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat vaksin HPV dengan deteksi dini kanker serviks di kalangan wanita di negara bagian Khartoum, Sudan, dengan nilai *p value* 0.081.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori penelitian Damailia dan Oktavia,(2019) menemukan bahwa terdapat hubungan antara status Vaksinasi HPV dengan deteksi dini kanker serviks melalui metode pap smear pada pasangan usia subur (Oktavia,2019).

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa ketidaksesuaian hasil yang ada pada penelitian ini dengan teori yang ada yaitu masih kurangnya pekerja wanita yang belum vaksin HPV, serta ada faktor risiko lainnya yang dapat memicu kejadian lesi pra kanker serviks. Kemungkinan adanya perbedaan karakteristik populasi, sampel dan metode pemeriksaan atau deteksi dini kanker serviks pada masing-masing tempat penelitian.

Islam menjelaskan berbagai cara pencegahan penyakit menular, juga mencegah penyebarannya. Di antaranya adalah dengan karantina penyakit. Selain upaya pencegahan, upaya penyembuhan sesuatu yang menjadi kewajiban. Adapun keterlambatan dalam pencegahan suatu

penyakit dapat menyebabkan tingginya angka kesakitan bahkan kematian utamanya pada penyakit kanker. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim (438) yang berbunyi :

وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ

Terjemahnya :

“Tidaklah suatu kaum senantiasa terlambat, melainkan Allah akan memperlambat mereka”.

Hadis tersebut bermakna bahwa dikhawatirkan bagi seseorang apabila ia membiasakan dirinya terlambat dalam ibadah, maka Allah SWT akan mengujinya dengan mengakhirkannya semua peluang kebaikan. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa seseorang yang selalu terlambat dalam perintah Allah maka akan dilambatkan dari rahmat Allah, dari surganya, keutamaan besar dari-Nya, dari kedudukan yang tinggi, terlambat dari mendapatkan ilmu serta terlambat dalam memperoleh kesehatan atau kesembuhan (Mia Fitriah Elkarimah, 2016).

Maka peneliti berpendapat bahwa islam memberikan kebebasan dalam hal teknik pencegahan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada contohnya dengan melakukan vaksinasi HPV untuk mencegah kanker serviks. Islam tidak pernah membatasi kemajuan teknologi, namun hanya memberi batasan terhadap sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Seperti larangan berobat dengan yang haram dan larangan berobat ke dukun atau ahli sihir. Hal-hal yang bersifat teknis sepenuhnya diserahkan kepada perkembangan ilmu sains sesuai perkembangan zamannya.

8. Hubungan Penggunaan Pembalut saat Menstruasi dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai *p value* 0.006 ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa

terdapat hubungan yang bermakna antara penggunaan pembalut dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syatriani (2019), dalam penelitiannya dengan hasil nilai *p value* 0.001 dan mengemukakan bahwa penggunaan pembalut pada saat menstruasi dan tidak sering diganti berisiko 3 kali lebih besar menderita kanker serviks.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori (WHO,2020) bahwa salah satu penyebab utama kanker serviks di Indonesia ternyata dari pembalut yang berkualitas buruk. Seperti penggunaan pembalut yang >5 jam, pakaian dalam yang lembab, tidak menggunakan pembalut yang aman dan steril dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa apabila pekerja wanita sedang menstruasi sebaiknya menggunakan pembalut dengan bahan yang lembut dan tidak membuat iritasi. Pembalut harus diganti sekitar 4-5 kali dalam satu hari agar terhindar dari bakteri yang masuk ke dalam vagina yang akan menyebabkan terjadinya kanker serviks.

Adapun hadis yang sejalan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan Kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, tentu mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala. Dengan kata lain, Kotor, jorok, sampah berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah itu tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan hadist :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ, نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ, كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ, جَوَادٌ يُحِبُّ
الْجُودَ, فَتَطَهَّرُوا أَفْنِيَّتَكُمْ

Terjemahnya :

“Dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu.” (HR.Tirmidzi).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa sebagai hamba yang taat, tentu kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah SWT. Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah (Tarigan,A.A.2022).

Maka peneliti berpendapat bahwa bentuk dari mewujudkan kebersihan yang dimulai dari diri kita sendiri contohnya membersihkan diri apabila sedang haid dengan mengganti pembalut dalam waktu satu hari ≤ 5 Jam. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman dan terhindar dari penyakit khususnya kanker serviks.

9. Hubungan Penggunaan Pembersih Kewanitaan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square* didapatkan nilai *p value* 0.009 ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara penggunaan pembersih kewanitaan dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chairani (2020) bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pemakaian pembersih kewanitaan terhadap kejadian kanker serviks ($p=0.001$) yang artinya penggunaan pembersih kewanitaan memiliki peluang risiko 7 kali

lebih besar menderita kanker serviks dibanding yang tidak menggunakan pembersih vagina. disebabkan karena dapat mengubah lingkungan kimia vagina dan serviks rentan dengan perubahan patologis dan kanker serviks.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Fitriasia et al., (2019), Penggunaan pembersih kewanitaan seperti deodoran dan antiseptik baik yang komersil maupun tradisional secara terus menerus atau terlalu sering akan menyebabkan iritasi pada vagina bahkan serviks yang memicu perubahan sel yang mengarah pada kanker. Kondisi ini diperburuk oleh kebiasaan teknik mencuci daerah kewanitaan yang seharusnya dilakukan satu arah dari depan kebelakang, namun dilakukan sebaliknya (Fitriasia et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa penggunaan pembersih kewanitaan baik yang komersil maupun yang tradisional tanpa indikasi, dapat mengganggu lingkungan daerah kewanitaan sehingga mengundang masuknya bakteri jahat yang menyebabkan gatal, ritasi atau infeksi pada vagina atau serviks. Infeksi yang terjadi tentunya akan menimbulkan peradangan sehingga terjadi mikro lesi pada epitel serviks yang pada akhirnya dapat menjadi media HPV.

Adapun ayat al-qur'an yang sejalan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Allah berfirman dalam (Qs. Al Ma'dah :77).

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Terjemahnya :

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus" (Kementerian Agama RI, 2022).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam agama Islam, perilaku melampaui batas disebut *ghuluw* adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat. *Ghuluw* sama sekali tidak mendatangkan kebaikan bagi pelakunya; juga tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam segala urusan. Apalagi jika hal tersebut dalam urusan agama (Elkarimah, 2016).

Maka peneliti berpendapat bahwa dalam kesehatan, segala sesuatu yang dikonsumsi dengan berlebihan adalah tidak baik. Sebagai contoh, jika kita minum air disaat haus dengan segelas air, tubuh kita masih bisa menerima air tersebut, tetapi jika kita meminum sampai 7-8 gelas pada waktu yang sama, maka tubuh tidak bisa menerimanya, karena itu sudah sangat berlebih dari yang seharusnya diterima oleh tubuh kita pada saat itu. Adapun terhadap penggunaan pembersih kewanitaan.

10. Usia saat Pertamakali Menikah dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Likelihood Ratio)* didapatkan nilai *p value* 0.046 ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara usia saat pertamakali menikah dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fitrisia et al., 2019) didapatkan bahwa terdapat hubungan antara usia pertama kali menikah dengan kejadian kanker serviks ($p=0.026$). Faktor risiko ini dihubungkan dengan karsinogen pada zona transformasi sedang berkembang dan paling

bahaya apabila terpajan HPV dalam 5-10 tahun. Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Teklehaimanot, D. A (2022), pada perempuan di Etiopia dengan nilai $p = 0.001$, usia dini saat pertamakali menikah/melakukan hubungan seksual (<15 tahun) meningkatkan kemungkinan berkembangnya lesi prakanker sebesar 4 kali lipat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Jean (2020), Pernikahan pada usia muda sering kali dikaitkan dengan aktivitas seksual di usia muda juga. Jika dibandingkan dengan perempuan yang berhubungan seksual dan memiliki usia diatas 20 tahun, wanita yang memulai hubungan seksual dibawah 20 tahun memiliki risiko kanker serviks 2 kali lebih besar. Selama periode rentan, terjadi proses metaplasia yang berhubungan dengan fase pubertas. Gangguan pada proses metaplasia ini, dapat memfasilitasi perubahan menjadi displasia, yang berpotensi menjadi kanker. Kematangan sel bergantung pada sel-sel mukosa yang ada di lapisan dalam kulit di dalam rongga tubuh. Secara umum, sel mukosa cenderung menjadi matang setelah wanita mencapai usia 20 tahun ke atas. Oleh karena itu, hubungan seksual yang dimulai pada usia kurang dari 20 tahun menyebabkan kerusakan pada serviks. Luka yang terbentuk sebagai hasilnya dapat menjadi tempat yang rentan untuk infeksi, termasuk infeksi oleh virus HPV yang dikenal sebagai penyebab kanker serviks (Jean. 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa hubungan seks idealnya dilakukan setelah seorang wanita benar-benar matang yang juga bergantung pada sel-sel mukosa yang terdapat diselaput kulit bagian dalam rongga tubuh. Umumnya sel-sel mukosa baru matang setelah wanita berusia 20 tahun ke atas. Kelainan sel yang mengarah pada kanker serviks tidak terjadi dalam

hitungan hari atau dalam hitungan bulan. Namun membutuhkan proses memakan waktu yang lama.

Di dalam Hadits Rasulullah Saw, juga ditemukan mengenai syariat atau hukum pernikahan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ سَتَّطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ

Terjemahnya :

“Dari Abdullah bin masud r.a berkata: Rasulullah bersabda kepada kami.”hai kaum pemuda, apabila diantara kaum kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu penjaga baginya. *Mutafaqun Alaih. (H.R Bukhori dan Muslim).*

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah Saw mengarahkan anjuran dan motivasi untuk menikah kepada seluruh umatnya khususnya para pemuda, hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap masalah para pemuda, sehingga Islam memberikan perhatian yang khusus bagi mereka, yaitu untuk segera menikah bagi yang telah mampu.

Maka peneliti berpendapat bahwa Hadits tersebut juga pengaruh bagi para pemuda yang belum mampu melaksanakan pernikahan baik itu belum siap secara raga dan batin maka disarankan untuk berpuasa, karena puasa mampu menahan gejolak syahawat agar terhindar dari penyakit kelamin/ kanker serviks.

11. Pemakaian Alat Kontrasepsi dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Likelihood Ratio)* didapatkan nilai *p value* 0.011 ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pemakaian alat kontrasepsi dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Sari

tahun 2021, bahwa wanita yang menggunakan kontrasepsi lebih banyak ditemukan pada wanita dengan hasil IVA positif (81.5%) dibandingkan dengan wanita dengan hasil IVA negatif (18.5%). Uji statistik Chi-Square menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara hasil IVA dengan penggunaan kontrasepsi, nilai (*p value* 0.013).

Kejadian kanker serviks akan meningkat empat kali lebih besar pada akseptor KB yang menggunakan alat kontrasepsi oral dibandingkan akseptor yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi dengan komposisi estrogen dan progestin yang bekerja melalui reseptornya di sel target, dapat meningkatkan insiden potensi karsinogen lainnya. Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Shaswati, M (2023), pada wanita Bangladesh bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemakaian alat kontrasepsi terhadap kerentanan kanker serviks, nilai (*p value* 0.013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Prasistyami et al., (2018), Estrogen dan progestin juga dapat mempengaruhi sel-sel serviks secara langsung. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen, dan upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara, alat atau obat-obatan. Pil kontrasepsi oral diduga akan menyebabkan defisiensi asam folat, yang mengurangi metabolisme mutagen sedangkan estrogen kemungkinan menjadi salah satu ko-faktor yang dapat membuat replikasi DNA HPV. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kontrasepsi jenis oral menyebabkan wanita sensitif terhadap HPV yang dapat menyebabkan adanya peradangan pada genitalia sehingga berisiko untuk terjadi kanker serviks. Kontrasepsi oral meningkatkan risiko kanker serviks bagi wanita

dengan HPV dan progesteron juga memicu efek karsinogenik dari HPV. Selain itu kelebihan progesteron juga dapat menimbulkan infeksi leher rahim (Prasistyami et al., 2018).

Kekentalan lendir pada serviks akibat penggunaan kontrasepsi akan menyokong terjadinya kanker serviks. Hal ini dikarenakan kekentalan lendir ini akan memperlama keberadaan suatu agen karsinogenik (penyebab kanker) di serviks yang terbawa melalui hubungan seksual termasuk adanya virus HPV menjadi penyebab dari kanker serviks (LISMANIAR et al., 2021). Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa kontrasepsi oral menyebabkan wanita sensitif terhadap HPV yang dapat menyebabkan adanya peradangan pada genitalia sehingga berisiko untuk terjadi kanker serviks.

Kanker serviks merupakan penyakit yang penularannya diakibatkan oleh kecenderungan merusak diri sendiri mengingat salah satu penyebabnya adalah penggunaan alat kontrasepsi (pemakaian pil KB) Hal ini selaras dengan apa yang ada pada surat Ar-Rum : 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Kementerian Agama RI, 2022).

Ayat ini, menjelaskan tentang firman Allah SWT yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak menjaga kesehatan adalah kelompok orang yang menjatukan diri sendiri kepada kemusnahan. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak merawat nikmat sehat yang diberikan oleh Allah SWT.

Sebelum munculnya alat kontrasepsi di masa Rasulullah saw telah terjadi suatu tindakan menghindari kehamilan dengan cara alami yang dilakukan parasahabat dan biasa disebut 'azl. Adapun menggunakan alat kontrasepsi atau sarana lain yang mengakibatkan alat-alat reproduksi tidak berfungsi dan mengakibatkan tidak dapat menghasilkan keturunan, dengan persetujuan ataupun tidak, dengan motivasi agama, maka hukumnya haram, dan para ulama sepakat mengharamkannya. Adapun Contoh yang diharamkan adalah fasektomi atau pemutusan saluran sperma dan tubektomi atau pemutusan saluran telur (Gemi, G. 2017).

Maka peneliti berpendapat bahwa kalau kita konsekwen terhadap pengajaran Islam maka minimal seorang muslim mendapatkan anak setiap tiga tahun, karena setiap bayi yang dilahirkan ada hak untuk menyusui dua tahun. Dan begitu juga seorang ibu punya hak untuk istirahat. Jika dipahami secara baik, maka Islam mengajarkan perencanaan yang matang dalam mengelola keluarga dan mengaturnya dengan baik. Dalam konteks inilah KB dibolehkan. Sedangkan upaya pembatasan keturunan secara masal dalam skala sebuah umat, maka hal tersebut diharamkan.

12. Jumlah Kehamilan (Paritas) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Likelihood Ratio)* didapatkan nilai *p value* 0.006 ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara jumlah kehamilan (paritas) dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian oleh Hamdayani (2021) yang menyatakan terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian kanker serviks dengan *p value* 0,000. Kanker serviks sering dijumpai pada wanita yang sering melahirkan anak. Hasil penelitian

ini juga sejalan oleh Bennur (2023), pada tingkat risiko kanker serviks pada wanita berusia 30-65 di Turki bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara paritas terhadap tingkat risiko kanker serviks, nilai *p value* 0.001.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Fitriasia et al., (2019), Wanita dengan paritas tinggi, selama kehamilan meningkatkan risiko transformasi sel terutama pada serviks sehingga terjadi infeksi HPV persisten. Kemudian saat hamil, zona transformasi dari ektoserviks melebar ditambah lagi dengan trauma/luka akibat proses persalinan normal berkali-kali sehingga paparan oleh HPV akan lebih mudah (Fitriasia et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa pekerja wanita yang rutin mengandung anak akan memperluas bahaya penyakit serviks. Dengan asumsi bahwa seorang wanita memiliki kehamilan lebih dari satu kali bisa longgarnya jalan rahim dan robeknya selaput di serviks. Robekan yang terjadi menyebabkan terbukanya jaringan sehingga dapat terkontaminasi oleh virus maupun bakteri sehingga terjadi infeksi jika kondisi hygiene vagina tidak terawat. Paritas >3 juga mengakibatkan naiknya frekuensi pertumbuhan kanker dan adanya jarak kehamilan terlalu dekat dengan kehamilan sebelumnya, maka akan banyak risiko yang menimpa baik ibu maupun janinnya, untuk ibu rahim yang masih belum pulih benar akibat persalinan sebelumnya dan akibatnya akan terjadi kerusakan pada sistem reproduksinya.

Adapun integrasi keislaman terkait memelihara kesehatan wanita yaitu Syekh Muhammad Yusuf al-Qadarawi membolehkan KB atas pertimbangan tujuannya yaitu dalam rangka memelihara kesehatan keluarga, menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan serta menjaga keselamatan agama. Yang mana aspek-aspek tersebut harus

diperhatikan dalam mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa'(4):9) :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)” (Kementerian Agama RI, 2022).

Maksud ayat diatas adalah memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah SWT menghendaki jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini menjadi umat dan bangsa yang lemah (Djauharoh, M.K., 2023).

Maka peneliti berpendapat bahwa Islam lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Memiliki keturunan yang kuat, maksud dari kuat yaitu kuat mental, fisik, moril maupun material. Menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan serta menjaga keselamatan dan kesehatan alat reproduksi, terutama wanita agar terhindar dari penyakit khususnya kanker serviks.

13. Hubungan Jumlah Anak dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Likelihood Ratio)* didapatkan nilai *p value* 0.044 ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara jumlah anak dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eka., Y.A. 2022) didapatkan dengan nilai *p value* 0.001 bahwa terdapat hubungan antara jumlah anak

dengan kejadian kanker serviks. Frekuensi melahirkan dan kejadian kanker serviksmemang berkaitan, maka semakin banyak riwayat melahirkan anak semakin besar pula risiko wanita tersebut untuk mengalami kanker serviks. Hal tersebut merujuk pada perubahan hormonal yang terjadi pada kehamilan. Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Siddig. E. E (2023), bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara banyaknya kelahiran anak dengan deteksi dini kanker serviks di kalangan wanita di negara bagian Khartoum, Sudan, dengan nilai *p value* 0.009.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Amelia (2022), Jika jumlah anak yang dilahirkan melalui jalan normal terlampau banyak dapat menyebabkan terjadinya perubahan sel abnormal epitel pada mulut rahim dapat berkembang menjadi keganasan, karena seharusnya serviks memerlukan waktu untuk perbaikan sel tidak memiliki waktu banyak sehingga proses involusi tidak sempurna (Amelia. 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa peningkatan risiko perubahan sel yang disebabkan oleh perubahan hormon yang dipengaruhi selama kehamilan dan trauma serviks karena melakukan persalinan akan mempermudah virus HPV masuk ke tubuh wanita.

Memiliki keturunan merupakan anugerah dari Allah yang memiliki banyak faidah dan keutamaan untuk orangtuanya, baik didunia maupun diakhirat kelak. Rasulullah memang menyukai jumlah umatnya yang banyak. Dalam hadis lainnya, Dalam hadisnya, Rasulullah juga bersabda:

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ

Terjemahnya :

"Ya Allah, limpahkanlah hartanya dan limpahkanlah (jumlah) anaknya. Dan berkahilah apa yang Engkau telah berikan kepadanya".

Maksud hadis diatas yaitu memiliki banyak anak juga mendapatkan keutamaan tersendiri. Rasulullah bersabda mengenai seseorang derajatnya ditinggikan disurga, lalu Abu Hurairah terheran-heran dan bertanya bisakah ia juga memperoleh derajat yang tinggi seperti itu di surga, bagaimana caranya? Nabi pun menjawab: "Disebabkan permohonan ampun dari anakmu kepada Allah SWT untukmu" (Persada, B.2023).

Maka peneliti berpendapat bahwa selain berdampak pada kesehatan, memiliki anak yang banyak juga berdampak pada psikologi anak juga. Jika orangtua bisa membagi perhatiannya secara adil dan memiliki pola asuh yang baik untuk anak, besar kemungkinan anak akan memiliki pengalaman menyenangkan yang akan dibawanya kelak sampai dewasa dan menjadi anak yang baik serta selalu mendoakan kedua orang tuanya.

14. Riwayat Abortus (Keguguran) dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Likelihood Ratio)* didapatkan nilai *p value* 0.025 ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat abortus (keguguran) dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wulandari, V. (2020) yaitu (*p value* 0.006). Sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat abortus dengan kejadian kanker serviks.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Shen et al., (2023). Praktek abortus yang tidak steril memicu terjadinya infeksi sehingga mudah memicu pertumbuhan sel-sel abnormal yang dapat mengakibatkan terjadinya kanker serviks. Wanita yang pernah melakukan abortus >1 kali

berisiko 3.37 kali lebih besar menderita kanker serviks dibandingkan wanita yang tidak pernah melakukan abortus (Shen et al., 2023). Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan setelah melalui konseling dengan tenaga medis dan mengetahui risikonya.

Berdasarkan pada pasal 75 Undang-Undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan semua orang dilarang melakukan aborsi. Namun, pada pertimbangan tertentu seperti indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan janin, menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan dan juga kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, hendaklah mengingat ayat Al-Qur'an (QS. Al-Isra' 17:31).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Terjemahnya :

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar” (Kementerian Agama RI, 2022).

Maka peneliti berpendapat bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan setelah melalui konseling dengan tenaga medis agar tidak memicu terjadinya sel-sel yang abnormal yang mengakibatkan terjadinya kanker serviks. Adapun keinginan menggugurkan kehamilan karena gagal kontrasepsi padahal kondisi ibu sehat, apalagi memiliki suami

15. Unit Kerja dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai *p value* 0.028 ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa

terdapat hubungan yang bermakna antara unit kerja dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti (2024), Hasil uji statistiik dengan menggunakan chi square didapatkan $p\text{-value} = 0,041$ sehingga dinyatakan terdapat hubungan antara unit kerja dan pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Pemeriksaan IVA Test. Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Bennur (2023), pada tingkat risiko kanker serviks pada wanita berusia 30-65 di Turki bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara unit kerja terhadap tingkat risiko kanker serviks, nilai $p\text{ value}$ 0.004.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Wawan (2019), menyebutkan bahwa kanker leher rahim berhubungan dengan unit pekerjaan, dimana bila dibandingkan dengan wanita pekerja ringan atau pekerja di kantor (sosial ekonomi menengah ke atas), wanita pekerja kasar, seperti buruh dan petani (sosial ekonomi rendah), mempunyai resiko 4 kali lebih tinggi. Unit kerja akan mempengaruhi stamina tubuh pekerja sehingga akan menurunkan ketahanan tubuh dan mudah terkena penyakit serta mempercepat penyebaran penyakit tersebut. Sedangkan bekerja merupakan kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi wanita akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarga (Wawan, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa pekerja wanita memiliki peran ganda artinya wanita tidak hanya bekerja di luar rumah tetapi juga bekerja di dalam rumah, mayoritas pekerja perempuan di PT. Eastern Pearl Flour Mills berstatus sudah menikah, wanita yang bekerja harus menyeimbangkan

tanggung jawab baik sebagai wanita karir maupun ibu rumah tangga.

Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ta Ha/20:132 yang berbunyi :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Terjemahnya :

“Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa” (Kementerian Agama RI, 2022).

Tafsir Al-Misbah, Perintahkanlah keluargamu agar selalu mengerjakan salat pada waktunya, sebab salat merupakan tali penghubung paling kuat antara mereka dengan Allah. Kerjakanlah selalu salat itu dengan sempurna. Kami tidak membebanimu untuk menanggung rezeki bagi dirimu. Kamilah yang menjamin rezekimu. Sesungguhnya akibat yang baik, di dunia dan di akhirat, diberikan kepada orang-orang yang baik dan bertakwa (Shihab, 2002).

Maka peneliti berpendapat bahwa adapun salah satu perintah Allah SWT. yakni bekerja, dengan bekerja maka seseorang akan mendapatkan penghidupan yang baik yang tentunya harus dibarengi dengan pengetahuan, sikap serta tindakan yang baik agar terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Lingkungan kerja aman yang sehat tentu dapat membantu pekerja dalam meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam bekerja. Namun sebaliknya, jika lingkungan kerja (unit kerja) tidak terorganisasi dengan baik serta banyak faktor yang berbahaya maka akan menimbulkan efek buruk bagi pekerja. Diantaranya resiko bahaya, penurunan efisiensi kerja, kerugian bagi perusahaan, dan resiko terkena penyakit.

16. Masa Kerja dengan Deteksi Dini Kanker Serviks

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square (Fisher's Exact Test)* didapatkan nilai *p value* 0.130 ($p > 0.05$) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan deteksi dini kanker serviks pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atfa berdasarkan uji statistik diperoleh *p-value* = 0,222 yang berarti $p < \alpha = 0,05$ (H_a ditolak dan H_0 diterima), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pekerjaan wanita dengan pemeriksaan IVA di Puskesmas Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 (Irmeita Atfa, 2023).

Adapun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari & Toyibah, 2018) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara masa bekerja dengan kejadian lesi prakanker serviks. Masa bekerja menunjukkan lamanya responden terpapar bahan baku kimia. Saat seseorang menghisap bahan kimia dan bahan kimia dapat ditemukan pada lendir serviks seseorang yang terkena bahan kimia tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Suma'mur (1994), semakin lama seseorang dalam bekerja maka semakin banyak terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja, sehingga rentan terkena penyakit akibat kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa Ketidakesuaian hasil yang ada pada penelitian ini dengan teori yang ada berarti ada faktor risiko lainnya yang dapat memicu kejadian lesi pra kanker serviks. Kemungkinan adanya

perbedaan karakteristik populasi dan sampel pada masing-masing tempat penelitian. Pekerjaan memang secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Menurut peneliti pekerjaan ibu dapat diatur jadwal, dapat dikondisikan jika ibu memiliki persepsi ingin bertindak dan niat harus melakukan deteksi dini. Pekerjaan dibagi menjadi banyak jenis, dan tidak semua ibu memiliki pekerjaan yang *fulltime*.

Sedangkan masih terdapat beberapa pekerja yang mengalami stres berat walaupun lama kerjanya sudah memenuhi syarat. Hal ini dimungkinkan pekerja mendapatkan pekerjaan tambahan dari atasan atau rekan kerja yang lain sehingga membuat pekerja tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:286, sebagai berikut :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahnya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya” (Kementerian Agama RI, 2022).

Tafsir Al-Misbah, Allah tidak membebani hamba-hamba-Nya kecuali dengan sesuatu yang dapat dilaksanakan. Maka, setiap orang yang mukallaf, amalnya akan dibalas yang baik dengan kebaikan, dan yang jelek dengan kejelekan (Shihab, 2000).

Maka peneliti berpendapat bahwa berdasarkan ayat diatas pekerjaan tidak selalu menjadi alasan untuk ibu tidak dapat mengikuti kegiatan apapun. Maka bagi ibu bekerja untuk dapat lebih memahami kesehatan dirinya, dan menimbang kembali hal yang perlu dilakukan sebagai upaya deteksi dini kanker yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah ditemukan, kelemahan atau keterbatasan dari penelitian ini yaitu terdapat pengurangan pada pekerja wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills yaitu dari 50 pekerja wanita ke 32 pekerja wanita. Meski 32 responden sudah memenuhi jumlah ideal responden penelitian, namun akan lebih baik jika lebih banyak responden yang digunakan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait faktor yang berhubungan dengan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *CerviScan* sebagai upaya pencegahan kanker serviks pada Pekerja Perempuan di PT. Eastern Pearl Flour Mills, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik responden penelitian yang ditemukan, mayoritas pekerja wanita yang berusia 20-30 tahun, beragama Islam, bersuku Bugis, status pendidikan tamat S1, sudah menikah, paritas multipara dan hasil pemeriksaan *CerviScan* yang positif yaitu 4 responden.
2. Terdapat hubungan antara usia dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 0.028).
3. Tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 0.566).
4. Tidak terdapat hubungan antara status pernikahan dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 0.104).
5. Terdapat hubungan antara riwayat penyakit infeksi menular seksual (IMS) dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 0.012).
6. Terdapat hubungan antara riwayat keluarga yang pernah terkena kanker serviks dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 0.012).

7. Tidak terdapat hubungan antara vaksinasi HPV dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 1.000).
8. Terdapat hubungan antara penggunaan pembalut saat menstruasi dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 0.006).
9. Terdapat hubungan antara penggunaan pembersih kewanitaan dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 0.009).
10. Terdapat hubungan antara usia saat pertamakali menikah dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 0.047).
11. Terdapat hubungan antara pemakaian alat kontrasepsi dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 0.003).
12. Terdapat hubungan antara jumlah kehamilan (paritas) dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 0.025).
13. Terdapat hubungan antara jumlah anak dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 0.002).
14. Terdapat hubungan antara riwayat abortus (keguguran) dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills (*p value* = 0.025).

15. Terdapat hubungan antara unit kerja dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills (p value = 0.028).
16. Tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills (p value = 0.271).

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian yang dilakukan terkait faktor yang berhubungan dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* pada pekerja wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills, yaitu :

1. Bagi PT. Eastern Pearl Flour Mills

Disarankan pihak manajemen perusahaan mengadakan program pemeriksaan kesehatan terkait pentingnya deteksi dini kanker serviks dan pemberian Vaksin HPV (*Human Papilloma Virus*) untuk mencegah infeksi HPV khususnya pada pekerja wanita.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi, khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh mengenai, Faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan* sebagai Upaya Pencegahan Kanker Serviks pada Pekerja Wanita, maka sebaiknya adanya penambahan variabel yang lain sehingga akan lebih bervariasi dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2012). Keluarga Sehat dalam Perspektif Islam. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(1).
- ADEJO, D. S., AMINU, M., ELLA, E. E., Oguntayo, A. O., & Murtala, A. (2024). Associated Risk Factors of Human Papillomavirus infection and Cervical Dysplasia among Women in Kaduna State Nigeria.
- Adib, M. A. (2022). Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Surat Al-Alaq Ayat 1-5 dalam Pembelajaran Agama Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 11(1), 1-18.
- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya Pendidikan bagi Manusia. *Jurnal Buana Pengabdian*, 1(1), 66-72.
- Alreshidi, F., Abdalla, R., & Ahmed, H. (2020). Acceptance and merit of Pap. Test for prevention and early detection of cervical cancer among Saudi women in Hail Region. *Medical Science*, 24(103), 1669-1676.
- Amelia NR, Ngo NF, Toruan VML. 2022. Hubungan Usia Pertama Menikah, Paritas dan Lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Kanker Serviks di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. *Jurnal Verdure*. 4(1):378-384.
- American Cancer Society. (2022). *Cervical Cancer*. Diakses tanggal 7/08/2023: <https://www.cancer.org/cancer/types/cervical-cancer.html>
- Aminah, N. (2020). Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kurikulum Ilmu Keperawatan. *Jurnal Kesehatan Budi Luhur : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Dan Kebidanan*, 13(Vol 13, No 2 (2020): Juli 2020),284–292.
- Ananti, Y., & Sari, F. (2020). Hubungan Sosiodemografi Wanita Usia Subur Dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks Metode Iva. *Jurnal KesehatanSamodra Ilmu*, 11(1), 76–83.
- Andrijono, A., Wulandari, D., Widyahening, I. S., Mahardhika, D., Nurainy, N., Sari, R. M., ... & Utama, R. (2023). Diagnostic Performance of Urine-based HPV-DNA Test (CerviScan, Bio Farma) as Cervical Cancer Screening Tool in Adult Women. *Indonesian Journal of Obstetrics and Gynecology*, 161-165.
- Azriful, A., Alam, S., & As Siddiq, M. (2022). Early Detection Program for Breast and Cervical Cancer in Indonesia: How is Implementation? *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 14(27), 211–224. <https://doi.org/10.24252/al-sihah.v14i2.33508>.
- Chabirah, S., Bujawati, E., Habibi, H., & Azriful, A. (2020). Impact of Posttraumatic Growth on the Quality of Life in Woman with Breast

- Cancer. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 12(1), 48. <https://doi.org/10.24252/as.v12i1.14564>.
- Dalimartha, S. (1999). *Ramuan tradisional untuk pengobatan kanker*. Penebar Swadaya.
- Damailia, H.T & Oktavia, TR. (2019). Faktor -Faktor Determinan Deteksi Dini Kanker Serviks Melalui Metode Pap Smear Pada Pasangan Usia Subur (PUS). *Gaster : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 12 (2)
- Depkes. (2009). *Kategori Usia Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia*.
- Dewi, I. G. A. A. N., Sawitri, A. A. S., Mahayati, N. M. D., & Lindayani, I. K. (2021). *Faktor Risiko Lesi Prakanker Leher Rahim (Serviks)*. Penerbit Qiara Media.
- Dewi, R. (2019). Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2), 248-272. <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.920>
- Dianti, N. R., & Isfandiari, M. A. (2017). Perbandingan Risiko Ca Serviks Berdasarkan Personal Hygiene Pada Wanita Usia Subur Di Yayasan Kanker Wisnuwardhana Surabaya. *Jurnal PROMKES*, 4(1), 82.
- Djauharoh, M. K., Sri Ratnaningsih, S. S. T., Keb, M., Suparni, S. S. T., Chabibah, N., Keb, S., ... & Resmawati, M. K. (2023). *Serial Islam dan Sains dalam Keluarga Berencana*. Deepublish.
- Elkarimah, M. F. (2016). Kajian Al-Qur'an dan Hadist tentang Kesehatan Jasmani dan Rohani. *Tajdid*, 15(1), 106.
- Fadila, A. N. (2021). INFEKSI MENULAR SEKSUAL DAN RIWAYAT KONTRASEPSI HORMONAL SEBAGAI FAKTOR RESIKO LESI PRA-KANKER LEHER RAHIM. *Jurnal Bidan Pintar*, 2(1), 209-226.
- Fahriani, E., Suroyo, R. B., & Maryanti, E. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kanker Serviks Pada Pasien Rumah Sakit Murni Teguh Medan. *Journal Healthy Purpose*, 2(1), 102-109.
- FAISAL, H. (2023). *TERM ANAK MENURUT HADIS NABI DALAM KITAB ADABUL MUFRAD KARYA IMAM BUKHARI*(Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Fatmawati. (2016). Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik). *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(1), 151-163.
- Fauza, M., Aprianti, A., & Azrimaidalisa, A. (2019). Faktor yang berhubungan dengan deteksi dini kanker serviks metode IVA di Puskesmas Kota Padang. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 14(1), 68-80. <https://doi.org/10.14710/jpki.14.1.68-80>.

- Fitrisia, C. A., Khambri, D., Utama, B. I., & Muhammad, S. (2019). *Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Lesi Pra Kanker Serviks pada Wanita Pasangan Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Bungo 1*. 8(4), 33–43.
- Fuadi Husin, A. (2014). Islam Dan Kesehatan. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 1–18. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.567>
- Gemi, G. (2017). Kontrasepsi dalam kajian Islam. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 17(1), 231-244.
- Globocan, 2018. Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018: Cancer Uteri. [Accessed 8th Januari 2020].
- Habtu, Y., Yohannes, S., & Laelago, T. (2018). Health seeking behavior and its determinants for cervical cancer among women of childbearing age in Hossana Town, Hadiya zone, Southern Ethiopia: Community based cross sectional study. *BMC Cancer*, 18(1), 1–9.
- Hamdayani, D. And Suryani, U. (2021) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kanker Serviks Pada Pasien Dengan Masalah Gynekologi Di Poliklinik Kebidanan', *Jurnal Keperawatan*, 13(2), Pp. 355–364.
- Hannah, N. (2017). Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 45–60. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>
- Has, D dan Hendrati, L, 2019. Faktor risiko karakteristik dan perilaku seksual terhadap kejadian kanker serviks. *The Indonesian Journal of Public Health*, Vol.6, No. 1, Surabaya.
- Hendriana. 2008. *Pernikahan Dini Tingkatkan Risiko Kanker Serviks*. Diakses: 20November2008.<http://hendrahendriana.blogspot.com/2008/09/pernikahan-dini-tingkatkan-resiko.html>
- Imelda, F., & Santosa, H. (2020). Deteksi Dini Kanker Serviks Pada Wanita. In *Journal Endurance*. <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2300/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Irmeita Atfa, Y. D. (2023, Januari). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemeriksaan IVA. *Jurnal Maternitas Aisyah (Jaman Aisyah) Universitas Aisyah Pringsewu*, 76-87. doi:<https://doi.org/10.30604/jaman.v4i1.771>.
- Jean PEN, Henri E, Valère MK, Jean PNN, Pascal F. 2020. Risk Factors of Cervical Cancer in Two Reference Hospitals Of Douala; A Case-Control Study. *Cancer Science & Research*, [Online Journal] [diunduh 20 Juli 2023] Tersedia dari: <https://doi.org/10.33425/2639-8478.1050>.

- Karim, U. N., Dewi, A., & Hijriyati, Y. (2021). Analisa faktor resiko kanker serviks dikaitkan dengan kualitas hidup pasien di rsia bunda jakarta. *Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan Universitas Binawan*, 1–61.
- Kemenag RI. (2023). Al-qur'an dan terjemah. Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI. 2022. Qur'an Kemenag. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal : Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560.
- Koca, B. E. N. N. U. R., & Açıkgöz, A. Y. L. A. (2023). Cervical cancer risk levels among women aged 30-65 and factors affecting compliance with the national cervical cancer screening standards. *Medicine Science*, 12(1).
- Kusumawati, Y., Nugrahaningtyas, R. W., & Rahmawati, E. N. (2019). Pengetahuan, deteksi dini dan vaksinasi HPV sebagai faktor pencegah kanker serviks di Kabupaten Sukoharjo. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 204-213.
- LISMANIAR, D., Wulan, W. S., Wardani, S. W., Gloria Purba, C. V., & Abidin, A. R. (2021). Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kanker Serviks Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020. *Media Kesmas (Public Health Media)*, 1(3), 1023–1042.
- Lisnadiyanti. Hubungan karakteristik pasien kanker serviks terhadap dukungan sosial pada pasien dengan kanker serviks di Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Kanker Dharmais. *Journal of Health Science and Physiotherapy (IHSP)*. 2019;1(1):32-6.
- Mayanda, V. (2019). Hubungan Karakteristik Wanita dengan Kejadian Kanker Serviks di Rumah Sakit Umum Mutia Sari. *Jurnal Bidan Komunitas*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.33085/jbk.v2i1.4170>
- Mia Fitriah Elkarimah. (2016). Kajian Al-Quran Dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani dan Ruhani. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, XV(1).
- Mustafa, P. S., & Winarno, M. E. (2020). Pengembangan Buku Ajar Pengajaran Remedial Dalam Pendidikan Jasmani Untuk Mahasiswa S1 Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan Universitas Negeri Malang. *Multilateral Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*, 19(1), 1–12.
- Musthofa, M. A. (2017). *STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA PENGHARAMAN ROKOK DALAM TAREKAT AL-IDRISIYYAH INDONESIA* (Doctoral dissertation, STAIN Kudus).
- Nugroho, E. G. Z., Sofro, M. A. U., & Kusuma, H. (2020). MODUL Islamic Based Spiritual Group Therapy Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik (PGK) yang Menjalani Hemodialisis.

- Nurbaiti, M. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DENGAN PEMERIKSAAN IVA TEST. *Jurnal'Aisyiyah Medika*, 9(1).
- Paremajangga R, Ndoen H, and Riwu Y. Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Lesi Prakanker Serviks (IVA +) Di Puskesmas Bakunase Kota Kupang Tahun 2019. *Jurnal Media Kesehatan Masyarakat*. 2020 ; 2(1):1-9.
- Parlagutan, M. T., & Pratama, M. Y. (2017). Hubungan Work Family Conflict Dengan Stres Kerja Pada Perawat Wanita Di Rumah Sakit Putri Hijau Medan. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 1(1).
- Persada, B., Dinnar, M., Ardiansyah, R., & Fasyaya, Q. (2023). ANALISIS FENOMENA CHILDFREE MENURUT PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 4(1), 55-75.
- Pradya, N. (2015). Hubungan Usia dan Penggunaan Pil Kontrasepsi Jangka Panjang terhadap Hasil Pemeriksaan IVA Positif sebagai Deteksi Dini Kejadian Kanker Leher Rahim. *Jurnal Majority*, 4(7), 13-18.
- Prasistyami, A., Kusmiyati, Y., & Puji, H. (2018). Urgan Lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Dengan Kejadian Kanker Serviks. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Pratiwi, T. Y., & Betria, I. (2021). Konflik Peran Ganda Dan Stres Kerja Pada Karyawan Perempuan. *Cano Ekonomos*, 2, 1-14.
- Purnama, S. G., & Purnama, I. G. H. DIKTAT KULIAH TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN PARIWISATA.
- Rahayu, S., Suhaimi, D., Yunita, J., Abidin, Z., & Riva'i, S. B. (2018). Pelaksanaan Program Deteksi Dini Kanker Serviks (Ca Cervix) dengan Metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di Kabupaten Kampar. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 4(2), 68-75.
- Rahayu, Y., & Nurrohim, A. (2022). Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 48-64.
- Ramadan, F., Hidayat, S. N., Lilis, L., Syahrir, N. A., Akila, N., Ekasari, R., ... & Widiastuty, L. (2023). Determinants of Impaired Lung Function Capacity in Furniture Workers in Gowa District, South Sulawesi. *HIGIENE: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 9(3), 138-144.
- Ramadhaningtyas, A., & Besral, B. (2020). Hubungan Seksual Usia Dini Dapat Meningkatkan Risiko Kanker Serviks. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 1(1), 46 <https://doi.org/10.51181/bikfokes.v1i1.4054>.

- Ramaita, R. (2023). *Problematika Pendidikan Seks bagi Siswa Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Mandailing Natal*(Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Rasjidi. 2010. 100 Questions & Answers Kanker Pada Wanita. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Ratnasari, N. V., & Toyibah, A. (2018). Hubungan Masa Bekerja Wanita Pekerja Pabrik Rokok dengan Kejadian Lesi Prakanker Serviks. *Jurnal Berkala Epidemiologi*,6(1),69.<https://www.google.com/search?q=HUBUNGAN+MASA+BEKERJA+WANITA+PEKERJA+PABRIK+ROKOK+DENGAN+KEJADIAN+LESI+PRAKANKER+SERVIKS+Relationship&oq=HUBUNGAN+MASA+BEKERJA+WANITA+PEKERJA+PABRIK+ROKOK+DENGAN+KEJADIAN+LESI+PRAKANKER+SERVIKS+Relationship&aqs=chrome.69i5>.
- Sari, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemeriksaan Iva Test Pada Wanita Pasangan Usia Subur. *Jurnal Ilmiah Panmed (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwifery, Environment, Dentist)*, 16(1), 72–76.
- Shaswati, M., Oeishy, F. H., Mumu, S. B., Zahid, M. Z. I., Hossain, M., Haque, M. A., ... & Mostaid, M. S. (2023). Polymorphisms of the interleukin-6 (IL-6) gene contribute to cervical cancer susceptibility in Bangladeshi women: A case-control study. *Health Science Reports*, 6(5), e1238.
- Shen, C. T., Tai, S. Y., Tsao, Y. H., Chen, F. M., & Hsieh, H. M. (2023). Abortion and Female Cancer Risks among Women Aged 20 to 45 Years: A 10-Year Longitudinal Population-Based Cohort Study in Taiwan. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043682>
- Shihab, M. Q. (2000). Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1. In *Lentera Hati*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Siddig, E. E., Ahmed, A., Ahmed, E. S., Mohammed, M. A., Kunna, E., El-Sadig, S. M., ... & Mohamed, N. S. (2023). Knowledge and attitudes towards cervical cancer prevention among women in Khartoum state, Sudan. *Women's Health*, 19, 17455057231166286.
- Sri Nengsih Destriani, D. M. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA) PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) DI PUSKESMAS KEMUMU TAHUN 2022* (Vol. 10). Bengkulu: Journal of Midwifery. doi:<https://doi.org/10.37676/jm.v10i2.3269>

- Sujiwati, S. (2019). *Evaluasi implementasi program deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA di puskesmas adimulyo kabupaten kebumen tahun 2019*.
- Sukaca, Bertiani. 2009. Cara Cerdas Menghadapi Kanker Serviks. Jakarta: Genius Publisher.
- Sumantri, A. (2017). Kesehatan Lingkungan . Depok: PT Kharisma Putra Utama.
- Supardi. (2017). Hubungan Usia dan Paritas dengan Kanker Payudara di RS Putri Hijau Medan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(2), 26–35.
- Susiana, S. (2019). Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 207–222.
- Syahza, A., & Riau, U. (2021). *Buku Metodologi Penelitian , Edisi Revisi Tahun 2021* (Issue September).
- Tarigan, A. A. (2022). *Al-Quran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Perspektif Integratif*. Merdeka Kreasi Group.
- Teklehaimanot, D. A., Derseh, B. T., Mekuria, A. D., & Dadi, A. F. (2022). Sexually Transmitted Infections (STIs) increased the risk of precancerous cervical lesions among women in Ethiopia: unmatched case-control study.
- Theodora Parapat, F., Henry Setyawan, & Dian Saraswati, L. (2016). Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Metode Inspeksi Visual Asam Asetat Di Puskesmas Candiroto Kabupaten Temanggung. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* , 4(4), 363–370.
- Wardhani, H. A., Moetmainnah, S., & Yazid, N. (2019). Hubungan Kejadian Carcinoma Cervicis Uteri dengan Umur, Status Perkawinan, dan Paritas di RSUP Dr Kariadi Semarang Periode Januari-Maret 2011. *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*, 1(3).
- Wawan, M. A. dan Dewi M (2019). *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- WHO. (2020). WHO recommendations on self-care interventions. *Human Reproduction Programme*.
- World Health Organization. (2022). *Cervical Cancer*. Diakses tanggal 8/08/2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer>
- Wulandari, V. (2020). Hubungan faktor risiko penggunaan kontrasepsi oral dan aktivitas seksual dengan kejadian kanker serviks. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4(3), 408-419

- Yuliani, N. (2016). *Konsep Hakikat Dasar Anak Usia Dini*. 1, 165.
- Yuni Nurul Izah, D. O. (2022, Agustus). Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Metode IVA di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 7, No. 2, 553-561. doi:<https://doi.org/10.14710/jekk.v7i2.13768> .
- Zakka, A., Ayolabi, C., Olusola, B., & Egwuatu, T. (2023). Prevalence and Associated Risk Factors of Cervical Human Papillomavirus (HPV) Infection among Women in Northcentral Nigeria: A cross-sectional study. *Babcock University Medical Journal*, 6(2), 88-98.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

L

A

M

P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

N

Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Makassar
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa. Telp. 0411-841879, Fax. 0411-8281400

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(INFORMED CONSENT)

Kepada Yth,

Ibu Calon

RespondenDi,-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Alya Nursakinah, NIM 70200119052 mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode CerviScan pada Pekerja Wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023”** untuk menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).

Saya meminta waktu dan kesediaan ibu agar kiranya bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan. Pada penelitian ini, ibu akan diberikan kuesioner untuk dijawab serta pengambilan sampel urin. Kerahasiaan jawaban akan dijaga dan hanya diketahui oleh peneliti.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Usia :

Alamat :

Maka dengan ini saya secara suka rela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Makassar, November 2023

Responden

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

“Faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode *CerviScan* Pekerja Wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023”

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan deteksi dini kanker serviks metode *CerviScan* di PT. Eastern Pearl Flour Mills. Saya sangat mengharapkan pekerja wanita agar memberikan jawaban yang sejujurnya dan sesuai dengan kondisi yang dirasakan. Atas perhatian dan bantuannya, saya mengucapkan terima kasih.

No.	Karakteristik Pekerja Wanita	Jawaban
1.	Nama	
2.	Alamat	
3.	Usia	
4.	Pendidikan Terakhir	a. Tamat SD b. Tamat SMP c. Tamat SMA d. Tamat Perguruan Tinggi (S1/S2)
5.	Suku	
6.	Agama	
7.	Masa Kerja	
8.	Status Pernikahan	a. Belum Menikah b. Sudah Menikah
9.	Unit Kerja	

Hasil Pemeriksaan *CerviScan*

Hasil Pemeriksaan <i>CerviScan</i>	Keterangan
(+) POSITIF (.....)	Lakukan pemeriksaan IVA test. 1. IVA test (-), lakukan skrining ulang 3 tahun. 2. IVA test (+) a. Lesi luas <75%, lakukan Krioterapi & skrining 1 tahun. b. Lesi luas >75%, maka dirujuk ke Sp.OG.
(-) NEGATIF (.....)	Lakukan skrining ulang 5 tahun ke depan.

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Jawablah pertanyaan dibawah ini, kemudian pilih sesuai keadaan yang sebenarnya yang dianggap benar. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya pada peneliti.

Kuesioner Tentang Faktor Reproduksi Wanita & Kehamilan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda mempunyai riwayat penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)?	a. Ya b. Tidak
2.	Apakah ada riwayat keluarga yang pernah terkena Kanker Serviks?	a. Ya b. Tidak
3.	Apakah anda sudah pernah melakukan Vaksinasi HPV?	a. Ya b. Tidak
4.	Berapa lama anda mengganti Pembalut dalam waktu satu hari pada saat Menstruasi?	1. > 5 jam 2. ≤ 5 jam
5.	Apakah anda menggunakan Pembersih Kewanitaan?	a. Ya b. Tidak
6.	Pada saat usia berapa anda pertamakali menikah ?	Tahun.
7.	Apakah anda menggunakan alat Kontrasepsi ?	a. Ya b. Tidak
8.	Berapa total jumlah kehamilan (Paritas) anda?	
9.	Berapa jumlah anak anda?	
10.	Apakah anda mempunyai riwayat Abortus (keguguran)?	a. Ya b. Tidak

Lampiran 3

Master Tabel

Nama	Usia Responden	Alamat	Pendidikan	Suku	Agama	Masa Kerja	Status Pernikahan	Unit Kerja	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	DDK
P1	32 tahun	Btn Minasa Upa	S1	Bugis	Islam	8 tahun	Belum Menikah	Logistic	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1
P2	26 tahun	Kompleks Hasanuddin	S1	Bugis	Islam	3 tahun	Belum Menikah	Logistic	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1
P3	26 tahun	Jl.Tanjung Merdeka	D3	Jawa	Islam	4 tahun	Belum Menikah	Packing	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1
P4	44 tahun	Jl.Ance Dg Ngoyo	S1	Minang	Islam	14 tahun	Sudah Menikah	Logistic	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1
P5	54 tahun	Perumahan Berdikari asri	SMA	Bugis	Islam	28 tahun	Sudah Menikah	Packing	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1
P6	33 tahun	Jl.Kalumpang	S1	Bugis	Islam	12 tahun	Sudah Menikah	Logistic	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1
P7	45 tahun	Mitra Berdikari Asri	S1	Bugis	Islam	18 tahun	Sudah Menikah	Logistic	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1
P8	35 tahun	perumahan Berdikari asri	S1	Bugis	Islam	12 tahun	Sudah Menikah	Logistic	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1
P9	29 tahun	Kompleks Hasanuddin	SMA	Makassar	Islam	3 tahun	Belum Menikah	Logistic	2	2	1	0	2	2	0	0	0	0	1
P10	38 tahun	Btn Kodam	S1	Bugis	Islam	13 tahun	Belum Menikah	Logistic	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1
P11	43 tahun	jl.Beringin,Gowa	D4	Makassar	Islam	15 tahun	Sudah Menikah	Packing	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2
P12	25 tahun	Aspol Tello Baru	S1	Bugis	Islam	2 tahun	Sudah Menikah	Logistic	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	1
P13	43 tahun	Jl.Gunung Bawakaraeng	S1	Makassar	Islam	20 tahun	Sudah Menikah	Packing	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2
P14	42 tahun	Jl.Hj.Kalla	D3	Makassar	Islam	19 tahun	Belum Menikah	Packing	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1
P15	50 tahun	Btn Somba Opu	S1	Bugis	Islam	9 tahun	Sudah Menikah	Packing	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2
P16	40 tahun	jl.Beringin	S1	Makassar	Katolik	15 tahun	Sudah Menikah	Packing	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2

Nama	Usia Responden	Alamat	Pendidikan	Suku	Agama	Masa Kerja	Status Pernikahan	Unit Kerja	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	DDK
P17	46 tahun	Yos Sudarso	SMA	Makassar	Budha	25 tahun	Sudah Menikah	Packing	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
P18	41 tahun	Jl.Talasalapang	S1	Bugis	Islam	16 tahun	Sudah Menikah	Logistic	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	1
P19	25 tahun	Taman Sudiang Indah	D4	Bugis	Islam	4 tahun	Belum Menikah	Packing	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1
P20	33 tahun	Jl.Da'wah	S1	Bugis	Islam	10 tahun	Belum Menikah	Logistic	2	2	1	0	2	2	0	0	0	0	1
P21	33 tahun	Btn Kodam	S1	Bugis	Islam	12 tahun	Belum Menikah	Logistic	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1
P22	35 tahun	Jl.Sabutung	SMA	Makassar	Islam	3 tahun	Sudah Menikah	Packing	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1
P23	43 tahun	Jl.Sabutung	SMA	Bugis	Islam	10 tahun	Sudah Menikah	Packing	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1
P24	26 tahun	Jl.Serigala	D3	Makassar	Tionghoa	4 tahun	Belum Menikah	Packing	2	2	2	0	2	1	0	0	0	0	1
P25	24 tahun	Jl.Rajawali	SMA	Makassar	Chinese	2 tahun	Belum Menikah	Packing	2	2	2	0	2	1	0	0	0	0	1
P26	23 tahun	jl.Beringin	S1	Makassar	Islam	3 tahun	Belum Menikah	Logistic	2	2	2	0	2	1	0	0	0	0	1
P27	54 tahun	Jl.Kakatua	S1	Makassar	Islam	6 tahun	Sudah Menikah	Logistic	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
P28	30 tahun	Mitra Berdikari Asri	S1	Makassar	Islam	6 tahun	Sudah Menikah	Logistic	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1
P29	44 tahun	jl.Singa	S1	Makassar	Islam	20 tahun	Sudah Menikah	Logistic	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1
P30	24 tahun	Jl.Insinyur Sutami	S1	Bugis	Islam	3 tahun	Belum Menikah	Logistic	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1
P31	22 tahun	Jl.Hj.Kalla	D4	Makassar	Islam	1 tahun	Belum Menikah	Packing	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1
P32	22 tahun	Jl.Rajawali	D4	Toraja	Kristen	1 tahun	Belum Menikah	Logistic	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1

Lampiran 4
Hasil Analisis Univariat
Statistics

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22	2	6.3	6.3	6.3
	23	1	3.1	3.1	9.4
	24	2	6.3	6.3	15.6
	25	2	6.3	6.3	21.9
	26	3	9.4	9.4	31.3
	29	1	3.1	3.1	34.4
	30	1	3.1	3.1	37.5
	32	1	3.1	3.1	40.6
	33	3	9.4	9.4	50.0
	35	2	6.3	6.3	56.3
	38	1	3.1	3.1	59.4
	40	1	3.1	3.1	62.5
	41	1	3.1	3.1	65.6
	42	1	3.1	3.1	68.8
	43	3	9.4	9.4	78.1
	44	2	6.3	6.3	84.4
	45	1	3.1	3.1	87.5
	46	1	3.1	3.1	90.6
	50	1	3.1	3.1	93.8
	54	2	6.3	6.3	100.0
Total		32	100.0	100.0	

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tua (> 35 tahun)	14	43.8	43.8	43.8
	Muda (≤ 35 tahun)	18	56.2	56.2	100.0
Total		32	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tingkat Pendidikan Menengah : SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan .	6	18.8	18.8	18.8
	Tingkat Pendidikan Tinggi : Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor.	26	81.2	81.2	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Suku

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bugis	15	46.9	46.9	46.9
	Makassar	12	37.5	37.5	84.4
	Toraja	1	3.1	3.1	87.5
	Tionghoa	2	6.3	6.3	93.8
	Jawa	1	3.1	3.1	96.9
	Minang	1	3.1	3.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Agama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Islam	27	84.4	84.4	84.4
	Kristen	3	9.4	9.4	93.8
	Katolik	1	3.1	3.1	96.9
	Buddha	1	3.1	3.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Status_Pernikahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Menikah	15	46.9	46.9	46.9
	Sudah Menikah	17	53.1	53.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

		Masa_Kerja				
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	1	2	6.3	6.3	6.3	
	2	2	6.3	6.3	12.5	
	3	5	15.6	15.6	28.1	
	4	3	9.4	9.4	37.5	
	6	2	6.3	6.3	43.8	
	8	1	3.1	3.1	46.9	
	9	1	3.1	3.1	50.0	
	10	2	6.3	6.3	56.3	
	12	3	9.4	9.4	65.6	
	13	1	3.1	3.1	68.8	
	14	1	3.1	3.1	71.9	
	15	2	6.3	6.3	78.1	
	16	1	3.1	3.1	81.3	
	18	1	3.1	3.1	84.4	
	19	1	3.1	3.1	87.5	
	20	2	6.3	6.3	93.8	
	25	1	3.1	3.1	96.9	
	28	1	3.1	3.1	100.0	
	Total		32	100.0	100.0	

		Masa_Kerja			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	> 5 Tahun	20	62.5	62.5	62.5
	≤ 5 Tahun	12	37.5	37.5	100.0
Total		32	100.0	100.0	

		Unit_Kerja			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Packing	14	43.8	43.7	43.8
	Logistic	18	56.3	56.3	100.0
Total		32	100.0	100.0	

Riwayat_Penyakit_Infeksi_Menular_Seksual

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	2	6.3	6.3	6.3
	Tidak Ada	30	93.8	93.7	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Riwayat_Keluarga_yang_Pernah_Terkena_Kanker

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	2	6.3	6.3	6.3
	Tidak Ada	30	93.8	93.7	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Vaksinasi_HPV

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sudah Pernah	4	12.5	12.5	12.5
	Belum Pernah	28	87.5	87.5	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Penggunaan_pembalut

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	> 5 jam	10	31.3	31.3	31.3
	≤ 5 jam	22	68.8	68.7	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Penggunaan_Pembersih_Kewanitaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	11	34.4	34.4	34.4
	Tidak	21	65.6	65.6	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Pemakaian Alat Kontrasepsi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Pernah (Belum Menikah)	17	53.1	53.1	53.1
	Ya	9	28.1	28.1	81.3
	Tidak	6	18.8	18.8	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Usia_saat_pertamakali_menikah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20	1	5.9	5.9	5.9
	23	1	5.9	5.9	11.8
	24	2	11.8	11.8	23.5
	25	4	23.5	23.5	47.1
	26	1	5.9	5.9	52.9
	27	3	17.6	17.6	70.6
	28	1	5.9	5.9	76.5
	29	4	23.5	23.5	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

Usia_Saat_Pertamakali_Menikah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Menikah	15	46.9	46.9	46.9
	≤ 20 tahun	1	3.1	3.1	50.0
	> 20 tahun	16	50.0	50.0	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Jumlah_Kehamilan_paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	20.0	20.0	20.0
	2	4	26.7	26.7	46.7
	3	6	40.0	40.0	86.7
	5	2	13.3	13.3	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

Jumlah_kehamilan_paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Hamil	17	53.1	53.1	53.1
	Paritas > 3 kali	5	15.6	15.6	68.8
	Paritas ≤ 3 kali	10	31.3	31.3	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Jumlah_Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Punya Anak	17	53.1	53.1	53.1
	> 2 Anak	4	12.5	12.5	65.6
	≤ 2	11	34.4	34.4	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Jumlah_Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	CumulativePercent
Valid	1	3	20.0	20.0	20.0
	2	6	40.0	40.0	60.0
	3	6	40.0	40.0	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

Abortus

		Frequency	Percent	Valid Percent	CumulativePercent
Valid	0	11	73.3	73.3	73.3
	1	2	13.3	13.3	86.7
	2	2	13.3	13.3	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

Deteksi Dini Kanker Serviks

		Frequency	Percent	Valid Percent	CumulativePercent
Valid	Positif	4	12.5	12.5	12.5
	Negatif	28	87.5	87.5	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Hasil Analisis Bivariat Crosstabs

Usia * Deteksi Dini Kanker Serviks

			Crosstab		
			Deteksi Dini Kanker Serviks		Total
			Positif	Negatif	
Usia	Tua (> 35 tahun)	Count	4	10	14
		Expected Count	1.8	12.3	14.0
		% within Usia	28.6%	71.4%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	100.0%	35.7%	43.8%
		% of Total	12.5%	31.3%	43.8%
	Muda (≤ 35 tahun)	Count	0	18	18
		Expected Count	2.3	15.8	18.0
		% within Usia	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	0.0%	64.3%	56.3%
		% of Total	0.0%	56.3%	56.3%
Total		Count	4	28	56.3%
		Expected Count	4.0	28.0	32
		% within Usia	12.5%	87.5%	32.0
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	12.5%	87.5%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.878 ^a	1	.015		
Continuity Correction ^b	3.556	1	.059		
Likelihood Ratio	7.362	1	.007		
Fisher's Exact Test				.028	.028
Linear-by-Linear Association	5.694	1	.017		
N of Valid Cases	32				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.75.

b. Computed only for a 2x2 table

Pendidikan * Deteksi Dini Kanker Serviks

		Crosstab			
		Deteksi Dini Kanker Serviks			
		Positif	Negatif	Total	
Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Count	0	6	6
	Menengah : SMA, Madrasah Aliyah, SMK,	Expected Count	.8	5.3	6.0
	Madrasah Aliyah	% within Pendidikan	0.0%	100.0%	100.0%
	Kejuruan .	% within Deteksi DiniKanker Serviks	0.0%	21.4%	18.8%
		% of Total	0.0%	18.8%	18.8%
	Tingkat Pendidikan	Count	4	22	26
Tinggi : Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor.		Expected Count	3.3	22.8	26.0
		% within Pendidikan	15.4%	84.6%	100.0%
		% within Deteksi DiniKanker Serviks	100.0%	78.6%	81.3%
		% of Total	12.5%	68.8%	81.3%
	Total	Count	4	28	32
	Expected Count	4.0	28.0	32.0	
	% within Pendidikan	12.5%	87.5%	100.0%	
	% within Deteksi DiniKanker Serviks	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	12.5%	87.5%	100.0%	

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.055 ^a	1	.304		
Continuity Correction ^b	.117	1	.732		
Likelihood Ratio	1.788	1	.181		
Fisher's Exact Test				.566	.416
Linear-by-Linear Association	1.022	1	.312		
N of Valid Cases	32				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .75.

b. Computed only for a 2x2 table

M A K A S S A R

Masa_Kerja * Deteksi Dini Kanker Serviks

		Crosstab			
		Deteksi Dini Kanker Serviks		Total	
		Positif	Negatif		
Masa_Kerja	> 5 Tahun	Count	4	16	20
		Expected Count	2.5	17.5	20.0
		% within Masa_Kerja	20.0%	80.0%	100.0%
		% within Deteksi DiniKanker Serviks	100.0%	57.1%	62.5%
		% of Total	12.5%	50.0%	62.5%
	≤ 5 Tahun	Count	0	12	12
		Expected Count	1.5	10.5	12.0
		% within Masa_Kerja	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi DiniKanker Serviks	0.0%	42.9%	37.5%
		% of Total	0.0%	37.5%	37.5%
Total	Count	4	4	32	
	Expected Count	4.0	4.0	32.0	
	% within Masa_Kerja	12.5%	12.5%	100.0%	
	% within Deteksi DiniKanker Serviks	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	12.5%	12.5%	100.0%	

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.743 ^a	1	.098		
Continuity Correction ^b	1.219	1	.270		
Likelihood Ratio	4.097	1	.043		
Fisher's Exact Test				.271	.135
Linear-by-Linear Association	2.657	1	.103		
N of Valid Cases	32				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.50.

b. Computed only for a 2x2 table

M A K A S S A R

Status_Pernikahan * Deteksi Dini Kanker Serviks

Crosstab

		Deteksi Dini Kanker Serviks			
		Positif	Negatif	Total	
Status_Pernikahan	Belum Menikah	Count	0	15	15
		Expected Count	1.9	13.1	15.0
		% within Status_Pernikahan	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini KankerServiks	0.0%	53.6%	46.9%
		% of Total	0.0%	46.9%	46.9%
	Sudah Menikah	Count	4	13	17
		Expected Count	2.1	14.9	17.0
		% within Status_Pernikahan	23.5%	76.5%	100.0%
		% within Deteksi Dini KankerServiks	100.0%	46.4%	53.1%
		% of Total	12.5%	40.6%	53.1%
Total	Count	4	28	32	
	Expected Count	4.0	28.0	32.0	
	% within Status_Pernikahan	12.5%	87.5%	100.0%	
	% within Deteksi Dini KankerServiks	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	12.5%	87.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.034 ^a	1	.045		
Continuity Correction ^b	2.169	1	.141		
Likelihood Ratio	5.563	1	.018		
Fisher's Exact Test				.104	.066
Linear-by-Linear Association	3.908	1	.048		
N of Valid Cases	32				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.88.

b. Computed only for a 2x2 table

Unit_Kerja * Deteksi Dini Kanker Serviks

Crosstab

		Deteksi Dini Kanker Serviks			
		Positif	Negatif	Total	
Unit_Kerja	<i>Packing</i>	Count	4	15	14
		Expected Count	1.8	13.1	14.0
		% within Unit_Kerja	28.6%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini KankerServiks	100.0%	53.6%	43.8%
		% of Total	12.5%	46.9%	43.8%
	<i>Logistic</i>	Count	0	13	18
		Expected Count	2.3	14.9	18.0
		% within Unit_Kerja	0.0%	76.5%	100.0%
		% within Deteksi Dini KankerServiks	0.0%	46.4%	56.3%
		% of Total	0.0%	40.6%	56.3%
Total	Count	4	28	32	
	Expected Count	4.0	28.0	32.0	
	% within Unit_Kerja	12.5%	87.5%	100.0%	
	% within Deteksi Dini KankerServiks	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	12.5%	87.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.878 ^a	1	.015		
Continuity Correction ^b	3.556	1	.059		
Likelihood Ratio	7.362	1	.007		
Fisher's Exact Test				.028	.028
Linear-by-Linear Association	5.694	1	.017		
N of Valid Cases	32				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.75.

b. Computed only for a 2x2 table

Riwayat_Penyakit_Infeksi_Menular_Seksual * Deteksi Dini Kanker Serviks

Crosstab

		Deteksi Dini Kanker Serviks		
		Positif	Negatif	Total
Riwayat_Penyakit_Infeksi_ Ada Menular_Seksual	Count	2	0	2
	Expected Count	.3	1.8	2.0
	% within Riwayat_Penyakit_Infeksi_ Menular_Seksual	100.0%	0.0%	100.0%
	% within Deteksi Dini Kanker Serviks	50.0%	0.0%	6.3%
	% of Total	6.3%	0.0%	6.3%
	Tidak Ada	Count	2	28
Tidak Ada	Expected Count	3.8	26.3	30.0
	% within Riwayat_Penyakit_Infeksi_ Menular_Seksual	6.7%	93.3%	100.0%
	% within Deteksi Dini Kanker Serviks	50.0%	100.0%	93.8%
	% of Total	6.3%	87.5%	93.8%
	Total	Count	4	28
Total	Expected Count	4.0	28.0	32.0
	% within Riwayat_Penyakit_Infeksi_ Menular_Seksual	12.5%	87.5%	100.0%
	% within Deteksi Dini Kanker Serviks	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	12.5%	87.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance	Exact Sig.
			(2-sided)	(2-sided)
Pearson Chi-Square	14.933 ^a	1	.000	
Continuity Correction ^b	7.619	1	.006	
Likelihood Ratio	9.417	1	.002	
Fisher's Exact Test				.012
Linear-by-Linear Association	14.467	1	.000	
N of Valid Cases	32			

a. 3 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .25.

b. Computed only for a 2x2 table

Riwayat_Keluarga_yang_Pernah_Terkena_Kanker_Serviks* Deteksi Dini Kanker Seviks

Crosstab

		Deteksi Dini Kanker Serviks		Total	
		Positif	Negatif		
Riwayat_Keluarga_yang_Pernah_Terkena_Kanker	Ada	Count	2	0	2
		Expected Count	.3	1.8	2.0
		% within Riwayat_Keluarga_yang_Pernah_Terkena_Kanker Serviks	100.0%	0.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	50.0%	0.0%	6.3%
		% of Total	6.3%	0.0%	6.3%
	Tidak Ada		Count	2	28
		Expected Count	3.8	26.3	30.0
		% within Riwayat_Keluarga_yang_Pernah_Terkena_Kanker Serviks	6.7%	93.3%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	50.0%	100.0%	93.8%
		% of Total	6.3%	87.5%	93.8%
Total			Count	4	28
		Expected Count	4.0	28.0	32.0
		% within Riwayat_Keluarga_yang_Pernah_Terkena_Kanker Serviks	12.5%	87.5%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	12.5%	87.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance(2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	14.933 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	7.619	1	.006		
Likelihood Ratio	9.417	1	.002		
Fisher's Exact Test				.012	.012
Linear-by-Linear Association	14.467	1	.000		
N of Valid Cases	32				

a. 3 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .25.

b. Computed only for a 2x2 table

Vaksinasi HPV * Deteksi Dini Kanker Serviks

Crosstab

			Deteksi Dini Kanker Serviks		Total
			Positif	Negatif	
Vaksinasi HPV	Sudah Pernah	Count	0	4	4
		Expected Count	.5	3.5	4.0
		% within Vaksinasi HPV	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	0.0%	14.3%	12.5%
		% of Total	0.0%	12.5%	12.5%
	Belum Pernah	Count	4	24	28
		Expected Count	3.5	24.5	28.0
		% within Vaksinasi HPV	14.3%	85.7%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	100.0%	85.7%	87.5%
		% of Total	12.5%	75.0%	87.5%
Total	Count	4	28	32	
	Expected Count	4.0	28.0	32.0	
	% within Vaksinasi HPV	12.5%	87.5%	100.0%	
	% within Deteksi Dini Kanker Serviks	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	12.5%	87.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.653 ^a	1	.419		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	1.147	1	.284		
Fisher's Exact Test				1.000	.569
Linear-by-Linear Association	.633	1	.426		
N of Valid Cases	32				

a. 3 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.

b. Computed only for a 2x2 table

Usia_Pertamakali_Menikah * Deteksi Dini Kanker Serviks

Crosstab

		Deteksi Dini Kanker Serviks		Total	
		Positif	Negatif		
Usia_Pertamakali _Menikah	Belum	Count	0	15	15
		Expected Count	1.9	13.1	15.0
	Menikah	% within usia_pertamakali_Menikah	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	0.0%	53.6%	46.9%
		% of Total	0.0%	46.9%	46.9%
	≤ 20 tahun	Count	0	1	1
		Expected Count	.1	.9	1.0
		% within usia_pertamakali_Menikah	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	0.0%	3.6%	3.1%
		% of Total	0.0%	3.1%	3.1%
	> 20 tahun	Count	4	12	16
		Expected Count	2.0	14.0	16.0
		% within usia_pertamakali_Menikah	25.0%	75.0%	100.0%
% within Deteksi Dini Kanker Serviks		100.0%	42.9%	50.0%	
% of Total		12.5%	37.5%	50.0%	
Total	Count	4	28	32	
	Expected Count	4.0	28.0	32.0	
	% within usia_pertamakali_Menikah	12.5%	87.5%	100.0%	
	% within Deteksi Dini Kanker Serviks	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	12.5%	87.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	4.571 ^a	2	.102
Likelihood Ratio	6.119	2	.047
Linear-by-Linear Association	4.295	1	.038
N of Valid Cases	32		

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Pemakaian Alat Kontrasepsi * Deteksi Dini Kanker Serviks

Crosstab

			Deteksi Dini Kanker Serviks		Total
			Positif	Negatif	
Pemakaian alat kontrasepsi	Belum Pernah (Belum Menikah)	Count	0	15	15
		Expected Count	1.9	13.1	15.0
		% within Pemakaian alat kontrasepsi	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	0.0%	53.6%	46.9%
		% of Total	0.0%	46.9%	46.9%
	Ya	Count	4	5	9
		Expected Count	1.1	7.9	9.0
		% within Pemakaian alat kontrasepsi	44.4%	55.6%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	100.0%	17.9%	28.1%
		% of Total	12.5%	15.6%	28.1%
	Tidak	Count	0	8	8
		Expected Count	1.0	7.0	8.0
		% within Pemakaian alat kontrasepsi	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	0.0%	28.6%	25.0%
		% of Total	0.0%	25.0%	25.0%
Total	Count	4	28	32	
	Expected Count	4.0	28.0	32.0	
	% within Pemakaian alat kontrasepsi	12.5%	87.5%	100.0%	
	% within Deteksi Dini Kanker Serviks	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	12.5%	87.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.683 ^a	2	.003
Likelihood Ratio	11.748	2	.003
Linear-by-Linear Association	.316	1	.574
N of Valid Cases	32		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.

Jumlah_Anak * Deteksi Dini Kanker Serviks

Crosstab

		Deteksi Dini Kanker Serviks			
		Positif	Negatif	Total	
Jumlah_Anak	Belum Punya Anak	Count	0	17	17
		Expected Count	2.1	14.9	17.0
		% within Jumlah_Anak	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	0.0%	60.7%	53.1%
	% of Total		0.0%	53.1%	53.1%
	> 2 Anak	Count	3	1	4
		Expected Count	.5	3.5	4.0
		% within Jumlah_Anak	75.0%	25.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	75.0%	3.6%	12.5%
	% of Total		9.4%	3.1%	12.5%
	≤ 2	Count	1	10	11
		Expected Count	1.4	9.6	11.0
% within Jumlah_Anak		9.1%	90.9%	100.0%	
% within Deteksi Dini Kanker Serviks		25.0%	35.7%	34.4%	
% of Total		3.1%	31.3%	34.4%	
Total	Count	4	28	32	
	Expected Count	4.0	28.0	32.0	
	% within Jumlah_Anak	12.5%	87.5%	100.0%	
	% within Deteksi Dini Kanker Serviks	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total		12.5%	87.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.831 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	12.913	2	.002
Linear-by-Linear Association	1.009	1	.315
N of Valid Cases	32		

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50

Penggunaan_Pembalut * Deteksi Dini Kanker Serviks

Crosstab

			Deteksi Dini Kanker Serviks		Total
			Positif	Negatif	
penggunaan _pembalut	> 5 jam	Count	4	6	10
		Expected Count	1.3	8.8	10.0
		% within penggunaan_pembalut	40.0%	60.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini KankerServiks	100.0%	21.4%	31.3%
		% of Total	12.5%	18.8%	31.3%
	≤ 5 jam	Count	0	22	22
		Expected Count	2.8	19.3	22.0
		% within penggunaan_pembalut	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini KankerServiks	0.0%	78.6%	68.8%
		% of Total	0.0%	68.8%	68.8%
Total	Count	4	28	32	
	Expected Count	4.0	28.0	32.0	
	% within penggunaan_pembalut	12.5%	87.5%	100.0%	
	% within Deteksi Dini KankerServiks	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	12.5%	87.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1sided)
Pearson Chi-Square	10.057 ^a	1	.002		
Continuity Correction ^b	6.732	1	.009		
Likelihood Ratio	10.653	1	.001		
Fisher's Exact Test				.006	.006
Linear-by-Linear Association	9.743	1	.002		
N of Valid Cases	32				

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.

Jumlah_kehamilan_paritas * Deteksi Dini Kanker Serviks

Crosstab

			Deteksi Dini Kanker Serviks		Total
			Positif	Negatif	
Jumlah_kehamilan _paritas	Belum Hamil	Count	0	17	17
		Expected Count	2.1	14.9	17.0
		% within Jumlah_kehamilan_paritas	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	0.0%	60.7%	53.1%
		% of Total	0.0%	53.1%	53.1%
	Paritas > 3kali	Count	2	3	5
		Expected Count	.6	4.4	5.0
		% within Jumlah_kehamilan_paritas	40.0%	60.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	50.0%	10.7%	15.6%
		% of Total	6.3%	9.4%	15.6%
	Paritas ≤ 3kali	Count	2	8	10
		Expected Count	1.3	8.8	10.0
% within Jumlah_kehamilan_paritas		20.0%	80.0%	100.0%	
% within Deteksi Dini Kanker Serviks		50.0%	28.6%	31.3%	
% of Total		6.3%	25.0%	31.3%	
Total	Count	4	28	32	
	Expected Count	4.0	28.0	32.0	
	% within Jumlah_kehamilan_paritas	12.5%	87.5%	100.0%	
	% within Deteksi Dini Kanker Serviks	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	12.5%	87.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.400 ^a	2	.041
Likelihood Ratio	7.375	2	.025
Linear-by-Linear Association	2.874	1	.090
N of Valid Cases	32		

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .63.

Abortus * Deteksi Dini Kanker Serviks

Crosstab

		Deteksi Dini Kanker Serviks		Total	
		Positif	Negatif		
Abortus	Belum Menikah	Count	0	15	15
		Expected Count	1.9	13.1	15.0
		% within Abortus	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	0.0%	53.6%	46.9%
		% of Total	0.0%	46.9%	46.9%
	Pernah > 1 Kali	Count	2	2	4
		Expected Count	.5	3.5	4.0
		% within Abortus	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	50.0%	7.1%	12.5%
		% of Total	6.3%	6.3%	12.5%
	Tidak Pernah	Count	2	11	13
		Expected Count	1.6	11.4	13.0
		% within Abortus	15.4%	84.6%	100.0%
		% within Deteksi Dini Kanker Serviks	50.0%	39.3%	40.6%
		% of Total	6.3%	34.4%	40.6%
Total	Count	4	28	32	
	Expected Count	4.0	28.0	32.0	
	% within Abortus	12.5%	87.5%	100.0%	
	% within Deteksi Dini Kanker Serviks	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	12.5%	87.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.385 ^a	2	.025
Likelihood Ratio	7.406	2	.025
Linear-by-Linear Association	1.609	1	.205
N of Valid Cases	32		

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.

Penggunaan_Pembersih_Kewanitaan * Deteksi Dini Kanker Serviks

Crosstab

			Deteksi Dini Kanker Serviks		Total
			Positif	Negatif	
Penggunaan_pembersih_ Ya Kewanitaan	Count		4	7	11
	Expected Count		1.4	9.6	11.0
	% within		36.4%	63.6%	100.0%
	Penggunaan_pembersih_Kewanitaan				
	% within Deteksi Dini Kanker Serviks		100.0%	25.0%	34.4%
	% of Total		12.5%	21.9%	34.4%
Tidak	Count		0	21	21
	Expected Count		2.6	18.4	21.0
	% within		0.0%	100.0%	100.0%
	Penggunaan_pembersih_Kewanitaan				
	% within Deteksi Dini Kanker Serviks		0.0%	75.0%	65.6%
	% of Total		0.0%	65.6%	65.6%
Total	Count		4	28	32
	Expected Count		4.0	28.0	32.0
	% within		12.5%	87.5%	100.0%
	Penggunaan_pembersih_Kewanitaan				
	% within Deteksi Dini Kanker Serviks		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		12.5%	87.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.727 ^a	1	.003		
Continuity Correction ^b	5.719	1	.017		
Likelihood Ratio	9.693	1	.002		
Fisher's Exact Test				.009	.009
Linear-by-Linear Association	8.455	1	.004		
N of Valid Cases	32				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.38.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 5 : Surat Keterangan Layak Etik



ALAUDDIN
MAKASSAR

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 38 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564 E-mail: kep@iain-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.B.025/KEPK/FKIK/XII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Alya Nursakinah
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DETEKSI DINI KANKER SERVIKS
MENGUNAKAN METODE CERVISCAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
KANKER SERVIKS PADA PEKERJA WANITA DI PT. EASTERN PEARL FLOUR
MILLS TAHUN 2023"**

**"FACTORS RELATED TO EARLY DETECTION OF CERVICAL CANCER USING
THE CERVISCAN METHOD AS A PREVENTION EFFORT IN WOMEN WORKERS
AT PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS IN 2023"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.


Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024.

This declaration of ethics applies during the period December 18, 2023 until December 18, 2024.

December 18, 2023
Chairperson and Chairperson,

Drs. Sriyanti, S.Si., M.Si., Apt.


Lampiran 6 : Rekomendasi Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Makassar
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Ratasungguhng-Gowa. Telp. 0411-841879, Fax. 0411-838400

Nomor : B- 01053/ Un.06/LP2M/PP.00.9/05/ 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Rangkap Proposal
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q.Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini :

Nama : **Alya Nursakinah**
NIM : 70200119052
Semester/T.A : VIII (Delapan)/T.A.2023-2024
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat
Alamat : BTN Pao-Pao Permai, Blok E1/6
No. HP. : 085241127291

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Faktor Yang Berhubungan Dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode CerviScan Sebagai Upaya Pencegahan Kanker Serviks Pada Pekerja Wanita di PT.Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar** dari tanggal **November-Desember 2023.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Lampiran 7 : Permohonan Izin Penelitian Penanaman Modal dan PelayanTerpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan



Nomor : 22349/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Pimpinan PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Mkaassar Nomor : B-01053/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ALYA NURSAKINAH**
Nomor Pokok : 70200119052
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" GAMBARAN DETEKSI DINI KANKER SERVIKS MENGGUNAKAN METODE CERVISCAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KANKER SERVIKS PADA PEKERJA WANITA DI PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS TAHUN 2023 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Agustus s/d 01 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 31 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Mkaassar di Makassar.
2. *Pertinggal*

Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini bagian HR PT. Eastern Pearl Flour Mills,
Menerangkan Bahwa :

Nama : 1. Alya Nursakinah (70200119052)
2. Afiah Alfina (70200119077)
3. Windasari Putri Ayu Ningsih (70200119066)

Jurusan / Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Lembaga : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Judul Penelitian Skripsi :

1. Faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode *CerviScan* sebagai Upaya Pencegahan Kanker Serviks pada Pekerja Wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023.
2. Analisis Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Terhadap Penyakit Kanker Serviks Sebelum dan Sesudah Penyuluhan pada Pekerja Wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills.
3. Perilaku Pencegahan Kanker Serviks pada Pekerja Wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023.

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian di PT. Eastern Pearl Flour Mills pada bulan November 2023 sesuai dengan surat dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 4 Desember 2023



M A K A S S A R

Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian


1. Lokasi/Tempat Penelitian : Pabrik PT. Eastern Pearl Flour Mills




2. Melakukan *Safety Induction* sebelum Penelitian



3. Proses Pengisian Kuesioner Penelitian dan Pengambilan Sampel Urine



4. Proses Pengisian Kuesioner Penelitian dan Pengambilan Sampel *Urine*



5. Alat dan Bahan untuk Pengambilan Sampel *Urine*




6. Proses Pemeriksaan HPV DNA di LAB Klinik Rinra Medika



7. Proses Pemeriksaan HPV DNA di LAB Klinik Rinra Medika



8. Proses Pemeriksaan HPV DNA di LAB Klinik Rinra Medika



9. Hasil Pemeriksaan Metode CerviScan (Positif/Negatif)

RM **KLINIK RINRA MEDIKA**
Jl. Tun Abdul Razak, komplekscitraandruko G.05
No. Hp/Wa :085256686707, e-mail : rinramedika@gmail.com
Gowa, Sulawesi Selatan

DATA HASIL PENELITIAN

Nama : Alya Nursakinah
Nim : 70200119052
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Tanggal Penelitian : Senin, 13 November 2023
Judul Penelitian : Faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode CerviScan pada Pekerja Wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023

No	Kode Sampel	Hasil	Nilai CT
1	MS	NEGATIF	> 40
2	UM	NEGATIF	> 40
3	NS	NEGATIF	> 40
4	AI	NEGATIF	> 40
5	Y	NEGATIF	> 40
6	YA	NEGATIF	> 40
7	H	NEGATIF	> 40
8	M	NEGATIF	> 40
9	AS	NEGATIF	> 40
10	RP	NEGATIF	> 40
11	RA	POSITIF	36,5
12	BS	NEGATIF	> 40
13	KB	POSITIF	37,8
14	NZ	NEGATIF	> 40
15	R	POSITIF	38,6
16	J	POSITIF	37,5
17	C	NEGATIF	> 40
18	LO	NEGATIF	> 40
19	NA	NEGATIF	> 40
20	AMB	NEGATIF	> 40
21	AP	NEGATIF	> 40
22	W	NEGATIF	> 40
23	N	NEGATIF	> 40
24	E	NEGATIF	> 40
25	PS	NEGATIF	> 40
26	MA	NEGATIF	> 40
27	S	NEGATIF	> 40
28	LA	NEGATIF	> 40
29	Y	NEGATIF	> 40

RM **KLINIK RINRA MEDIKA**
Jl. Tun Abdul Razak, komplekscitraandruko G.05
No. Hp/Wa :085256686707, e-mail : rinramedika@gmail.com
Gowa, Sulawesi Selatan

30	ISR	NEGATIF	> 40
31	NN	NEGATIF	> 40
32	EPS	NEGATIF	> 40

Gowa, 25 November 2023
Penanggung Jawab Klinik
RM **KLINIK RINRA MEDIKA**
Dr. Wahyudi, S. Ked

RIWAYAT PENELITI



Alya Nursakinah, Lahir di Makassar pada tanggal 13 September 2000, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Toto Sapturi, S.E dan Sukmawati. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2006 di TK RA. Masrurah, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN Pao-Pao pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Setelah itu, melanjutkan Pendidikan di MTsN Model 1 Makassar dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Talasalapang dan tamat pada tahun 2019. Selama pendidikan SMA aktif mengikuti organisasi yaitu PMR (Palang Merah Remaja). Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terbitnya skripsi ini dengan judul **“Faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode CerviScan pada Pekerja Wanita di PT. Eastern Pearl Flour Mills Tahun 2023”**.