

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KADAR GULA DARAH
PUASA PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2
DI PUSKESMAS BANGKALA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh: **DILA ANGGRAINI PUTRI**

NIM : 70200119091

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dila Anggraini Putri
NIM : 70200119091
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 22 Februari 2001
Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perum Guru SMAN 10 Makassar
Judul : Faktor yang Berhubungan dengan Kadar
Gula Darah Puasa pada Penderita Diabetes
Melitus Tipe 2 di Puskesmas Bangkala

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwaskripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 22 Februari 2024

Penyusun,



Dila Anggraini Putri

NIM : 70200119091

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Faktor yang Berhubungan dengan Kadar Gula Darah Puasa Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Bangkala*" yang disusun oleh Dila Angraini Putri, NIM: 70200119091, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Februari 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 22 Februari 2024
12 Syaban 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
Sekretaris	: Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes
Munaqisy I	: Dr. Azriful, SKM., M.Kes
Munaqisy II	: Dr. Rahmat, M.Pd.I
Pembimbing I	: Dr. BS. Titi Haerana, SKM., M.Kes
Pembimbing II	: Dian Ihwana Ansyar, SKM., M.Kes

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Diketahui dan
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
NIP: 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya, Sungguh tiada kalimat yang paling afdal dan paling terpelajar untuk mengawali kata pengantar ini, selain penyampaian puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang, Pemangku rezki Maha Pemberi.

Shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita nabi dan rasul akhir zaman. Dialah penghulu para nabi dan rasul, yakni Muhammad SAW. Semoga berimbas kepada keluarga, para sahabat dan ummatnya yang senantiasa istiqamah di jalan Islam hingga akhir zaman. Semoga kelak di akhirat kita semua mendapat syafaatnya.

Alhamdulillah, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat hambatan dan kendala yang dialami oleh peneliti. Tetapi berkat segala doa, usaha dan kemauan yang kuat serta bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, maka semua penghalang dan rintangan dapat teratasi dengan baik. Terkhusus untuk kedua orang tua saya, saya ucapkan banyak terima kasih karena senantiasa mendoakan dalam setiap sujudnya, dan memberikan semangat, serta motivasi. Tanpa dukungan, dan dorongan dari mereka penulis belum tentu berada disini dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama mengikuti perkuliahan di UIN Alauddin Makassar sampai penyusunan skripsi ini, diperoleh banyak bimbingan, bantuan dan arahan serta dukungan. Oleh karena itu, penulis senantiasa patut menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa khususnya:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A.,ph.D selaku rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Abdul Majid HR Lagu, SKM.,M.Kes selaku ketua program studi jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Bs. Titi Haerana , SKM.,M.Kes selaku pembimbing I dan ibu Dian Ihwana Ansyar, SKM.,M.Kes selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Azriful, SKM.,M.Kes selaku penguji I dan Bapak Dr. Rahmat, M.Pd.I selaku penguji II yang telah banyak memberi masukan dan arahan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Kepala Puskesmas Bangkala, Kab. Jeneponto yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian berlangsung.
7. Teruntuk keluarga besar dan sepupu saya yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir.

8. Untuk Dwi Afika, Rhosika Amaliah Rauf, Wilda Yusmaniar, Annisa Suci Istiqamah A.P, Sarlinda, Jean Fadillah Warahmah, dan Miftahul Akhyar yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan dan semangat pada saat penyusunan skripsi.
9. Saudara-saudari Gramost 19, teman kelas kesmas B, Peminatan Epidemiologi, serta teman-teman KKN Desa Polewali yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini. Penulis menyadari bahwa persembahan tugas akhir ini tidak ada artinya dibandingkan dengan pengorbanan mereka, hanya doa yang penulis panjatkan semoga amal ibadah serta niat yang ikhlas yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Makassar, 28 Agustus 2023


Penulis

Dila Anggraini Putri

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	4
C. <i>Tujuan</i>	4
D. <i>Manfaat Penelitian</i>	5
E. <i>Definisi Operasional (DO) dan Kriteria Objektif (KO)</i>	6
F. <i>Hipotesis</i>	9
G. <i>Kajian Pustaka</i>	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. <i>Tinjauan Umum Diabetes Melitus</i>	19
B. <i>Tinjauan Kadar Gula Darah</i>	30
C. <i>Tinjauan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi</i>	32
1. <i>Aktivitas Fisik</i>	32
2. <i>Pola Makan</i>	34
3. <i>Kepatuhan Minum Obat</i>	37
D. <i>Integrasi Keislamaan</i>	39
E. <i>Kerangka Teori</i>	47
F. <i>Kerangka Konsep</i>	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
A. <i>Jenis Penelitian</i>	49
B. <i>Waktu dan Lokasi Penelitian</i>	49
C. <i>Populasi dan Sampel</i>	50
D. <i>Teknik Penarikan Sampel</i>	51

<i>E. Sumber Data</i>	52
<i>F. Instrumen</i>	53
<i>G. Pengolahan Data</i>	53
<i>H. Analisis Data</i>	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
<i>A. Hasil Penelitian</i>	57
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
2. Hasil Analisis Univariat	58
3. Hasil Analisis Bivariat	63
4. Hasil Analisis Multivariat	71
<i>B. Pembahasan</i>	72
<i>C. Keterbatasan Penelitian</i>	88
BAB V PENUTUP	89
<i>A. Kesimpulan</i>	89
<i>B. Saran</i>	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sintesa	11
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia	58
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	59
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Gula Darah Puasa	59
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Aktifitas Fisik.....	60
Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Pola Makan	60
Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Bahan Makanan	61
Tabel 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Jadwal Makan	61
Tabel 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Energi.....	62
Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Kepatuhan Minum Obat.....	62
Tabel 4.11 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Obat Diabetes yang Diminum.....	63
Tabel 4.12 Hubungan Antara Usia dengan Kadar Gula Darah Puasa.....	63
Tabel 4.13 Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Kadar Gula Darah Puasa.....	64
Tabel 4.14 Hubungan Antara Pekerjaan dengan Kadar Gula Darah Puasa	65
Tabel 4.15 Hubungan Antara Aktifitas Fisik dengan Kadar Gula Darah Puasa.....	66
Tabel 4.16 Hubungan Antara Pola Makan dengan Kadar Gula Darah Puasa.....	67
Tabel 4.17 Hubungan Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah Puasa.....	68
Tabel 4.18 Variabel Kandidat Faktor yang Berhubungan dengan Kadar Gula Darah Puasa.....	69
Tabel 4.19 Analisis Multivariat Hubungan dengan Kadar Gula Darah Puasa.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori	48
Gambar 2.2 Kerangka Konsep	49



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Kuesioner Penelitian |
| Lampiran 2 | Master Tabel |
| Lampiran 3 | Surat Etik Penelitian |
| Lampiran 4 | Rekomendasi Izin Penelitian |
| Lampiran 5 | Permohonan Izin Penelitian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan |
| Lampiran 6 | Permohonan Izin Penelitian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jeneponto |
| Lampiran 7 | Surat Keterangan Telah Meneliti |
| Lampiran 8 | Hasil Analisis Univariat, Bivariat dan Multivariat |
| Lampiran 9 | Dokumentasi |



ABSTRAK

Nama : Dila Anggraini Putri
NIM : 70200119091
Judul : Faktor yang Berhubungan dengan Kadar Gula Darah Puasa pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Bangkala

Diabetes melitus adalah penyakit kronis serius yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menghasilkan insulin. Diabetes melitus merupakan salah satu masalah kesehatan yang berdampak pada produktivitas dan dapat menurunkan sumber daya manusia. Penyakit ini tidak hanya berpengaruh secara individu, tetapi sistem kesehatan suatu negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja berhubungan dengan kadar gula darah puasa pada penderita diabetes melitus tipe 2. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik menggunakan desain penelitian *cross-sectional study*. Analisis yang digunakan univariat, bivariat dengan uji chi square dengan confidence interval 95% dan multivariat. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 119 responden yang diambil menggunakan *simple random sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara aktifitas fisik (*p-value* 0.000), dan pola makan (*p-value* 0.000) dengan kadar gula darah puasa pada penderita diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Bangkala dan tidak terdapat hubungan antara usia (*p-value* 0.306), jenis kelamin (*p-value* 0.833), pekerjaan (*p-value* 0.382), lama menderita sakit (*p-value* 0.722) dan kepatuhan minum obat (*p-value* 0.244) dengan kadar gula darah puasa pada penderita diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Bangkala. Variabel pola makan yang paling dominan atau berpengaruh terhadap kadar gula darah puasa pada penderita diabetes melitus tipe 2.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya mengatur makan dan beraktifitas yang cukup untuk mengendalikan kadar gula darahnya agar tetap terkontrol.

Kata kunci : Diabetes Melitus, Gula Darah Puasa, Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Aktifitas Fisik, Pola Makan, Kepatuhan Minum Obat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2016) Diabetes melitus adalah penyakit kronis serius yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin (hormon yang mengatur gula darah atau glukosa) atau ketika tubuh tidak dapat menghasilkan insulin. Kadar gula darah yang tinggi bisa disebabkan karena kurangnya hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, atau karena hormon insulin tidak bekerja maksimal dalam menyerap gula sehingga tubuh tidak memanfaatkannya secara maksimal sebagai sumber energi.

Menurut *American Diabetes Association* (ADA) tahun 2010, Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Banyak faktor yang dapat terlibat dalam proses yang berhubungan dengan resistensi insulin, termasuk gaya hidup seperti obesitas, kurangnya olahraga, peningkatan diet tinggi lemak dan kurang serat, usia, serta faktor genetik.

Diabetes melitus merupakan penyakit menahun yang akan diderita seumurhidup. Diabetes merupakan masalah kesehatan masyarakat penting, salah satu dari empat prioritas penyakit tidak menular yang ditargetkan untuk ditindaklanjuti oleh para pemimpin di dunia. Baik jumlah kasus maupun prevalensi diabetes melitus terus meningkat selama beberapa dekade terakhir.

Data World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa tercatat 422 juta orang di dunia menderita diabetes melitus atau terjadi peningkatan sekitar 8,5 % pada populasi orang dewasa dan diperkirakan terdapat 2,2 juta kematian dengan presentase akibat penyakit diabetes melitus yang terjadi sebelum usia 70 tahun, khususnya di negara-negara dengan status ekonomi rendah dan menengah. Bahkan diperkirakan akan terus meningkat sekitar 600 juta jiwa pada tahun 2035 (Kemenkes RI, 2018).

Dengan prevalensi 8,6% dari total populasi, Indonesia menduduki peringkat keempat dari sepuluh besar negara di dunia dengan kasus diabetes melitus tipe 2, yang diperkirakan akan meningkat dari 8,4 juta kasus pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta kasus pada tahun 2030. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi DM pada penduduk dewasa di Indonesia sebesar 6,9% pada tahun 2013 meningkat menjadi 8,5% pada tahun 2018. Prevalensi diabetes melitus yang terdiagnosis pada tahun 2018, penderita terbesar berada pada kategori usia 55 sampai 64 tahun yaitu 6,3% dan 65 sampai 74 tahun yaitu 6,03% (Kemenkes RI, 2018).

Peningkatan kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) berhubungan dengan peningkatan faktor risiko akibat perubahan gaya hidup seiring dengan perkembangan dunia yang makin modern. Globalisasi yang semakin meningkat telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, termasuk pola konsumsi makanan keluarga. Tanpa disadari, perubahan ini telah berdampak pada transisi epidemiologi dengan peningkatan kasus penyakit tidak menular. seperti penyakit jantung, tumor, diabetes, hipertensi, gagal ginjal dan sebagainya. Di Indonesia, PTM merupakan penyakit dengan beban

biaya pengobatan yang tertinggi, data BPJS menyatakan bahwa dalam enam bulan pertama pelaksanaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), beban ekonomi akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) menduduki peringkat teratas klaim biaya rawat inap, seperti penyakit jantungstroke, gagal ginjal, diabetes, dan kanker.

Diabetes melitus merupakan masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan menurunkan sumber daya manusia. Penyakit ini tidak hanya menyerang individu tetapi juga sistem kesehatan negara. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Indonesia diprioritaskan pada strategi 4 by 4 sejalan dengan rekomendasi global WHO (Global Action Plan 2013-2020), fokus pada empat Penyakit Tidak Menular Utama Penyebab 60% kematian yaitu kardiovaskular, diabetes melitus, kanker, dan penyakit paru obstruksi kronis.

Data Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel menyebutkan bahwa tercatat 5.133 orang di Jeneponto yang menderita diabetes melitus pada tahun 2021. Pengobatan diabetes yang paling utama yaitu mengubah gaya hidup terutama mengatur pola makan yang sehat dan seimbang (Sudesna Chatterjee MD, 2018). Karena tingginya prevalensi dan mortalitas diabetes, surveilans diabetes harus dilakukan setiap tahun untuk meminimalkan morbiditas dan mortalitas.

Penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kadar gula dalam darah pada penderita diabetes telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Alianatasya, N., & Muflihatin, S. K. tahun 2020 menemukan fakta bahwa terdapat hubungan antara pola makan dengan terkendalinya kadar gula darah pada pasien penderita dm tipe 2.

Namun pada penelitian ini digabungkan beberapa variabel-variabel yang dapat memengaruhi kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe

2. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kadar Gula Darah Puasa Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Bangkala”.

B. Rumusan Masalah

Apa saja faktor yang berhubungan dengan kadar gula darah puasa pada penderita diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Bangkala ?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan kadar gula darahpuasa pada penderita diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Bangkala.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi gambaran karakteristik demografi responden padapenderita diabetes melitus tipe 2
- b. Mengetahui hubungan antara usia dengan kadar gula puasa pada penderita diabetes melitus tipe 2
- c. Mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan kadar gula puasapada penderita diabetes melitus tipe 2
- d. Mengetahui hubungan antara pekerjaan dengan kadar gula puasa padapenderita diabetes melitus tipe 2
- e. Mengetahui hubungan antara lama mendeita sakit dengan kadar gulapuasapada penderita diabetes melitus tipe 2

- f. Mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar gula puasa pada penderita diabetes melitus tipe 2
- g. Mengetahui hubungan antara pola makan dengan kadar gula puasa pada penderita diabetes melitus tipe 2
- h. Mengetahui hubungan antara kepatuhan konsumsi obat diabetes dengan kadar gula puasa pada penderita diabetes melitus tipe 2

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menjadi data dasar atau informasi bagi peneliti selanjutnya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kadar gula darah puasa pada penderita diabetes melitus sehingga akan dihasilkan penelitian lain terkait aspek-aspek dari penderita diabetes melitus yang mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di Indonesia.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat memberikan informasi dan menjadi sumber referensi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat khususnya mengenai penyakit diabetes melitus.

3. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Sebagai acuan informasi dan masukan untuk mengoptimalkan program kesehatan dan dapat menjadi acuan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya tentang penyakit diabetes melitus.

E. Definisi Operasional (DO) dan Kriteria Objektif (KO)

1. Kadar gula darah

a. Definisi Operasional

Kadar gula darah dalam penelitian ini adalah pengukuran kadar gula darah puasa pada responden yang diukur menggunakan *glucometer* pada saat penelitian.

b. Kriteria Objektif

Normal : jika hasil pengukuran

$\leq 125 \text{ mg/dl}$ Tidak normal : jika hasil

pengukuran $> 125 \text{ mg/dl}$

(Menurut American Diabetes Association, 2014)

2. Usia

a. Definisi Operasional

Lama hidup responden hingga saat pengambilan data dalam satuan tahun yang diperoleh berdasarkan tanggal lahir pada kartu identitas.

b. Kriteria Objektif

Tua : jika umur responden ≥ 46

tahun Muda : jika umur responden $<$

46 tahun

(Klasifikasi umur berdasarkan Depkes RI, 2009)

3. Jenis kelamin

a. Definisi Operasional

Pembagian kategori seksual responden yang ditentukan secara biologis.

- b. Kriteria
 - Objektif Laki-
 - laki
 - Perempuan

4. Pekerjaan

a. Definisi Operasional

Suatu kegiatan sehari-hari yang dilakukan responden untuk mendapatkan gaji/upah.

b. Kriteria Objektif

Bekerja : jika responden melakukan sesuatu dengan maksud memperoleh upah

Tidak bekerja : jika responden tidak mempunyai pekerjaan dan tidak punya penghasilan sendiri

(Menurut Anjelina, 2013)

5. Aktivitas Fisik

a. Definisi Operasional

Aktivitas fisik adalah kegiatan yang dilakukan responden dengan tujuan untuk meningkatkan atau mengeluarkan tenaga dan energi secara rutin dalam kehidupan sehari-hari selama satu minggu terakhir yang diukur menggunakan kuisioner *Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ)*.

Ket. Total aktivitas fisik MET Menit/minggu = $[(P2 \times P3 \times 8) + (P5 \times P6 \times 4) + (P8 \times P9 \times 4) + (P11 \times P12 \times 8) + (P14 \times P15 \times 4)]$

b. Kriteria Objektif

Kurang : jika hasil perhitungan aktivitas fisik responden < 600

MET Cukup : jika hasil perhitungan aktivitas fisik

responden ≥ 600 MET (*Menurut World Health Organization, 2006*)

6. Pola Makan

a. Definisi Operasional

Ketepatan dan keteraturan pasien dalam penatalaksanaan jumlah, jenis dan jadwal makan.

b. Kriteria Objektif

Baik : jika pasien melakukan 3 indikator pola makan, yaitu tepat jumlah, jadwal dan jenis makan

Tidak baik : jika pasien melakukan kurang dari 3 indikator pola makan, yaitu tepat jumlah, jadwal dan jenis makan.

- 1) Jenis bahan makanan yang dikonsumsi oleh responden dalam sehari, antara lain sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran dan buah dalam satu hari

1 = Beragam jika > 3

2 = Kurang beragam jika ≤ 3

- 2) Ketepatan jadwal makan seseorang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

1 = Baik jika sesuai jadwal sebanyak 6

kali 2 = Tidak baik jika tidak sesuai

jadwal

3) Jumlah asupan energi yang dikonsumsi responden selama 24 jam dibandingkan dengan kebutuhan dan dinyatakan dalam persen

1 = Baik, bila AKG >80%

2 = Tidak baik, bila AKG <80%

(Menurut Rahma, 2016)

7. Lama Menderita Sakit

a. Definisi Operasional

Lamanya subyek menderita DM sejak awal didiagnosis oleh dokter sampai saat dilakukan penelitian, dihitung dalam satuan tahun.

b. Kriteria Objektif

<10 tahun

>10 tahun

8. Kepatuhan Minum Obat Diabetes

a. Definisi Operasional

Pengukuran tingkat kepatuhan atau kedisiplinan pasien DM tipe 2 dalam mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan.

b. Kriteria Objektif


Patuh : jika mengonsumsi sesuai dosis dan anjuran

Tidak Patuh : jika tidak mengonsumsi sesuai dosis dan anjuran

F. Hipotesis

- a. Terdapat hubungan antara usia dengan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2

- b. Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2
- c. Terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2
- d. Terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2
- e. Terdapat hubungan antara pola makan dengan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2
- f. Terdapat hubungan antara kepatuhan konsumsi obat diabetes dengan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2



G. Kajian Pustaka

No	Judul	Nama Penerbit	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/ Pendekatan Penelitian	Subjek	Instrument	
1.	Hubungan Antara Pola Makan Dan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe Dua	Winona Akilakanya, SwaKurniati, Vetinl, Luse/2021	Penelitian Kuantitatif cross-sectional	Populasi dalam penelitian ini sebanyak 120 pasien diabetes melitus tipe II, sampel penelitian sebanyak 55 orang	Kuisisioner menggunakan 24-hr food recall Kadar glukosadarah sewaktu diambil menggunakan glucose strip test.	Tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara pola makan dengan kadar glukosa darah pada penderita diabetes melitus tipe dua di Kecamatan Serpong dan Kecamatan Penjaringan.
2.	Hubungan kadar gula darah dengan kebutuhan tidur pada pasien Diabetes Melitus	Rickiy Akbaril Okta Firdaus, Ucik Indrawati, Achmad Wahdi, Dewi Retno Puspitosari, Afif Hidayatul Arham/2022	Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif analitik korelasional dengan pendekatan retrospective	Populasi penelitian yaitu seluruh pasien Diabetes Melitus di Poli Interna RSISakinah Mojokerto sebanyak 37 pasien pada bulan Januari 2022.	Kuesioner	Ada hubungan antara kadar gula darah dengan kebutuhantidur penderita Diabetes Melitus

No	Judul	Nama Penerbit	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/ Pendekatan Penelitian	Subjek	Instrument	
				Sampel diambil dengan teknik purposive sampling sebanyak 28 responden.		
3.	Hubungan Kepatuhan Minum Obat dengan Terkendalnya Kadar Gula Darah pada Pasien DM Tipe II di Irna RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda	Hizam Zulfhi, Siti Khoiroh Muflihatin/2020	Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan rancangan penelitian <i>cross-sectional</i> .	Sampel penelitian adalah pasien diabetes melitus tipe II di instalasi rawat inap RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dengan total responden 90 pasien	Kuesioner MMAS-8 dan pemeriksaan laboratorium HbA1C.	Terdapat hubungan antara Kepatuhan Minum Obat dengan terkendalnya kadar gula darah pada pasien diabetes melitus Tipe II di instalasi rawat inap RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
4.	Hubungan Pola Makan dengan	Nur Alianatasya, Siti Khoiroh/2020	Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif	Jumlah responden 90 responden	Kuesioner tentang pola	Ada hubungan antara Pola Makan dengan Terkendalnya

No	Judul	Nama Penerbit	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/ Pendekatan Penelitian	Subjek	Instrument	
	Terkendalnya Kadar Gula Darah pada Penderita Diabetes Melitus Tipe II di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda		analitik dengan rancangan <i>crosssectional</i> .		makan	Kadar Gula darah padapenderita DM tipe II
5.	Analisis Status Gizi, Tingkat Kecemasan, Umur, Dan Kadar Gula Darah Dengan Kualitas Hidup Pasien Dm Tipe 2	Agnes Anastasya Rihi Le, Rosalia Valentina Kedo /2021	Penelitian kuantitatif dengan desain penelitian korelasi menggunakan rancangan penelitian <i>cross-sectional</i> .	Sampel yang diambil adalah pasien yang datang kemudian dirawat inap dan rawat jalan di RS Bhayangkara padabulan Januari – Februari 2019 yaitu sebanyak 30 orang	Kualitas hidup pasien diukur dengan menggunakan kuisioner Kualitas hidup yang diadaptasi dari kuisioner World Health Organization HO Quality of life (WHOQOL)	Ada hubungan status gizi dengan kualitas hidup pasien DM ($p=0,03$; $r=0,4$), ada hubungan kadar glukosa darah dengan kualitas hidup pasien DM, tidak ada hubungan antara umur dengan kualitas hidup pasien DM ($p=0,17$; $r=-0,63$), serta tidak ada hubungan antaratingkat kecemasan dengan kualitas hidup pasien DM

No	Judul	Nama Penerbit	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/ Pendekatan Penelitian	Subjek	Instrument	
					dengan satuan persen (%), kadar glukosa darah diukur dengan menggunakan glukometer, skorkecemasan diukur dengan menggunakan kuisisioner DASS (Then Depression Anxiety Stress Scale) dengan kategori kecemasan beratjika > 2 dan ringan jika ≤ 2, sedangkan status gizi diukur	(p=0,33)

No	Judul	Nama Penerbit	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/ Pendekatan Penelitian	Subjek	Instrument	
					dengan menggunakan IMT dengan kategori Malnutrisi jika IMT < 18 dan > 25 dan Normal jika IMT 18 – 25	
6.	Hubungan Kepatuhan Diet Terhadap Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2	Meliana Nursihhah, DwiSeptian Wijaya /2021	Penelitian kuantitatif yang didukung oleh penelitian kualitatif dengan desain crosssectional	Sampel berjumlah 143 responden menggunakan proporsionate stratified random sampling.	Kuisisioner	Terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan diet dengan nilai ($p=0,000$)
7.	Tingkat Stres Dengan Kadar	Lusiana Adam, Mansyur B.	Desain penelitian ini menggunakan	Populasinya adalah seluruh	wawancara langsung dengan	ada hubungan yang signifikan antara tingkat stres dengan

No	Judul	Nama Penerbit	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/ Pendekatan Penelitian	Subjek	Instrument	
	Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus	Tomayahu /2019	pendekatan crosssectional study	pasien Diabetes Melitus yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kota Barat Kota Gorontalo. Jumlah Sampel 52 orang yang diambil dengan proporsional sampling	menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat stres dan formulir lembar observasi, dan alat pengukuran gula darah (glukotest)	peningkatan kadar gula darah pada pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Kota Barat Kota Gorontalo tahun 2018 dengan $P = 0,000 < \alpha = 0,01$
8.	Penurunan Kadar Gula Darah Pasien Dm Tipe 2 Dengan Aktivitas Fisik	Made Sundayana, Dewa Ayu Rismayanti, Ida Ayu Putu Desta Candra Devi/2021	deskriptif korelasional dengan pendekatan cross-sectional	Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kubutambahan 1, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada	Kuisisioner	ada hubungan aktivitas fisik dengan kadar gula darah pada pasien DM Tipe 2

No	Judul	Nama Penerbit	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/ Pendekatan Penelitian	Subjek	Instrument	
				bulan Februari-Maret 2021. Teknik perhitungan besarsampel menggunakan rumus slovin, dandiperoleh besar sampel dalam penelitian ini adalah 44 pasien DM tipe 2		
9.	Hubungan kadargula darah dengan kebutuhan tidur pada pasien Diabetes Melitus	Rickiy Akbaril Okta Firdaus, Ucik Indrawati, Achmad Wahdi,Dewi Retno Puspitosari, AfifHidayatul Arham/2022	Desain penelitian yaitu analitik korelasional dengan pendekatan retrospective	Populasi penelitian yaitu seluruh pasien Diabetes Melitus di Poli Interna RSISakinah Mojokerto sebanyak 37 pasien pada bulan	Kuisisioner	Hasil uji spearman rho menunjukkan nilai p value kualitas tidur = 0,001dan p value kuantitas tidur = 0,009 maka H0 ditolak artinya ada hubungan antara kadar gula darah dengan kebutuhan tidur penderita Diabetes Melitus.

No	Judul	Nama Penerbit	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/ Pendekatan Penelitian	Subjek	Instrument	
				Januari 2022. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling sebanyak 28 responden.		
10.	Pengaruh Self-care Terhadap Kadar Glukosa Darah Puasa Pasien Diabetes Melitus Tipe-2	Syahrizal Ramadhan, Arie Firdiawan, Tri Murti Andayani, Dwi Endarti/2019	Jenis penelitian ini adalah observasional dengan rancangan cross-sectional	Jumlah responden pada penelitian ini adalah sebanyak 115 orang dan telah representatif untuk menggambarkan hubungan antara self-care terhadap kadar glukosa darah puasa.	survey kuesioner	Jumlah responden dari penelitian ini 115 orang dimana 79,1% dari responden memiliki tingkat self-care yang baik dan 47% responden dengan kadar glukosa puasa yang belum tercapai. Data dianalisis menggunakan uji Chi-square, dari hasil analisis menunjukkan bahwa self-care berpengaruh terhadap kadar glukosa puasa (OR=3,349, P<0,05).

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Diabetes Melitus

Diabetes melitus adalah diabetes yang berkaitan dengan kadar gula dalam darah. Diabetes melitus juga dikenal dengan nama kencing manis. Tidak hanya manusia saja, kucing pun bisa terkena diabetes melitus (*feline doabetes*). Mudah merasa haus dan banyak buang air kecil adalah gejala diabetes melitus yang paling umum. Selain itu, tubuh penderita diabetes sering mengalami keinginan untuk kencing karena tubuh mencoba menyesuaikan tingkat gula dalam darah mereka dengan membuangnya melalui urin. Karena kebutuhan penderita akan cairan, gejala haus biasanya muncul pada malam hari ketika kadar gula dalam darah lebih tinggi daripada normal. Hal ini disebabkan karena tubuh mengeluarkan banyak urine sehingga penderita merasa haus (Tjahjadi, 2002).

Diabetes melitus merupakan suatu kelainan metabolisme (sindrom metabolik) yang mengganggu distribusi gula dalam tubuh. Orang yang menderita diabetes tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif, sehingga mengakibatkan kelebihan gula dalam darah yang disebut hiperglikemia, yang merupakan racun bagi tubuh. Sebagian glukosa yang tertahan dalam darah memasuki saluran kemih dan dikeluarkan melalui urin. Kondisi ini disebut juga diabetes, karena air kencing manis penderita diabetes menarik bagi semut (Vitahealth, 2006).

Tubuh menyerap gula dari makanan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi jika pasokan gulanya berlebihan, sisanya disimpan pada jaringan otot sebagai glikogen. Pada saat tubuh kekurangan pasokan gula dari luar, glikogen ini akan digunakan. Tugas pengaturan pengiriman glukosa ke jaringan yang membutuhkan tersebut dibebankan pada hormon insulin yang diproduksi oleh kelenjar pankreas (VitaHealth, 2006). Diabetes melitus adalah penyakit di mana tubuh seseorang tidak mampu mengendalikan kadar gula darah, atau glukosa. Dalam tubuh yang sehat, pankreas mengeluarkan hormon insulin, yang mengangkut gula melalui darah ke otot dan jaringan lain untuk menghasilkan energi (VitaHealth, 2006).

1. Faktor Risiko Diabetes Melitus

a. Keturunan

Riwayat atau keturunan yaitu ketika seseorang memiliki garis keturunan diabetes dari ibu, mereka lebih berisiko terkena penyakit diabetes. Jika mereka memiliki riwayat diabetes dari ayah dan ibu, mereka juga lebih cenderung terkena penyakit tersebut. Ini mungkin terjadi karena adanya gabungan gen pembawa sifat diabetes melitus dari ayah dan ibu, yang menyebabkan usia yang lebih muda didiagnoskan dengan diabetes melitus. Orang yang memiliki satu atau lebih anggota keluarga yang menderita diabetes, seperti orang tua, saudara kandung, atau anak, memiliki kemungkinan dua hingga enam kali lebih besar terkena diabetes dibandingkan orang yang tidak memiliki anggota keluarga yang menderita diabetes.

Berdasarkan penelitian Nur Isnaini (2018), terdapat hubungan antara riwayat keluarga dengan diabetes tipe 2 dengan kadar gula darah, dimana orang yang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes mempunyai risiko 10,938 kali lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan orang yang diabetesnya tidak diturunkan.

b. Usia

Salah satu faktor risiko diabetes melitus adalah usia. Menurut beberapa penelitian, sebagian besar penderita diabetes berusia di atas 45 tahun. Penelitian yang dilakukan (Abidah Nur, 2016) menunjukkan bahwa timbulnya penyakit diabetes bervariasi berdasarkan usia. Diabetes bisa berkembang pada usia yang lebih muda, yakni sebelum usia 46 tahun. Orang yang berusia antara 20 dan 59 tahun berisiko terkena diabetes.

c. Obesitas

Obesitas memiliki risiko diabetes melitus yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak obesitas. Untuk mengetahui apakah seseorang gemuk atau tidak gemuk, atau bahkan obesitas atau tidak obesitas, indeks massa tubuh digunakan. Sementara populasi dengan status gizi normal memiliki risiko terkena diabetes melitus 2,93 kali lebih rendah daripada populasi dengan status gizi obesitas.

d. Pola makan

Para penderita diabetes melitus harus memahami pola makan sehat sehari-hari mereka, yang biasanya enam kali makan setiap hari, dibagi menjadi tiga makan besar dan tiga makan selingan.

Memenuhi tiga indikator diet, yaitu jumlah, jadwal, dan jenis, dianggap sebagai pola makan yang baik bagi pasien diabetes. Sebaliknya, memenuhi kurang daritiga indikator ini dianggap sebagai pola makan yang kurang baik.

e. Jenis kelamin

Diabetes lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria karena wanita memiliki aktivitas dan gaya hidup sehari-hari yang berbeda dibandingkan pria. Perbedaan inilah yang menjadi faktor risiko diabetes. Laki-laki dewasa memiliki kandungan lemak sebesar 15-20% dari total berat badannya, sedangkan wanita memiliki kandungan lemak sebesar 20- 25% dari total berat badannya. Akibatnya, perempuan memiliki proporsi lemak yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang berarti faktor risiko diabetes 3 sampai 7 kali lebih tinggi pada perempuan dan 2 sampai 3 kali lebih tinggi pada laki-laki.

f. Pekerjaan

Pada umumnya, kondisi pekerjaan membutuhkan hubungan sosial yang baik dengan orang lain, dan setiap orang harus dapat bergaul dengan teman sejawat. Seseorang yang bekerja juga dapat mengalami kesakitan karena faktor-faktor seperti lingkungannya dan juga dapat mengalamistres saat bekerja.

Di Indonesia, banyak penelitian tentang hubungan jenis kelamin dan pola kesakitan, terutama penyakit kronis seperti kanker, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Jenis pekerjaan terkait dengan diabetes melitus, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian

yang dilakukan oleh Nyenwe et al. pada tahun 2003 di Port Harcourt, Nigeria, di mana 44,2% orang dengan pekerjaan berat menderita diabetes melitus dan 55,8% orang dengan pekerjaan ringan.

2. Klasifikasi Diabetes Melitus

Banyak orang menyamakan diabetes dengan diabetes melitus. Namun, diabetes insipidus memiliki jenis lain. Diabetes melitus tipe 1 dan diabetes melitus tipe 2 terbagi menjadi dua kategori. Diabetes melitus juga ada yang hanya terjadi selama kehamilan. Untuk membedakannya dari diabetes insipidus gestasional, ia disebut diabetes gestasional atau diabetes melitus gestasional. Meskipun namanya hampir sama, penyebabnya berbeda. Diabetes insipidus biasanya dibagi menjadi dua bagian: diabetes insipidus sentral dan diabetes insipidus nefrogenik. Kedua jenis diabetes insipidus ini adalah yang paling umum. Sebenarnya diabetes insipidus terdiri dari empat jenis, yaitu diabetes insipidus sentral, diabetes insipidus nefrogenik, diabetes insipidus gestasional, dan diabetes insipidus dipsogenik (Tjahjadi, 2002).

a. Diabetes Melitus Tipe 1

Diabetes melitus tipe 1 juga disebut diabetes juvenil, atau diabetes pada anak-anak. Pada anak-anak ini, penyebab atau faktor risiko biasanya bersifat genetik, tetapi beberapa orang percaya bahwa penyebab diabetes tipe 1 tidak jelas. Sel-sel beta pankreas yang menghasilkan insulin rusak pada penderita diabetes tipe 1. Bahkan makanan yang mereka makan tidak menyebabkan mereka menderita diabetes. Oleh karena itu, tingkat glukosa dalam darah lebih tinggi

dari tingkat normal. Diabetes melitus tipe 1 biasanya memiliki tanda-tanda berikut: mereka kurus, berusia di bawah 40 tahun, memiliki antibodi positif pada sel penghasil hormon (islet cells) pankreas, dan memiliki gejala yang cepat dan jelas. Gejalanya termasuk mual, muntah, pusing, dan penurunan berat badan. Tetapi diabetes jenis ini juga dapat muncul pada usia tua karena kerusakan pankreas. Diabetes melitus adalah salah satu penyakit yang ditandai dengan kerusakan pankreas. Penyebab kerusakan pankreas yang terjadi biasanya adalah :

1) Konsumsi alkohol yang berlebihan

Alkohol memengaruhi pankreas, yang menghasilkan insulin, dan menyebabkan peradangan. Ini tidak hanya berdampak pada insulin, tetapi juga menyebabkan tubuh kesulitan membuang makanan dengan benar dan sulit menyerap nutrisi. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, yang berhubungan dengan komplikasi penyakit diabetes.

2) Penyakit pada pankreas

Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan beberapa penyakit pankreas, tetapi diabetes dan alkohol tidak selalu terkait dengan penyakit pankreas. Mungkin ada tumor pankreas yang menghasilkan insulin yang berlebihan, yang malah dapat menyebabkan hipoglikemia.

b. Diabetes Melitus Tipe 2

Diabetes melitus tipe 2 lebih umum daripada diabetes melitus tipe 1. Berbeda dengan diabetes melitus tipe 1, penderita diabetes tipe 2 masih

memiliki kemampuan pankreas untuk menghasilkan insulin. Tetapi tubuh menolak insulin, yang menyebabkan peningkatan glukosa dalam tubuh. Untuk penderita diabetes melitus tipe 2, ada banyak faktor risiko, seperti usia di atas 45 tahun, kegemukan atau obesitas, riwayat keluarga diabetes (ayah, ibu, atau saudara), penyakit jantung, kolesterol tinggi (HDL di bawah 35 mg/dl atau triglyceride di atas 250 mg/dl), ras tertentu (misalnya Asia), pernah mendapatkan diagnosis prediabetes, jarang berolahraga, menderita diabetes gestasional, pola makan yang tidak sehat, dan polycystic ovary disease.

Gejala - gejala pada penderita diabetes melitus tipe 2 yaitu ;

1) Gula keluar bersama urine (Glukosuria) yaitu ketika kadar glukosa dalam darah meningkat, glukosa akan disaring melalui ginjal lebih banyak daripada yang dapat diserap kembali oleh ginjal. Akibatnya, glukosa kemudian akan dibawa ke aliran urine. Kandungan glukosa dalam air kencing dapat memicu semut untuk mengerumuni urine karena rasanya yang manis. Inilah yang membuat penyakit diabetes melitus disebut kencingmanis juga.

2) Buang air kecil berlebihan (poliuria), yaitu karena glukosa mempunyai sifat menyerap air, sehingga jumlah air yang dikeluarkan dari tubuh meningkat seiring dengan dikeluarkannya glukosa melalui urin. Ginjal mengeluarkan lebih banyak air untuk mengencerkan lebih banyak glukosa. Penderita diabetes sering buang air kecil karena ginjalnya memproduksi urin dalam jumlah berlebihan.

3) Banyak minum (Polidipsi). Banyak kencing menyebabkan tubuh kehilangan cairan atau dehidrasi. Kondisi ini menyebabkan rasa haus yang terus menerus, yang mendorong penderita diabetes melitus untuk minum banyak. Reduksi berat badan. Proses penyerapan glikosa ke dalam jaringan tubuh akan terhambat pada penderita diabetes melitus. Tubuh tidak dapat menghasilkan cukup energi, jadi ia memecah jaringan lemak tubuh untuk menghasilkan energi. Penderita akan mengalami penurunan berat badan jika hal ini terus terjadi dalam jangka waktu yang lama.

c. Diabetes Melitus Gestasional

Ibu yang melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4,5 kg menderita diabetes. Mereka mungkin belum pernah menderita diabetes sebelumnya. Ibu hamil umumnya memiliki kadar gula darah lebih tinggi dari normal karena pengaruh hormon. Namun peningkatan tersebut tidak menyebabkan ibu hamil terkena diabetes. Pada trimester ketiga, kadar ini meningkat, yang sebenarnya meningkatkan risiko terkena diabetes gestasional (Tjahjadi, 2002).

Hormon tertentu yang diproduksi oleh plasenta pada ibu hamil membantu pergeseran nutrisi dari ibu ke janin. Hormon lain juga bekerja melawan atau menghentikan insulin untuk memastikan kadar gula darah ibu rendah. Akibatnya, untuk mencegah tubuh menghasilkan glukosa yang berlebihan, pankreas menghasilkan lebih banyak insulin tiga kali lipat dari jumlah normal. Jika pankreas tidak sanggup membuat cukup insulin, disinilah terjadi diabetes melitus gestasional.

3. Gejala Dan Tanda-Tanda Diabetes Melitus

Gejala dan tanda - tanda diabetes melitus dapat dibedakan menjadi gejala akut dan gejala kronik.

a . Gejala Akut

Diabetes melitus memiliki gejala yang berbeda dari orang satu ke orang lain, beberapa penderita mungkin tidak memiliki gejala sama sekali pada awalnya.

1. Pada awalnya, gejala yang ditunjukkan termasuk banyak (Poly), yaitu :

- a) Banyak makan (Polyphagia)
- b) Banyak minum (Polydipsia)
- c) Banyak kencing (Polyuria)

2. Bila keadaan tersebut tidak segera diobati, akan timbul gejala :

- a) Banyak minum
- b) Banyak kencing
- c) Nafsu makan mulai berkurang / berat badan turun dengan cepat (turun 5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu)
- d) Mudah lelah
- e) Bila tidak lekas diobati, akan timbul rasa mual bahkan penderita akan jatuh koma yang disebut dengan koma diabetik.

b. Gejala Kronik

Gejala kronik yang paling umum dialami oleh pasien diabetes melitus adalah sebagai berikut::

1. Kesemutan
2. Kulit terasa panas, atau seperti tertusuk - tusuk jarum
3. Rasa tebal dikulit
4. Kram
5. Capai
6. Mudah mengantuk
7. Mata kabur, biasanya sering ganti kaca mata
8. Gatal disekitar kemaluan terutama wanita
9. Gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual menurunkan impotensi
10. Para ibu hamil sering mengalami keguguran atau kematian janin dalam kandungan atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kg

4. Pencegahan penyakit diabetes melitus

Pencegahan penyakit diabetes melitus dibagi menjadi empat bagian yaitu :

a. Pencegahan Premodial

Pencegahan premodial berarti menciptakan lingkungan di mana penyakit tidak didukung oleh kebiasaan, gaya hidup, dan faktor risiko lainnya. Prakondisi ini harus dibuat dengan multimitra. Misalnya, pencegahan premodial pada penyakit diabetes melitus adalah menciptakan prakondisi di mana orang percaya bahwa pola makan barat adalah kurang baik bagi kesehatan.

b. Pencegahan Primer

Pencegahan primer menyoar kepada kelompok berisiko tinggi, yaitu orang-orang yang belum mengidap diabetes namun mungkin mengidapnya. Mereka termasuk orang-orang berikut: dari 1) kelompok umur (> 45 tahun), 2) obesitas (berat badan (kg) $120 \pm$ ideal atau BMI > 27 (kg/m²), 3) Hipertensi ($> 140/90$ mmHg), 4) riwayat keluarga diabetes melitus, 5) riwayat kehamilan dengan berat badan lahir > 4000 g, 6) dislipidemia (HDL < 35 mg/dl dan/atau trigliserida 250 mg/dl), 7) Mengalami IGT atau gangguan darah puasa glukosa (GDPT)..

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya diabetes melitus harus ditangani untuk mencegah diabetes melitus, karena pencegahan ini sangat penting. Sangat penting bagi anak-anak untuk memahami pentingnya berolahraga secara teratur, menjaga pola makan yang sehat, dan memastikan bahwa mereka tidak merokok untuk kesehatan mereka.

c. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder adalah pencegahan dan pencegahan terjadinya komplikasi dengan cara deteksi dini dan pengobatan suatu penyakit. Saat mengobati diabetes melitus, pasien harus diawasi sejak awal untuk mencegah komplikasi kronis. Pilar utama pengelolaan diabetes melitus yaitu penyuluhan, perencanaan makanan, latihan jasmani, dan obat.

d. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier berarti mencegah kecacatan lebih lanjut dan merehabilitasi pasien secepat mungkin. Sangat penting untuk menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh dan terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu, terutama di rumah sakit rujukan. Ini termasuk ahli sesama disiplin ilmu seperti ahli gizi, rehabilitasi medis, mata, dan penyakit jantung.

B. Tinjauan Kadar Gula Darah

1. Definisi kadar gula darah

Glukosa merupakan karbohidrat terpenting bagi tubuh karena berperan sebagai metabolit utama. Tubuh lebih memilih glukosa sebagai metabolit utamanya, yang berfungsi sebagai prekursor untuk sintesis karbohidrat lain seperti glikogen, galaktosa, ribosa, dan deoksiribosa. Selain itu, glukosa adalah produk akhir terbesar dari metabolisme karbohidrat. Sebagian besar karbohidrat diserap ke dalam darah dalam bentuk glukosa, namun gula sederhana lainnya seperti fruktosa dan galaktosa diubah menjadi glukosa oleh hati. Oleh karena itu, monosakarida yang paling melimpah dalam darah adalah glukosa.

Dalam keadaan absorbtif, kadar glukosa darah diatur untuk memenuhi kebutuhan tubuh; tubuh menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama, dan glukosa yang berlebihan disimpan dalam bentuk glikogen atau triglisenda.

Namun, dalam keadaan pasca-absorbtif, sel darah merah dan otak sangat bergantung pada glukosa. Jaringan lain yang dapat menggunakan bahan bakar alternative (Sherwood, 2012).

2. Pemeriksaan kadar gula darah

Menurut *American Diabetes Association* (2014) ada berbagai cara yang biasanya dilakukan untuk memeriksa kadar glukosa darah diantaranya.

a. Tes Gula Darah Sewaktu

Kadar gula darah sewaktu, juga dikenal sebagai kadar gula darah acak, adalah tes yang dapat dilakukan kapan saja untuk mengetahui kadar gula darah baik sebelum puasa maupun setelah makan. Tes ini biasanya digunakan untuk mendeteksi dan memantau pasien diabetes melitus pada tahap awal.

Hasil	Kadar Sewaktu
Normal	180mg/dl
Tinggi	>200mg/dl
Rendah	<70mg/dl

b. Tes Gula Darah Puasa

Pemeriksaan gula darah yang dilakukan setelah berpuasa 8-12 jam untuk mengetahui kadar gula puasanya.

Hasil	Kadar Gula Puasa
Normal	100-125mg/dl
Tinggi	>126mg/dl
Rendah	<100mg/dl

c. Uji HbA1c

Tes HbA1c mengukur rata-rata kadar gula darah Anda selama 2-3 bulan terakhir. Tes ini sering digunakan untuk memeriksa kadar gula darah pada penderita diabetes.

Hasil	Kadar Sewaktu
Normal	Kurang dari 5,7%
Prediabetes	5,7-6,4%
Diabetes	Sama atau lebih 6,5%

C. Tinjauan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

1. Aktivitas Fisik

a. Definisi aktivitas fisik

Karena aktivitas fisik merupakan pergerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan pengeluaran energi, maka kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kronis yang berpotensi fatal di seluruh dunia. Aktivitas fisik dapat dikelompokkan berdasarkan tugas setara metabolik (METs). MET didefinisikan sebagai pengeluaran energi saat duduk diam dan membutuhkan sekitar 3,5 ml oksigen per menit per kg berat badan pada orang dewasa (1,2 kkl/menit untuk orang dengan berat badan 70 kg). Manfaat aktivitas fisik antara lain penurunan risiko penyakit jantung koroner, kanker usus besar, tekanan darah tinggi, diabetes, dan kanker payudara.

Aktivitas fisik didefinisikan sebagai pergerakan yang dilakukan oleh tubuh khususnya pada otot yang sangat membutuhkan energi. Menurut Physical Activity and Health, aktivitas fisik dilakukan selama sekitar 30 menit setiap hari. Aktivitas fisik yang dilakukan setiap hari bermanfaat bukan hanya untuk mendapatkan kondisi tubuh yang sehat saja melainkan juga dapat bermanfaat bagi kesehatan mental dan menjadi hiburan dalam keadaan stress (Septian, 2017).

b. Aktivitas fisik pada diabetes melitus

Kecepatan pemulihan glukosa otot (seberapa banyak glukosa yang diambil otot dari aliran darah) dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas fisik atau olahraga. Saat berolahraga, otot menggunakan glukosa yang tersimpan dalam otot, dan jika glukosa otot berkurang, otot mengisi kekosongan dengan mengambil glukosa dari aliran darah, yang menghasilkan penurunan glukosa darah dan peningkatan glukosa darah.

Aktivitas fisik membantu mengontrol gula darah dengan mengubah glukosa menjadi energi. Aktivitas fisik meningkatkan insulin dan menurunkan kadar gula darah. Sebaliknya jika Anda kurang melakukan aktivitas fisik, maka komponen makanan yang masuk ke dalam tubuh Anda tidak akan terbakar dan akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk gula dan lemak. Ketika insulin tidak cukup untuk mengubah glukosa menjadi energi, hal itu menyebabkan diabetes (Wahyudin, 2019).

Kurangnya aktivitas fisik juga diketahui dapat memicu penurunan kebugaran pada tubuh dan membuat seseorang untuk rentan terkena penyakit. Sebaliknya, seseorang yang memiliki aktivitas fisik yang cukup akan memberikan dampak baik bagi tubuh seperti mengontrol tekanan darah dan kadar gula darah, mencegah terjadinya kegemukan, menurunkan resistensi insulin serta meningkatkan kebugaran tubuh (Wahyudin, 2019). Untuk memperoleh hasil yang baik, WHO menyarankan untuk melakukan aktifitas fisik atau latihan dengan intensitas sedang selama tiga puluh menit setiap minggu atau dua puluh menit dengan intensitas berat selama lima hari setiap minggu.

Berolahraga atau beraktivitas fisik memiliki banyak manfaat bagi orang yang menderita diabetes melitus, seperti menurunkan kadar glukosa darah, mencegah kegemukan, dan membantu mengurangi risikokomplikasi gangguan lipid darah dan tekanan darah.

2. Pola Makan

a. Definisi Pola Makan

Pola makan merupakan berbagai informasi yang memberikan gambaran tentang jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang setiap hari dan menjadi ciri suatu kelompok tertentu (Sulistyoningsih, 2011). Pola makan terdiri dari jenis, frekuensi, dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Pola makan dimaksudkan untuk menjaga kesehatan, status nutrisi, dan pencegahan atau membantu kesembuhan penyakit.

Yang pertama adalah jenis pangan, yaitu jenis pangan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, terdiri atas pangan pokok sehari-hari, lauk hewani, lauk nabati, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Makanan pokok Indonesia merupakan sumber makanan utama yang dikonsumsi oleh setiap orang atau sekelompok orang yang terdiri dari nasi, jagung, sagu, umbi-umbian, dan tepung terigu.

Selanjutnya frekuensi makan adalah berapa kali makan dalam sehari meliputi makan pagi, makan siang, makan malam dan makan selingan. Secara alami, tubuh mengolah makanan melalui alat pencernaan, mulai dari mulut hingga usus halus, yang dikenal sebagai frekuensi makan. Jumlah makanan yang masuk ke lambung bergantung pada jenis makanan dan sifatnya. Jika lambung rata-rata kosong selama tiga hingga empat jam, jadwal makan pun akan berubah sesuai dengan waktu kosong lambung.

Dan poin terakhir adalah jumlah makanan. Jumlah makanan mengacu pada jumlah makanan yang dikonsumsi oleh setiap orang atau individu dalam suatu kelompok. Makan setiap hari berarti mengonsumsi karbohidrat, protein, sayur mayur, dan buah-buahan. Mengonsumsi camilan tiga kali sehari, pagi dan sore, akan mencukupi nutrisi tubuh Anda. Namun kebiasaan makan berlebihan bisa memicu kelebihan berat badan dan obesitas.

b. Faktor yang Memengaruhi Pola Makan

Seseorang memiliki pola makan yang dibentuk oleh faktor-faktor seperti ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, dan lingkungan.

1) Faktor ekonomi

Peningkatan peluang untuk daya beli makanan dalam kuantitas dan kualitas disebabkan oleh variabel ekonomi yang cukup. Pendapatan tinggi dapat menyebabkan kurangnya daya beli mempengaruhi pola makan masyarakat, sehingga pilihan makanan lebih bergantung pada selera daripada kualitas gizi dan kecenderungan untuk mengonsumsi makanan impor.

2) Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya termasuk kepercayaan budaya adat daerah yang menjadi kebiasaan atau adat, dapat memengaruhi pantangan mengonsumsi jenis makanan tertentu. Pola makan setiap budaya memiliki bentuknya sendiri, termasuk bagaimana makanan diolah, disiapkan, dan disajikan.

3) Faktor agama

Cara makan sesuai agama dimulai dengan berdoa sebelum makan dan menggunakan tangan kanan. Hal-hal yang dilarang oleh agama, terutama Islam, disebut haram, dan seseorang yang melanggarnya berdosa. Konsep halal dan haram sangat mempengaruhi pemilihan bahan makanan yang akan dikonsumsi.

4) Faktor pendidikan

Dalam transfer pendidikan pengetahuan yang diketahui, gizi mempengaruhi pemilihan bahan makanan dan penentuan kebutuhan gizi. Pendidikan yang diberikan dalam konteks ini

biasanya mengacu pada pengetahuan yang mempengaruhi pemilihan bahan makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi.

5) Faktor lingkungan

Pola makan dalam lingkungan berpengaruh terhadap pembentukan perilaku makan berupa lingkungan keluarga, promosi media elektronik dan media cetak.

6) Faktor kebiasaan makan

Pola makan atau kebiasaan makan adalah cara seseorang mengonsumsi makanan tiga kali sehari, tergantung frekuensi dan jenis makanan yang dikonsumsi. Kebiasaan makan tiga kali sehari berarti kebiasaan makan setiap waktu.

3. Kepatuhan Minum Obat

a. Definisi Kepatuhan

Kepatuhan merupakan suatu perilaku pasien dalam menjalani pengobatan, mengikuti diet, atau mengikuti perubahan gaya hidup lainnya sesuai dengan anjuran medis dan kesehatan (Rohani, R., & Ardenny, 2018).

Ketaatan berasal dari kata "taat" yang berarti "tunduk pada", "tunduk pada", atau "terhadap disiplin". Menurut Niven, dalam Sianipar (2019) kepatuhan merupakan prosedur serta pengaruh sosial yang memberi perhatian untuk memberitahu atau memerintah orang untuk melakukan sesuatu dari pada meminta untuk melakukannya, dimana bahwa orang mematuhi perintah dari orang yang mempunyai kekuasaan bukanlah yang mengherankan.

Terdapat dua metode yang bisa digunakan untuk mengukur kepatuhan yaitu (Jilao, 2017) :

1. Metode Langsung

Pengukuran kepatuhan menggunakan metode langsung yaitu dengan pengamatan pengobatan secara langsung, pengukuran konsentrasi obat, dan metabolitnya dalam darah atau urin, serta mengukur biologic marker yang ditambahkan pada formulasi obat. Kelemahan penggunaan metode ini adalah biaya yang mahal, memberatkan tenaga kesehatan, dan rentan penolakan dari pasien.

2. Metode Tidak langsung

Metode ini dilakukan untuk menanyakan pasien tentang cara pasien menggunakan obat, menilai respon klinik, melakukan perhitungan obat, dan mengumpulkan kuesioner pasien.

b. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat

1. Pendidikan

Sekolah umum dari tingkat dasar hingga ke jenjang yang lebih tinggi dengan menggunakan buku ataupun kaset secara mandiri dapat meningkatkan kepatuhan pasien.

2. Akomodasi

Perilaku pasien yang dapat mempengaruhi kepatuhan harus dipahami. Pasien yang lebih mandiri, misalnya, harus dapat merasakan bahwa mereka berpartisipasi secara aktif dalam program pengobatan.

3. Modifikasi Faktor Lingkungan dan Sosial

Membangun dukungan sosial dari teman dan keluarga. Untuk mendukung kepatuhan terhadap program pengobatan, seperti mengurangi berat badan, mengurangi asupan cairan, dan mengurangi konsumsi protein, dapat dibentuk kelompok pendukung.

4. Perubahan Model Terapi

Dengan membuat program pengobatan sesederhana mungkin, pasien terlibat aktif dalam pembuatan mereka. Ini memungkinkan elemen-elemen sederhana dalam program untuk selanjutnya dapat mematuhi elemen-elemen yang lebih kompleks.

5. Meningkatkan Interaksi Tenaga Kesehatan Dengan Pasien

Sangat penting untuk meminta umpan balik dari pasien setelah menerima informasi tentang diagnosisnya. Pasien memerlukan penjelasan mengenai kondisinya saat ini, penyebabnya, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Mengklarifikasi penyebab dan pengobatan suatu penyakit meningkatkan kepercayaan pasien dan meningkatkan kepatuhan. Komunikasi yang baik oleh perawat diperlukan untuk meningkatkan interaksi antara petugas kesehatan dan pasien. Hal ini meningkatkan kepatuhan pasien (Zelika, R.P.Wildan, A&Prihatningtias, 2018).

D. Integrasi Keislamaan

Al-Qur'an mempunyai potensi untuk menyembuhkan penyakit baik jasmani maupun ruhani. Al-Qur'an sebagai obat penyakit ruhani sudah banyak yang meyakini, sedang al-Qur'an sebagai obat penyakit fisik belum banyak yang disinggung. Penggunaan istilah penyakit terulang sebanyak 24 kali dalam berbagai termnya. Sedangkan istilah maradh yang dihubungkan dengan kata al-Qalb, atau bisa disebut penyakit hati. Keimanan, psikis, dan fisik mempunyai hubungan yang sangat erat. Hampir setiap penyakit melibatkan baik tubuh maupun jiwa.

Membiasakan diri berpikir positif merupakan sikap dari seorang yang berperilaku sehat. Tanpa membiasakan diri berpikir positif, kita akan sulit untuk berpola pikir sehat. Berpikir positif itu harus selalu dibiasakan oleh setiap orang yang ingin menjalani hidup sehat. Karena pikiran yang sehat akan mempengaruhi perilaku kita yang sehat juga. Kalau orang tidak mau membiasakan diri berpikir positif, maka orang akan cenderung berpikir negatif, seperti iri, dengki, curiga, benci, dendam, putus asa, frustrasi, gelisah, cemas, kecewa, dan panik. Orang-orang yang hatinya sedang sakit itu biasanya sering mengalami kesulitan untuk mengendalikan emosinya. Sebab, emosi orang yang hatinya sedang sakit itu sangat tidak stabil. Karena itu, gampang sekali goyah. Hal itu terjadi karena orang yang hatinya sedang sakit itu sering mengalami kesulitan dalam melihat hakikat dari suatu persoalan atau situasi yang sedang terjadi di hadapannya. Akibatnya ia gampang sekali terpancing emosi, dan terkadang larut dalam situasi yang sedang terjadi.

Begitu banyak penyakit yang disebabkan oleh stress, salah satunya adalah diabetes mellitus. Hans Selye¹⁶ berani mengatakan, “kita baru saja mulai melihat bahwa banyak penyakit umum lebih disebabkan oleh kesalahan dalam tanggapan penyesuaian diri kita terhadap stress daripada karena pengrusakan langsung oleh kuman, racun, dan agen dari luar lainnya. Dalam pengertian ini banyak gangguan saraf dan emosional, tekanan darah tinggi, tukak lambung dan usus halus, penyakit rematik, penyakit jantung dan pembuluh darah, serta ginjal adalah gangguan adaptasi kita terhadap stressor.

Banyak nash-nash yang ditemukan di dalam Al-Quran dan as-sunah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan dunia dan cara hidup mereka, memastikan kesehatan dan kemuliaan mereka, dan menempatkan mereka di tempat yang sesuai dengan fitrah yang diciptakan Allah SWT. Adapun sabda nabi Muhammad Saw dalam hadis yang di riwayatkan al-Bukhari sebagai berikut :

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya :

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi bersabda: “Dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, (yaitu) kesehatan dan waktu luang”. [HR Bukhari,no. 5933].

Pada hadist diatas dijelaskan terkait nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia, salah satunya ialah nikmat sehat.

Berkaitan dengan hal ini manusia seringkali lalai dalam menjaga kesehatannya terutama dalam menjaga pola hidupnya. Hal tersebut sejalan dengan penyebab utama terjadinya penyakit diabetes melitus tipe 2. Seseorang mukmin harus menjaga kesehatannya sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah/2: 195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah/2:195).

Dalam tafsir Quraish Shihab didalam Al-Misbah maksud dari ayat tersebut ialah Sebagaimana berjihad bisa dilakukan dengan pengorbanan jiwa, ia juga dapat disalurkan lewat pengorbanan harta. Maka infakkanlah harta kalian untuk menyiapkan peperangan. Ketahuilah, memerangi mereka itu merupakan perang di jalan Allah. Janganlah kalian berpangku tangan dan dermakanlah harta kalian untuk peperangan itu. Sebab, dengan berpangku tangan dan kikir mendermakan harta, berarti kalian rela dikuasai dan dihina musuh. Itu sama artinya kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Maka lakukanlah kewajiban kalian seserius dan sebaik mungkin. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-Nya yang melakukan suatu pekerjaan secara optimal.

Orang-orang yang tidak menjaga kesehatannya termasuk dalam kategori orang-orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan karena tidak menjaga apa yang telah Allah berikan kepadanya. Begitu pentingnya kebersihan bagi kesehatan tubuh manusia, Nabi Muhammad menggambarkannya sebagai bagian dari iman. Ulama ahli hikmah mengatakan: “Pencegahan (dari penyakit) lebih baik daripada pengobatannya” Allah SWT lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Al-Quran menjelaskan bahwa suatu saat akan terjadi proses degenerasi dalam kehidupan manusia. Keadaan yang buruk dari proses degenerasi adalah munculnya berbagai penyakit degeneratif. Salah satu jenis penyakit degeneratif adalah diabetes melitus (DM). Kebersihan tubuh penderita diabetes harus selalu terjaga dengan baik. Infeksi mikro organisme baik bakteri, virus maupun jamur yang nampaknya tidak bermasalah, ternyata lebih mudah menyebar luas dalam jaringan-jaringan tubuh dibandingkan dengan non-diabetes Namun Al-Quran juga menjelaskan bahwa hanya sebagian orang yang menjadi lemah kembali (ada penurunan fungsi tubuh) atau tidak semua orang dapat mengalami diabetes melitus (DM).

Perihal kesehatan dan masalah penyakit telah disebutkan dalam Al- Quran pada QS.Yunus ayat 57 berikut :

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”. (QS. Yunus/10:57)

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab dalam Al-Mishbah maksud dari ayat diatas ialah Wahai umat manusia, telah datang kepada kalian kitab Allah yang disampaikan melalui rasul-Nya, Muhammad. Di dalamnya terdapat peringatan untuk taat dan beriman serta nasihat untuk melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan. Di dalamnya juga terdapat kisah-kisah orang sebelum kalian agar dapat dijadikan bahan renungan dan juga terdapat anjuran untuk melakukan pengamatan terhadap rahasia- rahasia alam raya, sehingga kalian dapat menyadari keagungan ciptaan-Nya. Selain itu, kitab ini pun mengandung terapi penyakit hati, semisal kemusyrikan dan kemunafikan. Kitab Al-Quran merupakan pedoman untuk mendapatkan jalan kebenaran. Semua itu adalah rahmat bagi orang-orang mukmin yang menerimanya dengan baik.

Rasulullah mencontohkan perilaku makan yang baik dengan mengikuti pola makan sehat Rasulullah SAW seperti pola makan sehari-hari untuk mencegah berbagai penyakit seperti diabetes. Dengan menjaga pola makan yang benar seperti jumlah, jenis, waktu dan frekuensi makan, disarankan untuk tidak mengonsumsi makanan terlalu banyak karena dapat mempengaruhi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Akibatnya dapat menyebabkan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan sel.

Dengan mengonsumsi makanan dan minuman, kebutuhan jasmani dapat dipenuhi. Dengannya tubuh menjadi sehat, kuat, dan bertenaga sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Namun demikian, orang sering tidak sadar dengan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait makanan dan minuman. Banyak sekali orang yang tidak memiliki spiritual awareness (kesadaran spiritual), yang pada umumnya mereka menganggap makan dan minum hanyalah urusan dunia ansich yang tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai spiritual. Bahkan ada juga yang tidak peduli dengan sesuatu yang dimakannya baik dari sisi zatnya maupun dari sisi cara memperolehnya.

Ketika berbicara tentang jenis makanan yang harus dikonsumsi, al- Qur'an selalu menekankan salah satu dari dua sifat, yaitu halal dan baik (thayyib). Bahkan ada empat ayat yang menggandengkan kedua sifat ini, yaitu surah al-Baqarah ayat 168, surah al-Maidah ayat 88, surah al-Anfal ayat 69, dan surah an-Nahl ayat 114. Rangkaian kedua sifat ini menunjukkan bahwa makanan yang dikonsumsi harus memenuhi syarat halal dan thayyib (baik). Ada makanan yang statusnya halal akan tetapi tidak thayyib. Demikian pula sebaliknya, makanan yang secara zatnya thayyib, akan tetapi tidak halal. Terpenuhinya syarat halal dan thayyib ini akan mendatangkan kebaikan pada makanan yang dikonsumsi dan cara mendapatkan makanan tersebut.

Al-Ghazali lalu mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih: athib math'amaka takun mustajaba al-da'wati "perbaikilah makananmu, niscaya Allah akan mengabulkan doa'amu" (Katsir, 2011: 137).


Senada dengan hal tersebut al-Qur'an mengisyaratkan bagaimana sebaiknya mengonsumsi makanan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (Q.S. al- Baqarah: 168).

Berdasarkan landasan teori di atas, menarik untuk mengambil spirit dari urusan makan dan minum terkait dengan halal dan thayyib. Islam menganjurkan kepada kita supaya ketika mengonsumsi makanan dan minuman namun mesti memperhatikan apa yang kita makan dan minum baik dari sisi zatnya maupun cara memperolehnya. Dalam hal ini, harus halal dan juga baik (halalan thayyiban), sebagaimana ungkapan Prof. Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya tentang aktivitas jasmani yang baik dimulai dengan makanan yang baik (Shihab, 2005: 380).

E. Kerangka Teori




Gambar 2.1

Kerangka teori sumber dari Sandra A. in American Journal of Public Health

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian yang akan diteliti :



Gambar 2.2
Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik menggunakan desain penelitian *cross-sectional study*. Penelitian *cross-sectional* bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor- faktor risiko berkorelasi dengan efek. Ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *point-time*, observasi, atau pengumpulan data sekaligus. Penelitian ini juga digunakan untuk menilai hubungan sebab-akibat dengan menguji variabel independen dan variabel dependen secara bersamaan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan selama tiga bulan, yaitu dimulai dari tahap penyusunan proposal hingga skripsi pada bulan Juni 2023 hingga bulan Agustus 2023.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang diambil adalah wilayah kerja Puskesmas Bangkala yang beralamat di Jl. Allu Raya, Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dari puskesmas tersebut peneliti memperoleh informasi mengenai pasien yang menderita diabetes melitus. Kemudian setelah memperoleh informasi dari Puskesmas Bangkala, lokasi penelitian kemudian mengerucut pada tempat tinggal masing-masing responden.

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang menjadi sasaran untuk dapat menyimpulkan data, baik berupa benda, manusia, maupun hal-hal yang terjadi yang diselidiki secara nyata menurut pandangan kolektif dan berdasarkan ciri-ciri yang telah ditetapkan.

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pasien penderita diabetes melitus yang teregistrasi di puskesmas Bangkala Kabupaten Jeneponto bulan Januari sampai Maret tahun 2023 sebanyak 184 pasien.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien yang menderita diabetes melitus tipe 2 di Bangkala Kabupaten Jeneponto. Penentuan besar sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{z^2 (1-P)N_{1-2}}{d^2(N-1) + z^2 (1-P)}$$

Keterangan :

n = besar sampel

minimalN = besar

populasi

p = proporsi

d = *margin of error*

$Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ = derajat kepercayaan

Berdasarkan data dari Puskesmas Bangkala diperoleh jumlah pasien diabetes melitus dari bulan Januari sampai Maret tahun 2023 yaitu sebanyak 184 orang. Jika data tersebut dimasukkan ke dalam rumus di atas maka :

$$n = \frac{z^2 (1-P)N_{1-2}}{d^2(N-1) + z^2 \frac{(1-P)}{1-2}}$$

$$n = \frac{(1,96)^2 \cdot 0,685 (1-0,685)184}{(0,05)^2(184-1) + (1,96)^2 \cdot 0,685(1-0,685)}$$

$$n = 118,5 = 119$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan 119 sampel pasien diabetes melitus tipe 2 yang ada di Puskesmas Bangkala.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik sampling adalah suatu proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* yaitu teknik sampel yang memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada seluruh populasi untuk terpilih menjadi sampel dalam penelitian. Peneliti menetapkan kriteria sampel sebagai berikut.

1. Kriteria inklusi :
 - a) Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di wilayah puskesmas Bangkala
 - b) Pasien berusia lebih dari 30 tahun
 - c) Puasa minimal 8 jam sebelum dilakukan tes

d) Pasien yang bersedia menjadi responden dengan menyetujui informed consent

2. Kriteria eksklusi :

a) Penderita Diabetes Melitus Tipe 1

b) Penderita DM tipe 2 yang memiliki penyakit komplikasi seperti penyakit ginjal, kelainan jantung dan stroke

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan kepada peneliti atau dengan kata lain adalah data telah dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuisioner dengan responden yaitu penderita diabetes melitus tipe 2 pada wilayah kerja puskesmas Bangkala dan hasil pemeriksaan kadar gula darah puasa responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak kedua biasanya diperoleh dari badan atau instansi baik pemerintah maupun swasta. Dengan adanya data sekunder ini bertujuan untuk mendukung data awal penelitian dan sebagai bahan diskusi. Data sekunder pada penelitian ini adalah data pasien diabetes melitus tipe 2 yang teregister di puskesmas Bangkala Kabupaten Jeneponto.

F. Instrumen

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa alat penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah puasa pada penderita diabetes, antara lain:

1. Data penderita diabetes melitus tipe 2 yang teregister di wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kabupaten Jeneponto
2. Kuesioner penelitian digunakan untuk mengumpulkan data demografi responden. Pola makan responden dengan menggunakan *Food Recall* 1x24 jam, aktivitas fisik dengan menggunakan kuesioner *global Physical Activity Questionre(GPAQ)*.
3. Alat ukur : *glucometer*
4. Kamera *handphone* digunakan untuk keperluan dokumentasi penelitian

G. Pengolahan Data

1. Editing

Setelah mengumpulkan data di lapangan, peneliti melakukan *editing*. Dalam penelitian ini, *editing* berarti mengecek isian formulir atau daftar pertanyaan untuk memastikan bahwa jawaban di dalamnya jelas, relevan, dan lengkap.

2. Coding

Coding adalah kegiatan mengubah data yang berbentuk kata-kata atau kalimat menjadi suatu data bilangan atau angka. Digunakan peneliti untuk memudahkan analisis data atau pada saat entry data.

3. *Scoring*

Angka-angka yang telah disusun pada tahap pengodingan kemudian dijumlahkan menurut kategori yang telah ditentukan oleh peneliti. Hasil perhitungan skor untuk setiap jawaban kemudian dikategorikan sesuai dengan variabel penelitian.

4. *Entry*

Setelah semua kuisioner telah terkumpul dan terisi penuh dan telah melwati proses pengkodean maka selanjutnya adalah memproses data, agar data yang sudah di entry dapat dianalisis.

5. *Tabulating*

Setelah entry data dikelompokkan dilakukan kemudian ditabulasikan sehingga diperoleh frekuensi dari masing-masing variabel.

H. Analisis Data

1. Analisis Univariat

Analisis Univariat yaitu analisis untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik tiap variabel penelitian. Dalam penelitian ini masing-masing variabel yaitu tingkat aktivitas fisik dan pola makan. Pada analisis ini hanya menampilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk menentukan apakah variabel penelitian berhubungan atau berkorelasi satu sama lain. Analisis ini menggunakan uji Chi Square dan analisis bivariat untuk melihat hubungan antara tingkat

aktivitas fisik dan kepatuhan minum obat dengan kadar gula dalam darah penderita diabetes melitus.

3. Analisis Multivariat

Analisis multivariat dilakukan untuk menentukan besar dan eratnya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Analisis multivariat juga bertujuan untuk melihat variabel independen yang mana yang paling erat hubungannya dengan variabel dependen. Apabila nilai $p\text{ value} < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kadar gula darah penderita DM. Adapun tujuan penelitian ini untuk melihat kekuatan hubungan variabel dependen dengan variabel independen.

I. Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi kepada pasien penderita diabetes melitus tipe 2 yang menjadi sampel dalam penelitian. Metode wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuisioner yang sudah disiapkan oleh peneliti untuk emndapatkan data mengenai pola makan, aktifitas fisik dan kepatuhan minum obat pada pasien penderita diabetes mellitus tipe 2. Peneliti dibantu teman melakukan wawancara kepada pasien yang menjadi sampel penelitian. Sebelumnya peneliti memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud, tujuan dan prosedur penelitian kepada calon responden. Calon responden yang bersedia menjadi subjek penelitian diminta untuk mengisi lembar persetujuan menjadi responden. Setelah bersedia menjadi responden, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan kuisioner

kepada responden. Setelah semua kuisisioner diisi, kemudian peneliti mengumpulkan semua kuisisioner untuk dilakukan pengolahan data melalui *editing, coding, entry, cleaning* dan *tabulating*. Sedangkan observasi dilakukan dengan cara melihat obat apa yang dikonsumsi oleh pasien dan dilakukan pengukuran kadar gula darah pada pasien yang telah berpuasa selama 8-12 jam. Sebelum melakukan pemeriksaan gula darah peneliti membuat kesepakatan dengan responden untuk tidak sarapan dulu sebelum peneliti melakukan pengecekan di esok harinya. Dalam sehari peneliti biasanya mendapatkan 3-4 responden.

Pengumpulan data sekunder seperti data kejadian diabetes melitus di dunia dan nasional didapat dari data WHO dan data Riskesdas Indonesia. Data penderita diabetes melitus tipe 2 didapat dari Profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan dan data rekam medis Puskesmas Bangkala tahun 2023.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Bangkala merupakan Puskesmas rawat inap yang terletak di Jalan Poros Allu Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gunung Silanu
- b. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Tamalatea
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkala Barat

Puskesmas Bangkala dibangun pada tahun 1976, dengan luas

wilayah kerja $67,5 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 6 desa dan 4 kelurahan serta jumlah dusun atau lingkungan sebanyak 68 dan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 39.336 jiwa.

Adapun visi dari Puskesmas Bangkala adalah “Mewujudkan Derajat Kesehatan Yang Bermutu Dan Berkeadilan, Menuju Masyarakat Bangkala Sehat Dan Bahagia”. Sedangkan misi dari Puskesmas Bangkalayaitu :

1. Melaksanakan Upaya Pelayanan Kesehatan secara profesional dan bertanggungjawab.

2. Melaksanakan kerjasama antar lintas sektor dalam kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan.
3. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, bermutu dan berkeadilan
4. Mendorong kemandirian masyarakat dalam perilaku hidup sehat.
5. Masyarakat Hidup dalam lingkungan bersih dan sehat.

2. Hasil Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi, frekuensi dan karakteristik dari data hasil penelitian yang telah dilakukan.

a. Karakteristik Responden

1) Usia

Tabel 4.1
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
Tua	90	75.6
Muda	29	24.4
Total	119	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 90 responden (75.6%) yang berusia kategori tua, dan sebanyak 29 responden (24.4%) yang berusia kategori muda.

2) Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	33	27.7
Perempuan	86	72.3
Total	119	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 33 responden (27.7%) yang berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 86 responden (72.3%) yang berjenis kelamin perempuan.

3) Pekerjaan

Tabel 4.3
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Bekerja	47	39.5
Tidak Bekerja	72	60.5
Total	119	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 47 responden (39.5%) yang bekerja, dan sebanyak 72 responden (60.5%) yang tidak bekerja.

b. Hasil Pemeriksaan Gula Darah Puasa

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Hasil Pemeriksaan
GDP pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas
Bangkala Tahun 2023

Gula Darah Puasa	Frekuensi	Persentase (%)
Normal	22	18.4
Tidak Normal	97	81.6
Total	119	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 22 responden (18.4%) yang memiliki kadar gula darah normal, dan sebanyak 97 responden (81.6%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal.

c. Aktifitas Fisik

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Aktifitas Fisik
pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala
Tahun 2023

Aktifitas Fisik	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang	90	75.6
Cukup	29	24.4
Total	119	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 90 responden (75.6%) yang kurang melakukan aktifitas fisik, dan sebanyak 29 responden (24.4%) yang melakukancukup aktifitas fisik.

d. Pola Makan

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Pola Makan pada Pasien
Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala
Tahun 2023

Pola Makan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	12	10.1
Tidak Baik	107	89.9
Total	119	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 12 responden (10.1%) yang pola makanannya baik, dan sebanyak 107 responden (89.9%) yang pola makannya yang tidak baik.

1) Jenis Bahan Makanan

Tabel 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Bahan Makanan
pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala
Tahun 2023

Jenis Makanan	Frekuensi	Persentase (%)
Beragam	47	39.4
Tidak Beragam	72	60.6
Total	119	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 47 responden (39.4%) yang jenis makanannya beragam, dan sebanyak 72 responden (60.6%) yang jenis makanan yang dikonsumsinya tidak beragam.

2) Jadwal Makan

Tabel 4.8
Distribusi Responden Berdasarkan Jadwal Makan pada
Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala
Tahun 2023

Jadwal Makan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	20	16.8
Tidak Baik	99	83.2
Total	119	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 20 responden (16.8%) yang memiliki jadwal makan yang baik, dan sebanyak 99 responden (83.2%) yang memiliki jadwal makan yang tidak baik.

3) Asupan Energi

Tabel 4.9
Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Energi
pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas
Bangkala Tahun 2023

Asupan Energi	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	15	12.6
Tidak Baik	104	87.4
Total	119	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 15 responden (12.6%) yang memiliki asupan energi baik, dan sebanyak 104 responden (87.4%) yang memiliki asupan energi tidak baik.

e. Lama Menderita Sakit

Tabel 4.10
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Menderita
Sakit pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas
Bangkala Tahun 2023

Lama Menderita DM	Frekuensi	Persentase (%)
<10 tahun	50	42
>10 tahun	69	58
Total	119	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 50 responden (42%) yang menderita diabetes melitus kurang dari 10 tahun, dan sebanyak 69 responden (58%) yang menderita diabetes melitus lebih dari 10 tahun.

f. Kepatuhan Minum Obat

1) Konsumsi Obat Diabetes

Tabel 4.11
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kepatuhan
Minum Obat pada Pasien Diabetes Melitus
di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Konsumsi Obat	Frekuensi	Persentase (%)
Patuh	47	82.1
Tidak Patuh	9	17.9
Total	56	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa dari total 56 responden yang mengonsumsi obat, terdapat 47 responden (82.1%) yang patuh dalam minum obat diabetes, dan sebanyak 9 responden (17.9%) yang tidak patuh dalam minum obat diabetes.

2) Jenis Obat Diabetes yang Diminum

Tabel 4.12
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Obat Diabetes yang Diminum pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Jenis Obat	Frekuensi	Persentase (%)
Metformin	31	55.4
Glibenclamide	17	30.4
Insulin	8	14.2
Total	56	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa dari total 56 responden yang mengonsumsi obat diabetes, terbanyak adalah 31 responden (55.4%) yang meminum jenis obat diabetes metformin, dan terendah yaitu 8 responden (14.2%) yang meminum jenis obat diabetes glibenclamide.

3. Hasil Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini. Setelah dilakukan analisis mengenai hubungan di antara variabel-variabel, diperoleh hasil sebagai berikut.

a. Hubungan Antara Usia dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Tabel 4.13
Hubungan Antara Usia dengan Kadar Gula Darah Puasapada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Usia	Kadar Gula Darah				Total		P Value
	Tidak Normal		Normal		N	%	
	n	%	n	%			
Tua	71	78.9	19	21.1	90	100	0.306
Muda	26	89.6	3	10.4	29	100	
Total	97	81.6	22	18.4	119	100	

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa dari 90 responden yang berusia tua, terdapat 71 responden (78.9%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 19 responden (21.1%) yang memiliki kadar gula darah normal. Sedangkan dari 29 responden yang yang berusia muda, terdapat 26 responden (89.6%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 3 responden (10.4%) yang memiliki kadar gula darah normal. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh nilai P sebesar (0.306)(>0.05) yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak ada hubungan antara usia dengan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes melitus di Puskesmas Bangkala.

b. Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Tabel 4.14
Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Kadar Gula Darah Puasa pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Jenis Kelamin	Kadar Gula Darah				Total	P Value	
	Tidak Normal		Normal				
	n	%	n	%	N	%	
Perempuan	71	82.5	15	17.5	86	100	0.833
Laki-Laki	26	78.8	7	21.2	33	100	
Total	97	81.6	22	18.4	119	100	

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa dari 86 responden yang berjenis kelamin perempuan, terdapat 71 responden (82.5%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 15 responden (17.5%) yang memiliki kadar gula darah normal.

Sedangkan dari 33 responden yang berjenis kelamin laki-laki terdapat 26 responden (78.8%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 7 responden (21.2%) yang memiliki kadar gula darah normal. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh nilai P sebesar (0.833)(>0.05) yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes melitus di PuskesmasBangkala.

c. Hubungan Antara Pekerjaan dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Tabel 4.15
Hubungan Antara Pekerjaan dengan Kadar Gula DarahPuasa pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Pekerjaan	Kadar Gula Darah				Total		P Value
	Tidak Normal		Normal		N	%	
	N	%	n	%			
Tidak Bekerja	61	84.8	11	15.2	72	100	0.382
Bekerja	36	76.6	11	23.4	47	100	
Total	97	81.6	22	18.4	119	100	

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa dari 72 responden yang tidak bekerja, terdapat 61 responden (84.8%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 11 responden (15.2%) yang memiliki kadar gula darah normal. Sedangkan dari 47 responden yang bekerja, terdapat 36 responden (76.6%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 11 responden (23.4%) yang memiliki kadar gula darah normal. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh nilai P sebesar (0.382)(>0.05) yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes melitus di Puskesmas Bangkala.

d. Hubungan Antara Aktifitas Fisik dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Tabel 4.16
Hubungan Antara Aktifitas Fisik dengan Kadar Gula DarahPuasa pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Aktifitas Fisik	Kadar Gula Darah				Total	P Value	
	Tidak Normal		Normal				
	n	%	n	%	N	%	
Kurang	82	91.1	8	8.9	90	100	0.000
Cukup	15	51.8	14	48.2	29	100	
Total	97	81.6	22	18.4	119	100	

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa dari 90 responden yang memiliki aktifitas fisik yang kurang, terdapat 82 responden (91.1%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 8 responden (8.9%) yang memiliki kadar gula darah normal. Sedangkan dari 29 responden yang memiliki aktifitas fisik yang cukup, terdapat 15 responden (51.8%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 14 responden (48.2%) yang memiliki kadar gula darah normal. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh nilai P sebesar (0.000)(>0.05) yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, ada hubungan antara tingkat aktifitas fisik dengan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes melitus di Puskesmas Bangkala.

e. Hubungan Antara Pola Makan dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Tabel 4.17
Hubungan Antara Pola Makan dengan Kadar Gula Darah Puasa pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Pola Makan	Kadar Gula Darah				Total		P Value
	Tidak Normal		Normal		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Baik	95	88.8	12	11.2	107	100	0.000
Baik	2	16.7	10	83.3	12	100	
Total	97	81.6	22	18.4	119	100	

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa dari 107 responden yang memiliki pola makan yang tidak baik, terdapat 95 responden (88.8%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 12 responden (11.2%) yang memiliki kadar gula darah normal. Sedangkan dari 12 responden yang memiliki pola makan yang baik, terdapat 2 responden (16.7%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 10 responden (83.3%) yang memiliki kadar gula darah normal. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh nilai P sebesar (0.000)(>0.05) yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, ada hubungan antara pola makan dengan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes melitus di Puskesmas Bangkala.

f. Hubungan Antara Lama Menderita Sakit dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Tabel 4.18
Hubungan Antara Lama Menderita Sakit dengan Kadar Gula Darah Puasa pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Lama Menderita DM	Kadar Gula Darah				Total		P Value
	Tidak Normal		Normal		N	%	
	N	%	N	%			
<10 tahun	42	84	8	16	50	100	0.722
>10 tahun	55	79.7	14	20.3	69	100	
Total	97	81.6	22	18.4	119	100	

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden yang menderita diabetes kurang dari 10 tahun, terdapat 42 responden (84%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 8 responden (16%) yang memiliki kadar gula darah normal. Sedangkan dari 69 responden yang menderita diabetes lebih dari 10 tahun, terdapat 55 responden (79.7%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 14 responden (20.3%) yang memiliki kadar gula darah normal. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh nilai P sebesar (0.722)(>0.05) yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak ada hubungan antara lama menderita sakit dengan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes melitus di Puskesmas Bangkala.

g. Hubungan Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Tabel 4.19
Hubungan Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah Puasa pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Kepatuhan Minum Obat	Kadar Gula Darah				Total		P Value
	Tidak Normal		Normal		N	%	
	N	%	N	%			
Tidak Patuh	7	77.8	2	22.2	9	100	0.244
Patuh	43	91.4	4	8.6	47	100	
Total	50	89.2	6	10.8	56	100	

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.19 diatas menunjukkan bahwa dari 9 responden yang tidak patuh dalam mengonsumsi obatnya, terdapat 7 responden (77.8%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 2 responden (22.2%) yang memiliki kadar gula darah normal. Sedangkan dari 47 responden yang patuh dalam mengonsumsi obat diabetesnya, terdapat 43 responden (91.4%) yang memiliki kadar gula darah tidak normal dan 4 responden (8.6%) yang memiliki kadar gula darah normal. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh nilai P sebesar (0.244)(>0.05) yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak ada hubungan antara kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes melitus di Puskesmas Bangkala.

4. Hasil Analisis Multivariat

Analisis multivariat dilakukan untuk menentukan besar dan eratnya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Analisis multivariat juga bertujuan untuk melihat variabel independen yang mana yang paling erat hubungannya dengan variabel dependen.

Masing-masing variabel independen dilakukan analisis bivariat dengan variabel dependen. Analisis bivariat yang menunjukkan nilai *p-value* <0.25 maka variabel tersebut masuk sebagai variabel kandidat multivariat, jika analisis bivariat menghasilkan nilai *p-value* >0.25 maka variabel tersebut dikeluarkan.

Tabel 4.20
Variabel Kandidat Faktor yang Berhubungan dengan Kadar Gula Darah Puasa pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Variabel	p-value	Keterangan
Usia	0.476	Tidak
Jenis Kelamin	0.833	Diikutsertakan
Pekerjaan	0.382	Tidak
Aktifitas Fisik	0.000	Diikutsertakan
Pola Makan	0.000	Diikutsertakan
Lama Menderita Sakit	0.722	Tidak
Kepatuhan Minum Obat	0.244	Diikutsertakan

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.20 didapatkan variabel kandidat yang diikutsertakan dalam pemodelan multivariat adalah aktifitas fisik, pola makan, dan kepatuhan minum obat.

Tabel 4.21
Analisis Multivariat Hubungan dengan Kadar Gula Darah
Puasa pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2
di Puskesmas Bangkala Tahun 2023

Variabel	B	SE	Wald	P-value
Aktifitas Fisik	1.705	.601	8.062	.005
Pola Makan	3.678	.833	19.501	.000
Kepatuhan Minum	-.382	.651	.344	.557

Obat

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.21 menunjukkan bahwa dari hasil uji multivariat yang dilakukan terdapat 2 variabel yang berpengaruh, yakni aktifitas fisik dan pola makan. Diperoleh hasil variabel dengan nilai signifikan aktifitas fisik sebesar (*p-value* 0.005) dan pola makan sebesar (*p-value* 0.000).

B. Pembahasan

1. Hubungan Antara Usia dengan Kadar Gula Darah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak dalam penelitian ini ialah usia tua (≥ 50 tahun) dengan jumlah 90 responden dan persentase sebesar (75.6%). Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia dengan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Boku (2019) tidak ada hubungan antara usia terhadap terhadap kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2.

Proses penuaan menyebabkan berkurangnya kemampuan sel pankreas untuk memproduksi insulin, yang menyebabkan peningkatan risiko diabetes seiring dengan usia, terutama pada usia lebih dari 40 tahun. Selain itu, ada penurunan aktivitas mitokondria di sel-sel otot sebesar 35% pada orang yang berusia lebih tua. Ini dikaitkan dengan peningkatan kadar lemak di otot sebesar 30% dan pembentukan resistensi insulin. Kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 tidak dipengaruhi oleh usia mereka.

Orang biasanya mengalami penurunan fisiologis yang cepat dan drastis pada usia empat puluh tahun. Salah satu dampak penurunan ini adalah pada organ pankreas. Leslie (2013) menjelaskan bahwa laki-laki lebih rentan terkena diabetes melitus tipe 2 dibandingkan dengan perempuan, tetapi faktanya, jumlah perempuan yang menderita diabetes melitus tipe 2 lebih banyak di dunia nyata dibandingkan dengan laki-laki. Ini karena perempuan memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, sehingga 44 persen perempuan lebih tua dari laki-laki..

Menurut asumsi peneliti hal ini dikarenakan masih banyak faktor- faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar gula darah. Usia memang sangat mempengaruhi prevalensi kejadian diabetes melitus tipe 2 karena penuaan dapat menurunkan sensitivitas insulin. Tetapi, pada penelitian ini usia tidak berpengaruh secara signifikan pada kadar gula darah responden. Baik usia muda maupun tua

sama-sama memiliki risiko yang sama tergantung bagaimana individu itu menjaga kadar gula darahnya agar tetap normal.

2. Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Kadar Gula Darah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak dalam penelitian ini ialah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 86 responden dan persentase sebesar (72.2%). Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* 0.833 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kadar gula darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komariah (2020) yang menyatakan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kadar gula darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2 di KPRJ Proklamasi, Depok, Jawa Barat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rudi & Kwureh (2017) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan jenis kelamin dengan kadar gula darah dengan nilai $P = 0.043$ berarti ≤ 0.05 .

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor risiko diabetes melitus tipe 2 yang tidak dapat dimodifikasi disamping faktor umur dan riwayat diabetes melitus dalam keluarga. Faktor risiko diabetes melitus pada laki-laki yang dapat dimodifikasi meliputi obesitas, perilaku merokok, diet tidak sehat, konsumsi alkohol,

dislipidemia, hipertensi dan kurangnya aktivitas fisik.

Menurut (Irawan, 2010), wanita lebih berisiko terhadap penyakit diabetes karena secara fisik perempuan memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Oleh karena itu, dibandingkan dengan laki-laki, perempuan lebih peduli untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Menurut peneliti, jenis kelamin tidak berdampak pada kadar gula darah penderita diabetes melitus, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki risiko yang sama untuk menderita penyakit tersebut. Selain itu, kadar gula darah penderita diabetes melitus menurut jenis kelamin sangat berbeda, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi kadar gula darah.

Salah satu faktor yang berhubungan dalam penelitian ini yang dapat memengaruhi kadar gula darah adalah pola makan. Baik laki-laki ataupun perempuan yang menderita diabetes sama-sama mempunyai kadar gula yang tidak normal tetapi dengan mengatur pola makan yang baik dapat memengaruhi kadar gula darah itu sendiri. Dalam penelitian ini terdapat 1 responden berjenis kelamin laki-laki yang memiliki pola makan yang baik dan 32 responden berjenis kelamin laki-laki yang memiliki pola makan yang tidak baik. Kemudian 11 responden yang berjenis kelamin perempuan memiliki pola makan yang baik dan 75 responden yang berjenis kelamin perempuan memiliki pola makan yang tidak baik.

3. Hubungan Antara Pekerjaan dengan Kadar Gula Darah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak dalam penelitian ini ialah yang tidak bekerja dengan jumlah 72 responden dan persentase sebesar (60.5%). Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* 0.382 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan kadar gula darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2.

Teori saat ini tidak sejalan dengan hasil penelitian ini. Menurut teori, jenis pekerjaan memengaruhi aktivitas fisik dan tingkat stres; stres meningkatkan hormon epinefrin, yang dapat menggerakkan glukosa, asam lemak, dan asam laktat. Hormon epinefrin adalah hormon antagonis insulin, yang menghambat fungsi insulin dan dapat mempengaruhi kadar gula darah.

Pekerjaan yaitu proses seseorang berusaha untuk memperoleh penghasilan di suatu perusahaan/instansi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu pekerjaan sektor formal/informal. American Diabetes Association (ADA) (2012) menyatakan bahwa seseorang yang bekerja memiliki manfaat yang besar karena kadar glukosa darah dapat terkontrol melalui aktivitas fisik serta mencegah terjadi komplikasi. Faktor pekerjaan mempengaruhi resiko besar terjadinya diabetes melitus, pekerjaan dengan aktivitas fisik yang ringan akan menyebabkan kurangnya pembakaran energi oleh tubuh sehingga kelebihan energi dalam tubuh akan disimpan dalam

bentuk lemak dalam tubuh yang mengakibatkan obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko diabetes melitus.

Tidak bekerja menyebabkan kurangnya aktivitas fisik, yang menghambat reaksi metabolisme dan pembakaran kalori. Aktivitas fisik sangat membantu mencegah diabetes. Pergerakan anggota tubuh hilang dalam masyarakat yang tidak bekerja karena mereka kurang melakukan aktivitas fisik.

Tetapi menurut asumsi peneliti, meskipun individu tersebut tidak mempunyai pekerjaan tapi jika dia rajin berolahraga atau mengatur pola makan yang baik maka mereka juga akan tetap bisa mengontrol kadar gula yang ada di dalam tubuhnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari 29 responden yang memiliki aktifitas fisik yang cukup terdapat 17 orang yang bekerja dan 12 orang yang tidak bekerja. Sedangkan untuk pola makan yang baik terdapat 5 responden yang bekerja dan 7 responden yang tidak bekerja.

4. Hubungan Antara Aktifitas Fisik dengan Kadar Gula Darah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak dalam penelitian ini ialah responden yang kurang melakukan aktifitas fisik dengan jumlah 90 responden dan persentase sebesar (75.6%). Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* 0.000 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara aktifitas fisik dengan dengan kadar gula

darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2. Kemudian pada uji multivariat yang menggunakan analisis regresi logistik didapatkan hasil bahwa aktifitas fisik pada penderita diabetes melitus tipe 2 diperoleh nilai (*p-value* 0.005), yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara aktifitas fisik pada penderita diabetes melitus tipe 2 dengan kadar gula darah puasa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irna Anggraeni (2018) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar gula darah puasa pada pasien DM tipe II dengan $p = 0,001$. Aktivitas fisik dapat meningkatkan sensitifitas reseptor insulin, sehingga glukosa dapat diubah menjadi energi melalui proses metabolisme yang ada dalam tubuh. Penggunaan glukosa oleh otot dapat meningkat selama aktivitas fisik.

Untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang, sintesis glukosa endogen ditingkatkan. Ini terjadi ketika tubuh dapat mengkompensasi kebutuhan glukosa yang lebih tinggi yang dihasilkan oleh aktivitas fisik yang berlebihan, yang menyebabkan kadar glukosa tubuh menjadi rendah, yang dikenal sebagai hipoglikemia. Sebaliknya jika glukosa darah melebihi kemampuan tubuh untuk menyimpan disertai dengan aktivitas fisik yang kurang maka kadar glukosa darah menjadi lebih tinggi dari normal (hiperglikemia) (Harfebrina, 2018).

Aktifitas fisik adalah bagian penting dari pengobatan diabetes. Salah satu jenis aktivitas fisik terorganisir yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik disebut olahraga. Baik aktivitas fisik maupun olahraga ditunjukkan untuk memperbaiki kontrol glukosa darah, mengurangi faktor risiko kardiovaskular, menurunkan berat badan, dan meningkatkan kesehatan (ADA, 2017).

Olahraga yang tepat akan membantu mengontrol kadar gula darah penderita. Pada awal melakukan kegiatan olahraga, glukosa dalam darah merupakan sumber energi utama. Bila olahraga berlangsung terus maka energi diperoleh dari pemecahan glikogen yang disimpan di hati. Jika berlangsung lebih dari 30 menit maka sumber energi utamanya adalah asam lemak bebas yang berasal dari pemecahan lemak di jaringan adiposa (jaringan lemak bawah kulit). Pada orang normal, perubahan metabolik yang terjadi akibat berolahraga dipengaruhi oleh lama dan beratnya latihan, serta tingkat kebugaran. Sedangkan pada diabetes, selain dipengaruhi oleh hal tersebut di atas juga dipengaruhi pula oleh kadar insulin plasma, kadar glukosa darah, kadar benda beton dan keseimbangan cairan tubuh. Pada diabetes yang tidak terkendali, olahraga akan menyebabkan terjadinya peningkatan glukosa darah dan benda beton. Sebaiknya, bila penderita diabetes ingin berolahraga kadar glukosadarah tidak lebih dari 250 mg/dl.

Menurut peneliti beraktivitas yang cukup akan mempengaruhi penurunan kadar gula darah. Kadar gula darah responden akan naik jika mereka kurang beraktivitas, tetapi jika mereka berolahraga dan bersenam secara teratur, kadar gula darah mereka akan tetap dalam rentang normal.

Kadar gula darah penderita diabetes melitus tipe 2 normal karena otot menggunakan glukosa yang disimpannya selama aktivitas fisik. Salahsatu pendekatan awal untuk mengelola diabetes melitus tipe 2 adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik secara positif dapat memengaruhi kebugaran tubuh, sensitivitas insulin, dan pembentukan berat badan yang ideal.

Islam mendukung orang-orangnya menjadi kuat dan sehat secara rohani dan jasmani. Ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kesehatan sangat penting untuk orang-orang yang melakukan amal saleh dan terlibat dalam urusan agama dan dunia mereka. Allah Subhanah wa Ta'ala berfirman:

..... قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ

Terjemahnya:

“(Nabi mereka) berkata, “Sesungguhnya Allah Subhanah wa Ta’ala telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” (QS. al-Baqarah: 247).

Rasulullah SAW bersabda:

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah.” (HR. Muslim).

Kekuatan yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut adalah kekuatan iman dan jasmani, sebagaimana perkara yang bermanfaat bagi kita adalah perkara yang bermanfaat untuk urusan dunia kita serta akhirat kita.

Islam menegaskan pentingnya olahraga untuk menciptakan generasi Rabbani yang kuat dan sehat. Oleh karenanya, Islam mengajarkan setiap muslim untuk mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara memanah, berenang, dan berkuda serta jenis olahraga lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan individu.

5. Hubungan Antara Pola Makan dengan Kadar Gula Darah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak dalam penelitian ini ialah responden yang memiliki pola makan yang tidak baik dengan jumlah 107 responden dan persentase sebesar (89.9%). Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Exact Fisher* menunjukkan nilai *p-value* 0.000 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pola makan dengan kadar gula darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2. Kemudian pada uji multivariat yang menggunakan analisis regresi logistik didapatkan hasil bahwa pola

makan pada penderita diabetes melitus tipe 2 diperoleh nilai (*p-value* 0.000), yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pola makan pada penderita diabetes melitus tipe 2 dengan kadar gula darah puasa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2020) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pola makan dengan kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus tipe 2. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Bistara (2018) dengan menerapkan pola makan 3j didapatkan hasil $p=0.000$ dengan <0.05 yang artinya terdapat hubungan yang kuat antara pola makan dengan kadar gula darah.

Pola makan mengatur jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi untuk menjaga kesehatan, status gizi, dan untuk membantu atau mencegah penyakit, terutama diabetes melitus. Sangat penting bagi penderita diabetes melitus untuk memahami bagaimana mengatur pola makan mereka setiap hari dengan mengatur tiga kali makan besar dan tiga kali makan selingan. Makanan manis, berlemak, dan asin sangat berhubungan dengan tingkat gula darah pasien diabetes. Oleh karena itu, agar gula darah dapat dikontrol dengan lebih baik, responden disarankan untuk mengubah pola makan mereka dan memastikan kapan mereka makan. Perawatan pola makan penderita diabetes melitus harus diperhatikan, termasuk jadwal, jumlah, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Makanan tertentu meningkatkan kadar gula darah dengan cepat karena mengandung glukosa yang tidak terkontrol (Tandra, 2009).

Makanan porsi kecil yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu membantu mengontrol kadar gula darah, tetapi makanan porsi besar menyebabkan peningkatan cepat dalam glukosa darah dan peningkatan yang berulang dapat menyebabkan komplikasi diabetes melitus.

Pola makan adalah salah satu komponen yang paling menantang dalam pengobatan diabetes. Sesuaikan jumlah kalori yang Anda butuhkan setiap hari. Kebutuhan ini didasarkan pada berat badan (obesitas, kurus, atau ideal), tinggi badan, jenis kelamin, usia, dan faktor penentu jumlah kalori yang dibutuhkan setiap hari. Pada umumnya, jadwal makan terdiri dari tiga porsi besar untuk makan pagi (20 persen), makan siang (30 persen), dan makan malam (25 persen). Selain itu, ada 2-3 porsi ringan (10-15 persen) di antara porsi besar. Pembagian berdasarkan jumlah kalori yang dibutuhkan ini dilakukan untuk memastikan pemasukan kalori secara merata sepanjang hari dan mencegah kenaikan gula darah yang berlebihan. Pankreas akan dapat bekerja dengan lebih teratur jika Anda mengatur jadwal makan Anda sepanjang hari. Makanan untuk penderita diabetes harus terdiri dari karbohidrat 45-65 persen dari kalori harian, protein 10-20 persen dari 15 persen, lemak 20-25 persen, dan serat lebih dari 25 gram serat yang bergizi.

Menurut peneliti kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pengaturan pola makan pada penderita diabetes membuat mereka makan semau dan sepuasnya.

Pola makan yang tidak baik ini dikarenakan pasien tidak mengurangi atau menghindari makanan yang disukainya. Kemudian pasien juga tidak dapat mengurangi cemilan seperti gorengan dan kue-kue manis.

Di dalam al-Qur'an juga membahas tentang peraturan makanan, sangat perlu untuk menjaga tubuh agar jiwa dan roh tetap sehat. Islam melarang manusia untuk sembarangan dalam memilih makanan karena ada makanan yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena makanan tersebut terdapat zat yang dapat mengakibatkan kerugian pada tubuh manusia. Islam menganjurkan manusia untuk memakan-makanan yang halal, suci, baik lagi bersih. Dalam surat al-A'raf ayat ke 31 berbunyi :

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ مِنْ حَيْثُ رَزَقْتَهُ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ ؕ

Terjemahnya :

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Segala penyakit berasal dari diri manusia sendiri. Bagaimana pola hidup manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat al-A'raf bahwasanya makan dan minumlah sewajarnya. Manusia tidak boleh berlebih-lebihan di dalam segala sesuatu. Rasulullah sudah mencontohkan pola makan yang baik, sebagaimana kita bisa mengikuti pola makan yang sehat dari Rasulullah SAW, seperti mencontoh pola makan kesehariannya untuk mencegah berbagai macam penyakit seperti penyakit diabetes ini.

Dengan mengatur pola makan yang baik, yang mencakup jumlah porsi makanan, jenis makanan, dan waktu atau frekuensi makan, disarankan untuk tidak mengonsumsi terlalu banyak makanan karena hal ini dapat mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang diperlukan tubuh, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kekurangan nutrisi yang diperlukan sel.

6. Hubungan Antara Lama Menderita Sakit dengan Kadar Gula Darah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak dalam penelitian ini ialah pasien yang menderita diabetes melitus lebih dari 10 tahun dengan jumlah 69 responden dan persentase sebesar (57.9%). Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara lama menderita sakit dengan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2.

Penurunan kualitas hidup pada pasien diabetes melitus terjadi karena penurunan kemampuan tubuh dalam mengontrol glukosa darah, yang diakibatkan karena penurunan sekresi insulin secara progresif akibat kerusakan sel beta pankreas akibat beban kerja yang berlebihan sebagai kompensasi glukosa darah yang tinggi. Hal ini akan mempersulit manajemen diabetes yang akan dilakukan. Pasien DM yang telah menderita DM lebih dari 10 tahun khususnya pada kalangan lansia memiliki kualitas hidup yang buruk utamanya pada aspek fisik, hubungan sosial, kemandirian, serta partisipasi sosial.

Dijelaskan juga bahwa kemandirian serta hubungan sosial pada penderita DM akan semakin berkurang tiap tahunnya yang disebabkan oleh kelemahan akibat dari penyakit. Juga dengan lebih dari 10 tahun pasien menderita DM maka besar kemungkinan terjadi keterbatasan kemampuan aktivitas, nyeri dan ketidaknyamanan. Hal ini akan berpengaruh negatif terhadap aktivitas sehari – hari bahkan meningkatkan perasaan sedih, isolasi sosial, dan takut kematian. Selain itu penurunan kemandirian dan kemampuan pengambilan keputusan dapat berpengaruh terhadap harga diri yang dapat mengarah pada ketidakpedulian akan kesehatannya sehingga mengurangi perawatan diri yang dapat berujung pada timbulnya komplikasi kronis dari diabetes melitus.

Waktu lamanya seseorang menderita penyakit dapat memberikan gambaran mengenai tingkat patogenesis penyakit tersebut. Peningkatan angka kesakitan Diabetes Mellitus dari waktu ke waktu lebih banyak disebabkan oleh faktor hereditas, life style (kebiasaan hidup) dan faktor lingkungannya, dengan semakin bertambahnya umur kemampuan jaringan mengambil glukosa darah juga akan semakin menurun. Onset atau mulai terjadinya DM Tipe 2 adalah 7 tahun sebelum diagnosis ditegakkan yaitu ketika memenuhi kriteria DM tipe 2 dengan keluhan khas polidipsi, polifagi dan poliuri dan didukung hasil pemeriksaan glukosa darah. Komplikasi diabetes mellitus dengan penyakit lain terkait dengan lamanya seseorang

menderita diabetes mellitus, semakin lama seseorang menderita Diabetes Mellitus maka komplikasi penyakit Diabetes Mellitus juga akan lebih mudah terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2008) menunjukkan bahwa semakin lama seseorang menderita Diabetes mellitus, maka semakin tinggi resiko untuk terjadinya komplikasi retinopati.

7.Hubungan Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak dalam penelitian ini ialah responden yang patuh dalam mengonsumsi obat diabetes dengan jumlah 47 responden dan persentase sebesar (83.9%). Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Exact Fisher* menunjukkan nilai *p-value* 0.224 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aelaide Bulu (2019), Ningrum (2020), dan Hizam Zulfhi (2020) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kepatuhan minum obat pasien diabetes dengan kadar gula darah. Sebagian faktor, termasuk karakteristik terapi dan penyakit, memengaruhi tingkat minimal ketaatan minum obat ini. Salah satu faktor tersebut adalah kompleksitas terapi.

Jika seseorang menggunakan lebih banyak kombinasi obat, mereka akan menjadi tidak taat dan menghambat terapi. Salah satu cara untuk mengontrol glukosa darah dan komplikasi yang dapat ditimbulkan adalah dengan memperhatikan bagaimana responden mengontrol konsumsi obat antidiabetes mereka. Jika seseorang yang menderita diabetes melitus tidak mematuhi program pengobatan yang telah disarankan oleh dokter, ahli gizi, atau petugas kesehatan lainnya, keadaan mereka dapat memburuk. Namun, pengobatan diabetes melitus ini, selain pengobatan obat, juga dipengaruhi oleh diet yang sehat dan olahraga.

Dunia kedokteran memang semakin maju dengan keberhasilannya mengembangkan obat-obatan, khususnya penyakit berat, namun hal ini justru menjadi bumerang bagi penderita penyakit karena obat-obat kimia itu justru menimbulkan masalah bagi organ tubuh manusia, khususnya ginjal yang bertugas menetralsir obat-obat tersebut. Obat kimia seperti bermata dua. Satu untuk menusuk lawan dan satu mata lagi untuk menusuk diri sendiri. Artinya di samping menyembuhkan juga menimbulkan masalah bagi organ tubuh yang lain. Limbahnya dibuang melalui tubuh manusia. Khususnya ginjal mendapat tugas yang berat untuk menetralsir obat-obatan tersebut. Allah SWT telah berfirman dalam surat Asy Syu'ara ayat 80 :

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

Terjemahnya :

“Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku”.

Ayat ini mengandung makna bahwa apapun jenis penyakit manusia, baik fisik maupun psikis, Allah-lah yang menyembuhkannya, yang terapinya sudah terkandung dalam firman-Nya, Al-Qur'an. Seharusnya segala penyakit dihadapi dengan sikap arif. Pendekatan spiritual merupakan jalan yang arif untuk memperingan penderita diabetes. Artinya, bagi penderita penyakit (tidak hanya terbatas pada DM) hendaknya lebih mendekatkan diri pada Allah SWT yang maha menyembuhkan berbagai penyakit. Doa merupakan suatu bentuk ikhtiar menuju diri pribadi yang sehat. Dalam ajaran Islam, doa dapat dipanjatkan di tiap kesempatan. Namun sebaiknya doa di waktu yang persentase terkabulnya besar seperti: setelah selesai sholat lima waktu, setelah selesai membaca Al Qur'an, sepertiga malam setelah bangun tidur dan lain sebagainya.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah bias informasi terjadi dalam bentuk recall bias. Pada penelitian ini recall bias dapat terjadi pada variabel aktivitas fisik yang dilakukan seseorang selama seminggu dan dilakukan terus menerus selama 10 menit atau lebih dalam setiap kali kegiatan. Responden harus mengingat kembali kebiasaan sehari-hari dalam memberikan jawaban. Responden bisa saja menjawab dengan perkiraan dan diperlukan kesabaran bagi peneliti dalam menunggu jawaban dari responden. Masih adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar gula darah yang belum diteliti pada penelitian ini. Dan juga adanya beberapa sampel yang menolak untuk menjadi responden dan sulitnya mencari lokasi tiap sampel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak terdapat hubungan antara usia dengan kadar gula darah puasa padapenderita diabetes melitus tipe 2.
2. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kadar gula darahpuasa pada penderita diabetes melitus tipe 2.
3. Tidak terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kadar gula darah puasapada penderita diabetes melitus tipe 2.
4. Terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar gula darah puasapada penderita diabetes melitus tipe 2
5. Terdapat hubungan antara pola makan dengan kadar gula darah puasa padapenderita diabetes melitus tipe 2
6. Tidak terdapat hubungan antara kepatuhan minum obat diabetes dengankadar gula darah puasa pada penderita diabetes melitus tipe 2
7. Dan variabel yang paling berpengaruh terhadap kadar gula darah puasaadalah pola makan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas di ajukan beberapa saran oleh peneliti,antara lain :

1. Melaksanakan intervensi kejadian diabetes mellitus 2 terkhusus faktorrisiko yang dominan perlu diprioritaskan sebagai strategi utama mengurangi angka kejadian diabetes mellitus 2.

Intervensi yang dilakukan dapat berupa puskesmas perlu lebih menggalakkan program diabetes melitus yang sudah ada sebelumnya. Selain itu puskesmas juga dapat melakukan penyebaran informasi dan edukasi melalui media cetak dan elektrik berupa buletin, serta mengadakan skrining kesehatan secara berkala kepada sekelompok masyarakat yang berisiko tinggi.

2. Masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya mengatur makan dan beraktifitas yang cukup dalam mengendalikan kadar gula darah penderita diabetes melitus.
3. Penderita diabetes melitus disarankan untuk terus mengetahui pilar DM dengan mencari tahu informasi seputar DM, melakukan kontrol gula darah secara rutin, mengontrol makanan yang dikonsumsi, minum obat secara teratur dan melakukan terapi insulin bila diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah Nur, d. (2016). Hubungan Pola Konsumsi dengan Diabetes Melitus Tipe 2 pada Pasien rawat Jalan di RSUD Dr. Fauziah Bireuen Provinsi Aceh. *Media Litbangkes*, 26(3), 145-150.
- Abil Rudi, H. N. (2017). Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kadar Gula Darah Puasa Pada Pengguna Layanan Laboratorium. *Wawasan Kesehatan*, Volume 3 Nomor 2.
- Ada. (2017). Standars Of Medical Care In Diabetes, The Journal Of Clinical And Applied Research And Education . *American Diabetes Association*.
- Adelaide Bulu, T. D. (2019). Hubungan Antara Tingkat Kepatuhan Minumobat Dengan Kadar Gula Darah Pada Pasiendiabetes Melitus Tipe Ii. *Nursing News*, Volume 4, Nomor 1.
- Agnes Anastasya Rihi Leo, R. V. (2021). Analisis Status Gizi, Tingkat Kecemasan, Umur, Dan Kadar Gula Darah Dengan Kualitas Hidup Pasien Dm Tipe 2 . *Jurnal Ilmiah Gizi Dan Kesehatan*, Vol.02, No.02.
- AKG. (2019). Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia. *Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019*.
- Alianatasya, N., & Muflihatin, S. K. (2020). Hubungan Pola Makan dengan Terkendalinya Kadar Gula Darah pada Penderita Diabetes Melitus Tipe II di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. *Borneo Student Research (BSR)*, 1(3), 1784-1790.
- Ambarwati, R. Y. (2017). Naturalisasi Pola Makan Dalam Surat Al-A'raf. *Raushan Fikr*, Vol. 6 No. 1.
- American Diabetes Association., 2014. Diagnosis and Classification of Diabetes Melitus. *Diabetes Care*. 37: 1
- Bistara, S. &. (2018). Hubungan Pola Makan Dengan Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Mellitus. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, Vol 3 No 1.
- Boku, A. (2019). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Kadar Gula Darah Padapenderita Diabetes Melitus Tipe Ii Di Rs Pku Muhammadiyahyogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan.
- Dalimartha, D. S. (2004). *Ramuan Tradisional Untuk Pengobatan Diabetes Mellitus*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Depkes. (2009). *Kategori Usia Menurut Depertemen Kesehatan Republik Indonesia*.

Harfebrina. (2018). *Perbandingan Rerata Langkah Kaki Perhari Terhadap Kadarglukosa Darah Mahasiswi Aak Yayasan Fajar Pekanbaru*. Pekanbaru: Aak Yayasan Fajar Pekanbaru.

Hizam Zulfhi, S. K. (2020). Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Terkendalinya Kadar Gula Darah Pada Pasien Dm Tipe Ii Di Irna Rsud Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. *Borneo Student Research*, Vol 1, No3.

Irna Anggraeni, R. A. (2018). Hubungan Aktifitas Fisik Dengan Kadar Gula Darah Puasa Padapenderita Diabetes Melitus Tipe Ii Di Rumah Sakit Umum Daerahdr. H. Abdul Moeloek. *Jurnal Dunia Kemas*, Volume 7. Nomor 3.

Kemenkes Ri. (2018). *Hasil Utama Riskesdas 2018*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesi.

Komariah, S. R. (2020). Hubungan Usia, Jenis Kelamin Dan Indeks Massa Tubuh Dengan Kadar Gula Darah Puasa Pada Pasien Diabetesmelitus Tipe 2 Di Klinik Pratama Rawat Jalanproklamasi, Depok, Jawa Barat. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*.

Lisavina Juwita, W. F. (2018). Model Pengendalian Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus. *Jurnal Endurance*, 102-111.

Meliana Nursihhah, D. S. (2021). Hubungan Kepatuhan Diet Terhadap Pengendalian Kadar Gula . *Jurnal Medika Hutama*, Vol. 02, No. 03.

Ningrum, D. K. (2020). Kepatuhan Minum Obat Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe Ii. *Higeia 4* , Special3.

Nur Isnaini, R. (2018). Faktor Risiko Mempengaruhi Kejadian Diabetes Mellitus Tipe Dua . *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan Aisyiyah*, Vol 14, No. 1.

Oktaviana, R. (2015). Hubungan Antara Kelompok Teman Sebaya Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Di Kelurahan X Palembang. *Jurnal Ilmu Psikologi*, 9 (1).

Profil Kesehatan Sulawesi Selatan Tahun 2021. Sulsel: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan; 2021

Ridwan, M. S. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 31.

- Ruhbani, F. (2022). Menjaga Kesehatan Jasmani Dan Rohani Dengan Olahraga Dalam Persepektif Hadis: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, Volume 16.
- Sastroasmoro, S. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: Sagung Seto.
- Selly Septi Fandinata, R. D. (2020). Pengaruh Kepatuhan Minum Obat Oral Anti Diabetik Terhadap Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe Ii. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, Vol. 10, No. 1.
- Septi Kurniasari, N. N. (2020). Pola Makan Dengan Kadar Glukosa Darah Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2. *Riset Media Keperawatan*, Vol 3, No1.
- Septian, R. (2017). Pola Konsumsi Fast Food, Aktivitas Fisik Dan Faktor Keturunan Terhadap Kejadian Obesitas. *Public Health Perspective Journal*, Volume 2 No 3.
- Sherwood, L. 2012. Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem. Edisi 6. Jakarta. EGC
- Sudesna Chatterjee Md, P. M. (2018). Program Pendidikan Manajemen Diri
Terstruktur Diabetes : Tinjauan Naratif Dan Inovasi Terkini. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 130-142.
- Sulistyoningsih, H. (2011). *Gizi Untuk Kesehatan Ibu Dan Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tandra. (2009). Segala Sesuatu Yang Harus Anda Ketahui Tentang Diabetes. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Tjahjadi, V. (2002). *Mengenal, Mencegah, Mengatasi Silent Killer Diabetes*. Semarang: Pustaka Widyamara.
- Vitahealth. (2006). *Diabetes*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wahyudin. (2019). Analisis Pola Makan Dan Aktivitas Fisik Terhadap Risiko Diabetes Mellitus Tipe 2 Pada Pekerja Di Pt.X. *Kesehatan Indra Husada*, 7(2).
- WHO. Global Report On Diabetes. France: *World Health Organization*; 2016.

Kuisisioner Penelitian

“Faktor Yang Berhubungan Dengan Kadar Gula Darah Puasa Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Bangkala”

Tanggal :.....

Nomor Responden :.....

Data Demografi Responden

1. Nama Responden :.....
2. Umur Tahun
3. Jenis Kelamin P/L
4. Pendidikan :.....
5. Pekerjaan :.....
6. Alamat :.....

Kadar Gula Darah

Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Mg/dl	Keterangan
Gula Darah Puasa (GDP)		

Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah anda mengonsumsi obat diabetes?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Obat diabetes apa yang anda minum (... ..)
3. Berapa kali anda minum obat (...kali sehari)

KUISIONER AKTIVITAS FISIK

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Aktivitas saat belajar/bekerja (aktivitas termasuk kegiatan belajar, latihan, aktivitas rumah tangga, dll)		
P1	Apakah aktivitas sehari-hari anda, termasuk aktivitas berat (seperti membawa beban berat, menggali atau pekerjaan konstruksi lain)?	1. Ya 2. Tidak (langsung ke P4)
P2	Berapa hari dalam seminggu anda melakukan aktivitas berat?hari
P3	Berapa lama dalam sehari biasanya anda melakukan aktivitas berat?jam.....menit
P4	Apakah aktivitas sehari-hari anda sedang yang menyebabkan peningkatan nafas dan denyut nadi, seperti mengangkat beban ringan dan jalan sedang (minimal 10 menit secara kontinyu)	1. Ya 2. Tidak (langsung ke P7)
P5	Berapa hari dalam seminggu anda melakukan aktivitas sedang?hari
P6	Berapa lama dalam sehari biasanya anda melakukan aktivitas sedang?jam.....menit
Perjalanan ke dan dari tempat aktivitas (perjalanan ke tempat aktivitas, berbelanja, beribadah di luar, dll)		
P7	Apakah anda berjalan kaki atau bersepeda untuk pergi ke suatu tempat minimal 10 menit kontinyu?	1. Ya 2. Tidak (langsung ke P10)
P8	Berapa hari dalam seminggu anda berjalan kaki atau bersepeda untuk pergi ke suatu tempat?hari
P9	Berapa lama dalam sehari biasanya anda berjalan kaki atau bersepeda untuk pergi ke suatu tempat?jam.....menit
Aktivitas Rekreasi (olahraga, fitness, dan rekreasi lainnya)		

P10	Apakah anda melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang berat seperti lari, bermain sepak bola, atau rekreasi lainnya yang mengakibatkan peningkatan nafas dan denyut nadi secara besar(minimal dalam 10 menit secara kontinyu)?	1. Ya 2. Tidak (langsung ke P13)
P11	Berapa hari dalam seminggu biasanya anda melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang tergolong berat?hari
P12	Berapa lama dalam sehari biasanya anda melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang tergolong berat?jam.....menit
P13	Apakah anda melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang sedang seperti berjalan cepat, bersepeda, berenang, bermain voli yang mengakibatkan peningkatan nafas dan denyut nadi (minimal dalam 10 menit secara kontinyu)?	1. Ya 2. Tidak (langsung ke P16)
P14	Berapa hari dalam seminggu biasanya anda melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang tergolong sedang?hari
P15	Berapa lama dalam sehari biasanya anda melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang tergolong sedang?jam.....menit
<p>Aktivitas menetap (Sedentary behavior)</p> <p>Aktivitas yang tidak memerlukan banyak gerak seperti duduk saat bekerja, duduk saat di kendaraan, menonton televisi, atau berbaring, kecuali tidur.</p>		
P16	Berapa lama anda duduk atau berbaring dalam sehari?jam.....menit

FORM FOOD RECALL 24 JAM

Petunjuk : Semua jenis makanan yang dikonsumsi Bapak/Ibu berikut waktu makan dan ukuran jumlahnya (dalam berat/gram atau ukuran rumah tangga) selama 1x24 jam yang lalu

Waktu	Makanan	Bahan Makanan (deskripsi detail dan merk jika ada)	Ukuran	
			Ukuran rumah tangga	Berat(gr)
PAGI Pukul :				
SELINGAN PAGI Pukul :				
SIANG Pukul :				
SELINGAN SORE Pukul :				
SORE/MALAM Pukul :				
SELINGAN MALAM Pukul :				
	TOTAL			

Lampiran 2 : Master Tabel

Nam a	Um r	Lam a Skit	J K	Pkrja n	GD P	Ktgo ri	Kom.Ob at	Jns.Obat	JM.Ob at	Akt.Fisi k	Ktgo ri	J.Mka n	Ktego ri	Asp.Ener gi	Ktgo ri	Jdl.Mak n	Ktgo ri	Pla. Mka n
Rm	41	1	2	2	207	2	1	Metformin HCL	3	540	1	3	2	44%	2	3	2	2
Ht	43	1	2	2	296	2	-			420	1	3	2	52%	2	3	2	2
Mw	39	1	2	2	351	2	1	Metformin HCL	3	1268	2	4	1	37%	2	2	2	2
Ma	50	2	2	2	441	2	1	Metformin HCL	2	610	2	3	2	35%	2	3	2	2
S	46	1	1	1	251	2	1	Metformin HCL	3	720	2	4	1	26%	2	4	2	2
Sh	34	1	2	2	273	2	-			580	1	4	1	43%	2	3	2	2
Ra	57	2	2	2	405	2	1	Glibenclamid e	1	560	1	3	2	50%	2	5	2	2
Hi	38	1	2	2	225	2	1	Metformin HCL	1	960	2	3	2	40%	2	4	2	2
Ad	52	2	1	1	265	2	1	Glibenclamid e	2	3600	2	5	1	67%	2	4	2	2
M	50	2	2	2	336	2	-			500	1	5	1	88%	1	6	1	1
Ji	65	2	2	2	134	2	1	Metformin HCL	2	216	1	2	2	38%	2	2	2	2
Sn	51	2	2	2	354	2	1	Metformin HCL	2	208	1	2	2	36%	2	2	2	2

Bn	54	2	1	1	403	2	1	Metformin HCL	2	576	1	3	2	65%	2	3	2	2
Sup	44	2	2	2	210	2	-			320	1	4	1	30%	2	3	2	2
Jkr	71	2	1	1	140	2	-			280	1	3	2	75%	2	3	2	2
Tn	70	2	2	2	265	2	-			360	1	4	1	47%	2	4	2	2
Ij	60	2	1	2	270	2	1	Latibet	1	560	1	3	2	40%	2	3	2	2
Mrf	57	1	1	1	299	2	1	Insulin	4	300	1	3	2	46%	2	3	2	2
Spr	55	1	1	1	81	1	1	Latibet	1	816	2	3	2	56%	2	6	1	2
Hp	65	2	1	1	139	2	-			720	2	3	2	51%	2	4	2	2
Kt	62	2	2	2	363	2	1	Latibet	1	580	1	5	1	78%	2	6	1	2
Mps	58	2	1	1	194	2	-			576	1	3	2	51%	2	4	2	2
Nh	56	2	1	1	336	2	1	Insulin	4	360	1	4	1	70%	2	5	2	2
Msh	38	1	1	1	317	2	-			480	1	4	1	63%	2	5	2	2
Nsi	52	1	2	1	155	2	1	Insulin	3	420	1	2	2	32%	2	2	2	2
Ssl	63	2	2	2	381	2	1	Insulin	2	240	1	4	1	51%	2	3	2	2
San	49	1	1	1	436	2	-			720	2	3	2	55%	2	5	2	2
Ak	65	2	1	1	260	2	-			2400	2	5	1	80%	1	4	2	2
Bso	65	2	1	1	76	1	-			560	1	3	2	26%	2	4	2	2

Iar	55	2	1	1	92	1	-			3600	2	3	2	52%	2	3	2	2
Hw	51	2	2	2	218	2	1	Metformin	1	320	1	2	2	53%	2	3	2	2
An	73	2	2	2	HI	2	1	Metformin	1	120	1	3	2	74%	2	4	2	2
Roa	40	1	2	2	303	2	-			280	1	2	2	36%	2	2	2	2
Sub	59	2	2	2	202	2	-			480	1	3	2	51%	2	4	2	2
Bss	65	2	2	2	79	1	-			420	1	4	1	55%	2	4	2	2
Bu	65	2	1	1	412	2	-			80	1	4	1	73%	2	4	2	2
Mag	58	2	1	2	408	2	1	Metformin	2	600	2	3	2	22%	2	4	2	2
Ny	68	2	2	2	333	2	-			240	1	2	2	49%	2	3	2	2
Je	60	2	1	1	155	2	-			3360	2	3	2	40%	2	3	2	2
Rh	60	2	2	1	237	2	1	Insulin	3	380	1	4	1	37%	2	4	2	2
Sf	48	1	1	1	110	1	-			4320	2	5	1	87%	2	6	1	2
San	61	2	2	2	324	2	1	Metformin	2	360	1	3	2	67%	2	6	1	2
Jg	47	1	2	2	449	2	1	Metformin	1	240	1	4	1	31%	2	4	2	2
Km	52	1	2	2	397	2	1	Metformin	3	360	1	3	2	48%	2	3	2	2
Ah	58	2	1	1	84	1	1	Insulin	2	720	2	4	1	81%	1	5	2	2
Na	66	2	2	1	111	1	-			1680	2	5	1	90%	1	6	1	1

Ra	60	2	2	2	195	2	-			400	1	2	2	77%	2	4	2	2
Ho	62	2	2	2	229	2	1	Metformin	1	564	1	3	2	50%	2	5	2	2
Be	65	2	2	2	192	2	-			420	1	2	2	61%	2	3	2	2
Mr	57	2	2	1	115	1	-			1400	2	5	1	83%	1	6	1	1
Sad	46	1	2	1	363	2	-			320	1	4	1	40%	2	4	2	2
Sah	48	1	1	1	35	1	1	Glibenclamide	1	360	1	3	2	55%	2	3	2	2
Hr	43	1	2	2	435	2	1	Insulin	2	420	1	2	2	27%	2	2	2	2
Bb	55	2	2	2	514	2	1	Glibenclamide	1	420	1	4	1	61%	2	3	2	2
Hs	53	1	2	1	392	2	-			328	1	2	2	32%	2	2	2	2
Sum	60	2	2	2	95	1	-			448	1	4	1	73%	2	4	2	2
Sw	43	1	2	2	155	2	1	Insulin	1	300	1	4	1	40%	2	4	2	2
Mt	56	2	1	1	225	2	-			248	1	2	2	53%	2	6	1	2
Mar	65	2	2	2	472	2	-			280	1	3	2	30%	2	4	2	2
Cn	68	2	2	2	79	1	2	Metformin	2	484	1	4	1	55%	2	4	2	2
Jr	70	2	2	2	193	2	2	Metformin	1	300	1	4	1	59%	2	3	2	2
Ika	38	1	2	2	426	2	-			520	1	2	2	65%	2	4	2	2

Kn	40	1	2	2	98	1	-			760	2	4	1	43%	2	2	2	2
Ng	72	2	2	2	357	2	1	Metformin	2	560	1	2	2	38%	2	2	2	2
Hg	56	2	2	1	268	2	-			432	1	3	2	35%	2	3	2	2
Pi	90	2	2	2	108	1	-			0	1	5	1	85%	1	6	1	1
Sar	63	2	2	2	208	2	1	Glibenclamide	2	392	1	4	1	36%	2	3	2	2
Dia	39	1	2	2	265	2	1	Metformin	2	476	1	4	1	70%	2	3	2	2
Sp	38	1	2	2	114	1	2	Glibenclamide	1	616	2	5	1	86%	1	6	1	1
Sb	55	2	2	2	299	2	-			420	1	5	1	86%	1	6	1	1
Cr	65	2	2	1	118	1	-			1546	2	4	1	93%	1	6	1	1
Sr	55	2	2	1	109	1	-			1068	2	4	1	83%	1	6	1	1
Ci	40	1	2	2	415	2	1	Glibenclamide	1	364	1	3	2	43%	2	3	2	2
Ros	45	1	2	2	180	2	-			610	2	3	2	42%	2	4	2	2
Sal	43	1	2	2	241	2	-			380	1	4	1	30%	2	3	2	2
Mi	63	1	2	2	278	2	1	Metformin	2	208	1	2	2	77%	2	4	2	2
Su	52	2	2	2	395	2	-			580	1	3	2	64%	2	4	2	2
Nb	62	2	2	2	208	2	-			610	2	2	2	31%	2	4	2	2

Sa	60	2	2	2	219	2	-			476	1	3	2	50%	2	5	2	2
Sd	68	2	2	2	484	2	1	Metformin	2	120	1	2	2	36%	2	2	2	2
Mm	52	2	2	2	387	2	-			564	1	4	1	40%	2	4	2	2
Sp	40	1	1	1	474	2	-			360	1	3	2	44%	2	5	2	2
Rh	57	2	2	2	269	2	1	Glibenclamide	1	360	1	3	2	48%	2	3	2	2
Ma	54	2	2	1	268	2	2	Metformin	2	328	1	4	1	78%	2	6	1	2
Ss	57	2	1	1	422	2	-			560	1	2	2	52%	2	3	2	2
Ig	58	2	2	2	209	2	2	Glibenclamide	1	448	1	3	2	51%	2	4	2	2
Sg	50	1	2	2	94	1	-			640	2	5	1	88%	1	6	1	1
Hn	45	1	2	1	102	1	-			1268	2	4	1	81%	1	6	1	1
Ba	44	1	2	2	233	2	1	Metformin	1	400	1	2	2	44%	2	3	2	2
Kn	59	1	1	1	253	2	1	Glibenclamide	1	380	1	3	2	40%	2	3	2	2
Bl	70	2	1	2	117	1	-			720	2	4	1	86%	1	6	1	1
San	54	2	2	2	413	2	-			380	1	3	2	26%	2	4	2	2
Ha	34	1	2	1	337	2	-			500	1	4	1	43%	2	3	2	2
Ns	36	1	2	1	276	2	-			240	1	4	1	58%	2	5	2	2

Nr	48	1	2	2	318	2	2	Metformin	2	576	1	4	1	31%	2	4	2	2
Mt	49	1	2	2	424	2	1	Metformin	2	300	1	3	2	42%	2	5	2	2
Ri	52	2	2	2	319	2	2	Glibenclami De	2	120	1	3	2	67%	2	6	1	2
Pb	58	2	2	2	326	2	-			216	1	3	2	35%	2	3	2	2
Bo	47	1	1	1	230	2	-			640	2	3	2	44%	2	3	2	2
Sg	66	2	2	2	164	2	-			120	1	4	1	90%	1	5	2	2
Sn	44	1	2	1	393	2	-			476	1	3	2	42%	2	5	2	2
Mw	53	2	2	2	119	1	1	Metformin	1	840	2	4	1	88%	1	6	1	1
Sr	40	1	1	1	315	2	-			328	1	2	2	37%	2	3	2	2
Bk	54	2	1	1	242	2	2	Glibenclami De	1	640	2	3	2	52%	2	3	2	2
Sl	68	2	2	2	226	2	-			610	2	2	2	55%	2	3	2	2
Wt	50	2	2	2	250	2	-			380	1	3	2	31%	2	4	2	2
Rt	45	1	2	2	294	2	-			564	1	2	2	22%	2	4	2	2
Sy	57	2	2	1	235	2	2	Glibenclami De	1	400	1	3	2	36%	2	2	2	2
Bu	61	2	1	1	398	2	1	Metformin	2	576	1	4	1	51%	2	4	2	2
Sp	48	1	1	1	511	2	1	Metformin	2	360	1	4	1	56%	2	4	2	2

Sr	39	1	2	2	237	2	1	Metformin	1	500	1	4	1	70%	2	3	2	2
Si	49	1	2	1	357	2	-			328	1	2	2	27%	2	2	2	2
Jm	39	1	1	1	308	2	-			448	1	4	1	26%	2	4	2	2
Sh	40	1	1	1	248	2	1	Glibenclamid E	1	380	1	2	2	52%	2	2	2	2
Ph	58	2	2	2	305	2	-			432	1	3	2	50%	2	5	2	2
Nn	48	1	2	2	471	2	1	Metformin	2	500	1	3	2	64%	2	6	1	2
Ai	49	1	2	2	82	1	-			240	1	3	2	30%	2	3	2	2
It	32	1	2	2	412	2	-			380	1	2	2	35%	2	3	2	2
Km	49	1	2	1	248	2	1	Metformin	2	208	1	3	2	40%	2	4	2	2

Lampiran 3 : Surat Etik Penelitian



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl.H.M. Yasin Lempo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Telp. 081210016564

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"
No. B 003/KEPK/FKIK/A/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by:

Peneliti utama : Dila Anggraini
Principal Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Faktor yang Berhubungan dengan Kadar Gula Darah Puasa pada Penderita Diabetes
Melitus Tipe 2 di Jeneponto"

*"Factors Associated with Blood Sugar Levels Fasting in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
in Jeneponto"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Perneratanan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bijukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risk, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024.

This declaration of ethics applies during the period August 29, 2023 until August 29, 2024.

August 29, 2023
Professor and Chairperson,


DR. Hj. Gerny Nasity Handayani, M.Si., Apt.

Lampiran 4 : Rekomendasi Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 4318/Un.08/LP2MPP.00.9/7/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Dila Anggraini Putri
NIM : 70200119091
Semester/T.A. : VIII (Delapan)/T.A. 2023-2024
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat
Alamat : Birangloe, Jeneponto
No. HP. : 085799788658

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KADAR GULA DARAH PUASA PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS BANGKALA.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Bangkala dari tanggal Juli-Agustus.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Bangka, 29 Juli 2023
Ketua

Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.
NIP. 196009051987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal

MAKASSAR

Lampiran 5 : Permohonan Izin Penelitian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 22026/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Jeneponto
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4318/Un.06/LP2M/PP.00.9/7/2023 tanggal 22 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: DILA ANGGRAINI PUTRI
Nomor Pokok	: 70200119091
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa


PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KADAR GULA DARAH PUASA PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS BANGKALA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 Juli s/d 20 Agustus 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

	ASRUL SANI, S.H., M.Si. Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008
---	--

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. *Peringgal*.

Lampiran 6 : Permohonan Izin Penelitian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jeneponto


PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jl. Ishak Iskandar No. 30 Bontosunggu Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311
[web : dpmpptsp.jenepontokab.go.id](http://web:dpmpptsp.jenepontokab.go.id)

IZIN PENELITIAN
Nomor: 73.4/633/IP/DPMPTSP/IP/VII/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor: 235/VII/REK-IP/DPMPTSP/2023.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama	: DILA ANGGRAINI PUTRI
Nomor Pokok	: 70200119091
Program Studi	: KESEHATAN MASYARAKAT
Lembaga	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: BIRANGLOE
Lokasi Penelitian	: PUSKESMAS BANGKALA

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **INGIN MEMINTA DATA-DATA PASIEN UNTUK DILAKUKAN PENELITIAN PADA PASIEN** dengan Judul:

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KADAR GULA DARAH PUASA PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS BANGKALA

Lamanya Penelitian : 2023-07-25 s/d 2023-08-20
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
28/07/2023 10:35:04
KEPALA DINAS,

Hi. MERYANI, SP. M. SI
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 196902021998032010

Tembusan :
1. Bupati Jeneponto di Jeneponto

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Meneliti


PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BANGKALA
Jl. Raya Alir, Mei Berteng, Kec. Bangkala, Kab. Jenepono
Email: puskesmasalirbangkala@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 445/ 261 / PKM - BKL / TU / IX / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. SUHARNI, S.Kep., Ns
Nip : 19800329 200312 2 009
Pangkat/ Gol : Pembina TK.IV.b
Jabatan : Kepala Puskesmas Bangkala

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DILA ANGGRAINI PUTRI
Nim : 70200119091
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian pada Puskesmas Bangkala, sebagai syarat Skripsi/ KTI dengan judul :
"FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KADAR GULA DARAH PUASA PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS BANGKALA" Yang dilaksanakan pada Tanggal 25-07-2023 s/d 20-08-2023

Demikian Surat Keterangan ini Dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bangkala, 18 September 2023
KEPALA PUSKESMAS BANGKALA

Hj. SUHARNI, S.Kep., Ns
Nip : 19800329 200312 2 009

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 8 : Hasil Uji

Uji Univariat

USia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Muda	29	24.4	24.4	24.4
	Tua	90	75.6	75.6	100.0
	Total	119	100.0	100.0	

JenisKelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	33	27.7	27.7	27.7
	Perempuan	86	72.3	72.3	100.0
	Total	119	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bekerja	47	39.5	39.5	39.5
	Tidak Bekerja	72	60.5	60.5	100.0
	Total	119	100.0	100.0	

GulaDarah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	22	18.4	18.4	18.4
	Tidak Normal	97	81.6	81.6	100.0
	Total	119	100.0	100.0	

AktifitasFisik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup	29	24.4	24.4	24.4
	Kurang	90	75.6	75.6	100.0
	Total	119	100.0	100.0	

PolaMakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	12	10.1	10.1	10.1
	Tidak Baik	107	89.9	89.9	100.0
	Total	119	100.0	100.0	

LamaSakit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<10 tahun	50	42.0	42.0	42.0
	>10 tahun	69	58.0	58.0	100.0
	Total	119	100.0	100.0	

KonsumsiObat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Patuh	47	39.5	39.5	39.5
	Tidak Patuh	72	60.5	60.5	100.0
	Total	119	100.0	100.0	

Uji Bivariat

USia * GDP Crosstabulation

Count

		GDP		Total
		Normal	Tidak Normal	
	Normal			
	Tidak Normal			

USia	Muda	3	26	29
	Tua	19	71	90
Total		22	97	119

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.687 ^a	1	.194		
Continuity Correction ^b	1.048	1	.306		
Likelihood Ratio	1.865	1	.172		
Fisher's Exact Test				.274	.153
Linear-by-Linear Association	1.673	1	.196		
N of Valid Cases	119				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.36.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		GulaDarah		
		Normal	Tidak Normal	Total
JenisKelamin	Laki-Laki	7	26	33
	Perempuan	15	71	86
Total		22	97	119

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.225 ^a	1	.635		
Continuity Correction ^b	.044	1	.833		
Likelihood Ratio	.220	1	.639		
Fisher's Exact Test				.609	.407

Linear-by-Linear Association	.223	1	.637		
N of Valid Cases	119				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.10.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		GulaDarah		
		Normal	Tidak Normal	Total
Pekerjaan	Bekerja	11	36	47
	Tidak Bekerja	11	61	72
Total		22	97	119

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.246 ^a	1	.264		
Continuity Correction ^b	.765	1	.382		
Likelihood Ratio	1.225	1	.268		
Fisher's Exact Test				.335	.190
Linear-by-Linear Association	1.236	1	.266		
N of Valid Cases	119				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.69.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		GulaDarah		Total
		Normal	Tidak Normal	
AktifitasFisik	Cukup	14	15	29
	Kurang	8	82	90
Total		22	97	119

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	22.579 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	20.041	1	.000		
Likelihood Ratio	19.771	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	22.389	1	.000		
N of Valid Cases	119				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.36.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		GulaDarah		Total
		Normal	Tidak Normal	
PolaMakan	Baik	10	2	12
	Tidak Baik	12	95	107
Total		22	97	119

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	37.240 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	32.608	1	.000		
Likelihood Ratio	28.007	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	36.927	1	.000		
N of Valid Cases	119				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.22.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		GDP		Total
		Normal	Tidak Normal	
LamaSakit	<10 tahun	8	42	50
	>10 tahun	14	55	69
Total		22	97	119

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.354 ^a	1	.552		
Continuity Correction ^b	.127	1	.722		
Likelihood Ratio	.358	1	.550		
Fisher's Exact Test				.637	.364
Linear-by-Linear Association	.351	1	.554		
N of Valid Cases	119				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.24.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		Gula Darah		Total
		Normal	Tidak Normal	
Konsumsi Obat	Patuh	4	43	47
	Tidak Patuh	2	7	9
Total		6	50	56

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.485 ^a	1	.223		
Continuity Correction ^b	.397	1	.529		
Likelihood Ratio	1.241	1	.265		
Fisher's Exact Test				.244	.244
Linear-by-Linear Association	1.458	1	.227		
N of Valid Cases	56				

Uji Multivariat

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	KonsumsiObat	-.382	.651	.344	1	.557	.683
	AktifitasFisik	1.706	.602	8.038	1	.005	5.509
	PolaMakan	2.976	.898	10.982	1	.001	19.600
	Constant	-6.167	2.329	7.011	1	.008	.002

a. Variable(s) entered on step 1: KonsumsiObat, AktifitasFisik, PolaMakan.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	AktifitasFisik	1.705	.601	8.062	1	.005	5.503
	PolaMakan	3.099	.880	12.398	1	.000	22.170
	Constant	-7.027	1.856	14.337	1	.000	.001

a. Variable(s) entered on step 1: AktifitasFisik, PolaMakan.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	PolaMakan	3.678	.833	19.501	1	.000	39.583
	Constant	-5.288	1.579	11.212	1	.001	.005

a. Variable(s) entered on step 1: PolaMakan.

Crosstab

Count

		AktifitasFisik		
		Cukup	Kurang	Total
JenisKelamin	Laki-Laki	14	19	33
	Perempuan	15	71	86
Total		29	90	119

Crosstab

Count

		PolaMakan		
		Baik	Tidak Baik	
JenisKelamin	Laki-Laki	1	32	33
	Perempuan	11	75	86
Total		12	107	119

Crosstab

Count

		AktifitasFisik		Total
		Cukup	Kurang	
Pekerjaan	Bekerja	17	30	47
	Tidak Bekerja	12	60	72
Total		29	90	119

Crosstab

Count

		PolaMakan		Total
		Baik	Tidak Baik	
Pekerjaan	Bekerja	5	42	47
	Tidak Bekerja	7	65	72
Total		12	107	119

Crosstab

Count

	Aktifitas Fisik		Total
	Cukup	Kurang	
Konsumsi Obat Patuh	9	38	47
Tidak Patuh	20	52	72
Total	29	90	119

Crosstab

Count


	Pola Makan		Total
	Baik	Tidak Baik	
Konsumsi Obat Patuh	1	46	47
Tidak Patuh	11	61	72
Total	12	107	119

Lampiran : Tabel usia, jenis kelamin, lama menderita DM, konsumsi obat, dan jenis obat

Usia		Jenis Kelamin	Lama Menderita DM	Konsumsi Obat		Jenis Obat
Tahun	n			Patuh	Tidak Patuh	
32	1	Perempuan	1 tahun			Tidak minum obat
34	2	Perempuan Perempuan	2 tahun 5 tahun			Tidak minum obat Tidak minum obat
36	1	Perempuan	2 tahun			Tidak minum obat
38	4	Perempuan Laki-laki Perempuan Perempuan	4 tahun 2 tahun 4 tahun 6 tahun	✓	✓	Metformin Tidak minum obat Tidak minum obat Glibenclamide
39	4	Perempuan Perempuan Perempuan Laki-laki	2 tahun 7 tahun 3 tahun 2 tahun	✓ ✓ ✓		Metformin Metformin Metformin Tidak minum obat
40	6	Perempuan Perempuan Perempuan Laki-laki Laki-laki Laki-laki	4 tahun 6 tahun 5 tahun 2 tahun 5 tahun 1 tahun	✓ ✓ ✓		Tidak minum obat Tidak minum obat Glibenclamide Tidak minum obat Tidak minum obat Glibenclamide
41	1	Perempuan	3 tahun	✓		Metformin
43	4	Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan	6 tahun 8 tahun 5 tahun 3 tahun	✓ ✓ ✓		Tidak minum obat Insulin Insulin Tidak minum obat
44	3	Perempuan Perempuan Perempuan	10 tahun 1 tahun 1 tahun	✓		Tidak minum obat Metformin Tidak minum obat
45	3	Perempuan Perempuan Perempuan	8 tahun 2 tahun 2 tahun			Tidak minum obat Tidak minum obat Tidak minum obat
46	2	Laki-laki Perempuan	1 tahun 3 tahun	✓		Metformin Tidak minum obat
47	2	Perempuan Laki-laki	3 tahun 8 tahun	✓		Metformin Tidak minum obat
48	5	Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan	2 tahun 5 tahun 4 tahun 3 tahun 7 tahun	✓ ✓ ✓	✓	Tidak minum obat Glibenclamide Metformin Metformin Metformin
49	5	Laki-laki Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan	3 tahun 8 tahun 9 tahun 3 tahun 4 tahun	✓ ✓		Tidak minum obat Metformin Tidak minum obat Tidak minum obat Metformin
50	4	Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan	10 tahun 12 tahun 8 tahun 14 tahun	✓		Metformin Tidak minum obat Tidak minum obat Tidak minum obat
51	2	Perempuan Perempuan	11 tahun 10 tahun	✓ ✓		Metformin Metformin

52	6	Laki-laki Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan	12 tahun 6 tahun 2 tahun 12 tahun 14 tahun 10 tahun	✓ ✓ ✓	✓	Glibenclamide Insulin Metformin Tidak minum obat Tidak minum obat Glibenclamide
53	2	Perempuan Perempuan	5 tahun 11 tahun	✓		Tidak minum obat Metformin
54	4	Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki	10 tahun 12 tahun 12 tahun 13 tahun	✓	✓ ✓	Metformin Glibenclamide Tidak minum obat Metformin
55	5	Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Perempuan	5 tahun 11 tahun 12 tahun 11 tahun 10 tahun	✓ ✓		Glibenclamide Tidak minum obat Glibenclamide Tidak minum obat Tidak minum obat
56	3	Laki-laki Laki-laki Perempuan	11 tahun 10 tahun 11 tahun	✓		Insulin Tidak minum obat Tidak minum obat
57	6	Perempuan Laki-laki Perempuan Perempuan Laki-laki Perempuan	14 tahun 11 tahun 10 tahun 10 tahun 4 tahun 12 tahun	✓ ✓ ✓	✓	Glibenclamide Tidak minum obat Glibenclamide Glibenclamide Insulin Tidak minum obat
58	6	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Perempuan	13 tahun 12 tahun 11 tahun 15 tahun 11 tahun 10 tahun	✓ ✓	✓	Tidak minum obat Metformin Insulin Glibenclamide Tidak minum obat Tidak minum obat
59	2	Perempuan Laki-laki	11 tahun 4 tahun	✓		Tidak minum obat Glibenclamide
60	6	Perempuan Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Perempuan	11 tahun 12 tahun 15 tahun 11 tahun 15 tahun 18 tahun	✓ ✓		Tidak minum obat Glibenclamide Tidak minum obat Insulin Tidak minum obat Tidak minum obat
61	2	Laki-laki Perempuan	13 tahun 10 tahun	✓ ✓		Metformin Metformin
62	3	Perempuan Perempuan Perempuan	12 tahun 15 tahun 12 tahun	✓ ✓		Glibenclamide Metformin Tidak minum obat
63	3	Perempuan Perempuan Perempuan	12 tahun 13 tahun 5 tahun	✓ ✓ ✓		Insulin Glibenclamide Metformin
65	9	Perempuan Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan	15 tahun 14 tahun 14 tahun 15 tahun 10 tahun 14 tahun 13 tahun	✓		Metformin Tidak minum obat Tidak minum obat Tidak minum obat Tidak minum obat Tidak minum obat Tidak minum obat

		Perempuan Perempuan	16 tahun 20 tahun			Tidak minum obat Tidak minum obat
66	2	Perempuan Perempuan	13 tahun 20 tahun			Tidak minum obat Tidak minum obat
68	4	Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan	16 tahun 20 tahun 10 tahun 20 tahun	✓	✓	Tidak minum obat Metformin Metformin Tidak minum obat
70	3	Perempuan Perempuan Laki-laki	12 tahun 13 tahun 15 tahun		✓	Tidak minum obat Metformin Tidak minum obat
71	1	Laki-laki	15 tahun			Tidak minum obat
72	1	Perempuan	18 tahun	✓		Metformin
73	1	Perempuan	20 tahun	✓		Metformin
90	1	Perempuan	18 tahun			Tidak minum obat
Total	119	Laki-laki (33) Perempuan (86)		47	9	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Lampiran : Tabel usia, kadar gula darah, aktifitas fisik, pola makan dan jenis obat

Usia		Kadar Gula Darah		Aktifitas Fisik		Pola Makan		Jenis Obat
Tahun	n	Normal	Tidak Normal	Kurang	Cukup	Baik	Tidak Baik	
32	1		✓	✓			✓	Tidak minum obat
34	2		✓ ✓	✓ ✓			✓ ✓	Tidak minum obat Tidak minum obat
36	1		✓	✓			✓	Tidak minum obat
38	4	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓ ✓	Metformin Tidak minum obat Tidak minum obat Glibenclamide
39	4		✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	Metformin Metformin Metformin Tidak minum obat
40	6	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Tidak minum obat Tidak minum obat Glibenclamide Tidak minum obat Tidak minum obat Glibenclamide
41	1		✓	✓			✓	Metformin
43	4		✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓ ✓	Tidak minum obat Insulin Insulin Tidak minum obat
44	3		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓	Tidak minum obat Metformin Tidak minum obat
45	3	✓	✓ ✓ ✓	✓	✓ ✓	✓	✓ ✓ ✓	Tidak minum obat Tidak minum obat Tidak minum obat
46	2		✓ ✓	✓ ✓	✓		✓ ✓	Metformin Tidak minum obat
47	2		✓ ✓	✓	✓		✓ ✓	Metformin Tidak minum obat
48	5	✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Tidak minum obat Glibenclamide Metformin Metformin Metformin
49	5	✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Tidak minum obat Metformin Tidak minum obat Tidak minum obat Metformin
50	4	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	Metformin Tidak minum obat Tidak minum obat Tidak minum obat
51	2		✓	✓			✓	Metformin

			✓	✓			✓	Metformin
52	6		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Glibenclamide Insulin Metformin Tidak minum obat Tidak minum obat Glibenclamide
53	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak minum obat Metformin
54	4		✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	Metformin Glibenclamide Tidak minum obat Metformin
55	5	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓ ✓	Glibenclamide Tidak minum obat Glibenclamide Tidak minum obat Tidak minum obat
56	3		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓	Insulin Tidak minum obat Tidak minum obat
57	6	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Glibenclamide Tidak minum obat Glibenclamide Glibenclamide Insulin Tidak minum obat
58	6	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Tidak minum obat Metformin Insulin Glibenclamide Tidak minum obat Tidak minum obat
59	2		✓ ✓	✓ ✓			✓ ✓	Tidak minum obat Glibenclamide
60	6	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Tidak minum obat Glibenclamide Tidak minum obat Insulin Tidak minum obat Tidak minum obat
61	2		✓ ✓	✓ ✓			✓ ✓	Metformin Metformin
62	3		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓	Glibenclamide Metformin Tidak minum obat
63	3		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓	Insulin Glibenclamide Metformin
65	9	✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓		✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Metformin Tidak minum obat Tidak minum obat Tidak minum obat Tidak minum obat

			✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓ ✓ ✓	Tidak minum obat Tidak minum obat Tidak minum obat Tidak minum obat
66	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak minum obat Tidak minum obat
68	4	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	Tidak minum obat Metformin Metformin Tidak minum obat
70	3	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓	Tidak minum obat Metformin Tidak minum obat
71	1		✓					Tidak minum obat
72	1		✓	✓			✓	Metformin
73	1	✓		✓			✓	Metformin
90	1	✓		✓		✓		Tidak minum obat
Total	119	Laki-laki (33) Perempuan (86)				12	107	72