

**FAKTOR RISIKO KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CAILE
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2022**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

HIDAYATUL MUZDALIFAH
NIM. 70200119096

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayatul Muzdalifah
NIM : 70200119096
Tempat/Tanggal Lahir : Nanasaya, 21 April 2001
Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/AKK
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Pelita Taeng No. 233, Taeng,
Pallangga, Gowa
Judul : Faktor Risiko Kejadian Berat Badan
Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja
Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Gowa, 13 Februari 2024

Penyusun,



Hidayatul Muzdalifah

NIM : 70200119096

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022*" yang disusun oleh Hidayatul Muzdalifah, NIM: 70200119096, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 13 Februari 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 13 Februari 2024
3 Syaban 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Yudi Adnan, S.Kep., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rahmat, M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Nildawati Amir, SKM., M.Epid	(.....)
Pembimbing II	: Zilfadhilah Arranury, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes
NIP: 19810621 200604 2 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul, “Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tiada henti kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan dan merupakan panutan bagi seluruh umat muslim, sumber inspirasi dan motivasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangannya merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah. Dimana, kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah SWT. namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Dalam penyelesaian skripsi, tidak hanya semata-mata dari usaha penulis sendiri. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua saya yang tercinta, sebagai penyemangat dan sumber inspirasi terbesarku Ayahanda Syamsul Alam dan Ibunda Rostina serta almarhum dan almarhumah saudara/i saya Nunung Paradilah, Ilham dan Qadri atas cinta kasih, doa restu, bimbingan, dukungan, serta motivasi yang diberikan.

Demikian juga penulis ucapkan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA. Ph. D, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, beserta staf Akademik yang telah membantu, mengatur dan mengurus administrasi selama peneliti menempuh pendidikan.
3. Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Dr. Bs. Titi Haerana, SKM., M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Nildawati Amir, SKM., M.Epid selaku Dosen Pembimbing I dan Zilfadhilah Arranury, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing II yang telah ikhlas meluangkan tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Yudi Adnan, S.Kep., M.Kes selaku Dosen Penguji Akademik dan Dr. Rahmat, M.Pd.I selaku Dosen Penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan motivasi untuk skripsi ini.
6. A. Syamsiah Adha, S.Gz., MPH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Prodi dan Staf Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama

proses studi dan proses administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

8. Pelayanan Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten Bulukumba beserta staf yang telah memberi izin serta kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian.
9. Kepala UPTD Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba dan seluruh staf yang telah membantu selama penelitian.
10. Saudara-saudari Gramost, Kesmas B, Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan KKN Posko 1 Kelurahan Pancaitana Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang telah membantu dan selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada peneliti, semoga Allah swt. senantiasa membalas dengan pahala yang berlimpah. Sangat besar harapan peneliti semoga dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 13 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Hidayatul Muzdalifah
70200119096

DAFTAR SINGKATAN

AKB	Angka Kematian Bayi
ASI	Air Susu Ibu
BBLASR	Bayi Berat Lahir Amat Sangat Rendah
BBLR	Berat Badan Lahir Rendah
BBLSR	Bayi Berat Lahir Sangat Rendah
H _a	Hipotesis Alternatif
H _b	Hemoglobin
H _o	Hipotesis Nol
IMD	Inisiasi Menyusui Dini
IUGR	<i>Intrauterine Growth Retardation</i>
KEK	Kekurangan Energi Kronik
Kkal	Kilokalori
KMK	Kecil Masa Kehamilan
LILA	Lingkar Lengan Atas
NKB SMK	Neonatus Kurang Bulan Sesuai Masa Kehamilan
NLB	Neonatus Lebih Bulan
PIH	<i>Pregnancy Induced Hypertension</i>
PTM	Penyakit Tidak Menular
VLBW	<i>Very Low Birth Weight</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Hipotesis Penelitian	6
F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	8
G. Kajian Pustaka	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Pengertian Berat Badan Lahir Rendah	23
B. Klasifikasi Berat Badan Lahir Rendah.....	23
C. Permasalahan pada BBLR.....	24
D. Faktor Risiko Kejadian BBLR	26
E. Prognosis BBLR.....	42
F. Konsep Masalah Janin Dalam Perspektif Islam.....	42
G. Kerangka Teori.....	60
H. Kerangka Konsep	61
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian.....	62

B. Lokasi dan waktu Penelitian.....	62
C. Populasi dan Sampel.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Instrumen Penelitian.....	64
F. Teknik Analisis Data	65
G. Etika Penelitian	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
B. Hasil Penelitian	71
C. Pembahasan.....	93
D. Keterbatasan Penelitian.....	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	105
RIWAYAT HIDUP.....	167

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu Mengenai Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	11
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Umur Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	71
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Pendidikan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	72
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Pekerjaan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	72
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Tinggi Badan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	73
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Umur Ayah di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	74
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Pendidikan Ayah di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	74
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Pekerjaan Ayah di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	75
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Tinggi Badan Ayah di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	76
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Umur Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	77
Tabel 4.10	Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	77
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Riwayat Berat Badan Lahir Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	78
Tabel 4.12	Distribusi Frekuensi Usia Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	79
Tabel 4.13	Distribusi Frekuensi Kekurangan Energi Kronik di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	80
Tabel 4.14	Distribusi Frekuensi Paritas di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	80
Tabel 4.15	Distribusi Frekuensi Konsumsi <i>Junk Food</i> Ketika Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	81
Tabel 4.16	Distribusi Frekuensi Usia Kehamilan di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	82
Tabel 4.17	Distribusi Frekuensi Komplikasi Kehamilan di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	83

Tabel 4.18 Risiko Usia Ibu Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	84
Tabel 4.19 Risiko Kekurangan Energi Kronik Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	85
Tabel 4.20 Risiko Paritas Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	86
Tabel 4.21 Risiko Konsumsi <i>Junk Food</i> Ketika Hamil Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	87
Tabel 4.22 Risiko Usia Kehamilan Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	88
Tabel 4.23 Risiko Komplikasi Kehamilan Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	89
Tabel 2 24 Hasil Analisis Bivariat Untuk Menilai Variabel Yang Diikuti Dalam Analisis Multivariat	90
Tabel 4.25 Hasil Analisis Multivariat Antara Kekurangan Energi Kronik, Paritas, Konsumsi <i>Junk Food</i> dan Usia Kehamilan Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	91
Tabel 4.26 Hasil Analisis Multivariat Antara Kekurangan Energi Kronik, Konsumsi <i>Junk Food</i> dan Usia Kehamilan Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	92
Tabel 2.27 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teori.....	60
Gambar 2. 2 Kerangka Konsep	61
Gambar 2. 3 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Caile.....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	127
Lampiran 2 Informed Consent	131
Lampiran 3 Keterangan Layak Etik	132
Lampiran 4 Izin Penelitian.....	132
Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian.....	135
Lampiran 6 Master Tabel Responden.....	136
Lampiran 7 <i>Output Analisis Data Statistical Product and Service Solutions</i> <i>(SPSS)</i>	149
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian.....	163



ABSTRAK

Nama : Hidayatul Muzdalifah

NIM : 70200119096

Judul : Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan suatu keadaan dimana bayi dengan berat badan lahirnya kurang dari 2.500 gr. Menurut WHO diperkirakan 15% - 20% dari seluruh kelahiran di dunia mengalami berat badan lahir rendah, yang mewakili lebih dari 20 juta kelahiran per tahun dan 95% diantaranya terjadi di negara-negara berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan penelitian *case control*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 132 responden (sampel kasus 66 dan kontrol 66).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada risiko antara kekurangan energi kronik ($p= 0,000$; OR =43,429), paritas ($p= 0,000$; OR = 1,426), konsumsi *junk food* ketika hamil ($p= 0,000$; OR = 19,776), usia kehamilan ($p= 0,000$; OR = 28,500) dengan kejadian BBLR dan tidak ada risiko antara usia ibu ($p= 0,182$) dan komplikasi kehamilan ($p= 0,137$) dengan kejadian BBLR. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel yang paling berisiko terhadap kejadian BBLR adalah usia kehamilan (OR = 21,793). Bagi ibu hamil agar dapat melakukan pemantauan kesehatan sesuai usia kehamilan sehingga ibu yang diduga berisiko melahirkan bayi dengan BBLR dapat dideteksi secara dini.

Kata Kunci : *Usia Ibu, Kekurangan Energi Kronik, Paritas, Konsumsi Junk Food, Usia Kehamilan, Komplikasi Kehamilan, BBLR*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator pertama dalam menentukan derajat kesehatan anak. Selain itu, angka kematian bayi juga merupakan cerminan dari status kesehatan masyarakat. Sebagian besar penyebab kematian bayi dan balita adalah masalah yang terjadi pada bayi baru lahir/neonatal (umur 0-28 hari). Permasalahan neonatal meliputi asfiksia (kesulitan bernafas saat lahir), BBLR dan infeksi (Depkes RI, 2019).

World Health Rankings tahun 2020 melaporkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 76 dari 183 negara di dunia yang mengalami angka kematian akibat BBLR mencapai 22.326 atau 1,32% dari total kematian infeksi (*World Health Rankings*, 2020).

Kementerian Kesehatan RI dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 melaporkan bahwa dalam 5 tahun terakhir di Indonesia mengalami angka kematian bayi sebanyak 24 per 1.000 kelahiran hidup dan pada kelompok neonatal sebanyak 15 per 1.000 kelahiran hidup, dimana penyebab kematian neonatal terbanyak salah satunya adalah kondisi BBLR sekitar 19%. Angka tersebut masih cukup jauh dari target tahun 2024, dimana angka kematian neonatal diharapkan turun menjadi 10 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup (Renstra Kemenkes RI 2020-2024).

Berat badan lahir rendah telah didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai berat lahir kurang dari 2.500 gr (5,5

pon). Berat badan lahir rendah disebabkan oleh hambatan pertumbuhan intrauterin, prematuritas atau keduanya. Ini berkontribusi pada berbagai hasil kesehatan yang buruk misalnya, hal ini terkait erat dengan mortalitas dan morbiditas janin dan neonatus, hambatan pertumbuhan dan perkembangan kognitif, dan PTM di kemudian hari (WHO & UNICEF, 2019).

Prevalensi global berat badan lahir rendah (BBLR) menurut WHO diperkirakan 15% - 20% dari seluruh kelahiran di dunia mengalami berat badan lahir rendah, yang mewakili lebih dari 20 juta kelahiran per tahun dan 95% diantaranya terjadi di negara-negara berkembang (WHO, 2019). Di Indonesia, berdasarkan data yang dilaporkan dari 34 provinsi kepada Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, pada tahun 2021 terdapat 3.632.252 bayi baru lahir yang dilaporkan ditimbang berat badannya (81,8%). Sementara itu, dari bayi yang ditimbang terdapat 111.719 bayi BBLR (2,5%) (Direktorat Gizi Masyarakat, 2019).

Di Sulawesi Selatan, data Profil Kesehatan Indonesia melaporkan bahwa pada tahun 2019 angka kejadian BBLR sebanyak 6.478 kasus dari 168.185 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 4,4% (Profil Kesehatan Indonesia, 2019). Tahun 2020 mencapai 6.353 kasus BBLR dari 167.083 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 4,2% (Profil Kesehatan Indonesia, 2020). Kemudian di tahun 2021 prevalensi BBLR sebanyak 6.254 kasus dari 144.079 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 4,4% (Profil Kesehatan Indonesia, 2021).

Profil Kesehatan kabupaten/ kota tahun 2019 jumlah bayi lahir hidup sebesar 150.624, bayi lahir hidup ditimbang sebesar 152.729 atau sebesar 99,97% dengan jumlah BBLR yaitu 7.059 kasus atau 4,62%.

Terbanyak di Kota Makassar sebesar 1.625 kasus, Kabupaten Bone 438 kasus, Wajo 386 kasus dan Kabupaten Gowa 341 kasus. Terendah di Kabupaten Luwu Utara 95 kasus dan Kabupaten Selayar 109 kasus. Namun secara persentase kasus BBLR tertinggi terjadi di Kabupaten Sinjai 8,01% dan Kabupaten Soppeng 7,21%, angka ini lebih besar dari target BBLR yang ditetapkan maksimal 7%. Untuk Tahun 2020 jumlah bayi lahir hidup sebesar 154.733. Bayi lahir hidup ditimbang sebesar 149.676 atau 96,37% dengan jumlah BBLR 6.353 kasus atau sebesar 4,24%. Tertinggi di Kabupaten Bulukumba sebanyak 888 kasus atau sebesar 13,12%. Terendah di Kabupaten Tana Toraja 65 kasus atau sebesar 1,86% (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, prevalensi kejadian BBLR di tahun 2021 sebanyak 284 kasus dan di tahun 2022 sebanyak 366 kasus. Dari seluruh puskesmas yang ada di kabupaten Bulukumba, puskesmas dengan prevalensi bayi BBLR terbanyak berada di wilayah kerja Puskesmas Caile dengan total BBLR sebanyak 66 kasus di tahun 2022.

Penyebab BBLR umumnya tidak hanya satu, sehingga kadang sulit untuk dilakukan pencegahan. Faktor risiko kejadian BBLR diantaranya ibu hamil berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, jarak kehamilan terlalu pendek, ibu mempunyai riwayat BBLR sebelumnya, mengerjakan pekerjaan fisik, mengerjakan pekerjaan fisik beberapa jam tanpa istirahat, sangat miskin, beratnya kurang dan kurang gizi, perokok, pengguna obat terlarang, alkohol, anemia, preeklampsia atau hipertensi, infeksi selama kehamilan, kehamilan ganda, bayi dengan cacat bawaan dan infeksi selama dalam kandungan (Depkes RI, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021) di RS Dustira Cimahi menemukan bahwa variabel yang berhubungan dengan BBLR adalah status gizi dan anemia pada ibu hamil. Penelitian yang dilakukan oleh Srimiyati & Ajul (2021) menemukan bahwa usia ibu hamil, usia kehamilan, pekerjaan ibu, komplikasi kehamilan, dan jenis kelamin bayi berhubungan dengan kejadian BBLR. Variabel yang berhubungan dengan kejadian BBLR menurut penelitian yang dilakukan oleh Sohibien & Jualeni (2019) yaitu hamil pertama ibu, kelayakan sanitasi, pendidikan tertinggi ibu, status tempat tinggal, dan jenis penolong persalinan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang dikaji dalam penelitian ini yaitu “ apakah faktor yang berisiko terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor risiko kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022”.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui faktor risiko usia ibu dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- b. Mengetahui faktor risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- c. Mengetahui faktor risiko paritas dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- d. Mengetahui faktor risiko konsumsi junk food dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- e. Mengetahui faktor risiko usia kehamilan dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- f. Mengetahui faktor risiko komplikasi kehamilan dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- g. Mengetahui variabel yang paling berisiko dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan tentang faktor yang berisiko terhadap kejadian BBLR di Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sumber informasi tentang faktor risiko yang menjadi penyebab BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.

b. Bagi Institusi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan, kebijakan dan program pengendalian kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan kajian tentang faktor yang berisiko terhadap kejadian BBLR sehingga peneliti lain dapat menambahkan faktor lain yang belum ada sebagai penelitian selanjutnya.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha (alternatif) :

- a. Ada risiko usia ibu dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.

- b. Ada risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) dengan kejadian BBLR di wilayah Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- c. Ada risiko paritas dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- d. Ada risiko konsumsi *junk food* ketika hamil dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- e. Ada risiko usia kehamilan dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- f. Ada risiko komplikasi kehamilan dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.

Ho (nol):

- a. Tidak ada risiko usia ibu dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- b. Tidak ada risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- c. Tidak ada risiko paritas dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- d. Tidak ada risiko konsumsi *junk food* ketika hamil dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.
- e. Tidak ada risiko usia kehamilan dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.

- f. Tidak ada risiko kehamilan komplikasi kehamilan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Variabel Dependen

a. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

BBLR yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bayi yang lahir dengan berat badan saat lahir kurang dari 2.500 gr. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) BBLR : apabila berat badan lahir bayi < 2.500 gr
- 2) Tidak BBLR : apabila berat badan lahir bayi ≥ 2.500 gr

(WHO, 2019)

2. Variabel Independen

a. Usia Ibu

Umur pada saat melahirkan anak terakhir dalam rumah tangga. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) Risiko tinggi : apabila usia < 20 tahun dan > 35
- 2) Risiko rendah : apabila usia 20-35 tahun

(Kemenkes RI, 2021)

b. Kekurangan Energi Kronik (KEK)

KEK pada ibu hamil yang dilihat melalui pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA). Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) Risiko tinggi : apabila LILA $< 23,5$ cm

2) Risiko rendah : apabila LILA \geq 23,5 cm

(Permenkes RI, 2016)

c. Paritas

Jumlah anak yang telah dilahirkan oleh seorang ibu baik lahir hidup maupun lahir mati. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

1) Risiko tinggi : apabila ibu telah melahirkan 1 atau \geq 4 anak

2) Risiko rendah : apabila ibu telah melahirkan 2-3 anak

(Depkes, 2011)

d. Konsumsi *Junk Food*

Konsumsi junk food pada ibu hamil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran terhadap jenis dan frekuensi ibu hamil dalam mengkonsumsi junk food dalam satu minggu/bulan selama hamil. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

1) Risiko tinggi : mengkonsumsi *Junk Food* $>$ 3 kali dalam seminggu

2) Risiko rendah : mengkonsumsi *Junk Food* \leq 3 kali dalam seminggu

(Kemenkes RI, 2017)

e. Usia Kehamilan

Usia kandungan saat kehamilan terakhir. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

1) Risiko tinggi : bayi lahir $<$ 37 minggu

2) Risiko rendah : bayi lahir \geq 37 minggu

(WHO, 2004)

f. Komplikasi Kehamilan

Komplikasi yang terjadi selama kehamilan terakhir, dapat berupa pendarahan, preeklamsia/eklamsia, infeksi, ketuban pecah dini. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) Ya : apabila terdapat komplikasi yang terjadi selama kehamilan terakhir
- 2) Tidak : apabila tidak terdapat komplikasi yang terjadi selama kehamilan terakhir.

(Depkes, 2000).

G. Kajian Pustaka

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Mengenai Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

No	Tahun/ Negara	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	2019 Indonesia	Julina Br Sembiring, Debby Pratiwi, Aprilian Sarumaha	Hubungan Usia, Paritas Dan Usia Kehamilan Dengan Bayi Berat Lahir Rendah di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jbk/article/view/4110	Usia ibu, paritas, usia kehamilan	Survei analitik dengan pendekatan cross sectional	Penelitian menunjukkan variabel usia ibu dengan bayi berat lahir rendah dengan uji chi-square diperoleh hasil $p < 0.05 (0.000)$, paritas ibu dengan bayi berat lahir rendah dengan uji chi-square diperoleh hasil $p < 0.05 (0.034)$, dan usia kehamilan dengan bayi berat lahir rendah dengan uji chi-square diperoleh hasil $p < 0.05 (0.015)$.
2	2019 Indonesia	Susi Yunita Haryanti, Dina Rahayuning Pangestuti, Apoina	Anemia Dan Kek Pada Ibu Hamil Sebagai Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Studi di Wilayah Kerja	Anemia, KEK, paparan asap rokok	Analitik observasional dengan pendekatan case control	Variabel penelitian faktor risiko BBLR adalah anemia pada ibu ($p = 0.001$, $OR = 9.333$), KEK pada ibu ($p = 0.004$, $OR = 7.429$). Paparan asap rokok merupakan variabel confounding yang berhubungan dengan kejadian

No	Tahun/ Negara	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
		Kartini	Puskesmas Juwana Kabupaten Pati) https://ejournal3.unidip.ac.id/index.php/jkm/article/view/22978			BBLR (p=0,027).
3	2019 Inggris	Satvinder Kaur , Choon Ming Ng , Slyvia E. Badon , Rohana Abdul Jalil , Dhivyalosini Maykanathan , Hip Seng Yim & Hamid Jan Jan	Risk factors for low birth weight among rural and urban Malaysian women https://bmcpublishing.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4	Usia, paritas, LILA	Studi cross-sectional prospektif ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan pedesaan-perkotaan dalam faktor risiko berat badan lahir rendah pada wanita di Malaysia	Prevalensi keseluruhan bayi berat lahir rendah adalah 6,38%. Wanita pedesaan memiliki lebih banyak bayi berat lahir rendah daripada wanita perkotaan (9,8% vs 2,0%, p = 0,03). Regresi logistik mengungkapkan bahwa usia yang lebih tua (OR = 1,395, 95% CI = 1,053 hingga 1,846), paritas rendah (OR = 0,256, 95% CI = 0,088-0,747) dan lingkaran lengan atas rendah (OR = 0,738, 95% CI = 0,552 hingga 0,987) meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah di

No	Tahun/ Negara	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
		Mohamed				pedesaan, tetapi tidak pada wanita perkotaan.
4	2019 Amarika Serikat	Tesfahun Mulatu Wachamo, Nigus Bililign Yimer , Asmamaw Demis Bizuneh	Risk factors for low birth weight in hospitals of North Wello zone, Ethiopia: A case-control study https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213054	Usia kehamilan, pendidikan, berat badan ibu, kunjungan ANC, graviditas	Desain studi kasus-kontrol berbasis institusi dilakukan dari 10 April hingga 15 Desember 2016	Berat badan ibu selama kehamilan, pendidikan ayah, komplikasi kebidanan sebelumnya dan tempat pemantauan antenatal dikaitkan dengan berat badan lahir rendah.
5	2019 Indonesia	Padma Permana, Gede Bagus Rawida Wijaya	Analisis faktor risiko bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Gianyar I tahun 2016-2017	Usia ibu, jumlah paritas, status anemia, status gizi, jarak kehamilan dan	Sebuah studi analitik case-control dilakukan terhadap kelompok kasus ibu BBLR dan kelompok kontrol ibu dengan bayi berat normal pada	Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia ibu, jumlah paritas, status anemia, status gizi, dan jarak kehamilan dengan kejadian berat lahir rendah ($P > 0,05$). Namun, kehamilan ganda telah menunjukkan hubungan yang bermakna dengan BBLR (OR: 14,9; 95% IK 3,2-68,5; $P = 0,0001$)

No	Tahun/ Negara	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
			https://www.isainsmedis.id/index.php/ism/article/view/481	kehamilan ganda	tahun 2017.	maupun usia kehamilan (OR: 3,1; 95% IK 1,02-9,50; P = 0,038).
6	2020 Indonesia	Hatijar Hatijar	Faktor Risiko Bayi Berat Lahir Rendah di Rumah Sakit Umum Daerah Haji http://jurnal.poltekk.esmamuju.ac.id/index.php/b/article/view/205	Umur ibu, status gizi	Metode penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan cross sectional study.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara umur ibu, status gizi BBLR dengan nilai (p value = 0,00 < α = 0,05). Usia ibu dan status gizi merupakan faktor yang mempengaruhi berat badan lahir rendah dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia ibu dan status gizi terhadap kejadian berat badan lahir rendah.
7	2020 Amerika Serikat	Anil K. C.ID, Prem Lal Basel, Sarswoti Singh	Low birth weight and its associated risk factors: Health facility-based case-control study (Berat badan lahir	Memiliki dapur serumah, asupan zat besi kurang, kenaikan	Case control study dengan pendekatan fasilitas kesehatan	Regresi logistik multivariat menemukan bahwa memiliki dapur di rumah tinggal yang sama (AOR 2.7, CI: 1.5–4.8), asupan zat besi kurang dari 180 tablet (AOR 3.2, CI: 1.7–5.7), kenaikan berat

No	Tahun/ Negara	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
			rendah dan faktor risiko yang terkait: Studi kasus kontrol berbasis fasilitas kesehatan) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234907	berat badan ibu, penyakit penyerta selama kehamilan dan kelahiran prematur.		badan ibu selama trimester kedua dan ketiga lebih sedikit dari 6,53 kg (AOR 2,6, CI: 1,5-4,7), komorbiditas selama kehamilan (AOR 2,4, CI: 1,3-4,5), kelahiran prematur (AOR 2,9, CI: 1,4-6,1) adalah faktor risiko yang terkait dengan kelahiran rendah berat.
8	2020 Amerika Serikat	M. Mazharul Islam, Faisal Ababneh, Tahmina Akter and M. Hasinur R. Khan	Prevalence and risk factors for low birth weight in Jordan and its association with under-five mortality: a population-based analysis https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901 Preval	Data dikumpulkan pada karakteristik anak dan ibu	Dalam analisis sekunder ini, data diambil dari 2012 Jordan Population and Family Health Survey untuk 9734 kelahiran hidup dalam 5 tahun sebelum survei dan berat lahir yang dilaporkan. Data	Dari 9734 kelahiran yang dianalisis, 13,8% memiliki berat lahir rendah dan 1,3% memiliki berat lahir sangat rendah. Usia ibu (< 30 dan ≥ 35 tahun), pendidikan (kurang dari pendidikan tinggi), jarak kelahiran (< 24 bulan dan kelahiran pertama), kehamilan yang tidak direncanakan, status kekayaan rumah tangga (termiskin dan terkaya), kekerabatan, tempat

No	Tahun/ Negara	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
			ence and risk factors for low birth weight in Jordan and its association with under-five mortality a populationbased analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf		dikumpulkan pada karakteristik anak dan ibu	tinggal (wilayah tengah dan selatan Yordania), jenis kelamin perempuan, urutan kelahiran (1 dan ≥ 6), kelahiran kembar dan merokok ibu selama kehamilan adalah faktor risiko yang signifikan untuk berat badan lahir rendah.
9	2021 Indonesia	Adriana Mapandin, Erni Yetti R, Sri Wulan	Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Lakipadada Kabupaten Tana	Anemia, paritas, frekuensi kunjungan ANC,	Observasional analitik dengan desain penelitian kasus kontrol (Case Control)	Hasil penelitian menemukan dari lima variabel berisiko terhadap kejadian BBLR, variabel-variabel (anemia OR= 1,294, p=0,005, frekuensi kunjungan ANC OR=

No	Tahun/ Negara	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
		Handayani	Toraja https://jurnal.unismuupalu.ac.id/index.php/MPPKI/article/view/1500	keterpaparan asap rokok. Stress kehamilan		2,715, $p=0,000$, keterpaparan asap rokok $OR=1,471$, $p=0,002$, stres kehamilan $OR=1,262$, $p=0,000$ dengan tingkat signifikan masing-masing $p<0,05$) terbukti berisiko terhadap BBLR.
10	2021 Indonesia	Myrna Lestari, Aida Fitriani, Nizan Maayah, N Norisa	Analisis Faktor Risiko Kejadian BBLR di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara https://ejournal.polt.ekkespontianak.ac.id/index.php/JKK/article/view/844	Usia ibu, paritas, risiko jarak kehamilan	Case control dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (metode campuran).	Pengujian analisis univariat, ditemukan usia ibu berisiko BBLR pada kasus; 55,6% pada kontrol 15,6%, paritas dalam kasus; 62,2% kontrol, 46,7%, jarak kehamilan pada kasus 22,2%, kontrol 4,4%, hasil uji bivariat dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan positif antara variabel usia ibu ($p = 0,000$), paritas ($p = 0,138$), masa kehamilan ($p = 0,000$), riwayat komplikasi ($p = 0,000$) dan riwayat sosial ekonomi keluarga ($p = 0,020$). dengan kejadian

No	Tahun/ Negara	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
						BBLR. Sedangkan variabel interval kehamilan ($p = 0,013$) tidak berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR.
11	2022 Kanada	Fitriani Hamsir, Suryani As'ad, Andi Mardiah Tahir, Deviana Soraya, Masita Fujiko, Sitti Maisuri T. Chaild, Irfan Idris, Agussalim Bukhari, Mochammad Hatta,	Macro- and Micronutrient of Junk Food and Preeclampsia on Pregnant Women https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macro+and+micronutrient+of+junk+food+and+preeclampsia+on+pregnant+women&btnG=	Asupan lemak, Vitamin C, Natrium, Frekuensi konsumsi <i>junk food</i>	Studi kasus-kontrol ini dilakukan pada 148 sampel, meliputi ibu hamil dengan preeklamsia ($n = 74$) dan ibu hamil normal ($n = 74$) dengan usia kehamilan > 20 minggu.	Regresi logistik biner menunjukkan bahwa asupan lemak ($p = 0,005$), vitamin C ($p = 0,002$), dan natrium ($p = 0,036$) yang terkandung dalam junk food berhubungan secara signifikan dengan PE. Frekuensi konsumsi junk food juga berpengaruh signifikan terhadap kejadian preeklamsia ($p=0,013$).

No	Tahun/ Negara	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
		Burhanuddin Bahar, Suradi Efendi				
12	2022 Indonesia	Rida Amelia, Sartika, Mansur Sididi	Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Kaluku Bodoa Kota Makassar <a href="https://jurnal.fkm.u
mi.ac.id/index.php/
woph/article/view/
366">https://jurnal.fkm.u mi.ac.id/index.php/ woph/article/view/ 366	Umur ibu saat melahirkan, tingkat pendidikan ibu, tinggi badan ibu, komplikasi kehamilan, riwayat penyakit, kekurangan energi kronik	Epidemiologi analitik dengan rancangan case control	Dari hasil analisis menggunakan uji chi-square dan Odd Rasio bahwa umur ibu saat melahirkan, tingkat pendidikan ibu dan tinggi badan ibu bukan merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap kejadian BBLR di Wilayah Puskesmas Kaluku Bodoa Kota Makassar dengan tingkat signifikan > 0,05. Sedangkan komplikasi kehamilan, riwayat penyakit dan kekurangan energi kronik merupakan faktor risiko kejadian BBLR di Wilayah Puskesmas Kaluku Bodoa Kota Makassar dengan tingkat signifikan < 0,05.

No	Tahun/ Negara	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
13	2022 Indonesia	Ria Pancawardani, Rizky Amelia, Sri Wahyuni	Usia Kehamilan Ibu Mempengaruhi Keluaran Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah https://ejournal.polt.ekkesmsg.ac.id/ojs/index.php/micajo/article/view/8312	Umur ibu, pendidikan, paritas, umur kehamilan, umur kehamilan, preeklampsia, jumlah ANC, LILA, dan kadar Hb	Observasi analitik dengan pendekatan case control	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas yang mempengaruhi kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah umur kehamilan ibu. Usia kehamilan ibu menghasilkan p-value sebesar 0,001, sehingga variabel ini memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR). Variabel yang tidak mempengaruhi kejadian BBLR adalah umur, pendidikan, paritas, jarak kehamilan, preeklampsia, jumlah ANC, LILA, dan kadar Hb
14	2022 Indonesia	Nurhayati, Sitti Hadriyanti Hamang, Halida Thamrin	Faktor Risiko Umur, Paritas, dan Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil terhadap Kejadian Berat Badan Lahir Rendah	Lingkar lengan atas, umur ibu, paritas	Survey analitik dengan pendekatan case control study	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh dan bermakna antara lingkar lengan atas ibu dengan kejadian BBLR, berisiko tapi tidak bermakna antara umur ibu dengan kejadian

No	Tahun/ Negara	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
			<a href="https://jurnal.fkm.u
mi.ac.id/index.php/
wom/article/view/3
40">https://jurnal.fkm.u mi.ac.id/index.php/ wom/article/view/3 40			BBLR, tidak berisiko dan tidak bermakna tetapi merupakan faktor protektif antara paritas ibu dengan kejadian BBLR.
15	2022 Indonesia	Andi Nisa Fathimiyah Afidah, Rahma Rahma, Stang	Analisis Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah	Anemia, Paritas, Usia Ibu	Studi kasus kontrol yang berlangsung pada bulan Maret-April 2023 di RSIA Ananda Makassar	Faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR adalah usia ($p=0,002$), paritas ($p=0,009$), dan anemia ($p=0,013$). Adapun variabel yang bukan faktor risiko BBLR adalah pendidikan ($p=1,00$), pekerjaan ($p=0,599$), hipertensi ($p=0,49$) dan kehamilan kembar ($p=0,303$).

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek penelitian, variabel, waktu dan tempat penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah ibu yang melahirkan di Puskesmas Caile pada periode Januari-Desember tahun 2022 dan peneliti menambahkan variabel kebiasaan konsumsi *Junk Food* dimana variabel tersebut belum pernah diteliti sebelumnya. Waktu penelitian diambil pada bulan Agustus-September 2023 dan tempat penelitian adalah di Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Berat Badan Lahir Rendah

Definisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut World Health Organization (WHO) merupakan berat badan saat lahir < 2.500 gr (< 5,5 pon). Bayi berat lahir rendah sekitar 20 kali untuk mengalami kematian dibandingkan dengan bayi yang berat badannya lebih berat/normal. Berat badan lahir rendah sering terjadi di negara berkembang daripada negara maju (WHO, 2019).

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) mendefinisikan berat badan lahir rendah sebagai persentase bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram saat lahir. Berat badan lahir rendah dianggap sebagai salah satu indikator terpenting peluang kelangsungan hidup bayi baru lahir (WHO & UNICEF, 2023).

B. Klasifikasi Berat Badan Lahir Rendah

Adapun klasifikasi berat badan lahir rendah (BBLR) menurut WHO (2018), antara lain :

- a. Klasifikasi BBLR berdasarkan berat lahir
 - 1) Bayi yang berat lahirnya kurang dari 2.500 gr, disebut bayi berat lahir rendah (BBLR)
 - 2) Bayi dengan berat lahir sangat rendah (BBLSR) atau very low birth weight (VLBW) adalah bayi yang lahir dengan berat badan lahir antara 1.000-1.500 gr.
 - 3) Bayi berat lahir amat sangat rendah (BBLASR) adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 1.000 gr.

b. Klasifikasi BBLR menurut gestasi/masa kehamilan :

1) Prematuritas murni

Kelahiran prematur murni adalah berat badan lahir rendah dengan usia kehamilan < 37 minggu dengan berat badan sesuai usia kehamilannya. Hal ini sering disebut dengan neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan (NKB-SMK). WHO (2018) mengatakan, prematuritas dapat diklasifikasikan menjadi :

- a) Extremely preterm, yaitu bayi prematur yang usia kehamilannya kurang dari 28 minggu.
- b) Very preterm, yaitu bayi prematur yang usia kehamilannya antara 28 minggu dan kurang 32 minggu.
- c) Moderate to late preterm, yaitu bayi prematur yang usia kehamilannya antara 32 minggu dan kurang dari 37 minggu.

2) Dismaturitas

Dismaturitas merupakan bayi yang berat badannya di bawah berat badan kehamilan normal, yaitu berat badan berada kurang dari persentil ke-10 pada kurva pertumbuhan intrauterin (grafik lubchenco) kondisi ini disebut Kecil Masa Kehamilan (KMK). Penyebab Kecil Masa Kehamilan adalah terjadinya pertumbuhan janin terganggu atau intrauterine growth retardation (IUGR) (Sembiring et al., 2019).

C. Permasalahan pada BBLR

Bayi dengan BBLR lebih mudah mengalami kematian atau mengalami masalah kesehatan yang serius. Berat bayi dan masa

kehamilan menggambarkan risiko semakin kecil berat bayi dan semakin muda masa kehamilan maka semakin besar risikonya (Depkes, 2014).

1. Asfiksia

BBLR bisa kurang, cukup atau lebih bulan, semuanya berdampak pada proses adaptasi pernafasan waktu lahir sehingga mengalami asfiksia lahir. BBLR membutuhkan kecepatan dan keterampilan dalam tindakan resusitasi.

2. Gangguan pernafasan

Gangguan nafas yang sering terjadi pada BBLR kurang bulan adalah penyakit membran hialin, sedangkan pada BBLR lebih bulan adalah aspirasi mekonium.

3. Hipotermia

Hipotermia terjadi karena hanya sedikitnya lemak tubuh dan sistem pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir belum matang.

4. Hipoglikemia

Hipoglikemia terjadi karena hanya sedikitnya simpanan energi pada bayi baru lahir dengan BBLR sehingga membutuhkan ASI sesegera mungkin setelah lahir.

5. Infeksi

Infeksi terjadi karena sistem kekebalan tubuh BBLR belum matang. Oleh karena itu, keluarga dan petugas kesehatan harus menjaga kebersihan agar tidak terjadi penularan.

6. Ikterus (kadar bilirubin yang tinggi)

Ikterus terjadi karena fungsi hati belum matang. Bayi dengan BBLR menjadi kuning lebih awal dan lebih lama dari pada bayi yang cukup beratnya.

7. Masalah pendarahan

Masalah pendarahan berhubungan dengan belum matangnya sistem pembekuan darah saat lahir.

Berat lahir sangat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan balita jangka panjang. Bayi dengan BBLR juga berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang dan dapat kehilangan fungsi intelektual. Selain itu, bayi lebih rentan mengalami infeksi dan hipotermia (Azriful et al., 2018).

D. Faktor Risiko Kejadian BBLR

Menurut WHO (2004), bayi dengan BBLR adalah salah satu hasil dari kelahiran prematur (sebelum 37 minggu kehamilan) atau pembatasan pertumbuhan janin (intrauterine). Berat lahir rendah sangat erat kaitannya dengan mortalitas dan morbiditas janin dan neonatal, menghambat pertumbuhan dan perkembangan kognitif dan penyakit kronis. Banyak faktor yang mempengaruhi durasi kehamilan dan pertumbuhan janin yang akan berpengaruh pada berat bayi.

Faktor risiko kejadian BBLR menurut WHO (2004), Depkes RI (2009) dan Manuaba (2010) antara lain :

1. Faktor Ibu

a. Usia < 20 tahun dan > 35 tahun

Usia adalah umur seseorang yang dihitung mulai dilahirkan sampai dengan ulang tahun. Ibu hamil yang memiliki umur < 20 tahun merupakan usia ibu yang berisiko mengalami permasalahan kesehatan 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang memiliki usia yang cukup. WHO menganjurkan bahwa usia yang dianggap ideal untuk menjalani kehamilan dan persalinan adalah 20

hingga 35 tahun. Persentase tertinggi bayi dengan berat badan lahir rendah terdapat pada kelompok remaja dan wanita berusia lebih dari 40 tahun (WHO, 2018).

Usia ibu memiliki peran penting selama masa kehamilan, usia yang memiliki resiko tinggi terjadinya BBLR yaitu usia < 20 tahun dan > 35 tahun. Hal ini dikarenakan penyaluran nutrisi dari ibu ke janin tidak adekuat. Usia ibu < 20 tahun dimana organ reproduksi belum berfungsi sempurna, sedangkan usia > 35 tahun terjadinya penurunan fungsi organ reproduksi, penurunan fungsi hormon-hormon yang mengatur organ reproduksi, penyakit penyerta yang dibawa oleh ibu seperti hipertensi dan diabetes melitus (Helena et al., 2021).

Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Fungsi sistem organ reproduksi pada remaja, salah satunya ovarium mulai berfungsi karena adanya pengaruh dari hormon gonadotropin, sehingga apabila remaja tersebut mengalami persaingan zat-zat penting untuk proses pematangan dan harus didukung oleh asupan makanan dan zat penting lainnya. Kehamilan pada remaja usia < 20 tahun cenderung membutuhkan gizi lebih untuk pertumbuhan janin dan pertumbuhan fisik remaja, serta membutuhkan kesiapan dari segi psikologis untuk menerima kehamilannya (Widyastuti & Azinar, 2021).

Penelitian yang dilakukan Lestari (2021) juga menyebutkan bahwa usia ibu < 20 tahun dan > 35 tahun lebih beresiko terhadap terjadinya BBLR sebanyak 6,786 kali jika dibandingkan usia ibu yang berusia ≥ 20 dan ≤ 35 tahun. Tubuh seorang remaja belum siap untuk

mengalami kehamilan hal ini juga dapat disebabkan kecukupan gizi pada usia tersebut, jika kehamilan terjadi pada usia tersebut maka resiko melahirkan berat bayi lahir rendah menjadi lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia normal.

b. Paritas

Paritas merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan jumlah kelahiran yang dialami ibu. Kesejahteraan janin selama kehamilan dapat dipengaruhi oleh paritas yang merupakan masalah yang signifikan. Kemungkinan kejadian BBLR dapat meningkat dengan status paritas tinggi. Hal ini terjadi ketika kapasitas rahim untuk menyediakan nutrisi selama kehamilan menurun, sehingga penyaluran nutrisi antara ibu dan janin (WHO, 2018).

Paritas yang berisiko terhadap kejadian berat badan lahir rendah yakni 1 anak atau ≥ 4 anak, serta rentan paritas yang tidak berisiko yaitu 2 sampai 3 anak. Pada anak dengan kehamilan pertama akan meningkatkan risiko kelahiran BBLR karena faktor pengalaman dan merupakan tempat jalan yang lahir baru yang akan dijalani rahim. Jika melahirkan ≥ 4 kali, kemampuan rahim akan menurun yang diakibatkan jaringan parut uterus sehingga persediaan darah ke plasenta tidak adekuat yang berujung pada kurang optimalnya nutrisi ke janin akibat aliran darah yang tidak cukup (Depkes, 2011).

c. Jarak Kehamilan

Jarak kehamilan adalah selisih waktu antara kehamilan sebelumnya dengan kehamilan selanjutnya. Jarak kehamilan yang terlalu dekat perlu diwaspadai karena fungsi alat reproduksi tidak berfungsi secara optimal sehingga memungkinkan pertumbuhan

janin kurang baik. Selain itu bayi yang dilahirkan dapat mengalami berat badan lahir rendah, nutrisi kurang baik, waktu/lama menyusui berkurang. Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun dapat menimbulkan pertumbuhan janin yang kurang baik, persalinan lama dan pendarahan saat persalinan karena rahim belum pulih dengan baik. Jarak kelahiran lebih lama akan memberikan kesempatan pada ibu untuk memperbaiki gizi dan kesehatannya (Manuaba, 2012).

Jarak kehamilan sangat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janin sehingga seorang wanita perlu waktu 2-3 tahun untuk pulih sempurna dan siap untuk hamil lagi. kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat mengindikasikan kurang siapnya rahim untuk menjadi tempat implantasi embrio sehingga jika terjadi kehamilan maka pertumbuhan juga tidak optimal. Jarak kehamilan yang < 2 tahun meningkatkan kejadian bayi berat lahir rendah karena pada masa tersebut alat reproduksi belum pulih sempurna sehingga asupan nutrisi yang dihasilkan kurang dan akan mempengaruhi pertumbuhan janin (Arsesiana, 2021).

Jarak kehamilan yang pendek akan menyebabkan seorang ibu belum cukup waktu untuk memulihkan kondisi tubuh kurang sehat inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab kematian ibu dan bayi yang dilahirkan serta risiko terganggunya sistem reproduksi. Sistem reproduksi yang dikandungnya sehingga berpengaruh terhadap berat badan lahir. Ibu hamil yang jarak kehamilannya kurang dari dua tahun, kesehatan fisik dan kondisi rahimnya masih butuh istirahat yang cukup .

Penelitian yang dilakukan Wahyuni et al., (2021) juga menyebutkan bahwa ibu dengan jarak kehamilan terlalu dekat memiliki risiko terjadi BBLR. Jarak kehamilan ibu yang dekat akan menyebabkan kondisi seorang ibu belum cukup waktu untuk memulihkan kondisi fisiologi tubuhnya setelah melahirkan sebelumnya. Kondisi tubuh ibu hamil yang kurang sehat inilah yang dapat menjadi faktor penyebab terganggunya sistem reproduksi sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandung sehingga berpengaruh terhadap berat badan saat lahir.

d. Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu yang dilakukan, diperbuat, dikerjakan untuk mendapatkan nafkah atau menghasilkan uang. Jadi pekerjaan yang dilakukan akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan seseorang, tetap atau tidaknya menerima penghasilan dan waktu menerima gaji atau upah "*labour force concept*" (Sukfitrianty et al., 2016).

Pekerjaan dapat mempengaruhi kejadian BBLR hal ini berkaitan dengan daya beli dan kemampuan ekonomi untuk pemenuhan kecukupan asupan nutrisi dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan, disamping itu masalah pekerjaan berhubungan dengan aktivitas fisik karena berhubungan dengan faktor kelelahan, mengangkat beban berat serta kompensasi nilai uang yang didapat sebagai upah gaji, jika pendapatan rendah maka kemungkinan untuk biaya pemeriksaan dan perawatan selama masa kehamilan tidak dilaksanakan (Helena et al., 2021).

Menurut Sastri (2022) pekerjaan juga dihubungkan dengan penghasilan yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi wanita hamil tersebut. BBLR dapat terjadi pada wanita yang bekerja terus menerus selama kehamilan, terutama bila pekerjaan tersebut memerlukan kerja fisik atau berdiri untuk waktu yang lama. Keadaan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan serta kesejahteraan janin yang dikandungnya.

e. Pendidikan

Tingkat pendidikan ibu akan menentukan tingkat pemahaman dan penerimaan seseorang terhadap suatu pengetahuan, hal ini sejalan dengan konsep teori dari Lawrence Green, bahwa pengetahuan merupakan faktor predisposing dan berpengaruh terhadap perilaku seseorang (Helena et al., 2021).

Pendidikan memegang peranan penting pada pembangunan sosial dan ekonomi yang akan berdampak pada status kesehatan. Kurangnya pendidikan akan berimplikasi pada kurangnya kemampuan untuk menemukan, memahami dan menggunakan informasi kesehatan yang tersedia. Tingkat pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi berat badan lahir bayi melalui pengetahuan yang diperoleh terkait perawatan dan nutrisi selama kehamilan (Sadarang, 2021).

Semakin tinggi pendidikan ibu maka akan semakin mudah ibu dalam mencerna informasi yang diperolehnya. Ibu hamil dengan pendidikan tinggi dapat lebih mudah memperoleh dan mencerna informasi seputar kehamilan sehingga dapat mengatur dengan baik

asupan dan perawatan apa saja yang perlu dilakukan agar bayi yang dilahirkan dalam kondisi sehat (Sohibien & Yuhan, 2019).

f. Tingkat Ekonomi

Faktor risiko kelangsungan hidup ibu dan bayi secara tidak langsung mungkin disebabkan oleh sosial ekonomi masyarakat. Populasi ini biasanya sulit dijangkau layanan dan informasi kesehatan. Serupa dengan ini, kelompok berpenghasilan rendah biasanya menunjukkan tingkat kemandirian dan keterlibatan yang tidak dapat diterima dalam merencanakan kegiatan pengembangan kesehatan prenatal (Riska et al., 2022).

Anak yang dibesarkan di keluarga yang memiliki ekonomi tinggi dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan baik dibandingkan dengan anak yang dibesarkan di keluarga yang berekonomi rendah (Sembiring et al., 2019). Menurut Sitorus et al., (2022) salah satu penyebab terjadinya BBLR adalah faktor sosial ekonomi terutama pendapatan secara logika dengan pendapatan yang mencukupi maka daya beli juga akan meningkat secara keseluruhan termasuk untuk konsumsi. Pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kualitas dan kuantitas hidangan. Semakin tinggi status ekonomi maka semakin baik makanan yang diperoleh. Dengan kata lain, semakin tinggi penghasilan tersebut untuk membeli daging, buah, sayuran dan beberapa jenis bahan makanan lainnya.

g. Merokok

Ibu yang merokok memiliki peluang lebih besar melahirkan bayi BBLR dari pada yang tidak merokok karena kandungan nikotin pada rokok akan menimbulkan kontraksi pada pembuluh darah yang

mengakibatkan aliran darah janin akan berkurang dan distribusi zat-zat yang bermanfaat bagi janin ikut berkurang. Sedangkan karbon monoksida pada rokok dapat mengikat HB dalam darah yang menyebabkan distribusi zat makanan ke janin menjadi terganggu sehingga bayi yang dilahirkan berisiko memiliki berat badan yang rendah (Sohibien & Yuhan, 2019).

h. Alkohol

Penggunaan alkohol dan rokok secara aktif maupun pasif dapat menyebabkan efek negatif pada tubuh manusia. Alkohol merupakan salah satu zat teratogen yang dapat menyebabkan gangguan pada kehamilan. Alkohol dapat melintasi plasenta barrier atau penghalang plasenta dan diketahui bahwa metabolisme alkohol pada janin dua kali lebih lambat dibandingkan pada ibu. Konsumsi alkohol pada ibu hamil dapat menyebabkan aborsi spontan, kelahiran prematur, atresia anal, hambatan pertumbuhan serta melahirkan bayi dengan BBLR (Fitriana, 2019).

i. Kekurangan Energi Kronik (KEK)

Suatu kondisi yang disebut kekurangan energi kronis menyebabkan ibu hamil mengalami malnutrisi kronis jangka panjang (asupan rendah kalori dan protein) yang mencegah tubuh mereka mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Akibatnya, tubuh mengalami perubahan yang tidak sepenuhnya ideal, baik secara fisik maupun mental (Kemenkes RI, 2019).

Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi,

asfiksia intrapartum (mati dalam kandungan), lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Gizi yang jelek sebelum terjadinya kehamilan maupun pada waktu sedang hamil, lebih sering mengakibatkan abortus, BBLR, hambatan pertumbuhan otak janin, anemia pada bayi baru lahir, bayi lahir mudah terkena infeksi, lahir mati dan jarang menyebabkan cacat bawaan (Riska et al., 2022).

Lingkar Lengan Atas (LILA) merupakan indikator status gizi ibu hamil. LILA diasumsikan ukuran yang tidak terpengaruh dengan berat badan ibu dan bayi dalam kandungan. Di Indonesia batas ambang LILA normal adalah 23,5 cm. Ibu hamil dengan ukuran LILA < 23,5 cm berisiko menderita KEK yang menyebabkan prematuritas dan risiko Berat Badan Lahir Rendah (Permenkes RI, 2016).

Ibu hamil yang KEK akan berpengaruh terhadap persalinan seperti persalinan sulit dan lama, persalinan belum waktunya (prematuur), pendarahan setelah persalinan dan persalinan dengan proses operasi semakin meningkat. Ibu hamil yang mengalami KEK juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin seperti keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, janin mati dalam kandungan serta lahir dengan BBLR (Haryanti, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia et al., (2022) yang menunjukkan bahwa wanita hamil pada kelompok yang memiliki LILA < 23,5 (Ada KEK) mempunyai risiko sebesar 4,561 kali untuk melahirkan BBLR dibandingkan dengan kelompok ibu yang LILA > 23,5. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2019) juga menunjukkan bahwa KEK

berisiko 2,654 kali menyebabkan BBLR dibandingkan ibu yang tidak mengalami KEK.

j. Anemia

Anemia adalah kondisi dimana kadar hemoglobin (Hb) di dalam darah kurang dari 12 g/dl. Anemia sering terjadi pada perempuan karena kurangnya asupan atau konsumsi makanan yang mengandung zat besi, pengaturan pola makan yang salah, gangguan haid/haid abnormal dan penyakit lainnya seperti kecacingan, malaria dan lain sebagainya. Pada ibu hamil, dikatakan anemia jika kadar Hb pada trimester I dan 3 < 11 g/dl atau pada trimester II < 10,5 g/dl (Kemenkes RI, 2021).

Anemia dalam kehamilan dapat terjadi karena peningkatan volume plasma darah yang menyebabkan kadar hemoglobin dalam darah menurun. Anemia gizi dimulai dengan menipisnya simpanan zat besi (ferritin) dan bertambahnya absorpsi zat besi yang digambarkan dengan meningkatnya kapasitas pengikatan besi, sehingga mengakibatkan habisnya simpanan besi, berkurangnya kejenuhan tranferin, berkurangnya jumlah protoporfirin yang diubah menjadi heme seiring dengan menurunnya kadar feritin serum. Sehingga terjadi anemia dengan ditandai rendahnya kadar Hb (Haryanti, 2019).

Ibu hamil yang menderita anemia menyebabkan kurangnya suplai darah pada plasenta yang akan berpengaruh pada fungsi plasenta terhadap janin. Ibu selama kehamilan mengalami perubahan fisiologis yang menyebabkan ketidakseimbangan jumlah plasma darah dan sel darah merah yang dapat dilihat dalam bentuk

penurunan kadar hemoglobin. Hal ini akan mempengaruhi oksigen ke rahim dan mengganggu kondisi intrauterine khususnya pertumbuhan janin akan terganggu sehingga berdampak pada janin lahir dengan BBLR (Haryanti, 2019).

Faktor penyebab anemia yaitu kepatuhan mengkonsumsi tablet zat besi, status gizi, pendapatan, pengetahuan, perilaku ibu hamil yang tidak baik, sosial ekonomi dan kurangnya pengayoman keluarga terhadap kedisiplinan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe (Koerniawati, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Mapandin et al., (2021) bahwa ibu yang mengalami anemia 1,294 kali berisiko mengalami BBLR. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2019) 9 kali lebih berisiko melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia pada saat hamil. Kadar Hb berhubungan dengan kejadian BBLR, hal ini disebabkan karena apabila ibu hamil mengalami anemia maka pasokan O₂ untuk jaringan menurun dan pengangkutan CO₂ dari jaringan menjadi terhambat sehingga dapat menghambat pertumbuhan jaringan baik pada janin maupun pada plasenta sehingga dapat mengakibatkan kematian janin dalam kandungan, abortus, cacat bawaan, partus prematur, partus lama dan lain-lain.

k. Konsumsi *Junk Food*

Pola makan merupakan salah satu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah, frekuensi dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan. Status

nutrisi, mencegah dan membantu kesembuhan penyakit (Depkes RI, 2009).

Kebiasaan pola makan yang buruk pada ibu hamil dapat mengakibatkan tekanan darah naik seperti makanan tinggi garam dan lemak yang dapat meningkatkan volume darah dan membuat jantung memompa lebih cepat. Ibu yang sering mengonsumsi makanan manis, minuman bersoda dan *junk food* juga berisiko terjadinya preeklampsia karena dalam makanan dan minuman tersebut mengandung natrium yang dapat meningkatkan volume darah sehingga memaksa jantung memompa lebih kuat (Amalina et al., 2022).

Menu makanan untuk ibu hamil pada dasarnya tidak banyak berbeda dari menu sebelum hamil, kelompok bahan makanan yang direkomendasikan yakni roti, sereal, sayuran, buah, susu dan olahannya, daging, ayam, ikan, kacang-kacangan, minyak dan gula. Menu makanan bagi ibu hamil perlu divariasikan dengan bahan makanan yang beraneka ragam. Menu ibu hamil harus dibatasi dari bahan makanan instan berbahaya bagi ibu hamil, yaitu kandungan garam yang tinggi dapat menjadi penyebab hipertensi dan preeklampsia, kandungan pengawet dan pewarna, makanan instan khususnya mie instan lebih lama dicerna sehingga dapat mengganggu pencernaan. Makanan seperti *junk food* juga perlu dihindari karena zat gizi yang dikandung tidak seimbang bagi ibu hamil, meningkatkan resiko alergi, resiko penyakit jantung dan obesitas (Swamilaksita et al., 2019).

Makanan yang termasuk *junk food* yaitu makanan kaleng, makanan gorengan, makanan daging yang diproses, mie instan, makanan yang dibakar atau dipanggang, makanan asinan, olahan keju, makanan manis beku, makanan daging berlemak dan jeroan. Makanan yang digoreng akan menghasilkan acrylamide. Zat acrylamide merupakan bahan kimia yang dapat terbentuk saat makanan digoreng pada suhu yang sangat tinggi, seperti kentang goreng, keripik kentang dan makanan lain yang termasuk junk food. Dari hasil penelitian yang dilakukan Pedersen et al., (2012) menemukan bahwa ibu dengan konsumsi makanan yang kaya akrilamida, seperti kentang goreng, dapat menyebabkan lingkaran kepala lebih kecil dan berat badan lahir rendah pada bayi.

Penelitian yang dilakukan Hamsir et al., (2022) menyebutkan bahwa ibu semakin banyak *junk food* yang dikonsumsi, semakin tinggi risiko mengalami preeklampsia. Asupan lemak harian ditemukan secara langsung mempengaruhi konsentrasi trigliserida plasma, kolesterol dan total lemak dalam darah. Dilaporkan bahwa trigliserida plasma, kolesterol lipoprotein densitas rendah dan asam lemak bebas secara signifikan lebih besar pada wanita hamil dengan preeklampsia daripada wanita hamil yang sehat.

2. Faktor Kehamilan

a. Umur kehamilan

Usia kehamilan adalah taksiran usia janin yang dihitung dari hari pertama masa haid normal sampai saat melahirkan. Umur kehamilan ibu umumnya berlangsung 40 minggu atau 280 hari. Pembagian usia kehamilan dibagi kelompok yaitu :

- 1) Preterm : usia kehamilan kurang 37 minggu
- 2) Aterm : usia kehamilan antara 37 dan 42 minggu
- 3) Post Term : usia kehamilan 42 minggu

Pada setiap tahap kehamilan, seorang ibu hamil membutuhkan makanan dengan kandungan zat-zat gizi yang berbeda dan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan perkembangan janin. Berat badan bayi semakin bertambah sesuai usia kehamilan. Faktor usia kehamilan mempengaruhi kejadian BBLR karena semakin pendek masa kehamilan semakin kurang sempurna pertumbuhan alat-alat tubuhnya, sehingga akan turut mempengaruhi berat badan bayi, sehingga dapat dikatakan bahwa umur kehamilan mempengaruhi BBLR.

Berdasarkan hasil penelitian Srimiyati & Ajul (2021) menyebutkan bahwa besarnya resiko jika bayi lahir pada umur kehamilan < 37 minggu sebesar 2.097 kali lipat dibanding bayi yang lahir pada umur kehamilan > 38 minggu. Umur kehamilan 37 minggu merupakan usia kehamilan yang baik bagi janin. Bayi yang hidup dalam rahim ibu sebelum usia kehamilan 37 minggu belum dapat tumbuh secara optimal sehingga berisiko bayi memiliki berat lahir kurang dari 2.500 gr.

b. Komplikasi kehamilan

Komplikasi kehamilan adalah masalah kesehatan yang sering terjadi selama kehamilan dan juga persalinan. Masalah kesehatan dapat terjadi saat sebelum ibu hamil dan berdampak pada komplikasi kehamilan dan akan berakibat pada kesehatan bayi yang dilahirkan (Arsesiana, 2021).

Bayi berat lahir rendah dapat terjadi pada ibu mengalami gangguan/komplikasi selama kehamilan seperti hipertensi gravidarum, hipotensi, anemia, preeklampsia dan eklampsia. Penyakit yang berhubungan langsung dengan kehamilan misalnya pendarahan antepartum, trauma fisik dan psikologis, diabetes melitus dan penyakit infeksi menjadi salah satu penyebab BBLR karena janin tumbuh lambat atau memperpendek usia kehamilan (Amelia et al., 2022).

c. Kehamilan ganda

Pertumbuhan janin pada kehamilan kembar bergantung pada faktor plasenta apakah menjadi satu (sebagian besar hamil kembar monozigotik) atau bagaimana lokalisasi implantasi plasentanya. Dari kedua faktor tersebut, mungkin janin yang mempunyai jantung salah satu janin lebih kuat dari yang lain, sehingga janin yang memiliki jantung lemah mendapat nutrisi yang kurang yang menyebabkan pertumbuhan terlambat sampai kematian janin dalam rahim. Selain itu kebutuhan zat-zat akan makanan pada kehamilan ganda bertambah yang dapat menyebabkan anemia sehingga berisiko mengalami BBLR. Pada kehamilan ganda distensi uterus berlebihan, sehingga melewati batas toleransi dan sering terjadi partus prematurus (Manuaba, 2010).

Penelitian yang dilakukan Permana et al., (2019) juga menyebutkan bahwa ibu dengan kehamilan ganda memiliki risiko melahirkan bayi BBLR 14,9 kali lebih tinggi dibandingkan ibu tanpa kehamilan ganda. Hasil penelitian juga menunjukkan pada kelompok BBLR terdapat 19 (36,5%) responden dengan kehamilan ganda,

sedangkan kelompok kontrol (normal) terdapat 2 (3,7%) responden dengan kehamilan ganda. Berat badan janin pada kehamilan kembar lebih ringan dari pada janin pada kehamilan tunggal pada umur kehamilan yang sama. Berat badan janin pada kehamilan kembar rata-rata 1.000 gr lebih ringan dari pada janin kehamilan tunggal dan pada umumnya memiliki berat kurang dari 2.500 gr.

3. Faktor Janin

a. Cacat bawaan

Cacat bawaan yaitu keadaan janin yang cacat sebagai faktor pertumbuhan janin di dalam kandungan tidak sempurna (Depkes RI, 2009). Menurut Wiknjastro (2007), cacat bawaan merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil kontrasepsi sel telur. Bayi yang dilahirkan dengan cacat bawaan umumnya akan dilahirkan sebagai bayi berat badan lahir rendah (BBLR). Bayi berat badan rendah dengan kelainan kongenital yang mempunyai berat kira-kira 20% meninggal dalam minggu pertama kehidupannya.

b. Infeksi dalam rahim

Infeksi hepatitis terhadap kehamilan bersumber dari gangguan fungsi hati dalam mengatur dan mempertahankan metabolisme tubuh, sehingga aliran nutrisi ke janin dapat terganggu atau berkurang. Oleh karena itu, pengaruh infeksi hepatitis menyebabkan abortus atau persalinan prematuritas dan kematian janin dalam rahim. Wanita hamil dengan infeksi rubella akan berakibat buruk terhadap janin. Infeksi ini dapat menyebabkan bayi

berat badan lahir rendah, cacat bawaan dan kematian janin (Wiknjosastro, 2007).

E. Prognosis BBLR

Kematian perinatal pada bayi berat lahir rendah 8 kali besar dari bayi normal pada umur kehamilan yang sama, prognosis akan lebih buruk lagi bila berat badan makin rendah. Angka kematian yang tinggi terutama disebabkan oleh seringnya dijumpai kelainan komplikasi neonatal seperti asfiksia, aspirasi pneumonia, pendarahan intrakranial dan hipoglikemia. Bila bayi ini selamat kadang-kadang dijumpai kerusakan pada syaraf dan akan terjadi gangguan bicara, IQ yang rendah dan gangguan lainnya.

F. Konsep Masalah Janin Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Janin

Dalam kamus al-Munjid dan al-Munawwir disebutkan bahwa kata جَيْنٌ dengan bentuk jamaknya جِنَّةٌ dan أَجْنِينٌ seakar dengan kata جِنٌّ dan مَجْنُونٌ ketiga kata ini berasal dari kata جَنَّ yang berarti tertutup atau tersembunyi dari segala sesuatu. Janin dikatakan tersembunyi karena dia masih berada di dalam rahim.

Sementara dalam perspektif fikih atau definisi yang diberikan oleh ulama bahwa istilah janin merupakan nama yang menyimbolkan proses akhir dari pembuahan sperma terhadap ovum (sel telur) yang sebentar lagi akan lahir sebagai anak atau bayi dari kandungan ibunya. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Syafi'i yang menyatakan bahwa yang disebut janin adalah ketika proses kejadian manusia berada pada tahap mudghah karena telah memiliki karakteristik sebagai manusia seperti jari, tangan, mata, kuku dan lain-lain. Pandangan Imām Syāfi'i ini mendekati pengertian

janin dalam ilmu kedokteran dibanding pengertian janin yang dikemukakan oleh al-Nuwāiri yang mengatakan bahwa yang disebut dengan janin jika sudah ditiupkan ruh.

Adapun yang dimaksud dengan janin dalam ilmu kedokteran adalah fetus yang merupakan hasil dari proses pembuahan sperma dan sel telur yang disebut dengan zigot yang berkembang dalam kandungan, kemudian memasuki masa embrio sebagai awal dari terbentuknya bakal-bakal organ yang siap berkembang lebih lanjut. Setelah embrio itu, maka hasil pembuahan tersebut dinamakan janin. Janin atau fetus merupakan hasil fertilisasi dari selesainya tahap perkembangan embrio di delapan minggu setelah fertilisasi sampai saat kelahiran atau abortus.

2. Proses pembentukan janin dalam Al-Qur'an

Proses pembentukan janin dijelaskan oleh Allah dalam QS Al-Mu'minun/23: 12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Terjemahnya :

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta." (Kemenag RI, 2019).

Berdasarkan ayat diatas terdapat fase perkembangan janin sebelum dilahirkan sebagai bayi. Fase-fase tersebut meliputi fase Nutfah, Alaqah, Mudghah, Idhzaman, Lahman dan Khalqan Akhar.

a) *Nutfah*

Ayat ke-13 menjelaskan bahwa tahap pertama pembentukan janin disebut *nutfah*. *Nutfah* merupakan pencampuran sel sperma dengan sel ovum (*nutfah amsyaj*) atau disebutkan dalam ayat adalah air mani. Tidak dapat dikatakan sebagai *nutfah* jika belum terjadi percampuran antara air mani pria dan wanita.

Ayat pendukung yang menjelaskan hal serupa bahwa dalam proses awal pembentukan janin melalui tahap *nutfah* atau air mani yaitu QS. At-Tariq/86: 6.

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Dia diciptakan dari air (mani) yang memancar” (Kemenag RI, 2019).

QS. Al-Hajj/22: 5

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ...

Terjemahnya:

“Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani...” (Kemenag RI, 2019).

Maksud ayat tersebut adalah penciptaan manusia diawali dengan penciptaan Adam dari tanah. Kemudian anak keturunannya diciptakan dari saripati air yang hina yaitu air mani.

QS. As-Sajadah/32: 8

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Kemudian, Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina (air mani)” (Kemenag RI, 2019).

QS. Al-Qiyamah/75: 37

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يُمْنِيَّ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

“Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim)?” (Kemenag RI, 2019).

QS. Al-Mursalat/77: 20

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

“Bukankah Kami menciptakanmu dari air yang hina (mani)?” (Kemenag RI, 2019).

b) *Alaqah*

Tahapan selanjutnya adalah *alaqah*. *Alaqah* diartikan sebagai sesuatu yang melekat terhadap sesuatu yang lainnya. *Alaqah* memiliki struktur dan fungsi tubuh mirip lintah, yaitu menempel dan mendapatkan makanan dari inangnya. Segumpal darah yang melekat kuat pada dinding rahim bagaikan akar yang kokoh menancap di tanah dengan serabutnya. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai tahapan ini yaitu QS. Al-Alaq/96: 2.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dia menciptakan manusia dari segumpal darah” (Kemenag RI, 2019).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa embrio di dalam rahim ibu berbentuk segumpal darah yang menggantung dan bentuknya menyerupai seekor lintah.

QS. Al-Hajj/22: 5

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ...

Terjemahnya:

“Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah...” (Kemenag RI, 2019).

QS. Al-Ghafir/40: 67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ...

Terjemahnya:

“Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal...” (Kemenag RI, 2019).

c) *Mudghah*

Mudghah adalah tahapan ketiga dalam pembentukan janin dalam perspektif Al-Qur'an. *Mudghah* diartikan sebagai sepotong daging yang terkunyah. Daging tersebut jika diamati dengan mikroskop nampak semacam gambar bekas gigitan. Pada tahap ini ditandai dengan peningkatan jumlah sel secara drastis. *Mudghah* memiliki karakteristik beberapa jaringannya tidak dapat dibedakan. Hal tersebut terjadi disebabkan jaringan-jaringan tersebut akan

berubah menjadi plasenta. Ayat-ayat yang menjelaskan mengenai tahapan mudghah terdapat pada QS. Al-Mu'minun/23: 14.

...عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً...

Terjemahnya:

“...Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging...” (Kemenag RI, 2019).

QS. Al-Hajj/22: 5

...ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَظِيمٍ مُخَلَّقَةٍ...

Terjemahnya:

“...lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna...” (Kemenag RI, 2019).

Daging sempurna akan berubah menjadi janin sedangkan yang tidak sempurna akan menjadi plasenta.

d) *Idhzaman*

Idzaman, pada tahap ini tulang-belulang dibentuk. Tahapan ini memiliki makna yang sangat berarti karena pada tahap ini janin akan memiliki struktur internal. Janin akan memiliki keteraturan bentuk walaupun tulang-belulang yang dibentuk masih tergolong tulang lunak. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada tahap ini segumpal daging tersebut berubah menjadi sesuatu yang memiliki kepala, dua buah tangan dan kaki beserta tulang-tulanginya dengan urat-urat syarafnya dan urat-urat lainnya. Ayat yang menjelaskan mengenai tahap ini adalah surah Al-Mu'minun/23: 14.

...فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا...

Terjemahnya:

“...Lalu, segumpal daging itu itu Kami jadikan tulang belulang...”
(Kemenag RI, 2019).

e) *Lahman*

Lahman, tahap ini menjelaskan mengenai terbungkusnya tulang belulang dengan otot/daging (Mustafa al-Maragi). *Lahman* merujuk pada daging segar. Hal ini berbeda dengan *mudghah*. *Mudghah* bukan merupakan daging segar, namun sepotong daging yang dikunyah. Melalui tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa *lahman* adalah tulang belulang yang ditutupi, dibungkus, dan dikuatkan. Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan mengenai tahap ini adalah QS. Al-Mu’minun/23: 14.

... فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ...

Terjemahnya:

“...Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging...”
(Kemenag RI, 2019).

f) *Khalqan Akhar*

Khalqan akhar merupakan fase terakhir proses pembentukan janin dalam perspektif Al-Qur’an. Pada tahap ini bentuk janin sudah dapat disebut seperti manusia. Tahapan ini menjelaskan bahwa proses terakhir pembentukan janin berbeda keseluruhan dengan ciri dan sifat serta keadaan dari proses penciptaan janin dalam proses-proses sebelumnya (Hisham Thalbah, 2009:57). Tafsir Sayyid qutub (1992:2459) bahwasannya makhluk lain yang dimaksudkan dalam fase ini adalah manusia yang memiliki karakter istimewa.

Hal yang paling penting pada fase ini ditandai dengan ditiupkannya ruh sehingga membuatnya dapat bernapas. Dengan

ditiupkannya ruh menjadikannya dapat bergerak dan berubah menjadi makhluk yang memiliki indera diantaranya, pendengaran, perasaan, penglihatan, dan bergerak (tafsir Ibnu Katsir). Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tahap ini adalah QS. Al-Mu'minun/23: 14.

...ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ...

Terjemahnya:

"...Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk lain...) (Kemenag RI, 2019).

QS. As-Sajadah/32: 8-9

ثُمَّ جَعَلْ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

"Kemudian, Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina (air mani). Kemudian, Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)-nya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur" (Kemenag RI, 2019).

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah bin Mas'ud :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

Artinya :

"Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radiallahuanhu beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orana vana benar dan dibenarkan: Sesungguhnya seseorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya empat puluh hari. kemudian menjadi 'alaaqah seperti itu, kemudian menjadi mudahah (seperti daging) seperti itu. Kemudian malaikat diutus kepadanya. lalu ia meniupkan ruh kepadanya. Dan ia diperintahkan kepada empat kalimat, rizqinya, ajalnya, amalnya dan

apakah ia seorang yang celaka atau bahagia...” (HR. Bukhari, no. 6594 dan Muslim, no. 2643).

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya janin atau bayi meliputi fase 40 hari pertama berupa nutfah atau cairan kental, 40 hari kedua berkembang menjadi ‘alaqah atau segumpal darah dan 40 hari ketiga berkembang menjadi mudghah atau segumpal daging. Apabila seluruh waktu dalam fase tersebut dihitung berdasarkan bulan, maka akan sama dengan 4 bulan atau 120 hari. Pada bulan ke 4 inilah, Allah SWT mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang terdapat dalam rahim ibu.

3. Pembentukan janin dalam perspektif sains

Tahap kehamilan atau pembentukan janin terjadi melalui 3 periode penting. Periode pertama yaitu kehamilan memasuki trimester I selama 3 bulan awal kehamilan, trimester II selama 3 bulan berikutnya dan trimester III selama 3 bulan terakhir masa kehamilan. Dalam rahim ibu, zigot mengalami pertumbuhan dan perkembangan kurang lebih selama 280 hari dengan melalui 3 periode penting yaitu periode preimplantasi, embrionik dan fetus.

a) Preimplantasi

Memasuki kehamilan 2 minggu atau 14 hari, seorang ibu mengalami ovulasi. Sel telur dilepaskan dan bergerak ke arah rahim melalui saluran tuba falopi. Sel telur kemudian menetap di dalam saluran tuba falopi untuk dibuahi oleh sperma. Beberapa ratus sel sperma kemungkinan bertemu dengan sel telur, namun hanya satu yang dapat membuahi sel telur. Setiap sel sperma dan sel telur mengandung 23 kromosom. Sel sperma menjadi penentu jenis kelamin karena memiliki kromosom X dan Y, sedangkan sel

telur hanya berkromosom X. sperma dan kromosom pada sel telur melebur membentuk zigot yang menandai proses pembuahan telah usai.

Setelah proses pembuahan selesai, siklus menstruasi otomatis berhenti karena adanya produksi hormon yaitu *Human Chorionik Gonadotropin* (HCG). Hormon ini yang nantinya berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kehamilan karena tugasnya untuk menjaga hormon progesteron tetap tinggi. Zigot hasil pembuahan berdiameter 0,1 mm akan terus membelah diri hingga menjadi 16 sel yang berbentuk bola padat yang disebut morula. Setelah hari ke 4 pembuahan, morula bergerak menuju rahim. Kemudian sel-sel tersebut membelah diri menjadi 58 sel yang disebut dengan blastosit. Setelah 7 hari pasca pembuahan, blastosit menanamkan diri ke dinding rahim.

Blastosit memiliki lapisan luar sel yang terdiri atas lapisan, lapisan luar sel dan lapisan dalam. Pada lapisan luar berfungsi sebagai pengikis dinding rahim untuk membuat ruang dan sebagai penghasil hormon. Lapisan sel dalamnya akan berubah menjadi plasenta dan kantong ketuban, dimana pada masa bagian dalam sel akan membentuk embrio.

b) Embrionik

Periode ini terjadi ketika memasuki minggu ke-2 pasca pembuahan. Bagian depan otak dan sistem saraf pusat mulai terbentuk. Embrio tampak seperti cakram yang memiliki tiga lapisan sel. Minggu ke-3 pasca pembuahan, embrio berukuran 2,5 mm. Kantong ketuban berisi cairan sebagai pelindung embrio, tali

pusar terbentuk, tulang yang mulai terbentuk adalah tulang belakangnya dan terdapat tonjolan bakal kepala pada janin. Pada minggu ke-4 pasca pembuahan, yang berubah pada tubuh embrio adalah ukurannya bertambah sepanjang 1,5 mm. Bakal mata mulai nampak yaitu adanya lubang kecil pada sisi kepala janin. Tonjolan-tonjolan kecil mulai bermunculan sebagai bakal anggota gerak janin. Pada minggu ini jantung embrio berdetak untuk pertama kalinya.

Memasuki minggu ke-5 pasca pembuahan, embrio memiliki panjang 8 mm. fungsi jantung dan hati mulai muncul. Struktur wajah mulai terbentuk. Tunas bakal kaki dan lengan mulai memanjang. Minggu ke-6, embrio berukuran 13 mm. Tulang belakangnya kini lebih lurus, ukuran kepala lebih besar, tali pusar sudah berfungsi sebagai penyuplai nutrisi bagi embrio dan membuang kotoran. Minggu ke-7, embrio bertambah panjangnya menjadi 18 mm, daun telinganya mulai terbentuk, siku bayi dapat digerakkan, alat indera mendekati sempurna pembentukannya dan organ pencernaannya berkembang namun belum berfungsi.

Pada minggu ke-8, embrio mencapai 3 cm. Anggota geraknya mengalami perkembangan dalam hal bentuk dan fungsi. Struktur wajah hampir sempurna, plasenta sepenuhnya berfungsi sebagai penopang embrio selama kehamilan, jari jemari memanjang dan terpisah. Minggu ini adalah minggu terakhir pada fase embrionik.

c) Fetus

Minggu ke-9 pasca pembuahan atau memasuki kehamilan di minggu ke 11 adalah dimulainya periode fetus hingga janin siap lahir. Periode ini terjadi masih dalam kehamilan di trimester I. pada periode ini, janin mengalami banyak perkembangan, dimana janin sudah berbentuk mirip manusia.

Awal periode ini, janin memiliki panjang sekitar 5 cm diukur dari kepala hingga pantat janin. Janin dapat mengangguk dan bergeleng karena lehernya mengalami perkembangan, dan organ reproduksinya mulai berkembang. Kelopak matanya terbentuk, namun masih tertutup rapat. Janin bergerak aktif di dalam kantung ketuban sekalipun ibu tidak dapat merasakannya. Janin sudah mulai dapat melakukan gerakan bernafas karena diafragma mulai terbentuk. Kemudian pada minggu-minggu selanjutnya perkembangan janin mengalami penyempurnaan bentuk dan ukuran hingga ia siap dilahirkan setelah mengalami masa perkembangan di dalam rahim ibu selama 280 hari.

4. Pendidikan anak sejak dalam kandungan menurut perspektif islam

Dari tahap ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan sang ibu, sebagai guru pertama seorang anak, untuk mendidik anak dalam kandungan. Lahirnya anak cerdas dan sholeh-sholehah tidak bisa juga ditentukan secara medis maupun kecukupan gizi saja. Keduanya hanyalah faktor pendukung dan yang tak kalah penting adalah dengan disertai pendidikan agama sejak dalam kandungan. Untuk bisa mendapatkan anak yang baik sehat secara fisik dan mental maka dibutuhkan amalan serta metode pendidikan yang tepat saat dalam kandungan maupun setelah melahirkan.

Menurut perspektif Islam, pendidikan kanak-kanak ialah proses mendidik, mengasuh dan melatih rohani dan jasmani mereka berteraskan nilai-nilai baik yang bersumberkan Al-Quran, Hadis dan pendapat serta pengalaman para ulama. Ia bertujuan melahirkan “Insan Rabbani” yang beriman, bertakwa dan beramal shaleh. Cara mendidik anak dalam kandungan secara Islami dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut adalah metode mempersiapkan pendidikan anak semenjak dalam kandungan dan diantaranya yaitu dengan :

- a) Seorang ibu yang hamil diharuskan banyak-banyak mendoakan bayinya. Allah Yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan kita, kita sebagai manusia hamba yang lemah hanya doa dan usaha yang senantiasa kita panjatkan agar kita (ibu yang sedang mengandung) memperoleh anak yang shalih, diberikan kesempurnaan lahir dan batin serta sempurna seperti sempurnanya Al-Quran yang engkau ciptakan.
- b) Mendidik anak dalam kandungan dengan Membacakan Al-Qur'an. Diharapkan dengan bayi yang masih dalam kandungan dibiasakan oleh orang tuanya untuk mendengarkan tilawah Qur'an karena banyak manfaat dari mendengarkan Al-Qur'an. Kita ketahui fungsi pertama yang paling banyak digunakan janin dalam kandungan adalah fungsi pendengarannya maka kita optimalkan fungsi pendengaran janin untuk terbiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Selain itu dengan kita membiasakan bayi dalam kandungan memperdengarkan Al-Qur'an maka ketika sang

anak memasuki masa kanak-kanak ia akan lebih mudah dalam menghafal Al-Qur'an.

- c) Seorang ibu harus selalu menjaga dirinya dengan makan makanan yang bergizi halalan thayyiban. Makanan yang halal lagi baik akan berpengaruh terhadap shalih-shalihah anak kelak. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah/5: 88.

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman” (Kemenag RI, 2019).

- d) Ikhlas dan sabar dalam mendidik anak (prenatal) orang tua haruslah ikhlas dan senantiasa sabar dalam mendidik anak. Dengan kata lain, mendidik anak prenatal harus diniatkan beribadah, anak adalah rezeki yang tak ternilai, anugerah, amanah Allah SWT yang harus kita jaga serta kita didik. Seorang ibu hamil harus kuat sabar serta ikhlas. Di kala kehamilan banyak ujian yang menimpa baik pribadi maupun keluarga.
- e) Memenuhi kebutuhan istri. Anak adalah tanggung jawab, milik serta kebahagiaan kedua orang tuanya (suami dan istri). Maka dari itu Suami harus memenuhi kebutuhan istri yang sedang mengandung, terutama pada masa-masa awal umur kandungannya. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4: 9.

﴿ وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾

Terjemahnya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)” (Kemenag RI, 2019).

Oleh karena itu setiap suami yang telah mengetahui istrinya hamil haruslah berupaya membuat istrinya senang, tentram, dan bahagia pula, sehingga akan lahir bayi yang sehat, cerdas, dan unggul sesuai dengan harapan kedua orang tuanya.

- f) Taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT melalui ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Orang tua yang rajin beribadah maka jiwanya semakin bersih dan suci serta semakin dekat dengan Allah SWT.
- g) Orang tua berakhlak mulia. Akhlak orang tua mempunyai pengaruh yang besar dan menjadi rangsangan yang positif bagi anak dalam kandungan. Menjaga perilaku sangat penting dan dibutuhkan ketika masa kehamilan, karena akhlak orang tua sangat berpengaruh terhadap akhlak anak-anaknya kelak, terutama ibu hamil. Mulai dari sikap, ucapan hingga perilaku, menghindari hal-hal yang kurang baik tidak hanya ditekankan dalam masa kehamilan saja, namun juga sampai anak dewasa. Sebab orang tua memegang peranan yang penting dalam menanamkan perilaku dan adab serta akhlak yang baik kepada anak-anaknya.

5. Perlindungan hukum islam terhadap janin

Dalam kaitannya dengan janin, maka faktor-faktor yang menyebabkan perlunya janin diberikan perlindungan hukum adalah

karena janin memerlukan perlindungan orang tuanya, janin memiliki fisik yang masih lemah, janin memiliki kondisi yang masih labil, janin belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, janin belum dewasa, janin memerlukan pendidikan ruhani dalam kandungan istri. Atas dasar itu, maka janin perlu diberikan perlindungan yang sesuai dengan fitrahnya berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hukum Islam yang terletak pada adanya jaminan bahwa syariat memiliki sifat yang langgeng dan kekal, penuh kebaikan, terhormat, konsisten dan mulia. Karena itu, tujuan perlindungan hukum Islam terhadap janin dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan janin.

a) Perlindungan terhadap keturunan

Perlindungan keturunan adalah merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam untuk memelihara kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin persahabatan dan persatuan antara sesama umat manusia. Salah satu unsur pokok yang harus dijaga pada kemaslahatan manusia adalah menjaga keturunan oleh karena keturunan merupakan unsur sangat penting dalam sebuah keluarga.

b) Penghormatan pada janin

Sperma yang ada dalam rahim istri harus dihormati sebagai anugerah terbesar dari Allah terhadap proses kejadian manusia di muka bumi. Al-Qardhāwi mengatakan, bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) merupakan kehidupan yang harus dihormati dengan menganggapnya sebagai suatu wujud yang hidup dan wajib dijaga. Atas dasar ini, maka seorang istri yang

mengandung dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan bahkan kadang-kadang diwajibkan berbuka jika ia khawatir akan keselamatan janin yang ada dalam kandungannya. Untuk itu, hukum Islam mengharamkan tindakan pengguguran janin istri meskipun yang melakukannya adalah atas perintah suami atau kehendak istri sendiri yang mengandungnya dengan susah payah.

c) Pemenuhan hak janin

Secara etimologis, kata hak terambil bahasa Arab yang mengandung banyak arti sebagaimana yang dapat dipahami dari beberapa ayat Alquran, yaitu bermakna kepastian dan kejelasan, bagian, kewajiban, kebenaran. Musthāfa Ahmad al-Zarqa memberikan definisi mengenai hak, yaitu suatu kekhususan di mana kekhususan itu syarak menetapkan kekhususan atau tanggung jawab. Kata hak merupakan kebalikan dari kewajiban, artinya sesuatu yang dianggap hak bagi orang maka menjadi kewajiban bagi orang lain. Karena itu, antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan keduanya melekat pada diri ibu dan janin yang dikandungnya. Di antara hak-hak janin yang harus dilindungi adalah sebagai berikut :

1) *Hak hidup*

Pada dasarnya fikih Islam melarang pengguguran janin secara mutlak kecuali terdapat indikasi kedarūatan medis dan perkosaan oleh karena menyangkut hak hidup calon anak yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan janin dalam kandungan seorang istri. Sekalipun para ulama berbeda pendapat mengenai hak hidup janin, apakah sejak terjadinya proses

pembuahan, ataukah setelah terbentuknya janin atau apakah setelah janin itu bernyawa.


2) *Hak mendapatkan nafkah dan warisan*

Sekalipun janin masih berada dalam perut seorang ibu, tidak berarti janin tidak memiliki hak nafkah dari kedua orang tuanya, khususnya ibunya oleh karena asupan gizi untuk janin harus melewati aliran darah ibu melalui semipermeabel dari plasenta dan tali pusar, sehingga janin dapat hidup dan berkembang dengan pesat di dalam rahim ibunya. Karena itu, hak yang paling utama yang harus diberikan kepada janin adalah hak nafkah melalui ibunya, jika janin tidak memperoleh nafkah dari orang tuanya, maka dikhawatirkan jiwa janin itu akan terancam sehingga meninggal sebelum keluar dari perut ibunya atau lahir dalam keadaan prematur dengan timbangan di bawah standar bahkan dapat berakibat cacatnya janin karena karena asupan gizi yang kurang.

3) *Hak nasab dan mendapatkan nama yang baik*

Hak-hak lain yang dimiliki janin yang sudah bernyawa yang sebentar lagi lahir sebagai bayi atau sobiyyun, adalah hak mendapatkan nasab dari ayahnya, yaitu kejelasan garis keturunan oleh karena hal itu merupakan identitas kemanusiaan yang besar pengaruhnya terhadap janin ketika lahir sebagai manusia. Kepastian garis keturunan harus melalui lembaga perkawinan karena dengan perkawinan saja garis keturunan menjadi jelas dan sah.


G. Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

Sumber : Modifikasi dari WHO (2004), Depkes RI (2009) dan Manuaba (2010)

H. Kerangka Konsep



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep

Keterangan :

 : Variabel Independen

 : Variabel Dependen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan observasional analitik dengan rancangan penelitian *case control*. Penelitian analitik yaitu penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi, kemudian melakukan analisis korelasi antara fenomena, baik antara faktor risiko maupun antara faktor efek (Notoatmodjo, 2012).

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus-September 2023 di Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang melahirkan di Puskesmas Caile pada periode Januari-Desember tahun 2022 yaitu sebanyak 198 jiwa.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Sampel pada penelitian ini yaitu ibu yang memiliki bayi yang lahir dengan berat badan < 2.500 gr dan ibu yang memiliki bayi yang lahir dengan berat badan ≥ 2.500 gr.

a) Kriteria Inklusi

- 1) Bayi BBLR dan bayi yang tidak BBLR yang lahir pada periode Januari-Desember 2022
- 2) Ibu yang melahirkan di Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022

b) Kriteria Eksklusi

- 1) Responden tidak berada ditempat saat penelitian
- 2) Responden mengundurkan diri dari penelitian atau pindah domisili

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kasus dan kontrol yang diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sutrisno et al., 2022).

Dalam penentuan jumlah sampel pada penelitian ini, apabila Apabila populasi telah diketahui maka teknik pengambilan sampel dapat menggunakan rumus Slovin, rumus tersebut sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = jumlah Populasi

d² = Presisi (5%)

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

$$n = \frac{198}{1 + 198(0,05)^2}$$

$$n = \frac{198}{1 + 198(0,0025)}$$

$$n = \frac{198}{1 + 0,495}$$

$$n = \frac{198}{1,495}$$

$$n = 132$$

Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan rumus Slovin adalah 132 sampel. Dimana sampel BBLR sebanyak 66 orang dan sampel tidak BBLR 66 orang (1:1).

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang digunakan menurut sumbernya ada dua, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti dari hasil penelitian melalui wawancara, pemberian kuesioner. Setelah itu data yang diperoleh pada penelitian dikelola menggunakan aplikasi SPSS.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari Puskesmas Caile tentang kejadian BBLR

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2010). Instrumen

dalam penelitian ini adalah lembar observasi yang berisi tentang usia ibu, kekurangan energi kronik, paritas, konsumsi junk food ketika hamil, usia kehamilan dan komplikasi kehamilan. Setelah itu data yang diperoleh pada penelitian tersebut dikelola menggunakan aplikasi SPSS.

F. Teknik Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data pada penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu mengkaji dan meneliti data yang terkumpul

Pada tahap ini peneliti mengecek setiap jawaban responden kemudian melakukan pengeditan jika ada kesalahan dalam perhitungan atau penskoran

b. *Coding*, yaitu memberikan kode pada data untuk memudahkan dalam memasukkan data ke program komputer.

c. *Cleaning data*, yaitu melihat kembali data yang telah dimasukkan atau sudah dibersihkan dari kesalahan, baik dalam pengkodean atau pada entry data

d. *Tabulating*, yaitu setelah data tersebut masuk kemudian direkap dan disusun dalam bentuk tabel agar dapat dibaca dengan mudah

2. Analisis Data

a. Analisis Univariat

Analisis *univariat* adalah analisis yang dilakukan tiap variabel dari hasil penelitian. Pada umumnya analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2012). Analisis univariat bertujuan

untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel.

b. Analisis Bivariat

Analisis *bivariat*, yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau korelasi (Sugiyono, 2010). Analisis bivariat yang digunakan adalah uji statistik *Chi Square*. Adapun batas kemaknaan perhitungan statistik *p-value* (0,05). Jika nilai $p \geq 0,05$ maka ada risiko antara variabel yang diteliti dengan kejadian BBLR. Sedangkan jika nilai $p \leq 0,05$ maka tidak ada risiko antara variabel yang diteliti dengan kejadian BBLR.

c. Analisis Multivariat

Analisis multivariat digunakan untuk mengetahui variabel independen mana yang menunjukkan paling dominan berisiko terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji multivariat dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik berganda karena variabel dependen berupa data kategorik.

Analisis multivariat diawali dengan melakukan analisis bivariat terhadap masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Apabila hasil analisis bivariat menunjukkan $p\text{-value} = < 0,05$, maka variabel penelitian dapat diikuti dalam analisis multivariat. Sebaliknya, apabila hasil analisis bivariat menunjukkan nilai $p\text{-value} = > 0,05$, maka variabel tersebut tidak dapat diikuti dalam analisis multivariat.

Setelah didapatkan variabel yang memenuhi syarat analisis multivariat, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menentukan variabel independen yang paling berisiko dengan variabel dependen. Apabila hasil uji menunjukkan terdapat variabel yang memiliki nilai $p\text{-value} > 0,05$, maka variabel tersebut harus dikeluarkan hingga menghasilkan model akhir hasil regresi logistik berganda.

G. Etika Penelitian

Menurut Nursalam, S (2013) beberapa hal yang perlu dituliskan dalam penelitian meliputi :

1. *Ethical Clearance*

Sebelum melakukan penelitian, permintaan *ethical clearance* diajukan kepada Komisi Etika Penelitian Kesehatan (KEPK) No: B.008/KEPK/FKIK/1/2023.

2. Lembar persetujuan penelitian diberikan kepada responden.

Tujuannya adalah subjek mengetahui maksud dan tujuan peneliti serta dampak yang diteliti selama pengumpulan data. Jika bersedia diteliti, maka objek harus menandatangani lembar persetujuan.

Jika subjek menolak untuk diteliti, maka peneliti tidak akan memaksa obyek dan tetap menghormati haknya.

3. *Anonymity*

Untuk menjaga kerahasiaan identitas subjek, peneliti tidak akan mencantumkan nama subyek pada lembar kuesioner dan hanya mencantumkan inisial.

4. *Confidentiality*

Peneliti menjaga privasi dan kerahasiaan data rekam medis yang diambil dengan tidak membicarakan data yang diambil kepada orang lain dan hanya data tertentu yang dilaporkan oleh peneliti.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografi

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba. Puskesmas Caile merupakan puskesmas perkotaan yang berada di Kecamatan Ujung Bulu. Letaknya yang strategis di tengah kota dengan kemudahan untuk diakses melalui jalan raya baik menggunakan alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan yaitu antara titik koordinat $-5,54483$ dan $120,196838$ dengan batas administratif yakni :

- a. Sebelah Utara : Desa Polewali Kecamatan Gantarang
- b. Sebelah Selatan : Laut Flores
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang
- d. Sebelah Timur : Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe



Gambar 2. 3 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Caile

Luas wilayah kerja Puskesmas Caile adalah 14,44 km² atau 1,25% dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba. Luas wilayah masing-masing kelurahannya yaitu :

- a. Kelurahan Caile dengan luas 3,13 km² dan jarak ke Puskesmas Caile 3 km dengan waktu tempuh 5 menit.
- b. Kelurahan Kalumeme dengan luas 4,33 km² dan jarak ke Puskesmas Caile dengan waktu tempuh 15 menit.
- c. Kelurahan Bentenge dengan luas 1,00 km² dan jarak ke Puskesmas Caile 2,5 km dengan waktu tempuh 10 menit.
- d. Kelurahan Loka dengan luas 0,68 km² dan jarak ke Puskesmas Caile 2,5 km dengan waktu tempuh 7 menit.
- e. Kelurahan Tanah Kongkong dengan luas 1,16 km² dengan waktu tempuh 10 menit.
- f. Kelurahan Kasimpureng dengan luas 1,24 km² dan jarak ke Puskesmas Caile 3,5 km dengan waktu tempuh 15 menit.
- g. Kelurahan Bintarore dengan luas 2,48 km² dan jarak ke Puskesmas Caile 3,5 km dengan waktu tempuh 20 menit.
- h. Kelurahan Ela-Ela 0,22 km², jarak ke Puskesmas Caile 2 km dengan waktu tempuh 10 menit.

2. Demografi

Penduduk di wilayah kerja Puskesmas Caile berdasarkan angka tahun 2022 berjumlah 24.297 jiwa yang tersebar di desa/kelurahan. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Ujung Bulu tidak signifikan mengalami peningkatan namun terjadinya perubahan proporsi penduduk di beberapa desa di Kecamatan Ujung Bulu dimungkinkan karena terjadi urbanisasi terutama untuk melanjutkan pendidikan dan

merantau ke luar negeri. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

a. Karakteristik Ibu

Terdapat 4 karakteristik ibu yang dimasukkan ke dalam penelitian ini yaitu umur, pendidikan, pekerjaan dan tinggi badan ibu.

1) Umur

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Umur Ibu
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Umur	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
18-23 Tahun	25	37.9	17	25.8	42	31.8
24-29 Tahun	28	42.4	25	37.9	53	40.2
30-35 Tahun	11	16.7	22	33.3	33	25
36-41 Tahun	2	3	2	3	4	3
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan umur ibu, diketahui kelompok umur dengan jumlah terbanyak yaitu kelompok umur 24-29 tahun yaitu sebanyak 28 (42,4%) pada responden kasus dan 25 (37,9%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 53 (40,2%) responden dan umur dengan jumlah terendah yaitu kelompok umur 36-41 tahun sebanyak 2 (3%) pada responden kasus dan 2 (3%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 4 (3%) responden.

2) Pendidikan

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Pendidikan Ibu
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Pendidikan	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
Tidak Bersekolah	0	0	1	1.5	1	0.8
SD	2	3	2	3	4	3
SMP	25	37.9	22	33.3	47	35.6
SMA/SMK	37	56.1	37	56.1	74	56.1
Perguruan Tinggi	2	3	4	6.1	6	4.5
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan ibu, diketahui kelompok pendidikan dengan jumlah terbanyak yaitu SMA/SMK sebanyak 37 (56,1%) pada responden kasus dan 37 (56,1%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 74 (56,1%) responden dan kelompok pendidikan dengan jumlah terendah yaitu tidak bersekolah sebanyak 1 (0,8%) pada responden kontrol.

3) Pekerjaan

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Pekerjaan Ibu
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Pekerjaan	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
Tidak Bekerja	64	97	63	95.5	127	96.2
Pegawai Swasta	2	3	3	4.5	5	3.8
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan ibu, diketahui bahwa sebagian besar responden tidak bekerja sebanyak 64 (97%) pada responden kasus dan 63 (95,5%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 127 (96,2%) responden dan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 2 (3%) pada responden kasus dan 3 (4,5%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 5 (3,8%) responden.

4) Tinggi Badan

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Tinggi Badan Ibu
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Tinggi Badan (cm)	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
145-151	13	19.7	20	30.3	33	25
152-158	47	71.2	35	53	82	62.1
159-165	6	9.1	11	16.7	17	12.9
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan tinggi badan ibu, diketahui kelompok tinggi badan dengan jumlah terbanyak yaitu kelompok 152-158 cm sebanyak 47 (71,2%) pada responden kasus dan 35 (53%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 82 (62,1%) responden dan kelompok tinggi badan dengan jumlah terendah yaitu 159-165 cm sebanyak 6 (9,1%) pada responden kasus dan 11 (16,7%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 17 (12,9%) responden.

b. Karakteristik Ayah

Terdapat 4 karakteristik ayah yang dimasukkan ke dalam penelitian ini yaitu umur, pendidikan, pekerjaan dan tinggi badan ayah.

1) Umur

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Umur Ayah
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Umur	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
18-24 Tahun	24	36.4	20	30.3	44	33.3
25-31 Tahun	33	50	29	43.9	62	47
32-38 Tahun	7	10.6	12	18.2	19	14.4
39-45 Tahun	2	3	5	7.6	7	5.3
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan umur ayah, diketahui kelompok umur dengan jumlah terbanyak yaitu kelompok umur 25-31 tahun sebanyak 33 (50%) pada responden kasus dan 29 (43,9%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 62 (47%) responden dan kelompok umur dengan jumlah terendah yaitu kelompok umur 39-45 tahun sebanyak 2 (3%) pada responden kasus dan 5 (7,6%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 7 (5,3%) responden.

2) Pendidikan

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Pendidikan Ayah
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Pendidikan	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
SD	1	1.5	4	6.1	5	3.8
SMP	22	33.3	18	27.3	40	30.3
SMA/SMK	39	59.1	38	57.6	77	58.3
Perguruan Tinggi	4	6.1	6	9.1	10	7.6
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan ayah, diketahui kelompok pendidikan dengan jumlah terbanyak yaitu SMA/SMK sebanyak 39 (59,1%) pada responden kasus dan 38 (57,6%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 77 (58,3%) responden dan kelompok pendidikan dengan jumlah terendah yaitu SD sebanyak 1 (1,5%) pada responden kasus dan 4 (6,1%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 5 (3,8%) responden.

3) Pekerjaan

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Pekerjaan Ayah
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Pekerjaan	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
Wiraswasta	62	93.9	60	90.9	122	92.4
Pegawai Swasta	3	4.5	5	7.6	8	6.1
PNS	1	1.5	1	1.5	2	1.5
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan ayah, diketahui kelompok pekerjaan dengan jumlah terbanyak yaitu wiraswasta sebanyak 62 (93,9%) pada responden kasus dan 60 (90,9%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 122 (92,4%) responden dan kelompok pekerjaan dengan jumlah terendah yaitu PNS sebanyak 1 (1,5%) pada responden kasus dan 1 (1,5%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 2 (1,5%) responden.

4) Tinggi Badan

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Tinggi Badan Ayah
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Tinggi Badan (cm)	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
156-161	57	86.4	23	34.8	80	60.6
162-167	7	10.6	26	39.4	33	25
168-173	2	3	12	18.2	14	10.6
174-179	0	0	5	7.6	5	3.8
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan tinggi badan ayah, diketahui kelompok tinggi badan dengan jumlah terbanyak yaitu kelompok 156-161 cm sebanyak 57 (86,4%) pada responden kasus dan 23 (34,8%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 80 (60,6%) responden dan kelompok tinggi badan dengan jumlah terendah yaitu 174-179 cm sebanyak 5 (3,8%) pada responden kontrol.

c. Karakteristik Bayi

Terdapat 3 karakteristik bayi yang dimasukkan ke dalam penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, dan riwayat berat badan lahir bayi.

1) Umur

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Umur Bayi
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Umur	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
9-12 bulan	41	62.1	2	3	43	32.6
13-16 bulan	15	22.7	34	51.5	49	37.1
17-20 bulan	10	15.2	30	45.5	40	30.3
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa umur bayi dengan jumlah terbanyak yaitu pada kelompok umur 13-16 bulan sebanyak 15 (22,7%) pada kasus dan 34 (51,5%) pada kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 49 (37,1%) dan umur bayi dengan jumlah terendah yaitu pada kelompok umur 17-20 bulan sebanyak 10 (15,2%) pada kasus dan 30 (45,5%) pada kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 40 (30,3%) bayi.

2) Jenis Kelamin

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Bayi
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Jenis Kelamin	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
Laki-laki	46	69.7	24	36.4	70	53
Perempuan	20	30.3	42	63.6	62	47
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa jenis kelamin dengan jumlah terbanyak yaitu laki-laki sebanyak 46 (69,7%) pada kasus dan 24 (36,4%) pada kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 70 (53%)

bayi dan jenis kelamin dengan jumlah terendah yaitu perempuan sebanyak 20 (30,3%) pada kasus dan 42 (63,6%) pada kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 62 (47%) bayi.

3) Riwayat Berat Badan Lahir Bayi

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Riwayat Berat Badan Lahir Bayi
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Riwayat Berat Badan Lahir Anak	Frekuensi (n)	Persentase (%)
BBLR	66	50
Tidak BBLR	66	50
Total	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa bayi yang mengalami BBLR (< 2.500 gr) sebanyak 66 (50%) bayi dan yang tidak BBLR (\geq 2.500 gr) sebanyak 66 (50%) bayi.

2. Analisis Uji Univariat

Analisis Univariat merupakan analisis yang digunakan untuk mendapatkan distribusi frekuensi dan persentase dari variabel dependen (kejadian BBLR) maupun variabel independen (usia ibu, kekurangan energi kronik, paritas, kebiasaan konsumsi *junk food*, usia kehamilan dan komplikasi kehamilan). Adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

a) Usia Ibu

Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi Usia Ibu
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Usia Ibu	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
Risiko Tinggi (< 20 dan > 35 tahun)	11	16.7	5	7.6	16	12.1
Risiko Rendah (20 - 35 tahun)	55	83.3	61	92.4	116	87.9
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan usia ibu yaitu dari 132 sampel, usia ibu dengan kategori risiko tinggi (< 20 dan > 35 tahun) sebanyak 11 (16,7%) pada responden kasus dan 5 (7,6%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 16 (12,1%) responden dan kategori risiko rendah (20-35 tahun) sebanyak 55 (83,3%) pada responden kasus dan 61 (92,4%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 116 (87,9%) responden.

b) Kekurangan Energi Kronik

Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Kekurangan Energi Kronik
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Kekurangan Energi Kronik	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
Risiko Tinggi (LILA < 23,5 cm)	38	57.6	2	3	40	30.3
Risiko Rendah (LILA ≥ 23,5 cm)	28	42.4	64	97	92	69.7
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan kekurangan energi kronik yaitu dari 132 sampel, ibu dengan kategori risiko tinggi (LILA < 23,5 cm) sebanyak 38 (57,6%) pada responden kasus dan 2 (3%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 40 (30,3%) responden dan kategori risiko rendah (LILA ≥ 23,5 cm) sebanyak 28 (42,4%) pada responden kasus dan 64 (97%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 92 (69,7%) responden.

c) Paritas

Tabel 4.14
Distribusi Frekuensi Paritas
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Paritas	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
Risiko Tinggi (1 dan ≥ 4 anak)	48	72.7	24	36.4	72	54.5
Risiko Rendah (2-3 anak)	18	27.3	42	63.6	60	45.5
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan paritas yaitu dari 132 sampel, paritas dengan kategori risiko tinggi (1 atau ≥ 4 anak) sebanyak 48 (72,7%) pada responden kasus dan 24 (36,4%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 72 (54,5%) responden dan kategori risiko rendah (2-3 anak) sebanyak 18 (27,3%) pada responden kasus dan 42 (63,6%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 60 (45,5%) responden.

d) Konsumsi *Junk Food* Ketika Hamil

Tabel 4.15

Distribusi Frekuensi Konsumsi *Junk Food* Ketika Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Konsumsi <i>Junk Food</i>	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
Risiko Tinggi (> 3 kali dalam seminggu)	37	56.1	4	6.1	41	31.1
Risiko Rendah (≤ 3 kali dalam seminggu)	29	43.9	62	93.9	91	68.9
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan konsumsi *junk food* ketika hamil yaitu dari 132 sampel, kebiasaan konsumsi *junk food* ketika hamil pada kategori risiko tinggi (> 3 kali dalam seminggu) sebanyak 37 (56,1%) pada responden kasus dan 4 (6,1%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 41 (31,1%) responden dan kategori risiko rendah (≤ 3 kali dalam seminggu) sebanyak 29 (43,9%) pada responden kasus dan 62 (93,9%)

pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 91 (68,9%) responden.

e) Usia Kehamilan

Tabel 4.16
Distribusi Frekuensi Usia Kehamilan
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Usia Kehamilan	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
Risiko Tinggi (< 37 minggu)	38	57.6	3	4.5	41	31.1
Risiko Rendah (≥ 37 minggu)	28	42.4	63	95.5	91	68.9
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan usia kehamilan yaitu dari 132 sampel, usia kehamilan pada kategori risiko tinggi (< 37 minggu) sebanyak 38 (57,6%) pada responden kasus dan 3 (4,5%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 41 (31,1%) responden dan kategori risiko rendah (≥ 37 minggu) sebanyak 28 (42,2%) pada responden kasus dan 63 (95,5%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 91 (68,9%) responden.

f) **Komplikasi Kehamilan**

Tabel 4.17
Distribusi Frekuensi Komplikasi Kehamilan
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Komplikasi Kehamilan	Frekuensi				Total	
	Kasus		Kontrol		N	%
	n	%	n	%		
Risiko Tinggi (Ya)	13	19.7	6	9.1	19	14.4
Risiko Rendah (Tidak)	53	80.3	60	90.9	113	85.6
Total	66	100	66	100	132	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan komplikasi kehamilan yaitu dari 132 sampel, yang mengalami komplikasi kehamilan sebanyak 13 (19,7%) pada responden kasus dan 6 (9,1%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 19 (14,4%) responden dan yang tidak mengalami komplikasi kehamilan sebanyak 53 (80,3%) pada responden kasus dan 60 (90,9%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 113 (85,6%) responden.

3. Analisis Uji Bivariat

Analisis Bivariat merupakan analisis yang dilakukan guna mengetahui adanya pengaruh /risiko variabel dependen (kejadian BBLR) dan variabel independen (usia ibu, kekurangan energi kronik, paritas, kebiasaan konsumsi *junk food*, usia kehamilan dan komplikasi kehamilan). Adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

a) Analisis Risiko Usia Ibu terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Risiko usia ibu < 20 dan > 35 tahun terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Risiko Usia Ibu Terhadap Kejadian BBLR
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Usia Ibu	Berat Badan Bayi				Total		P-value	Odds Ratio (95% CI)
	Kasus		Kontrol		N	%		
	n	%	n	%				
Risiko Tinggi (< 20 dan > 35 tahun)	11	16.7	5	7.6	16	12.1	0,182	2.440 (0.798-7.465)
Risiko Rendah (20 - 35 tahun)	55	83.3	61	92.4	116	87.9		
Jumlah	66	100	66	100	132	100		

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa dari 132 responden, 16 responden dengan usia ibu berisiko tinggi (< 20 dan > 35 tahun) lebih banyak pada kelompok kasus yaitu 11 orang (16,7%) dan 5 orang (7,6%) pada kelompok kontrol. Sedangkan dari 116 responden dengan usia ibu berisiko rendah (20-35 tahun), lebih banyak pada kelompok kontrol yaitu 61 orang (92,4%) dan 55 orang (86,4%) pada kelompok kasus.

Hasil uji *chi square* diperoleh nilai *p-value* = 0,182 ($p > 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya tidak ada risiko antara usia ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.

b) Analisis Risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Risiko kekurangan energi kronik terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.19
Risiko Kekurangan Energi Kronik Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Kekuran Energi Kronik	Berat Badan Bayi				Total		P-value	Odds Ratio (95% CI)
	Kasus		Kontrol		N	%		
	n	%	n	%				
Risiko Tinggi (LILA < 23,5 cm)	38	57.6	2	3	40	30.3	0.000	43.429 (9.791-192.628)
Risiko Rendah (LILA ≥ 23,5 cm)	28	42.4	64	97	92	69.7		
Jumlah	66	100	66	100	132	100		

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa dari 132 responden, 40 responden dengan risiko tinggi (LILA < 23,5 cm), lebih banyak pada kelompok kasus yaitu 38 orang (57,6%) dan 2 orang (3%) yang pada kelompok kontrol. Sedangkan dari 92 responden yang berisiko rendah (LILA ≥ 23 cm), lebih banyak pada kelompok kontrol yaitu 28 orang (42,4%) dan 64 orang (97%) pada kelompok kasus.

Hasil uji *chi square* diperoleh nilai *p-value* = 0,000 ($p < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya ada risiko antara kekurangan energi kronik dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Hasil analisis *Odds Ratio* diperoleh nilai OR = 43,429 (95% CI = 9,791-

192,628). Ini berarti ibu dengan LILA < 23,5 cm berisiko 43,429 kali bayinya mengalami BBLR dibandingkan dengan ibu yang memiliki LILA \geq 23 cm.

c) Analisis Risiko Paritas terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Risiko paritas terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20
Risiko Paritas Terhadap Kejadian BBLR
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Paritas	Berat Badan Bayi				Total		P-value	Odds Ratio (95% CI)
	Kasus		Kontrol		N	%		
	n	%	n	%				
Risiko Tinggi (1 dan \geq 4 anak)	48	72.7	24	36.4	72	54.5	0.000	4.667 (2.230-9.764)
Risiko Rendah (2-3 anak)	18	27.3	42	63.6	60	45.5		
Jumlah	66	100	66	100	132	100		

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa dari 132 responden, 72 responden dengan paritas risiko tinggi (1 dan \geq 4 anak) lebih banyak pada kelompok kasus yaitu 48 orang (72,7%) dan 24 orang (36,4%) pada kelompok kontrol. Sedangkan dari 60 responden dengan paritas risiko rendah (2-3 anak), lebih banyak pada kelompok kontrol yaitu sebanyak 42 orang (63,6%) dan hanya 18 orang (27,3%) pada kelompok kasus.

Hasil uji *chi square* diperoleh nilai *p-value* = 0,000 ($p < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya ada risiko antara paritas dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas

Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Hasil analisis *Odds Ratio* diperoleh nilai OR = 4,667 (95% CI = 2,230-9,764). Ini berarti ibu dengan paritas 1 dan ≥ 4 anak berisiko 4,667 kali bayinya mengalami BBLR dibandingkan ibu dengan paritas 2-3 anak.

d) Analisis Risiko Konsumsi *Junk Food* Ketika Hamil terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Risiko konsumsi *junk food* ketika hamil terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.21
Risiko Konsumsi *Junk Food* Ketika Hamil Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Konsumsi <i>Junk Food</i> Ketika Hamil	Berat Badan Bayi				Total		P-value	Odds Ratio (95% CI)
	Kasus		Kontrol		N	%		
	n	%	n	%				
Risiko Tinggi (>3 kali dalam seminggu)	37	56.1	4	6.1	41	31.1	0.000	19.776 (6.440-60.724)
Risiko Rendah (≤ 3 kali dalam seminggu)	29	43.9	62	93.9	91	68.9		
Jumlah	66	100	66	100	132	100		

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa dari 132 responden, 41 responden dengan risiko tinggi (> 3 kali dalam seminggu) lebih banyak pada kelompok kasus yaitu 37 orang (56,1%) dan 4 orang (6,1%) pada kelompok kontrol. Sedangkan dari 91 responden dengan risiko rendah (≤ 3 kali dalam seminggu), lebih banyak pada kelompok kontrol yaitu 62 orang (93,9%) dan hanya 29 orang (43,9%) pada kelompok kasus.

Hasil uji *chi square* diperoleh nilai *p-value* = 0,000 ($p < 0.05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak berarti ada risiko antara konsumsi *junk food* ketika hamil dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Hasil analisis *Odds Ratio* diperoleh nilai OR = 19,776 (95% CI = 6,440-60,724). Ini berarti ibu dengan konsumsi *junk food* > 3 kali dalam seminggu berisiko 19,776 kali bayinya mengalami BBLR dibandingkan ibu dengan konsumsi *junk food* \leq 3 kali dalam seminggu.

e) Analisis Risiko Usia Kehamilan terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Risiko usia kehamilan terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.22
Risiko Usia Kehamilan Terhadap Kejadian BBLR
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Usia Kehamilan	Berat Badan Bayi				Total		P-value	Odds Ratio (95% CI)
	Kasus		Kontrol		N	%		
	n	%	n	%				
Risiko Tinggi (<37 minggu)	38	57.6	3	4.5	41	31.1	0.000	28.500 (8.109-100.162)
Risiko Rendah (\geq 37minggu)	28	42.4	63	95.5	91	68.9		
Jumlah	66	100	66	100	132	100		

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel 4.22 menunjukkan bahwa dari 132 responden, 41 responden dengan usia kehamilan risiko tinggi (< 37 minggu) lebih

banyak pada kelompok kasus yaitu 38 orang (57,6%) dan 3 orang (4,5%) pada kelompok kontrol. Sedangkan dari 91 responden dengan usia kehamilan risiko rendah (≥ 3 minggu), lebih banyak pada kelompok kontrol yaitu 63 orang (95,5%) dan 28 orang (42,4%) pada kelompok kasus.

Hasil uji *chi square* diperoleh nilai *p-value* = 0,000 ($p < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya ada risiko antara usia kehamilan dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Hasil analisis *Odds Ratio* diperoleh nilai OR = 28,500 (95% CI = 8,109-100,162). Ini berarti ibu dengan usia kehamilan < 37 minggu berisiko 28,500 kali bayinya mengalami BBLR dibandingkan ibu dengan usia kehamilan ≥ 37 minggu.

f) Analisis Risiko Komplikasi Kehamilan terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Risiko komplikasi terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.23
Risiko Komplikasi Kehamilan Terhadap Kejadian BBLR
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022

Komplikasi Kehamilan	Berat Badan Lahir Bayi				Total		P-value	Odds Ratio (95% CI)
	Kasus		Kontrol		N	%		
	n	%	n	%				
Risiko Tinggi (Ya)	13	19.7	6	9.1	19	14.4	0.137	2.453 (0.871-6.908)
Risiko Rendah (Tidak)	53	80.3	60	90.9	113	85.6		
Jumlah	66	100	66	100	132	100		

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa dari 132 responden, 19 responden dengan risiko tinggi (Ya) lebih banyak pada kelompok kasus yaitu 13 orang (19,7%) dan 6 orang (9,1%) pada kelompok kontrol. Sedangkan dari 113 responden dengan risiko rendah (Tidak), lebih banyak pada kelompok kontrol yaitu sebanyak 60 orang (90,9%) dan hanya 53 orang (80,3%) pada kelompok kasus.

Hasil uji *chi square* diperoleh nilai *p-value* = 0,137 ($p > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima yang berarti tidak ada risiko antara komplikasi kehamilan dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.

4. Analisis Uji Multivariat

Analisis multivariat digunakan untuk melihat reaksi seluruh variabel. Variabel independen yang diikutkan dalam analisis multivariat adalah variabel yang mempunyai nilai $p < 0,05$ pada hasil analisis bivariat seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.24
Hasil Analisis Bivariat Untuk Menilai Variabel
Yang Diikutkan Dalam Analisis Multivariat

Variabel Penelitian	<i>p-value</i>	Odds Ratio	CI 95%		Memenuhi Syarat
			Lower	Upper	
Usia Ibu	0.182	2.440	0.798	7.465	Tidak
KEK	0.000	43.429	9.791	192.628	Ya
Paritas	0.000	4.667	2.230	9.764	Ya
Konsumsi <i>Junk Food</i>	0.000	19.776	6.440	60.724	Ya
Usia Kehamilan	0.000	28.500	8.109	100.162	Ya
Komplikasi Kehamilan	0.137	2.453	0.871	6.908	Tidak

Sumber : Olah Data SPSS, 2023

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang diteliti, terdapat 4 variabel yang memenuhi syarat untuk diikutkan dalam

analisis multivariat dengan nilai $p < 0,05$ yaitu variabel kekurangan energi kronik ($p= 0,000$), paritas ($p= 0,000$), konsumsi *junk food* ($p= 0,000$) dan usia kehamilan ($p= 0,000$).

a. **Pemodelan Awal**

Tabel 4.25
Hasil Analisis Multivariat Antara Kekurangan Energi Kronik, Paritas, Konsumsi *Junk Food* dan Usia Kehamilan Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Variabel Penelitian	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	CI 95%	
							Lower	Upper
KEK	2.735	0.846	10.443	1	0.000	19.811	4.855	80.843
Paritas	0.791	0.547	2.090	1	0.148	2.205	0.755	6.440
Konsumsi <i>Junk Food</i>	1.678	0.726	5.338	1	0.021	5.357	1.290	22.250
Usia Kehamilan	2.986	0.718	17.322	1	0.000	19.811	4.855	80.843
Constant	-14.324	2.554	31.457	1	0.000	0.000		

Sumber : Olah Data SPSS, 2023

Tabel 4.25 menunjukkan bahwa terdapat variabel yang $p > 0,05$, yaitu variabel paritas ($p= 0,148$). Proses multivariat dilanjutkan dengan mengeluarkan variabel paritas.

b. Pemodelan Akhir

Tabel 4.26
Hasil Analisis Multivariat Antara Kekurangan Energi Kronik, Konsumsi *Junk Food* dan Usia Kehamilan Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Variabel Penelitian	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	CI 95%	
							Lower	Upper
KEK	2.806	0.844	11.054	1	0.001	16.537	3.163	86.445
Konsumsi <i>Junk Food</i>	1.972	0.708	7.760	1	0.005	7.188	1.794	28.793
Usia Kehamila n	3.082	0.713	18.659	1	0.000	21.793	5.384	88.221
Constant	- 14.006	2.551	30.140	1	0.000	0.000		

Sumber : Olah Data SPSS, 2023

Tabel 4.26 menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang berperan terhadap terjadinya BBLR dengan model prediksi atau persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen

a = Konstanta

b_1, b_2, \dots, b_n = Nilai koefisien regresi/slope

X_1, X_2, \dots, X_n = Variabel bebas

$$Y = -14,006 + 2,806 \text{ Kekurangan Energi Kronik} + 1,972 \text{ Konsumsi } \textit{Junk Food} + 3,082 \text{ Usia Kehamilan}$$

Terdapat 3 (tiga) variabel yang berisiko terhadap kejadian BBLR adalah kekurangan energi kronik, konsumsi *junk food* dan usia kehamilan. Diantara ketiga variabel tersebut, variabel yang paling berisiko terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile

Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah usia kehamilan dengan nilai $\text{Exp(B)}/\text{OR} = 21,793$. Artinya ibu dengan usia kehamilan < 37 minggu mempunyai risiko 21,793 kali untuk melahirkan bayi dengan BBLR.

Tabel 2.27
Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.714	.509	.486	.360

Sumber : Olah Data SPSS, 2023

Tabel 4.27 menunjukkan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,714. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,509 yang artinya bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 50,9%.

C. Pembahasan

a. Usia Ibu

Usia adalah umur seseorang yang dihitung mulai dilahirkan sampai dengan ulang tahun. WHO menganjurkan bahwa usia yang dianggap ideal untuk menjalani kehamilan dan persalinan adalah 20 hingga 35 tahun. Persentase tertinggi bayi dengan berat badan lahir rendah terdapat pada kelompok remaja dan wanita berusia lebih dari 40 tahun WHO (2018).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada risiko usia ibu terhadap kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang signifikan $p = 0,182$ ($p > 0,05$). Data yang diperoleh pada umur ibu berisiko tinggi (< 20 dan > 35 tahun) sebanyak 11 (16,7%) responden pada kelompok kasus dan 5 (7,6%) responden pada kelompok kontrol.

Sedangkan responden dengan umur berisiko rendah (20-35 tahun) sebanyak 55 (83,3%) responden pada kelompok kasus dan 61 (92,4%) responden pada kelompok kontrol.

Dalam penelitian ini ibu yang melahirkan bayi pada kelompok kasus sebagian besar ibu yang usia berisiko rendah. Hal ini menunjukkan bahwa usia produktif tidak menjamin kehamilan maupun hasil kehamilan yang sehat atau berhasil. Terdapat berbagai faktor lain yang mempengaruhi ibu usia produktif sehingga melahirkan bayi dengan BBLR. Faktor tersebut antara lain masalah ekonomi serta asupan gizi ibu selama kehamilan yang tidak terpenuhi. Ibu dengan penghasilan keluarga yang rendah akan mempunyai asupan makanan yang lebih rendah baik secara kualitas maupun kuantitas yang akan berakibat terhadap rendahnya status gizi ibu hamil (Aristiyani et al., 2023).

Adapun ibu dengan usia berisiko tinggi pada kelompok kontrol, hal ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti usia kehamilan yang cukup dan tidak mengalami KEK. Selain itu didukung oleh status pendidikan dan pendapatan keluarga yang berkaitan dengan daya beli akan kebutuhan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin mudah keluarga untuk mendapatkan asupan nutrisi dalam kehamilan, akses pelayanan kesehatan memadai dan lingkungan yang mendukung. Sebaliknya, bila pendapatan keluarga rendah, makanan bergizi sulit diperoleh, akses kesehatan terbatas serta lingkungan sehat sulit dijangkau (Sitorus et al., 2022).

Ibu dengan usia berisiko rendah pada kelompok kontrol dikarenakan usia ibu termasuk usia 20-35 tahun. Usia 20-35 tahun merupakan masa yang optimal bagi wanita untuk menjalani kehamilan

dan persalinan. Sesuai dengan teori Wiknjastro (2007) yang menyatakan usia reproduksi sehat adalah usia 20-35 tahun, dimana usia tersebut merupakan usia aman untuk kehamilan dan persalinan. Ibu hamil yang memiliki umur di bawah 20 tahun merupakan usia ibu yang berisiko terhadap masalah kesehatan dibandingkan dengan ibu yang memiliki usia yang cukup. WHO menganjurkan bahwa usia yang dianggap ideal untuk menjalani kehamilan dan persalinan adalah 20 hingga 35 tahun (WHO, 2018).

Adapun ibu dengan umur berisiko tinggi pada kelompok kasus, dikarenakan usia < 20 dan > 35 tahun yang merupakan usia yang berisiko melahirkan bayi dengan BBLR. Sesuai dengan teori Manuaba (2010), usia < 20 dan > 35 tahun memungkinkan banyak faktor risiko dan masalah kesehatan yang dapat dialami oleh ibu karena pada usia < 20 tahun kematangan organ-organ reproduksi belum cukup sedangkan pada usia > 35 tahun dihadapkan pada kemungkinan terjadinya beberapa risiko tertentu termasuk risiko kehamilan. Usia reproduksi optimal bagi seorang wanita adalah usia antara 20-35 tahun, karena usia dibawah 20 tahun perkembangan organ-organ reproduksi yang belum optimal, kematangan emosi dan kejiwaan kurang serta fungsi fisiologi yang belum optimal, sebaliknya pada usia diatas 35 tahun telah terjadi kemunduran fungsi fisiologis maupun reproduksi secara umum yang mengakibatkan proses perkembangan janin menjadi tidak optimal (Sari & Wahyuni, 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian Amelia et al., (2022) dimana hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p= 0,362$ artinya secara statistik tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur ibu dengan kejadian

BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa Kota Makassar dengan nilai OR 1,752 yang artinya ibu dengan umur < 20 dan > 30 tahun mempunyai risiko sebesar 1,752 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan kelompok umur 20-35 tahun yang termasuk dalam umur ideal. Sama halnya dengan penelitian Levita & Langi (2022), yang menunjukkan hasil $p= 0,193$ yang artinya hubungan antara usia ibu hamil dengan kejadian BBLR tidak signifikan ($p > 0,05$). Penelitian Apriani et al., (2021) juga menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia ibu hamil dengan kejadian BBLR di RSUD Cilacap ($p= 0,656$).

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Suroso & Melda (2023) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan $p= 0,008$ antara umur responden dengan kejadian BBLR. Sama halnya dengan penelitian Asma et al., (2023) didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara usia dengan kejadian BBLR dimana $p= 0,005$ ($p < 0,05$). Hamil di usia muda merupakan faktor risiko terhadap terjadinya BBLR, karena ibu hamil yang terlalu muda masih berada dalam proses pertumbuhan, sehingga asupan gizi untuk janin berkurang. Akibatnya pertumbuhan janin terhambat dan berat lahir bayi berkurang (BBLR). Sedangkan apabila ibu hamil saat usia terlalu tua (> 35 tahun), fertilitas endometrium dan kualitas sel telur sudah menurun, serta meningkatnya risiko ibu mengalami penyakit kronik seperti hipertensi makanan ke janin melalui plasenta yang akan meningkatkan risiko maupun diabetes melitus yang dapat mengakibatkan terhambatnya transmisi melahirkan bayi dengan BBLR.

b. Kekurangan Energi Kronik (KEK)

Suatu kondisi yang disebut kekurangan energi kronis menyebabkan ibu hamil mengalami malnutrisi kronis jangka panjang (asupan rendah kalori dan protein) yang mencegah tubuh mereka mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Akibatnya, tubuh mengalami perubahan yang tidak sepenuhnya ideal, baik secara fisik maupun mental (Kemenkes RI, 2019). Kondisi ibu hamil dengan risiko KEK, berisiko terhadap penurunan kekuatan otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya partus lama dan pendarahan pasca salin, bahkan kematian pada ibu. Risiko pada bayi dapat mengakibatkan terjadinya kematian janin (keguguran), prematur, lahir cacat, BBLR bahkan kematian bayi (Direktorat Gizi Masyarakat, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada risiko Kekurangan Energi Kronik terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang signifikan $p=0,000$ ($p < 0,05$) dengan nilai OR sebesar 43,429. Artinya ibu yang kekurangan energi kronik (LILA $< 23,5$ cm) berisiko 43,429 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan ibu yang tidak kekurangan energi kronik (LILA $\geq 23,5$ cm). Data yang diperoleh pada kategori berisiko tinggi (LILA $< 23,5$ cm) terdapat 38 (57,6%) responden pada kelompok kasus dan 2 (3%) responden pada kelompok kontrol. Sedangkan pada kategori risiko rendah (LILA $\geq 23,5$ cm) sebanyak 28 (42,4%) responden pada kelompok kasus dan 64 (97%) responden pada kelompok kontrol.

Dalam penelitian ini sebagian besar ibu pada kelompok kasus adalah ibu dengan KEK berisiko tinggi. Ini dikarenakan ibu yang mengalami KEK (LILA < 23,5 cm) merupakan risiko penyebab terjadinya bayi dengan BBLR. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Manuaba (2010) yang menyatakan bahwa ibu hamil yang kekurangan energi kronik memiliki ukuran lengan atas LILA < 23,5 cm akan menyebabkan metabolisme energi, oleh karena itu kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat selama kehamilan, peningkatan energi dan zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu dapat disebabkan oleh usia ibu dan kebiasaan konsumsi makanan yang tidak sehat. Apabila asupan makanan pada ibu hamil saat remaja itu baik maka akan menghasilkan energi yang baik serta dapat digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja. Semakin buruk asupan makanan seorang ibu hamil saat remaja maka akan semakin tinggi risiko terjadinya KEK (Dwi & Wahyuningsih, 2019).

Adapun ibu dengan KEK berisiko tinggi pada kelompok kontrol, dikarenakan faktor lain seperti ibu selama kehamilan rutin untuk memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan serta pengetahuan tentang pola makan yang baik bagi ibu hamil sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi janin selama kehamilan. Ibu hamil yang rutin melakukan kunjungan ANC akan selalu mendapatkan informasi tentang bagaimana cara meningkatkan nutrisi selama kehamilan. Misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin dan lain sebagainya dimana hal tersebut dapat memberikan peluang peningkatan kesehatan bagi ibu hamil sehingga jika kebutuhan nutrisi terpenuhi maka akan menyebabkan status nutrisi ibu menjadi baik (Salam, 2021).

Ibu yang KEK berisiko rendah pada kelompok kasus, hal ini dikarenakan yang mempengaruhi kejadian BBLR tidak hanya status gizi ibu hamil, namun terdapat faktor lain. Hal ini sesuai dengan teori Manuaba (2010) bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR yaitu umur, paritas, jarak kehamilan, pekerjaan serta frekuensi pemeriksaan kehamilan. Ibu yang hamil pada usia < 20 tahun cenderung membutuhkan gizi lebih untuk pertumbuhan janin dan pertumbuhan fisik remaja, serta membutuhkan kesiapan dari segi psikologis untuk menerima kehamilan (Siantar et al., 2021).

Sedangkan ibu dengan KEK berisiko rendah pada kelompok kontrol, dikarenakan ibu tidak mengalami KEK (LILA \geq 23,5 cm) yang dimana ini bukan merupakan faktor terjadinya BBLR. Selain itu, didukung dengan pengetahuan ibu yang baik sehingga pengetahuan mengenai kebutuhan gizi yang dibutuhkan selama masa kehamilan dapat terpenuhi sehingga bayi yang dilahirkan dapat lahir dengan berat badan normal (Diningsih et al., 2021).

Sejalan dengan penelitian Agustin & Afrika (2022) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara kekurangan energi kronik (KEK) dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Muara Burnai tahun 2020 ($p= 0,044$) dengan nilai OR 3,6 artinya responden yang KEK memiliki peluang risiko 3,6 kali bayinya mengalami BBLR dibandingkan dengan responden yang tidak KEK. Sama halnya dengan penelitian Sapta et al., (2023) didapatkan hasil ada hubungan antara KEK dengan kejadian BBLR dimana $p= 0,000$ dan OR 8,424 yang berarti ibu yang KEK (LILA < 23,5 cm) berpeluang 8,424 kali melahirkan bayi dengan BBLR.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian F. M. Mulyaningrum & Nurulistyawan (2022), yang menunjukkan hasil uji chi square didapatkan nilai $p= 0,109$ ($p > 0,05$), artinya tidak ada hubungan bermakna antara status KEK dengan kejadian BBLR. Sama halnya dengan penelitian Marlina & Mastina (2020) dimana tidak ada hubungan KEK dengan kejadian BBLR dengan $p= 0,627$ dengan nilai OR sebesar 1,425.

Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada kehamilan berisiko meningkatkan kematian pada ibu dan berisiko melahirkan bayi dengan BBLR. Kekurangan energi kronik ditandai dengan ukuran lingkaran lengan atas (LILA) $< 23,5$ cm. Faktor yang menjadi penyebab KEK pada ibu hamil antara lain pengetahuan ibu, pola konsumsi ibu hamil, paritas, kondisi ekonomi, asupan gizi selama kehamilan, makanan tambahan selama kehamilan, riwayat konsumsi tablet Fe serta berat badan ibu sebelum kehamilan (Harismayanti, 2021).

c. Paritas

Paritas adalah banyaknya jumlah anak yang dilahirkan. Menurut kesehatan, jumlah anak yang paling aman bagi seorang wanita adalah paritas kedua dan ketiga, sedangkan paritas pertama dan lebih dari tiga dikatakan berisiko terhadap kehamilan, persalinan bahkan bagi bayi yang dilahirkan (Sembiring et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada risiko paritas terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang signifikan $p= 0,000$ ($p < 0,05$) dengan nilai OR sebesar 1,426. Artinya ibu dengan paritas risiko tinggi (1 dan ≥ 4 anak) berisiko 1,426 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan ibu dengan paritas risiko rendah (2-3 anak). Data

yang diperoleh pada kategori risiko tinggi (1 dan \geq 4 anak) terdapat 48 (72,7%) responden pada kelompok kasus dan 24 (36,4%) responden pada kelompok kontrol. Sedangkan pada kategori risiko rendah (2-3 anak) terdapat 18 (27,3%) responden pada kelompok kasus dan 42 (63,6%) responden pada kelompok kontrol.

Dalam penelitian ini, ibu pada kelompok kasus sebagian besar ibu dengan paritas berisiko tinggi (1 dan \geq 4 anak). Sesuai dengan teori Wiknjastro (2007) yang menyatakan paritas yang tinggi akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah kesehatan baik bagi ibu maupun bayi yang dilahirkan. Kehamilan dan persalinan yang berulang-ulang menyebabkan kerusakan pembuluh darah di dinding rahim dan kemunduran daya lentur (elastisitas) jaringan yang sudah berulang kali diregangkan saat kehamilan sehingga cenderung timbul kelainan letak ataupun kelainan pertumbuhan plasenta dan pertumbuhan janin sehingga melahirkan bayi dengan BBLR.

Kelahiran pertama kali atau kelahiran primipara berisiko melahirkan bayi dengan BBLR dapat disebabkan oleh usia ibu. Ibu yang berusia $<$ 20 tahun, yang dimana kondisi ini membutuhkan asupan gizi yang lebih banyak karena pada usia tersebut ibu masih dalam masa pertumbuhan. Diperlukan pula kesiapan mental yang optimal agar pemenuhan gizi bagi ibu dan janin selama hamil tetap diperhatikan. Hal ini berisiko mengakibatkan terjadinya kelahiran bayi BBLR (Putri et al., 2019).

Ibu dengan paritas risiko tinggi (1 dan \geq 4 anak) pada kelompok kontrol, ini disebabkan karena ibu yang biasanya lebih berpengalaman dalam perawatan bayi dan kesiapan dalam menghadapi kehamilan, baik

secara fisik maupun mental serta ibu mampu mengurus kehamilannya sehingga menekan kejadian kelahiran dengan BBLR (Apriani et al., 2021).

Adapun ibu dengan paritas berisiko rendah (2-3 anak) pada kelompok kasus, hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang dapat menyebabkan BBLR, diantaranya kekurangan energi kronik, usia ibu, status sosial ekonomi dan lain-lain sehingga bukan hanya paritas saja yang dapat menyebabkan terjadinya BBLR (Sari & Wahyuni, 2021). Sedangkan ibu dengan paritas risiko rendah (2-3 anak) pada kelompok kontrol dikarenakan paritas 2-3 bukan merupakan risiko terjadinya BBLR dan merupakan jumlah paritas yang aman. Sesuai dengan teori Manuaba (2010), dari sudut paritas terbagi atas paritas 1 tidak aman, paritas 2-3 aman untuk hamil dan bersalin dan paritas lebih dari 3 tidak aman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian ini Pitriani et al., (2023) dimana hasil analisis data menggunakan uji *chi square* antara paritas dengan kejadian BBLR diperoleh nilai $p= 0,016$ yang artinya ada hubungan antara paritas dengan kejadian BBLR di RSUD Drs. H. Abu Hanifah tahun 2022 dengan nilai OR = 2,189 yang berarti bahwa responden dengan paritas berisiko memiliki kecenderungan 2,198 kali lebih besar mengalami kasus BBLR dibandingkan paritas tidak berisiko. Sama halnya dengan penelitian Nuzula (2020) dimana didapatkan hasil uji statistik $p= 0,001$ dengan nilai OR 4 yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara paritas primipara dengan kejadian BBLR dengan 4 kali berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Ibu dengan paritas > 3 telah mengalami penurunan fungsi

reproduksi karena persalinan yang dialami sebelumnya. Penurunan fungsi organ reproduksi ini dapat berakibat pada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandung ibu sehingga pada akhirnya ibu akan melahirkan bayi dengan BBLR.

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Apriani et al., (2021) tentang hubungan usia ibu hamil, paritas dan usia kehamilan dengan kejadian BBLR di RSUD Cilacap menunjukkan hasil dari uji chi square $p= 0,236$ yang berarti tidak terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian BBLR. Sama halnya dengan penelitian Artini et al., (2023) menunjukkan bahwa hasil uji antara paritas dengan BBLR mendapatkan hasil nilai $p= 0,081$ ($p > 0,05$) yang memiliki makna bahwa tidak terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian berat badan lahir rendah di RSU Bali Royal pada tahun 2021.

d. Konsumsi *Junk Food* Ketika Hamil

Pola makan merupakan salah satu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah, frekuensi, dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi dan mencegah dan membantu kesembuhan penyakit (Depkes RI, 2009). Makanan siap saji seperti *junk food* adalah makanan yang tidak sehat karena memiliki jumlah lemak yang tinggi dan sedikit nutrisi. *Junk food* juga perlu dihindari karena zat gizi yang dikandung tidak seimbang bagi ibu hamil, meningkatkan resiko alergi, resiko penyakit jantung dan obesitas. Apabila ibu mengonsumsi makanan sehari-hari kurang mengandung zat besi yang dibutuhkan ibu selama kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandung (Kemenkes RI, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada risiko konsumsi *junk food* terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang signifikan $p= 0,000$ ($p= < 0,05$) dengan nilai OR sebesar 21,036. Artinya ibu yang mengkonsumsi *junk food* > 3 kali dalam seminggu ketika hamil berisiko 21,036 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan ibu yang konsumsi *junk food* ≤ 3 kali dalam seminggu. Data yang diperoleh pada kategori berisiko tinggi (> 3 kali dalam seminggu) terdapat 37 (56,1%) responden pada kelompok kasus dan 4 (6,1%) responden pada kelompok kontrol. Sedangkan pada kategori risiko rendah (≤ 3 kali dalam seminggu) terdapat 29 (43,9%) responden pada kelompok kasus dan 62 (93,9%) responden pada kelompok kontrol.

Dalam penelitian ini sebagian besar ibu pada kelompok kasus adalah ibu dengan konsumsi *junk food* berisiko tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang pola makan yang sehat sehingga asupan gizi ibu selama kehamilan yang mungkin tidak terpenuhi karena saat hamil pengetahuan ibu akan kebutuhan gizi kurang atau juga dapat dikarenakan ibu lebih mementingkan selera dan makanan kesukaannya daripada makanan yang seharusnya dikonsumsi saat masa kehamilan (Levita & Langi, 2022). Sesuai dengan teori Manuaba (2010), menjelaskan bahwa anemia dalam kehamilan dapat mengakibatkan terjadinya abortus, persalinan prematur, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah terjadi infeksi, hiperemesis gravidarum, pendarahan antepartum, dan ketuban pecah dini. Untuk mencegah hal tersebut ibu hamil perlu meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang banyak mengandung zat besi.

Adapun ibu dengan konsumsi *junk food* berisiko rendah pada kelompok kasus, hal ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti usia ibu dan KEK sehingga kebutuhan gizi yang dibutuhkan janin dalam kandungan menjadi terhambat. Sedangkan ibu dengan konsumsi *junk food* berisiko tinggi tetapi bayinya tidak BBLR ini dikarenakan ibu selama dalam masa kehamilan teratur dalam melakukan penanganan berupa pemantauan kesehatan. Ibu hamil yang rutin melakukan ANC akan selalu mendapatkan informasi tentang bagaimana cara meningkatkan nutrisi selama kehamilan (Salam, 2021).

Adapun ibu dengan konsumsi *junk food* berisiko rendah pada kelompok kontrol, hal ini dikarenakan frekuensi konsumsi *junk food* yang tidak terlalu sering serta ibu dengan pengetahuan yang baik tentang pola makan yang sehat sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi janin selama dalam kandungan (Diningsih et al., 2021).

Hal ini sesuai dengan penelitian Alfahmi (2023) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pola makan ibu hamil dengan kejadian BBLR yang signifikan nilai $p= 0,003$ ($p < 0,05$) dengan nilai OR sebesar 6 artinya ibu hamil yang memiliki pola makan yang kurang berisiko 6 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibanding dengan ibu hamil yang memiliki pola makan yang cukup. Gizi yang baik diperlukan seorang ibu hamil agar pertumbuhan janin tidak mengalami hambatan dan selanjutnya akan melahirkan bayi dengan berat lahir normal. Ibu yang sedang hamil dengan kekurangan zat gizi yang penting bagi tubuh akan menyebabkan anak lahir prematur dan BBLR (Manuaba, 2010).

Menurut penelitian Hamsir et al., (2022) menunjukkan bahwa asupan lemak ($p= 0,005$), vitamin c ($p= 0,002$), dan natrium ($p= 0,036$) yang terkandung dalam *junk food* berhubungan secara signifikan dengan preeklampsia dan frekuensi konsumsi *junk food* juga berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian preeklampsia pada ibu hamil dengan nilai $p= 0,013$.

Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Gizi seimbang bagi ibu hamil mengindikasikan bahwa konsumsi makanan ibu hamil harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin atau bayinya. Oleh karena itu ibu hamil membutuhkan asupan makanan bergizi seimbang yang lebih banyak dalam jumlah dan proporsi yang telah disesuaikan dengan trimester kehamilan (Septiani et al., 2021).

Penambahan kebutuhan gizi selama hamil meliputi :

1) Energi

Menurut RISKESDAS 2007 rerata nasional konsumsi energi per kapita per hari adalah 1.735,5 kkal.

2) Protein

Kebutuhan protein pada trimester I hingga II kurang dari 6 gr tiap harinya, sedangkan pada trimester III sekitar 10 gr tiap harinya. Protein digunakan untuk pembentukan jaringan baru baik

plasenta dan janin pertumbuhan dan diferensiasi sel, pembentukan cadangan darah dan persiapan masa menyusui.

3) Lemak

Lemak merupakan sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Selain itu, lemak disimpan untuk persiapan ibu sewaktu menyusui. Kadar lemak akan meningkat pada kehamilan trimester III.

4) Karbohidrat

Karbohidrat kompleks mengandung vitamin dan mineral serta meningkatkan asupan serat untuk mencegah terjadinya konstipasi.

5) Vitamin, seperti Asam Folat, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E dan Vitamin K

6) Mineral mencakup zat besi, zat seng, kalsium, yodium, fosfor, fluor dan natrium.

Di dalam islam segala batasan larangan yang diajarkan merupakan suatu hal yang bertujuan baik, yakni untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap sejahtera. Islam melarang seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman secara berlebihan karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Hal ini tercantum dalam QS Al-A'raf/7: 31.

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

ALAUDDIN
MAKASSAR

Terjemahnya :

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Kemenag RI, 2019).

Islam menganjurkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, bukan hanya makanan yang mengenyangkan saja tapi nutrisi yang dikandungnya harus memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Hal ini tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” (Kemenag RI, 2019).

Junk food merupakan makanan yang kadar nutrisinya sangat rendah, lemak, garam dan kalornya yang sangat tinggi. Mengkonsumsi *junk food* dalam jumlah yang berlebihan dan terus menerus akan berdampak negatif bagi kesehatan tubuh. Islam menganjurkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, sedangkan *junk food* merupakan jenis makanan dan minuman yang rendah nutrisi, mengandung lemak, garam dan kalori yang tinggi. Hal tersebut dapat diartikan sebagai makanan yang tidak baik dan berdampak buruk bagi kesehatan. Mengkonsumsi makanan dan minuman bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia dan tujuan-tujuan dasar manusia yaitu harta, jiwa, agama, akal dan keturunan. Oleh

karena itu, sebaiknya memakan makanan rendah nutrisi (*junk food*) harus dihindari untuk kesehatan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

e. Usia Kehamilan

Usia kehamilan adalah masa sejak terjadinya konsepsi sampai dengan saat kelahiran, dihitung dari hari pertama haid terakhir (*menstrual age of pregnancy*). Kehamilan cukup bulan adalah usia kehamilan 37-42 minggu (259-294 hari) lengkap sedangkan usia kehamilan kurang bulan adalah usia kehamilan yang kurang dari 37 minggu (259 hari) (Kemenkes RI, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada risiko antara usia kehamilan terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba yang signifikan $p= 0,022$ ($p < 0,05$) dengan nilai OR sebesar 4,173. Artinya ibu yang usia kehamilan < 37 minggu berisiko 4,1 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan ibu dengan usia kehamilan ≥ 37 minggu. Data yang diperoleh pada kategori berisiko tinggi (< 37 minggu) terdapat 38 (57,6%) responden pada kelompok kasus dan 3 (4,5%) responden pada kelompok kontrol. Sedangkan pada kategori berisiko rendah (> 37 minggu) terdapat 28 (42,4%) responden pada kelompok kasus dan 63 (95,5%) responden pada kelompok kontrol.

Dalam penelitian ini sebagian besar ibu pada kelompok kasus adalah ibu dengan usia kehamilan berisiko tinggi. Usia kehamilan yang kurang dari 37 minggu mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin belum optimal sehingga perkembangan janin belum sempurna dan mempengaruhi berat badan bayi yang dilahirkan (Hartini & Yusvita, 2023).

Hal ini didukung oleh teori Manuaba (2010), umur kehamilan mempengaruhi kejadian BBLR karena semakin pendek masa kehamilan semakin kurang sempurna pertumbuhan alat-alat tubuhnya sehingga akan turut mempengaruhi berat badan bayi.

Adapun ibu dengan usia kehamilan berisiko rendah pada kelompok kasus, hal ini disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan janin saat dalam kandungan serta adanya faktor lain yang mempengaruhi seperti paritas dan komplikasi yang terjadi selama dalam masa kehamilan (Budiarti et al., 2022).

Ibu dengan usia kehamilan resiko tinggi pada kelompok kontrol, ini dikarenakan pengetahuan ibu memadai sehingga selama dalam masa kehamilan kebutuhan bayi terpenuhi dengan baik. Sedangkan ibu dengan usia kehamilan berisiko rendah dan bayinya tidak BBLR dikarenakan usia kehamilan ≥ 37 minggu merupakan usia kehamilan yang sangat sedikit berpeluang mengakibatkan BBLR, hal ini dikarenakan pada usia kehamilan tersebut pertumbuhan dan perkembangan organ-organ bayi sudah matang sehingga berat bayi yang dilahirkan normal (Sari et al., 2022).

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Apriani et al., (2021) yang menunjukkan hasil uji chi square $p= 0,000$, berarti terdapat hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian BBLR di RSUD Cilacap dengan nilai OR = 20,213 yang berarti usia kehamilan dengan kategori preterm berpeluang sebesar 20,213 kali untuk mengalami kejadian BBLR dibandingkan dengan usia kehamilan risiko rendah. Sama halnya dengan penelitian Srimiyati & Ajul (2021) menunjukkan dengan nilai $p= 0,000$ dan nilai OR = 2,097. Artinya usia kehamilan < 37 minggu mempunyai

kemungkinan 2,097 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibanding bayi dengan usia kehamilan ≥ 37 minggu. Berat bayi bertambah seiring dengan umur kehamilan. Normalnya berat badan bayi akan bertambah sesuai dengan pertambahan usia kehamilan, semakin muda umur kehamilan maka perkembangan organ-organ tubuhnya belum sempurna atau matang dan berpengaruh pada berat badan bayi. Ketika umur kehamilan belum mencukupi maka perkembangan janin di dalam uterus juga belum maksimal.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu lebih cenderung mengatakan adanya hubungan antara usia kehamilan dengan bayi prematur terhadap kejadian BBLR. Hasil penelitian yang diperoleh sebagian besar sama dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Ra'd/13: 8

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

"Allah menaetahui apa vana dikanduna oleh setiap perempuan dan apa vana berkurana (tidak sempurna dalam) rahim dan apa yang bertambah. Segala sesuatu ada ketentuan di sisi-Nya." (Kemenag RI, 2019).

Al-aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas berdasarkan ayat tersebut sehubungan dengan makna firmanNya ada janin yang kurang sempurna atau janin yang gugur dan kandungan yang bertambah. Rahim yang sempurna akan terus bertambah masa kandungannya sehingga melahirkan dengan sempurna, berbeda dengan rahim yang kurang sempurna kelahirannya prematur. Demikian itu karena diantara kaum wanita ada yang masa kandungannya mencapai sepuluh bulan, ada pula

yang masa kandungannya lebih lama dari biasanya dan ada pula yang kurang dari biasanya. Hal itulah yang disebutkan oleh Allah Swt. dalam ayat ini, semuanya itu terjadi berdasarkan pengetahuan dari Allah Swt. Allah SWT mengatakan mengetahui tentang kandungan dari dulu hingga sekarang dan seterusnya, mengetahui keadaan janin sejak masih berbentuk ovum yang dibuahi sperma. Allah SWT telah terlebih dahulu mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan bukan saja jenis kelaminnya, tetapi juga berat badan dan bentuknya, keindahan dan keburukannya, usia dan rezekinya, masa kini dan masa depannya dan Allah Swt. ialah yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak, yang maha besar lagi makah tinggi, sehingga pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang ghaib bagi-Nya.

Merujuk pada ayat di atas seorang ibu hendaknya senantiasa mendoakan kehamilannya agar menjaga kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan karena berawal dari segumpal darah hingga memiliki bentuk, jenis kelamin, bahkan berat badan bayi serta usia untuk bayi dilahirkan semua dengan ketentuan dan kekuasaan Allah SWT.

f. Komplikasi Kehamilan

Komplikasi kehamilan adalah masalah kesehatan yang sering terjadi selama kehamilan dan juga persalinan. Masalah kesehatan dapat terjadi saat sebelum ibu hamil dan berdampak pada komplikasi kehamilan dan akan berakibat pada kesehatan bayi yang dilahirkan (Arsesiana, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada risiko komplikasi kehamilan terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang signifikan $p=0,137$ ($p > 0,05$). Data yang diperoleh pada kategori mengalami komplikasi kehamilan terdapat 13 (19,7%) responden pada kelompok kasus dan 6 (9,1%) responden pada kelompok kontrol. Sedangkan responden yang tidak mengalami komplikasi kehamilan terdapat 53 (80,3%) pada kelompok kasus dan 60 (90,9%) pada kelompok kontrol.

Dalam penelitian ini sebagian besar ibu pada kelompok kasus tidak mengalami komplikasi kehamilan. Hal ini disebabkan oleh faktor lain seperti paritas yang banyak, usia kehamilan yang terlalu muda dan kebiasaan ibu mengkonsumsi makanan seperti *junk food* yang dapat mempengaruhi status gizi ibu dan janin sehingga tidak menjamin anak yang dilahirkan memiliki berat badan lahir normal (Swamilaksita et al., 2019). Sesuai dengan teori Manuaba (2010) yang menyatakan bahwa usia kehamilan, status gizi ibu hamil, komplikasi kehamilan serta asupan zat gizi merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR.

Adapun ibu dengan komplikasi kehamilan pada kelompok kasus, ini disebabkan karena kurangnya pemeriksaan kesehatan selama kehamilan serta pola makan ibu hamil yang tidak sehat (*junk food*) yang merupakan jenis makanan dan minuman yang rendah nutrisi, mengandung lemak, garam yang dapat menyebabkan permasalahan kesehatan selama kehamilan seperti preeklampsia serta anemia pada ibu hamil sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi (Swamilaksita et al., 2019). Ibu dengan komplikasi kehamilan pada kelompok kontrol, ini dikarenakan ibu rutin memeriksakan kehamilannya serta pengetahuan ibu akan kehamilan yang sehat

sehingga bayi yang dilahirkan dapat lahir dengan berat badan normal (Diningsih et al., 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewanti & Widyanthini (2023), bahwa komplikasi kehamilan dengan kejadian BBLR tidak berhubungan secara signifikan dengan nilai $p= 0,124$. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Srimiyati & Ajul (2021) didapatkan nilai $p= 0,000$ artinya ada hubungan antara komplikasi kehamilan dengan kejadian BBLR dengan nilai OR = 4,407 dimana kehamilan dengan komplikasi mempunyai risiko 4,407 kali melahirkan bayi BBLR dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki komplikasi kehamilan. Sama halnya dengan penelitian Dhirah et al., (2021) dari hasil uji statistik didapatkan $p= 0,029$ dan nilai OR = 4,200 yang artinya ada hubungan faktor komplikasi kehamilan dengan kejadian BBLR. Kehamilan dengan komplikasi dapat menghambat bahkan mengganggu perkembangan bayi di dalam rahim dan menambah prevalensi persalinan dengan berat lahir rendah.

g. Variabel yang dominan berisiko

Pada pemodelan akhir analisis multivariat terdapat 3 (tiga) variabel yang berisiko terhadap kejadian berat badan lahir rendah yaitu faktor KEK, konsumsi *junk food* dan usia kehamilan. Diantara ketiga variabel tersebut, usia kehamilan merupakan faktor yang paling dominan berisiko terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dengan nilai OR= 21.793.

Hal ini didukung oleh teori Manuaba (2010), umur kehamilan mempengaruhi kejadian BBLR karena semakin pendek masa kehamilan semakin kurang sempurna pertumbuhan alat-alat tubuhnya sehingga

akan turut mempengaruhi berat badan bayi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Ariyanti & Dartiwen (2022) bahwa usia kehamilan berisiko paling dominan terhadap kejadian BBLR dimana nilai $p= 0,000$ dan $OR= 10,392$ yang berarti ibu dengan usia kehamilan < 37 minggu berisiko 10,392 kali bayinya mengalami BBLR.

D. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu :

1. Penelitian ini tidak meneliti semua variabel pada kerangka teori di bab sebelumnya seperti jarak kehamilan, merokok, alkohol, anemia, kehamilan ganda, cacat bawaan dan infeksi dalam rahim. Hal ini disebabkan karena tidak adanya responden yang memiliki riwayat kehamilan ganda di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba di tahun 2022 dan beberapa variabel lainnya sudah banyak diteliti.
2. Ketika responden penelitian sulit mengingat kembali kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama kehamilan terutama jika sudah dilewati dalam waktu yang cukup lama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang berisiko terhadap kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah kekurangan energi kronik ($p= 0,000$; $OR= 43,429$), paritas ($p= 0,000$; $OR= 1,426$), konsumsi *junk food* ($p= 0,000$; $OR= 19,776$), usia kehamilan ($p= 0,000$; $OR= 28,500$).
2. Faktor yang tidak berisiko terhadap kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah usia ibu ($p= 0,182$) dan komplikasi kehamilan ($p= 0,137$).
3. Faktor yang paling berisiko terhadap kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba adalah usia kehamilan ($OR= 21,793$).

B. Saran

1. Bagi institusi

Bagi institusi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya BBLR dan dapat menjadi masukan dalam penyusunan perencanaan, kebijakan dan program untuk pengendalian kejadian BBLR.

2. Bagi ibu hamil

Bagi ibu hamil agar dapat melakukan pemantauan kesehatan sesuai usia kehamilan sehingga ibu yang diduga berisiko melahirkan bayi dengan BBLR dapat dideteksi secara dini.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, informasi yang bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan tentang kejadian BBLR serta dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk menguji kembali atau mengungkapkan lebih banyak lagi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, A. N. F., Rahma, R., & Stang, S. (2023). *Analisis Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Babi Berat Lahir Rendah*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 15(3), 143-149. <https://doi.org/10.52022/jikm.v15i3.515>
- Agustin, A. D., & Afrika, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Burnai. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 1042-1049. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v6i2.3120>
- Alfahmi, F. (2023). *Hubungan Pola Makan Dan Asupan Protein Ibu Hamil Dengan Kejadian Bblr Di Puskesmas Kaduagede*. *Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan Kuningan*, 3(1), 13-26. <https://jurnal.unisa.ac.id/index.php/jfikes/-article/view/363>
- Amalina, N., Kasoema, R. S., & Mardiah, A. (2022). *Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil*. *Voice Of Midwifery*, 12(1), 8-21. <https://doi.org/10.35906/vom.v12i1.168>
- Amelia, R., & Sididi, M. (2022). Faktor Risiko Kejadian Babi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Kalulu Badoa Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 3(2), 220-230. <https://doi.org/10.33096/woph.v3i2.366>
- Apriani, E., Subandi, A., & Mubarak, A. K. (2021). *Hubungan Usia Ibu Hamil, Paritas dan Usia Kehamilan dengan Kejadian BBLR di RSUD Cilacap*. *Trends of Nursing Science*, 2(1), 45-52. <https://doi.org/10.36760/tens.v2i1.286>
- Aristiyani, I. (2023). Dampak Status Ekonomi pada Status Gizi Balita. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 7(2). <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v7i2.5607>
- Arsesiana, A. (2021). *Analisis Hubungan Usia Ibu dan Jarak Kehamilan dengan Kejadian Babi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RS Panembahan Senopati Bantul*. *Jurnal Kebidanan*, 11(1), 592-597. https://doi.org/10.33486/jurnal_kebidanan.v11i1.136
- Artini, N. K. M., Erawati, N. L. P. S., & Seniava, A. A. (2023). Hubungan Paritas dan Usia Ibu dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Rumah Sakit Umum Bali Royal Hospital. *Jurnal Ilmiah Kebidanan (The Journal Of Midwifery)*, 11(1), 33-40. <https://doi.org/10.33992/jik.v11i1.2312>
- Aryanti, M., & Dartiwen, D. (2022). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah Di Desa Karanasona*. *Jurnal Kesehatan Indra Husada*, 10(2), 69-75. <https://doi.org/10.36973/jkih.v10i2.414>
- Asma, Adu, Sukarta, Im, & Umar, S. (2023). *Hubungan Status Gizi Dan Usia Ibu Hamil Dengan Kejadian Bblr Di Rskdia Siti Fatimah Makassar*. *Sehat:*

- Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan , 2 (2), 115-122.
<https://doi.org/10.51878/healthy.v2i2.2531>
- Azriful, A., Bujawati, E., Habibi, H., Aeni, S., & Yusdarif, Y. (2018). Determinan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan di Kelurahan Rangs Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 10(2), 192-203.
<https://doi.org/10.24252/as.v10i2.6874>
- Budiarti, I., Rohaya, R., & Silaban, T. D. S. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 195-202.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1927>
- Departemen Agama. RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Depkes, RI. (2000). *Parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
<https://onesearch.id/Record/IOS4680.JATIM000000000035264>
- Depkes RI. (2009). *Kumpulan Buku Acuan Kesehatan Bayi Baru Lahir*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
https://slims.unjaya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=393&keywords
- Depkes, RI. (2014). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2013*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
<https://repository.kemkes.go.id/book/109>
- Depkes RI. (2019). *Penyakit penyebab kematian bayi baru lahir (neonatal) dan sistem pelayanan kesehatan yang berkaitan di Indonesia*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
<https://onesearch.id/Record/IOS13.article-2065>
- Dewanti, L. M. P., & Widyanthini, D. N. (2023). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Kota Denpasar (Analisis Data Sekunder Menggunakan Uji Regresi Logistik)*. *Archive of Community Health*, 10(1), 114.
<https://doi.org/10.24843/ach.2023.v10.i01.p10>
- Dhirah, U. H., Ulviara, D., Rosdiana, E., & Marniati, M. (2021). Determinan Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh. *Journal of Healthcare Technoloav and Medicine*, 7(1), 283-294. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v7i1.1420>
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (2021). *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*.
<https://dinkes.sulselprov.go.id/document/Profil%20Kesehatan>
- Diningsih, R. F., Wiratmo, P. A., & Lubis, E. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Gizi Terhadap Kejadian Kekurangan Energi Kronik

- (KEK) pada Ibu Hamil. *Binawan Student Journal*, 3(3), 8-15.
<https://doi.org/10.54771/bsj.v3i3.327>
- Direktorat Gizi Masyarakat. (2019). *Laporan Akuntabilitas Kinerja 2018*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
<https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/040712-laporan-kinerja-progr-gizi-tahun-2018>.
- Dwi, E., & Wahyuningsih, P. S. (2019). *Asupan Makan Dengan Kejadian Kek Pada Remaja Putri Di Sman 2 Pare Kabupaten Kediri (Food Intake with Chronic Energy Deficiency in Young Women in Public Senior High*. 1(2), 102–109. ISSN : 2460-6855. *Jurnal Gizi KH*, Volume 1, Nomor 2.
<http://www.jurnal.gizikaryahusadakediri.ac.id/index.php/gizikh/article/view/31/19>
- Fitriana, K. R. (2019). *Efek Konsumsi Alkohol dan Merokok Pada Wanita Hamil*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(2), 233-237. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.159>
- Hamsir, F., As'ad, S., Tahir, A. M., Soraya, D., Fujiiko, M., Chalid, S. M. T., ... & Efendi, S. (2022). *Macro-and Micronutrient of Junk Food and Preeclampsia on Preanant Women*. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(E), 1-6.
<https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.9949>
- Harismavanti, H., & Svukur. S. B. (2021). Analisis kekurangan energi kronik pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Telaga Biru. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 4(2), 162-170.
<https://doi.org/10.56338/mppki.v4i2.1491>
- Hartini, L., & Yusvita, H. (2023). Hubungan Usia Ibu, Usia Kehamilan dan Preeklampsia Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Arga Makmur. *Jurnal Media Kesehatan*, 16(2), 1-12.
<https://doi.org/10.33088/jmk.v16i1.943>
- Haryanti, S. Y. (2019). *Anemia Dan Kek Pada Ibu Hamil Sebagai Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (Bblr) (Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas Juwana Kabupaten Pati)*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*, 7(1), 322–329. <https://doi.org/10.14710/jkm.v7i1.22978>
- Hatijar. H. (2020). *Faktor Risiko Bawi Berat Lahir Rendah di Rumah Sakit Umum Daerah Haii Makassar*. *Jurnal Kebidanan Malakbi*, 1 (1), 16-20.
<https://doi.org/10.33490/b.v1i1.205>
- Helena, D. F., Sarinengsih, Y., Ts, N., & Suhartini, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Soreang Kabupaten Bandung*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Immanuel*, 14(2), 105–112. <https://doi.org/10.36051/jiki.v14i2.143>
- Islam, M. M., Ababneh, F., Akter, T., & Khan, H. R. (2020). Prévalence et facteurs de risque pour l'insuffisance pondérale à la naissance en jordanie et son lien avec la mortalité des moins de cinq ans: Une analyse

- populationnelle. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 26(10), 1273-1284. <https://doi.org/10.26719/emhj.20.096>
- Kaur, S., Ng, C. M., Badon, S. E., Ialil, R. A., Mavkanathan, D., Yim, H. S., & Ian Mohamed, H. I. (2019). *Risk factors for low birth weight among rural and urban Malaysian women*. *BMC Public Health*, 19(4), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6864-4>
- KC, A., Basel, P. L., & Singh, S. (2020). *Low birth weight and its associated risk factors: Health facility-based case-control study*. *PloS one*, 15(6), e0234907. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234907>
- Kemendes RI. (2017). *Buku Saku Pemantauan Status Gizi*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/105/0/012609-buku-saku-psg-2017>
- Kemendes RI. (2021). *Buku Saku Merencanakan Kehamilan Sehat*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. <https://gizikia.kemkes.go.id/assets/file/pedoman/Buku%20Saku%20Kehamilan%20Sehat.pdf>
- Kemendes RI. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. In *Pusdatin.Kemendes.Go.Id*. <https://www.kemendes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2021>
- Koerniawati, R. D. (2022). *Kajian Literatur: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anemia pada Ibu Hamil*. *Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas*, 3(1), 45-50. <http://dx.doi.org/10.52742/jgkp.v3i1.15352>
- Permenkes RI. (2016). *Standar Produk Suplementasi Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/114009/permenkes-no-51-tahun-2016>
- Lestari, M., Fitriani, A., Mauvah, N., & Norisa, N. (2021). *Analisis Faktor Risiko Kejadian BBLR Di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara*. *Jurnal Kebidanan Khatulistiwa*, 7(2), 74-79. <https://doi.org/10.30602/jkk.v7i2.844>
- Levita, S., & Langi, L. (2022). *Hubungan Berbagai Faktor Risiko dengan BBLR di RSUD Kota Tangerang Selatan Periode Maret-Oktober 2021*. *Jurnal Pro-Life*, 9(2), 417-427. <https://doi.org/10.33541/jpvol6iss2pp102>
- Manuaba. (2010). *Ilmu kebidanan, penyakit kandungan dan keluarga berencana untuk pendidikan bidan*. Edisi kedua. Jakarta: EGC.
- Mapandin, A., R, E. Y., & Handayani, S. W. (2021). *Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Lakipadada Kabupaten Toraja*. *MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia The Indonesian Journal Of Health Promotion*, 4(2), 321-329. <https://doi.org/10.56338/mppki.v4i2.1500>
- Marlina, T., & Mastina, M. (2021). *Hubungan Lingkar Lengan Atas, Umur dan*

- Paritas Ibu dengan Kejadian BBLR. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 11(04), 201-207. <https://doi.org/10.33221/jiki.v11i04.1322>
- Mulyaningrum, D., & Rahmaniati, M. (2020). Pengaruh Kehamilan Tidak Diinginkan Dengan Berat Babi Lahir Rendah di Perdesaan (Analisis Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017). *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan (BIKFOKES)*, 1(1), 11-19. <http://dx.doi.org/10.51181/bikfokes.v1i1.4093>
- Mulyaningrum, F. M. (2022). Correlation Between Mother's Age, Chronic Energy Deficiency (KEK) and Anemia to Low Birth Weight Babies at Purwodadi II Public Health Center. *Jurnal Profesi Bidan Indonesia*, 2(2), 01-07. <https://pbijournal.org/index.php/pbi/article/view/40>
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi penelitian kesehatan (Cetakan VI)*. ISBN : 978-623-6351-76-5. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Nurhavati, N., Hamang, S. H., & Thamrin, H. (2022). Faktor Risiko Umur, Paritas, dan Linakar Lenaan Atas Ibu Hamil terhadap Kejadian Berat Badan Lahir Rendah. *Window of Midwifery Journal*, 31-38. <https://doi.org/10.33096/wom.vi.340>
- Nuzula, R. F., Dasuki, D., & Kurniawati, H. F. (2020). Hubungan Kehamilan Pada Usia Remaja Dengan Kejadian Berat Babi Lahir Rendah (Bblr) Di Rsud Panembahan Senopati. *Jurnal Kesehatan Samodra Ilmu*, 11(2), 121-130. <https://doi.org/10.55426/jksi.v11i2.115>
- Pancawardani, R., Amelia, R., & Wahyuni, S. (2022). Usia Kehamilan Ibu Mempengaruhi Keluaran Babi Dengan Berat Badan Lahir Rendah. *Midwifery Care Journal*, 3(2), 40-47. <https://doi.org/10.31983/micajo.v3i2.8312>
- Pedersen, M., Von Stedingk, H., Botsivali, M., Agrunt, S., Alexander, I., Brunborg, G., ... & NewGeneris Consortium. (2012). Birth weight, head circumference, and prenatal exposure to acrylamide from maternal diet: the European prospective mother-child study (NewGeneris). *Environmental health perspectives*, 120 (12), 1739-1745. <https://doi.org/10.1289/ehp.1205327>
- Permana, P., & Wiiava, G. B. R. (2019). Analisis faktor risiko babi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Gianyar I tahun 2016-2017. *Intisari Sains Medis*, 10(3). <https://doi.org/10.15562/ism.v10i3.481>
- Pitriani, T., Nurvinanda, R., & Lestari, I. P. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Meningkatnya Kejadian Babi Berat Lahir Rendah (BBLR). *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(4), 1597-1608. <https://doi.org/10.37287/jppp.v5i4.1884>
- Profil Kesehatan Indonesia. (2019). *Health Statistics and Health Information System*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2019>.

- Profil Kesehatan Indonesia. (2020). *Health Statistics and Health Information System*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2020>.
- Profil Kesehatan Indonesia. (2021). *Health Statistics and Health Information System*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2021>.
- Purba, R. B., Rumagit, F. A., Laoh, J., & Sineke, M. E. (2022, June). Asupan Zat Gizi dan Pendapatan Keluarga dengan Kejadian Kurang Energi Kronik (KEK) pada Siswa Putri di SMA N 1 Belang. In *E-PROSIDING Seminar Nasional 2022 ISBN: 978.623. 93457.1. 6* (Vol. 1, No. 02, pp. 430-440).<https://mail.ejurnal.poltekkes-manado.ac.id/index.php/eprosiding2022/article/view/1725/1065>
- Putri, A. W., Pratitis, A., Luthfiya, L., Wahyuni, S., & Tarmali, A. (2019). Faktor Ibu terhadap Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 3(1), 55-62. <https://doi.org/10.15294/higeia.v3i1.28692>
- Riska, M. A. H., Hanifa, F., & Ola, S. E. (2022). Hubungan Primigravida Muda, Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Sosial Ekonomi dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Puskesmas Tenjo Tahun 2022. *SIMFISIS Jurnal Kebidanan Indonesia*, 2(2), 297-302. <https://doi.org/10.53801/sjki.v2i2.81>
- Sadarang, R. (2021). Kajian kejadian berat badan lahir rendah di Indonesia: Analisis data survei demografi dan kesehatan indonesia tahun 2017. *Jurnal Kesmas Jambi*, 5(2), 28-35. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v5i2.14352>
- Salam, P. R. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR di Kabupaten Jember. *Medical Jurnal Of Al-Qodiri*, 6(2), 98-106.https://doi.org/10.52264/jurnal_stikesalqodiri.v6i2.100
- Sari, A. K., & Wahyuni, S. (2021). Hubungan Usia Ibu Bersalin dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). *Midwifery Journal*, 1(3), 131-134. <http://dx.doi.org/10.33024/mj.v1i3.5204>
- Sastri. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keiadian Bavi Berat Badan Lahir Rendah. *Jurnal'Aisyiyah Medika*, 7(2).<https://doi.org/10.36729/jam.v7i2.862>
- Sembiring, I. B., Pratiwi, D., & Sarumaha, A. (2019). *Hubunaan usia, paritas dan usia kehamilan denaan bavi berat lahir rendah di rumah sakit umum mitra medika medan*. *Jurnal Bidan Komunitas*, 2(1), 38-46. <https://doi.org/10.33085/jbk.v2i1.4110>
- Septiani, B. D. S., Nurmaningsih, N., & Nisa, S. H. (2021). Penyuluhan Gizi Seimbang Pada Ibu Balita Gizi Kurang Di Desa Beleke Kabupaten Lombok


- Barat. *Ipkm: Jurnal Penaabdian Kesehatan Masyarakat*, 2(2), 126-134. <https://doi.org/10.37905/jpkm.v2i1.11377>
- Siantar, R. L., Sirait, L. I., & Aisah, S. (2021). *Kehamilan Remaja Dengan Insidensi Bayi Lahir Berat (BBLR)*. 436-440. ISSN : 2775-3530. <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/PSNSYS/article/download/950/685>
- Sitorus, F., Anita, S., & Bancin, D. R. (2022). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (Bblr) Di Kelurahan Gedung Johor Kota Medan. *Jurnal Health Reproductive*, 7(2), 32-37. <https://doi.org/10.51544/jrh.v7i2.3643>
- Sukfitrianty, S., Aswadi, A., & Lagu, A. M. H. (2016). Faktor risiko hipertensi pada ibu hamil di rumah sakit hikmah kota Makassar. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*. <https://doi.org/10.24252/as.v8i1.2086>
- Suroso, S., & Yenni, M. (2023). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Bblr (Bavi Berat Lahir Rendah) Di Rumah Sakit Umum Daerah Haii Abdoel Madiid Batoe Muara Bulian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(3), 631-638. <https://doi.org/10.47492/jip.v4i3.2752>
- Sohibien, G. P. D., & Yuhan, R. I. (2019). *Determinan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia: Determinan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Indonesia*. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, 11(1), 1-14. <https://doi.org/10.34123/jurnalasks.v11i1.182>
- Srimiyati, & Ajul, K. (2021). *Determinan Risiko Terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah*. *Journal of Telenursing (joting)*, 3(1), 334-346. <https://doi.org/10.31539/joting.v3i1.2279>
- Sugiyono, D. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ISBN : 979-8433-71-8. Bandung: Alfabeta.
- Swamilaksita, P. D., Devi Angeliana, K., & Sa'bang, M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi Perbaikan Gizi Ibu Hamil Dengan Meningkatkan Konsumsi Makanan Alami*. *Jurnal Abdimas Volume 6 Nomor 1, September 2019* <https://doi.org/10.47007/abd.v6i.2877>
- Wachamo, T. M., Bililign Yimer, N., & Bizuneh, A. D. (2019). *Risk factors for low birth weight in hospitals of North Wello zone, Ethiopia: A case-control study*. *PloSone*, 14(3), e0213054. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.021304>
- Wahyuni, W. T., Wardhana, A. W., & Riastiti, Y. (2021). *Hubungan Anemia, Usia Ibu, Paritas Dan Jarak Kehamilan Dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah Di Rsud Abdul Wahab Sjahrane Samarinda*. *Jurnal Medika: Karya Ilmiah Kesehatan*, 6(1). <https://doi.org/10.35728/jmkik.v6i1.692>
- WHO. (2004). *Filcher of Good Names: An Enquiry Into Antrhropology and Gossip*. *In Man (Vol. 9, Issue 1)*. <https://doi.org/10.2307/2800038>
- Widyastuti, A., & Azinar, M. (2021). Pernikahan Usia Remaja dan Risiko

terhadap Keadian BBLR di Kabupaten Kendal. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 5(4), 569-576. <https://doi.org/10.15294/higeia.v5i4.50194>

World Health Organization. (2019). *Unicef-Who low birth weight estimates: levels and trends 2000-2015* (No. who/nmh/nhd/19.21). World Health Organization. [http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30565-5](http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30565-5)

World Health Organization. (2023). *UNICEF/WHO Low Birthweight Estimates: levels and trends 2000-2020*. World Health Organization. <https://books.google.co.id/books?id=z7rLEAAAOBAI&lpq=PA32&ots=tF4Y6Uk8LV&da=unicef%202020%20lbw&lr&hl=id&pg=PA2#v=onepage&q=unicef%202020%20lbw&f=false>

World Health Rankings. (2020). <https://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/low-birth-weight/by-country/> - diakses 20 Juli 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa

KUESIONER PENELITIAN
FAKTOR RISIKO KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH
(BBLR) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CAILE
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Tanggal Pengisian :

No. Kuesioner :

Bersama ini saya memohon kesediaan ibu/responden untuk mengisi daftar kuesioner. Informasi yang ibu berikan digunakan untuk melengkapi data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022”** untuk itu diharapkan ibu/responden bersedia meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan / pernyataan (kuesioner) berikut:

A. IDENTITAS RESPONDEN

a. Karakteristik Bayi

1. Nama Bayi :
2. Umur Bayi : Bulan
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Riwayat Berat Badan Lahir Bayi :gr

b. Karakteristik Ayah

1. Nama :
2. Tinggi badan :
3. Umur :
4. Pendidikan :

Tidak Bersekolah

SD

SMP

SMA/SMK

Perguruan Tinggi

5. Pekerjaan :

Tidak Bekerja

Wiraswasta

Pegawai Swasta

PNS

Petani

c. Karakteristik Ibu

6. Nama :

7. Tinggi badan :

8. Umur :

9. Pendidikan :

Tidak Bersekolah

SD

SMP

SMA/SMK

Perguruan Tinggi

10. Pekerjaan :

Tidak Bekerja

Wiraswasta

Pegawai Swasta

PNS

Petani

A. USIA IBU

11. Berapakan usia pada saat melahirkan anak terakhir?

a. < 20 Tahun

b. 20-35 Tahun

c. > 35 Tahun

B. USIA KEHAMILAN

12. Berapakan umur kandungan ibu saat melahirkan anak terakhir?

- a. < 37 minggu b. \geq 37 minggu

C. KEKURANGAN ENERGI KRONIK (KEK)

13. Ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) :

- a. < 23,5 cm b. \geq 23,5 cm

D. PARITAS

14. Berapa banyak anak yang pernah ibu lahirkan sampai saat ini?

- a. 1 anak b. 2-3 anak c. \geq 4 anak

E. KONSUMSI *JUNK FOOD*

15. Seberapa seringkah anda konsumsi *junk food* selama kehamilan? Makanan yang termasuk *junk food* yaitu:



Makanan kaleng



Makanan gorengan



Mie instan



Makanan manisan



Makanan daging yang diproses



Makanan yang dibakar atau dipanggang



Makanan manis beku



Makanan daging berlemak



Jeroan

- a. > 3 kali dalam seminggu b. \leq 3 kali dalam seminggu

F. KOMPLIKASI KEHAMILAN

16. Cheklist jawaban dibawah ini sesuai dengan keadaan yang pernah dialami ibu selama hamil :

No	Komplikasi Kehamilan	Ya	Tidak	Usia Kandungan
1	Muntah/mual dan tidak mau makan			
2	Demam tinggi			
3	Bengkak kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang			
4	Pendarahan pada hamil muda dan hamil tua			
5	Air ketuban keluar sebelum waktunya			
6	Janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya			
7	Terasa sakit pada saat buang air kecil atau keluar keputihan/gatal-gatal di daerah kemaluan			
8	Jantung berdebar-debar atau nyeri di dada			
9	Diare berulang			
10	Batuk lama (lebih dari 2 minggu)			

Lampiran 2 Informed Consent

INFORMED CONSENT

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Telah mendapat keterangan secara rinci dan jelas mengenai :

1. Penelitian yang berjudul “Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022”
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian
4. Bahaya yang akan timbul
5. Prosedur Penelitian

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

.....,..... 2023

Responden,

.....

Lampiran 3 Keterangan Layak Etik



ALAUDDIN

J.H.M. Yasir Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fk@iain-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No: B.008/KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Hidayatul Muzdalifah
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul
Title

" Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 "
" Risk Factors for Low Birth Weight (LBW) in Caile Community Health Center Working Area, Bulukumba Regency in 2022 "

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard!

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2024

This declaration of ethics applies during the period September 5, 2023 until September 5, 2024.

September 5, 2023
Professor and Chairperson.

DR. Hj. Geny Nastity Landayany, M.Si., Apt.

Lampiran 4 Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 23749/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Bulukumba
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Aalauddin Makassar Nomor : B-01384/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: HIDAYATUL MUZDALIFAH	
Nomor Pokok	: 70200119096	
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" FAKTOR RISIKO KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CAILE KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Agustus s/d 30 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Aalauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 502/DPMPTSPTK/IP/VIII/2023**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor 074/877/Bakesbangpol/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :


Nama Lengkap	: Hidayatul Muzdalifah
Nomor Pokok	: 70200119096
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Jenjang	: S1
Institusi	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Tempat/Tanggal Lahir	: Nanasaya / 2001-04-21
Alamat	: Nanasaya
Jenis Penelitian	: Skripsi
Judul Penelitian	: FAKTOR RISIKO KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CAILE KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022
Lokasi Penelitian	: Bulukumba
Pendamping	: Nildawati Amir, SKM., M.Epid dan Zilfadhilah Arranury, SKM., M.Kes
Instansi Penelitian	: Puskesmas Caile
Lama Penelitian	: tanggal 21 Agustus 2023 s/d 30 September 2023

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 23 Agustus 2023



	Kepala Dinas DPMPTSPTK
	Dra. Hj. Umrah Aswani, MM
	Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/c
	Nip : 19670304 199303 2 010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CAILE**

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kode Pos: 92511 Telp:(0413) 84677 email: puskesmascaile@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 556/PKM-C/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Suwarni Dewi, SKM
NIP : 19641218 199403 2 008
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV b
Jabatan : Kasubag TU UPT Puskesmas Caile

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HIDAYATUL MUZDALIFAH
Nim : 70200119096
Program Studi : SI Kesehatan Masyarakat
Judul : "FAKTOR RISIKO KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CAILE KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022"

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba pada tanggal 21 Agustus – 30 September 2023. Selama penelitian tersebut yang bersangkutan menunjukkan sikap baik,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

Kasubag TU UPT Puskesmas Caile



Hj. Suwarni Dewi, SKM
Nip: 19641218/199403 2 008

Lampiran 6 Master Tabel Responden

MASTER TABEL RESPONDEN
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CAILE KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No	B2	B3	B4	A2	A3	A4	A5	I2	I3	I4	I5	V1	V2	V3	V4	V5	V6
1	20 bulan	L	BBLR	37 Tahun	SMP	Wiraswasta	156 cm	35 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	145 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
2	19 bulan	L	BBLR	29 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	26 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	149 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Ya
3	19 bulan	P	BBLR	32 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	155 cm	30 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
4	18 bulan	L	BBLR	37 Tahun	SMP	Wiraswasta	157 cm	35 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Ya
5	18 bulan	L	BBLR	39 Tahun	SMP	Wiraswasta	158 cm	36 Tahun	SD	Tidak Bekerja	159 cm	>35 Tahun	<23,5 cm	2-3 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
6	17 bulan	P	BBLR	28 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	158 cm	25 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Ya
7	17 bulan	L	BBLR	20 Tahun	SMP	Wiraswasta	160 cm	19 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	150 cm	<20 Tahun	<23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Ya
8	17 bulan	L	BBLR	28 Tahun	SMP	Wiraswasta	158 cm	27 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	151 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
9	16 bulan	L	BBLR	30 Tahun	SMP	Wiraswasta	156 cm	32 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	152 cm	>35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
10	16 bulan	P	BBLR	33 Tahun	SD	Wiraswasta	160 cm	33 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak

No	B2	B3	B4	A2	A3	A4	A5	I2	I3	I4	I5	V1	V2	V3	V4	V5	V6
	bulan			Tahun			cm	Tahun		Bekerja		Tahun	cm	anak	seminggu	minggu	
11	15 bulan	L	BBLR	29 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	159 cm	26 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
12	15 bulan	L	BBLR	20 Tahun	SMP	Wiraswasta	159 cm	18 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	155 cm	<20 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Ya
13	15 bulan	L	BBLR	27 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	155 cm	19 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	<20 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
14	14 bulan	P	BBLR	22 Tahun	SMP	Wiraswasta	155 cm	24 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Ya
15	14 bulan	L	BBLR	29 Tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Swasta	157 cm	30 Tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Swasta	156 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
16	13 bulan	L	BBLR	23 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	162 cm	24 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	157 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
17	13 bulan	P	BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	163 cm	24 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	157 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
18	12 bulan	L	BBLR	28 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	157 cm	28 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	157 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
19	12 bulan	P	BBLR	40 Tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Swasta	167 cm	38 Tahun	SD	Tidak Bekerja	157 cm	>35 Tahun	<23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
20	11 bulan	P	BBLR	24 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	159 cm	23 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	156 cm	<20 tahun	<23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Ya
21	11 bulan	L	BBLR	22 Tahun	SMP	Wiraswasta	162 cm	24 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	157 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Ya

No	B2	B3	B4	A2	A3	A4	A5	I2	I3	I4	I5	V1	V2	V3	V4	V5	V6
				n				n				n		k			
22	10 bulan	L	BBLR	25 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	158 cm	22 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	158 cm	<20 tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
23	10 bulan	L	BBLR	28 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	158 cm	24 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	159 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Ya
24	10 bulan	P	BBLR	21 Tahun	SMP	Wiraswasta	165 cm	24 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	160 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
25	9 bulan	L	BBLR	30 Tahun	SMP	Wiraswasta	168 cm	25 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	160 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
26	20 bulan	L	BBLR	27 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	156 cm	25 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	2-3 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
27	18 bulan	P	BBLR	30 Tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Swasta	158 cm	27 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
28	16 bulan	L	BBLR	34 Tahun	Perguruan Tinggi	PNS	158 cm	32 Tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Swasta	155 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
29	16 bulan	L	BBLR	27 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	26 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
30	13 bulan	L	BBLR	25 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	158 cm	29 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
31	13 bulan	L	BBLR	29 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	25 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
32	13 bulan	P	BBLR	20 Tahun	SMP	Wiraswasta	160 cm	19 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	155 cm	<20 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Ya

No	B2	B3	B4	A2	A3	A4	A5	I2	I3	I4	I5	V1	V2	V3	V4	V5	V6
33	12 bulan	P	BBLR	27 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	165 cm	29 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
34	9 bulan	L	BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	157 cm	30 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	160 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
35	9 bulan	L	BBLR	29 Tahun	SMP	Wiraswasta	157 cm	19 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	155 cm	<20 Tahun	<23,5 cm	2-3 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
36	9 bulan	L	BBLR	23 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	158 cm	24 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Ya
37	11 bulan	L	BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	158 cm	22 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Ya
38	11 bulan	P	BBLR	30 Tahun	SMP	Wiraswasta	156 cm	27 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
39	11 bulan	L	BBLR	29 Tahun	SMP	Wiraswasta	163 cm	25 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	158 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
40	11 bulan	P	BBLR	32 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	168 cm	30 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
41	11 bulan	L	BBLR	24 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	24 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
42	11 bulan	P	BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	158 cm	23 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
43	11 bulan	L	BBLR	25 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	23 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	> 3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
44	11	L	BBLR	20	SMP	Wiraswasta	156	19	SMP	Tidak	155	<20	<23,5	1	>3 kali dalam	<37	Tidak

No	B2	B3	B4	A2	A3	A4	A5	I2	I3	I4	I5	V1	V2	V3	V4	V5	V6
	bulan			Tahun			cm	Tahun		Bekerja	cm	Tahun	cm	anak	seminggu	minggu	
45	11 bulan	P	BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	24 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Ya
46	11 bulan	L	BBLR	21 Tahun	SMP	Wiraswasta	158 cm	22 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
47	11 bulan	L	BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	156 cm	22 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
48	11 bulan	L	BBLR	23 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	24 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	160 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
49	11 bulan	L	BBLR	25 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	156 cm	21 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	157 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
50	11 bulan	P	BBLR	25 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	157 cm	20 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	156 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
51	11 bulan	L	BBLR	28 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	157 cm	24 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
52	11 bulan	P	BBLR	20 Tahun	SMP	Wiraswasta	157 cm	22 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
53	11 bulan	L	BBLR	30 Tahun	SMP	Wiraswasta	158 cm	26 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	157 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
54	11 bulan	L	BBLR	31 Tahun	SMP	Wiraswasta	158 cm	30 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	157 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	2-3 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
55	11 bulan	L	BBLR	26 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	158 cm	31 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak

No	B2	B3	B4	A2	A3	A4	A5	I2	I3	I4	I5	V1	V2	V3	V4	V5	V6
				n				n				n		k			
56	11 bulan	P	BBLR	26 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	157 cm	28 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
57	11 bulan	L	BBLR	25 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	26 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
58	11 bulan	L	BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	157 cm	23 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
59	11 bulan	L	BBLR	23 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	156 cm	23 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	157 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
60	11 bulan	P	BBLR	21 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	22 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	157 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
61	11 bulan	L	BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	158 cm	20 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
62	11 bulan	L	BBLR	25 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	156 cm	20 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
63	11 bulan	L	BBLR	28 Tahun	SMP	Wiraswasta	160 cm	20 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
64	11 bulan	P	BBLR	26 Tahun	SMP	Wiraswasta	157 cm	23 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
65	11 bulan	L	BBLR	30 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	23 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
66	11 bulan	L	BBLR	33 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	33 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	2-3 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak

No	B2	B3	B4	A2	A3	A4	A5	I2	I3	I4	I5	V1	V2	V3	V4	V5	V6
67	12 bulan	L	Tidak BBLR	32 Tahun	SMP	Wiraswasta	174 cm	35 Tahun	SD	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
68	12 bulan	P	Tidak BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	168 cm	20 Tahun	Tidak Bersekolah	Tidak Bekerja	165 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
69	13 bulan	P	Tidak BBLR	34 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	159 cm	32 Tahun	Perguruan Tinggi	Tidak Bekerja	145 cm	20-35 Tahun	<23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
70	13 bulan	P	Tidak BBLR	36 Tahun	SMP	Wiraswasta	159 cm	33 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	152 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	>37 minggu	Tidak
71	13 bulan	L	Tidak BBLR	29 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	163 cm	30 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Ya
72	17 bulan	P	Tidak BBLR	39 Tahun	SMP	Wiraswasta	163 cm	41 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	153 cm	>35 Tahun	<23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
73	16 bulan	L	Tidak BBLR	28 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	162 cm	28 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
74	17 bulan	L	Tidak BBLR	45 Tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Swasta	159 cm	32 Tahun	SMA/SMK	Pegawai Swasta	165 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
75	17 bulan	P	Tidak BBLR	44 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	170 cm	34 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
76	18 bulan	L	Tidak BBLR	18 Tahun	SD	Wiraswasta	170 cm	18 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	150 cm	<20 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
77	13 bulan	P	Tidak BBLR	22 Tahun	SMP	Wiraswasta	165 cm	19 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	152 cm	< 20 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
78	13	P	Tidak	40	SMA/SMK	Wiraswasta	165	32	SD	Tidak	160	20-35	≥23,5	2-3	≤3 kali dalam	≥37	Tidak

No	B2	B3	B4	A2	A3	A4	A5	I2	I3	I4	I5	V1	V2	V3	V4	V5	V6
	bulan		BBLR	Tahun			cm	Tahun		Bekerja	cm	Tahun	cm	anak	seminggu	minggu	
79	13 bulan	L	Tidak BBLR	38 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	165 cm	25 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	165 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Ya
80	14 bulan	P	Tidak BBLR	32 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	165 cm	32 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
81	14 bulan	L	Tidak BBLR	25 Tahun	SD	Wiraswasta	175 cm	20 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	151 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
82	19 bulan	L	Tidak BBLR	31 Tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Swasta	161 cm	28 Tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Swasta	160 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
83	19 bulan	P	Tidak BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	165 cm	24 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Ya
84	19 bulan	P	Tidak BBLR	40 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	36 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	160 cm	> 35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
85	20 bulan	P	Tidak BBLR	30 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	162 cm	25 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Ya
86	20 bulan	P	Tidak BBLR	34 Tahun	SMP	Wiraswasta	168 cm	32 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
87	15 bulan	P	Tidak BBLR	30 Tahun	SMP	Wiraswasta	168 cm	26 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
88	15 bulan	L	Tidak BBLR	23 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	24 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	151 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
89	15 bulan	P	Tidak BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	162 cm	24 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	159 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak

No	B2	B3	B4	A2	A3	A4	A5	I2	I3	I4	I5	V1	V2	V3	V4	V5	V6
				n				n				n		k			
90	15 bulan	P	Tidak BBLR	33 Tahun	Perguruan Tinggi	PNS	168 cm	32 Tahun	Perguruan Tinggi	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
91	15 bulan	L	Tidak BBLR	27 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	25 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	>3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
92	20 bulan	P	Tidak BBLR	33 Tahun	SMP	Wiraswasta	156 cm	32 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
93	20 bulan	P	Tidak BBLR	26 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	163 cm	27 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
94	20 bulan	P	Tidak BBLR	28 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	162 cm	27 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	156 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
95	20 bulan	P	Tidak BBLR	27 Tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Swasta	157 cm	25 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	156 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
96	20 bulan	P	Tidak BBLR	27 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	175 cm	29 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	159 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
97	20 bulan	P	Tidak BBLR	30 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	165 cm	30 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
98	19 bulan	L	Tidak BBLR	34 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	156 cm	32 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
99	19 bulan	P	Tidak BBLR	27 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	163 cm	31 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
100	19 bulan	P	Tidak BBLR	25 Tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Swasta	165 cm	24 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak

No	B2	B3	B4	A2	A3	A4	A5	I2	I3	I4	I5	V1	V2	V3	V4	V5	V6
101	19 bulan	L	Tidak BBLR	21 Tahun	SMP	Wiraswasta	157 cm	22 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	151 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
102	19 bulan	P	Tidak BBLR	26 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	165 cm	28 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
103	18 bulan	L	Tidak BBLR	21 Tahun	SMP	Wiraswasta	160 cm	24 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	151 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
104	18 bulan	L	Tidak BBLR	31 Tahun	SMP	Wiraswasta	160 cm	27 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	<37 minggu	Tidak
105	18 bulan	P	Tidak BBLR	21 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	165 cm	22 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	156 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Ya
106	18 bulan	P	Tidak BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	23 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
107	18 bulan	P	Tidak BBLR	31 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	165 cm	25 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
108	17 bulan	L	Tidak BBLR	25 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	174 cm	23 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	157 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
109	17 bulan	P	Tidak BBLR	33 Tahun	SMP	Wiraswasta	162 cm	32 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	158 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
110	17 bulan	P	Tidak BBLR	28 Tahun	SMP	Wiraswasta	160 cm	29 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	156 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
111	17 bulan	L	Tidak BBLR	30 Tahun	SMP	Wiraswasta	163 cm	25 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	156 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
112	17	P	Tidak	21	SMA/SMK	Wiraswasta	162	22	SMA/SMK	Tidak	155	20-35	≥23,5	1	≤3 kali dalam	≥37	Tidak

No	B2	B3	B4	A2	A3	A4	A5	I2	I3	I4	I5	V1	V2	V3	V4	V5	V6
	bulan		BBLR	Tahun			cm	Tahun		Bekerja	cm	Tahun	cm	anak	seminggu	minggu	
113	16 bulan	L	Tidak BBLR	26 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	165 cm	31 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	159 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
114	16 bulan	L	Tidak BBLR	21 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	158 cm	19 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	150 cm	< 20 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Ya
115	16 bulan	P	Tidak BBLR	31 Tahun	SMP	Wiraswasta	162 cm	30 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	156 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
116	16 bulan	P	Tidak BBLR	34 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	160 cm	31 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
117	16 bulan	P	Tidak BBLR	21 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	175 cm	23 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	160 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
118	16 bulan	L	Tidak BBLR	22 Tahun	SMP	Wiraswasta	160 cm	30 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
119	15 bulan	P	Tidak BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	162 cm	23 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
120	15 bulan	L	Tidak BBLR	24 Tahun	SD	Wiraswasta	158 cm	31 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	151 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
121	15 bulan	P	Tidak BBLR	25 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	165 cm	26 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	158 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
122	15 bulan	L	Tidak BBLR	26 Tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Swasta	174 cm	29 Tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Swasta	156 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
123	15 bulan	P	Tidak BBLR	32 Tahun	SD	Wiraswasta	158 cm	30 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	151 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak

No	B2	B3	B4	A2	A3	A4	A5	I2	I3	I4	I5	V1	V2	V3	V4	V5	V6
				n				n				n		k			
124	14 bulan	L	Tidak BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	158 cm	20 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
125	14 bulan	P	Tidak BBLR	31 Tahun	SMP	Wiraswasta	165 cm	30 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	160 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
126	14 bulan	P	Tidak BBLR	23 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	168 cm	24 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	1 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
127	14 bulan	P	Tidak BBLR	25 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	168 cm	23 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
128	14 bulan	L	Tidak BBLR	25 Tahun	SMP	Wiraswasta	156 cm	21 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
129	13 bulan	P	Tidak BBLR	25 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	167 cm	25 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	157 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
130	13 bulan	P	Tidak BBLR	31 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	163 cm	25 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	154 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
131	13 bulan	P	Tidak BBLR	22 Tahun	SMA/SMK	Wiraswasta	170 cm	20 Tahun	SMA/SMK	Tidak Bekerja	155 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak
132	13 bulan	L	Tidak BBLR	24 Tahun	SMP	Wiraswasta	160 cm	20 Tahun	SMP	Tidak Bekerja	150 cm	20-35 Tahun	≥23,5 cm	2-3 anak	≤3 kali dalam seminggu	≥37 minggu	Tidak

Keterangan :

B2 = Umur Bayi

B3 = Jenis kelamin

B4 = Riwayat berat badan lahir bayi

A2 = Umur ayah

A3 = Pendidikan terakhir ayah

A4 = Pekerjaan ayah

A5 = Tinggi badan ayah

I2 = Umur ibu

I3 = Pendidikan terakhir ibu

I4 = Pekerjaan ibu

I5 = Tinggi badan ibu

V1 = Usia ibu melahirkan

V2 = Kekurangan energi kronik

V3 = Paritas

V4 = Kebiasaan konsumsi *junk food* ketika hamil

V5 = Usia kehamilan

V6 = Komplikasi kehamilan

Lampiran 7 Output Analisis Data Statistical Product and Service Solutions (SPSS)

1. Karakteristik Responden

a. Karakteristik Ibu

1) Umur

Umur Ibu					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Valid	18-23 tahun	Frequency	25	17	42
		Valid Percent	37.9%	25.8%	31.8%
	24-29 tahun	Frequency	28	25	53
		Valid Percent	42.4%	37.9%	40.2%
	30-35 tahun	Frequency	11	22	33
		Valid Percent	16.7%	33.3%	25.0%
	36-41 tahun	Frequency	2	2	4
		Valid Percent	3.0%	3.0%	3.0%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

2) Pendidikan

Pendidikan Ibu						
			Berat Badan Bayi		Total	
			Kasus	Kontrol		
Valid	Tidak Bersekolah	Frequency	0	1	1	
		Valid Percent	0.0%	1.5%	0.8%	
	SD	Frequency	2	2	4	
		Valid Percent	3.0%	3.0%	3.0%	
	SMP	Frequency	25	22	47	
		Valid Percent	37.9%	33.3%	35.6%	
	SMA/SMK	Frequency	37	37	74	
		Valid Percent	56.1%	56.1%	56.1%	
	Perguruan Tinggi	Frequency	2	4	6	
		Valid Percent	3.0%	6.1%	4.5%	
	Total		Frequency	66	66	132
			Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

3) Pekerjaan

Pekerjaan Ibu					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Valid	Tidak Bekerja	Frequency	64	63	127
		Valid Percent	97.0%	95.5%	96.2%
	Pegawai Swasta	Frequency	2	3	5
		Valid Percent	3.0%	4.5%	3.8%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

4) Tinggi Badan

Tinggi Badan Ibu					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Valid	145-151 cm	Frequency	13	20	33
		Valid Percent	19.7%	30.3%	25.0%
	152-158 cm	Frequency	47	35	82
		Valid Percent	71.2%	53.0%	62.1%
	159-165 cm	Frequency	6	11	17
		Valid Percent	9.1%	16.7%	12.9%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

b. Karakteristik Ayah

1) Umur

Umur Ayah						
			Berat Badan Bayi		Total	
			Kasus	Kontrol		
Valid	18-24 tahun	Frequency	24	20	44	
		Valid Percent	36.4%	30.3%	33.3%	
	25-31 tahun	Frequency	33	29	62	
		Valid Percent	50.0%	43.9%	47.0%	
	32-38 tahun	Frequency	7	12	19	
		Valid Percent	10.6%	18.2%	14.4%	
	39-45 tahun	Frequency	2	5	7	
		Valid Percent	3.0%	7.6%	5.3%	
	Total		Frequency	66	66	132
			Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

2) Pendidikan

Pendidikan Ayah					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Valid	SD	Frequency	1	4	5
		Valid Percent	1.5%	6.1%	3.8%
	SMP	Frequency	22	18	40
		Valid Percent	33.3%	27.3%	30.3%
	SMA/SMK	Frequency	39	38	77
		Valid Percent	59.1%	57.6%	58.3%
	Perguruan Tinggi	Frequency	4	6	10
		Valid Percent	6.1%	9.1%	7.6%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

3) Pekerjaan

Pekerjaan Ayah					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Valid	Wiraswasta	Frequency	62	60	122
		Valid Percent	93.9%	90.9%	92.4%
	Pegawai Swasta	Frequency	3	5	8
		Valid Percent	4.5%	7.6%	6.1%
	PNS	Frequency	1	1	2
		Valid Percent	1.5%	1.5%	1.5%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

4) Tinggi badan

Tinggi Badan					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Valid	156-161 cm	Frequency	57	23	80
		Valid Percent	86.4%	34.8%	60.6%
	162-167 cm	Frequency	7	26	33
		Valid Percent	10.6%	39.4%	25.0%
	168-173 cm	Frequency	2	12	14
		Valid Percent	3.0%	18.2%	10.6%
	174-179 cm	Frequency	0	5	5
		Valid Percent	0.0%	7.6%	3.8%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

c. Karakteristik Bayi

1) Umur

Umur Bayi					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Valid	9-12 bulan	Frequency	41	2	43
		Valid Percent	62.1%	3.0%	32.6%
	13-16 bulan	Frequency	15	34	49
		Valid Percent	22.7%	51.5%	37.1%
	17-20 bulan	Frequency	10	30	40
		Valid Percent	15.2%	45.5%	30.3%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

2) Jenis kelamin

Jenis Kelamin					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Valid	Laki-laki	Frequency	46	24	70
		Valid Percent	69.7%	36.4%	53.0%
	Perempuan	Frequency	20	42	62
		Valid Percent	30.3%	63.6%	47.0%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

3) Riwayat berat badan lahir bayi

Riwayat Berat Badan Lahir Bayi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BBLR	66	50.0	50.0	50.0
	Tidak BBLR	66	50.0	50.0	100.0
	Total	132	100.0	100.0	

2. Analisis Univariat

a. Usia Ibu

Usia Ibu					
		Berat Badan Bayi			Total
		Kasus	Kontrol		
Valid	Risiko tinggi	Frequency	11	5	16
		Valid Percent	16.7%	7.6%	12.1%
	Risiko rendah	Frequency	55	61	116
		Valid Percent	83.3%	92.4%	87.9%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

b. Kekurangan Energi Kronik

Kekurangan Energi Kronik					
		Berat Badan Bayi			Total
		Kasus	Kontrol		
Valid	Risiko tinggi	Frequency	38	2	40
		Valid Percent	57.6%	3.0%	30.3%
	Risiko rendah	Frequency	28	64	92
		Valid Percent	42.4%	97.0%	69.7%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

c. Paritas

Paritas					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Valid	Risiko tinggi	Frequency	48	24	72
		Valid Percent	72.7%	36.4%	54.5%
	Risiko rendah	Frequency	18	42	60
		Valid Percent	27.3%	63.6%	45.5%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

d. Konsumsi *Junk Food* Ketika Hamil

Konsumsi Junk Food					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Valid	Risiko tinggi	Frequency	37	4	41
		Valid Percent	56.1%	6.1%	31.1%
	Risiko rendah	Frequency	29	62	91
		Valid Percent	43.9%	93.9%	68.9%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

e. Usia Kehamilan

Usia Kehamilan					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Valid	Risiko tinggi	Frequency	38	3	41
		Valid Percent	57.6%	4.5%	31.1%
	Risiko rendah	Frequency	28	63	91
		Valid Percent	42.4%	95.5%	68.9%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

f. Komplikasi Kehamilan

Komplikasi Kehamilan					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Valid	Ya	Frequency	13	6	19
		Valid Percent	19.7%	9.1%	14.4%
	Tidak	Frequency	53	60	113
		Valid Percent	80.3%	90.9%	85.6%
Total		Frequency	66	66	132
		Valid Percent	100.0%	100.0%	100.0%

3. Analisis Bivariat

a. Usia Ibu

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia Ibu * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	132	100.0%	0	0.0%	132	100.0%

Usia Ibu * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi Crosstabulation					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Usia Ibu	Risiko tinggi	Count	11	5	16
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	16.7%	7.6%	12.1%
	Risiko rendah	Count	55	61	116
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	83.3%	92.4%	87.9%
Total		Count	66	66	132
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.560 ^a	1	.110		
Continuity Correction ^b	1.778	1	.182		
Likelihood Ratio	2.616	1	.106		
Fisher's Exact Test				.181	.091
Linear-by-Linear Association	2.541	1	.111		
N of Valid Cases	132				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia Ibu Saat Melahirkan (Risiko tinggi / Risiko rendah)	2.440	.798	7.465
For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = BBLR	1.450	.990	2.124
For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = Tidak BBLR	.594	.282	1.254
N of Valid Cases	132		

b. Kekurangan Energi Kronik

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kekurangan Energi Kronik * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	132	100.0%	0	0.0%	132	100.0%

Kekurangan Energi Kronik * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi Crosstabulation					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Kekurangan Energi Kronik	Risiko tinggi	Count	38	2	40
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	57.6%	3.0%	30.3%
	Risiko rendah	Count	28	64	92
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	42.4%	97.0%	69.7%
Total		Count	66	66	132
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	46.487 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	43.940	1	.000		
Likelihood Ratio	54.041	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	46.135	1	.000		
N of Valid Cases	132				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kekurangan Energi Kronik (Risiko tinggi / Risiko rendah)	43.429	9.791	192.628
For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = BBLR	3.121	2.273	4.286
For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = Tidak BBLR	.072	.018	.279
N of Valid Cases	132		

c. Paritas

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Paritas * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	132	100.0%	0	0.0%	132	100.0%

Paritas * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi Crosstabulation					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Paritas	Risiko tinggi	Count	48	24	72
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	72.7%	36.4%	54.5%
	Risiko rendah	Count	18	42	60
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	27.3%	63.6%	45.5%
Total		Count	66	66	132
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17.600 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	16.164	1	.000		
Likelihood Ratio	18.029	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	17.467	1	.000		
N of Valid Cases	132				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Paritas (Risiko tinggi / Risiko rendah)	4.667	2.230	9.764
For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = BBLR	2.222	1.461	3.381
For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = Tidak BBLR	.476	.330	.687
N of Valid Cases	132		

d. Konsumsi *Junk food* Ketika Hamil

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Konsumsi Junk Food * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	132	100.0%	0	0.0%	132	100.0%

Konsumsi Junk Food * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi Crosstabulation					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Konsumsi Junk Food	Risiko tinggi	Count	37	4	41
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	56.1%	6.1%	31.1%
	Risiko rendah	Count	29	62	91
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	43.9%	93.9%	68.9%
Total		Count	66	66	132
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	38.528 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	36.228	1	.000		
Likelihood Ratio	42.868	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	38.236	1	.000		
N of Valid Cases	132				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Konsumsi Junk Food (Risiko tinggi / Risiko rendah)	19.776	6.440	60.724
For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = BBLR	2.832	2.063	3.887
For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = Tidak BBLR	.143	.056	.367
N of Valid Cases	132		

e. Usia Kehamilan

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia Kehamilan * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	132	100.0%	0	0.0%	132	100.0%

Usia Kehamilan * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi Crosstabulation					
			Berat Badan Bayi		Total
			BBLR	Tidak BBLR	
Usia Kehamilan	Risiko tinggi	Count	38	3	41
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	57.6%	4.5%	31.1%
	Risiko rendah	Count	28	63	91
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	42.4%	95.5%	68.9%
Total		Count	66	66	132
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	43.340 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	40.898	1	.000		
Likelihood Ratio	49.188	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	43.011	1	.000		
N of Valid Cases	132				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia Kehamilan (Risiko tinggi / Risiko rendah)	28.500	8.109	100.162
For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = BBLR	3.012	2.187	4.148
For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = Tidak BBLR	.106	.035	.317
N of Valid Cases	132		

f. Komplikasi Kehamilan

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Komplikasi Kehamilan * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	132	100.0%	0	0.0%	132	100.0%

Komplikasi Kehamilan * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi Crosstabulation					
			Berat Badan Bayi		Total
			Kasus	Kontrol	
Komplikasi Kehamilan	Ya	Count	13	6	19
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	19.7%	9.1%	14.4%
	Tidak	Count	53	60	113
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	80.3%	90.9%	85.6%
Total		Count	66	66	132
		% within Riwayat Berat Badan Lahir Bayi	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.013 ^a	1	.083		
Continuity Correction ^b	2.213	1	.137		
Likelihood Ratio	3.075	1	.080		
Fisher's Exact Test				.135	.068
Linear-by-Linear Association	2.990	1	.084		
N of Valid Cases	132				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Komplikasi Kehamilan (Ya / Tidak)	2.453	.871	6.908
For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = BBLR	1.459	1.015	2.097
For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = Tidak BBLR	.595	.300	1.179
N of Valid Cases	132		

4. Analisis Multivariat

Case Processing Summary			
Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	132	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	132	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		132	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Variables in the Equation									
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp (B)	95% C.I. for EXP (B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Usia Kehamilan	2.986	.718	17.322	1	.000	19.811	4.855	80.843
	Kekurangan Energi Kronik	2.735	.846	10.443	1	.001	15.412	2.934	80.966
	Paritas	.791	.547	2.090	1	.148	2.205	.755	6.440
	Konsumsi Junk Food	1.678	.726	5.338	1	.021	5.357	1.290	22.250
	Constant	-14.324	2.554	31.457	1	.000	.000		
Step 2 ^a	Usia Kehamilan	3.082	.713	18.659	1	.000	21.793	5.384	88.221
	Kekurangan Energi Kronik	2.806	.844	11.054	1	.001	16.537	3.163	86.445
	Konsumsi Junk Food	1.972	.708	7.760	1	.005	7.188	1.794	28.793
	Constant	-14.006	2.551	30.140	1	.000	.000		

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.714 ^a	.509	.486	.360

a. Predictors: (Constant), Komplikasi Kehamilan, Konsumsi Junk Food, Usia Ibu Saat Melahirkan, Usia Kehamilan, Paritas, Kekurangan Energi Kronik

Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN
Proses Wawancara Dengan Responden





Lampiran 10 Hasil Uji Similarity

Skripsi Hidayatul Muzdalifah			
ORIGINALITY REPORT			
31 %	29 %	17 %	11 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		2 %
2	adoc.pub Internet Source		2 %
3	docplayer.info Internet Source		1 %
4	repository.unhas.ac.id Internet Source		1 %
5	digilib.unisayogya.ac.id Internet Source		1 %
6	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source		1 %
7	www.scribd.com Internet Source		1 %
8	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source		1 %
9	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper		1 %

RIWAYAT HIDUP



HIDAYATUL MUZDALIFAH lahir di Nanasaya Kec. Kajang Kab. Bulukumba pada tanggal 21 April 2001, anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Syamsul Alam dan Rostina. Penulis mulai menempuh Pendidikan pada tahun 2007 di SDN 118 Lembang Tumbu dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 24 Bulukumba dan tamat pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kembali Pendidikan di SMA Negeri 5 Bulukumba dan tamat pada tahun 2019. Di tahun 2019 berhasil lulus melalui jalur UMM (Ujian Masuk Mandiri) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat konsentrasi Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK).