

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELELAHAN
MATA PADA PEKERJA OPERATOR KOMPUTER DI BAGIAN
CENTRAL CONTROL ROOM PT. SEMEN TONASA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

FINGKI INDRIANI

70200120048

**PRODI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fingki Indriani
NIM : 70200120048
Tempat/Tanggal Lahir : Warue, 17 Januari 2002
Jurusan/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/K3
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Green Nurhidayat, Gowa
Judul : Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja Operator Komputer di Bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 04 Juni 2024

Penyusun,



Fingki Indriani
NIM : 70200120048

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja Operator Komputer di Bagian Central Control Room PT. Semen Tonasa*" yang disusun oleh Fingki Indriani, NIM: 70200120048, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 11 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 11 Juli 2024 M
05 Muharram 1446 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Aswadi, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. BS. Titi Haerana, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: A. Syamsiah Adha, S. Gz., M.P.H	(.....)

Diketahui Oleh:

.....
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes

810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang ia berikan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berjudul “Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja Operator Komputer di Bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa” ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat islam menuju ke zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini terdapat berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan. Terutama peran dari keluarga tercinta, yaitu ibu, Almarhum bapak, kakak dan para saudara yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doa kepada penulis. Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Prof. Hamdan Juhannis, MA, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati Sp. OG selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Abdul Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Bs. Titi Haerana, SKM., M.Kes selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
5. Ibu A. Syamsiah Adha, S.Gz., M.P.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
6. Bapak Dr. Aswadi, SKM., M.Kes selaku dosen penguji akademik yang telah memberikan arahan dan masukan.
7. Ustad Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd.I selaku dosen penguji agama yang telah memberikan arahan dan masukan.
8. Pihak PT. Semen Tonasa yang telah membantu kegiatan penelitian sehingga terlaksana dengan baik.
9. Nur Inayah Rustan, Dini, Dian Yuliawati dan Nurhidayah yang selalu menemani dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 yang selalu memberikan semangat dan saling mendoakan.
11. Teman-teman KKN Posko 2 Desa Paenre Lompoe Kab. Bulukumba yang selalu memberikan semangat, dukungan dan saling mendoakan.
12. Semua pihak yang ikut serta membantu dan mendoakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Segala sesuatu yang telah diberikan beberapa pihak tersebut, semoga Allah SWT yang membalasnya dan semoga semua amal ibadahnya diterima dan dicatat sebagai suatu ganjaran/pahala.

Terakhir, harapan dan doa penulis panjatkan semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca pada umumnya. Kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samata-Gowa, 23 Februari 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI (MUNAQASYAH)	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	7
D. Hipotesis	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian	18
G. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kelelahan Mata.....	20
1. Definisi Kelelahan Mata	20
2. Patofisiologi Kelelahan Mata	21
3. Gejala Kelelahan Mata	21
4. Mekanisme terjadinya Kelelahan Mata	23
5. Dampak Kelelahan Mata.....	24
6. Pengendalian Kelelahan Mata	25
B. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Mata.....	26
1. Sumber Kelelahan Mata yang berasal dari Monitor	26
2. Faktor Lingkungan.....	28
3. Faktor Individu	30
C. Kerangka Teori.....	41
D. Kerangka Pikir	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Metode Pengumpulan Data	44
D. Instrument Penelitian.....	44
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	47
F. Etik Penelitian	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil.....	50
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
2. Analisis Univariat.....	52
3. Analisis Bivariat.....	56
B. Pembahasan	61
1. Hubungan Usia dengan Kelelahan Mata.....	62
2. Hubungan Lama Kerja dengan Kelelahan Mata	64
3. Hubungan Istirahat Mata dengan Kelelahan Mata.....	67
4. Hubungan Kelainan Refraksi dengan Kelelahan Mata.....	70
5. Hubungan Gangguan Metabolik dengan Kelelahan Mata.....	71
6. Hubungan Jarak Monitor dengan Kelelahan Mata	73
7. Hubungan Penggunaan anti radiasi dengan Kelelahan Mata ...	75
C. Keterbatasan Penelitian.....	77
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	7
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	12
Tabel 4.1 Distribusi dan Frekuensi Usia Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa	52
Tabel 4.2 Distribusi dan Frekuensi Lama Kerja Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa.....	53
Tabel 4.3 Distribusi dan Frekuensi Istirahat Mata Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa.....	53
Tabel 4.4 Distribusi dan Frekuensi Kelainan Refraksi Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa.....	54
Tabel 4.5 Distribusi dan Frekuensi Gangguan Metabolik Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa.....	54
Tabel 4.6 Distribusi dan Frekuensi Jarak Monitor pada Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa.....	55
Tabel 4.7 Distribusi dan Frekuensi Penggunaan Anti Radiasi pada Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa	55
Tabel 4.8 Distribusi dan Frekuensi Kelelahan Mata pada Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa.....	56
Tabel 4.9 Hubungan Usia dengan Kelelahan Mata pada Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa.....	57
Tabel 4.10 Hubungan Lama Kerja dengan Kelelahan Mata pada Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa	57
Tabel 4.11 Hubungan Istirahat Mata dengan Kelelahan Mata pada Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa	58
Tabel 4.12 Hubungan Kelainan Refraksi dengan Kelelahan Mata pada Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa	59
Tabel 4.13 Hubungan Gangguan Metabolik dengan Kelelahan Mata pada Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa	59
Tabel 4.14 Hubungan Jarak Monitor dengan Kelelahan Mata pada Karyawan <i>Central Control Room</i> (CCR) PT. Semen Tonasa	60

Tabel 4.15 Hubungan Penggunaan Anti Radiasi dengan Kelelahan Mata
pada Karyawan *Central Control Room* (CCR) PT. Semen Tonasa
.....61




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	41
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner penelitian
- Lampiran 2 : Rekam medik karyawan
- Lampiran 3 : Surat pernyataan telah meneliti
- Lampiran 4 : Kode etik penelitian
- Lampiran 5 : Surat izin penelitian LP2M
- Lampiran 6 : Surat izin penelitian PTSP
- Lampiran 7 : Master tabel
- Lampiran 8 : Output SPSS
- Lampiran 9 : Dokumentasi



ABSTRAK

Nama : Fingki Indriani

NIM : 70200120048

Judul : Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja Operator Komputer di Bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *central control room* PT. Semen Tonasa. Faktor-faktor yang dimaksud adalah usia, lama kerja, istirahat mata, kelainan refraksi, gangguan metabolik, jarak layar dan pemanfaatan terhadap anti radiasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross sectional study* dan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *total sampling* sebanyak 32 orang. Uji hipotesis penelitian menggunakan uji *Chi Square* dan *Fisher Exact Test*. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner, Rekam medik karyawan, *Digital Eye Strain Questionnaire* (DES-Q) dan meteran untuk mengukur jarak pandang pekerja dengan layar monitor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan usia dengan kelelahan mata ($p=1.000$), tidak terdapat hubungan lama kerja dengan kelelahan mata ($p=0,712$), tidak terdapat hubungan istirahat mata dengan kelelahan mata ($p=0,678$), terdapat hubungan kelainan refraksi dengan kelelahan mata ($p=0,019$), tidak terdapat hubungan gangguan metabolik dengan kelelahan mata ($p=1.000$), tidak terdapat hubungan jarak monitor dengan kelelahan mata ($p=1.000$) dan tidak terdapat hubungan penggunaan anti radiasi dengan kelelahan mata ($p=0,946$).

Peneliti menyarankan pihak PT. Semen Tonasa untuk menyediakan kacamata khusus anti radiasi dan *screen protector* kepada semua karyawan CCR agar lebih nyaman dalam bekerja dan terhindar dari kelelahan mata. Selain itu diharapkan juga aturan wajib *check up* setiap setahun sekali khususnya *check up* kesehatan mata.

Kata kunci : kelelahan mata; pekerja *central control room*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelelahan mata atau bisa disebut dengan *Computer Vision Syndrome* (CVS) adalah salah satu gejala yang terjadi pada seseorang dikarenakan penggunaan komputer secara berlebihan sehingga menyebabkan kerugian kesehatan baik secara fisik maupun psikologis. Gangguan fisik dan psikologis ini juga sering terjadi di tempat kerja walaupun kesehatan kerja di pengaruhi oleh banyak faktor. Akan tetapi, penggunaan komputer secara berlebihan dapat menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan yang paling tinggi (Munif *et al.*, 2020). Menurut *Occupational Safety Health Administration* (OSHA) pada tahun 1997 terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kelelahan mata seperti faktor lingkungan kerja (suhu, kelembapan dan pencahayaan), faktor karakteristik pekerja (umur dan kelainan refraksi), faktor karakteristik pekerjaan (istirahat mata) dan faktor perangkat kerja (jarak pandang pada monitor) (Asnel & Kurniawan, 2020).

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) Tahun 2014 menunjukkan angka kejadian kelelahan mata (*astenopia*) di berbagai Negara berkisar antara 40% sampai 90%. WHO juga menambahkan sebanyak 285 juta orang atau 4,24% dari total populasi di dunia mengalami gangguan penglihatan berupa *low vision*/ketajaman

penglihatan yang rendah dan kebutaan dengan distribusi sebesar 246 juta orang atau 65% (Nikmah *et al.*, 2023). Pada Asia dan ASEAN angka kebutaan mencapai 1,0% dari Bangladesh, 0,7% dari India dan 0,3% dari Thailand (Andriany *et al.*, 2017). Hampir di seluruh dunia masyarakat tidak terlepas dari penggunaan komputer dikarenakan aktivitas sehari-hari mereka di tempat kerja. Diperkirakan lebih dari 50% pekerja terpapar komputer dan mengalami keluhan kelelahan mata (Wolffsohn, 2018).

Menurut *survey* yang telah dilakukan oleh *American Optometric Association/AOA* (2016) di Amerika Serikat tentang *Most Americans Experience Digital Eye Strain from Overexposure to Computers According to Survey*, bahwa waktu rata-rata yang dihabiskan untuk bekerja di depan komputer adalah 5,8 jam atau sekitar 69% dari total 8 jam kerja. Penggunaan komputer yang sangat berlebihan seringkali meningkatkan risiko masalah terhadap kesehatan mata dikarenakan terus-menerus menatap layar komputer (*American Optometric Association*, 2016).

Di Indonesia sekitar 3% dari populasi mengalami gangguan penglihatan (Kemenkes, 2019). Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, tingkat keparahan gangguan penglihatan atau *low vision* yang serius dan kebutaan adalah masing-masing sebesar 1,49% dan 0,5% pada kelompok usia produktif (15-54 tahun) di Indonesia. Dari tingkat keparahan gangguan penglihatan yang serius dan kebutaan ini meningkat secara signifikan pada penduduk berusia 45 tahun keatas, dengan peningkatan rata-rata tiga kali lipat setiap 10 tahun. Prevalensi

keparahan gangguan penglihatan yang serius dan kebutaan paling tinggi terjadi pada penduduk yang berusia 75 tahun keatas, sejalan dengan proses *degenerative* yang terjadi seiring bertambahnya usia. Penggunaan kacamata juga meningkat pada kelompok usia produktif (15-54 tahun) dengan tingkat prevalensi mencapai 12,1% (Riskesdas, 2018).

Prevalensi terendah terkait gangguan penglihatan yakni berada pada dua daerah yakni Sulawesi Selatan sebesar 1,2% dan paling terendah di DKI Jakarta sebesar 0,9% sehingga dapat disimpulkan bahwa Sulawesi Selatan menempati urutan kedua terendah prevalensi gangguan penglihatan. Penyandang terbesar dari keluhan mata di Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan oleh faktor pekerjaan, usia, pendidikan, dan tempat tinggal. Adapun prevalensi gangguan penglihatan tertinggi yakni di Sulawesi Utara (3,7%) di susul oleh Jambi (2,8%) dan Bali (2,7%) (Suwandi, 2022).

Menurut hasil penelitian Ibrahim dkk (2018) pada pekerja operator komputer di PT. Semen Tonasa menunjukkan adanya hubungan antara istirahat mata pekerja shift 2 dengan keluhan *computer vision syndrome* dan mempunyai risiko 2,3 kali lebih tinggi dari shift 1 dan 3 dan adanya hubungan antara masa kerja pekerja shift 1 dan shift 2 dengan keluhan *computer vision syndrome* dan shift 2 mempunyai risiko 2,3 kali lebih tinggi dari shift 1 dan 3. Hasil penelitian dari Firdani (2020) di PT Semen Padang menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara kelainan refraksi dengan kelelahan mata dan berdasarkan

hasil penelitian Naota dkk (2019) ada hubungan masa kerja dengan kelelahan mata pada operator komputer di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelelahan mata dapat menyebabkan gejala seperti nyeri, berdenyut di sekitar mata, pandangan atau penglihatan kabur, penglihatan ganda atau ganda, fokus yang kuat di mata, peri, merah, berair, gatal, kering, sakit kepala, pusing, dan mual (Ranasinghe *et al.*, 2016) . Jumlah jarak antara mata dan layar monitor, lama paparan, tingkat pencahayaan radiasi komputer, dan ketinggian monitor adalah penyebab utama kelelahan mata. Kelelahan mata timbul ketika mata terlalu dekat dengan monitor. Ini karena mata dipaksa untuk melihat dari jarak yang cukup dekat dalam jangka waktu yang lama, sedangkan kemampuan mata sendiri untuk melihat dari dekat tidak ada (Pertiwi *et al.*, 2023).

PT. Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki perseron kapasitas 5.980.000 ton semen pertahun dan mempunyai 4 pabrik yaitu Tonasa 2,3,4 dan 5. Sebagian besar proses produksi dijalankan oleh mesin yang diawasi dan dikontrol langsung melalui operator monitor yang ada di ruang kontrol. Hal ini di pantau secara terus-menerus untuk menghindari permasalahan di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa operator di ruang kontrol memiliki risiko mengalami gangguan kelelahan mata. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan

dengan kelelahan mata pada operator di ruang kontrol PT. Semen Tonasa agar tidak terjadi gangguan kesehatan akibat kerja.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana hubungan usia dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa?
2. Bagaimana hubungan lama kerja dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa?
3. Bagaimana hubungan jarak monitor dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa?
4. Bagaimana hubungan istirahat mata dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa?
5. Bagaimana hubungan kelainan refraksi dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa?
6. Bagaimana hubungan gangguan metabolik dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa?

7. Bagaimana hubungan penggunaan anti radiasi dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa?



C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Tabel 1.1
Definisi Operasional dan Kriteria Objektif Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja Operator Komputer di Bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

Variabel Independen

Variabel	Definisi Operasional	Kriteria Objektif	Alat Ukur	Skala Data
Usia	Usia adalah total tahun sejak lahirnya individu. Dalam konteks manusia, usia dimulai pada tahap perkembangan dari bayi hingga dewasa dan lansia	a. ≥ 33 Tahun b. < 33 Tahun	Rekam medik	Ordinal
Lama Kerja	Waktu yang digunakan oleh responden dalam bekerja yang dinyatakan dalam satuan jam/hari	a. Memenuhi syarat jika 7-8 jam/hari b. Tidak memenuhi syarat jika >8 jam/hari	Kuesioner	Ordinal
Jarak Monitor	Jarak monitor adalah jarak antara mata pengguna dengan layar monitor komputer. Jarak tersebut sangat penting untuk diperhatikan karna berkaitan langsung dengan kenyamanan si pengguna	a. Beresiko jika <50 cm/ >100 cm b. Tidak beresiko jika 50-100 cm (Asnel & Kurniawan, 2020)	Observasi	Ordinal

Variabel	Definisi Operasional	Kriteria Objektif	Alat Ukur	Skala Data
Istirahat Mata	Kegiatan mengistirahatkan mata dari layar monitor setiap satu jam sekali selama 10 menit	a. Ya, jika mengistirahatkan mata setiap satu jam sekali selama 10 menit b. Tidak, jika tidak mengistirahatkan mata setiap satu jam sekali selama 10 menit (Nourmayanti, 2010)	Kuesioner	Ordinal
Kelainan Refraksi	Kelainan refraksi adalah suatu ketidakseimbangan sistem penglihatan pada mata berupa gangguan penglihatan sehingga penglihatan menjadi kabur seperti rabun jauh, rabun dekat, silinder dan sebagainya	a. Ada Kelainan b. Tidak ada Kelainan (Arianti, 2017)	Rekam medik dan observasi	Ordinal

Variabel	Definisi Operasional	Kriteria Objektif	Alat Ukur	Skala Data
Gangguan Metabolik	Gangguan metabolik adalah gangguan yang melibatkan parameter-parameter yang dapat diukur secara klinis guna mengenali dan mengevaluasi gangguan tersebut. Adapun gangguan yang dimaksud yaitu Diabetes Melitus dan Hipertensi	a. Ada gangguan b. Tidak ada gangguan (Zahra <i>et al.</i> , 2020)	Rekam medik dan observasi	Ordinal
Penggunaan anti radiasi	Anti radiasi digunakan untuk mengurangi paparan sinar biru dari komputer. Anti radiasi yang dimaksud yakni <i>screen protector</i> dan kacamata anti radiasi	a. Menggunakan b. Tidak menggunakan (Ayu <i>et al.</i> , 2018)	Kuesioner dan observasi	Ordinal

Variabel Dependen

Variabel	Definisi Operasional	Kriteria Objektif	Alat Ukur	Skala Data
Kelelahan Mata	Kelelahan mata adalah ketegangan yang terjadi pada organ visual, dimana terjadi gangguan pada mata dan sakit kepala yang dirasakan akibat penggunaan mata secara intensif. Adapun jenis kelelahan mata yang berhubungan dengan operator komputer yakni kelelahan mata akomodatif yang di sebabkan oleh kelelahan otot siliaris	a. Mengalami kelelahan mata : skor ≥ 8 b. Tidak mengalami kelelahan mata : skor < 8	<i>Digital Eye Strain Questionnaire (DES-Q) from Spain</i>	Ordinal

D. *Hipotesis*

Berdasarkan masalah yang diajukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

1. H_a (Hipotesis Alternatif) :

Ada hubungan usia, lama kerja, jarak monitor, istirahat mata, kelainan refraksi, gangguan metabolik, penggunaan anti radiasi dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa.

2. H_0 (Hipotesis Nol) :

Tidak ada hubungan usia, lama kerja, jarak monitor, istirahat mata, kelainan refraksi, gangguan metabolik, penggunaan anti radiasi dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa.



E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu Terkait Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja Operator Komputer Bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Variabel	Metode	Hasil
1	Septiani Sustri, Firman Edigan, Raviola	Faktor- Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan mata pada Pengguna Komputer di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau	2022	Variabel Dependen : Kelelahan Mata Variabel Independen : Kelainan Refraksi, Durasi Penggunaan Komputer, Jarak pandang mata Layar Komputer, Masa kerja	Kuantitatif dengan jenis penelitian analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	Terdapat hubungan yang signifikan antara kelainan refraksi, durasi penggunaan komputer dan jarak pandang mata pada layar monitor terhadap kelelahan mata
2	Mirna, Yuliati, Nur Ulmy Mahmud	Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja PT. Semen Bosowa Maros	2020	Variable Dependen : Kelelahan Mata Variable Independen : Riwayat kesehatan mata, riwayat kesehatan pekerja, beban kerja, lama kerja	Penelitian jenis kuantitatif dengan desain <i>Cross Sectional Study</i>	Tidak terdapat hubungan antara riwayat kesehatan mata, riwayat kesehatan pekerja, beban kerja, lama kerja dengan kelelahan mata

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Variabel	Metode	Hasil
3	Nur Hidayatun Nikmah, Eko Mirsiyanto, Eti Kurniawati	Faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan mata (<i>Astenopia</i>) pada Pengguna Komputer di Jambi <i>Ekspress</i> Tahun 2023	2023	Variable Dependen : Kelelahann Mata Variabel Independen : Istirahat mata, Jarak pandang pada monitor, Durasi Penggunaan komputer, Intensitas pencahayaan	Kuantitatif dengan pendekatan <i>Cross Sectional</i>	Terdapat hubungan yang signifikan antara jarak pandang pada monitor dan intensitas pencahayaan dengan kelelahan mata
4	Suwandi N	Hubungan Masa Kerja dan Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Kelelahan Mata pada Pekerja Welding Logam di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara	2022	Variable Dependen : Kelelahan Mata Variable Independen : Masa Kerja, Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri	Penelitian ini bersifat studi observasional analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Terdapat hubungan masa kerja dan perilaku penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian kelelahan mata
5	Fea Firdani	Faktor yang berhubungan dengan Keluhan Kelelahan Mata pada Pekerja Operator Komputer	2020	Variabel Dependen : Kelelahan Mata Variabel Independen : Usia, Istirahat mata, Lama kerja, Kelainan Refraksi, Jarak pandang Komputer, Pencahayaan	Kuantitatif dengan pendekatan <i>Cross Sectional</i>	Terdapat hubungan yang bermakna antara usia dan kelainan refraksi dengan keluhan kelelahan mata

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Variabel	Metode	Hasil
6	Dessy Widhya, Putri Mulyono	Hubungan Jarak Monitor, Durasi penggunaan komputer, Tampilan Layar monitor, dan Pencahayaan dengan Keluhan Kelelahan Mata	2018	Variabel Dependen : Kelelahan Mata Variabel Independen : Jarak monitor, Durasi penggunaan komputer, Tampilan layar monitor, Pencahayaan	Penelitian Kuantitatif dengan rancang bangun <i>cross sectional</i>	Variabel tampilan monitor dan durasi penggunaan komputer yang berhubungan dengan keluhan kelelahan mata pada pengguna komputer
7	Wiwik Eko Pertiwi, Indah Permatasari, Titin Nasiatin	Determinan kelelahan mata pada pekerja pengguna komputer	2023	Variable Dependen : Kelelahan mata Variable Independen : Tinggi monitor, Jarak mata, lama paparan, Tingkat paparan radiasi komputer	Kuantitatif dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Terdapat hubungan yang signifikan antara jarak mata, lama paparan dan tingkat paparan radiasi komputer dengan kelelahan mata
8	Hasbi Ibrahim, Syahrul Basri, Muhammad Saleh Jastam, Iman Kurnianda	Faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan <i>Computer Vision Syndrome</i> pada pekerja operator komputer di PT. Semen Tonasa	2018	Variabel Dependen : Kelelahan mata Variabel Independen : Istirahat mata, Frekuensi kedipan, Durasi kerja, Masa kerja, Jarak monitor, Pencahayaan	Kuantitatif dengan pendekatan <i>Cross Sectional Study</i>	Terdapat hubungan yang signifikan antara istirahat mata dan masa kerja dengan kelelahan mata

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Variabel	Metode	Hasil
9	Estu Marganita	Faktor yang berhubungan dengan kejadian kelelahan mata terhadap paparan komputer pada karyawan di PT. Inka Multi Solusi Service Madiun	2021	Variabel Dependen : Kejadian kelelahan mata Variabel Independen : Jarak penglihatan terhadap monitor, Penerangan, Durasi penggunaan komputer, Masa kerja, Istirahat mata	Kuantitatif dengan pendekatan <i>Cross Sectional</i>	Terdapat hubungan yang signifikan antara jarak penglihatan terhadap monitor, penerangan, durasi penggunaan komputer, masa kerja dan istirahat mata dengan kejadian kelelahan mata
10	Sunyanti	Keluhan kelelahan mata pada pekerja pengguna komputer di Perusahaan Travel di Kolaka Raya	2019	Variabel Dependen : Keluhan Kelelahan mata Variabel Independen : Usia, Gangguan penglihatan, Durasi kerja, Tampilan layar monitor, Jarak pandang, Pencahayaan, Suhu udara	Kuantitatif dengan pendekatan <i>Study Cross Sectional</i>	Terdapat hubungan yang signifikan antara durasi kerja dengan keluhan kelelahan mata

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Variabel	Metode	Hasil
11	Marwa M. Zalat, Soliman M. Amer, Ghada A. Wassif, Shereen A. El Tarhouny & Tayseer M. Mansour	<i>Computer Vision Syndrome, Visual Ergonomics and Amelioration among Staff Members in a Saudi Medical Collage</i>	2021	Variabel Dependen : <i>Prevalence of the Computer Vision Syndrome (CVS)</i> Variabel Independen : <i>Working Conditions, visualize ergonomic, prevent measure application among university staff members</i>	<i>A cross-sectional study was conducted using a semi-structured questionnaire that include a validated CVS questionnaire on university medical staff members</i>	<i>Asignificantly higher prevalence of CVS was among females (52,3%), having a higher mean work duration (21.65±7.55 years), those who frequently use a smartphone (84,9%), and spend most of the screen time during day and night (87,1%)</i>
12	Zanastia Sukmayanti	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan mata pada siswa SMAN 8 Tangerang Selatan	2022	Variabel Dependen : Kelelahan mata Variabel Independen : Jenis kelamin, penggunaan kacamata, istirahat mata, postur tubuh saat penggunaan komputer dan ponsel layar sentuh, <i>screen time</i> dan anti <i>glare screen</i>	Penelitian kuantitatif dengan desain studi <i>cross sectional</i>	Terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan anti <i>glare screen</i> terhadap penggunaan komputer/laptop dan ponsel layar sentuh dengan kelelahan mata

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Variabel	Metode	Hasil
13	Farras Putri Arianti	Faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan kelelahan mata pada pekerja pengguna komputer di <i>call center</i> PT. AM	2017	Variabel Dependen : Kelelahan mata Variabel Independen : Jarak monitor, alat pelindung mata, istirahat mata, tingkat pencahayaan, jenis kelamin dan kelainan refraksi	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i>	Terdapat hubungan antara tingkat pencahayaan dan kelainan refraksi terhadap kelelahan mata

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada lokasi dan variabel yang masih jarang di teliti sebelumnya seperti hubungan kelelahan mata dengan gangguan metabolik dan kelainan refraksi.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan usia dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa
- b. Untuk mengetahui hubungan lama kerja dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa
- c. Untuk mengetahui hubungan jarak monitor dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa
- d. Untuk mengetahui hubungan istirahat mata dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa
- e. Untuk mengetahui hubungan kelainan refraksi dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

- f. Untuk mengetahui hubungan gangguan metabolik dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa
- g. Untuk mengetahui hubungan penggunaan anti radiasi dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Dapat menambah referensi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan mata yang kemudian dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi data awal bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi perusahaan

Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak PT. Semen Tonasa agar para pekerja lebih memperhatikan kesehatannya khususnya kesehatan mata.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat di jadikan sebagai media pembelajaran secara praktis untuk mengembangkan teori-teori yang telah di pelajari dan memberi pengalaman yang berarti dalam menghadapi sebuah masalah di lapangan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Kelelahan Mata*

1. Definisi kelelahan mata

Berdasarkan pendapat Yasserli (2014) dalam kutipan pendapat Brigder (1995), dapat disimpulkan bahwa kelelahan mata cenderung lebih tinggi terjadi pada pekerja yang melibatkan pengamatan objek dari jarak dekat dibandingkan pekerja dengan pengamatan objek dari jarak yang lebih jauh. Hal ini disebabkan oleh aktivitas otot akomodasi yang bekerja lebih intens saat mengontraksi agar objek terlihat dengan jelas pada jarak dekat.

Kelelahan mata adalah kelelahan yang merujuk pada ketegangan organ visual yang dapat menyebabkan gangguan mata dan sakit kepala karena penggunaan mata yang intensif. Jenis kelelahan mata yang berkaitan dengan penggunaan komputer dikenal dengan kelelahan mata akomodatif, yang disebabkan oleh kelelahan otot siliaris (Ilyas, 2001).

Menjaga kesehatan merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur kepada Allah SWT. Islam menetapkan tujuan pokok sesuai syariat (maqashid syariah) untuk mewujudkan kemaslahatan dalam hidup. Tujuan pokok tersebut meliputi lima bagian yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Di dalam lima bagian tersebut, juga berkaitan dengan

kewajiban untuk menjaga kesehatan. Dimana dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah menjaga kesehatan mata.

Rasulullah bersabda:

فَإِنْ لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ۝

Artinya : “ *Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu* “. (HR. *al-Bukhari*).

Dalam hadits diatas dapat dipahami, bahwa tubuh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Kesehatan yang dimaksud yaitu memperoleh keadaan baik, bebas dari penyakit dan dalam keadaan normal (Fitriah, 2016).

2. Patofisiologi kelelahan mata

Mata akan sulit fokus pada tulisan dan gambar pada layar komputer, laptop, dan ponsel sentuh yang tidak jelas. Mata meningkatkan fokus dengan meningkatkan kemampuan untuk lebih fokus (fokus terus-menerus), peningkatan frekuensi pergerakan bola mata (pergerakan bola mata), dan peningkatan pergerakan otot. Hal ini dapat menyebabkan mata tegang karena beban yang lebih besar pada otot siliaris mata, yang menyebabkan mata menjadi mudah lelah dan kering. Dalam menjaga mata tetap fokus disertai postur tubuh yang tidak stabil atau postur yang salah dapat menyebabkan tegangnya otot leher, bahu, dan punggung (Harahap, 2020)

3. Gejala kelelahan mata

Menurut (Segui *et al.*, 2015), gejala yang paling umum dialami oleh orang yang mengalami kelelahan mata adalah sebagai berikut:

- a. Mata panas
- b. Mata gatal
- c. Merasa ada benda asing di mata
- d. Mata berair
- e. Berkedip berlebihan
- f. Mata merah
- g. Nyeri pada mata
- h. Kelopak mata terasa berat
- i. Penglihatan kabur
- j. Penglihatan ganda
- k. Mata kering
- l. Penglihatan kabur
- m. Sensitif terhadap cahaya
- n. Lingkaran berwarna di sekitar objek
- o. Pandangan menjadi lebih buruk
- p. Sulit melihat dari jarak dekat

Menurut *American Optometric Association* (2018) dalam penelitian (Sukmayanti, 2022) jenis kelamin, usia, penggunaan kacamata, durasi penggunaan perangkat digital, durasi istirahat mata, jarak layar, dan masalah penglihatan tambahan seperti rabun jauh, astigmatisme, atau presbiopi dapat menyebabkan gejala di atas. Untuk menetapkan diagnosis kelelahan mata, seseorang harus memiliki skor setidaknya 6 gejala yang menunjukkan bahwa mereka mengalami kelelahan mata (Segui *et al.*, 2015). Menurut pedoman *Questionnaire of Digital Eye Strain* (DES-Q)

dimulai dengan mata panas, mata gatal, merasa ada benda asing di dalam mata, mata berair, berkedip berlebihan, mata merah, nyeri pada mata, dan kelopak mata terasa berat dan kering adalah gejala kelelahan mata (Nourmayanti, 2010). Kemudian datang masalah mata seperti sulit fokus untuk penglihatan dekat, sensitif terhadap cahaya, lingkaran berwarna di sekitar objek, pandangan yang lebih buruk, dan sakit kepala (Pangemanan *et al.*, 2014).

Mengutip pendapat dari *American Optometric Association* (2018) bahwa setelah berhenti menggunakan komputer, laptop, atau ponsel layar sentuh, kelelahan mata dapat berkurang atau bahkan hilang. Ini tergantung pada lamanya penggunaan perangkat digital. Penglihatan dapat terganggu pada masa yang akan datang karena penurunan kemampuan visual dan gejala kelelahan mata yang berulang (Sukmayanti, 2022).

4. Mekanisme terjadinya kelelahan mata

Proses penglihatan dimulai ketika suatu objek memantulkan cahaya yang kemudian masuk ke mata melalui kornea, pupil, lensa dan akhirnya fokus ke retina. Pupil atau manik mata, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang terlalu terang dan melebar pada cahaya yang kurang terang. Fungsi pupil mirip dengan diafragma pada kamera. Lensa mengatur agar bayangan objek dapat jatuh dengan tepat di retina. Di retina terdapat lapisan tipis dalam bola mata dan memiliki jutaan sel saraf yang disebut sel batang dan sel kerucut. Cahaya yang mencapai retina diubah menjadi

sinyal listrik, yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf optik untuk diproses. Kerja otak inilah yang memungkinkan kita melihat objek. Selain itu, sel batang membantu penglihatan dalam kondisi pencahayaan yang kurang, sementara sel kerucut mendukung penglihatan dalam kondisi terang, seperti membaca dan membedakan warna (Setiawan, 2010).

Kelelahan mata timbul akibat tekanan yang diterapkan pada fungsi visual. Tekanan pada otot yang berperan mengakomodasi bisa muncul ketika seseorang berusaha untuk melihat objek kecil dan dekat dalam waktu yang lama. Pada situasi tersebut, otot-otot mata akan bekerja secara terus-menerus dan mengalami beban yang lebih besar. Ketegangan pada otot akomodasi (*korpus siliaris*) akan meningkat sehingga menyebabkan asam laktat ikut meningkat dan pada akhirnya terjadi kelelahan mata. Tekanan pada retina dapat terjadi ketika kontras visual berlebihan dan durasi penglihatan yang berkepanjangan terjadi.

5. Dampak kelelahan mata

Penglihatan dan produktivitas dipengaruhi sebagian besar oleh kelelahan mata. Siswa yang menggunakan komputer, laptop, atau ponsel layar sentuh paling sering mengalami mata gatal (57,1%), kering (28,6%), sakit kepala (50%), berair (46,4%), tegang (64,3%), dan kabur (39,3%) (Pangemanan *et al.*, 2014). Menurut penelitian lain, postur statis seseorang saat bekerja di depan komputer atau laptop dapat menyebabkan nyeri leher (Harahap, 2020). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar responden menggunakan komputer, laptop, atau ponsel layar sentuh untuk jangka waktu yang lama tanpa memberikan

istirahat mata. Penurunan kemampuan visual, kecerdasan, dan produktivitas adalah dampak tambahan kelelahan mata pada siswa (Gayatri *et al.*, 2021).

6. Pengendalian kelelahan mata

Septianyah (2014) memberikan saran dengan langkah yang mudah dalam mengurangi risiko kelelahan mata yakni sebagai berikut.

a. Gunakan pencahayaan yang sesuai

Kelelahan mata seringkali disebabkan karena kurang atau terlalu terangnya cahaya, baik itu dari sinar matahari yang masuk melalui jendela atau pencahayaan interior yang terlalu kuat. Adapun usaha untuk mengurangi cahaya dari luar yakni dengan cara menutup tirai.

b. Sering melakukan kedipan

Saat melakukan pekerjaan yang memerlukan fokus mata, disarankan untuk rajin berkedip karena hal tersebut dapat membantu menjaga kelembapan dan mencegah terjadinya iritasi pada mata. Selama fase tidak berkedip, maka lapisan air mata pada mata akan menguap lebih cepat, sehingga menyebabkan mata menjadi kering. Faktor tambahan seperti udara kering di lingkungan kerja dapat meningkatkan kecepatan penguapan air mata, sehingga meningkatkan risiko kelelahan mata.

c. Manfaatkan waktu istirahat

Beristirahat secara teratur selama bekerja tidak hanya menjaga produktivitas tetapi juga disarankan untuk mengurangi atau

mencegah terjadinya risiko. Selain itu, disarankan untuk berdiri, bergerak dan meregangkan lengan, kaki, punggung, leher dan bagian bawah tubuh untuk mengurangi ketegangan dan kelelahan otot.

d. Latihan untuk mata

Untuk mengurangi risiko kelelahan mata akibat fokus terus-menerus, disarankan untuk mengalihkan pandangan dari objek kerja setiap 20 menit atau melihat objek yang jauh sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Beberapa dokter mata merujuk pada aturan 20-20-20 ini.

B. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan mata

1. Sumber kelelahan mata yang berasal dari monitor

a. Jarak monitor

Menurut *Occupational Safety and Health Association* (OSHA) pada tahun 1997, menyarankan agar jarak antara mata dan layar monitor minimal 20-40 inch atau 50-100 cm. adapun peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016, standar dari keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran menyarankan agar jarak minimal antara mata dan layar monitor saat bekerja dengan komputer adalah 50 cm. Penyebab mata menjadi lelah dikarenakan jarak yang terlalu dekat dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi kenyamanan pekerja.

Titik terjauh yang bisa terlihat dengan jelas disebut sebagai titik jauh, sementara titik terdekat dimana objek bisa terlihat jelas disebut

titik dekat. Ketika seseorang dengan mata normal melihat objek dekat, otomatis lensa matanya akan menjadi lebih tebal dan apabila dilihat dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan tegangan otot siliaris, yang pada akhirnya dapat membuat mata si pekerja lelah. Maka dari itu, semakin jauh objek yang diamati, semakin kecil kemungkinan kelelahan mata akan terjadi (Iridiastadi & Yassierli, 2014).

b. Penggunaan anti radiasi

Anti radiasi adalah alat tambahan yang digunakan untuk melindungi layar ponsel layar sentuh yang terbuat dari plastik. Berikut jenis-jenis pelindung layar komputer beserta fungsinya (Ayu *et al.*, 2018).

- 1) *Transparent glass* : dapat melindungi layar komputer baik dari goresan ringan. Bahan dasarnya terbuat dari plastik dan bening.
- 2) *Anti spy* : dapat melindungi layar dari orang lain dan menjaga privasi pengguna. Apabila tegak lurus, layar akan terlihat. *Anti spy* berbahan dasar plastik, lebih tebal, dan berwarna hitam pekat.
- 3) *Mirror glass* : membuat layar ponsel lebih gelap dan terbuat dari plastik yang dilapisi konduktor cermin, berfungsi sebagai cermin apabila layarnya mati.
- 4) *Tempered glass* : dapat melindungi layar dari goresan ringan. Berbahan dasar kaca tipis dan bening.
- 5) *Anti glare* : melindungi layar dari minyak dan goresan, silau, pantulan cahaya, buram, dan sinar biru dari ponsel.

Silau atau pantulan layar dapat menyebabkan kelelahan mata, menyebabkan merah, berair, dan kelelahan mata (Amalia, 2018). Selain itu, pupil bereaksi yang melambat terhadap cahaya menyebabkan kelelahan mata (Harahap, 2020).

2. Faktor Lingkungan

a. Penerangan

Kelelahan mata sangat dipengaruhi oleh pencahayaan ruangan yang buruk. Menurut penelitian Simblon (2017) tingkat pencahayaan ruangan kantor sebesar 28-113 lux. Ini menunjukkan bahwa pencahayaan masih kurang dari standar (Simbolon, 2017). Sesuai dengan aturan *Nasional Enviromental Quality Standart* (NEQS) dan *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA), pencahayaan standar adalah 300 lux (Tawaddud, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Suwandi (2013), ditemukan bahwa ada korelasi signifikan antara intensitas pencahayaan dan tingkat kelelahan mata. Karena intensitas pencahayaan menunjukkan nilai negatif, dapat disimpulkan bahwa jika intensitas cahaya rendah ada di suatu ruangan, maka tingkat keluhan kelelahan mata akan meningkat (Yuliana & Suwandi, 2013).

Penggunaan *gadget* ketika ruangan gelap juga dapat menjadi faktor risiko kelelahan mata atau kelelahan mata. Sebuah penelitian oleh Ganne dkk (2020) menemukan hubungan yang signifikan dengan nilai p sebesar 0,017 terhadap kejadian kelelahan mata (Ganne *et al.*, 2021). Penggunaan *gadget* dalam keadaan gelap secara teratur dapat

menyebabkan penurunan kemampuan untuk melihat. Selain itu, paparan sinar radiasi dari perangkat adalah salah satu dampak negatif dari paparan perangkat tersebut yang dapat mempengaruhi penglihatan (Bawelle *et al.*, 2016).

b. Suhu Ruangan

Suhu berhubungan dengan kelembapan udara. Kelembapan dan suhu ruangan akan memengaruhi kenyamanan kerja, kata Grandjean. Daerah yang memiliki empat musim disarankan untuk memiliki suhu ideal 19–23°C dan kecepatan udara 0,1–0,2 m/det; musim panas disarankan untuk memiliki suhu ideal 22–24 °C dan kecepatan udara 0,15–0,4 m/det, dan kelembapan 40%–60%. Daerah yang memiliki dua musim harus dipertimbangkan dan ditinjau kembali. Sehingga tingkat kelembapan ruangan akan menurunkan kenyamanan tempat bekerja (Susanti *et al.*, 2015).

Menurut Sumamur, tubuh dapat menyesuaikan dengan lingkungannya dengan baik pada suhu antara 29-30°C dan kelembapan antara 85 hingga 95 persen. Hasil penelitian PUSPERKES menunjukkan bahwa suhu yang nyaman untuk bekerja adalah antara 22-26°C. Karena tidak ada pergerakan udara, ruangan kerja yang terlalu panas dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat bekerja. Suhu udara dan kelembapan yang tinggi juga dapat menyulitkan tubuh untuk merasa panas dan gerah, karena tubuh secara otomatis mengontrol suhu yang tepat (Tarwaka & Bakri, 2016).

Menurut rekomendasi *National Institute for Occupational Safety and Health* (NIOSH), suhu dalam ruangan dapat dikategorikan sebagai nyaman jika berada di antara 20-24°C selama musim dingin dan 23-26°C selama musim panas, dengan kelembapan 35% hingga 65%. Namun, rekomendasi ini harus dipertimbangkan lagi jika digunakan di lingkungan yang tropis atau dua musim seperti Indonesia. Untuk ruangan ber-AC, disarankan untuk menjaga suhu tetap antara 24°C dan 26°C dan tidak disarankan untuk membuat perbedaan suhu lebih dari 5°C antara ruang dalam dan luar (Tarwaka & Bakri, 2016).

Jika kelembapan udara rendah dan suhunya sama, mata akan lelah. Ini karena kelembapan dan suhu yang rendah dapat memengaruhi frekuensi berkedip secara normal, yang menyebabkan mata kering (Cabrera & Siong, 2010). Sesuai dengan penelitian Odi dkk (2017), ada korelasi yang signifikan antara suhu dan jumlah kejadian kelelahan mata, dengan p value 0,023 (Odi *et al.*, 2018)

3. Faktor Individu

a. Usia

Usia Daya akomodasi mata cenderung berkurang seiring bertambahnya usia. Hal ini disebabkan karena menurunnya kekenyalan mata dan elastisitas lensa mata akan hilang secara perlahan (Pheasant, 1991).

Pada umumnya, usia mempengaruhi kinerja sistem penglihatan. Setelah usia 40 tahun, sensitivitas terhadap kontras cahaya dan kemampuan akomodasi mata dapat terpengaruh oleh penurunan

elastisitas lensa. Fungsi otot mata dapat melemah sehingga terjadi pergeseran pada titik terdekat mata ke titik fokus ideal. Elastisitas yang menurun juga dapat mengurangi jarak titik dekat, meskipun jarak titik jauh biasanya tetap. Kecepatan akomodasi juga menurun seiring bertambahnya usia sehingga potensialnya mengganggu kinerja visual dalam bekerja (Iridiastadi & Yassierli, 2014).

Selain itu, kesulitan melihat pada jarak dekat juga seringkali muncul setelah usia mencapai 40 tahun. Pada jarak baca 25 cm, mata memerlukan akomodasi maksimal yang dapat menyebabkan kelelahan mata lebih cepat terjadi. Ada beberapa penelitian yang mendukung teori tersebut. Salah satunya, penelitian yang telah dilakukan oleh (Sawitri, 2017) di bagian operasional PT. Angkasa Pura I (Persero) Kota Manado tentang Hubungan Antara Intensitas Pencahayaan dan Usia dengan Kelelahan Mata pada Pekerja Bagian Operasional, menyatakan bahwa usia berhubungan dengan kelelahan mata dikarenakan banyak pekerja bagian operasional yang berusia >40 Tahun mengalami keluhan-keluhan dari kelelahan mata.

b. Gangguan Metabolik

Hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan seperti begadang, makan tak tepat waktu dan terlalu banyak duduk maupun berdiri. Pekerja di sarankan untuk memanfaatkan waktu luang untuk bersitirahat, paling tidak seminggu sekali untuk berolahraga demi

menjaga kesehatan tubuh secara fisik bagi para pekerja. Namun tidak bisa di pungkiri pekerja yang memiliki gangguan metabolik seperti diabetes dan hipertensi juga dapat berdampak menyebabkan kelelahan mata. Salah satu penyakit degeneratif yang menjadi masalah kesehatan klinis dan publik di banyak negara di dunia pada masa saat ini yaitu diabetes melitus atau biasa di singkat dengan DM (Azriful *et al.*, 2018). Menurut Kamso *et al.*, (2011) dalam Sadarang *et al.*, (2024) ada beberapa faktor terjadinya *syndrome* metabolik yaitu urbanisasi, asupan energi yang berlebihan, peningkatan kejadian obesitas dan gaya hidup sedentary. Dari beberapa faktor itulah sehingga *syndrome* metabolik menjadi tantangan klinis di seluruh dunia.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 31 menjelaskan bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan. Adapun bunyinya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
1965
ALAUDDIN
KIRKASSAR
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : "Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan".

Menurut tafsir Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam Fiqh al-Islami wa adillatuhu bahwa ajaran islam sangat memperhatikan kesehatan fisik dengan mewajibkan umatnya untuk memakan asupan yang dapat menjaga kehidupan, menolak kerusakan fisik, melakukan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, puasa dan yang lainnya.

Dalam Al-Qur'an itu mengharuskan kaum muslim memahami ilmu gizi dan menjaga kualitas makan yang *thayyiban* dengan cara

yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penyakit yang timbul akibat makan secara berlebihan atau bisa disebut obesitas. Obesitas ini dapat menyebabkan kelelahan mata dikarenakan menumpuknya lemak dalam tubuh sehingga laju metabolisme menurun. Gerakan secara monoton yang dilakukan secara terus menerus dapat menyebabkan laju peredaran darah ke otot melambat sehingga metabolisme tidak sempurna dan menyebabkan otot siliaris pada mata semakin cepat menimbulkan rasa nyeri dan lelah.

c. Lama Kerja

Lama Lama kerja adalah jumlah waktu yang dapat dihabiskan untuk melakukan pekerjaan baik pada waktu siang atau malam hari. Salah satu cara untuk meningkatkan pengurusan waktu adalah dengan merencanakan pekerjaan yang akan datang. Perencanaan pekerjaan tidak dapat digunakan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan. Pengurusan waktu atau jam kerja harus dilakukan guna menghemat waktu dan kerjanya (Suud, 2008).

Pada tahun 2009, Darmawan menyatakan bahwa *time work*, juga dikenal sebagai upah menurut waktu yang merupakan suatu sistem pembayaran yang didasarkan pada lamanya atau jangka waktu pekerjaan yang dilakukan, seperti hari, jam, minggu, bulan, dan sebagainya. Menurut Ghani (2010), terdapat aturan tentang batasan waktu kerja maksimal, istirahat, dan kompensasi untuk melampaui

batas tersebut. Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi aturan ketenagakerjaan ILO (*International Labor Organizational*) yang mengharuskan mereka mempekerjakan karyawan selama 40 jam per minggu.

Jika perusahaan mempekerjakan lebih dari 8 orang setiap hari, mereka akan dikenakan biaya tambahan dikarenakan :

- 1) Kelebihan waktu lebih dari 8 jam dihitung sebagai *overtime*, dihitung per jam. Ini terjadi untuk jam pertama, yang menghasilkan 1,5 jam kerja biasa, dan untuk jam kedua dan selanjutnya, yang menghasilkan 2 kali jam kerja biasa.
- 2) Memungkinkan kecelakaan yang disebabkan oleh kelelahan. Jika hal itu terjadi maka perusahaan harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kecelakaan kerja tersebut.
- 3) Pekerja yang sakit harus digantikan oleh pekerja lain selama sakit.
- 4) Kecelakaan atau sakit yang sering akan mengurangi produktivitas karena jadwal yang berubah, kualitas buruk dan produk cacat.

d. Kelainan Refraksi

Gangguan refraksi pada mata merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kelelahan mata. Gangguan refraksi ini mempengaruhi cara mata memandang objek, dimana mata tidak dapat fokus dengan baik pada cahaya yang masuk sehingga objek terlihat buram atau tidak jelas (Kemenkes, 2018). Kelainan refraksi mata dapat menyebabkan

otot mata bekerja secara berlebihan dalam melakukan akomodasi. Kelebihan akomodasi tersebut akan terus berlanjut sehingga berpotensi menyebabkan gangguan visual lainnya (Ardiansyah & I, 2016).

Mata selama ini tidak disadari dan dianggap biasa saja. Padahal, mata adalah rezeki yang sangat besar dan nikmat yang sangat mahal. Dengan mata, kita bisa melihat indahnya dunia. Kita bisa melihat wajah anak-anak, istri, dan keluarga tercinta. Mengenal orang-orang di sekitar kita. Tilawah Al-Qur'an dan membaca buku lebih mudah mencari ilmu. Jangankan saat nikmat mata hilang dengan kebutaan, bahkan saat nikmat mata berkurang karena sakit saja, kita merasa sangat tidak nyaman. Merasa sangat kehilangan. Rela mengeluarkan dana besar untuk mengembalikan kesehatan mata.

Misal ketika seseorang mengalami *miopi* (rabun jauh), *hipermetropi* (rabun dekat), *astigmatisme* (silinder) atau *presbiopi* (mata tua). Ia harus memakai kacamata atau lensa kontak agar bisa melihat dengan jelas. Itu pun masih terasa memberatkan dan tidak nyaman. Inginnya bebas dari kacamata dan lensa kontak. Maka ia pun rela mengeluarkan belasan juta per mata untuk operasi lasik. Jika dua mata, biaya operasi lasik bisa mencapai 25-30 juta. Demikian pula jika menderita katarak. Ia akhirnya membayar 8-15 juta untuk operasi katarak per mata. Apalagi kalau penyakit mata yang lebih parah. Maka, tidakkah kita bersyukur dengan nikmat mata ini?

e. Istirahat Mata

Untuk mengurangi kelelahan mata saat menggunakan *gadget* maupun laptop, disarankan untuk beristirahat sejenak selama 20 menit dengan melihat jarak 20 kaki (6,069 m) selama 20 detik (Efriliani *et al.*, 2017). Direkomendasikan bagi para pekerja yang intens menggunakan komputer untuk mengambil jam istirahat minimal 10 menit setiap jam saat bekerja di depan komputer (Cahyati, 2018). Istirahat mata perlu dilakukan selama penggunaan komputer atau laptop, dengan durasi istirahat mata setidaknya 1-2 menit setiap 20 menit penggunaan perangkat (Anshel & J.R, 2005).

Mata adalah organ yang sangat penting. Dalam Al-Qur'an, mata disebut di banyak ayat. Mulai dari pengingat nikmat agar bersyukur hingga pertanggungjawaban atas nikmat itu, seperti dalam surah Al-Qashash ayat 73 yang berbunyi :

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

Menurut tafsir Al-Mukhtashar/Markaz tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram bahwa Di antara Kasih sayang-Nya bahwa Allah menjadikan untuk kalian malam yang gelap untuk beristirahat setelah kalian merasa letih karena kerja di siang hari, dan menjadikan siang hari, menjadi siang yang terang agar kalian bisa berusaha untuk mencari rezeki pada waktu itu dan agar kalian mensyukuri nikmat Allah atas kalian dan tidak mengukfurinya.

Istirahat setelah beraktivitas dalam islam sangat dianjurkan agar memberikan dampak yang baik, salah satunya kesehatan mata. Apabila istirahatnya cukup maka akan semangat pula dalam melakukan pekerjaan.

f. Alat Pelindung Mata

Salah satu faktor yang menyebabkan mata menjadi cepat lelah adalah refraksi yang buruk dari penglihatan. Keadaan ini menjadi lebih buruk jika seseorang tidak menggunakan kacamata untuk kelainan refraksi, karena ini menyebabkan kontraksi otot siliaris mata yang lebih kuat yang dapat menyebabkan mata menjadi cepat lelah. Hal tersebut termasuk salah satu dari gejala kelelahan mata (Munif *et al.*, 2020). Menurut Sukmayanti (2022) yang mengutip pendapat Guyton & Hall (2011) kelainan refraksi mata yaitu :

1) *Myopia* (rabun jauh)

Miopia adalah kelainan refraksi mata di mana mata tidak dapat memfokuskan bayangan objek yang jauh; namun, ketika objek didekatkan ke mata, bayangan objek menjadi jelas (Sukmayanti, 2022).

2) *Hipermetropi* (rabun dekat)

Hipopermetropi adalah kelainan refraksi mata yang tidak memiliki mekanisme fokus; bayangan objek yang dekat tidak jelas

di retina, tetapi ketika objek dijauhkan dari mata, bayangan objek menjadi jelas (Sukmayanti, 2022).

3) *Astigmatisma* (fokus tidak simetris)

Kelainan refraksi yang disebut *astigmatisma* disebabkan karena adanya kelainan yang melengkung pada kornea mata, yang menyebabkan bayangan objek yang lurus menjadi tidak fokus (Sukmayanti, 2022).

4) *Presbiop* (mata tua/kurangnya akomodasi mata)

Kelainan refraksi mata yang biasanya muncul pada usia 40 tahun ke atas dikarenakan berkurangnya kemampuan lensa untuk akomodasi (Sukmayanti, 2022).

Kacamata yang dirancang khusus untuk kelainan refraksi mata termasuk *miopi* dengan lensa minus tunggal, *hipermetropi* dengan lensa plus tunggal, *presbiopi* dengan lensa campuran plus dan minus, dan *astigmatisma* dengan lensa silindris. Kacamata dapat mengurangi ketegangan dan kelelahan mata karena membantu mata melihat objek dengan lebih fokus (Munif *et al.*, 2020).

Berdasarkan kajian islam, bahwa seorang hamba dituntut untuk mematuhi Allah Swt, RasulNya dan para pemimpinnya yang disebut Ulil Amri. Kepatuhan kepada Allah dan RasulNya merupakan kepatuhan yang mutlak harus ditaati. Sedangkan kepatuhan terhadap pemimpin mempunyai batasan yakni selama itu mengarah ke hal-hal yang baik maka wajib dipatuhi. Salah satu perintah dan peraturan dalam suatu perusahaan yaitu menggunakan Alat pelindung diri

(APD). Alat pelindung diri yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Kacamata.

Adapun Hadis Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ صَلَاتِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ أَمْ لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ مَرَّ أُفَادًا بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.


Terjemahan : “Abdullah bin Umar r.a berkata : Nabi SAW : “Mendengar dan taat itu wajib bagi seseorang dalam apa yang ia sukai atau benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah berbuat maksiat maka tidak wajib mendengar dan wajib taat”. (HR. Bukhari dan Muslim.


Sebagaimana hadits yang diterangkan diatas maka jelaslah bahwa kalimat mendengar dan taat itu wajib bagi seseorang terhadap apa yang dia sukai, selama perbuatan itu tidak melanggar perintah Allah Swt.

Seorang pekerja wajib mematuhi segala perintah dan peraturan yang diterapkan di lingkungan kerjanya. Mematuhi aturan yang sudah ditetapkan menunjukkan seseorang bekerja dengan disiplin dan mematuhi pemimpin dan dapat berdampak baik kepada pekerja itu sendiri. Seperti mematuhi aturan wajib menggunakan APD agar terhindar dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Contohnya kelelahan mata.



C. Kerangka Teori







Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber : (Dewi, 2009); (Cahyati, 2018); (Murtopo & Sarimurni, 2005); (Bicford, 1996); (Roestijawati, 2007); (Ilyas, 2003); (Ayu et al., 2018); (Kharel & Khatri, 2018)

D. Kerangka pikir



**Keterangan :**

: Variabel Independen



: Variabel Dependen

Gambar 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian dan lokasi penelitian*

Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik, yaitu penelitian yang mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini dilakukan di PT. Semen Tonasa Pangkep pada bulan April 2024.

B. *Populasi dan Sampel*

1. *Populasi*

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pekerja Operator Komputer bagian *Central Control Room* di PT. Semen Tonasa Pangkep sebanyak 32 orang.

2. *Sampel*

Sampel adalah bagian yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Pekerja Operator Komputer bagian *Central Control Room* (CCR) di PT. Semen Tonasa sebagai pengguna komputer sebanyak 32 orang.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional study*, pengambilan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *total sampling*.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun sumber data yakni :

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner, *Digital Eye Strain Questionnaire* (DES-Q) dan dilakukan pengukuran jarak pandang pekerja dengan layar monitor menggunakan meteran.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan langsung dari PT. Semen Tonasa dan beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis. Salah satu contohnya rekam medik karyawan operator komputer di Bagian *Central Control Room* yang didapatkan dari *Medical Centre* (Klinik) PT. Semen Tonasa.

D. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengobservasi, mengukur, atau ,menilai suatu fenomena. Data yang diperoleh dari suatu pengukuran kemudian dianalisa dan dijadikan sebagai bukti (*Avidence*) dari suatu penelitian. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni :

1. Usia

Usia pekerja dilihat dari data rekam medis yang didapatkan dari *Medical Centre* (klinik) PT. Semen Tonasa. Adapun kategori dalam variabel ini yakni ≥ 33 tahun dan < 33 tahun.

2. Lama kerja

Untuk mengetahui lama kerja responden maka digunakan kuesioner. Responden diarahkan untuk menjawab sesuai dengan shift yang sedang dijalani. Adapun kategori lama kerja yakni memenuhi syarat jika bekerja 7-8 jam/hari dan tidak memenuhi syarat jika > 8 jam/hari.

3. Jarak monitor

Untuk mengetahui berapa jauh jarak pandang responden dari layar monitor yaitu dengan mengukur menggunakan meteran. Adapun kategori jarak monitor beresiko jika < 50 cm/ > 100 cm dan tidak beresiko jika jarak 50-100 cm.

4. Istirahat mata

Kuesioner digunakan untuk mengetahui apakah responden mengistirahatkan matanya di sela-sela pekerjaan atau tidak. Adapun kategori istirahat mata yang dimaksud yakni mengistirahatkan mata apabila menoleh ke objek lain setiap satu jam sekali selama 10 menit dan tidak mengistirahatkan mata apabila tidak menoleh ke objek lain setiap satu jam sekali selama 10 menit.

5. Kelainan refraksi

Kelainan refraksi responden dilihat dari data rekam medis karyawan khususnya di bagian *central control room* PT. Semen Tonasa.

6. Gangguan metabolik

Gangguan metabolik responden dilihat dari data rekam medis karyawan khususnya di bagian *central control room* PT. Semen Tonasa.

7. Penggunaan anti radiasi

Kuesioner digunakan untuk mengetahui apakah layar komputer yang digunakan responden terdapat anti radiasi atau tidak dan untuk mengetahui apakah pekerja menggunakan kacamata (khusus anti radiasi) atau tidak.

8. Kelelahan mata

Adapun kuesioner *Digital Eye Strain Questionnaire* (DES-Q) dari Negara Spanyol untuk mengukur kejadian kelelahan mata. Kuesioner ini diukur dengan frekuensi yang terdiri dari : tidak pernah (TP) dengan skor 0, kadang-kadang (K) dengan skor 1, Sering/selalu (S) dengan skor 2 dan intensitas sedang dengan skor 1 dan intensitas berat dengan 2 skor (Segui *et al.*, 2015). DES-Q meliputi 16 pertanyaan yang terdiri dari 16 gejala ocular dan visual antara lain : mata panas, mata gatal, merasa ada benda asing di mata, mata berair, berkedip berlebihan, mata merah, nyeri pada mata, kelopak mata terasa berat, mata kering, penglihatan kabur,

penglihatan ganda, mata sulit fokus untuk penglihatan dekat, mata sensitive terhadap cahaya, lingkungan berwarna di sekitar objek, pandangan semakin buruk dan sakit kepala (Segui *et al.*, 2015). Rumus yang digunakan dalam DES-Q sebagai berikut.

$$\text{Skor} = \text{Frekuensi} \times \text{Intensitas}$$

Setelah di dapatkan hasil, kemudian dikategorikan kembali menjadi : 0=0, 1 atau 2=1, dan 4=2. Penentuan mengalami kelelahan mata apabila total skor ≥ 8 dan tidak mengalami kelelahan mata apabila total skor < 8

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan di input kemudian dianalisis melalui pengolahan data program *Statistic Package for Social Science* (SPSS) versi 21 yang mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a. *Editing*, penyuntingan data yang dilakukan untuk menghindari kesalahan atau kemungkinan adanya kuesioner yang belum terisi.
- b. *Coding*, pemberian kode dan skoring pada tiap jawaban untuk memudahkan proses entry data.
- c. *Entry* data, setelah proses *coding* dilakukan pemasukan data ke komputer.
- d. *Cleaning*, sebelum analisis data dilakukan pengecekan dan perbaikan terhadap data yang sudah masuk.

- e. *Tabulating*, dilakukan dengan membuat tabel distribusi frekuensi dan tabel silang. Tabel silang meliputi analisis variabel independen dengan variabel dependen.

2. Analisis Data

a. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel untuk menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel. Analisis univariat dilakukan pada semua variabel yakni usia, lama kerja, jarak monitor, istirahat kerja, kelainan refraksi, gangguan metabolik, dan penggunaan anti radiasi.

b. Analisis Bivariat

Apabila telah dilakukan analisis univariat, hasilnya akan diketahui karakteristik atau distribusi setiap variabel, dan kemudian dilanjutkan analisis bivariat. Analisis bivariat ini dilakukan pada dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi.

Analisis bivariat ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan, maka analisis bivariat yang dilakukan yakni analisis statistik dengan menggunakan tabulasi silang dilanjutkan uji statistik menggunakan uji *chi square*.

F. Etik Penelitian

Penelitian ini sudah diajukan *ethical clearance*-nya kepada Komisi Etik Penelitian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan sudah disetujui dengan nomor surat No.B.089/KEPK/FKIK/V/2024.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdirinya PT. Semen Tonasa ditandai dengan diresmikannya proyek di Tahun 1968 oleh Jenderal M. Yusuf, Menteri Perindustrian di masa itu. Di dorong oleh komitmen pemerintah untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak, maka didirikan PT. Semen Tonasa di Desa Biring Ere' sebuah daerah yang sangat terpencil namun sangat kaya dengan bahan baku semen.

PT. Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang menempati lahan seluas 1.571 Hektar di Desa Biring Ere' Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, sekitar 68 Km dari Kota Makassar. Perseroan memiliki kapasitas 5.980.000 ton semen pertahun ini, mempunyai 4 unit pabrik, yaitu Pabrik Tonasa 2,3,4 dan 5. Keempat unit pabrik tersebut menggunakan proses kering dengan kapasitas masing-masing 590.000 ton semen pertahun untuk unit 2 dan 3, 2.300.000 ton semen pertahun untuk unit 4 serta 2.500.000 ton semen untuk unit 5 yang diproyeksikan mampu men-support kebutuhan semen nasional. Di dukung oleh bahan baku yang berlimpah, pabrik ini diperkirakan akan terus beroperasi dan berkontribusi pada perekonomian nasional hingga beberapa puluh tahun ke depan.

Kegiatan proses produksi semen dipantau dari suatu ruang pusat pengendalian operasi atau *central control room* (CCR). Petugas yang bekerja melakukan pemantauan produksi yaitu operator CCR yang bertugas mengontrol semua variabel operasi mesin pabrik, memonitor, menganalisa dan mengatur operasi sesuai panduan kerja dengan sasaran untuk memastikan tercapainya target produksi. Operator CCR juga mendeteksi dini indikasi gangguan dan kelainan operasi untuk memastikan gangguan dapat diatasi selama operasi. Operator CCR harus berkoordinasi dengan petugas lapangan mengenai kerusakan yang terjadi secara langsung.

Adapun visi misi PT. Semen Tonasa yaitu :

Visi

“Menjadi Perusahaan Persemenan Terkemuka yang Efisien dan Berwawasan Lingkungan”.

Misi

Sebagai Bahan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Semen Tonasa mengembangkan beberapa misi, yaitu :

- a. Meningkatkan nilai perusahaan sesuai keinginan *stakeholder*.
- b. Memproduksi semen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan kualitas dan harga bersaing serta penyerahan tepat waktu.
- c. Senantiasa berupaya melakukan *improvement* di segala bidang, guna meningkatkan daya saing di pasar dan produktivitas perusahaan.

- d. Membangun lingkungan kerja yang mampu membangkitkan motivasi karyawan untuk bekerja secara profesional.

2. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan pada variabel usia, lama kerja, istirahat mata, kelainan refraksi, gangguan metabolik, jarak monitor, penggunaan anti radiasi dan kelelahan mata. Hal tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel untuk menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel.

a. Karakteristik Responden

1) Usia

Tabel 4.1 Distribusi dan frekuensi Usia Karyawan *Central Control Room (CCR)* PT. Semen Tonasa

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
≥ 33 Tahun	22	68.8%
< 33 Tahun	10	31.2%
Total	32	100 %

Sumber: Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.1, diatas menggambarkan bahwa usia responden dalam penelitian ini dari total responden sebanyak 32 orang didominasi oleh usia ≥ 33 Tahun sebanyak 22 responden (68.8%) dan usia < 33 Tahun sebanyak 10 responden (31.2%).

2) Lama kerja

Tabel 4.2 Distribusi dan frekuensi Lama Kerja pada Karyawan *Central Control Room (CCR)* PT. Semen Tonasa

Lama Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
Lama ≥ 8 Jam	10	31.2%

Tidak lama 7-8 Jam	22	68.8%
Total	32	100 %

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menggambarkan bahwa lama kerja dari total responden sebanyak 32 orang didominasi oleh tidak lama 7-8 jam yakni sebanyak 22 responden (68.8%) dan lama ≥ 8 jam sebanyak 10 responden (31.2%).

3) Istirahat mata

Tabel 4.3 Distribusi dan frekuensi Istirahat mata pada Karyawan *Central Control Room* (CCR) PT. Semen Tonasa

Istirahat mata	Frekuensi	Persentase (%)
Ya, jika mengistirahatkan mata setiap 1 jam sekali selama 10 menit	25	78.1%
Tidak, jika tidak mengistirahatkan mata setiap 1 jam sekali selama 10 menit	7	21.9%
Total	32	100 %

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menggambarkan bahwa istirahat mata dari total responden sebanyak 32 orang didominasi oleh ya, jika mengistirahatkan mata setiap 1 jam sekali selama 10 menit yakni sebanyak 25 responden (78.1%) dan tidak mengistirahatkan mata setiap 1 jam sekali selama 10 menit sebanyak 7 responden (21.9%).

4) Kelainan refraksi

Tabel 4.4 Distribusi dan frekuensi Kelainan refraksi pada Karyawan *Central Control Room* (CCR) PT. Semen Tonasa

Kelainan refraksi	Frekuensi	Persentase (%)
Ada kelainan	11	34.4%
Tidak ada kelainan	21	65.6%
Total	32	100 %

Sumber: Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.4, diatas menggambarkan bahwa responden dalam penelitian ini dari total responden sebanyak 32 orang didominasi oleh tidak ada kelainan sebanyak 21 responden (65.6%) dan ada kelainan sebanyak 11 responden (34.4%).

5) Gangguan metabolik

Tabel 4.5 Distribusi dan frekuensi Gangguan meetabolik pada Karyawan *Central Control Room* (CCR) PT. Semen Tonasa

Gangguan metabolik	Frekuensi	Persentase (%)
Ada gangguan	5	15.6%
Tidak ada gangguan	27	84.4%
Total	32	100 %

Sumber: Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.5, diatas menggambarkan bahwa responden dalam penelitian ini dari total responden sebanyak 32 orang didominasi oleh tidak ada gangguan sebanyak 27 responden (84.4%) dan ada gangguan sebanyak 5 responden (15.6%).

b. Sumber kelelahan mata yang berasal dari monitor

1) Jarak monitor

Tabel 4.6 Distribusi dan frekuensi Jarak monitor pada Karyawan *Central Control Room* (CCR) PT. Semen Tonasa

Jarak Monitor	Frekuensi	Persentase (%)
Beresiko jika < 50 cm/>100 cm	9	28.1%
Tidak beresiko jika 50-100 cm	23	71.9%
Total	32	100 %

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menggambarkan bahwa jarak monitor dari total responden sebanyak 32 orang didominasi oleh tidak beresiko jika 50-100 cm yakni sebanyak 23 responden (71.9%).

2) Penggunaan anti radiasi

Tabel 4.7 Distribusi dan frekuensi Penggunaan anti radiasi pada layar komputer di *Central Control Room* (CCR) PT. Semen Tonasa

Penggunaan anti radiasi	Frekuensi	Persentase (%)
Menggunakan	13	40,6%
Tidak menggunakan	19	59,4%
Total	32	100 %

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.7, diatas menggambarkan bahwa responden dalam penelitian ini dari total responden sebanyak 32 orang didominasi oleh tidak menggunakan anti radiasi sebanyak 19 responden (59,4%) dan menggunakan anti radiasi sebanyak 13 responden (40,6%).

c. Kelelahan mata

Tabel 4.8 Distribusi frekuensi kelelahan mata pada karyawan
Central Control Room PT. Semen Tonasa

Kelelahan mata	Frekuensi	Persentase (%)
Mengalami kelelahan mata jika skor ≥ 8	17	53.1%
Tidak mengalami kelelahan mata jika skor < 8	15	46.9%
Total	32	100 %

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.8, diatas menggambarkan bahwa responden dalam penelitian ini dari total responden sebanyak 32 orang didominasi oleh pekerja yang tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 17 responden (53.1%) dan yang mengalami kelelahan mata sebanyak 15 responden (46.9%).

3. Analisis Bivariat

Dalam analisis bivariat ini menjelaskan secara statistik mengenai variabel penelitian yaitu usia, lama kerja, istirahat mata, kelainan refraksi, gangguan metabolik, jarak monitor dan penggunaan anti radiasi sebagai variabel independen dan kelelahan mata sebagai variabel dependen.

a. Hubungan Usia dengan Kelelahan Mata

Tabel 4.9 Hubungan usia dengan kelelahan mata pada karyawan
Central Control Room PT. Semen Tonasa

Usia	Kelelahan mata	Total	P value
-------------	-----------------------	--------------	----------------

	Iya		Tidak				
	n	%	n	%	n	%	
≥33 Tahun	12	37,5	10	31,3	22	68,8	1.000
<33 Tahun	5	15,6	5	15,6	10	31,2	

Sumber: Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.9 didapatkan hasil sebagian besar responden berusia ≥ 33 tahun dan mengalami kelelahan mata sebanyak 12 orang (37,5%). Responden yang berusia ≥ 33 tahun dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 10 orang (31,3%). Responden yang berusia < 33 tahun yang mengalami kelelahan mata sebanyak 5 orang (15,6%). Responden yang berusia < 33 tahun dan tidak mengalami kelelahan mata juga sebanyak 5 orang (15,6%).

b. Hubungan Lama Kerja dengan Kelelahan Mata

Tabel 4.10 Hubungan lama kerja dengan kelelahan mata pada karyawan *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

Lama Kerja	Kelelahan mata				Total		P value
	Iya		Tidak				
	n	%	n	%	n	%	
>8 jam	6	18,7	4	12,5	10	31,2	0,712
7-8 jam	11	34,4	11	34,4	22	68,8	

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh bahwa sebagian besar responden yang memenuhi syarat bekerja 7-8 jam/hari dan mengalami kelelahan mata sebanyak 11 orang (34,4%). Responden yang memenuhi syarat 7-8 jam/hari dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 11 orang (34,4%). Responden yang tidak memenuhi syarat

bekerja ≥ 8 jam/hari dan mengalami kelelahan mata sebanyak 6 orang (18,7%). Responden yang tidak memenuhi syarat bekerja ≥ 8 jam/hari dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 4 orang (12,5%).

c. Hubungan Istirahat Mata dengan Kelelahan Mata

Tabel 4.11 Hubungan istirahat mata dengan kelelahan mata pada karyawan *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

Istirahat Mata	Kelelahan mata				Total		P value
	Iya		Tidak		n	%	
	n	%	n	%			
Ya	14	43,7	11	34,4	25	78,1	0,678
Tidak	3	9,4	4	12,5	7	21,9	

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh bahwa pekerja yang telah mengistirahatkan mata setiap 1 jam sekali selama 10 menit dan mengalami kelelahan mata sebanyak 14 orang (43,7%). Responden yang telah mengistirahatkan matanya setiap satu jam sekali selama 10 menit dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 11 orang (34,4%). Responden yang tidak mengistirahatkan matanya setiap satu jam sekali selama 10 menit dan mengalami kelelahan mata sebanyak 3 orang (9,4%). Responden yang tidak mengistirahatkan matanya setiap satu jam selama 10 menit dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 4 orang (12,5%).

d. Hubungan Kelainan Refraksi dengan Kelelahan Mata

Tabel 4.12 Hubungan kelainan refraksi dengan kelelahan mata pada karyawan *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

Kelainan Refraksi	Kelelahan mata				Total	P value	
	Iya		Tidak				
	n	%	n	%	n		%
Ada kelainan	9	28,1	2	6,3	11	34,4	0,019
Tidak ada kelainan	8	25	13	40,6	21	65,6	

Sumber: Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh bahwa sebagian besar responden yang mengalami kelainan refraksi dan mengalami kelelahan mata sebanyak 9 orang (28,1%). Responden yang mengalami kelainan refraksi dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 2 orang (6,3%). Responden yang tidak mengalami kelainan refraksi dan mengalami kelelahan mata sebanyak 8 orang (25%). Responden yang tidak mengalami kelainan refraksi dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 13 orang (40,6%).

e. Hubungan Gangguan Metabolik dengan Kelelahan Mata

Tabel 4.13 Hubungan gangguan metabolik dengan kelelahan mata pada karyawan *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

Gangguan Metabolik	Kelelahan mata				Total	P value	
	Iya		Tidak				
	n	%	n	%	n		%
Ada Gangguan	3	9,3	2	6,3	5	15,6	1.000
Tidak ada gangguan	14	43,7	13	40,6	27	84,3	

Sumber: Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh bahwa sebagian besar responden yang tidak mengalami gangguan metabolik dan mengalami kelelahan mata sebanyak 14 orang (43,7%). Responden yang tidak

mengalami gangguan metabolik dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 13 orang (40,6%). Responden yang mengalami gangguan metabolik dan mengalami kelelahan mata sebanyak 3 orang (9,4%). Responden yang mengalami gangguan metabolik dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 2 orang (6,3%).

f. Hubungan Jarak Monitor dengan Kelelahan Mata

Tabel 4.14 Hubungan jarak monitor dengan kelelahan mata pada karyawan *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

Jarak Monitor	Kelelahan mata				Total		P value
	Iya		Tidak		n	%	
	n	%	n	%			
<50 cm/>100 cm	5	15,6	4	12,5	9	28,1	1.000
50-100 cm	12	37,5	11	34,4	23	71,9	

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh bahwa sebagian besar responden yang jarak pandangnya tidak beresiko yakni 50-100 cm dan mengalami kelelahan mata sebanyak 12 orang (37,5%). Responden yang jarak pandangnya tidak beresiko yakni 50-100 cm dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 11 orang (34,4%). Responden yang jarak pandangnya beresiko yakni <50 cm/>100 cm dan mengalami kelelahan mata sebanyak 5 orang (15,6%). Responden yang jarak pandangnya beresiko yakni <50 cm/>100 cm dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 4 orang (12,5%).

g. Hubungan Penggunaan Anti Radiasi dengan Kelelahan Mata

Tabel 4.15 Hubungan Penggunaan anti radiasi dengan kelelahan mata pada karyawan *Central Control Room* PT. Semen Tonasa

Penggunaan Anti Radiasi	Kelelahan mata				Total		<i>P value</i>
	Iya		Tidak		n	%	
	n	%	n	%			
Menggunakan	7	21,9	6	18,7	13	40,6	0,946
Tidak menggunakan	10	31,3	9	28,1	19	59,4	

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh bahwa sebagian besar responden yang tidak menggunakan anti radiasi dan mengalami kelelahan mata sebanyak 10 orang (31,3%). Responden yang tidak menggunakan anti radiasi dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 9 orang (28,1%). Sementara itu, Responden yang menggunakan anti radiasi dan mengalami kelelahan mata sebanyak 7 orang (21,9%). Responden yang menggunakan anti radiasi dan tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 6 orang (18,7%).

B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan membahas pengaruh dua variabel yaitu variabel independen (usia, lama kerja, istirahat mata, kelainan refraksi, gangguan metabolik, jarak monitor dan penggunaan anti radiasi) dengan variabel dependen (kelelahan mata).

1. Hubungan Usia dengan Kelelahan Mata

Usia adalah satuan waktu yang digunakan untuk mengukur berapa lama suatu benda atau makhluk hidup atau mati. Fungsi mata

dan indra lainnya akan menurun seiring bertambahnya usia. Pada usia 40 tahun, lensa kehilangan sebagian kemampuan untuk mengakomodasi, yang dikenal sebagai presbiopi atau mata tua (Arianti, 2017).

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* menunjukkan bahwa nilai signifikan *p value* 1.000 ($>0,05$) yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *central control room* PT. Semen Tonasa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zahra *et al.*, (2020), yang menunjukkan hasil statistik $p = 1.000$ ($>0,05$) yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan usia dengan kelelahan mata. Hal ini disebabkan karena kurangnya variasi distribusi usia pekerja di *Lacosta Desta Shoes*. Dari 15 responden, hanya 1 yang berusia di bawah 40 tahun dan tetap mengeluhkan kelelahan mata sehingga uji statistik tidak menunjukkan hubungan. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang telah dilakukan Maulina & Syafitri (2019) yang menunjukkan hasil statistik $p = 0,101$ yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan usia dengan kelelahan mata pada penjahit di Kecamatan Bunda Sakti Kota Lhokseumawe. Agar dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi, menjahit membutuhkan kondisi fisik dan keterampilan yang baik. Kelompok umur 26 hingga 35 tahun merupakan puncak perkembangan fisik

manusia, sehingga produktivitas yang tinggi dapat dicapai terutama pada pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik, seperti menjahit. Oleh karena itu, kelompok umur yang ideal untuk menjahit adalah orang-orang berusia 26 hingga 35 tahun. Usia tenaga kerja sangat mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan suatu pekerjaan, baik secara fisik maupun non-fisik. Tenaga kerja yang berumur 45 tahun ke atas biasanya memiliki kekuatan fisik yang lemah, yang dapat mengurangi produktivitas, sementara tenaga kerja yang berumur 20 hingga 45 tahun memiliki kekuatan fisik yang kuat, yang dapat meningkatkan produktivitas.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti pemindahan tenaga kerja dengan visus yang setinggi-tingginya adalah cara terbaik untuk mengurangi kelelahan mata yang sesuai dengan usia bagi pengguna komputer. Kerja malam harus dilakukan oleh tenaga kerja berusia muda dan yang bertambah tua dapat dipindahkan ke pekerjaan yang kurang membutuhkan ketelitian (Suma'mur, 1995).

Seorang mu'min tidaklah patut tertipu dengan usianya yang masih muda atau terlena dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Sehingga ia mengulur-ulur waktu atau bahkan lupa untuk beribadah. Karena walau bagaimanapun panjang umurnya namun yang akan bermanfaat di akhirat adalah masa-masa yang ia gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Sedang yang lainnya akan hilang seperti

debu diatas batu licin yang tersiram hujan hilang tak berbekas. Sesuai dengan Surah Yasin ayat 68 yang berbunyi :

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Artinya : Siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami balik proses penciptaannya (dari kuat menuju lemah). Maka, apakah mereka tidak mengerti?

Adapun tafsir wajiz, Dan ingatlah wahai anak cucu Adam, barang siapa Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Pada saat itu dia kembali lemah dan kurang akal, layaknya anak kecil, sehingga tidak kuat lagi melakukan ibadah yang berat. Maka, mengapa mereka tidak mengerti dan memanfaatkan kesempatan selagi muda?

2. Hubungan Lama Kerja dengan Kelelahan Mata

Menurut Suma'mur (2014), waktu kerja seseorang menentukan efisiensi dan produktivitasnya. Waktu kerja sehari yang ideal adalah 6-8 jam dan sisa 16-18 jam digunakan untuk istirahat, tidur, keluarga, dan hal-hal lainnya. Menambah waktu kerja lebih dari kemampuan biasanya dan dibarengi efisiensi yang tinggi, seringkali menghasilkan penurunan produktivitas sehingga menyebabkan kelelahan, menimbulkan penyakit bahkan kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* menunjukkan bahwa nilai signifikan *p value* 0,712 ($<0,05$) yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara

lama kerja dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *central control room* PT. Semen Tonasa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Maulina & Syafitri (2019) dengan hasil pemeriksaan dari analisis bivariat dengan menggunakan *software statistic* uji *chi square* dengan $p = 0,148$ yang bermakna tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan kelelahan mata pada penjahit di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar lama kerja para penjahit masih dalam batas normal yakni 7 jam perhari sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan pasal 77 yang menyatakan waktu kerja untuk bekerja 7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Mirna *et al* (2020) dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 1.000$ yang berarti tidak ada hubungan antara lama kerja dengan kelelahan mata pada pekerja di PT. Semen Bosowa Maros.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Hadits Riwayat Bukhari tentang nikmat sehat dan waktu luang yang sering dilalaikan oleh manusia. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَغْنَمُ خُمْسًا قَبْلَ خُمْسٍ : شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَ غِنَاكَ قَبْلَ فُقْرِكَ وَ فَرَاغِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

Terjemahan : "Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu." (HR Al Hakim dalam Al Mustadrak-nya)

Hadits ini juga dikuatkan oleh Imam Adz Dzahabiy dalam at Talkhish berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Syaikh Al Albani dalam Shahih at Targhib wa At Tarhib dan Al Iraqi dalam Takhrij Ahadits Al Ihya' mengatakan bahwa hadits tersebut shahih.

Berkenaan dengan nasihat Rasulullah SAW tersebut, Al Manawi menafsirkan bahwa Rasulullah SAW mengajak muslim untuk memanfaatkan waktu hidup sebelum meninggal dunia. Sebab, amalan seorang akan terputus jika telah meninggal dunia. Kemudian, menurut Al Manawi, untuk memanfaatkan waktu sehat dalam hadits di atas maksudnya adalah memanfaatkannya dengan beramal dan bekerja dalam keadaan sehat.

"Sesungguhnya banyak kendala yang menjadi penghalang, contohnya seperti sakit, sehingga kamu akan menuju ke tempat kembali tanpa membawa bekal," demikian jelas Al Manawi yang diterjemahkan Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam buku Bertarung Melawan Syahwat.

Selain itu, memanfaatkan waktu luang dimaksudkan dengan masa luang di dunia sebelum disibukkan dari berbagai hara-huru pada hari kiamat. Lebih lanjut diterangkan Al Manawi, memanfaatkan masa muda sebelum masa tua maksudnya memanfaatkan momen di waktu

muda dengan memperbanyak melakukan ketaatan sebelum datangnya masa tua dengan fisik yang lemah dan terbatas. Terakhir, untuk memanfaatkan masa kaya sebelum masa miskin tersebut artinya adalah memanfaatkannya dengan bersedekah dan menyumbangkan sebagian harta yang ada. Kelima perkara tersebut kemudian disebut sebagai Al Manawi sebagai kenikmatan yang baru disadari nilainya setelah kenikmatan tersebut hilang.

Tidak ada hubungan antara lama kerja dengan kelelahan mata dikarenakan pekerja sudah paham terkait istirahat yang dilakukan di sela-sela pekerjaan sehingga dengan teraturnya frekuensi istirahat maka akan mengurangi terjadinya kelelahan mata. Pihak perusahaan juga sebaiknya melakukan sosialisasi secara rutin terkait istirahat dan peregangan yang perlu dilakukan oleh karyawan di tengah-tengah penggunaan komputer.

3. Hubungan Istirahat Mata dengan Kelelahan Mata

Pekerjaan yang membuat mata terus menerus memfokuskan pada layar komputer dapat membuat mata menjadi cepat lelah. *Computer Vision Syndrome* (CVS) dapat muncul segera setelah pemakaian komputer dalam jangka waktu lama atau lebih dari empat jam, tetapi beberapa orang mengalaminya beberapa hari kemudian.

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* menunjukkan bahwa nilai signifikan *p value* 0,678 ($>0,05$) yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara

istirahat mata dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *central control room* PT. Semen Tonasa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nourmayanti (2010) yakni hasil uji *chi square* dengan nilai *p value* 0,569 yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara istirahat mata dengan kelelahan mata. Hal tersebut mungkin saja terjadi dikarenakan pekerja belum mengerti bagaimana istirahat mata yang baik dilakukan disela-sela aktivitas kerjanya sehingga istirahat yang dilakukan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keluhan kelelahan mata. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian Asnel & Kurniawan (2020) dengan hasil uji statistik menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai *p value* = 0,345 maka H_0 diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara istirahat mata dengan kelelahan mata pada pekerja pengguna komputer. Menurut Henning *et al* (1997) menyatakan bahwa mengambil waktu istirahat tambahan daripada waktu istirahat rutin operator komputer dapat mengurangi kelelahan otot, lengan, kaki, dan mata serta dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Hadits Riwayat Bukhari yang berbunyi :

إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه

Terjemahan : “Sungguh, Tuhanmu memiliki hak yang harus kaupenuhi, dirimu memiliki hak yang harus kaupenuhi, keluargamu juga memiliki

hak yang harus kaupenuhi, maka berikanlah hak mereka secara proporsional.”

Kiai Faqihuddin Abdul Qadir dalam fashal pertama kitab Manba'ussa'adah menjelaskan tiga hak tubuh yang harus dipenuhi secara sempurna. Di antaranya, hak konsumsi makanan yang halal dan bergizi baik (at-taghadzi bi al-halal at-thayyib), hak atas istirahat yang cukup (akhdzu ar-rahah), dan hak menyalurkan hasrat seksual secara halal dan layak (talbiyyah al-gharizah al-jinsiyyah).

Tidak ada hubungan antara istirahat mata dengan kelelahan mata dikarenakan kurangnya pencahayaan dan adanya kelainan refraksi pada pekerja yang belum dikoreksi sehingga meskipun sudah melakukan istirahat mata pekerja masih tetap mengalami keluhan kelelahan mata. Bahkan terdapat beberapa pekerja yang mengistirahatkan matanya pada saat jam istirahat saja. Hal sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arianti (2017) yang menunjukkan bahwa pekerja yang sudah cukup mengistirahatkan matanya yaitu 67,1% dan 32,9% lainnya tidak cukup mengistirahatkan matanya dari penggunaan komputer selama bekerja.

4. Hubungan Kelainan Refraksi dengan Kelelahan Mata

Salah satu penyebab utama gangguan penglihatan adalah kelainan refraksi yang merupakan kerusakan pada akomodasi visual, baik karena perubahan pada biji mata maupun perubahan pada lensa. Kesalahan pemfokusan (refraktif) disebut ametropia, sedangkan

emetropia tidak ada kesalahan refraksi. Ametropia dapat berupa miopia, hipermetropia, astigmatisma, dan presbyopia (Arianti, 2017).

Berdasarkan hasil uji *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai signifikan *p value* 0,019 ($<0,05$) yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kelainan refraksi dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *central control room* PT. Semen Tonasa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Firdani (2020) dengan hasil uji statistik *chi square* diperoleh *p value* sama dengan 0,025 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara kelainan refraksi dengan keluhan kelelahan mata. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Berliana & Rahmayanti (2017) menyatakan terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara kelainan refraksi dengan kelelahan mata dengan *p value* 0,013.

Penelitian juga selaras dengan penelitian Sustru *et al* (2022) dengan hasil uji statistik diperoleh *P value* = 0,011 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kelainan refraksi dengan kelelahan mata pada pengguna komputer di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2022. Penelitian ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa kelainan refraksi mata seperti hyperopia, astigmatisma, presbiop dan myopia dapat menyebabkan kelelahan mata di karenakan terus menerus

berakomodasi untuk melihat subjek yang lebih jelas (Roestijawati, 2007).

5. Hubungan Gangguan Metabolik dengan Kelelahan Mata

Gangguan metabolik yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Diabetes Mellitus dan Hipertensi. Diabetes dapat menyebabkan terjadinya kelelahan mata dikarenakan perubahan pada lensa dan apabila dalam jangka waktu yang panjang maka akan menyebabkan kekeruhan sehingga akomodasi mata menurun. Sedangkan hipertensi yakni kerusakan pembuluh darah termasuk pada mata. Kerusakan ini dapat mengganggu aliran darah ke mata sehingga menyebabkan gangguan penglihatan seperti retinopati atau perubahan retina.

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* menunjukkan bahwa nilai signifikan $p\text{ value}=1.000 (>0,05)$ yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara gangguan metabolik dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *central control room* PT. Semen Tonasa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zahra *et al.*, (2020) dengan hasil uji statistik $p=1000 (>0,05)$ yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara penyakit metabolik dengan kelelahan mata. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian pada cucuk bahwa terdapat hubungan antara penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes mellitus dengan kelelahan mata. Pengambilan data tidak dilakukan secara langsung diukur

tekanan darah maupun gula darah melainkan hanya proses wawancara sehingga yang didapatkan hanya berupa riwayat penyakit.

Penelitian ini tidak sejalan dengan kandungan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 31 menjelaskan bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan. Adapun bunyinya :

المُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ تُسْرِفُونَ لَاؤُ وَاشْرَبُوا وَكُلُوا

Artinya : “Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.

Tafsir wajiz, dalam rangka beribadah, kami telah menyediakan makanan dan minuman, maka makan dan minumlah apa saja yang kamu sukai dari makanan dan minuman yang halal, baik dan bergizi, tetapi jangan berlebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya, ataupun dalam makan dan minum. Karena sungguh, Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran-Nya kepada orang yang berlebihan dalam hal apa pun.

Gangguan metabolik tidak berhubungan dengan kelelahan mata dikarenakan gangguan metabolik termasuk ke dalam penyakit degenerative yang muncul secara lambat laun mengikuti bertambahnya usia. Sedangkan kelelahan mata yang dikeluhkan adalah salah satu kondisi yang dirasakan pekerja setelah bekerja dalam beberapa jam karena dalam pembuatan sepatu ini membutuhkan

keuletan dan ketelitian sehingga menuntut pekerja untuk fokus secara terus menerus melihat satu titik.

6. Hubungan Jarak Monitor dengan Kelelahan Mata

Menurut *Occupational Safety and Health Association* (OSHA) pada saat menggunakan komputer jarak yang ideal antara mata pekerja dengan layar sekurang-kurangnya adalah 20-40 inc atau sekitar 50-100 cm. Monitor yang ditempatkan terlalu dekat atau terlalu jauh dapat menyebabkan posisi tubuh kurang ergonomis sehingga menyebabkan kelelahan mata.

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact* menunjukkan bahwa nilai signifikan *p value* 1.000 ($>0,05$) yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jarak monitor dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *central control room* PT. Semen Tonasa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sunyanti (2019) dengan hasil nilai uji statistik yang menunjukkan nilai *P value* 0,683 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jarak pandang dengan keluhan kelelahan mata. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian Putri & Mulyono (2018) dengan hasil uji statistik *chi-square* didapatkan nilai *p value* = 0,499 yang dapat disimpulkan bahwa antara jarak monitor dengan keluhan kelelahan mata tidak memiliki hubungan yang signifikan pada karyawan PT. Indonesia Power UP Semarang.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian oleh Jaschinski Kruza, dalam Bridger, 2003 yang menunjukkan bahwa pekerja sehat dan tidak mengeluhkan kelelahan mata ketika bebas untuk mengatur jarak pandang mereka sendiri yaitu 51 cm sampai 99 cm. Hal tersebut mungkin dikarenakan pengguna komputer yang bekerja dengan jarak pandang >50 cm dan mengalami keluhan mata terjadi karena adanya faktor pencahayaan yang kurang sehingga tetap mengalami kelelahan mata.

Tidak ada hubungan antara jarak monitor dengan kelelahan mata dikarenakan mayoritas pekerja sudah memenuhi standar dari jarak pandang yang di anjurkan yakni 50-100 cm. Posisi monitor juga sangat penting karena dapat mempengaruhi jarak pandang pekerja.

7. Hubungan Penggunaan Anti Radiasi dengan Kelelahan Mata

Pemakaian kacamata untuk mengoreksi kelainan refraksi mata saat menggunakan komputer, laptop atau ponsel layar sentuh bisa mengurangi kontraksi otot siliaris mata, sehingga dapat mencegah kelelahan mata (Munif *et al.*, 2020). Selain itu memasang anti radiasi pada layar monitor juga sangat membantu mengurangi terjadinya kelelahan mata (Ayu *et al.*, 2018).

Berdasarkan hasil uji *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai signifikan *p value* 0,946 (>0,05) yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak,

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan anti radiasi dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian *central control room* PT. Semen Tonasa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sukmayanti (2022) dengan hasil analisis yang didapatkan *p value* sebesar 0,904 ($>0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan kacamata dengan kelelahan mata pada siswa SMAN 8 Tangerang Selatan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianti (2016) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan kacamata untuk kelainan refraksi mata maupun kacamata anti radiasi. Mata yang sangat fokus di depan layar dapat menyebabkan mata menjadi kering dan merah karena gesekan yang terjadi antara lensa dan kelopak mata (Arianti, 2016).

Dalam islam kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk melakukan sesuatu dalam hal ini pekerjaan dengan cara yang sebaik-baiknya dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan seperti dalam kandungan Surah Al-baqarah ayat 195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya : Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Tafsir Al-Muyassar, Dan teruslah kalian wahai orang-orang Mukmin menginfakkan harta demi membela agama Allah dan jihad di jalan-Nya. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam tempat-tempat kebinasaan dengan tidak berjihad di jalan Allah dan meninggalkan infak padanya. Dan berbuat baiklah kalian dalam berinfaq dan taat kepada Allah dan jadikanlah amal shalih kalian seluruhnya murni karena mengharap wajah Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ikhlas dan berbuat baik.



C. Keterbatasan Penelitian

Pada variabel jarak monitor penulis menganggap bahwa pengukuran belum sesuai dikarenakan ada beberapa pekerja terlalu jauh dari monitor saat dilakukan pengukuran sehingga ukuran yang didapatkan belum memenuhi syarat. Posisi pekerja berubah-ubah saat pengukuran dan pada saat bekerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Pengguna Operator Komputer di bagian *Central Control Room* PT. Semen Tonasa yang telah dilakukan penyebaran kuesioner dan pengukuran, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Tidak ada hubungan antara usia, lama kerja, istirahat mata, gangguan metabolik, jarak monitor dan penggunaan anti radiasi terhadap kelelahan mata pada karyawan *Central Control Room* PT. Semen Tonasa.
2. Terdapat hubungan antara kelainan refraksi dengan kelelahan mata pada karyawan *Central Control Room* PT. Semen Tonasa.
3. Lebih dominan tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan kelelahan mata dikarenakan kurangnya sampel.

B. Saran

Adapun beberapa saran setelah dilakukannya penelitian antara lain sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada pihak PT. Semen Tonasa untuk menyediakan kacamata anti radiasi dan *screen protector* kepada seluruh karyawan CCR agar pekerja lebih nyaman dalam bekerja dan terhindar dari kelelahan mata

2. Lebih di tegaskan lagi aturan wajib *check up* setiap setahun sekali khususnya *check up* kesehatan mata
3. Perlunya ada penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel pemicu contohnya diluar pekerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia. (2018). Computer Vision Syndrome. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 2, 1–2. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2165079917712727>
- Andriany, Immaculata, Bima, & Cendrawasih. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi keluhan penglihatan*.
- Anshel, & J.R. (2005). *Visual Ergonomics in the Hand Book, T and D. Taylor & Francis*. <https://doi.org/10.1201/9780429321627-9>
- Ardiansyah, & I, M. (2016). Studi Kelelahan Mata pada Pengguna Komputer dan Intensitas Penerangan di Laboratorium Komputer Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. *Integrated Lab Journal*, 4(1), 95–102. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/integratedlab/article/view/1543/1246>.
- Arianti. (2016). Faktor-faktor yang Berpengaruh dengan Keluhan Kelelahan Mata pada Pekerja Pengguna Komputer di Call Center PT. AM Tahun 2016. *Skripsi*.
- Arianti, F. P. (2017). *Faktor-faktor yang Berpengaruh dengan Keluhan Kelelahan Mata pada Pengguna Komputer di Call Center PT. AM*.
- Asnel, R., & Kurniawan, C. (2020). Analisis Faktor Kelelahan Mata pada Pekerja Pengguna Komputer. *Jurnal Endurance*, 5(2), 356–365.
- Association, A. O. (2016). America Optometric Association. *Most American Experience Digital Eye Strain from Overexposure to Computers According to Survey*, : AOA.
- Ayu, Udiantari, Citrawathi, & Warpala. (2018). Fitur Eye Protection Pada Layar Smartphone Dapat Mengurangi Kelelahan Mata dan Memperpanjang Durasi Penggunaan Pada Siswa SMP Negeri 1 Seririt. *Jurnal Pendidikan Biologi Undiksha*, 6(1), 20–32.
- Azriful, Nildawati, Habibi, & Juddin, D. R. (2018). Hubungan Tingkat Pengetahuan Faktor Risiko DM dengan Status DM pada Pegawai Negeri Sipil UIN Alauddin Makassar. *Al-Sihah : Public Health Science Journal*, Vol 10 No, 63–71.
- Bawelle, Lintong, & Rumampuk. (2016). Hubungan Penggunaan Smartphone dengan fungsi Penglihatan pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado Angkatan 2016. *Jurnal E-Biomedik*, 4(2), 0–5. <https://doi.org/10.35790/ebm.4.2.2016.14865>
- Berliana, & Rahmayanti. (2017). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan

Keluhan Kelelahan Mata pada Pekerja Pengguna Komputer di Bank X Kota Bangko. *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 1(2).

Bicford, L. (1996). *Computer and Eyestrain*. https://doi.org/http://www.eyecarecontacts.com/computers_and_eyestrain.html

Cabrera, & Siong, L. B. (2010). A Survey of eye-related complaints among call-center agents in Metro Manila. *Philippine Journal of Ophthalmology*, 35(2), 65–69.

Cahyati. (2018). Hubungan antara Umur, Lama Istirahat Mata, Durasi Kerja dan Jarak Monitor Komputer di RSUD Dr. M. Djamil Padang Tahun 2018. *Skripsi Kesehatan Masyarakat*.

Dewi, E. C. (2009). *Hubungan antara Jarak Monitor, Tinggi Monitor dan Gangguan Kesilauan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja di Bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY*.

Efriliani, Yani, & Pujowaskito. (2017). Hubungan Kebiasaan Penggunaan Gadget dengan Keluhan Kelelahan Mata pada Siswa SMP Negeri 3 Cimahi. *Repositori Fakultas Kedokteran Unjani Cimahi*, 1–8. <http://repository.unjani.ac.id/index.php?p=fstream&fid=3555&bid=300>

Firdani, F. (2020). *Faktor yang berhubungan dengan Keluhan Kelelahan Mata pada Pekerja Operator Komputer*. 5(1), 64–70.

Fitriah. (2016). Kajian Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani dan Ruhani'. *TAJID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 105–126. <https://doi.org/doi:10.30631/tjd.v15i1.29>.

Ganne, P, & M. (2021). Digital Eye Strain Epidemic amid COVID-19 Pandemic- A Cross-sectional Survey. *Ophthalmic Epidemiology*, 28(4)(Taylor & Francis), 285–292. <https://doi.org/10.1080/09286586.2020.1862243>

Gayatri, Puspita, & Suarningsih. (2021). Hubungan Intensitas Penggunaan Gadget dengan Keluhan Computer Vision Syndrome pada Siswa-Siswi di Smpn 4 Denpasar. *Coping: Community of Publishing in Nursing*, 8(4), 446. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/coping.2020.v08.i04.p14>

Harahap. (2020). *Hubungan Perilaku dan Durasi Penggunaan Komputer Dengan Keluhan Computer Vision Syndrome (CVS) Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara*.

Henning, R. A., Jacques, P., Kissel, G. V., Sullivan, A. B., & M, S. (1997). Alters-Webb (1997) Frequent short rest breaks from computer work: effects on productivity and well-being at two field sites. *Ergonomics*, 40:1, 78–91.

<https://doi.org/10.1080/001401397188396>

- Ibrahim, H., Basri, S., Jastam, M. S., & Kurnianda, I. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan computer vision syndrome pada pekerja operator komputer di PT. Semen Tonasa. *Al-Sihah : Public Health Science Journal*, 10, 85–95.
- Ilyas. (2001). Penuntun Ilmu Penyakit Mata. In *in. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia*.
- Ilyas, S. (2003). *Ilmu Penyakit Mata. Jakarta : Balai Penerbit FKUI*.
- Iridiastadi, & Yassierli. (2014). Ergonomi Suatu Pengantar. In *Bandung : PT. Remaja Roskadarya*.
- Kamso, Purwastyastuti, Lubis, Juwita, Robbi, & Besral. (2011). Prevalensi dan Determinan Sindrom Metabolik pada Kelompok Eksekutif di Jakarta dan Sekitarnya. *Kesmas: National Public Health Journal*, 6(2), 85–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.21109/KESMAS.V6I2.110>
- Kemendes. (2018). Apa itu Kelainan Refraksi ? *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*, p.1.
- Kemendes, R. (2019). Infodatin :Situasi Gangguan Penglihatan. *Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kharel, & Khatri. (2018). Knowledge, Attitude and Practice of Computer Vision Syndrome among medical students and its impact on ocular morbidity. *Journal of Nepal Health Research Council*, 16(3), 291–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.33314/jnhrc.v16i3.1177>
- Maulina, N., & Syafitri, L. (2019). Hubungan Usia, Lama Bekerja, dan Durasi Kerja dengan Keluhan Kelelahan Mata pada Penjahit Sektor Usaha Informal di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2018. *Averrous, Vol 5 No 2*, 44–58.
- Mirna, Yulianti, & Mahmud, N. U. (2020). Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja PT. Semen Bosowa. *Window of Public Health, Vol. 01 No*, 232–240.
- Munif, A., Yuliana, & W, I. N. G. (2020). Hubungan Kelainan Refraksi Mata, Durasi dan Jarak Penggunaan Laptop dengan Keluhan Mata pada Mahasiswa PSSKPD Angkatan 2017-2018 Universitas Udayana. *Jurnal Medika Udayana*, 9(9), 5–8.
- Murtopo, I., & Sarimurni. (2005). *Pengaruh Radiasi Layar Komputer Terhadap Daya Akomodasi Mata Mahasiswa Pengguna Komputer di Universitas*

Muhammadiyah *Surakarta.* *6(2),* 153–163.
<https://doi.org/http://eprints.ums.ac.id/503/-17k>

Naota, S. K., Afni, N., & M, S. (2019). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan Gejala Kelelahan Mata pada Operator Komputer di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.* 40.

Nikmah, N. H., Mirsiyanto, E., & Kurniawati, E. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kelelahan Mata (Asthenopia) pada Pengguna Komputer di Jambi Ekspres Tahun 2022. *Jurnal Inovasi Penelitian, vol.3. No.,* 7580.

Nourmayanti. (2010). Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kelelahan Mata Pada Pekerja Pengguna Komputer Di Corporate Costumer Care Center (C4) PT. Teelekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun 2014. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,* 1–122.

Odi, Purimahua, & Ruliati. (2018). Hubungan Sikap Kerja, Pencahayaan dan Suhu Terhadap Kelelahan Kerja dan Kelelahan Mata pada Penjahit di Kampung Solor Kupang 2017. *Jurnal IKESMA, 14(1),* 65–76.

Pangemanan, Saerang, & Rarers. (2014). Hubungan Lamanya Waktu Penggunaan Tablet Computer Dengan Keluhan Penglihatan pada Anak Sekolah di SMP KR. Eben Heazer 2 Manado. *E-CliniC, 2(2).*
<https://doi.org/https://doi.org.10.35790/ecl.2.2.2014.5426>

Pertiwi, W. E., Permatasari, I., & Nasiatin, T. (2023). Determinan Kelelahan Mata pada Pekerja Pengguna Komputer. *Jurnal Ilmiah Kesehatan, 22 (1),* 41.

Pheasant. (1991). *Ergonomics, Work and Health.* In *in. London : Macmilan Press.*

Putri, D. W., & Mulyono. (2018). Hubungan Jarak Monitor, Durasi Penggunaan Komputer, Tampilan Layar monitor dan Pencahayaan dengan Keluhan Kelelahan Mata. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health,* 1–10. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v7i1.2018.1-10>

Ranasinghe, Wathurapatha, Perera, Lamabadusuriya, Kulatunga, & Jayawardana. (2016). Computer vision syndrome among computer office workers in a developing country : An evaluation of prevalence and risk factors. *BMC Res Notes, 9(1),* 1–9.

Risikesdas. (2018). *Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.*

Roestijawati, N. (2007). *Sindrom Dry Eye pada Pengguna Visual Display Terminal (VDT) dalam Cermin Dunia Kedokteran No. 154.*

https://doi.org/http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/154_11_Sindromadryeye.pdf, diakses 26 April 2008

- Sadarang, R. A. I., Bujawati, E., Wijaya, D. R., Ansyar, D. I., & Haerana, B. T. (2024). Portrait of Metabolic Syndrome by Gender in A Rural Area of Gowa Regency. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*, 4(2), 70–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/diversity.v4i2.45475>
- Sawitri. (2017). Hubungan Antara Intensitas Pencahayaan dan Usia dengan Kelelahan Mata pada Pekerja di Bagian Operasional PT. Angkasa Pura I (Persero) Kota Manado Tahun 2017. *Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi*.
- Segui, Cabrero-Garcia, Crespo, Verdu, & Ronda. (2015). A Reliable and valid questionnaire was developed to measure computer vision syndrome at the workplace. *Journal of Clinical Epidemiology*, 68(6), 662–673. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.01.015>
- Septianyah. (2014). Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja Pengguna Komputer di PT. Duta Astakona Girinda. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Setiawan, D. (2010). Analisis Kelelahan Mata Pekerja Sebelum dan Sesudah Bekerja pada Intensitas Penerangan dibawah Standar diruangan Office PT. Buma Jobsite Andaro. *In. Surakarta*.
- Simbolon. (2017). Hubungan Intensitas Pencahayaan dan Lama Paparan Radiasi Monitor Komputer dengan Kelelahan Mata pada Pekerja Pengguna Komputer di Kantor. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2113>
- Sukmayanti, Z. (2022). Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Siswa SMAN 8 Tangerang Selatan Tahun 2022.
- Suma'mur. (1995). *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerjaa*.
- Sunyanti. (2019). Keluhan Kelelahan Mata pada Pekerja Pengguna Komputer di Perusahaan Travel di Kota Kolaka Raya. *Jurnal Ilmiah Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan*, 5(2), 168–177. <https://doi.org/10.36277/identifikasi.v5i2.99>.
- Susanti, Zadry, & Yuliandra. (2015). *Pengantar Ergonomi Industri, Andalas University Press. Andalas University Press*.
- Sustri, S., Edigan, F., & Raviola. (2022). Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Mata pada Pengguna Komputer di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau. *Jurnal Olahraga Dan Kesehatan, Vol 1*

No.2, 386–398.

Suud. (2008). Orientasi Kesejahteraan Sosial. In *Jakarta : Prestasi Pustaka*.

Suwandi. (2022). Hubungan Masa Kerja dan Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Kejadian Kelelahan Mata pada Pekerja Welding Logam di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. *Mega Buana Journal of Public Health*, 1(2), 87–94.

Tarwaka, & Bakri. (2016). *Ergonomi untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktivitas*. <http://shadibakri.uniba.ac.id/wp-content/uploads/2016/03/Buku-Ergonomi.pdf>

Tawaddud. (2019). Kajian Iluminasi pada Laboratorium Teknik Grafika Polimedia Jakarta terhadap Standar Kesehatan Kerja Industri (K3). *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan*, 1(2), 1–16. <https://scholar.google.co.id/shcolar>

Wolffsohn, S. &. (2018). Digital eye strain : prevalence, measurement and amelioration. *BMJ Open Ophthalmol*, 3(1). <https://doi.org/10.1136/bmjophth-2018-000146>

Yuliana, & Suwandi. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelelahan Mata Mahasiswa Gedung G Universitas Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan*, 4(2), 28–42.

Zahra, D. M., Suwondo, A., & Lestanyo, D. (2020). Hubungan Kualitas Tidur, Lama Kerja dan Kelelahan Mata terhadap Kejadian Minor Injury di Industri Rumahan Sepatu Kulit Lacosta Desta Shoes. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(6), 812–818.

Lampiran 1

No Responden :

KUESIONER PENELITIAN

**“FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELELAHAN MATA
PADA PEKERJA OPERATOR KOMPUTER DI *CENTRAL CONTROL ROOM* PT
SEMEN TONASA”**

Petunjuk pengisian :

- Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih
- Isilah pertanyaan sesuai dengan kondisi anda saat ini

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Agama :
3. Pendidikan Terakhir :

Karakteristik Pekerja

1. Berapa jam anda bekerja dalam sehari (..... Jam)
2. Apakah setiap satu jam pemakaian komputer anda mengistirahatkan mata anda minimal 10 menit?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah anda menggunakan kacamata pada saat menggunakan komputer ? (jika tidak, no 4 tidak usah dijawab)
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Jika “ya”, jenis kacamata apa yang anda gunakan ? (*ceck-list* salah satunya)

No	Jenis kacamata	Ya	Tidak
1	Kacamata lensa minus		
2	Kacamata lensa silinder		

3	Kacamata lensa anti radiasi		
4	Kacamata lensa minus dan silinder		
5	Kacamata lensa minus dan anti radiasi		
6	Kacamata lensa minus, silinder dan anti radiasi		

5. Apakah anda menggunakan anti radiasi pada layar komputer ?
- Ya
 - Tidak

Kelelahan Mata

Apakah anda mengalami gejala di bawah ini ketika atau selesai 4 jam menggunakan komputer ?

Berikan tanda ceklis apabila anda mengalami gejala di bawah ini (✓)

a. Frekuensi

Tidak pernah = tidak pernah terjadi

Kadang-kadang = gejala terjadi seminggu sekali

Sering/selalu = gejala terjadi 2 atau 3 kali seminggu atau hampir setiap hari

b. Intensitas

Sedang = tidak mengganggu aktivitas sehari-hari

Berat = mengganggu aktivitas sehari-hari

No	Gejala	Frekuensi			Intensitas	
		Tidak pernah	Kadang-kadang	Sering/selalu	Sedang	Berat
1	Mata panas					
2	Mata gatal					
3	Merasa ada benda asing di mata					
4	Mata berair					
5	Berkedip berlebihan					
6	Mata merah					
7	Nyeri pada mata					
8	Kelopak mata terasa berat					
9	Mata kering					
10	Penglihatan kabur					
11	Penglihatan ganda					

12	Mata sulit fokus untuk penglihatan dekat					
13	mata sensitif terhadap cahaya					
14	Lingkaran berwarna di sekitar objek					
15	Pandangan semakin buruk					
16	Sakit kepala					



Lampiran 2

REKAM MEDIK KARYAWAN CCR

No	Inisial	Jabatan	Section	Umur	Refraksi	Penyakit Metabolik
1	MAR	Spv of line 2/3 CCR Raw Mill (Shift) B	Section of line 2/3 Raw Mill Operation	34	Normal	-
2	MLF	Spv of line 2/3 CCR Raw Mill (Shift) C	Section of line 2/3 Raw Mill Operation	34	Normal	-
3	AAS	Spv of line 2/3 CCR Raw Mill (Shift) D	Section of line 2/3 Raw Mill Operation	34	Normal	-
4	NHD	Spv of line 2/3 CCR Raw Mill (Shift) A	Section of line 2/3 Raw Mill Operation	34	Normal	-
5	MSD	Spv of line 2 CCR Kiln (Shift) C	Section of line 2/3 Kiln & CM Operation	52	Presbyop	DM
6	HMK	Spv of line 2 CCR Kiln (Shift) A	Section of line 2/3 Kiln & CM Operation	33	Normal	-
7	FUN	Spv of line 2 CCR Kiln (Shift) D	Section of line 2/3 Kiln & CM Operation	33	Normal	-
8	ZFI	Spv of line 2 CCR Kiln (Shift) C	Section of line 2/3 Kiln & CM Operation	31	Normal	-
9	ARD	Spv of line 3 CCR Kiln (Shift) B	Section of line 2/3 Kiln & CM Operation	32	Normal	-
10	WYD	Spv of line 4 CCR RM (Shift)	Section of line 4 RKC Operation	30	Normal	Hipertensi
11	ARD	Spv of line 4 CCR RM (Shift)	Section of line 4 RKC Operation	33	Normal	-
12	MHB	Spv of line 4 CCR RM (Shift)	Section of line 4 RKC Operation	53	Presbyop	DM
13	RLM	Spv of line 4 CCR RM (Shift)	Section of line 4 RKC Operation	32	Normal	-
14	SHD	Spv of line 4 CCR Kiln (Shift)	Section of line 4 RKC Operation	49	Presbyop	Hipertensi
15	MNR	Spv of line 4 CCR Kiln (Shift)	Section of line 4 RKC Operation	33	Normal	-
16	IKD	Spv of line 4 CCR Kiln (Shift)	Section of line 4 RKC Operation	32	Normal	-
17	AID	Spv of line 4 CCR CM (Shift)	Section of line 4 RKC Operation	31	Myopia	-

18	JSM	Spv of line 4 CCR CM (Shift)	Section of line 4 RKC Operation	31	Normal	-
19	MIB	Spv of line 4 CCR CM (Shift)	Section of line 4 RKC Operation	29	Normal	-
20	NSR	Spv of line 5 CCR RM	Section of line 5 RKC Operation	33	Myopia	-
21	MSM	Spv of line 5 CCR RM	Section of line 5 RKC Operation	35	Myopia	-
22	RKB	Spv of line 5 CCR RM	Section of line 5 RKC Operation	31	Normal	-
23	MIH	Spv of line 5 CCR RM	Section of line 5 RKC Operation	33	Normal	-
24	IWN	Spv of line 3 CCR Kiln (Shift) A	Section of line 2/3 Kiln & CM Operation	49	Presbyop	Hipertensi
25	IRM	Spv of line 3 CCR Kiln (Shift) C	Section of line 2/3 Kiln & CM Operation	36	Normal	-
26	MHN	Spv of line 3 CCR Kiln (Shift) D	Section of line 2/3 Kiln & CM Operation	47	Presbyop	-
27	HSL	Spv of line 5 CCR Kiln & CM (Shift)	Section of line 5 RKC Operation	33	Normal	-
28	MAS	Spv of line 5 CCR Kiln & CM (Shift)	Section of line 5 RKC Operation	33	Myopia	-
29	MIL	Spv of line 5 CCR Kiln & CM (Shift)	Section of line 5 RKC Operation	31	Myopia	-
30	THN	Spv of line 2/3 CCR FM (Shift)	Section of line 2/3 FM Operation	38	Normal	-
31	SLM	Spv of line 2/3 CCR FM (Shift)	Section of line 2/3 FM Operation	35	Normal	-
32	ANR	Spv of line 2/3 CCR FM (Shift)	Section of line 2/3 FM Operation	35	Myopia	-

Lampiran 3



Surat Keterangan

664/PP.02.02/22.10/05-2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifki S. Pradipta
 Jabatan : SM of CLD & Innovation

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : **Fingki Indriani**
 Perguruan : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Jurusan : Kesehatan Masyarakat

dinyatakan dengan sebenar-benarnya mahasiswi yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Unit of Safety, Health & Environment, PT Semen Tonasa dari tanggal 01 s.d. 30 April 2024 dengan judul :

" Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Kelelahan Mata pada pekerja Operator Komputer di Bagian *Central Control Room* PT Semen Tonasa"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya. Atas Perhatiannya kami sampaikan terima kasih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pangkep, 27 Mei 2024
 Unit of CLD & Innovation


Rifki S. Pradipta
 Senior Manager

ALAUDDIN
MAKASSAR

Go
 Beyond
 Next

PT SEMEN TONASA
 Biringene, Pangkep, Sulawesi Selatan, 90651 Telp. (410)-312-345

Lampiran 4



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.B.089/KEPK/FKIK/V/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Fingki Indriani
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELELAHAN
MATA PADA PEKERJA OPERATOR KOMPUTER DI BAGIAN
CENTRAL CONTROL ROOM PT SEMEN TONASA"**

**"FACTORS ASSISTING WITH FATIGUE THE EYES OF A
COMPUTER OPERATOR WORKER IN THE SECTION
CENTRAL CONTROL ROOM PT SEMEN TONASA"**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025.

This declaration of ethics applies during the period May 17, 2024 until May 17, 2025.

May 17, 2024



Professor and Chairperson,

Dr. apt. Ismail Ismail, S.Si., M.Si.

Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 6164/Un.06/LP2M/PP.00.9/03/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Makassar

di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Fingki Indriani
 NIM : 70200120046
 Semester/T.A. : VIII (Delapan)/T.A. 2023-2024
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat
 Alamat : Jalan Parai-katte
 No. HP. : 082188826056

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan mata pada pekerja operator komputer di bagian central control room PT. Semen Tonasa.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di PT. Semen Tonasa dari tanggal 1-30 April 2024.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Dr. Rosmini, S. Ag., M. Th. I.
 NIP. 197212311999032004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
 - pertinggal

Lampiran 6



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 6503/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Pimpinan PT Semen Tonasa Kab. Pangkep
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-6164/Un.06/LP2M/PP.00.9/03/2024 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: FINGKI INDRIANI
Nomor Pokok	: 70200120048
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36. Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja Operator Komputer di Bagian Central Control Room PT. Semen Tonasa "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 s/d 30 April 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat Izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 19 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Inisial	Usia	LamaKerja	JarakMonitor	IstirahatMata	KelainanRefraksi	GangguanMetabolik	PenggunaanAntiRadiasi	KelelahanMata
MAR	1	2	1	1	2	2	2	2
MLF	1	2	1	1	2	2	2	2
AAS	1	2	2	1	2	2	1	2
NHD	1	2	2	1	2	2	1	1
MSD	1	2	1	2	1	1	2	1
HMK	1	2	2	1	2	2	2	2
FUN	1	2	1	1	2	2	2	2
ZFI	2	2	2	2	2	2	2	2
ARD	2	2	1	2	2	2	2	2
WYD	2	1	2	1	2	1	1	2
ARD	1	1	2	1	2	2	1	1
MHB	1	2	2	1	1	1	2	2
RLM	2	2	1	1	2	2	1	1
SHD	1	2	2	1	1	1	2	1
MNR	1	2	2	1	2	2	1	2
IKD	2	2	2	2	2	2	1	2
AID	2	2	2	2	1	2	1	1
JSM	2	1	2	1	2	2	2	2
MIB	2	1	2	1	2	2	1	1
NSR	1	2	1	2	1	2	2	1
MSM	1	1	1	1	1	2	2	1
RKB	2	2	2	1	2	2	1	1
MIH	1	2	2	1	2	2	2	1
IWN	1	2	2	1	1	1	2	1
IRM	1	1	2	2	2	2	1	2
MHN	1	1	2	1	1	2	2	2
HSL	1	1	2	1	2	2	2	1
MAS	1	2	2	1	1	2	2	1
MIL	2	1	2	1	1	2	2	1
THN	1	2	1	1	2	2	2	1
SLM	1	2	2	1	2	2	1	2
ANR	1	1	2	1	1	2	1	1

Lampiran7

Lampiran 8

Descriptives

		Statistic	Std. Error
Usia	Mean	35.59	1.167
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	33.21	
	Upper Bound	37.97	
	5% Trimmed Mean	34.99	
	Median	33.00	
	Variance	43.604	
	Std. Deviation	6.603	
	Minimum	29	
	Maximum	53	
	Range	24	
	Interquartile Range	3	
	Skewness	1.764	.414
	Kurtosis	1.872	.809

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Usia	.317	32	.000	.704	32	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Kelelahan Mata	Mean	8.38	.873	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	6.60	
		Upper Bound	10.15	
	5% Trimmed Mean	8.40		
	Median	8.50		
	Variance	24.371		
	Std. Deviation	4.937		
	Minimum	0		
	Maximum	17		
	Range	17		
	Interquartile Range	9		
	Skewness	-.151	.414	
	Kurtosis	-1.097	.809	

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kelelahan Mata	.109	32	.200*	.954	32	.187

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≥ 33 Tahun	22	68.8	68.8	68.8
	< 33 Tahun	10	31.3	31.3	100.0
Total		32	100.0	100.0	

		Lama Kerja			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lama : > 8 Jam	10	31.3	31.3	31.3
	Tidak Lama : < 8 Jam	22	68.8	68.8	100.0
Total		32	100.0	100.0	

Jarak Monitor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Beresiko jika < 50 cm/>100 cm	9	28.1	28.1	28.1
	Tidak Beresiko jika 50-100 cm	23	71.9	71.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Istirahat Mata

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya, jika mengistirahatkan mata setiap 1 jam sekali selama 10 menit	25	78.1	78.1	78.1
	Tidak, jika tidak mengistirahatkan mata setiap 1 jam sekali selama 10 menit	7	21.9	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Kelainan Refraksi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada Kelainan	11	34.4	34.4	34.4
	Tidak ada kelainan	21	65.6	65.6	100.0
Total		32	100.0	100.0	

Gangguan Metabolik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada gangguan	5	15.6	15.6	15.6
	Tidak ada gangguan	27	84.4	84.4	100.0
Total		32	100.0	100.0	

Penggunaan Anti Radiasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menggunakan	13	40.6	40.6	40.6
	Tidak menggunakan	19	59.4	59.4	100.0
Total		32	100.0	100.0	

Kelelahan Mata

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mengalami kelelahan mata jika total skor ≥ 8	15	46.9	46.9	46.9
	Tidak mengalami kelelahan mata jika total skor < 8	17	53.1	53.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Crosstab

Count

		Kelelahan Mata		
		Mengalami kelelahan mata jika total skor ≥ 8	Tidak mengalami kelelahan mata jika total skor < 8	Total
Usia	≥ 33 Tahun	12	10	22
	< 33 Tahun	5	5	10
	Total	17	15	32

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.057 ^a	1	.811		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.057	1	.811		
Fisher's Exact Test				1.000	.555
Linear-by-Linear Association	.055	1	.814		
N of Valid Cases	32				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,69.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Count

		Kelelahan Mata		Total
		Mengalami kelelahan mata jika total skor ≥8	Tidak mengalami kelelahan mata jika total skor <8	
Lama Kerja				
	Lama : > 8 Jam	6	4	10
	Tidak Lama : < 8 Jam	11	11	22
Total		17	15	32

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.276 ^a	1	.599		
Continuity Correction ^b	.021	1	.886		
Likelihood Ratio	.278	1	.598		
Fisher's Exact Test				.712	.445
Linear-by-Linear Association	.267	1	.605		
N of Valid Cases	32				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,69.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		Kelelahan Mata		Total
		Mengalami kelelahan mata jika total skor ≥8	Tidak mengalami kelelahan mata jika total skor <8	
Jarak Monitor	Beresiko jika < 50 cm/>100 cm	5	4	9
	Tidak Beresiko jika 50-100 cm	12	11	23
Total		17	15	32

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.030 ^a	1	.863		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.030	1	.863		
Fisher's Exact Test				1.000	.589
Linear-by-Linear Association	.029	1	.865		
N of Valid Cases	32				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,22.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		Kelelahan Mata		Total
		Mengalami kelelahan mata jika total skor ≥ 8	Tidak mengalami kelelahan mata jika total skor < 8	
Istirahat Mata	Ya, jika mengistirahatkan mata setiap 1 jam sekali selama 10 menit	14	11	25
	Tidak, jika tidak mengistirahatkan mata setiap 1 jam sekali selama 10 menit	3	4	7
Total		17	15	32

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.379 ^a	1	.538		
Continuity Correction ^b	.035	1	.851		
Likelihood Ratio	.379	1	.538		
Fisher's Exact Test				.678	.424
Linear-by-Linear Association	.367	1	.544		
N of Valid Cases	32				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,28.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		Kelelahan Mata		Total
		Mengalami kelelahan mata jika total skor ≥ 8	Tidak mengalami kelelahan mata jika total skor < 8	
Kelainan Refraksi	Ada Kelainan	9	2	11
	Tidak ada kelainan	8	13	21
Total		17	15	32

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.542 ^a	1	.019		
Continuity Correction ^b	3.925	1	.048		
Likelihood Ratio	5.895	1	.015		
Fisher's Exact Test				.028	.022
Linear-by-Linear Association	5.368	1	.021		
N of Valid Cases	32				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,16.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		Kelelahan Mata		Total
		Mengalami kelelahan mata jika total skor ≥ 8	Tidak mengalami kelelahan mata jika total skor < 8	
Gangguan Metabolik	Ada gangguan	3	2	5
	Tidak ada gangguan	14	13	27
Total		17	15	32

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.112 ^a	1	.737		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.113	1	.736		
Fisher's Exact Test				1.000	.563
Linear-by-Linear Association	.109	1	.741		
N of Valid Cases	32				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,34.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		Kelelahan Mata		Total
		Mengalami kelelahan mata jika total skor ≥8	Tidak mengalami kelelahan mata jika total skor <8	
Penggunaan Anti Radiasi	Menggunakan	7	6	13
	Tidak Menggunakan	10	9	19
Total		17	15	32

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.005 ^a	1	.946		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.005	1	.946		
Fisher's Exact Test				1.000	.615
Linear-by-Linear Association	.004	1	.947		
N of Valid Cases	32				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,09.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 9

DOKUMENTASI

1. Pengukuran Jarak Monitor



2. Pembagian Kuesioner



3. Tampilan Ruangan *Central Control Room (CCR)*



4. Aktivitas Pendukung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

