

**DETERMINAN BIOSOSIAL DAN PERILAKU TERHADAP TEKANAN DARAH
PADA PETANI BAWANG DI DESA BONTO KARAENG KECAMATAN SINOA
KABUPATEN BANTAENG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

DEWI SRI HANDAYANI

NIM: 70200120121

**PRODI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Determinan Biososial dan Perilaku Terhadap Tekanan Darah Pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng*" yang disusun oleh Dewi Sri Handayani, NIM 70200120120, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Juli 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 22 Juli 2024
12 Muharram 1446 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes (.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes (.....)
Munaqisy I	: Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M. Kes (.....)
Munaqisy II	: Dr. Muzakkir. M. Pd. I (.....)
Pembimbing I	: Emmi Bujawati, SKM., M. Kes (.....)
Pembimbing II	: Munawir Amansyah, SKM., M. Kes (.....)

Diketahui Oleh:

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes
810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat, dan pertolongan serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan, kesehatan, dan keselamatan, serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Determinan Biososial dan Perilaku Terhadap Tekanan Darah Pada Petani Bawang Di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng”. Shalawat dan salam atas junjungan kami baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan kepada kami nikmat Islam dan menuntun manusia kejalan yang lurus, yaitu jalan yang di kehendaki serta di ridhoi oleh Allah SWT.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat tugas akhir untuk menyelesaikan studi sarjana (S1), dan memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM) pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Pertama-tama dan paling utama saya ucapkan terima kasih kepada ibunda saya Suriati dan ayah saya tercinta Aso Tuba, terima kasih telah menjadi pahlawan dan suri tauladan dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas dukungannya, selalu memberikan nasehat, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tidak dapat penulis balas. Teruntuk keluarga besar dari kedua orang tua serta Teman-teman saya ucapkan terima kasih atas segala dorongan, motivasi, dan dukungannya, baik dalam bentuk material

maupun non-material, tanpa kalian saya tidak akan mampu berada pada tahap ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kendala dan kesulitan baik dari pihak peneliti itu sendiri maupun pihak luar. Namun dengan kesabaran peneliti mampu mengatasi kendala-kendala tersebut, tentunya dengan petunjuk dari Allah SWT serta bimbingan dan bantuan semua pihak yang terlibat. Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, melalui ucapan sederhana ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph. D, Rektor UIN Alauddin Makassar.
Beserta Wakil Rektor I, II, III, IV UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG, M. Kes Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes, Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Dr. BS. Titi Haerana, SKM., M. Kes Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Emmi Bujawati, SKM., M.Kes Dosen Pembimbing I dan Munawir Amansyah, SKM., M.Kes Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes Dosen Penguji Kompetensi dan Dr. Muzakkir, M. Pd. I Dosen Penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Keluarga Besar Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan pemahaman arti dari sebuah proses pengembangan diri, berbagi pengalaman dan inspirasi.
8. Teman-teman terdekat saya dan teman seperjuangan Kesehatan Masyarakat Corvus 2020 yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi seluruh pembaca, dan juga menjadi pemantik semangat bagi seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dalam bidang penelitian.

Gowa, 22 Juli 2024

Penulis

Dewi Sri Handayani

NIM: 70200120121

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
<i>A. Latar Belakang</i>	1
<i>B. Rumusan Masalah</i>	7
<i>C. Tujuan Penelitian</i>	7
<i>D. Hipotesis Penelitian</i>	8
<i>E. Manfaat Penelitian</i>	9
<i>F. Definisi Operasional</i>	10
<i>G. Kajian Pustaka</i>	14
BAB II	20
TINJAUAN TEORITIS	20
<i>A. Definisi Tekanan Darah</i>	20
<i>B. Klasifikasi Tekanan Darah</i>	24
<i>C. Gejala Tekanan Darah</i>	30
<i>D. Patofisiologi Tekanan Darah</i>	31
<i>E. Faktor-Faktor Risiko</i>	32
<i>F. Pencegahan dan Manajemen Faktor Risiko Hipertensi</i>	42
<i>G. Pengobatan Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)</i>	43
<i>H. Kerangka Teori</i>	49
<i>I. Kerangka Konsep</i>	50
BAB III	51
METODELOGI PENELITIAN	51
<i>A. Jenis Penelitian</i>	51
<i>B. Tempat dan Waktu Penelitian</i>	51
<i>C. Populasi dan Sampel</i>	51
<i>D. Metode Pengumpulan Data</i>	54

<i>E. Instrument Penelitian</i>	55
<i>G. Instrument Pengumpulan Data</i>	62
<i>H. Pengolahan dan Analisis Data</i>	63
BAB IV	68
HASIL DAN PEMBAHASAN	68
<i>A. Gambaran Umum Lokasi Peneliti</i>	68
<i>B. Hasil Penelitian</i>	73
<i>C. Pembahasan</i>	85
BAB V	121
PENUTUP	121
<i>A. Kesimpulan</i>	121
<i>B. Implikasi Penelitian</i>	123
DAFTAR PUSTAKA	125



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka Penelitian.....	14
Tabel 2.1 Klasifikasi Tekanan Darah.....	24
Tabel 2.2 Klasifikasi Tekanan Darah.....	25
Tabel 2.3 Klasifikasi Tekanan Darah.....	26
Tabel 2.4 Ketentuan Konsumsi Garam.....	32
Tabel 2.5 Kebutuhan Asupan Natrium per Hari Menurut AKG.....	32
Tabel 2.6 Klasifikasi Tingkat Asupan Natrium.....	32
Tabel 3.1 Distribusi Total Sampel Penelitian Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.....	49
Tabel 3.2 Kode Variabel Independen.....	56
Tabel 4.1 Kondisi Lahan.....	60
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk, Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga Desa Bonto Karaeng Tahun 2019.....	62
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Responden di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.....	65
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengukuran Tekanan Darah, Pola Konsumsi Natrium dan Serat Responden di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.....	66
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategori Pengukuran Tekanan Darah, Pola Konsumsi Natrium dan Serat Responden di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.....	66
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendapatan Responden di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.....	67
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kebiasaan Merokok Responden di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.....	68
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategori Kebiasaan Merokok dan Konsumsi Kafein Responden di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.....	69
Tabel 4.9 Hubungan Usia dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa.....	70.

Tabel 4.10 Hubungan Jenis Kelamin dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa.....	71
Tabel 4.11 Hubungan Pendapatan dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa.....	72
Tabel 4.12 Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa.....	73.
Tabel 4.13 Hubungan Konsumsi Kafein dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa.....	74.
Tabel 4.14 Hubungan Pola Konsumsi Natrium dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa.....	75
Tabel 4.15 Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	44
Gambar 2.2 Kerangka Konsep.....	45



ABSTRAK

Nama : Dewi Sri Handayani

Nim : 70200120121

Judul :

Determinan Biososial dan Perilaku Terhadap Tekanan Darah Pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

Tekanan darah adalah tekanan yang dialami oleh darah dalam arteri ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Terdapat dua bentuk gangguan tekanan darah, yakni hipertensi (tekanan darah tinggi) dan hipotensi (tekanan darah rendah). Tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang paling umum di dunia, serta salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni faktor yang bersifat tidak dapat diubah, seperti jenis kelamin, usia, Faktor yang dapat diubah, seperti pengetahuan, kebiasaan olahraga, serta pola konsumsi makan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara determinan biososial dan perilaku terhadap tekanan darah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan analitik observasional dan desain studi *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini 217 orang dengan sampel 140 orang petani bawang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, pendapatan, kebiasaan merokok, konsumsi kafein, pola konsumsi natrium dan pola konsumsi serat, sedangkan variabel dependennya tekanan darah. Hasil uji *chi-square* hubungan antara usia dengan tekanan darah ($p = 0,000$), jenis kelamin ($p = 0,257$), pendapatan ($p = 0,028$), kebiasaan merokok ($p = 0,007$), konsumsi kafein ($p = 0,000$), pola konsumsi natrium ($p = 0,000$) dan pola konsumsi serat ($p = 0,006$). Hasil studi menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, kebiasaan merokok, konsumsi kafein, pola konsumsi natrium dan pola konsumsi serat terhadap tekanan darah pada petani bawang, sedangkan untuk variabel jenis kelamin tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

Kata Kunci: usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, konsumsi kafein, tekanan darah.

ABSTRACT

Blood pressure refers to the pressure faced by the blood in the arteries when the heart pumps blood throughout the human body. There are two types of blood pressure disorders, namely hypertension (high blood pressure) and hypotension (low blood pressure). High blood pressure is a non-communicable disease that has a high incidence rate globally, and is also a risk factor for cardiovascular disease. Factors that influence the emergence of hypertension can be classified into two main categories, namely factors that cannot be changed, such as gender, age, factors that can be changed, such as knowledge, exercise habits, and food consumption patterns. This study aims to determine the relationship between biosocial and behavioral determinants of blood pressure. This type of research is quantitative with an observational analytical approach and a cross-sectional study design. The population in this study was 217 people with a sample of 140 onion farmers. The independent variables in this study are age, gender, income, smoking habits, caffeine consumption, sodium consumption patterns and fiber consumption patterns, while the dependent variable is blood pressure. Chi-square test results of the relationship between age and blood pressure ($p = 0.000$), gender ($p = 0.257$), income ($p = 0.028$), smoking habits ($p = 0.007$), caffeine consumption ($p = 0.000$), consumption patterns sodium ($p = 0.000$) and fiber consumption patterns ($p = 0.006$). The results of the study show that there is a significant relationship between age, income, smoking habits, caffeine consumption, sodium consumption patterns and fiber consumption patterns on blood pressure in onion farmers, while for the gender variable there is no significant relationship with blood pressure in onion farmers in Bonto Village, Karaeng, Sinoa District, Bantaeng Regency.

Keywords: *age, income, smoking habits, caffeine consumption, blood pressure.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tekanan darah adalah tekanan yang dialami oleh darah dalam arteri ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Terdapat dua bentuk gangguan tekanan darah, yakni hipertensi (tekanan darah tinggi) dan hipotensi (tekanan darah rendah). Tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang paling umum di dunia, serta salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular (Rachmawati et al., 2020).

Menurut *American Society of Hypertension* (ASH), hipertensi, atau tingkat tekanan darah tinggi, adalah penyakit kardiovaskular yang dapat muncul secara perlahan-lahan sebagai akibat dari serangkaian gangguan yang kompleks dan saling terkait. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan tekanan darah tinggi sebagai tekanan sistolik 160 mmHg atau lebih tinggi, atau tekanan diastolik 95 mmHg atau lebih tinggi. Sementara itu, JNC VII mendefinisikan hipertensi sebagai peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg (Raziansyah & Amalia, 2022).

Di Amerika Serikat, tekanan darah tinggi merupakan penyebab utama kematian, yang mempengaruhi sekitar 75 juta orang, atau sekitar 32% dari populasi orang dewasa, dengan satu dari setiap tiga orang dewasa terkena dampaknya. Pada tahun 2014, hipertensi menyebabkan

atau berkontribusi pada hampir 410.000 kematian di Amerika, dengan lebih dari 1.100 kematian setiap hari (Siregar et al., 2020).

Menurut data yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO) tahun 2019, hipertensi mempengaruhi 22% populasi global (Jung et al., 2020). Setiap tahun, hipertensi atau tekanan darah tinggi membunuh sekitar 8 juta orang, dengan 1,5 juta kematian terjadi di Asia Tenggara, yang merupakan sepertiga dari populasi hipertensi di kawasan ini (Nikmah & Pawenang, 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hipertensi dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor yang tidak dapat dimodifikasi, termasuk jenis kelamin, usia, dan faktor genetik. Aspek yang dapat dimodifikasi termasuk pengetahuan, kebiasaan olahraga, dan pola konsumsi makanan. Hipertensi disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor risiko. Pada tahun 2014, WHO menganjurkan upaya global untuk mengurangi kejadian penyakit tidak menular, termasuk hipertensi, melalui Rencana Aksi Global. Langkah-langkah ini termasuk mengurangi faktor risiko seperti merokok, konsumsi garam yang berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, dan mengelola stres atau masalah psikologis (Mayasari et al., 2019).

Seseorang yang merokok beberapa bungkus rokok setiap hari berisiko mengalami masalah kesehatan. Nikotin yang dihirup dari rokok mengandung karbon monoksida, dan hemoglobin, komponen darah yang mengangkut oksigen, lebih mudah berikatan dengan karbon monoksida

dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya, suplai oksigen ke jantung berkurang, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan jumlah energi yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah (Kurniasih, 2019).

Perilaku berkembang sebagai hasil dari pengalaman dan hubungan manusia yang berbeda dengan lingkungannya. Perilaku manusia bersifat menyeluruh atau holistik, dan dapat dievaluasi dari sudut pandang psikologi, fisiologi, dan pertimbangan sosial. Dengan kata lain, perilaku manusia dapat direduksi menjadi serangkaian tindakan sehari-hari seperti berbicara, berjalan, menjalankan tradisi, pakaian, menjawab, dan sebagainya. Perilaku manusia, sebagai kecenderungan mendasar, dapat dikembangkan dan dipelajari sepanjang waktu (Juditha, 2020).

Pada tahun 2009, *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa berbagai indikator perilaku dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan dampaknya, khususnya kebiasaan makan yang buruk, penggunaan nikotin, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, dan asupan alkohol yang berlebihan. Karakteristik sosial ekonomi seperti pendidikan yang diperoleh, posisi kekayaan, dan area tempat tinggal semuanya berdampak pada risiko perilaku (Kibria et al., 2019). perilaku konsumsi dimana frekuensi pemanfaatan makanan dengan kadar natrium yang tinggi seperti biskuit, ikan asin, susu dan olahannya, kopi, dan penyedap makanan berdampak pada kejadian hipertensi sistolik sebesar

33%, sedangkan pada kasus lain seperti minum teh memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi diastolik sebesar 37% (Aristi et al., 2020).

Menurut data Riskedas terbaru dari tahun 2018, angka kejadian hipertensi secara keseluruhan adalah 34,1%. Prevalensi hipertensi juga meningkat secara signifikan di antara orang berusia 60 tahun ke atas. Perkiraan jumlah kasus hipertensi di Indonesia adalah 63.309.620, dengan angka kematian 427.218 (Irwanto et al., 2023).

Prevalensi hipertensi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 25,06%. Kabupaten Bantaeng memiliki tingkat layanan tertinggi, yaitu 100%, diikuti oleh Kabupaten Pinrang sebesar 87,67%. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah orang berusia di atas 15 tahun dengan hipertensi di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 1.520.659 pada tahun 2021, dengan perawatan medis yang diberikan kepada sekitar 381.133. Menurut Puskesmas Sinoa di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, penyakit tidak menular akan menjadi sepuluh penyakit terbanyak pada tahun 2022, dengan hipertensi berada di peringkat kelima. Desa Bonto Karaeng merupakan pusat pertanian bawang merah di Kabupaten Bantaeng.

Saat ini, masyarakat Indonesia bergantung pada sumber daya alam, khususnya sektor pertanian, untuk mempertahankan hidup. Petani menghadapi berbagai kendala dalam pertanian, termasuk adanya patogen pengganggu tanaman yang dapat merusak tanaman. Petani bawang merah adalah individu atau bisnis yang mengkhususkan diri dalam penanaman

bawang merah. Bawang adalah tanaman sayuran yang umum dan merupakan bahan pokok dalam banyak resep. Petani bawang merah memprioritaskan penanaman, budidaya, dan pemanenan bawang merah untuk memenuhi permintaan pasar. Menurut (Sahuri & Sahna, 2021) petani bawang merah sering mengalami masalah kesehatan akibat penggunaan pestisida berisiko tinggi yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa merokok meningkatkan risiko hipertensi, stroke, dan berbagai jenis keganasan kanker (Krittanawong et al., 2020).

Penelitian tekanan darah telah dilakukan dengan berbagai subjek, termasuk nelayan (Mufaidah et al., 2019; Fifianah et al., 2022; Fadlilah & Halim, 2023) dan subjek lanjut usia (Muhaimin et al., 2019; Darwis et al., 2019; Siregar, 2020; Supriadi et al., 2023). Sedangkan untuk penelitian tekanan darah pada remaja telah dilakukan (Hutapea, 2021; Faisal et al., 2022; Nurlani et al., 2023). Subjek pada pegawai kantor oleh penelitian (Anggraenny & Martini, 2020; Garwahasada & Wirjatmadi, 2020; Yana et al., 2023) Penelitian pada pegawai kantoran telah dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk pendekatan dengan desain *case control* (Garwahasada & Wirjatmadi, 2020; Kartikadewi et al., 2022; Diana & Hastono, 2023). Metode penelitian deskriptif korelatif oleh (Ajeng et al., 2020; Rismadi & Merindany, 2023; Darmataty et al., 2023).

Namun, hanya sedikit penelitian yang dilakukan pada pekerja informal seperti petani bawang. Mengingat bahwa petani bawang merah

adalah sekelompok individu yang melakukan banyak pekerjaan fisik, memahami efek merokok pada tekanan arteri mereka sangat penting untuk kesehatan mereka secara keseluruhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tumagger F, 2019), petani merupakan kelompok pekerja yang sangat sensitif terhadap penyakit neurodegeneratif dan kecelakaan saat melakukan aktivitasnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fokus pada masalah keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, seperti penggunaan pakaian pelindung dan alas kaki. Pekerja di sektor pertanian juga rentan terhadap penyakit karena pola perilaku yang tidak mendukung hidup aktif dan kebersihan. Seperti tidak membersihkan tangan dengan sabun, merokok, atau minum minuman beralkohol.

Pemilihan petani bawang sebagai partisipan penelitian memungkinkan kami untuk menemukan dan memahami faktor-faktor risiko tertentu yang mempengaruhi kesehatan mereka. Berbeda dengan studi sebelumnya, para peneliti memutuskan untuk melakukan studi kuantitatif dengan menggunakan metode analitik observasional dan desain studi cross-sectional. Dimana peneliti ingin menemukan dan mengaitkan hubungan antara faktor penentu biososial dan perilaku sebagai variabel independen dan variabel tekanan darah sebagai variabel dependen pada satu periode pengamatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang “Determinan Hubungan Biososial dan

Perilaku terhadap Tekanan Darah pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Determinan Biososial dan Perilaku terhadap Tekanan Darah pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng?"

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Determinan Biososial dan Perilaku terhadap Tekanan Darah pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan usia dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.
- b. Untuk mengetahui hubungan jenis kelamin dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.
- c. Untuk mengetahui hubungan pendapatan dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

- d. Untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.
- e. Untuk mengetahui hubungan konsumsi kafein dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.
- f. Untuk mengetahui hubungan pola konsumsi natrium dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.
- g. Untuk mengetahui hubungan pola konsumsi serat dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari H_0 dan H_a , yakni sebagai berikut :

1) Hipotesis Nol (H_0):

Tidak terdapat hubungan antara determinan biososial dan perilaku terhadap tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

2) Hipotesis Alternatif (H_a):

Terdapat hubungan antara determinan biososial dan perilaku terhadap tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Institusi

- a. Penelitian ini dapat membantu institusi, seperti rumah sakit dan pusat kesehatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bahaya kardiovaskular yang terkait dengan merokok di kalangan petani bawang. Hal ini dapat membantu mereka mengembangkan program pencegahan dan pengobatan yang lebih baik.
- b. Temuan penelitian ini dapat membantu badan pemerintah, seperti kementerian kesehatan, untuk membuat kebijakan dan tindakan kesehatan yang lebih terfokus.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini menawarkan kesempatan untuk memajukan pemahaman ilmiah mengenai hubungan antara usia, jenis kelamin, pendapatan, kebiasaan merokok, konsumsi kafein, kebiasaan konsumsi natrium dan serat dengan tingkat tekanan darah dalam konteks sampel pekerja pertanian bawang. Hasil dari studi ini dapat digunakan untuk menginformasikan penelitian di masa depan dan menambah literatur akademis.

3. Manfaat Bagi Petani

Penelitian ini secara langsung membantu petani bawang dengan memberikan informasi tentang risiko kesehatan mereka. Dengan kesadaran yang lebih besar akan hubungan antara usia, jenis kelamin, pendapatan, kebiasaan merokok, konsumsi kafein, pola konsumsi

natrium dan serat, serta tekanan darah, petani bawang dapat lebih sadar akan bahaya kesehatan yang mereka hadapi dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat

F. Definisi Operasional

1. Tekanan Darah

Tekanan darah pada penelitian ini ditentukan dengan cara mengukur aliran darah responden yang dipompa oleh sistem kardiovaskular dengan menggunakan alat yang dikenal sebagai *sphygmomanometer*, dan dilakukan oleh peneliti dengan bantuan tenaga kesehatan.

Kriteria Objektif (Kemenkes, 2023):

- a. Rendah : < 90/60 mmHg
- b. Normal : 90/60 mmHg - 139/89 mmHg
- c. Tinggi : \geq 140/90 mmHg

2. Usia

Dalam penelitian ini, usia didefinisikan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam survei, yang dihitung dari tanggal lahir responden hingga waktu pengumpulan data.

Kriteria Objektif (Depkes, 2009):

- a. Dewasa awal : 26-35 tahun
- b. Dewasa akhir : 36-45 tahun
- c. Lansia awal : 46-55 tahun
- d. Lansia akhir : 56-65 tahun

3. Jenis Kelamin

Sifat dan identitas biologis yang ditentukan oleh penampilan luar responden dan apa yang tercantum di kartu identitas mereka.

Kriteria Objektif:

- a. Laki-laki, apabila responden berjenis kelamin laki-laki berdasarkan yang tertera pada KTP responden.
- b. Perempuan, apabila berjenis kelamin perempuan berdasarkan yang tertera pada KTP responden.

4. Pendapatan

Pendapatan dalam penelitian ini mengacu pada gaji atau bayaran yang diperoleh petani yang menanam bawang selama satu bulan kerja.

Kriteria Objektif (Disnaker, 2022):

- a. Pendapatan Rendah : \leq UMR (Rp. 3.294.467)
- b. Pendapatan Tinggi : $>$ UMR (Rp. 3.294.467)

5. Kebiasaan Merokok

kebiasaan merokok digambarkan sebagai praktik menghirup asap atau tembakau secara teratur, yang dapat mempengaruhi tekanan darah di antara para petani bawang.

Kriteria Objektif (Kemenkes, 2023):

- a. Tidak Merokok : Jika tidak pernah merokok
- b. Perokok Ringan : Jika konsumsi rokok 1-10 batang perhari
- c. Perokok Sedang : Jika konsumsi rokok 11 – 20 batang perhari
- d. Perokok Berat : Jika konsumsi rokok \geq 21 batang perhari

6. Konsumsi Kafein (Kopi)

Konsumsi kafein yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu pada tindakan mengonsumsi kafein dalam kopi. Kafein adalah stimulan organik yang dapat meningkatkan kewaspadaan, mengurangi rasa lelah, dan memberikan ledakan energi yang cepat.

Kriteria Objektif (kemenkes, 2022) :

- a. Berisiko : > 3 cangkir / hari
- b. Tidak berisiko : ≤ 3 cangkir (200 miligram)/ hari

7. Pola Konsumsi Natrium

Pola konsumsi natrium dalam penelitian ini menilai seberapa sering seseorang mengonsumsi makanan tinggi natrium, seperti makanan ringan asin, yang berarti makanan ringan atau camilan yang mengandung natrium dalam jumlah tinggi. Dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan *Food Frequent Questionnaire*. (FFQ).

Kriteria Objektif (Sirajuddin, et al 2018):


- a. Rendah : Jika skor jawaban responden $X < 15$
- b. Tinggi : Jika skor jawaban responden $X \geq 15$

8. Pola Konsumsi Serat

Pola konsumsi serat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa sering responden mengonsumsi makanan sumber protein, seperti frekuensi konsumsi buah dan sayur per minggu.

Kriteria Objektif: (Sirajuddin, et al 2018)

- a. Kurang : Jika skor jawaban responden $X < 15$
- b. Cukup : Jika skor jawaban responden $X \geq 15$



G. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Kajian Pustaka Penelitian

No	Nama	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Astri Meidah Setiawati. 2019	Hubungan Asap Rokok Terhadap Terjadinya Hipertensi Pada Ibu Hamil di Desa Brangkal Bojonegoro	Variabel independennya adalah asap rokok dan variable dependennya adalah kejadian hipertensi pada ibu hamil	Rancangan Penelitian Ini Menggunakan Metode Cross Sectional. Data Ini Diperoleh Dari Data Primer Dan Sekunder.	Tidak ada hubungan yang signifikan terhadap asap rokok terjadinya hipertensi pada ibu hamil. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti terdapat suami yang sedang bekerja di luar kota sehingga paparan asap rokok tidak sesering mungkin, adapun faktor suami yang bekerja sebagai buruh tani dan bekerja saat malam hari sehingga jarang berada dirumah. Namun terdapat suami atau kerabat keluarga yang masih dijumpai tinggal di sekitar rumah ibu hamil.
2	John Pastor Anshah, Ryan Leung Hoe Inn, and Salman Ahmad. 2019	An evaluation of the impact of aggressive hypertension, diabetes and smoking cessation management on CVD outcomes at the	variabel independennya adalah hipertensi agresif, diabetes, dan kebiasaan merokok sedangkan variabel dependennya adalah hasil CVD ditingkat populasi	Metodologi pemodelan sistem dinamika sistem digunakan untuk mengembangkan model simulasi untuk mengevaluasi dampak hipertensi agresif, diabetes,	Karena populasi yang menua dan meningkatnya prevalensi penyakit kronis di Singapura, jumlah kejadian CVD di Singapura diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat sehingga

No	Nama	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Kesimpulan
		population level: a dynamic simulation analysis		dan manajemen berhenti merokok terhadap hasil CVD di tingkat populasi.	diperlukan perencanaan yang proaktif untuk menerapkan intervensi yang diperlukan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian CVD serta kematian dan kecacatan yang terkait dapat dikurangi secara signifikan jika pasien diabetes dan hipertensi ditangani secara agresif.
3	Sinta Saadatun Nikmah1, Eram Tunggul Pawenang, 2020	Faktor Kejadian Hipertensi Pada Petani Penyemprot Bunga	Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian hipertensi. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan, masa kerja, jenis pestisida, Teknik penyemprotan, waktu penyemprotan, lama penyemprotan, frekuensi penyemprotan, kelengkapan apd, dan penyimpanan	Jenis Penelitian Ini Adalah Analitik Observasional Dengan Rancangan Pendekatan Cross Sectional. Sampel Dalam Penelitian Ini Adalah 77 Petani Penyemprot Bunga Yang Diambil Menggunakan Teknik Simple Random Sampling.	Faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada petani penyemprot bunga di desa kenteng kecamatan bandungan adalah pengetahuan, masa kerja, jenis pestisida, waktu penyemprotan, dan kelengkapan apd. Sementara faktor yang tidak berhubungan dengan kejadian hipertensi adalah teknik penyemprotan, lama penyemprotan, frekuensi penyemprotan, dan penyimpanan.

No	Nama	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Kesimpulan
4	Raziansyah, Nor Ridha Amalia, Stikes Intan Martapura, Indonesia. 2020	Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura 2	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu gaya hidup dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kejadian hipertensi	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasi dengan populasi adalah seluruh penderita hipertensi berjumlah 613 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan Probability Sampling dengan jumlah sampel 86 orang, dan menggunakan analisis Sperman-Rank	Penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup penderita hipertensi mayoritas adalah berkategori baik sedangkan yang paling sedikit yaitu berkategori buruk sebanyak. Kejadian hipertensi mayoritas adalah berkategori ringan sedangkan yang paling sedikit yaitu berkategori berat. Hasil menunjukkan Adanya hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi dengan nilai $p - value=0,000$ ($\alpha < 0,005$).
5	Putra Apriadi Siregar, Saidah Fatimah Sari Simanjuntak, Feby Harianti Br. Ginting, Sutari Tarigan, Shafira Hanum, Fikha Syra Utami. 2020	Analisis Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Masyarakat Pesisir Kota Medan (Aspek Sosial Budaya Masyarakat Pesisir)	Variable independennya adalah jenis kelamin, usia, genetic, dan pola makan, variable dependennya adalah tekanan darah atau hipertensi. variable kontrolnya adalah IMT, aktivitas fisik, kebiasaan merokok.	Penelitian Ini Dilakukan Menggunakan Desain Observasional Dengan Pendekatan Studi Cross-Sectional	Mayoritas responden yang mengalami hipertensi adalah usia dewasa (25-59 tahun) (31,8%), memiliki imt lebih (38,9%), sering terpapar asap rokok dalam ruangan tertutup (41,4%) dan mayoritas responden hipertensiyang merokok adalah seorang perokok ringan (36%). Mayoritas responden yang mengalami hipertensi jarang mengonsumsi makanan asin, mie instan dan soft drink (1-10

No	Nama	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Kesimpulan
					kali perbulan) yaitu masing-masing sebesar 32,4%; 27,4%; dan 30,9%; serta melakukan aktivitas fisik sedang (20,9%).
6	Sukyong Jung, Mi Kyung Kim, Jinho Shin, Nakyoung Lee, Hye Won Woo, Bo Youl Choi, Min-Ho Shin, Dong Hoon Shin, Young-Hoon Lee. 2020	Positive association of alcohol consumption with incidence of hypertension in adults aged 40 years and over: Use of repeated alcohol consumption measurements	variabel independennya adalah konsumsi alcohol berulang dan variabel dependennya adalah hipertensi.	Penelitian ini melibatkan total 4989 peserta yang tidak mengonsumsi obat antihipertensi dan memiliki tekanan darah (BP). menggunakan tiga ukuran konsumsi alkohol sebagai paparan dan membandingkan ketiga pendekatan tersebut. Dengan menggunakan model regresi Poisson yang dimodifikasi dengan penduga kesalahan yang kuat, peneliti memperkirakan rasio tingkat kejadian (IRR) dan interval kepercayaan (CI) 95% untuk hipertensi.	Temuan ini sebanding dengan bukti sebelumnya mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan tersebut. Dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan diet seumur hidup, ditemukan hubungan positif linier yang signifikan pada semua kategori peminum pria dan hanya pada ≥ 3 minuman/hari pada wanita. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan gender dalam sifat psiko-sosio-kultural, dan perbedaan jenis kelamin dalam variabilitas farmakokinetik alkohol, efek pada sistem transmisi saraf, dan hormon seks
7	Chayakrit Krittanawong, Anirudh Kumar, Zhen Wang, Usman Baber, Deepak L. Bhatt. 2020	Self-employment and cardiovascular risk in the US general population	variabel independennya adalah tekanan darah sistolik dan distolik, usia, jenis kelamin, dan Riwayat keluarga. Sedangkn	Menggunakan Survei Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional (NHANES), kami mengidentifikasi semua pasien dengan	Terdapat hubungan yang signifikan antara wirausaha dan prevalensi risiko kardiovaskular yang lebih tinggi, termasuk DM, HTN, HLD,

No	Nama	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Kesimpulan
			variabel dependennya adalah status hipertensi dan komplikasi kardiovaskuler	hipertensi (HTN), hiperlipidemia (HLD), diabetes mellitus (DM), stroke, gagal jantung (HF), dan penyakit arteri koroner (CAD) antara tahun 1999 dan 2016	HF, stroke, dan CAD, dibandingkan populasi umum AS. Penelitian prospektif lebih lanjut sangat diperlukan untuk menetapkan strategi pencegahan yang optimal untuk mengurangi risiko kardiovaskular pada individu wiraswasta.
8	Zemene Demelash Kifle, Agumas Alemu Alehegn, Meaza Adugna, Biruk Bayleyegn. 2021	Prevalence and predictors of dyslipidemia among hypertensive patients in Lumame Primary Hospital, Amhara, Ethiopia: A cross-sectional study	Variabel independen seperti usia, jenis kelamin, tempat tinggal, riwayat keluarga dengan hipertensi, merokok, minum alkohol, kebiasaan makan buah-buahan, aktivitas fisik, DM, dan BMI sedangkan Variabel dependennya adalah hipertensi	jenis penelitian yang digunakan adalah studi cross-sectional	Prevalensi dislipidemia pada pasien hipertensi cukup tinggi. Variabel independen seperti usia, jenis kelamin, tempat tinggal, riwayat keluarga dengan hipertensi, merokok, minum alkohol, kebiasaan makan buah-buahan, aktivitas fisik, DM, dan BMI merupakan determinan signifikan terjadinya dislipidemia.
9	Liliane R. Teixeira, Frank Pega, Malaikat M. Dzhambov, Alicja Bortkiewis, Denise T. Correa da Silva, Carlos A.F. oleh Andrade,	The effect of occupational exposure to noise on ischaemic heart disease, stroke and hypertension: A systematic review and	variabel independennya adalah tingkat paparan kebisingan, durasi paparan kebisingan. Sedangkan variabel dependennya adalah	jenis penelitian yang digunakan adalah studi acak, observasional dan/atau simulasi	hubungan positif diamati antara paparan dan hasil dimana peluang, bias, dan perancu tidak dapat dikesampingkan dengan keyakinan yang masuk akal. Saat ini, perkiraan beban

No	Nama	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Kesimpulan
	Elzbieta Gadzicka, Kishor Hadkhale, Sergio Iavicoli, Martha S. Martínez-Silveira, Bułgorzata pawlaczyk-Łuszczynska, Bruna M. Rondinone, Jadwiga Siedlecka, Antonio Valenti, Diana Gagliardi. 2021	meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-Related Burden of Disease and Injury	kejadian risiko penyakit jantung iskemik dan kejadian risiko hipertensi		penyakit kardiovaskular akibat paparan kebisingan di tempat kerja tampaknya belum berdasarkan bukti. kardiovaskular (CVD) yang disebabkan oleh paparan kebisingan di tempat kerja, jika memungkinkan, sebagai salah satu pasangan faktor risiko-hasil tambahan yang diprioritaskan.
10	Fiola Salsabila Irwanto, Dita Hasni, Debie Anggraini, Budi Yulhasfi Febrianto. 2023	Hubungan Pola Konsumsi Lemak Dan Sodium Terhadap Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Perempuan Etnis Minangkabau	Variabel independent dalam penelitian ini adalah pola konsumsi lemak dan sodium, variabel dependennya adalah hipertensi	Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Analitik Observasional Dan Menggunakan Desain Penelitian Case Control.	Terdapat hubungan konsumsi lemak dengan tekanan darah pada pasien hipertensi perempuan etnis minangkabau. Sedangkan hasil uji statistik untuk hubungan konsumsi sodium dengan tekanan darah pada pasien hipertensi perempuan etnis minangkabau diperoleh nilai p value sebesar 0,999. Artinya tidak terdapat hubungan konsumsi asupan sodium dengan tekanan darah pada pasien hipertensi perempuan etnis minangkabau

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Definisi Tekanan Darah

Menurut (Kowalski, 2010), tekanan darah adalah tekanan di mana darah mengalir melalui arteri. Tekanan darah adalah elemen penting dalam sistem peredaran darah. Tekanan darah adalah elemen yang sangat penting dalam fungsi sistem peredaran darah. Tidak semua tekanan darah berada dalam kisaran normal, sehingga mengakibatkan gangguan tekanan darah seperti hipertensi (tekanan darah tinggi) dan hipotensi (tekanan darah rendah) (Fadillah S et al., 2020).

Tekanan dalam aliran darah adalah jumlah kekuatan yang diterapkan oleh darah pada lapisan terdalam arteri saat darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh. Tekanan darah dapat berfluktuasi secara dramatis dalam hitungan detik. Perubahan tekanan darah dapat menyebabkan pusing, migrain, kekakuan leher, dan sakit kepala. Tentunya, hal ini mengganggu kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Perubahan tekanan darah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: tinggi (hipertensi) dan rendah (hipotensi) (Sasmalinda L et al., 2019).

1. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)

Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2013, Hipertensi dapat digambarkan sebagai suatu kejadian di mana tekanan darah maksimum selama latihan melebihi 140 mmHg dan tekanan darah sistolik melebihi 90 mmHg dalam dua kali pengukuran berturut-turut

yang dilakukan dalam beberapa menit dalam kondisi yang sesuai, berbaring, atau tenang. Jika tekanan darah tinggi berlanjut dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat mencederai organ-organ penting seperti ginjal, jantung, dan otak. Oleh karena itu, deteksi dini dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk menghindari konsekuensi kesehatan yang tidak menguntungkan ini (Rejo & Nurhayati, 2020)

Hipertensi diklasifikasikan menjadi dua jenis dalam patofisiologi:

a. Hipertensi Essensial (Primer)

Etiologinya tidak diketahui, meskipun dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk faktor keturunan, lingkungan, hiperaktivitas, sistem saraf simpatis, sistem renin-angiotensin, efek sekresi Na, obesitas, merokok, dan stres. Penyebab hipertensi primer belum ditemukan.

b. Hipertensi Sekunder

Hipertensi sekunder disebabkan oleh adanya penyakit atau kondisi tambahan, seperti kelainan ginjal, penyempitan pembuluh darah, terutama pada ginjal, keganasan tertentu, atau masalah hormonal. Penyakit-penyakit ini membatasi gerakan darah, menyebabkan jantung beraktivitas berlebihan, maka dari itu mengakibatkan tekanan darah lebih tinggi. Saat ini, lebih dari

90% dari semua kasus hipertensi diklasifikasikan sebagai hipertensi sekunder (Hidayat, 2021).

Sebagaimana dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisā' [4]:32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahannya:

"Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu" (Kemenag RI, 2024)

Menurut tafsir kemenag dalam surah ini adalah namun sering terjadi dalam kehidupan bahwa angan-angan untuk memperoleh sesuatu sebagaimana dimiliki orang lain bisa mendorong seseorang melakukan pelanggaran. Ayat ini berpesan agar menghindari kebiasaan berangan-angan yang menimbulkan sifat iri dan dengki kepada sesama. Dan janganlah kamu berangan-angan yang membuat kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, baik karunia itu berupa kecerdasan, kemuliaan, nama baik, pangkat, dan jabatan, maupun dalam bentuk harta benda serta kekayaan yang berlimpah. Karena

bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan sesuai pula dengan apa yang mereka usahakan, dan begitu pula bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan sesuai petunjuk Allah dan apa yang mereka usahakan. Oleh sebab itu, janganlah berangan-angan yang menyebabkan iri hati. Mohonlah kepada Allah dengan tulus agar kamu dianugerahi-Nya sebagian dari karunia-Nya yang berlimpah ruah itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu termasuk angan-angan dan iri serta kedengkian yang tersembunyi dalam hati kamu.

Iri hati merupakan salah satu jenis penyakit jantung yang jika berlangsung lama atau sering terjadi, menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk mengedarkan darah dalam jumlah yang relatif banyak, sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat atau disebut juga dengan hipertensi. Hal ini tentu saja ditimbulkan oleh pikiran manusia yang tidak senang melihat orang lain bergembira, sehingga memunculkan istilah penyakit hati, yang nantinya akan menjadi beban bagi umat manusia dan niscaya akan menimbulkan berbagai macam penyakit akibat pikiran dan perasaan yang kacau.

2. Tekanan Darah Rendah (Hipotensi)

Selain hipertensi ada pula gangguan tekanan darah rendah atau yang sering disebut dengan hipotensi. Seperti yang dinyatakan oleh Roman (2011), prevalensi hipotensi secara keseluruhan berkisar

antara 5% hingga 34%, dan cenderung meningkat antara usia 17 dan 19 tahun. Lebih dari separuh insiden hipotensi terjadi pada lansia yang mengunjungi klinik geriatri, dirawat di rumah sakit, atau tinggal di panti jompo. Di Amerika Serikat, prevalensi tahunan telah dihitung menjadi 36 per 100.000 orang dewasa, meningkat menjadi 233 per 100.000 pada mereka yang berusia 75 tahun ke atas.

Selain berkontribusi terhadap masalah tekanan darah arteri yang disebabkan oleh hipertensi, hipotensi juga dapat berbahaya. Hipotensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik <90 mmHg atau tekanan diastolik <60 mmHg. Gejalanya dapat berupa pusing, lemas, kelelahan, sakit kepala sedang, sesak nafas, nyeri dada, detak jantung tidak teratur, muntah dan mual, dehidrasi ekstrem, merasa kebingungan dan berkeringat, pandangan kabur, kebingungan, dan kesulitan untuk memperhatikan, yang menyebabkan pingsan (Fadillah S et al., 2020).

B. Klasifikasi Tekanan Darah

1. Klasifikasi Hipertensi

Hipertensi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu sistolik, diastolik, dan campuran. Hipertensi sistolik, juga dikenal dengan istilah hipertensi sistolik terisolasi, adalah suatu kondisi yang ditandai dengan lonjakan tekanan sistolik tetapi tidak ada peningkatan tekanan diastolik. Kondisi ini paling banyak terjadi pada orang tua. Tekanan sistolik mengacu pada tekanan tinggi dalam arteri ketika jantung

berkontraksi (detak jantung). Hal ini muncul dalam pengukuran tekanan arteri sebagai nilai ambang batas maksimal yang lebih tinggi. Hipertensi diastolik, juga disebut hipertensi diastolik, didefinisikan sebagai lonjakan tekanan diastolik meskipun tidak ada peningkatan tekanan sistolik. Gangguan ini sangat lazim terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Hal ini terjadi ketika pembuluh darah kecil berkontraksi secara tidak normal, sehingga meningkatkan resistensi peredaran darah dan tekanan darah sistolik. Tekanan darah diastolik berhubungan dengan tekanan arteri ketika jantung beristirahat di antara denyut nadi. Pada saat itu, hipertensi campuran didefinisikan sebagai peningkatan tekanan sistolik dan diastolik (Lukitaningtyas & Cahyono, 2023).

Menurut Hastuti (2020), hipertensi dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan gejalanya, yaitu hipertensi jinak dan hipertensi ganas. Hipertensi jinak digambarkan sebagai hipertensi yang tidak menimbulkan keluhan dan biasanya ditemukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin. Hipertensi ganas, di sisi lain, adalah penyakit hipertensi yang sangat berbahaya dan sering dikaitkan dengan situasi darurat karena gangguan pada organ-organ penting seperti otak, jantung, dan ginjal.

Menurut berbagai pedoman, klasifikasi hipertensi dibagi menjadi:

a. Klasifikasi Joint National Committee 7

Komite eksekutif Program Pendidikan Tekanan Darah Tinggi Nasional, yang terdiri dari 46 profesional, sukarelawan, dan lembaga federal, mengusulkan kategorisasi JNC (*Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure*), yang ditunjukkan pada tabel. Pengelompokan ini diperiksa oleh 33 ahli hipertensi nasional dari Amerika Serikat.

Tabel 2.1 Klasifikasi Tekanan Darah

Klasifikasi Tekanan Darah	Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Tekanan Darah Diastolik (mmHg)
Normal	<120	<80
Prahipertensi	120-139	80-89
Hipertensi Stage 1	140-159	90-99
Hipertensi Stage 2	> 160	> 100
Hipertensi Sistolik Terisolasi	>140	<90

Sumber: (Rejo & Nurhayati, 2020).

Peningkatan kejadian hipertensi yang terus berlanjut dan sering kali sulit dikendalikan mendorong *American College of Cardiology (ACC)*, *American Heart Association (AHA)*, dan sembilan organisasi lainnya untuk mengklasifikasikan ulang hipertensi berdasarkan ukuran tekanan darah sistolik dan diastolik. Modifikasi tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Klasifikasi Tekanan Darah

Klasifikasi Tekanan Darah	Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Tekanan Darah Diastolik (mmHg)
Normal	<120	<80
Prahipertensi	120-129	<80
Hipertensi Stage 1	130-139	80-89
Hipertensi Stage 2	> 139	> 89

Sumber: (Rejo & Nurhayati, 2020).

b. Klasifikasi menurut WHO (*World Health Organization*)

WHO dan *International Society of Hypertension Working Group* (ISHWG) telah mengelompokkan kategori hipertensi ke enam tingkatan: optimal, normal, tinggi-normal, hipertensi ringan, hipertensi sedang, dan hipertensi berat. Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) lebih memilih kategorisasi WHO/ISH karena memiliki cakupan yang lebih luas.

Tabel 2.3 Klasifikasi Tekanan Darah

Klasifikasi	Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Tekanan Darah Diastolik (mmHg)
Optimal	<120	<80
Normal	<130	<85
Normal-Tinggi	130-139	85-89
Tingkat 1 (Hipertensi ringan)	140-159	90-99

Klasifikasi	Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Tekanan Darah Diastolik (mmHg)
Sub-group	140-149	90-94
Tingkat 2 (hipertensi sedang)	16-179	100-109
Tingkat 3 (hipertensi berat)	180 atau > 180	110 atau >110
Hipertensi systole terisolasi (isolated systolic hypertension)	140 atau > 140	<90
Sub-group: perbatasan	140-149	<90

Sumber: (Rejo & Nurhayati, 2020.)

2. Klasifikasi Hipotensi

Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi banyak penyebab tekanan darah rendah, termasuk:

a. Hipotensi Ortostatik

Hipotensi ortostatik adalah krisis tekanan darah rendah yang terjadi ketika seseorang tiba-tiba bangkit dari posisi duduk, berjongkok, atau tidur. Selama beberapa detik setelah berganti posisi, seseorang mungkin merasa pusing atau berkunang-kunang. Penyakit ini sangat sering terjadi pada orang tua, melainkan mampu menyerang usia kanak-kanak hingga dewasa.

b. Hipotensi Postprandial

Hipotensi postprandial adalah penurunan tekanan darah yang terjadi dalam waktu 1-2 jam setelah makan. Gejalanya

mungkin mirip dengan hipotensi ortostatik. Hipotensi postprandial dihipotesiskan terjadi ketika darah ekstra bergerak menuju saluran pencernaan buat membantu penyerapan sesudah mengonsumsi sesuatu. Situasi ini jarang dirasakan oleh orang dewasa, namun sangat lazim terjadi pada orang tua.

c. Hipotensi Vasovagal

Hipotensi vasovagal merupakan serangan hipotensi di mana sistem neuron mendorong pembuluh darah agar mengurangi *blood pressure*. Usia remaja dan balita berpeluang menderita hipotensi jenis ini. Tanda-tandanya dapat berupa keringat dingin, disorientasi, gangguan penglihatan, dan pingsan. Hipotensi vasovagal mampu berlangsung apabila manusia berdiri dalam periode yang lama, seperti pada upacara atau saat bekerja.

d. Hipotensi Akut

Ini adalah kejadian tekanan darah rendah yang cepat, yang dapat disebabkan oleh syok. Kondisi ini adalah jenis penurunan hipertensi yang paling serius. Ketika seseorang mengalami syok, tekanan darahnya menurun secara dramatis, dan otak serta organ-organ vital lainnya tidak dapat memperoleh sirkulasi yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Syok dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk dehidrasi ekstrem, pendarahan hebat, atau infeksi (Kemenkes, 2022).

C. Gejala Tekanan Darah

1. Gejala Hipertensi

Kebanyakan orang yang hipertensi tidak sadar bahwa mereka terkena hipertensi karena penyakit hipertensi terkadang tidak memiliki gejala maka dari itu hipertensi biasa disebut dengan "*silent killer*". Untuk hal tersebut maka sangat penting dilakukan pengecekan tekanan darah. Kondisi ini adalah jenis penurunan arteri yang paling serius. Ketika seseorang mengalami tekanan darah tinggi, detak jantungnya turun drastis, dan otak serta berbagai organ lainnya tidak mendapatkan aliran darah yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tekanan darah tinggi dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk dehidrasi ekstrem, pendarahan hebat, atau infeksi (WHO, 2023).

2. Gejala Hipotensi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa gejala hipotensi dapat meliputi:

- a. Pusing dan Kepala Terasa Ringan: Penurunan tekanan darah secara tiba-tiba dapat menyebabkan pusing atau merasa pusing.
- b. Pingsan: Tekanan darah rendah dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau pingsan.
- c. Penglihatan Kabur: Pasokan darah yang tidak mencukupi ke mata dapat menyebabkan penglihatan kabur.

- d. Mual: Berkurangnya suplai darah ke organ pencernaan dapat menyebabkan mual.
- e. Hipotensi dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan.
- f. Pasokan darah yang tidak memadai ke otak dapat menyebabkan kesulitan berkonsentrasi dan berpikir secara efektif.

Jika tidak ditangani dengan benar, hipotensi dapat menjadi kondisi yang berbahaya, terutama jika gejalanya parah atau muncul secara tidak terduga (Kemenkes, 2022).

D. Patofisiologi Tekanan Darah

1. Hipertensi

Pusat vasomotor di medula otak mengontrol penyempitan dan relaksasi pembuluh darah, yang merupakan tempat asal hipertensi. Pusat vasomotor dirangsang oleh impuls yang menjalar ke saraf simpatis dan masuk ke ganglia simpatis. Neuron preganglia simpatis mengeluarkan asetilkolin, yang merangsang serabut saraf ke sirkulasi dan melepaskan norepinefrin, yang mengakibatkan vasokonstriksi. Subjek dengan hipertensi sangat rentan terhadap norepinefrin, yang menyebabkan saraf simpatis menstimulasi pembuluh darah. Jika hal ini terjadi, kelenjar adrenal akan diaktifkan, yang mengakibatkan vasokonstriksi (Miciko Umeda, 2020).

Vasokonstriksi menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal, yang menyebabkan pelepasan renin. Hipertensi juga dapat muncul

sebagai akibat dari penyakit penyerta seperti gagal ginjal, karena nefropati hipertensi adalah suatu jenis gangguan fungsi ginjal yang disebabkan oleh peningkatan tekanan darah yang berkepanjangan (Donatila Mano S et al., 2023).

2. Hipotensi

Menurut (Christopher dan Jeffrey, 2007), hipotensi yang disebabkan oleh analgesia epidural pasca operasi kemungkinan besar disebabkan oleh pemblokiran simpatis yang dihasilkan oleh anestesi lokal, yang terutama menghasilkan resistensi vaskular sistemik yang lebih rendah. Pemasangan kateter epidural lumbal seharusnya menghasilkan hipotensi yang lebih rendah daripada pemasangan kateter toraks, karena blok simpatis toraks yang tinggi dapat merusak mekanisme kompensasi jantung yang normal (peningkatan denyut jantung).

E. Faktor-Faktor Risiko

1. Hipertensi

Hipertensi, yang sering dikenal sebagai tekanan darah tinggi, dihasilkan oleh interaksi yang kompleks dari berbagai elemen yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: faktor inang, agen penyebab, dan lingkungan (fisik dan sosial). Penyebab hipertensi dapat dibagi menjadi dua kategori: variabel yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga, dan faktor yang dapat diubah seperti kebiasaan merokok dan diet tinggi kolesterol, serta kebiasaan

merokok, pola perilaku, dan kebiasaan minum alkohol, semuanya berkontribusi terhadap perkembangan hipertensi. Merokok, misalnya, dapat meningkatkan tekanan darah dengan menyebabkan nikotin merangsang pelepasan norepinefrin dari terminal saraf adrenergik. Orang yang merokok lebih dari satu bungkus per hari dua kali lebih mungkin untuk mengembangkan hipertensi dibandingkan non-perokok (Tumanduk et al., 2019)

Dua penyebab utama hipertensi adalah faktor genetik atau keturunan dan gaya hidup. Meskipun genetika tidak dapat diubah, namun kebiasaan gaya hidup yang baik dapat diubah. Gaya hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan hipertensi. Kebiasaan gaya hidup yang buruk termasuk kurangnya aktivitas fisik, konsumsi makanan tinggi lemak dan garam secara berlebihan, minum minuman berkafein, merokok, dan stres (Raziansyah & Amalia, 2022).

1) Faktor Risiko yang tidak dapat diubah

a. Usia

Usia adalah salah satu elemen yang mempengaruhi tekanan darah, terutama dalam kasus hipertensi. Tekanan darah tinggi (hipertensi) lebih mungkin terjadi seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Kejadian hipertensi pada lansia terkait dengan penurunan regangan sistolik longitudinal atrium.

Hal ini menyebabkan hilangnya kelenturan atrium, sehingga menjadi kaku, yang mengakibatkan darah diperas melalui arteri

darah yang lebih sempit dari biasanya pada setiap detak jantung, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan tekanan darah.

Peningkatan tekanan darah yang terkait dengan usia kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan pembuluh darah. Penuaan menyebabkan penyempitan lumen pembuluh darah dan pengerasan dinding pembuluh darah, suatu kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis. Aterosklerosis menyebabkan modifikasi struktur, seperti peningkatan kalsifikasi pembuluh darah, yang menghasilkan gelombang tekanan yang sebelumnya dipantulkan selama perjalanan gelombang tekanan darah (Yunus et al., 2021).

b. Jenis Kelamin

Jenis kelamin juga mempengaruhi tekanan darah. Secara umum, diasumsikan bahwa pria lebih rentan terkena hipertensi. Berbeda dengan pria, yang cenderung memiliki profil imun pro-inflamasi yang meningkat, wanita mungkin memiliki profil imun antiinflamasi yang lebih kuat yang bertindak sebagai bentuk kompensasi untuk membatasi peningkatan tekanan darah. Meskipun demikian, menurut data Riset Kesehatan Dasar 2018, pada usia 65 tahun ke atas, prevalensi hipertensi pada wanita adalah 28,8, lebih besar dari prevalensi hipertensi pada pria (22,8) (Yunus et al., 2021).

c. Riwayat keluarga

Riwayat hipertensi dalam keluarga, termasuk ayah, ibu, kakek, dan nenek, merupakan faktor risiko yang tidak dapat diubah untuk terkena hipertensi. Namun, risiko ini dapat dikurangi dengan menjalani gaya hidup sehat, yang meliputi konsumsi makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik yang sesuai, menghindari stres, dan tindakan lainnya (Yusmaniar & Safitri, 2022).

2. Faktor Risiko yang dapat diubah:

a. Pola Konsumsi Makanan

Pilihan diet merupakan kontributor utama terhadap risiko pengelolaan hipertensi. Pola makan yang kaya akan daging merah dan produk hewani, garam, makanan cepat saji, lemak, dan makanan manis sebagai pencuci mulut dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi.

Jenis makanan yang dikonsumsi dan tekanan darah sistolik responden terbukti berkorelasi secara signifikan.

Makanan yang berpengaruh terhadap tekanan darah sistolik termasuk karbohidrat C (kaya natrium dan lemak), lauk hewani A (tinggi natrium), lauk hewani C (tinggi natrium dan lemak), dan penyedap makanan. Sementara itu, dalam hal tekanan darah diastolik, kelompok makanan yang paling penting adalah

karbohidrat C (kaya natrium dan lemak), produk susu, dan penyedap makanan (Manik et al., 2020).

Salah satu teknik untuk menyembuhkan hipertensi tanpa efek samping yang besar adalah dengan melakukan diet atau mengubah pola makan, karena pengendalian pola makan lebih bersifat organik dibandingkan dengan obat-obatan penurun tekanan darah, yang harus selalu dikonsumsi. Jenis dan jumlah makanan merupakan faktor yang mempengaruhi pilihan makanan penderita hipertensi. Makanan yang dimaksud adalah makanan pokok seperti sayuran, nasi, buah, dan lauk pauk susu (Simamora et al., 2020).

a) Asupan natrium

Konsumsi natrium dalam jumlah sedang dapat memengaruhi retensi air, resistensi sistem perifer, aktivitas simpatis, dan saraf otonom dalam sistem kardiovaskular, yang mendatangkan hipertensi (Grillo et al., 2019).

Tabel 2.4 Ketentuan konsumsi garam

Hipertensi	Tekanan darah sistol	Tekanan darah diastole	Dosis garam
Ringan	140-159	90-99	¼ sendok teh perhari
Sedang	160-179 mmhg	¼ sendok the	¼ sendok teh perhari
Berat	≥ 180 mmhg	≥110 mmhg	Tanpa garam

Sumber: Modul hipertensi, Fakultas ilmu keperawatan (Miciko Umeda, 2020)

Tabel 2.5 Kebutuhan Asupan Natrium per Hari menurut AKG

Umur	Laki-laki	Perempuan
50-64 tahun	1300 mg	1400 mg
60-80 tahun	1100 mg	1200 mg

Sumber: *Jurnal of nutrition collage 2015* dalam jurnal (Pradipta, 2015)

Tabel 2.6 Klasifikasi Tingkat Asupan Natrium

Kategori	Presentase
Kurang	< 80%
Cukup	80% - 110%
Lebih	>110%

Sumber: *Jurnal of nutrition collage 2015* dalam jurnal (Pradipta, 2015)

b) Kebiasaan makan buah dan sayur

Kebiasaan makan makanan yang kurang buah dan sayur dapat menyebabkan hipertensi. Jika mengalami hipertensi sebaiknya mengatur pola makan dengan makan buah dan sayur.

Buah-buahan di konsumsi sebanyak 5 porsi (400-500 gram) dan sayuran per hari di konsumsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak (Kemenkes, 2022). Perubahan gaya hidup dapat membantu untuk mencegah dan menurunkan tekanan darah tinggi yaitu, dengan makan lebih banyak sayuran dan buah-buahan (WHO, 2023).

c) Indeks Massa Tubuh (IMT)

Obesitas dan BMI abnormal lainnya merupakan faktor risiko hipertensi. Obesitas terjadi ketika jumlah lemak dalam jaringan adiposa melampaui batas normal. Obesitas dianggap sebagai salah satu faktor risiko untuk mengembangkan hipertensi, karena kapasitas pemompaan jantung harus meningkat untuk menangani volume darah yang lebih besar daripada orang dengan Indeks Massa Tubuh (BMI) yang normal (Abineno et al., 2022).

d) Kebiasaan merokok

Merokok adalah salah satu penyebab utama hipertensi, dengan tembakau sebagai kontributor utama. Merokok merupakan masalah sosial dengan konsekuensi kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merugikan baik bagi perokok maupun bukan perokok, dan merupakan salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nikotin dalam rokok dapat meningkatkan tekanan darah melalui berbagai mekanisme, seperti timbulnya plak aterosklerosis, pengaruh langsung nikotin terhadap pelepasan hormon epinefrin dan norepinefrin, dan peran karbon monoksida (CO) dalam meningkatkan jumlah sel darah merah. Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci, diperlukan

pembacaan yang menyeluruh terhadap makalah-makalah pendukung (Rahmatika, 2020).

Merokok menimbulkan risiko kesehatan yang melibatkan gangguan jantung, pembuluh darah, kanker mulut, hipertensi, dan bronkitis. Selain itu, merokok memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang merugikan, mempengaruhi perokok pasif dan mengakibatkan pengeluaran keuangan yang besar (Alam et al., 2024).

Rokok dapat meningkatkan tekanan darah karena rokok mengandung senyawa berbahaya seperti nikotin dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan hipertensi. Kehadiran nikotin dalam rokok menyebabkan lonjakan tekanan darah; namun, peningkatan ini tidak langsung terasa setelah merokok. Hal ini ditentukan oleh frekuensi dan volume merokok seseorang, serta gaya hidup mereka secara keseluruhan.

e) Konsumsi Kafein

Kopi mengandung salah satu bentuk kafein yang paling pekat, yang merupakan kontributor utama hipertensi. Kafein dapat mengencangkan pembuluh darah, meningkatkan denyut nadi dan kecepatan tekanan darah. Kafein dapat meningkatkan kadar plasma berbagai hormon yang mengatur stres, terutama adrenalin, norepinefrin, dan kortisol, yang menyebabkan

peningkatan risiko kardiovaskular yang bervariasi sesuai dengan intensitas kopi dan kecenderungan tertentu.

Kopi hitam mengandung lebih banyak kafein daripada kopi biasa, oleh karena itu peningkatan tekanan darah yang disebabkan oleh konsumsi kopi hitam yang lebih besar diduga disebabkan oleh kafein. Kopi hitam adalah jenis kopi yang diperoleh segera sebelum dicampur, sehingga menghasilkan jumlah kafein yang lebih besar dibandingkan dengan kopi lainnya. Dampak buruk kafein terhadap tekanan darah telah dijelaskan dalam berbagai jurnal, yang terdiri dari peningkatan aktivitas saraf simpatis, antagonisme reseptor adenosin, peningkatan pelepasan norepinefrin melalui aksi medula adrenal langsung, dan stimulasi sistem renin-angiotensin.

Kopi mengandung zat pengubah tekanan sirkulasi seperti asam klorogenat dan kafein, yang merupakan komponen utama. Kafein mencapai tubuh manusia dengan struktur seperti adenosin dan menempel pada reseptor adenosin, mencegah membran sel mengikat adenosin. Hal ini menjaga otak dari kerusakan dengan mengurangi aktivitas saraf simpatik dan meningkatkan sirkulasi ke otot dan jantung. Kafein berikatan dengan reseptor adenosin pada sel saraf, merangsang sintesis adrenalin dan menyebabkan osilasi tekanan arteri. Berdasarkan hipotesis dan paparan kesulitan yang diuraikan di atas, tujuan

dari penyelidikan ini adalah untuk membangun hubungan antara pemberian kopi hitam dan tekanan darah pada perokok dewasa.

2. Hipotensi

Hipotensi, atau tekanan darah rendah, sering kali disebabkan oleh berbagai keadaan. Berikut ini adalah beberapa faktor risiko utama yang dapat menyebabkan hipotensi:

- a. Risiko hipotensi meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Seiring dengan bertambahnya usia, sistem pengatur tekanan darah kita menjadi kurang efisien.
- b. Dehidrasi: Kekurangan cairan dalam tubuh dapat mengurangi volume darah dan menyebabkan hipotensi.
- c. Faktor keturunan: Memiliki riwayat hipotensi dalam keluarga dapat meningkatkan kemungkinan terkena penyakit ini.
- d. Kehamilan: Tekanan darah biasanya menurun selama trimester pertama dan kedua.
- e. Penyakit jantung: Hipotensi dapat disebabkan oleh kelainan jantung seperti bradikardia, gagal jantung, atau masalah katup.
- f. Infeksi Berat (Sepsis): Infeksi sistemik dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan.
- g. Hipotensi Ortostatik: Beralih dari duduk atau berbaring ke berdiri dapat menyebabkan penurunan denyut jantung yang cukup besar bagi sebagian orang.

- h. Efek Samping Obat: Obat-obatan tertentu, termasuk diuretik, obat antihipertensi, dan antidepresan, dapat menyebabkan penurunan tekanan darah (Kemenkes, 2022).

F. Pencegahan dan Manajemen Faktor Risiko Hipertensi

1. Tekanan darah tinggi (Hipertensi)

a. Pencegahan

- 1) Batasi asupan garam kurang dari 5 gram per hari.
- 2) Meningkatkan asupan buah dan sayuran.
- 3) Melakukan aktivitas fisik secara teratur.
- 4) Hindari perilaku merokok.
- 5) Kurangi konsumsi alkohol.
- 6) Batasi konsumsi lemak jenuh.
- 7) Kurangi lemak trans dalam makanan.

Manajemen faktor resiko hipertensi

- 1) Manajemen stres
- 2) Pemantauan tekanan darah secara teratur
- 3) Obat untuk tekanan darah tinggi
- 4) Mengelola masalah medis lainnya (WHO, 2023).

2. Tekanan darah rendah (Hipotensi)

Hipotensi sering kali dapat diobati dengan cara-cara berikut ini:

- a) Tetap terhidrasi dengan minum banyak air.
- b) Makanlah makanan yang bergizi, terutama makanan yang tinggi garam atau natrium.

- c) Hindari perubahan postur tubuh yang cepat dan berdiri dalam waktu lama.
- d) Batasi konsumsi minuman beralkohol.
- e) Konsumsilah sedikit minuman stimulan pilihan Anda sedini mungkin di pagi hari.
- f) Gunakan stoking khusus untuk meningkatkan kesehatan peredaran darah.
- g) Berolahragalah sekitar 30 menit setiap hari, atau 150 menit setiap minggu (Kemenkes, 2022).

G. Pengobatan Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)

Hipertensi ditangani secara holistik, yang mencakup perubahan gaya hidup dan juga obat-obatan. Berikut ini adalah poin-poin penting terkait pengobatan hipertensi:

- a. Penyesuaian gaya hidup termasuk mengurangi asupan garam, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan yang sehat, dan menghindari konsumsi alkohol yang berlebihan.
- b. Obat-obatan,
 - 1) Diuretik, seperti pil *Hydrochlorothiazide* (HCT) dan Lasix (Furosemide), membantu membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh. Termasuk dalam golongan obat hipertensi yang menyebabkan pengeluaran cairan tubuh melalui urin. Namun, karena kehilangan kalium dalam urin mungkin terjadi, asupan kalium harus dibatasi.

2) Beta-blockers (Atenolol (Tenorim), capoten (captopril)

Mengurangi tekanan darah dengan menurunkan denyut jantung. Tekanan darah dikontrol oleh obat ini, yang memperlambat kerja jantung dan melebarkan pembuluh darah.

3) ACE Inhibitor: Merelaksasi pembuluh darah

Obat yang sering digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi. Obat ini bekerja dengan cara menenangkan pembuluh darah, yang membantu memperbesarnya.

4) Obat-obatan tambahan berdasarkan kesehatan dan kebutuhan penerima.

5) Mengobati hipertensi pada orang dewasa yang lebih tua dapat menjadi tantangan karena ada peningkatan ketergantungan pada obat-obatan.

Untuk mengatasi peningkatan tekanan darah yang terus-menerus dan menghindari konsekuensi yang ditimbulkannya, manajemen perawatan diri yang baik diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi (Mariyani et al., 2021)

Pengobatan modern untuk hipertensi meliputi modifikasi gaya hidup seperti diet bergizi, olahraga, dan manajemen stres, yang semuanya sesuai dengan ajaran Al-Quran tentang menjaga kesehatan jiwa dan raga. Pengobatan hipertensi tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran, namun ada berbagai prinsip kesehatan

yang dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit tersebut.

Seperti yang dinyatakan dalam QS, ayat 1-7 dari Al-Fatihah berbunyi:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ

﴿٤﴾ أَيَّامِكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾

﴿٧﴾ الصِّرَاطَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هُوَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Terjemahannya:

“Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan.” (Kemenag RI, 2024)

Allah SWT adalah Tuhan semesta alam, yang berarti bahwa dialah yang memberi dan mengambil penyakit yang dipercayakan kepada manusia, dan hanya kepadaNya lah kita memohon pertolongan dalam bentuk kehidupan, penyembuhan, pembasmian penyakit, dan sebagainya. Surat Al-Fatihah memiliki tempat yang sangat unik dalam Islam. Banyak ulama yang telah mengakui khasiatnya sebagai obat segala penyakit, baik jasmani maupun rohani, yang dibuktikan dengan berbagai kisah nyata. Membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan keimanan dianggap dapat memberikan kesembuhan dan ketenangan pikiran. Ketika Al-Fatihah digunakan sebagai obat, Basmalah mengacu pada ayat berikut. Sebagai hasilnya, Surat Al-Fatihah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari umat Islam ketika mereka mencari berkah dan kesehatan yang baik,

salah satu kualitas Surat Al-Fatihah adalah kemampuannya untuk menyembuhkan semua penyakit.

Ad-Darimi mendengar dari Abu Sa'id secara marfu bahwa Al-Fatihah adalah penawar segala racun. Riwayat ini termuat dalam Tafsir Ibnu Katsir:

“Fatihatul Kitab (surah Al-Fatihah) merupakan obat penawar bagi segala jenis racun.” Karena itu, surah Al-Fatihah juga disebut dengan Syifa.

Menurut Nahdatul Ulama, Al-Hasan al-Bashri menyatakan bahwa Allah SWT menempatkan semua pengetahuan dari kitab-kitab sebelumnya di dalam Al-Qur'an, dan hadis menyebutkan bahwa Al-Fatihah memiliki kemampuan penyembuhan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabatnya menggunakan Surat Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit dan berhasil. Ini adalah kutipan dari Nabi SAW, yang menyatakan bahwa Fatihatul kitab memiliki obat untuk semua penyakit. Kepercayaan terhadap Al-Fatihah sebagai obat untuk semua penyakit merupakan bagian dari sistem kepercayaan Islam, yang menekankan pada kekuatan doa dan pengabdian kepada Allah.

Selain itu, dalam QS: Al-Isra' ayat 82 juga disebutkan:

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْزُقُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya:

“ Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.” (Kemenag RI, 2024)


Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut berarti bahwa Allah swt. membahas tentang kitab yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw. yaitu Al-Qur'an, yang tidak ada kebohongan di dalamnya, dibandingkan dengan pintu masuk dan belakang, yang diungkapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Al-Qur'an menyembuhkan penyakit-penyakit hati, seperti keraguan, kemunafikan, kemusyrikan, dan penyimpangan dari jalan yang benar, menjadikannya sumber rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an membangun keimanan, memberikan kebijaksanaan, mempromosikan kebaikan, dan menumbuhkan kecintaan terhadapnya. Untuk mendapatkan semua itu, seseorang harus percaya, membenarkan, dan menaati petunjuk Al-Qur'an. Al-Qur'an akan menjadi sumber kesembuhan dan rahmat baginya.

Dalam QS: Al-Isra', ayat 82 menegaskan bahwa ada pengobatan untuk setiap penyakit. Hal ini menyiratkan bahwa jika seseorang ingin mencari obatnya, mereka pasti akan menemukannya. Dalam hadits lain, Nabi menegaskan pentingnya ilmu kedokteran, meneliti, dan mencari obat. Hadis ini meminta Anda untuk melakukan penelitian medis, seperti yang dinyatakan dalam sabdanya. Lebih lanjut, Nabi menekankan bahwa obat itu ada, tetapi membutuhkan orang-orang yang mencarinya dan serius dalam melakukan studi dan menemukannya. Kedokteran adalah sebuah peradaban yang bertujuan untuk melindungi manusia dari penyakit yang mengancam kehidupannya. Kebudayaan tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh kepercayaan dan keyakinan,

karena manusia selalu merasa ada yang lebih kuat dari dirinya, baik melalui panca indera maupun secara supranatural.




H. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber: Dimodifikasi dari (Lemone Priscilla, 2018), (WHO, 2023), (Kemenkes, 2022)

I. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

 : Variabel Independen

 : Variabel Dependen

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik observasional dan desain studi *cross sectional*. *Cross sectional* adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data pada saat yang sama. Dimana peneliti dalam penelitian ini mengidentifikasi dan mengaitkan hubungan antara variabel usia, jenis kelamin, pendapatan, kebiasaan merokok, konsumsi kafein, pola konsumsi natrium dan serat sebagai variabel independent dengan variabel tekanan darah sebagai variabel dependen pada satu waktu pengamatan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sampai 26 Maret tahun 2024. Lokasi ini dipilih untuk dilakukan penelitian oleh peneliti, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Bonto Karaeng berprofesi sebagai petani dan menjadi salah satu daerah dengan mata pencaharian sebagai petani terbesar di Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun jumlah petani di Desa Bonto Karaeng berjumlah 217 orang. Sehingga diperoleh jumlah populasi pada penelitian ini

sebanyak 217 petani bawang yang ada di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

2. Sampel

Dalam penentuan jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

$$n = \frac{217}{1 + 217(0,05)^2} = \frac{217}{1,5425} = 140$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e^2 = Presisi (5%)

Jumlah sampel pada penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil dari rumus Slovin yaitu berjumlah 140 sampel. Sampel dari hasil rumus Slovin ini merupakan jumlah sampel minimal.

3. Teknik Sampling

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan memakai jenis teknik *multistage* dengan memakai 2 jenis penarikan sampel yakni *proporsional random sampling* dan *simple random sampling*. Teknik *proporsional random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dimana populasi dibagi menjadi subkelompok (strata) yang homogen dan sampel diambil secara acak dari setiap strata dalam proporsi yang sama

dengan ukuran strata dalam populasi. Teknik *proporsional random sampling* ini dilakukan secara acak melalui undian dalam tiap dusun.

Beberapa langkah dalam mengundi sampel penelitian yaitu:

1. Tiap dusun akan dipilih sejumlah petani sesuai dengan jumlah yang sudah dihitung dalam rumus proporsional random sampling.
2. Peneliti membuat potongan kertas kecil sesuai dusun dan nama petani di desa tersebut.
3. Nama-nama petani yang ditulis pada potongan kertas akan digulung dan dimasukkan dalam toples kemudian di kocok, lalu dikeluarkan satu persatu.
4. Nama yang keluar, akan dicatat sebagai sampel kemudian nama yang telah dicatat, potongan kertasnya akan dibuang dan mencari nama lainnya untuk dijadikan sampel penelitian. Responden yang telah dipilih nantinya, akan diukur tekanan darahnya menggunakan tensi meter dan diberikan kuisisioner, kemudian hasilnya akan diklasifikasikan sesuai dengan definisi operasional yang telah ditentukan.

Adapun rumus dari proporsional random sampling yaitu:

$$\text{Sampel} = \frac{\text{jumlah petani}}{\text{total populasi}} \times \text{total sampel}$$

Tabel 3.1
Distribusi Total Sampel Penelitian Desa Bonto Karaeng Kecamatan
Sinoa Kabupaten Bantaeng

NO	Dusun	Jumlah Petani	Perhitungan	Sampel
1.	Tombolo Eja	41	$\frac{41}{217} \times 140$	26
2.	Ere Manurung	45	$\frac{45}{217} \times 140$	29
3.	Pappasangang	50	$\frac{50}{217} \times 140$	32
4.	Pa'bentengang	35	$\frac{35}{217} \times 140$	23
5.	Kariango	46	$\frac{46}{217} \times 140$	30

Sumber: Data Sekunder Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa

Setelah mendapatkan hasil sampel dari rumus *proporsional random sampling*, kemudian menggunakan teknik *simple random sampling* untuk memilih sampel secara acak dari daftar nama petani yang sudah di tentukan dari hasil sampel teknik *proporsional random sampling*.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer dari penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, tanya jawab, dan pemberian kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung, diperoleh melalui buku, jurnal penelitian, dan data yang didapatkan dari petani di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

E. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, yaitu metode untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden (Herlina, 2019). Dalam penelitian ini, pengumpulan data variabel dependen (tekanan darah) menggunakan alat pengukur tensimeter dan variabel independen (usia, jenis kelamin, pendapatan, kebiasaan merokok, konsumsi kafein, pola konsumsi natrium, dan pola konsumsi serat) menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner (daftar pertanyaan). Instrumen yang digunakan adalah angket terbuka dimana responden diberikan kebebasan untuk menjawab tanpa diberikan pilihan jawaban, serta angket tertutup dimana responden hanya diharuskan untuk memilih atau menjawab pilihan yang telah disediakan (Herlina, 2019).

1. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)

Pengukuran tekanan darah dilakukan secara langsung dengan menggunakan alat *sphygmomanometer* aneroid. Pengukuran dilakukan

pada bagian lengan atas sejajar dengan jantung dengan posisi responden duduk (Kemenkes, 2019). Secara umum, tensimeter aneroid mungkin sedikit lebih akurat dibandingkan tensimeter digital jika digunakan oleh individu yang terlatih dan jika alat tersebut terkalibrasi dengan baik. Pengukuran dilakukan setidaknya dua hingga tiga kali pengukuran tekanan darah dalam waktu yang bersamaan.

2. Pendapatan

Kuesioner pendapatan berisikan pertanyaan terkait dengan pendapatan responden pada saat penelitian dilakukan. Kemudian, hasil data dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:

- 1) Pendapatan Rendah, jika \leq UMR (Rp. 3.294.467)
- 2) Pendapatan Tinggi, jika $>$ UMR (Rp. 3.294.467)

3. Kebiasaan merokok

Kuesioner kebiasaan merokok berisikan pertanyaan terkait dengan kebiasaan merokok responden pada saat penelitian dilakukan. Kemudian, hasil data dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

- 1) Tidak merokok, jika tidak pernah merokok
- 2) Perokok ringan, jika konsumsi rokok 1-10 batang perhari
- 3) Perokok sedang, jika konsumsi rokok 11 – 20 batang perhari
- 4) Perokok berat, jika konsumsi rokok \geq 21 batang perhari

4. Konsumsi kafein

Kuesioner mengenai pertanyaan konsumsi kopi terdapat pada bagian D yaitu D1 dan D2. Hasil data dikelompokkan ke dalam kategori, antara lain:

- 1) Berisiko, apabila mengkonsumsi > 3 cangkir / hari
- 2) Tidak berisiko, apabila mengkonsumsi ≤ 3 cangkir hari

5. Pola konsumsi natrium dan serat

Dalam Survey Konsumsi Pangan (Kemenkes, 2018), dijelaskan bahwa Food Frequency Questionnaire (FFQ) adalah salah satu metode atau alat yang digunakan untuk melakukan penilaian pada asupan makanan. Dalam penilaian ini, jenis-jenis makanan yang akan ditanyakan kepada subjek disediakan dalam bentuk pertanyaan tertutup dengan menghitung jumlah konsumsi natrium dan serat perharinya. Pada metode ini, informasi bahan yang dikonsumsi hanya disediakan nama makanannya saja dan tidak ditentukan jumlahnya. Subjek yang menyatakan sering mengonsumsi makanan atau minuman tertentu tidak perlu dianalisis lebih lanjut mengenai ukuran porsinya, yang dibutuhkan hanya data seberapa sering makanan tersebut dikonsumsi.

Skor konsumsi pangan dengan menggunakan metode FFQ mengacu pada porsi makanan yang tercantum dalam piramida makanan pada masing-masing negara. Piramida pangan Indonesia dikenal dengan tumpeng Pesan Gizi Seimbang (PGS) dimana piramida

tersebut memberikan informasi mengenai ukuran porsi sebagai standar untuk menilai asupan dari kelompok makanan (Kemenkes, 2018).

Metode food frequency quasioner (FFQ) dan penelitian setiap kuesioner sebagai berikut:

	>1x/hari	1x/hari	3- 6x/minggu	1- 2x/minggu	2- 3x/bulan	Tidak pernah
skor	50	25	15	10	5	0

(Sirajuddin et al., 2018)

Selanjutnya kategori nilai yang sudah diberi skor dijumlahkan secara keseluruhan dan kemudian dirata-ratakan. Kategori pola konsumsi natrium adalah:

- 1) Tinggi, jika rata-rata skor ≥ 15
- 2) Rendah, jika rata-rata skor < 15

Kemudian pola konsumsi serat adalah:

- 1) Cukup, jika rata-rata skor ≥ 15
- 2) Kurang, jika rata-rata skor < 15

J. Uji Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Sebelum instrumen penelitian digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan realibilitas. Uji validitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui keterpaduan tiap pertanyaan yang digunakan di dalam penelitian apakah dapat mengukur sesuai dengan apa yang akan diukur. Sedangkan uji realibilitas instrumen penelitian

dimasukkan untuk mengukur apakah instrumen yang digunakan cukup akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur variabel penelitian.

Jika r_{hitung} yang diperoleh dari data pengukuran lebih besar dari r_{tabel} , maka instrumen dianggap valid, sebaliknya jika r_{hitung} lebih rendah dari r_{tabel} maka item kuesioner dikatakan tidak valid. Item pertanyaan yang tidak valid akan dikeluarkan (*dropout*) dari analisis data. Item-item pertanyaan tersebut terwakili oleh item pertanyaan lainnya yang dinyatakan valid.

a. Uji validitas instrumen variabel kebiasaan merokok

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Kebiasaan Merokok

No	R_{hitung}	$R_{tabel(N-2)}$	Keterangan
1	0,875	0,000	Valid
2	1,000	0,000	Valid
3	0,712	0,000	Valid

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan data tabel tersebut dengan melihat nilai validitas antara pertanyaan item 1-3 dengan kategori variabel maka dapat melihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel kebiasaan merokok memiliki status valid. Dengan nilai R_{hitung} yang dicapai lebih besar daripada R_{tabel} dengan nilai signifikan $<0,05$. Dari hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa dari 3 item pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti untuk angket variabel kebiasaan merokok dinyatakan valid.

b. Uji validitas instrumen variabel pola konsumsi natrium dan serat

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sirajuddin et al., 2018) telah menunjukkan bahwa FFQ dapat menjadi alat yang valid dan reliabel untuk mengukur asupan natrium dan serat, dengan penyesuaian dan validasi yang tepat dilakukan terhadap populasi yang diteliti. Kuesioner dikembangkan dengan pertanyaan yang spesifik untuk mengukur asupan natrium dan serat. Hal ini mencakup daftar makanan yang merupakan sumber utama natrium dan serat.

Ahli gizi atau pakar diet mengkaji kuesioner untuk memastikan semua item relevan dan mencakup semua aspek penting dari asupan natrium dan serat. Dilakukan dengan membandingkan hasil FFQ dengan metode lain yang sudah terbukti valid, seperti catatan makanan harian atau wawancara diet 24 jam. Korelasi antara hasil FFQ dan metode lain diukur untuk menentukan validitas konstruksi. Hasil dari FFQ dibandingkan dengan hasil pengukuran biomarker yang relevan, seperti kadar natrium dalam urin atau kadar serat dalam tinja, untuk menentukan seberapa baik FFQ mengukur asupan natrium dan serat yang sebenarnya. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan validitas yang baik.

3. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2006) menyatakan data data dianggap reliabel jika terdapat kesamaan data sepanjang waktu. Dengan kata lain, suatu instrumen dikatakan reliabel jika secara konsisten menghasilkan data yang sama ketika digunakan untuk mengukur hal yang sama sepanjang waktu. Angka *Cronbach Alpha* bertujuan dalam menentukan apakah kuesioner dapat dikatakan reliabel atau sebaliknya. Angka *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,600, berarti menunjukkan reliabilitas . sedangkan uji reliabilitas instrumen penelitian dimaksudkan mengukur apakah instrumen yang digunakan cukup akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur variabel penelitian.

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>N Of Items</i>	Keterangan
Kebiasaan Merokok	0,835	3	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2024.

Dari hasil analisis uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas bebas yaitu kebiasaan merokok sebesar 0,835. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel kebiasaan merokok dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan konsisten.

G. Instrument Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari responden. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden menggunakan kuesioner terstruktur sebagai panduan.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati determinan biososial dan perilaku pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

3. Pengukuran

Pengukuran tekanan darah pada petani bawang dilakukan sesudah wawancara. Pengukuran menggunakan alat sphygmomanometer aneroid atau Tensimeter manual untuk mengetahui tekanan darah petani bawang. Tensimeter jarum (*aneroid*) yang digunakan adalah merk *General Care*. Kelebihan dari merk tersebut adalah tingkat presisi yang tinggi, akurasi *medical grade* +/-3 mmHg dan *Carrying case* untuk menyimpan alat. Dilengkapi dengan teknologi pengukuran inflasi yang terbaru sehingga pasien lebih nyaman cukup sekali tekanan saja. Alat ini sering digunakan oleh tenaga medis dan petugas kesehatan, menunjukkan bahwa ia memenuhi standar pengukuran yang ketat (Medicalogy, 2017).

H. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Semua fakta yang didapat, termasuk data primer dan data sekunder, diselesaikan dengan susunan sebagai berikut:

a. Menata Data (*Editing*)

Kegiatan pengeditan data dilakukan untuk mengecek kembali seluruh kuesioner yang telah diisi oleh responden sebelum memasukkan data ke dalam software. Pengeditan data dilakukan untuk menghindari ada data missing, sehingga seluruh kuesioner harus dipastikan telah terisi secara benar serta lengkap. Jika ditemukan kuesioner yang kurang lengkap maupun belum benar, maka kuesioner akan dikembalikan kepada responden yang kemudian harus dilengkapi. Pengeditan dapat dilakukan setelah kuesioner diisi oleh responden.

b. Mengkode Data (*Coding*)

Data coding atau pengkodean data ialah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengklasifikasikan data dan memberikan kode pada setiap variabel dependen maupun independen atau data dalam kuesioner sesuai dengan tujuan dikumpulkannya data untuk mempermudah proses pengolahan data.

1) Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Hipertensi yang terdiri dari dua kategori antara lain Normal diberi kode "0", kemudian Tekanan darah tinggi (Hipertensi) diberi kode "1".

2) Variabel Independen

Tabel 3.2 Kode Variabel Independen

No	Variabel	Kode
1.	Usia	1. Dewasa Awal 2. Dewasa Akhir 3. Lansia Awal 4. Lansia Akhir
2.	Jenis Kelamin	0. Perempuan 1. Laki-Laki
3.	Pendapatan	0. Rendah 1. Tinggi
4.	Kebiasaan Merokok	0. Tidak Merokok 1. Perokok Ringan 2. Perokok Sedang 3. Perokok Berat
5.	Konsumsi Kafein	0. Tidak Berisiko 1. Berisiko
6.	Pola Konsumsi Natrium	0. Tinggi 1. Rendah
7.	Pola Konsumsi Serat	0. Kurang 1. Cukup

c. Memasukkan Data (*Entry*)

Proses memasukkan data dilakukan dengan menggunakan software analisis data untuk memasukkan data yang telah dikumpulkan kemudian diberi kode jawaban.

d. Membersihkan Data (*Cleaning*)

Data yang telah melewati proses entri data perlu dilakukan proses pembersihan untuk mengecek kesalahan yang ada pada proses pemasukan data serta mengoreksi data secara sistematis. Hal ini dilakukan agar data sesuai dengan yang telah diperoleh pada saat pengumpulan data.

2. Analisis Data

Keterangan data yang didapatkan diolah dan dilampirkan dalam bentuk tabel yang disertakan dengan penjelasan variabel. Merupakan faktor yang dapat menyebabkan gejala hipertensi pada petani bawang menggunakan program SPSS.

a. Analisis Univariat

Analisis Univariat ini bertujuan untuk memaparkan karakteristik dari variabel independen dan dependen dimana keseluruhan data pada kuesioner diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi (n).

b. Analisis Bivariat

Analisis Bivariat bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan analisis *uji Chi-Square*. Melalui *Uji Chi-Square* maka akan didapatkan nilai P, dimana dalam penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan sebesar 0,05. Jadi, penelitian antara dua

variabel dikatakan bermakna jika mempunyai nilai $p \leq 0.05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima dan dikatakan Tidak bermakna apabila nilai $p \geq 0.05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

I. Alur Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, memiliki alur pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

1. Tahapan Awal

Tahapan awal dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sampai dengan 26 Maret tahun 2024, pada tahapan ini peneliti meminta izin kepada kepala desa dan para staff dikantor desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penelitian dengan membawa surat izin penelitian yang sudah peneliti siapkan dan meminta izin untuk memeriksa tekanan darah para petani bawang yang sudah ditentukan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di tahapan awal, yakni pada tanggal 26 Februari sampai dengan 26 Maret tahun 2024. Peneliti terlebih dahulu mendatangi satu persatu rumah maupun tempat bekerja responden lalu memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan peneliti datang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, lalu menjelaskan tata cara pengisian kuisioner serta membimbing responden dalam pengisian

kuisisioner agar responden memahami alur pengisian kuisisioner yang diberikan oleh peneliti. Kemudian responden diukur menggunakan tensi meter pada peneliti dengan persetujuan responden.

3. Tahapan Akhir

Tahapan akhir juga dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama yakni pada tanggal 26 Februari sampai dengan 26 Maret tahun 2024, setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah dan pembagian kuisisioner, selanjutnya peneliti memeriksa dan mengecek kembali data atau kuisisioner yang diperoleh dari semua petani bawang untuk menentukan sampel penelitian. Setelah memeriksa dan mengecek data atau kuisisioner responden, peneliti mendapatkan sampel penelitian sebanyak 140 responden yang nantinya data tersebut akan diolah menggunakan aplikasi SPSS.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Peneliti

1. Keadaan Geografis

a. Letak Desa

Desa Bonto Karaeng terletak di wilayah pemerintahan Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, jarak dari ibu kota kecamatan \pm 2,5 km dan jarak dari ibu kota kabupaten \pm 12 km. Jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh ke kota kecamatan \pm 5 menit dan \pm 15 menit menuju ibu kota kabupaten.

Luas wilayah Desa Bonto Karaeng \pm 23,74 km dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bonto Majannang
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonto Maccini
- 3) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bonto Tangnga dan Desa Bonto Lojong
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bonto Bulaeng.

Tabel 4.1 Kondisi Lahan

No	Jenis lahan	Luas lahan
1.	Lahan kebun	140,8 Ha
2.	Lahan sawah	219 Ha
3.	Lahan pemukiman	0,44 Ha
Total		360,24 Ha

Sumber: *Data Monografi Desa.*

b. Topografi

Kondisi Desa Bonto Karaeng memiliki kondisi daerah yang termasuk dalam kategori dataran tinggi (berbukit-bukit), berada diatas gunung dengan ketinggian ± 800 -meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah Desa Bonto Karaeng terdiri dari lahan perkebunan, persawahan, pemukiman penduduk dan hutan kawasan. Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang.

Berdasarkan hasil penjajakan diketahui bahwa jenis mata pencaharian pokok yang ada di Desa Bonto Karaeng adalah petani, peternak, pedagang, tukang batu, tukang kayu, Sopir, buruh, PNS, peternak ayam petelur, wiraswasta, tukang pabrik, honorer dan beberapa warga yang merantau keluar daerah untuk mencari nafkah.

2. Kondisi Penduduk

Desa Bonto Karaeng terdiri dari Empat dusun yaitu Dusun Tombolo Eja, Dusun Pa'bentengan, Dusun Pappasangan Dan Dusun Kariango. Dari ke Empat dusun tersebut terdiri dari 8 RK/RW. Dusun Pappasangan Dimekrkan Menjadi Dua Dusun penduduknya hampir sama dibandingkan dengan Dusun Pa'bentengan Dusun Tombolo Eja, dan Dusun Kariango karena Dusun Pappasangan lebih luas wilayah yang terdiri dari dua wilayah perkampungan maka Dari Itu Dimekerkan

Menjadi Dua Dusun Pada Tahun 2015 yaitu lapporo dan pare-pareang, Dusun Pa'bentengan terdiri dari kampung Pa'rasangan Beru dan Pappakeng sedangkan Dusun Tombolo Eja hanya terdiri dari satu kampung sekaligus sebagai nama Dusun. Secara umum Jumlah Penduduk perempuan Lebih Banyak Di bandingkan Jumlah Penduduk Laki- laki baik di Dusun Pappasangan maupun Dusun Pabbentengan dan Dusun Tombolo Eja.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk, Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga Desa Bonto Karaeng Tahun 2019

Desa	Dusun	Jenis Kelamin		Total	Kepala Rumah Tangga	Kepala Keluarga
		L	P			
Bonto Karaeng	Tombolo Eja	229	239	468	129	130
	Pa'pasangang	100	115	215	104	125
	Pa'bentengang	250	252	502	133	135
	Kariango	150	179	329	98	110
	Manurung	120	110	230	40	100
Jumlah		849	895	1744	504	600

Sumber: *Data sensus Sosial program CLAPPP-GSI oleh KPM bulan September 2012*

1. Kesehatan

a. Puskesmas Pembantu (Pustu)

Pustu di Desa Bonto Karaeng terletak di dusun Pabbentengan. sebagian besar masyarakat Bonto Karaeng berobat di Puskesmas tersebut karena jaraknya tidak terlalu jauh dan biayanya relatif lebih rendah di banding di Rumah Sakit Umum.

Selain itu Puskesmas tersebut sudah memiliki sarana rawat inap. Sehingga pelayanannya kepada masyarakat bisa lebih dimaksimalkan.

b. Posyandu

Saat ini Desa Bonto Karaeng belum memiliki Gedung Posyandu, sehingga aktifitas posyandu masih dilakukan di bawah kolom rumah. Kelompok posyandu tersebut terletak di Dusun Tombolo Eja dan Dusun Pappsangan. Kegiatan Posyandu ini dilakukan 1 kali dalam sebulan. Aktifitas yang dilakukan adalah menimbang, Imunisasi, Pemberian makanan tambahan dan memberikan pelayanan kesehatan anak balita dan ibu hamil. Proses pelaksanaan kegiatannya di bantu oleh 5 orang kader yang sudah diberikan pendidikan dari dinas Kesehatan.

2. Sarana Pendidikan

a. PAUD

Salah satu sarana pendidikan di Desa Bonto Karaeng adalah PAUD. PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini. PAUD ini terletak di Dusun Tombolo Eja. Dibangun pada tahun 2010 dengan sumber anggaran dari PNPM-MP. Tenaga pendidik di PAUD tersebut hanya 2 orang dan 1 orang kepala sekolah. Saat ini gaji dan transportasi tenaga pendidik di biyai oleh PNPM-MP selama 1 tahun 8 bulan. Setelah itu pemerintah Desa bonto Karaeng akan mengupayakan dan mengusulkan kedinas pendidikan.

b. Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Dasar di Desa Bonto Karaeng terdiri dari 2 sekolah. Yaitu SD 37 pa'rasangan beru dan SD 36 Lapporo. Rata-rata peserta didik pada sekolah tersebut dari Desa Bonto Karaeng namun demikian ada beberapa dari Desa Bonto Majannang. Pengajarnya kebanyakan dari luar desa, yang berasal dari Desa Bonto Karaeng hanya tenaga honorer.

c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Di Desa Bonto Karaeng, juga terdapat *Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)*. Sekolah tersebut bernama SLTP Neg 1 Sinoa terletak di Dusun Pabbentengan. Siswanya banyak dari luar desa bahkan dari luar kecamatan. Diperkirakan sekolah ini dibangun pada tahun 1998. Pada sekolah tersebut, pendidikannya kebanyakan dari luar desa bonto karaeng. Dengan adanya sekolah tersebut sangat membantu masyarakat Desa Bonto Karaeng dan sekitarnya karena mempermudah anak usia sekolah untuk mengakses pendidikan tanpa harus wilayah kota.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Responden di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Karakteristik	Jumlah (N=140)	Persentase (100%)
Usia		
Dewasa awal (26-35 Tahun)	32	22,9
Dewasa akhir (36-45 Tahun)	60	42,9
Lansia awal (46-55 Tahun)	39	27,9
Lansia akhir (56-65 Tahun)	9	6,4
Jenis Kelamin		
Perempuan	49	35
Laki-Laki	91	65

Sumber: *Data Primer, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan bahwa dari total 140 responde yang diteliti, responden yang memiliki proporsi paling tinggi terdapat pada usia Dewasa akhir (36 tahun - 45 tahun) sebanyak 60 orang (42.9%), sedangkan responden pada Lansia akhir (56 tahun - 65 Tahun) memiliki proporsi paling rendah sebanyak 9 orang (6.4%). Responden penelitian ini didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 91 orang (65%). Sedangkan, yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 49 orang (35%).

b. Tekanan Darah, Pola Konsumsi Natrium dan Serat

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengukuran Tekanan Darah, Pola Konsumsi Natrium dan Serat pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Karakteristik	Min	Max	Median	Mean \pm SD
Tekanan Darah				
Sistolik	90	170	140	131,9 \pm 19,4
Diastolik	60	120	90	86,4 \pm 18,2
Skor Pola Konsumsi Natrium	7,2	17,2	12,2	12,6 \pm 2,96
Skor Pola Konsumsi Serat	5,5	18,2	9,9	11,06 \pm 3,72

Sumber: *Data Primer, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.4, menunjukkan bahwa dari 140 responden yang diteliti, ditemukan nilai minimum pengukuran tekanan darah sistolik adalah 90 mmHg dan nilai maksimumnya 170 mmHg, sedangkan untuk nilai minimum pengukuran tekanan darah diastolik adalah 60 mmHg dan nilai maksimumnya 120 mmHg. Untuk pola konsumsi natrium didapatkan nilai rata-rata 12,6 \pm 2,96 dan pola konsumsi serat dengan nilai rata-rata 11,06 \pm 3,72.

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategori Pengukuran Tekanan Darah, Pola Konsumsi Natrium dan Serat pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Kategori	Jumlah (N=140)	Persentase (100%)
Tekanan Darah		
Normal	68	48,6
Tekanan Darah Tinggi	72	51,4

Kategori	Jumlah (N=140)	Persentase (100%)
Pola Konsumsi Natrium		
Tinggi	54	38,6
Rendah	86	61,4
Pola Konsumsi Serat		
Kurang	35	25
Cukup	105	75

Sumber: *Data Primer, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa dari 140 responden yang diteliti sebagian besar responden mengalami tekanan darah tinggi sebanyak 72 orang (51,4%), kategori pola konsumsi natrium rendah sebanyak 86 orang (61,4%) dan pola konsumsi serat cukup sebanyak 105 orang (75%).

c. Pendapatan

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendapatan pada Petani Bawang di
Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Karakteristik	Jumlah (N=140)	Persentase (100%)
Pendapatan Rendah		
≤UMR (Rp. 3.294.467)	91	65
Pendapatan Tinggi		
> UMR (Rp. 3.294.467)	49	35

Sumber: *Data Primer, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa dari 140 orang responden, sebanyak 91 orang (65%) memiliki pendapatan rendah ≤UMR (Rp. 3.294.467), dan sebanyak 49 orang (35%) memiliki pendapatan tinggi > UMR (Rp. 3.294.467).

d. Kebiasaan Merokok dan Konsumsi Kafein

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kebiasaan Merokok dan Konsumsi Kafein pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Karakteristik	Jumlah (N=140)	Persentase (100%)
Merokok		
Tidak	54	38,6
Ya	86	61,4
Jumlah rokok yang dihisap perhari		
Tidak merokok	54	38,6
≤ 10 batang	17	12,1
11-20 batang	43	30,7
≥ 21 batang	26	18,6
Jenis rokok yang dihisap		
Tidak merokok	54	38,6
Rokok kretek	31	22,1
Rokok filter	45	32,1
Rokok putih	2	1,4
Rokok gulung sendiri (Roll-Your-Own)	26	5,7
Minum kopi		
Tidak	32	22,9
Ya	108	77,1
Berapa cangkir kopi yang diminum dalam sehari		
Tidak minum	32	22,9
1 cangkir	10	7,1
2 cangkir	43	30,7
3 cangkir	17	12,1
4 cangkir	38	27,1

Sumber: *Data Primer, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui bahwa dari 140 orang yang diteliti sebanyak 86 orang (61,4%) yang merupakan perokok dan 54 orang (38,6%) yang tidak merokok. Dari 86 responden yang merokok ini sebagian besar menghisap rokok sekitar 11-20 batang

perhari sebanyak 43 orang (30,7%) dan dengan jenis rokok yang dihisap terbanyak adalah rokok filter yaitu 45 orang (32,1%). Dan dari 140 responden sebanyak 108 orang (77,1%) yang minum kopi, sebagian besar meminum kopi sebanyak 2 cangkir perhari.

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategori Kebiasaan Merokok dan Konsumsi Kafein pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Kategori	Jumlah (N=140)	Persentase (100%)
Kebiasaan Merokok		
Tidak merokok	54	38,6
Perokok ringan	17	12,1
Perokok sedang	43	30,7
Perokok berat	26	18,6
konsumsi kafein		
Tidak Berisiko	102	72,9
Berisiko	38	27,1

Sumber: *Data Primer, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.8, dari 140 responden yang diteliti sebagian besar responden yang merokok merupakan kategori perokok sedang yakni sebanyak 43 orang (30,7%). Dan untuk kategori konsumsi kafein yang termasuk tidak berisiko sebanyak 102 orang (72,9%) dan yang berisiko 38 orang (27,1%).

2. Hasil Analisis Bivariat

a. Hubungan Usia dengan Tekanan Darah

Tabel 4.9
Hubungan Usia dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang di
Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Usia	Tekanan Darah				Total		<i>p-value</i>
	Normal		Tekanan Darah Tinggi		N	%	
	n	%	n	%			
Dewasa Awal	26	38,2	6	8,3	32	22,9	0,000
Dewasa Akhir	32	47,1	28	38,9	60	42,9	
Lansia Awal	8	11,8	31	43,1	39	27,9	
Lansia Akhir	2	2,9	7	9,7	9	6,4	
Total	68	100	72	100	140	100	

Sumber: *Data Primer, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.9 dari 72 orang yang mengalami tekanan darah tinggi sebagian besar diderita oleh responden yang berada pada rentang usia lansia awal (46-55 tahun) yaitu sebanyak 31 orang (43,1%) dan usia yang paling sedikit menderita tekanan darah tinggi adalah dewasa awal (26-35 Tahun) yaitu 7 orang (9,7%).

Hasil analisis statistik menggunakan uji *chi-square* menunjukkan nilai *p-value* 0,000 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara usia dengan tekanan darah pada petani

bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

b. Hubungan Jenis Kelamin dengan Tekanan Darah

Tabel 4.10
Hubungan Jenis Kelamin dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Jenis Kelamin	Tekanan Darah				Total		<i>p-value</i>
	Normal		Tekanan Darah Tinggi		N	%	
	n	%	n	%			
Perempuan	27	39,7	22	30,6	49	35	0,257
Laki-Laki	41	60,3	50	69,4	91	65	
Total	68	100	72	100	140	100	

Sumber: *Data Primer, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 72 responden yang mengalami tekanan darah tinggi, sebanyak 50 orang (69,4%) berjenis kelamin laki-laki dan 22 orang (30,6%) lainnya berjenis kelamin Perempuan.

Hasil analisis statistik menggunakan uji *chi-square* menunjukkan nilai *p-value* 0,257 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

c. Hubungan Pendapatan dengan Tekanan Darah

Tabel 4. 11
 Hubungan Pendapatan dengan Tekanan Darah pada Petani
 Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Pendapatan	Tekanan Darah				Total		<i>p-value</i>
	Normal		Tekanan Darah Tinggi		N	%	
	n	%	n	%			
Rendah	38	55,9	53	73,6	91	65	0,028
Tinggi	30	44,1	19	26,4	49	35	
Total	68	100	72	100	140	100	

Sumber: *Data Primer, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 72 orang yang mengalami tekanan darah tinggi, sebanyak 53 orang (73,6%) memiliki pendapatan rendah dan sebanyak 19 orang (26,4%) yang berpendapatan tinggi.

Hasil analisis statistik menggunakan uji *chi-square* menunjukkan nilai *p-value* 0,028 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Sehingga terdapat hubungan antara pendapatan dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

d. Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Tekanan Darah

Tabel 4.12
 Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Tekanan Darah pada
 Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa
 Kabupaten Bantaeng

Kebiasaan Merokok	Tekanan Darah				Total		p-value
	Normal		Tekanan Darah Tinggi				
	n	%	n	%	N	%	
Tidak Merokok	32	47,1	22	30,6	54	38,6	0,007
Perokok Ringan	10	14,7	7	9,7	17	12,1	
Perokok Sedang	21	30,9	22	30,6	43	30,7	
Perokok Berat	5	7,4	21	29,2	26	18,6	
Total	68	100	72	100	140	100	

Sumber: *Data Primer, 2024.*

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa dari 72 orang yang memiliki tekanan darah tinggi, sebagian besar merupakan perokok sedang yaitu 22 orang (30,6%) dan sebagian kecil merupakan perokok ringan yaitu sebanyak 7 orang (9,7%).

Hasil analisis statistik menggunakan uji *chi-square* menunjukkan nilai *p-value* 0,007 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

e. Hubungan Konsumsi Kafein dengan Tekanan Darah

Tabel 4.13
 Hubungan Konsumsi Kafein dengan Tekanan Darah pada
 Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa
 Kabupaten Bantaeng

Konsumsi Kafein	Tekanan Darah				Total	<i>p-value</i>	
	Normal		Tekanan Darah Tinggi				
	n	%	n	%			N
Tidak Berisiko	61	89,7	41	56,9	102	72,9	0,000
Berisiko	7	10,3	31	43,1	38	27,1	
Total	68	100	72	100	140	100	

Sumber: *Data Primer, 2024.*

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa dari sebanyak 72 orang yang menderita tekanan darah tinggi, sebanyak 41 orang (56,9%) tidak berisiko mengonsumsi kafein dan 31 orang (43,1%) lainnya berisiko mengonsumsi kafein.

Hasil analisis statistik menggunakan uji *chi-square* menunjukkan nilai *p-value* 0,000 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H₀ ditolak, dan H₁ diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara konsumsi kafein dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

f. Hubungan Pola Konsumsi Natrium dengan Tekanan Darah

Tabel 4.14
 Hubungan Pola Konsumsi Natrium dengan Tekanan Darah
 pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa
 Kabupaten Bantaeng

Pola Konsumsi Natrium	Tekanan Darah				Total	<i>p-value</i>
	Normal		Tekanan Darah Tinggi			
	n	%	n	%	N	
Tinggi	58	85,3	47	65,3	105	75
Rendah	62	91,2	24	33,3	86	61,4
Total	68	100	72	100	140	100

Sumber: *Data Primer, 2024.*

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 72 responden yang mengalami tekanan darah tinggi, sebagian besar memiliki pola konsumsi tinggi natrium sebanyak 48 orang (66,7%) dan sebanyak 24 orang (33,3%) yang memiliki pola konsumsi rendah natrium.

Hasil analisis statistik menggunakan uji *chi-square* menunjukkan nilai *p-value* 0,000 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pola konsumsi natrium dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

g. Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Tekanan Darah

Tabel 4.15
 Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Tekanan Darah pada
 Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa
 Kabupaten Bantaeng

Pola Konsumsi Serat	Tekanan Darah				Total	<i>p-value</i>	
	Normal		Tekanan Darah Tinggi				
	n	%	n	%	N		%
Kurang	10	14,7	25	34,7	35	25	
Cukup	58	85,3	47	65,3	105	75	0,006
Total	68	100	72	100	140	100	

Sumber: *Data Primer, 2024.*

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari 72 responden yang menderita tekanan darah tinggi, sebagian besar responden memiliki pola konsumsi cukup serat sebanyak 47 (65,3%) dan sebanyak 25 orang (34,7%) yang memiliki pola konsumsi kurang serat.

Hasil analisis statistik menggunakan uji *chi-square* menunjukkan nilai *p-value* 0,006 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pola konsumsi serat dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

C. Pembahasan

1. Hubungan Usia dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang

Tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi multifaktorial yang disebabkan oleh paparan seseorang terhadap berbagai faktor risiko. Bertambahnya usia mengakibatkan perubahan fisiologis pada tubuh, seperti penebalan dinding rahim akibat penumpukan kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah menyempit dan kaku (Widjaya et al., 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari 140 responden, distribusi usia yang paling banyak menderita tekanan darah tinggi adalah lansia awal (46-55 tahun) yaitu sebanyak 31 orang (43,1%). Dengan hasil analisis menggunakan uji Chi-Square, diperoleh nilai *p-value* 0,000 ($p < 0,05$) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan tekanan darah pada petani bawang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mantuges et al., 2021) dimana uji hubungan antara umur dengan kejadian hipertensi pada petani sawah didapatkan hasil ada hubungan yang signifikan antara umur dengan kejadian hipertensi didapatkan nilai *p-value* 0,000 ($p < 0,05$). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Nurhayati et al., 2023) dimana hasil uji korelasi dengan menggunakan uji Spearman Rank pada variable usia menunjukkan hasil bahwa *p-value* 0,000 ($p < 0,05$) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan

yang signifikan antara Usia terhadap kejadian hipertensi pada pasien RSUD Muhammadiyah Bantul.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Masoli et al., 2022) variabel seperti penuaan memengaruhi kesehatan kardiovaskular secara umum, termasuk peningkatan tekanan darah. Mereka menemukan bahwa tekanan darah secara bertahap meningkat seiring bertambahnya usia, terutama di atas usia 50 tahun. Hal ini konsisten dengan gagasan Benson (2006) bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi biasanya berkembang pada usia lanjut. Tekanan sistolik meningkat rata-rata 20 mmHg antara usia 30 dan 65 tahun, dan terus meningkat setelah usia 70 tahun. Faktor risiko yang berkaitan dengan usia secara substansial menjelaskan hipertensi sistolik terisolasi, yang dikaitkan dengan peningkatan resistensi terhadap aliran darah dalam kapiler darah perifer di arteri.

Sehingga Peneliti berasumsi bahwa seiring bertambahnya usia, sistem kardiovaskular dalam tubuh akan memburuk, akibatnya meningkatkan kemungkinan terkena tekanan darah tinggi. Data ini mendukung teori Tryanto (2014), yang menyatakan bahwa usia adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tekanan darah tinggi, karena adanya perubahan alamiah pada jantung, pembuluh darah, dan hormon. Usia berkaitan dengan disfungsi endotel dan peningkatan kekakuan arteri pada tekanan darah tinggi, terutama hipertensi sistolik pada lansia (Tindangen et al., 2020).

Menurut temuan penelitian ini, responden yang berusia dewasa akhir sudah mengalami tekanan darah tinggi, meskipun masih berusia muda. Mereka percaya bahwa mereka masih awet muda, sehingga mereka minum banyak natrium dan kafein, dan sebagian besar dari mereka merokok, yang semuanya dapat berkontribusi pada tekanan darah tinggi. Bukan hanya karena pembekuan pembuluh darah, tetapi juga karena faktor ekstrinsik seperti asupan natrium yang tinggi, penggunaan kopi yang berlebihan, dan merokok.

Hal ini terlihat dari hasil tabulasi silang antara variabel usia dan pola konsumsi natrium. Dari 54 responden dengan pola konsumsi natrium tinggi, 42,6 persen berada pada rentang usia dewasa akhir, mengindikasikan bahwa kelompok usia ini paling banyak mengonsumsi natrium dibandingkan dengan usia lainnya. Selain itu, tabulasi silang antara usia dan pola merokok menemukan bahwa 44,2 persen perokok moderat berada di usia dewasa akhir. Tabulasi silang antara penggunaan kafein dan usia menunjukkan bahwa 39,5% dari 38 responden yang berisiko berada di usia dewasa akhir. Tekanan darah tinggi pada usia dewasa akhir sering dikaitkan dengan konsumsi kopi yang berlebihan, yang merupakan salah satu variabel yang meningkatkan tekanan darah.

Dalam islam, bukti kuasa Allah dalam membutakan dan merubah tampilan manusia itu dapat dilihat ketika ia menua. Setiap kali seorang bayi dilahirkan, kondisi fisiknya lemah dan dia mengetahui

sesuatu; seiring berjalannya waktu, tubuhnya berkembang dan keahliannya bertambah; dan seiring bertambahnya usia, manusia menjadi semakin lemah dan rentan terhadap penyakit. Allah SWT berfirman dalam QS. Yasin /36 :68 yang berbunyi :

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۗ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Terjemahan :

“Siapa yang kami panjangkan umurnya niscaya kami balik proses penciptaanya (dari kuat menuju lemah). Maka, apakah mereka tidak mengerti?” (Kemenag RI, 2024)

Berdasarkan Tafsir Kementerian Agama RI, Allah SWT berfirman dalam QS. Yasin/36:68 bahwa mereka yang berumur panjang akan kembali ke tempat kelahirannya. Artinya, mereka kembali dalam keadaan lemah dan kurang dalam kapasitas mental, mirip dengan balita. Tekad mereka tidak lagi cukup kuat untuk melakukan tindakan pengabdian yang intens, dan mereka sering lupa, mencegah mereka beribadah dengan baik. Di akhir ayat ini, Allah bertanya mengapa mereka tidak menyadari dan mengambil kesempatan ketika mereka masih muda dan kuat. Nabi Muhammad (saw) membahas hal ini dalam hadisnya, yang berbunyi Manfaatkanlah lima kesempatan sebelum kesempatan itu muncul. Waktu luang sebelum kesibukan, kekayaan sebelum kemiskinan, kesehatan sebelum sakit, masa muda sebelum tua, dan kehidupan sebelum kematian. Penggalan syair di atas menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, kondisi fisik manusia akan semakin memburuk, sehingga memungkinkan penyakit lebih cepat masuk ke dalam tubuh.

2. Hubungan Jenis Kelamin dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dimodifikasi dalam hal tekanan darah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tekanan darah tinggi pada produsen bawang merah ($p\text{-value} = 0,257, >0,05$). Menurut temuan penelitian ini, responden dengan tekanan darah tinggi lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor yang meningkatkan tekanan darah pada laki-laki, termasuk stres, kelelahan, kebiasaan minum kopi, merokok, dan pola makan yang tidak teratur.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tindangen et al., 2020) menunjukkan bahwa $p\text{-value}$ lebih dari 0,05, yang berarti tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah tinggi. Laki-laki cenderung memiliki gaya hidup yang dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan darah daripada perempuan meskipun begitu perempuan yang akan memasuki usia menopause akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah.

Penelitian ini bertentangan dengan temuan (Mantuges et al., 2021) yang menemukan hubungan yang signifikan ($P=0,000, <0,05$) antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi pada pasien Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Menurut penelitian tersebut, laki-

laki memiliki risiko hipertensi yang lebih tinggi daripada perempuan, meskipun mereka kurang menyadarinya.

Berlawanan dengan kepercayaan umum, wanita lebih cenderung memiliki tekanan darah tinggi (Nurhayati et al., 2023). Salah satu penjelasan dari pola ini adalah perbedaan hormon di antara kedua jenis kelamin. Selama menopause, produksi hormon estrogen melambat, dan wanita kehilangan manfaat positifnya, sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat. Frekuensi tekanan darah tinggi pada pria hampir sama dengan wanita, meskipun wanita terlindungi dari penyakit kardiovaskular sebelum menopause; wanita yang belum mengalami menopause dilindungi oleh hormon estrogen, yang berperan dalam meningkatkan kadarnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Immawanti et al., 2019) menunjukkan bahwa dimana lansia yang memiliki tekanan darah tinggi lebih banyak menyerang pada jenis kelamin perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan sudah memasuki masa menopause yang akan kekurangan sedikit demi sedikit hormon estrogen yang memiliki peran dalam peningkatan kadar High Density Lipoprotein (HDL) dan berfungsi melindungi pembuluh darah dari kerusakan dan inilah alasan mengapa perempuan lebih rentan terkena hipertensi dibandingkan dengan laki-laki.

Hasil tersebut konsisten dengan temuan (Immawanti et al., 2019) yang menemukan bahwa lansia dengan tekanan darah tinggi

lebih sering menyerang pada jenis kelamin perempuan. Hal ini disebabkan karena perempuan telah memasuki masa menopause yang menyebabkan hilangnya hormon estrogen secara bertahap, yang berperan dalam meningkatkan kadar High Density Lipoprotein (HDL) dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan, sehingga perempuan lebih rentan terkena hipertensi dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan hal ini, para peneliti menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan tekanan darah tinggi. Meskipun wanita memiliki risiko tekanan darah tinggi yang lebih rendah sebelum menopause, risiko mereka meningkat setelah menopause karena perubahan hormonal seperti penurunan estrogen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel genetik dan hormonal mempengaruhi kejadian tekanan darah tinggi pada kedua jenis kelamin. Selain itu, faktor gaya hidup seperti makanan, tingkat aktivitas fisik, dan perilaku merokok juga berkontribusi terhadap perkembangan tekanan darah tinggi. Faktor-faktor ini memengaruhi pria dan wanita, tanpa memandang jenis kelamin.

Menurut (Zuo et al., 2021) obesitas, stres, dan penggunaan alkohol, semuanya menambah kemungkinan terjadinya tekanan darah tinggi. Obesitas dan distribusi lemak tubuh memengaruhi tekanan darah pria dan wanita secara berbeda. Menurut penelitian, wanita lebih sensitif terhadap peningkatan kekakuan arteri dan peningkatan tekanan darah yang disebabkan oleh berat badan daripada pria. Hal ini

menyiratkan bahwa tekanan darah tinggi dipengaruhi oleh lebih dari sekedar jenis kelamin. Oleh karena itu, adalah keliru untuk menyatakan bahwa jenis kelamin adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi risiko tekanan darah tinggi.

3. Hubungan Pendapatan dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang

Sukirno (1995) mendefinisikan pendapatan sebagai balas jasa yang melibatkan pemilik dan mereka yang bekerja di tempat pemilik usaha. Menurut pendapat Lipsey (1997:40), pendapatan dibagi menjadi dua kategori yaitu pendapatan per orang dan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pendapatan per orang didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan kepada setiap individu tergantung pada kinerja mereka sendiri sebelum pajak, dengan beberapa di antaranya disisihkan untuk diri sendiri (kebutuhan rumah tangga). Pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah sisa upah atau gaji yang diperoleh setelah dipotong pajak; pendapatan ini bertujuan untuk dibelanjakan atau ditabung (Mahendra & Ardani, 2019).

Penghasilan diperoleh dari hasil kerja kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama satu bulan. Biasanya, uang ini digunakan untuk biaya hidup, perawatan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan material lainnya. Hasil observasi menunjukkan bahwa responden memiliki pendapatan yang rendah (UMR). Terdapat 91 responden (65%) yang berpenghasilan rendah. Hal

ini disebabkan oleh kebiasaan responden yang rata-rata merokok, serta konsumsi untuk bekerja dan kebutuhan material lainnya.

Hal ini sejalan dengan hipotesis Ferguson dan Juanitas (1980), yang menyatakan bahwa gaji adalah salah satu faktor penentu yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membayar kebutuhan rutin. Lebih lanjut, teori Suparmono (2004) bertolak belakang dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pola pengeluaran seseorang dipengaruhi oleh konsumsi individu terhadap produk dan layanan sebagian besar ditentukan oleh status keuangan mereka secara langsung, tingkat biaya, etnis, status sosial ekonomi, dan kecenderungan (Wahyuni, 2019).

Analisis chi-square menemukan hubungan yang signifikan antara pendapatan dan tekanan darah pada bawang merah, dengan nilai p-value sebesar 0,028 ($p < 0,05$). Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menemukan adanya hubungan antara status ekonomi dengan tekanan darah tinggi yang ditunjukkan dengan nilai OR. Responden dengan pendapatan di bawah UMR memiliki kemungkinan 2,2 kali lebih besar untuk mengalami hipertensi. Hal ini dikatakan dengan pemahaman bahwa status sosial ekonomi yang rendah, selain gaya hidup, dapat meningkatkan risiko hipertensi. Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan rendah memiliki

risiko hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa tingkat pendapatan yang lebih tinggi berbanding terbalik dengan terjadinya tekanan darah tinggi. Individu dengan gaji yang lebih besar cenderung memiliki tekanan darah yang lebih rendah dibandingkan dengan individu yang memiliki pendapatan yang lebih rendah. Hal ini berhubungan dengan pernyataan yang dibuat oleh (Wahyuni, 2019) bahwa kesenjangan pendapatan dapat mengganggu kontrol tekanan darah. Individu dari rumah tangga berpenghasilan rendah sering kali memiliki kontrol tekanan darah yang lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga berpenghasilan tinggi, mungkin karena kurangnya akses ke layanan kesehatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan jantung.

Menurut temuan penelitian ini, beberapa responden berpenghasilan tinggi mengalami peningkatan tekanan darah. Orang dengan gaji tinggi sering kali memiliki akses ke makanan berlemak dan asin, serta kecenderungan makan berlebihan yang berkontribusi pada tekanan darah tinggi. Orang berpenghasilan tinggi sering kali mengalami tekanan pekerjaan yang signifikan, yang dapat meningkatkan stres dan secara langsung memengaruhi tekanan darah. Faktor risiko tekanan darah tinggi meliputi usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga, yang tidak dipengaruhi oleh uang.

Hal ini didukung oleh temuan tabulasi silang variabel pendapatan dan usia, yang menunjukkan bahwa hingga 50% dari 32 responden pada kelompok usia dewasa akhir memiliki pendapatan yang tinggi. Tabulasi silang antara variabel pendapatan dan pola konsumsi natrium menunjukkan bahwa dari 54 responden dengan pola konsumsi natrium tinggi, 24,1% memiliki pendapatan yang tinggi, yang menunjukkan bahwa seseorang dengan pendapatan yang tinggi kemungkinan besar memiliki konsumsi garam yang tinggi. Lebih lanjut, tabulasi silang antara pendapatan dan pola konsumsi serat menunjukkan bahwa dari 35 responden dengan pola konsumsi serat yang kurang, 28,6% memiliki pendapatan yang tinggi. Tabulasi silang antara perilaku merokok dan pendapatan menunjukkan bahwa dari 43 responden, 41,9% merupakan perokok sedang yang juga memiliki pendapatan tinggi.

Selain kekayaan, faktor sosial seperti pendidikan juga mempengaruhi tekanan darah. Orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung memiliki pengetahuan tentang gaya hidup sehat, yang dapat membantu manajemen tekanan darah. Secara keseluruhan, lebih banyak pendapatan dikaitkan dengan tekanan darah yang lebih rendah, karena akses yang lebih besar ke sumber daya kesehatan dan gaya hidup yang lebih sehat (Michelle et al., 2019).

Dalam Q.S Al-Munafiqun (63): 9, Allah SWT menyatakan bahwa segala sesuatu yang berlebihan dalam hal pendapatan dan tekanan darah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi” (Qs. Al-Munafiqun/63:9) (Kemenag RI, 2024)

Menurut tafsir Kementerian Agama RI atas ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menenteramkan orang-orang beriman bahwa kesibukan mereka mengejar uang dan mengasuh anak tidak menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah. Hai kamu yang, di mana pun kamu berada, percayalah! Jangan biarkan barang-barang yang Anda inginkan atau anak-anak yang Anda cintai mengganggu Anda dari mengingat Allah, terutama selama shalat lima waktu atau perintah-perintah-Nya tentang tempat kerja, masyarakat, atau pemerintahan anda. Dan orang-orang yang melakukan hal ini, yang mengabaikan ibadah dan hukum-hukum Allah, adalah orang-orang yang merugi karena kebutuhan spiritualnya tidak terpuaskan dan hidupnya tidak harmonis.

Umat Islam menganggap bekerja sebagai cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Bekerja juga sangat disarankan karena membantu orang menjaga harga diri dan kebanggaan mereka. Seseorang yang bekerja tidak bergantung pada sedekah dan belas kasihan orang lain. Allah swt. dan Rasul-Nya mengharamkan pengemis untuk bekerja dan menunggu tanpa tujuan. Ibnu Mas'ud menyatakan, "Tidak ada usaha untuk kebaikan dunia dan akhirat, maka aku benci melihat orang yang tidak bekerja." Setiap tindakan yang kita lakukan di tempat kerja mempengaruhi apakah kita diridhoi atau tidak di dunia ini, dan kesibukan manusia akan dituntut pertanggungjawaban di akhirat kelak. Bekerja merupakan salah satu jembatan menuju akhirat.

4. Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang

Angka kematian kasar (CDR) dapat digunakan sebagai salah satu matriks kematian. Merokok adalah praktik berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dan kematian. Nikotin, yang hanya terkandung dalam tembakau, berkontribusi pada sifat adiktif obat tersebut. Nikotin, seperti halnya kokain dan heroin, adalah zat psikotropika yang berpotensi menimbulkan kecanduan. Ketika seseorang merokok, mereka menghirup nikotin, zat adiktif yang ditemukan dalam rokok, yang masuk ke dalam tubuh mereka. Selain dihisap, tembakau dapat dikunyah atau dalam bentuk permen karet yang mengandung nikotin. Namun, merokok adalah cara yang paling

populer untuk menggunakan tembakau. Merokok merupakan salah satu elemen yang dapat berdampak pada tingkat tekanan darah (Satriawan, 2022).

Menurut pengamatan lapangan oleh responden, beberapa petani bawang merokok untuk membuatnya terjaga pada saat bekerja atau melakukan aktivitas lainnya. Mereka juga merokok untuk meremajakan tubuh dan mengurangi kelelahan, yang menghilangkan rasa kantuk. Dari hasil analisis bahwa dari 72 orang yang bertekanan darah tinggi sebanyak 53 orang responden yang merokok dan memiliki tekanan darah tinggi. Hal ini dikarenakan merokok dapat mempengaruhi tekanan darah seseorang meningkat.

Rokok adalah bahan yang mengandung nikotin dalam bentuk batangan atau digulung. Merokok merupakan perilaku dimana perokok menghisap gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas. Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh p-value 0,007 ($p < 0,05$) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Widyatama et al., 2020) yang melakukan penelitan terhadap 135 subjek usia 35-55 tahun yang merokok aktif. Hasil analisis chi-square menunjukkan hubungan yang signifikan antara jumlah batang rokok yang dikonsumsi dengan kejadian hipertensi p-

value 0,004, yang artinya semakin banyak jumlah batang rokok yang dikonsumsi, semakin tinggi tekanan darahnya.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (Andriani et al., 2021) yang menemukan bahwa sebagian besar perokok aktif adalah laki-laki usia produktif yang merokok dalam jumlah yang bervariasi setiap harinya, seseorang yang merokok lebih dari sebungkus rokok per hari lebih besar kemungkinannya untuk mengalami hipertensi dibandingkan dengan seseorang yang tidak merokok. Namun temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian (Wahyuni et al., 2021) dengan hasil uji statistik Chi-Square pada tingkat kepercayaan 95% (0,05) menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0,446 sehingga ($P > 0,05$), menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara merokok dengan kejadian hipertensi pada petani di wilayah kerja Puskesmas Basala Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020.

Sebuah studi oleh (Wang et al., 2020) terhadap setengah juta partisipan di Cina menemukan bahwa merokok sangat terkait dengan penurunan tekanan darah sistolik (SBP) dan diastolik (DBP). Namun, kombinasi dari merokok dan penggunaan alkohol berhubungan dengan SBP dan DBP yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun merokok saja dapat menurunkan tekanan darah, kombinasi dengan alkohol dapat meningkatkannya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa Studi menunjukkan semakin lama seseorang merokok, semakin besar risiko terkena tekanan darah tinggi. Lamanya kebiasaan merokok berhubungan dengan kerusakan pembuluh darah dan tekanan darah tinggi. Menurut (Wahyuni et al., 2021) praktik merokok sangat berhubungan dengan kejadian tekanan darah tinggi. Pria lebih mungkin terlibat dalam percakapan dengan orang lain, oleh karena itu merokok lebih banyak meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Kebiasaan merokok para petani tercipta karena mereka bekerja hampir separuh hari dan menghabiskan waktu dengan orang lain, sehingga sulit bagi petani yang sudah lama merokok untuk berhenti. Akibatnya, keluarga mengambil langkah untuk mengurangi merokok untuk menghindari kenaikan tekanan darah.

beberapa orang yang bukan perokok memiliki tekanan darah tinggi. Hal ini dikarenakan risiko tekanan darah tinggi meningkat seiring bertambahnya usia, baik Anda merokok atau tidak. Selain itu, mengonsumsi makanan tinggi garam adalah salah satu alasan mengapa seorang non-perokok dapat mengembangkan hipertensi.

Hal ini didukung oleh hasil tabulasi silang antara variabel kebiasaan merokok dengan usia; dari 9 responden yang berada pada rentang usia lansia akhir, 66,7% tidak merokok; terlihat jelas bahwa

pada kelompok usia ini lebih banyak yang tidak merokok namun memiliki tekanan darah tinggi. Tabulasi silang antara faktor kebiasaan merokok dan pola konsumsi natrium menunjukkan bahwa dari 54 responden dengan pola konsumsi natrium tinggi, 38,9% tidak merokok, mengimplikasikan bahwa seseorang yang tidak merokok mengonsumsi banyak natrium.

Kebiasaan merokok para pekerja dapat meningkatkan risiko hipertensi dan kejadian kardiovaskular lainnya karena zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok, seperti nikotin, dapat masuk ke dalam aliran darah dan merusak dan menghancurkan dinding pembuluh darah. Kondisi ini meningkatkan risiko seseorang terkena gangguan kardiovaskular, termasuk hipertensi, yang didefinisikan sebagai tekanan darah yang tidak normal. Nikotin dalam rokok dapat meningkatkan tekanan darah karena menginduksi vasokonstriksi, mendorong jantung untuk bekerja lebih keras. Zat beracun rokok juga merusak lapisan endotel pada pembuluh darah (Naraswari et al., 2020).

Nikotin dalam tembakau menyebabkan peningkatan tekanan darah sesaat setelah menghirupnya. Nikotin, seperti senyawa lain yang ditemukan dalam asap rokok, diserap oleh kapiler darah kecil di paru-paru dan diangkut ke dalam aliran darah. Nikotin memasuki otak dalam beberapa detik. Otak merespons nikotin dengan memerintahkan kelenjar adrenal untuk melepaskan epinefrin (adrenalin). Hormon yang kuat ini menyempitkan arteri darah, menyebabkan jantung bekerja

lebih keras karena tekanan yang meningkat. Setelah hanya dua batang rokok, tekanan sistolik dan diastolik akan meningkat 10 mmHg (Wahyuni et al., 2021).

5. Hubungan Konsumsi Kafein dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang

Kopi telah dikonsumsi sejak zaman kuno, dan saat ini merupakan salah satu minuman paling populer di dunia. Telah lama ada kontroversi mengenai apakah minum kopi menyebabkan hipertensi. Menurut beberapa penelitian, minum kopi secara teratur justru dapat membantu mencegah hipertensi. Kadar polifenol, kalium, dan kafein dalam kopi dapat berpengaruh pada tekanan darah. Polifenol dan kafein menurunkan tekanan darah, sedangkan kafein meningkatkan tekanan darah.

Uji chi-square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara konsumsi kafein dan tekanan darah di kalangan petani. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Johanna M, 2008) bahwa satu cangkir kopi mengandung 75-200 mg kafein dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan tekanan darah sebesar 5-10 mmHg. Dalam penelitian ini, terdapat 38 partisipan (27,1%) yang minum kopi secara teratur, dan 102 orang (72,9%) berada dalam rentang risiko karena mengonsumsi empat cangkir kopi per hari.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Michael et al., 2023) Temuan dalam penelitian ini menguatkan bahwa

ada hubungan antara asupan kopi kronis dan peningkatan tekanan darah, yang menyiratkan bahwa minum kopi secara teratur dapat menyebabkan tekanan darah yang lebih tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sari et al., 2022) yang menemukan adanya hubungan antara konsumsi kopi dengan tekanan darah pada lansia dengan riwayat hipertensi, dengan nilai p-value sebesar 0,000 ($<0,05$). Kopi merupakan salah satu faktor risiko hipertensi karena mengandung kafein yang dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah.

Namun, penelitian ini bertentangan dengan temuan (Hashemi et al., 2023) yang menemukan bahwa pemberian kafein hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dampak terhadap peningkatan tekanan darah ($p=0,52$; $>0,05$). Penelitian ini juga tidak konsisten dengan penelitian (Kristanto, 2021) Analisis yang menggunakan *Pearson Correlation* untuk menguji hubungan antara pola konsumsi kopi dengan kejadian hipertensi menghasilkan nilai p-value sebesar 0,058. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pola konsumsi kopi dengan kejadian hipertensi ($p>0,05$).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa sering minum kopi berkafein dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, meskipun efeknya dapat bervariasi tergantung pada jumlah dan durasi konsumsi. Zat dalam tubuh yang membuat pembuluh darah melebar.

Hal ini menyebabkan arteri darah menyempit, sehingga meningkatkan tekanan darah.

Berdasarkan penelitian ini juga didapatkan bahwa terdapat individu yang tidak mengonsumsi kafein lebih berpotensi menderita tekanan darah tinggi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang berbeda, termasuk usia, yang meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi. Hal ini terjadi karena kelenturan arteri darah melemah seiring bertambahnya usia, yang mungkin menyebabkan tekanan darah tinggi. Pola makan yang tidak sehat, yang terdiri dari makanan yang banyak mengandung garam, lemak dan kalori, dapat meningkatkan tekanan darah. Makanan yang tidak sehat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap tekanan darah tinggi.

Hal ini dibuktikan dari hasil crosstabulasi antara variabel konsumsi kafein dengan usia, dari 102 dengan konsumsi kafein tidak berisiko paling banyak terdapat pada rentang usia dewasa akhir yakni (44,1%) dan (24,5%) responden pada rentang usia lansia awal yang tidak berisiko mengonsumsi kafein, hal tersebut terlihat bahwa pada rentang usia tersebut lebih banyak yang tidak berisiko tetapi mengalami tekanan darah tinggi. Crosstabulasi antara variabel konsumsi kafein dengan pendapatan dari 49 responden yang memiliki pendapatan tinggi, (81,6%) responden di antaranya tidak berisiko mengonsumsi kafein. Hasil crosstabulasi antara konsumsi kafein dengan kebiasaan merokok dari 102 responden yang tidak berisiko

mengonsumsi kafein, terdapat (30,4%) responden merupakan perokok sedang. Pada variabel pola konsumsi natrium didapatkan dari 54 responden dengan pola konsumsi natrium tinggi sebanyak (57,4%) responden yang tidak berisiko mengonsumsi kafein. Hal tersebut diketahui bahwa pola konsumsi natrium tinggi lebih banyak pada responden yang tidak berisiko mengonsumsi kafein. Crosstabulasi antara variabel pola konsumsi serat didapatkan bahwa dari 35 responden memiliki pola konsumsi kurang serat sebanyak (54,3%) responden yang tidak berisiko mengonsumsi kafein.

Pandangan masyarakat tentang penyebab hipertensi sangat beragam. Beberapa menyebutkan konsumsi garam yang berlebihan. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa hipertensi dipicu oleh makanan tertentu, seperti makanan asin, santan, dan durian. Faktor psikologis dan makanan yang tinggi natrium/garam (seperti ikan asin dan MSG) juga dianggap berkontribusi terhadap hipertensi (Bujawati et al., 2024).

Responden yang minum tiga cangkir kopi atau kurang per hari memiliki kemungkinan lebih rendah untuk memiliki tekanan darah yang tidak normal. Responden yang mengonsumsi lebih dari tiga cangkir kopi hitam per hari memiliki risiko lebih tinggi mengalami tekanan darah abnormal. Partisipan yang minum maksimal atau sama dengan tiga cangkir kopi per hari menunjukkan kesehatan jantung yang sebagian besar normal, sedangkan mereka yang minum lebih dari tiga

cangkir setiap hari memiliki tekanan darah yang bermasalah (Hartanti et al., 2019).

Menurut (Hashemi et al., 2023) kopi adalah salah satu sumber kafein yang paling pekat, yang merupakan salah satu penyebab tekanan darah tinggi. Kafein dapat melebarkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi. Kafein dapat meningkatkan kadar plasma beberapa hormon stress, seperti epinefrin, norepinefrin, dan kortisol yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah yang bergantung pada kepekatan kopi dan sensitivitas individu.

Menurut Weinberg dan Bonnie, konsumsi kafein dalam kopi hitam yang minimal akan memberikan efek yang minimal pada tekanan darah, sedangkan konsumsi kopi hitam yang lebih banyak dari itu akan memberikan efek yang lebih besar terhadap tekanan darah. Kopi hitam merupakan jenis kopi dengan kandungan kafein yang lebih tinggi dibandingkan kopi biasa, sehingga peningkatan tekanan darah akibat peningkatan konsumsi kopi hitam diasumsikan akibat pengaruh kafein.

Kopi hitam merupakan jenis kopi yang diekstraksi secara langsung tanpa campuran apapun yang menyebabkan kandungan kafein pada kopi hitam lebih tinggi daripada kandungan kafein pada kopi lainnya. Beberapa jurnal telah menjelaskan mengenai peranan kafein terhadap tekanan darah, termasuk meningkatkan aktivasi simpatis, antagonisme reseptor adenosine, peningkatan pelepasan norepinefrin melalui efek

langsung medulla adrenal, dan aktivasi sistem reningangiotensin (Naraswari et al., 2020)

Kadar kafein dalam kopi telah dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah. Cara kerja utama kafein adalah sebagai antagonis kompetitif pada reseptor adenosin. Adenosin bertindak sebagai vasodilator dalam pembuluh darah, tetapi juga memiliki efek inotropik dan kronotropik yang menguntungkan di jantung, meningkatkan irama jantung dan konduktivitas jantung. Kafein bekerja sebagai pesaing agresif terhadap adenosin, yang memiliki konsekuensi yang merugikan. Kafein dapat merelaksasi arteri darah sekaligus memberikan manfaat inotropik dan kronotropik yang positif. Kafein juga bekerja dengan menghasilkan kalsium melalui retikulum sarkoplasma dan menghambat internalisasi. Hal ini selanjutnya dapat meningkatkan kekuatan dan lamanya kedutan pada otot rangka dan jantung. Selain itu, kopi meningkatkan penyerapan norepinefrin, yang dapat menyebabkan vasokonstriksi, detak jantung yang lebih tinggi, dan kontraksi jantung yang lebih besar. Hal ini dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah (Wahyuni et al., 2021).

6. Hubungan Pola Konsumsi Natrium dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang

Konsumsi makanan tinggi natrium merupakan salah satu faktor diet yang berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa mayoritas partisipan

mengonsumsi makanan tinggi natrium dalam kategori yang tidak baik, yang didominasi oleh makanan asin dan makanan yang diawetkan. Paparan garam dan bahan makanan yang kaya natrium dapat mempersempit jalur arteri kecil di dinding arteri, sehingga meningkatkan beban mereka. Garam juga merangsang sistem hormon renin-angiotensin-aldosteron, yang meningkatkan tekanan darah

Asupan garam yang tinggi meningkatkan jumlah cairan ekstraseluler dalam darah, meningkatkan volume darah yang berkontribusi terhadap perkembangan hipertensi. Menggambarkan pola konsumsi garam subjek. Tingginya asupan natrium pada individu-individu tersebut disebabkan oleh konsumsi makanan olahan yang tinggi natrium, seperti kecap, roti putih, dan mie instan. Selain itu, wawancara dengan individu mengungkapkan bahwa penggunaan penyedap rasa dalam pengolahan makanan meningkatkan terjadinya hipertensi.

Berdasarkan hasil analisis uji *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value* 0,000 ($p < 0,05$) bahwa konsumsi natrium berhubungan dengan hipertensi sistolik maupun hipertensi diastolik petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (PusparanI, 2019) bahwa salah satu faktor yang berhubungan dengan konsumsi natrium yaitu faktor genetik, dimana faktor genetik seseorang yang memiliki

keluarga gaya hidupnya menyukai makanan asin maka keturunannya juga memiliki kesamaan yang sama.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa petani mengonsumsi makanan asin seperti ikan laut, dan jika sebuah keluarga mengonsumsi makanan asin maka tekanan darah akan meningkat. Nafsu makan petani dapat meningkat jika makanannya asin dan bukannya manis. Peningkatan asupan natrium harus dihindari karena dapat menyebabkan tekanan darah tinggi (Hartanti et al., 2019).

Penelitian sejalan dengan penelitian (Octarini et al., 2023) yang dilakukan di Kalimantan Selatan mengenai hubungan antara konsumsi natrium, frekuensi dan durasi olahraga dengan tingkat tekanan darah lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera dan Bina Laras Budi Luhur Kota Banjarbaru, yang menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara konsumsi natrium dengan tekanan darah sistol ($p < 0.05$) dan diastol ($p < 0.05$).

Hal ini diperkuat oleh penelitian (Melini & Tanuwijaya, 2021) yang menemukan hubungan yang kuat antara asupan garam dan perkembangan hipertensi. Dalam penelitian ini, lebih dari setengah dari mereka yang disurvei mengonsumsi natrium melebihi kebutuhan nutrisi mereka untuk hari itu. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Mantuges et al., 2021), yang menemukan hubungan antara konsumsi garam dan tekanan darah di Unit Rawat Jalan UPTD Puskesmas Pajang, Surakarta ($p=0,046$) (16). Konsumsi

natrium yang tinggi meningkatkan risiko terkena hipertensi sebesar 5,7 kali lipat dibandingkan dengan konsumsi garam yang sesuai ($p=0,016$).

Penelitian ini sejalan dengan dengan (Stamler, 1997) yang merupakan investigasi lintas negara terhadap lebih dari 10.000 partisipan dari 39 negara. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa ekskresi natrium urin secara substansial terkait dengan tekanan darah individu. Korelasi ini juga terlihat lebih besar pada orang lanjut usia dan mereka yang asupan kaliumnya tidak memadai.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa konsumsi natrium berlebih dapat menyebabkan pembengkakan pada dinding arteriol, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan darah. Pembengkakan ini membuat arteri lebih kaku dan sempit, sehingga darah harus dipompa dengan tekanan yang lebih tinggi untuk mengalir melalui pembuluh darah. Konsumsi natrium yang tinggi secara konsisten berkaitan dengan peningkatan tekanan darah. Peningkatan ini dapat terjadi karena natrium menarik air ke dalam pembuluh darah, meningkatkan volume darah dan tekanan di dalam pembuluh tersebut

Menurut temuan penelitian ini, beberapa responden yang mengonsumsi natrium dalam jumlah yang tidak mencukupi memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan lain, termasuk usia. Risiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. Hal ini terjadi karena fleksibilitas arteri darah melemah seiring bertambahnya usia, yang mungkin menyebabkan

tekanan darah tinggi. Pola makan yang tidak sehat, yang meliputi makanan tinggi garam, lemak, dan kalori, dapat meningkatkan tekanan darah secara signifikan.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil tabulasi silang antara variabel pola konsumsi natrium dengan usia, dari 86 responden dengan pola konsumsi natrium rendah, sebanyak (36,9%) berada pada rentang usia dewasa akhir, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat juga responden pada rentang usia dewasa akhir yang memiliki hipertensi meskipun mengonsumsi natrium rendah. Tabulasi silang pola konsumsi garam dengan pendapatan menunjukkan bahwa dari 91 responden yang berpenghasilan rendah, sebanyak 54,9 persen memiliki pola konsumsi natrium yang rendah. Selanjutnya, tabulasi silang antara variabel pola konsumsi natrium dengan kebiasaan merokok menunjukkan bahwa 62,8 persen dari 43 responden yang merupakan perokok sedang memiliki pola konsumsi natrium yang rendah, sedangkan 50 persen dari 26 responden yang merupakan perokok berat juga memiliki pola konsumsi natrium yang rendah.

Petani bawang sering mengonsumsi karbohidrat (nasi) dalam jumlah yang cukup banyak setiap kali makan. Selain nasi, makanan berlemak yang sering dikonsumsi adalah makanan yang digoreng, dan makanan seperti mie instan, kepiting, udang, ikan kering, dan ayam potong yang daging dapat dimakan selama seminggu atau sebulan, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit dalam sebulan karena setiap

orang hanya makan daging pada saat pesta atau acara-acara tertentu. Meskipun menjadi petani, masyarakat jarang mengonsumsi buah-buahan karena mereka percaya bahwa buah-buahan yang ditanam lebih baik dilelang daripada dimakan sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, kelompok ini hanya menanam buah-buahan sepanjang musim dan memanennya setahun sekali.

Natrium menjaga keharmonisan kimiawi tubuh, mengatur kadar cairan, dan memperkuat serta melenturkan membran sel. Selain itu, garam membantu penyaluran denyut saraf dan kontraksi otot, terutama di jantung. Ketika natrium dimakan, natrium akan mengikat air, sehingga air dapat diserap ke dalam sistem intravaskular dan meningkatkan volume darah. Tekanan darah meningkat sebanding dengan volume darah. Selain itu, natrium adalah zat terlarut dalam darah. Konsumsi garam menyebabkan konsentrasi zat terlarut yang tinggi, yang menyebabkan penyerapan air dan peningkatan tekanan darah.

Hasil food frequency questionnaire (FFQ) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa makanan yang mengandung natrium yang biasa dikonsumsi oleh petani bawang merah termasuk garam, kecap, dan ikan asin. Petani bawang yang menggunakan kecap manis setiap hari percaya bahwa gula dalam kecap manis tidak mengandung garam, sehingga aman untuk dikonsumsi, terutama bagi orang yang pernah menderita hipertensi. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kecap

manis mengandung monosodium glutamat (MSG). MSG dalam dosis besar dapat mempengaruhi tubuh dengan menyebabkan obesitas, kerusakan otak, radang hati, dan memperlambat pertumbuhan kecerdasan anak. Selain itu, membeli mie instan yang mengandung hingga 1000 mg natrium per bungkusnya dapat meningkatkan asupan natrium harian rata-rata.

Karena rasanya yang gurih, makanan asin dan makanan siap saji dapat merangsang nafsu makan. Akibatnya, jika dicerna secara teratur, kelebihan natrium akan terakumulasi dan menyebabkan hipertensi. Garam dikaitkan dengan peningkatan risiko hipertensi karena konsumsi garam yang tinggi mengurangi luasnya arteri, jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah dalam jumlah yang lebih besar melalui ruang yang lebih sempit, sehingga mengakibatkan tekanan darah yang lebih tinggi. Jumlah garam yang tinggi dalam darah memicu pusat rasa haus di otak, sehingga menyebabkan seseorang minum lebih banyak air (Wahyuni et al., 2021).

Dalam hal pengaturan pola makan, salah satu tantangan yang dihadapi manusia saat ini adalah mengonsumsi makanan yang kekurangan nutrisi, yang dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kuman dan virus yang masuk ke dalam tubuh dan menyebar ke seluruh pembuluh darah, sehingga membuat seseorang mudah terserang penyakit. Nutrisi dalam makanan harus diperiksa, terutama masalah gizi. Islam telah menjelaskan makanan apa saja yang dapat kita

konsumsi, khususnya makanan yang halal dan sehat (Nengsih et al. n.d.).

Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan pola makan di antaranya: Surah Al-Baqarah/2 : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (Kemenag RI, 2024)

Menurut tafsir Wajiz menyatakan Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia.

7. Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Tekanan Darah pada Petani Bawang

Pola konsumsi serat adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kebiasaan makan di Indonesia masih belum sesuai dengan pola makan ideal yang digariskan dalam pola pangan harapan. Konsumsi biji-bijian. Masih lazim dilakukan baik di perkotaan maupun di pedesaan, meskipun perlu dicatat bahwa konsumsi makanan yang berasal dari lemak, minyak, dan gula sudah berlebihan. Konsumsi kedua jenis makanan tersebut secara berlebihan akan berdampak buruk bagi kesehatan, terutama gangguan degeneratif seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes (Pangemanan et al., 2021).

Berdasarkan hasil analisis uji *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value* 0,006 ($p < 0,05$) bahwa konsumsi serat berhubungan dengan tekanan darah tinggi petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Baoqi, 2019) yang menyebutkan bahwa asupan serat memiliki hubungan yang signifikan terhadap hipertensi. Asupan sereal, dan sayur berserat terbukti menurunkan tekanan darah. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian (Marques, 2020) yang menyebutkan bahwa asupan buah dan sayur memiliki hubungan terhadap penurunan kejadian hipertensi pada mekanisme perubahan microbiota usus dan

memberikan peran perlindungan terhadap perkembangan penyakit jantung.

Berbeda dengan temuan (Nur'afni et al., 2023) analisis bivariat menunjukkan tidak ada hubungan antara serat makanan dengan kejadian hipertensi di Kecamatan Dampal Selatan. Menurut peneliti, rata-rata jumlah kecukupan serat pada penelitian ini masih lebih rendah dari angka kecukupan serat yang dianjurkan sehingga tidak berpengaruh terhadap tekanan darah. Kemudian, pada penelitian ini (Melini & Tanuwijaya, 2021) didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi serat dengan kejadian hipertensi. Hasil dari nilai p adalah 1,000. Responden mengonsumsi rata-rata 18,61 mg serat per hari, dengan rentang 7 mg hingga 44 mg. Hal ini terjadi karena konsumsi serat bukan satu-satunya komponen yang menyebabkan hipertensi.

Menurut penelitian (Ghavami et al., 2023) sebuah meta-analisis uji coba terkontrol secara acak (RCT) menunjukkan bahwa konsumsi serat larut dapat menurunkan tekanan darah sistolik (SBP) dan diastolik (DBP) secara signifikan. Studi ini menyimpulkan bahwa konsumsi serat larut yang lebih besar terkait dengan penurunan tekanan darah, terutama pada orang dengan hipertensi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi asupan serat makanan yang tinggi dapat membantu menurunkan tekanan darah. Serat makanan membantu meningkatkan kesehatan pembuluh darah

dan mengurangi tekanan pada dinding arteri, yang pada gilirannya dapat menurunkan tekanan darah. Studi menunjukkan bahwa ada hubungan antara asupan serat dan tekanan darah pada pasien hipertensi. Serat dapat membantu mengontrol berat badan, kadar kolesterol, dan mengurangi risiko penyakit jantung, yang semuanya berkontribusi pada kontrol tekanan darah.

Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang jarang mengonsumsi sayur dan buah, sehingga asupan seratnya rendah. Masyarakat masih belum memahami pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang cukup bagi penderita tekanan darah tinggi. Selain itu, masyarakat tidak terbiasa makan sayur dan buah secara teratur sejak kecil dan lebih memilih untuk mengonsumsi sayur dan buah tertentu saja, sehingga konsumsi serat menjadi lebih rendah.

Menurut temuan penelitian ini, lebih banyak responden dengan pola konsumsi serat yang cukup menderita hipertensi. Selain asupan serat, faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi antara lain stres, konsumsi natrium yang tinggi, kurangnya aktivitas fisik, dan faktor hormonal. Sebagai contoh, pada wanita, peningkatan hormon estrogen seiring bertambahnya usia dapat meningkatkan risiko hipertensi meskipun mereka mengonsumsi cukup serat. Individu yang mengonsumsi serat dalam jumlah yang cukup juga dapat terlibat dalam kebiasaan makan yang berbahaya, seperti makan makanan cepat saji atau makanan yang tinggi lemak dan garam, yang dapat meningkatkan

risiko hipertensi. Bahkan dengan asupan serat yang cukup, asupan nutrisi lain yang tidak seimbang, seperti kelebihan protein atau natrium, dapat menyebabkan hipertensi.

Hal ini dibuktikan dengan temuan tabulasi silang antara variabel konsumsi serat yang berkorelasi dengan usia. Dari 105 responden dengan pola konsumsi serat yang cukup, sebanyak (41%) berada pada rentang usia dewasa akhir dan (28,6%) berada pada rentang usia lansia awal. Dapat dilihat bahwa pada rentang usia dewasa akhir dan lansia awal, terdapat tambahan responden yang mengalami hipertensi dengan pola konsumsi serat yang cukup. Tabulasi silang antara variabel yang berkaitan dengan pola konsumsi serat dan pendapatan menunjukkan bahwa dari 105 responden dengan kebiasaan konsumsi serat yang cukup, sebanyak (62,9%) memiliki pendapatan yang rendah. Selanjutnya, tabulasi silang variabel rutinitas konsumsi natrium dan kebiasaan merokok menunjukkan bahwa 72,1% dari 43 perokok sedang memiliki pola konsumsi serat yang cukup, sementara 65,4% dari 26 orang yang merokok berat juga memiliki pola konsumsi serat yang cukup.

Dari hasil studi yang dilakukan menggunakan hasil food frequency questionnaire (FFQ) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa makanan yang mengandung serat yang jika dikonsumsi secara berlebihan tidak baik untuk penderita tekanan darah tinggi. Seperti sayuran tinggi garam yakni sayuran seperti tomat dan sayuran dalam

keluarga kubis-kubisan, seperti sawi dan kol, jika diolah dengan garam yang berlebih, dapat memicu kenaikan tekanan darah. sayur daun singkong, acar mentimun serta buah-buahan yang tinggi gula, seperti jeruk dan anggur, jika dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menyebabkan kenaikan kadar gula darah, yang pada gilirannya dapat berdampak pada tekanan darah.

Pola makan yang tidak seimbang, seperti pola makan tinggi lemak, kurang sayur dan buah, serta tinggi natrium, meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Konsumsi lemak jenuh secara teratur berkaitan erat dengan peningkatan berat badan, risiko aterosklerosis, dan risiko tekanan darah tinggi. Diet adalah praktik menetap yang melibatkan konsumsi makanan berdasarkan jenis makanan, seperti protein, sayuran, dan buah-buahan, serta frekuensi makan. Diet seimbang yang memenuhi semua kebutuhan nutrisi tubuh (Ghavami et al., 2023).

8. Kekuatan dan Keterbatasan Penelitian

a. Kekuatan

Tekanan darah diukur langsung pada individu yang diteliti, untuk memastikan hasil yang akurat dan valid. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan kesehatan dan memberikan intervensi yang lebih terfokus kepada petani bawang.

b. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat berpengaruh terhadap penelitian, yaitu tidak dilakukannya jeda waktu yang cukup antara pengukuran tekanan darah. Replikasi pengukuran berdasarkan jeda waktu yang memadai sangat penting untuk memastikan hasil yang akurat dan konsisten. Oleh karena itu hasil dalam penelitian ini mungkin dipengaruhi oleh variasi yang disebabkan oleh kurangnya jeda waktu yang tepat antara pengukuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait determinan biososial dan perilaku terhadap tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square menunjukkan nilai p-value 0,000 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan usia memiliki hubungan yang signifikan terhadap tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.
2. Terdapat hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square menunjukkan nilai p-value 0,257 ($>0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Sehingga, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin terhadap tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.
3. Terdapat hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square menunjukkan nilai p-value 0,028 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan pendapatan memiliki

hubungan yang signifikan terhadap tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

4. Terdapat hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square menunjukkan nilai p-value 0,007 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan kebiasaan merokok memiliki hubungan yang signifikan terhadap tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.
5. Terdapat hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square menunjukkan nilai p-value 0,000 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan konsumsi kafein memiliki hubungan yang signifikan terhadap tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.
6. Terdapat hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square menunjukkan nilai p-value 0,000 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan pola konsumsi natrium memiliki hubungan yang signifikan terhadap tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.
7. Terdapat hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square menunjukkan nilai p-value 0,006 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan pola konsumsi serat

memiliki hubungan yang signifikan terhadap tekanan darah pada petani bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

B. Implikasi Penelitian

Adapun saran dari hasil penelitian yang dilakukan terkait determinan biososial dan perilaku terhadap tekanan darah pada petani di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng yaitu:

1. Bagi pemerintah

- a) Pemerintah harus menerapkan kampanye pendidikan untuk mempromosikan gaya hidup sehat, termasuk diet seimbang yang mengikuti pedoman Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH). Hal ini termasuk mengonsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan membatasi asupan garam dan lemak jenuh
- b) Mendorong aktivitas fisik melalui program kebugaran yang ramah petani, seperti senam pagi atau olahraga yang sesuai dengan rutinitas sehari-hari. Aktivitas fisik dapat menurunkan risiko hipertensi.

2. Bagi Petani Bawang

- a) Petani didorong untuk mengurangi konsumsi natrium dengan memasak menggunakan sedikit garam dan menghindari makanan olahan tinggi natrium.

- b) Diharapkan untuk melakukan aktivitas fisik yang teratur seperti berjalan kaki atau aktivitas lainnya yang dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil
 - c) Petani diharapkan untuk menghindari rokok karena dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskuler.
 - d) Petani bawang diharapkan agar mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayuran secara teratur
3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau memperkaya sumber informasi terkait determinan biososial dan perilaku pada petani bawang, dan diharapkan juga dapat menambah variabel yang banyak terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah pada petani bawang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwijaya, H., & Kasmiaty. (2021). Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dengan Keinginan Untuk Berhenti Merokok Siswa di SMAN 2 Kota Palu. 4(1).
- Abineno, A. P., Fakultas, E. M., & Keperawatan, I. (2022). *Hubungan Indeks Massa Tubuh Dengan Tekanan Darah Pada Orang Dewasa*. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJNHS>
- Andriani, A., Rasni, H., Susanto, T., Aini Susumaningrum, L., & Siswoyo, S. (2021). Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Hipertensi pada Petani di Wilayah Kerja Puskesmas Panti Kabupaten Jember. *Jurnal Citra Keperawatan*, 9(1), 48-60. <https://ejournalcitrakeperawatan.com/index.php/JCK/article/view/129>
- Ajeng, A., Yoyoh, I., & Suryatama, R. (2020). Perbedaan Perilaku Konsumsi Kopi Terhadap Tekanan Darah di Puskesmas Kosambi Kabupaten Tangerang. 2.
- Alam, S., Ramadhani, M., Imcira, K., Farhansyah, M., Lestari, N. K., & Nadia, W. (2024). Determinan Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pada Mahasiswa Putra Di Fkik Uin Alauddin Makassar. *Ecohealth: Jurnal Inovasi Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja*, 1(1), 29-37.
- Ali, I. N. (2020). Hubungan Perilaku Merokok Dengan Kejadian Hipertensi.
- Angga, Y., Elon, Y., & Kesehatan Komunitas, J. (2021). Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Tekanan Darah *the Association between Smoking Habits and Blood Pressure of Adult Men ABSTRAK*. 7(1), 124-128. <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol7.Iss1.861>
- Anggraenny, N., & Martini, S. (2020). Hubungan Perilaku Merokok Dengan Tekanan Darah Sistolik Dan Tekana Darah Diastolik Pada Awak Kapal Di Wilayah Kerja. In *Medical Technology and Public Health Journal (MTPH Journal) | (Vol. 4, Issue 2)*.
- Brigita F, Tindangen, Fima F, G Langi, & Nova H, K. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi pada Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tombariri Timur. *Jurnal KESMAS, Vol. 9, No 1*.
- B. Sun, X. Shi, T. Wang, and D. Zhang, "Exploration of the association between dietary fiber intake and hypertension among US adults using 2017 American College of Cardiology/American Heart Association Blood Pressure Guidelines: NHANES 2007-2014," *Nutrients*, vol. 10, no. 8, p. 1091, 2019.

- Bujawati, E., Ansyar, D. I., Basri, S., & Ekasari, R. (2024). Cultural Penetration in Preventing Hypertension in the Ammatoa Kajang Tribe Community, Bulukumba, South Sulawesi. *Social Medicine*, 17(1), 35-39.
- Darmataty, T., Dewi, W. N., & Zulfitri, R. (2023). Hubungan Penerapan Perilaku Cerdik Dengan Derajat Hipertensi Pada Pasien Hipertensi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ners Indonesia*, 14(1), 1-7. <https://doi.org/10.31258/jni.14.1.1-7>
- Darwis, N., Surianti, T., Rusanda, R., & Keperawatan dan Kebidanan, F. (2019). Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Laki-Laki.
- Diana, T. S., & Hastono, S. P. (2023). Pengaruh Gaya Hidup terhadap Hipertensi pada Remaja: Literature Review. *Faletahan Health Journal*, 10(2), 169-177. www.journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ
- Donatila Mano S, Pasuarja Jeranding Ezra, Agnes Marcella, & Yohanes Firmansyah. (2023). Kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam Rangka Edukasi Masyarakat Terhadap Hipertensi serta Deteksi Dini Penyakit Gagal Ginjal Sebagai Komplikasi dari Hipertensi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 34-45. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v2i2.1776>
- Fadlilah, N., & Halim, A. R. (2023). *Higeia Journal of Public Health Research and Development* Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Nelayan Tradisional Saat Di Kapal Info Artikel. <https://doi.org/10.15294/higeia/v7i2/65760>
- Fadillah, L., Rahil, N.H, & Lanni, F. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tekanan Darah dan Saturasi Oksigen Perifer (SPO2). *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada* .
- Faisal, Demmalewa, J. Q., Abadi, E., Karya Kesehatan, Stik., & Jend, J. (2022). Hubungan Pola Makan Dan Perilaku Merokok Dengan Kejadian Hipertensi Pada Remaja Putra Di Wilayah Kerja Puskesmas Nambo, Sulawesi Tenggara. 2(2), 194-205.
- Febriyanto, K., Gunawan, M. C., & Amalia, N. (2019). Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Kelelahan Kerja Pada Petugas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda. In *Jurnal Dunia Kesmas* (Vol. 8).
- Fifianah, F., Irawati, D. N., Triastuti, N., & Airlangga, M. P. (2022). Hubungan Konsumsi Kopi dan Kebiasaan Merokok Terhadap Peningkatan Tekanan Darah Pada Nelayan di Desa Warulor Paciran Lamongan.
- F. Z. Marques et al., "High-fiber diet and acetate supplementation change the gut microbiota and prevent the development of hypertension and heart

- failure in hypertensive mice," *Circulation*, vol. 135, no. 10, pp. 964–977, 2020.
- Fifianah, F., Irawati, D. N., Triastuti, N., & Airlangga, M. P. (2022). *Hubungan Konsumsi Kopi dan Kebiasaan Merokok Terhadap Peningkatan Tekanan Darah Pada Nelayan di Desa Warulor Paciran Lamongan*.
- Ghavami, A., Banpouri, S., Ziaei, R., Talebi, S., Vajdi, M., Nattagh-Eshtivani, E., Barghchi, H., Mohammadi, H., & Askari, G. (2023). *Effect of soluble fiber on blood pressure in adults: a systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials*. *Nutrition Journal*, 22(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12937-023-00879-0>
- Gao, N., Liu, T., Wang, Y., Chen, M., Yu, L., Fu, C., & Xu, K. (2023). *Assessing the association between smoking and hypertension: Smoking status, type of tobacco products, and interaction with alcohol consumption*. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1027988>
- Garwahasada, E., & Wirjatmadi, B. (2020). *Hubungan Jenis Kelamin, Perilaku Merokok, Aktivitas Fisik Dengan Hipertensi Pada Pegawai Kantor* *Correlation of Sex, Smoking Habit, Physical Activity and Hypertension among Office Employee*. <https://doi.org/10.204736/mgi.v15i1.60-65>
- Grillo, A., Salvi, L., Coruzzi, P., Salvi, P., & Parati, G. (2019). Sodium intake and hypertension. *Nutrients*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/nu11091970>
- Haerunisa N. (2020). *Hubungan Kualitas Tidur dengan Daya Konsentrasi pada Mahasiswa Kedokteran*.
- Handayani, S., Amiruddin, F., Tangdilian, R., Padallingan, T., & Puspita Sari, E. (2023). *Literasi Kesehatan Tentang Bahaya Rokok Pada Anak Sekolah Dasar*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1).
- Hartanti, Marlinda, Putri, & Mifbakhuddin. (2019). *Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi Pada Petani*. *J. Kesehat. Masy. Indones*, 10(1), 2019.
- Hashemi, S. A., Hosseininasab, D., Rastgoo, S., Shiraseb, F., & Asbaghi, O. (2023). *The effects of caffeine supplementation on blood pressure in adults: A systematic review and dose-response meta-analysis*. *Clinical Nutrition ESPEN*, 58, 165–177. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2023.09.923>
- Hidayat, T. (2021). *Literatur Reviuw: Hubungan Kebiasaan Merokok Terhadap Kejadian Hipertensi*.
- Hutapea, G. (2021). *Hubungan Perilaku Merokok Dengan Kejadian Insomnia Pada Remaja Dan Dewasa oleh Hutapea, Gabbe*. <https://www.researchgate.net/publication/348777339>

- Irwanto, F. S., Hasni, D., Anggraini, D., & Febrianto, B. Y. (2023). Hubungan Pola Konsumsi Lemak Dan Sodium Terhadap Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Perempuan Etnis Minangkabau. <http://journal.scientic.id/index.php/sciena/issue/view/8>
- Immawanti. (2021). Pengaruh Pemberian Air Seduhan Bawang Putih Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pamboang Kabupaten Majene Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Marendeng*, 1(1), 30–37. <https://doi.org/>
- Juditha, C. (2020). *People Behavior Related to The Spread of Covid-19's Hoax*. *Journal Pekommas*, 5(2), 105. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050201>
- Julaecha, J., & Wuryandari, A. G. (2021). Pengetahuan dan Sikap tentang Perilaku Merokok pada Remaja. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 10(2), 313. <https://doi.org/10.36565/jab.v10i2.337>
- Jung, S., Kim, M. K., Shin, J., Lee, N., Woo, H. W., Choi, B. Y., Shin, M. H., Shin, D. H., & Lee, Y. H. (2020). *Positive association of alcohol consumption with incidence of hypertension in adults aged 40 years and over: Use of repeated alcohol consumption measurements*. *Clinical Nutrition*, 39(10), 3125–3131. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.01.020>
- Julianty pradono, N. K. R. R. (2020). *Hipertensi Pembunuh Terselubung di Indonesia*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (PLB).
- Kartikadewi, A., Wahab, Z., Andikaputri, K., Kedokteran, F., Muhammadiyah Semarang Jl Kedungmundu Raya No, U., Semarang, K., & Tengah Kode Pos, J. (2022). *Ankle Brachial Index pada Penderita Diabetes dan non-diabetes, dan Hubungannya dengan Aktivitas Fisik dan Perilaku Merokok*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK>
- Kemenkes. (2013). Laporan Nasional Riskesdas Tahun 2013.
- Kemenkes, (2022). Laporan Nasional Riskesdes Tahun 2022.
- Kifle, Z. D., Alehegn, A. A., Adugna, M., & Bayleyegn, B. (2021). *Prevalence and predictors of dyslipidemia among hypertensive patients in Lumame Primary Hospital, Amhara, Ethiopia: A cross-sectional study*. *Metabolism Open*, 11, 100108. <https://doi.org/10.1016/j.metop.2021.100108>
- Krittawong, C., Kumar, A., Wang, Z., Baber, U., & Bhatt, D. L. (2020). *Self-employment and cardiovascular risk in the US general population*. *International Journal of Cardiology: Hypertension*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.ijchy.2020.100035>

- Kurniasih, Y. (2019). Hubungan Perilaku Merokok Dengan Peningkatan Tekanan Darah Pada Laki-Laki Dewasa Di Kampung Telaga Rindu Pungur Kota Batam *Yulvina kurniasih*.
- Kristanto, B. (2021). Hubungan Kebiasaan Mengonsumsi Kopi Dengan Kejadian Hipertensi. *KOSALA: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 9(2), 73–84. <https://doi.org/10.37831/kjik.v9i2.215>
- Li, G., Wang, H., Wang, K., Wang, W., Dong, F., Qian, Y., Gong, H., Hui, C., Xu, G., Li, Y., Pan, L., Zhang, B., & Shan, G. (2017). *The association between smoking and blood pressure in men: A cross-sectional study. BMC Public Health*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-017-4802-x>
- Lukitaningtyas, D., & Cahyono, E. A. (2023). Hipertensi; Artikel Reviuw. *Jurnal Pengembangan Ilmu Dan Praktik Kesehatan*, Vol 2, No 2.
- Lestari, D., Puspitsari, P., & Amrullah, J. F. (2022). Pengaruh pemberian pendidikan kesehatan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan terhadap pengetahuan pengemudi dalam menolong kecelakaan lalu lintas. XVI, 346–361
- Lemone Priscilla, K. M. Burke. G. B. ff. (2018). *buku ajar keperawatan medikal bedah: egc*.
- Manik, L. A., Sri, I., & Wulandari, M. (2020). Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Anggota Prolanis Di Wilayah Kerja Puskesmas Parongpong. In *Chmk Nursing Scientific Journal* (Vol. 4).
- Mayasari, M., Waluyo, A., Jumaiyah, W., & Azzam, R. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 1(2), 344–353. <https://doi.org/10.31539/joting.v1i2.849>
- Mahendra, M. M., & Ardani, I. G. A. K. S. (2015). Pengaruh Umur, Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Niat Beli Konsumen Pada Produk Kosmetik the Body Shop di Kota Denpasar. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 4(2), 442–456.
- Mariyani, M., Azriful, A., & Bujawati, E. (2021). Family support through selfcare behavior for hypertension patients. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*, 1-8.
- Miciko Umeda, N. M. D. M. W. J. N. (2020). *modul hipertensi* (N. M. D. M. W. J. N. Miciko umeda, Ed.). Fakultas Ilmu keperawatan- Universitas Muhammadiyah Jakarta. <http://fikumj.ac.id>
- Mufaidah, S., Mandagi, A. M., & Masyarakat, F. K. (2019). Hubungan Imt, Usia Dan Kebiasaan Merokok Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Nelayan Kub Pondok Layar Relationship Between Body Mass Index, Age, And Smoking Habit Among Hypertension in Fisherman Kub Pondok Layar. *Journal of Community Mental Health and Public Policy*.

- Muhaimin, T., Anwar, S., & Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, F. (2019). Pengaruh Aktivitas Olah Raga Dan Perilaku Merokok Terhadap Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Tomini Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019.
- Munir, M. (2019). Gambaran Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki. *Jurnal Kesehatan*, 12(2), 112. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v12i2.10553>
- Mantuges, S. H., Widiyany, F. L., & Astuti, A. T. (2021). Pola konsumsi makanan tinggi natrium, status gizi, dan tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Mantok, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. *Ilmu Gizi Indonesia*, 4(2), 97. <https://doi.org/10.35842/ilgi.v4i2.161>
- Masoli, J. A. H., Mensah, E., & Rajkumar, C. (2022). *Age and ageing cardiovascular collection: blood pressure, coronary heart disease and heart failure. Age and Ageing*, 51(8), 1–4. <https://doi.org/10.1093/ageing/afac179>
- Melini, D. O. C. W., & Tanuwijaya, R. R. (2021). Jurnal Status Gizi. *Jurnal Nutrisia*, 23(2), 101–108. <https://doi.org/10.29238/jnutri.v23i2.241>
- Miciko Umeda, N. M. D. M. W. J. N. (2020). *Modul Hipertensi* (N. M. D. M. W. J. N. Miciko umeda, Ed.). Fakultas Ilmu keperawatan- Universitas Muhammadiyah Jakarta. <http://fikumj.ac.id>
- Nikmah, S. S., & Pawenang, E. T. (2020). 381 HIGEIA 4 (Special 2) (2020) Higeia *Journal of Public Health Research and Development*. <https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%202/33975>
- Nurlani, I., Dwimawati, E., & Nasution, A. (2023). Hubungan antara Perilaku Merokok dengan Kejadian Insomnia pada Remaja Laki-Laki di Wilayah Taman Muara RW 09 Kelurahan Pasir Jaya Tahun 2022. 6(4), 345–350. <https://doi.org/10.32832/pro>.
- Naraswari, N. M. S. M., Sutadarma, I. W. G., & Dewi, N. N. A. (2020). Hubungan konsumsi kopi hitam terhadap tekanan darah pada perokok dewasa. *Intisari Sains Medis*, 11(3), 1236–1241. <https://doi.org/10.15562/ism.v11i3.700>
- Nur'afni, Masfufah, & Imansari, A. (2023). Pola Makan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Awal Di Kecamatan Dampal Selatan. *Binawan Student Journal (BSJ)*, 5, 70–76.
- Octarini, D. L., Meikawati, W., & Purwanti, I. A. (2023). Hubungan Kebiasaan Konsumsi Makanan Tinggi Natrium dan Kalium Dengan Tekanan Darah Pada Usia Lanjut. *Prosiding Seminar Kesehatan Masyarakat*, 1(September), 10–17. <https://doi.org/10.26714/pskm.v1iseptember.186>

- Pangemanan, R. H., Kindangen, P., & Masinambow, V. A. . (2021). Analisis Ketersediaan Pangan Pokok Dan Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Pasan, Tombatu Timur dan Belang Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 1–21. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jpekd/article/view/35502/33220>
- Pradipta, G. N. (2015). Huubungan asupan Kalium, Kalsium dan kebiasaan merokok dengan kepadatan tulang pria dewasa awal. *Journal of Nutrition Collage*, 374.
- Podungge, Y. (2020). Hubungan Umur dan Pendidikan dengan Hipertensi pada Menopause. *Gorontalo Journal of Public Health*, 3(2), 154–161.
- Rachmawati, L., Suhartono, S., & Budiyo, B. (2020). Faktor yang Berhubungan dengan Tekanan Darah pada Petani Penyemprot Tanaman Hortikultura di Desa Trayu Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(1), 38–42. <https://doi.org/10.14710/mkmi.19.1.38-42>
- Rahmatika, A. F. (2020). Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Hipertensi. *Jurnal Medika Utama, Vol 02. No 02*.
- Raziansyah, & Amalia, N. R. (2022). Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura 2 *Relationship of Lifestyle with Hypertension in The Work Area of Puskesmas Martapura 2*. <https://doi.org/10.54004/join.v1i2.xx>
- Rejo, & Nurhayati, I. (2020). Hubungan Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang Hipertensi dengan Klasifikasi Hipertensi *the Carrelation of a Family Knowledge Level of Hypertension with Hypertension Classification*.
- Rezeki, S., & Utari, D. M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Anak Sekolah Dasar di SD Pinggiran Banda Aceh Tahun 2021 (*Affecting Factors Smoking Behavior in Suburban Elementary School of Children at Banda Aceh in 2021*). In *Journal of Healthcare Technology and Medicine* (Vol. 7, Issue 1).
- Rismadi, K., & Merindany, T. (2023). Hubungan Perilaku Kebiasaan Merokok Dengan Kejadian Hipertensi di Desa Klumpang Kebun Deli Serdang Hamparan Perak (Vol. 3, Issue 2).
- Sabrina, S. (2021). Hubungan Kebiasaan Merokok Dan Penderita Covid-19: Studi Literatur.
- Sasmalinda, L., Syafriadi & Helma. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Tekanan Darah Pasien di Puskesmas Malalo Batipuh Selatan dengan Menggunakan Regresi Linear Berganda.

- Sari, F., Reni Zulfitri, & Nopriadi. (2022). Hubungan Kebiasaan Konsumsi Kopi dengan Tekanan Darah pada Lansia Riwayat Hipertensi. *Jurnal Vokasi Keperawatan (JVK)*, 5(2), 138–147. <https://doi.org/10.33369/jvk.v5i2.24114>
- Stamler, J. (1997). The INTERSALT study: Background, methods, findings, and implications. *American Journal of Clinical Nutrition*, 65(2 SUPPL.), 626S–642S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/65.2.626S>
- Sahuri, S., & Sahna, S. A. (2021). Efektivitas Program Penyuluhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Petani Bawang Merah saat Pemberian Pestisida di Desa Tegalglagah. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 20(3), 111–117. <https://doi.org/10.33221/jikes.v20i3.1445>
- Salsabila, N. N., Indraswari, N., & Sujatmiko, B. (2019). Gambaran Kebiasaan Merokok Di Indonesia Berdasarkan Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5). In *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia* (Vol. 7, Issue 1).
- Siburian, T. D. S., Yustina, I., & Juanita. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok di Dalam Rumah pada Petani Sawah di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Health Sains*, Vol. 2, No. 4.
- Siregar, E. A. (2020). Hubungan Perilaku Merokok Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Ulumahuam Kabupaten Labuhanbatu Selatan Skripsi.
- Siregar, P. A., Fatimah Sari Simanjuntak, S., Harianti Br Ginting, F., Tarigan, S., Hanum, S., & Syra Utami, F. (2020). Analisis Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Masyarakat Pesisir Kota Medan (Aspek Sosial Budaya Masyarakat Pesisir). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8(1). <http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP>
- Sofia Rongalaha, A., Asih Blandina, O., Salamor, J. M., & MSalamor, J. (2021). Hubungan Peran Orang Tua Terhadap Perilaku Merokok Remaja Di Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat*, 1(2). <http://ejournal.lppmunhena.ac.id/index.php/leleani>
- Stokes, G. S. (2009). *Clinical Interventions in Aging Management of hypertension in the elderly patient*. In *Clinical Interventions in Aging*. www.dovepress.com
- Supriadi, D., Kusumawaty, J., Nurapandi, A., Putri, R. Y., & Sundewi, A. (2023). Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Intensitas Hipertensi Pada Lansia Laki-Laki Di Kelurahan Ciamis.
- Satriawan, D. (2022). Gambaran Kebiasaan Merokok Penduduk di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 51– 58. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i2.243>

- Simamora, H. G., Simbolon, N., Sianturi, E., Studi, P., Gizi, S., Santa, S., & Medan, E. (2020). Hubungan Pola Makan Dengan Hipertensi Pada Lansia Di Kelurahan Mangga Dua Week VII Simalingkar. *Jurnal Keperawatan Wiyata*, 1(1).
- Tindangen, B. F. N. E., Langi, F. F. L. G., & Kapantow, N. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tombariri Timur. *Kesmas*, 9(1), 189–196.
- Tumanduk, W. M., Nelwan, J. E., & Asrifuddin, A. (2019). *Faktor-faktor risiko hipertensi yang berperan di Rumah Sakit Robert Wolter Mongisidi*.
- Wardana, A. S., Ma'rufi, I., & Widi, R. (2020). Smoking habits and the age of ARI Occurrence in Farmers in Ijen District Bondowoso. In *Multidisciplinary Journal* (Vol. 3, Issue 2). <http://staff.blog.ui.ac.id/ari.fahrrial/files/2012/04/Dampak->
- Wijaya, A. (2020). *Hubungan Kelelahan Kerja Dengan Kejadian Hipertensi Pada Petani di Kecamatan Panti Kabupaten Jember*.
- Widyatama, H. G. et al. (2020) 'Usia dan jumlah rokok meningkatkan tekanan darah', *Ilmiah Kesehatan IQRA*, 8(2), pp. 69–76. Available at: Peningkatan tekanan darah; Usia, Periode merokok; Jumlah batang rokok; Jenis rokok.
- Wahyuni, W., Yusran, S., Yusran, S., Harleli, H., & Harleli, H. (2021). Hubungan Pola Makan Dan Gaya Hidup Dengan Kejadian Hipertensi Pada Petani Di Wilayah Kerja Puskesmas Basala Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020. *Jurnal Gizi Dan Kesehatan Indonesia*, 1(2), 65–73. <https://doi.org/10.37887/jgki.v1i2.17324>
- Wang, M., Li, W., Zhou, R., Wang, S., Zheng, H., Jiang, J., Wang, S., Yu, C., Gao, W., Lv, J., Wu, T., Cao, W., Hu, Y., Li, L., & Ji, J. S. (2020). *The paradox association between smoking and blood pressure among half million chinese people. International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(8), 7–17. <https://doi.org/10.3390/ijerph17082824>
- Widjaya, N., Anwar, F., Laura Sabrina, R., Rizki Puspawati, R., & Wijayanti, E. (2019). Hubungan Usia Dengan Kejadian Hipertensi di Kecamatan Kresek dan Tegal Angus, Kabupaten Tangerang. *Jurnal Kedokteran YARSI*, 26(3), 131–138. <https://doi.org/10.33476/jky.v26i3.756>
- WHO. (2023). *World Health Organization, Hypertension*.
- Yana, P. R., Santi, T. D., Fahdhienie, F., & Baharuddin, D. (2023). Case Control Study Faktor Risiko Kejadian Hipertensi pada Pegawai Kantor Gubernur Aceh Kota Banda Aceh Tahun 2022. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(9), 1827–1834. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i9.3605>

- Yunus, M., Aditya, I. W. C., & Eksa, D. R. (2021). Hubungan Usia dan Jenis Kelamin dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kab. Lampung Tengah. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, vol 8, No 3.
- Yusmaniar, & Safitri, F. (2022). Hubungan Perokok dan Riwayat Keluarga dengan Kejadian Hipertensi Pada Pasien di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Tingkat II Iskandar Muda Banda Aceh *Relationship of Smokers and Family History with the Event of Hypertension in Patients in Disease Poly in Level II Hospital*. In *Journal of Healthcare Technology and Medicine* (Vol. 8, Issue 2).
- Zuo, J., Chao, H., Tang, B., Avolio, A. P., Schlaich, M. P., Nolde, J. M., Adji, A., & Carnagarin, R. (2021). *Female gender is associated with higher susceptibility of weight induced arterial stiffening and rise in blood pressure*. *Journal of Clinical Medicine*, 10(16), 1–12. <https://doi.org/10.3390/jcm10163479>

Lampiran 1**LEMBAR CONSENT****PERSETUJUAN RESPONDEN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Usia :

Alamat :

Menyatakan saya bersiap menjadi responden atau subjek penelitian yang berjudul “Determinan Biososial dan Perilaku Terhadap Tekanan Darah Pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng”. Saya telah mendapatkan penjelasan secara rinci terkait informasi jalannya penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan sesuatu yang merugikan bagi saya dan anak saya, sehingga saya secara sadar memberikan persetujuan untuk ikut serta dalam kegiatan ini.

Demikian pernyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bantaeng,

2024

Responden

Peneliti

(.....)

(Dewi Sri Handayani)

Lampiran 2



KUISIONER PENELITIAN

A. IDENTITAS RESPONEN

1. Nama : _____
2. Umur : _____ Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki
4. Pendapatan : ≤UMR (Rp. 3.294.467)
 >UMR (Rp. 3.294.467)

B. TEKANAN DARAH

1. Sistolik : _____ mmHg
2. Diastolik : _____ mmHg

C. KUISIONER KEBIASAAN MEROKOK

Petunjuk: berikanlah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (X)

1. Apakah anda merokok?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Berapa batang rokok yang anda habiskan setiap hari?
 - a. ≤ 10 batang
 - b. 11 – 20 batang
 - c. ≥ 21 batang

3. Jenis rokok apa yang anda hisap?
 - a. Rokok Kretek
 - b. Rokok Filter
 - c. Rokok Putih
 - d. Rokok Gulung Sendiri (Roll-Your-Own)

D. KUESIONER KONSUMSI KAFEIN

1. Apakah anda minum kopi?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Berapa cangkir kopi yang diminum dalam sehari?
= _____ Cangkir

E. KUESIONER POLA KONSUMSI NATRIUM DAN SERAT

Berilah tanda (√) pada kolom frekuensi yang sesuai berdasarkan jenis bahan makanan dan frekuensi makanan yang tersedia

FORMULIR FOOD FREQUENCY QUESTIONARE

Bahan Makanan	Frekuensi					
	>1x/hari	1x/hari	3-6x/minggu	1-2x/minggu	2-3x/bulan	Tidak Pernah
Sumber Natrium						
Roti Putih						
Biskuit						
Sagu						
Mie						
Bihun goreng						
Daging ayam						
Sarden kaleng						
Telur ayam						
Ikan asin						
Telur asin						
Udang						
Kepiting						

Bahan Makanan	Frekuensi					
	>1x/hari	1x/hari	3-6x/minggu	1-2x/minggu	2-3x/bulan	Tidak Pernah
Kecap						
Garam						
MSG						
Keju						
Kentang goreng						
Sosis						
Sayur-Sayuran						
Timun						
Daun bawang						
Daun singkong						
Daun melinjo						
Bayam						
Kangkung						
Labu siam						
Wortel						
Kol						
Kacang Panjang						
Sawi						
Tomat						
Buah-Buahan						
Jeruk						
Alpukat						
Jambu air						
Papaya						
Melon						
Pisang						
Apel						
Nanas						
Sukun						
Durian						



KUISIONER PENELITIAN

A. IDENTITAS RESPONEN

1. Nama : Amir
2. Umur : 42 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki
4. Pendapatan : ≤UMR (Rp. 3.294.467)
 >UMR (Rp. 3.294.467)

B. TEKANAN DARAH

1. Sistolik : 140 mmHg
2. Diastolik : 90 mmHg

C. KUISIONER KEBIASAAN MEROKOK

Petunjuk: berikanlah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (X)

1. Apakah anda merokok?

Ya

Tidak

2. Berapa batang rokok yang anda habiskan setiap hari?

a. ≤ 10 batang

≥ 21 batang

3. Jenis rokok apa yang anda hisap?

a. Rokok Kretek

Rokok Filter

c. Rokok Putih

d. Rokok Gulung Sendiri (Roll-Your-Own)

D. KUESIONER KONSUMSI KAFEIN

1. Apakah anda minum kopi?

Ya

b. Tidak

2. Berapa cangkir kopi yang diminum dalam sehari?

= 3 Cangkir

E. KUESIONER POLA KONSUMSI NATRIUM DAN SERAT

Berilah tanda (\checkmark) pada kolom frekuensi yang sesuai berdasarkan jenis bahan makanan dan frekuensi makanan yang tersedia

FORMULIR FOOD FREQUENCY QUESTIONARE

Bahan Makanan	Frekuensi					
	>1x/hari	1x/hari	3-6x/minggu	1-2x/minggu	2-3x/bulan	Tidak Pernah
Sumber Natrium						
Roti Putih				<input checked="" type="checkbox"/>		
Biskuit				<input checked="" type="checkbox"/>		
Sagu						<input checked="" type="checkbox"/>
Mie			<input checked="" type="checkbox"/>			
Bihun goreng						<input checked="" type="checkbox"/>
Daging ayam				<input checked="" type="checkbox"/>		
Sarden kaleng						<input checked="" type="checkbox"/>

$$\frac{\text{Skor Natrium}}{\text{Jml. Pertanyaan}} = \frac{285}{18} = 15,8 \text{ (tidak baik).}$$

(Tinggi natrium)

Bahan Makanan	Frekuensi					
	>1x/hari	1x/hari	3-6x/minggu	1-2x/minggu	2-3x/bulan	Tidak Pernah
Telur ayam	✓					
Ikan asin			✓			
Telur asin						✓
Udang				✓		
Kepiting				✓		
Kecap	✓					
Garam	✓					
MSG	✓					
Keju						✓
Kentang goreng						✓
Sosis					✓	
Sayur-Sayuran						
Timun					✓	
Daun bawang				✓		
Daun singkong				✓		
Daun melinjo						✓
Bayam				✓		
Kangkung			✓			
Labu siam				✓		
Wortel				✓		
Kol				✓		
Kacang Panjang				✓		
Sawi				✓		
Tomat				✓		
Buah-Buahan						
Jeruk					✓	
Alpukat					✓	
Jambu air					✓	
Papaya				✓		
Melon						✓
Pisang			✓			
Apel						✓
Nanas						✓
Sukun					✓	
Durian				✓		

$$\frac{\text{Skor Semat}}{\text{Jl. Pertanyaan}} = \frac{165}{22} = 7,5 \text{ (ukup)}$$

Lampiran 3

Keterangan Layak Etik Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Jl.H.M. Yasir Lampo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepkk.frik@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.B.088/KEPK/FKIK/V/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Dewi Sri Handayani
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"DETERMINAN BIOSOSIAL DAN PERILAKU TERHADAP TEKANAN DARAH
PADA PETANI BAWANG DI DESA BONTO KARAENG
KECAMATAN SINOA KABUPATEN BANTAENG"**

**"BIOSOCIAL AND BEHAVIORAL DETERMINANTS OF BLOOD PRESSURE ON
ONION FARMERS IN BONTO KARAENG VILLAGE,
SINOA DISTRICT, BANTAENG DISTRICT"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025.

This declaration of ethics applies during the period May 17, 2024 until May 17, 2025.

May 17, 2024

Professor and Chairperson,



Dr. Apt. Ismail, S.Si., M.Si.

Lampiran 4

Surat Izin Meneliti LP2M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@iain-alauddin.ac.id website : lp2m.iain-alauddin.ac.id

Nomor : B- 6012/Un.05/LP2M/PP.00.9/2/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Dewi Sri Handayani
 NIM : 70200120121
 Semester/T.A. : VII (Delapan)/T.A. 2023-2024
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat
 Alamat : Romang Polong, Jl Mustafa Dg Bunga
 No. HP : 085943503947

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Determinan Biososial dan Perilaku Terhadap Tekanan Darah Pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng** dari tanggal **26 Februari - 26 Maret 2024.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Strip : - mahasiswa yang bersangkutan
 - peringat

Lampiran 5

Surat Izin Meneliti DPM PTSP



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 449936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 4265/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Bantaeng
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-6012/Un.06/LP2M/PP.00.9/2/2024 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: DEWI SRI HANDAYANI	
Nomor Pokok	: 70200120121	
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang palong-Gowa	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Determinan Biososial dan Perilaku Terhadap Tekanan Darah Pada Petani Bawang di Desa BontoKaraeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 Februari s/d 26 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

Lampiran 6

Surat Izin Meneliti DPM PTSP Kabupaten Bantaeng



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7/41/SKP/DPM-PTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : DEWI SRI HANDAYANI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 N I M : 70200120121
 No. KTP : 7303014309020004
 Program Studi : Kesehatan Masyarakat
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Alamat : Tala- Tala Kec. Bissappu Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :
 " Determinan Biososial dan Perilaku Terhadap Tekanan Darah Pada Petani Bawang di Desa Bonto Karaeng
 Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng "

Lokasi Penelitian : Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Lama Penelitian : 26 Februari 2024 s.d. 26 Maret 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1202419328000041



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
 Pada tanggal : 04 Maret 2024
 a.n. BUPATI BANTAENG

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
 Pangkat : Pembina TK.I, IV/b

Lampiran 7

Surat Keterangan Selesai Meneliti

 **PEMERINTAH DESA BONTO KARAENG**
KECAMATAN SINOA
KABUPATEN BANTAENG
Alamat : Parasangan Beru Desa Bonto Karaeng Kec.Sinoa Kab.Bantaeng

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 120/BTK/KSN/V/2024

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama	: H.ARIFUDDIN.P
Jabatan	: Kepala Desa Bonto Karaeng
Alamat	: Desa Bonto Karaeng Kec.Sinoa Kab.Bantaeng

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama	: DEWI SRI HANDAYANI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nim	: 70200120121
Nik KTP	: 7303014309020004
Program Study	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat	: Tala-tala Kec.Bissappu Kab.Bantaeng

Telah melaksanakan Penelitian Sejak tanggal 26 Februari 2024 s/d 26 Maret 2024 Dengan judul **DETERMINAN BIOSOSIAL DAN PERILAKU TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PETANI BAWANG DI DESA BONTO KARAENG KECAMATAN SINOA KABUPATEN** Yang berlokasi di Desa Bonto Karaeng Kec.Sinoa Kab.Bantaeng dan telah dilaksanakan secara tuntas.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bonto Karaeng, 27 Mei 2024
Kepala Desa Bonto Karaeng


H.ARIFUDDIN.P

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 8

Pemeriksaan Pengukuran Tekanan Darah pada Petani Bawang



M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 9

Wawancara dan Pengisian Kuesioner pada Responden



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

IN
R



MASTER TABEL KUESIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN						PENGUKURAN TEKANAN DARAH			KEBIASAAN MEROKOK				KONSUMSI KAFEIN			POLA KONSUMSI NATRIUM		POLA KONSUMSI SERAT	
R	U	K1	JK	P	K2	Sistolik	Diastolik	K3	B1	B2	B3	K4	C1	C2	K5	D	K6	E	K7
R1	45	2	0	0	0	140	90	1	0	0	0	0	1	4	1	14.4	1	15.4	0
R2	50	3	0	0	0	130	80	0	0	0	0	0	1	4	1	16.1	0	8.8	1
R3	40	2	1	0	0	120	70	0	1	2	1	2	1	2	0	15.0	0	16.2	0
R4	35	1	1	0	0	110	70	0	1	1	2	1	1	4	1	9.7	1	15.4	0
R5	48	3	1	1	1	160	120	1	1	2	3	2	0	0	0	8.6	1	8.8	1
R6	52	3	1	0	0	140	90	1	1	3	2	3	1	3	0	10.5	1	9.7	1
R7	61	4	0	0	0	150	100	1	0	0	0	0	1	2	0	11.6	1	7.7	1
R8	50	3	1	1	1	160	120	1	1	1	4	1	1	3	0	8.6	1	6.5	1
R9	45	2	1	0	0	100	80	0	1	3	2	3	1	2	0	11.6	1	9.7	1
R10	59	4	0	0	0	150	90	1	0	0	0	0	1	4	1	15.0	0	15.4	0
R11	60	4	0	1	1	160	110	1	0	0	0	0	1	1	0	15.0	0	14.5	1
R12	42	2	1	1	1	140	120	1	1	3	2	3	1	3	0	16.6	0	16.2	0
R13	62	4	0	0	0	100	90	0	0	0	0	0	1	4	1	8.6	1	15.4	0
R14	35	1	1	0	0	130	80	0	0	0	0	0	1	2	0	9.7	1	7.3	1
R15	65	4	1	0	0	130	60	0	1	2	4	2	1	1	0	7.2	1	17.4	0
R16	55	3	1	0	0	140	80	1	1	2	2	2	1	4	1	9.7	1	16.2	0
R17	32	1	1	1	1	150	100	1	1	2	2	2	1	3	0	11.6	1	8.8	1
R18	33	1	1	1	1	120	60	0	1	3	2	3	1	2	0	10.8	1	9.7	1
R19	45	2	1	1	1	110	70	0	1	1	2	1	1	2	0	8.6	1	7.7	1
R20	42	2	1	0	0	150	100	1	1	2	4	2	1	4	1	15.0	0	15.4	0

IDENTITAS RESPONDEN						PENGUKURAN TEKANAN DARAH			KEBIASAAN MEROKOK				KONSUMSI KAFEIN			POLA KONSUMSI NATRIUM		POLA KONSUMSI SERAT	
R	U	K1	JK	P	K2	Sistolik	Diastolik	K3	B1	B2	B3	K4	C1	C2	K5	D	K6	E	K7
R21	39	2	0	1	1	100	60	0	0	0	0	0	0	0	0	16.6	0	6.5	1
R22	26	1	1	1	1	120	60	0	1	1	2	1	0	0	0	10.8	1	8.8	1
R23	38	2	1	1	1	150	110	1	1	2	1	2	1	3	0	16.1	0	15.2	0
R24	26	1	1	1	1	120	60	0	1	2	1	2	0	0	0	9.7	1	7.3	1
R25	32	1	1	1	1	110	70	0	0	0	0	0	1	2	0	8.6	1	5.5	1
R26	48	3	1	0	0	160	120	1	1	3	4	3	1	4	1	16.1	0	15.2	0
R27	33	1	0	0	0	120	60	0	0	0	0	0	1	2	0	8.6	1	5.5	1
R28	50	3	1	0	0	140	90	1	1	2	2	2	1	2	0	15.0	0	16.2	0
R29	36	2	0	1	1	100	70	0	0	0	0	0	1	2	0	10.5	1	8.4	1
R30	27	1	1	1	1	120	90	0	1	2	2	2	0	0	0	11.6	1	11.5	1
R31	42	2	1	0	0	150	90	1	1	2	2	2	1	2	0	15.0	0	16.6	0
R32	35	1	0	0	0	150	100	1	0	0	0	0	1	4	1	17.2	0	11.5	1
R33	32	1	0	0	0	140	120	1	0	0	0	0	0	0	0	16.6	0	12.4	1
R34	39	2	1	1	1	100	80	0	1	3	1	3	1	2	0	11.6	1	8.8	1
R35	47	3	1	1	1	140	90	1	1	3	2	3	1	4	1	13.5	1	16.6	0
R36	36	2	1	1	1	110	70	0	1	2	1	2	0	0	0	10.5	1	11.5	1
R37	40	2	1	1	1	140	100	1	1	1	2	1	1	3	0	15.0	0	12.4	1
R38	45	2	0	1	1	130	60	0	0	0	0	0	0	0	0	11.6	1	12.4	1
R39	40	2	1	1	1	120	80	0	1	2	2	2	1	4	1	10.5	1	8.8	1
R40	54	3	1	0	0	150	100	1	1	3	1	3	1	2	0	16.6	0	8.8	1
R41	38	2	1	0	0	120	80	0	1	1	2	1	0	0	0	8.6	1	11.5	1
R42	45	2	0	0	0	130	60	0	0	0	0	0	1	4	1	15.4	0	17.4	0

IDENTITAS RESPONDEN						PENGUKURAN TEKANAN DARAH			KEBIASAAN MEROKOK				KONSUMSI KAFEIN			POLA KONSUMSI NATRIUM		POLA KONSUMSI SERAT	
R	U	K1	JK	P	K2	Sistolik	Diastolik	K3	B1	B2	B3	K4	C1	C2	K5	D	K6	E	K7
R43	43	2	1	0	0	160	100	1	1	3	1	3	1	2	0	16.6	0	14.2	1
R44	40	2	1	0	0	110	110	0	1	1	2	1	0	0	0	11.6	1	7.7	1
R45	26	1	1	0	0	100	60	0	0	0	0	0	1	2	0	9.7	1	14.2	1
R46	32	1	1	0	0	140	90	1	1	3	1	3	1	4	1	12.5	1	8.8	1
R47	48	3	0	0	0	130	80	0	0	0	0	0	0	0	0	13.5	1	9.7	1
R48	52	3	1	0	0	160	100	1	1	2	2	2	1	3	0	17.2	0	6.5	1
R49	30	1	0	1	1	100	80	0	0	0	0	0	1	2	0	8.6	1	14.5	1
R50	40	2	1	0	0	140	90	1	1	3	1	3	1	4	1	11.6	1	7.7	1
R51	41	2	1	0	0	140	120	1	1	3	2	3	1	3	0	7.2	1	16.2	0
R52	36	2	1	1	1	100	70	0	1	2	2	2	1	1	0	10.5	1	15.4	0
R53	48	3	1	0	0	150	100	1	1	2	1	2	1	4	1	17.2	0	14.5	1
R54	43	2	1	1	1	130	80	0	1	2	1	2	0	0	0	12.5	1	7.7	1
R55	32	1	0	1	1	120	90	0	0	0	0	0	1	2	0	12.5	1	17.4	0
R56	53	3	0	1	1	150	90	1	0	0	0	0	0	0	0	15.0	0	14.2	1
R57	27	1	1	1	1	140	120	1	1	2	2	2	1	2	0	12.5	1	9.7	1
R58	41	2	1	0	0	140	90	1	1	3	1	3	1	2	0	16.6	0	7.3	1
R59	35	1	1	0	0	90	60	0	0	0	0	0	1	1	0	12.2	1	6.5	1
R60	50	3	1	0	0	170	100	1	1	2	4	2	1	4	1	16.1	0	14.2	1
R61	40	2	0	0	0	140	90	1	0	0	0	0	1	2	0	8.8	1	14.5	1
R62	37	2	1	0	0	120	80	0	1	1	2	1	1	3	0	10.5	1	16.2	0
R63	32	1	1	0	0	110	80	0	1	1	1	1	1	1	0	8.8	1	11.5	1
R64	43	2	1	0	0	120	80	0	1	2	2	2	1	2	0	11.6	1	12.4	1

IDENTITAS RESPONDEN						PENGUKURAN TEKANAN DARAH			KEBIASAAN MEROKOK				KONSUMSI KAFEIN			POLA KONSUMSI NATRIUM		POLA KONSUMSI SERAT	
R	U	K1	JK	P	K2	Sistolik	Diastolik	K3	B1	B2	B3	K4	C1	C2	K5	D	K6	E	K7
R65	52	3	0	0	0	160	100	1	0	0	0	0	1	4	1	17.2	0	11.5	1
R66	45	2	1	1	1	140	90	1	1	3	1	3	0	0	0	10.8	1	10.2	1
R67	40	2	0	1	1	160	120	1	0	0	0	0	1	4	1	17.2	0	14.5	1
R68	28	1	0	1	1	130	80	0	0	0	0	0	1	3	0	11.6	1	5.5	1
R69	37	2	1	0	0	130	80	0	1	2	2	2	0	0	0	9.7	1	7.7	1
R70	53	3	1	0	0	150	90	1	1	2	1	2	1	2	0	16.6	0	9.7	1
R71	39	2	1	0	0	120	60	0	1	2	2	2	0	0	0	8.8	1	7.3	1
R72	45	2	1	0	0	150	90	1	1	3	2	3	1	4	1	15.0	0	17.4	0
R73	38	2	1	1	1	110	80	0	1	2	1	2	0	0	0	11.6	1	5.5	1
R74	40	2	0	1	1	120	80	0	0	0	0	0	1	4	1	7.2	1	15.4	0
R75	35	1	0	1	1	120	70	0	0	0	0	0	1	2	0	8.8	1	14.5	1
R76	41	2	1	0	0	140	90	1	1	2	2	2	1	4	1	15.0	0	8.4	1
R77	39	2	0	0	0	120	80	0	0	0	0	0	1	1	0	10.8	1	7.7	1
R78	47	3	0	0	0	130	70	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	1	5.5	1
R79	42	2	1	0	0	140	90	1	1	3	1	3	1	2	0	15.0	0	15.4	0
R80	50	3	1	1	1	150	110	1	1	2	2	2	1	4	1	12.5	1	10.2	1
R81	48	3	0	0	0	140	90	1	0	0	0	0	1	2	0	16.1	0	14.5	1
R82	39	2	1	0	0	160	100	1	1	2	2	2	1	3	0	15.4	0	16.6	0
R83	40	2	0	0	0	110	80	0	0	0	0	0	0	0	0	12.5	1	6.5	1
R84	48	3	0	0	0	140	100	1	0	0	0	0	1	4	1	10.8	1	9.7	1
R85	53	3	1	0	0	140	90	1	1	1	1	1	1	3	0	13.5	1	11.5	1
R86	38	2	1	0	0	150	110	1	1	3	2	3	1	2	0	16.1	0	6.5	1

IDENTITAS RESPONDEN						PENGUKURAN TEKANAN DARAH			KEBIASAAN MEROKOK				KONSUMSI KAFEIN			POLA KONSUMSI NATRIUM		POLA KONSUMSI SERAT	
R	U	K1	JK	P	K2	Sistolik	Diastolik	K3	B1	B2	B3	K4	C1	C2	K5	D	K6	E	K7
R87	49	3	1	0	0	150	100	1	1	2	2	2	1	4	1	15.0	0	15.4	0
R88	32	1	0	1	1	120	60	0	0	0	0	0	0	0	0	11.6	1	8.4	1
R89	30	1	1	1	1	100	60	0	1	2	1	2	0	0	0	14.4	1	7.3	1
R90	56	4	0	1	1	140	100	1	0	0	0	0	1	4	1	16.6	0	9.7	1
R91	43	2	1	0	0	160	120	1	1	1	2	1	1	3	0	11.6	1	16.2	0
R92	48	3	1	0	0	120	70	0	1	2	2	2	1	2	0	12.2	1	11.5	1
R93	37	2	0	0	0	150	110	1	0	0	0	0	1	4	1	15.0	0	7.3	1
R94	29	1	0	0	0	100	60	0	0	0	0	0	0	0	0	9.7	1	5.5	1
R95	54	3	1	0	0	150	90	1	1	1	4	1	1	1	0	16.6	0	12.4	1
R96	34	1	1	0	0	100	70	0	1	2	1	2	1	2	0	13.5	1	11.5	1
R97	45	2	1	0	0	140	120	1	1	3	2	3	1	4	1	15.0	0	12.4	1
R98	47	3	1	0	0	120	80	0	1	3	2	3	1	2	0	11.6	1	6.5	1
R99	38	2	1	0	0	140	90	1	1	2	2	2	1	4	1	8.6	1	10.2	1
R100	51	3	1	0	0	160	100	1	1	2	4	2	1	2	0	17.2	0	14.5	1
R101	35	1	0	1	1	130	80	0	0	0	0	0	0	0	0	8.8	1	7.3	1
R102	41	2	1	1	1	130	80	0	1	2	2	2	1	1	0	11.6	1	11.5	1
R103	50	3	0	1	1	170	100	1	0	0	0	0	1	4	1	17.2	0	16.2	0
R104	46	3	0	0	0	140	90	1	0	0	0	0	1	2	0	17.2	0	5.5	1
R105	29	1	1	0	0	120	80	0	1	2	1	2	1	4	1	12.2	1	8.8	1
R106	42	2	1	0	0	150	110	1	1	3	1	3	1	2	0	15.0	0	18.2	0
R107	40	2	1	0	0	100	70	0	1	1	2	1	1	2	0	10.5	1	9.7	1
R108	50	3	1	0	0	160	120	1	1	2	4	2	1	4	1	16.6	0	11.5	1

IDENTITAS RESPONDEN						PENGUKURAN TEKANAN DARAH			KEBIASAAN MEROKOK				KONSUMSI KAFEIN			POLA KONSUMSI NATRIUM		POLA KONSUMSI SERAT	
R	U	K1	JK	P	K2	Sistolik	Diastolik	K3	B1	B2	B3	K4	C1	C2	K5	D	K6	E	K7
R109	37	2	1	1	1	110	70	0	1	2	1	2	1	2	0	9.7	1	10.2	1
R110	45	2	1	0	0	140	90	1	1	3	2	3	1	4	1	11.6	1	8.4	1
R111	35	1	1	0	0	140	100	1	1	1	2	1	1	3	0	15.0	0	18.2	0
R112	41	2	1	0	0	150	90	1	1	3	2	3	1	2	0	15.4	0	8.4	1
R113	27	1	0	0	0	130	60	0	0	0	0	0	0	0	0	11.6	1	7.7	1
R114	30	1	0	0	0	120	60	0	0	0	0	0	1	1	0	7.2	1	15.4	0
R115	46	3	0	0	0	140	90	1	0	0	0	0	1	4	1	15.4	0	11.5	1
R116	41	2	1	1	1	120	70	0	1	2	1	2	1	2	0	11.6	1	8.4	1
R117	54	3	1	1	1	150	90	1	1	1	2	1	1	2	0	14.4	0	7.3	1
R118	47	3	0	1	1	110	70	0	0	0	0	0	0	0	0	12.2	1	8.4	1
R119	37	2	1	1	1	140	120	1	1	3	2	3	1	4	1	15.4	0	15.4	0
R120	38	2	1	0	0	130	80	0	1	1	3	1	1	3	0	9.7	1	8.8	1
R121	40	2	0	0	0	130	70	0	0	0	0	0	0	0	0	15.4	0	6.5	1
R122	56	4	0	0	0	140	90	1	0	0	0	0	1	4	1	17.2	0	7.7	1
R123	44	2	1	0	0	100	60	0	0	0	0	0	1	2	0	8.6	1	5.5	1
R124	47	3	1	0	0	90	60	0	1	2	1	2	1	2	0	10.8	1	9.7	1
R125	57	4	1	1	1	160	120	1	1	2	2	2	1	4	1	16.6	0	15.4	0
R126	27	1	1	1	1	100	60	0	1	1	1	1	0	0	0	8.8	1	6.5	1
R127	34	1	1	0	0	90	60	0	1	3	2	3	1	2	0	11.6	1	9.7	1
R128	49	3	0	1	1	140	120	1	0	0	0	0	1	3	0	15.4	0	15.4	0
R129	55	3	0	0	0	150	110	1	0	0	0	0	0	0	0	12.2	1	8.4	1
R130	28	1	0	1	1	130	60	0	0	0	0	0	0	0	0	11.6	1	10.2	1

IDENTITAS RESPONDEN						PENGUKURAN TEKANAN DARAH			KEBIASAAN MEROKOK				KONSUMSI KAFEIN			POLA KONSUMSI NATRIUM		POLA KONSUMSI SERAT	
R	U	K1	JK	P	K2	Sistolik	Diastolik	K3	B1	B2	B3	K4	C1	C2	K5	D	K6	E	K7
R131	52	3	0	0	0	150	100	1	0	0	0	0	1	4	1	15.4	0	15.2	0
R132	42	2	0	0	0	100	60	0	0	0	0	0	1	2	0	16.6	0	7.3	1
R133	40	2	1	0	0	140	90	1	1	3	1	3	1	4	1	8.8	1	7.3	1
R134	47	3	1	1	1	120	80	0	1	2	1	2	1	1	0	11.6	1	8.4	1
R135	57	4	1	0	0	140	100	1	1	3	1	3	1	2	0	17.2	0	18.2	0
R136	38	2	1	0	0	140	90	1	1	2	1	2	0	0	0	8.8	1	8.4	1
R137	42	2	0	0	0	130	70	0	0	0	0	0	0	0	0	11.6	1	8.4	1
R138	55	3	1	0	0	150	90	1	1	2	1	2	1	2	0	16.6	0	15.4	0
R139	40	2	0	0	0	100	60	0	0	0	0	0	1	3	0	10.5	1	6.5	1
R140	49	3	0	0	0	140	90	1	0	0	0	0	0	0	0	8.6	1	9.7	1

Hasil Analisis Data Univariat

Umur responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26	3	2.1	2.1	2.1
	27	4	2.9	2.9	5.0
	28	2	1.4	1.4	6.4
	29	2	1.4	1.4	7.9
	30	3	2.1	2.1	10.0
	32	7	5.0	5.0	15.0
	33	2	1.4	1.4	16.4
	34	2	1.4	1.4	17.9
	35	7	5.0	5.0	22.9
	36	3	2.1	2.1	25.0
	37	5	3.6	3.6	28.6
	38	7	5.0	5.0	33.6
	39	5	3.6	3.6	37.1
	40	13	9.3	9.3	46.4
	41	6	4.3	4.3	50.7
	42	7	5.0	5.0	55.7
	43	4	2.9	2.9	58.6
	44	1	.7	.7	59.3
	45	9	6.4	6.4	65.7
	46	2	1.4	1.4	67.1
	47	6	4.3	4.3	71.4
	48	7	5.0	5.0	76.4
	49	3	2.1	2.1	78.6
	50	7	5.0	5.0	83.6
	51	1	.7	.7	84.3
	52	4	2.9	2.9	87.1
	53	3	2.1	2.1	89.3
	54	3	2.1	2.1	91.4
	55	3	2.1	2.1	93.6
	56	2	1.4	1.4	95.0
	57	2	1.4	1.4	96.4
59	1	.7	.7	97.1	
60	1	.7	.7	97.9	

61	1	.7	.7	98.6
62	1	.7	.7	99.3
65	1	.7	.7	100.0
Total	140	100.0	100.0	

Kategori umur responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dewasa Awal	32	22.9	22.9	22.9
	Dewasa Akhir	60	42.9	42.9	65.7
	Lansia Awal	39	27.9	27.9	93.6
	Lansia Akhir	9	6.4	6.4	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	49	35.0	35.0	35.0
	Laki-Laki	91	65.0	65.0	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Pendapatan responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤UMR (Rp. 3.294.467)	91	65.0	65.0	65.0
	>UMR (Rp. 3.294.467)	49	35.0	35.0	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Kategori pendapatan responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pendapatan Rendah	91	65.0	65.0	65.0
	Pendapatan Tinggi	49	35.0	35.0	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Statistics

		Pengukuran sistolik tekanan darah	Pengukuran diastolik tekanan darah	Kategori tekanan darah
N	Valid	140	140	140
	Missing	0	0	0
Mean		131.93	86.43	.51
Median		140.00	90.00	1.00
Std. Deviation		19.412	18.273	.502
Minimum		90	60	0
Maximum		170	120	1

Pengukuran sistolik tekanan darah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	90	3	2.1	2.1	2.1
	100	15	10.7	10.7	12.9
	110	11	7.9	7.9	20.7
	120	22	15.7	15.7	36.4
	130	17	12.1	12.1	48.6
	140	34	24.3	24.3	72.9
	150	22	15.7	15.7	88.6
	160	14	10.0	10.0	98.6
	170	2	1.4	1.4	100.0
Total		140	100.0	100.0	

Pengukuran diastolik tekanan darah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60	23	16.4	16.4	16.4
	70	17	12.1	12.1	28.6
	80	25	17.9	17.9	46.4
	90	34	24.3	24.3	70.7
	100	19	13.6	13.6	84.3
	110	7	5.0	5.0	89.3
	120	15	10.7	10.7	100.0
	Total		140	100.0	100.0

Kategori tekanan darah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	68	48.6	48.6	48.6
	Tekanan Darah Tinggi	72	51.4	51.4	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Apakah anda merokok?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	54	38.6	38.6	38.6
	Ya	86	61.4	61.4	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Berapa batang rokok yang anda habiskan setiap hari?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak merokok	54	38.6	38.6	38.6
	≤ 10 batang	17	12.1	12.1	50.7
	11 – 20 batang	43	30.7	30.7	81.4
	≥ 21 batang	26	18.6	18.6	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Jenis rokok apa yang anda hisap?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak merokok	54	38.6	38.6	38.6
	Rokok Kretek	31	22.1	22.1	60.7
	Rokok Filter	45	32.1	32.1	92.9
	Rokok Putih	2	1.4	1.4	94.3
	Rokok Gulung Sendiri (Roll-Your-Own)	8	5.7	5.7	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Kategori kebiasaan merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak merokok	54	38.6	38.6	38.6
	Perokok Ringan	17	12.1	12.1	50.7
	Perokok Sedang	43	30.7	30.7	81.4
	Perokok Berat	26	18.6	18.6	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Apakah anda minum kopi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	32	22.9	22.9	22.9
	Ya	108	77.1	77.1	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Berapa cangkir kopi yang diminum dalam sehari?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 cangkir	10	7.1	7.1	7.1
	2 cangkir	43	30.7	30.7	37.9
	3 cangkir	17	12.1	12.1	50.0
	4 cangkir	38	27.1	27.1	77.1
	tidak minum	32	22.9	22.9	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Kategori konsumsi kafein

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak beresiko	102	72.9	72.9	72.9
	Beresiko	38	27.1	27.1	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Statistics

		Skor pola konsumsi natrium	Kategori pola konsumsi natrium
N	Valid	140	140
	Missing	0	0
Mean		12.689	.61
Median		12.200	1.00
Std. Deviation		2.9695	.489
Minimum		7.2	0
Maximum		17.2	1

Skor pola konsumsi natrium

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7.2	4	2.9	2.9	2.9
	8.6	11	7.9	7.9	10.7
	8.8	8	5.7	5.7	16.4
	9.7	9	6.4	6.4	22.9
	10.5	9	6.4	6.4	29.3
	10.8	6	4.3	4.3	33.6
	11.6	22	15.7	15.7	49.3
	12.2	5	3.6	3.6	52.9
	12.5	6	4.3	4.3	57.1
	13.5	4	2.9	2.9	60.0
	14.4	3	2.1	2.1	62.1
	15.0	16	11.4	11.4	73.6
	15.4	8	5.7	5.7	79.3
	16.1	6	4.3	4.3	83.6
	16.6	13	9.3	9.3	92.9
	17.2	10	7.1	7.1	100.0
	Total		140	100.0	100.0

Kategori pola konsumsi natrium

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	54	38.6	38.6	38.6
	Rendah	86	61.4	61.4	100.0
Total		140	100.0	100.0	

Statistics

		Skor pola konsumsi serat	Kategori pola konsumsi serat
N	Valid	140	140
	Missing	0	0
Mean		11.065	.75
Median		9.950	1.00
Std. Deviation		3.7287	.435
Minimum		5.5	0
Maximum		18.2	1

Skor pola konsumsi serat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.5	8	5.7	5.7	5.7
	6.5	10	7.1	7.1	12.9
	7.3	10	7.1	7.1	20.0
	7.7	9	6.4	6.4	26.4
	8.4	11	7.9	7.9	34.3
	8.8	10	7.1	7.1	41.4
	9.7	12	8.6	8.6	50.0
	10.2	5	3.6	3.6	53.6
	11.5	12	8.6	8.6	62.1
	12.4	6	4.3	4.3	66.4
	14.2	4	2.9	2.9	69.3
	14.5	8	5.7	5.7	75.0
	15.2	3	2.1	2.1	77.1
	15.4	14	10.0	10.0	87.1

16.2	8	5.7	5.7	92.9
16.6	3	2.1	2.1	95.0
17.4	4	2.9	2.9	97.9
18.2	3	2.1	2.1	100.0
Total	140	100.0	100.0	

Kategori pola konsumsi serat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	35	25.0	25.0	25.0
	Cukup	105	75.0	75.0	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Hasil Analisis Data Bivariat

Kategori umur responden * Kategori tekanan darah Crosstabulation

		Kategori tekanan darah		Total	
		Normal	Tekanan Darah Tinggi		
Kategori umur responden	Dewasa Awal	Count	26	6	32
		Expected Count	15.5	16.5	32.0
		% within Kategori tekanan darah	38.2%	8.3%	22.9%
	Dewasa Akhir	Count	32	28	60
		Expected Count	29.1	30.9	60.0
		% within Kategori tekanan darah	47.1%	38.9%	42.9%
	Lansia Awal	Count	8	31	39
		Expected Count	18.9	20.1	39.0
		% within Kategori tekanan darah	11.8%	43.1%	27.9%
	Lansia Akhir	Count	2	7	9
		Expected Count	4.4	4.6	9.0
		% within Kategori tekanan darah	2.9%	9.7%	6.4%
Total	Count	68	72	140	
	Expected Count	68.0	72.0	140.0	
	% within Kategori tekanan darah	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	29.018 ^a	3	.000
Likelihood Ratio	31.057	3	.000
Linear-by-Linear Association	26.493	1	.000
N of Valid Cases	140		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.37.

Jenis kelamin * Kategori tekanan darah Crosstabulation

		Kategori tekanan darah		Total	
		Normal	Tekanan Darah Tinggi		
Jenis kelamin	Perempuan	Count	27	22	49
		Expected Count	23.8	25.2	49.0
		% within Kategori tekanan darah	39.7%	30.6%	35.0%
	Laki-Laki	Count	41	50	91
		Expected Count	44.2	46.8	91.0
		% within Kategori tekanan darah	60.3%	69.4%	65.0%
Total	Count	68	72	140	
	Expected Count	68.0	72.0	140.0	
	% within Kategori tekanan darah	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.287 ^a	1	.257		
Continuity Correction ^b	.916	1	.338		
Likelihood Ratio	1.288	1	.256		
Fisher's Exact Test				.290	.169
N of Valid Cases	140				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.80.

b. Computed only for a 2x2 table

M A K A S S A R

**Kategori pendapatan responden * Kategori tekanan darah
Crosstabulation**

			Kategori tekanan darah		Total
			Normal	Tekanan Darah Tinggi	
Kategori pendapatan responden	Pendapatan Rendah	Count	38	53	91
		Expected Count	44.2	46.8	91.0
		% within Kategori tekanan darah	55.9%	73.6%	65.0%
	Pendapatan Tinggi	Count	30	19	49
		Expected Count	23.8	25.2	49.0
		% within Kategori tekanan darah	44.1%	26.4%	35.0%
Total	Count	68	72	140	
	Expected Count	68.0	72.0	140.0	
	% within Kategori tekanan darah	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.832 ^a	1	.028		
Continuity Correction ^b	4.084	1	.043		
Likelihood Ratio	4.860	1	.027		
Fisher's Exact Test				.034	.021
Linear-by-Linear Association	4.797	1	.029		
N of Valid Cases	140				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.80.

b. Computed only for a 2x2 table

Kategori kebiasaan merokok * Kategori tekanan darah Crosstabulation

		Kategori tekanan darah			
		Normal	Tekanan Darah Tinggi	Total	
Kategori kebiasaan merokok	Tidak merokok	Count	32	22	54
		Expected Count	26.2	27.8	54.0
		% within Kategori tekanan darah	47.1%	30.6%	38.6%
	Perokok Ringan	Count	10	7	17
		Expected Count	8.3	8.7	17.0
		% within Kategori tekanan darah	14.7%	9.7%	12.1%
	Perokok Sedang	Count	21	22	43
		Expected Count	20.9	22.1	43.0
		% within Kategori tekanan darah	30.9%	30.6%	30.7%
	Perokok Berat	Count	5	21	26
		Expected Count	12.6	13.4	26.0
		% within Kategori tekanan darah	7.4%	29.2%	18.6%
Total	Count	68	72	140	
	Expected Count	68.0	72.0	140.0	
	% within Kategori tekanan darah	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.146 ^a	3	.007
Likelihood Ratio	12.891	3	.005
Linear-by-Linear Association	9.199	1	.002
N of Valid Cases	140		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.26.

Kategori konsumsi kafein * Kategori tekanan darah Crosstabulation

		Kategori tekanan darah			
			Tekanan Darah Tinggi	Total	
			Normal		
Kategori konsumsi kafein	Tidak beresiko	Count	61	41	102
		Expected Count	49.5	52.5	102.0
		% within Kategori tekanan darah	89.7%	56.9%	72.9%
	Beresiko	Count	7	31	38
		Expected Count	18.5	19.5	38.0
		% within Kategori tekanan darah	10.3%	43.1%	27.1%
Total	Count	68	72	140	
	Expected Count	68.0	72.0	140.0	
	% within Kategori tekanan darah	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18.981 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	17.360	1	.000		
Likelihood Ratio	20.205	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	18.845	1	.000		
N of Valid Cases	140				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.46.

b. Computed only for a 2x2 table

M A K A S S A R

**Kategori pola konsumsi natrium * Kategori tekanan darah
Crosstabulation**

		Kategori tekanan darah			
		Normal	Tekanan Darah Tinggi	Total	
Kategori pola konsumsi natrium	Tinggi	Count	6	48	54
		Expected Count	26.2	27.8	54.0
		% within Kategori tekanan darah	8.8%	66.7%	38.6%
	Rendah	Count	62	24	86
		Expected Count	41.8	44.2	86.0
		% within Kategori tekanan darah	91.2%	33.3%	61.4%
Total	Count	68	72	140	
	Expected Count	68.0	72.0	140.0	
	% within Kategori tekanan darah	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	49.383 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	46.972	1	.000		
Likelihood Ratio	54.457	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	49.031	1	.000		
N of Valid Cases	140				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26.23.

b. Computed only for a 2x2 table

M A K A S S A R

Kategori pola konsumsi serat * Kategori tekanan darah Crosstabulation

		Kategori tekanan darah			
		Normal	Tekanan Darah Tinggi	Total	
Kategori pola konsumsi serat	Kurang	Count	10	25	35
		Expected Count	17.0	18.0	35.0
		% within Kategori tekanan darah	14.7%	34.7%	25.0%
	Cukup	Count	58	47	105
		Expected Count	51.0	54.0	105.0
		% within Kategori tekanan darah	85.3%	65.3%	75.0%
Total	Count	68	72	140	
	Expected Count	68.0	72.0	140.0	
	% within Kategori tekanan darah	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.473 ^a	1	.006		
Continuity Correction ^b	6.443	1	.011		
Likelihood Ratio	7.682	1	.006		
Fisher's Exact Test				.007	.005
Linear-by-Linear Association	7.419	1	.006		
N of Valid Cases	140				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.00.

b. Computed only for a 2x2 table

M A K A S S A R