

**ANALISIS PENYEBAB KEMATIAN MATERNAL DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2022**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Keperawatan Program Studi Keperawatan
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ST. RAFIAH
NIM 70300119048

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Analisis Penyebab Kematian Maternal Di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022*" yang disusun oleh St. Rafiah, NIM: 70300119048, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 April 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 22 April 2024
12 Syaban 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, SpOG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kes.	(.....)
Munaqisy I	: Nurul Fadhilah Gani, S,Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasnah, S.Sit., S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Dewi Setiawati, SpOG., M.Kes
NIP: 19810621 200604 2005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : St. Rafiah
Nim : 70300119048
Tempat/Tanggal Lahir : Ncera, 07 Desember 2001
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata Gowa
Judul : Analisis Kematian Maternal di Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2022

Menyatakan yang sesungguhnya bahwa dengan penuh kesadaran, skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan tiruan, duplikasi, dan plagiasi atau disebut oleh orang lain seluruhnya maupun sebagian maka gelar yang didapatkan dan skripsi batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gowa, 27 Mei 2024

Penulis

St. Rafiah
70300119048

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya yang selalu tercurahkan dan tiada henti diberikan kepada hamba-Nya serta salam dan salawat juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat dan teman-teman seperjuangan merupakan suatu kehoratan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul **“Analisis Penyebab Kematian Maternal Di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.”**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat meraih gelar pendidikan strata satu (S1) jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2024. Selesaiannya penulisan skripsi penelitian ini penulis berharap ada banyak manfaat yang dapat diambil. Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan tidak terlepas dari berbagai pihak yang banyak memberikan doa, dukungan, dan semangat hingga skripsi ini mampu diselesaikan. Kepada orangtua tercinta bapak Suhaimin dan ibu Nur Hasanah yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putrinya, bidadari surga ku yang telah melahirkan dan membesarkan ku dengan penuh kasih, cinta dan perjuangan yang luar biasa, doa yang selalu terpanjatkan, dan dukungan semangat serta dukungan moril dan materilnya. Satu hal yang perlu bapak dan ibu ketahui saya sangat menyayangi dan mencintai kalian berdua. Tolong hidup lebih lama lagi di dunia ini, izinkan saya untuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang kalian lakukan selama ini.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A. Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr. dr Dewi Setiawati, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, para wakil Dekan, serta staf Akademik yang telah membantu, mengelola, serta mengurus administrasi selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku ketua jurusan Keperawatan dan Rasdiyanah, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep. Kom selaku sekretaris jurusan Keperawatan beserta staf dosen pengajar yang telah ikhlas dan sabar memberi bimbingan, gagasan, serta motivasi selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Keperawatan.
4. Dr. Hasnah. S.Sit., S.Kep., Ns., M.Kes, selaku pembimbing I dan Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya dengan ikhlas untuk membimbing, memberikan arahan dengan penuh kesabaran pada mahasiswa yang fakir ilmu, serta memberikan motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual kepada penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini.
5. Nurul Fadhilah Gani., S.Kep., Ns., M.Kep. selaku penguji I dan Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I. selaku dosen penguji Agama yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kakak dan abang tersayang Jumratun Nisa dan Burhanuddin serta bibi tercinta Sarlah, om Abdul Hamid dan seluruh keluarga besar, terimakasih atas kasih sayang dan rasa cinta yang tulus, doa yang selalu terpanjatkan untuk penulis sampai berada ditahap ini.

7. Ucapan terimakasih kepada paman tercinta Al- Khairin, S.Kep., Ns atas kasih cinta yang tulus, membantu dan melindungi ku selama penulis berada di Makassar.
8. Kepada sahabat ku Nur Hayati dan Ziadatun Fil.ilmu, terimakasih telah memberikan rasa cinta yang tulus, motivasi, semangat dan semoga persahabatan ini abadi untuk selamanya.
9. Kepada teman-teman seperjuangan jurusan Keperawatan angkatan 2019 (L19AMEN) atas semua kebersamaan dan perjuangan yang telah dilalui selama ini.
10. Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada keluarga besar Lingkar Study Ncera (LSN) Makassar yang telah memberikan wadah untuk belajar, yang sudah saling melindungi dan mengasihi selama berada di tanah rantauan.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun dengan doa dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, yang lisan maupun tulisan selama penulis menimba ilmu di kampus peradaban Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Tidak menutup kemungkinan dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak disadari oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun untuk kemajuan ilmu penelitian. Karena sejatinya manusia tidak pernah luput dari kesalahan, dan kesempurnaan hanya milik Allah swt. Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahatullahi Wabarakatuh

Samata, 2024

Penulis

St. Rafiah
70300119048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Kematian Maternal.....	14
1. Definisi Kematian Maternal.....	14
2. Faktor Penyebab Kematian Maternal.....	15
3. Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).....	27
B. Konsep Dasar Hidup Dan Mati.....	28
1. Definisi Hidup Dan Mati.....	28
2. Kematian Dalam Perspektif Agama Islam.....	29
3. Perbedaan Mati Syahid Ibu Hamil Dan Mati Syahid Karena Peperangan.....	30
C. Kerangka Teori.....	33
D. Kerangka Konsep.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Desain Penelitian.....	35

B. Tempat Dan Waktu Penelitian	35
C. Populasi Dan Sampel.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Pengolahan Data.....	36
H. Analisa Data.....	37
I. Etika Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan.....	46
D. Keterbatasan Penelitian	61
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
RIWAYAT HIDUP	88


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Definisi Operasional.....	5
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	7
Tabel 4.1 Jumlah Kematian Kematian Maternal Berdasarkan Penyebab Periode 2018-2022	41
Tabel 4.2 Kematian Maternal Berdasarkan Kabupaten/Kota 5 Tahun Terakhir.....	42
Tabel 4.3 Penyebab Kematian Maternal Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	45



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Teori.....	33
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	34



ABSTRAK

Nama : St. Rafiah
Nim : 70300119048
Judul : Analisis Penyebab Kematian Maternal Di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Berdasarkan data Kemenkes tahun (2021) jumlah angka kematian ibu (AKI) mengalami peningkatan setiap tahun yaitu 4,221 kasus (2018), 4,192 kasus (2019), dan 4,614 kasus (2020). AKI tetap menjadi perhatian yang harus diperjuangkan hingga Indonesia benar-benar mampu mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berlaku bagi semua Negara maju dan berkembang untuk tahun 2030, yaitu target penurunan AKI menjadi kurang dari 70/100.000 kelahiran hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kematian maternal di Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 785. Analisis data menggunakan analisis deskriptif frekuensi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan penyebab kematian maternal di Sulawesi Selatan dari tahun 2018-2022 adalah penyebab karena perdarahan sebanyak 29,9%, hipertensi sebanyak 27,6%, covid-19 sebanyak 5,1%, gangguan darah sebanyak 5,0%, infeksi sebanyak 4,5%, gangguan metabolik sebanyak 3,6%, dan 24,3% karena penyebab lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab kematian tertinggi adalah perdarahan, Hipertensi, dan Covid-19, sedangkan penyebab kematian terendah adalah gangguan darah.. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan upaya pencegahan dan penanganan perdarahan, hipertensi, dan infeksi, gangguan darah, gangguan metabolik pada ibu hamil.

Kata Kunci: Kematian maternal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan penduduk suatu negara, khususnya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak yaitu angka kematian ibu (AKI). Kematian maternal menurut *World Health Organization* (WHO) tahun 2019, didefinisikan sebagai kematian yang terjadi selama kehamilan atau 42 hari pasca terminasi, tidak berkaitan dengan durasi dan lokasi hamil, disebabkan oleh hal yang berkaitan, atau diperburuk akibat kehamilan atau penatalaksanaannya, tetapi bukan akibat kecelakaan (Nara, 2021).

Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 dengan harapan angka kematian ibu dari 305/100.000 kelahiran hidup (KH) bisa menjadi 183 per 100.000 KH. Berdasarkan data Kemenkes 2021 jumlah AKI mengalami peningkatan yaitu 4,221 kasus (2018), 4,196 kasus (2019), dan 4,614 (2020), AKI tetap menjadi perhatian yang harus di perjuangkan hingga Indonesia benar-benar mampu mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berlaku bagi semua negara maju dan berkembang sampai tahun 2030 mendatang, yaitu target penurunan AKI menjadi kurang dari 70/100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2021).

Menurut data WHO tahun 2019, AKI masih sangat tinggi di seluruh dunia, sekitar 810 ribu setiap hari. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyebutkan pada tahun 2020 bahwa AKI di Indonesia belum memenuhi target SDGs 2023. AKI di Indonesia diperkirakan mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup.

Menurut data profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 menunjukkan jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 sebanyak 133 kasus dan mengalami penurunan sebanyak 11 kasus dari tahun sebelumnya (tahun 2019=144 kasus), dan mengalami peningkatan sebanyak 62 kasus yaitu (tahun 2021=192), dan pada tahun

2022 mengalami penurunan sebanyak 21 kasus (tahun 2022=174) (Dinakes Prov Sulsel, 2022).

AKI menggambarkan satu dari sekian indikator kesuksesan pelayanan di suatu negara. Tiap harinya terdapat kurang lebih 830 wanita yang meninggal di sebabkan oleh masalah yang dapat di cegah berkaitan dengan kehamilan dan persalinan 99% di seluruh kematian ibu terjadi pada negara berkembang. Terdapat kurang lebih 830 wanita meninggal karena komplikasi kehamilan atau persalinan diseluruh dunia setiap harinya. Komplikasi utama yang mengakibatkan hampir 75% keseluruhan kematian ibu adalah pendarahan hebat sesudah persalinan seperti adanya infeksi, komplikasi karena persalinan, gangguan metabolik, gangguan darah, serta aborsi yang tidak sesuai prosedur (WHO, 2018).

Angka kematian ibu/maternal merupakan indikator yang menggambarkan status Kesehatan maternal, terutama kehamilan atau yang diperberat oleh kehamilan atau karena penanganannya dan bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Kematian maternal di negara berkembang jauh lebih tinggi dari pada negara maju, dimana pada tahun 2015 AKI di negara berkembang sebesar 239/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan di negara maju hanya 12/100.000 kelahiran hidup. Sebagian besar (tiga perempat) kematian maternal merupakan kematian yang dapat di cegah dan 37-90% nya terjadi di negara berkembang. Salah satu negara berkebang dengan AKI yang masih tinggi adalah Indonesia (Sari, 2022).

Penyebab kematian ibu di provinsi Sulawesi selatan untuk tahun 2017 perdarahan sebanyak 62 kasus (41,61%) Rupture perineum menjadi penyebab utamanya. Jumlah kasus angka kematian ibu sebanyak 149 per 100.00 kelahiran hidup di Sulawesi Selatan. Kejadian ruptur perineum di puskesmas minasa upa provinsi Sulawesi selatan kota makassar tahun 2019 mencapai 52 kasus dari 358 kasus kelahiran hidup pertahun.

Permasalahan yang terjadi pada saat kehamilan berdampak psikologis, termasuk rasa takut, cemas, dan depresi yang berhubungan

dengan kehamilan. Kekhawatiran ibu terhadap janinnya, berlangsung selama masa kehamilan, persalinan, masa setelah persalinan dan ketika telah berperan menjadi ibu. (Rahman & Urbayatun, 2021). Meskipun merupakan kondisi normal, namun kehamilan dapat menyebabkan perubahan fisiologis dan psikologis yang jika tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan kematian pada ibu hamil.

Penyebab terbanyak kematian ibu di Indonesia pada tahun 2019 adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan metabolik dan lain-lain (Kemenkes RI, 2019). Sekitar 25-50% Kematian ibu disebabkan masalah yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas (WHO, 2018).

Secara global penyebab kematian maternal adalah perdarahan, preeklampsia, eklampsia, penyebab tidak langsung, karakteristik ibu dan perilaku ibu hamil, abortus, sepsis, dan emboli. Sedangkan di Indonesia penyebab kematian maternal adalah perdarahan, preeklampsia, gangguan metabolik, gangguan darah, infeksi, serta penyebab lainnya (Desi, et al, 2019).

Kematian ibu dibagi menjadi kematian langsung dan kematian tidak langsung. Kematian ibu langsung adalah sebagai akibat komplikasi kehamilan, persalinan atau masa nifas dan segala intervensi dan penanganan tidak tepat dari komplikasi tersebut. Kematian ibu tidak langsung merupakan akibat dari penyakit yang sudah ada atau penyakit yang timbul sewaktu kehamilan. Misalnya diabetes mellitus, malaria, anemia, HIV/AIDS dan penyakit kardiovaskuler. Secara global 80% kematian ibu tergolong pada kematian ibu langsung. Pola penyebab langsung kematian ibu yang paling umum di Indonesia yaitu perdarahan, biasanya perdarahan pasca persalinan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan darah, gangguan metabolik, komplikasi abortus, partus macet, aborsi tidak aan, dan sebab-sebab lainnya. (Fahira & Adhar, 2017).

Adapun faktor pelayanan kesehatan disebabkan oleh belum mantapnya jangkauan KIA dan penanganan kelompok berisiko, masih rendahnya cakupan Ante Natal Care (ANC) dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, keterlambatan penanganan, akses pelayanan kesehatan (jarak, biaya, waktu dan transportasi yang tidak terjangkau. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa kematian ibu dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor ibu, status reproduksi, komplikasi obsterik, pelayanan kesehatan, dan sosial ekonomi, oleh karna itu penelitian tertarik untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab kematian di kota Makassar (Respati et al., 2019). Dan juga pada tahun 2015 Angka kematian ibu di Kota Makassar menunjukkan penurunan dari 20,33/100.000 KH di Tahun 2014 menjadi 19,85/100.000 KH di tahun 2015, dimana terjadi 5 kematian ibu dari sejumlah 25.181 kelahiran hidup di Kota Makassar. Terdapat 3 penyebab kematian ibu di Kota Makassar diantaranya 2 kasus disebabkan perdarahan, preeklamsi dan edema.

Kematian maternal tidak dapat dicegah jika ibu tidak memiliki faktor risiko dan telah dilakukan tindakan penanganan sesuai dengan prosedur sehingga kematian tersebut tidak dapat di prediksi. Beberapa literature menyebutkan bahwa terjadinya kematian maternal yang dapat dicegah dikarenakan pengetahuan pasien/keluarga kurang, status ekonomi rendah, sarana dan prasarana yang tidak lengkap, ketersediaan dan kualitas sumber daya tenaga kesehatan yang kurang, budaya, dan hambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan, serta keterlambatan dalam rujukan. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasi menjadi faktor tenaga kesehatan, faktor pasien, faktor sarana prasarana, faktor rujukan (Nataria et al, 2020).

Upaya-upaya untuk menurunkan angka kematian ibu tersebut salah satunya melalui program pelayanan antenatal terpadu. Antenatal terpadu merupakan pelayanan antenatal di fasilitas kesehatan yang komprehensif dan terpadu, mencakup upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitative. Pemanfaatan pelayanan antenatal oleh ibu hamil pada

dasarnya merupakan manifestasi dari salah satu bentuk perilaku dibidang kesehatan dalam upaya mencegah dan menanggulangi adanya penyakit atau gangguan yang dapat membahayakan kesehatan (Fatahilah, 2019).

Ketika terdapat kasus kematian maternal. Program KIA sangat membutuhkan data kematian. Pendokumentasian Autopsi verbal dan data pendukung yang lain dapat digunakan untuk melakukan intervensi agar AKI tidak terjadi lagi. Selagi dasar pengambilan keputusan dan kebijakan data dan informasi harus memiliki kualitas yang baik. AKI yang tinggi menjadi bukti kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah. Hal ini yang menjadikan program ANC menjadi tolak ukur keberhasilan tenaga kesehatan dalam menjaga ibu hamil dengan tujuan deteksi dini resiko kehamilan. Sebagian besar kematian ibu hamil seharusnya telah dapat diketahui dan dicegah sebelumnya jika proses ANC dilakukan dengan baik (WHO, Regional Office for Africa, 2024). Penggunaan sistem pencatatan atau pendataan jumlah kematian ibu menjadi hal yang sangat penting dilakukan, ketika sebuah kejadian kematian dilaporkan maka bisa direkomendasikan untuk meningkatkan jumlah kontak antara ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini resiko kematian pada ibu hamil atau melahirkan (Yanto & Maula, 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab kematian maternal di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Definisi Operasional

Tabel 1.1

Variabel	Kriteria Objektif	Alat Ukur
Kematian Maternal adalah kematian yang terjadi pada saat kehamilan, persalinan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan.	Ibu hamil dan melahirkan	-
Karakteristik		

Perdarahan kondisi dimana terjadi perdarahan yang tidak normal selama kehamilan atau setelah proses melahirkan.	Ibu hamil dan melahirkan	-
Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah persistem pada pembuluh darah arteri dengan tekanan darah diastolik >90 mmHg dan sistolik 140 mmHg yang terjadi pada 20 minggu kehamilan	Normal 120/80 mmHg Tinggi 140/90 mmHg	Sfigmomanometer
Covid-19 adalah penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru.	Ibu hamil dan melahirkan	Swab polymerase chain reaction (PCR), swab antigen, rapid test antibody
Gangguan darah merupakan penyakit komplikasi dari, penyakit stroke, jantung dan lain.lain.	Ibu hamil dan melahirkan	-
Infeksi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri.	Ibu hamil dan melahirkan	-
Gangguan metabolik merupakan penyakit penyakit komplikasi dari diabetes melitus.	Ibu hamil dan melahirkan	-

D. Kajian Pustaka

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
1.	(Innama Sakinah, Ahmad Jubaedi & Fifi Musfirowati, 2023). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kematian Maternal Dalam Penguatan Pengetahuan Dan Pengembangan Kebijakan Kesehatan: Studi Otopsi Verbal Maternal.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-kualitatif (mixed methods) dengan strategi sequential explanatory yaitu metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan.	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui profil kematian maternal, faktor penyebab kematian maternal yang dapat di cegah dan yang menjadi hambatan yang menyebabkan kematian maternal.	Hasil penelitian menunjukkan kematian maternal dapat dicegah sebanyak 97,6. Tingginya angka kematian maternal yang disebabkan karena kurangnya kunjungan ANC, faktor rujukan terutama terlambat dalam memutuskan untuk merujuk.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada tujuan yang akan di capai. Pada penelitian ini untuk mengetahui profil kematian maternal, faktor penyebab kematian maternal yang dapat di cegah, dan hambatan yang menyebabkan kematian maternal sedangkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan untuk melihat faktor penyebab kematian Maternal.

2.	(Fifi Musfirowati, 2021). 2021. Faktor Penyebab Kematian Ibu Yang Dapat Di Cegah Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021	Desain penelitian ini adalah deskriptif analitik	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab keatian ibu yang dapat di cegah di kabupaten pandeglang tahun 2021.	Hasil penelitian ini kematian ibu yang dapat di cegah berjumlah (58,5%) dan yang tidak dapat di cegah berjumlah (41,5%) tingginya angka kematian maternal yang disebabkan karena kurangnya kunjungan ANC, faktor rujukan terutama dalam memutuskan untuk merujuk.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui penyebab kematian ibu yang dapat di cegah sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui faktor penyebab kematian maternal.
3.	Netty Herawaty Purba, 2020. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Kematian Maternal	Penelitian ini menggunakan sequential explanatory mixed method. Pengumpulan data dan analisis data kuantitatif.	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kematian maternal yang dapat di cegah di Kabupaten Cianjur.	Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kasus kematian maternal di Kabupaten Cianjur tahun 2015 paling banyak adalah kematian yang dapat dicegah, keterlambatan dalam proses rujukan terbesar	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan yang akan di capai. Dalam artikel ini tujuannya yaitu menganalisis faktor-faktor penyebab kematian Maternal yang dapat di cegah.

				yaitu pengambilan keputusan dan pencatatan dan pelaporan keatian maternal yang belum lengkap.	Sedangkan peneliti yaitu untuk mengetahui faktor penyebab kematian maternal.
4.	(Desi Nataria, et al., 2020). Analisis Penyebab Kematian Maternal Di Kabupaten Cirebon.	Metode penelitian ini adalah sequential explanatory mixed method yang dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan penelitian kuantitatif dengan deskriptif analitik.	Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor penyebab kematian Maternal.	Hasil penelitian kuantitatif diperoleh dari 53 kasus kematian Maternal yang terdapat pada dokumen OVM/RM/RMMP dan rekapitulasi kematian Maternal. Sedangkan penelitian kualitatif di peroleh dari in depth interview yang dilakukan pada 5 keluarga dari ibu yang mengalami kematian dan 11 tenaga kesehatan yang terdiri dari bidan coordinator dan bidan desa yang terlibat langsung dala kematian	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan yang akan di capai. Dalam artikel ini tujuannya yaitu mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor penyebab kematian Maternal. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui faktor penyebab keatian maternal.

				Maternal, bidan di rumah sakit serta bidan yang bertanggung jawab dalam pencatatan pelayanan kematian aternal.	
5.	Dhita Aulia Octaviani, Farid Husin, Firman F. Wirakusumah, Hadi Susiarno, Hadyana Sukandar, Dadan Susandi, 2019). Analisis Penyebab kematian Maternal Di Kabupaten Garut (Studi Epidemiologi dalam Upaya Menurunkan Kematian Maternal di Provinsi Jawa Barat)	Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian sequential explanatory mixed method. Tahap pertama dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode deskriptif pada 45 dokumen OVM (Otopsi Verbal Maternal) dan RMMP (Rekam Medis Maternal Perantara), dilanjutkan dengan tahap kualitatif dengan melakukan in depth interview dan Focus Group Discussion (FGD) pada keluarga, tenaga kesehatan dan petugas pencatatan	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab kematian maternal di kabupaten Garut.	Hasil penelitian ini penyebab kematian maternal di Kabupaten Garut penyebab yang dapat di cegah yaitu sebesar 96%, disebabkan oleh multifactor, yang didominasi oleh faktor pasien dan faktor tenaga kesehatan. Faktor pasien disebabkan oleh karakteristik ibu yang berisiko serta adanya persepsi negative terhadap fasilitas kesehatan, sedangkan faktor pasien lebih kepada	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan yang akan dicapai. Diartikel ini tujuannya yaitu mengetahui penyebab kematian maternal. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui faktor penyebab kematian maternal.

		pelaporan kematian maternal.		kurangnya konseling yang efektif dan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kewenangan yang dimiliki dalam memberikan asuhan.	
6.	(Astri Nurdiana & Riska Setiawati, 2019). Memahami Tren Penyebab Kematian Ibu Dengan Menggunakan Data Audit Maternal Di Kabupaten Karawang, Indonesia.	Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan analisis data univariat	Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana data yang didapatkan dari dokumen audit maternal dalam kasus kematian ibu di kabupaten karawang.	Hasil penelitian didapatkan bahwa preeklampsia dan pendarahan merupakan dua penyebab langsung tertinggi kematian ibu, dalam 1 tahun terdapat 21,7% kasus pendarahan dan 21,7 kasus preeklampsia. Kasus kematian terjadi mayoritas pada ibu dengan usia 20-35 tahun (56,5%), pendidikan SD (50%), ibu bekerja sebagai	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan yang akan dicapai. Dalam artikel ini tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana data yang didapatkan dari dokumen audit maternal dalam kasus kematian ibu di kabupaten karawang. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui faktor penyebab

				ibu rumah tangga (87%), ibu hamil ke 2 atau 3 (67,4%), frekuensi asuhan antenatal mayoritas kematian terjadi dengan jumlah ANC 4 atau lebih (60,9%), periode kematian mayoritas terjadi pada masa nifas (50%).	kematian maternal.
--	--	--	--	--	--------------------

E. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis penyebab kematian maternal di Sulawesi Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Untuk Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan institusi dan mahasiswa keperawatan sebagai sumber ilmu dan informasi terkait dengan faktor-faktor penyebab kematian maternal.

2. Manfaat Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terkhusus dengan faktor penyebab kematian maternal sehingga dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Selain itu, sebagai sumber referensi tambahan dan acuan pengembangan konsep dan intervensi pada penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dasar masyarakat terkhusus ibu hamil dan melahirkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kematian Maternal

1. Definisi Kematian Maternal

Kematian maternal menurut WHO (2010) adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Kematian maternal atau kematian ibu menurut *The Tenth Revision of International Classification of Disease (ICD-10)* adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah kehamilan, tidak tergantung dari lama atau lokasi kehamilan. Disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut, atau penanganannya, akan tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO, 2015)

Kematian perinatal merupakan kematian bayi yang lahir pada usia kehamilan 22 minggu sampai dengan kurang 7 hari setelah kelahiran, hal ini dikaitkan dengan penyebab kematian bayi yang berhubungan dengan peristiwa obstetrik seperti lahir mati dan kematian bayi pada minggu pertama kehidupannya. Kasus kematian perinatal sebesar 402 kasus, dengan 217 lahir mati dan 185 kematian pada neonatal dini. Namun dimungkinkan angka ini belum sesuai yang terjadi dilapangan karena di asumsikan banyak data-data kematian yang belum dilaporkan dengan baik.

Beberapa studi menyebutkan sebagian besar faktor kematian maternal yang dapat di cegah seperti faktor tenaga kesehatan, faktor pasien, faktor transportasi/rujukan dan faktor administrasi. Faktor pasien lebih dipengaruhi oleh kondisi maternal seperti karakteristik ibu diantaranya umur, paritas, jarak kehamilan, penyakit penyerta seperti serta faktor bayi

seperti kelainan bawaan sejak sejak kehamilan. Faktor petugas lebih dipengaruhi oleh kompetensi dari petugas kesehatan. Faktor ketersediaan fasilitas kesehatan lebih dipengaruhi oleh kesediaan darah, alat dan obat di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Sakinah et al., 2023).

2. Faktor Penyebab Kematian Maternal

a. Perdarahan

Perdarahan post partum merupakan salah satu masalah penting karena kesehatan ibu yang dapat menyebabkan kematian, walaupun seorang ibu bertahan hidup setelah mengalami perdarahan pasca persalinan, namun ia akan menderita akibat kekurangan darah yang berat (anemia berat) dan akan mengalami masalah kesehatan yang berkepanjangan. Perdarahan post partum dapat ditangani dengan perawatan kebidanan dasar, namun keterlambatan dapat mengakibatkan komplikasi lebih lanjut sehingga memerlukan pelayanan kebidanan darurat yang komprehensif. Bukti dan penelitian menunjukkan bahwa penanganan aktif pada persalinan kala III dapat menurunkan insidensi dan tingkat perdarahan post partum. Tindakan pencegahan tidak saja dilakukan sewaktu bersalin, namun juga dimulai sejak ibu hamil dengan melakukan antenatal care yang baik (Ani et al, 2019).

Salah Satu penyebab utama tingginya angka kematian ibu di Indonesia sekitar 307 per 100.000 kelahiran hidup adalah karena pendarahan, baik itu pada masa kehamilan, persalinan maupun pada masa nifas. Pendarahan post partum masih menjadi salah satu dari 3 penyebab utama kematian ibu secara global. Meskipun mayoritas (99%) kematian dilaporkan terjadi di negara berkembang, risiko pendarahan post partum tidak boleh diremehkan pada setiap kala persalinan. Tidak hanya itu, kala III menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena kala III merupakan kala persalinan yang berbahaya. Selama kala ini, fokus dan perasaan emosional ibu sering berubah secara spontan dari kelelahan konsentrasi terhadap persalinan yang actual menjadi ekspiorasi dan pengenalan terhadap bayinya yang baru lahir (Muthmainnah et al., 2017).

Sebenarnya pendarahan post partum dapat diturunkan dengan penanganan yang optimal dari tenaga kesehatan. Akan tetapi, dalam penurunan angka kejadian pendarahan post partum akibat pendarahan tidak hanya mengurangi risiko kematian ibu, tetapi juga menghindarkannya dari risiko kesakitannya yang berhubungan dengan pendarahan post partum, seperti transfusi, tindakan operatif, dan infeksi. Jadi yang menjadi titik utama adalah keterampilan dari petugas dalam menangani kejadian pendarahan postpartum. Penyebab pendarahan pasca persalinan (Ismunandar, 2017), yaitu :

1) Atonia Uteri

Atonia uteri adalah gagalnya uterus berkontraksi dengan baik setelah persalinan. Faktor predisposisinya meliputi umur yang terlalu muda, atau terlalu tua, paritas (multipara dan primipara), partus lama, uterus terlalu renggang atau besar (pada gamellii, bayi besar), kelainan uterus dan fakto sosial ekonomi.

2) Robekan Jalan Lahir

Untuk komplikasi ini biasanya kejadian tidak terduga dalam waktu yang cepat, bidan harus dapat melakukan tindakan penyelamatan sebelum ibu mengalami syok hipovolemik. Deteksi yang dapat dilakukan adalah senantiasa siaga ketika melakukan pertolongan persalinan, gejalannya dapat berupa perdarahan segera dimana darah segar mengalir segera setelah bayi lahir, kontraksi uterus baik, plasenta baik, kadang ibu terlihat pucat, ibu tampak lemah dan menggigil.

3) Perdarahan Postpartum

Merupakan perdarahan yang jumlahnya melebihi 500 ml dalam 24 jam pertama setelah persalinan atau kapan saja selambat-lambatnya dalam 12 minggu pertama setelah persalinan.. Diperkirakan bahwa perdarahan postpartum terjadi sekitar 5% dari semua persalinan pervagina, dan sekitar seperempat dari seluruh kematian ibu disebabkan oleh perdarahan postpartum. Adapun faktornya adalah

partus lama, anemia, paritas, peregangan uterus yang berlebihan, oksitosin drip, persalinan dengan tindakan dan lain-lain. Perdarahan yang tidak tertangani dengan baik dapat mengakibatkan syok dan menurunnya kesadaran akibat, banyaknya darah yang keluar. Hal ini menyebabkan gangguan sirkulasi darah keseluruhan tubuh dan dapat menyebabkan hipovolemia berat. Bila hal ini terjadi bisa mengakibatkan ibu tidak terselamatkan.

b. Preeklampsia

Preeklampsia adalah kelainan multi sistematis yang terjadi pada kehamilan yang ditandai dengan adanya hipertensi dan edema, serta dapat disertai proteinuria, biasanya terjadi pada usia kehamilan 20 minggu keatas atau dalam triwulan ketiga dari kehamilan, sering terjadi pada kehamilan 37 minggu ataupun dapat terjadi segera sesudah persalinan (Lalenoh, 2018).

Preeklampsia merupakan sindroma spesifik kehamilan yang terutama berkaitan dengan berkurangnya perfusi organ akibat vasospasme dan aktivitas endotel, yang bermanifestasi dengan adanya peningkatan tekanan darah dan proteinuria. Preeklampsia dapat berkembang dari ringan, sedang, sampai dengan berat, yang dapat berlanjut menjadi eklampsia. Preeklampsia berat adalah preeklampsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah distolik ≥ 110 mmHg disertai proteinuria > 5 g/24 jam. Preeklampsia dapat timbul pada saat sebelum, selama, serta setelah persalinan.

Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15% penyulit kehamilan dan salah satu dari tiga penyebab tertinggi mortalitas dan morbiditas di samping pendarahan dan infeksi. Secara global 80% kematian ibu disebabkan oleh hipertensi. Faktor risiko terjadinya preeklampsia yaitu primigravida, primipaternitas, umur, riwayat preeklampsia atau eklampsia, penyakit ginjal, dan hipertensi yang sudah ada sebelum kehamilan, kehamilan ganda, serta obesitas (Sudarman et al., 2021)

Penyebab hipertensi dalam kehamilan dipengaruhi oleh riwayat keturunan, rasa tau golongan etnik, obesitas dan tingkah laku, umur ibu dan jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu. Penyakit hipertensi dalam kehamilah dengan mortalitas tertinggi adalah penyakit utama pada primigravida dan kehamilan > 4 kali. Pada primigravida 3 atau ibu yang pertama kali hamil dan > 4 kali hamil sering mengalami stres dan mengalami persalinan sehingga resiko meningkat lagi pada grandemulti gravida. Primigravida mempunyai resiko lebih besar terjadi hipertensi dalam kehamilan jika dibandingkan dengan multigravida (Flora, 2021)

Wanita yang mengalami hipertensi pada kehamilan pertama akan meningkatkan preeklampsia pada kehamilan berikutnya, kejadian hipertensi menunjukkan bahwa seorang ibu hamil yang mempunyai riwayat hipertensi cenderung memiliki riwayat hipertensi pada kehamilan kedua bila kehamilan dengan jarak yang jauh. Hipertensi dalam kehamilan merupakan masalah medis yang kerap kali muncul dan dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti kejang eklamsi, pendarahn otak dan BBLR. Ibu hamil dengan jarak kehamilan kurang dari 10 tahun memiliki peluang sebesar 3 kali untuk menderita preeklampsia jika dibandingkan dengan ibu hamil dengan jarak 10 tahun. Ibu hamil yang memiliki penyakit kronis memiliki peluang untuk menderita preeklampsia dibandingkan ibu hamil tanpa penyakit kronis sebelumnya (Abik, et al, 2021).

c. Infeksi

Setiap individu memiliki kesempatan atau peluang untuk mengalami penyakit menular, termasuk ibu yang sedang mengandung atau baru saja melahirkan. Beberapa infeksi yang menyerang ibu hamil dapat menular dengan cara menurun atau dari ibu yang menularkan ke janin yang dikandungnya. Jika janin yang terinfeksi , maka kemungkinan akan terjadi kelahiran premature atau catat lahir dapat terjadi. Penularan virus ke janin yang berasal dari ibu meliputi Toksoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan

Harpes atau dikenal sebagai TORCH. Keempat macam penyakit menular ini sama-sama berbahaya (Natalia et al., 2023).

1) Toksoplasma

Penyebab infeksi toksoplasma adalah parasit yang dikenal sebagai Toksoplasma gondii. Pada dasarnya gejala infeksi Toksoplasma tidak spesifik. Sekitar 10% hingga 20% kasus infeksi Toksoplasma memiliki gejala ringan, yang sama dengan flu dan biasanya tidak menimbulkan masalah. Namun infeksi ini bisa berbahaya bagi ibu yang sedang mengandung atau seseorang yang kekebalan tubuhnya dalam kondisi menurun atau lemah. Jika wanita hamil terkena infeksi maka bisa menyebabkan keguguran spontan (4%), bayi lahir mati (3%), atau seorang bayi yang terkena Toksoplasmosis secara bawaan.

2) Rubella

Gejala infeksi rubella dapat dikenal dari demam tiba-tiba, ruam kulit, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Virus rubella dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak, maupun dewasa muda. Jika terjadi pada ibu hamil muda, infeksi rubella dapat membahayakan bayi yang dikandungnya. Jika infeksi yang terjadi pada bulan pertama kehamilan, risiko kelainan bayi mencapai 50%, sedangkan jika terjadi pada trimester pertama risiko mencapai 25% (sesuai dengan American College Of Obstetricians and Gynecologists, 1981). Meskipun gejala infeksi rubella sangat bervariasi pada individu, beberapa orang mungkin tidak menyadari, terutama jika ruam merah tidak terlihat. Oleh karena itu, diagnosis infeksi rubella yang tepat dilakukan dengan bantuan tes laboratorium.

3). Cytomegalovirus

Penyebab infeksi Cytomegalovirus (CMV) adalah virus Cytomegalovirus yang termasuk keluarga virus herpes. Virus CMV bersifat membahayakan bagi janin jika kondisi ibu yang

mengandungnya dalam status terinfeksi. Jika terjadi infeksi pada saat ibu mengandung, maka ada risiko janin terinfeksi dan mengalami gangguan seperti pembesaran hati, tuli, penyakit kuning, opasitas otak, disabilitas intelektual dan lain-lain.

4). Herpes

Infeksi herpes kelainan (genital) disebabkan oleh virus herpes simpleks tipe II (HSV II). Virus ini bisa berada dalam bentuk laten, menyebar melalui serabut saraf, sensorik, dan menetap di ganglia otonom. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi HSV II biasanya mengalami luka pada kulitnya, tetapi tidak selalu terlihat sehingga dapat terlewatkan. Infeksi HSV II pada bayi yang baru lahir bisa berakibat fatal (lebih dari 50 kasus). Pemeriksaan laboratorium, yaitu IgG dan Igm anti HSV II, sangat penting untuk mendeteksi infeksi HSV II dengan cepat dan mencegah kerusakan yang lebih parah pada bayi jika infeksi terjadi selama kehamilan.

Di sisi lain, ibu yang telah melahirkan di anggap mengalami infeksi nifas jika mereka mengalami peningkatan suhu tubuh hingga 38 derajat celsius atau di atasnya dalam satu hari pertama setelah melahirkan, dan berhenti pada hari ke sepuluh setelah melahirkan (Joyce Y, 2010). Infeksi pada ibu nifas terjadi akibat infeksi bakteri yang berkembang selama persalinan.

d. Lain-Lain

1. Umur

Umur wanita <20 atau >35 tahun beresiko mengalami komplikasi obstetrik dan umur reproduksi sehat yaitu 20-35 tahun. Umur berhubungan dengan proses reproduksi, umur di bawah 20 tahun belum cukup matang dalam menghadapi kehamilan dan persalinan, Rahim dan panggul belum berkembang dengan baik sehingga perlu di waspadai kemungkinan mengalami persalinan yang sulit. Sebaiknya umur di atas 35 tahun resiko

mengalami pendarahan, hipertensi, obesitas, diabetes melitus, mioa uteri, persalinan lama dan penyakit lainnya. Umur ibu 15-19 tahun dua kali lipat lebih mungkin meninggal akibat melahirkan dibandingkan umur dua puluhan dan umur dibawah 15 tahun memiliki resiko lima kali lebih mungkin untuk meninggal (Aeni, 2013).

Hal ini dikarenakan banyak ibu hamil di usia reproduksi sehat yang merupakan usia aman untuk hamil sehingga risiko kematian banyak pada usia tersebut. Kehamilan usia di bawah 20 tahun secara fisik dan emosional belum matang secara fisiologis menyebabkan ketidaknyamanan psikologis apalagi kalau ada faktor eksternal seperti kehamilan tidak diinginkan atau kehamilan di luar nikah. Sedangkan kehamilan di atas usia 35 tahun akan menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan karna kondisi fisik ibu dan kualitas organ reproduksi sudah berkurang fungsinya (Sakinah et al., 2023)

2. Paritas

Paritas adalah riwayat reproduksi seorang wanita yang berkaitan dengan jumlah kehamilan. Klasifikasi paritas dapat dibagi menjadi: primiparan dengan paritas 1 anak, multiparan dengan paritas 2-4 anak dan grandemulti adalah seorang wanita yang telah melahirkan lima orang anak atau lebih. Paritas yang ideal adalah 2-3, dengan jarak persalinan 3-4 tahun. Bila G lebih dari 5 dan umur ibu lebih dari 35 tahun maka disebut 'grande multigravida' yang memerlukan perhatian khusus (Jaya & Syokumawena, 2019).

3. Jarak Kelahiran

Jarak kelahiran adalah interval waktu antara dua kehamilan yang berurutan dari seorang wanita. Jarak kelahiran yang pendek secara langsung akan memberikan efek terhadap kesehatan wanita maupun kesehatan janin yang di kandung. Seorang wanita setelah bersalin membutuhkan waktu 2 sampai 3 tahun untuk memulihkan tubuhnya dan mempersiapkan diri untuk kehamilan dan persalinan berikutnya. Bila jarak kelahiran terlalu dekat,

dapat cenderung menimbulkan kerusakan tertentu pada sistem reproduksi baik secara fisiologis maupun secara patologis sehingga memberikan kemungkinan terjadinya anemia bahkan dapat menyebabkan kematian maternal (Sawitri et al., 2014)

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Pengetahuan yang dipengaruhi tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang dalam berperilaku sehat. Perubahan perilaku masyarakat disebabkan semakin meningkatnya tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan maka pengetahuan semakin banyak dan berakibat pada meningkatnya kualitas hidup terutama dibidang kesehatan.

Tingkatan pendidikan menurut undang-undang no 20 tahun 2003 terdiri dari pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, pendidikan menengah yaitu SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi yaitu diploma, sarjana, spesialis, dan doktor. Salah satu penyebab kematian maternal karna rendahnya pengetahuan ibu tentang risiko kehamilan diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan. Hasil penelitian Baral dkk di Nepal menunjukan pendidikan rendah berkaitan dengan tingginya prevalensi persalinan di rumah tanpa bantuan tenaga kesehatan yang terampil. Wanita dengan pendidikan rendah dan berumur 30-39 tahun berkaitan dengan rendahnya pemanfaatan tenaga penolong persalinan yang terampil dibandingkan dengan wanita usia muda.

Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan berpikir seseorang secara terarah dan rasional. Pendidikan yang tinggi memungkinkan seseorang mempunyai pengetahuan yang luas. Pengetahuan merupakan ranah yang sangat penting dalam pembentukan perilaku. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka ia akan memiliki kemampuan yang sangat tinggi serta berbagai keterampilan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin luas pola pikir

serta perilakunya. Tingkat pendidikan akan mempunyai kecenderungan yang tidak sama dalam mengerti dan bereaksi terhadap kesehatannya (Sakinah et al., 2023).

5. Penyakit Penyerta

Ibu yang memiliki riwayat penyakit mempunyai risiko 6,4 lebih besar untuk terjadi kematian maternal dibandingkan dengan yang tidak memiliki riwayat penyakit. Jenis penyakit yang di derita ibu antara lain hipertensi, jantung, asma, bronkhiale, anemia, leukimia, typoid, dan TB paru (Aeni, 2013).

Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyakit yang di derita ibu selama kehamilan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap peningkatan langsung pada kematian maternal dan yang umum terjadi adalah anemia (12%), Tuberculosis (TB) (10%), HIV/AIDS (2%) dan malaria (2%).

Namun ada beberapa kasus yang tidak terdeteksi penyakit sebelumnya seperti penyakit jantung dimana jumlah penyebab kematian akibat penyakit jantung. Hal ini kemungkinan bisa disebabkan karena kurang deteksi dini selama kehamilan melalui pemeriksaan kehamilan yang berkualitas atau kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada ibu untuk mengenali tanda bahaya pada kehamilan sehingga ibu tidak mengetahui bahwa sebenarnya memiliki penyakit yang memperberat kehamilan dan berisiko pada kematian. Semakin awal terdeteksi penyulit pada masa kehamilan maka akan mempercepat penanganan dan bisa merencanakan persalinan dan nifas yang aman bagi ibu.

6. Kunjungan ANC

Upaya deteksi dini kehamilan risiko tinggi perlu mendapat perhatian agar komplikasi yang menyebabkan kematian maternal dapat di cegah. Walaupun komplikasi obstetri tidak diperkirakan selamanya, tidak berarti bahwa komplikasi tersebut tidak dapat ditangani. Setiap ibu hamil berisiko untuk mengalami komplikasi obstetri maka perlu memiliki akses

terhadap pelayanan kegawatdaruratan obstetrik. Melalui pelayanan antenatal yang berkualitas dapat memantau kesehatan ibu hamil setiap saat dan secara dini dapat dilakukan intervensi mencegah faktor risiko kematian maternal (Simarmata et al., 2012). Buruknya pelayanan kesehatan antenatal, persalinan dan pasca persalinan merupakan hambatan utama menurunkan kematian maternal.

7. Penolong Persalinan

Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten (Kementrian Kesehatan RI, 2017). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar (Kemenkes RI, 2019). Para ahli kesehatan ibu sepakat bahwa kehadiran tenaga kesehatan selama persalinan dan periode awal postpartum mungkin merupakan kunci penting untuk mengurangi kematian ibu. Umur merupakan karakteristik deografi yang juga mencerminkan atau berhubungan dengan karakteristik sosial (perbedaan sosial dari umur mempengaruhi berbagai tipe dan ciri-ciri sosial) (Enadarlita, 2019).

Sehingga perlu pendekatan kepada paraji untuk berkolaborasi menjaga kesehatan ibu dan bayi agar tenaga kesehatan mendapat tempat di hati masyarakat dan keitraan antara bidan dengan paraji dapat terjalin dengan baik dimana pada saat bidan menolong persalinan selalu menghubungi paraji dan jika keluarga memanggil paraji maka paraji membawa pasien ke tempat bidan (Jasmiati et al., 2019).

8. Tempat Persalinan

Persalinan dilakukan sesuai dengan standar persalinan normal atau standar persalinan komplikasi. Standar persalinan normal adalah Asuhan Persalinan Normal (APN) sesuai standar normal dan memenuhi persyaratan meliputi:

- 1) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan

- 2) Tenaga adalah tim penolong persalinan, terdiri dari dokter, bidan dan perawat, apabila terdapat keterbatasan akses tenaga medis, persalinan dilakukan oleh tim minimal 2 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari bidan-bidan, atau bidan-perawat
- 3) Tim penolong mampu melaksanakan tata laksana awal penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Beberapa faktor yang menyebabkan ibu memilih tempat persalinan yaitu kepercayaan terhadap tenaga kesehatan, biaya, akses ke pelayanan kesehatan serta pengetahuan dalam mencari penolong dan tempat persalinan yang aman serta dukungan keluarga. Oleh karena itu, untuk melakukan pertolongan persalinan oleh nakes harus ada persiapan yang tepat, baik persiapan penolong, alat dan bahan yang di sediakan penolong, persiapan tempat, persiapan biaya, persiapan lingkungan dan keluarga serta persiapan transportasi rujukan yang memadai.

9. Kasus Rujukan

Rujukan ibu hamil dibedakan menjadi rujukan kegawatdaruratan yang dilakukan sesegera mungkin karna berhubungan dengan kondisi kegawatdaruratan yang mendesak dan rujukan berencana dilakukan dengan persiapan lebih panjang dan keadaan umum relatif lebih baik (Nurdiana & Setiawati, 2019)

10. Keterlambatan

Hal keterlambatan yaitu terlambat mengenali tanda bahaya dan risiko, terlambat mengambil keputusan untuk mencari pertolongan, terlambat mendapatkan transportasi untuk mencapai sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan terlambat mendapatkan pertolongan difasilitas rujukan. Hal tersebut sebenarnya bisa di cegah dengan pengenalan tanda bahaya lebih dini, dengan pendidikan yang baik diharapkan,

masyarakat lebih cepat mendeteksi kegawatdaruratan yang terjadi sehingga tidak terjadi kematian maternal (Masturoh et al., 2018).

Menurut Thandeus Maine (1994) dalam Gelany SE., et al (2015) banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kematian pada ibu, selain ada penyebab langsung ada pula penyebab tidak langsung seperti faktor keterlambatan dalam pengambilan keputusan, keterlambatan dalam mencapai tempat rujukan, dan keterlambatan dalam mendapatkan penanganan yang memadai di fasilitas rujukan (Masturoh et al., 2018).

Keterlambatan pengambilan keputusan dimungkinkan karena terlambat menyadari adanya masalah/terlambat mendeteksi dini masalah, perasaan takut terhadap rumah sakit atau kurangnya biaya (masalah ekonomi) (Masturoh et al., 2018).

Keterlambatan dalam mencapai tempat rujukan bisa karena sulit dalam sarana transportasi, sedangkan keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan bisa terjadi karena kurangnya fasilitas pelayanan medis, terbatasnya ruang operasi dan terbatasnya pasokan darah. Keterlambatan pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan di rumah sakit rujukan, dan faktor tersebut memiliki dampak terbesar pada kematian maternal, karena tidak semua fasilitas menyediakan pelayanan kegawatdaruratan obstetric, sehingga menjadi masalah tersendiri bagi sistem pelayanan kesehatan (Masturoh et al., 2018).

Menurut Sumarni (2014) keterlambatan dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pendidikan dan pekerjaan ibu. Pendidikan berpengaruh terhadap keterlambatan dalam pengambilan keputusan karena perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, menyebabkan kurangnya pengertian mereka akan bahaya yang dapat menimpa ibu hamil terutama dalam hal kegawatdaruratan kehamilan dan persalinan (Masturoh et al., 2018)

3. Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

Berbagai pemerintah daerah dengan berbagai upaya program dalam percepatan penurunan AKI seperti inovasi jari emas oleh kabupaten Karawang Jawa Barat, Madulin oleh Kalimantan tengah (masy peduli ibu bersalin), Kabupaten Banyuwangi dengan Tak Manabi (turunkan angka kematian ibu dan bayi), dan masih banyak program-program lainnya.

Upaya lainnya juga dengan program menempatkan bidan desa secara besar-besaran dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, *Making Pregnancy Safer (MPS)* dengan meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu serta neonatal di tingkat pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Upaya lainnya untuk menurunkan keatian ibu dan bayi adalah Emas (*Expanding maternal and survival*) merupakan program kerjasama kementerian kesehatan RI dan USAID selama lima tahun (2012-2016). Program emas ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan PONEK dan PONEK, emastikan intervensi media prioritas yang mempunyai dampak besar pada penurunan kematian diterapkan di RS dan Puskesmas. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi sistem rujukan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjamin akuntabilitas dan kualitas nakes, faskes dan pemda, program penempatan bidan desa, pembangunan pondok bersalin desa (Polindes), pembangunan puskesmas dengan pelayanan obstetrik neonatal eergensi dasar (PONEK) dan pengembangan desa siaga (Ulfah, 2021).

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan AKI antara lain:

- 1) Program menuju penjaminan kompetensi bidan di desa sesuai standar.
- 2) Program menuju penjaminan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mampu pertolongan persalinan 24/7 sesuai standar.

- 3) Program menuju penjaminan seluruh puskesmas PONEK dan RS PONEK Kabupaten/Kota berfungsi 24/7 sesuai standar.
- 4) Program menuju penjaminan terlaksananya rujukan efektif pada kasus komplikasi.
- 5) Program menuju penjaminan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program percepat penurunan kematian ibu.
- 6) Program peningkatan pemahaman dan pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) di masyarakat komplikasi dan kegawat daruratan maternal dan neonatal bersifat "Unpredictable" yang bisa terjadi kapan saja dan pada ibu maupun bayi manapun. Tenaga kesehatan yang kompeten sangat diperlukan untuk melakukan deteksi, penanganan awal dan rujukan kasus-kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal. Untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, lembaga pendidikan tenaga kesehatan harus mempunyai tenaga pendidikan yang kompeten juga dalam memberikan materi tentang kegawat daruratan maternal neonatal (Triana et al., 2012)

B. Konsep Dasar Hidup dan Mati

1. Definisi

Kata hidup (*al-hayah*). Kata ini mengandung makna hidup, kehidupan, tumbuh kembang, kekal atau berguna. Kata *hayat* dalam al-Qur'an selalu dikaitkan dengan kehidupan manusia di dunia yang ditandai antara lain dengan pertumbuhan fisik, pertambahan usia, pemenuhan kebutuhan biologis, hubungan silaturahmi, kepemilikan harta, kedudukan, kemegahan, dan seterusnya yang kemudian pikun dan pada gilirannya akan mati. Sedangkan mati dari segi ke-bahasaan, istilah kata mati (*al-mawt*) memiliki korelasi yang sama dengan istilah pancaindera, akal dan lain-lain. Korelasi ini

mengandung pemahaman bahwa kematian yang dimaksud berarti telah kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk hidup, dan ini sama seperti seorang yang telah kehilangan sejumlah organ tubuh, yang menyebabkan seseorang tidak dapat merasakan atau melihat sesuatu. Mati mengindikasikan berlawanan dengan kata hidup (*al-hayah*), meski kemudian kata ini merupakan ciptaan Allah SWT. namun demikian mati dan hidup berkaitan erat dengan kedudukan dan perwujudan roh. (Umar, 2016).

Kematian pada dasarnya adalah peristiwa universal yang akan dihadapi semua manusia yang hidup, tetapi konseptualisasi manusia mengenai peristiwa ini dapat beragam secara kultural dan konseptual. Konseptualisasi terhadap kematian ini juga bervariasi secara kontekstual seperti dalam ranah agama. Sebagai contoh, karena agama Hindu dan Budha mempercayai adanya *reinkarnasi*, kematian dipandang sebagai proses dari siklus perjalanan manusia sebelum ia kembali dilahirkan di dunia. Namun agama Islam tidak mengenal konsep *reinkarnasi*, kematian tidak dipahami seperti siklus. Selain pandangan kematian sebagai bagian dari siklus tersebut, pandangan Islam terhadap konsep kematian juga rupanya tidak terbatas pada tidak berfungsinya organ-organ vital (mis., jantung dan otak) yang mendukung jalannya aktivitas biologis dan neurologis yang kompleks dalam tubuh manusia seperti di dunia kedokteran, tetapi kematian secara umum dimaknai sebagai transendensi dari kehidupan (*life*) ke akhirat (*afterlife*) yang merupakan tujuan akhir manusia (Adelia, 2019).

2. Kematian Dalam Perspektif Agama Islam

Menurut perspektif Islam kematian dianggap sebagai peralihan kehidupan, dari dunia menuju kehidupan di alam lain. Kematian didefinisikan sebagai kehilangan permanen dari fungsi integratif manusia secara keseluruhan. Al-Qur'an merupakan media terbaik yang paling representatif dalam mengungkapkan perspektif Islam mengenai kematian dan pasca kematian.

Allah berfirman dalam Qs. Ali-Imran/3:185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Terjemahnya:

Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan kedalam surga sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. (<https://quran.keenag.go.id>)

Penjelasan dari ayat di atas adalah setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Pada hari kiamat nanti tiap perbuatan yang dikerjakan akan diberikan pembalasan yang adil. Balasan dari perbuatan amal baik dan buruk tersebut berupa keputusan akhir di akhirat, yakni surga dan neraka. Mereka yang terpilih sebagai penghuni surga dan dijauhkan dari neraka disebut sebagai orang yang mendapat kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki bukanlah berupa kedudukan dan pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, rumah dan istana yang mewah. Semua itu akan musnah. Kehidupan di dunia hanyalah sementara dan penuh tipu daya. Baik kenikmatan berupa makanan, minuman, pangkat, kedudukan, dan sebagainya mampu membawa kerugian besar bagi manusia di akhirat kelak. Hal ini berlaku bagi mereka yang terlena dengan kenikmatan sementara tersebut (Kemenag, 2023).

3. Perbedaan Mati Syahid Ibu Hamil dan Mati Syahid Dalam Medan Perang

Mati syahid merupakan kematian yang di idam-idamkan oleh setiap umat Islam mengingat keistimewaaan dan keutamaan yang akan didapatkan. Di dalam Al-Qur'an orang yang mati syahid disejajarkan dengan para nabi, para pecinta kebenaran dan orang-orang shaleh. (Anas, 2021).

Syahid dalam hukum di dunia dan akhirat yakni orang yang syahid di medan perang (syahid al-Ma'rakah). Menurut pendapat jumbuh ulama.

Adapun hukum di akhiratnya ialah memperoleh pahala spesial yakni pahala syahid yang sempurna. Menurut ulama Malikiyyah, pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'iyah dan pendapat Muhammad saw. serta Abu Yusuf mati syahid dalam peperangan tidak dimandikan. Ia dikafani dengan pakaiannya yang masih layak dan dikubur bersama darahnya. Seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah saw. melarang untuk memandikan mereka, karena setiap luka atau darah akan tercium semerbak sebagai aroma kasturi pada hari kiamat. Demikian pula Rasulullah saw. memerintahkan agar syuhada perang uhud dikubur bersama darah mereka tanpa dimandikan dan tidak di salati. Al-Syafi'i mengatakan bahwa tidak dimandikan dan tidak di salatkan mereka supaya mereka dapat menghadap Allah swt. dengan luka-luka mereka karena seperti yang di tegaskan dalam hadis, aroma darah mereka akan menjadi aroma kasturi. Begitu pula dengan perlakuan Allah swt. yang memuliakan mereka, membuat mereka tidak memerlukan lagi untuk disalati. Disamping itu dalam rangka meringankan beban bagi pasukan Muslim yang hidup, karena mungkin ada dari mereka yang terluka dan membutuhkan perawatan dan kekhawatiran akan kembalinya musuh untuk menyerang (Anas, 2021).

Salah satu keistimewaan menjadi seorang wanita adalah memiliki Rahim yang memungkinkan untuk hamil dan melahirkan. Melahirkan merupakan peristiwa di ambang hidup dan mati, setiap ibu yang melahirkan sedang bertaruh nyawa. Kematian wanita hamil memiliki keistimewaan tersendiri dalam Islam, jika seorang wanita meninggal pada saat hamil atau melahirkan maka kematian itu disebut syahid. Hukum yang diberikan kepada mereka adalah sama dengan orang yang mati pada umumnya, yakni dimandikan, dikafani dan disalati. Hal ini sudah menjadi konsensus (*ittifaq*) para ulama. Adapun di akhirat mereka memperoleh pahala akhirat dan pahala syuhada (Ridwan, 2022).

Dalam Hadis dijelaskan bahwa terdapat kemuliaan dari ibu yang meninggal karena hamil atau melahirkan Rasulullah saw. bersabda:

أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ شهداء أمتي إذاً لقليل، القتل في سبيل
الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة
والنفساء يجرها ولدها بسره إلى الجنة¹¹

Artinya:

“Tahukah kalian, siapa yang mati syahid dikalangan umatku?” beliau menjawab, orang yang mati syahid dikalangan umatku Cuma sedikit. Orang yang mati berjihad dijalan Allah, syahid orang yang mati karena Tha’un, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena sakit perut, syahid. Dan wanita yang mati karena nifas, dia akan ditarik oleh anaknya menuju surge dengan tali pusarnya (HR. Ahmad:15998).

Penjelasan dari hadis di atas adalah kematian wanita saat hamil dan melahirkan dalam islam memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satu keistimewaan menjadi seorang wanita adalah memiliki rahim yang memungkinkan untuk hamil dan melahirkan bayi. Meski hamil dan melahirkan terkadang menyakitkan, namun ketika hamil wanita juga mendapatkan pahala atas perhatian yang diberikan dalam menjaga kandungan. Wanita yang sedang hamil mendapat pahala yang lebih besar daripada wanita yang tidak hamil. Dan Allah swt. menjanjikan surga bagi wanita yang meninggal pada saat melahirkan (Marisa 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR


C. Kerangka Teori

Bagan 2.1 Kerangka Teori



D. Kerangka Konsep

Bagan 2.2 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada sifat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan (Sugiyono, 2016).

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua induvidu yang menjadi sumber pengambilan sampel yang terdiri atas obyek yang memiliki kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Tarjo, 2019). Dalam penelitian terdapat sejumlah 785 populasi ibu hamil yang mengalami kematian maternal di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 sampai 2022.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili variabel terkait atau populasinya, sampel pada penelitian ini sejumlah 785. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus total (Tarjo, 2019).

D. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya atau dalam sumber lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data-data yang diambil dari arsip tentang kasus kematian pada ibu hamil dan melahirkan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses mengumpulkan data primer dan data sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang teliti atau untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu :

1. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi dalam hal pengumpulan data dikarenakan metode ini sesuai dengan data peneliti yang bersifat sekunder, artinya data yang tidak diambil langsung dari lapangan.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat berupa smartphone, buku, pulpen, dan laptop.

G. Teknik Pengolahan Data

Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara manual dan bantuan pencatatan SPSS untuk memperoleh hasil statistik yang diharapkan.

1. Editing

Editing adalah tahap pemeriksaan informasi yang telah didapatkan. Proses editing tersebut dilakukan apabila data yang masuk ada yang sesuai

maupun tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada bagian editing, penelitian harus melakukan pemeriksaan informasi yang didapatkan dari hasil data sekunder.

2. Koding

Koding berfungsi agar data-data tersebut mudah diolah yaitu dengan cara data disederhanakan dalam bentuk angka.

3. Prosesing

Merupakan tahap saat semua data telah lengkap dan juga telah dilakukan pengkodean. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program SPSS dalam computer atau laptop untuk memasukan data yang diperoleh selama penelitian.

4. Tabulasi data

Tabulasi data adalah pembuatan tabel-tabel data yang dikodekan sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Agregasi harus akurat untuk menghindari kesalahan. Agregasi dilakukan untuk mempermudah pengolahan data dalam tabel. Data diolah secara elektronik menggunakan SPSS.

H. Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan pokok penelitian, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menggunakan fenomena (Nursalam, 2020).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif adalah bentuk analisis data untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel. (Misbahuddin & Iqbal, 2013).

I. Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin kebidang keperawatan (Nursalam, 2020). Penelitian ini hanya melibatkan responden yang mau terlibat saja secara sadar bukan adanya

paksaan dan penelitian ini akan mendapatkan izin etik dari komite Etika Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar, juga menerapkan prinsip-prinsip etik dalam melakukan penelitian ini gunanya untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan dampak yang timbul selama kegiatan penelitian. Etika yang perlu diperhatikan adalah:

1. Anonimity (tampa nama)

Anonimity adalah tindakan untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden,.

2. Beneficience (manfaat)

Dalam sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian.

3. Confidentially (kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian, yang tidak termasuk data yang dibutuhkan peneliti tidak akan mempresentasikan pada saat hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Sulawesi selatan adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi yaitu di Sulawesi bagian Selatan. Berdasarkan letak geografis, Provinsi Sulawesi Selatan terletak di $0^{\circ}12'-8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}48'-122^{\circ}36'$ Bujur Timur. Di sebelah Utara teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di sebelah timur, batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah Selat Makassar dan Laut Flores. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 46.083,94 km² yang secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 21 Kabupaten dan Kota dengan 304 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan 3.023. Kabupaten dan 3 kota dengan 304 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan 3.023. Kabupaten Luwu utara merupakan Kabupaten terluas dengan luas 7.365,51 km² atau luas Kabupaten tersebut merupakan 15,98% dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintahan Sulawesi Selatan menaungi 24 daerah tingkat II dengan 21 wilayah berstatus Kabupaten dan 3 wilayah Kota, yakni Kota Makassar, Kota Pare Pare dan Kota Palopo.

Adapun visi dan misi

Visi :Sulawesi selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter

Misi :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini berisi tentang faktor kematian maternal di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2022 yang telah dilakukan pada bulan Agustus 2023. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang di ambil di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel pada penelitian ini sejumlah 785 kasus. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan hasil data yang didapatkan berupa angka-angka yang kemudian jenis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif frekuensi.

Grafik 4.1
Kematian Maternal Per Tahun



Berdasarkan grafik 4.1 diatas kasus kematian maternal dari 5 tahun terakhir mengalami naik turun. Kematian maternal tertinggi berapa pada tahun 2021 yaitu mencapai 195 kematian maternal, tertinggi kedua pada tahun 2022 yaitu sebanyak 174 kasus, tertinggi ketiga pada tahun 2019 yaitu 144 kasus, tahun 2018 sebanyak 139 kasus dan tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 133 kasus kematian maternal.

Tabel 4.1
Jumlah Kematian Maternal Berdasarkan Penyebab Tahun 2018-2022

Penyebab Kematian Maternal	Frekuensi	Presentase (%)
Perdarahan	235	29,9%
Hipertensi	217	27,6%
Covid-19	40	5,1%
Gangguan Darah	39	5,0%
Infeksi	35	4,5%
Gangguan Metabolik	28	3,6%
Lain-Lain	191	24,3%
Total	785	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas faktor utama penyebab kematian maternal di Sulawesi Selatan adalah perdarahan sebanyak 235 kasus dengan presentase 29,9%, hipertensi sebanyak 217 kasus dengan presentase 27,6%, covid-19 sebanyak 40 kasus yang terjadi pada tahun 2021 dengan presentase 5,1%, gangguan darah sebanyak 39 kasus dengan presentase sebanyak 5,0%, infeksi sebanyak 35 kasus dan memiliki presentase sebanyak 4,5%, gangguan metabolik sebanyak 28 kasus dengan presentase 3,6%, dan yang tidak diketahui penyebabnya sebanyak 191 kasus dengan presentase 24,3%.

Tabel 4.2


Kematian Maternal Berdasarkan Kabupaten/Kota 5 Tahun Terakhir

Kabupaten/Kota	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Total
Gowa	17	14	15	17	14	77
Makassar	5	10	12	14	21	62
Jeneponto	8	11	7	10	15	51
Sinjai	12	7	4	17	8	48
Luwu	6	5	10	15	11	47
Pangkep	10	14	6	8	8	46
Bone	8	8	7	11	7	41
Luwu Utara	5	8	5	10	8	36
Takalar	8	7	6	11	4	36
Luwu Timur	5	8	6	8	7	34
Pinrang	4	6	5	8	10	33
Bulukumba	7	3	4	10	8	32
Maros	3	3	4	5	12	27
Enrekang	6	1	5	9	4	25
Sidrap	2	4	6	7	5	24
Barru	4	7	3	7	2	23
Toraja Utara	7	7	5	1	1	21
Pare-Pare	4	4	2	6	5	21
Wajo	5	4	4	6	1	20
Palopo	3	1	1	6	8	19
Selayar	2	5	7	2	3	19
Bantaeng	3	2	3	2	8	18
Soppeng	2	4	3	2	2	13
Tana Toraja	3	1	3	3	2	12
Jumlah						785

Berdasarkan tabel 4.3 kasus kematian maternal berdasarkan kabupaten/kota tertinggi berada pada kabupaten Gowa yaitu sebanyak 77 kasus kematian maternal, tertinggi kedua berada pada kota Makassar yaitu sebanyak 62 kasus kematian, tertinggi ketiga berada pada kabupaten Jeneponto yaitu sebanyak 51 kasus kematian, tertinggi keempat berada pada kabupaten Sinjai yaitu sebanyak 48 kasus kematian, tertinggi kelima berada pada kabupaten Luwu yaitu sebanyak 47 kasus, dan kasus kematian yang paling rendah berada pada kabupaten Tana Toraja yaitu sebanyak 12 kasus kematian selama lima tahun terakhir.


Grafik 4.2

Kematian Maternal Berdasarkan Penyebab Tiap Tahun



Berdasarkan hasil grafik 4.2 kematian maternal berdasarkan penyebabnya tiap tahun, tahun 2018 penyebab kematian terbanyak karena hipertensi, pada tahun 2019 dan tahun 2020 penyebab terbanyak karena perdarahan, pada tahun 2021 penyebab terbanyak karena penyebab lain, dan penyebab kematian terbanyak pada tahun 2022 adalah hipertensi. Dari hasil

grafik diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian maternal dari tahun 2018 sampai tahun 2022 terbanyak yaitu perdarahan.



Tabel 4.3
Penyebab Kematian Maternal Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/PerdarahanHipertensi Covid-19 GD Infeksi GM Lain2							
Kota							
Selayar	5	4	1	0	3	1	5
Bulukumba	12	11	0	0	0	1	8
Bantaeng	9	6	0	0	0	0	3
Jeneponto	12	15	0	2	1	3	18
Takalar	7	7	0	2	1	0	19
Gowa	25	29	4	5	2	2	9
Sinjai	15	14	3	3	4	2	7
Maros	8	6	0	0	2	0	11
Pangkep	12	16	2	2	6	2	8
Barru	6	1	3	0	0	1	12
Bone	15	19	0	0	0	0	7
Soppeng	7	1	0	1	2	1	3
Wajo	7	7	1	1	0	0	4
Sidrap	5	14	2	1	0	1	1
Pinrang	11	8	2	3	1	0	7
Enrekang	6	5	1	1	1	0	11
Luwu	10	12	3	2	3	5	11
Tana Toraja	3	4	1	0	1	0	3
Luwu Utara	13	7	2	4	1	6	3
Luwu Timur	16	8	3	3	0	0	4
Toraja Utara	9	0	0	1	0	0	11
Makassar	10	15	7	5	8	3	15
Pare-Pare	5	3	4	3	0	0	6
Palopo	7	5	1	0	1	0	5
Jumlah							785

Berdasarkan hasil tabel 4.5 diatas kasus kematian tertinggi karena perdarahan berada pada kabupaten Gowa dengan jumlah 25 kasus, tertinggi kedua berada pada kabupaten Luwu Timur dengan jumlah 16 kasus, tertinggi ketiga berada pada kabupaten Sinjai dan Bone yaitu sejumlah 15 kasus. Kasus tertinggi karena hipertensi berada pada kabupaten Gowa yaitu sejumlah 29 kasus, tertinggi kedua berada pada kabupaten Bone yaitu sejumlah 19 kasus kematian. Kasus kematian yang disebabkan oleh covid-19 tertinggi berada pada kota Makassar yaitu sebesar 7 kasus, tertinggi kedua berada pada kabupaten Gowa dan kota Makassar yaitu sebanyak 4 kasus dan tertinggi ketiga berada pada, kota Baru, kabupaten Luwu dan kabupaten Luwu Timur yaitu sebesar 3 kasus dari 40 kasus yang terjadi padatahun 2021 dari 24 kabupaten/kota. Kasus kematian tertinggi karena gangguan darah berada pada kabupaten Gowa dan kota Makassar yaitu sejumlah 5 kasus selama lima tahun terakhir. Kasus tertinggi kematian karena Infeksi berada pada kota Makassar yaitu sejumlah 8 kasus kematian. Kasus kematian tertinggi karena gangguan metabolik berada pada kabupaten Luwu Utara yaitu sebanyak 6 kasus.

C. Pembahasan

Kematian merupakan salah satu rahasia ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Kematian akan mendatangi setiap mahluk Allah yang bernyawa dengan penyebab yang berbeda-beda tanpa dapat ditawar menawar. Nikmat hamil dan melahirkan yang dialami oleh seorang ibu tidak jarang menjadi penyebab kematian namun tidak ada hal yang sia-sia dalam pandangan Allah. Seorang ibu yang meninggal karena melahirkan maka akan di ganjar dengan pahala seperti orang yang mati syahid (Fadhlihsan, 2011).

Terdapat sebuah hadist yang menyebutkan bahwa seorang wanita yang meninggal dunia saat melahirkan akan mendapatkan pahala orang mati syahid, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasalam.

الشَّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : الْمَطْعُونُ
شَهِيدٌ ، وَالْعَرِقُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ،
وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ
الْهَذْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدٌ .

Terjemahnya:

“Syuhada’ (orang-orang mati syahid) yang selain terbunuh di jalan Allah itu ada tujuh: korban wabah tha’un adalah syahid, mati tenggelam adalah syahid, penderita penyakit lambung (semacam liver) adalah syahid, mati karena penyakit perut adalah syahid, korban kebakaran adalah syahid, yang mati tertimpa reruntuhan adalah syahid, dan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid.” (HR. Malik, Ahmad, Abu Dawud, dan al-nasai, juga Ibnu Majah. Berkata Syu’aib Al Arnauth: hadits shahih).

Penjelasan dari hadist diatas, dalam sudut pandang Islam, mati syahid adalah seorang muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah swt. membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah swt. Beberapa kejadian meninggal dunia dikategorikan mati syahid, dimana kematian tersebut merupakan kekhususan dalam arti husnul khatimah, begitu juga yang meninggal karena hamil atau melahirkan. Mati syahid ada tiga macam, yaitu syahid dunia, syahid akhirat dan syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia adalah seseorang yang berjuang di jalan Allah swt. akan tetapi niatnya hanya karena ingin dapat nama atau pamrih bukan semata karena Allah swt. Sementara mati syahid akhirat adalah umat Islam yang meninggal karena beberapa hal contohnya, wabah penyakit, atau meninggal dalam peperangan. Adapun mati syahid dunia akhirat, ialah mendapatkan pahala keduanya baik dunia maupun di akhirat kelak serta jaminan surga.

1. Faktor Kematian Maternal

a. Perdarahan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat kematian maternal di Sulawesi Selatan yang paling tinggi adalah perdarahan dibuktikan dengan data yang didapatkan sejumlah 235 kasus dengan presentase 29,9% kematian selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sugi, 2015) bahwa penyebab angka kematian ibu terbanyak adalah perdarahan post partum. perdarahan yang disebabkan antara lain, atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, laserasi jalan lahir, kelainan darah, dimana faktor resikonya antara lain adalah umur, paritas yang tinggi. Perdarahan sendiri merupakan penyebab terbanyak dari angka kematian ibu (AKI). Pemerintah Indonesia melalui program MGDs (Millenium Development Goals) mengharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, untuk dapat mencapai target tersebut diperlukan usaha yang tidak mudah karna berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Penyebab terbanyak dari perdarahan postpartum dini adalah atonia uteri dalam persalinan pembuluh darah yang ada di uterus melebar yang meningkatkan sirkulasi kearah tersebut, atonia uteri menyebabkan kontraksi uterus menurun sehingga pembuluh darah yang melebar dan tidak menutup sempurna sehingga perdarahan terjadi terus menerus. Gejala yang selalu ada pada atonia uteri adalah uterus tidak berkontraksi dan lembek serta perdarahan segera setelah anak lahir (Ani, et al, 2019)

Atonia uteri merupakan penyebab utama dalam kasus perdarahan postpartum dini, keadaan ini berhubungan erat dengan kondisi uterus yang sudah menurun sehingga kontraksi uterus jelek dan tidak bisa mengantisipasi terjadinya perdarahan postpartum. Itulah sebabnya atonia uteri lebih banyak terjadi pada seorang wanita dengan partus lama sehingga

rentan terjadi perdarahan postpartum. Tetapi sebaliknya jika kontrol perdarahan dari tempat plasenta atau uterus dicapai dengan kontraksi yang lama dan reaksi serat myometrium yang saling melin serta uterus yang kuat dan berkontraksi dengan baik maka tidak akan terjadi perdarahan postpartum (Faradina, 2017)

Setelah bayi dilahirkan uterus secara spontan berkontraksi. Kontraksi dan retraksi otot-otot uterus menyelesaikan proses ini pada akhir persalinan. Sesudah berkontraksi, sel myometrium tidak relaksasi, melainkan menjadi lebih pendek dan lebih tebal. Dengan kontraksi yang berlangsung kontinyu, myometrium menebal secara progresif dan kavum uteri mengecil sehingga ukuran juga mengecil. Pada partus lama, ibu yang bersalin akan kelelahan. Hal tersebut akan mempengaruhi kontraksi uterus. Adanya gangguan retraksi dan kontraksi otot uterus akan menghambat proses pelepasan dan pengeluaran plasenta sehingga dapat terjadi retensio plasenta. Apabila terjadi retensio plasenta maka terjadi pula perdarahan yang banyak karena uterus tidak dapat berkontraksi dan beretraksi dengan baik (Faradina, 2017)

Selain itu akibat partus lama juga dapat menyebabkan uterus benar-benar kehilangan tonus otot karena myometrium gagal berkontraksi dan beretraksi saat atau setelah plasenta lepas. Dalam kondisi normal, pelepasan plasenta selalu diikuti dengan perdarahan karena sinus-sinus maternalis ditempat insersinya pada dinding uterus terbuka. Biasanya perdarahan itu tidak banyak, sebab kontraksi dan retraksi otot-otot uterus menekan pembuluh-pembuluh darah yang terbuka sehingga lumennya tertutup. Kemudian pembuluh darah tersumbat oleh pembekuan darah. Apabila uterus tidak berkontraksi dan beretraksi maka akan menghambat penutupan pembuluh darah yang terbuka ketika pelepasan plasenta dan penyebab perdarahan yang banyak. Keadaan demikian menjadi faktor utama penyebab perdarahan postpartum. Oleh karena itu semakin lama proses persalinan

maka kemungkinan untuk terjadinya perdarahan postpartum dini semakin besar (Siti, et al, 2018).

Menurut (Ani, et al, 2019). Persalinan lama yang gagal membuka penuh dalam jangka waktu yang lama yaitu 18 jam pada multipara 24 jam pada primipara, sehingga saat memasuki kala III persalinan otot dalam Rahim mengalami kelelahan yang mengakibatkan tidak terjadinya retraksi dan kontraksi serta otot myometrium sehingga menimbulkan kegagalan kompres pembuluh darah pada tempat implantasi plasenta yang dapat menyebabkan perdarahan post partum yaitu atonia uteri.

Faktor penyebab terjadinya *retensio plasenta* yang menyebabkan perdarahan postpartum dan mengakibatkan kematian maternal pada wanita hamil yang melahirkan pada usia dibawah 20 tahun dengan 2-5 kali lebih tinggi daripada perdarahan pasca persalinan yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Apabila didalam pertolongan persalinan diberikan uterotonika segera setelah persalinan plasenta dipercepat dan terjadi kontraksi uterus, maka perdarahan tidak akan terjadi (Siti, et al 2018).

b. Hipertensi

Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal dan diukur paling tidak pada tiga kesempatan. Secara umum seseorang dianggap mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya lebih dari 140/90 mmHg. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 sampai 2022 faktor penyebab kematian maternal kedua di Sulawesi Selatan karena hipertensi yaitu sebanyak 217 orang dan memiliki presentase sebanyak 27,6%. walaupun mengalami naik turun setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 sebanyak 52 orang, tahun 2019 sebanyak 42 orang, tahun 2020 sebanyak 26 orang, tahun 2021 sebanyak 41 orang, dan tahun 2022 sebanyak 57 orang. Hipertensi dalam kehamilan merupakan penyebab langsung kedua yang paling umum dari kematian maternal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dhora & Rachah, 2014). Tentang faktor resiko kematian ibu dengan hipertensi di Provinsi Jawa Timur bahwa penyebab utama kematian ibu adalah hipertensi rata-rata terjadi pada ibu yang berusia 30 tahun, dengan usia minimal 15 tahun dan usia maksimal 41 tahun. Belum ada teori yang pasti berkaitan dengan penyebab terjadinya preeklampsia, tetapi beberapa penelitian menyimpulkan sejumlah faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya preeklampsia. Faktor resiko preeklampsia tersebut meliputi; gravida, usia ibu, riwayat penyakit kronis, dan riwayat preeklampsia.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Abik, et al, 2021) tentang faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia bahwa faktor kematian ibu kedua tertinggi adalah preeklampsia dibuktikan dengan ibu hamil dengan preeklampsia di Puskesmas Cibeureum terus meningkat. Pada tahun 2017 berjumlah 9 kasus dan meningkat di tahun setelahnya yaitu 41 kasus dan sedikit menurun di tahun 2019 yaitu sebesar 39 kasus. Peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2018 menyebabkan Puskesmas Cibeurem menempati peringkat ketiga kasus preeklampsia tertinggi di Kabupaten Kuningan setelah Puskesmas Garawangi (41 kasus) dan Meleber (43 kasus).

Hipertensi adalah salah satu penyakit yang memiliki berbagai komplikasi diantaranya adalah stroke, infark miokard atau gagal jantung, gagal ginjal, dan ensefalopi atau yang sering disebut dengan kerusakan otak. Kasus dengan masalah hipertensi terus meningkat salah satunya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang suka dengan makanan yang cepat saji atau yang sering dijumpai seperti sea food, yang banyak mengandung lemak jahat atau kolestrol. Makanan yang asin dan malasnya berolahraga sangat berdampak berperan dalam menambah jumlah pasien hipertensi. Selain itu ada banyak lagi penyebab lainnya yang dapat menyebabkan hipertensi seperti kegemukan (obesitas), stress merokok, dan

mengonsumsi alcohol, gaya hidup yang tidak sehat dapat memicu terjadinya hipertensi (Mardalena, et al, 2019)

Hipertensi pada umumnya tidak mempunyai riwayat penyebab yang spesifik. Tetapi hipertensi terjadi sebagai peningkatan respon curah jantung yang cepat dengan disebabkan beberapa faktor antara lain: genetic, obesitas, stress karena lingkungan, konsumsi minuman alcohol, dan perubahan elastisitas jaringan serta pelebaran pembuluh darah sehingga sangat berpengaruh terhadap penyakit. (Mardalena, et al, 2019)

Terjadinya hipertensi dipengaruhi oleh gravida. Gravida adalah wanita yang sedang hamil. Status gravida dibagi menjadi 2 kategori, yang pertama primigravida dan multigravida. Primigravida adalah wanita yang hamil pertama kalinya sedangkan primigravida adalah wanita yang hamil kedua atau lebih. Hipertensi banyak dijumpai pada primigravida dari pada multigravida, terutama primigravida usia muda. Primigravida lebih berisiko mengalami hipertensi dari pada multi gravida karena hipertensi biasanya muncul pada wanita yang pertama kali terpapar virus koria. Hal ini terjadi karena pada wanita tersebut mekanisme imunologi pembentukan *blocking antibody* yang dilakukan oleh HLA=G terhadap antigen plasenta belum terbentuk secara sempurna sehingga proses implantasi trofoblas ke jaringan desidua ibu menjadi terganggu. Primigravida juga rentan stress dalam menghadapi persalinan yang menstimulasi tubuh untuk mengeluarkan kortisol. Efek kortisol adalah meningkatkan respon simpatis, sehingga curah jantung dan tekanan darah juga akan meningkat (Abik, et al, 2021).

Hipertensi yang tidak segera ditangani dengan baik, sangat berisiko tinggi terjadinya komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi akibat tekanan darah yang tinggi antara lain stroke atau turunnya intensitas kinerja pada saraf pusat, gagal jantung gagal ginjal, dan pendengaran menurun. Jika komplikasi ini berlanjut maka dapat menyebabkan kematian.

Untuk mengantisipasi hipertensi dalam kehamilan, ibu dapat melakukan pola hidup sehat dengan menjaga makanan yang dikonsumsi,

menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga dan menjauhi stress. Selain itu, ibu hamil juga harus memperbanyak control sejak dini sehingga hipertensi dapat dideteksi dengan lebih cepat oleh dokter (Mardalena et al, 2020).

c. Covid-19

Covid-19 adalah salah satu anggota keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) and MERS (*Middle East Respiratory Syndrom*). Covid-19 dapat menimbulkan risiko yang lebih besar pada wanita hamil dibandingkan dengan populasi wanita yang tidak hamil, karena ada peningkatan konsumsi oksigen dan penurunan kapasitas residu fungsional selama kehamilan, kondisi kehamilan adalah menekan imunitas, sistem kekebalan yang terganggu membuat wanita lebih rentan terhadap infeksi (Rina, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan penyebab kematian maternal adalah covid-19 dibuktikan dengan data yang didapatkan sebanyak 40 kasus dengan presentase sebanyak 5,1% yang terjadi pada tahun 2021 (Rina, 2020).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lisa, 2023) tentang sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak pasca covid-19 di kota Samarinda, bahwa pada tahun 2021 terdapat sekitar 168 kasus kematian ibu dan sebagian besar kematian tersebut disebabkan oleh pandemi covid-19.

Pada masa pandemi terjadi peningkatan jumlah kematian ibu di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur. Kematian ibu hingga saat ini masih menjadi permasalahan bagi Indonesia hingga tahun 2020. Kementerian Kesehatan RI melaporkan bahwa terdapat 305 kematian per kelahiran hidup secara nasional. Covid-19 berdampak pada morbiditas dan mortalitas ibu hamil dan janin, gangguan kehamilan seperti persalinan preterm dan gangguan pertumbuhan janin (Putri et al, 2023).

Ibu hamil dan bersalin yang terkonfirmasi Covid-19 ada yang bergejala dan ada yang tidak, adapun gejala Covid-19 secara umum memiliki gejala demam, batuk, nyeri otot, kadang disertai diare. Ibu hamil yang

terkonfirmasi Covid-19 dan tidak bergejala tetap melakukan isolasi mandiri dan menerapkan protokol kesehatan. Upaya pencegahan dan penularan yang lebih berat. Mayoritas wanita hamil yang didiagnosis dengan penyakit Covid-19 memiliki penyakit ringan dan akan pulih tanpa perlu melahirkan, tetapi risiko penyakit kritis dan kebutuhan ventilasi mekanis meningkat dibandingkan dengan populasi umum. Faktor risiko kematian dan penyakit parah antara lain obesitas, diabetes, dan usia ibu > 40 tahun.

Terdeteksinya Covid-19 ini dapat menurunkan risiko terhadap penolong persalinan kala II, karena pada kala II ini ibu melahirkan akan mengeluarkan cairan melalui mulut berupa batuk, teriakan dan pernafasan. Selain berisiko terhadap penolong persalinan ibu dengan Covid-19 juga berisiko terhadap bayi yang dilahirkan, meskipun beberapa penelitian menyatakan penularan secara vertikal tidak mungkin terjadi, diantaranya dapat terjadi persalinan prematur, pertumbuhan janin yang terlambat, bahkan kerusakan atau kematian janin (Putri et al, 2023).

Persalinan premature dan operasi *saesar* lebih tinggi terjadi pada wanita hamil yang didiagnosis Covid-19. Apabila pelaksanaan operasi caesar tidak dapat ditunda maka pelaksanaan operasi dilakukan sesuai standar yang sudah ditetapkan. Pada ibu kala II dengan kondisi kelelahan dan ada tanda hipoksia dipertimbangkan untuk operatif pervagina untuk mempercepat kala II. Penjepitan tali pusat dapat dilakukan apabila tidak ada kontraindikasi pada bayi. Antibiotik intrapartum harus diberikan sesuai protokol, penanganan plasenta dilakukan sesuai kondisi normal, menghindari anastesi umum jika benar-benar tidak diperlukan (Nasriyah, et al, 2021).

Selama hamil kebutuhan oksigen meningkat 30% sampai dengan 40%. Hal ini karena kebutuhan metabolime janin, uterus, dan plasenta serta untuk meningkatkan kerja jantung. Hiperventilasi selama hamil mengakibatkan tekanan oksigen meningkat dan karbodioksida menurun. Secara fisiologis terjadi perubahan fungsi paru pada kehamilan. Kapasitas residu menurun 20-30% atau 400-700 mL selama kehamilan. Jumlah oksigen yang dikirim ke

paru-paru meningkatkan volume tidak yang jelas melebihi kebutuhan karena kehamilan (Nasriyah, et al, 2021).

Tingginya angka kematian ibu akibat Covid-19, penting sekali untuk mengetahui penyebab secara ilmiah melalui berbagai jurnal penelitian sehingga dapat dilakukan pencegahan secara dini dan penanganan secara tepat. Untuk mencegah Covid-19 direkomendasikan untuk tidak meninggalkan rumah jika tidak perlu, menghindari kerumunan dan sering mencuci tangan. (Islami, et al, 2021).

c. Gangguan Darah

Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah tertutup dan terbuka. Disebut sistem peredaran darah tertutup karena, darah selalu melalui pembuluh darah. Disebut peredaran darah ganda karena darah masuk ke jantung sebanyak dua kali dalam satu kali peredaran darah (Devrico, et al, 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan penyebab kematian maternal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yaitu gangguan darah dibuktikan dengan 39 kasus kematian dengan persentase sebanyak 5,0%

Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat jumlah kematian ibu di Indonesia sebanyak 4.627 jiwa pada tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 4.197 jiwa. Adapun sebanyak 1.330 kasus kematian di Indonesia disebabkan oleh gangguan peredaran darah (jantung, stroke dan lain-lain) sebanyak 230 kasus (Nurul et al, 2022).

Stroke merupakan penyakit multi faktorial dengan berbagai jenis penyebab utama terjadinya yang disertai manifestasi klinis mayor dan penyebab utama terjadinya kecacatan dan kematian. Stroke merupakan suatu tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan otak fokal (global) dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian.

Menurut Davenport dan Dannis, secara garis besar stroke dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik adalah tanda klinis disfungsi atau kerusakan jaringan otak yang disebabkan kurangnya aliran darah ke otak sehingga mengganggu kebutuhan darah dan oksigen di otak.

Faktor resiko yang memicu tingginya angka kejadian stroke iskemik adalah faktor yang tidak dapat dimodifikasi (non modifiable risk factors) seperti usia, ras, gender, genetik, dan riwayat Transient Ischemic Attack atau stroke sebelumnya. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi (modifiable risk factors) berupa hipertensi, merokok, penyakit jantung, diabetes, obesitas, gangguan oral kontrasepsi, alkohol, hiperkolesterolemia (Nurul et al, 2022).

Resiko stroke lebih tinggi pada wanita karena kehamilan, resiko stroke pada wanita selam trimester ketiga dan *postpartum*, tekanan darah tinggi dapat berkembang selama kehamilan dan meningkatkan resiko stroke dikemudian hari. Fluktuasi hormonal yang terjadi yang disertai dengan berbagai kondisi premorbid dengan prevalensi yang lebih tinggi adalah faktor resiko stroke spesifik pada wanita. Demikian juga pemakaian kontrasepsi oral menjadi faktor resiko stroke spesifik pada wanita hamil (Amila, et al, 2021).

Bagian dari gangguan peredaran darah semasa hamil bisa juga karena kurangnya Zn dan Fe (zat besi). Penelitian di Gambella, Ethiopia Barat memberi bukti bahwa kurangnya Zn memunculkan pengaruh negative bagi ibu dan janinnya, termasuk kelangsungan hidup bayinya usai dilahirkan. Di samping Zn gangguan peredaran darah yang barangkali muncul yaitu anemia. Anemia dalam kehamilan muncul sebab kurangnya zat besi (tablet Fe) yang dikonsumsi di masa hamil yang akhirnya memunculkan efeknya pada janin, yakni sedikitnya asupan oksigen pada janin, dan ibunya kekurangan hemoglobin yang akhirnya muncul perdarahan (Santy et al, 2023).

d. Infeksi

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 kasus kematian karena infeksi yaitu sebanyak 35 orang dengan presentase 4,5%, dan mengalami naik turun yaitu pada tahun 2018 sebanyak 6 orang, tahun 2019 sebanyak 5 orang, tahun 2020 sebanyak 10 orang, tahun 2021 sebanyak 6 orang, dan tahun 2022 sebanyak 8 orang, dan infeksi merupakan kasus tertinggi ketiga penyebab kematian maternal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Indah, et al, 2021). Tentang kandungan bawang hitam sebagai rekomendasi pencegahan infeksi ibu postpartum penyebab kematian ibu di Negara berkembang seperti Indonesia adalah infeksi, hal tersebut terjadi akibat dari pelayanan kesehatan yang masih jauh dari sempurna namun pemerintah sudah menerapkan peraturan untuk mengurangi kematian ibu. Infeksi dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya yaitu seperti anemia, perawatan nifas yang kurang baik, daya tahan tubuh yang kurang, hygiene yang kurang baik, kurang gizi/nutrisi, serta kelelahan.

Infeksi bisa muncul bila tubuh dimasuki bakteri dan tidak mampu melawanya. Ada infeksi yang bahkan bisa mengakibatkan kematian pada ibu usai bayinya dilahirkan. Bakteri Streptokokus B yang menginfeksi ibu hamil bisa memunculkan sepsis (infeksi darah). Kekebalan tubuh ibu bisa terserang oleh sepsis itu yang bisa membuatnya meninggal. Adakalanya pada ibu hamil, darahnya bisa saja menggumpal sebab munculnya sepsis yang akhirnya aliran darah yang menuju organ penting (contohnya jantung dan otak) menjadi terlambat. Resikonya yaitu organnya tidak bisa berfungsi dan berujung pada kematian. Infeksipun bisa muncul dikala persalinan namun persalinannya belum bersih. Infeksi dimasa nifas bisa mengakibatkan kematian maternal sebab terdapatnya kuman yang tersebar dalam aliran darah (septicemia), yang akhirnya timbul abses di organ-organ tubuh, contohnya otak dan ginjal (Susilia, et al, 2022)

Disamping itu, saluran genital bisa pula dimasuki kuman yang menjadi pemicu infeksi lewat berbagai cara, contohnya tangan orang yang mengasistensi persalinan tidak steril, atau alat yang digunakannya pun belum steril. Infeksi asalnya bisa pula dari udara, ataupun dari ibu itu sendiri yang bisa membuat organisme pemicu infeksi berpindah dari banyak spot, utamanya anus. Permasalahan ini bisa ditanggulangi lewat pendeteksian seawal mungkin terhadap infeksi, persalinan yang bersih dan perawatan dimasa nifas (Santy et al, 2023).

Faktor penyebab terjadinya infeksi masa nifas disebabkan karena karena faktor langsung dan faktor yang tidak langsung. Faktor langsung penyebab infeksi yaitu karena proses persalinan yang dimulai semenjak dilakukan pada masa inpartu kala I, partus lama, proses persalinan kala II dengan *section caesar*, dan setelah masa nifas yang disebabkan karena personal hygiene yang rendah. Partus lama merupakan persalinan yang berlangsung lebih dari 12 jam pada primagravida dan lebih dari 8 jam pada multipara. Persalinan yang berlangsung lama akan membuat pemeriksaan dalam menjadi lebih sering. Peeriksaan vagina yang terlalu sering dapat menyebabkan infeksi masa nifas. Infeksi terjadi karena pemeriksaan dalam dimana kuman atau bakteri pada sarunf tangan penolong persalinan ikut masuk saat melakukan pemeriksaan. Selain disebabkan karena partum lama proses kala II dengan *section caesar* dapat meningkatkan terjadinya infeksi pada masa nifas (Susilia, et al, 2022)

Section caesar merupakan tindakan yang dilakukan dengan pembedahan dinding perut dan uterus untuk melahirkan bayi. Luka bekas operasi dapat menjadi media terjadinya infeksi silang. Prevelensi infeksi masa nifas menunjukkan *section caesar* sebagai faktor penyebab terjadinya masa nifas. Menurut Joseph Ngonzi et all. Menunjukkan persalinan secara caesar terkait dengan kejadian infeksi masa nifas mengungkapkan bahwa persalinan caesar memiliki risiko 3 kali lebih berisiko disbanding persalinan pervagina selain itu perdarahan postpartum, anemia ringan sampai berat,

dan persalinan lama juga secara statistik memiliki hubungan dengan kejadian infeksi masa nifas (Fatihatul, 2019).

Beberapa penyebab tidak langsung dari infeksi berdasarkan hasil review yaitu tempat tinggal, tingkat pendidikan, pengetahuan, ketersediaan makanan, tempat bersalin, riwayat kunjungan antenatal care, riwayat diabetes mellitus dan anemia.

Upaya pencegahan infeksi pada masa nifas harus dilakukan langkah dasar dengan cara menjaga kebersihan diri yaitu tentang menjaga kebersihan personal hygiene atau kebersihan genetalia agar tidak menjadi tempat masuk utama bakteri, dan kebersihan tubuh sangat penting juga untuk mencegah terjadinya infeksi. (Fatihatul, 2020).

e. Gangguan Metabolik

Gangguan metabolik merupakan penyakit yang saat ini banyak diderita oleh penduduk dunia, tidak terkecuali Indonesia. Diabetes mellitus merupakan salah satu contoh penyakit gangguan metabolik. Berdasarkan riset kesehatan prevelensi penyakit diabetes di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 23%. (Anita & Dina, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 penyebab kematian maternal adalah gangguan metabolik dibuktikan dengan terdapat 28 kasus kematian maternal dengan persentase 3,6%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Deby & Suci, 2022) tentang Peningkatan pengetahuan ibu hamil terhadap kehamilan resiko tinggi bahwa penyebab kematian tertinggi pada ibu adalah akibat perdarahan, sedangkan penyebab kematian paling sedikit diakibatkan oleh gangguan metabolik. Gangguan metabolik menjadi salah satu faktor langsung penyebab meninggalnya ibu. Contohnya diabetes mellitus, ibu hamil yang terkena diabetes akan berefek buruk yang memunculkan kekhawatiran dan berisiko pada ibu dan janinnya hingga keduanya bisa saja meninggal (Nurzakiah, et al, 2021).

Gangguan metabolik disebabkan oleh obesitas dan resistensi insulin. Gangguan metabolik merupakan salah satu faktor resiko dari penyakit tidak menular yang angka kesakitan dan kematiannya tinggi diantaranya penyakit stroke diabetes mellitus tipe 2, penyakit kardiovaskuler dan kanker (Nurzakiah, et al, 2021).

Gangguan metabolik menjadi salah satu faktor langsung penyebab meninggalnya ibu. Contohnya ibu hamil yang terkena diabetes akan berefek buruk yang memunculkan kekhawatiran dan berisiko pada ibu dan janinnya hingga keduanya bisa saja meninggal. Naiknya kasus kematian ibu dan bayinya bisa tercegah lewat suatu strategi, contohnya ialah pendekatan awal mengenai kemungkinan munculnya risiko pada ibu yang sedang hamil (Anita, & Dina, 2022).

Usaha yang bisa diterapkan agar tingginya risiko kematian ibu karena gangguan metabolik yang bisa membuat keselamatan ibu bisa terancam akan bisa dihindari. Program P4K menitikberatkan pada akses, mutu, dan potensi masyarakat yang bisa ditingkatkan dan akhirnya mereka bisa sadar dan tidak acuh akan persiapan dan aksi dalam menyelamatkan ibu dan bayi yang baru dilahirkan (Santy, et al, 2023).

f. Lain-Lain

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan selain dari perdarahan, hipertensi, infeksi, gangguan peredaran darah, gangguan metabolik, dan covid-19, kematian maternal yang tidak diketahui penyebabnya dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sebanyak 191 kasus dengan presentase sebanyak 24,3%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tiara & Arulita, 2017) tentang kejadian kematian maternal di RSUD Dr. Soesilo Slawi, bahwa faktor kematian maternal selain dari perdarahan, hipertensi, dan infeksi terdapat beberapa faktor lainnya antaranya adalah ibu yang memiliki komplikasi sebanyak 34 orang, ibu dengan paritas sebanyak 29 orang, ibu dengan jarak kehamilan sebanyak 36 orang, ibu yang menderita penyakit sebanyak 24

orang, ibu yang mengalami keterlambatan pengambilan keputusan sebanyak, 38 orang, ibu yang mengalami keterlambatan penanganan medis sebanyak 11 orang, ibu yang mengalami keterlambatan waktu tempuh sebanyak 4 orang.

D. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman pertama bagi peneliti. Kurangnya pengalaman dan ilmu penunjang yang dimiliki oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yang baik menjadi kendala dalam pelaksanaan penelitian.

2. Keterbatasan Instrumen

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga peneliti kesulitan untuk menggali informasi yang lebih lengkap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis penyebab kematian maternal di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa penyebab utama kematian maternal adalah karena perdarahan sebanyak 235 kasus dengan presentase 29,9%, penyebab kematian kedua karena hipertensi yaitu sebanyak 217 kasus dengan presentase 27,6%, penyebab ketiga yaitu karena covid-19 yang terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 40 kasus dengan presentase 5,1%, penyebab kematian yang disebabkan oleh gangguan darah yaitu sebanyak 39 kasus dengan presentase 5,0%, penyebab kematian karena infeksi sebanyak 35 kasus dengan presentase 4,5%, dan penyebab kematian terendah yaitu karena gangguan metabolik sebanyak 28 kasus dengan presentase 3,6% dan kasus kematian yang tidak dapat diketahui sebanyak 191 dengan persentase 24,3%.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dikembangkan dengan menggunakan perbandingan usia, jarak kehamilan dan paritas.

2. Bagi Institusi Pendidikan


Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor kematian maternal.

3. Bagi Ibu Hamil

Diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas untuk menghindari terjadinya kematian maternal dan menurunkan AKI.

4. Bagi Peneliti

Semoga dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam hal bagaimana penyebab terjadinya kematian maternal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abik, B., Mamlukah, Dwi, N. I., & Lely, W. (2021). Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Trimester II Dan III Di Puskesmas Cibeureum Kabupaten Kuningan Tahun 2019. *Journal Of Public Health Inovation*. Vol. 2 No. 01. DOI:10.34305/iphi.v2il.331
- Adelia J. (2019). Kematian Adalah Kehidupan: Metafora Konseptual Kematian dalam Islam di Indonesia. *Kajian Lingustik Pada Karya Sastra*. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks>.
- Aeni, N. (2013). Faktor Risiko Kematian Ibu. *Kesmas: National Public Health Journal*, 7(10), 453. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v7i10.4>
- A. Fahira, N., & Adhar, A. (2017). Faktor Risiko Terjadinya Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di RSUD Anutapura Kota Palu. *Jurnal Kesehatan Tadulako*. vol. 3 no.2.
- Anas. A. (2021). Kajian Semantik Kata Syahid Dalam Al-Qur'an
- Ani, K., Hamid, M., & Ely, Ermawati. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Post Partum di RSUD Pringsewu. *Wellness And Healthy Magazine*. Volume 1. Nomor 2, p, 139-149. ISSN 2655-9952
- Anita, S. S., & Dina, F., (2022). Meningkatkan Kualitas Hidup Penderita Gangguan Jiwa Metabolik Di Klinik Pratama Semarang Melalui Pelatihan Pengaturan Diet dan Senam Kaki. *Jurnal ABDIMAS-KU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kedokteran* ISSN: 2809-9115X. VOL 01. NO 03.
- Deby, M. S., & Suci, S. (2022). Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Terhadap Kehamilan Resiko Tinggi. *Volume 4, Nomor 1, P-ISSN : 2654-864X*.
- Devrico, P., Virginia, T., & Brave, A. G. (2019). Aplikasi Pembelajaran Interaktif Sistem Peredaran Darah Manusia. *Jurnal Teknik Informasi*. vol. 14
- Dhora, D. P., & Rachma, I. (2014). Faktor Resiko Kematian Ibu Dengan Preeklampsia Dan Perdarahan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Biometrik Dan Kependudukan*. Vol 3, No 2: 107 113
- Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. (2020). *Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020*. https://doi.org/10.1007/978-3-642-94500-7_1
- Enadarlita. (2019). Hubungan Pengetahuan dan Karakteristik Akseptor Dengan Penggunaan Pelayanan KB Jalur Swasta di Jawa Barat. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 3(1), 402-419. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v3i1.37>

- Fadhlihsan. (2011). Wanita Meninggal Saat Melahirkan Syahid. <http://fadhlihsan.wordpress.com/2011/07/24/wanita-meninggal-saat-melahirkan-syahid/>
- Faradila, E. S. (2017). Upaya Pencegahan Perdarahan Pada Persalinan Ibu Hamil Dengan Anemia
- Farlikhatun, L., Sitiyaroh, N., Anggraini, N., & Nurhasanah, R. (2021). Pengaruh Adat Istiadat Budaya dengan Kesehatan Ibu Hamil. *Jurnal Antar Kebidanan*, 4(4), 184–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.37063/ak.v4i4.637>
- Fatihatul, H. (2020). Personal Hygiene Pada Masa Nifas. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*. Vol.2, No.1
- Flora, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Nunpene Kabupaten Timur Tengah Utara Tahun 2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*. Vol. 2 NO. 12 E-ISSN 2686 5661
- Fatahilah. (2019). Program Antenatal Care Terpadu dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 4(4), 759–767.
- Indah, N., Febi, R., & Latri. M. W. (2021). Literatur Review: Kandungan Bawabg Hitam Sebagai Rekomendasi Pencegahan Infeksi Ibu Postpartum. *Jurnal Mitra Kencana Keperawatan Dan Kebidanan*. Volume 5 Nomor 2. Hal. 9-17. P-issn : 2599-0055, E-ISSN : 2615-1987 DOI 10.54440
- Islami., Nor, A., & Nasriyah. (2021). Covid-19 Pada Kehamilan. Indonesia Jurnal Kebidanan. vol. 5. no 2
- Ismunandar, D. K. (2017). Identifikasi Penyebab Terjadinya Perdarahan Post Partum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Tahun 2015 dan 2016. *Skripsi*. <http://repository.poltekkes-kdi.ac.id/112/>
- Jasmiati, Wirakusumah, F. F., Sukandar, H., Husin, F., Hidayat, Y. M., & Yumatmo, U. (2019). Analisis Peran Faktor Penyebab Kematian Maternal Yang Dapat Dicegah Terhadap Keterlambatan Rujukan Dan Penanganan Di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Trust Health Journal*, 2(2), 214–225. <https://doi.org/10.37104/ithj.v2i2.38>
- Jaya, H., & Syokumawena. (2019). Hubungan Status Paritas dengan Kecemasan Ibu Pre Operasi Sectio Caesarea di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2017. *Seminar Nasional Keperawatan*, 5(1), 187–192.
- Kemenag. (2023). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>

- Kemenkes RI. (2019). Profil Kesehatan Indonesia 2019. In *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*. <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusda/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019>.
- Kementrian Kesehatan RI. (2017). *Aturan Kemenkes Soal Persalinan*. <https://www.kemkes.go.id/article/print/17072400010/-ini-aturan-kemenkes-soal-persalinan.html>
- Lalenoh, D. C. (2018). Preeklampsia Berat dan Eklampsia: Tatalaksana Anestesi Perioperati. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=ccRiDwAAQBAJ&printsec=frontcover>
- Lisa, A. M. (2023). Sosialisasi Pentingnya Menjaga Kesehatan Ibu dan Anak Pasca Covid-19 di Kota Samarinda. *Jurnal Abdi Masyarakat*.
- Mardalena., Heni, Y., & Helda, F., (2020). Pendidikan Kesehatan Upaya Pencegahan Hipertensi Pada Ibu Hamil Diwilayah Kerja Puskesmas Pembina Palembang Tahun 2019. *khidmah.stikesmp.ac.id.vol. 2, no 2*
- Marisa, P. (2020). Analisis Pendapat Empat Imam Tentang Caesar Pada Wanita Hamil Yang Meninggal Dunia. Lampung.
- Masturoh, Pamuji, S. E. B., & Siswati. (2018). Path Analisis: Tiga Keterlambatan Penyebab Kematian Maternal Di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kesehatan Pena Medika*, 8(1), 18. <http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/74>
- Muh Ridwan. (2022). Syahid Dalam Wabah Perspektif Hadist.
- Musfirowati, F. (2021). Faktor Penyebab Kematian Ibu yang Dapat di Cegah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021. *Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan*, 1(1), 4.
- Muthmainnah, A. U., Johan, H., & Llyod, S. S. (2017). *Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir*. ANDI. <https://books.google.co.id/books?id=5ppdDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Natalia, M. S., Amalina, N., Fitri, N., Wulandari, S., Miharti, S. I., Sukmawati, E., Sirait, L. I., Yusuf, S. A., Sari, E., & Jayatmi, I. (2023). Penyakit Infeksi dalam Kehamilan dan Nifas. *Global Eksekutif Teknologi*. https://books.google.co.id/books?id=63LFEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
- Nataria, D., Husin, F., Hidayat, Y. M., Sismayadi, D., Sukandar, H., & Wirakusumah, F. F. (2020). Analisis Penyebab Kematian Maternal di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 22-32. <https://doi.org/10.35730/jk.v11i1.465>

- Novian, A. (2014). Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan DIIT Pasien Hipertensi. *Unnes Journal of Public Health*, 3(3), 1–9.
- Nurdiana, A., & Setiawati, R. (2019). Memahami Tren Penyebab Kematian Ibu Dengan Menggunakan Data Audit Maternal Di Kabupaten Karawang, Indonesia. *Health Science Growth*, 4(2), 95–108.
- Nurul, H. A., Baiq, R. A., Ni, P. A., & Susilia, I. (2022). Pengabdian Pada Ibu Hamil Untuk Deteksi Dini. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 7, No. 4 e-ISSN: 2541-626X pp. 452-456
- Nursalam. (2020). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. *Salemba Medika*.
- Nurzakiah, Veni, H., Nurhaedar J., Rahayu, I., Saifuddin, S., & Ridwan, A., (2021). Literatur Review: Pengaruh Pola Makan Terhadap Sindrom Metabolik. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat*. Vol. 1 No. 2
- Octaviani, D. A., Husin, F., Wirakusumah, F. F., Susiarno, H., Sukandar, H., & Susandi, D. (2019). Analisis Penyebab Kematian Perinatal Di Kabupaten Garut. *Jurnal Kebidanan*, 9(1), 264. <https://doi.org/10.26751/jikk.v10i1.533>
- Purba, N. H. (2020). Analisis dan Pencatatan Pelaporan Kematian Maternal. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and* 4(3), 411–422. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/35591>
- Putri, S., Dewi, R., Lydia, N., & Sri, M. (2023). Morbiditas dan Kesehatan Ibu Hamil Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Infant And Child Healthcare*. Vol 2, No 1, pp 19-27. ISSN 2830-392X.
- Rahman, A., & Urbayatun, S. (2021). Kesehatan Mental Ibu Hamil Sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Kajian Literatur. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 7(2), 59–67. <https://doi.org/10.22487/htj.v7i2.161>
- Respati, S. H., Sulistyowati, S., & Nababan, R. (2019). Analisis Faktor Determinan Kematian Ibu di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 6 (2), 52–59. <https://doi.org/10.22146/jkr.43463>
- Rina, P. (2020). Covid-19 In Pregnant Women And Their Newborns : A Rewiew. *Excellent Midwifery Journal*. Volume 3 No. 2,
- Saifuddin, & Abdul, B. (2018). Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. 281. Ed. 1 Cetakan 4. Jakarta Bina Pustaka Sarjono Prawiharjo.
- Sakinah, I., Jubaedi, A., & Musfirowati, F. (2023). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kematian Maternal dalam Penguatan

Pengetahuan dan Pengembangan Kebijakan Kesehatan: Studi Otopsi Verbal Maternal. *Oksitosin :Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 10(1), 69–88. <https://doi.org/10.35316/oksitosin.v10i1.2589>

- Santi, I. P., Astri, Y., Hendra, D. K., & Aris, W. (2023). Implementasi Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Kaitannya Dengan Penyebab Kematian Maternal. *Jurnal Ilmu Kesehatan*. Vol. 11 No. 2
- Sari, D. K. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keikutsertaan Ibu Hamil Dalam Vaksinasi Covid-19. *Tesis*. <http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUSPUSAT.pdf%0Ahttp://businesslaw.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisatasyariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>
- Sawitri, L., H, R., & R, K. (2014). Hubungan Jarak Kehamilan dengan Kejadian Haemoragik Postpartum di Puskesmas Sumberbaru. *The Journal of Midwifery*, 1(46–51).
- Simarmata, O. S., Armagustini, Y., & Bisara, D. (2012). Determinan Kejadian Komplikasi Persalinan. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 11(1), 11–23.
- Siti, C. W. B., Rahmani, M., & Uswatun, K. (2016). Hubungan Antara Partus Lama Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Dini Di Kamar Bersalin Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. *Majalah Kesehatan FKUB*. vol. 3 no. 4
- Sudarman, Tendean, H. M. M., & Wagey, F. W. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Preeklampsia. *E-Clinic*, 9(1), 68–80. <https://doi.org/10.35790/ecl.v9i1.31960>
- Sugi, P., & Yuli, T. (2015). Determinan Faktor Penyebab Terjadinya Perdarahan Post Partum Karena Atonia Uteri. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*. Vol. 6 No. 1.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.
- Tarjo. (2019). *Metode Penelitian*. Budi Utama.
- Tiara, A. H. I., & Arulita, I. F. (2017). Kejadian Kematian Maternal Di RSUD Dr. Soesilo Slawi. *Higeia Journal Of Public Health Research And Development. Tegal Jawa Timur*. p ISSN 1475-362846. E ISSN 1475-222656.
- Triana, A., Damayanti, I. P., Afni, R., & Yanti, J. S. (2012). Kegawatdaruratan

Maternal dan Neonatal. Budi Utama.

- Ulfah, B. (2021). Fakta Dibalik Kematian Ibu & Bayi. Insania. https://books.google.co.id/books/about/Fakta_Dibalik_Kematian_Ibu_Bayi.html?id=vnxJEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Umar, L. (2016). Konsep Mati dan Hidup Dalam Islam. (Pemahaman Berdasarkan Konsep Eskatologis). *Jurnal Al-Bayan/ Vol. 22 No.34*.
- WHO. (2010). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. In *World Health Organization*. <https://doi.org/10.1159/000371811>
- WHO. (2015). Trends in Maternal Mortality 2010 - 2015. In *World Health Organization*. <http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality2015>
- WHO.(2018). Maternal mortality. World Health Organization. <https://www.who.int/new-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>.
- Yanto, H., & Maula, I. M. (2024). Pelatihan Aplikasi Kematian Ibu Hamil Dalam Upaya Tata Kelola KIA Di Puskesmas. [https://ejurnal2.po;tekkestasikmalaya.ac.id/index.php/emass](https://ejurnal2.po.tekkestasikmalaya.ac.id/index.php/emass)

L

A

M

P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

A

M A K A S S A R

N

Lampiran 1

**DATA SEKUNDER HASIL KEMATIAN MATERNAL DARI TAHUN 2018-2022 DARI DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kematian Ibu	Penyebab Kematian Maternal					
			Pendarahan	Hipertensi dalam kehamilan	Infeksi	Gangguan sistem peredaran darah (Jantung, Stroke, dll)	Gangguan Metabolik (DM dll)	Lain- lain
1.	Selayar	2	0	2	0	0	0	0
2.	Bulukumba	7	4	3	0	0	0	0
3.	Bantaeng	3	1	1	0	0	0	1
4.	Jeneponto	8	3	3	0	1	0	1
5.	Takallar	8	1	4	0	0	0	3
6.	Gowa	17	4	8	1	2	0	2

7.	Sinjai	12	4	5	1	1	0	1
8.	Maros	3	2	1	0	0	0	0
9.	Pangkep	10	1	5	2	0	0	2
10.	Barru	4	1	0	0	0	0	3
11.	Bone	8	5	3	0	0	0	0
12.	Soppeng	2	1	0	0	1	0	0
13.	Wajo	5	2	2	0	1	0	0
14.	Sidrap	2	0	2	0	0	0	0
15.	Pinrang	4	0	1	0	2	0	1
16.	Enrekang	6	1	1	1	0	0	3
17.	Luwu	6	2	2	0	0	0	2
18.	Tana Toraja	3	1	1	1	0	0	0
19.	Luwu Utara	5	2	3	0	0	0	0
20.	Luwu Timur	5	2	3	0	0	0	0
21.	Toraja Utara	7	3	0	0	1	0	3
22.	Makassar	5	1	0	0	0	0	4
23.	Pare-pare	4	1	1	0	1	0	1
24.	Palopo	3	2	1	0	0	0	0

Total	139	44	52	6	10	0	27
-------	-----	----	----	---	----	---	----

TAHUN 2019

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kematian Ibu	Penyebab Kematian Maternal					
			Pendarahan	Hipertensi dalam kehamilan	Infeksi	Gangguan sistem peredaran darah (Jantung, stroke, dll)	Gangguan Metabolik (DM dll)	Lain- lain
1.	Selayar	5	2	1	1	0	1	0
2.	Bulukumba	3	1	2	0	0	0	0
3.	Bantaeng	2	0	1	0	0	0	1
4.	Jeneponto	11	1	5	0	0	3	2
5.	Takallar	7	4	0	0	0	0	3
6.	Gowa	14	4	5	1	0	1	3
7.	Sinjai	7	2	3	1	0	0	1
8.	Maros	3	1	0	0	0	0	2

9.	Pangkep	14	4	5	1	0	1	3
10.	Barru	7	2	0	0	0	1	4
11.	Bone	8	1	6	0	0	0	1
12.	Soppeng	4	2	1	0	0	1	0
13.	Wajo	4	3	1	0	0	0	0
14.	Sidrap	4	2	2	0	0	0	0
15.	Pinrang	6	6	0	0	0	0	0
16.	Enrekang	1	0	1	0	0	0	0
17.	Luwu	5	0	0	1	0	1	3
18.	Tana Toraja	1	0	0	0	0	0	1
19.	Luwu Utara	8	1	3	0	0	3	1
20.	Luwu Timur	8	6	1	0	0	0	1
21.	Toraja Utara	7	3	0	0	0	0	4
22.	Makassar	10	2	2	0	0	0	6
23.	Pare-pare	4	0	2	0	0	0	2
24.	Palopo	1	0	0	0	0	0	1
Total		144	47	41	5	0	12	39

TAHUN 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kematian Ibu	Penyebab Kematian Maternal					
			Pendarahan	Hipertensi dalam kehamilan	Infeksi	Gangguan sistem peredaran darah (Jantung, stroke, dll)	Gangguan Metabolik (DM dll)	Lain- lain
1.	Selayar	7	2	0	2	0	0	3
2.	Bulukumba	4	1	1	0	0	0	2
3.	Bantaeng	3	3	0	0	0	0	0
4.	Jeneponto	7	1	2	1	1	0	2
5.	Takallar	6	1	0	0	0	0	5
6.	Gowa	15	6	3	0	2	1	3
7.	Sinjai	4	0	1	1	0	0	2
8.	Maros	4	1	1	0	0	0	2
9.	Pangkep	6	1	3	1	0	0	1
10.	Barru	3	0	0	0	0	0	3
11.	Bone	7	3	2	0	0	0	2

12.	Soppeng	3	2	0	0	0	0	1
13.	Wajo	4	1	1	0	0	0	2
14.	Sidrap	6	1	5	0	0	0	0
15.	Pinrang	5	2	1	0	1	0	1
16.	Enrekang	5	1	1	0	1	0	2
17.	Luwu	10	3	3	0	2	1	1
18.	Tana Toraja	3	1	1	0	0	0	1
19.	Luwu Utara	5	2	1	0	0	2	0
20.	Luwu Timur	6	4	0	0	1	0	1
21.	Toraja Utara	5	3	0	0	0	0	2
22.	Makassar	12	3	0	5	0	2	2
23.	Pare-pare	2	2	0	0	0	0	0
24.	Palopo	1	0	0	0	0	0	1
Total		133	44	26	10	8	6	39

TAHUN 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kematian Ibu	Penyebab Kematian Maternal									
			Penda rahan	Hiperte nsi	Infeksi	Abortus	Gangg uan Darah	Ganggu an Metabol ik	Jantung	Covid- 19	Lain- lain	
1.	Selayar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.	Bulukumba	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6
3.	Bantaeng	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jeneponto	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
5.	Takallar	11	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8
6.	Gowa	17	2	10	0	0	0	0	0	1	4	0
7.	Sinjai	17	6	4	1	1	0	0	0	0	3	2
8.	Maros	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2
9.	Pangkep	8	2	2	1	0	0	0	0	0	2	1
10.	Barru	7	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2
11.	Bone	11	3	4	0	0	0	0	0	0	0	4

12.	Soppeng	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
13.	Wajo	6	1	2	0	0	0	0	0	1	2
14.	Sidrap	7	1	3	0	0	0	0	0	2	1
15.	Pinrang	8	1	3	0	0	0	0	0	2	2
16.	Enrekang	9	3	1	0	0	0	0	0	1	4
17.	Luwu	15	4	2	2	1	0	1	0	3	2
18.	Tana Toraja	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0
19.	Luwu Utara	10	6	0	0	0	0	0	1	2	1
20.	Luwu Timur	8	2	1	0	0	0	0	0	3	2
21.	Toraja Utara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22.	Makassar	14	0	3	0	0	1	0	0	7	3
23.	Pare-pare	6	0	0	0	0	0	0	0	4	2
24.	Palopo	6	3	0	0	0	0	0	0	1	2
Total		195	44	41	6	2	1	2	2	40	57

11.	Bone	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0
12.	Soppeng	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1
13.	Wajo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sidrap	5	1	2	0	0	0	1	1	0	0
15.	Pinrang	10	2	3	1	0	0	0	1	0	3
16.	Enrekang	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2
17.	Luwu	11	1	5	0	0	0	2	0	0	3
18.	Tana Toraja	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
19.	Luwu Utara	8	2	0	1	0	3	1	0	0	1
20.	Luwu Timur	7	2	3	0	0	0	0	2	0	0
21.	Toraja Utara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22.	Makassar	21	4	9	3	0	2	1	2	0	0
23.	Pare-pare	5	2	0	0	0	1	0	1	0	1
24.	Palopo	8	2	4	1	0	0	0	0	0	1
Total		174	56	57	8	1	7	8	11	0	26

Lampiran 2

Analisis Crosstabulasi Dengan Kabupaten/Kota Dengan Insiden Kematian Tertinggi Kematian Ibu Dengan Perdarahan, Preeklampsia, dan Infeksi.


No.	Kabupaten/Kota	Perdarahan	Hipertensi	Infeksi	Gangguan Peredaran Darah	Gangguan Metabolik	Covid-19	Lain-Lain
1.	Selayar	5	4	3	0	1	1	5
2.	Bulukumba	12	11	0	0	1	0	8
3.	Bantaeng	9	6	0	0	0	0	3
4.	Jeneponto	12	15	0	2	3	0	18
5.	Takalar	7	7	1	2	0	0	19
6.	Gowa	25	29	2	5	2	4	9
7.	Sinjai	15	14	4	3	2	3	7
8.	Maros	8	6	2	0	0	0	11
9.	Pangkep	12	16	6	2	2	2	8
10.	Barru	6	1	0	0	1	3	12
11.	Bone	15	19	0	0	0	0	7

12.	Soppeng	7	1	0	1	1	0	3
13.	Wajo	7	7	0	1	0	1	4
14.	Sidrap	5	14	0	1	1	2	1
15.	Pinrang	11	8	1	3	0	2	7
16.	Enrekang	6	5	1	1	0	1	11
17.	Luwu	10	12	3	2	5	3	11
18.	Tana Toraja	3	4	2	0	0	1	3
19.	Luwu Utara	13	7	1	4	6	2	3
20.	Luwu Timur	16	8	0	3	0	3	4
21.	Toraja Utara	9	0	0	1	0	0	11
22.	Makassar	10	15	8	5	3	7	15
23.	Pare-Pare	5	3	0	3	0	4	6
24.	Palopo	7	5	1	0	0	1	5
Jumlah		235	217	35	39	28	40	191

Jumlah kematian maternal dari tahun 2018-2022 adalah:

1. Perdarahan:235
2. Preeklampsia :217
3. Infeksi :35
4. Gangguan Peredaran Darah :39
5. Gangguan Metabolik :28
6. Covid-19 :40
7. Lain-Lain : 191

Jadi jumlah keseluruhannya adalah 785



Lampiran 3

Hasil Uji Analisis Deskriptif Frekuensi Kematian Maternal

		Statistics						
		Perdarahan	Hipertensi	Infeksi	Gangguan Darah	Gangguan Metabolik	Covid-19	Lain-Lain
N	Valid	24	24	24	24	24	24	24
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Sum		235.00	217.00	35.00	39.00	28.00	40.00	191.00

		Kematian Maternal			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perdarahan	235	29.9	29.9	29.9
	Hipertensi	217	27.6	27.6	56.5
	Infeksi	35	4.5	4.5	65.0
	Gangguan Darah	39	5.0	5.0	41.7
	Gangguan Metabolik	28	3.6	3.6	45.8
	Covid-19	40	5.1	5.1	54.2
	Lain-Lain	191	24.3	24.3	100.0
	Total	785	100.0	100.0	

Lampiran 4

Surat Keterangan Layak Etik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website : p2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-01441/Jn.06/LP2M/PP.00.9/5/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : St Rafiah
NIM : 70300119048
Semester/TA : IX (Semhlan)TA 2023-2024
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Keperawatan
Alamat : Sama'a
No. HP. : 085238772873

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Dengan judul Skripsi: **Analisis Faktor Kematian Maternal di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2022.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Dinas kesehatan provinsi Sulawesi Selatan** dari tanggal **23 Agustus 2023** sampai **10 September 2023**.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sumata, 23 Agustus 2023
Ketua

Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.
NIP. 196003051987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal

Lampiran 5

Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **24666/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulsel
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-01441/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ST RAFIAH**
Nomor Pokok : **70300119048**
Program Studi : **Keperawatan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa**
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS FAKTOR KEMATIAN MATERNAL DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2018-2022 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Agustus s/d 28 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**


Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian

17.43 4G 41

Ibu Marni Dinkes...



2018 12.17

2019 12.19

2020 12.19

Ketik pesan

The image displays a WhatsApp chat interface with a green background. At the top, the status bar shows the time 17.43, 4G connectivity, and a 41% battery level. The chat header includes a back arrow, a profile picture of 'Ibu Marni Dinkes...', a video call icon, a voice call icon, and a menu icon. The main content consists of four sequential screenshots of research data tables, each with a timestamp below it: 1. A table for the year 2018, timestamped 12.17. 2. A table for the year 2019, timestamped 12.19. 3. A table for the year 2020, timestamped 12.19. 4. A table for the year 2021, timestamped 12.19. Each table is a complex spreadsheet with numerous columns and rows of data. At the bottom of the chat is a text input field with the placeholder 'Ketik pesan' and icons for emojis, attachments, camera, and voice recording. The Android navigation bar is visible at the very bottom.

17.43

4G 41



Ibu Marni Dinkes...



2019

12.19

TABUNG 2019

No. Kab/Kota	Jumlah Korban (B)	Pasien	Sehat	Meninggal	Salah Diagnosa	Salah Rawat	Salah Obat
1 SELAYAR	2	0	0	0	0	0	0
2 BILUKUMBA	0	0	0	0	0	0	0
3 BANTALAN	2	0	0	0	0	0	0
4 BANGKAPULE	0	0	0	0	0	0	0
5 TAKALARI	0	0	0	0	0	0	0
6 GOWA	10	0	0	0	0	0	0
7 BARRU	0	0	0	0	0	0	0
8 PANGKAP	0	0	0	0	0	0	0
9 PANGKAP	0	0	0	0	0	0	0
10 BANGGULU	2	0	0	0	0	0	0
11 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
12 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
13 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
14 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
15 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
16 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
17 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
18 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
19 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
20 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
21 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
22 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
23 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
24 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	102	0	0	0	0	0	0

2020

12.19

TABUNG 2020

No. Kab/Kota	Jumlah Korban (B)	Pasien	Sehat	Meninggal	Salah Diagnosa	Salah Rawat	Salah Obat
1 SELAYAR	0	0	0	0	0	0	0
2 BILUKUMBA	0	0	0	0	0	0	0
3 BANTALAN	0	0	0	0	0	0	0
4 BANGKAPULE	0	0	0	0	0	0	0
5 TAKALARI	0	0	0	0	0	0	0
6 GOWA	0	0	0	0	0	0	0
7 BARRU	0	0	0	0	0	0	0
8 PANGKAP	0	0	0	0	0	0	0
9 PANGKAP	0	0	0	0	0	0	0
10 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
11 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
12 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
13 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
14 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
15 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
16 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
17 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
18 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
19 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
20 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
21 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
22 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
23 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
24 BANGGULU	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0	0

2022

12.22

TABUNG 2021

No. Kabupaten	Jumlah Korban (B)	Infeksi	Salah Diagnosa	Salah Rawat	Salah Obat	Salah Lain
1 SELAYAR	2	0	0	0	0	0
2 BILUKUMBA	0	0	0	0	0	0
3 BANTALAN	2	0	0	0	0	0
4 BANGKAPULE	0	0	0	0	0	0
5 TAKALARI	0	0	0	0	0	0
6 GOWA	0	0	0	0	0	0
7 BARRU	0	0	0	0	0	0
8 PANGKAP	0	0	0	0	0	0
9 PANGKAP	0	0	0	0	0	0
10 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
11 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
12 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
13 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
14 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
15 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
16 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
17 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
18 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
19 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
20 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
21 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
22 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
23 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
24 BANGGULU	0	0	0	0	0	0
Jumlah	44	0	0	0	0	0

2021

12.31

Ketik pesan



RIWAYAT HIDUP



ST. RAFIAH, lahir di Ncera pada tanggal 22 Desember 2001. Penulis adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Suhaimin dan ibu Nur Hasanah. Penulis yang dikenal dengan nama panggilan Rafiah ini mulai mengikuti pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2007, di SD Negeri No.1 Ncera dan selesai di tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Belo pada tahun 2013, dan selesai di tahun 2016, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Kota Bima pada tahun 2016, dan selesai di tahun 2019. Setelah itu, di tahun yang sama penulis memasuki perguruan tinggi disalah satu Universitas di Kota Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur mandiri, tepatnya di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan jurusan keperawatan. Syukur Alhadulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan sehingga masih bisa melewati perjuangan yang disertai doa dari orangtua penulis, keluarga, serta rekan-rekan yang membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penyebab Kematian Maternal Di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022". Selama kuliah penulis aktif pada beberapa organisasi internal maupun eksternal. Dalam organisasi internal kampus penulis menjabat sebagai anggota Divisi Keolahragaan HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar periode 2021-2022. Dalam organisasi eksternal penulis juga pernah menjabat sebagai sekretaris umum Lingkar Study Ncera (LSN) Makassar periode 2021-2022.

skripsi st rafiah

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	docobook.com Internet Source	1%
3	ejurnal.politeknikpratama.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	<1%
5	muslimahactivity.wordpress.com Internet Source	<1%
6	dalamislam.com Internet Source	<1%
7	journal.ibrahimy.ac.id Internet Source	<1%
8	www.ejournal.poltekkesaceh.ac.id Internet Source	<1%
9	core.ac.uk Internet Source	<1%