

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA NY "K" DENGAN  
PERDARAHAN AKIBAT REST PLASENTA DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA  
9 JULI – 6 AGUSTUS TAHUN 2018**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Dianjurkan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan  
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**SULFIKA  
70400115046**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN  
MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SULFIKA  
Nim : 70400115046  
Tempat /Tgl. Lahir : Sinjai, 26 Desember 1996  
Jurusan : Kebidanan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Judul : **MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA NY "K" DENGAN PERDARAHAN AKIBAT REST PLASENTA DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA 9 JULI – 6 AGUSTUS TAHUN 2018**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA NY "K" DENGAN PERDARAHAN AKIBAT REST PLASENTA DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA 9 JULI – 6 AGUSTUS TAHUN 2018”** adalah benar hasil karya penyusun sendiri.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 16 Agustus 2018 M  
4 Zulhizah 1439 H

Penyusun

SULFIKA  
NIM: 70400115046

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care Pada Ny “K” dengan Perdarahan Post Partum akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 9 Juli – 6 Agustus Tahun 2018” yang di susun oleh Sulfika NIM: 70400115046, Mahasiswi jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam Karya Tulis Ilmiah yang di selenggarakan pada hari kamis 16 Agustus 2018 M. Dinyatakan telah dapat di terima salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 16 Agustus 2018 M  
4 Dzulhizah 1439

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Saleha., S.SiT., SKM., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Rauliy Rahmadani M. Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Rahmi Damis, M. Ag	(.....)

Dekan  
  
Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc  
NIP: 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR

*Asslamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah rabbil ‘Alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini yang berjudul “Manajemen Asuhan Kenidanan Postnatal Care Pada Ny “K” Dengan Perdarahan Post Partum Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2018” dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Tak lupa pula penulis sampaikan salam dan shalawat kepada junjungan kita Rasulullah saw. yang telah membentangkan permadani-permadani Islam dan menggulungkan tikar-tikar kebatilan.

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, penulis banyak menemukan rintangan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan masukan serta doa dari berbagai pihak, alhamdulillah hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang tak pernah berhenti memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Juga kepada adik saya yang tak pernah berhenti memberikan suport terbaiknya. Serta keluargaku yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan suport untuk saya.
2. Bapak prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
4. Ibunda Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb selaku ketua prodi kebidanan dan selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan ilmu yang bermamfaat dan membimbing dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Ibunda Firdayanti, S.Sit., M.Keb selaku sekretaris jurusan prodi kebidanan
6. Ibunda dr. Syatirah, Sp.A., M.kes Selaku pembimbing II yang telah banyak menyempatkan waktu untuk membimbing dengan sabar dan ikhlas dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibunda dr. Raully Rahmadhani M.kes selaku penguji I yang telah banyak membagikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Ibunda Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar.
10. Kepala RSUD Syekh Yusuf Gowa dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
11. Kepada sahabat-sahabatku tercinta yang telah memberikan suport yang membangun dan telah menemani dalam suka maupun duka dalam perjalanan menuju kesuksesan saya.

12. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan angkatan 2015 yang selalu memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Meskipun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan baik.

Ilmu merupakan penghias ibadah manusia kepada Allah swt, kepada sesama manusia dan kepada diri sendiri. Ketika ilmu di pelajari dengan sungguh-sungguh dan di amalkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang benar maka akan sangat indah mamfaat yang di raih. Namun bila ilmu di pelajari dengan setengah-setengah dan di mamfaatkan semauanya tanpa tahu tujuannya benar atau tidak, maka ilmu itu akan merusak citra keindahan. Inilah yang sangat penting kita pahami agar tidak sembarang mempergunakan ilmu dalam kehidupan kita. Akhir kata penulis ucapkan jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermamfaat bagi kita semua. Aamiin yarabbal 'alamin.



Gowa, 10 Agustus 2018

Penulis

**SULFIKA**  
**NIM 70400115046**

## DAFTAR ISI

### SAMPUL

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penulisan .....	7
E. Metode Penulisan .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perdarahan Post Partum .....	13
1. Masa Nifas.....	12
2. Perdarahan Post Partum.....	17
B. TINJAUAN KHUSUS TENTANG REST PLASENTA .....	23

1. Definisi .....	23
2. Fisiologi Dan Tipe Plasenta .....	24
3. Etiologi .....	28
4. Tanda Gejala Rest Plasenta .....	29
5. Dignosis.....	30
6. Penyebab Rest Plasenta .....	31
7. Komplikasi Rest Plasenta.....	31
8. Penatalaksanaan Rest Plasenta .....	32
9. Pencegahan Rest Plasenta .....	34
C. Tinjauan Agama Islam Tentang Rest Plasenta.....	35
D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan .....	40
1. Pengertian Manajemen Kebidanan.....	40
2. Tahapan Dalam Manajemen Kebidanan .....	40
E. Pendokumentasin Asuhan Kebidanan .....	42
<b>BAB III STUDI KASUS .....</b>	<b>44</b>
Langkah I Identifikasi Data Dasar .....	44
A. Identifikasi Istri/Suami .....	44
B. Data Subjektif.....	45
C. Data Objektif .....	50
Langkah II Identifikasi Diagnosa/Data Aktual .....	53
A. Post Partum Hari I.....	53
B. Rest Plasenta.....	54

Langkah III Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial .....	57
A. Syok Hipovolemik.....	57
B. Infeksi Puerperium .....	58
C. Anoksia Jaringan .....	58
Langkah IV Tindakan Segera/Kolaborasi Jam 01.40 Wita.....	59
Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan .....	60
Langkah VI Melaksanakan Tindakan Asuhan Kebidanan.....	65
Langkah VII Evaluasi Tindakan .....	70
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>86</b>
A. Langkah I Identifikasi Data Dasar.....	86
B. Langkah II Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual.....	92
C. Langkah III Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial .....	96
D. Langkah IV Melaksanakan Tindakan Segera/Kolaborasi .....	100
E. Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan.....	102
F. Langkah VI Pelaksanaan Asuhan Kebidanan .....	107
G. Langkah VII Evaluasi.....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Proses Involusi (lochea) .....	14
Table 2.2 Kebijakan Program Nasional .....	15
Table 2.3 Tanda dan Gejala Penyebab Perdarahan Postpartum.....	20



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tanda dan Gejala Perdarahan Post Partum .....	20
Gambar 3.1. Riwayat Persalinan.....	46
Gambar 3.2 Pemantauan Kala IV.....	51



## DAFTAR ISTILAH

### A

Abortus : keguguran

Abnormal : tidak normal atau bersifat menyimpang

Adaptasi : penyesuaian diri terhadap kondisi atau lingkungan

Amnion : air ketuban

Anamnesa : pengambilan data seorang pasien medis yang berhubungan dengan masalah yang di alami klien

Anemia : kekurangan darah

Antenatal care : pemeriksaan kehamilan

Antepartum : sebelum persalinan atau melahirkan

Antibiotik : obat yang menghentikan atau memperlambat pertumbuhan bakteri

Atonia uteri : uterus tidak berkontraksi dengan baik

Auskultasi : pemeriksaan fisik dengan mendengarkan suara yng terbentuk dalam tubuh pasien

### C

Cavum uteri : rongga uterus

### D

Desidua : membran mukosa yang melapisi rahim

Diagnosa : penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti dan memeriksa gejala-gejalanya

## **E**

Eksplorasi : pencarian atau penjelajahan

## **H**

Head to toe : pemeriksaan yang di lakukan dari kepala hingga ujung kaki

Health Education : pendidkn kesehatan

Hematocrit : jumlah sel darah merah

Hemoglobin : protein sel darah merah yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh

Hemorrhage : perdarahan

Hipotermi : suatu kondisi di mana tubuh kehilangan suhu panas

## **I**

Ikterus : yaitu warna kuning yang terdapat pada kulit dan sklera mata

Informed consent : yaitu proses untuk mendapatkan izin dari pasien atau keluarganya sebelum melakukan tindakan

Inspekulo : pemeriksaan yang di lakukan menilai serviks, tanda-tanda infeksi dan cairan dari dalam serta cairan dari ostium uteri

Inspeksi : proses pemeriksaan dengan metode pengamatan atau observasi menggunakan panca indra untuk mendeteksi masalah kesehatan pasien

Involusio : proses kembalinya uterus seperti semula

Intra partum : serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan/hampir cukup bulan, di sertai dengan pengeluarn plsentia dan selaput janin dari tubuh ibu

Intra uterin : dalam uterus atau dalam rahim

## **K**

Kotiledon : selaput pembungkus plasenta

Kuretase : suatu tindakan yang di lakukan pada wanita untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang biasanya mengalami keguguran atau masalah lainnya yang berhubungan dalam rahim

Kustner : dengan meletakkan tangan di sertai tekanan pada atau di atas simpisis, tali pusat di regangkan, maka bil tali pusat masuk berarti plasenta belum sudah lepas, tetapi bila diam atau maju berarti plasenta sudah lepas.

Klien : seorang pasien

Komprehensif : tindakan yang di lakukan secara menyeluruh

## **L**

Lanugo : rambut halus dan tipis pada kulit janin

Laserasi : luka yang di sebabkan oleh robekan

Lochea :cairan sekret yang bersal dari kavum uteri dan vagina selama masa nifas

## **M**

Massase : yaitu pemijatan atau penggunaan tekanan dan gerakan yang bervariasi untuk memanipulasi otot dan jaringan yang lunak

Mekonium : kotoran atau feses yang di hasilkan bayi dalam rahim

Memonitor : mengawasi, memantau, atau mengecek dengan cermat terutama untuk tujuan khusus

Menarche : siklus menstruasi pertama pada perempuan

Morbiditas :tingkat kesakitan (menggambarkan pola penyakit yang terjadi di masyarakat)

## **O**

Oedema : bengkak atau pembengkakan

On demend : sesuai keinginan atau permintaan

## **P**

Palmar : telapak tangan atau tangan bagian depan

Palpasi : suatu teknik pengkajian untuk menilai kelainan pada pasien dengan cara meraba, menekan dan merasakan dengan satu atau kedua telapak tangan

Perkusi	: suatu tindakan pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi getaran/gelombang suara yang di hantarkan kepermukaan tubuh dari bagian tubuh yang di periksa
Personal Hygiene	: kebersihan diri
Post natal care	: pelayanan kesehatan yang di lakukan segera setelah melahirkan atau asuhan masa nifas
Post partum	: masa setelah persalinan
Psikososial	: istilah yang di gunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental/emosionalnya.
Puerperium	: masa setelah persalinan yang di perlukan untuk pulihnya alat kandungan yang lamanya 6 minggu
<b>R</b>	
Remote puerperium	: waktu yng di perlukan untuk pulih dan sehat sempurna
Rest plasenta	: sisa plasenta yng tertinggl dalam uterus
Retensio plasenta	: tertinggalnya plasenta dalam uterus dalam waktu $\pm 30$ menit
<b>S</b>	
Strassman	: tegangan tali pusat dan ketok pada fundus, bila tali pusat bergetar berarti plasenta belum lepas, tetpi bila tidk bergetar berarti plasenta sudah lepas
Syok	: suatu kedaan yang dapat mengancam jiwa

## U

Underpad : kain yang berbentuk lembaran sekali pakai yang di gunakan di rumah sakit dengan tujuan melindungi seprai dari kotoran paissen seperti darah persalinan, nanah, bab/bak yang tidak dapat di kontrol, dan sebagainya

Urin : air seni atau air kencing

Uterotonika : obat yang dapat membuat kontraksi uterus baik

Uterus : rahim

## V

Varices : pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang terletak tepat di bawah permukaan kulit dan bisanya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah yang t

Verniks kaseosa : sejenis substansi lemak yang menyerupai keju yang berasal dari kelenjar minyak bayi yang terdiri dari sel minyak serta sel kulit yang telah mengelupas.



## DAFTAR SINGKATAN

AKDR	: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
AKBK	: Alat Kontrasepsi Bawah Kulit
AKI	: Angka Kematian Ibu
ASEAN	: Association Of South East Asia
ASI	: Air Susu Ibu
COT	: Clot Observation Test
HB	: Hemoglobin
ANC	: Antenatal Care
DM	: Diabetes Melitus
HE	: Health Education
HPHT	: Hari Pertama Haid Terakhir
HTP	: Hari Tafsiran Persalinan
KB	: Keluarga Berencana
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SDKI	: Survei Demografi Kesehatan Indonesia
SOAP	:Subjektif, Objektif, Asessmen,Planning (suatu prinsip pendokumentasin tentang kondisi dan perkembangan kesehatan pasien)

STP : Setinggi Pusat

TFU : Tinggi Fundus Uteri

USG : Ultrasonografi

VT : Vagina Toucher

WHO : Word Health Organisation



## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2018

SULFIKA, 70400115046

Pembimbing I : Sitti Saleha

Pembimbing II : Syatirah

### **“Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care Pada Ny “K” Dengan Perdarahan Post Partum Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa 9 Juli – 6 Agustus Tahun 2018”**

---

*Rest plasenta* adalah keadaan dimana suatu bagian dari plasenta (1 atau lebih lobus) tertinggal dalam uterus, sehingga uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan dapat menimbulkan perdarahan. *Rest plasenta* yang tidak segera di tangani akan berdampak buruk pada ibu. Dampak yang biasa timbul diantaranya yaitu terjadi anemia, infeksi poerperium, syok, serta kematian akibat *perdarahan post partum*.

Tujuan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care Pada Ny “K” Dengan Perdarahan Post Partum Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada Tahun 2018 sesuai dengan 7 langkah varney dan SOAP.

Hasil studi kasus pada Ny “K” diagnosis perdarahan post partum akibat *Rest plasenta* di tegakkan dengan data subjektif nyeri perut bagian bawah, banyak darah keluar dari jalan lahir, pusing dan lemas. Data objektif plasenta lahir dengan kesan tidak lengkap, kontaksi uterus teraba lunak dan tidak teraba bundar, tinggi fundus uteri satu jari atas pusat, pengeluaran darah dari jalan lahir  $\pm 500$  CC. Asuhan yang dilakukan yaitu melakukan massase uterus agar uterus berkontraksi dengan baik, Pemasangan infus RL + oxytocin 20 IU, 40 tetes/menit, melakukan kuretase untuk membersihkan sisa jaringan plasenta yang tertinggal dalam rahim untuk megatasi perdarahan aktif.

Kesimpulan dari kasus ini yaitu asuhan yang telah diberikan dengan kunjungan selama 3 hari dan kunjungan rumah sebanyak 2 kali di dapatkan hasil yaitu tidak di temukannya komplikasi, tanda-tanda vital dalam batas normal, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik yaitu teraba keras dan bundar, dan sudah tidak terjadi perdarahan aktif.

DaftarPustaka : 53 (1999-2017)

Kata Kunci : Perdarahan Post Prtum, Rest Plasenta, 7 Langkah Varney

## ABSTRACT

### MIDWIFERY MANAGEMENT UIN ALAUDDIN MAKASSAR SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 2018

SULFIKA, 70400115046

Supervisor I: Sitti Saleha

Supervisor II: Syatirah

**"The Postnatal Midwifery Care Management on Mrs. " K " With Post Partum Hemorrhage Due to the Placental Rest at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital on July 9 - August 6, 2018"**

---

The Placental rest is a condition where a part of the placenta (1 or more lobes) is left in the uterus, so that the uterus cannot contract effectively and can cause bleeding. Placental rest that is not immediately treated will have a negative effect on the mother. The usual effects include anemia, puerperium infection, shock, and death from post-partum hemorrhage.

The purpose of this Study was aimed at implementing the Postnatal Midwifery Care Management on Mrs. "K" with Post Partum Hemorrhage due to the Placental Rest at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 based on the 7 steps varney and SOAP.

The results of the case study on Mrs. "K" diagnosis of post partum hemorrhage due to placental rest are established with subjective data on lower abdominal pain, lots of blood coming out of the birth canal, dizziness and weakness. Objective data of birth placenta with incomplete impression, uterine contraction palpable and not palpable, high fundus uterine one finger over the center, removal of blood from the birth canal  $\pm$  500 CC. Upbringing was done by performing uterine massase so that the uterus contracts properly, Installation of infusion of RL + oxytocin 20 IU, 40 drops / minute, performs curettage to clean the remaining placental tissue left in the uterus to overcome active bleeding.

The conclusion of this case was the care has been given with visits for 3 days and home visits 2 times to get results namely no complications, vital signs within normal limits, TFU 2 fingers below the center, good uterine contractions which are palpable and round, and there is no active bleeding.

**Bibliography** : 53 (1999-2017)

**Keywords** : Post Partum Hemorrhage, Rest Placenta, 7 Steps Varney



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang*

Masa nifas merupakan masa pengawasan bagi ibu dan bayinya. Khususnya pada 24 jam pertama pasca persalinan. Karena pada masa ini banyak masalah yang biasa muncul, yaitu salah satunya perdarahan *post partum*. Perdarahan *post partum* merupakan perdarahan yang terjadi setelah masa nifas yaitu dimulai 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai 6 minggu pasca persalinan. Pentingnya tenaga kesehatan khususnya bidan mengetahui penyebab dan akibat dari perdarahan *post partum* itu sendiri.

Perdarahan *post partum* adalah perdarahan yang terjadi karena hilangnya darah lebih dari 500 ml pasca persalinan. Di mana perkiraan kehilangan darah biasanya tidak sebanyak pengeluaran darah yang sebenarnya, kadang-kadang hanya setengah dari biasanya, darah tersebut bercampur dengan cairan *amnion* atau dengan *urin* dan darah juga tersebar pada *underpad*, handuk, dan kain di dalam ember dan di tempat tidur. Pengeluaran volume darah yang juga bervariasi sesuai dengan kadar hemoglobin ibu (Asih, 2016: 254).

Salah satu penyebab perdarahan pada masa nifas adalah karena rest plasenta yang di sebabkan sisa plasenta yang tertinggal dalam rahim, sehingga menyebabkan kontraksi uterus tidak adekuat untuk menjepit pembuluh darah yang terbuka pada tempat perlekatan plasenta sehingga

hal ini dapat memicu terjadinya perdarahan. Bila sebagian kecil plasenta masih tertinggal dalam uterus di sebut *rest plasenta* (Saifuddin, A B. 2011). Sisa plasenta dalam masa nifas dapat menyebabkan perdarahan dan infeksi. Perdarahan yang banyak dalam masa nifas hampir selalu disebabkan oleh sisa plasenta atau potongan-potongan plasenta yang tertinggal tanpa di ketahui yang biasanya menimbulkan perdarahan post partum lambat (Saleha, Sitti, 2013 : 100).

Perdarahan dalam kehamilan dan persalinan terdiri dari perdarahan *antepartum, intrapartum, dan post partum*. *Rest plasenta* merupakan salah satu penyebab perdarahan *post partum* dengan angka kejadian berkisar antara 5%-15% dari laporan-laporan pada negara maju maupun negara berkembang, termasuk didalamnya adalah perdarahan karena *rest plasenta*. Insiden perdarahan pasca persalinan akibat *rest plasenta* dilaporkan berkisar 23%-24%. Di perkirakan bahwa 60% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama pasca melahirkan (Martiningsih, 2013).

Menurut Talluri, dkk (2016) perdarahan pasca persalinan juga bisa menjadi penyebab *morbiditas* berat jangka panjang dengan sekitar 12% wanita yang bertahan dalam perdarahan *post partum* akan mengalami anemia berat. Perdarahan pasca persalinan merupakan penyebab utama kematian ibu nifas dinegara-negara berpenghasilan rendah dan penyebab utama hampir seperempat dari semua kematian maternal secara global. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi perdarahan primer dan sekunder tergantung pada waktu perdarahan pasca persalinan. Perdarahan *post partum primer* atau perdarahan *post partum* awal terjadi dalam 24 jam setelah persalinan dan *post partum* sekunder terjadi mulai dari 24 jam setelah melahirkan sampai minggu ke 6 dari masa nifas.

*Rest plasenta* terjadi karena berbagai macam diantaranya terjadi pengeluaran plasenta yang dilakukan secara tidak hati-hati, dimana plasenta dilahirkan tidak sesuai kurva jalan lahir, kesalahan dalam pimpinan kala III, dan terjadi lingkaran konstiksi pada bagian bawah uterus. Perdarahan *rest plasenta* menjadi nomor urut kedua dalam kasus ginekologi. *Rest plasenta* yang tidak segera ditangani akan berdampak pada ibu. Adapun dampak yang bisa ditimbulkan yaitu memudahkan terjadinya anemia yang berkelanjutan dan infeksi puerperium dan bahkan kematian akibat perdarahan *post partum* (Karlina, dkk. 2016).

Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2013 Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia 210 per 100.000 kelahiran hidup, AKI di negara berkembang 230 per 100.000 kelahiran hidup dan AKI di negara maju 16 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Asia Timur 33 per 100.000 kelahiran hidup, Asia Selatan 190 per 100.000 kelahiran hidup, Asia Tenggara 140 per 100.000 kelahiran hidup dan Asia Barat 74 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Masa nifas merupakan hal penting untuk di perhatikan guna menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup tinggi jika di bandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. AKI di Indonesiasejak tahun 1991 hingga 2007 mengalami penurunan dari 390 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, pada tahun 2012 SDKI kembali mencatat kenaikan AKI yang signifikan, yakni dari 228 menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2015).

Penyebab terbesar kematian ibu di kota makassar dari tahun 2014-2016 di sebabkan oleh satu kasus yaitu kasus perdarahan. Pada tahun 2014 yaitu sebesar 20,33 per 1000.000 kelahiran hidup. Di banding tahun 2015 sebesar 19,86 per 1000.000 kelahiran hidup. Dan kembali meningkat pada tahun 2016 yaitu sebesar 23,42 per 1000.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2016 kasus perdarahan terjadi di wilayah puskesmas Makkasar, 3 kasus karena preeklamsi (tekanan darah tinggi) dimana 2 kasus terjadi di wilayah puskesmas Jumpangang baru, dan 1 kasus di puskesmas Rappokalling, 1 kasus karena solusio plasenta (lepasnya plasenta dari dinding rahim bagian dalam sebelum proses persalinan) terjadi di wilayah Puskesmas Mangasa dan 1 kasus kematian ibu karena komplikasi post partum ginjal terjadi di wilayah puskesmas Maccini sawah (Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2016: 37).

Perdarahan pasca persalinan merupakan perdarahan pervaginam 500 ml melalui jalan lahir yang terjadi selama atau setelah persalinan kala III (Nurjannah, dkk, 2013:146). Apabila terjadi perdarahan yang berlebihan pasca persalinan harus di cari etiologi yang spesifik, *atonia uteri, retensio plasenta, rest plasenta dan laserasi traktus agenitalia* bahwa merupakan penyebab sebagian besar perdarahan *post partum* (Londok. Dkk. *Jurnal e-Biomedik* 1.1. 2013). Oleh karena itu setiap perdarahan yang terjadi dalam masa kehamilan, persalinan dan nifas harus dianggap sebagai suatu keadaan akut dan serius.

Dari data rekan medik yang di peroleh dari RSUD Syekh Yusuf Gowa jumlah ibu nifas pada tahun 2014 sebanyak 2619 orang dan yang mengalami *rest plasenta* sebanyak 159 orang. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah ibu nifas sebanyak 2826 orang dan yang mengalami

*rest plasenta* sebanyak 172 orang. Pada tahun 2016 jumlah ibu nifas sebanyak 3887 orang dan yang mengalami perdarahan akibat *rest plasenta* sebanyak 13 orang. Dan pada tahun 2017 jumlah ibu nifas sebanyak 993 orang dan ada 23 orang yang mengalami perdarahan akibat *rest plasenta*. Dan pada tahun 2018 jumlah ibu nifas sebanyak 472 orang dan yang mengalami *rest plasenta* sebanyak 23 orang.

Pemberian asuhan kebidanan kepada ibu dalam masa nifas sangat penting dilakukan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, melaksanakan deteksi dini adanya komplikasi dan infeksi, memberikan pendidikan pada ibu serta memberikan pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi. Selama masa nifas ibu akan mengalami perubahan. Pelayanan atau asuhan merupakan cara penting untuk *memonitor* dan mendukung kesehatan ibu nifas normal dan mengetahui secara dini bila ada penyimpangan yang ditemukan dengan tujuan agar ibu dapat melalui masa nifasnya dengan selamat (Widyasih, dkk, 2013).

## **B. Ruang Lingkup Pembahasan**

Dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan dapat memperoleh informasi dan pelayanan nyata tentang proses asuhan kebidanan pada Ny “K” dengan perdarahan *post partum* akibat *rest plasenta*.

## **C. Tujuan Penulisan**

### 1. Tujuan Umum

Mampu melaksanakan manajemen asuhan kebidanan *postnatal care* pada Ny “K” dengan perdarahan *post partum* akibat *rest plasenta*.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian pada Ny “K” dengan *rest plasenta*.
- b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual yang terjadi pada Ny “K”

- dengan *rest plasenta*.
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial pada Ny "K" dengan *rest plasenta*.
  - d. Dilakukannya tindakan segera/kolaborasi pada Ny "K" dengan *rest plasenta*.
  - e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny "K" dengan *rest plasenta*.
  - f. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan pada Ny "K" dengan *rest plasenta*.
  - g. Diketuainya hasil tindakan yang telah dilakukan pada Ny "K" dengan *rest plasenta*.
  - h. Didokumentasikan semua hasil temuan dan tindakan yang telah diberikan pada Ny "K" dengan *rest plasenta*.

#### **D. Manfaat Penulisan**

##### **1. Manfaat Bagi Rumah Sakit**

Dapat menjadi sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pengelola program kesehatan di rumah sakit Syekh Yusuf dalam mencegah dan penanganan *rest plasenta*.

##### **2. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

- a. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan acuan bagi penulisan karya tulis ilmiah berikutnya.
- b. Pelaksanaan asuhan kebidanan ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang *rest plasenta*.

##### **3. Manfaat Bagi Penulis**

Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penulis serta

menambah wawasan yang sangat berharga dalam penerapan manajemen asuhan kebidanan postpartum pada pasien dengan *rest plasenta*.

#### 4. Manfaat Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi bagi rekan-rekan dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Program D III Kebidanan dalam pelaksanaan Manajemen Asuhan Kebidanan dengan perdarahan post partum akibat *rest plasenta*.

#### 5. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan penambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca tentang *rest plasenta*.

### ***E. Metode Penulisan***

Dalam menyusun proposal karya tulis ini di gunakan dasar teori yang di padukan dengan praktek, metode yang di gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Studi kepustakaan

Dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan sebagai literatur, mengambil data dari internet yang ada kaitannya dengan masalah yang di bahas sebagai dasar teoritis yang digunakan dalam pembahasan proposal karya tulis ilmiah.

#### 2. Studi Kasus

Melakukan studi kasus pada post partum dengan pendekatan manajemen kebidanan yang meliputi: pengumpulan data dasar, menganalisis dan mengevaluasi serta mendokumentasi asuhan

kebidanan. Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnese

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, suami, keluarga, dan bidan yang terlibat langsung yang dapat membantu memberikan informasi yang di butuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi:

- 1) *Inspeksi*, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) *Palpasi*, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau perabaan, metode ini di lakukan untuk mendeteksi jaringan atau organ.
- 3) *Perkusi* merupakan metode pemeriksaan dengan cara mengetuk yang hanya dilakukan pada tungkai bawah pada pemeriksaan fisik.
- 4) *Auskultasi*, yaitu metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah sedangkan lenek digunakan untuk mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian Psikososial

Meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang di alami serta pola interaksi klien terhadap keluarga,

petugas kesehatan, lingkungan/kehidupan bertetangga, dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan tentang nilai kesehatan, serta respon terhadap keadaan yang dialami.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium, dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

### 4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan dokter dan bidan yang menangani langsung klien dan dosen pembimbing baik dilahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

### ***F. Sistematika Penulisan***

adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari bab I pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, mamfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang masa nifas, tinjauan umun tentang perdarahan *post partum*, tinjauan khusus tentang *rest plasenta*, tinjauan agama islam tentang masa nifas, proses manajemen asuhan kebidanan, pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi

diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana tindakan, pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, evaluasi asuhan kebidanan, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kunjungan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di Rumah Sakit Syekh Yusuf dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu masa nifas dengan *rest plasenta*.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan, Kemudian selanjutnya daftar pustaka. Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Tinjauan Umum Tentang Perdarahan Post Partum*

##### **1. Masa Nifas**

###### **1) definisi**

- a) masa nifas (*puerperium*) dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu atau setelah persalinan sampai 42 hari persalinan merupakan priode penting bagi ibu dan bayi (Prawirohardjo, 2014).
- b) Masa nifas (*puerperium*) dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas atau *puerperium* dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu 42 hari (Dewi, Vivian, dkk. 2014:1).
- c) Masa nifas dimulai setelah 2 jam *post partum* dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Biasanya berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Namun secara keseluruhan baik secara fisiologis akan pulih dalam waktu 3 bulan (Lockhart, 2014: 14).
- d) Masa nifas merupakan masa dimulai beberapa jam sesudahnya lahir plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat

kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira-kira 6 minggu (Marmi, 2012:11).

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa masa nifas (*puerperium*) dimulai setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu hingga alat-alat kandungan kembali seperti semula yaitu keadaan sebelum hamil.

## 2) Proses Involusio (Lochea)

Lochea merupakan cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina selama masa nifas. Cairan lochia akan mengalami 4 tahapan perubahan baik warna, bau dan kekentalannya:

Tabel 2.1  
proses involusi (lochea)

LOCHEA	WAKTU	WARNA	CIRI-CIRI
Rubra	1-3 hari	Merah kehitaman	Terdiri dari darah segar, jaringan sisa plasenta, lemak bayi, lanugo dan sisa mekonium
Sanguilenta	4-7 hari	Merah kecoklatan dan bercampur lendir	Sisa darah bercampur lendir
Serosa	7-14 hari	Kuning	Lebih sedikit darah dan lebih banyak serum, juga terdiri dari leukosit, dan robekan/laserasi plasenta
Alba	hari	Putih	Mengandung leukosit sel, sel desidua dan sel epitel, selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati.

(Sumber: Maritalia, 2012: 20-21).

### 3) Kebijakan Program Nasional Masa Nifas

Tabel 2.2  
kebijakan program nasional

WAKTU KUNJUNGAN	TUJUAN
Kunjungan I (6-8 jam setelah persalinan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mencegah perdarahan akibat <i>atonia uteri</i></li> <li>▪ Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk jika perdarahan berlanjut.</li> <li>▪ Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri</li> <li>▪ Pemberian ASI secara dini</li> <li>▪ Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir.</li> <li>▪ Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir minimal 2 jam pertama kelahiran, atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil.</li> </ul>
Kunjungan II 6 hari setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau</li> <li>▪ Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal</li> <li>▪ Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan istirahat.</li> <li>▪ Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit.</li> <li>▪ Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan asuhan</li> <li>▪ pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari hari.</li> </ul>
Kunjungan III 2 minggu setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sama seperti di atas (6 hari setelah persalinan).</li> </ul>
Kunjungan IV 6 minggu setelah persalina	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ibu atau bayi alami.</li> <li>▪ Memberikan konseling untuk KB secara dini.</li> </ul>

( Sumber: Suherni,dkk. 2013)

Kebijakan program nasional pada masa nifas yaitu paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas dilakukan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang terjadi.

Tujuan kebijakan tersebut adalah:

- 1) Untuk menilai kesehatan ibu dan kesehatan bayi baru lahir.
- 2) Pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu nifas dan bayinya.
- 3) Mendeteksi adanya kejadian-kejadian pada masa nifas.
- 4) Menangani berbagai masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu maupun bayinya pada masa nifas (Wulandari, Setyo Retno, dkk. 2011: 3-4).

#### **4). Tahapan masa nifas**

Ada beberapa tahapan masa nifas diantaranya:

- a. *Puerperium dini* (0-24 jam *post partum*), yaitu kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan.
- b. *Puerperium intermedia* (1-7 hari *post partum*), yaitu kepulihab menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu.
- c. *Remote puerterium* (1-6 minggu *post prtum*), yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sempurna terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi (Rukiyah, dkk. 2012)

## **2. Perdarahan Post partum**

### **1) Definisi**

- a) Perdarahan *post partum* adalah perdarahan lebih dari 500 cc dan terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1.000 mI setelah persalinan abnormal (Nugroho, 2014).

- b) Perdarahan *post partum* adalah perdarahan lebih dari 500 ml pada persalinan pervaginam atau lebih dari 100 ml pada persalinan caesar setelah bayi lahir perdarahan dapat terjadi sebelum, selama, dan setelah plasenta lahir (Norma, 2013).
- c) Perdarahan *post partum* adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml dalam masa 24 jam setelah anak lahir (Mochtar, 2015).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perdarahan post partum adalah perdarahan yang berlebihan (jumlah darah yang keluar >500 ml) selama masa nifas termasuk periode 24 jam pertama setelah kala III persalinan selesai.

Klasifikasi perdarahan *post partum* berdasarkan waktu terjadinya perdarahan (Imron, 2016), yaitu:

- 1) Perdarahan pasca persalinan primer (*Early Post partum Haemorrhage*, atau perdarahan pasca persalinan segera).

Perdarahan pasca persalinan primer terjadi 24 jam pertama , akan tetapi lebih banyak terjadi pada 2 jam pertama. Penyebab utama perdarahan pasca persalinan primer adalah *atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, dan robekan jalan lahir*.

- 2) Perdarahan pasca persalinan sekunder (*last post partum haemorrhage* atau perdarahan pasca persalinan lambat)

Perdarahan pasca persalinan sekunder terjadi setelah 24 jam pertama. Penyebab utama perdarahan sekunder adalah robekan jalan lahir dan sisa plasenta (Nurjannah, dkk. 2013 : 146-147).

## 2) Etiologi

Adapun penyebab terjadinya perdarahan *post partum* yaitu:

- a) *Atonia uteri* adalah perdarahan obstetri yang di sebabkan oleh kegagalan uterus untuk berkontraksi secara memadai setelah bayi lahir (Cunningham, 2013: 415).
- b) *Retensio plasenta* adalah keadaan dimana plasenta belum lahir hingga atau lebih dari 30 menit setelah bayi lahir (Rukiyah, 2012).
- c) *Rest plasenta* adalah keadaan dimana suatu bagian dari plasenta (1 atau lebih lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan dapat menimbulkan perdarahan (Nurjannah, 2013: 149).
- d) *Robekan jalan lahir* adalah trauma yang diakibatkan oleh kelahiran bayi yang terjadi pada serviks, vagina, atau perineum (Maryunani, 2014).

## 3) Diagnosis Perdarahan *Post partum*

Gejala yang dapat menunjukkan bahwa pasien mengalami perdarahan *post partum* yaitu: perdarahan yang tidak dapat dikontrol, penurunan tekanan darah, peningkatan detak jantung, penurunan hitung sel darah merah (*Hematocrit*) serta pembengkakan dan nyeri pada jaringan daerah vagina dan sekitar perineum.

Langkah-langkah untuk mendiagnosa perdarahan pasca persalinan:

- a. *Palpasi uterus*: bagaimana kontraksi uterus dan tinggi fundus

uteri

b. Memeriksa plasenta dan ketuban apakah lengkap atau tidak

c. Lakukan eksplorasi cavum uteri untuk mencari:

1. Sisa plasenta atau selaput ketuban

2. Robekan rahim

3. Plasenta suksenturiata

d. *Inspékulo*: untuk melihat robekan pada serviks, vagina dan varices yang pecah.

e. Pemeriksaan laboratorium: pemeriksaan darah yaitu Hb, COT (clot observation test) dan lain-lain (Renden, 2015:115).

#### 4) Tanda dan Gejala Perdarahan *Post partum*

Penilaian klinik untuk menentukan penyebab perdarahan postpartum dilihat dari tanda dan gejalanya menurut *Nugroho*,

2014 yaitu:

Tanda dan gejala	Penyulit	Diagnosa
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uterus tidak berkontraksi</li> <li>• Perdarahan segera setelah lahir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syok</li> <li>• Pembekuan darah pada serviks atau posisi terelentang akan menghambat aliran darah keluar</li> </ul>	Atonia uteri
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darah segar mengalir segera setelah bayi lahir</li> <li>• Terus berkontraksi dan keras</li> <li>• Plasenta lengkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pucat</li> <li>• Lemah</li> <li>• Menggigil</li> </ul>	Robekan jalan lahir
<ul style="list-style-type: none"> <li>• plasenta belum lahir setelah 30 menit persalinan</li> <li>• perdarahan segera, uterus berkontraksi dan keras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tali pusat putus akibat traksi berlebihan</li> <li>• inversio uteri akibat tarikan</li> <li>• perdarahan lanjutan</li> </ul>	Retensio plasenta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• plasenta atau sebagian selaput tidak lengkap</li> <li>• perdarahan segera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang</li> </ul>	Retensi sisa plasenta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• uterus tidak teraba</li> <li>• lumen vagina terisi massa</li> <li>• tampak tali pusat (bila plasenta belum lahir)</li> <li>• perdarahan segera</li> <li>• nyeri sedikit atau berat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• neurogenik syok</li> <li>• pucat dan limbung</li> </ul>	Inversio uteri

Gambar 2.1 tanda dan gejala penyebab perdarahan post partum  
(sumber: Maemunah S, dkk. 2013)

### 5) Penanganan Perdarahan *Post partum*

Mencegah atau sekurang-kurangnya bersiap siaga pada kasus-kasus yang disangka akan terjadi perdarahan adalah penting. Tindakan pencegahan tidak hanya dilakukan sewaktu bersalin, namun sudah dimulai sejak ibu hamil dengan melakukan *antenatal care* yang baik. Ibu-ibu yang mempunyai predisposisi atau riwayat perdarahan postpartum sangat dianjurkan untuk bersalin di rumah sakit. (Mochtar, 2015)

Pasien dengan perdarahn *post partum* harus ditangani dalam 2 komponen yaitu: Resusitasi dan penanganan perdarahn obstetri serta kemungkinan syok hipovolemik dan identifikasi penanganan penyebab terjadinya perdarahan post partum (Nugroho, 2014).

Adapun penanganan umum perdarahan *post partum* yaitu perbaiki keadaan umum dengan cara:

- a) Memasang infus
- b) Transfusi darah
- c) Pemberian antibiotik
- d) Pemberian uterotonika

perdarahan pasca bersalin merupakan penyebab utama kematian ibu baik di negara maju maupun negara terbelakang dimana hampir 80%nya di sebabkan oleh gagalnya uterus berkontraksi. *Misoprostol* merupakan agen uterotonika kuat yang di gunakan sebagai alternative dalam mencegah perdarahan pasca persalinan. Penggunaan uterotonika secara rutin pada kala III merupakan langkah penting sebagai pencegahan perdarahan pasca persalinan. *Misoprostol* merupakan agen uterotonika kuat yng di gunakan sebagai alternatif dalam mencegah perdarahan pasca persalinan dan memiliki banyak kelebihan antara lain; bersifat stabil dalam suhu ruangan, murah dan mudah dalam pemberiannya. Secara luas telah di evaluasi dapat di gunakan sebagai alternatif pengganti oksitocin sebagai profilaksis perdarahan pasca persalinan. Oksitosin dan *misoprostol* bekerja pada reseptor oksitocin dan prostanoid di myometrium. Efektifits

penambahan penggunaan *misoprostol* dalam penatalaksanaan aktif kala III dalam mencegah perdarahan pasca persalinan terkait kondisi atonia uteri belum secara sistematis di evaluasi. Pemberian *misoprostol* berpengaruh terhadap jumlah perdarahan kala IV dan penurunan kadar hemoglobin.

Efek samping yang sering timbul pada penggunaan *misoprostol* yaitu menggigil di ikuti dengan demam, muntah dan diare. Demam dan menggigil berkaitan dengan dosis *misoprostol*. Dosis pemberian tambahan *misoprostol* 600 mcg peroral pada penatalaksanaan aktif kala III bermakna secara statistik dalam menurunkan jumlah perdarahan pasca persalinan (Geni, dkk. 2017: 170).

## **B. Tinjauan Khusus Tentang Rest Plasenta**

### **1) Defenisi**

- a. *Rest plasenta* adalah potongan-potongan plasenta yang ketinggalan tanpa diketahui biasanya menimbulkan perdarahan post partum lambat (Saleha, Sitti, 2013: 100)
- b. *Rest plasenta* adalah keadaan dimana suatu bagian dari plasenta (1 atau lebih lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan dapat menimbulkan perdarahan (Nurjannah, 2013: 149).
- c. *Rest plasenta* atau tertinggalnya sisa plasenta yaitu apabila sebagian besar plasenta sudah lahir tetapi sebagian kecil masih melekat pada dinding uterus.potongan-potongan plasenta yang tertinggal tanpa diketahui dapat menimbulkan perdarahan (Liliyana, et. Al, 2011 dalam Sari, Husna, 2012).
- d. *Rest plsenta* atau sisa plasenta adalah dimana suatu bagian dari plasenta (1 atau 2 lobus) tertinggal dalam uterus sehingga

uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif sehingga keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan (Saifuddin A.B, 2010: 31).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa *rest plasenta* merupakan perdarahan yang terjadi akibat tertinggalnya kotiledon dan selaput kulit ketuban yang mengganggu kontraksi uterus dalam menjepit pembuluh darah dalam uterus sehingga menyebabkan perdarahan.

## 2) Fisiologi Dan Tipe Plasenta

Plasenta berbentuk bundar atau oval, diameter 15-20 cm, tebal 3 cm, berat 500-600 Gram, biasanya plasenta akan berbentuk lengkap pada kehamilan kira-kira 16 minggu, dimana ruang amnium telah mengisi seluruh rongga rahim.

Letak plasenta yang normal umumnya pada *corpus uteri* bagian depan atau belakang agak kearah fundus uteri. Plasenta terdiri atas tiga bagian yaitu:

### a. Bagian Janin (fetal portion)

Bagian janin terdiri dari *korionfrondosum* dan *vili* dari *uri* atau plasenta yang matang terdiri atas:

#### a) Vili korialis

b) Ruang-ruang interviler. Darah ibu yang berada dalam ruang interviler berasal dari arteris spirialis yang berada di *desidua basalis*. Pada *sistole*, darah dipompa dengan tekanan 70-80 mmHg kedalam ruang interviler sampai lemepng kronik

(*chorionic plate*) pangkal dari kotiledon – Kotiledon. Darah tersebut membanjiri vili korialis dan kembali perlahan ke pembuluh darah balik (vena-vena) didesidua dengan tekanan 8 mmHg.

c) Pada bagian permukaan janin plasenta diliputi dengan *amnion* yang licin, dibawah lapisan amnion ini berjalan cabang-cabang pembuluh darah tali pusat. Tali pusat akan berinsersi pada plasenta bagian permukaan janin.

#### b. Bagian Maternal (Maternal Portion)

Bagian maternal terdiri atas desidua kompakta yang berbentuk dari beberapa lobus dan kotiledon (15-20 buah). Desidua basalis pada plasenta yang matang disebut lempeng korionik (basal) dimana sirkulasi utero-plasenta berjalan keruang-ruang intervili melalui tali pusat.

##### 1) Tali pusat

Tali pusat merentang dari pusat janin ke plasenta bagian permukaan janin. Panjangnya rata-rata 50-55 cm, sebesar jari (diameter 1- 2,5 cm), strukturnya terdiri atas 2 *arteri umbilikal* dan 1 *vena umbilikal* serta *jelly wharton*.

Tipe-tipe plasenta:

##### 1. Menurut bentuknya

a. Plasenta normal

b. Plasenta *membramesa*: tipis, lebar, kadang-kadang

menutupi seluruh ruang kavum uteri

c. Plasenta *suksenturiata* (satu lobus terpisah), bila disamping plasenta yang besar ditemukan pula plasenta yang besar ditemukan pula plasenta yang kecil disebut plasenta suksenturiata.

d. Plasenta *spuria*, yaitu tidak ada pembuluh darah diantara bagian plasenta.

e. Plasenta *bilobus*, yaitu plasenta yang terdiri dari 2 lobus

f. Plasenta *trilobus*, plasenta yang terdiri dari 3 lobus

2. Menurut perlekatan pada dinding rahim

a. Plasenta *adhesif*, yaitu implantasi yang kuat dari *vili korialis* sehingga menyebabkan kegagalan mekanisme separasi fisiologis.

b. Plasenta *akreta*, merupakan bagian plasenta yaitu *vili korialis* menanamkan diri lebih dalam didinding rahim.

c. Plasenta *inkreta*, bagian plasenta yaitu *vili korialis* yang masuk kedalam lapisan otot rahim (*miometrium*)

d. Plasenta *perkreta*, bagian plasenta yaitu *vili korialis* yang menembus miometrium dan mencapai serosa.

### 3. Mekanisme Lahirnya Plasenta

Menurut Mochtar (1998) fase-fase dalam pengeluaran plasenta meliputi:

#### 1) Fase pelepasan plasenta

Terdapat 3 Cara Pengeluaran plasenta yaitu dengan menggunakan metode Kustner, Klein dan Strassman adapun uariannya sebagai berikut :

- a) Mekanisme schultz: pelepasan plasenta yang dimulai dari sentral/bagian tengah sehingga terjadi bekuan retroplasenta. dan pelepasan dari tengah ini mengakibatkan perdarahan tidak terjadi sebelum plasenta lahir. peredaran terjadi setelah placenta lahir.
- b) Mekanisme *Duncan* : terjadi pelepasan plasenta dari pinggir atau bersamaan dari pinggir dan tengah mengakibatkan semburan darah sebelum plasenta lahir.

#### 2) Fase pengeluaran plasenta

- a) *Kustner*: Dengan meletakkan tangan disertai tekanan pada atau diatas simpisis, tali pusat ditegangkan, maka bila tali pusat masuk berarti plasenta sudah lepas, tetapi bila diam atau maju berarti plasenta sudah lepas.
- b) *Klein* : Sewaktu ada his, rahim didorong sedikit, bila tali pusat kembali berarti plasenta belum lepas, tetapi bila diam turun berarti plasenta sudah lepas.

- c) *Strassman* : Tegangan tali pusat dan ketok pada fundus, bila tali pusat bergetar berarti plasenta belum lepas, tetapi bila tidak bergetar plasenta sudah lepas (Jannah, 2012: 75).

### 3) Etiologi

Sebab-sebab plasenta belum lahir:

#### 1) Plasenta belum lepas dari dinding uterus

Apabila plasenta belum lahir sama sekali, tidak terjadi perdarahan, jika lepas sebagian akan terjadi perdarahan yang merupakan indikasi untuk mengeluarkannya.

Plasenta belum lepas dari dinding uterus bisa karena:

- a) Kontraksi uterus kurang kuat untuk melepaskan plasenta (*plasenta adhesiva*).
- b) Plasenta melekat pada dinding uterus oleh sebab *vili korialis* menembus desidua sampai miometrium.

#### 2) Plasenta sudah lepas akan tetapi belum dilahirkan

Plasenta yang sudah lepas dari dinding uterus akan tetapi belum keluar disebabkan oleh:

- a. Karena atonia uteri
- b. Kesalahan penanganan kala 3 sehingga menyebabkan terjadinya lingkaran *konstriksi* pada *segmen* bagian bawah uterus yang dapat menghalangi keluarnya plasenta.

### 4) Tanda Gejala Rest Plasenta

Gejala klinik dari rest plasenta yaitu:

- a. Plasenta atau sebagian selaput (mengandung pembuluh darah)

tidak lengkap

- b. Perdarahan pervaginam
- c. Uterus berkontraksi tapi tinggi fundus tidak berkurang (Nurjannah, dkk. 2013: 151).
- d. Perdarahan pasca partus sekunder
- e. Perdarahan pasca partus berkepanjangan dan pengeluaran lokhea dapat berbau akibat infeksi rest plasenta (Manuaba, 2001 dalam Nadiah, 2013).
- f. Pemeriksaan tanda-tanda vital:
  - a) Tekanan darah menurun
  - b) Denyut nadi akan meningkat cepat
  - c) Suhu biasanya meningkat sampai 38 dianggap normal. Setelah satu hari suhu akan kembali normal (36,5 - 37,5), terjadi penurunan akibat *hipovolemik*.
  - d) Pernafasan cepat, bila suhu dan nadi tidak normal pernafasan juga menjadi tidak normal
  - e) Pusing, gelisah, letih, ekstremitas dingin dan dapat terjadi syok *hipovolemik*.

## 5) **Diagnosis**

Sisa plasenta bisa diduga bila kala uri berlangsung tidak lancar atau setelah melakukan plasenta manual atau menemukan adanya kotiledon yang tidak lengkap pada saat melakukan pemeriksaan plasenta dan masih ada perdarahan dari ostium uteri eksternum pada saat kontraksi rahim sudah baik dan robekan jalan lahir sudah terjahit (Lisnawati, 2013).

Diagnosa rest plasenta dapat ditegakkan berdasarkan:

1. Palpasi uterus, bagaimana kontraksi uterus dan tinggi fundus uteri.
2. Memeriksa plasenta dan selaput ketuban apakah lengkap atau tidak.
3. Lakukan *eksplorasi cavum uteri* untuk mencari:
  - a) Sisa plasenta atau selaput ketuban
  - b) Robekan rahim
  - c) Plasenta suksenturiata (Mochtar, 2012).
4. Inspekulo, untuk melihat robekan pada serviks, vagina, dan varices yang pecah.
5. Pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan USG (Ultrasonografi).

**6) Penyebab *Rest Plasenta***

Penyebab terjadinya *rest plasenta* ada dua yaitu antara lain:

- A) Penyebab utama perdarahan baik secara primer maupun sekunder yaitu:
- a. Grendemultipara yaitu jarak persalinan pendek kurang dari 2 tahun.
  - b. Persalinan yang di lakukan dengan tindakan, yaitu pertolongan kala uri sebelum waktunya.
  - c. Perolongan persalinan oleh dukun yaitu persalinan dengan tindakan paksa.
  - d. Persalinan dengan narkosa (Yeyeh, 2015: 325).
- B) Penyebab yang lain terjadinya perdarahan akibat *rest plasenta* yaitu:
- a. Pengeluaran plasenta tidak secara hati-hati, dimana plasenta dilahirkan tidak sesuai dengan kurva jalan lahir.
  - b. Salah dalam pimpinan kala III, terlalu terburu-buru untuk mempercepat lahirnya plasenta

- c. Terjadi lingkaran kontraksi pada bagian bawah uterus  
(Lisnawati, 2013)

**7) Komplikasi Rest Plasenta**

- 1) Merupakan sumber infeksi dan perdarahan potensial
- 2) Memudahkan terjadinya anemia yang berkelanjutan
- 3) Terjadi plasenta polip
- 4) Degenerasi *koriokarsinoma*
- 5) Dapat menimbulkan gangguan pembekuan darah (Manuaba, 2012 dalam Sugianti, 2016).

**8) Penatalaksanaan Rest Plasenta**

Penatalaksanaan *rest plasenta* Menurut Yeyeh, 2015 yaitu:

- a. Perbaiki keadaan umum dengan memasang infus RL atau cairan NaCL 0,9%.
- b. Kosongkan kandung kemih.
- c. Memakai sarung tangan steril
- d. Desinfeksi genitalia eksternal
- e. Tangan kiri melebarkan genitalia eksternal, tangan kanan dimasukkan secara obstetrik sampai serviks
- f. Jika pasien demam, tunggu sampai suhu turun dengan pemberian antibiotik dan 3-4 hari kemudian rahim di bersihkan.
- g. Jika perdarahan banyak, maka rahim segera dibersihkan walaupun pasien demam (Saleha, Sitti, 2013:100).
- h. Lakukan eksplorasi didalam cavum uteri bila serviks terbuka untuk mengeluarkan sisa plasenta, dan bila serviks hanya dapat dilalui oleh instrumen, lakukan evakuasi sisa plasenta dengan AMV dilatasi dan kuretase (dilakukan oleh dokter

obgyn).

- i. Setelah plasenta keluar semua injeksi uterotonika
- j. Berikan antibiotik untuk mencegah infeksi
- k. Berikan antibiotik (sesuai instruksi dokter) karena perdarahan juga merupakan gejala matritis. Antibiotik yang dipilih adalah *ampisilin* dosis awal 1 gram IV di lanjutkan dengan gram oral dikombinasikan dengan *metronidazol* 1 gram *supositoria* dilanjutkan dengan 3x500 mg oral.
- l. Observasi tanda-tanda vital dan perdarahan
- m. Bila kadar Hb <8 gr% berikan transfusi darah. Bila kadar Hb >8 gr% berikan *sulfas ferosus* 600 Mg/hari selama 10 hari (Yeyeh, 2015). Pada syok parah, dapat gunakan plasma ekspander di berikan karena cairan ini dapat meresap ke jaringan dan cairan ini dapat menarik cairan lain dari jaringan ke pembuluh darah.
- n. Jika ada indikasi terjadi infeksi yang diikuti dengan demam, menggigil, vagina berbau busuk, segera berikan antibiotika spectrum luas. Antibiotik yang dapat di berikan:
  - a) *Benzilpenisilin* 5jt IU IV kemudian 2jt IU setiap 6 jam + gentamisin 100 mg stat IM, kemudian 80 Mg tiap 8 jam + *metronidazol* 400 atau 500 Mg secara oral setiap 8 jam.
  - b) *Metronidazol* 400 atau 500 Mg secara oral setiap 8 jam.
  - c) *Benzilpenisilin* 5 jt IU IV kemudian 2 jt IU setiap 6 jam + *kloramfenikol* 500 Mg secara IV setiap 6 jam.

- o. Kuretase oleh Dokter. Kuretase harus dilakukan di RS dengan hati-hati karena dinding rahim relatif tipis dibandingkan dengan kuretase pada *abortus*
- p. Sisa plasenta dapat dikeluarkan dengan manual plasenta. Tindakan ini dapat dilakukan untuk mengeluarkan sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim setelah plasenta lahir.
- q. Setelah selesai tindakan pengeluaran sisa plasenta, dilanjutkan dengan pemberian obat uterotonika melalui suntikan atau per oral.

Catatan: jika sisa plasenta telah lepas dan perdarahan masih berlanjut kaji status pembekuan darah dengan menggunakan uji pembekuan darah sederhana. Kegagalan terbentuknya bekuan darah setelah 7 menit atau terbentuknya bekuan darah yang lunak dan mudah hancur menunjukkan adanya kemungkinan koagulasi (yulianti, 2005 dalam sugianti, 2016).

#### 9) Pencegahan *Rest Plasenta*

- a. Meningkatkan kesehatan ibu sehingga tidak terjadi anemia dalam kehamilan.
- b. Meningkatkan usaha penerimaan KB
- c. Meningkatkan pertolongan partus (kala III) tidak diperbolehkan melakukan massase dengan tujuan mempercepat proses persalinan plasenta karena dapat mengganggu kontraksi uterus sehingga memicu terjadinya *rest plasenta*.
- d. Melakukan pertolongan persalinan di rumah sakit bagi ibu

yang mengalami perdarahan post partum.

- e. Memberikan uterotonika segera setelah bayi lahir, dan segera melahirkan plasenta dengan cara peregangan tali pusat terkendali.

### C. Tinjauan Agama Islam Tentang Rest Plasenta

Rest plasenta merupakan salah satu bentuk penyakit yang di alami akibat tertinggalnya satu atau lebih kotiledon dan selaput ketuban yang mengganggu kontraksi uterus dalam menjepit pembuluh darah sehingga mengakibatkan perdarahan.

Penyakit merupakan suatu ujian yang diberikan oleh Allah swt. Hal ini dapat di pahami dari firman Allah dalam QS Al-Anbiya' / 21: 35.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

*Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.*

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً wa nablukum bi asy-syarri wa al-khairi fitnatan (kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan), hal ini mengisyaratkan bahwa hidup manusia tidak pernah luput dari ujian, karena hidup hanya berkisar pada baik dan buruk. Ujian dengan kebaikan biasanya lebih sulit daripada ujian dengan malapetaka (keburukan). Karena manusia biasa lupa daratan dikala dia senang, sedangkan bila dalam kesulitan, dia lebih cenderung

butuh sehingga dorongan untuk mengingat Allah swt, menjadi lebih kuat. (Shihab. 2002: 53).

Dalam menyikapi cobaan tersebut Allah sudah memberikan tuntunan seperti dalam QS.Al-Baqarah/2 ayat 156.

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun

Dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un* dengan menghayati maknanya yaitu sebagaimana yang di kemukakan di atas, mereka itulah yang mendapat banyak keberkatan. keberkatan itu sempurna, banyak dan beraneka ragam, sebagaimana di pahami dari bentuk jamak yang digunakan ayat di atas antara lain berupa limpahan pengampunan, pujian, menggantikan lebih baik daripada nikmat sebelumnya yang telah hilang, dan lain-lain. semua keberkatan itu bersumber dari Tuhan yang memelihara dan mendidik mereka, serta dengan demikian keberkatan itu dilimpahkan sesuai dengan pendidikan dan pemeliharaan-Nya (Shihab, 2002: 438-439).

Meskipun demikian, kita wajib berusaha dengan melakukan pengobatan. Sesuai hadits nabi, **لكل عاءد عاود** *setiap penyakit pasti ada obatnya* (HR. Imam Bukhari). Didalam hadits diatas terdapat dorongan untuk berobat dan yakin bahwasanya yang demikian itu termasuk dari takdir Allah. Bahkan ia termasuk menuntut takdirnya jika ia berkeyakinan bahwa ia akan sembuh dengan seizinnya. Begitupun dengan terjadinya perdarahan akibat *rest plasenta* maka seseorang harus bersabar menghadapi sakitnya dan berusaha untuk mencari obatnya atau berobat (Minnatul Mun'im Syarah Shahih Muslim, 3: 457).

Selain berusaha harus di barengi dengan memperbanyak do'a karena pada dasarnya kesembuhan itu datangnya dari Allah swt. QS As-Syu'ara:80.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرْتُ بِشَفِيِّنِ

Terjemahnya:

*Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku*

Dalam tafsir Al-Misbah di jelaskan maksud kalimat *وَإِذَا مَرَضْتُ* *wa idza maridhtu* (dan apabila aku sakit) berbeda dengan redaksi lainnya. Perbedaan pertama yaitu penggunaan kata *idza/apabila* dan mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya apa yang dibicarakan, dalam hal ini adalah sakit. Di mana disini mengisyaratkan bahwa sakit berat atau ringan, fisik atau mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Perbedaan kedua yaitu redaksinya yang menyatakan “apakah aku sakit” bukan “apabila Allah menjadikan aku sakit”. Namun demikian, dalam hal penyembuhan seperti juga dalam pemberian hidayah, makan, dan minum secara tegas beliau menyatakan bahwa yang melakukannya adalah Dia, Tuhan semesta alam.

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa berbicara tentang nikmat, secara tegas, Nabi Ibrahim as. Menyatakan bahwa sumbernya adalah Allah swt, berbeda ketika berbicara tentang penyakit. Ini penganugrahan nikmat adalah sesuatu yang terpuji sehingga wajar disandarkan kepada Allah, sedangkan penyakit adalah sesuatu yang dapat dikatakan buruk sehingga tidak wajar di nyatakan bersumber dari Allah swt. Adapun yang tercela dan negatif hendaklah terlebih dahulu di cari penyebabnya pada diri sendiri. Jika demikian dalam kehidupan kita, ada yang disebut dengan *sunnatullah*, yakni ketetapan-ketetapan Allah yang biasa berlaku dalam kehidupan nyata seperti hukum sebab dan akibat,

kemudian *'inayatullah*, yaitu pertolongan dan bimbingan Allah di luar kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.

Dimana penyembuhan disini tidak dapat di lakukan kecuali atas kehendak Allah swt. Hal ini perlu di tekankan, apalagi di hadapan mereka yang tidak mengakui keesaan Allah swt. Di sisi lain, penggunaan kata kerja *mudhari'* (masa kini dan datang) pada ayat di atas mengisyaratkan bahwa hal itu dilakukan Allah bersinambung dan terjadi setiap saat (Sihab, 2002: 257-259).

Maka obat dan dokter hanya penyalur cara kesembuhan, sedangkan kesembuhan hanya datang dari Allah. Karena dia sendiri menyatakan demikian, “Dialah yang menciptakan segala sesuatu.” semujarab apapun obat dari spesialis dokter itu, namun jika Allah tidak menghendaki kesembuhan, maka kesembuhan itu tidak akan didapat. Bahkan jika meyakini bahwa kesembuhan itu datang dari selain Allah, berarti iya telah rela keluar dari agama dan neraka tempat tinggalnya kelak jika tidak juga bertaubat. Dan fenomena ini banyak dijumpai di banyak kalangan, entah sadar atau tidak.

Begitu pun dengan ibu nifas yang mengalami sakit akibat *rest plasenta* sesuai dengan penjelasan ayat di atas maka hendaklah kita bertawakkal kepada Allah bahwa di balik cobaan itu pasti ada hikmahnya, dan yakin pada diri sendiri bahwa Allah tidak akan memberi cobaan pada hambanya diluar batas kemampuannya. Hal ini sesuai dengan (QS al-Baqarah/2: 286).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا  
أَوْ أَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا

تُحْمَلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ<sup>ط</sup> وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Terjemahnya:

*Allah Swt tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya....(Qs Al-baqarah: 286)*

Yang perlu di ketahui oleh setiap muslim yaitu Allah tidak menetapkan (*mentaqrkan*) suatu takdir melaingkan dibalik takdir itu terdapat hikmah, baik diketahui ataupun tidak. Dengan demikian hati seorang muslim harus senantiasa ridho dan pasrah terhadap ketetapan rabb-nya. Saat seseorang mengalami sakit, hendaknya ia menyadari bahwa Rasulullah yang merupakan manusia termulia sepanjang sejarah juga pernah merasakan sakit. Bahkan dengan adanya sakit, banyak orang menyadari kekeliruannya selama ini sehingga sakit itu menghantarkannya menuju pintu tubat.

#### **D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan**

##### **1. Pengertian Manajemen Kebidanan**

Manajemen kebidanan merupakan pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Muslihatun, 2013).

##### **2. Tahapan dalam manajemen kebidanan**

###### **Langkah I. Identifikasi data dasar**

Langkah ini dilakukan dengan melakukan pengkajian melalui proses pengumpulan data yang diperlukan untk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan

fisik sesuai dengan kebutuhan, peninjauan catatan terbaru atau catatan

sebelumnya, data laboratorium dan membandingkannya dengan hasil studi. Semua data dikumpulkan dari semua sumber yang berhubungan dengan kondisi pasien.

### **Langkah II. Interpretasi Data Dasar**

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi data secara benar terhadap diagnosis atau masalah kebutuhan pasien. Masalah atau diagnosis yang spesifik dapat ditemukan berdasarkan interpretasi yang benar terhadap data dasar. Selain itu, sudah terfikirkan perencanaan yang dibutuhkan terhadap masalah.

### **Langkah III. Identifikasi Diagnosa Masalah atau masalah Potensial**

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial yang lain berdasarkan beberapa masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi yang cukup dan apabila memungkinkan dilakukan proses pencegahan atau dalam kondisi tertentu pasien memungkinkan tindakan segera.

### **Langkah IV. Evaluasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi**

Tahap ini dilakukan oleh bidan dengan melakukan identifikasi dengan menetapkan beberapa kebutuhan setelah diagnosis dengan masalah ditegakkan. kegiatan bidan pada tahap ini adalah konsultasi, kolaborasi dan melakukan rujukan.

### **Langkah V. Rencana Asuhan Kebidanan**

Setelah beberapa kebutuhan pasien yang ditetapkan, diperlukan

perencanaan secara menyeluruh terhadap masalah dan diagnosis yang ada. Dalam proses perencanaan asuhan secara menyeluruh juga dilakukan beberapa data yang tidak lengkap agar pelaksanaan secara menyeluruh dapat berhasil.

#### **Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan**

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari semua rencana sebelumnya, baik terhadap masalah pasien ataupun diagnosis yang ditegakkan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh bidan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya.

#### **Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan**

Merupakan tahap terakhir dalam manajemen kebidanan, yakni dengan melakukan evaluasi dari perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan bidan. Evaluasi sebagai bagian dari proses yang dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan pelayanan secara komprehensif dan selalu berubah sesuai dengan kondisi atau kebutuhan klien (Varney, 2003).

#### ***E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan***

Manajemen asuhan kebidanan merupakan suatu metode atau bentuk pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan, langkah-langkah dalam manajemen kebidanan merupakan alur pola fikir dan tindakan bidan dalam pengambilan keputusan klinis untuk mengatasi masalah.

##### **a. Data Subjektif**

Segala bentuk pernyataan atau keluhan dari pasien yang berhubungan dengan masalah yang di alami pasien.

##### **b. Data Objektif**

Data yang di peroleh melalui hasil observasi dari hasil pemeriksaan fisik pasien, laboratorium atau pemeriksaan diagnostic lain, catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain yang dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya.

c. Assesment

Kesimpulan dari langkah kedua, ketiga, dan keempat sehingga mencakup hal-hal berikut: diagnosis/masalah kebidanan, masalah potensial, serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera untuk antisipasi diagnosa/masalah potensial.

d. Planning

Pelaksanaan asuhan sesuai rencana tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan keadaan berdasarkan analisis dalam rangka mengatasi masalah pasien. Dimana pelaksanaan tindakan harus di setujui oleh pasien, kecuali bila tindakan tidak di laksanakan akan membahayakan keselamatan pasien.

### **BAB III**

### **STUDI KASUS**

#### **MANAJEM ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM PADA NY "K"**

#### **DENGAN PERDARAHAN AKIBAT REST PLASENTA**

#### **DI RUMAH SAKIT SYEKH YUSUF GOWA**

**TANGGAL 10 JULI 2018**

No.Register : 498XXX  
Tanggal Masuk RS : 09 Juli 2018, jam 22.30 Wita  
Tanggal Partus : 10 Juli 2018, jam 00.45 Wita  
Tanggal Pengkajian : 09 Juli 2018, jam 22.35 Wita  
Nama Pengkaji : Sulfika

#### **Langkah I. Identifikasi Data Dasar**

##### ***A. Identitas Istri/Suami***

Nama : Ny "K"/Tn"S"  
Umur : 34 tahun/37 tahun  
Nikah : 1x/±6 tahun  
Suku : Makassar/Makassar  
Agama : Islam/islam  
Pendidikan : S1/ S1  
Pekerjaan : IRT/ pendidik  
Alamat : Ballaparang

### B. Data Subjektif

1. Ibu merasa nyeri perut tembus belakang tanggal 09 Juli 2018, jam 14.30 Wita
2. Ibu melahirkan tanggal 10 Juli 2018, jam 01.20 Wita
3. Ibu merasa banyak darah keluar dari jalan lahir sekitar jam 08.30 setelah ibu dipindahkan ke ruang perawatan nifas.
4. Ibu merasa pusing dan lemah.
5. Ibu merasa nyeri perut bagian bawah.
6. Riwayat persalinan yang lalu

Anak ke	Tahun lahir	Jenis persalinan	penolong	Tempat bersalin	Umur kehamilan	Data bayi			ASI
						JK	BBL	PBL	
I	2015	normal	bidan	puskesmas	aterm	♂	3500 gram	47 cm	v
II	Kehamilan sekarang								

Gambar 3.1 riwayat persalinan (Sumber Data Murni)

7. Ibu merasa cemas dengan keadaannya
8. Ibu dan keluarga senang dengan kelahiran bayinya
9. Keluarga mengharapkan agar ibu cepat sehat dan pulang ke rumah
10. Ibu selalu berdoa kepada Allah swt, agar diberikan kesehatan bagi dirinya, bayinya dan seluruh keluarganya
11. Penghasilan suami cukup untuk biaya sehari-hari
12. Ibu melakukan pekerjaan rumah di bantu oleh suami

13. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit keturunan dan penyakit serius lainnya seperti jantung, hipertensi, DM, asma, dan lain-lain.
14. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit PMS
15. Ibu tidak memiliki riwayat alergi obat maupun makanan
16. Saat ini ibu tidak sedang menderita penyakit apapun
17. Riwayat reproduksi
  - a. Menarche : 14 tahun
  - b. Siklus haid : 28-30 hari
  - c. Lamanya haid : 5-7 hari
  - d. Disminorhea : tidak ada
18. Riwayat kehamilan sekarang
  - 1) GIPIA0
  - 2) HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) tanggal 7 November 2017
  - 3) HTP (Hari Tafsiran Persalinan) tanggal 14 Agustus 2018
  - 4) ANC sebanyak 3 kali di puskesmas
    - Trimester I : 2x
    - Trimester II : 1x
    - Trimester III : 2x
  - 5) Ibu mendapat suntik TT (Tetanus Toksoit) 2 kali
    - TT I : tanggal 12 Maret 2018
    - TT II: tanggal 12 April 2018
  - 6) Keluhan-keluhan:
    - Trimester I : mual muntah di pagi hari
    - Trimester II : tidak ada keluhan

Trimester III : sering kencing, nyeri perut bagian bawah, sakit pinggang, dan sakit punggung.

7) Usia kehamilan 39 minggu 3 hari

8) Menurut ibu kehamilannya  $\pm 9$  bulan

Ibu merasakan pergerakan bayi kuat dan dominan dirasakan pada bagian perut sebelah kiri.

9) Riwayat persalinan sekarang

a. Kala I

a) Ibu merasakan sakit perut tembus belakang tanggal 09 Juli 2018 jam 14.30 Wita

b) Masuk rumah sakit tanggal 09 Juli 2018, jam 22.30 Witadisertai pelepasan lendir dan darah

c) Hasil VT I jam 22.30 wita

Vulva dan vagina : tidak ada kelainan

Portio : tebal

Pembukaan : 8 cm

Ketuban : utuh

Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang

Penurunan : hodge III, 2/5

Molase : tidak ada

Penumbungan : 0

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir dan darah

d) Hasil pemeriksaan dalam(VT II)jam 00. 30 Wita

Vulva dan vagina : tidak ada kelainan

Portio : melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : jernih

Presentasi : UUK kanan depan

Penurunan : hodge IV, 0/5

Molase : 0

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir dan darah dan air ketuban

e) Lamanya kala I  $\pm$ 8 jam

f) Ketuban masih utuh

b. Kala II

a) Melahirkan tanggal 10 juli 2018, jam 00.45 Wita

b) Jenis persalinan normal, presentase belakang kepala, spontan, dan sesuai masa kehamilan. BBL(Berat Badan Lahir): 3200 gram, PBL(Panjang Badan Lahir): 48 cm, jenis kelamin perempuan, Apgar Skor: 8/9 (oleh dokter obgyn).

c) lamanya kala II  $\pm$ 15 menit

d) Selaput ketuban dan plasenta belum lahir

c. Kala III

- a) Kala III berlanjut  $\pm 1$  jam
- b) Terdapat penyulit yaitu terjadi retensio plasenta
- c) Penanganan:
  - Jam 00.46 Wita, diberikan oksitosin ke-1 = 10 IU(IM)
  - Jam 00.50 Wita, drips RL + 20 IU
  - Jam 01. 05 wita, dilakukan manual plasenta
  - Jam 01. 00 wita, drips RL+ oksitosin 20 IU
- d) Plasenta lahir dengan kesan tidak lengkap jam 01.35wita, karena ketika dilakukan pemeriksaan pada kotiledon di dapatkan jumlah kotiledon 15 yang berarti kurang dari jumlah normal(normal 15-20)
- e) Terdapat pengeluaran darah yang menggumpal ketika di lakukan eksplorasi
- f) Perdarahan  $\pm 500$  CC
- g) TFU setinggi pusat, kontraksi uterus kurang baik, teraba lembek.
- h) Terjadi ruptur tingkat II pada perineum dan telah di lakukan penjahitan dengan teknik jelujur oleh bidan menggunakan benang cutgut.

## d. Kala IV

a) Adapun proses kala IV ibu berlangsung dengan normal yaitu:

Jam	Waktu	Tekanan Darah (mmHg)	Nadi (x/i)	Suhu (°c)	TFU	Kontraksi uterus	Kandung kemih	perdarahan
I	02.05	110/60	86	37,5 Axiler	STP	Lemah	Kosong	±200 CC
	02.20	110/60	86		STP	Lemah	Kosong	±120 CC
	02.35	110/60	86		STP	Lemah	Kosong (ibu berkemih dengan kateter nelaton/ sementara)	±80 CC
	02.50	110/60	86	36,8	STP	Lemah	Kosong	±50 CC
II	03..20	110/70	84		STP	Lemah	Kosong	±30 CC
	03.50	110/70	84		STP	Lemah	Kosong	±20 CC

Gambar 3.2 Pemantauan Kala IV (Sumber Data Murni).

b) Ibu dipindahkan ke ruang nifas jam 02.00 wita.

### 17. Riwayat KB(Keluarga Berencana)

Ibu pernah menjadi aseptor KB suntik *Depo-medroxyprogesterone acetate* (DMPA) ±1 tahun dan KB implan±2 tahun.

### C. Data Objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi wajah nampak lesu
4. TFU 1 jari diatas pusat, kontraksi uterus kurang baik teraba lembek dan lunak

5. Terdapat pengeluaran darah  $\pm 500$  CC

6. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah: 110/70 mmg

Pernafasan: 20x/i

Nadi : 84 x/i

Suhu : 36,5°C

7. Pemeriksaan fisik

a. Mata

Inspeksi: konjungtiva pucat, tidak oedema, sklera putih/tidak ikterus

b. Wajah

Inspeksi: ekspresi wajah cemas, pucat, tidak ada cloasma gravidarum

Palpasi: tidak ada oedema

c. Leher

Inspeksi: tidak ada oedema

Palpasi: tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis, serta tidak ada benjolan dan nyeri tekan

d. Payudara

Inspeksi: puting susu menonjol, terdapat hyperpigmentasi areola mammae

Palpasi: tidak ada benjolan, massa dan nyeri tekan, dan terdapat pengeluaran ASI pada saat puting susu di pencet.

e. Abdomen

Inspeksi: tidak ada luka bekas operasi, tampak *striae alba*

Palpasi: tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus kurang baik, uterus lembek tidak teraba keras dan bundar, TFU setinggi pusat, kandung kemih kosong

f. Genitalia

Inspeksi: tidak ada varices, tampak pengeluaran darah segar dan abnormal, tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat II (jumlah jahitan 6) dan masih basah

Palpasi: tidak ada oedema, terdapat nyeri tekan pada perineum, *refleks patella* kiri dan kanan positif

g. Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi: tidak ada varices, ekstremitas atas terpasang infuse RL+ *Oxytocin* 20 IU pada tangan kiri

Palpasi: tidak ada oedema, terdapat nyeri tekan pada tangan kiri

h. Anus

Inspeksi: tidak ada hemoroid, serta varices

i. Pemeriksaan penunjang

- Pemeriksaan laboratorium tanggal 10 juli 2018: Hb: 8,5 gr%

j. Pemeriksaan USG

Oleh dokter obgyn R.A (11 Juli 2018, jam 09.00 Wita)

Hasil: terdapat sisa jaringan plasenta dalam uterus

## Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Diagnosa: post partum hari I dengan masalah *rest plasenta*

Masalah aktual: anemia ringan

### A. *Post partum hari I*

#### Data Subjektif

1. Melahirkan tanggal 10 juli 2018, jam 00.45 Wita
2. Nyeri perut bagian bawah

#### Data Objektif

1. Keadaan umum ibu lemah
2. TFU setinggi pusat
3. Kontraksi uterus kurang baik, teraba lembek
4. Terdapat luka jahitan perineum dan masih tampak basah
5. Pengeluaran lochea rubra

Analisa dan interpretasi data

- a. Post partum hari pertama yaitu mulai lahirnya bayi tanggal 10 juli 2018, jam 00.45 wita sampai tanggal pengkajian tanggal 10 juli 2018, jam 00.30 Wita. Setelah janin di lahirkan fundus uteri setinggi pusat.
- b. Lochea merupakan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina dalam masa nifas. Lochea yang keluar pada hari pertama sampai hari ketiga yaitu lochea rubra yang terdiri atas darah segar bercampur sisa-sisa plasenta dan

selaput ketuban, dinding rahim, lemak bayi, lanugo dan sisa mekonium  
(Lockhart, 2014)

### **B. Rest plasenta**

#### **Data Subjektif**

1. Ibu melahirkan tanggal 10 Juli 2018, jam 00.45 Wita
2. Ibu merasakan banyak darah keluar dari jalan lahir sekitar jam 08.30 wita
3. Ibu merasa pusing dan lelah
4. Ibu merasakan nyeri perut bagian bawah

#### **Data Objektif**

1. Tampak pengeluaran darah dari jalan lahir  $\pm 500$  CC
2. Plasenta lahir dengan kesan tidak lengkap
3. Kontaksi uterus teraba lunak dan tidak teraba bundar
4. Tinggi fundus uteri meningkat dari setinggi pusat menjadi satu jari atas pusat
5. Tanda-tanda Vital
  - a. TD : 110/70 mmHg S : 36,5°C  
N : 84 x/i P : 24 x/i
6. Plasenta lahir dengan kesan tidak lengkap tanggal 10 Juli 2018, jam 01.35 Wita

## Analisa dan interpretasi data

*Rest plasenta* merupakan suatu keadaan, di mana suatu bagian dari plasenta (satu atau lebih lobus) yang tertinggal dalam rahim sehingga uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif sehingga dapat menimbulkan perdarahan. Berikut penjelasan lanjut mengenai penegakan diagnosa *rest plasenta*:

- a. Gejala dan tanda yang selalu ada pada kasus *rest plasenta*:
  1. Plasenta atau sebagian selaput (mengandung pembuluh darah) tidak lengkap
  2. Terjadi perdarahan segera setelah plasenta lahir
- b. Gejala dan tanda yang kadang-kadang ada
  1. Uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus uteri tidak berkurang. Diagnosis biasanya tidak sulit, terutama apabila timbul perdarahan banyak dalam waktu pendek. Namun jika perdarahan sedikit tapi dalam jangka waktu lama, tanpa di sadari pasien telah kehilangan banyak darah sebelum pasien tampak pucat, nadi serta pernafasan menjadi lebih cepat, dan tekanan darah menurun.
  2. Gejala-gejala baru tampak pada kehilangan darah 20%. Jika perdarahan berlanjut terus maka dapat menimbulkan anemia berat dan syok. Diagnosis perdarahan pasca persalinan di permudah apabila pada tiap-tiap persalinan setelah anak lahir secara rutin di ukur pengeluaran darah dalam kala III dan satu jam sesudahnya. Apabila terjadi perdarahan pasca persalinan dan plasenta belum lahir, agar di usahakan

melahirkan plasenta segera. Bila plasenta telah lahir, maka perlu dibedakan antara perdarahan akibat atonia uteri atau perdarahan karena perlukaan jalan lahir(Karlina, 2016).

Masalah aktual: anemia ringan

### Data Subjektif

1. Ibu merasa pusing dan lemas

### Data Objektif

- Keadaan umum ibu lemah
- Wajah dan konjungtiva pucat
- Tanda-tanda vital:

TD	: 110/70 mmHg	P	: 24 x/i
N	: 84 x/i	S	: 36,5°C

### Analisa dan interpretasi data

Pada wanita, anemia didefinisikan sebagai kadar hemoglobin kurang dari 12gr%. Karena jumlah sel darah merah yang rendah menyebabkan berkurangnya pengiriman oksigen ke setiap jaringan dalam tubuh, sehingga menyebabkan berbagai gejala dan tanda (proverawati, 2013). Seperti pada anemia ringan pasien akan merasa cepat lelah, pucat, penurunan energi, pusing, sakit kepala, sesak nafas(TantoChris, 2014).

### Langkah. III Identifikasi Dioagnosa/Masalah Potensial

Potensial terjadinya syok hypofolemik, infeksi perineum, dan anoksa jaringan.

#### A. Syok Hipofolemik

##### Data Subjektif

- 1) Ibu mengeluh mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir (  $\pm 500 \text{ cc}$  )
- 2) Ibu mengeluh lemah dan pusing

##### Data Objektif

- 1) Keadaan umum ibu lemah
- 2) Wajah dan konjungtiva terlihat pucat
- 3) Nampak keluar darah yang banayak dari jalan lahir
- 4) Tanda-tanda vital:

TD : 110/70 mmHg S : 36,5°C

N : 84 x/i P : 24 x/i

Analisa dan interpretasi data:

Darah mengandung sel eritrosit yang terdiri dari hemoglobin untuk mengikat O<sub>2</sub>. Dengan adanya darah yang terus menerus mengalir keluar mengakibatkan suplai O<sub>2</sub> ke otak berkurang yang menyebabkan ibu pusing dan lemah serta akibatnya apabila hal tersebut tidak di tangani dengan segera maka perdarahan akan semakin banyak dan dapat menyebabkan pasien mengalami syok hypovolemik(Rukiyah, 2012).

## ***B. Infeksi Puerperium***

### **Data Objektif**

- 1) Ibu mengatakan terdapat luka jahitan
- 2) Ibu mengeluh nyeri pada perineum

### **Data Subjektif**

- 1) Terdapat luka jahitan yang masih basah

Analisa dan interpretasi data:

Infeksinifas yaitu semua peradangan yang di sebabkan oleh kuman yang masuk kedalam organ genitalia pada saat persalinan dan masa nifas. Di mana infeksi nifas ini merupakan infeksi bakteri pada traktus genitalia yang terjadi setelah melahirkan, yang di tandai dengan kenaikan suhu sampai 38°C atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan, dengan mengecualikan 24 jam pertama. Berdasarkan masuknya kuman penyebab infeksi kedalam organ kandungan yaitu ektogen(kuman datang dari luar), autogen(kuman dari tempat lain), endogen(kuman dari jalan lahir sendiri).

## **C. Anoksia jaringan**

### **Data Subjektif**

- 1) Ibu mengeluh pusing dan lemah

### Data objektif

- 1) Kedan umum ibu lemah
- 2) wajah dan konjungtiva terlihat pucat
- 3) tanda-tanda vital

TD	: 110/60 mmHg	S	: 36,8°C
N	: 84 x/i	P	: 24 x/i

### Analisa dan interpretasi

Anoksia jaringan merupakan gangguan yang terjadi di dalam jaringan sendiri atau tubuh tidak dapat menggunakan oksigen secara efektif.

### Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi Jam 01.40 Wita

- 1) Massase pada fundus uteri jam 00.45 Wita

Rasional: dengan melakukan massase maka akan merangsang agar uterus berkontraksi

- 2) Eksplorasi kavum uteri

Rasional: eksplorasi kavum uteri merupakan tindakan untuk membersihkan sisa-sisa plasenta yang tertinggal atau sisa jaringan plasenta yang melekat sehingga mengurangi perdarahan

- 3) Pemasangan infus RL + oxytocin 20 IU, 40 tetes/menit

Rasional: cairan yang di berikan melalui intravena dapat membantu mengganti cairan dalam tubuh yang keluar terlalu banyak. Uterotonika

akan merangsang reseptor yang terletak dalam miometrium untuk berkontraksi sehingga mengurangi perdarahan.

4) Lakukan USG (ultrasonografi)

Rasional: dengan melakukan USG sehingga dapat mengetahui sisa jaringan yang tertinggal di kavum uteri

5) Kolaborasi dengan dokter untuk melakukan kuretase

Rasional: kuretase dilakukan untuk membersihkan sisa jaringan yang terdapat pada *cavum uteri* yang lebih bersih dan hanya boleh dilakukan oleh dokter.

**Langkah V. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan**

Diagnosa : Post Partum Hari Pertama

*Rest plasenta*

Masalah aktual : anemia ringan

Masalah Potensial: potensial terjadi syok hipovolemik, infeksi *poerperium*, anoksia jaringan.

Tujuan : *postpartum* hari pertama berlangsung dengan normal

Perdarahan *post partum* akibat *rest plasenta* dapat teratasi

Tidak terjadi anemia berat

Tidak terjadi syok hipovolemik

Tidak terjadi infeksi *poerperium*

## 1. Kriteria

- a. Sisa plasenta dapat dikeluarkan dari vacuum uteri
- b. Perdarahan sedikit/berkurang
- c. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
- d. Tanda-tanda vital dalam batas normal:

Tekanan Darah : 110/70 mmHg (normal: systole 90-130 mmHg dan

Diastole 60-90 mmHg)

Nadi : 84 x/i (normal: 80-100x/i)

Suhu : 36,5°C (normal: 36,5-37,5°C)

Pernapasan : 24x/i (normal: 16-24x/i)

- e. TFU turun 1 cm setiap hari
- f. Luka jahitan tidak tampak merah dan tidak ada Pus
- g. Tidak terjadi anemia
- h. Tidak terjadi syok hipovolemik
- i. Pengeluaran lochea normal
- j. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka jahitan seperti:
  1. Merah
  2. Bengkak
  3. Bermanah
  4. Panas

Intervensi/rencana tindakan tanggal 10 Juli 2018, jam 02.00 wita

1. Jelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan

Rasional: Dengan memberikan penjelasan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, maka pasien akan lebih mengerti dan mau diajak kerja sama untuk melakukan tindakan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar

2. Observasi keadaan umum dan tanda-tanda vital setiap 4 jam

Rasional: mengobservasi tanda-tanda vital untuk memantau keadaan ibu dan mempermudah melakukan tindakan

3. Observasi tetesan infus setiap 2 jam

Rasional: untuk mempertahankan dan mengetahui jumlah tetesan cairan infus

4. Observasi jumlah perdarahan dan kontraksi uterus setiap 30 menit

Rasional: untuk mengetahui jumlah perdarahan, membuat diagnosa banding serta menentukan jumlah penggantian

5. Eksplorasi cavum uteri

Rasional: eksplorasi cavum uteri merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa plasenta atau sisa jaringan plasenta yang tertinggal

6. Mengajarkan pada ibu cara melakukan masase fundus uteri

Rasional: untuk membantu memperbaiki kontraksi uterus

7. Memberikan penjelasan tentang keadaan yang dialaminya

Rasional: agar ibu mengerti dan dapat menerima keadaannya

8. Memberikan dukungan emosional dan spiritual

Rasional: dengan memberikan dukungan emosional dan spiritual, sehingga ibu dapat lebih optimis dalam menghadapi keadaannya yang sekarang

9. Memberi intake yang adekuat

Rasional:memberikanagar dapat mengembalikan kehilangan cairan tubuh akibat perdarahan dan memulihkan tenaga ibu

10. Kolaborasi dengan dokter untuk melakukan USG

Rasional: melakukan USG agar dapat mengetahui sisa jaringan yang tertinggal di dalam cavum uteri

11. Kolaborasi dengan dokter obgyn untuk melakukan kuretasi

Rasional: kuretasi dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa jaringan dalam cavum uteri yang menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum

12. *Informed consent* untuk pelaksanaan tindakan kuretase

Rasional: sebagai pernyataan persetujuan dari ibu atau keluarga untuk tindakan dan sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan bidang dalam melakukan tindakan

13. Jelaskan pada klien/keluarga tentang pentingnya dilakukan kuretase, jika klien atau keluarga setuju maka akan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 11 Juli 2018 jam, 09.30 wita

14. Persiapan pelaksanaan tindakan kuretase

Rasional: persiapan yang dilakukan yaitu dengan persiapan alat, penolong dan persiapan pasien akan memudahkan dalam melakukan prosedur kerja sesuai dengan protap

15. Lakukan pemasangan kateter tetap

Rasional: pemasangan kateter tetap dilakukan untuk mengosongkan kandung kemih serta untuk mengetahui jumlah urine yang keluar apakah sesuai dengan cairan yang masuk

16. Membantu klien mengatur posisi yang nyaman sesuai kebutuhan klien

Rasional: mengatur posisi yang diinginkan dan memberikan rasa nyaman dan aman pada ibu

17. Memberi kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya

Rasional: dengan mengungkapkan perasaan dan mendengar keluhan klien maka klien akan merasa diperhatikan sehingga ia akan lebih tenang

18. Memberikan penyuluhan tentang *Health Education* (HE) kepada ibu yaitu:

- a. Nutrisi: mengkomsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti ikan, telur dan daging, vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran serta kalsium seperti susu.
- b. Personal hygiene: menjaga personal hygiene dengan mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian setiap habis mandi (basah/kotor), mengganti pakaian dalam saat lembab (basah/kotor) serta mengganti pembalut setiap kali terasa penuh.
- c. Istirahat: ibu sebaiknya istirahat yang cukup yaitu tidur siang 2-3 jam dan malam 6-8 jam

19. Memberikan obat antibiotik, analgetik, dan vitamin sesuai dengan instruksi dari dokter.

Rasional: pengobatan dilakukan untuk mengurangi rasa sakit yang di alami ibu dan proses penyembuhan.

20. Melibatkan orang terdekat klien selama perawatan

Rasional: agar klienakan merasa nyaman dan aman bila didampingi oleh orang terdekatnya khususnya suami

21. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsimakan seperti kacang-kacangan, telur, susu, daging, ikan.

Rasional: karena kacang-kacangan, telur, susu, daging, ikan, udang mengandung protein, di mana protein itu berfungsi sebagai pengganti sel-sel tubuh yang rusak, mengangkut zat gizi.

22. Menganjurkan untuk memperbanyak istighfar

Rasional: dalam sebuah hadis mengatakan “barang siapa yang memperbanyak istighfar jika dia dalam kesusahan maka Allah akan memberikan jalan baginya”

### **Langkah VI. Melaksanakan Tindakan Asuhan Kebidanan**

Tanggal 10 Juli 2018, jam 02.30 wita

1. Jelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan

Hasil: ibu mengerti dan bersedia ditindaki

2. Mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital setiap 4 jam

Hasil: TD : 110/70 mmHg S : 36,5°C

N : 84x/i

P : 24x/i

3. Mengobservasi tetesan infus setiap 2 jam

Hasil: tetesan infuse 28 tetes/menit

4. Mengobservasi jumlah perdarahan dan kontraksi uterus setiap 30 menit

Hasil: kontraksi uterus tidak baik, uterus tidak teraba keras dan bundar

5. Mengeksplorasi cavum uteri

Hasil: eksplorasi telah dilakukan tetapi sisa plasenta belum keluar

6. Mengajarkan pada ibu cara untuk melakukan masase fundus uteri

Hasil: ibu telah mengetahui cara mengasase fundus uteri dengan menggunakan 4 jari palmar

7. Memberikan penjelasan tentang keadaan yang dialaminya

Hasil: ibu telah mengetahui kondisinya kurang baik

8. Memberikan dukungan emosional dan spiritual

Hasil: ibu lebih optimis menghadapi keadaannya

9. Memberikan intake yang adekuat

Hasil: ibu telah diberikan minum

10. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk USG

Hasil: Nampak potongan plasenta dalam endometrium (hasil USG)

11. Melakukan kolaborasi dengan dokter obgyn untuk melakukan kuretase

Hasil: kuretase akan dilakukan tanggal 11 Juli 2018, jam 09.30 wita

12. Melakukan *informend concent* pada ibu dan keluarga untuk dilakukan

tindakan kuretase pada tanggal 11 Juli 2018, jam 09.00 wita

Hasil: suami setuju dan telah menandatangani surat persetujuan tindakan kuret, rencana kuret tanggal 11 Juli 2018, jam 09.30 wita

13. Menjelaskan pada klien mengenai pentingnya dilakukan kuretase yaitu agar ibu tidak mengalami perdarahan terus menerus yang dapat menimbulkan hal yang tidak di inginkan

Hasil: ibu dan keluarga telah mengetahui pentingnya tindakan kuretase

14. Melakukan persiapan pelaksanaan tindakan kuretase yakni berupa persiapan alat, penolong, serta persiapan pasien

- a. Persiapan alat kuret

- 1) Handscoon 2 pasang
- 2) Kain kassa secukupnya
- 3) Duk steril 1 buah
- 4) Larutan betadine
- 5) Spekulum anterior dan posterior
- 6) Tampongan
- 7) Sonde uterus
- 8) Tenakulum
- 9) Kuret tumpul dan kuret tajam
- 10) Abortus tang
- 11) Kapas DTT
- 12) Kateter 1 buah
- 13) Menyiapkan obat-obatan sesuai dengan intruksi dokter

b. Persiapan penolong

- 1) Celemek
- 2) Masker
- 3) Tutup kepala
- 4) Kacamata
- 5) Sepatu boot

c. Persiapan alat-alat lain

- 1) Tempat darah
- 2) Lampu sorot
- 3) Tabung oksigen
- 4) Larutan clorin
- 5) Tempat sampah

d. Persiapan pasien

Hasil: persiapan kuret telah lengkap

15. Melakukan pemasangan kateter tetap pada ibu

Hasil: kateter telah di pasang

16. Membantu mengambil posisi yang nyaman dan aman pada klien

Hasil: ibu merasa nyaman pada posisinya yang sekarang yaitu baring dengan posisi miring kiri

17. Memberi kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya.

Hasil: setelah mengungkapkan perasaannya ibu merasa lebih tenang

18. Memberikan penyuluhan tentang Health Education (HE) kepada ibu yaitu:

- a. Nutrisi: mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti ikan, telur dan daging, vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran serta kalsium seperti susu.
- b. Personal hygiene: menjaga personal hygiene dengan mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian setiap habis mandi(basah/kotor), mengganti pakaian dalam saat lembab(basah/kotor) serta mengganti pembalut setiap kali terasa penuh.
- c. Istirahat: ibu sebaiknya istirahat yang cukup yaitu tidur siang 2-3 jam dan malam 6-8 jam

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan dan bersedia melakukannya

#### 19. Memberikan obat sesuai dengan intruksi dokter

Hasil: a. Antibiotik(cefadroxil 2x1): mengatasi infeksi akibat bakteri yang terjadi pada berbagai bagian tubuh seperti; sistem pernafasan, THT, ginjal, sistem saluran kemih, tulang dan sendi, kulit dan jaringan, ginekologi atau sistem reproduksi wanita.

b. Metilergometri 3x1(200 mcg): berfungsi meningkatkan kontraksi rahim

c. Analgetik(Asam Mefenamat 250 mg setiap 6 jam): untuk mengurangi rasa sakit

d. Vitamin (Sulfas Ferosus (300-325 mg) 1x1): berfungsi untuk mencegah kadar zat besi rendah dalam darah.

e. injeksi cefoferazone 1 gr: berfungsi untuk menanganai infeksi yang di sebabkan oleh bakteri

20. Melibatkan orang terdekat klien selama perawatan

Hasil: ibu di damping oleh suami dan keluarga

21. Menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi buah kurma

Hasil: ibu bersedia melakukan anjuran yang di berikan

22. Menganjurkan ibu untuk memperbanyak istighfar

Hasil: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

### **Langkah VII. Evaluasi Tindakan Asuhan Kebidanan**

Tanggal 10 Juli 2018, jam 03.00Wita

1. Ibu di pindahkan keruang nifas pada jam 10.35Wita setelah dilakukan kuretase dari jam 09.30sampai 10.30 wita
2. Keadaan umum ibu lemah
3. Kesadaran komposmentis
4. Tidak terjadi syok hipovolemik dengan ditandai tanda-tanda vital:

TD : 110/70 mmHg S : 36,5°C

N : 84 x/i P : 24 x/i

5. Perdarahan aktif sudah teratasi atau sudah tidak ada ditandai dengan TFU 2 jari bawah pusat, serta kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
6. Kecemasan teratasi di tandai dengan ibu dapat beradaptasi dengan keadaannya
7. Sisa plasenta yang tertinggal dalam uterus dapat di keluarkan seluruhnya dan uterus kosong
8. Perdarahan  $\pm 100$  C
9. Terjadi anemia ringan di tandai dengan Hb 8,5gr%.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM HARI  
I PADA NY“K”DENGAN PERDARAHAN AKIBAT REST PLASENTA  
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA  
TANGGAL10 JULI 2018**

No. Register : 498XXX

Tanggal Masuk RS : 10 Juli 2018, jam 22.30 Wita

Tanggal Partus : 10 Juli 2018, jam00.45 Wita

Tanggal Pengkajian : 10 Juli 2018, jam 22.35 Wita

Nama Pengkaji : Sulfika

***A. Identitas Istri/Suami***

Nama : Ny “K”/ Tn “S”

Umur : 34 tahun/ 37 tahun

Nikah : 1X/ ±6 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : S1/S1

Pekerjaan : IRT/ pendidik

Alamat : Ballaparang

**B. Data Subjektif (S)**

1. Ibu melahirkan tanggal 10 Juli 2018, jam 00.45 wita
2. Ibu merasa pusing dan lemah
3. Ibu merasakan banyak darah keluar dari jalan lahir
4. Ibu merasa nyeri pada perineum

**C. Data Objektif (O)**

1. Tanggal pengkajian 10 Juli 2018, jam 00.45 wita
2. Kontraksi uterus tidak keras dan bundar
3. Tampak pengeluaran darah banyak dari jalan lahir  $\pm 500\text{CC}$
4. Tanda – tanda vital

TD : 110/70 mmHg                      S                      : 36,5°C

N : 84x/i    p                      : 24x/i

**D. Assesment (A)**

Diagnosa : perdarahan post partum hari pertama Rest plasenta

Masalah aktual: anemia ringan

Masalah Potensial: terjadinya syok hipovolemik, infeksi perineum, anoksia jaringan.

### ***E. Planning (P)***

Tanggal 10 Juli 2018, jam 22.35wita

1. Menjelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan

Hasil: ibu mengerti dan mau diajak kerja sama untuk tindakan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar.

2. Mengobservasi tetesan infus

Hasil: tetesan infus 28 tetes /menit

3. Mengobservasi jumlah perdarahan dan kontraksi uterus

Hasil: jumlah perdarahan  $\pm 500\text{cc}$  serta kontraksi uterus lemah dan tidak teraba bundar

4. Mengajarkan pada ibu cara melakukan masase fundus uteri

Hasil: ibu mengerti cara melakukan massase uterus dan mau melakukannya

5. Memberikan penjelasan pada ibu tentang keadaan yang dialaminya

Hasil: ibu mengerti dan mau menerima keadaannya

6. Memberi intake yang adekuat

Hasil: tenaga ibu sudah mulai pulih kembali

7. Memberikan obat sesuai dengan intruksi dokter yaitu cefadroxil 2x1

Hasil: ibu bersedia minum obat yang diberikan

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM HARI  
KEIIPADA NY "K" DENGAN POST KURETASE REST PLASENTADI  
RSUD SYEKH YUSUF GOWA HARI KEDUA  
TANGGAL 11JULI 2018**

No. Register : 498XXX  
Tanggal Masuk RS : 11 Juli 2018, jam 22.13 Wita  
Tanggal Partus : 11 Juli 2018, jam 00.45 Wita  
Tanggal Pengkajian : 11 Juli 2018, jam 08.00 Wita  
Nama Pengkaji : Sulfika

***A. Identitas Istri/Suami***

Nama : Ny "K"/Tn"S"  
Umur : 34 tahun/ 37 tahun  
Nikah : 1X/ ±6 *tu hu*  
Suku : Makassar/Makassar  
Agama : Islam/islam  
Pendidikan : S1/S1  
Pekerjaan : IRT/ pendidik  
Alamat : Ballaparang

**B. Data Subjektif (S)**

1. Ibu melahirkan tanggal 10 Juli 2018, jam 00.45 wita
2. Ibu telah dilakukan kuretase pada tanggal 11 Juli 2018, jam 09.30 - 10.30 wita
3. Ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah
4. Pengeluaran darah sudah tidak banyak  $\pm 100\text{cc}$
5. Ibu sudah tidak merasa pusing
6. Ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya
7. Asi sudah keluar tapi belum lancar
8. Ibu telah menyusui bayinya
9. Ibu telah BAB jam 05.30 wita sebanyak 1 kali berwarna kuning dan padat
10. Ibu telah BAK sebanyak 2 kali berwarna kekuningan dan tidak merasa nyeri saat BAK

**C. Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran kompos mentis
3. Ibu sudah tidak merasa pusing
4. Tampak pengeluaran lochea rubra

5. TFU 2 jari dibawah pusat
6. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
7. Ibu sudah tidak mengeluh nyeri pada perineumnya
8. Konjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus
9. Tanda- tanda vital

TD : 110/80 mmHg S : 36,8°C

N : 82 x/i P : 22 x/i

10. Tidak ada tanda-tanda infeksi
11. Tampak luka premium masih basah

#### **D. Assesment (A)**

Post partum hari ke II, post kuretase hari pertama

#### **E. Planning**

Tanggal 11 Juli 2018, jam 08.30 wita

1. Menjelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan

Hasil: ibu mengerti dan mau di ajak kerja sama

2. Mengobservasi tetesan infus

Hasil: tetesan infus RL 40 tetes/menit + transfusi darah lengkap/*whole blood*

(450 ml dengan kecepatan 25 tetes/menit dalam waktu 2 jam/1 unit).

3. Mengobservasi jumlah perdarahan

Hasil: jumlah perdarahan kurang dari 100 CC

4. Mengajarkan pada ibu dan keluarga cara melakukan massase fundus uteri dengan menggunakan palmar 4 jari, sehingga dapat merangsang terjadinya kontraksi uterus pada proses involusio uteri untuk mengembalikan uterus kebentuk semula sebelum hamil.

Hasil: Ibu mengerti cara melakukan massase uterus dan mau melakukannya

5. Memberikan dukungan emosional dan spiritual pada ibu, bahwa keadaan yang di alami ibu dapat segera teratasi dengan perawatan dan pengobatan serta memberikan dukungan agar ibu lebih tabah menghadapi cobaan dari Allah swt.

Hasil: Ibu terlihat lebih tenang dan menerima keadaannya

6. Memberikan dukungan pada ibu untuk memulai memberi bayinya ASI eksklusif

Hasil: Ibu bersedia memberi ASI eksklusif pada bayinya

7. Mengajarkan pada ibu cara melakukan perawatan payudara

Hasil: Ibu telah mengetahui cara melakukan perawatan payudara dan bersedia melakukannya

8. Mengajarkan pada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil: Ibu telah mengetahui cara menyusui yang benar dan bersedia melakukannya

9. Mengajarkan pada ibu cara perawatan perineum yaitu:

a. memberitahu ibu agar tidak mencuci vagina dengan menggunakan air hangat karena dapat menyebabkan benang jahit terlepas

b. memberitahu ibu agar senantiasa menjaga kebersihan perineumnya dengan cara mengganti pakaian dalam sertamengganti pembalut ketika pembalut terasa penuh

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan dan bersedia melakukannya

10. Menganjurkan ibu agar menyusui bayinya secara *on demand* yaitu setiap 2 jam atau sesuai dengan keinginan bayi

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

11. Menganjurkan ibu mengkomsumsi makanan yang halal, sehat, dan bergizi seimbang

Hasil: Ibu bersedia melakukan anjuran yang di berikan

12. Memberikan ibu cairan infus

Hasil: Telah terpasang cairan infus pada tangan kiri ibu

13. Mengobservasi TFU dan kontraksi uterus

Hasil: TFU 1 jari di bawah pusat, serta kontraksi uterus baik uterus teraba keras dan bundar

14. Memberikan obat sesuai intruksi dokter

- Antibiotik(cefadroxil 2x1)
- Metilergonometri 3x1
- Analgetik(Asam Mefenamat 3x1)
- Sulfat Ferosus 1x1

15. Mengajukan ibu untuk ber-KB dan menjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi seperti: AKDR/IUD, pil, implant(AKBK), suntikan, kondom, kontrasepsi mantap, dan senggama terputus.

Hasil: Ibu berencana menggunakan alat kontrasepsi implant

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM HARI  
IIIPADA NY”K” DENGAN POST KURETASE RESTPLASENTADI RSUD  
SYEKH YUSUF GOWA HARI KE TIGA  
TANGGAL 12 JULI 2018**

No. Register : 498XXX  
Tanggal Masuk RS : 12 Juli 2018, jam 22.30 Wita  
Tanggal Partus :12 Juli 2018, jam00.45 Wita  
Tanggal Pengkajian : 12 Juli 2018, jam 09.30 Wita  
Nama Pengkaji : Sulfika

***A. Identitas Istri/Suami***

Nama :Ny “K”/Tn “S”  
Umur : 34 tahun/ 37 tahun  
Nikah : 1X/ ±6 t<sub>u</sub> h<sub>u</sub>  
Suku : Makassar/Makassar  
Agama : Islam/Islam  
Pendidikan : S1/S1  
Pekerjaan :IRT/ pendidik  
Alamat : Ballaparang

**B. Data Subjektif (S)**

1. Ibu melahirkan tanggal 10 Juli 2018, jam 00.45wita
2. Pengeluaran darah berupa berupa bercak
3. Ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya
4. Ibu sudah tidak merasa pusing
5. Ibu sudah merasa lebih sehat
6. Bayi ibu sudah mulai menyusui dan menghisap dengan kuat
7. ASI ibu sudah mulai lancar
8. Ibu telah BAB sebanyak satu kali berwarna kuning padat
9. Ibu telah BAK sebanyak 2 kali berwarna kuning dan ibu tidak merasa nyeri saat BAK.

**C. Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Ekspresi wajah tampak ceria
4. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
5. Tampak pengeluaran *lochea* rubra dan sudah tidak terjadi perdarahan
6. TFU 3 jari di bawah pusat

7. Tampak luka perineum yang masih basah

8. Tidak terdapat infeksi pada luka jahitan

9. Tanda-tanda vital

TD : 110/70 mmHg S : 36,5°C

N : 82 x/i P : 22 x/i

10. Hb post transfusi 9,5 gr%

#### ***D. Assesment (A)***

Post partum hari ke III, post kuretase hari ke II karena *rest plasenta*

#### ***E. Planning***

Tanggal 12 Juli 2018, jam 09.35 wita

1. Menjelaskan pada ibu tentang tindakan yang akan dilakukan

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan

2. Melepaskan infus

Hsasil: infus telah di lepas

3. Memberikan dukungan pada ibu untuk memulai ASI eksklusif

Hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Memberitahu ibu bahwa tentang keadaannya yang sudah baik

Hasil: ibu merasa lega dan senang

5. Mengobservasi kontraksi uterus

Hasil: Kontraksi uterus baik, uterus teraba keras dan bundar

6. Menganjurkan ibu agar menyusui bayinya secara *on demand* yaitu setiap 2 jam atau sesuai keinginan bayi

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

7. Mengajarkan pada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil: Ibu telah mengetahui cara menyusui yang baik dan benar

8. Memberikan *Health Education* pada ibu yaitu:

a. *Self care* (perawatan diri)

b. Pola nutrisi

c. Istirahat yang cukup

d. Asuhan bayi baru lahir

e. Senam nifas dan mobilisasi dini

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan

9. Menjelaskan pada ibu tentang jenis-jenis KB

a. KB pil

b. KB suntik terbagi 2 yaitu suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan

c. Kondom

d. KB implant

e. AKDR/IUD

Hasil: Ibu telah mengetahui semua jenis alat kontrasepsi

10. Mengajukan ibu menggunakan alat kontrasepsi

Hasil: Ibu telah menggunakan KB implant

11. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan semua asuhan dan hasil temuan telah di catat.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang kesenjangan yang terjadi antara konsep dasar, tinjauan pustaka serta tinjauan khusus dalam pelaksanaan proses Manajemen Asuhan Kebidanan dengan kasus "Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care dengan Perdarahan *Post Partum* Akibat *Rest Plasenta*" di RSUD Syekh Yusuf Gowa yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 10 Juli 2018 sampai 12 Juli 2018.

Dalam hal ini, untuk memudahkan pembahasan maka penulis akan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dapat diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah Varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

#### **A. Langkah I Identifikasi data dasar**

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data berarti menghimpun informasi tentang klien/orang yang meminta asuhan. Kegiatan pengumpulan data dimulai saat klien masuk Rumah Sakit kemudian dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung, dan data dapat di kumpulkan dari berbagai sumber. Adapun sumber yang dapat memberikan informasi paling

akurat yang dapat di peroleh secepat mungkin yaitu pasien itu sendiri, kemudian keluarga serta kerabat yang lain. Namun pasien merupakan sumber informasi yang paling akurat dan ekonomis, yang di sebut sebagai sumber data primer. Sumber data sekunder atau alternatif yaitu data yang sudah ada, perhatikan kesehatan lain dan anggota keluarga.

Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu observasi, dimana pengumpulan data melalui pengelihatian(perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran(bunyi batuk dan bunyi nafas), penciuman(bau nafas dan bau luka), perabaan(suhu badan dan nadi), dan wawancara. Dalam pengumpulan data melalui wawancara yang perlu di perhatikan yaitu data yang di tanyakan di arahkan data yang relefan dan pemeriksaan, dimana pengumpulan data yang di lakukan dengan memakai instrument atau alat mengukur. Dengan tujuan untuk memastikan batas dimensi angka dan irama kuantitas, misalnya pengukuran tinggi badan dengan menggunakan meteran, berat badan dengan timbangan, serta tekanan darah dengan tensi meter.

Dalam tahapan pengkajian, penulis tidak mendapat hambatan. Hal ini dapat dilihat dari kesediaan ibu yang dapat menerima kehadiran penulis mulai dari pengumpulan data sampai melakukan tindakan yang di berikan. Ibu menunjukkan sikap terbuka dan menerima anjuran serta saran yang di berikan oleh penulis maupun tenaga medis lainnya dalam memberikan asuhan kebidanan.

Tindakan yang pertama kali dilakukan di ruangan *intranatal care* RSUD Syekh Yusuf yakni pengumpulan data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk ke puskesmas, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikologis, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu. Sementara itu, dilakukan juga pengumpulan data objektif yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu baik, pemeriksaan fisik (*head to toe*), serta data penunjang berupa pemeriksaan laboratorium dan USG.

Ny"K" dengan usia 34 tahun, GIPIA0 masuk ke ruang bersalin RSUD Syekh Yusuf dengan keluhan nyeri perut bagian bawah tembus ke pinggang yang disertai dengan pelepasan lendir dan darah tanggal 10 Juli 2018, jam 00.30 wita, nyeri yang dirasakan ibu semakin lama semakin sering dan bertambah kuat. Pasien mengatakan selama hamil ia melakukan kunjungan *antenatal care* (ANC) sebanyak 3 kali di RSUD Syekh Yusuf. Pasien mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 7 November 2017, pasien mengatakan selama hamil ia tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat. Pasien tidak pernah mengalami trauma kehamilan yang sekarang maupun kehamilan yang lalu.

Pasien tidak pernah mengalami penyulit dan trauma selama persalinan dan nifas yang lalu, dan pasien juga tidak pernah memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, asma, jantung, serta penyakit menular lainnya.

Pasien tidak memiliki riwayat mengonsumsi obat-obatan selama hamil kecuali resep dari bidan/dokter. Pasien tidak pernah mengalami penyakit serius dan tidak pernah dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas. Selama hamil nutrisi pasien terpenuhi dengan baik, istirahat cukup, pasien tetap melakukan aktivitas berupa pekerjaan rumah tangga. Pasien mengatakan melahirkan tanggal 10 Juli 2018, jam 00.45 wita, pasien mengatakan plasenta lahir tidak lengkap setelah bersalin, dan pasien merasakan banyak pengeluaran darah dari jalan lahir tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 08.30 wita ( $\pm 6$  J) setelah di pindahkan ke ruang bersalin.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos mentis, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 84 x/i, pernafasan 24 x/i, suhu 36,6°C, ekspresi wajah tampak lesu, tidak tenang dan tampak meringis menahan sakit serta tidak ada oedema dan pembengkakan pada wajah, kedua konjungtiva mata pucat, sklera tidak ikterus, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis, payudara tampak simetris, tampak hyperpigmentasi pada areola mammae. Pada pemeriksaan abdomen kontraksi uterus kurang baik (tidak teraba bundar dan keras), TFU setinggi pusat dan kandung kemih kosong.

Pada pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan USG dan laboratorium didapatkan hasil USG didapatkan sisa jaringan plasenta, dan pada hasil pemeriksaan laboratorium 8,5 gr%. Pengkajian pada kasus ini maka dilanjutkan dengan perencanaan tindakan *kuretase*.

Menurut Dewi, Vivian, dkk. 2014:1, masa nifas(*puerperium*) yaitu dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas atau *puerperium* dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu 42 hari. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa masa nifas (*puerperium*) dimulai setelah 2 jam *post partum* dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Biasanya berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari, namun secara keseluruhan baik secara fisiologis akan pulih dalam waktu 3 bulan(Lockhart, 2014: 14).

Perdarahan *post partum* adalah perdarahan lebih dari 500 CC dan terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1.000 mL setelah persalinan abnormal termasuk *rest plasenta*(Nugroho, 2014).

Beberapa gejala yang dapat menimbulkan perdarahan *post partum* di antaranya karena adanya perdarahan yang tidak dapat di kontrol, penurunan tekanan darah, penurunan hitung sel darah merah(*hematocrit*), peningkatan detak jantung, pembengkakan dan nyeri pada jaringan daerah vagina dan sekitar perineum, perdarahan hanyalah gejala, penyebabnya haruslah diketahui dan melakukan penatalaksanaan sesuai penyebabnya.

Berdasarkan teori didapatkan gejala-gejala yang ditimbulkan dari perdarahan dengan *rest plasenta* yaitu nampak adanya perdarahan, pasien gelisah dan pusing, nampak adanya sisa plasenta yang tertinggal. Pemeriksaan terfokus yaitu melakukan palpasi uterus, kontraksi uterus lembek dan plasenta

lahir tidak lengkap. Melakukan eksplorasi kavum uteri, inspekulo untuk melihat robekan pada serviks, vagina, dan varices yang pecah dan pemeriksaan laboratorium yaitu periksa darah (Hb 8.5 gr%).

Perdarahan *post partum* di definisikan sebagai kehilangan darah secara berlebihan  $\pm 500\text{CC}$  dalam persalinan pervaginam atau persalinan normal dan lebih dari 1.000 CC dalam persalinan sesar. Adapun yang menjadi penyebab perdarahan *post partum* yaitu *tonus*(atonia uteri), *trauma*(robekan jalan lahir), *tissue*(sisa-sisa jaringan plasenta), *thrombin*(pembekuan darah) (FIGO, 2016: 109). Begitupun dengan yang dikatakan oleh(Norma, 2013) bahwa perdarahan *post partum* adalah perdarahan lebih dari 500 ml pada persalinan pervaginam atau lebih dari 1.000 ml pada persalinan caesar setelah bayi lahir perdarahan dapat terjadi sebelum, selama, dan setelah plasenta lahir. Termasuk perdarahan karena *rest plasenta*. Perdarahan *post partum* merupakan perdarahan yang berlebihan (jumlah darah yang keluar  $> 500\text{ml}$  ) selama masa nifas termasuk periode 24 jam pertama setelah kala III persalinan selesai.

Dengan melihat data yang di peroleh tidak terdapat perbedaan dari tinjauan pustaka dan kasus nyata pada klien dengan perdarahan *post partum* dengan *rest plasenta* sebagaimana dalam teori mengatakan bahwa perdarahan *post partum* adalah perdarahan yang terjadi lebih dari 500-600 ml selama 24 jam setelah bayi lahir, termasuk perdarahan karena *rest plasenta*. Perdarahan *post partum* merupakan perdarahan lebih dari 500-600 ml dalam masa 24 jam setelah anak lahir (Mochtar, 2015). *Rest plasenta* merupakan potongan-

potongan plasenta yang tertinggal tanpa di ketahui biasanya menimbulkan perdarahan *post partum* lambat (Saleha, 2013: 100).

Demikian pula didalam buku Maartaadisoebrata (2013), *rest plasenta* yaitu dimana kontraksi uterus tidak baik atau kembali lembek setelah kompresi bimanual ataupun massase di hentikan, bersamaan dengan pemberian *uterotonika* lakukan eksplorasi. Penemuan secara dini, dimungkinkan dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta setelah plasenta lahir.

Berdasarkan uraian di atas yang dimulai dari pasien masuk sampai di lakukan tindakan kuretase, terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus *rest plasenta*. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

### **B. Langkah II Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual**

Pada langkah ini kegiatan yang di lakukan yaitu menginterpretasikan semua data yang telah di kumpulkan sehingga di temukan diagnosis atau masalah. Diagnosis yang di rumuskan adalah diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan yang tergolong pada momenklatur standar diagnosis, sedangkan perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan hasil pengkajian (betty Mangkuji dkk, 2014:5).

Dalam menegakkan suatu diagnosa atau masalah kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan di tunjang dan di dukung oleh beberapa data baik data subjektif, maupun data objektif yang di peroleh pada

hasil pengkajian melalui hasil pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang di tuangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien.

Berdasarkan teori masalah aktual yang terjadipada post partum hari pertama dengan *rest plasenta* yaitu kecemasan dan perdarahan. Hasil pemeriksaan ini di dapatkan data subjektif ibu mengeluh sakit pada daerah genitalia setelah melahirkan bayi dengan berat badan lahir 3200 gram, panjang badan lahir 48 cm, dengan jenis kelamin perempuan, ibu merasakan banyak darah keluar dari jalan lahir sekitar jam 08.30 wita ( $\pm 6 \text{ ja}$  ) setelah ibu di pindahkan ke ruang perawatan nifas ibu merasa lemah dan sering pusing. Pada pemeriksaan objektif di dapatkan pemeriksaan inspeksi nampak adanya darah dari jalan lahir, perdarahan  $\pm 500 \text{ C}$  , konjungtiva pucat dan sklera tidak ikterus, sebelum eksplorasi tanggal 11 Juli 2018 jam 02.00 wita, Hb 8,5 gr% serta adanya sisa jaringan plasenta yang belum lepas.

Dalam tinjauan pustaka di jelaskan bahwa terjadinya *rest plasenta* dapat di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengeluaran plasenta tidak secara hati-hati, dimana plasenta dilahirkan tidak sesuai kurva jalan lahir, salah dalam pimpinan kala III, terlalu terburu-buru untuk mempercepat lahirnya plasenta, terjadi lingkaran kontruksi(Lisnawati, 2013).

Pada kasus Ny”K” di temukan masalah aktual perdarahan, dan kecemasan, teori mengatakan bahwa perdarahan *post partum* adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml dalam 24 jam setelah anak lahir (Mochtar, 2015).

Berdasarkan pengkajian data asuhan kebidanan pada hari kedua di dapatkan masalah aktual pada ibu yaitu *post partum* hari ke dua di dapatkan dari hasil data subjektif yaitu ibu melahirkan tanggal 10 Juli 2018 jam 00.45 wita, ibu mengatakan pengeluaran darah tapi tidak terlalu banyak, ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya, ibu sudah mulai menyusui bayinya, ASI sudah mulai keluar tapi belum lancar. Data objektif yang di dapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos mentis, tampak pengeluaran lochea rubra, kontraksi uterus teraba keras dan bundar, tanda-tanda vital: tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 x/i, suhu 36,8°C, pernafasan 24 x/i, Hb 8,5 gr%, konjungtiva pucat dan sklera tidak ikterus, dan dari pengkajian teori masa nifas (*puerperium*) adalah masa atau waktu sejak bayi di lahirkan dan plasenta lepas dari rahim sampai 6 minggu berikutnya, di sertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan yang mengalami perubahan seperti permukaan dan lain sebagainya berkaitan saat melahirkan.

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa masa nifas (*puerperium*) dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu atau setelah persalinan sampai 42 hari persalinan yang merupakan periode penting bagi ibu dan bayi (Prawirohardjo, 2014). *Lochea rubra* berisi

darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel *desidua*, *verniks kaseosa*, *lanugo*, *mekonium*, yang berlansung selama 3 hari pasca persalinan.

Dari data pengkajian asuhan kebidanan pada Ny"K" dengan *post partum* hari ke tiga di dapatkan diagnosa aktual *post partum* hari ketiga yang di dapatkan dari data subjektif ibu melahirkan tanggal 10 Juli 2018 jam 00.45wita, ibu mengatakan pengeluaran darah berupa bercak, ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya, ibumengatakan bahwa bayinya sudah mulai menyusu dan bayi menghisap ASI dengan kuat, ASI ibu sudah mulai lancar, ibu sudah tidak merasa pusing, ibu sudah merasa lebih sehat. Data objektif yang di dapatkan dari hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, kontraksi uterus teraba keras dan bundar, tampak pengeluaran *lochea rubra* dan sudah tidak terjadi perdarahan hebat (diluar batas normal), TFU 3 jari bawah pusat, tanda-tanda vital: tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 x/i, suhu 36,5 °C, pernafasan 22x/i, Hb 9,5gr%.

Pada saat bayi lahir TFU setinggi pusat dengan berat 3200 gram, panjang 48 cm,pada akhir kala III TFU teraba 2 jari bawah pusat, adapun tahapan masa nifas yaitu *puerperium dini* merupakan kepulihan dimana ibu telah di perbolehkan berdiri dan berjalan, *puerperium intermedial* yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu, dan *remote puerperium* adalah waktu yang di perlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi (Rukiyah, dkk. 2012).

Dari data yang di peroleh baik dari tinjauan pustaka maupun dari data pengkajian tidak di temukan adanya kesenjangan yang berarti pada kasus perdarahan *post partum* hari ke tiga dengan *rest plasenta*.

### ***C. Langkah III Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial***

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan di lakukan pencegahan, sambil mengamati klien bidan di harapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Maka pada langkah ini sangat penting melakukan asuhan yang aman (Murfdillah, dkk 2012: 116).

Berdasarkan teori masalah potensial yang mungkin dapat terjadi pada penanganan yaitu potensial terjadinya *syok hipovolemik*, infeksi puerperium dan anoksia jaringan. Pada teori kasus *rest plasenta* masalah potensial yang terjadi yaitu potensial terjadinya anemia berat. Darah mengandung *sel eritrosit* yang terdiri dari Hb mengikat O<sub>2</sub> adanya darah yang terus menerus mengalir keluar mengakibatkan suplai O<sub>2</sub> ke otak berkurang yang menyebabkan ibu merasa lemah dan pusing. Apabila hal tersebut tidak tertangani dengan segera maka perdarahan akan makin banyak dan dapat menyebabkan pasien mengalami *syok hipovolemik* (sarwono, 2014).

Syok merupakan suatu sindrom klinis akibat kegagalan akut fungsi sirkulasi yang menyebabkan ketidak cukupan perfusi jaringan dan oksigenasi jaringan, dengan akibat gangguan mekanisme homeostatis. Berdasarkan

penelitian Moyer dan Mc Clelland tentang fisiologi keadaan syok dan homeostatis, syok yaitu keadaan dimana pengiriman oksigen ke jaringan tidak cukup. Syok ada beberapa macam sesuai dengan konteks klinis dan tingkat kedalaman analisisnya. Secara patofisiologi syok merupakan gangguan sirkulasi yang diartikan sebagai kondisi tidak adekuatnya transport oksigen ke jaringan atau perfusi yang di akibatkan oleh gangguan hemodinamik. *Syok hipovolemik* merupakan kegagalan perfusi jaringan yang di sebabkan oleh kehilangan cairan intra vaskuler. Adapun proses kegagalan perfusi akibat kehilangan volume intra muskular terjadi melalui penurunan aliran darah bilik jantung (venous return) yang menyebabkan volume sekuncup dan curah jantung berkurang. Cedera pada jantung atau pembuluh darah atau berkurangnya jumlah darah yang mengalir menyebabkan oksigen dan perfusi jaringan tidak optimal dalam keadaan berat sehingga menyebabkan terjadinya *syok*.

Gejala klinis *syok hipovolemik* baru jelas terlihat apabila kekurangan volume sirkulasi lebih dari 15% karena pada tahap awal perdarahan kurang, mekanisme kompensasi sistem kardiovaskular dan saraf otonom masih dapat menjaga fungsi sirkulasi dalam keadaan normal. Gejala dan tanda klinis juga tidak muncul dalam waktu yang bersamaan seperti perubahan tekanan darah sistolik lebih lambat yaitu kurang dari 80 mmHg dari adanya perubahan tekanan nadi, frekuensi jantung dan penurunan produksi urin (oliguria) yaitu kurang dari 20 mL/jam. Oleh karena itu pemeriksaan dan penatalaksanaan yang teliti harus dilakukan untuk penatalaksanaan yang tepat serta penanganan segera kasus-kasus yang beresiko agar tidak jatuh dalam

kondisi syok. Adapun komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien syok hipovolemik yaitu kerusakan organ susunan saraf, kerusakan ginjal, dan kerusakan hati.

Penanganan pada pasien *syok hipovolemik* yaitu lakukan ABC (*Airway-Breathing-Circulation*) terlebih dahulu, kemudian tinggikan posisi kaki pasien, jaga jalur pernafasan, berikan cairan intravena (infus) 2-4 liter dalam waktu 20-30 menit. Seperti cairan infus RL (hati-hati pemberian terlalu cepat pada pasien asidosis hiperkloremia), jika perdarahan atau kehilangan cairan belum bisa di atasi maka lakukan cek kadar hemoglobin, jika hasilnya  $\leq 10 \text{ g/d}$  maka berikan transfuse darah, pastikan darah sesuai dengan golongan darah pasien serta disarangkan darah yang di gunakan sudah menjalani tes uji silang. Yang perlu di ingat selain resusitasi cairan saluran pernafasan harus tetap di jaga (Hardisman, 2013).

Anemia menurut *WHO*, hemoglobinyang kurang dari 11gr% merupakan penyebab tersering morbiditas dan mortalitas ibu terutama di negara-negara berkembang. Kekurangan zat besi merupakan penyebab yang paling umum anemia pasca melahirkan, dengan tingkat yang tinggi seperti 50,0% di laporkan pada minggu pasca *post partum* pertama. Adapun pengobatan anemia *post parum* yaitu terapi besi parenteral, besi oral, serta transfusi darah(Singh, dkk, 2016: 5).

Anemia merupakan suatu keadaan adanya penurunan kadar hemoglobin, hematokrin dan jumlah eritrosit dibawah nilai normal. Pada

penderita anemia biasanya di sebut dengan kurang darah, dimana kadar sel darah merah (hemoglobin/Hb) di bawah nilai normal (Prawirohardjo, 2014). Gejala-gejala yang timbul pada anemia seperti lemah, lesu, sakit kepala, pusing, dan mata berkunang-kunang terjadi karena organ-organ tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk berfungsi dengan baik, yaitu oksigen.

Adapun penanganan yang baik untuk ibu yang anemia yaitu menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi protein dan kurma, sebagaimana yang di jelaskan dalam surah Maryam tentang kurma merupakan makanan yang sangat baik bagi wanita yang sedang dalam masa nifas dan dalam persalinan karena kurma mudah di cerna, lezat dan mengandung kalori yang tinggi serta dalam kisah rasulullah selalu makan tuju biji buah kurma “ajwa” (matang). Rasulullah bersabda “barang siapa yang makan tujuh biji kurma, maka akan terlindung dari racun.” Dan terbukti ketika seorang wanita yahudi menaruh racun dalam makanan Rasulullah dalam sebuah percobaan pembunuhan di perang khaibar, racun yang di telan oleh beliau bisa di netralisir oleh zat-zat yang terkandung dalam kurma. Bisyr ibnu al Barra’, salah seorang sahabat yang ikut makan racun akhirnya meninggal (Maria Hidayah, 2014: 35).

Infeksi pada masa nifas (*puerperium*) yang di sebabkan oleh kuman yang masuk melalui organ genitalia pada saat persalinan dan masa nifas, infeksi ini di sebabkan bakteritruktus *genitalia* yang terjadi setelah melahirkan yang di tandai dengan meningkatnya suhu tubuh menjadi 38°Catau lebih

selama 2 hari. Infeksi nifas juga termasuk penyebab utama kematian ibu nifas terutama di negara berkembang seperti Indonesia, masalah itu terjadi akibat dari pelayanan kebidanan yang masih jauh dari sempurna. Faktor penyebab lain terjadinya infeksi masa nifas yaitu daya tahan tubuh seseorang yang kurang baik, kurang gizi atau malnutrisi, hygiene yang kurang baik, kelelahan, serta perawatan masa nifas yang kurang baik.

*Anoksia jaringan* merupakan gangguan yang terjadi di dalam jaringan sendiri, sehingga jaringan atau tubuh tidak dapat menggunakan oksigen secara efektif. Adapun gejala anoksia ringan yaitu bibir dan kuku tampak berwarna kebiruan atau pucat, kehilangan kesadaran, pusing, sesak napas. Adapun penanganan dari *anoksia jaringan* yaitu pemberian cairan dan obat untuk meningkatkan tekanan darah, pemberian obat untuk mengurangi kejang.

Maka dari itu potensial untuk infeksi, *syok hipovolemik*, dan anemia tidak akan terjadi jika di tangani dengan segera. Sedangkan pada kasus, klien mengerti tentang penyebab dari keluhan yang di alaminya dan bersedia untuk di lakukan tindakan kuretase. Sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus.

#### ***D. Langkah IV Melaksanakan Tindakan Segera/Kolaborasi***

Ada beberapa data yang menunjukkan situasi emergensi di mana perlu bertindak sesegera mungkin demi keselamatan ibu, dan beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sambil sementara menunggu intruksi dari dokter untuk melakukan tindakan selanjutnya.

Mungkinjuga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan perlu mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan.

Dalam teori di jelaskan bahwa tindakan segera/kolaborasi pada kasus perdarahan *post partum* dengan *rest plasenta* yaitu pemasangan *infus*, *uterotonika*, *manual plasenta*, *pemberian antibiotic*, *USG*, dan *kuretase*. Beberapa ahli menganjurkan segera lakukan eksplorasi secepatnya, akan tetapi hal ini sulit dilakukan tanpa general anastesi kecuali pasien jatuh dalam kondisi syok. Jangan hentikan pemberian uterotonika selama dilakukan eksplorasi. Setelah eksplorasi lakukan *massase* dan *kompresi bimanual* ulang tanpa menghentikan *uterotonika* (Mochtar, 2012: 56).

Tindakan kolaborasi untuk menunjang diagnosa adalah pemeriksaan USG dan pemasangan infus RL+ transfusi darah lengkap (*whole blood*)+ oxytocin 20 IU, 28 tetes/menit, eksplorasi kavum uteri dengan bimanual plasenta, kemudian pemberian antibiotik sesuai dengan intruksi dari dokter. Dan hasil pemeriksaan USG di dapatkan hasil pemeriksaan yaitu terdapat sisa jaringan plasenta(Muchtar, 2012: 56).

Sebelum kuretase di lakukan, terlebih dahulu biasanya pasien di berikan obat anastesi secara total dengan jangka waktu singkat yaitu sekitar 2-3 jam. Setelah pasien terbius maka proses kuretase segera di lakukan. Ada dua pilihan alat bantu bagi dokter ketika melakukan kuret, di lihat dari *emergency*

dan kolaborasi pada kasus dan teori tidak ada kesenjangan yang di temukan. Sehingga dapat di simpulkan tidak ada kesenjangan antara kasus dengan teori.

#### ***E. Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan***

Rencana asuhan kebidanan di buat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi pada langkah ini di rencanakan asuhan yang menyeluruh di tentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah di identifikasi atauantisipasi, pada langkah ini data dasar/informasi yang tidak lengkap (Mufdillah, dkk. 2012: 118).

Pada langkah ini di rencanakan asuhan yang menyeluruh di tentukan oleh langkah-langkah sebelumnya dan merupakan lanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah di identifikasi atau diantisipasi. Jadi, rencana tindakan komprehensif bukan hanya meliputi kondisi klien serta hubungannya dengan masalah yang di alami oleh klien, namun perlu juga dilakukan konseling, bila perlu mengenai ekonomi, budaya, agama, maupun masalah psikologis. Rencana asuhan di setuju oleh klien oleh karena itu harus berdasarkan rasional yang relevan kebenarannya serta situasi dan kondisi tindakan harus secara teoritis.

Setiap rencana asuhan haruslah di setuju oleh kedua belah pihak yaitu bidan dan klien agar dapat di laksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Rencana yang di buat harus rasional dan benar-banar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang

*up to date serta evidence based* terkini serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan di lakukan klien.

Pada teori di jelaskan bahwa rencana tindakan pada kasus *rest plasenta* yaitu dengan meningkatkan kesehatan ibu agar tidak terjadi anemia dalam kehamilan, melakukan pertolongan persalinan di rumah sakit pada ibu yang mengalami perdarahan *post partum*, memberikan *uterotonika* segera setelah bayi lahir, serta kelahiran plasenta di percepat, melakukan pemasangan infus dan pemberian *uterotonika* untuk mempertahankan keadaan umum ibu dan merangsang kontraksi uterus.

Ada beberapa tujuan dan tindakan kuretase antara lain menentukan penyebab atau menghentikan perdarahan vagina, mengeluarkan janin pada ibu yang mengalami keguguran atau sisa jaringan lain yang masih tertinggal di dalam *endometrium*, menentukan derajat keparahan dari suatu kanker *endometrium*. Untuk menentukan tindakan kuretase yang sudah di rencanakan sebelumnya, maka pasien diwajibkan untuk puasa selama 6-8 jam sebelum tindakan kuretase di lakukan. Pada umumnya sebelum tindakan kuretase di lakukan terlebih dahulu pasien di bius total, namun ada juga yang hanya di lakukan bius sebagian atau hanya di berikan obat penenang sehingga pasien tetap sadar namun tidak meraskan sakit yang hebat. Pemilihan penggunaan obat bius harus tetap di sesuaikan degan kondisi pasien dan riwayat penyakitnya.

Tindakan kuretase memiliki beberapa mamfaat bukan hanya untuk calon ibu atau wanita yang mengalami keguguran, namun juga beberapa hal lainnya untuk memeriksakan masalah atau kesehatan pada rahim. Adapun mamfaatnya yaitu membersihkan rahim setelah mengalami keguguran, mendiagnosa keadaan tertentu yang ada pada rahim, membersihkan jaringan plasenta yang tersisa setelah proses persalinan di kemudian hari, menghilangkan *blighted ovum* atau tidak ada janin dalam indung telur, menghindari rahim tidak bisa berkontraksi karena pembuluh darah dalam rahim tidak menutup sehingga terjadi perdarahan, membersihkan sisa jaringan pada jaringan pada dinding rahim yang biasa menjadi tempat kuman berkembang biak dan timbul infeksi.

Pada pasien yang akan melakukan tindakan kuretase harus berbaring dengan posisi *litotomi* di mana kedua lutut di tekuk ke arah perut sehingga daerah vagina menjadi terbuka. Vagina dan serviks kemudian di bersihkan dengan menggunakan *speculum* untuk membuka lubang vaginaserta menggunakan alat dan obat yang khusus untuk membuka lubang serviks, proses ini di sebut dilatasi. Setelah dilatasi maksimal maka kuret di masukkan ke dalam rongga rahim untuk membersihkan sisa-sisa jaringan (Mochtar, 2012: 36).

Setelah menjalani prosedur, kondisi umum pasien tetap di monitor selama beberapa jam sampai benar-benar stabil dan tetap memantau tanda-tanda vital dan kemungkinan terjadinya perdarahan. Pasien yang telah menjalani tidakan *kuretase* akan pulih kembali normal setelah beberapa hari.

Pasien tidak boleh menggunakan tampon, memasukkan apapun ke jalan lahir, dan boleh bersenggama selama 2 minggu untuk mencegah terjadinya infeksi (Nugroho, T.2012: 60).

Kuretase juga memiliki efek samping walaupun pada umumnya proses *kuretase* ini bisa dikatakan aman untuk dilakukan, namun pada setiap prosedur juga memiliki resiko serta efek samping dan komplikasi seperti halnya pada proses kuretase ini seperti infeksi di dalam rahim, kerusakan dan luka pada rahim yang biasa disebut dengan *sindrom asherman* yang bisa menimbulkan keguguran saat kehamilan berikutnya, nyeri saat haid atau menstruasi, mengalami kemandulan, terjadi kebocoran pada usus karena alat (instrument) operasi membuat lubang pada rahim. Adapun resiko terjadinya komplikasi pada kasus kuretase ini meningkat pada beberapa kondisi di antaranya kelainan posisi rahim, adanya infeksi pada rahim dan sudah pernah menjalani operasi sebelumnya pada rahim seperti operasi sesar (Maaraadisoebrata, 2013: 102).

Pada kasus Ny"K" adapun rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu menjelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, mengobservasi jumlah perdarahan, mengobservasi tetesan infus, mengobservasi kontraksi uterus, mengajarkan pada ibu/keluarga cara melakukan massase fundus uteri, member penjelasan tentang keadaan yang dialami ibu, member intake yang adekuat, melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pelaksanaan tindakan *kuretase*, berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat antibiotic.

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan kepada klien untuk memantau keadaannya dan memberikan asuhan sesuai dengan apa yang di butuhkan klien. Pemantauan pertama hari kedua Ny “K” dengan perdarahan *post partum*, pada kunjungan ini ibu mengeluh masih banyak darah yang keluar dari jalan lahir, merasa lemas, dan kepala pusing. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, pemeriksaan fisik pada perut TFU 2jari bawah pusat dan pengeluaran *lochea rubra* dari jalan lahir. Rencana asuhan yang di berikan yaitu menjelaskan kepada ibu bahwa darah yang keluar dari jalan lahir merupakan perdarahan normal normal yang di alami oleh ibu nifas.

Menjelaskan pada ibu mengenai *Health Education (HE)* yaitu personal *hygiene*, menganjurkan ibu mandi 2x sehari, menjaga kebersihan tubuhnya, mengganti pakaian bila terasa kotor dan basah, menjaga kebersihan daerah genitalia, mengganti pembalut jika sudah penuh, mengganti pakaian dalam bila terasa lembab dan basah, pola istirahat menganjurkan ibu agar istirahat yang cukup (tidur siang minimal 2 jam dan malam 6-8 jam) per hari, pola nutrisi yaitu menganjurkan ibu agar mengkomsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, sayur, ikan dan susu untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu selama masa nifas.

Pemantauan ke dua hari ke tiga Ny”K” dengan perdarahan *post partum*, pada kunjungan ini ibu mengatakan pengeluaran darah sudah tidak banyak, tidak merasa pusing lagi. Pengeluaran ASI ibu sudah mulai lancar, bayi menghisapdengan kuat, ibu sudah merasa lebih sehat. Pada kunjungan ini

menjelaskan ibu mengenai *Health Education* (HE) tentang personal hygiene yaitu menganjurkan ibu agar mandi 2x sehari, menjaga kebersihan tubuhnya yaitu dengan mengganti pakaian ibu bila terasa basah dan kotor, menjaga kebersihan daerah genitalia, mengganti pembalut bila sudah penuh, mengganti pakaian dalam bila terasa lembab atau basah, menganjurkan ibu istirahat yang cukup yaitu tidur siang minimal 2 jam dan malam 6-8 jam perhari. Serta memberitahu ibu gara sebaiknya mengkonsumsi makanan bergizi dan halal seperti buah-buahan, sayuran, lauk (ikan, daging, tahu, tempe), susu agar kebutuhan gizi ibu selama masa nifas terpenuhi.

Pada kasus dan teori tidak di temukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus. Karena pada kasus di jelaskan tindakan pertolongan yang di lakukan pada kasus *rest plasenta* yaitu dengan kuretase dan pada teori di lakukan tindakan kuretase. Sehingga dapat di simpulkan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

#### ***F. Langkah VI Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan***

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah di uraikan pada langkah kelima di laksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa di lakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian di lakukan oleh klien, atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, maka ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan penatalaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana) (Dewi Asri, dkk. 2012: 31).

Pada studi kasus Ny” K” Dengan *rest plasenta*, semua tindakan yang di rencanakan terlaksana dengan baik. Seperti menyampaikan hasil pemeriksaan dengan baik. Seperti menyampaikan hasil pemeriksaan dengan baik, memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bersama, dalam hal ini pasien di beri waktu sebelum di hadapkan pada keputusan untuk tindakan kuretase, memberikan penjelasan tentang *rest plasenta* serta penatalaksanaannya, memberikan dukungan moril kepada ibu dan keluarga untuk mengambil keputusan penting.

Penjelasan telah di sampaikan, pasien dan keluarga memutuskan untuk di lakukan *kuretase*, kemudian memberitahu ibu dan keluarga tentang tindakan yang akan di lakukan agar sisa jaringan plasenta segera di keluarkan dan berkolaborasi dengan dokter ahli kandungan untuk memberikan terapi dan tindakan untuk *kuretase*. Setelah mediskusikan tindakan *kuretase* pada ibu dan keluarga, maka tindakan tersebut telah di kolaborasikan dengan dokter ahli kandungan dengan memberikan obat analgetik dan antibiotik.

Setelah bayi lahir segera lakukan pengecekan fundus dan tidak ada lagi bayi dalam uterus, kemudian memberithu ibu dan menyuntikkan oksitosin dan suntikan oksitosin, dan menjepit dan memotong tali pusat. Pemantauan selanjutnya, yaitu pada kala III persalinan, kala III di mulai setelah bayi lahir pukul 01.20 Wita, dan di tandai dengan adanya semburan darah tiba-tiba serta tali pusat bertambah panjang. Tindakan yang di lakukan pada saat kala III yaitu melakukan manajemen aktif kala III, plasenta dan selaput ketuban lahir spontan pukul 00.45 Wita, kontraksi uterus tidak baik dan TFU setinggi pusat.

Kala III berlangsung selama  $\pm 30$  menit, plasenta dan selaput ketuban lahir tidak lengkap, perdarahan  $\pm 500\text{C}$  dan terjadi robekan pada vagina dan perineum, melakukan kateter dengan jumlah urin yaitu  $\pm 150\text{C}$ . Pemantauan lanjutan dari kala III yaitu untuk memastikan adanya sisa plasenta kemudian melakukan kolaborasi dengan dokter ahli kandungan untuk tindakan USG. Pemeriksaan USG dilakukan pada tanggal 11 Juli 2018, jam 09.00 Wita, hasil pemeriksaan USG tampak sisa jaringan. Membersihkan sisa jaringan dengan melakukan kuretase oleh dokter ahli kandungan pada tanggal 11 Juli 2018, jam 09.30 Wita.

Pemantauan di lanjutkan pada kala IV persalinan kala IV persalinan di mulai setelah plasenta lahir. Ibu merasa lega setelah melahirkan dan masih sedikit mules, keadaan umum ibu baik, ibu tampak meringis, tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88 x/i, suhu  $37,5^{\circ}\text{C}$ , pernafasan 24 x/i, kontraksi uterus tidak baik, TFU setinggi pusat, tindakan yang dilakukan yaitu menjelaskan pada ibu tentang kondisinya saat ini dan keluhan yang di alami setelah bersalin, memberi dukungan mental kepada ibu/keluarga dan pendamping pada ibu untuk tetap tabah dan sabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah Swt.

Setelah di lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, meminta keluarga agar selalu menemani dan memenuhi kebutuhan ibu, mengajarkan ibu dan keluarga cara memantau kontraksi uterus, memberikan, memberikan penjelasan tentang persiapan *prakonsepsi* dan masa subur, membicarakan kejadian yang di alami ibu serta pencegahan yang perlu di lakukan di masa

mendatang dan meyakinkan ibu bahwa kejadian yang di alaminya merupakan kehendak Allah swt, menganjurkan ibu dan keluarga agar senantiasa berdoa kepada Allah swt agar dikaruniai keturunan yang baik dan sholeh, memindahkan ibu ke ruang perawatan pada pukul 02.00 Wita, dan di lakukan kolaborasi dengan dokter ahli kandungan untuk tindakan USG untuk melihat ada tidaknya sisa plasenta yang dapat menyebabkan perdarahan. Tindakan USG akan di lakukan pada tanggal 11 Juli 2018, jam 08.30 Wita dengan hasil tampak sisa jaringan. Penatalaksanaan pada Ny "K" adalah tindakan kuretase pada tanggal 11 Juli 2018, jam 09.30 Wita.

Semua intervensi yang ada pada langkah V dapat di lakukan sesuai dengan kebutuhan pasien di RSUD Syekh Yusuf Gowa, pada tahap ini tidak di temukan hambatan-hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan asuhan dari pembimbing di lahan praktek sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus.

#### **G. Langkah VII Evaluasi**

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan di mana pada tahap ini di temukan kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang di hadapi klien. Adapun proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan, pada tahapan ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi (Mufdillah, dkk.

2012: 119). Hasil anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan USG, diagnosa yang di tegakkan pada Ny”K” adalah *rest plasenta*. Rencana asuhan yang telah di susun berorientasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan di laksanakan secara menyeluruh. Adanya kerjasama antara pasien dan petugas kesehatan sehingga tidak di temukan hambatan pada saat pelaksanaan asuhan.

Adapun evaluasi yang di maksud untuk memperoleh atau memberi nilai terhadap intervensi yang di lakukan berdasarkan kriteria yang telah di tentukan sebelumnya. Adapun evaluasi yang di peroleh pada tanggal 10 Juli 2018 masalah perdarahan *post partum* akibat *rest plasenta* di tandai dengan ekspresi wajah klien tidak meringis lagi, ibu telah mengerti dengan penjelasan yang di berikan. Masalah potensial sudah dapat diatasi, dengan melihat hasil yang di peroleh seperti yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan bahwa hanya sebagian tujuan yang ingin di capai telah di evaluasi.

Evaluasi pada tanggal 11 Juli 2018 yaitu kecemasan telah berkurang, anemia belum teratasi di tandai dengan Hb 8,5 gr% perdarahan teratasi di tandai dengan kontraksi baik dan *involuti* sesuai dengan hari nifas.

Evaluasi tanggal 12 Juli 2018, anemia teratasi di tandai dengan Hb 9,5 gr% (post transfusi), keadaan ibu sudah membaik di tandai dengan ibu sudah melahirkan tanggal 10 Juli 2018 jam 00.45Wita, ibu mengatakan pengeluaran darah berupa bercak, serta ibu tidak merasa pusing lagi, ibu sudah merasa lebih sehat, dan ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya, ibu mengatakan bahwa bayinya sudah mulai menyusui dan menghisap dengan kuat. Maka

dapat di simpulkan bahwa mulai dari pemantauan hari pertama sampai dengan hari ke tiga setelah persalianan yang di lakukan secara bertahap, Semuanya berlangsung normal, tidak ditemukan terjadi komplikasi pada ibu. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang di berikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.



## BAB V

### PENUTUP

Setelah penulis membahas dan menguraikan kasus Ny”K” dengan perdarahan post partum akibat *rest plasenta* maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu:

#### A. Kesimpulan

1. Dari pengkajian yang di lakukan dengan identifikasi data dasar, interpretasi data, serta analisa maka diagnosa yang ditegakkan pada Ny “K” yaitu *post partum* hari pertama dengan *Rest Plasenta*.
2. Dari pengkajian dan interpresti data maka masalah aktual pada Ny “K” yaitu anemia ringan dan telah dilakukan tindakan transfusi darah agar tidak berpotensi terjadi anemia berat.
3. Adapun masalah potensial pada kasus Ny”K” yaitu Ny “ K” berpotensi mengalami syok hipofolemik, infeksi puerperium, dan anoksia jaringan.
4. Pada kasus Ny”K” tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus dalam tindakan kolaborasi yang dilakukan, tindakan *emergency*.kolaborasi yaitu pemasangan infuse RL + transfusi darah lengkap (*whole blood*) + oksitosin 20 UI, 28 tetes/menit, melakukan kuretase, serta pemberian antibiotik.
5. Tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus nyata dalam rencana tindakan asuhan kebidanan yaitu pada kasus dijelaskan bahwa tindakan

pertolongan yang dilakukan pada kasus *rest plasenta* yaitu tindakan pertama dengan melakukan eksplorasi, apabila tindakan eksplorasi tidak berhasil maka tindakan selanjutnya yaitu dengan melakukan kuretase. dan pada teori dilakukan tindakan kuretase.

6. Pada pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan pada Ny “K” yaitu dengan menjelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan serta mengajarkan pada pasien cara melakukan massase fundus uteri, dan cara perawatan dirisesuai dengan 7 langkah dan dalam pembahasan tidak ditemukan kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus.

7. Tidak terdapat kesenjangan anatara teori dan kasus nyata dalam melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan selama 3 hari, adapun evaluasi yang diperoleh pada tanggal 10 Juli 2018 masalah perdarahan post partum akibat *rest plasenta* diatasi dengan ditandai ekspresi wajah klien tidak meringis lagi. Ibu tidak bertanya-tanya dan memahami penjelasan yang telah diberikan. masalah potensial sudah dapat diatasi. Pendokumentasian sangat penting dilaksanakan pada setiap tahap dari proses manajemen kebidanan, karena merupakan salah satu pembuktian tanggung jawab bidan terhadap asuhan kebidanan yang telah diberikan.

Dengan melihat hasil yang diperoleh seperti yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian tujuan yang ingin dicapai setelah dievaluasi.

Evaluasi pada tanggal 11 juli 2018 ditandai dengan kontraksi bayi dan involusi sesuai dengan hari nifas yan berlangsung normal. Evaluasi tanggal 12 Juli 2018, keadaan ibu semakin membaik dan berlangsung normal ditandai dengan keadaan ibu baik, kesadaran kompos mentis, ekspresi wajah tampak ceria, teraba keras dan bundar, tampak pengeluaran lochea lubra dan sudah tidak terjadi perdarahan (perdarahan abnormal), TFU tiga jari bawah pusat, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 x/i, pernafasan 22x/i, suhu 36,5°C Hb (sebelum transfusi) 8,5 gr%, Hb(post transfusi) 9,5 gr%,

8. Mendokumentasikan semua hasil temuan dan tindakan kedalam metode soap

## **B. Saran**

1. Untuk klien

Adapun saran-saran untuk klien sebagai berikut:

- a. Diharapkan pada setiap ibu nifas agar makan makanan yang bergizi dan halal karena makanan yang bergizi akan mengandung kebutuhan energy, juga untuk mempercepat proses penyembuhan, dan pengembalian alat reproduksi, mendekati keadaan sebelum hamil serta untuk memperbanyak produksi asi.
- b. Diharapka pada setiap ibu nifas agar senantiasa menjaga kebrsihan dirinya, terutama pada daerah genitalianya untuk mencegah terjadinya infeksi pada ibu.
- c. Diperlukan keterlibatan suami/keluarga dalam melakukan perawatan untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat antara pasien dengan bayinya dengan

menambah pengetahuan dan bimbingan sebagai kelanjutan perawatan dirumah.

## 2. Untuk bidan

Adapun saran-saran untuk bidan yaitu:

- a. Sebagai petugas kesehatan khususnya seorang bidan diharapkan agar senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih professional berdasarkan manajemen kebidanan sebagai pertanggungjawaban apabila ada gugatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagai bidan harus dengan sepengetahuan klien dan mendapatkan persetujuan dari klie/keluarga.
- c. Dalam meberikan asuhan kepada klien, bidan diharapkan agar menerapkan manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan sebgai pertanggungjawaban apabila ada gugatan.
- d. Pendokumentasian sangat penting dialkuakn pada setiap tahap dalam proses manajemen kebidanan, karena hal ini merupakan bukti pertanggungjawaban bidan terhadap klien.
- e. Pemberian asuhan kebidanan pada klien dalam pandangan islam, sebaiknya menerapkan kaidah agama didalamnya agar klien dapat mengerti tentang larangan dalam melakukan senggama antara suami istri apabila dalam keadaan haid atau nifas.

### 3. Untuk RSUD Syekh Yusuf Gowa

Untuk memperoleh hasil yang lebih baik maka perlu menyediakan fasilitas atau alat-alat yang memadai untuk menunjang pelaksanaan petugas.

### 4. Untuk institusi

Menyediakan tenaga pengajar yang professional agar dapat membimbing mahasiswa dalam proses belajar mengajar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarakfuri Shofiyyurrahman Syaikh. *Minnatul Mun'im Fii Syarhi Shahih Muslim*. Arab Saudi: Darussalam, riyadh.1999.
- Asih, Yusari dan Risneni. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Jakarta: Trans Info Media. 2016.
- Atika, Proverawati. *Anemia dan Anemia Kehamilan*. Yogyakarta. Nuha Medika. 2013.
- Betty, Mangkuji, dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Soap*. Jakarta: Kedokteran EGC. 2014.
- Cunningham, G.f. dkk. *Obstetri Williams, edisi 21*, Jakarta: EGC. 2012.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: Mizan Media Utama (MMU). 2012.
- Dewi, Asri. *Asuhan Persalinan Normal*. Yogyakarta: Nuhmedika. 2012.
- Dewi, Vivian Nanny Lia dan Trisumarsih. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Madika. 2014.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Profil Kesehatan Prov. Sulsel. Tahun 2014*. Sulsel: Dinkes Sulsel. 2014
- Geni, Puti Lenggo, dkk. *Peran Penambahan Misoprostol Pada Penatalaksanaan Aktif Kala III Dalam Menurunkan Perdarahan Pasca Persalinan*. Journal Kesehatan Reproduksi vol.4. No. 3 :170-177. 2017.
- Hardisman. *Memahami Patofisiologi dan Aspek Klinis Syok Hipovolemik*. Available from: <http://Jurnal.fk.Unand.ac.id.2013>.
- Imron, Riyanti, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Patologi dalam Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Gangguan Reproduksi*. Jakarta: Trans Info Media 2016.
- Jannah Nurul. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Yogyakarta: C.V OFFSET. 2012.
- Karlina. *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*. Bogor. In Medika. 2016.
- Kartini, Farida. Dkk. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*.

- Kementrian Kesehatan RI. 2015. *Profil Kesehatan Indonesia tahun 2014*. Jakarta:Kemenkes RI.
- Lisnawati, L. *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*. Bogor: In Medika. 2016.
- Lisnawati, L. *Buku Praktis Kebidanan Komunita*. Jakarta: Trans Infomedia. 2013
- Lochart, anita. *Asuhan Kebidanan Masa Persalinan Fisiologis Dan Patologis*. Tangerang: Binapura Aksara Publisher.2014.
- Maemunah. *Asuhan Kebidanan II*.Jakarta: Trans Info Media. 2013.
- Manuaba dkk. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB*. Jakarta: EGC. 2010
- Maartaadisoebrata. *Obstetri Patologi*. Jakarta: EGC. 2013
- Maria, Hidayah. *Bidadari*.Yogyakarta: Abata Press. 2014
- Maritalia, Dewi. *Asuhan kebidanan Nifas dan Menyusui*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Marmi. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas "Peuperiumcare"*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Mastiningsih Putu. "*Rest Placenta Pada Ibu Nifas Pada 6 Jam Post Partum Di Ruang Bersalin Rsud Wangaya*". 2012.
- Maryunani, dkk. *Asuhan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Trans Info Media. Jakarta. 2014.
- Mochtar. Rustam. *Sinopsis Obsteri, Buku Kedokteran*. Jakarta: EGC. 2015.
- Mochtar, Rustam. *Sinopsis Obsteri*. Jakarta: EGC. 2012.
- Mufdillah, dkk.*Konsep Kebidanan Edisi Revisi*, Yogyakarta :NuhaMedika : 2012.
- Muslihatun, Nur dkk. *Dokumentasi kebidanan*. Yokyakarta: Fitramaya. 2013.
- Nadiyah. *Kegawat Daruratan Neonatal, Anak dan Maternal (Panduan Praktis Untuk Mahasiswa Kebidanan)*. Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Norma Nita, Dwi Mustika. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yokyakarta: Nuha Medika. 2013.

- Nugroho, Taufan. Dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas*. Jogjakarta: Nuhamedika. 2014.
- Nugroho, Taufan. Dkk. *Buku Ajar Obstetri untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta: Nuhamedika. 2012.
- Nurjannah, Sitti, Nunung. Dkk. *Asuhan kebidanan postpartum dilengkapi dengan asuhan kebidanan post sectio caesarea*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2013.
- Prawirohardjo S. *Ilmi Kebidanan*. Jakarta: YBP-SP. 2013.
- Prawirohardjo S. *Ilmi Kebidanan*. Jakarta: EGC. 2014.
- Profil Kesehatan Makassar Tahun 2016.
- Renden, Lince dkk. *Asuhan Kegawat Daruratan Dalam Kebidanan*. Pustakan As Salam. 2015.
- Rukiyah. *Asuhan Kebidanan III (Nifas)*. Jakarta: TIM. 2012.
- Rukiyah. *Asuhan Kebidanan IV Patologi Bagian 2*. Jakarta: TIM. 2012.
- Rukiyah, Yeyeh. *Konsep Kebidanan*. Madura: TIM. 2015.
- Saifuddin, A.B. dkk. *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*. Jakarta: PT. Bina Pustaka. 2011.
- Saleha, Sitti. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika. 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*/M. Quraish Shihab. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Singh, dkk. Ferric Carboxymaltose: A Better Option for Treatment of Postpartum Iron Deficiency Anemi. International Journal of Basic and Applied Medical Sciences ISSN: 2277-2103 (online) An Open Access, Online International Journal Available at <http://www.cibetch.org/jms.htm> 2016vol 6 (1) January-April, 2016
- Suherni. *Perawatan Masa Nifas*. Fitramaya: Yokykarta. 2013.
- Talluri Bhavishya. Acquired Uterine Hypoplasia After Postpartum Haemorrhage With Worst Prognosis – A Case Report. J. Evid. Based Med. Healthc., pISSN-2349-2562, eISSN- 2349-2570/ Vol. 3/Issue 24/Mar. 24, 2016.

Tanto Chris. *Kapta Slehta Kedokteran I*. Jakarta: Media Aesculapius. 2014

Varney, Helen dkk, *Varney's midwifery*, america: jhones and Barttlet publisher, 2003.

Widyasih.Dkk. *Perawatan Masa Nifas*. Fitramaya: Yogyakarta. 2013

Wulandari, Setyo Retno dan Sri Handayani. 2011. *Asuhan Kebidanan Ibu Masa Nifas*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411)864924 Fax. (0411) 864923 Makassar  
Kampus II : Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax. (0411) 8221400 Samata-Gowa

Nomor : B. <sup>2130</sup> /FKIK/PP.00.9/06/2018

Gowa, <sup>29</sup> Juni 2018

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data**

Kepada Yth.  
**Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa**  
di-  
Tempat

*Dengan Hormat,*

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Sulfika  
NIM : 70400114096  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny "X" Dengan Post Partum Akibat Rest Plasenta di Rumah Sakit Syekh Yusuf.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan data awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam  
An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.**  
NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)

870



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF**  
 Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Telepon (0411) 866536/840892  
 SUNGGUMINASA

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : **UIN Alauddin MKS** Diterima Tgl: **02 Juli 2018**  
 No. Surat : **2130/1744/PP-009/06/2018** No. Agenda : **1067**  
 Tgl. Surat : **29 Juni 2018** Sifat :  
 Sangat Sederhana     Segera     Rahasia

Perihal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal an. Sultha**

Diteruskan Kepada Sdr..... Dengan Hormat harap :  
 **Bilal B**  Tanggapan dan saran  
 .....  Proses lebih lanjut  
 .....  Koordinasi / Konfirmasikan  
 Dan seterusnya.....  
 .....

Catatan :  
 ✓ / **dikeluarkan sesuai surat MKS**  
**B/**  
**7 - 2018**  
**Des Iskandar**  
 Ap.  
 Jh: **Pangian RM**  
 Mohon Agihan d **berhingga**  
 Ybs w/ data yg di **comalend**  
 (nama & paraf)

Jabatan :  
 Tanggal : **02 Juni 2018**  
 \_\_\_\_\_  
 (nama & paraf)



ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR : 69-A TAHUN 2018

TENTANG

PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL  
JURUSAN/PROGRAM STUDI KEBIDANAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat pengantar mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan atas nama: **Sulfika NIM. 70400115046** tertanggal 04 Juni 2018 perihal permohonan Ujian Proposal pada tanggal 08 Juni 2018 Yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal pada Ibu dengan Perdarahan Post Partum".
- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan Ujian Proposal  
b. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran Ujian Proposal perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan wewenang menandatangani Surat Keputusan;  
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 330/PMK.05 Tahun 2008 tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Badan Layanan Umum (BLU);  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200c Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alaudin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama: Membentuk Dewan Penguji Ujian Proposal Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:  
Ketua : Dr.dr.H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc  
Sekertaris : Firdayanti, S.ST., M.Keb  
Pembimbing I : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb  
Pembimbing II : dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.  
Penguji I : dr. Raully Rahmadani, M.Kes  
Penguji II : Dr. Rahmi Damis, M.Ag
- Kedua: Dewan penguji bertugas melaksanakan Ujian Proposal bagi Mahasiswa yang namanya tersebut di atas.
- Ketiga: Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- Keempat: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata - Gowa

Pada tanggal : 07 - Juni 2018

A.n Rektor  
Dekan, 



Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc  
NIP. 19550203 198312 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Para Pembimbing dan Penguji;
3. Arsip.

Nomor : B- /FKIK/PP.00.9/07/2018  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, Juli 2018

Kepada Yth.  
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel.  
di-

Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian/Pengambilan Kasus:

Nama : Sulfika  
NIM : 70400115046  
Program Studi : Kebidanan  
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny "X"  
Dengan Perdarahan Post Partum Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa.  
Tempat Penelitian : RSUD Syekh Yusuf Gowa  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.  
2. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
MAKASSAR



Wassalam  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes.  
NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Masing-masing Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Aisip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 2756/S.01/PTSP/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Bupati Gowa

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1235/FKIK/PP.00.9/07/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SULFIKA**  
Nomor Pokok : 70400115046  
Program Studi : Kebidanan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDNAN PADA NY "X" DENGAN PERDARAHAN POST PARTUM AKIBAT REST PLASENTA DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Juli s/d 30 Agustus 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 16 Juli 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN. SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 16-07-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://p2tbkpmdu.sulselprov.go.id> Email : [p2t\\_provsulsel@yahoo.com](mailto:p2t_provsulsel@yahoo.com)  
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 3 Agustus 2018

K e p a d a

Nomor : 070/1377 /BKB.P/2018

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di-

T e m p a t

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel  
Nomor: 2756/S.01/PTSP/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : SULFIKA  
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai. 26 Desember 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Samata

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY "X" DENGAN PERDARAHAN POST PARTUM AKIBAT REST PLASENTA DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA**"

Selama : 18 Juli s/d 30 Agustus 2018  
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. KEPALA BADAN  
SEKRETARIS,



DRS. ALWI ARIFIN.Msi

Pangkat : Pembina Tk.I

N.I.P. 19680808198811012.

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Yang bersangkutan;
5. Peringatan,-



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF**  
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

**SURAT KETERANGAN STUDY KASUS**

Nomor : 195/Diklat.RSUD-SY/VIII /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Sulfika  
N i m : 70400115046  
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Study Kasus di Ruang Perawatan Nifas ( PNC ) dan Rekam Medis RSUD. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul "**Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care Pada Ny " K " Dengan Perdarahan Akibat Rest Plasenta Di RSUD Syekh Yusuf kabupaten Gowa Tahun 2018**" pada Tanggal 09 Juli 2018 S/D 06 Agustus 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 09 Agustus 2018

An. Ketua Diklat  
Koordinator bagian Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM  
**ALAUDDIN**  
M A K A S  
M A K A S  
RSUD. SYEKHYUSUF  
GOWA  
**DIKLAT**  
Dra. Hj. Ramlah Rauf, Bsc. MMRS  
Nip. 19630710 198703 2 019



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 94.C TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGUJI UJIAN SEMINAR UJIAN HASIL TUGAS AKHIR  
JURUSAN/PROGRAM STUDI KEBIDANAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat pengantar mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan atas nama: **Sulfika NIM. 70400115046** tertanggal 14 Agustus 2018 perihal permohonan Ujian Hasil pada tanggal 16 Agustus 2018 Yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal pada Ny K dengan Perdarahan Post Partum Akibat Rest Plasenta di RUSD Syech Yusuf Gowa Tahun 2018".
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan Ujian Hasil Tugas Akhir  
b. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran Ujian Hasil Tugas Akhir perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan wewenang menandatangani Surat Keputusan;  
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 330/PMK.05 Tahun 2008 tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Badan Layanan Umum (BLU);  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200c Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** Pertama: Membentuk Dewan Penguji Ujian Hasil Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:  
Ketua : Dr.dr.H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc  
Sekertaris : Firdayanti S.Si.T., M.Keb  
Pembimbing I : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb  
Pembimbing II : dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
Penguji I : dr. Raully Rahmadani, M.Kes  
Penguji II : Dr. Rahmi Damis, M.Ag
- Kedua: Dewan penguji bertugas melaksanakan Ujian Hasil bagi Mahasiswa yang namanya tersebut di atas.
- Ketiga: Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- Keempat: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata - Gowa  
Pada tanggal : 10 Agustus 2018

A. dr. Rektor  
Dekan,  
  
Dr.dr.H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc  
NIP. 19550203 198312 1 001

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Para Pembimbing dan Penguji;
3. Arsip

**LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL**

Proposal ini telah dikoreksi, diperbaiki dan akhirnya disetujui oleh pembimbing I dan Pembimbing II untuk diajukan dalam Seminar Proposal Studi Kasus Tigas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) mahasiswa Kebidanan. Adapun judul studi kasus:

*manajemen asuhan kebidanan pada ny. "x" dengan perdarahan post partum  
dekat rest. plasenta di Puskesmas / RS*

**Tanggal:**

**Pembimbing I**

*[Signature]*  
Drs. Siti Saleha, S.Si.T, SKM, M. Keb  
NIP: 19760126 200604 2 001

**Tanggal:**

**Pembimbing II**

*[Signature]*  
dr. Syarifah, MKS. SPA  
NIP: 19800701 200604 2 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LEMBAR PERSETUJUAN PENELITIAN

Proposal ini dengan judul

Manajemen asuhan kebidanan postnatal care pada ibu "x" Dengan  
perdarahan MEKAT rest placentae di RSUD Syekh Yusuf Makassar

Telah diujikan pada 08 Juni 2018 dan telah melalui perbaikan dari tim pembimbing dan penguji, sehingga layak dilanjutkan untuk penelitian dengan studi kasus.

### Tim Penguji

1. Pembimbing I Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb
2. Pembimbing II Dr. Syakirah, M.Kes. SPA
3. Penguji I Dr. Rauli, Rahmadani, M.Kes.
4. Penguji II Dr. H. Rahmi, Darsis, M.Ag

Mengetahui  
Ketua Prodi Kebidanan

DR.Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb  
NIP: 19760126 200604 2 001

#### Catatan:

1. Lembar persetujuan ini menjadi dasar pemberian surat izin meneliti
2. Lembar persetujuan ini juga menjadi dasar dimulainya perhitungan minimal 8 minggu untuk pelaksanaan seminar ujian hasil.


**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR UJIAN HASIL**

Laporan Tugas Akhir Studi Kasus ini dengan judul,  
"Manajemen Asuhan Kebidanan postnatal care pada tdk" dengan perdarahan  
post partum akibat post plasenta Di RSUP. Sjahrudin Yusuf

Telah diperiksa dan telah melalui perbaikan oleh tim pembimbing, sehingga layak dan dapat diajukan untuk Seminar Ujian Akhir.

Tim Penguji

(Tanggal & TT)

- 1. Pembimbing I *Dr. Hj. Sitti Saleha SIT. SKM. M. Keb.* 
- 2. Pembimbing II *dr. Syatirah M. Kes. S.PA* 

- Catatan:
- 1. Lembar persetujuan ini menjadi dasar pendaftaran peserta seminar ujian hasil
  - 2. Lembar persetujuan ini juga menjadi dasar dimulainya perhitungan minimal 8 minggu untuk pelaksanaan ujian akhir.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Peneliti

Nama : SULFIKA  
NIM : 70400115046  
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 26 Desember 1996  
Suku : Bugis  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Macanda

### B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2003-2009: SD Negeri 140 Batusantung
2. Tahun 2009-2012: SMP Negeri 4 Tellulimpoe
3. Tahun 2012-2015: SMA Negeri 1 Tellulimpoe
4. Tahun 2015-2018: Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R