

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN *POSTPARTUM* BERKELANJUTAN  
PADA NY "S" DI RSIA SITTI KHADIJAH 1  
TANGGAL 31 MARET s.d 25 MEI 2024**



**RISALAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Pendidikan  
Ahli Madya Kebidanan Jurusan DIII Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran dan  
Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**NURUL HIDAYAH**  
**70400121012**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN RISALAH**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah

Nim : 70400121012

Tempat / Tanggal Lahir : Makassar / 13 Maret 2003

Jurusan / Prodi : D3 Kebidanan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl Toddopuli X Blok A1/26 G P Sari

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan

*Postpartum* Berkelanjutan Pada Ny "S" Di  
RSIA Sitti Khadijah 1 Tahun 2024

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh keyakinan bahwa Risalah ini adalah benar adanya dan hasil karya kerangka pikiran sendiri. Jika kemudian hari bahwa Risalah ini merupakan duplikasi, tiruan bahkan plagiat baik sebagian dan seluruhnya maka Risalah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, Juni 2024

Penyusun

**NURUL HIDAYAH**  
**70400121012**

**PERSETUJUAN RISALAH**

Nama : Nurul Hidayah  
NIM : 70400121012  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum  
Berkesinambungan Pada Ny "S" Di RSIA Sitti  
Khadijah 1 Tahun 2024

Risalah ini telah disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil Risalah  
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam  
Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 24 Juni 2024

Pembimbing I

**Firdayanti, S.Si.T., M.Keb**  
Nip. 197511192006042001

Pembimbing II

**Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb**  
Nip. 1976012620060420012

Diketahui Oleh:  
Ketua Prodi Kebidanan

**Anisa Mumthi'ah AlKautzar, S.ST., M.Keb**  
NIP. 19890116 201903 2 009

## PENGESAHAN RISALAH

Risalah ini berjudul **"Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Berkelanjutan Pada Ny "S" Di RSIA Sitti Khadijah 1 Tahun 2024"**, yang disusun oleh **Nurul Hidayah NIM 70400121012** Mahasiswa Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Risalah yang diselenggarakan pada hari **Senin, 24 Juni 2024**, bertepatan dengan **Tanggal 17 Dzulhijjah 1445 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 24 Juni 2024  
17 Dzulhijjah 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Firdayanti, S.Si.T., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji I	: Anicq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji II	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:

Dehan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes  
NIP. 198106212006040005

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua sehingga aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah disisi-Nya. Salam dan Shalawat semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Risalah yang berjudul "**Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Berkelanjutan Pada Ny "S" Di RSIA Sitti Khadijah 1 Tanggal 31 Mret s.d 25 Mei 2024**". Karya ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pendidikan di jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam proses penyusunan Risalah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dalam kata sempurna, baik dari segi penulis maupun penyajiannya. Oleh karena itu saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan yang ada dalam penulisan karya tulisan ilmiah ini.

Terselesainya penulisan Risalah ini berbagai pihak yang terlibat telah memberikan banyak bantuan, sehingga di kesempatan ini atas segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih

yang sebesar-besarnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Risalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D. sebagai rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Kepada Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG, M.Kes, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Kepada Ibunda Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Kepada Ibunda Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb selaku Sekretaris Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Kepada Ibunda Firdayanti, S.Si.T., M.Keb selaku pembimbing I yang memberikan dukungan banyak kepada penulis dan dengan kesabarannya meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Kepada Ibunda Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

7. Kepada Ibunda Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M.Keb selaku penguji kompetensi yang senantiasa meluangkan waktunya dalam pemberian kritik, dan saran untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.
8. Kepada bapak Dr. Wahyuddin G M.Ag selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah dalam penyempurnaan karya tulis ilmiah ini sehingga penulis mengetahui keterkaitan kasus yang diangkat dengan ajaran agama islam.
9. Kepada seluruh Dosen dan Staf Pengajar Studi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu, wawasan, bimbingan dan mendidik penulis selama pendidikan.
10. Kepada Kepala Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Makassar yang telah memberikan kesempatan dan izin, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
11. Kepada Bapak Sultan, ayahanda tercinta yang selalu tegas dalam mendidik penulis dan dengan kedisiplinannya hingga saat ini penulis memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan sebuah amanah dan sangat berperan dalam memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.
12. Kepada Ibu Fitriani, Ibunda tercinta yang setiap hari berjuang dan tidak mengenal lelah dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya dan dengan kesabaran, ketulusan hatinya selalu memberikan senyuman terbaik kepada anak-anaknya.

13. Kepada adik Muh. Ibnu Zulkifli, adikku tercinta dengan kesabarannya selalu membantu penulis dalam mengurus pekerjaan rumah dan menjaga toko di waktu penulis sedang menyelesaikan risalah ini.
14. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2021, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
15. Kepada sahabat-sahabat penulis Stella, Emy, Winda, Fitria, Dinda, Aul dan Shalsa yang masing-masing kemampuan mereka telah memberikan dukungan dan saran untuk penulis semasa pendidikan.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam risalah ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kesehatan.

Makassar, Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**Nurul Hidayah**  
**70400121012**

**ABSTRAK**

**JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
RISALAH, Mei 2024**

**Nama : Nurul Hidayah, 70400121012**

**Pembimbing I : Firdayanti**

**Pembimbing II : Ferawati Taherong**

**Manajemen Asuhan Kebidanan *Postpartum* Berkelanjutan pada Ny "S" di  
RSIA Sitti Khadijah 1 Tahun 2024**

---

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan oleh kehamilannya atau pengelolaannya sehingga mengakibatkan terjadinya angka kematian ibu (AKI). Jumlah kematian ibu tahun 2020 yang dilaporkan sebanyak 133 orang atau 85,95 per 100.000 kelahiran hidup. Yaitu dari kematian ibu hamil 29 orang (22%), kematian ibu bersalin 36 orang (23%), dan kematian ibu nifas 77 orang (55%) (Dinas Kesehatan Data Profil, 2021).

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan *Postpartum* Berkelanjutan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1 Tanggal 31 Maret 2024 sesuai atas kebutuhan dan wewenang bidan dalam metode manajemen 7 langkah varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yaitu dilakukan pengkajian berupa anamnesa dan pemantauan dilakukan sebanyak 4 kali selama 42 hari dan berlanjut kunjungan 1 kali setelah 42 hari, selama asuhan kebidanan dilakukan mobilisasi dini, masase fundus uteri, *health education*, perawatan payudara, teknik menyusui, menyusui secara *on demand*, perawatan bayi baru lahir, dan konseling KB.

Kesimpulan studi kasus yang telah dilakukan pada Ny "S" dengan luka episiotomi. Pada pemantauan ibu *postpartum* di RSIA Sitti Khadijah 1 pada tanggal 31 Maret 2024-25 Mei 2024, dengan terjadi perubahan signifikan bahwa ibu *postpartum* telah pulih dari nyeri luka jahitan perineum, terdapat pengeluaran ASI, tanda-tanda vital dalam batas normal dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya kelainan.

**Kata Kunci : *Postpartum*, Luka Episiotomi, 7 Langkah Varney**

**ABSTRACT**

**DEPARTMENT OF MIDWIFERY  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC WRITING, MAY 2024**

**Name : Nurul Hidayah, 70400121012**

**Advisor I : Firdayanti**

**Advisor II : Ferawati Taherong**

**"Management of Continuous Postpartum Midwifery Care in Mrs. "S" at Sitti Khadijah 1 Mother and Child Hospital in 2024"**

---

Maternal mortality during pregnancy or 42 days since the termination of pregnancy, regardless of the length and place of delivery, is caused either by pregnancy or its management. The number of maternal deaths reported in 2020 was 133 people or 85.95 per 100,000 live births, which included 29 (22%) pregnant women deaths, 36 people (23%) maternal deaths, and 77 people (55%) postpartum maternal deaths (Health Data Profile, 2021).

This study used a case study method, which aimed to carry out continuous postpartum midwifery care management in Mrs. "S" at Sitti Khadijah 1 Mother and Child Hospital on March 31-May 25, 2024, in accordance with the needs and authority of midwives following the 7-step Varney and SOAP.

The case study results showed that anamnesis and monitoring were carried out four times for 42 days and continued with one visit after 42 days. According to the anamnesis, Mrs. "S" had a complaint of episiotomy wound. Therefore, the authors conducted midwifery care, such as early mobilization, uterine fundus mass, health education, breast care, breastfeeding techniques training, breastfeeding on dependency, newborn care, and family planning counseling.

The case study concluded that there is a significant change in Mrs. "S" condition; where she had recovered from pain in perineal suture wounds, there was breast milk production, vital signs were within normal limits, and physical examination does not find any abnormalities.

**Keywords:** Postpartum, Episiotomy Wound, 7 Steps of Varney



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN RISALAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN RISALAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penulisan .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum.....	12
1. Pengertian masa nifas .....	12

2. Tujuan masa nifas .....	14
3. Tahapan masa nifas .....	16
4. Perubahan fisiologi pada masa nifas .....	17
5. Perubahan psikologi ibu masa nifas .....	23
6. Kebutuhan dasar masa nifas .....	28
7. Manajemen laktasi.....	35
8. Kunjungan Masa Nifas .....	46
9. Komplikasi dan penyakit dalam masa nifas.....	47
B. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	51
C. Pendokumentasian Manajemen Asuhan Kebidanan dengan Metode (SOAP) .....	55
<b>BAB III STUDI KASUS .....</b>	<b>58</b>
A. Langkah I : IDENTIFIKASI DATA DASAR.....	58
B. Langkah II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL.....	65
C. Langkah III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL.....	66
D. Langkah IV : TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI.....	67
E. Langkah V : INTERVENSI.....	67
F. Langkah VI : IMPLEMENTASI.....	72
G. Langkah VII : EVALUASI .....	76
<b>MATRIKS KUNJUNGAN .....</b>	<b>124</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>129</b>
A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar.....	129
B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual .....	133

C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial .....	135
D. Langkah IV : Tindakan Segera Atau Kolaborasi.....	136
E. Langkah V : Intervensi.....	137
F. Langkah VI : Implementasi .....	140
G. Langkah VII : Evaluasi.....	144
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>147</b>
A. Kesimpulan .....	147
B. Saran.....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>151</b>
<b>PENDOKUMENTASIAN.....</b>	<b>155</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>156</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>161</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Perubahan Uterus <i>Postpartum</i> .....	18
Gambar 1.2 TFU Involusi Uteri.....	19
Gambar 2.1 Anatomi Payudara.....	44
Gambar 2.2 Posisi Menyusui Bayi .....	50
Gambar 2.3 Posisi Perlekatan Bayi.....	50



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Asuhan Selama Kunjungan Nifas.....55



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan oleh kehamilannya atau pengelolaannya sehingga mengakibatkan terjadinya angka kematian ibu (AKI). Kematian ibu merupakan kematian wanita dalam masa persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan yang diakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai sebab-sebab dan penanggulangan komplikasi-komplikasi penting dalam persalinan serta nifas (WHO, 2023).<sup>1</sup>

Antara Tahun 2000 dan 2020 secara global, jumlah kematian ibu turun dari 447.000 menjadi 287.000 dan rasio kematian ibu menyusut dari 339 kematian per 100.000 kelahiran hidup menjadi 223 kematian per 100.000 (Organisasi Kesehatan Dunia, 2023). *United Nations Children's Fund*, Organisasi Kesehatan Dunia serta lembaga mitra lainnya melakukan kerja sama untuk mempercepat kemajuan dalam kesehatan ibu dan bayinya. Melalui target dikembangkan yaitu memastikan setiap perempuan dan perempuan melahirkan menerima intervensi penting, salah satunya ibu dan bayinya menerima perawatan pasca persalinan dalam waktu dua hari setelah kelahiran (WHO, 2023).

---

<sup>1</sup> WHO *Trends in Maternal Mortality, 2023*

Menurut *World Health Organization* artikel 2023 Indonesia memiliki 173 kasus kematian ibu per 100.000 dari kelahiran hidup. Sehingga sangat penting terhadap perempuan mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas tinggi selama pasca melahirkan demi menghindari kematian ibu. (WHO, 2023).

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan sewaktu ibu melahirkan dan masa nifas. Diberitakan sebanyak 133 kematian ibu pada tahun 2020 atau 85,95 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan kata lain, tingkat kematian ibu hamil adalah 29 orang (22%), kematian ibu melahirkan adalah 36 orang (23%), dan kematian ibu *postpartum* adalah 77 orang (55%) (Dinas Kesehatan, 2021).<sup>2</sup>

*Postpartum* merupakan masa sesudah lahirnya plasenta hingga kembalinya organ kandungan seperti keadaan normal. Dalam 6 pekan akan terjadi pengerutan uterus yang merupakan proses perubahan kembalinya keadaan sebelum mengandung dengan bobot hanya 60 gram (Purba, 2023).<sup>3</sup> Selama periode ini, seorang wanita perlu beradaptasi terhadap perubahan fisik, sosial dan psikologis. Ibu *Postpartum* sedang memasuki masa pemulihan, menyesuaikan diri dengan perubahan hormon dan belajar memberi makan serta merawat bayinya yang baru lahir. Selama masa ini, pelayanan pasca persalinan sering kali terpecah antara penyedia layanan kesehatan ibu dan

---

<sup>2</sup> Dinas Kesehatan Data Profil, 2021

<sup>3</sup> Purba Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Perubahan Adaptasi Fisiologi Masa Nifas (Pangkalpinang, Jurnal Sains Kesehatan, 2023)

anak, dan komunikasi selama masa transisi dari rawat inap ke rawat jalan yang tidak konsisten (Auguste & Gulati, 2018).<sup>4</sup>

Pasca melahirkan akan terjadi kelelahan fisik. Denyut nadi mungkin meningkat beberapa jam pasca persalinan karena kegembiraan atau nyeri yang dirasakan dan akan kembali normal pada hari kedua. Tekanan darah akan meningkat karena rasa sakit atau kegembiraan tetapi umumnya dalam kisaran normal. Terjadi penurunan berat badan sebesar 5 hingga 6 kg karena pengeluaran hasil konsepsi dan kehilangan darah yang menyertainya (Chauhan & Tadi, 2022).<sup>5</sup>

Keberlangsungan persalinan yang lancar merupakan hal yang membahagiakan dan salah satu anugerah paling berharga dari Allah SWT yang diberikan kepada wanita. Beberapa hal yang dialami oleh seorang ibu setelah menjalani sembilan bulan kehamilan adalah perubahan fisik dan perubahan psikologis yang memerlukan adaptasi (Qanita, 2021)<sup>6</sup>. Selama masa nifas, ibunya akan mengalami adaptasi fisiologis, psikologis dan adaptasi sosial. Tetapi, diantara ibu *Postpartum* hanya beberapa yang dapat melewati adaptasi masa nifas ini dengan lancar. (Qanita, 2021)

Pada perubahan fisiologi terdiri dari: perubahan uterus, lokia, perubahan pada serviks, perubahan pada vulva dan vagina, perineum,

---

<sup>4</sup> Auguste Presidential Task Force on Redefining the Postpartum Visit Committee on Obstetric Practice (The American College of Obstetricians and Gynecologists, 2018)

<sup>5</sup> Chauhan Physiology Postpartum Changes (StatPearls Publishing, 2022)

<sup>6</sup> Qanita Analisis Faktor Risiko Terjadinya Postpartum Blues Di Ruang Wijaya Kusuma (Banten, *Journal of Applied Health Research and Development*, 2021)

perubahan pada sistem pencernaan, perubahan sistem perkemihan, perubahan sistem muskuloskeletal, perubahan sistem endokrin, perubahan tanda-tanda vital, perubahan sistem hematologi. Jika perubahan masa nifas yang dialami oleh ibunya tidak mengetahui keadaannya dan terjadi suatu infeksi maka perubahan fisiologi tersebut akan berubah menjadi patologi dan dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayinya (Hamdayani Pasaribu, 2023).<sup>7</sup>

Menurut data WHO Tahun 2021 menunjukkan bahwa angka kematian bayi di Indonesia adalah 11 per 1000 kelahiran hidup. Risiko kematian bayi dapat terjadi pada semua usia kehamilan ibu terutama pada ibu persalinan primi dan multi. Pelayanan asuhan kebidanan diperlukan untuk mengurangi AKI dan AKB yang bermutu sehingga dibutuhkan keterlibatan keluarga untuk memastikan ibu dan bayi mendapatkan segala yang mereka butuhkan pada fase pemulihan ibu dan fase adaptasi bayi dengan dunia luar pasca persalinan (Yuliasih, 2023).<sup>8</sup>

Untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan bayi, perawatan pasca persalinan harus menjadi suatu proses yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar pertemuan tunggal, dengan layanan dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap ibu. Menurut penelitian oleh *Americans Collage of Obstetricians and Gynecologists* merekomendasikan waktu

---

<sup>7</sup> Hamdayani Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui (Jawa Tengah, Eureka Media Aksara, 2023)

<sup>8</sup> Yuliasih Trend Determinan Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Magetan Tahun 2020-2022 (Surabaya, *Communication and Social Dynamics*, 2023)

kunjungan pasca persalinan komprehensif yang dilakukan secara individual dan berpusat pada wanita. Untuk memenuhi kebutuhan wanita pada masa nifas dengan lebih baik, perlunya perawatan ideal yang mencakup penilaian awal baik secara langsung atau melalui via telepon, dalam 3 minggu pertama pasca persalinan yaitu mengatasi masalah akut pasca persalinan. Penilaian awal ini harus ditindaklanjuti dengan perawatan berkelanjutan sesuai kebutuhan, diakhiri dengan kunjungan komprehensif ke ibu sehat selambat-lambatnya 12 minggu setelah kelahiran (Auguste & Gulati, 2018).

Dalam memberikan asuhan pada ibu *postpartum* peran bidan sangatlah diperlukan karena bidan dituntut berkontribusi terhadap melakukan kompetensi, keterampilan, dan sensitivitas dalam kebutuhan dan harapan tiap ibu dan keluarga. Sesuai dengan kebutuhan ibu, asuhan yang diberikan oleh bidan harus terencana dengan baik yaitu memberikan dukungan secara berkesinambungan dalam mengurangi ketegangan fisik dan psikologis, melakukan skrining secara komprehensif, memberikan pendidikan kesehatan sesuai dengan kebutuhan ibu serta pelayanan keluarga berencana (Septianti, 2018)<sup>9</sup>. Standar pelayanan kesehatan ibu nifas dilakukan tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan: enam jam hingga tiga hari pasca persalinan, pada hari keempat hingga hari kedua puluh delapan pasca persalinan, dan pada hari kedua puluh sembilan hingga hari keempat puluh dua setelah persalinan (Dinkes Data Profil 2021).

---

<sup>9</sup> Septiani Modul Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui (Surabaya, Untuk Kalangan Sendiri, 2018)

Adapun data rekam medis yang didapatkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf mencatat jumlah persalinan normal pada Tahun 2021 sebanyak 1.106 jiwa, Tahun 2022 sebanyak 938 jiwa, dan Tahun 2023 sebanyak 896 jiwa. Sedangkan data rekam medik dari RSIA Sitti Khadijah 1 mencatat jumlah persalinan normal pada Tahun 2021 sebanyak 1.053 jiwa, Tahun 2022 sebanyak 1.362 jiwa, dan Tahun 2023 sebanyak 1.163 jiwa.

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab penulis dalam mengambil kasus manajemen asuhan kebidanan berkelanjutan pada ibu *postpartum*, karena mengingat data-data dan kasus tersebut merupakan suatu hal yang penting bagi penulis untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama pada ibu *postpartum* yang masih belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya sebagai seorang ibu.

## **B. Ruang Masalah Pembahasan**

Ruang masalah dalam studi kasus berikut adalah Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ibu *Postpartum*

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Mampu melaksanakannya asuhan manajemen kebidanan berkelanjutan pada ibu *postpartum* berkelanjutan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1 Tanggal 31 Maret s.d 25 Mei 2024 dengan manajemen 7 langkah varney dan pendokumentasian SOAP.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Dilakukannya pengkajian asuhan kebidanan berkelanjutan pada ibu *postpartum* berkelanjutan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1 Tanggal 31 Maret s.d 25 Mei 2024
- b. Dilakukannya perumusan diagnosa serta masalah aktual pada ibu *postpartum* berkelanjutan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1 Tanggal 31 Maret s.d 25 Mei 2024
- c. Dilakukannya perumusan diagnosa serta masalah potensial pada ibu *postpartum* berkelanjutan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1 Tanggal 31 Maret s.d 25 Mei 2024
- d. Dilakukannya pengidentifikasian penanganan segera atau bekerja sama pada ibu *postpartum* berkelanjutan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1 Tanggal 31 Maret s.d 25 Mei 2024
- e. Dilakukannya perencanaan penanganan asuhan kebidanan pada ibu *postpartum* berkelanjutan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1 Tanggal 31 Maret s.d 25 Mei 2024
- f. Dilaksanakannya penanganan asuhan kebidanan pada ibu *postpartum* berkelanjutan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1 Tanggal 31 Maret s.d 25 Mei 2024
- g. Diketuinya evaluasi tindakan asuhan kebidanan pada ibu *postpartum* berkelanjutan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1 Tanggal 31 Maret s.d 25 Mei 2024

- h. Dilakukannya pendokumentasian hasil asuhan kebidanan pada ibu *postpartum* berkelanjutan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1 Tanggal 31 Maret s.d 25 Mei 2024
- i. Dilakukannya penerapan nilai-nilai keislaman pada asuhan kebidanan ibu *postpartum* berkelanjutan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1 Tanggal 31 Maret s.d 25 Mei 2024

#### **D. Manfaat Penulisan**

##### 1. Manfaat Praktis

###### a. Manfaat bagi pasien

Agar pasien dapat mengetahui apa yang harus dilakukan atau perannya sebagai ibu pada pasca kelahiran bayinya (ibu *postpartum*).

###### b. Manfaat Ilmiah

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kesehatan, khususnya kesehatan setelah persalinan. Sehingga hasil ini akan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

###### c. Manfaat bagi Peneliti

Temuan penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama dibangku kuliah mengenai asuhan manajemen kebidanan dari pengalaman nyata di tempat peneliti dalam memberikan asuhan pada ibu *postpartum*.

###### d. Manfaat bagi Institusi

Sebagai referensi dan referensi bacaan tentang perawatan ibu pasca persalinan.

## 2. Manfaat Teoritis

Sebagai informasi tentang penentu kebijakan dan pelaksanaan Program Studi Kebidanan Diploma III di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khususnya prodi kebidanan dan pihak rumah sakit tentang intervensi, penatalaksanaan dan evaluasi manajemen asuhan kebidanan berkelanjutan pada ibu yang telah melahirkan.

## E. Metode Penelitian

Metode berikut digunakan untuk menulis karya ilmiah:

### 1. Studi Kepustakaan

Setelah membaca literatur dan mendapatkan informasi dari internet yang ada kaitannya dengan *postpartum* fisiologi ibu primigravidarum.

### 2. Studi Kasus

Menggunakannya metode manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari 7 langkah varney, yaitu: menemukan data dasar, merumuskan diagnosa atau masalah aktual, merumuskan diagnosa atau masalah potensial, melakukan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan dan menerapkan penanganan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi hasil asuhan kebidanan.

### 3. Studi Dokumentasi

Melakukan pendokumentasian dari data subjektif dan data objektif yang telah diperoleh hingga pemeriksaan penunjang, selanjutnya menetapkan diagnosa aktual maupun potensial serta melakukan tindakan *emergency* jika terdapat indikasi. Langkah selanjutnya ialah penetapan rencana, implementasi

rencana dan evaluasi. Semua langkah di dokumentasikan termasuk setiap kunjungan.

#### 4. Diskusi

Menjalankan diskusi dengan pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan, dosen pembimbing yang membantu membuat proses penulisan ilmiah menjadi lebih lancar.

#### **F. Sistematika penulisan**

Secara sistematis tulisan ini terdiri dari enam bab yang terdiri dari bab I, bab II, bab III, bab IV, bab V, dan bab VI:

Bab pertama menyediakan Pendahuluan yang membahas latar belakang, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua terdapat Tinjauan Pustaka yang terdiri dari teori medis meliputi definisi masa *postpartum*, perubahan fisiologi selama masa *postpartum*, tanggung jawab dan peran bidan setelah persalinan.

Pada bab III terdapat Tinjauan Kasus atau studi penelitian yang membahas mengenai asuhan kebidanan *postpartum* ibu primigravida dari pengkajian data hingga evaluasi hasil asuhan dan pendokumentasian dengan menggunakan SOAP.

Pada bab IV terdapat pembahasan mengenai perbandingan atau perbedaan asuhan yang dilakukan di tempat peneliti, pembahasan setiap asuhan yang dilakukan dari 7 langkah varney serta pendokumentasian

menggunakan SOAP, perbandingan teori dari asuhan yang diberikan dengan teori dari tinjauan pustaka, dan permasalahan asuhan selama kunjungan.

Pada bab V terdapat Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menjadi inti dari diskusi dan menjawab tujuan penulis, sedangkan saran adalah masukan atau solusi dari kesimpulan.

Pada bab VI terdapat daftar pustaka yang terdiri dari sumber referensi yang didapatkan dalam penulisan maupun membuat karya tulis ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Masa Nifas

##### 1. Definisi *Postpartum*

Masa nifas berasal dari bahasa latin dari kata *puer* yang berarti bayi, dan *paros* yang berarti melahirkan. Masa nifas adalah masa pemulihan, mulai dari persalinan hingga kembalinya organ reproduksi seperti sebelum kehamilan. Masa yang dimasuki ibu setelah melahirkan, sejak lahirnya bayi dan plasenta yaitu setelah berakhirnya kala IV hingga minggu keenam (42 hari) ditandai terhentinya perdarahan disebut masa nifas (Azizah, 2019).<sup>10</sup>

*Postpartum* merupakan pasca persalinan yang memerlukan proses penyembuhan selama kurang lebih 6 minggu, masa pemulihan akan terjadi perubahan fisik yang disebabkan oleh faktor fisiologis dan memberikan rasa ketidaknyamanan pada awal nifas yang dapat menyebabkan berkembangnya penyakit jika tidak diberikan perawatan yang tepat (Rahmawati, 2023).

Masa nifas adalah periode setelah persalinan, lahirnya bayi, plasenta dan selaput sehingga memerlukan pemulihan alat kandungan, sama seperti masa sebelum hamil selama enam minggu. Disebut sebagai *puerperium*, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *puer* berarti bayi dan *partus* berarti melahirkan atau masa pasca persalinan. Proses ini dari pasca berakhirnya dan

---

<sup>10</sup> Azizah Buku Ajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui (Jawa Timur, UMSIDA Press, 2019)

dimulainya kembali alat-alat reproduksi, baik hamil atau tidak hamil merupakan akibat dari perubahan fisik dan psikologis (Hilmiah, 2023).

Bagi tenaga kesehatan masa ini merupakan hal yang perlu diperhatikan dan sangat baik dan sangat penting dalam selalu dilakukan pemantauan karena jika tidak tepat dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan berbagai masalah dan komplikasi seperti infeksi nifas (*sepsis puerperalis*). Jika kita melihat beberapa faktor kematian ibu *postpartum*, infeksi ini adalah salah satu faktor kematian terbanyak kedua setelah perdarahan, jadi sangat penting bagi para medis untuk memberikan perhatian yang lebih besar sekarang. Selain itu hal ini akan berdampak keselamatan bayi yang dilahirkan karena bayi tersebut tidak mendapatkan perawatan yang terbaik dari ibunya. (Hilmiah, 2023)

Ummu Salamah ra menceritakan bahwa perdarahan masa nifas umumnya empat puluh hari yang terjadi pada wanita bersalin. Maksudnya, sepanjang itu wanita *postpartum* akan melakukan larangan-larangan yang diperuntukkan bagi para muslimat, sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah ra, di mana ia berkata:

كَانَتْ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا  
أَرْبَعِينَ يَوْمًا

Terjemahnya :

“Wanita-wanita yang nifas pada masa Rasulullah SAW, biasa menahan dirinya selama empat puluh hari atau empat puluh malam.” (HR Abu Daud dan At-Tarmizi).

Setelah meriwayatkan hadis ini, Tarmizi berkata “kalangan cendekiawan mulai dari sahabat Nabi SAW, para tabiin dan masyarakat yang awam telah memahami bahwa wanita nifas tidak boleh menjalan salat selama 40 hari, kecuali mereka merasa bersih sebelum waktu tersebut. Jika sudah bersih, maka ia wajib mandi dan menunaikan Shalat. Jika darah masih mengalir setelah masa empat puluh hari, maka sebagian besar ahli mengatakan agar perempuan itu tidak meninggalkan Shalat setelah masa empat puluh hari atau nifas.”

## 2. Tujuan *Postpartum*

Berikut standar asuhan kebidanan untuk ibu *postpartum* terdiri dari perawatan bayi baru lahir (standar 13), penanganan 2 jam pertama setelah persalinan (standar 14), dan pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa *postpartum* (standar 15). Jika digambarkan secara komprehensif mengenai sasaran pemberdayaan, maka akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

### a. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi secara keseluruhan

Ibu akan mendapatkan dukungan dan fasilitas untuk menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai seorang ibu dan mendampingi pendampingan keluarga saat memiliki anak kedua. Kesejahteraan fisik dan psikologis ibu dan bayi akan meningkat jika semuanya berjalan lancar.

- b. Mencegah, mendeteksi, dan menangani komplikasi yang terkait dengan ibu nifas

Dengan diberikannya asuhan tersebut, hal-hal yang dapat terjadinya permasalahan dan komplikasi akan terdeteksi lebih cepat sehingga ditangani dengan maksimal.

- c. Merujuk ibu ke asuhan tenaga ahli jika diperlukan

Dengan diberikannya asuhan tersebut, tenaga kesehatan atau bidan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menemukan masalah, mengobatinya, dan merujuk bila terjadi masalah pada ibu dan bayinya.

- d. Meningkatkan dan mendukung keyakinan ibu, dan membantu ibu melakukan perannya dalam keluarga dan budaya tertentu

Seorang bidan akan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kesehatan atau pelayanan kesehatan terhadap ibu dan keluarga dalam memberikan asuhan nifas. Keterampilan oleh seorang bidan harus di kuasai yaitu materi berbagai pendidikan kesehatan, metode penyampaian, media yang digunakan, dan pendekatan psikologis yang sesuai dengan budaya lokal. Khususnya ibu *postpartum* yang melahirkan anak pertama yang sangat membutuhkan sebuah pendampingan baik dari keluarga maupun tenaga kesehatan untuk dapat menjalani peran barunya sebagai seorang ibu.

- e. Mendorong praktik metode yang sehat tentang pemberian makanan anak, serta peningkatan pengembangan hubungan yang baik antara ibu dan anak

Dalam melakukan asuhan *postpartum*, pengetahuan dan pengawasan diberikan harus mencakup semua masalah ibu dan anak, bukan hanya masalah

ibu. Di mana bidan memberikan pelayanan kesehatan yang mencakup perawatan diri, nutrisi, kontrasepsi, menyusui, imunisasi bayi, dan perawatan bayi yang sehat. Dan yang lebih utamanya ibu nifas harus diberikan edukasi tentang pentingnya kebutuhan gizi dalam masa nifas sehingga akan mencukupi kebutuhan gizi pada bayinya melalui ASI.

### 3. Tahapan *Postpartum*

Adapun fase yang terjadi pada *postpartum*:

#### a. Masa *Immediate postpartum*

Masa pasca lahirnya plasenta hingga dengan 24 jam. Saat ini sering kali terdapat beberapa komplikasi, seperti perdarahan karena *atonia* uteri (uterus tidak mengeras atau kontraksi). Maka dari itu diperlukan pemeriksaan dan pemantauan secara teratur.

#### b. Masa awal pasca melahirkan (24 jam-1 minggu)

Dalam masa ini tenaga medis atau bidan memastikan involusi uteri (kembali fungsi dan ukuran uterus keadaan normal), tidak terjadi perdarahan, lokia (cairan atau darah yang keluar dari vagina selama masa nifas) tidak berbau busuk, tidak terjadi infeksi, terpenuhinya makanan dan cairan, dan bayi dapat menyusui dengan baik.

#### c. Periode *late postpartum* (1 minggu-5 minggu)

Dalam fase berikut, diperlukan pemulihan dan ibu *postpartum* harus tetap melakukan pemeriksaan secara teratur sesuai anjuran.

#### 4. Perubahan Fisiologi Pada *Postpartum*

##### a. Perubahan Sistem Reproduksi

##### 1) Uterus

##### a) Pengerutan uterus (Involusi uteri)

Tahap kembalinya rahim ke keadaan sebelum mengandung dan melahirkan disebut proses involusi. Prosedur ini dilakukan ketika plasenta diangkat akibat kontraksi otot-otot polos rahim. Dalam fase berikut, fundus uteri terletak di garis tengah, sekitar 2 cm di bawah umbilikus dengan bagian fundus bersandar pada promontorium sakralis. Ukuran rahimnya kurang lebih sama dengan usia kehamilan 16 minggu dan beratnya kurang lebih 100 gram.

*Gambar 1.1 Perubahan Uterus Postpartum*



Sumber Azizah, 2019


Dengan palpasi yaitu bagian TFU (tinggi fundus uteri) dapat diketahui dari perubahan uterus.

- (1) Fundus uteri setinggi pusat dengan berat 1000 gram, saat bayi lahir
- (2) TFU teraba 2 jari di bawah pusat, setelah plasenta lahir
- (3) TFU teraba pertengahan pusat, dalam minggu pertama
- (4) TFU teraba di atas simfisis dengan berat 350 gram, dalam minggu kedua

- (5) Fundus uteri mengecil (tidak teraba) dengan berat lima puluh gram dalam enam minggu setelah persalinan.

Perubahan ini berkaitan erat dalam perubahan *myometrium* bersifat protolisis

*Gambar 1.2 TFU Involusi Uteri 1*



*Sumber Triana, 2018*

Proses involusi uterus dapat digambarkan sebagai berikut:

- (1) Iskemia *myometrium*

Setelah pengeluaran plasenta membuat uterus relatif anemia dan mengalami atrofi serat otot karena kontraksi dan retraksi yang terus-menerus

- (2) Autolisis

Autolisis adalah tahap di mana otot uterus hancur sendiri. Dalam proses yang disebut sebagai perusakan secara langsung jaringan hipertrofi yang berlebihan, enzim proteolitik selama kehamilan akan memendekkan jaringan otot yang sudah kendor hingga panjangnya sepuluh kali lipat dan lebarnya lima kali lipat dari semula.

### (3) Atrofi jaringan

Jaringan yang berproliferasi adanya estrogen dalam hitungan banyak, kemudian mengalami atrofi sebagai reaksi dalam penghentian produksi estrogen yang menyertai terlepasnya plasenta.

### (4) Akibat oksitoksin

Intensitas kontraksi uterus meningkat dengan cepat setelah melahirkan. Hormon oksitoksin yang berasal dari kelenjar hipofisis mengatur kontraksi uterus dan pelebaran rahim serta membantu proses homeostasis. Perdarahan dan bekas luka di tempat implantasi plasenta dapat dikurangi melalui proses ini.

#### 2) Perubahan pada alat kelamin perempuan

Beberapa hari setelah melahirkan, dua jari dapat melewati ostium externum, tetapi bagian pinggirnya retak karena robekan persalinan. Pada akhir minggu pertama, satu jari saja yang dapat melewati dan lingkaran retraksi terhubung ke bagian dari saluran serviks (Sukma, 2021).

#### 3) Perubahan pada cairan vagina (lochia)

Lochia merupakan adanya pengeluaran cairan *secret* pada *cavum* uteri. Ada beberapa macam lochia yaitu :

##### a) Lochia *rubra*

Darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, verniks *caseosa* lanugo (bulu halus bayi yang baru lahir), dan mekonium (isi usus janin yang cukup bulan terdiri dari air ketuban dan getah kelenjar usus berwarna hijau kehitaman). Lochia ini akan terjadi dalam 2 hari pasca melahirkan.

b) *Lokia sanguinolenta*

Terdapat darah dan lendir yang berwarna merah kuning. Lokia berlangsung dari hari ke tiga hingga tujuh setelah partus.

c) *Lokia serosa*

Terdapat cairan yang berwarna kuning kecokelatan. Lokia ini terjadi hari ke tujuh hingga empat belas setelah melahirkan.

d) *Lokia alba*

Terdapat cairan putih dan terjadi hari setelah dua minggu.

e) *Lokia purulenta*

Lokia ini terjadi disebabkan adanya infeksi atau keluarnya cairan seperti nanah berbau busuk.

b. Perubahan Sistem Pencernaan

Pasca proses persalinan dinding abdominal akan menjadi lunak disebabkan perut meregang selama kehamilan. Setelah persalinan, ibu mengalami diastatis recti, yang berarti dua otot abdomen paralel terpisah. Ini terjadi disebabkan peregangan otot abdomen selama kehamilan.

Nafsu makan ibu bertambah pada masa ibu nifas. Saat persalinan alat pencernaan ibu *postpartum* mendapatkan tekanan, pengeluaran cairan yang berlebih, kurang makan, hemoroid, robekan jalan lahir, pembengkakan prenatal yang disebabkan episiotomi karena ibunya mengalami terjadi konstipasi.

### c. Perubahan Sistem Perkemihan

Pasca tahap persalinan terjadi, ibu *postpartum* mengalami sukar sekali buang air kecil dalam 24 jam pertama. Tekanan yang terjadi antara tulang pubis dan kepala janin selama persalinan menyebabkan spasme sfingter dan edema leher kandung kemih (Sukma, 2021). Dalam waktu 12-36 jam pasca melahirkan akan menghasilkan urine dalam jumlah yang banyak. Pasca keluarnya plasenta, kadar hormon estrogen yang menahan air akan menurun secara signifikan, menyebabkan diuresis (Sumarni, 2019).<sup>11</sup>

### d. Sistem Muskuloskeletal

Di hari pertama ibu pasca persalinan abdomen ibu akan terlihat serupa saat mengandung. Setelah 2 minggu persalinan, dinding perut ibu bakal rileks. Sehingga dibutuhkan dalam waktu 6 minggu mengalami perubahan dinding perut seperti keadaan sebelum hamil. Kulit mencapai kembali kelenturannya, hanya saja beberapa bagian striae menetap.

### e. Sistem Endokrin

Pasca persalinan terjadinya penurunan hormon plasenta, selama tiga jam hingga tujuh hari sebagai omset pemenuhan *mammae* pada hari ketiga ibu nifas, HCG menurun sampai 10%. Dalam waktu dua minggu, hormon pituitari prolaktin meningkat sehingga menyebabkan wanita dapat menyusui. FSH dan LH akan mengalami kenaikan pada minggu ke-3. Pasien mengalami penurunan kadar estrogen yang signifikan setelah persalinan, sehingga aktivitas prolaktin

---

<sup>11</sup> Sumarni Asuhan Kebidanan Ibu PostPartum (Gowa, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2019)

meningkat, yang dapat berdampak pada kemampuan kelenjar *mammae* untuk menghasilkan ASI.

f. Sistem Kardiovaskuler

Beberapa faktor bertanggung jawab atas perubahan volume darah pasca persalinan termasuk kehilangan darah, peningkatan curah jantung, dan perubahan dalam hematologi, seperti penurunan fibrinogen dan plasma yang cepat serta peningkatan kadar leukosit, plasma, dan faktor pembekuan darah selama beberapa minggu. Pada ibu nifas akan mengalami perubahan tanda-tanda vital, yaitu:

1) Suhu tubuh

Selama 24 jam setelah melahirkan, temperatur tubuh sedikit meningkat (37,5–38°C) sebagai akibat kerja persalinan yang berlangsung lebih lama dari perkiraan dan menyebabkan lebih sedikit kram dan perdarahan. Jika keadaan uterus berjalan seperti biasa, maka badan tersebut akan menjadi biasa. Karena adanya ASI yang membeku, suhu tubuh biasanya naik lagi pada hari ketiga.

2) Nadi

Setelah persalinan, denyut nadi akan lebih cepat. Ini adalah hal yang normal untuk orang dewasa dengan denyut nadi 60-80 kali per menit. Setiap denyut nadi yang lebih dari 100x/menit merupakan hal yang tidak normal dan menandakan adanya tanda-tanda peradangan.

3) Tekanan Darah

Setelah persalinan, tekanan darah biasanya rendah karena perdarahan. Tekanan darah tinggi mungkin merupakan indikasi preeklampsia masa nifas.

Tekanan darah normal pada tekanan darah sistole 90-140 mmHg dan tekanan darah diastole 60-90 mmHg.

g. Sistem Hematologi

Selama proses persalinan, jumlah sel darah putih meningkat hingga 15.000 di hari pertama *postpartum*, tetapi jika wanita melahirkan lebih lama, jumlah sel darah putih dapat meningkat hingga 25.000 atau 30.000 tanpa adanya kondisi patologis.

Dalam persalinan pervaginam kehilangan darah normal adalah 500 mililiter, *sectio caesaeria* 1000 ml, histerektomi *caesaeria* 1500 ml. Jumlah total darah yang hilang hingga akhir masa *postpartum* adalah 1500 ml, yaitu 200-500 ml pada saat persalinan, 500-800 ml pada minggu pertama *postpartum* ± 500 ml pada saat *puerperium* selanjutnya. Setelah tiga minggu *postpartum*, volume darah kembali normal. Setelah empat hingga enam minggu *postpartum*, hemoglobin normal akan kembali.

5. Perubahan Psikologis Pada *Postpartum*

a. Adaptasi Psikologis Ibu *Postpartum*

Proses kehamilan, persalinan Kehamilan, persalinan, nifas dan menjadi seorang ibu adalah peristiwa transisi yang normal bagi seorang wanita. Namun, banyak perempuan yang mengalami stres selama masa transisi ini karena tidak siap memulai peran baru. Secara psikologis, seorang ibu baru melahirkan mengalami perubahan emosi selama *postpartum* sebagai akibat dari adaptasinya sebagai seorang ibu. ketidaknyamanan setelah melahirkan,

perubahan dalam keluarganya, dan perubahan citra tubuhnya adalah semua hal yang membuat ibu berjuang untuk beradaptasi. Ibu yang baru melahirkan mungkin tidak mudah menyesuaikan diri dengan kondisi normal baru mereka.

Periode masa nifas merupakan suatu keadaan krisis yang disebabkan oleh beberapa perubahan fisik dan psikis yang memerlukan proses adaptasi atau penyesuaian. Menurut Reva Rubin, ada tiga fase proses adaptasi psikologis, sebagai berikut:

1) *Taking In*

Fase ini membutuhkan perhatian karena menyebabkan depresi pasca persalinan yang bahkan dikenal sebagai "*postpartum blues*". Terjadi hari ke-1 dan hari ke-2 setelah melahirkan. Pada tahap ini, ibu berkonsentrasi pada dirinya sendiri, masih butuh bantuan dengan orang sekitarnya, lebih pasif, mengulang pengalamannya tentang melahirkan. Dengan berempati dan memahami keadaan emosi ibu, intervensi yang efektif dapat dilakukan pada tahap ini.

2) *Taking Hold*

Tahap transisi dari ketergantungan menjadi mandiri. Terjadi dari hari ketiga hingga hari sepuluh setelah persalinan. Ketika ibu merawat bayinya, dia lebih memperhatikan bagaimana menjadi orang tua dan tanggung jawabnya. Saat ini, orang tua lebih sensitif dan membutuhkan komunikasi yang baik serta dukungan kesehatan mental. Kegagalan yang sering terjadi pada fase ini sehingga menyebabkan ibu mengalami depresi pasca melahirkan, suatu kondisi di mana ibu menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan

mengasuh bayinya. Pada tahap ini, ibu berperan dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan bayinya, maka dari itu pendidik kesehatan dapat menawarkan berbagai program pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan ibu. Selain memberikan kesadaran diri dan kepercayaan diri yang lebih terhadap kemampuannya dalam mengasuh bayinya, rawat gabung juga memberikan ibu lebih penerimaan diri dalam merawat bayinya hingga di rumahnya nanti.

### 3) *Letting Go*

Periode ini biasanya berlangsung setelah ibu dan bayi kembali ke rumah. Ibu bertanggung jawab kepada bayinya dan menerima peran barunya secara mandiri. Pada tahap ini keinginan mengasuh diri dan bayinya telah meningkat. Untuk membuat ibu tidak merasa terbebani, suami dan keluarganya harus mendukungnya.

#### b. *Postpartum Blues*

Depresi pasca persalinan adalah kondisi umum yang menyerang 50-80% wanita pasca persalinan, sering kali berlangsung selama tiga hingga empat hari, namun terkadang dapat berlangsung hingga enam minggu. Penyebab pasti dari *postpartum blues* belum diketahui namun perubahan hormon seperti yang disebabkan oleh progesteron, estrogen, dan prolaktin tampaknya berkaitan erat dengan produksi ASI. Hal ini mungkin juga menjadi faktor penyebab munculnya *postpartum blues*, yaitu:

- 1) Setelah persalinan ibu merasa kehilangan fisik.
- 2) Ibu merasa kehilangan menjadi pusat perhatian dan kepedulian.

- 3) Mengalami ketidaknyamanan fisik dan emosi yang tidak stabil.
- 4) Ibu diasingkan dari keluarga dan bayi-bayinya.
- 5) Kebijakan rumah sakit yang kaku atau tidak fleksibel sering menyebabkannya.

*Postpartum* blues menunjukkan pentingnya dukungan sosial, terutama dari orang sekitar dan anggota keluarga. Penting untuk diingat bahwa hubungan ini dapat mengurangi kemungkinan depresi pasca melahirkan. Salah satu cara mengatasi depresi pasca melahirkan dan mengatasinya ialah memberikan edukasi pada ibu hamil hingga 12 bulan setelah melahirkan. Edukasi yang harus diberikan selama masa nifas adalah tentang cara merawat bayi dan proses laktasi dalam mencegah dan mengatasi masalah menyusui. Studi menunjukkan bahwa masalah menyusui dapat meningkatkan risiko depresi pasca persalinan.

#### c. Kesedihan dan Duka Cita

Duka cita merupakan tanggapan fisiologis dalam kegagalan. Penyebab Kegagalan duka cita biasanya disebabkan suatu keinginan untuk meninggalkan sakit yang intens. Duka cita sangat berbeda-beda tergantung apa yang terjadi dan persepsi masing-masing orang. Taraf kehilangan ditentukan melewati tanggapan individu. Penyebab kegagalan tersebut antara lain infertilitas, keguguran, *Intrauterine fetal death* (IUFD), penyakit bawaan, dan bayi meninggal. Proses duka cita terdiri dari langkah-langkah berikut:

- 1) Reaksi awal terhadap kegagalan *shock*; contoh respons tahap ini adalah ketidakmampuan memahami, ketakutan, kesepian, merasa bersalah, menangis, memberontak, irasional, dan kehilangan konsentrasi.
- 2) Realitas dan penerimaan adalah kehilangan sesuatu dan mengubah atau menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi. Karena keadaan ini, pasien membuat pembiasaan yang harus direncanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan seperti “mengapa”, “jika”, dan “bagaimana” mulai muncul. Pertanyaan ini akan menimbulkan perasaan marah, bersalah, dan takut. Ekspresi, yaitu menangis sangat penting untuk kesembuhan.
- 3) Pada tahap resolusi, orang menjadi lebih aktif kembali tetapi pada tahap resolusi, mereka mulai menerima keterbatasannya dan membangun hubungan baru. ini individu menjadi lebih aktif kembali, sedangkan fase resolusi merupakan tahap di mana individu mulai menerima keterbatasannya dan menjalin hubungan baru. Orang-orang di sekitarnya dan tenaga kesehatan sangat berpengaruh. Membantu ibu yang sedih adalah peran yang sangat penting bagi ibu. Khususnya pada bayi yang lahir tidak sempurna (kelainan kongenital), bidan berperan dalam menyediakan lingkungan yang tenang, memberi dukungan, mendengarkan keluhan, menghindari penilaian, dan memberi bimbingan untuk berusaha menerima bayinya. Karena ini merupakan wujud duka cita, ibu berkesempatan untuk menceritakan perasaan mereka berulang-ulang. Untuk membantu ibu melewati tahap ini, berikan informasi tentang kelainan bayinya serta penyebabnya.

## 6. Kebutuhan Dasar Masa Nifas

Untuk memaksimalkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan, pendidikan kesehatan dan intervensi dari para ahli kesehatan dapat membantu perempuan menghadapi hari-hari pasca persalinan yang tidak sehat atau ketidakseimbangan. Informasi terbaru tentang perawatan masa nifas dapat membantu orang memahami dan meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perawatan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan dalam masa nifas, pengasuhan secara tatap muka juga disarankan. Kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi selama masa nifas adalah sebagai berikut:

### a. Nutrisi dan cairan

Pertimbangan pola makan di masa nifas memerlukan pertimbangan yang matang. Diet harus tinggi kalori, rendah lemak, dan tinggi protein. Nutrisi yang tepat akan mempercepat proses pembentukan dan pemeliharaan kesehatan, yang sayangnya akan berdampak negatif terhadap produksi ASI (Saleha, 2009)<sup>12</sup>. Kebutuhan ibu pada masa nifas, dapat dipenuhi dengan:

- 1) Konsumsi 500 kalori setiap hari dari makanan.
- 2) Menjaga pola makan seimbang untuk memastikan kecukupan asupan protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin.
- 3) Minum air putih sekitar tiga liter per hari.
- 4) Konsumsi zat besi selama 40 hari setelah melahirkan.

---

<sup>12</sup> Saleha Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas (Jakarta, Salemba Medika, 2009)

5) Konsumsi kapsul vitamin A sebesar 200.000 UI.

Jika membahas jenis makanan yang boleh dikonsumsi, Al-Quran menganjurkan dua jenis yaitu halal dan baik (tayib). Ada pula ayat-ayat tertentu yang menghubungkan kedua definisi tersebut, seperti Q.S Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Kementerian Agama, 2019)

Menurut Tafsir Al-Misbah, penjelasan ayat tersebut tentang makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agamanya. Makanan haram ada dua macam yakni yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah; dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini (Tafsir-Al-Mishbah).

Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam yaitu wajib, sunah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah SWT. selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang

kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan halal, tetapi tidak bergizi dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah halal lagi baik (Shihab, 2014).

#### b. Mobilisasi

Proses mobilisasi melibatkan berjalan kaki, dengan variasi sesuai masalah kasus pasien, dan kondisi kesehatan. Ibu dengan persalinan normal dapat bergerak setelah dua jam melahirkan. Namun, ibu dengan persalinan *sectio caesarea* yang mendapatkan anestesi dapat melakukan mobilisasi dengan miring kanan atau kiri di tempat tidur setelah 12 jam, duduk, bangun dan turun dari tempat tidur antar 24 hingga 48 jam setelah melahirkan. Ibu yang melakukan mobilisasi dengan benar dan tepat akan segera pulih.

#### c. Eliminasi

1) Miksi kadang-kadang ibu nifas mengalami kesulitan BAK yang disebabkan adanya penekanan kepala janin sehingga sfingter uretra tertekan dan spasme oleh iritasi muskulo sfingter ani selama proses tersebut, serta akibat edema kandung kemih yang terjadi selama proses tersebut. Dianggap khas jika miksi muncul dalam waktu enam jam setelah melahirkan. Jika setelah 8 jam berkemih masih belum mencapai atau mendekati 100 cc, akan dilakukan katerisasi.

2) Buang air besar idealnya dilakukan tiga sampai empat hari setelah melahirkan. Jika BAB masih kesulitan dan terjadi sembelit, obat oral akan diresepkan. Jika masih tidak bisa maka dilakukan menggunakan klisma.

#### d. *Personal Hygiene*

Infeksi selama nifas sangat mungkin terjadi pada ibu. Pencegahan infeksi dilakukan dengan kebersihan diri. Penting untuk mempertimbangkan tidak hanya kesejahteraan diri sendiri tetapi juga lingkungan sekitar. Berikut ini adalah kebersihan diri yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Sebelum dan setelah membersihkan alat kelamin, cuci tangan dengan sabun dan air.
- 2) Gunakan teknik yang benar untuk membersihkan area di sekitar vulva, mulai dari depan ke belakang lalu area di sekitar anus.
- 3) Jangan lupa membersihkan vulva setiap kali BAK dan BAB.
- 4) pergantian pembalut dilakukan setiap enam jam atau setidaknya dua kali per hari.
- 5) Pada daerah luka episiotomi atau laserasi harus dibiarkan kering.

#### e. *Istirahat*

Untuk menjaga kondisi kesehatan dan produksi ASI tetap optimal, ibu *postpartum* harus mendapatkan pola istirahat yang cukup, dan ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan setelah persalinan:

- 1) Istirahat yang cukup untuk mencegah kelelahan
- 2) Melakukan pekerjaan rumah tangga dengan perlahan
- 3) Saat bayi tidur, istirahat siang
- 4) Melibatkan anggota keluarga dalam pekerjaan rumah dan merawat bayi.

Kebutuhan istirahat yang tidak terpenuhi dapat menghambat produksi ASI, memperlambat proses involusi dan menyebabkan depresi pasca persalinan.

#### f. Seksual

Ketika luka episiotomi sembuh dan pengeluaran lochia berhenti, hubungan seksual dapat dilakukan dengan aman. Jika ibu melahirkan secara normal, disarankan untuk menunda berhubungan intim sampai masa nifas selesai atau sampai 6 minggu pasca persalinan. Sedangkan jika ibu melahirkan secara operasi *Caesar* atau menjalani episiotomi saat persalinan normal, maka waktu yang tepat berhubungan seksual ialah setelah luka jahitan akibat tindakan ini pulih. Lama waktu pemulihan tergantung pada kondisi fisik dan perawatan luka yang dilakukan setelahnya.

Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan berhubungan seksual terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 222, sebagai berikut :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَظَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri (Kementerian agama, 2019).

Sejenis darah yang keluar bersama cairan yang siap untuk mempersiapkan fertilisasi di uterus wanita disebut haid. Dilepaskan secara berkala, bergantung pada tahapan pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti ini dianggap kotor dan membuat perempuan tidak suci secara syar'i, termasuk untuk berhubungan seksual dengan suaminya.

Menurut Tafsir Al-Misbah, penjelasan ayat tersebut ialah kata **مَحِيضٍ** (mahidh) mengacu pada lokasi, waktu haid atau haid sebenarnya. Yaitu haid merupakan gangguan. Meskipun demikian, haid juga menyebabkan gangguan terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis perempuan dan juga terhadap laki-laki. Secara fisik, perempuan mengalami masalah karena keluarnya darah baru. Kedatangan tamu bulanan menyebabkan emosi yang sering kali tidak terkendali dan mengurangi nafsu seksual perempuan. Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan pada pria. Oleh karena itu, dalam ayat juga diartikan *jauhilah istri pada waktu haid*, dalam artian tidak melakukan hubungan seksual pada waktu mereka mengalami haid atau pada lokasi di mana haid itu keluar. Maksudnya boleh mendekati apabila bukan pada tempat gangguan tersebut. Jadi kapan kita bisa berhubungan seks? Kapan saja, tetapi dengan syarat tidak mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersih, campurilah mereka sesuai dengan perintah Allah kepadamu (Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.Quraish-Shihab-Z).

g. Senam nifas

Sebagian besar senam *postpartum* sebenarnya mirip dengan senam antenatal. Yang penting bagi ibu adalah melakukannya dengan perlahan, kemudian semakin sering dan kuat. Ada beberapa faktor yang menentukan kesiapan ibu untuk memulai senam *postpartum*:

- 1) Tingkat kesegaran tubuh ibu sebelum kelahiran bayi
- 2) Apakah ibu telah mengalami persalinan yang panjang dan sulit atau tidak
- 3) Apakah bayinya mudah dirawat atau rewel.

Beberapa keuntungan dari senam nifas, sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki sirkulasi darah untuk menghindari trombosis pembuluh darah, terutama pembuluh tungkai.
- 2) Memperbaiki postur tubuh setelah kehamilan dan persalinan dengan menguatkan dan memulihkan otot punggung.
- 3) Memperbaiki tonus otot pelvis
- 4) Memperbaiki regangan otot tungkai bawah
- 5) Memperbaiki regangan otot perut setelah hamil dan melahirkan
- 6) Meningkatkan kesadaran akan relaksasi otot dasar panggul
- 7) Mempercepat proses involusi organ reproduksi.

h. Kontrasepsi

Menurut WHO jarak kehamilan harus 24 bulan atau 2 tahun. Untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, ibu nifas dan keluarga harus memperhatikan tentang penggunaan alat kontrasepsi setelah persalinan. Setelah persalinan, penggunaan alat kontrasepsi dapat melindungi ibu dari

risiko kehamilan karena menjalani proses kehamilan membutuhkan kondisi fisik dan mental yang sehat serta stamina yang kuat. Dengan menggunakan alat kontrasepsi, ibu dapat mengatur jarak kehamilan sehingga dapat melahirkan pada waktu yang direncanakan. Untuk wanita yang baru saja melahirkan, waktu yang tepat untuk melakukan menggunakan alat kontrasepsi adalah setelah persalinan, sebelum mereka meninggalkan rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Namun, kondisi ini bervariasi tergantung pada alat kontrasepsi yang dipilih ibunya dan apakah ibu berencana untuk menyusui bayinya.

#### 7. Manajemen Laktasi

ASI merupakan cairan hidup yang dinamis, memiliki kandungan gizi beragam dan lengkap. ASI dengan segala kandungannya sesuai dengan keadaan bayi yang bersifat alami, bukan sintetik sehingga aman dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kandungan utama ASI sebanyak 88% adalah air. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan pada bayi.

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja sejak bayi dilahirkan sampai usia 6 bulan. Selama itu bayi tidak diharapkan mendapatkan tambahan cairan lain seperti susu formula, air jeruk, air teh, madu ataupun air putih. Pada pemberian ASI Eksklusif bayi juga tidak diberikan makanan tambahan seperti pisang, biskuit, bubur susu, bubur tim, dan sebagainya. Pemberian ASI secara benar akan dapat mencukupi kebutuhan bayi selama 6 bulan tanpa makanan pendamping. Setelah bayi berusia lebih dari 6 bulan, memerlukan makanan

pendamping tetapi pemberian ASI dapat dilanjutkan sampai bayi berusia 2 tahun, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran yang diturunkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا نُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Terjemahnya :

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Kementerian agama, 2019).

Menurut Tafsir Al-Misbah, penjelasan ayat tersebut telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Dengan menyusui pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram; sebab menurut penelitian ilmunan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Dalam hal ini Al-Quran mengisyaratkan bahwa penyusuan akan dianggap sempurna jika diberikan selama dua tahun. Dapat disimpulkan

bahwasanya tuntutan bagi orang tua yang ingin menyempurnakan masa penyusuannya yakni kurang dari dua tahun, tidaklah apa-apa akan tetapi meski anjuran atau perintah yang ditetapkan merupakan kewajiban, masa dua tahun merupakan masa yang maksimal untuk penyempurnaan karena ASI adalah asupan makanan terbaik (Shihab, 2014).

a. Anatomi Payudara

Payudara (*mammae*, susu) merupakan kelenjar yang terletak di bawah kulit, di atas otot dada dan fungsinya memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara, masing-masing dengan berat 200gram, dan kelenjar payudara kiri biasanya lebih besar dari yang kanan. Payudara terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- 1) Korpus (badan), yaitu bagian yang membesar
- 2) Areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah
- 3) Papila, atau *putting* yaitu bagian yang menonjol di atas payudara.

Alveolus, bagian terkecil dari korpus *mammae*, memproduksi ASI. Alveolus terdiri dari beberapa sel aciner, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos dan pembuluh darah. Beberapa alveolus berkumpul menjadi *lobules*, yang kemudian berkumpul menjadi 15-20 lobus pada tiap payudara. Alveolus mengirimkan ASI ke dalam saluran kecil yang disebut duktulus. Kemudian beberapa saluran kecil bergabung untuk membentuk saluran yang lebih besar yang disebut duktus *laktiferus*.

Sinus *laktiferus*, saluran yang besar di bawah areola, melebar. Otot polos terletak di dalam dinding alveolus dan saluran-saluran yang berkontraksi memompa ASI keluar.

*Gambar 2.1 Anatomi Payudara*



(sumber Febi, 2021)

#### b. Fisiologi Laktasi

Laktasi atau menyusui mempunyai dua pengertian, yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Payudara mulai dibentuk sejak embrio berumur 18-19 minggu, dan baru selesai ketika mulai menstruasi. Dengan terbentuknya hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk maturasi alveoli. Sedangkan hormon prolaktin adalah hormon yang berfungsi untuk produksi ASI di samping hormon lain seperti insulin, tiroksin dan sebagainya.

Dua refleks pada ibu yang sangat penting dalam proses laktasi, refleks prolaktin dan refleks aliran timbul akibat perangsangan *putting* susu oleh isapan bayi.

- 1) Refleks Prolaktin Dalam *putting* susu terdapat banyak ujung saraf sensorik. Bila dirangsang, timbul impuls yang menuju hipotalamus selanjutnya ke kelenjar hipofisis bagian depan sehingga kelenjar ini mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon inilah yang berperan dalam produksi ASI di tingkat alveoli.
- 2) Refleks aliran (*Let Down Reflex*) rangsang *putting* susu tidak hanya diteruskan sampai ke kelenjar hipofisis depan, tetapi juga ke kelenjar hipofisis bagian belakang, yang mengeluarkan hormon oksitoksin. Hormon ini berfungsi memacu kontraksi otot polos yang ada di dinding alveolus dan didinding saluran, sehingga ASI di pompa keluar.

#### c. Komposisi Gizi dalam ASI

Studi menunjukkan bahwa ASI eksklusif meningkatkan pertumbuhan bayi pada usia enam bulan pertama, atau bahkan setelah enam bulan lebih. Bayi yang menerima ASI eksklusif memiliki kekebalan terbaik karena ASI mengandung 50% faktor kekebalan yang sudah diketahui. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan bayi diberi ASI sejak satu jam pertama setelah kelahiran. ASI telah berubah untuk memenuhi kebutuhan bayi, yaitu:

##### 1) Kolostrum

Di hari-hari pertama, ASI diproduksi biasanya selama empat hari dan bayi perlu menyusu sering untuk merangsang produksi dan keluarnya ASI.

Komposisi ASI sama dengan nutrisi yang diterima bayi di dalam uterus. Kolostrum lebih mengandung lebih banyak protein, terutama imunoglobulin (IgA, IgG, dan IgM). Mengandung protein dalam jumlah dominan dapat membantu mencegah gula darah yang rendah. Bayi telah dilatih untuk mengolah kolesterol sejak dini karena kolostrum hanya mengandung sedikit lemak dan karbohidrat. Jika dibandingkan dengan ASI matur, kolostrum mengandung zat anti infeksi 10 hingga 17 kali lebih banyak. Kolostrum, yang berwarna kuning, juga dapat berguna sebagai vaksinasi pertama.

## 2) ASI Transisi

ASI transisi mulai di produksi dari hari ke empat hingga sepuluh setelah kelahiran. Komposisi dari kolostrum ke ASI transisi berubah: kadar protein dan imunoglobulin berkurang, sedangkan kadar lemak dan karbohidrat meningkat. Volume ASI transisi juga meningkat dibandingkan dengan kolostrum, dan perilaku *supply dan demand* mulai muncul, yaitu ASI diproduksi sebanyak ASI yang dikeluarkan, tetapi ini belum benar-benar sesuai.

## 3) ASI Matur

Antara hari kesepuluh dan akhir masa laktasi atau penyapihan, ASI matur diproduksi. Per hari, ASI matur bervolume 300-850 mililiter dan mengandung *casient, riboflanum*, dan karotin. ASI matur berubah seiring perkembangan bayi. ASI ini mengandung lebih banyak lemak selama 32 malam hari, yang akan membantu meningkatkan berat badan dan pertumbuhan otak yang optimal

d. Upaya Memperbanyak ASI dan Tanda Bayi Cukup ASI

Ada beberapa cara untuk meningkatkan produksi ASI, seperti:

- 1) Berikan ASI sesering mungkin, meskipun tidak begitu banyak, tetapi dengan merangsang produksi ASI, maka akan meningkat.
- 2) Berikan ASI pada bayi dengan jumlah waktu yang lama.
- 3) Berikan ASI secara bergantian sehingga bayi tidak bosan dengan satu sisi.
- 4) Pijatan oksitoksin dengan benar dapat membantu meningkatkan ASI.
- 5) Memompa ASI setelah selesai menyusui apabila ASI masih banyak
- 6) Buatlah suasana yang tenang dan rileks sehingga bayi lebih lama menyusui.
- 7) Banyak minum air putih.
- 8) Hindari kecemasan tentang ASI yang tidak lancar.

Untuk mengetahui apakah bayi di bawah enam bulan memerlukan ASI, berikut cara mengetahuinya:

- 1) Berat lahir kembali setelah berusia 2 minggu.
- 2) Bayi sering buang air kecil enam kali atau lebih per hari
- 3) Bayi menyusui dengan rakus setiap kali menyusui, kemudian melemah dan tertidur.
- 4) Payudara ibu terasa lunak daripada sebelumnya setelah menyusui.
- 5) Kurva pertumbuhan atau berat badan dalam kartu menuju sehat (KMS) sesuai dengan seharusnya.

#### e. Pemberian ASI


Ada dua cara pemberian ASI, yaitu menyusui langsung dan pemberian ASI perah tidak langsung. Berikut langkah-langkah menyusui:

##### 1) Menyusui langsung

Karena pengeluaran ASI dipengaruhi oleh hormon oksitoksin, ibu harus merasa senang dan tenang sebelum menyusui. Kemudian, oleskan ASI ke puting dan areola, rangsang refleks *rooting* bayi dengan meletakkan jari ke mulutnya dan mulai menyusui dengan teknik menyusui yang benar.

Memerhatikan posisi dan teknik menyusui adalah cara menyusui yang benar. Bayi diposisikan untuk menyusui dengan memegangnya dengan satu lengan dan meletakkan kepalanya pada lengkung siku dan bokongnya pada lengannya. Perut bayi melekat pada perut ibunya. Bayi dengan kepala menghadap payudara, lengan dan telinga lurus. Teknik menyusui yang benar juga dipengaruhi oleh perlekatan bayi. Prinsip perlekatan yang baik adalah bayi memasukkan sebagian besar areola payudara ke dalam mulut bayi, mulut bayi terbuka lebar, bibir atas dan bawah bayi melipat keluar, dagu bayi menyentuh payudara ibu dan bayi tampak tenang.

*Gambar 2.2 Posisi Menyusui*  
**Breast-Feeding Positions**



*Gambar 2.3 Posisi Perlekatan Bayi 1*



Setelah menyusui selesai, ibu dapat menyendawakan bayi untuk menghindari kembung setelah menyusui dengan memasukkan jari kelingking ke dalam mulut bayi. Ini dapat dilakukan dengan menggendong bayi tegak ke pundak ibu dan mengusap punggung atau tengkuknya.

## 2) Pemberian ASI Perah

ASI tetap dapat diberikan meski bayi tidak di dekat ibu dengan cara melakukan perah ASI. Tiga hal yang harus diperhatikan saat melakukan perah ASI: teknik perah, penyimpanan ASI perah, dan bagaimana memberikan ASI

perah. Perah ASI dapat dilakukan secara manual dengan tangan atau dengan alat perah, dan ibu dapat memilih alat perah yang sesuai untuk bayinya. Metode untuk perah ASI dengan tangan adalah dengan menekan dan melepaskan tepi areola dengan ibu jari dan telunjuk secara berurutan. Jari tangan harus diposisikan kembali pada beberapa interval areola untuk memungkinkan semua duktus *laktiferus* drainase. Untuk memungkinkan drainase dari semua duktus *laktiferus*, jari tangan harus diposisikan kembali pada beberapa interval areola. Tidak ada batas waktu dalam setiap sesi pemerahan; perah ASI terus berlanjut sampai aliran ASI berhenti atau sampai fase deras. Tiap payudara diperah minimal dua kali. ASI dapat disimpan dalam botol plastik, beling, atau wadah khusus ASI sekali pakai yang bersih. Wadah ASI tidak perlu disterilisasi, dapat dibersihkan dengan air sabun dan dibilas dengan air. ASI harus disimpan dalam wadah yang cukup untuk satu kali

pemberian, Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan saat memberikan ASI perah:

- a) ASI harus diberikan dalam keadaan hangat,
- b) ASI yang dingin dihangatkan dengan meletakkan wadah ASI ke dalam wadah berisi air hangat.
- c) ASI yang sudah dihangatkan tidak dapat didinginkan lagi
- d) ASI harus dicairkan perlahan di bagian bawah lemari es (bukan *freezer*) jika ASI telah dibekukan sebelumnya.
- e) ASI beku yang sudah dicairkan harus digunakan dalam 24 jam, dan ASI cair tidak dapat dibekukan kembali.
- f) ASI dapat diberikan dengan menggunakan botol atau alternatif media lainnya seperti sendok lunak atau *spoon feeder*, *syringe* Pemberian dengan cangkir (*cup feeding*).
- g) Tanggal dan waktu harus ditunjukkan pada tiap wadah. ASI yang terakhir diperah itulah yang diberikan kepada bayi, sehingga bayi mendapat ASI perah yang lebih *fresh*. Namun, penting untuk mengetahui berapa lama ASI perah bertahan.

## 8. Kunjungan selama Masa Nifas

Tabel 1.1 Asuhan Selama Kunjungan Nifas

Kunjungan	Waktu	Asuhan
I	6-8 Jam <i>postpartum</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah perdarahan yang disebabkan oleh <i>atonia</i> uteri selama masa nifas.</li> <li>2. Mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan serta melakukan rujukan bila perdarahan berlanjut.</li> <li>3. Memberikan konseling kepada ibu dan keluarga tentang cara menghindari perdarahan yang disebabkan <i>atonia</i> uteri.</li> <li>4. Memulai pemberian ASI pada usia dini.</li> <li>5. Mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir.</li> <li>6. Mencegah hipotermi untuk menjaga bayi tetap sehat.</li> <li>7. Setelah melakukan pertolongan persalinan, bidan harus menjaga ibu dan bayi selama dua jam pertama setelah kelahiran atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan baik.</li> </ol>
II	6 hari <i>postpartum</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan involusi uterus berjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal.</li> <li>2. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdarahan.</li> <li>3. Memastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup.</li> <li>4. Memastikan ibu menerima makanan yang bergizi dan cairan yang cukup.</li> <li>5. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar serta tidak mengalami masalah menyusui.</li> <li>6. Memberikan konseling tentang cara merawat bayi baru lahir.</li> </ol>
III	2 minggu <i>postpartum</i>	Asuhan pada 2 minggu <i>postpartum</i> sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan 6 hari <i>postpartum</i> .
IV	6 minggu <i>postpartum</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menanyakan masalah yang dihadapi ibu selama masa nifas.</li> </ol> <p>Memberikan konseling KB secara dini.</p>

## 9. Komplikasi dan Penyakit Dalam Masa Nifas

### a. Perdarahan setelah melahirkan

Perdarahan *postpartum* didefinisikan sebagai perdarahan di atas 500 mililiter setelah melahirkan. Secara umum bila terdapat kelainan dari biasanya yang mengakibatkan perubahan tanda-tanda vital (yakni turunnya kesadaran, pucat, keringat dingin, sesak nafas, dan atau tekanan darah <90 mmHg dan nadi >100 x/menit), maka segera mengambil tindakan. (Setiawati, 2013).

Perdarahan *postpartum* dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- 1) Perdarahan *postpartum* primer adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml dalam masa 24 jam setelah anak lahir, atau perdarahan dengan volume seberapa pun tetapi terjadi perubahan keadaan umum ibu dan tanda-tanda vital sudah menunjukkan analisa adanya perdarahan. Penyebab utamanya adalah *atonia* uteri, retensio plasenta, sisa plasenta dan robekan jalan lahir. Terbanyak dalam 2 jam pertama.
- 2) Perdarahan *postpartum* sekunder adalah perdarahan dengan konsep pengertian yang sama seperti perdarahan *postpartum* primer namun terjadi setelah 24 jam *postpartum* hingga masa nifas selesai. Perdarahan *postpartum* sekunder yang terjadi dari hari kelima hingga lima belas setelah persalinan. Sisa plasenta dan robekan jalan lahir merupakan penyebab utama.

### b. Infeksi nifas

Infeksi nifas adalah keadaan yang mencakup semua peradangan alat-alat genitalia dalam masa nifas. Masuknya kuman-kuman dapat terjadi dalam

kehamilan, waktu persalinan, dan nifas. Demam nifas adalah demam dalam masa nifas oleh sebab apa pun. Morbiditas puerperalis adalah kenaikan suhu badan sampai  $38^{\circ}\text{C}$  atau lebih selama 2 hari dari dalam 10 hari *postpartum*. Kecuali pada hari pertama. Suhu diukur 4 kali secara oral.

c. Bendungan payudara

Bendungan payudara adalah peningkatan aliran vena dan limfa pada payudara dalam rangka mempersiapkan diri untuk laktasi. Bendungan terjadi akibat bendungan berlebihan pada limfatik dan vena sebelum laktasi. Payudara bengkak disebabkan karena menyusui yang tidak kontinu, sehingga sisa ASI terkumpul pada daerah duktus. Hal ini dapat terjadi pada hari ke tiga setelah melahirkan. Penggunaan bra yang keras serta keadaan puting susu yang tidak bersih dapat menyebabkan sumbatan pada duktus.

d. Mastitis

Mastitis adalah peradangan pada payudara yang dapat disertai infeksi atau tidak, yang disebabkan oleh kuman terutama *Staphylococcus aureus* melalui luka pada puting susu atau melalui peredaran darah. Tanda dan gejala meliputi, peningkatan suhu badan yang cepat dari  $39.5^{\circ}\text{C}$ - $40^{\circ}\text{C}$ , peningkatan kecepatan nadi, menggigil, sakit kepala, nyeri hebat, bengkak, inflamasi area payudara keras.

e. Abses Payudara

Mastitis yang tidak ditangani memiliki hampir 10% risiko terbentuknya abses. Tanda dan gejala abses payudara adalah adanya *discharge puting* susu purulenta, munculnya demam remiten (suhu naik turun) disertai menggigil

dan terjadi pembengkakan payudara dan sangat nyeri; massa besar dan keras dengan area kulit berwarna fluktuasi kemerahan dan kebiruan mengindikasikan lokasi abses berisi pus.

f. Infeksi luka perineum dan luka abdominal

Luka perineum adalah luka perineum karena adanya robekan jalan lahir baik karena ruptur maupun karena episiotomi pada waktu melahirkan janin. Ruptur perineum adalah robekan yang terjadi pada perineum sewaktu persalinan.

B. Landasan Al-Quran dan Hadis dalam Larangan Wanita Nifas

Dalam Islam, mengenai larangan saat nifas memiliki peraturan khusus dalam beribadah dan kegiatan sosial sehingga telah tersedia landasan hukum dan pedoman terkait larangan nifas. Larangan nifas yang telah diharamkan selama periode tersebut, ialah :

1. Shalat

Telah disepakati dalam Islam semua ulama Mazhab sepakat melarang perempuan nifas untuk melakukan salat begitu pun dengan salat wajib dan salat sunah. Berikut dalil dalam Islam terkait larangan wanita haid dan nifas melakukan salat berdasarkan Hadist Bukhari No. 1951 dan Muslim No. 80

bahwa Abu Said, beliau berkata bahwa Nabi bersabda : *“Bukanlah wanita Haid tidak salat dan tidak puasa? Demikianlah kekurangan agamanya”*.

## 2. Puasa

Wanita haid dan nifas telah disepakati oleh para ulama dalam Islam bahwa dilarang berpuasa namun wajib mengqada atau mengganti puasanya setelah wanita itu suci.

## 3. Tawaf

Wanita haid dan nifas dilarang untuk melakukan tawaf berdasarkan pendapat jumhur ulama karena tawaf membutuhkan kesucian.

## 4. Menyentuh Mushaf dan Membaca Al-Quran

Menurut kesepakatan ulama Mahzab bahwa wanita haid dilarang menyentuh alquran, yakni ditemukan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79 berbunyi : *“Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan”*. Apabila dalam keadaan darurat seperti jika dikhawatirkan mushaf tenggelam, terbakar atau terkena najis atau jatuh ke tangan orang kafir, maka perempuan haid wajib membawanya tetapi tidak boleh dengan sengaja, menurut ulama Syafi'iyah.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa selama perempuan tersebut tidak menyentuh mushaf maka dibolehkan berinteraksi dengan Alquran atas ketentuan bahwa perempuan itu ialah penghafal Alquran, pengajar Alquran

dan sedang murajaah Alquran, namun para ulama tetap mengingatkan untuk perempuan haid menjaga dan menghormati mushaf Alquran.

#### 5. Berdiam di masjid

Setiap pemuka agama sepakat bahwa perempuan yang sedang haid dan nifas tidak diperbolehkan berada di masjid, sedangkan pendapat lain dari Mazhab Syafii dan Hanabilah mengatakan boleh kalau hanya lewat jika tidak takut mengotori masjid karena mengotori masjid dengan najis atau sesuatu yang kotor merupakan haram.

#### 6. Larangan melakukan hubungan suami istri

Larangan melakukan hubungan suami istri terhadap perempuan haid dan nifas telah dijelaskan dengan baik dalam dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, bahwa Istri yang sedang mendapatkan haid dan nifas diharamkan bersama suami kecuali bersenggama, begitu pula suami dilarang memaksa istrinya yang sedang haid untuk berhubungan badan (Afrianty, 2023).<sup>13</sup>

### C. Asuhan Manajemen Kebidanan

#### 1. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar

Pada tahap pertama, perhatian diberikan pada kondisi fisik dan psikologis ibu, tingkat kenyamanan, perilaku bonding, dan adaptasi terhadap perubahan yang dibutuhkan untuk menjadi ibu yang mengumpulkan seluruh

---

<sup>13</sup> Afrianty Masa Nifas dalam Berbagai Perspektif (Sumatera Barat, Get Press Indonesia, 2023)

informasi (data) yang akurat dan menyeluruh dari segala sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien. Untuk meninjau data, gunakan metode ini:

- a) Data identitas pasien akan diperoleh selama proses anamnesis, riwayat kesehatan dan tidak adanya keluhan pada ibu, riwayat prenatal dan *intranatal* yang lalu, riwayat menstruasi, riwayat pola kehidupan sehari-hari, riwayat kontrasepsi, data psikososial ekonomi dan spiritual dan pengetahuan pasien.
- b) Pada pemeriksaan fisik akan didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal, tidak ada pembengkakan pada payudara, adanya kontraksi pada uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus atau involusi uteri turun 1 cm per hari, *vesika urinaria* selalu dikosongkan, pengeluaran lochia yang normal dan tidak ditemukan tanda-tanda infeksi pada bekas luka jahitan, tidak ditemukan hemoroid pada anus, tidak didapatkan adanya edema dan varises pada ekstremitas, dan pada hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya masalah. Jadi semua pemeriksaan dalam batas normal yang akan didapatkan pada ibu nifas normal.

## 2. Langkah II : Merumuskan Diagnosa atau Masalah Aktual

Pada tahap ini akan didapatkan diagnosis *postpartum* hari pertama hingga masa nifas berlangsung selama 40 hari dengan didukung data subjektif meliputi adanya keluhan perutnya merasakan nyeri dan data objektif menemukan TTV dalam batas normal, payudara, uterus, *vesika urinaria*, genitalia, perineum dan ekstremitas dalam keadaan baik dan tidak ada

kelainan, proses menyusui baik, lokia normal dan mengeluarkan bau serta interpretasi data untuk menguatkan hasil diagnosa pada ibu *postpartum*.

### 3. Langkah III : Merumuskan Diagnosa Atau Masalah Potensial

Pada tahap ini jika ditemukan komplikasi luka perineum maka yang terjadi infeksi luka perineum, jika ditemukan masalah pengeluaran ASI maka yang terjadi bendungan payudara dan infeksi payudara, jika ditemukan kontraksi uterus kurang baik maka yang terjadi retensio plasenta dan perdarahan vaginam, jika terjadi luka pada *putting* susu maka yang terjadi mastitis, dan jika terjadi masalah psikologi atau kecemasan maka bisa menurunkan kontraksi uterus, perdarahan pervaginam, dan menurunkan produksi ASI sehingga bayi tidak terpenuhi kebutuhan cairannya.

### 4. Langkah IV : Penanganan Segera atau Kolaborasi

Langkah keempat mencerminkan proses kesinambungan dengan manajemen kebidanan. Jadi, manajemen tidak hanya berlangsung selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal saja, tetapi juga selama wanita tersebut dalam pendampingan bidan. Misalnya, jika terjadi masalah atau komplikasi yang didapatkan selama pemeriksaan maka bidan memerlukan tindakan segera dan kolaborasi atau berkonsultasi dengan dokter atau tim medis lain seperti pekerja sosial, ahli gizi atau seorang ahli perawatan klinis bayi baru lahir. Dalam hal ini, bidan harus memiliki kemampuan mengevaluasi kondisi setiap pasien untuk menentukan kepada siapa konsultasi dan kolaborasi dilakukan. Selain itu, rumusan ini mencakup

tindakan segera yang dapat dilakukan secara rujukan, kolaborasi, atau secara mandiri.

#### 5. Langkah V : Rencana Tindakan

Pada tahap ini, tindakan yang akan dilakukan yaitu pemantauan keadaan ibu, tanda-tanda vital, TFU, kontraksi uterus, pengeluaran *urine*, produksi dan pengeluaran ASI, dan memantau tanda-tanda bahaya seperti perdarahan vaginam, lochia yang berbau busuk, nyeri hebat di bagian bawah perut, sakit kepala menetap hingga mengganggu penglihatan, pembengkakan di wajah dan tungkai, demam dan muntah, payudara merah, bengkak dan keras.

Melakukan konseling mengenai *health education* seperti gizi, menjaga *personal hygiene*, istirahat dan tidur, ambulasi, keluarga berencana, mengajarkan senam ibu nifas, mengajarkan perawatan bayi sehari-hari, mengajarkan ibu perawatan payudara, mengajarkan ibu teknik menyusui dengan benar, memfasilitasi untuk menjadi orang tua seperti memberikan dukungan dan keyakinan akan kemampuan atau kesiapan sebagai orang tua.

Memberikan pemahaman kepada ibunya bahwa tanggung jawabnya akan bertambah sehingga nantinya ibu akan mengalami kelelahan, khawatir dan rasa cemas. Menganjurkan ibu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah

SWT dengan berbagai cara, seperti mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, berzikir, memperbanyak doa.

#### 6. Langkah VI : Implementasi

Di langkah enam, akan dilakukan tindakan sesuai dengan rencana tindakan di langkah V. Pelaksanaan ini biasanya dilakukan oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh pasien atau anggota tim kesehatan lainnya. Walaupun bidan tidak melakukannya sendiri, namun ia tetap bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya.

#### 7. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini, akan mengevaluasi kembali asuhan yang telah diberikan yakni tanda-tanda vital dalam batas normal, tinggi fundus uteri sesuai dengan involusi uteri, kontraksi uterus baik teraba keras maupun bundar, lokia normal, tidak ada hambatan pada proses menyusui, dan tidak ada tanda bahaya atau infeksi. Ibu mengerti dan bersedia melakukan hal yang telah dianjurkan.

#### D. Manajemen kebidanan dengan metode SOAP

1. S (subjektif), Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data pasien melalui anamnesis sebagai Langkah Varney I yang terdiri dari riwayat kesehatan dan tidak adanya keluhan pada ibu, riwayat prenatal dan intranatal yang lalu, riwayat menstruasi, riwayat pola kehidupan

sehari-hari, riwayat kontrasepsi, data psikososial ekonomi dan spiritual dan pengetahuan pasien.

2. O (objektif), menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik pasien, hasil laboratorium juga uji diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung sebagai asuhan Langkah Varney II

3. A (analisa), menggambarkan pendokumentasian tentang analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam satu identifikasi:

a) Diagnosis/masalah

b) Antisipasi diagnosis/masalah potensial

c) Perlu tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/ kolaborasi dan rujukan sebagai Langkah 2,3 dan 4 Varney.

4. P (plan), menggambarkan pendokumentasian dan tindakan (I) dan evaluasi perencanaan (E) berdasarkan assessment sebagai Langkah 5,6 dan 7 Varney. Didapatkan dari hasil kunjungan yang telah dilakukan.

Kunjungan hari pertama akan dilakukan pemberian asuhan dalam hal mengajarkan ataupun menganjurkan sesuai kebutuhan ibu nifas hari pertama, yaitu mobilisasi dini jika didapatkan ibu *postpartum* dengan keluhan nyeri bagian bawah perut ataupun nyeri luka jahitan perineum, pemberian *health education*, menyusui secara *on demand* untuk membantu merangsang produksi dan pengeluaran ASI, teknik menyusui dan posisi menyusui, perawatan payudara bertujuan untuk meminimalkan terjadinya bendungan atau pembengkakan pada payudara atau salah satu tujuan jika didapati adanya permasalahan dalam produksi dan pengeluaran ASI, perawatan bayi baru lahir

dengan tujuan ibu *postpartum* sudah mempunyai bekal untuk di rumah dan tidak merasakan kebingungan dalam merawat bayinya, ibu *postpartum* yang baru saja melewati persalinan tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual selama 42 hari *postpartum*, dan perjanjian kesediaan waktu di kunjungan berikutnya.

Kunjungan berikutnya hingga kunjungan 8 minggu, akan diberikan perawatan yang memenuhi kebutuhan ibu *postpartum* yaitu mengingatkan kembali mengenai *health education*, menyusui secara *on demand*, konseling kontrasepsi secara dini, tanda-tanda bahaya pada ibu nifas dan bayi baru lahir, dan pentingnya untuk pemberian imunisasi lengkap pada bayi. Dan dilakukan pemantauan hasil anjuran sebelumnya apakah ibu *postpartum* telah melakukan dan memahaminya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dan apakah terjadi perubahan dari kunjungan sebelumnya.

### BAB III

#### STUDI KASUS

#### MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN *POSTPARTUM* BERKELANJUTAN

#### PADA NY "S" DI RSIA SITTI KHADIJAH 1

31 MARET 2024

No. Register : 13xxxx

Tanggal Partus : 31 Maret 2024 Pukul : 10.47 WITA

Tanggal Masuk Ruang Nifas : 31 Maret 2024 Pukul : 19.00 WITA

Tanggal Pengkajian : 31 Maret 2024 Pukul : 19.00 WITA

Pengkaji : Nurul Hidayah

#### A. LANGKAH I : PENGUMPULAN DATA DASAR

##### 1. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "S" / Tn "T"

Umur : 21 tahun / 25 tahun

Nikah/lamanya : 1x / ± 14 bulan

Suku : Makassar/ Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wirausaha

Alamat : Jl. Mxx Jxxxx

## 2. Data Biologis / Fisiologis

### a. Keluhan Utama

Ibu mengatakan nyeri luka jahitan perineum

### b. Riwayat Keluhan Utama

- 1) Ibu mengatakan nyeri luka jahitan
- 2) Nyeri di rasakan sejak setelah dijahit
- 3) Ibu baru saja dipindahkan dari kamar bersalin
- 4) Ibu merasa lega setelah melahirkan

### c. Riwayat Kehamilan dan Persalinan

- 1) Riwayat Kehamilan
  - a) Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
  - b) Ibu mengatakan HPHT tanggal 29 Juni 2023
  - c) Ibu mengatakan HTP tanggal 6 April 2024
  - d) Ibu mengatakan bahwa pemeriksaan ANC telah dilakukan 2 kali di PKM, 4 kali di Sp. OG dan telah mendapatkan suntikan TT 1 kali di usia kehamilan 7 bulan
  - e) Ibu mengatakan selama kehamilannya tidak mengalami komplikasi apa pun
- 2) Riwayat Persalinan
  - a) KALA 1 : Ibu mengatakan datang ke RS tanggal 30 Maret 2024 dengan mengalami nyeri perut menembus belakang disertai pengeluaran lendir

dan darah, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu 2 hari, dengan pembukaan 3 cm.

b) KALA II : Ibu melahirkan secara normal dengan episiotomi selama kala II berlangsung  $\pm$  17 menit. Bayi lahir ini pada 31 Maret 2024 pukul 10.47 WITA, berjenis kelamin perempuan, berat badan lahir : 2900 gram, panjang badan : 46 centimeter, dan *apgar score*: 8/10

c) KALA III : Berlangsung  $\pm$  5 menit, plasenta lahir dengan kesan lengkap (selaput dan kotiledon lengkap), perdarahan  $\pm$  100 cc, dan terdapat luka episiotomi tingkat II.

d) KALA IV : Kala IV berlangsung normal, dan diamati sampai 2 jam setelah plasenta lahir.

d. Riwayat Kesehatan Ibu

1) Ibu tidak memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, asma, DM, jantung, atau penyakit lainnya.

2) Ibu dan keluarga tidak memiliki riwayat penyakit keturunan maupun menular

3) Ibu tidak memiliki riwayat alergi makanan maupun obat-obatan

e. Riwayat Menstruasi

1) *Menarche* : 12 tahun

2) Lamanya : 7 hari

3) Siklus : 28-30 hari

4) Dismenorea : Sedang

f. Riwayat Keluarga Berencana

Ibu sebelumnya belum pernah menggunakan alat kontrasepsi apa pun.

g. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1) Nutrisi

Setelah melahirkan ibu telah makan satu kali dengan porsi sedang. Dan minum sebanyak 5 gelas.

2) Eliminasi

BAK : (+)

BAB : (-)

3) Istirahat/tidur

Ibu belum pernah tidur setelah melahirkan.

h. Pemeriksaan Fisik Ibu

1) Keadaan umum ibu baik

2) Kesadaran *composmentis*

3) Ibu tampak lelah

4) Ibu tampak meringis saat bergerak

5) Pemeriksaan tanda-tanda vital

a) Tekanan darah : 110/70 mmHg

b) Nadi : 82 x/i

c) Pernapasan : 20 x/i

d) Suhu : 36.6°C

6) Pemeriksaan *Head to Toe*

## a) Kepala

Inspeksi : Rambut terurai, tidak adanya kelainan

Palpasi : Tidak adanya benjolan dan nyeri tekan

## b) Wajah

Inspeksi : Tidak tampak pucat

Palpasi : Tidak ada edema dan nyeri tekan

## c) Mata

Inspeksi : Konjungtiva merah muda dan sklera putih

## d) Leher

Palpasi : Tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, limfa,  
dan vena *jugularis*

## e) Payudara

Inspeksi : Bentuknya simetris kiri kanan, puting susu  
kurang menonjol, hiperpigmentasi areola  
*mammae*

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan, dan  
belum ada pengeluaran ASI

## f) Abdomen

Inspeksi : Tampak *striae livide*, *linea nigra*, dan tidak  
ada bekas luka operasi

Palpasi : Tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bulat, dan tidak nyeri tekan

g) Genitalia

Inspeksi : Tidak ada varises, tampak luka jahitan belum kering, tampak pengeluaran lochia *rubra* berwarna merah segar

Palpasi : Tidak ada edema

h) Anus

Inspeksi : Tidak ada hemoroid

i) Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varises

Palpasi : Tidak ada edema

i. Pemeriksaan Fisik Bayi

1) Tanda-tanda Vital Bayi :

a) Suhu : 36.7°C

b) HR : 145 x/i

c) Respiratory : 38 x/i

2) Head to Toe Bayi

a) Kepala : Simetris kiri kanan, tidak ada kelainan dan benjolan

b) Mata : Konjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus, tidak ada secret

- c) Telinga : Simetris kiri kanan, daun telinga terbentuk
- d) Hidung & Mulut : Tampak lubang hidung simetris, tidak ada kelainan, tidak ada kelainan bagian mulut dan langit-langit, *rooting* (+), *sucking* (+),
- e) Leher : Tidak Pembengkakan vena *jugularis* dan limfa
- f) Bahu, lengan dan tangan : Tangan simetris kiri kanan, jari-jari tangan lengkap dan tidak ada fraktur
- g) Dada : Bentuk datar dan tidak ada kelainan
- h) Abdomen : Tali pusat tampak basah
- i) Genitalia : Tidak ada kelainan
- j) Ekstremitas bawah : Jumlah jari-jari kaki lengkap dan tidak ada kelainan
- k) Punggung & Anus : Tidak ada kelainan dan terdapat lubang anus
- l) Kulit : Tampak kemerahan

### 3. Data Psikososial, Budaya, Ekonomi, dan Spiritual

- a. Dengan kelahiran bayinya, ibu, suami, dan keluarga sangat gembira
- b. Ibu merasa lega setelah melewati persalinan
- c. Ibu, suami memiliki hubungan dengan keluarganya yang baik
- d. Ibu dan suami akan merencanakan akikah dalam waktu dekat
- e. Kebutuhan ibu dan bayi dipenuhi oleh suaminya
- f. Ibu dan suami beragama Islam dan taat menjalankan ibadah khususnya Shalat 5 waktu

**B. LANGKAH II : MERUMUSKAN DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL**

Diagnosis : P1A0, *Postpartum* hari pertama

Masalah Aktual : Nyeri luka perineum

**1. Data Subjektif**

- a) Ibu mengatakan ini kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
- b) Ibu melahirkan secara pervaginam tanggal 31 Maret 2024 pukul 10.47 WITA
- c) Ibu merasakan nyeri luka jahitan perineum

**2. Data Objektif**

- a) TFU setinggi pusat
- b) Kontraksi uterus baik teraba keras dan bulat
- c) Tampak adanya lokia *rubra*
- d) Tampak luka jahitan perineum belum kering

**3. Analisis dan Interpretasi Data**

- a) Proses involusi adalah kembalinya uterus seperti keadaan sebelum hamil dan persalinan. Ini dimulai setelah plasenta lahir karena kontraksi otot-otot polos uterus (Azizah & Rosyidah, 2019).
- b) Pada cavum uteri mengeluarkan cairan secret disebut lokia salah satunya lokia *rubra* yang terdapat darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, verniks *caseosa* lanugo (bulu halus bayi yang baru lahir), dan mekonium (isi usus janin cukup bulan yang terdiri dari atas getah kelenjar usus dan air ketuban

berwarna hijau kehitaman). Lokia ini akan terjadi selama 2 hari pasca melahirkan (Azizah & Rosyidah, 2019).

- c) Nyeri perineum terjadi karena adanya robekan jalan lahir baik karena ruptur maupun karena episiotomi pada waktu melahirkan janin yang disebabkan adanya jaringan terputus yang mendorong hipotalamus untuk mengeluarkan reseptor nyeri di area perineum(Asma, 2022)<sup>14</sup>.

### C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya infeksi luka perineum

#### Data Subjektif :

1. Ibu merasakan nyeri luka jahitan perineum
2. Nyeri dirasakan setelah dijahit

#### Data Objektif :

1. Ibu tampak meringis jika bergerak
2. Tampak luka jahitan perineum belum kering

#### Analisis dan Interpretasi Data :

Nyeri adalah bentuk pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan dan berhubungan adanya kerusakan jaringan atau cenderung suatu keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. Dampak negatif jika tidak diatasi akan mempengaruhi proses pemulihan ibu *postpartum* sehingga

---

<sup>14</sup> Asma Asuhan Kebidanan Post Natal pada Ny . N dengan Nyeri Luka Perineum (Makassar, Pusat Kajian dan Pengelola Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI, 2022)

sangatlah penting untuk mengetahui penanganan tepat untuk memperkecil risiko kelainan atau bahkan kematian ibu *postpartum* (Rahayu, 2023)<sup>15</sup>.

Seluruh peradangan yang terjadi pada alat genitalia selama masa nifas, di mana bakteri masuk dari organisme yang menyerang implantasi plasenta atau laserasi yang terjadi selama intranatal, dikenal sebagai infeksi nifas. Akibat perawatan perineum yang kurang baik sehingga menghambat proses penyembuhan luka. Infeksi terjadi jika ditandai kenaikan suhu 38°C atau lebih selama 2 hari dari kenaikan 10 hari *postpartum* (Asma, 2022).

#### **D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI**

Tidak ada indikasi untuk dilakukan tindakan segera

#### **E. LANGKAH V : RENCANA TINDAKAN**

##### 1. Tujuan :

- a) Masa nifas berlangsung normal
- b) Ibu dapat beradaptasi atas kondisinya yang mengalami perubahan secara fisik maupun psikologis serta nyeri luka perineum
- c) Tidak terjadi infeksi pada luka perineum
- d) Bayi dapat terpenuhi nutrisinya dengan ASI

##### 2. Kriteria :

- a) Keadaan umum ibu baik

---

<sup>15</sup> Rahayu Asuhan Kebidanan Post Natal pada Ny. N dengan Nyeri Luka Perineum (Makassar, Pusat Kajian dan Pengelola Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI, 2023)

b) Tanda-tanda vital dalam batas normal

- (1) Tekanan darah sistole : 90-140 mmHg
- Tekanan darah diastole : 60-90 mmHg
- (2) Nadi : 60-100x/i
- (3) Pernapasan : 16-24x/i
- (4) Suhu : 36.5°C-37.5°C

c) Kontraksi uterus baik

d) Tinggi fundus uteri turun 1 cm/hari

e) Tidak ditemukan adanya tanda-tanda infeksi seperti peningkatan suhu tubuh yang melewati batas normal, luka jahitan perineum bengkak berwarna merah dan pengeluaran lochia yang berbau

### 3. Rencana Tindakan

Tanggal 31 Maret 2024, Pukul : 19.00 WITA

a. Cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir sebelum dan sesudah melakukan tindakan atau berkontak langsung dengan pasien

Rasional : Untuk menghindari infeksi silang

b. Jelaskan kepada ibu penyebab nyeri luka perineum yang dirasakannya

Rasional : Dengan mengetahui penyebab nyeri yang dirasakan ibu tidak lagi merasa khawatir dengan kondisinya

c. Lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada kunjungan berikutnya

Rasional : Tanda-tanda vital merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ibu

- d. Lakukan pemeriksaan TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochia pada kunjungan berikutnya

Rasional : Sebagai indikator untuk menilai atau mengetahui proses involusi berjalan normal atau tidak

- e. Ajarkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini dengan melakukan miring kiri atau kanan dan berjalan disekitaran tempat tidurnya atau berjalan ke kamar mandi

Rasional : Mobilisasi dini dilakukan untuk menjaga sirkulasi darah ke jaringan tetap lancar yang mengurangi risiko *tromboplebitis* dan mempercepat involusi uteri

- f. Berikan ibu *health education* tentang :

- 1) Nutrisi dan cairan

Anjurkan ibu mengonsumsi makan-makanan yang bergizi dan seimbang serta pemenuhan cairan dalam tubuh

Rasional : Dengan nutrisi yang baik, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akan lebih cepat, yang berdampak pada produksi ASI

- 2) Istirahat/tidur

Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur 7-8 jam per hari

Rasional : Membantu ibu pulih dan kembali bertenaga setelah melahirkan

- 3) *Personal hygiene*

Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya seperti mandi 2 kali sehari, keramas rambut 2-3 kali seminggu, mengganti pembalut 3 kali

sehari atau setiap kali dirasa sudah penuh, dan mengganti pakaian setiap kali dirasa lembap

Rasional : Untuk memberikan kenyamanan dan mencegah infeksi pada luka jahitan perineum, ibu harus tetap bersih

- g. Ajarkan ibu teknik menyusui dengan baik dan benar, posisi menyusui serta cara perawatan payudara yang baik dan benar

Rasional : Dengan mengetahui cara menyusui yang baik dan benar, perawatan payudara dapat mencegah bendungan ASI sehingga bayi dapat lebih mudah menghisap ASI untuk menghindari luka pada payudara.

- h. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* pada kedua payudara secara bergantian

Rasional : Hormon prolaktin, yang membantu memperlancar atau memproduksi ASI, akan distimulasi dengan menyusui sesering mungkin.

- i. Ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase fundus uteri

Rasional : Agar ibu dapat melakukannya sendiri dan membantu uterus ibu berkontraksi dengan baik sehingga mencegah perdarahan karena *atonia* uteri dan memperlancar pengeluaran lokia

- j. Jelaskan kepada ibu tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum

Rasional : Agar ibu dapat mengetahui atau mendeteksi dini infeksi luka jahitan sehingga ibu dapat segera mengambil tindakan jika hal tersebut terjadi

- k. Jelaskan dan anjurkan ibu untuk meminum obat analgesik dan zat besi yang telah diberikan

Rasional : Kebutuhan zat besi meningkat pada masa nifas karena kehilangan darah selama proses persalinan. Oleh karena itu, obat analgesik dapat mengurangi rasa nyeri ibunya.

- l. Berikan dukungan psikologis kepada ibunya untuk tidak selalu khawatir dengan kondisinya serta membantu ibunya untuk melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu

Rasional : Dengan adanya dukungan psikologis ibu tidak mengalami kekhawatiran berlebihan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai ibu yang baru

- m. Anjurkan ibu tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT, perbanyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan masa nifas yaitu berzikir, bersholawat, dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran atau dengan membaca ayat tersebut, Q.S Al-Baqarah ayat 78-80:

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ﴾

Terjemahnya :

(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumannya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan (Kementerian Agama, 2019).

Rasional : Dengan melakukan pendekatan ini, ibu akan merasa tenang dan dapat menerima keadaan bahwa itu adalah anugerah dan berkah dari Allah SWT.

- n. Rencanakan dan minta kesediaan ibu untuk dilakukan kunjungan berikutnya pada 1 April 2024

Rasional : Untuk mengetahui perkembangan keadaan ibu dan bayinya

#### **F. LANGKAH VI : IMPLEMENTASI**

Tanggal 31 Maret 2024, Pukul : 19.00 – 20.00 WITA

1. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir sebelum dan sesudah melakukan tindakan atau berkontak langsung dengan pasien

Hasil : Telah dilakukan

2. Menjelaskan kepada ibu bahwa nyeri yang disebabkan oleh perlukaan akan sembuh dalam waktu 6-7 hari setelah luka sembuh

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

3. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada kunjungan berikutnya

Hasil : Dilakukan pada kunjungan berikutnya

4. Mengajarkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini dengan cara miring kanan atau kiri atau dan berjalan di sekitar tempat tidurnya atau berjalan ke kamar mandi

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

5. Berikan ibu *health education* tentang :

a. Nutrisi dan cairan

Menganjurkan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang seperti ikan, telur, daging, hati, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran serta cukup cairan yaitu air putih 7 hingga 8 gelas per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

b. Istirahat/tidur

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur 7-8 jam per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya seperti mandi dua kali sehari, keramas rambut dua hingga tiga kali seminggu, mengganti pembalut tiga kali sehari atau setiap kali merasa sudah penuh, dan mengganti pakaian setiap kali dirasa lembap

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

6. Mengajarkan ibu teknik menyusui dengan baik dan benar, posisi menyusui baik dan benar yaitu:

a. Mempersilahkan ibu untuk duduk dengan santai dan nyaman

b. Mempersilahkan dan membantu ibu untuk membuka pakaian bagian atas

c. Mengajari ibu untuk mengoleskan sedikit ASI pada *putting* susu dan areola

d. Mengajari ibu untuk meletakkan bayi pada satu lengan, kepalanya di lengkungan siku ibu, dan bokongnya di lengan bawah ibu. bayi berada pada lengkungan siku ibu dan bokong bayi berada lengan bawah ibu

- e. Mengajari ibu untuk memosisikan bayi dengan telinga dan lengan pada garis lurus
- f. Mengajari ibu untuk memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah serta jangan menekan *putting* susu dan areolanya
- g. Mengajari ibu untuk merangsang membuka mulut bayi : menyentuh pipi dengan *putting* susu atau menyentuh sudut mulut bayi
- h. Setelah bayi membuka mulut, anjurkan ibu untuk mendekatkan dengan cepat kepala bayi ke payudara ibu kemudian memasukkan *putting* susu serta sebagian besar areola ke mulut bayi
- i. Setelah bayi mulai menghisap, menganjurkan ibu untuk tidak memegang atau menyangga payudaranya lagi
- j. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan bayi selama menyusui
- k. Mengajari ibu cara melepas isapan bayi
- l. Setelah selesai menyusui, mengajarkan ibu untuk mengoleskan sedikit ASI pada *putting* susu dan areola. Biarkan kering dengan sendirinya.

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

7. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* pada kedua payudara secara bergantian

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

8. Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase fundus uteri dengan meletakkan tangan bagian perut ibu dan melakukan gerakan

pijat membulat searah jarum jam untuk merangsang uterus berkontraksi dengan baik

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti cara melakukan masase fundus uteri

9. Mengedukasi kepada ibu tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum seperti kenaikan suhu tubuh dalam batas normal, merah, bengkak, nyeri, bernanah, berbau, dan kesadaran berkurang. Jika tanda-tanda tersebut dialami oleh ibunya anjurkan ibu untuk segera mendatangi ke fasilitas kesehatan terdekat

Hasil : Ibu memahami

10. Mengedukasi dan menganjurkan ibu untuk meminum obat analgesik dan zat besi yang telah diberikan
- Asam Mafenamat adalah obat analgesik yang membantu mengurangi nyeri jalan lahir.
  - Tablet FE adalah salah satu cara yang memiliki manfaat dalam mengatasi anemia akibat kekurangan zat besi dalam darah.

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

11. Memberikan dukungan psikologis kepada ibunya untuk tidak selalu khawatir dengan kondisinya serta membantu ibunya untuk melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu

Hasil : Ibu memiliki sedikit kecemasan akan peran barunya sebagai ibu baru.

12. Mengajukan ibu tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT, perbanyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan masa nifas yaitu berzikir, bersholawat, dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran atau dengan membaca ayat tersebut, Q.S Al-Baqarah ayat 78-80:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumannya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan (Kementerian Agama, 2019).

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

13. Rencanakan dan minta kesediaan ibu untuk dilakukan kunjungan berikutnya pada 1 April 2024

Hasil : Ibu bersedia

## G. LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 31 Maret 2024, Pukul : 20.00 WITA

1. Masa nifas hari pertama berlangsung normal ditandai dengan :
  - a. Keadaan umum ibu baik
  - b. Tanda-tanda vital :
    - 1) Tekanan darah : 110/70 mmHg

- 2) Nadi : 82x/i
- 3) Pernapasan : 20x/i
- 4) Suhu : 36.6°C

c. TFU setinggi pusat

d. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar

e. Pengeluaran lochia *rubra*, tidak berbau dan berwarna merah segar

- 2. Ibu mulai beradaptasi dengan nyeri yang dirasakan setelah mulai miring kanan kiri dan berjalan ke kamar mandi
- 3. Tidak terdapat tanda-tanda infeksi yang ditandai dengan suhu 36.6°C
- 4. Ibu sedang berusaha merangsang payudaranya dengan menyusui bayinya agar terjadi pengeluaran ASI

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN *POSTPARTUM***

**BERKELANJUTAN HARI PERTAMA PADA NY "S"**

**DI RSIA SITTI KHADIJAH 1**

No. Register : 13xxxx

Tanggal Partus : 31 Maret 2024 Pukul : 10.47 WITA

Tanggal Masuk Ruang Nifas : 31 Maret 2024 Pukul : 19.00 WITA

Tanggal Pengkajian : 31 Maret 2024 Pukul : 19.00 WITA

Pengkaji : Nurul Hidayah

**IDENTITAS ISTRI/SUAMI**

Nama : Ny "S" / Tn "T"

Umur : 21 tahun / 25 tahun

Nikah/lamanya : 1x / ± 14 bulan

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wirausaha

Alamat : Jl. Mxx Jxxxx

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengeluh merasakan nyeri luka jahitan karena di episiotomi *grade II*
2. Ibu berkata ini kehamilan pertama dan tidak pernah abortus

3. Ibu melahirkan tanggal 31 Maret 2024, pukul 10.47 WITA
4. Ibu mengatakan belum BAK dan belum BAB
5. Ibu mengatakan belum ada pengeluaran ASI
6. Ibu mengatakan refleks isap pada bayi bagus
7. Ibu mengatakan bayinya sudah BAK dan belum BAB
8. Ibu mengatakan bayinya sudah mendapatkan imunisasi HB.0
9. Ibu dan keluarga senang atas kelahiran bayinya

#### DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
  - b. Nadi : 80x/i
  - c. Pernapasan : 20x/i
  - d. Suhu : 36.6°C
4. Pemeriksaan Head to Toe
  - a. Wajah : Tidak pucat, tidak ada edema dan nyeri tekan
  - b. Mata : Konjungtiva merah muda dan sklera putih
  - c. Leher : Tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, limfa dan vena *jugularis*
  - d. Payudara : Bentuknya simetris kiri kanan, puting susu kurang menonjol, hiperpigmentasi areola *mammae*, tidak ada

benjolan dan nyeri tekan, dan belum ada pengeluaran ASI

- e. Abdomen : Tampak *striae livide*, *linea nigra* , tidak ada bekas luka operasi, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, dan tidak ada nyeri tekan
- f. Genitalia : Tidak ada varises dan edema, terdapat luka jahitan sudah mulai kering, tampak adanya lokia *rubra* berwarna merah segar
- g. Anus : Tidak ada hemoroid
- h. Ekstremitas: Tidak ada varises dan edema

#### ANALISA (A)

P1A0, *Postpartum* hari pertama

#### PENATALAKSANAAN (P)

Tanggal 31 Maret 2024, Pukul 19.00 WITA

1. Menjelaskan kepada ibu bahwa nyeri yang dirasakan karena adanya perlukaan dan akan sembuh seiring dengan penyembuhan luka 6-7 hari  
Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
2. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada kunjungan berikutnya  
Hasil : Dilakukan pada kunjungan berikutnya
3. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lokia  
Hasil : Dilakukan pada kunjungan berikutnya

4. Mengajarkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini dengan cara miring kanan atau kiri atau dan berjalan di sekitaran tempat tidurnya atau berjalan ke kamar mandi

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

5. Berikan ibu *health education* tentang :

- a. Nutrisi dan cairan

Menganjurkan ibu mengonsumsi makan-makanan yang bergizi dan seimbang seperti ikan, telur, daging, hati, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran serta pemenuhan cairan dalam tubuh yaitu minum air putih 7-8 gelas per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

- b. Istirahat/tidur

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur 7-8 jam per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

- c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya seperti mandi 2 kali sehari, keramas rambut 2-3 kali seminggu, mengganti pembalut 3 kali sehari atau setiap kali dirasa sudah penuh, dan mengganti pakaian setiap kali dirasa lembap

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

6. Mengajarkan ibu teknik menyusui dengan baik dan benar, posisi menyusui baik dan benar
  - a. Mempersilahkan ibu untuk duduk dengan santai dan nyaman
  - b. Mempersilahkan dan membantu ibu untuk membuka pakaian bagian atas
  - c. Mengajari ibu untuk mengoleskan sedikit ASI pada *putting* susu dan areola
  - d. Mengajari ibu untuk meletakkan bayi pada satu lengan, kepala bayi berada pada lengkungan siku ibu dan bokong bayi berada lengan bawah ibu
  - e. Mengajari ibu untuk menempelkan perut bayi pada perut ibu dengan meletakkan satu tangan bayi di belakang badan ibu dan yang satu di depan, kepala bayi menghadap payudara
  - f. Mengajari ibu untuk memosisikan bayi dengan telinga dan lengan pada garis lurus
  - g. Mengajari ibu untuk memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah serta jangan menekan *putting* susu dan areolanya
  - h. Mengajari ibu untuk merangsang membuka mulut bayi : menyentuh pipi dengan *putting* susu atau menyentuh sudut mulut bayi

- i. Setelah bayi membuka mulut, anjurkan ibu untuk mendekatkan dengan cepat kepala bayi ke payudara ibu kemudian memasukkan *putting* susu serta sebagian besar areola ke mulut bayi
- j. Setelah bayi mulai menghisap, menganjurkan ibu untuk tidak memegang atau menyangga payudaranya lagi
- k. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan bayi selama menyusui
- l. Mengajari ibu cara melepas isapan bayi
- m. Setelah selesai menyusui, mengajarkan ibu untuk mengoleskan sedikit ASI pada *putting* susu dan areola. Biarkan kering dengan sendirinya.

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

- 7. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* pada kedua payudara secara bergantian

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

- 8. Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase fundus uteri dengan meletakkan tangan bagian perut ibu dan melakukan gerakan pijat membundar searah jarum jam untuk merangsang uterus berkontraksi dengan baik

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti cara melakukan masase fundus uteri

- 9. Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum seperti kenaikan suhu tubuh dalam batas normal, merah, bengkak, nyeri, bernanah, berbau, dan kesadaran berkurang. Jika tanda-tanda tersebut

dialami oleh ibunya anjurkan ibu untuk segera mendatangi ke fasilitas kesehatan terdekat

Hasil : Ibu mengerti

10. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk meminum obat analgesik dan zat besi yang telah diberikan

- a. Asam Mafenamat adalah obat analgesik yang membantu mengurangi rasa nyeri pada jalan lahir yang dirasakan
- b. Tablet FE adalah salah satu cara yang memiliki manfaat dalam mengatasi anemia akibat kekurangan zat besi dalam darah.

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

11. Memberikan dukungan psikologis kepada ibunya untuk tidak selalu khawatir dengan kondisinya serta membantu ibunya untuk melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu

Hasil : Ibu memiliki sedikit kecemasan akan peran barunya sebagai ibu baru

12. Menganjurkan ibu tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT, perbanyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan masa nifas yaitu berzikir, bersholawat, dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

13. Rencanakan dan minta kesediaan ibu untuk dilakukan kunjungan berikutnya pada 1 April 2024

Hasil : Ibu bersedia

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN *POSTPARTUM***

**BERKELANJUTAN HARI KEDUA PADA NY "S"**

**DI RSIA SITTI KHADIJAH 1**

No. Register : 13xxxx

Tanggal Partus : 31 Maret 2024 Pukul : 10.47 WITA

Tanggal Masuk Ruang Nifas : 31 Maret 2024 Pukul : 19.00 WITA

Tanggal Pengkajian : 1 April 2024 Pukul : 12.00 WITA

Pengkaji : Nurul Hidayah

**IDENTITAS ISTRI/SUAMI**

Nama : Ny. "S" / Tn "T"

Umur : 21 tahun / 25 tahun

Nikah/lamanya : 1x / ± 14 bulan

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wirausaha

Alamat : Jl. Mxx Jxxxx

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu merasakan nyeri luka jahitan berkurang

2. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
3. Ibu melahirkan tanggal 31 Maret 2024, pukul 10.47 WITA
4. Ibu mengatakan sudah BAK dan belum BAB
5. Ibu mengatakan belum ada pengeluaran ASI
6. Ibu mengatakan refleks isap pada bayi bagus
7. Ibu mengatakan bayinya sudah BAK dan belum BAB
8. Ibu dan keluarga senang atas kelahiran bayinya

#### DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 109/73 mmHg
  - b. Nadi : 119x/i
  - c. Pernapasan : 20x/i
  - d. Suhu : 36.5°C
4. Pemeriksaan *Head to Toe*
  - a. Wajah : Tidak pucat, tidak ada edema dan nyeri tekan
  - b. Mata : Konjungtiva merah muda dan sklera putih
  - c. Leher : Tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, limfa, dan vena *jugularis*

- d. Payudara : Bentuknya simetris kiri kanan, puting susu kurang menonjol, hiperpigmentasi areola *mammae* , tidak ada benjolan dan nyeri tekan, dan belum ada pengeluaran ASI
- e. Abdomen : Tampak *striae livide*, *linea nigra*, dan tidak ada bekas luka operasi, tinggi fundus uteri 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bulat, dan tidak nyeri tekan
5. Genitalia : Tidak ada varises, terdapat luka jahitan sudah mulai kering, tampak pengeluaran lochia *rubra* berwarna merah segar, tidak ada edema
6. Anus : Tidak ada hemoroid
7. Ekstremitas : Tidak ada varises dan edema
8. Tanda-tanda Vital Bayi
- a. Suhu : 36.5°C
- b. HR : 140 x/i
- c. P : 40 x/i
9. Pemeriksaan Fisik Bayi
- a. Mata : Konjungtiva merah muda, sklera putih
- b. Abdomen : Tampak tali pusat belum kering
- c. Kulit : Tampak kemerahan

**ANALISA (A)**

P1A0, *Postpartum* hari kedua

**PLANNING (P)**

Tanggal 1 April 2024, Pukul 12.00 WITA

1. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

2. Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase fundus uteri

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti cara melakukan masase fundus uteri

3. Memberikan ibu *health education* tentang :

- a. Nutrisi dan cairan

Menganjurkan ibu mengonsumsi makan-makanan yang bergizi dan seimbang seperti ikan, telur, daging, hati, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran serta pemenuhan cairan dalam tubuh yaitu minum air putih 7-8 gelas per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

- b. Istirahat atau tidur

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur 7-8 jam per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

- c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya seperti mandi 2 kali sehari, keramas rambut 2-3 kali seminggu,

mengganti pembalut 3 kali sehari atau setiap kali dirasa sudah penuh, dan mengganti pakaian setiap kali dirasa lembap

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

4. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* pada kedua payudara secara bergantian

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

5. Mengajarkan ibu teknik menyusui dengan baik dan benar, serta posisi menyusui yang baik dan benar

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

6. Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan payudara yang baik dan benar untuk membantu memproduksi ASI

- a. Membersihkan *putting* terlebih dahulu
- b. Menggunakan Baby Oil untuk mempermudah *massage*
- c. Melakukan *massage* payudara

1) *Massage* pertama

Licinkan kedua tangan dengan Baby Oil tempatkan kedua tangan diantara payudara lakukan *massage*, dimulai dari arah atas lalu arah sisi samping kiri kemudian ke arah kanan, lakukan terus ke arah bawah atau melintang. Lalu kedua tangan dilepas dari payudara, ulangi gerakan hingga 20-30 kali untuk setiap satu payudara.

2) *Massage* kedua

Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri, kemudian dua atau 3 jari tangan kanan mulai dari pangkal payudara dan berakhir pada *putting* susu. Lakukan tahap ini dengan sisi kelingking dari arah tepi ke arah *putting* susu. Lakukan gerakan 20-30 kali.

3) *Massage* ketiga

Menyokong payudara dengan satu tangan, sedangkan tangan lain *massage* dan menggenggam dari pangkal menuju ke *putting* susu. Lakukan gerakan 20-3- kali.

d. Mengompres payudara dimulai air hangat kemudian air dingin.

Hasil : Ibu mengerti dan dapat mempraktikkannya sendiri

7. Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum seperti kenaikan suhu tubuh dalam batas normal, merah, bengkak, nyeri, bernanah, berbau, dan kesadaran berkurang. Jika tanda-tanda tersebut dialami oleh ibunya anjurkan ibu untuk segera mendatangi ke fasilitas kesehatan terdekat

Hasil : Ibu mengerti

8. Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari yaitu :

a. Dalam pemberian ASI saja sesuai dengan keinginan bayi, diberikan tiap 2-3 jam atau paling sedikit setiap 4 jam mulai dari hari pertama

- b. Menjaga kebersihan bayi untuk selalu mengganti popok, selimut, pakaian jika basah atau lembap
- c. Perawatan tali pusat hanya membersihkan menggunakan kain bersih dengan air bersih tanpa dibubuhi apa pun seperti bedak, minyak, sale, dll. Dan biarkan tali pusat dalam keadaan terbuka
- d. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai pada bayi baru lahir yaitu pernafasan  $\geq 60$ x/menit, suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  atau  $\leq 36^{\circ}\text{C}$ , warna kulit kuning, biru atau pucat, tali pusat merah, bau busuk, keluar cairan atau darah. Apabila tanda-tanda tersebut terjadi maka harus segera membawa bayinya ke fasilitas kesehatan terdekat.

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

9. Menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka dan akan berisiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup di luar masuk ke dalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

10. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk meminum obat analgesik dan zat besi yang telah diberikan
  - a. Asam Mafenamat adalah obat analgesik yang membantu mengurangi rasa nyeri pada jalan lahir yang dirasakan
  - b. Tablet FE adalah salah satu cara yang memiliki manfaat dalam mengatasi anemia akibat kekurangan zat besi dalam darah.

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

11. Memberikan dukungan psikologis kepada ibunya untuk tidak selalu khawatir dengan kondisinya serta membantu ibunya untuk melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu

Hasil : Ibu memiliki sedikit kecemasan akan peran barunya sebagai ibu baru

12. Menganjurkan ibu tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT, perbanyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan masa nifas yaitu berzikir, bersholawat, dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

13. Rencanakan dan minta kesediaan ibu untuk dilakukan kunjungan berikutnya pada hari ke-3 atau sampai hari ke-6 setelah ibu keluar dari rumah sakit

Hasil : Ibu bersedia

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN *POSTPARTUM***

**BERKELANJUTAN HARI KE EMPAT PADA NY "S"**

**DI RSIA SITTI KHADIJAH 1**

No. Register : 13xxxx

Tanggal Partus : 31 Maret 2024 Pukul : 10.47 WITA

Tanggal Masuk Ruang Nifas : 31 Maret 2024 Pukul : 19.00 WITA

Tanggal Pengkajian : 3 April 2024 Pukul : 12.00 WITA

Tempat : Rumah Pasien

Pengkaji : Nurul Hidayah

**IDENTITAS ISTRI/SUAMI**

Nama : Ny. "S" / Tn "T"

Umur : 21 tahun / 25 tahun

Nikah/lamanya : 1x / ± 14 bulan

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wirausaha

Alamat : Jl. Mxx Jxxxx

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri luka jahitan perineum

2. Ibu mengatakan ASI-nya sudah keluar banyak dan lancar tadi subuh
3. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran cairan dari jalan lahir berwarna merah pudar dan tidak berbau
4. Ibu mengatakan BAK lancar dan BAB 1 kali
5. Ibu mengatakan sempat memberikan susu formula pada bayi kemarin
6. Ibu mengatakan bayinya menyusu dengan baik
7. Ibu mengatakan refleks isap pada bayi bagus
8. Ibu mengatakan bayinya sudah BAK dan BAB
9. Ibu mengatakan warna kulit bayinya kuning bagian wajah

#### **DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 110/80 mmHg
  - b. Nadi : 85x/i
  - c. Pernapasan : 20x/i
  - d. Suhu : 36.5°C
4. Pemeriksaan Head to Toe
  - a. Mata : Konjungtiva merah muda dan sklera putih
  - b. Payudara : Bentuknya simetris kiri kanan, puting susu kurang menonjol, hiperpigmentasi areola

*mammae*, tidak ada benjolan dan nyeri tekan, dan sudah ada pengeluaran ASI

- c. Abdomen : Tampak *striae livide*, *linea nigra*, dan tidak ada bekas luka operasi, tinggi fundus uteri pertengahan pusat dan simfisis, kontraksi uterus baik teraba keras dan bulat, dan tidak nyeri tekan
- d. Genitalia : Tidak ada varises dan edema, terdapat luka jahitan sudah mulai kering, tampak adanya lokia *sanguinolenta* berwarna merah pudar
5. Tanda-tanda Vital Bayi
- a. Suhu : 36.8°C
  - b. HR : 142 x/i
  - c. P : 40 x/i
6. Pemeriksaan Fisik Bayi
- a. Mata : Konjungtiva merah muda, sklera putih
  - b. Abdomen : Tampak tali pusat kering
  - c. Kulit : Tampak kuning bagian wajah

### ANALISA (A)

P1A0, *Postpartum* Hari Keempat

**PLANNING (P)**

Tanggal 3 April 2024, Pukul 12.00 WITA

1. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

2. Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase fundus uteri

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti cara melakukan masase fundus uteri

3. Memberikan ibu *health education* tentang :

- a. Nutrisi dan cairan

Menganjurkan ibu mengonsumsi makan-makanan yang bergizi dan seimbang seperti ikan, telur, daging, hati, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran serta pemenuhan cairan dalam tubuh yaitu minum air putih 7-8 gelas per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

- b. Istirahat/tidur

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur 7-8 jam per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

- c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya seperti mandi 2 kali sehari, keramas rambut 2-3 kali seminggu, mengganti pembalut 3 kali sehari atau setiap kali dirasa sudah penuh, dan mengganti pakaian setiap kali dirasa lembap

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

4. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* pada kedua payudara secara bergantian

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

5. Mengajarkan ibu teknik menyusui dengan baik dan benar, serta posisi menyusui yang baik dan benar

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

6. Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan payudara yang baik dan benar untuk membantu memproduksi ASI

- a. Membersihkan *putting* terlebih dahulu
- b. Menggunakan Baby Oil untuk mempermudah *massage*
- c. Melakukan *massage* payudara

- 1) *Massage* pertama

Licinkan kedua tangan dengan Baby Oil tempatkan kedua tangan diantara payudara lakukan *massage*, dimulai dari arah atas lalu arah sisi samping kiri kemudian ke arah kanan, lakukan terus ke arah bawah atau melintang. Lalu kedua tangan dilepas dari payudara, ulangi gerakan hingga 20-30 kali untuk setiap satu payudara.

- 2) *Massage* kedua

Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri, kemudian dua atau 3 jari tangan kanan mulai dari pangkal payudara dan berakhir pada *putting* susu. Lakukan tahap ini

dengan sisi kelingking dari arah tepi ke arah *putting* susu.

Lakukan gerakan 20-30 kali.

3) *Massage* ketiga

Menyokong payudara dengan satu tangan, sedangkan tangan lain *massage* dan menggenggam dari pangkal menuju ke *putting* susu. Lakukan gerakan 20-3- kali.

d. Mengompres payudara dimulai air hangat kemudian air dingin.

Hasil : Ibu mengerti dan dapat mempraktikkannya sendiri

7. Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum seperti kenaikan suhu tubuh dalam batas normal, merah, bengkak, nyeri, bernanah, berbau, dan kesadaran berkurang. Jika tanda-tanda tersebut dialami oleh ibunya anjurkan ibu untuk segera mendatangi ke fasilitas kesehatan terdekat

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya jika tanda tersebut dialami

8. Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari yaitu :

- a. Dalam pemberian ASI saja sesuai dengan keinginan bayi, diberikan tiap 2-3 jam/paling sedikit setiap 4 jam mulai dari hari pertama
- b. Menjaga kebersihan bayi untuk selalu mengganti popok, selimut, pakaian jika basah atau lembap

- c. Perawatan tali pusat hanya membersihkan menggunakan kain bersih dengan air bersih tanpa dibubuhi apa pun seperti bedak, minyak, sale, dll. Dan biarkan tali pusat dalam keadaan terbuka
- d. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai pada bayi baru lahir yaitu pernafasan  $\geq 60$ x/menit, suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  atau  $\leq 36^{\circ}\text{C}$ , warna kulit kuning, biru atau pucat, tali pusat merah, bau busuk, keluar cairan atau darah. Apabila tanda-tanda tersebut terjadi maka harus segera membawa bayinya ke fasilitas kesehatan terdekat.

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

9. Mengajarkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka dan akan berisiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup di luar masuk ke dalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

10. Mengajarkan ibu cara melakukan senam nifas dan mempraktikkannya bertujuan memperlancar pengeluaran lokia, memperlancar peredaran darah, memperlancar involusi uteri, dan merelaksan ibunya. Mengajarkan ibunya untuk melakukan secara mandiri setiap hari selama 6 minggu

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

11. Memberikan konseling KB secara dini yaitu alat kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI

Hasil : Ibu mengerti dan akan mendiskusikannya dahulu dengan suami

12. Menjelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya nifas

- a. Perdarahan vagina yang banyak melebihi dari darah haid biasa
- b. Pengeluaran lochia yang berbau busuk
- c. Nyeri bagian abdomen atau punggung
- d. Sakit kepala terus menerus, nyeri ulu hati dan pandangan kabur
- e. Pembengkakan pada wajah dan tungkai
- f. Payudara menjadi merah, panas dan terasa sakit apabila ditekan
- g. Menganjurkan ibu untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila menemukan tanda-tanda bahaya tersebut

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya jika tanda-tanda tersebut dialami

13. Menganjurkan ibu untuk menjemur bayinya pada pagi hari  $\pm$  15 menit dengan menutupi matanya

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

14. Memberikan dukungan psikologis kepada ibunya untuk tidak selalu khawatir dengan kondisinya serta membantu ibunya untuk melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu

Hasil : Ibu memiliki sedikit kecemasan akan peran barunya sebagai ibu baru

15. Menganjurkan ibu tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT, perbanyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan masa nifas yaitu berzikir, bersholawat, dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

16. Rencanakan dan minta kesediaan ibu untuk dilakukan kunjungan berikutnya pada hari ke-7 atau sampai hari ke-14 setelah ibu keluar dari rumah sakit

Hasil : Ibu bersedia



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN *POSTPARTUM*****BERKELANJUTAN HARI KE-16 PADA NY "S"****DI RSIA SITTI KHADIJAH 1**

No. Register : 13xxxx  
Tanggal Partus : 31 Maret 2024 Pukul : 10.47 WITA  
Tanggal Masuk Ruang Nifas : 31 Maret 2024 Pukul : 19.00 WITA  
Tanggal Pengkajian : 15 April 2024 Pukul : 16.00 WITA  
Tempat : Rumah Pasien  
Pengkaji : Nurul Hidayah

**IDENTITAS ISTRI/SUAMI**

Nama : Ny. "S" / Tn "T"  
Umur : 21 tahun / 25 tahun  
Nikah/lamanya : 1x / ± 14 bulan  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SMA / SMA  
Pekerjaan : IRT / Wirausaha  
Alamat : Jl. Mxx Jxxxx

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan luka jahitannya sudah kering dan tidak merasakan nyeri

2. Ibu mengatakan produksi dan pengeluaran ASI lancar
3. Ibu mengatakan sudah tidak menggunakan pembalut dan masih ada pengeluaran cairan dari jalan lahir berwarna kecokelatan dan tidak berbau
4. Ibu mengatakan BAK lancar dan BAB lancar
5. Ibu mengatakan rencana ingin menggunakan KB suntik 3 bulan
6. Ibu mengatakan bayinya menyusui dengan baik
7. Ibu mengatakan refleks isap pada bayi bagus
8. Ibu mengatakan bayinya sudah BAK dan BAB
9. Ibu mengatakan warna kulit bayi sudah tidak kuning
10. Ibu mengatakan tali pusat bayi telah pupus

#### **DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 90/70 mmHg
  - b. Nadi : 92x/i
  - c. Pernapasan : 20x/i
  - d. Suhu : 36.6°C
4. Pemeriksaan Head to Toe
  - a. Wajah : Tidak pucat, tidak ada edema dan nyeri tekan
  - b. Mata : Konjungtiva merah muda dan sklera putih

- c. Leher : Tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, limfa, dan vena *jugularis*
- d. Payudara : Bentuknya simetris kiri kanan, puting susu kurang menonjol, hiperpigmentasi areola *mammae*, tidak ada benjolan dan nyeri tekan, dan ada pengeluaran ASI
- e. Abdomen : Tampak *striae livide*, *linea nigra*, dan tidak ada bekas luka operasi, tinggi fundus uteri tidak teraba dan tidak ada nyeri tekan
- f. Genitalia : Tidak ada varises, terdapat luka jahitan sudah kering, tampak adanya *lochia serosa* berwarna merah kekuningan dan tidak berbau, tidak ada edema

#### 5. Tanda-tanda Vital Bayi

- a. Suhu : 36.7°C
- b. HR : 140 x/i
- c. P : 40 x/i

#### 6. Pemeriksaan Fisik Bayi

- a. Mata : Konjungtiva merah muda, sklera putih
- b. Abdomen : Tampak tali pusat telah pupus
- c. Kulit : Tampak kemerahan

**ANALISA (A)**

P1A0, *Postpartum* Hari Ke-16

**PLANNING (P)**

Tanggal 15 April 2024, Pukul 16.00 WITA

1. Memberikan ibu *health education* tentang :

a. Nutrisi dan cairan

Menganjurkan ibu mengonsumsi makan-makanan yang bergizi dan seimbang seperti ikan, telur, daging, hati, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran serta pemenuhan cairan dalam tubuh yaitu minum air putih 7-8 gelas per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

b. Istirahat atau tidur

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur 7-8 jam per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya seperti mandi 2 kali sehari, keramas rambut 2-3 kali seminggu, mengganti pembalut 3 kali sehari atau setiap kali dirasa sudah penuh, dan mengganti pakaian setiap kali dirasa lembap

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

2. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* pada kedua payudara secara bergantian

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

3. Mengajarkan ibu teknik menyusui dengan baik dan benar, serta posisi menyusui yang baik dan benar

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

4. Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan payudara yang baik dan benar untuk membantu memproduksi ASI

- a. Membersihkan *putting* terlebih dahulu
- b. Menggunakan Baby Oil untuk mempermudah *massage*
- c. Melakukan *massage* payudara

- 1) *Massage* pertama

Licinkan kedua tangan dengan Baby Oil tempatkan kedua tangan diantara payudara lakukan *massage*, dimulai dari arah atas lalu arah sisi samping kiri kemudian ke arah kanan, lakukan terus ke arah bawah atau melintang. Lalu kedua tangan dilepas dari payudara, ulangi gerakan hingga 20-30 kali untuk setiap satu payudara.

- 2) *Massage* kedua

Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri, kemudian dua atau 3 jari tangan kanan mulai dari pangkal payudara dan berakhir pada *putting* susu. Lakukan tahap ini dengan sisi

kelingking dari arah tepi ke arah *putting* susu. Lakukan gerakan 20-30 kali.

3) *Massage* ketiga

Menyokong payudara dengan satu tangan, sedangkan tangan lain *massage* dan menggenggam dari pangkal menuju ke *putting* susu. Lakukan gerakan 20-3- kali.

d. Mengompres payudara dimulai air hangat kemudian air dingin.

Hasil : Ibu mengerti dan dapat mempraktikkannya sendiri

5. Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari yaitu :

- a. Dalam pemberian ASI saja sesuai dengan keinginan bayi, diberikan tiap 2-3 jam atau paling sedikit setiap 4 jam mulai dari hari pertama
- b. Menjaga kebersihan bayi untuk selalu mengganti popok, selimut, pakaian jika basah atau lembap
- c. Perawatan tali pusat hanya membersihkan menggunakan kain bersih dengan air bersih tanpa dibubuhi apa pun seperti bedak, minyak, sale, dll. Dan biarkan tali pusat dalam keadaan terbuka
- d. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai pada bayi baru lahir yaitu pernafasan  $\geq 60$ x/menit, suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  atau  $\leq 36^{\circ}\text{C}$ , warna kulit kuning, biru atau pucat, tali pusat merah, bau busuk, keluar cairan atau darah. Apabila tanda-tanda tersebut terjadi maka harus segera membawa bayinya ke fasilitas kesehatan terdekat.

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka dan akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup di luar masuk ke dalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

7. Memberikan konseling KB secara dini yaitu alat kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI

Hasil : Ibu mengerti dan rencana ingin menggunakan KB suntik 3 bulan

8. Menjelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya nifas
  - a. Perdarahan vagina yang banyak melebihi dari darah haid biasa
  - b. Pengeluaran lochia yang berbau busuk
  - c. Nyeri bagian abdomen atau punggung
  - d. Sakit kepala terus menerus, nyeri ulu hati dan pandangan kabur
  - e. Pembengkakan pada wajah dan tungkai
  - f. Payudara menjadi merah, panas dan terasa sakit apabila ditekan
  - g. Menganjurkan ibu untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila menemukan tanda-tanda bahaya tersebut

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya jika tanda-tanda tersebut dialami

9. Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda bahaya pada bayi
- a. Jika bayi tidak dapat menyusu, sulit minum, malas minum kemungkinan bayi mengalami kelainan pada bibir dan langit-langit atau bayi infeksi
  - b. Bayi kejang
  - c. Nafas bayi 30-60 per menit
  - d. Bayi merintih, kurang aktif dan lemah
  - e. Warna kulit bayi sianosis, kuning mulai dari kepala turun kebagian bawah
  - f. Perut bayi kembung, dan muntah
  - g. Tali pusat bayi dan dinding perut di sekitar tali pusat berwarna kemerahan, berbau busuk terdapat pus atau nanah, keluar darah atau perdarahan
  - h. Dan apabila bayi mengalami salah satu tanda bahaya tersebut maka ibu atau keluarga harus segera membawa bayi ke petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat

Hasil : Ibu mengerti

10. Memberikan dukungan psikologis kepada ibunya untuk tidak selalu khawatir dengan kondisinya serta membantu ibunya untuk melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu

Hasil : Ibu memiliki sedikit kecemasan akan peran barunya sebagai ibu baru

11. Menganjurkan ibu tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT, perbanyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan masa nifas yaitu berzikir, bersholawat, dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

12. Menjelaskan kepada ibu bahwa sangat penting untuk melakukan imunisasi lengkap pada bayinya

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

13. Mengingatkan ibu untuk melakukan imunisasi *Bacillus Calmette-Guerin* (BCG) pada bayinya pada tanggal 24 April 2024

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

14. Rencanakan dan minta kesediaan ibu untuk dilakukan kunjungan berikutnya pada hari ke-15 atau sampai hari ke-42 setelah ibu keluar dari rumah sakit

Hasil : Ibu bersedia

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN *POSTPARTUM***

**BERKELANJUTAN HARI KE-42 PADA NY "S"**

**DI RSIA SITTI KHADIJAH 1**

No. Register : 13xxxx

Tanggal Partus : 31 Maret 2024 Pukul : 10.47 WITA

Tanggal Masuk Ruang Nifas : 31 Maret 2024 Pukul : 19.00 WITA

Tanggal Pengkajian : 11 May 2024 Pukul : 15.00 WITA

Tempat : Rumah Pasien

Pengkaji : Nurul Hidayah

**IDENTITAS ISTRI/SUAMI**

Nama : Ny. "S" / Tn "T"

Umur : 21 tahun / 25 tahun

Nikah/lamanya : 1x / ± 14 bulan

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wirausaha

Alamat : Jl. Mxx Jxxxx

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan produksi dan pengeluaran ASI lancar

2. Ibu mengatakan sudah tidak menggunakan pembalut dan ada pengeluaran keputihan dan tidak berbau
3. Ibu mengatakan rencana sebentar sore akan melakukan mandi wajib
4. Ibu mengatakan BAK lancar dan BAB lancar
5. Ibu mengatakan belum menggunakan KB saat ini dan rencana ingin menggunakan KB suntik 3 bulan mulai bulan Agustus
6. Ibu mengatakan bayinya menyusu dengan baik
7. Ibu mengatakan refleks isap pada bayi bagus
8. Ibu mengatakan bayinya sudah BAK dan BAB
9. Ibu mengatakan warna kulit bayi sudah tidak kuning
10. Ibu mengatakan telah membawa bayinya imunisasi BCG

#### **DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 90/80 mmHg
  - b. Nadi : 93 x/i
  - c. Pernapasan : 20 x/i
  - d. Suhu : 36.6°C
4. Pemeriksaan Head to Toe
  - a. Wajah : Tidak pucat, tidak ada edema dan nyeri tekan
  - b. Mata : Konjungtiva merah muda dan sklera putih

- c. Leher : Tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, limfa, dan vena *jugularis*
- d. Payudara : Bentuknya simetris kiri kanan, puting susu kurang menonjol, hiperpigmentasi areola *mammae*, tidak ada benjolan dan nyeri tekan, dan ada pengeluaran ASI
- e. Abdomen : Tampak *striae livide*, *linea nigra*, dan tidak ada bekas luka operasi, tinggi fundus uteri tidak teraba dan tidak ada nyeri tekan
- f. Genitalia : Tidak ada varises, terdapat luka jahitan sudah kering, tampak adanya lokia alba berwarna keputihan dan tidak berbau, tidak ada edema
5. Tanda-tanda Vital Bayi
- a. Suhu : 36.9°C
- b. HR : 140 x/i
- c. P : 40 x/i
6. Pemeriksaan Fisik Bayi
- a. Mata : Konjungtiva merah muda, sklera putih
- b. Abdomen : Tampak tali pusat telah pupus dan tidak ada kelainan
- c. Kulit : Tampak kemerahan

### ANALISA (A)

P1A0, *Postpartum* Hari Ke-42

**PLANNING (P)**

Tanggal 11 Mei 2024, Pukul 15.00 WITA

1. Memberikan ibu *health education* tentang :

a. Nutrisi dan cairan

Menganjurkan ibu mengonsumsi makan-makanan yang bergizi dan seimbang seperti ikan, telur, daging, hati, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran serta pemenuhan cairan dalam tubuh yaitu minum air putih 7-8 gelas per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

b. Istirahat atau tidur

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur 7-8 jam per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya seperti mandi 2 kali sehari, keramas rambut 2-3 kali seminggu, mengganti pembalut 3 kali sehari atau setiap kali dirasa sudah penuh, dan mengganti pakaian setiap kali dirasa lembap

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

2. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* pada kedua payudara secara bergantian

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

3. Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari yaitu :
- a. Dalam pemberian ASI saja sesuai dengan keinginan bayi, diberikan tiap 2-3 jam atau paling sedikit setiap 4 jam mulai dari hari pertama
  - b. Menjaga kebersihan bayi untuk selalu mengganti popok, selimut, pakaian jika basah atau lembap
  - c. Perawatan tali pusat hanya membersihkan menggunakan kain bersih dengan air bersih tanpa dibubuhi apa pun seperti bedak, minyak, sale, dll. Dan biarkan tali pusat dalam keadaan terbuka
  - d. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai pada bayi baru lahir yaitu pernafasan  $\geq 60$ x/menit, suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  atau  $\leq 36^{\circ}\text{C}$ , warna kulit kuning, biru atau pucat, tali pusat merah, bau busuk, keluar cairan atau darah. Apabila tanda-tanda tersebut terjadi maka harus segera membawa bayinya ke fasilitas kesehatan terdekat.

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

4. Memberikan konseling KB secara dini yaitu alat kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI

Hasil : Ibu mengerti dan rencana ingin menggunakan KB suntik 3 bulan

5. Menjelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya nifas
- a. Perdarahan vagina yang banyak melebihi dari darah haid biasa
  - b. Pengeluaran lochia yang berbau busuk
  - c. Nyeri bagian abdomen atau punggung
  - d. Sakit kepala terus menerus, nyeri ulu hati dan pandangan kabur

- e. Pembengkakan pada wajah dan tungkai
- f. Payudara menjadi merah, panas dan terasa sakit apabila ditekan
- g. Menganjurkan ibu untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila menemukan tanda-tanda bahaya tersebut

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya jika tanda-tanda tersebut dialami

6. Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda bahaya pada bayi
- a. Jika bayi tidak dapat menyusu, sulit minum, malas minum kemungkinan bayi mengalami kelainan pada bibir dan langit-langit atau bayi infeksi
  - b. Bayi kejang
  - c. Nafas bayi 30-60 per menit
  - d. Bayi merintih, kurang aktif dan lemah
  - e. Warna kulit bayi sianosis, kuning mulai dari kepala turun ke bagian bawah
  - f. Perut bayi kembung, dan muntah
  - g. Tali pusat bayi dan dinding perut di sekitar tali pusat berwarna kemerahan, berbau busuk terdapat pus atau nanah, keluar darah atau perdarahan
  - h. Dan apabila bayi mengalami salah satu tanda bahaya tersebut maka ibu atau keluarga harus segera membawa bayi ke petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat

Hasil : Ibu mengerti

7. Mengajarkan kepada ibu cara mandi wajib yang benar

Hasil : Ibu mengerti

8. Memberikan dukungan psikologis kepada ibunya untuk tidak selalu khawatir dengan kondisinya serta membantu ibunya untuk melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu

Hasil : Ibu memiliki sedikit kecemasan akan peran barunya sebagai ibu baru

9. Menganjurkan ibu tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT, perbanyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan masa nifas yaitu berzikir, bersholawat, dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

10. Menjelaskan kepada ibu bahwa sangat penting untuk melakukan imunisasi lengkap pada bayinya

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

11. Rencanakan dan minta kesediaan ibu untuk dilakukan kunjungan berikutnya pada dua minggu setelah kunjungan ke-42 hari

Hasil : Ibu bersedia

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN *POSTPARTUM***

**BERKELANJUTAN CALON AKSEPTOR KB PADA NY "S"**

**DI RSIA SITTI KHADIJAH 1**

No. Register : 13xxxx

Tanggal Partus : 31 Maret 2024 Pukul : 10.47 WITA

Tanggal Masuk Ruang Nifas : 31 Maret 2024 Pukul : 19.00 WITA

Tanggal Pengkajian : 25 May 2024 Pukul : 16.00 WITA

Tempat : Rumah Pasien

Pengkaji : Nurul Hidayah

**IDENTITAS ISTRI/SUAMI**

Nama : Ny. "S" / Tn "T"

Umur : 21 tahun / 25 tahun

Nikah/lamanya : 1x / ± 14 bulan

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wirausaha

Alamat : Jl. Mxx Jxxxx

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan produksi dan pengeluaran ASI lancar

2. Ibu mengatakan sudah tidak menggunakan pembalut dan ada pengeluaran berwarna keputihan dan tidak berbau
3. Ibu mengatakan belum menggunakan KB saat ini dan rencana ingin menggunakan KB suntik 3 bulan mulai bulan Agustus
4. Ibu mengatakan bayinya menyusui dengan baik
5. Ibu mengatakan refleks isap pada bayi bagus
6. Ibu mengatakan bayinya sudah BAK dan BAB

#### DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 100/70 mmHg
  - b. Nadi : 88 x/i
  - c. Pernapasan : 20 x/i
  - d. Suhu : 36.5°C
4. Pemeriksaan Head to Toe
  - a. Wajah : Tidak pucat, tidak ada edema dan nyeri tekan
  - b. Mata : Konjungtiva merah muda dan sklera putih
  - c. Leher : Tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, limfa, dan vena *jugularis*
  - d. Payudara : Bentuknya simetris kiri kanan, puting susu kurang menonjol, hiperpigmentasi areola

*mammae*, tidak ada benjolan dan nyeri tekan, dan ada pengeluaran ASI

- e. Abdomen : Tampak *striae livide*, *linea nigra*, dan tidak ada bekas luka operasi, tinggi fundus uteri tidak teraba dan tidak ada nyeri tekan
- f. Genitalia : Tidak ada varises dan edema, terdapat luka jahitan sudah kering, tampak adanya lokia alba berwarna keputihan dan tidak berbau

#### 5. Tanda-tanda Vital Bayi

- a. Suhu : 36.4°C
- b. HR : 145 x/i
- c. P : 52 x/i

#### 6. Pemeriksaan Fisik Bayi

- a. Mata : Konjungtiva merah muda, sklera putih
- b. Abdomen : Tampak tali pusat telah pupus dan tidak ada kelainan
- c. Kulit : Tampak kemerahan

### ANALISA (A)

P1A0, Calon Akseptor KB Suntik 3 bulan

**PLANNING (P)**

Tanggal 25 Mei 2024, Pukul 16.00 WITA

1. Memberikan ibu *health education* tentang :

a. Nutrisi dan cairan

Menganjurkan ibu mengonsumsi makan-makanan yang bergizi dan seimbang seperti ikan, telur, daging, hati, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran serta pemenuhan cairan dalam tubuh yaitu minum air putih 7-8 gelas per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

b. Istirahat atau tidur

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur 7-8 jam per hari

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya seperti mandi 2 kali sehari, keramas rambut 2-3 kali seminggu, mengganti pembalut 3 kali sehari atau setiap kali dirasa sudah penuh, dan mengganti pakaian setiap kali dirasa lembap

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

2. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* pada kedua payudara secara bergantian

Hasil : Ibu mengerti dan sedang melakukannya

3. Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda bahaya pada bayi
  - a. Jika bayi tidak dapat menyusu, sulit minum, malas minum kemungkinan bayi mengalami kelainan pada bibir dan langit-langit atau bayi infeksi
  - b. Bayi kejang
  - c. Nafas bayi 30-60 per menit
  - d. Bayi merintih, kurang aktif dan lemah
  - e. Warna kulit bayi sianosis, kuning mulai dari kepala turun ke bagian bawah
  - f. Perut bayi kembung, dan muntah
  - g. Tali pusat bayi dan dinding perut di sekitar tali pusat berwarna kemerahan, berbau busuk terdapat pus atau nanah, keluar darah atau perdarahan
  - h. Dan apabila bayi mengalami salah satu tanda bahaya tersebut maka ibu atau keluarga harus segera membawa bayi ke petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat

Hasil : Ibu mengerti

4. Mengingatkan ibu untuk melakukan imunisasi DPT pada bayinya pada tanggal 2024

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

5. Memberikan dukungan psikologis kepada ibunya untuk tidak selalu khawatir dengan kondisinya serta membantu ibunya untuk melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu

Hasil : Ibu sudah tidak merasa cemas dan lebih handal dalam merawat bayinya

6. Menganjurkan ibu tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT, perbanyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan yaitu Shalat 5 waktu, berzikir, bersholawat, dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya

Hasil : Ibu memahami dan siap untuk melakukannya

## MATRIKS KUNJUNGAN

No	Hari / Tanggal	Masa Kunjungan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1.	Jum'at / 1 April 2024 Pukul : 12.00 WITA  Kamar Perawatan Nifas	Kunjungan 1	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu merasakan nyeri luka jahitan berkurang</li> <li>Ibu mengatakan sudah BAK dan belum BAB</li> <li>Ibu mengatakan belum ada pengeluaran ASI</li> <li>Ibu mengatakan refleks isap pada bayi bagus</li> <li>Ibu mengatakan bayinya sudah BAK dan belum BAB</li> </ol> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanda-tanda vital : <ul style="list-style-type: none"> <li>TD : 109/73 mmHg</li> <li>Nadi : 119x/i</li> <li>Pernapasan : 20x/i</li> <li>Suhu : 36.5°C</li> </ul> </li> <li>Payudara : belum ada pengeluaran ASI</li> <li>Abdomen : TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik</li> <li>Genitalia : tampak luka jahitan sudah mulai kering, tampak lokia rubra</li> <li>TTV Bayi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Suhu : 36.5°C</li> <li>HR : 140 x/i</li> <li>P : 38X/i</li> </ul> </li> <li>Pemeriksaan Fisik Bayi : Tidak ada kelainan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini</li> <li>Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase fundus uteri</li> <li>Memberikan ibu <i>health education</i> tentang mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, dan personal <i>hygiene</i>.</li> <li>Mengajarkan ibu teknik menyusui, posisi menyusui cara melakukan perawatan payudara yang baik dan benar, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand pada kedua payudara secara bergantian.</li> <li>Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum</li> <li>Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>Menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan</li> <li>Rencanakan dan minta kesediaan ibu untuk dilakukan kunjungan berikutnya pada hari ke-3 atau sampai hari ke-6 setelah ibu keluar dari rumah sakit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masa nifas hari kedua berlangsung normal di tandai dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>TTV dalam batas normal</li> <li>TFU : 2 Jrbpst</li> <li>Kontraksi uterus baik</li> <li>Lokia : Rubra</li> </ul> </li> <li>Ibu mulai merasakan nyerinya berkurang</li> <li>Ibu memahami dan bersedia melakukannya dengan baik atas penjelasan yang diberikan</li> <li>Keadaan bayi baik</li> <li>Kebutuhan nutrisi akan ASI pada bayi belum terpenuhi</li> <li>Ibu bersedia akan dikunjungi pada hari ke-3 atau sampai hari ke-6 setelah ibu keluar dari rumah sakit</li> </ol>

2.	Rabu / 3 April 2024 Pukul : 12.00 WITA  Di Rumah Pasien	Kunjungan 2	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu sudah tidak merasakan nyeri luka jahitan perineum</li> <li>Ibu mengatakan BAK lancar dan BAB 1 kali</li> <li>Ibu mengatakan masih ada pengeluaran cairan dari jalan lahir berwarna merah pudar dan tidak berbau</li> <li>Ibu sempat memberikan sufor kepada bayinya kemarin</li> <li>Ibu mengatakan ASI-nya sudah keluar banyak dan lancar tadi subuh</li> <li>Ibu mengatakan bayinya menyusu dengan baik</li> <li>Ibu mengatakan bayinya sudah BAK dan BAB</li> <li>Ibu mengatakan warna kulit bayinya kuning</li> </ol> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanda-tanda vital : <ul style="list-style-type: none"> <li>TD : 110/80 mmHg</li> <li>N : 85 x/i</li> <li>P : 20 x/i</li> <li>S 36.5°C</li> </ul> </li> <li>Payudara : sudah ada pengeluaran ASI</li> <li>Abdomen : TFU pertengahan pusat-simpisis, kontraksi uterus baik</li> <li>Genitalia : tampak luka jahitan mulai kering, tampak lokia sanguinolenta</li> <li>TTV Bayi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Suhu : 36.7°C</li> <li>HR : 142 x/i</li> <li>P : 40 x/i</li> </ul> </li> <li>Tampak warna kulit bayi kuning bagian wajah</li> <li>Pemeriksaan fisik bayi tidak ada kelainan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengajarkan ibu teknik menyusui, posisi menyusui cara melakukan perawatan payudara yang baik dan benar, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demend pada kedua payudara secara bergantian dan menganjurkan ibu untuk berhenti memberikan sufor.</li> <li>Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum sertan tanda-tanda bahaya nifas</li> <li>Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>Mengajarkan ibu cara melakukan senam nifas dan menganjurkan untuk melakukan secara mandiri setiap hari selama 6 minggu</li> <li>Memberikan konseling KB secara dini yaitu alat kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI</li> <li>Menganjurkan ibu untuk menjemur bayinya pada pagi hari ± 15 menit dengan menutupi matanya Rencanakan dan minta kesediaan ibu untuk dilakukan kunjungan berikutnya pada hari ke-8 atau sampai hari ke-14 setelah ibu keluar dari rumah sakit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masa nifas hari ke-4 berlangsung normal di tandai dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>TTV dalam batas normal</li> <li>TFU : pertengahan pusat-simpisis</li> <li>Kontraksi uterus baik</li> <li>Lokia Sanguinolenta</li> </ul> </li> <li>Ibu sudah melakukan posisi menyusui serta perawatan payudara dengan baik</li> <li>Ibu ingin berdiskusi dengan suaminya mengenai alat kontrasepsi yang ibu mau gunakan</li> <li>Ibu bersedia menjemur bayinya pada pagi hari agar warna kulit bayi yang kuning kembali warna kemerahan</li> <li>Kebutuhan nutrisi akan ASI pada bayi terpenuhi</li> <li>Ibu bersedia akan dikunjungi pada hari ke-8 atau sampai hari ke-14 setelah ibu keluar dari rumah sakit</li> </ol>
----	--	-------------	--	---	---

3.	Rabu / 15 April 2024 Pukul : 16.00 WITA  Di Rumah Pasien	Kunjungan 3	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luka jahitannya ibu sudah kering dan tidak merasakan nyeri</li> <li>2. Produksi dan pengeluaran ASI ibu lancar</li> <li>3. Ibu sudah tidak menggunakan pembalut dan masih ada pengeluaran cairan dari jalan lahir berwarna kecoklatan dan tidak berbau</li> <li>4. Ibu mengatakan BAK lancar dan BAB lancar</li> <li>5. Ibu mengatakan rencana ingin menggunakan KB suntik 3 bulan</li> <li>6. Ibu mengatakan bayinya menyusu dengan baik</li> <li>7. Ibu mengatakan refleks isap pada bayi bagus</li> <li>8. Ibu mengatakan tali pusat bayi telah pupus</li> </ol> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda-tanda vital : <ul style="list-style-type: none"> <li>• TD : 90/70 mmHg</li> <li>• N : 92 x/i</li> <li>• P : 20 x/i</li> <li>• S : 36.6°C</li> </ul> </li> <li>2. Payudara : Tidak ada pembengkakan dan nyeri tekan</li> <li>3. Abdomen : TFU tidak teraba dan tidak ada nyeri tekan</li> <li>4. Genitalia : tampak luka jahitan sudah kering dan lokia serosa</li> <li>5. TTV Bayi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suhu : 36.7°C</li> <li>• HR : 140 x/i</li> <li>• P : 40 x/i</li> </ul> </li> <li>6. Pemeriksaan fisik bayi : Tidak ada kelainan</li> <li>7. Warna kulit bayi tampak kemerahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan ibu <i>health education</i> tentang mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, dan personal hygiene</li> <li>2. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand pada kedua payudara secara bergantian dan menganjurkan ibunya untuk memberikan ASI-nya secara eksklusif</li> <li>3. Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>4. Memberikan konseling KB secara dini yaitu alat kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI</li> <li>5. Menjelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya nifas</li> <li>6. Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda bahaya pada bayi</li> <li>7. Menjelaskan kepada ibu bahwa sangat penting untuk melakukan imunisasi lengkap pada bayinya dan mengingatkan ibu untuk melakukan imunisasi BCG pada bayinya pada tanggal 24 April 2024</li> <li>8. Rencanakan dan minta kesediaan ibu untuk dilakukan kunjungan berikutnya pada hari ke-15 atau sampai hari ke-42 setelah ibu keluar dari rumah sakit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa nifas hari ke-16 berlangsung normal di tandai dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• TTV dalam batas normal</li> <li>• TFU tidak teraba</li> <li>• Lokia serosa</li> </ul> </li> <li>2. Ibu melakukan anjuran untuk tidak berhubungan seksual</li> <li>3. Ibu rencana ingin menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan</li> <li>4. Ibu menyusui bayinya secara <i>on demand</i> dan bayi menyusu dengan baik dan bersedia memberikan ASI-nya secara eksklusif</li> <li>5. Warna kulit bayi tampak kemerahan Ibu bersedia akan dikunjungi kembali pada kunjungan berikutnya</li> </ol>
----	--	-------------	--	--	--

4.	Jum'at / 11 Mei 2024 Pukul 15.00 WITA  Di Rumah Pasien	Kunjungan 4	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu sudah tidak menggunakan pembalut dan terdapat pengeluaran lokia alba dan tidak berbau</li> <li>Produksi dan pengeluaran ASI lancar</li> <li>Ibu rencana akan melakukan mandi wajib</li> <li>Ibu menyusui dengan baik</li> <li>Bayi telah diimunisasi BCG dan tidak memiliki keluhan</li> </ol> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanda-tanda vital : <ul style="list-style-type: none"> <li>TD : 90/80 mmHg</li> <li>N : 93 x/i</li> <li>P : 20 x/i</li> <li>S : 36.6°C</li> </ul> </li> <li>Payudara : tidak ada kelainan, pengeluaran ASI</li> <li>Genitalia : luka jahitan kering, adanya lokia alba dan tidak berbau</li> <li>TTV Bayi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Suhu : 36.9°C</li> <li>HR : 143 x/i</li> <li>P : 52 x/i</li> </ul> </li> <li>Pemeriksaan fisik bayi : Tidak ada kelainan</li> <li>Warna kulit bayi tampak kemerahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demend pada kedua payudara secara bergantian dan menganjurkan ibunya untuk memberikan ASI-nya secara eksklusif</li> <li>Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>Memberikan konseling KB secara dini yaitu alat kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI</li> <li>Menjelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya nifas</li> <li>Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda bahaya pada bayi Rencanakan dan minta kesediaan ibu untuk dilakukan kunjungan berikutnya pada dua minggu setelah kunjungan ke-42 hari</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masa nifas hari ke-42 berlangsung normal di tandai dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>TTV dalam batas normal</li> <li>TFU tidak teraba</li> <li>Lokia serosa</li> </ul> </li> <li>Ibu rencana ingin menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan mulai pada bulan Agustus</li> <li>Ibu menyusui bayinya secara <i>on demend</i> dan bayi menyusu dengan baik dan bersedia memberikan ASI-nya secara eksklusif</li> <li>Warna kulit bayi tampak kemerahan Ibu bersedia akan dikunjungi kembali pada kunjungan berikutnya</li> </ol>
----	--	-------------	--	--	---

5.	Sabtu, 25 Mei 2024 Pukul 16.00 WITA Di rumah pasien	Kunjungan 5	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu sudah tidak menggunakan pembalut dan terdapat pengeluaran lokia alba dan tidak berbau</li> <li>Produksi dan pengeluaran ASI lancar</li> <li>Ibu rencana akan melakukan mandi wajib</li> <li>Ibu menyusui dengan baik</li> <li>Bayi telah diimunisasi BCG dan tidak memiliki keluhan</li> </ol> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanda-tanda vital : <ul style="list-style-type: none"> <li>TD : 100/70 mmHg</li> <li>N : 88 x/i</li> <li>P : 20 x/i</li> <li>S : 36.5°C</li> </ul> </li> <li>Payudara : tidak ada kelainan, ada pengeluaran ASI</li> <li>Genitalia : luka jahitan kering, tidak ada pengeluaran apapun</li> <li>TTV Bayi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Suhu : 36.4°C</li> <li>HR : 145 x/i</li> <li>P : 52 x/i</li> </ul> </li> <li>Pemeriksaan fisik bayi : Tidak ada kelainan</li> <li>Warna kulit bayi tampak kemerahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demend pada kedua payudara secara bergantian dan menganjurkan ibunya untuk memberikan ASI-nya secara eksklusif</li> <li>Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>Memberikan konseling KB secara dini yaitu alat kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI</li> <li>Menjelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya nifas</li> <li>Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda bahaya pada bayi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Calon akseptor KB Suntik 3 bulan</li> <li>Ibu menyusui bayinya secara on demend dan bayi menyusu dengan baik dan bersedia memberikan ASI-nya secara eksklusif</li> <li>Warna kulit bayi tampak kemerahan</li> </ol>
----	---	-------------	---	---	--

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada pembahasan ini akan membahas mengenai teori dan hasil kajian pelaksanaan dan implementasi asuhan yang telah dilakukan pada Ny "S" dengan *postpartum* berkelanjutan di RSIA Sitti Khadijah 1 pada tanggal 31 Maret 2024 dengan melakukan kunjungan rumah sebanyak 4 kali dan berlanjut di kunjungan berikutnya sebanyak 1 kali.

Penulis akan memberikan penjelasan tentang manajemen 7 langkah varney untuk menerapkan asuhan kebidanan secara teoritis dan sesuai dengan data nyata. Langkah pertama adalah menemukan data dasar, mengidentifikasi diagnosa atau masalah aktual dan potensial, penanganan segera atau kolaborasi, intervensi dan implementasi asuhan, serta evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan.

#### **A. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar**

Pada tahap ini berisi penjelasan data pasien yang akurat dan menyeluruh dari seluruh sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien. Data subjektif dan data objektif termasuk dalam metode pengumpulan data ini. Data subjektif adalah data yang diperoleh anamnesis atau wawancara yang dilakukan oleh pasien untuk menggambarkan kondisi pasien. Data objektif adalah data yang dikumpulkan dari observasi dan studi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau penulis sendiri.

Terlepas dari proses pengumpulan data ini, penulis tidak melihat adanya masalah karena sebelum melakukan pengkajian data telah dilakukan permohonan izin kepada pasien dan keluarga pasien dari kamar bersalin atas kesediaannya dilakukan pengkajian data serta asuhan yang akan diberikan sampai pasien selesai melewati masa nifasnya dengan baik sehingga memudahkan memberikan informasi secara terbuka dan membantu pasien mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kondisi pasien.

Pendataan pertama masa nifas dilakukan saat pasien telah berada pada ruang perawatan dan melakukan anamnesis dari pasien sendiri terdiri dari identitas ibu dan suami, keluhan utama, riwayat keluhan, riwayat prenatal dan intranatal, riwayat kesehatan ibu dan keluarga, siklus menstruasi, riwayat kontrasepsi, riwayat pola kehidupan sehari-hari serta data psikososial, ekonomi dan spiritual. Sedangkan analisis data objektif berasal dari pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan fisik. Pengkajian data ini bukan hanya berlaku pada ibu *postpartum* namun berlaku juga dalam pengkajian data bayinya.

Berdasarkan studi kasus Ny "S" dengan nifas hari pertama diketahui bahwa ibu telah saja melewati proses persalinan secara pervaginam pada tanggal 31 Maret 2024, pukul 10.47 WITA ditolong oleh bidan dengan riwayat episiotomi tingkat II dan mengeluh nyeri luka jahitan, pengeluaran ASI belum ada. Bayi lahir secara normal tanpa ada komplikasi dan plasenta lahir lengkap. Pola eliminasi ibu telah buang air kecil namun belum buang air besar.

Selanjutnya data objektif didapatkan bahwa ibu kelihatan meringis, tanda-tanda vital dalam batas normal dengan TD : 110/70 mmHg, Nadi : 82 x/i, Pernapasan : 20 x/i, suhu : 36.6°C. setelah pemeriksaan fisik, tidak ditemukan masalah dengan bayinya; proses involusi berlangsung normal ditandai dengan TFU setinggi pusat, kontraksi uterus baik teraba bulat maupun keras, dan lokia *rubra*.

Pada umumnya ibu *postpartum* yang mengalami nyeri luka perineum karena disebabkan adanya robekan jalan lahir baik karena ruptur maupun karena episiotomi pada waktu melahirkan janin yang disebabkan terdapat jaringan terputus, menyebabkan hipotalamus mengeluarkan reseptor nyeri di area perineum (Asma, 2022). Proses pemulihan luka perineum yang normal adalah 6 hingga 7 hari ibu nifas. Tindakan episiotomi dilakukan atas indikasi pencegahan ruptur secara spontan sehingga mencegah tingginya derajat robekan (Rohmin, 2017)<sup>16</sup>. Menurut penelitian *Markus Harry Jansson* bahwa robekan perineum mempengaruhi sekitar 80% wanita saat melahirkan, dengan wanita primipara lebih sering terkena dibandingkan wanita multipara (Jansson, 2020)<sup>17</sup>.

Dalam proses laktogenesis II dimulai dengan produksi susu yang banyak setelah melahirkan. Dengan dikeluarkannya plasenta saat melahirkan, penurunan progesteron yang cepat, serta adanya peningkatan kadar prolaktin,

---

<sup>16</sup> Rohmin Faktor Risiko yang Mempengaruhi Lama Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu *Postpartum* (Palembang, Jurnal Kesehatan, 2017)

<sup>17</sup> Jansson *Risk factors for perineal and vaginal tears in primiparous women – the prospective POPRACT-cohort study* (BMC Pregnancy and Childbirth, 2020)

kortisol, dan insulin, merangsang tahap ini. Dan biasanya terjadi pada hari ke 2 atau 3 pasca melahirkan. Laktasi dipertahankan dengan pengeluaran ASI secara teratur dan rangsangan pada puting yang memicu pelepasan prolaktin dari kelenjar hipofisis anterior dan oksitosin dari kelenjar hipofisis posterior. Maka dari itu, ibu perlu dukungan untuk memulai menyusui sesegera mungkin dan teratur pasca melahirkan demi merangsang produksi ASI (Pillay & Davis, 2023)<sup>18</sup>. Menurut penelitian Naomi Parmila bahwa bayi baru lahir memiliki cadangan energi dari protein, karbohidrat, dan lemak yang telah didapatkan semasa dalam kandungan dan hendak memberikan nutrisi hingga umur 3 hari pertama (Parmila, 2021)<sup>19</sup>.

Kisaran tanda-tanda vital dalam batas normal ditandai dengan tekanan darah sistole 90-140 mmHg dan tekanan darah diastole 60-90 mmHg, nadi 60-100 x/i, pernafasan 16-24 x/i, dan suhu 36.5°C-37.5°C. proses involusi berlangsung normal ditandai dengan uterus berkontraksi baik teraba bundar dan keras, penurunan TFU kisaran 1-2 cm tiap 24 jam, pengeluaran lokia sesuai tahapannya yaitu hari pertama hingga 4 hari lokia *rubra* berwarna merah segar yang terdiri dari darah dan pecahan desidua, jaringan endometrium, dan lendir (Chauhan & Tadi, 2023).

Keadaan Ibu dengan luka perineum, tidak mempengaruhi langsung dengan TTV, sehingga TTV dalam batas normal. Perubahan TTV jika terjadi infeksi pada luka perineum akan menyebabkan peradangan di sekitar luka

---

<sup>18</sup> Pillay *Physiology, Lactatio* (Amerika, StatPearls, 2023)

<sup>19</sup> Parmilah Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Ibu Nifas Dalam Pemberian Kolostrum Di Wilayah Kotatip Cilacap (Jawa Tengah, Viva Medika, 2021)

yang ditandai dengan luka basah, jahitan terbuka dan ibu menjadi demam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus.

#### B. Langkah II : Merumuskan Diagnosa / Masalah Aktual

Pada tahap ini, perumusan diagnosa atau masalah didasarkan pada interpretasi data dari data subjektif dan data objektif. Menurut data yang telah diperoleh pada Ny "S" dari data subjektif dan data objektif didapatkan hasil *postpartum* hari pertama berlangsung normal dengan ruptur tingkat II dalam menegakkan diagnosa.

Berdasarkan tinjauan pustaka bahwa masa nifas merupakan masa pasca persalinan yang memerlukan proses penyembuhan selama kurang lebih 6 minggu, selama proses pemulihan akan mengalami perubahan fisik yang sejalan dengan perubahan fisiologis dan menimbulkan rasa tidak nyaman pada awal masa nifas yang jika tidak dirawat dengan baik dapat menyebabkan perubahan patologis (Rahmawati, 2023)<sup>20</sup>.

Diharapkan involusi uteri ibu nifas kembali normal jika TFU turun 1 cm per harinya. Kemudian pengeluaran lokia diharapkan terjadi perubahan sesuai masa tahapan ibu *postpartum* yaitu lokia *rubra* berwarna merah segar yang berlangsung dari hari pertama hingga hari ketiga, lokia *sanguinolenta* berwarna merah kekuningan yang berlangsung pada hari ketiga hingga hari ke tujuh, lokia *serosa* berwarna kekuningan atau kecokelatan yang berlangsung

---

<sup>20</sup> Rahmawati Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas (Global Eksekutif Teknologi, 2023)

pada hari ke tujuh hingga hari ke empat belas, dan lokia alba berwarna keputihan berlangsung setelah 2 minggu (Sukma, 2021)<sup>21</sup>.

Data subjektif yang dikumpulkan untuk Ny "S" menunjukkan bahwa ibu merupakan kehamilan pertama dan sebelumnya tidak pernah abortus, telah melewati persalinan secara normal di tanggal 31 Maret 2024 pukul 10.47 WITA, ibu mengalami nyeri luka jahitan perineum. Sedangkan data objektif didapatkan dari pemeriksaan fisik yang meliputi, tanda-tanda vital dalam batas normal dengan Tekanan darah : 110/70 mmHg, Nadi : 82 x/i, Pernapasan : 20 x/i, suhu : 36.6°C, tinggi fundus uteri ibu berada setinggi pusat, kontraksi uterus baik teraba bulat dan keras, terlihat adanya lokia *rubra*, terlihat luka jahitan perineum belum kering dan tidak terjadi perdarahan abnormal.

Interpretasi data yang didapatkan dari diagnosa tersebut ialah Proses kembalinya rahim ke keadaan sebelum mengandung dan melahirkan dikenal dengan proses involusi. Kontraksi otot polos uterus memicu proses ini, yang dimulai dengan lahirnya plasenta. Nyeri perineum terjadi karena adanya robekan jalan lahir baik karena ruptur maupun karena episiotomi pada waktu melahirkan janin yang disebabkan terdapat jaringan terputus, menyebabkan hipotalamus mengeluarkan reseptor nyeri di area perineum (Asma, 2022.). Sehingga dapat disimpulkan mengenai tinjauan teori dan tinjauan kasus tidak ditemukan adanya kesenjangan.

---

<sup>21</sup> Sukma Modul Asuhan Masa Nifas Penyusun (Jakarta, 2021)

### C. Langkah III : Merumuskan Diagnosa / Masalah Potensial

Pada tahap ini, akan membahas potensi masalah yang muncul dari kumpulan masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya sehingga mengantisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan yaitu terjadinya tanda-tanda bahaya dalam masa *postpartum* yaitu infeksi nifas, perdarahan hebat, masalah payudara, sub involusi, dan masalah psikologis. Indikator dalam pencegahan tanda-tanda bahaya nifas yaitu tidak mengeluh nyeri perut bagian bawah berulang, tanda-tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus baik, terjadi penurunan TFU, pengeluaran lokia sesuai tahapannya dan tidak berbau, tidak terjadi bendungan atau pembengkakan payudara, luka jahitan perineum mengering dan tidak lembap.

Pada ibu nifas juga akan mengalami masalah psikologi yang menjadi salah satu penyebabnya ialah ibu yang berusia muda atau ibu yang kehamilannya primigravidarum, kelelahan akibat kurang tidur selama persalinan, dan nyeri yang ibu rasakan tidak berhenti. Masalah psikologi ini bisa saja dicegah dengan memberikan dukungan kepada ibunya bahwa peran dan tanggung jawab sebagai seorang ibu dapat dilakukan dengan baik dan mengajak ibunya senantiasa berzikir, berdoa, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan hal lain yang bisa memberikan ketenangan jiwa dan batin ibunya.

Adapun studi penelitian telah dilakukan pada kasus Ny "S" antisipasi yang bisa terjadi yaitu infeksi luka perineum. Hal ini bisa saja terjadi karena daya tahan tubuh ibu yang rendah pasca persalinan, perawatan dan

kebersihan perineum yang kurang baik (Gustirini, 2021)<sup>22</sup>. Menurut penelitian Miratu dan Iga tahun 2021, pemenuhan nutrisi sangat mempengaruhi dalam penyembuhan luka perineum jika nutrisi tidak terpenuhi akan menghambat proses penyembuhan bahkan menyebabkan infeksi pada luka (Megasari, 2021)<sup>23</sup>.

Diagnosa potensial ditegakkan berdasarkan jika terjadinya indikasi terhadapantisipasi infeksi luka perineum yaitu peradangan pada sekitar luka yang ditandai dengan luka basah, jahitan terbuka dan ibu menjadi demam. Sehingga dapat disimpulkan mengenai tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ditemukan adanya perbedaan.

#### D. Langkah IV : Tindakan Segera / Kolaborasi

Pada tahap ini, bidan mampu melakukan penanganan segera atau kolaborasi secara mandiri dan bersifat rujukan jika telah teridentifikasi di langkah sebelumnya memiliki kondisi yang mengharuskan atau membutuhkan sebuah tindakan segera untuk menyelamatkan pasien. Pada kasus *postpartum* fisiologi keadaan yang harus diantisipasi yaitu perdarahan *postpartum*, infeksi, bendungan ASI, sub involusi, dan lain-lain.

Adapun studi penelitian telah dilakukan pada kasus Ny "S" tidak ditemukannya data penunjang yang memerlukan penanganan segera, bekerja sama atau rujukan. Dengan dilakukannya pengkajian dan pemantauan

---

<sup>22</sup> Gustirini Pengetahuan Ibu Postpartum Normal Tentang Perawatan Luka Perineum (Palembang, Jurnal Kebidanan, 2021)

<sup>23</sup> Megasari Asuhan Kebidanan Ny. V Dengan Luka Episiotomi (Pekanbaru, Nuha Medika, 2021)

keadaan didapatkan ibu *postpartum* berlangsung normal dan tidak ditemukan adanya komplikasi yang menyertainya. Sehingga ditarik kesimpulan mengenai tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ditemukannya adanya kesenjangan.

#### E. Langkah V : Rencana Tindakan / Intervensi

Pada tahap ini merencanakan asuhan kebidanan yang didapatkan dari langkah-langkah sebelumnya. Pada asuhan manajemen kebidanan merupakan suatu penanganan komprehensif yang dilaksanakan atas indikasi berdasarkan keadaan pasien, rencana tindakan pun harus disetujui pasien dan seluruh tindakan yang akan dilakukan bersifat logis yang signifikan dan kebenarannya diakui. Pada pembuatan perencanaan harus berlandaskan tujuan dan kriteria yang akan dicapai yaitu berdasarkan keadaan pasien dari diagnosa, masalah aktual, dan masalah potensial.

Pada kasus Ny "S" dari diagnosa aktual dan masalah potensial dengan *postpartum* berkelanjutan. Dalam hal ini asuhan yang dilaksanakan harus sesuai dengan standar dan kebutuhan ibu. Dengan melakukan pemantauan rutin kunjungan yaitu tanda-tanda vital untuk mengetahui keadaan umum ibu, hasil pemeriksaan yang didapatkan dalam batas normal dan diharapkan selama ibu masa nifas berlangsung normal.

Selanjutnya proses involusi didapatkan dari pemantauan tinggi fundus uteri bertujuan mengetahui apakah involusi berlangsung secara normal dan uterus akan mengalami kembalinya seperti keadaan sebelum hamil dan persalinan disebut proses involusi. Penilaian kontraksi merupakan salah satu cara mencegah perdarahan *postpartum* yang disebabkan oleh *atonia* uteri

yaitu ketidakmampuan uterus berkontraksi. Dan pemantauan pengeluaran lokia adalah cairan ekskresi yang keluar dari jalan lahir selama *postpartum* dan pengeluaran lokia yang normal akan berubah sesuai dengan tahapannya.

Pada langkah sebelumnya dalam masalah aktual telah dilakukan pengkajian adanya nyeri luka perineum, maka dari itu perencanaan tindakan asuhan yang akan dilakukan untuk ibunya adalah menjelaskan penyebab nyeri yang ibu rasakan bahwa nyeri tersebut karena terjadinya robekan jalan lahir baik karena ruptur maupun karena episiotomi pada waktu melahirkan janin yang disebabkan terdapat jaringan terputus, menyebabkan hipotalamus mengeluarkan reseptor nyeri di area perineum (Asma, 2022).

Setelah itu, mengajarkan cara melakukan mobilisasi dini dengan melakukan miring kanan dan kiri terlebih dahulu dan berjalan di sekitar tempat tidurnya atau berjalan ke kamar mandi bertujuan sirkulasi darah ke jaringan lancar sehingga mencegah terjadinya *tromboplebitis* serta membantu mempercepat proses involusi uteri dan penyembuhan. Dan menjelaskan kepada ibunya mengenai tanda-tanda infeksi pada luka jahitan yang bertujuan untuk mengetahui segera adanya infeksi sehingga ibu dapat segera mengambil penanganan jika hal tersebut terjadi.

memberikan pendidikan kesehatan tentang makan makanan yang bergizi serta mencukupi cairan bertujuan untuk memulihkan tenaga serta membantu penyembuhan selama proses pemulihan dengan luka persalinan dan pemenuhan gizi yang baik akan berdampak pada produksi ASI ibu dan makanan yang mengandung serat akan memperlancar BAB. Menganjurkan ibu

istirahat yang cukup bertujuan memulihkan kembali tenaga ibu yang cukup menguras tenaga selama proses persalinan dan jika ibu tidak istirahat dengan cukup tentu akan mempengaruhi dalam pengurangan produksi ASI.

Menganjurkan untuk menjaga kebersihan diri ibunya seperti mandi 2 kali dalam sehari, keramas rambut 2-3 kali seminggu, mengganti pembalut 3 kali dalam sehari atau setiap kali terasa penuh, dan mengganti pakaian tiap kali terasa lembap bertujuan untuk memberikan rasa kenyamanan pada ibunya dan mencegah potensi infeksi terutama pada luka jahitan perineum.

Seorang ibu yang telah berada pada masa *postpartum* tentu diharapkan bisa memberikan ASI kepada bayinya. ASI merupakan makanan lezat yang memiliki kandungan gizi luas dan mendalam. Seluruh kandungan ASI sesuai dengan kesejahteraan bersifat alami, bukan sintetis sehingga aman dan dapat dimanfaatkan secara sepenuhnya. Selain bermanfaat pada bayinya, ASI juga bermanfaat pada ibunya untuk mencegah bendungan ASI yang disebabkan oleh penyempitan duktus *laktiferus* atau kelenjar yang tidak dikosongkan dengan sempurna sehingga ibu diajarkan cara teknik menyusui, posisi menyusui, dan cara perawatan payudara dengan baik dan benar.

Sangat penting bagi ibu untuk menghindari hubungan seksual selama enam minggu setelah persalinan. Ini karena selama masa nifas, atau keluarnya darah bersama jaringan yang disiapkan untuk pembuahan di rahim wanita, haid mengganggu wanita secara fisik dan mental, serta pria. Selain itu, keluarnya darah baru menyebabkan masalah fisik bagi wanita. Sebaliknya, kedatangan tamu bulanan menyebabkan nafsu seksual wanita menurun dan

emosinya sering kali tidak terkendali. Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan pada pria.

Selanjutnya, masalah psikologi harus menjadi perhatian khusus karena masa *postpartum* adalah tahapan di mana ibu memulai menjadi seorang ibu, terutama bagi ibu muda yang baru melahirkan dan memiliki kehamilan pertama. Karena itu, ibu dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, berzikir, dan berdoa secara konsisten.

Pada tahap ini penulis menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara teori dan kasus yang ditemukan selama proses pengkajian. Oleh karena itu, rencana asuhan yang akan dilakukan akan sesuai dengan teori, atau memiliki kemiripan dengan kasus yang telah ditemukan

#### F. Langkah VI : Implementasi

Pada langkah ini, rencana asuhan yang telah dibuat di langkah sebelumnya diterapkan. Bidan memiliki tanggung jawab akan pelaksanaan semua rencana asuhan (memastikan bahwa tindakan ini benar-benar dilakukan) di mana bidan memastikan ibunya melakukan perannya sesuai tindakan yang telah direncanakan.

Pada studi kasus Ny "S", pelaksanaan asuhan yang direncanakan diberikan sejak ibu masuk ke dalam ruangan perawatan 5 jam pasca persalinan. Di mulai dari pengkajian awal di RSIA Sitti Khadijah 1 pada tanggal 31 Maret 2024 yang baru saja melewati proses persalinan 5 jam yang lalu.

Asuhan dilakukan mengajarkan dan menganjurkan ibu terkait cara mobilisasi dini, masase fundus uteri, pendidikan kesehatan mengenai nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup dan menjaga *personal hygiene*, proses laktasi yaitu teknik menyusui, posisi menyusui dan perawatan payudara, menjelaskan tanda-tanda infeksi, menganjurkan ibu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan senantiasa berdoa agar proses masa *postpartum* ibu berlangsung dengan normal.

Rencana asuhan tersebut dilaksanakan dengan baik dan ibu maupun keluarga bekerja sama dengan baik dan menerima kedatangan peneliti untuk menjalankan proses pengkajian. Sehingga hasil pemeriksaan yang didapatkan dan telah disampaikan oleh ibunya bahwa kondisi ibu saat ini baik dengan keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, TFU setinggi pusat, pengeluaran lokia *rubra* berwarna merah segar, serta asuhan yang diajarkan dan dianjurkan oleh ibunya telah dipahami dan dilakukan dengan baik.

Selanjutnya pada kunjungan pertama masih di RSIA Sitti Khadijah 1 pada tanggal 1 April 2024 sebelum ibu akan dipulangkan, kunjungan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi ibunya setelah pengkajian sebelumnya yaitu mengobservasi tanda-tanda vital dalam batas normal, proses involusi uteri berlangsung normal ditandai dengan kontraksi uterus baik, TFU 2 jari bawah pusat, adanya lokia *rubra* dan tidak berbau, pengeluaran ASI belum ada, luka jahitan belum kering serta memberikan kembali *health education*, menganjurkan ibu menyusui bayinya secara *on*

*demand*, mengajarkan ibunya dan memperagakan kembali cara perawatan payudara untuk membantu memperlancar pengeluaran dan produksi ASI telah dilakukan, cara perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari mengingatkan ibu dalam peran baru sebagai seorang ibu, menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu, memberikan ibu dukungan psikologi dan memperbanyak amalan-amalan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Setelah dilakukan kunjungan pertama, kunjungan berikutnya dilanjutkan dengan kunjungan rumah dilakukan sebanyak 4 kali. Dimulai kunjungan kedua tanggal 3 April 2024 pada masa *postpartum* hari keempat dilakukan dengan pemeriksaan keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus baik, TFU pertengahan pusat dan simfisis, lochia *rubra* berwarna merah segar, serta mengingatkan kembali tentang *health education*, mengajarkan dan menanyakan bagaimana manfaat didapatkan dalam melakukan perawatan payudara yaitu setelah dilakukan dengan rutin selama di rumah pengeluaran ASI berjalan dengan lancar, apakah ada kesulitan dalam melakukan perawatan bayi di kehidupan sehari-hari dan ibu tidak kesulitan dalam merawat bayinya, menganjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual telah dilakukan, memberikan konseling kontrasepsi secara dini yaitu alat kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI dan ibunya masih ingin berdiskusi dengan suaminya mengenai alat kontrasepsi yang dia gunakan, menjelaskan tanda-tanda bahaya nifas, menganjurkan ibu untuk menjemur bayinya pada pagi hari mengingat hasil

data objektif didapatkan kulit bayi tampak kuning dan memberhentikan dalam pemberian susu formula, memberikan dukungan psikologis bahwa ibu tidak perlu merasa khawatir dan cemas karena merupakan salah satu hambatan dalam memproduksi ASI, serta mengingatkan kembali ibu untuk berserah diri dan memperbanyak amalan yaitu dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran atau bersholawat.

Kunjungan ketiga rumah berikutnya pada tanggal 15 April 2024 masa *postpartum* hari ke-16, kunjungan keempat pada tanggal 11 Mei 2024 masa *postpartum* hari ke-42, dan kunjungan terakhir tanggal 25 Mei 2024. Asuhan yang dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, tinggi fundus uteri sudah tidak teraba, pengeluaran lokia sesuai dengan tahapannya, dan mengingatkan kembali dalam *health education*, menganjurkan menyusui secara *on demand*, menanyakan apakah sudah mendapatkan persetujuan KB apa yang ingin digunakan yaitu rencana ingin menggunakan KB suntik 3 bulan, menjelaskan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, menjelaskan bahwa pemberian imunisasi lengkap pada bayi sangat penting, dan mengingatkan ibu untuk membawa bayi dilakukan imunisasi BCG tanggal 24 April 2024.

Pada tahap ini, semua perawatan yang diberikan kepada ibu telah disesuaikan dengan kebutuhan ibu, ibu dandan keluarga telah mendapatkan banyak informasi tentang kebutuhan ibu. ibu juga menerima dan menerapkan apa yang diajarkan.

### G. Langkah VII : Evaluasi

Pada tahap ini, evaluasi atau langkah terakhir dari asuhan yang telah dilakukan di tahap sebelumnya dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi pada diagnosa dan masalah telah terpenuhi. Jika rencana benar-benar efektif dalam pelaksanaannya, maka rencana tersebut dianggap efektif.

Pada hari pertama pemeriksaan *postpartum* fisiologi Ny "S", hasilnya menunjukkan bahwa keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, proses involusi uteri berjalan dengan normal dengan TFU setinggi pusat, kontraksi uterus baik teraba keras maupun bundar, ada lochia *rubra* berwarna merah segar dan tidak berbau, tidak ada infeksi pada jahitan perineum. Mengajarkan ibunya cara mobilisasi dini dan ibunya mulai perlahan berjalan ke kamar mandi, mengajarkan ibu untuk cara teknik menyusui dan posisi menyusui yang baik dan benar serta ibu sedang berusaha merangsang payudaranya dengan menyusui bayinya sesering mungkin agar terjadi pengeluaran ASI.

Selanjutnya evaluasi pada kunjungan pertama *postpartum* hari ke-2, keadaan ibu makin membaik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal, proses involusi uteri berlangsung normal ditandai dengan TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, pengeluaran lochia masih berwarna merah segar dan tidak berbau, luka jahitan mulai kering, belum ada pengeluaran ASI, ibu sudah bisa duduk di tempat tidur bahwa mobilisasi yang dilakukan telah berhasil, ibu sedang berusaha merangsang payudaranya dengan menyusui

bayinya sesering mungkin serta melakukan perawatan payudara yang telah diajarkan bertujuan untuk membantu memproduksi ASI dan kelancaran pengeluaran ASI, ibu telah memahami cara perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari dan tanda-tanda bahaya nifas.

Pada kunjungan kedua *postpartum* hari ke-4, keadaan ibu sudah membaik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal, proses involusi berlangsung normal ditandai dengan TFU mengalami penurunan yaitu pertengahan simfisis dan pusat, kontraksi uterus baik, pengeluaran lochia berwarna merah pudar, pengeluaran ASI sudah ada, bayi menyusu dengan baik, ibu bersedia untuk menjemur bayinya pada pagi hari  $\pm$  15 menit karena kulit bayi tampak kuning, dan ibu ingin berdiskusi dengan suaminya tentang metode kontrasepsi yang ingin digunakan.

Kunjungan ketiga *postpartum* hari ke-16, kondisi ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal, proses involusi uteri berlangsung normal dengan TFU tidak teraba, terdapat lochia *serosa* berwarna merah kekuningan dan tidak berbau, terdapat luka jahitan sudah kering, ibu rencana ingin menggunakan KB suntik 3 bulan, pengeluaran ASI ibu lancar dan bayi menyusu dengan baik, tampak kulit bayi sudah tidak kuning, dan ibu telah mahir dalam melakukan perawatan bayi baru lahir dalam sehari-hari, ibu bersedia akan membawa bayinya imunisasi BCG.

Kunjungan keempat *postpartum* hari ke-42, keadaan ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal, pengeluaran lochia alba warna keputihan dan tidak berbau, ibu rencana ingin menggunakan KB suntik 3 bulan

mulai pada bulan Agustus, pengeluaran ASI ibu lancar dan bayi menyusu dengan baik, dan ibu telah membawa bayinya imunisasi BCG dan tidak memiliki keluhan.

Kunjungan kelima *postpartum* hari ke-, keadaan ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal, ibu mengatakan sudah tidak ada pengeluaran apa pun dari jalan lahir, ibu rencana ingin menggunakan KB suntik 3 bulan mulai pada bulan Agustus, pengeluaran ASI ibu lancar dan bayi menyusu dengan baik, dan ibu rencana akan membawa bayinya untuk imunisasi DPT.

Maka dari itu dapat disimpulkan terkait pengkajian dan pemantauan dari hari pertama hingga 42 hari dan berlanjut kunjungan satu kali setelah *postpartum* 42 hari dilakukan secara bertahap mulai dari kunjungan rumah sakit hingga kunjungan di rumah pasien dengan terjadi perubahan signifikan bahwa ibu *postpartum* telah pulih dari nyeri luka jahitan perineum, terdapat pengeluaran ASI, tanda-tanda vital dalam batas normal dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya kelainan atau komplikasi dalam proses pengkajian dan pemantauan yang bisa saja membahayakan keselamatan ibu sehingga masa *postpartum* ibu berlangsung secara normal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penulis dapat sampai pada kesimpulan bahwa setelah menerapkan manajemen asuhan kebidanan berkelanjutan pada ibu *postpartum* Ny "S" dari pengkajian hingga evaluasi

1. Sebuah studi asuhan kebidanan *postpartum* yang berkelanjutan telah dilakukan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1. Hasilnya menunjukkan bahwa ibu berusia 21 tahun, P1A0 dengan *postpartum* 5 jam yang lalu, melahirkan secara normal pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 10.47 WITA.
2. Diagnosa dan masalah aktual dilakukan Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1. Hasil interpretasi data menunjukkan bahwa *postpartum* berlangsung secara normal dengan nyeri luka jahitan perineum.
3. Telah dilakukan perumusan diagnosa serta masalah potensial pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1. Hasil analisis dan interpretasi data menunjukkan berpotensi mengalami infeksi nyeri luka jahitan perineum.
4. Tindakan segera atau kolaborasi telah diidentifikasi pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada data yang mendukung untuk dilakukannya tindakan segera atau kolaborasi.
5. Perencanaan tindakan asuhan kebidanan telah dilakukan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1. Hasil perencanaan ini mencakup diagnosa atau

masalah aktual dan potensial serta intervensi yang diberikan kepada ibu dan keluarganya mengenai keadaannya berdasarkan semua hasil pemeriksaan. Ibu juga diberitahu tentang penyebab nyeri yang dirasakan akibat luka jahitan perineum. Melakukan pemantauan tanda-tanda vital, evaluasi kontraksi, TFU, pengeluaran lochia dan pengeluaran ASI.

Pendidikan kesehatan tentang pemenuhan nutrisi, istirahat dan *personal hygiene*. Mengajarkan ibu untuk mobilisasi dini, teknik menyusui, posisi menyusui, perawatan payudara, menganjurkan ibu menyusui secara *on demand* secara bergantian di kedua payudara, mengajarkan cara perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari, menganjurkan ibu untuk tidak berhubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan, mengajarkan senam nifas, menjelaskan kepada ibunya bahwa imunisasi pada bayi sangat penting, menganjurkan ibu untuk menjarangkan kehamilannya dalam penggunaan alat kontrasepsi, dan memberikan dukungan psikologi dan spiritual untuk memenuhi kebutuhan ibunya dari secara fisik hingga secara psikologi.

6. Tindakan asuhan kebidanan telah dilakukan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1. Hasil yang didapatkan dari perencanaan asuhan telah dilakukan dengan baik dan tidak ada masalah yang terjadi.
7. Diketahui bahwa evaluasi tindakan asuhan kebidanan pada Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah 1. Hasil yang telah didapatkan dari keseluruhan asuhan ialah ibu Ny "S" telah pulih dengan sempurna dari luka jahitan

perineum, terdapat pengeluaran ASI, tanda-tanda vital dalam batas normal dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan.

8. Hasil asuhan kebidanan Ny "S" di RSIA Sitti Khadijah telah dicatat dalam bentuk 7 langkah varney dan SOAP.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pasien**

Ibu yang baru melahirkan diharapkan dapat mengikuti dan menerapkan secara mandiri semua instruksi yang telah diberikan, terutama selama proses penyembuhan luka jahitan perineum, proses involusi uteri dan perawatan pada bayi baru lahir. Dan keterlibatan suami atau keluarga sangat diperlukan dalam meningkatkan hubungan yang lebih kuat dengan ibu dan bayinya.

### **2. Untuk Bidan**

Mampu memberikan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kebidanan, dengan menerapkan manajemen kebidanan dan dokumentasi asuhan untuk menunjukkan bahwa semua tindakan telah dilakukan. Serta seorang bidan juga diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik dan memberikan informasi atau pengetahuan dengan tepat bagi masyarakat khususnya pasiennya.

### **3. Untuk Institut Pendidikan**

Dari hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang timbul pada masa nifas dengan nyeri luka jahitan perineum. Oleh karena itu, diharapkan bahwa ilmu pengetahuan yang dipelajari selama kuliah dengan pengalaman

yang nyata di tempat peneliti tentang manajemen asuhan kebidanan dapat diterapkan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu *postpartum*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, I., Widiyanti Longgupa, L., Fajria Maulida, L., Kusuma Wardani, E., Dyah, A. S., Bahar, N., Sianipar, K., Purnamasari, D., & Mustary, M. (N.D.). *Masa Nifas*.
- Asma, K., Istiqamah, E., Masnilawati, A., & Kesehatan Masyarakat, F. (N.D.). *Penerbit: Pusat Kajian Dan Pengelola Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Umi Asuhan Kebidanan Post Natal Pada Ny. J Dengan Nyeri Luka Perineum*.
- Auguste, T., & Gulati, M. (2018). Recommendations And Conclusions Presidential Task Force On Redefining The Postpartum Visit Committee On Obstetric Practice Optimizing Postpartum Care Committee Opinion Optimizing Postpartum Care E141. In *Obstetrics & Gynecology Acog Committee Opinion Number* (Vol. 131, Issue 5).
- Azizah, O. N., & Rosyidah, R. (2019). *Buku Ajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Nifas Dan Menyusui Diterbitkan Oleh Umsida Press*.
- Chauhan, G., & Tadi, P. (2023). *Physiology, Postpartum Changes*. Statpearls. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/Nbk555904/?report=printable>
- Dinkes Data Profil 2021. (2021).
- Gustirini, R. (2021). Pengetahuan Ibu Postpartum Normal Tentang Perawatan Luka Perineum Knowledge Of Normal Post Partum Mother's About Perineal Wound Care Info Artikel Abstrak. *Jurnal Kebidanan*, 10(1), 31.
- Hamdayani Pasaribu, I., Khalidatul Khair Anwar, Mk., Ano Luthfa, Mk., Fath Irtaniyah Rahman, Mk., Irma Yanti, Mk., Yuanita Viva Avia Dewi, Mk., Dian Rosmala Lestari, Mk., Nurmala Sari, Mk., Helmy Apreliasari, Mt., Keb Lydia Febri Kurniatin, M., Wahidah Rohmawati, Mk., Mukhlisiana Ahamd, Mk., Erniwati Daranga Sst, Mk., Eny Irawati, Mk., & Lia Indria Sari, M. (2023).

*Asuhan Kebidanan Masa Nifas Dan Menyusui Penerbit Cv.Eureka Media Aksara.*

- Hilmiah, Y., Maemunah, D., Fitria, N., Nurhaliza, F., Dewi, T. R., & Mandavika, S. (2023). *Asuhan Masa Nifas Di Keluarga*. Langgam Pustaka. [https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=O6\\_Neaaaqbj&Lpg=Pa1&Dq=Asuhan%20masa%20nifas&Lr&Hl=id&Pg=Pr1#V=Onepage&Q=Asuhan%20masa%20nifas&F=True](https://books.google.co.id/books?id=O6_Neaaaqbj&lpg=Pa1&dq=asuhan%20masa%20nifas&lr&hl=id&pg=pr1#v=onepage&q=asuhan%20masa%20nifas&f=true)
- Jansson, M. H., Franzén, K., Hiyoshi, A., Tegerstedt, G., Dahlgren, H., & Nilsson, K. (2020). Risk Factors For Perineal And Vaginal Tears In Primiparous Women – The Prospective Popract-Cohort Study. *Bmc Pregnancy And Childbirth*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-020-03447-0>
- Kementerian Agama RI, A. N. *Quran Kemenag 2019*. [https://Lajnah.Kemenag.Go.Id](https://lajnah.kemenag.go.id)
- Megasari, M., Aulia, I., Hang, S., & Pekanbaru, T. (N.D.). *Asuhan Kebidanan Ny. V Dengan Luka Episiotomi*.
- Parmila Hesti Savitri, N., Kebidanan Graha Mandiri Cilacap, A., & Sevi Oktaviana, A. (2021). *Viva Medika Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Ibu Nifas Dalam Pemberian Kolostrum Di Wilayah Kotatip Cilacap* (Vol. 14). [http://Ejournal.Uhb.Ac.Id/Index.Php/Vm/Issue/Archive](http://ejournal.uhb.ac.id/index.php/vm/issue/archive)
- Pillay, J., & Davis, T. J. (2023, July). *Physiology, Lactatio*.
- Purba, N. H., Mastikana, I., Purba, D., Oktavia, L. D., Kebidanan, P., Bros, A., Kebidanan, P. D., & Pangkapinang, K. (2023). Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Perubahan Adaptasi Fisiologi Masa Nifas. In *Jurnal Sains Kesehatan* (Vol. 30, Issue 1).

- Qanita, Muhida, V., & Kesehatan Aisyiyah Banten, P. (2021). *Analisis Faktor Risiko Terjadinya Postpartum Blues Di Ruang Wijaya Kusuma Analysis Of The Risk Factors Of The Postpartum Blues In The Wijaya Kusuma*.
- Rahmawati, E., Nurhidayati, S., Mustari, R., Yanti, L. C., Novidha, D. H., Erviany, N., Syamsuriyati, Rabiattunnisa, Fitri, N., Martini, Wijayanti, E., Mayasari, S. I., & Febriyanti, N. M. A. (2023). *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas* (I. Melisa & N. Sulung, Eds.). Global Eksekutif Teknologi. [https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Oznceaaaqbaj&Lpg=Pa26&Dq=Asuhan%20masa%20nifas&Lr&Hl=id&Pg=Pp1#V=Onepage&Q=Asuhan%20masa%20nifas&F=True](https://books.google.co.id/books?id=Oznceaaaqbaj&lpg=Pa26&dq=Asuhan%20masa%20nifas&lr&hl=id&pg=pp1#v=onepage&q=Asuhan%20masa%20nifas&f=true)
- Rohmin, A., Octariani, B., Jania, M., Studi, P., Kebidanan, D., Siti, S., & Palembang, K. (N.D.). *Oofaktor Risiko Yang Mempengaruhi Lama Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Post Partum*.
- Saleha, S. (2009). *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Salemba Medika.
- Septianti, T., Nuryani, P., Puji, T., Asuhan, R., Nifas, K., Menyusui, D., Kalangan, U., Penerbit, S., Kebidanan, P., Poltekkes, M., & Surabaya, K. (2018). *Modul Ajar Nifas Dan Menyusui*.
- Setiawati, D. (2013). *Buku Saku Dasar-Dasar Obstetri*.
- Shihab, M. Q. (N.D.). *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1*.
- Sukma, F., Meli Deviana, Mk., Trkeb Heri Rosyati, M., & Prodi Sarjana Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Kesehatan, M. (2021). *Modul Asuhan Masa Nifas Penyusun*.
- Sumarni, & Nahira. (2019). *Asuhan Kebidanan Ibu Postpartum*.
- Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1*. (N.D.).
- Wa Ode Rahayu, K., Hardiyanti Saputri, L., Diii Kebidanan, P., & Kesehatan Masyarakat, F. (N.D.). *Penerbit : Pusat Kajian Dan Pengelola Jurnal Fakultas*

*Kesehatan Masyarakat Umi Asuhan Kebidanan Post Natal Pada Ny. N Dengan Nyeri Luka Perineum.*

Who. (2023). *World Health Statistics 2023 Monitoring Health For The Sdgs Sustainable Development Goals Health For All.*  
<https://www.who.int/publications/book-orders>.

Who, Unicef, Unfpa, World Bank Group, & Undesa. (2023). *Trends-In-Maternal-Mortality-2000-2020.*

Yuliasih, W. F., Surtinah, N., Herlina, T., & Handayani, T. E. (2023). Trend Determinan Penyebab Kematian Bayi Di Kabupaten Magetan Tahun 2020-2022. *Global Health Science, 8.*



PENDOKUMENTASIAN



ALAUDDIN  
MAKASSAR



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

J.R.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016364, E-mail: [kepka.fkik@uin-alauddin.ac.id](mailto:kepka.fkik@uin-alauddin.ac.id)

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
**ETHICAL CLEARANCE**  
**DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD**  
**"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"**

No.D.019/KEPK/FKIK/II/2024

Protokol penelitian yang diajukan oleh :  
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : Nurul Hidayah  
 Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar  
 Name of the Institution

Dengan judul:  
 Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM BERKELANJUTAN  
 PADA NY "... RSIA SITI KHADIJAH 1 TAHUN 2024"**


**"SUSTAINABLE POSTPARTUM MIDWIFERY CARE MANAGEMENT  
 ON NY "... RSIA SITI KHADIJAH 1 IN 2024"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefit, 4) Risk, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025.

*This declaration of ethics applies during the period February 15, 2024 until February 15, 2025.*

February 15, 2024  
 and Chairperson,  
  
 Dr. Ismay Ismail, S.Si., M.Si., Apt.  




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa  
Website: fki.ulin-alauddin.ac.id

Nomor : B-2175 / Un.06/FKIK/PP.00.9/5/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Perihal : **Rekomendasi Pengambilan Data Awal**

Gowa, 20 Mei 2024

Yth. Direktur RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar  
Di  
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini :

Nama : **Nurul Hidayah**  
N I M : 70400121012  
Semester/T.A : VI (Enam)  
Fakultas/Prodi : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan  
Alamat : Makassar  
No. Hp : 085241652782

Bermaksud melakukan pengambilan data awal dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi:

**"Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Berkelanjutan pada Ny "... di RSIA Sitti Khadijah I Makassar"**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Firdayanti, S.Si.,M.Keb.  
2. Ferawali Taherong, S.ST.,M.Keb..

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa(i) tersebut dapat di beri izin untuk pengambilan Data Awal di Wilayah Kerja **RSIA Sitti Khadijah I Makassar**.

Demikian rekomendasi ini di buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Isriany Ismail

Tembusan :  
- Dekan FKIK UINAM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
 Jl. H.M. Yasin Limpe No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879  
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 02971/Ujn.06/LP2M/PP.00.9/03/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan  
 C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di  
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah  
 NIM : 70400121012  
 Semester/T.A. : VI (Enam)/T.A. 2023-2024  
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
 Jurusan/Prodi : Kebidanan  
 Alamat : Jl Toddopuli X Blok A1/26  
 No. HP. : 085241642782

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Dengan judul Skripsi: **Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Berkelanjutan Pada Ny "..."** Di RSIA Sitti Khadijah 1 Tahun 2024.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di RSIA Sitti Khadijah 1 dari tanggal 9 Maret 2024 sampai 9 Mei 2024.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 09 Maret 2024



**DR. ROPMATI, S. Ag., M. Th. I.**  
 NIP. 197212311999032004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan  
 - pertinggal



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://slmap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: 5848/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSIA Siti Khadijah 1
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Muhammadiyah Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor: B-02971/Un.06/LP2M/PP.00.9/03/2024 tanggal 09 Maret 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: NURUL HIDAYAH
Nomor Pokok	: 70400121012
Program Studi	: Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM BERKELANJUTAN PADA NY "..." DI RSIA SITI KHADIJAH 1 TAHUN 2024 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Maret s/d 09 Mei 2024**.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 09 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar,  
2. Peninggal.



**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA)  
"SITTI KHADIJAH 1"  
MUHAMMADIYAH CABANG MAKASSAR**

Jl. R.A. KARTINI 15 - 17 TEL.P. (0411) 3624554, 3629245, 3627119, 3614661 FAX 3627119  
MAKASSAR SULAWESI SELATAN 90111 E-Mail : rsia.sitti.khadijah@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 582./DiklatRS//IV.6.AU/F/1495 /2024

Makassar, 17 Ramadhan 1445 H  
28 Maret 2024M

Lamp :

Hal : Pengambilan Data Penelitian

Kepada Yth.

Ka. Bidang/Ka. Bagian/Ka. Instalasi/Ka. Ruang

P.N.S. / Perawat

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat, Mohon bantuannya untuk memberikan data / informasi yang diperlukan untuk penelitian kepada yang bersangkutan :

Nama : Nurul Hidayah  
No. Telp : 085241642782  
N I M : 704002102  
Program Studi : Kebidanan (D3)  
Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Berdasarkan pada Ny " " Di RSIA Sitti Khadijah 1 Tahun 2024

Tanggal Penelitian

28 Maret 2024 s/d 07 April 2024

Demikian, kami sampaikan atas bantuannya diucapkan banyak TERIMA KASIH dengan iringan do'a Jazaakumullahu Khairat Jazaa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wasalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diklat,  
SITTI KHADIJAH 1  
Lupol Nekt R. SKM

Tembusan :

1. Arsip.

**BIODATA PENULIS****I. Identitas Peneliti**

Nama : Nurul Hidayah  
NIM : 70400121012  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : Makassar, 13 Maret 2003  
Agama : Islam  
Alamat : Jl Toddopuli X Blok A1/26  
No. Hp : 085241642782  
Email : [dayaya1325@gmail.com](mailto:dayaya1325@gmail.com)

**II. Riwayat Pendidikan**

1. Tahun 2009-2015 : SD Negeri Tidung Makassar
2. Tahun 2015-2018 : SMP Negeri 24 Makassar
3. Tahun 2018-2021 : SMA Negeri 9 Makassar
4. Tahun 2021-2024 : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar