

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PASCA SEKSIO SESAREA PADA NY."P"

DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR

TAHUN 2024



RISALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Pendidikan
Ahli Madya Kebidanan Jurusan DIII Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran
Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh :

REZKY AMELINDAH

NIM. 70400121014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PROGRAM STUDI KEBIDANAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN RISALAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rezky Amelindah
Nim : 70400121014
Tempat/Tanggal lahir : Bulukumba, 18 Desember 2003
Jurusan/Prodi : D3 Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul :Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio
Sesarea Pada Ny. "P" Di RS Bhayangkara
Makassar Tahun 2024.

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Risalah ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka Risalah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Juni 2024

Dzulhijjah 1445 H

Penyusun

Rezky Amelindah

70400121014


PERSETUJUAN RISALAH

Nama : Rezky Amelindah
NIM : 70400121014
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio
Sesarea Pada Ny. "P" Di RS Bhayangkara
Makassar

Risalah ini telah disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil Risalah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata, 24 Juni 2024

Pembimbing I



Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb
Nip. 1976012620060420012

Pembimbing II



A. Dian Diarfah, M.Psi., Psikolog
Nip. 199003032019032014

Diketahui Oleh:
Ketua Prodi Kebidanan




Anieq Mumthi'ah AlKautzar, S.ST., M.Keb
NIP. 19890116 201903 2 009

PENGESAHAN RISALAH

Risalah ini berjudul "**Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. "P" Di RS Bhayangkara Makassar Tahun 2024**", yang disusun oleh **Rezky Amelindah NIM 70400121014** Mahasiswa Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Risalah yang diselenggarakan pada hari **Senin, 24 Juni 2024**, bertepatan dengan **Tanggal 17 Dzulhijjah 1445 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 24 Juni 2024
17 Dzulhijjah 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG, M.Kes (.....)	
Sekretaris	: Zelna Yuni Andryani, S.ST, M.Keb	
Pembimbing I	: Ferawati Taherong S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: A. Dian Diarfah, M.Psi., Psikolog	(.....)
Penguji I	: Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST, M.Keb	
Penguji II	: Sitti Syakirah Abu Nawas, M.Th.I	

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes
NIM 198106212006040005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga segala kegiatan yang sedang dikerjakan dan diusahakan bernilai ibadah di sisi-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, Nabi yang telah memberikan keberkahan dan petunjuk kebenaran kepada seluruh umat islam yang ada di muka bumi ini terutama kepada penulis yang Menyusun Risalah dengan judul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. “P” di RS Bhayangkara Makassar Tahun 2024”**. Risalah ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Terselesaikannya Risalah ini tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak, sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Risalah ini sehingga bisa selesai dengan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengatakan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D. Selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.Og., M. Kes. Selaku Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan fasilitas kepada seluruh mahasiswa selama masa pendidikannya.
3. Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M. Keb. Selaku Ketua Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Sekaligus sebagai Penguji kompetensi yang telah menyempatkan waktu, memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan Risalah ini.
4. Ferawati Taherong, S.ST., M. Keb. Selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing, menuntun, dan mendidik serta selalu meluangkan waktunya, tenaganya dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis. Tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi kepada penulis sehingga Risalah ini bisa selesai dengan tepat waktu.
5. A. Dian Diarfah, M.Psi., Psikolog. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga Risalah ini bisa selesai dengan tepat waktu.
6. Sitti Syakirah Abu Nawas, M. Th., I. Selaku Penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan bersifat islamiah dalam penyusunan Risalah ini.
7. Para dosen Prodi Kebidanan yang selalu senantiasa memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa pendidikannya.

8. Direktur RS Bhayangkara Makassar dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian hingga selesai.
9. Kepada kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda tercinta Abd. Wahab Sunusi dan Ibunda Tercinta Hasmawati yang telah memberiku kasih sayang sepenuh hati, bersusah payah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan senantiasa membina penulis dengan Ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batiniah serta selalu senantiasa sabar dalam mengajarkan banyak hal kepada penulis dan kekhusu'an doa yang selalu terucap dalam setiap sholat beliau untuk penulis yang tidak ada hentinya. Tanpa kalian penulis tidak akan bisa sampai ke tahap seperti ini. Demikian juga untuk kakak tercinta Serda Ricky Azhari yang selalu mendukung penulis baik secara materi dan senantiasa mendukung penulis dalam segala hal, serta untuk adek tercinta Citra Trimadevi yang selalu memberikan semangat.
10. Para sahabat Nadiatul Umrana, Warni, Nur Tilawah, Nurul Hidayah, Sahmirawani, Reyza Fatimah Sahra, Ummi Kaltsum, Mentari Syarif, Fitriwana dan Nurfadillah Istiqomah yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Risalah ini.
11. Para teman-teman Kebidanan Khususnya Angkatan 2021 atau E2IM yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan warna-warni di bangku perkuliahan. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

12. Terakhir, untuk diri saya Rezky Amelindah terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai macam tekanan diluar keadaan dan tidak pernah sedikitpun memutuskan menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan risalah ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirul Kalam, penulis berharap Semoga Risalah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaannya maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kesehatan khususnya di Kebidanan. Penulis menyadari Risalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna dapat menyempurnakan penulisan Risalah.
Terima Kasih

Samata, Juni 2024

Rezky Amelindah

70400121014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan keaslian risalah	ii
Persetujuan Risalah	iii
Pengesahan Risalah	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan	8
E. Metode Penulisan.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13

A. Tinjauan Umum Masa Nifas	13
1. Pengertian masa nifas	13
2. Tujuan asuhan masa nifas	18
3. Periode masa nifas	20
4. Tahapan masa nifas	21
5. Perubahan fisiologis masa nifas	22
6. Perubahan psikologis masa nifas.....	34
7. Kebutuhan dasar ibu masa nifas	36
8. Program tindak lanjut asuhan masa nifas di rumah.....	39
9. Tanda-tanda bahaya masa nifas	42
10. Asuhan pada ibu nifas dengan pasca seksio sesarea.....	45
B. Tinjauan Khusus Tentang Seksio Sesarea	46
1. Definisi seksio sesarea	46
2. Jenis seksio sesarea	51
3. Indikasi seksio sesarea	53
4. Komplikasi pasca seksio sesarea	54
5. Proses penyembuhan luka pasca seksio sesarea	60
6. Perawatan pasca operasi seksio sesarea yang dilakukan bidan....	61
7. Asuhan perawatan luka seksio sesarea	62
8. Nutrisi masa nifas.....	64
9. Ambulasi dini.....	65
10. Defekasi	66
11. Kebersihan diri	67

C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	68
1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan	68
2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan	68
3. Pendokumentasian asuhan kebidanan (SOAP).....	72
BAB III STUDI KASUS	74
A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney	74
B. Pendokumentasian Tanggal 28 April 2024.....	97
C. Kunjungan Tanggal 28 April 2024.....	101
D. Kunjungan Tanggal 29 April 2024.....	107
E. Kunjunga Tanggal 4 Mei 2024	113
F. Kunjungan Tanggal 11 Mei 2024.....	118
G. Kunjungan Tanggal 22 Mei 2024.....	123
H. Kunjungan Tanggal 3 Juni 2024.....	127
I. Kunjungan Tanggal 16 Juni 2024	131
J. Matriks Kunjungan.....	135
BAB IV PEMBAHASAN	147
A. Langkah I : Identifikasi data dasar.....	147
B. Langkah II : Identifikasi diagnosa/masalah aktual.....	153
C. Langkah III : Identifikasi diagnosa/masalah potensial.....	155
D. Langkah IV : Tindakan segera/kolaborasi	156
E. Langkah V : Rencana tindakan.....	157

F. Langkah VI : Implementasi.....	162
G. Langkah VII : Evaluasi.....	167
BAB V PENUTUP	170
A. Kesimpulan	170
B. Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA.....	173
LAMPIRAN.....	175
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	182



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masa involusi	22
Tabel 2.2 Jadwal kunjungan masa nifas.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Kegiatan di RS Bhayangkara Makassar
- Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah
- Lampiran 3 : Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah
- Lampiran 4 : Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah
- Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah
- Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah
- Lampiran 7 : Dokumentasi Keterangan Layanan Etik
- Lampiran 8 : Dokumentasi Rekomendasi Izin Penelitian LP2M
- Lampiran 9 : Dokumentasi Izin Penelitian PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 10 : Dokumentasi Izin Penelitian di RS Bhayangkara Makassar



ABSTRACT

DEPARTMENT OF MIDWIFERY
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC WRITING, JUNE 2024

Name : Rezky Amelindah, 70400121014

Advisor I : Ferawati Taherong

Advisor II : A. Dian Diarfah

“Management of Post-Cesarean Section Midwifery Care in Mrs. "P" at Bhayangkara Hospital Makassar in 2024”

Cesarean section is a surgical procedure performed to deliver a baby and placenta through abdominal and uterine incision. According to data obtained at Bhayangkara Hospital Makassar in 2023, there were about 361 cases of mothers giving birth through cesarean section.

This study used a case study method to carry out post-cesarean section midwifery care management on Mrs. "P" at Bhayangkara Hospital Makassar in 2024. This study was conducted for about eight weeks, following Varney's 7-step midwifery care management approach and documentation in the form of SOAP.

The results of this study showed that Mrs. "P" experienced a suture wound after a cesarean section. The assessment revealed that the level of pain has decreased, routine breastfeeding on demand, and not giving formula milk to the baby, the wound with dry stitches and no signs of infection, observation of normal and odorless lochia discharge, no signs of danger in the newborn, mother had enough rest, constantly praying and dhikr to the God.

The conclusion of the case study showed that the midwifery care provided was effective, indicated by reduced pain levels, fluent breastfeeding, dry surgical wounds, and no signs of infection. Also, the baby's condition was good, there were no signs of danger for newborns, and mothers could do regular activities. Therefore, it could be concluded that there was no gap between the theory and the result of this case study.

Keywords: Postpartum, cesarean section, 7 steps of Varney



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, JUNI 2024

Rezky Amelindah, 70400121014

Pembimbing I : Ferawati Taherong

Pembimbing II : A. Dian Diarfah

“Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. “P” Di RS Bhayangkara Makassar Tahun 2024”

Seksio Sesarea ialah suatu tindakan bedah yang dilakukan untuk melahirkan janin dan plasenta dengan membuka dinding perut dan dinding uterus. Data yang diperoleh di RS Bhayangkara Makassar, pada tahun 2023 ibu melahirkan secara seksio sesarea sekitar 361 kasus.

Oleh karena itu, karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. “P” Di RS Bhayangkara Makassar Tahun 2024 selama ±8 minggu dengan melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Pada Ny. “P” dengan luka jahitan pasca seksio sesarea telah dilakukan, pengkajian tingkatan nyeri berkurang, rutin menyusukan secara *on demand* dan tidak memberikan susu formula kepada bayinya, luka bekas jahitan kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi, observasi pengeluaran lokia normal dan tidak berbau, tidak ada tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, ibu istirahat yang cukup, senantiasa berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT.

Kesimpulan dari studi kasus menunjukkan bahwa asuhan yang diberikan berhasil. Dengan tingkat nyeri berkurang, ASI lancar, luka bekas operasi kering dan tidak ada tanda infeksi, keadaan bayi baik dan tidak ada tanda-tanda bahaya bayi baru lahir, ibu sudah bisa beraktivitas yang baik. Studi kasus disimpulkan tidak didapatkan kesenjangan teori dengan didapatkan dilapangan.

Kata Kunci : Postpartum, seksio sesarea, 7 langkah varney.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Seksio Sesarea dilakukan dengan cara membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut dengan tujuan untuk melahirkan janin dan plasenta. Tindakan Seksio Sesarea ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian pada janin dan ibu yang disebabkan karena adanya komplikasi yang akan terjadi apabila ibu melahirkan secara normal. Kemudahan untuk menjadwalkan kelahiran bayi menjadi salah satu alasan tindakan seksio sesarea ini juga dilakukan (Setiyowati & Maringga, 2022).

Indikasi dilakukannya Seksio Sesarea terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor ibu dan faktor janin. Faktor ibu yaitu adanya riwayat kehamilan atau persalinan yang buruk, ukuran panggulnya sempit, plasenta previa terutama pada kehamilan pertama, solusio plasenta, komplikasi kehamilan yang disertai dengan penyakit jantung, asma dan diabetes melitus, *Chepalo Pelvik Disproportion* (CPD), Pre-Elampsia Berat (PEB), Ketuban Pecah Dini (KPD) dan faktor hambatan jalan lahir. Faktor penyebab dari janin yaitu gawat janin, malpresentasi, malposisi kedudukan janin, lilitan tali pusat dengan pembukaan kecil serta terjadinya kegagalan persalinan vakum dan forceps ekstraksi (Juliathi et al., 2020).

Proporsi melahirkan secara seksio sesarea dalam beberapa tahun terakhir, telah meningkat dengan sangat pesat. Ini adalah salah satu fenomena multifaktorial yang berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi dan budaya. Operasi Seksio Sesarea telah menjadi prosedur yang sangat aman dan banyak dilakukan di dunia hingga sudah dianggap hampir sempurna. Alasan terjadinya peningkatan kasus melahirkan secara seksio sesarea karena adanya rasa takut akan rasa sakit pada saat melahirkan secara normal termasuk rasa sakit akibat adanya kontraksi pada rahim (Juliathi et al., 2020)

Komplikasi kelahiran, terutama operasi seksio sesarea adalah penyebab umum dari AKI berat. Rasio Angka kematian ibu (AKI) untuk operasi seksio sesarea sekitar 40-80 per 100.000 kelahiran. Operasi seksio sesarea memiliki tingkat kematian 25 kali lipat dari kelahiran secara normal atau pervaginam. Namun, seksio sesarea adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin dalam kasus risiko tertinggi pada saat melahirkan secara normal (Saragih, 2023).

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa rata-rata penggunaan Seksio Sesarea pada tahun 2020 diperoleh sekitar 5-15% dari 1.000 kelahiran yang ada di dunia. Angka kejadian seksio sesarea dirumah sakit pemerintah rata-rata 11%, sementara dirumah sakit swasta bisa mencapai lebih dari 30%. Permintaan seksio sesarea di sejumlah negara berkembang secara pesat disetiap tahunnya. Selain itu, menurut WHO Prevelensi Seksio Sesarea meningkat sebanyak 46% di negara Cina dan di

negara Asia, Eropa, Amerika, seksio sesarea meningkat sebanyak 25%. Seksio Sesarea menjadi salah satu tindakan yang sangat meningkat di dunia (Hazaini et al., 2022).

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 terdapat ibu dengan persalinan *seksio sesarea* sekitar 927.000 dari 5.017.552 persalinan yang terjadi di Indonesia. Ibu nifas dengan persalinan seksio sesarea terbanyak berada pada provinsi Jawa Barat sekitar 217.04 ibu nifas, Jawa Timur sekitar 214.015 ibu nifas, Jawa Tengah sekitar 153.205, Jakarta sekitar 125.031 ibu nifas dan di Aceh sekitar 121.193 ibu nifas (Hazaini et al., 2022)

Masa nifas (*puerperium*) dimulai setelah plasenta lahir lengkap dan berakhir ketika alat kandungan kembali kedalam kondisi sebelum hamil. Masa nifas dimulai sejak 2 jam pertama setelah lahirnya plasenta secara lengkap sampai dengan 6 minggu atau sekitar 40 hari. Selama masa nifas ibu tidak hanya mengalami perubahan fisik saja, tetapi juga mengalami perubahan psikologis (Maharani et al., 2022).

Perubahan psikologis yang sering terjadi pada ibu post seksio sesarea adalah ibu yang belum bisa beradaptasi dengan peran barunya sebagai ibu serta sering merasakan kecemasan, kekecewaan, ketakutan akan tidak bisa merawat bayinya dengan baik, mengalami frustasi karena kehilangan kendali dan merasakan hilangnya harga diri terkait dengan perubahan bentuk tubuhnya yang berbeda sebelum mengalami kehamilan. Oleh karena itu,

dukungan suami, keluarga dan bidan pada masa nifas ini sangatlah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya postpartum blues (Purwanti et al., 2022).

Ibu nifas dengan seksio sesarea dapat menimbulkan luka akibat sayatan pada perut setelah janin dan plasenta lahir secara lengkap. Prinsip penyembuhan pada semua luka itu sama, variasinya tergantung pada lokasi sayatan, tingkat keparahan dan luasnya cedera. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka seksio sesarea yaitu nutrisi, mobilisasi dini, personal hygiene, dan dukungan suami atau keluarga yang sangat berperan penting dalam proses penyembuhan luka. Faktor-faktor ini juga dapat berkontribusi pada komplikasi post seksio sesarea yang dapat memperpanjang waktu perawatan dan pemulihan di rumah sakit atau dirumah (Saragih, 2023).

Pada ibu nifas, makanan yang bergizi dan sesuai dengan porsinya akan menyebabkan ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu nifas biasanya memiliki budaya pantang makan-makanan seperti telur, ayam, dan daging yang akan mempengaruhi proses penyembuhan luka seksio sesarea. Luka dikatakan sembuh jika dalam waktu 1 minggu kondisi luka menjadi kering, menutup dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Makanan yang bergizi akan mempercepat proses penyembuhan luka seksio sesarea. Bila gizi ibu tidak terpenuhi dengan baik, maka proses penyembuhan luka seksio sesarea menjadi lebih lama. Nutrisi yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka seksio sesarea

yaitu nutrisi yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat (Hazaini et al., 2022).

Analisis penyebab ibu pantang makan-makanan yaitu pengetahuan yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, pekerjaan, usia dan status ekonomi. Dampak jika ibu nifas tetap melakukan pantang makan-makanan adalah ibu nifas akan mengalami kekurangan zat gizi sehingga penyembuhan luka seksio sesarea akan lebih lama dan bahkan bisa menimbulkan infeksi. Apalagi ibu nifas sangat membutuhkan makanan yang bergizi untuk pemulihan kesehatannya, mempercepat penyembuhan luka dan produksi ASI (Hazaini et al., 2022).

Asuhan masa nifas sangat diperlukan didalam periode ini karena merupakan suatu masa kritis baik bagi ibu maupun bayinya. Diperkirakan hampir 60% kematian ibu terjadi selama proses persalinan dan sebanyak 50% dari kematian pada masa postpartum yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah bayi dan plasenta lahir secara lengkap. Kematian pada masa postpartum disebabkan adanya komplikasi pada masa ini. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab bidan untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas sangat diperlukan dengan melakukan pemantauan untuk mencegah beberapa angka kematian yang terjadi (Saputri, 2020).

Berdasarkan data untuk wilayah provinsi Sulawesi selatan yang tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, jumlah

persalinan secara seksio sesarea di Sulawesi Selatan mencapai 76,48 yang telah melewati target yaitu 69% (Dinkes Sulsel, 2018).

Data ibu nifas dengan seksio sesarea di RSUD Syekh Yusuf yaitu Tahun 2020 sebanyak 392 kasus, Tahun 2021 sebanyak 576 kasus, Tahun 2022 sebanyak 477 kasus, Tahun 2023 terhitung mulai januari - juni sebanyak 347 kasus. Data ibu nifas dengan post seksio sesarea di RS Bhayangkara Makassar pada Tahun 2021 sebanyak 237 kasus, Tahun 2022 sebanyak 586 kasus dan Tahun 2023 terhitung mulai januari – juni sebanyak 361 kasus.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan asuhan kebidanan dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. “P” di RS Bhayangkara Makassar.

B. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Penulisan Karya Tulis Ilmiah meliputi : Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. “P” di RS Bhayangkara Makassar.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dilaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. “P” di RS Bhayangkara Makassar dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi atau wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilakukannya pengkajian asuhan kebidanan Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. "P" di RS Bhayangkara Makassar.
- b. Dilakukannya perumusan diagnosa atau masalah aktual pada Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. "P" di RS Bhayangkara Makassar.
- c. Dilakukannya perumusan diagnosa atau masalah potensial pada Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. "P" di RS Bhayangkara Makassar.
- d. Dilakukannya pengidentifikasian perlunya tindakan segera dan kolaborasi Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. "P" di RS Bhayangkara Makassar.
- e. Dilakukannya perencanaan tindakan asuhan kebidanan pada Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. "P" di RS Bhayangkara Makassar.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan pada Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. "P" di RS Bhayangkara Makassar.
- g. Diketuinya evaluasi tindakan asuhan kebidanan pada Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. "P" di RS Bhayangkara Makassar.
- h. Dilakukannya pendokumentasian hasil asuhan kebidanan pada Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. "P" di RS Bhayangkara Makassar.
- i. Dilakukannya penerapan nilai-nilai keislaman pada asuhan kebidanan Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. "P" di RS Bhayangkara Makassar.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penulis

Tentunya dengan adanya penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis karena selain dijadikan sebagai suatu bahan untuk menambah pengetahuan juga dijadikan sebagai wadah dalam mengaplikasikan yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan pada Program Studi Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta ditujukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

b. Manfaat Bagi Tenaga Kesehatan

Dengan adanya penelitian ini, harapan penulis dalam memberikan pekayanan kesehatan menjadi lebih baik lagi sehingga para tenaga kesehatan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam melakukan asuhan kebidanan.

c. Manfaat Bagi Klien atau Keluarga

Dengan dilakukannya asuhan kebidanan yang baik dan benar kepada ibu Pasca Seksio Sesarea, penulis berharap mampu menambah wawasan ibu tentang mobilisasi dini dan menjaga personal hygiene yang baik, sehingga

apabila adanya komplikasi atau masalah dalam postpartum dapat dideteksi sedini mungkin.

2. Manfaat Teoritis

Menjadi salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program diploma III Kebidanan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khususnya prodi Kebidanan maupun pihak rumah sakit dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program upaya untuk melakukan Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. "P" di RS Bhayangkara Makassar.

E. Metode Penulisan

Penulis ini menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari berbagai literatur dan mengambil data dari jurnal nasional maupun internasional yang ada referensinya tentang Pasca Seksio Sesarea termasuk karya tulis ilmiah.

2. Studi Kasus

Melaksanakan studi kasus yang ada dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah melalui asuhan kebidanan yang meliputi: Identifikasi data dasar, Identifikasi diagnosa atau masalah aktual, Identifikasi diagnosa atau masalah potensial, tindakan segera atau kolaborasi, Rencana tindakan

atau intervensi, Implementasi dan Evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu dengan Pasca Seksio Sesarea serta mendokumentasikan untuk memperoleh data atau informasi. Dalam pengkajian penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa

Penulis melakukan Tanya jawab dengan pasien dan keluarganya sehingga dapat membantu memberikan keterangan atau informasi yang akan dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis untuk menjamin diperolehnya data yang lengkap mulai dari kepala sampai dengan kaki (*Head to toe*) meliputi:

1) Inspeksi

Merupakan proses observasi menggunakan mata. Inspeksi dilakukan dengan mendeteksi tanda-tanda fisik normal ataupun tidak normal untuk melengkapi pemeriksaan fisik.

2) Palpasi

Dilakukan dengan sentuhan atau perabaan pada tubuh pasien. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada organ atau jaringan pada tubuh.

3) Perkusi

Adalah metode pemeriksaan dengan cara pengetahuan yang hanya dilakukan pada tungkai bawah pada saat pemeriksaan fisik.

4) Auskultasi

Adalah metode pengkajian dengan menggunakan pendengaran.

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi pasien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari status kesehatan pasien yang bersumber pada catatan medis pasien, baik dari bidan, dokter maupun data penunjang lainnya yang dapat menjadi kontribusi menyelesaikan karya tulis ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis Risalah yaitu:

BAB I terdapat pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II terdapat tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang definisi nifas, tinjauan umum tentang Pasca Seksio Sesarea, tinjauan islami tentang Pasca Seksio Sesarea, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

BAB III berisi studi kasus yang akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu Identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah aktual, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, tindakan segera atau kolaborasi, rencana tindakan atau intervensi, implementasi dan evaluasi serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

BAB IV yaitu pembahasan, yang akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di Rumah Sakit dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu pasca seksio sesarea.

BAB V yaitu penutup, yang akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulis.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Masa Nifas

1. Pengertian masa nifas

- a. Masa nifas (puerperium) adalah masa dimulai sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar secara lengkap dari rahim. Masa nifas berlangsung selama 6 minggu yang disertai dengan pulihnya kembali alat kandungan yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan lainnya yang berkaitan saat melahirkan (Kasmiati, 2023).
- b. Masa puerperium atau masa nifas adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta secara lengkap dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti dalam keadaan sebelum hamil. Masa nifas dimulai sejak setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari (Kasmiati, 2023).
- c. Masa nifas (puerperium) adalah masa pulih kembali dimulai setelah persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Lama masa nifas berlangsung sekitar 6-8 minggu (Wahyuningsih, 2018).
- d. Masa puerperium adalah masa nifas yang terjadi dalam jangka waktu 6 minggu yang dimulai setelah melahirkan bayi sampai dengan pemulihan organ-organ reproduksi seperti sebelum mengalami kehamilan (Saleha, 2009).
- e. Masa nifas adalah masa sesudah persalinan yaitu sejak bayi dilahirkan, plasenta dan selaputnya lahir secara lengkap. Pada masa nifas memerlukan

waktu untuk memulihkan kembali kesehatan ibu seperti keadaan sebelum hamil selama 6 minggu (Atikah et al., 2020).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi ibu dalam keadaan masa nifas agar masa nifasnya berjalan dengan baik dan tidak ada komplikasi yang terjadi. Dalam hal ini sebaiknya ibu harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatannya seperti halnya makan-makanan yang bergizi, menjaga personal hygiene terutama pada luka bekas operasi agar tidak terjadi infeksi sehingga dapat menyusukan bayinya dengan baik.

Untuk itu, ibu harus mengetahui larangan-larangan dalam masa nifas yaitu larangan berhubungan suami isteri. Larangan ini didasarkan atas Firman Allah Swt dalam Q.S Al- Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَزِلُوا فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ ۲۲۲

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik, sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar'i, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya (Kementrian Agama RI, 2023).

Menurut Tafsir Al-Misbah Kata *mabidh* adalah tempat atau waktu haid, atau haid itu sendiri. Pertanyaan di atas muncul, karena pria-pria Yahudi menghindari wanita-wanita yang sedang haid, bahkan tidak makan bersama mereka dan meninggalkan rumah pada saat mereka sedang haid atau datang bulan. Dengan demikian, pertanyaan mereka pada hakikatnya bukan tentang apa itu haid, tetapi bagaimana tuntunan Ilahi kepada suami pada saat istrinya sedang haid. Jawaban di atas, sangat singkat namun menginformasikan tentang keadaan wanita yang sedang mengalami haid, dan bagaimana menghadapi mereka kala itu. Sesaat setelah turunnya ayat ini Nabi saw. menyampaikan maksud jawaban Ilahi ini dengan menyatakan kepada para penanya dan seluruh umat Islam, “Lakukanlah segala sesuatu (yang selama ini dibenarkan) kecuali hubungan seks” (HR. Muslim).

Ia, yakni haid adalah gangguan. Maksudnya, haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita, juga terhadap pria. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. Rasa sakit seringkali melilit perutnya akibat rahim berkontraksi. Di sisi lain, kedatangan tamu bulanan itu mengakibatkan nafsu seksual wanita sangat menurun, emosinya seringkali tidak terkontrol. Hubungan seks ketika itu tidak melahirkan hubungan intim antara pasangan, apalagi dengan darah yang selalu siap keluar. Itu adalah gangguan psikis bagi wanita. Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan kepada pria, di samping itu emosi istri yang tidak

stabil yang juga tidak jarang mengganggu ketenangan suami, atau siapa pun di sekeliling wanita. Sel telur pun, dengan datangnya haid, keluar serta belum ada gantinya, sampai beberapa lama setelah wanita suci, sehingga pembuahan yang merupakan salah satu tujuan hubungan seks tidak mungkin akan terjadi pada masa haid. Oleh sebab itu *hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita*, dalam arti tidak bersetubuh, *pada waktu mereka mengalami haid*; atau pada tempat haid itu keluar. Ini berarti boleh mendekati asal bukan pada tempat haid, yakni bukan pada tempat gangguan itu. Nabi mengizinkan untuk bercumbu pada bagian atas, tidak di bagian bawah.

Disini ditegaskan lagi kata *mahidh*, walaupun bisa jadi ada sementara orang yang merasa cukup menunjuknya dengan kata itu, Misalnya *hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu itu, atau pada tempat itu*. Tetapi bila demikian redaksinya, boleh jadi ada yang menduga adanya larangan berhubungan seks setiap istri mengalami gangguan apapun. Padahal, tidak demikian yang dimaksud, karena ada gangguan lain terhadap istri yang secara hukum tidak mengakibatkan larangan ini. Penyebutan kata *mahidh* sekaligus untuk menggambarkan bahwa darah yang keluar dari vagina Wanita misalnya *istihadhah* tidak selalu menimbulkan gangguan yang sama dengan gangguan yang dialami saat haid. Karena itu, jika wanita mengalami *istihadhah* dia wajib shalat, tidak seperti kalau mereka haid.

Kapan hubungan seks dapat dilakukan? Kapan saja, tetapi dengan syarat, Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Anda lihat,

redaksinya, jangan dekati, bukan jangan lakukan, karena nafsu seksual seringkali sulit dibendung. Namun, mendekati yang dimaksud di sini adalah mendekati tempat di mana dapat terjadi hubungan seks yang berbuah.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang suami menggauli istrinya saat sedang haid atau masa nifas karena akan berakibat buruk dan berdampak negatif pada kesehatan diantaranya membuat vagina luka dan infeksi serta dapat terjadi kehamilan diluar kandungan dan lain-lain.

Nifas adalah darah yang dikeluarkan oleh rahim saat melahirkan dan sesudahnya hingga batas waktu yang diketahui. Takaran maksimal bagi keluarnya darah nifas ini adalah 40 hari, sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah, dimana ia berkata:

“Pada masa Rasulullah, para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama empat puluh hari atau empat puluh malam”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah dan para tabi'in telah menempuh kesepakatan, bahwa wanita-wanita yang sedang menjalani masa nifas harus meninggalkan sholat selama 40 hari. Apabila telah bersuci sebelum masa tersebut, maka hendaklah mandi wiladah dan mengerjakan sholat, demikian dikatakan oleh Imam Tirmidzi. Apabila wanita muslimah melihat darah keluar dari vagina selama satu hari satu malam, setelah bersuci pada hari ke lima belas (Setelah nasa nifasnya selesai) maka darah yang keluar itu

dianggap sebagai darah haid. Akan tetapi, apabila darah yang keluar kurang dari satu hari satu malam, maka darah itu disebut sebagai darah kotor dan ia boleh mengerjakan sholat atau puasa.

Apabila ia mengeluarkan darah kembali setelah dua atau tiga hari, maka darah tersebut termasuk darah nifas sedangkan apabila mengeluarkan darah pada keesokan harinya setelah suci, maka mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat: Menurut para Ulama Hanafi, keadaan seperti ini dianggap nifas. Menurut Ulama Syafi'i, apabila keluar tepat pada hari kelima belas atau lebih, maka ia dianggap telah suci dari masa nifas dan apabila sebelum dari hari kelima belas, maka dianggap sebagai masa nifas. Selain itu, menurut Maliki apabila berhentinya darah itu berlangsung selama setengah bulan, maka hal itu dianggap sebagai masa suci. Adapun darah yang keluar sesudahnya itu disebut sebagai darah haid dan apabila darah keluar kurang dari setengah bulan, maka masih termasuk darah nifas.

2. Tujuan Asuhan Masa Nifas

Asuhan masa nifas sangat diperlukan karena pada periode ini masa kritis baik bagi ibu maupun bayinya terutama dalam 24 jam pertama setelah persalinan. Adapun tujuan asuhan masa nifas (Kasmiati, 2023) yaitu:

- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik secara fisik maupun psikologisnya. Dimana asuhan pada masa nifas ini peran suami, keluarga dan bidan sangat

penting dalam pemberian nutrisi dan dukungan psikologis, maka kesehatan ibu dan bayinya akan selalu terjaga.

- b. Melaksanakan skrining secara komprehensif atau menyeluruh dengan mendeteksi masalah, mengobati, dan merujuk apabila terjadi komplikasi pada ibu dan bayinya. Pada hal ini, seorang bidan bertugas untuk melakukan pengawasan kala IV yang meliputi pemeriksaan plasenta, pengawasan TFU, pengawasan konsistensi rahim dan pengawasan keadaan umum ibu. Bila mengetahui permasalahan maka harus segera melakukan tindakan sesuai dengan standar pelayanan pada penatalaksanaan masa nifas.
- c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, kebutuhan nutrisi, perencanaan pengaturan jarak kehamilan, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya dan perawatan bayi sehat. Ada beberapa kebutuhan gizi ibu menyusui yaitu :
 - 1) Mengonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari
 - 2) Makan dengan diet seimbang untuk mendapatkan protein, mineral dan vitamin yang cukup.
 - 3) Minum air putih minimal 3 liter dalam sehari (Anjurkan ibu untuk minum sebelum menyusukan bayi).
- d. Memberikan pelayanan keluarga berencana
Seorang bidan memberikan konseling KB sebagai berikut :
 - 1) Idealnya pasangan suami istri harus menunggu sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum ibu hamil kembali. Setiap pasangan harus merencanakan

sendiri kapan dan bagaimana mereka ingin menjarangkan kehamilannya dengan mengajarkan kepada ibu dan suami tentang cara mencegah kehamilan yang tidak di inginkan.

- 2) Biasanya seorang wanita akan menghasilkan ovulasi sebelum mendapatkan lagi haidnya setelah persalinan. Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi sangat dibutuhkan sebelum haid pertama untuk mencegah kehamilan baru. Pada umumnya metode kontrasepsi dapat dimulai 2 minggu setelah persalinan.
- 3) Sebelum menggunakan kontrasepsi sebaiknya dijelaskan kepada ibu tentang efektifitasnya, efek samping, keuntungan dan kerugian serta kapan metode tersebut dapat digunakan. Jika ibu dan suami telah memilih metode kontrasepsi yang digunakan, dalam dua minggu kedepan ibu di anjurkan untuk kembali. Hal ini untuk melihat apakah metode tersebut bekerja dengan baik atau tidak.

3. Periode Masa Nifas

- a. Puerperium dini yaitu suatu masa pemulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri atau berjalan-jalan. Dalam agama islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah hari ke 40.
- b. Puerperium intermedial yaitu masa pemulihan dari organ-organ reproduksi secara menyeluruh yang terjadi selama 6-8 minggu.
- c. Remote puerperium yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna secara bertahap terutama pada saat kehamilan dan persalinan ibu yang mempunyai komplikasi waktu untuk sehat

secara sempurna bisa berminggu-minggu, bulanan atau tahunan (Kasmiati, 2023).

4. Tahapan Masa Nifas

a. *Periode Immediate Post Partum*

Masa segera setelah plasenta lahir secara lengkap sampai dengan 24 jam pertama post partum. Pada masa ini, sering sekali terjadi masalah seperti perdarahan karena terjadi atonia uteri. Oleh karena itu, seorang bidan harus secara teratur melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, pengeluaran lochea, tekanan darah dan suhu tubuh ibu.

b. *Periode Early Post Partum (24 jam- 1 minggu)*

Pada fase ini seorang bidan harus memastikan involusio uteri dalam keadaan normal, tidak ada perdarahan, lochea tidak mengeluarkan bau busuk, tidak mengalami demam, ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan serta ibu dapat menyusukan bayinya dengan baik.

c. *Periode Late Post Partum (1 minggu- 5 minggu)*

Pada masa periode ini, bidan tetap melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-hari serta melakukan konseling tentang alat kontrasepsi (Kasmiati, 2023).

5. Perubahan Fisiologis Masa Nifas

a. Perubahan Sistem Reproduksi

Selama masa nifas, organ-organ interna maupun eksterna secara perlahan akan kembali seperti sebelum mengalami kehamilan. Perubahan keseluruhan alat reproduksi ini disebut sebagai involusio uteri. Pada masa ini terjadi juga beberapa perubahan penting antara lain:

1) Uterus

Segera setelah plasenta lahir, pada uterus yang berkontraksi posisi fundus uteri berada kurang lebih pertengahan antara umbilicus dan simfisis atau sedikit lebih tinggi. Dalam keadaan normal, uterus mencapai ukuran besar pada masa sebelum hamil dengan ukuran dari 4 minggu.

Tabel 2.1 Tinggi fundus uteri dan berat uterus

<i>Involusio</i>	<i>TFU</i>	<i>Berat Uterus</i>
Bayi lahir	tinggi pusat, 2 jrbpst	1.000 gr
1 minggu	ertengahan pusat simfisis	750 gr
2 minggu	idak teraba diatas simfisis	500 gr
6 minggu	ormal	50 gr
8 minggu	ormal tapi sebelum hamil	30 gr

Keterangan :

Jrbpst = jari bawah pusat

TFU = Tinggi Fundus Uteri

Namun, pada keadaan yang abnormal tinggi fundus uteri mengalami perlambatan akibat adanya luka sayatan pada posisi Seksio Sesarea timbul

rasa nyeri akibat adanya luka sayatan sehingga involusi lebih lambat dibandingkan dengan persalinan normal.

2) Lokia

Lokia adalah cairan sekret yang berasal dari rahim dan vagina yang keluar selama masa nifas. Lokia yang normal ditandai dengan tidak adanya bau yang abnormal selama masa nifas. Lokia yang berbau tidak sedap menandakan adanya infeksi. Lokia mempunyai perubahan warna dan volume karena adanya proses involusio uteri, lokia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a) Lokia rubra

Lokia rubra berwarna merah karena berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, dinding rahim, lemak bayi, lanugo (rambut bayi) dan mekonium. Lokia ini keluar pada hari pertama sampai hari ke 3 masa postpartum.

b) Lokia sanguelenta

Lokia sanguelenta berwarna merah kekuningan berisi darah dan lendir yang keluar pada hari ke 3 sampai hari ke 7 masa postpartum,

c) Lokia serosa

Lokia serosa berwarna kuning kecoklatan karena mengandung cairan serum, jaringan desidua, leukosit dan eritrosit. Cairan ini keluar pada hari ke 7 sampai dengan hari ke 14 masa postpartum.

d) Lokia alba

Lokia alba adalah lochea yang terakhir. Dimulai dari hari ke 14 dan dapat berlangsung selama 2- 6 minggu postpartum. Bentuknya seperti cairan putih berbentuk seperti krim serta terdiri atas leukosit dan sel-sel desidua (Kasmiati, 2023).

3) Endometrium

Perubahan pada endometrium adalah dengan timbulnya trombosis, degenerasi dan nekrosis di tempat implantasinya plasenta. Pada hari pertama endometrium setebal 2,5 mm, mempunyai permukaan yang kasar akibat terjadinya pelepasan desidua dan selaput janin. Setelah tiga hari semuanya mulai rata, sehingga tidak ada pembentukan jaringan parut pada bekas implantasi plasenta (Kasmiati, 2023).

4) Serviks

Segera setelah berakhirnya kala II, serviks menjadi lembek, kendur dan terkulasi. Serviks tersebut bisa melepuh dan lecet terutama pada bagian anterior. Serviks akan terlihat padat yang mencerminkan vaskularisasinya yang tinggi, lubang serviks cepat atau lambat akan mengecil. Rongga leher serviks bagian luar akan membentuk seperti keadaan sebelum hamil pada saat empat minggu postpartum (Kasmiati, 2023).

5) Vagina

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses kelahiran bayi. Dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap dalam keadaan kedur. Setelah 3 minggu kemudian, vulva dan vagina kembali ke dalam keadaan sebelum hamil dan rugae dalam vagina secara bertahap akan muncul kembali, sementara labia menjadi lebih menonjol (Kasmiati, 2023).

6) Payudara

Pada semua wanita yang telah melahirkan proses laktasi terjadi secara alami. Proses menyusui mempunyai mekanisme fisiologi yaitu sebagai berikut:

(a) Fisiologi Laktasi

Laktasi atau menyusui mempunyai dua pengertian yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Payudara mulai dibentuk sejak embrio berumur 18-19 minggu dan baru selesai ketika mulai terjadi menstruasi. Dengan terbentuknya hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk maturasi alveoli. Hormon prolaktin adalah hormon yang berfungsi untuk produksi ASI disamping hormon lain seperti insulin, tiroksin dan sebagainya.

Dua refleks pada ibu sangat penting dalam proses laktasi yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran yang timbul akibat adanya rangsangan puting susu oleh hisapan bayi.

(1) Refleksi prolaktin dalam puting susu terdapat banyak ujung saraf sensorik. Bila dirangsang, timbul impuls yang menuju hipotalamus selanjutnya ke kelenjar hipofisis bagian depan sehingga kelenjar ini mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon inilah yang berperan dalam produksi ASI di tingkat alveoli.

(2) Refleksi aliran (*Let Down Reflex*)

Rangsangan puting susu tidak hanya diteruskan sampai ke kelenjar hipofisis depan, tetapi juga ke kelenjar hipofisis bagian belakang yang mengeluarkan hormon oksitosin. Hormon inilah yang berfungsi memacu kontraksi otot polos yang ada di dinding alveolus dan di dinding saluran sehingga ASI di pompa keluar.

(b) Produksi ASI

Psikis pada ibu menyusui sangat mempengaruhi produksi ASI, dimana ibu yang mengalami stress produksi ASI-Nya akan berkurang sehingga berdampak pada pemenuhan nutrisi bayinya. Pada pemberian ASI harus diberikan secara on demand agar tidak terjadi bendungan ASI dan disisi lain bayi juga akan mendapatkan asupan ASI yang cukup sehingga tidak terjadi mal nutrisi pada bayi. Pada pasca seksio sesarea bayi dan ibunya dirawat secara terpisah. Ibu nifas dengan pasca seksio sesarea belum bisa menyusukan bayinya secara langsung oleh karena itu, biasanya ibu melakukan pumping secara *on demand* dan hasil pumpinggannya akan dimasukkan kedalam botol susu, sehingga kebutuhan nutrisi bayinya tetap terpenuhi dengan baik.

6. Sistem Pencernaan

Sistem pencernaan selama kehamilan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tingginya kadar progesteron yang dapat mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh, meningkatkan kolesterol darah dan juga dapat menghambat terjadinya kontraksi otot-otot polos. Pasca persalinan kadar hormon progesteron juga mulai menurun. Namun demikian, faal usus sangat memerlukan waktu selama 3-4 hari untuk kembali normal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan pada sistem pencernaan, antara lain:

1) Nafsu makan

Pada masa nifas biasanya ibu akan mengalami perubahan nafsu makan. Pemulihan nafsu makan diperlukan waktu sekitar 3 sampai 4 hari sebelum faal usus kembali secara normal. Kadar hormon progesteron setelah persalinan menurun dan juga asupan makanan setelah melahirkan mengalami penurunan selama satu atau dua hari.

2) Motilitas

Secara fisiologi terjadi penurunan tonus dan motilitas otot traktus pencernaan menetap dalam waktu yang singkat setelah beberapa jam bayi lahir. Setelah itu, akan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Pada ibu Pasca Seksio Sesarea dimungkinkan karena pengaruh anastesia dan analgesia yang bisa memperlambat pengembalian tonus dan motilitas ke keadaan normal.

3) Pengosongan usus

Pasca persalinan ibu biasanya mengalami konstipasi. Hal ini disebabkan karena tonus otot usus yang menurun selama proses persalinan berlangsung dan awal pasca masa nifas. Sistem pencernaan pada masa nifas sangat membutuhkan waktu dalam beberapa hari untuk kembali secara normal. Ada beberapa cara agar ibu bisa buang air besar dengan teratur yaitu pengaturan diet yang mengandung serat buah dan juga sayuran dan mengkonsumsi cairan yang cukup (Wahyuningsih, 2018).

7. Sistem Perkemihan

Setelah proses persalinan berlangsung, biasanya ibu akan mengalami kesulitan untuk buang air kecil dalam waktu 24 jam pertama setelah persalinan. Penyebab dari keadaan ini adalah terdapat spasme sfinkter dan odema leher kandung kemih setelah mengalami tekanan antara kepala janin dan tulang pubis selama proses persalinan berlangsung. Kadar hormon estrogen yang bersifat menahan air akan mengalami penurunan yang mencolok. Keadaan tersebut disebut sebagai *diuresis* (Wahyuningsih, 2018).

8. Sistem Muskuloskeletal

Otot-otot uterus berkontraksi segera setelah melahirkan, pembuluh darah yang berada diantara anyaman otot-otot uterus akan terjepit, sehingga akan menghentikan perdarahan. Ligamen-ligamen, fasia dan diafragma pelvis yang meregang pada waktu kehamilan dan persalinan yang berangsur-angsur

kembali pada waktu sebelum hamil. Stabilisasi secara sempurna terjadi pada 6-8 minggu setelah persalinan (Wahyuningsih, 2018).

9. Sistem Endokrin

Selama poses kehamilan dan persalinan terdapat beberapa perubahan pada sistem endokrin, terutama pada hormon-hormon yang berperan dalam proses tersebut yaitu:

1) Oksitosin

Oksitosin disekresikan dari kelenjar otak bagian belakang. Pada kala III persalinan hormon oksitosin sangat berperan penting dalam proses pelepasan plasenta dan mempertahankan kontraksi ibu sehingga mencegah terjadinya perdarahan. Isapan bayi dapat merangsang produksi ASI dan juga dapat meningkatkan sekresi oksitosin sehingga hal ini yang dapat membantu uterus kembali kedalam bentuk sebelum hamil.

2) Prolaktin

Menurunnya kadar hormon estrogen menimbulkan rangsangan kelenjar hipofisis posterior untuk mengeluarkan prolaktin. Hormon ini berperan dalam pembesaran payudara untuk merangsang terjadinya produksi air susu. Pada ibu yang menyusukan bayinya, kadar prolaktin tetap tinggi dan pada saat permulaan pengisapan ada rangsangan folikel dalam ovarium yang ditekan. Pada ibu yang tidak menyusukan bayinya tingkat sirkulasi prolaktin menurun dalam 14-21 hari setelah pasca persalinan sehingga merangsang

kelenjar gonad pada otak yang mengontrol ovarium kearah permulaan pola produksi estrogen dan progesteron yang normal, pertumbuhan folikel, maka terjadilah ovulasi dan juga menstruasi.

3) Estrogen dan progesterone

Selama kehamilan, volume darah normal meningkat walaupun mekanismenya secara keseluruhan belum dimengerti. Diperkirakan bahwa tingkat kenaikan hormon estrogen yang tinggi memperbesar hormon antideuritik yang meningkatkan volume darah. Disamping itu, hormon progesteron mempengaruhi otot halus yang mengurangi rangsangan dan peningkatan pembuluh darah. Hal inilah yang sangat mempengaruhi saluran perkemihan, ginjal, usus, dinding vena, dasar panggul, perineum, vulva dan juga vagina.

4) Perubahan tanda-tanda vital

Pada saat masa nifas, tanda-tanda vital yang harus dikaji yaitu :

(a) Suhu tubuh

Dalam 24 jam pertama postpartum, suhu tubuh akan naik sedikit (37,5 - 38°C) akibat dari kerja keras waktu persalinan, kehilangan cairan dan kelelahan. Apabila dalam keadaan normal, suhu tubuh akan menjadi biasa. Pada hari ketiga pasca persalinan, suhu tubuh akan naik kembali karena adanya pembentukan ASI. Bila suhu tubuh tidak turun kemungkinan adanya infeksi pada endometrium.

(b) Nadi

Denyut nadi normal pada orang dewasa (60-100 kali per menit). Denyut nadi setelah melahirkan biasanya akan lebih cepat. Denyut nadi akan melebihi 100 kali per menit, harus waspada kemungkinan terjadinya dehidrasi, infeksi atau perdarahan postpartum.

(c) Tekanan darah

Tekanan darah biasanya tidak berubah. Kemungkinan tekanan darah akan lebih rendah setelah ibu melahirkan karena ada perdarahan. Tekanan darah tinggi pada saat postpartum menandakan terjadinya Pre-eklampsia postpartum.

(d) Pernafasan

Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu tubuh dan denyut nadi. Bila suhu dan nadi tidak normal, pernafasan juga akan mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran pernafasan. Jika pernafasan pada masa nifas menjadi lebih cepat kemungkinan ada tanda-tanda syok (Wahyuningsih, 2018).

10. Perubahan psikologis masa nifas

a. Adaptasi psikologis ibu nifas menurut Reva Rubin :

1) *Fase taking in*

(a) Berlangsung pada hari pertama sampai kedua pasca persalinan.

(b) Ibu cenderung masih bergantung kepada orang lain

- (c) Pada fase ini ibu biasanya akan fokus pada dirinya sendiri dan sering menceritakan pengalaman persalinannya secara berulang kali ke orang terdekatnya.
- (d) Pada periode ini biasanya banyak keluarga atau kerabat yang datang berkunjung. Biasanya seorang bidan membatasi jadwal kunjungan keluarga agar tidak mengganggu waktu istirahat ibu. Istirahat yang cukup dapat mengurangi gangguan fisik maupun psikologis ibu.
- (e) Dalam fase ini kebutuhan nutrisi sangat diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan dan persiapan laktasi ibu.
- (f) Dalam memberikan asuhan kebidanan kita harus memfasilitasi kebutuhan psikologis ibu dengan menjadi pendengar yang baik dan juga memberikan dukungan mental atau apresiasi atas hasil perjuangan ibu selama proses persalinannya.
- (g) Kehadiran suami dan keluarga terdekat sangat diperlukan pada fase ini. Ketika malam hari suami turut membantu dalam merawat dan menjaga bayinya yang sedang rewel atau minta minum, hal itulah yang dapat menjadi support bagi ibu karena merasa tidak sendirian dalam mengurus anaknya (Diarfah, 2023).

2) *Fase taking hold*

- (a) Berlangsung pada hari ketiga sampai hari ke sepuluh pasca persalinan.
- (b) Pada fase ini biasanya ibu akan timbul rasa khawatir akan ketidakmampuan dalam merawat dan mengasuh anaknya.
- (c) Ibu mempunyai perasaan yang sangat sensitif sehingga mudah tersinggung dan gampang marah.

- (d) Pada fase ini kita harus berhati-hati dalam menjaga komunikasi dengan ibu.
- (e) Ibu sangat membutuhkan dukungan moral untuk menambah kepercayaan dirinya.

3) *Fase letting go*

- (a) Fase ini berlangsung 10 hari setelah pasca persalinan.
- (b) Pada fase ini ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Ibu sudah mulai mengerti bahwa bayinya butuh disusui sehingga siap terjaga untuk memenuhi kebutuhan bayinya.
- (c) Pada fase ini ibu juga sudah memiliki keinginan untuk merawat diri dan bayinya secara baik.
- (d) Ibu juga akan menjadi lebih percaya diri dalam menjalani peran barunya sebagai seorang ibu.
- (e) Pada fase ini dukungan suami dan keluarga masih sangat dibutuhkan oleh ibu. Keluarga dan suami dapat membantu merawat bayinya, membantu mengerjakan urusan rumah tangga sehingga ibu tidak akan merasa terbebani. Ibu memerlukan istirahat yang cukup sehingga mendapatkan kondisi fisik yang sehat untuk merawat bayinya (Diarfah, 2023).

b. Postpartum blues

Postpartum blues adalah kesedihan atau kemurungan yang dialami oleh ibu biasanya terjadi setelah melahirkan yang berkaitan dengan bayinya atau biasa disebut dengan baby blues. Baby blues disebabkan karena adanya perubahan perasaan yang dialami oleh ibu hamil sehingga akan merasa sulit menerima keadaan bayinya. Perubahan perasaan ini merupakan respon alami

terhadap rasa lelah yang ibu rasakan. Selain itu, terjadi juga karena adanya perubahan fisik dan emosional selama beberapa bulan kehamilannya. Perubahan ini akan kembali secara perlahan setelah ibu menyesuaikan diri dengan peran barunya dan tumbuh kembali dalam keadaan normal (Wahyuningsih, 2018).

Adapun faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan ibu mengalami baby blues yaitu:

- 1) Melahirkan di usia yang sangat muda
- 2) Kehamilan yang tidak diinginkan
- 3) Tidak memiliki pasangan hidup
- 4) Merasa kecewa atau tidak puas terhadap pasangannya.
- 5) Kurangnya dukungan dari suami ataupun keluarga
- 6) Pendidikan dan ekonomi juga sangat mempengaruhi terjadinya baby blues.
- 7) Ibu yang pertama kali melahirkan (Blues et al., 2023)

Penanganan yang diberikan untuk ibu yang mengalami postpartum blues yaitu:

- 1) Melakukan pendekatan spiritual

Islam memandang anak adalah titipan yang harus dijaga oleh orang tua sebaik mungkin. Terkadang ada orang tua yang enggan mengurus anaknya bahkan tidak memberikan nafkah. Mendengarkan Al-Quran sangat membantu ibu nifas dalam mencegah konstruksi postpartum blues. Salah

satu diantara sekian banyak mukjizat Al-Quran yang sudah terbukti sejak diturunkannya hingga saat ini adalah bisa menjadi penyembuh, termasuk penyembuh hati (Dani Suryaningrat, 2023).

- 2) Memberikan support mental kepada ibu
 - a) Meminta suami atau keluarga terdekat untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu mengurus bayinya dan menyiapkan susu.
 - b) Suami dan keluarga harus lebih perhatian terhadap istri dan permasalahan yang dihadapi istrinya.
 - c) Suami dan keluarga menggantikan peran istrinya ketika sang istri merasakan kelelahan dan memperbanyak dukungan dan menemani istri dalam mengurus anaknya.

- 3) Memberikan motivasi kepada ibu

Terdapat dua cara dalam memberikan motivasi, yang pertama yaitu motivasi langsung diberikan secara langsung kepada setiap individunya sifatnya khusus seperti pujian. Motivasi kedua yaitu motivasi secara tidak langsung yang diberikan hanya fasilitas-fasilitas mendukung serta menunjang gairah sang ibu dalam merawat bayinya, seperti ruangan yang bersih dan nyaman.

- 4) Mengajarkan ibu untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam dengan tujuan agar ibu bisa lebih rileks dan nyaman dalam menghadapi masa nifasnya. Teknik relaksasi nafas dalam ini, bisa dilakukan secara mandiri oleh ibu nifas.

11. Kebutuhan dasar ibu masa nifas

a. Nutrisi dan cairan

Nutrisi dan cairan sangat penting karena berpengaruh dalam proses laktasi dan involusi. Makan-makanan dengan diet seimbang, tambahan kalori 500-800 kal per hari. Makan dengan diet seimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Minum air putih minimal 3 liter dalam sehari, tablet zat besi (Fe) diminum untuk menambah zat besi setidaknya selama proses masa nifas berlangsung, dan minum kapsul vitamin A (200.000 IU) agar dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI.

b. Mobilisasi

Segera mungkin kita membimbing ibu untuk keluar atau turun dari tempat tidur tetapi hal ini harus tergantung kepada keadaan ibu, namun hal ini dianjurkan kepada ibu yang melahirkan secara normal untuk dapat melakukan mobilisasi 2 jam pertama pada masa postpartum. Pada persalinan dengan seksio sesarea ibu dapat melakukan mobilisasi miring kanan atau kiri setelah 12 jam pertama pasca persalinan, lalu tidur dengan posisi setengah duduk, dan turun dari tempat tidur setelah 24 jam pertama setelah persalinan.

c. Eliminasi

Buang Air Kecil (BAK). Pada persalinan secara pervaginam masalah berkemih dan buang air besar tidak mengalami hambatan apapun.

Kebanyakan pasien dapat melakukan BAK secara spontan dalam 8 jam pertama setelah melahirkan. Jika dalam 8 jam postpartum ibu belum berkemih atau sekali berkemih belum melebihi 100 cc, maka dilakukan katerisasi. Akan tetapi, jika kandung kemih penuh maka tidak perlu menunggu selama 8 jam untuk melakukan katerisasi.

Buang Air Besar (BAB). Pada ibu postpartum diharapkan dapat BAB setelah hari kedua masa nifas. Jika pada hari ketiga masa nifas ibu belum juga melakukan BAB, maka perlu diberikan obat pencahar per-oral atau per-rectal. Jika setelah pemberian obat pencahar masih belum bisa BAB maka akan dilakukan klisma (huknah).

d. Personal Hygiene

Ibu nifas biasanya rentan terhadap infeksi, untuk itu personal hygiene harus dijaga dengan baik yaitu :

- 1) Mencuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan area genitalia, menjaga kebersihan tubuh, pakaian, daerah tempat tidur dan lingkungan sekitar harus selalu dijaga kebersihannya.
- 2) Membersihkan daerah genitalia dari depan ke belakang dengan menggunakan sabun dan air bersih dengan tujuan agar terhindar dari infeksi.
- 3) Mengganti pembalut setiap 4 jam atau paling sedikit mengganti 4 kali dalam sehari.

4) Menjaga kebersihan vulva, perineum dan anus.

e. Aktivitas seksual

Aktivitas seksual yang dapat dilakukan oleh ibu pada masa nifas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Secara fisik harus aman untuk memulai hubungan seksual begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan satu atau dua jarinya kedalam vagina tanpa ada rasa nyeri yang dirasakan. Maka ibu aman untuk memulai melakukan hubungan seksual kapan saja jika ibu sudah siap.
- 2) Banyak budaya yang mempunyai tradisi menunda dalam melakukan hubungan seksual sampai waktu tertentu misalnya setelah 40 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Keputusan ini tergantung pada keputusan pasangan suami istri yang bersangkutan.

f. Kebutuhan perawatan payudara

Sebaiknya perawatan payudara dimulai sejak wanita hamil agar putingnya lemas, tidak keras, dan kering sebagai tanda persiapan untuk menyusukan bayinya. Berikut ini cara perawatan payudara yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Sokong payudara sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri (payudara kanan dengan tangan kanan) dua atau tiga jari dari tangan yang berlawanan membuat gerakan memutar sambil menekan dari pangkal payudara dan berakhir dengan gerakan spiral pada daerah puting susu dan dilakukan pada setiap payudara minimal 2 kali gerakan.

- 2) Tempatkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara. Mengurut payudara dari tengah sambil mengangkat kedua payudara dan lepaskan kedua payudara secara perlahan-lahan sambil membuat sentakan kecil. Lakukan gerakan ini sebanyak 30 kali disetiap payudara.
- 3) Sokong payudara dengan menggunakan satu tangan, sedangkan tangan lain mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi kebagian arah puting susu ibu. Melakukan gerakan ini sebanyak 30 kali pada setiap payudara.
- 4) Kompres kedua payudara dengan menggunakan washlap yang hangat selama 2 menit. Ganti dengan kompres yang dingin selama 1 menit. Kompres dilakukan secara berganti-gantian selama 3 kali berturut-turut dan diakhiri dengan kompres hangat (Wahyuningsih, 2018).

12. Program tindak lanjut asuhan masa nifas di rumah

a. Jadwal kunjungan rumah

Program dan kebijakan teknis yang lebih baru mengenai jadwal kunjungan masa nifas dirumah paling sedikit dilakukan empat kali, yaitu diantaranya:

Tabel 2.2 Jadwal kunjungan masa nifas

Kunjungan	Waktu	Tujuan
1	6-8 jam setelah persalinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadinya perdarahan pada masa nifas yang disebabkan karena atonia uteri. 2. Mendeteksi secara dini dan melakukan perawatan penyebab lain dari perdarahan serta melakukan

rujukan bila terjadi perdarahan yang berkelanjutan.

3. Memberikan konseling kepada ibu dan suami tentang cara mencegah terjadinya perdarahan yang disebabkan oleh atonia uteri.
4. Pemberian ASI segera mungkin.
5. Mengajarkan ibu bagaimana cara mempererat hubungan antara ibu dengan bayinya.
6. Menjaga kehangatan bayi agar tetap sehat sehingga terhindar dari terjadinya hipotermi.
7. Setelah seorang bidan melakukan pertolongan persalinan, maka kita harus menjaga ibu dan bayinya untuk 2 jam pertama setelah persalinan atau sampai keadaan ibu dan bayi yang baru lahir dalam keadaan baik.

2

Hari ke- 6
setelah
persalinan

1. Memastikan involusio uteri berjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri dibawah umbilikus, dan tidak ada perdarahan abnormal yang terjadi.
 2. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau kelainan pasca proses persalinan.
-

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat yang cukup. 4. Memastikan ibu menyusukan bayinya dengan baik dan tidak ada tanda-tanda penyulit. 5. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, cara merawat tali pusat dan bagaimana cara menjaga bayi agar tetap dalam kondisi hangat.
3	Dua minggu setelah persalinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuhan pada 2 minggu postpartum sama seperti yang diatas (enam hari setelah persalinan).
4	Enam minggu setelah persalinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa postpartum. 2. Melakukan konseling KB secara dini.

Sumber : (Kemenkes, RI., 2013)

b. Keuntungan dan keterbatasan

Kunjungan rumah pada masa nifas memiliki keuntungan yang sangat baik karena membuat bidan dapat melihat dan berinteraksi dengan anggota keluarga didalam lingkungan yang aman dan alami. Bidan juga mampu mengkaji kecukupan sumber daya yang ada dirumah dan di lingkungan sekitar. Melakukan kunjungan rumah lebih mudah dilakukan untuk mengidentifikasi penyesuaian fisik dan psikologis yang sangat rumit.

Selain keuntungan, kunjungan rumah pada masa nifas juga memiliki keterbatasan yang masih sering kita temukan, yaitu:

- 1) Besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengunjungi pasien yang jarak rumahnya jauh.
- 2) Terbatasnya jumlah bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan.
- 3) Merasa khawatir tentang keamanan untuk mendatangi pasien di daerah tertentu (Kasmiati, 2023).

13. Tanda-tanda Bahaya Masa Nifas

Tanda-tanda bahaya masa nifas merupakan suatu tanda tidak normal yang mengidentifikasikan adanya bahaya atau komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas, apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian pada ibu. Adapun tanda-tanda bahaya masa nifas yaitu:

a. Perdarahan postpartum

Perdarahan masa nifas dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya:

- 1) Perdarahan postpartum primer atau *Early Postpartum Hemorrhage* adalah jumlah perdarahan yang keluar lebih dari 500-600 ml dalam waktu 24 jam pertama setelah bayi lahir. Penyebab utama perdarahan ini terjadi karena atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta dan robekan jalan lahir banyak terjadi dalam 2 jam pertama setelah persalinan (Wahyuningsih, 2018).

2) Perdarahan postpartum sekunder atau *Late Postpartum Hemorrhage* adalah jumlah perdarahan yang keluar lebih dari 500-600 ml yang terjadi setelah 24 jam pertama setelah melahirkan. Biasanya perdarahan ini juga terjadi pada hari ke 5 sampai dengan hari 15 masa nifas. Penyebab utama dari perdarahan ini adalah robekan jalan lahir dan adanya sisa-sisa plasenta yang tersimpan didalam rahim (Wahyuningsih, 2018).

b. Infeksi pada masa postpartum

Infeksi pada masa nifas merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu. Infeksi organ genitalia merupakan suatu komplikasi pada masa nifas. Penyebab terjadinya AKI tertinggi yaitu karena infeksi yang menyebar ke saluran urinary, payudara dan pasca perdarahan. Adapun gejala umum dari infeksi pada masa nifas ini yaitu suhu tubuh panas, malaise dan denyut nadi cepat. Gejala lokal dapat berupa uterus menjadi lembek, kemerahan dan adanya rasa nyeri pada payudara (Wahyuningsih, 2018).

c. Lokia yang berbau busuk

Bila lokia mengeluarkan nanah dan berbau busuk yang disertai dengan nyeri perut bagian bawah dan kemungkinan diagnosanya adalah metritis. Metritis merupakan infeksi uterus yang terjadi setelah melahirkan yang merupakan salah satu penyebab utama terbesar kematian ibu. Bila pengobatan terlambat dilakukan atau kurang adekuat dapat menjadi abses pelvik, peritonitis dan syok septik (Wahyuningsih, 2018).

d. Sub involusi uterus

Involusi adalah keadaan uterus mengecil yang disebabkan oleh kontraksi rahim dimana berat rahim dari 1.000 gr saat setelah melahirkan, berubah menjadi 40-60 mg dalam 6 minggu kemudian. Bila pengecilan uterus ini kurang baik atau mengalami gangguan disebut sebagai sub involusi uterus. Faktor penyebab terjadinya sub involusi adalah adanya sisa plasenta didalam rahim, endometritis, dan adanya mioma uteri. Pada keadaan sub involusio pemeriksaan bimanual ditemukan uterus menjadi lebih besar dan lebih lembek dari seharusnya, TFU masih tinggi, lochea yang banyak dan mengeluarkan bau busuk dan biasanya juga akan terjadi perdarahan. Pengobatan dilakukan dengan memberikan injeksi Methergin setiap hari dan ditambah dengan Ergometrin per oral (Wahyuningsih, 2018).

e. Suhu tubuh ibu > 38°C

Dalam waktu beberapa hari setelah persalinan suhu tubuh ibu akan mengalami sedikit peningkatan antara 37,2°C – 37,8°C oleh karena reabsorpsi proses perlukaan dalam uterus, proses autolisis dan proses mulainya laktasi dalam hal ini disebut sebagai demam reabsorpsi. Apabila terjadi peningkatan suhu tubuh lebih dari 38°C secara berturut-turut dalam beberapa hari kemungkinan terjadi infeksi (Wahyuningsih, 2018).

f. Payudara yang berubah menjadi merah, panas dan terasa sakit

Keadaan ini disebabkan karena payudara tidak disusui secara adekuat, puting susu yang lecet, bra yang terlalu ketat, ibu dengan diet yang kurang baik, kurang istirahat yang cukup, mengalami anemia. Keadaan ini yang merupakan salah satu tanda dan gejala adanya komplikasi dan penyulit pada proses laktasi, misalnya terjadi pembengkakan payudara, bendungan ASI, mastitis dan abses payudara (Wahyuningsih, 2018).

14. Asuhan pada ibu nifas dengan Pasca Seksio Sesarea

a. Pemberian Cairan

Melakukan pemberian cairan secara intravena harus cukup banyak mengandung elektrolit agar tidak terjadi yang namanya dehidrasi atau komplikasi pada organ lainnya. Bila kadar Hb ibu rendah maka diberikan transfusi darah sesuai dengan kebutuhannya.

b. Menilai tingkat nyeri yang dirasakan oleh ibu setelah operasi seksio sesarea ini dilakukan. Melakukan pemberian analgetik sesuai dengan dosis yang telah ditentukan jika tingkat nyeri yang dirasakan ibu semakin meningkat.

c. Melakukan perawatan luka dengan melihat kondisi balutan luka yang dilihat pada hari pertama post seksio sesarea, bila mengalami basah maka harus dibuka dan diganti dengan yang baru.

d. Mobilisasi dini yang dianjurkan pada ibu untuk menunjang proses penyembuhan luka dan mencegah terjadinya infeksi.

- e. Melakukan pemeriksaan secara rutin seperti memeriksa tekanan darah, nadi, suhu dan pernafasan ibu.
- f. Pemberian KIE tentang perawatan luka untuk mencegah terjadinya infeksi dan mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi pada ibu Pasca Seksio Sesarea (Nunung, 2020).

B. Tinjauan Khusus Tentang Seksio Sesarea

1. Definisi Seksio Sesarea

Seksio sesarea atau operasi sesar adalah suatu tindakan bedah yang dilakukan untuk melahirkan janin dan plasenta dengan membuka dinding perut dan dinding uterus (Dewi, 2020).

Seksio sesarea atau melahirkan secara sesar adalah proses melahirkan janin melalui irisan pada dinding perut atau laparatomi dan dinding rahim atau histerektomi. Pada umumnya seksio sesarea ini dilakukan ketika proses melahirkan secara normal melalui pervaginam tidak memungkinkan karena adanya risiko yang terjadi pada komplikasi medis lainnya (Nunung, 2020).

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan umatnya. Berbagai macam aspek yang diatur di dalamnya dimana semuanya terungkap di dalam Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahannya. Namun, tidak menutup kemungkinan hal-hal yang buruk dapat terjadi baik kepada ibu maupun bayinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al- Ahqaf/46: 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ١٥

Terjemahnya:

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim” (Kementrian Agama RI,2023).

Menurut Tafsir Al-Misbah, Ayat di atas menyatakan: Sesungguhnya kami telah memerintahkan manusia siapa pun manusia itu selama dia benar-benar manusia agar taat kepada Kami sepanjang hidup mereka dan *Kami telah mewasiatkan* yakni memerintahkan dan berpesan *kepada manusia* itu juga dengan *wasiat yang baik* yaitu agar berbuat baik dan berbakti *terhadap kedua orang tuanya* siapa pun dan apapun agama kepercayaan atau sikap dan kelakuan orang tuanya. Ini antara lain karena ayahnya terlibat dalam kejadiannya dan setelah sang ayah mencampakkan sperma ke dalam rahim *ibunya*, sang ibu *mengandungnya dengan susah payah*, sambil mengalami aneka kesulitan bermula dari mengidam, dengan aneka gangguan fisik dan psikis, dan melahirkannya dengan susah payah setelah berlalu masa

kehamilan. *Masa kandungan* dalam perut ibu dan penyapihannya yang paling sempurna adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila ia yakni sang anak telah dewasa yakni sempurna awal masa bagi kekuatan fisik dan psikisnya, ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan kebaktiannya berlanjut sampai ia mencapai usia empat puluh tahun yakni masa kesempurnaan kedewasaannya, dan sejak itu ia berdoa memohon agar pengabdianya kepada kedua orang tuanya semakin bertambah. Ia bermohon: *'Tuhanku yang selama ini selalu berbuat baik kepadaku, anugerahilah aku kemampuan serta dorongan yang selalu menghiasi jiwaku untuk mensyukuri nikmat-Muyang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan yang benar-benar telah kunikmati dan juga nikmat yang Engkau anugerahkan kepada ibu bapakku sehingga mereka berhasil memelihara dan mendidikku dan aku bermohon juga kiranya aku secara khusus dapat selalu melakukan amal yang saleh yakni yang baik dan bermanfaat lagi yang Engkau ridhai; berilah kebaikan untukku pada anak cucuku.* Yakni jadikanlah kebaikan tertampung secara mantap dan bersinambung pada anak cucuku, kebaikan yang kuperoleh pula manfaatnya.

Kata *Ihsanan* dan ada juga yang membacanya *husnan* . Kedua kata tersebut mencakup "segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi". Kata *hasanab* digunakan untuk menggambarkan apa yang menggembirakan manusia akibat perolehan nikmat, menyangkut jiwa, jasmani dan keadaannya. Demikian dirumuskan oleh pakar kosa kata alQur'an, ar-Raghib al-Ashfahani. Bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bersikap sopan santun

kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap anak. Termasuk dalam makna bakti adalah mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan anak.

Firman-Nya: *hamalathu ummuhu kurhan wa wadha'athu kurhan*/ibunya mengandungnya dengan susah payah melahirkannya dengan susah payah, Menjelaskan betapa berat kandungan dan kelahiran itu dialami oleh ibu. Dalam konteks ini Sayyid Quthub menulis bahwa dengan kemajuan yang dicapai dalam Embriologi dapat diketahui secara lahiriah betapa besar pengorbanan ibu. Setelah terjadi pembuahan zat yang merupakan cikal bakal manusia, bergerak menuju dinding rahim untuk berdempet. Zat itu dilengkapi dengan potensi menyerap makanan, sehingga ia merobek rahim di mana ia berdempet dan memakannya, sehingga darah ibu mengalir menuju zat itu dan ia pun senantiasa bagaikan berenang di dalam kolam darah ibu yang kaya dengan sari pati makanan. Ia mengisapnya agar dapat hidup dan tumbuh berkembang, sedangkan sang ibu yang sungguh wajar dikasihani itu makan, minum, mengunyah dan mengisap, yang kesemuanya menghasilkan darah yang bersih untuk anak yang dikandungnya yang dengan amat lahap memakannya. Selanjutnya pada periode pembentukan tulang-tulang, semakin banyak kebutuhan janin itu kepada kalsium dan karena itu pula sang ibu memberikan kepadanya dari sari pati tulang-tulangnyanya pada darah agar kerangka sang anak dapat terbentuk dengan sempurna. Itu sedikit dari banyak

sekali yang dianugerahkan ibu saat kehamilan janinnya. Demikian lebih kurang Sayyid Quthub.

Firman-Nya: *Wahamlahu wa fishaluhu tsalatsuna syahran/kandungan dan penyapihannya adalah tiga puluh bulan*, mengisyaratkan bahwa masa kandungan minimal adalah enam bulan, karena pada Q.S al-Baqarah: 233 telah dinyatakan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun yakni 24 bulan. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa penyusuan minimal adalah Sembilan bulan, karena masa kandungan yang normal adalah Sembilan bulan. Ayat diatas menunjukkan betapa pentingnya ibu menyusukan anaknya dengan ASI.

Ayat di atas juga menunjukkan betapa pentingnya ibu kandung memberi perhatian yang cukup terhadap anak-anaknya, khususnya pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Sikap kejiwaan seorang dewasa banyak sekali ditentukan oleh perlakuan yang dialaminya pada saat kanak-kanak, karena itu tidaklah tepat membiarkan mereka hidup terlepas dari ibu bapak kandungnya. Berapapun banyaknya kasih sayang yang dapat diberikan oleh orang lain, tetap saja kasih sayang ibu bapak masih sangat mereka butuhkan. Firman-Nya: *hatta idza balagha asyuddahu* diperselisihkan oleh ulama tentang batas waktunya. Banyak ulama yang menyatakan bahwa itu terpenuhi pada usia 33 tahun. Adapun maknanya, yang jelas ayat di atas menuntut peningkatan pengabdian dan berbakti kepada kedua orang tua dari saat ke saat, dan bahwa walaupun seseorang telah mencapai usia kedewasaan

dan memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, namun bakti tersebut harus terus berlanjut dan meningkat.

Adapun kaitannya ayat tersebut dengan judul penelitian yang saya ambil yaitu Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio Sesarea Pada Ny. "P" di RS Bhayangkara Makassar. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa betapa susahny seorang ibu mengandung selama kurang lebih sembilan bulan lamanya dan selama persalinan tersebut berlangsung banyak komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi dan dapat berdampak kepada ibu dan bayinya sehingga menyebabkan kematian. Berbagai komplikasi yang dapat timbul pada ibu mulai dari dalam rahim ketika ibu sedang mengandung dengan susah payah sambil mengalami kesulitan yang bermula dari mengidam sampai dengan mengalami gangguan fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, berbagai asuhan dapat diberikan kepada ibu untuk menjaga ibu dan janin yang sedang dikandungnya seperti pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi.

2. Jenis Seksio Sesarea

Teknik pembedahan yang paling banyak digunakan ialah *section caesarea transperitonealis* (STTP) dengan melakukan sayatan di segmen bawah uterus. Keuntungannya dilakukan teknik ini adalah jumlah perdarahan pada luka sayatan tidak terlalu banyak, bahaya peritonitis tidak besar dan parut pada uterus yang umumnya kuat sehingga bahaya terjadinya ruptur uteri di kemudian hari tidak besar karena dalam masa nifas segmen bawah

uterus tidak seberapa banyak mengalami kontraksi seperti korpus uteri sehingga luka akan sembuh secara sempurna.

Seksio Sesarea memiliki dua tipe yaitu tipe yang pertama ialah dengan melakukan insisi melintang melalui segmen bawah uteri yang meregang. Teknik yang kedua ialah teknik section caesarea klasik yaitu dengan melakukan insisi vertikal pada *myometrium*. Hal ini jarang dilakukan kecuali jika terjadi vaskularisasi di segmen bawah uteri yang banyak sekali atau tidak dapat dilakukan karena adanya perlengketan yang luas atau posisi janin letak lintang dengan bahu terjepit.

Teknik operasi SSTP adalah sebagai berikut :

- a) Asepsis lapangan operasi.
- b) Insisi kurang lebih 10 cm horizontal diatas simfisis sehingga mencapai peritoneum.
- c) Peritoneum yang menutupi segmen bawah uterus di iris dan didorong ke bawah.
- d) Otot segmen bawah rahim di insisi sehingga nyaris mencapai selaput ketuban.
- e) Selaput ketuban dipecahkan dan kepala dilahirkan secara manual menggunakan tangan atau menggunakan forsep sebagai bidang miring, dan fundus ditekan kebawah.
- f) Setelah bayi lahir, menyuntikkan oksitosin secara intramuskular. Lalu mengeluarkan plasenta dan pastikan plasenta keluar secara lengkap.

- g) Penjahitan luka insisi dilakukan lapis demi lapis dengan jahitan di sudut luka harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati.
- h) Kontrol perdarahan di daerah luka.
- i) Dilakukan penjahitan peritoneum.
- j) Jahit dinding abdomen setiap lapisannya.
- k) Tindakan operasi selesai.
- l) Menutup luka dengan verban (Dewi, 2020).

3. Indikasi seksio sesarea

Secara etiologi operasi seksio sesarea dilakukan jika melahirkan secara normal mungkin akan menyebabkan risiko kepada ibu dan janin. Adapun indikasi dilakukannya tindakan seksio sesarea adalah:

- 1) Disproporsi janin panggul
- 2) Gawat janin
- 3) Plasenta previa
- 4) Riwayat seksio sesarea sebelumnya
- 5) Kelainan letak janin (letak kepala diatas atau dibawah)
- 6) Hipertensi
- 7) Pre-eklampsia berat
- 8) Eklampsia
- 9) Ukuran janin terlalu besar (Agustin et al., 2020).

4. Metode seksio sesarea

ERACS (*Enhanced Recovery After Caesarean Surgery*) adalah teknik operasi yang dikembangkan pada persalinan sesarea Dimana keadaan bisa dioptimalkan pada saat sebelum, selama, sesudah operasi dalam mencapai proses pemulihan lebih cepat setelah menjalani tindakan pembedahan.

Metode ERACS adalah prosedur untuk membantu merasakan lebih baik setelah operasi seksio sesarea. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prosedur ini membantu untuk mengelola rasa sakit dengan lebih baik, dan membantu untuk bergerak lebih cepat setelah operasi. Adapun tujuan dari metode ERACS ini adalah :

- a) Agar mobilitas dan proses penyembuhan persalinan dapat tercapai sehingga pasien bisa melakukan mobilisasi dini lebih cepat seperti bergerak lebih awal dan nyeri minimal pasti lebih nyaman.
- b) Mengurangi risiko infeksi nosocomial
- c) Biaya minimal
- d) Kelebihan metode Eracs
- e) Meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien
- f) Berkurangnya komplikasi dan durasi rawat inap (Ana Zumrotun Nisak, 2023).

5. Komplikasi pasca seksio sesarea

Komplikasi yang timbul pada ibu post seksio sesarea yaitu :

a. Nyeri

Menurut *International Asociation For The Study Of Pain* (IASP) nyeri merupakan suatu pengalaman emosional dan sensorik yang berhubungan dengan kerusakan suatu jaringan secara potensial maupun aktual. Nyeri yang dirasakan ibu biasanya akan menimbulkan kecemasan, yang dimana rasa cemas ini akan membuat rasa nyeri yang dirasakan akan semakin parah. Adanya rasa cemas dan nyeri yang diakibatkan oleh luka bekas operasi seksio sesarea dapat menyebabkan ibu mengalami kelelahan, kurang merasa percaya diri, kurang percaya pada kemampuan dirinya dalam mengontrol emosi, ketidak mampuan ibu bisa merawat bayinya dan ibu merasakan takut akan mengalami nyeri yang sama pada persalinan berikutnya.

1) Skala Nyeri

Intensitas dan penentuan tipe nyeri sangat penting dikarenakan menyangkut jenis pengobatan yang sesuai dan sebaiknya diberikan terutama pada terapi farmakologis. Ada beberapa alat ukur yang sudah namun dipakai untuk mengukur intensitas nyeri adalah *visual Analogue Scale* (VAS) atau *Numeric Pain Slace* (NPS).



Gambar 2.1 *Visual analogue scale* (VAS) sebagai alat ukur nyeri

Sumber : Nadyah, 2013

Secara total minimum dalam pembacaan *Visual Analog Scale* (VAS) Atau *Numeric Pain Scale* (NPS) score total minimum adalah (-1) dan score total maksimum (5). Jika skor pasien >2 maka dokter atau bidan harus melakukan evaluasi lanjutan dan kemungkinan nyeri yang dirasakan pasien adalah nyeri neuropatik.

Assesment Nyeri:

- a) Deskripsi: Bagaimana gambaran nyeri yang dirasakan apakah tumpul, tajam, pegal-pegal, panas dan seperti disengat listrik.
- b) Lokasi: Dimana lokasi nyeri yang dirasakan? Apakah lebih dari satu tempat?
- c) Intensitas:
 - (1) Bagaimana derajat nyeri yang dirasakan saat ini?
 - (2) Bagaimana derajat nyeri yang dirasakan sebelumnya?
 - (3) Apakah nyeri yang dirasakan terus menerus?
 - (4) Kapan mulai merasakan nyeri ini?

2) Mekanisme nyeri

Pada tindakan pasca seksio sesarea meninggalkan sayatan pada kulit perut dan mengakibatkan terputusnya jaringan yang di insisi. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya zat kimia yang berupa histamine, bradkinin, kalium, dan sustansi P. Zat kimia ini yang dibawa serabut saraf delta A dan C yang berperan membawa transmisi nyeri dan medulla spinalis menuju thalamus, kemudian transmisi nyeri tersebut dilanjutkan menuju korteks serebal dan otak akan mempersepsikan nyeri yang mengakibatkan pasien merasakan nyeri pada daerah insisi saat efek anastesi hilang.

Pada pasien pasca seksio sesarea dianjurkan untuk melakukan mobilisasi dini. Manfaat dilakukannya latihan mobilisasi dini dapat meningkatkan sirkulasi darah yang akan menyebabkan rasa nyeri pada luka operasi menurun dan proses penyembuhan lukanya akan lebih cepat dibandingkan dengan ibu yang tidak melakukan mobilisasi dini (Agustin et al., 2020).

b. Kecemasan

Kecemasan yang dirasakan oleh ibu pasca seksio sesarea cenderung dipengaruhi oleh adanya rasa nyeri yang ibu rasakan sehingga menimbulkan rasa cemas dan merasakan takut terhadap keadaannya dan ditambah lagi ibu belum memiliki pengalaman dalam melakukan persalinan secara seksio sesarea. Kecemasan dapat diatasi dengan dua cara yaitu cara yang pertama ialah dengan terapi perilaku kognitif seperti konseling, hipnoterapi, dan teknik

relaksasi nafas dalam. Cara yang kedua yaitu dengan mengkonsumsi obat anti depresi dan orang yang menderita kecemasan dapat mengontrolnya dengan mengurangi gejalanya dan menghindari makanan atau minuman yang berkafein.

Kecemasan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pendidikan, umur dan pengalaman. Dimana tingkat pendidikan dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang, semakin tinggi pendidikannya maka akan semakin tinggi juga pengetahuannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang lebih mudah untuk mengalami kecemasan dibandingkan dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Kecemasan yang dialami dapat berakibat buruk terhadap kondisi pasien tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari kecemasan yang dialami ialah kehilangan tenaga, mengalami kesulitan tidur, nafsu makan menjadi berkurang dan tidak ada semangat untuk hidup (Agustin et al., 2020).

c. Syok

Syok terjadi karena insufisiensi akut dari sistem sirkulasi dengan akibat dari sel-sel jaringan yang tidak mendapatkan zat-zat makanan dan O₂ dengan akibat terjadinya kematian. Penyebab terjadinya syok ialah hemoragi yang merupakan penyebab terbanyak dan harus selalu dipikirkan pada waktu 24 jam pertama setelah pasca seksio sesarea, sepsis, neurogenik dan kardiogenik. Adapun gejalanya dari syok tersebut ialah frekuensi nadi dan

pernafasan meningkat, tekanan darah menurun, mengalami gelisah, ekstremitas dan wajah menjadi dingin serta warna kulit menjadi keabu-abuan.

d. Infeksi Saluran Kemih

Infeksi saluran kemih selalu ada, terutama pada ibu yang menderita panas dan sering kali menderita nyeri pada saat berkemih. Pemeriksaan amsr seni dikeluarkan melalui kateter atau sebagai midstream urine yang mengandung leukosit dalam kelompok. Hal tersebut dapat segera diketahui dengan meningkatnya leukosit esterese.

e. Distensi perut

Pada pasca operasi seksio sesarea tidak jarang perut pasien agak kembung akan tetapi jika setelah flatus keluar maka keadaan perut akan kembali menjadi normal. Ada kemungkinan bahwa distensi akan bertambah jika terdapat timpani diatas perut pada saat pemeriksaan ketok serta akan merasakan mual dan muntah.

f. Infeksi puerperal

Adanya komplikasi ini biasanya akan bersifat ringan seperti mengalami kenaikan suhu tubuh selama beberapa hari dalam masa nifas dan akan bersifat berat seperti tromboflebitis, peritonitis dan sepsis.

g. Terbukanya luka operasi eviserasi

Penyebab utama terbukanya luka operasi pasca seksio sesarea dilakukan ialah luka tidak dijahit secara sempurna sesuai dengan prosedur, distensi perut, batuk atau muntah yang keras dan mengalami infeksi (Nunung, 2020).

6. Proses penyembuhan luka pasca seksio sesarea

Proses penyembuhan luka terbagi menjadi tiga fase yaitu :

a) Fase inflamasi

Penyembuhan luka pada fase ini terjadi pada hari pertama sampai hari kelima setelah operasi seksio sesarea dilakukan. Namun, fase ini bisa saja singkat jika tidak terjadi infeksi.

b) Fase proliferasi

Adalah fase dimana terjadinya penurunan jumlah sel-sel inflamasi, tanda-tanda peradangan berkurang, dan pembentukan pembuluh darah yang baru. Pada fase ini terjadi juga epiteliasasi yaitu proses pembentukan kembali lapisan kulit yang rusak.

c) Fase maturasi

Adalah fase dimana proses penyembuhan luka dimulai hari ke 21 hingga 1 tahun yang akan datang, dimana proses ini didasari dari pergantian kolagen tipe-3 menjadi kolagen tipe-1. Perubahan peningkatan kolagen terjadi

secara signifikan pada minggu ketiga sampai dengan minggu ke enam setelah adanya luka bekas operasi seksio sesarea.

Ada beberapa faktor yang mempercepat proses penyembuhan luka ialah faktor usia, anemia, faskulirisasi, nutrisi, kegemukan, obat-obatan, merokok, mobilisasi dini, personal hygiene dan stress.

7. Perawatan pasca operasi seksio sesarea yang dilakukan oleh bidan yaitu:

a. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu, serta mengukur jumlah urine yang tertampung di kantong urine. Periksa atau ukur jumlah perdarahan selama operasi.

b. Membuat laporan operasi dan mencantumkan hasil pemeriksaan pada lembaran laporan. Mencatat waktu lamanya operasi, jenis kelamin, nilai apgar score dan kondisi bayi setelah lahir. Lembar operasi ditandatangani oleh operator.

c. Membuat intruksi perawatan yang meliputi: jadwal untuk melakukan pemeriksaan ulang tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu, jadwal pengukuran jumlah produksi urine, serta memberikan intruksi dengan jelas, singkat dan terperinci yang mencakup: nama, jenis obat, jumlah dosisnya, cara pemberian dan waktu atau jam pemberian obatnya.

d. Memberikan nasihat dan konseling pasca operasi diantaranya :

a) Kepada keluarga pasien beritahukan bahwa tindakan operasi telah selesai dilakukan dan sampaikan jalannya operasi, kondisi ibu saat ini, dan apa yang

diharapkan, minimal mencakup 24 jam pertama pasca operasi. Waktu lahir, jenis kelamin, panjang badan, berat badan, dan keadaan operasi. Risiko fungsi reproduksi pasien dan kehamilan atau persalinan yang akan datang, jenis alat kontrasepsi yang akan digunakan. Menjelaskan rencana perawatan dan perkiraan waktu pasien dapat dipulangkan kerumah. Meminta kepada keluarga untuk ikut dalam mengawasi pasien, khususnya terhadap risiko fungsi reproduksi berupa bekas operasi seksio sesarea.

b) Kepada pasien, setelah sadar atau dapat berkomunikasi beritahukan keadaan pasien saat ini. Waktu lahir, jenis kelamin, panjang badan, berat badan dan keadaan bayinya. Risiko fungsi reproduksi, kehamilan dan persalinan yang akan datang. Melakukan konseling dan rencanakan upaya-upaya pencegahan kehamilan apabila tidak dilakukan tubektomi, jelaskan hingga pasien dapat memahaminya dengan baik, menerima dan dapat memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan keinginannya. Jelaskan kembali risiko yang dihadapi oleh pasien, berikan cukup waktu untuk berdiskusi hingga diyakini bahwa pasien telah cukup mengerti dan paham tentang apa yang sudah dijelaskan.

8. Asuhan perawatan luka Seksio Sesarea

a. Setiap satu minggu kasa harus dibuka

Idealnya kasa yang dipakai diganti dengan kasa baru dalam waktu satu minggu sekali. Tidak terlalu sering agar luka cepat kering karena jika sering dibuka luka bisa menempel pada kasa sehingga sulit untuk kering. Maka,

mintalah kepada keluarga untuk membantu dalam membukanya selama satu minggu sekali.

b. Bersihkan jika keluar darah dan langsung ganti kasa

Jika luka bekas operasi keluar darah, maka segeralah untuk mengganti kasanya agar tidak basah atau lembab oleh darah, karena darah merupakan kuman yang bisa cepat menyebar keseluruh bagian luka.

c. Jaga luka agar tidak lembab

Usahakan semaksimal mungkin agar luka tetap kering karena tempat yang lembab akan menjadi tempat kuman untuk berkembangbiak dengan cepat. Misalkan, suhu ruangan terlalu dingin dengan AC yang membuat ruangan menjadi lembab. Bisa jadi luka juga akan ikut lembab. Oleh karena itu, hindari ruangan yang lembab dan atur suhu AC dengan sebaik mungkin.

d. Menjaga kebersihan

Agar luka operasi tidak terkena kotoran yang mengakibatkan cepat berkembangnya kuman, maka kebersihan diri dan lingkungan sekitar harus dijaga semaksimal mungkin. Jauhkan luka dari kotoran untuk itu seprei dan bantal harus selalu bersih dari debu.

e. Gunakan bahan plastik atau pembalut yang kedap air (opset)

Jika ingin mandi atau melakukan aktivitas yang mengharuskan bersentuhan dengan air, maka gunakan bahan plastik atau pembalut yang

kedap air (opset) untuk melindungi luka bekas operasi agar tidak terkena air. Upayakan agar luka tidak sampai basah karena hal tersebut bisa mempercepat pertumbuhan luka.

9. Nutrisi masa nifas

Nutrisi atau gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolismenya. Makan dan minum harus sesuai dengan kebutuhan. Hidup sehat dengan minum air putih 8-9 gelas (3 liter) per hari, sebaiknya minum setiap kali akan menyusukan. Anggaplah salah jika minum air putih mengakibatkan luka akan sulit mengering karena jika tubuh sehat, maka luka akan cepat mengering dan sembuh. Kebutuhan gizi pada masa nifas meningkat sebanyak 25% dari kebutuhan biasa, karena berguna untuk proses kesembuhan setelah melahirkan dan untuk memproduksi air susu yang cukup. Makanan yang dikonsumsi harus bermutu tinggi dan cukup kalori, protein, banyak cairan serta banyak buah-buahan dan sayuran karena sang ibu sedang mengalami hemokonsentrasi.

Ibu yang menyusui harus mengonsumsi tambahan kalori 5000 kalori tiap hari, tablet FE harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca persalinan. Makan dengan diet seimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan juga vitamin yang cukup, mengonsumsi kapsul vitamin A (200.000 unit) agar bisa memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI-nya. Makanan bergizi terdapat pada sayuran hijau, lauk pauk, dan buah. Konsumsi sayuran hijau seperti bayam, sawi, kol, dan

sayuran hijau lainnya yang menjadi sumber makanan bergizi. Untuk lauk-pauk dapat memilih daging, ayam, ikan dan telur.

Ibu pasca seksio sesarea harus menghindari makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia, pedas dan menimbulkan gas perut terkadang menimbulkan masalah sesudah operasi seksio sesarea. Jika ada gas didalam perut, ibu akan merasakan nyeri yang menusuk. Gerakan mobilisasi dini, terknik relaksasi nafas dalam, dan bergoyang di kursi dapat membantu dalam mencegah dan menghilangkan gas.

10. Ambulasi Dini

Setelah melahirkan, ibu merasakan kelelahan karena itu ibu harus istirahat dan tidur secara terlentang selama 8 jam pasca persalinan. Ibu juga boleh miring kiri-kanan untuk mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli. Ada beberapa manfaat mobilisasi bagi ibu pasca seksio sesarea adalah sebagai berikut :

- a. Ibu merasakan lebih sehat dan kuat dengan ambulasi dini. Dengan bergerak, otot-otot perut dan panggul akan kembali normal, sehingga otot perutnya menjadi kuat kembali dan dapat mengurangi rasa sakit. Oleh karena itu, ibu merasa lebih sehat, lebih cepat dalam proses kesembuhan, faal usus dan kandung kemih menjadi lebih baik. Selain itu, dengan bergerak akan merangsang peristaltik usus kembali kedalam bentuk normal. Aktivitas ini juga sangat membantu dalam mempercepat organ-organ tubuh bekerja seperti sebelum mengalami kehamilan.

b. Mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli karena dengan mobilisasi, sirkulasi darah menjadi normal atau lancar sehingga risiko terjadinya trombosis dan tromboemboli dapat dicegah. Pada pasien dengan pasca seksio sesarea biasanya mulai melakukan ambulasi dini 24-36 jam setelah persalinan. Jika pasien menjalani analgesia epidural maka pemulihan sensibilitas yang total harus dibuktikan dahulu sebelum ambulasi dini dilakukan.

Pada hari pertama, dapat dilakukan miring kanan-kiri yang dapat dimulai sejak 6-10 jam setelah ibu sadar. Latihan relaksasi nafas dalam dapat dilakukan ibu sambil tidur terlentang sedini mungkin setelah sadar. Pada hari kedua, ibu dapat duduk dan dianjurkan untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam dengan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri dan membuat ibu lebih rileks dalam menghadapi masa nifasnya. Setelah itu, posisi tidur terlentang diubah menjadi setengah duduk. Beberapa hari setelah melahirkan ibu dianjurkan untuk belajar duduk selama satu hari, belajar berjalan dan berjalan sendiri pada hari ke-3 sampai pada hari ke-5 setelah operasi. Mobilisasi dini secara teratur dan bertahap serta diikuti dengan istirahat yang cukup dapat membantu proses penyembuhan ibu.

11. Defekasi

Fungsi gastrointestinal pada pasien obstetrik yang tindakannya tidak terlalu berat akan kembali normal dalam waktu 12 jam pertama setelah persalinan. Buang air besar secara spontan biasanya akan tertunda selama

2-3 hari setelah melahirkan. Keadaan ini disebabkan karena tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan pada masa postpartum, dehidrasi, kurang makan dan efek anastesi yang menjadi penyebabnya. Bising usus biasanya belum terdengar pada hari pertama setelah operasi seksio sesarea dan mulai terdengar pada hari kedua dan ketiga setelah operasi. Untuk dapat melakukan buang air besar secara teratur dapat dilakukan dengan diet teratur, pemberian cairan yang banyak, konsumsi makanan yang cukup akan serat dan olahraga atau ambulasi dini secara teratur. Jika pada hari ketiga, ibu belum buang air besar maka laksanakan supositoria dapat diberikan pada ibu.

12. Kebersihan diri

Menjaga kebersihan diri dapat membantu dalam mengurangi sumber infeksi dan meningkatkan perasaan kenyamanan dan kesejahteraan ibu. Mandi di tempat tidur dapat dilakukan sampai ibu dapat mandi sendiri di kamar mandi, terutama yang dibersihkan pada saat mandi adalah puting susu dan mammae, kemudian dilanjutkan dengan melakukan perawatan payudara. Pada hari ketiga setelah operasi seksio sesarea dilakukan, ibu sudah bisa mandi tanpa membahayakan luka operasi. Payudara juga harus tetap diperhatikan pada saat mandi, payudara dibasuh dengan menggunakan alat pembasuh yang disediakan secara khusus (Nunung, 2020).

C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan adalah suatu metode proses berpikir secara logis dan sistematis dalam memberikan asuhan kebidanan, agar menguntungkan kedua belah pihak baik bagi pasien maupun bidan. Oleh karena itu, manajemen kebidanan adalah suatu alur berpikir bagi seorang bidan dalam memberikan arah atau kerangka berpikir dalam menangani kasus yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bidan. Manajemen kebidanan merupakan suatu proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan-temuan, dan sebuah keterampilan suatu keputusan yang berfokus kepada pasien. Penatalaksanaan kebidanan terdiri atas VII langkah varney yang urutannya dimulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah-langkah tersebut dapat membentuk kerangka yang lengkap dan telah diaplikasikan dalam semua situs.

2. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan terdiri atas VII langkah varney yaitu sebagai berikut :

a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Merupakan langkah awal dalam pengumpulan data dasar dari berbagai referensi atau sumber data untuk mengevaluasi keadaan ibu secara lengkap

dan mengidentifikasi status kesehatan pasien. Untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan cara melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan, tanda-tanda vital, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan penunjang.

Data yang diperoleh untuk kasus pasca seksio sesarea dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara lengkap dari pasien dengan menilai keadaan pasien melalui anamnesa, informasi dari keluarga dan pemeriksaan fisik. Pengkajian ibu pasca seksio sesarea berfokus pada status fisiologis dan psikologis ibu, tingkat kenyamanannya, perilaku bounding attachment, dan penyesuaian terhadap transisi yang diperlukan untuk menjadi seorang ibu. Selain itu, bayi juga perlu dikaji mengenai penyesuaian fisiologis bayi terhadap lingkungan diluar rahim, kenormalan fisik bayi serta kemampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan bayinya.

b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa Atau Masalah Aktual

Pada langkah ini bidan akan melakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat atas data-data yang telah dikaji dan dikumpulkan pada langkah pengumpulan data dasar. Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan agar dapat merumuskan diagnosa atau masalah yang spesifik. Rumusan diagnosa dan masalah keduanya dapat digunakan karena masalah yang terjadi pada pasien dapat di definisikan sebagai diagnosa tetapi tidak membutuhkan sebuah penanganan. Masalah juga sering menyertai diagnosa.

Dari data subjektif dan objektif yang didapatkan pada saat pengkajian data, maka diagnosa yang ditegakkan yaitu kurangnya pengetahuan tentang manfaat melakukan mobilisasi dini dan kurangnya pengetahuan tentang komplikasi yang dapat terjadi pada ibu pasca seksio sesarea.

c. Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial

Pada langkah ketiga ini, identifikasi masalah atau diagnosis potensial berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang telah diidentifikasi. Pada langkah ini dibutuhkan tindakan antisipasi, jika mungkin dilakukan pencegahan sambil melakukan pengamatan terhadap pasien serta dapat diperlukan persiapan terhadap semua keadaan yang mungkin akan muncul.

Adapun masalah potensial yang mungkin muncul pada kasus pasca seksio sesarea yaitu syok, terbukanya luka operasi, distensi perut, infeksi puerperal, gangguan dan infeksi pada saluran perkemihan.

d. Langkah IV : Mengidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi.

Pada langkah ini, bidan akan mengidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn, dokter umum atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain yang sesuai dengan kondisi pasien. Seorang bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah atau kebutuhan yang dihadapi pasien. Setelah bidan merumuskan tindakan untuk mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial pada langkah sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan segera

atau emergency untuk segera ditangani serta menentukan tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau bersifat rujukan.

Perlunya tindakan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn atau dokter umum untuk memantau proses penyembuhan luka bekas seksio sesarea.

e. Langkah V : Intervensi Atau Rencana Tindakan

Pada langkah ini, diperlukan perencanaan asuhan secara menyeluruh yang ditentukan berdasarkan pada langkah sebelumnya. Pada rencana tindakan ini, tidak hanya melibatkan kondisi ibu yang terlihat tetapi juga akan menggambarkan petunjuk antisipasi pada ibu terhadap keadaan yang akan terjadi selanjutnya.

Pada pasien dengan kasus post seksio sesarea tindakan yang akan diambil yaitu memberikan asuhan tentang mobilisasi dini, teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan dan pada saat melakukan relaksasi boleh sambil berdzikir didalam hati, memberikan penyuluhan tentang cara merawat luka bekas operasi dan cara menjaga personal hygiene.

f. Langkah VI : Implementasi

Pada langkah ini, rencana asuhan secara menyeluruh yang telah diuraikan pada langkah lima, kemudian dilaksanakan secara aman dan efisien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada ibu.

g. Langkah VII : Evaluasi

Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan dari asuhan yang telah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan yang secara benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan dapat dikatakan efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Hasil yang diharapkan dari kasus pasca seksio sesarea yaitu nyeri luka jahitan seksio sesarea berkurang, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas dan kondisi ibu berangsur menjadi lebih baik.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pendokumentasian (SOAP) merupakan metode pendokumentasian yang bersifat sederhana, jelas, logis dan mengandung semua unsur data dan langkah yang dibutuhkan dalam asuhan kebidanan.

a. *Data Subjektif (S)*

Data subjektif berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien, ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan langsung yang akan berhubungan dengan diagnosa yang dialami oleh pasien. Data subjektif ini menjadi penguat diagnosa yang akan disusun.

b. *Data Objektif (O)*

Data objektif merupakan data yang diperoleh berdasarkan observasi dari pemeriksaan fisik pasien, hasil pemeriksaan laboratorium, catatan rekam medik, dan informasi dari keluarga atau orang lain. Data objektif ini akan

memberikan bukti gejala klinis pasien dan diagnosa yang berhubungan dengan fakta.

c. *Assesment (A)*

Assesment merupakan pendokumentasian hasil analisis dan intervensi atau kesimpulan dari data subjektif dan objektif yang telah diperoleh meliputi diagnosa masalah, antisipasi diagnosa atau masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kolaborasi.

d. *Planning (P)*

Planning atau perencanaan adalah membuat rencana asuhan yang disusun berdasarkan hasil asuhan analisis dan interpretasi data yang bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien sebaik mungkin dan mempertahankan rencana asuhan dan mencapai target rencana dalam batas waktu tertentu.

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PASCA SEKSIO SESAREA PADA NY "P"
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 28 APRIL 2024

No. Register : 4634××

Tanggal Masuk : 28 April 2024 Jam : 10.05 Wita

Tanggal Operasi : 28 April 2024 Jam : 13.00 Wita

Tanggal Pengkajian : 28 April 2024 Jam : 15.00 Wita

Nama Pengkaji : Rezky Amelindah

LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny. "P" / Tn. "S"

Umur : 15 Tahun / 18 Tahun

Nikah/Lamanya : 1x / 1 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Dangko Lr. 31

B. Data Biologis/Fisiologis

1. Keluhan

a. Keluhan utama

Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi seksio sesarea

b. Riwayat Keluhan Utama

- 1) Nyeri yang ibu rasakan setelah operasi seksio sesarea pada tanggal 28 April 2024 pukul 13.00 Wita.
- 2) Sifat nyeri yang ibu rasakan menetap pada abdomen diatas simfisis dengan luka bekas operasi seksio sesarea secara melintang.

c. Riwayat Keluhan Penyerta

- 1) Ibu merasakan pusing saat membuka mata
- 2) Ibu merasakan mual ketika diajak berbicara terlalu lama.

2. Riwayat kesehatan

a. Kesehatan yang lalu

- 1) Ibu tidak pernah menderita penyakit hipertensi, asma, jantung, dan diabetes melitus.
- 2) Ibu tidak pernah menderita penyakit menular seperti hepatitis dan HIV/AIDS.
- 3) Ibu tidak pernah memiliki riwayat ketergantungan obat-obatan dan alkohol.
- 4) Ibu tidak memiliki riwayat alergi obat dan makanan.
- 5) Ibu tidak ada riwayat penyakit turunan dalam keluarganya.

b. Kesehatan sekarang

- 1) Ibu tidak pernah menderita penyakit hipertensi, asma, jantung, diabetes melitus
- 2) Ibu tidak ada riwayat penyakit menular seperti hepatitis dan HIV/AIDS
- 3) Ibu tidak memiliki Riwayat alergi terhadap obat
- 4) Ibu tidak ada Riwayat penyakit turunan dalam keluarganya.

3. Riwayat Menstruasi

- a. Menarche : 14 Tahun
- b. Lamanya haid : 5-6 Hari
- c. Siklus haid : 21-35 Hari
- d. Dismenore : Tidak ada

4. Riwayat ANC

- a. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertama dan tidak pernah mengalami keguguran sebelumnya.
- b. HPHT 16 September 2023
- c. HTP 23 Juni 2024
- d. Pemeriksaan ANC sebanyak 4 kali
 - 1) Trimester 1 : 1× kunjungan
 - 2) Trimester 2 : 1× kunjungan
 - 3) Trimester 3 : 2× kunjungan
- e. Ibu mengonsumsi tablet Fe sebanyak ± 70 butir selama kehamilannya.

f. Selama kehamilan, ibu tidak pernah mengalami mual muntah secara berlebihan, nyeri perut yang hebat, perdarahan pervaginam dan tanda-tanda bahaya kehamilan lainnya.

5. Riwayat persalinan sekarang

a. Ibu masuk ke rumah sakit bhayangkara makassar pada tanggal 28 April 2024 pukul 10.05 Wita dengan diagnosa GIP0A0, preterm, gemeli, KPD, dan rencana seksio sesarea.

b. Ibu menjalani operasi seksio sesarea pada tanggal 28 April 2024 pukul 13.00 Wita dengan anastesi spinal. Bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki, Anak pertama BBL 900 gram dan Anak kedua 2.302 gram.

6. Riwayat Ginekologi

a. Ibu tidak pernah menderita penyakit infeksi pada sistem organ reproduksi.

b. Ibu tidak pernah menderita penyakit kelamin.

7. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB sebelumnya.

8. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

a. Kebutuhan Nutrisi

Sebelum hamil, ibu makan 3 kali dalam sehari dengan porsi sedang seperti nasi, sayur dan lauk pauk. Minum 7-8 gelas air putih dalam sehari. Ibu juga rajin mengkonsumsi buah-buahan. Selama hamil, ibu makan 3-4 kali dalam sehari dengan porsi sedang seperti nasi, sayur, lauk dan buah-buahan. Minum 8-9 gelas air putih dalam sehari dan 1 gelas susu ibu hamil setiap harinya.

b. Eliminasi

Sebelum hamil, kebiasaan BAB 1 kali dalam sehari dan BAK 3-4 kali dalam sehari. Setelah 2 jam pasca seksio sesarea masih terpasang keteter dengan jumlah urine \pm 450 ml didalam urine bag dan setelah keluar dari ruangan operasi ibu belum pernah BAB.

c. Istirahat

Kebiasaan tidur siang ibu selama hamil 1-2 jam dalam sehari dan tidur malam sekitar 6-7 jam dalam sehari. Selama 2 jam pasca seksio sesarea ibu belum pernah tidur.

9. Pemeriksaan fisik

1. Keadaan umum ibu lemah
2. Kesadaran ibu composmentis
3. Pemeriksaan TTV

Tekanan Darah : 110/70 mmhg Suhu : 36,5°C

Nadi : 83×/menit Pernapasan : 21×/menit

4. Pemeriksaan *head to toe*

a. Wajah

Tampak pucat, terlihat ekspresi meringis dan tidak ada oedema.

b. Mata

Simetris kiri dan kanan, konjungtiva tidak anemis dan sklera tidak ikterik.

c. Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar limfe, kelenjar tiroid dan vena jugularis.

d. Dada

Melekat obat *durogesic patch* di bagian dada sebelah kiri, bersih dan kering.

e. Payudara

Simetris kanan dan kiri, tampak *hiperpigmentasi areola mammae*, puting susu menonjol, tidak ada massa, tidak ada nyeri tekan dan belum ada pengeluaran kolostrum.

f. Abdomen

Tampak luka bekas operasi seksio sesarea secara melintang yang dibaluti menggunakan kasa steril.

g. Genitalia

Masih terpasang keteter dan tampak pengeluaran lochia rubra.

h. Anus

Tidak terdapat hemoroid.

i. Ekstremitas

1) Ekstremitas atas

Simetris kanan dan kiri, tidak ada varises, tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan masih terpasang infus *dextrose* 28 tpm di sebelah tangan kiri ibu.

2) Ekstremitas bawah

Simetris kanan dan kiri, tidak ada varises, tidak ada oedema dan tidak ada nyeri tekan.

5. Pemeriksaan penunjang 2 jam pasca seksio sesarea

HB : 10.0 gr/dl

C. Data psikososial ekonomi, budaya dan spiritual

- a. Ibu dan keluarga merasakan senang atas kelahiran bayinya.
- b. Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarganya.
- c. Hubungan ibu dan keluarganya baik-baik saja.
- d. Ibu dan keluarga selalu berdoa dan berdzikir agar keadaan bayinya selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan.

LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : Ny. "P" P1A0 dengan Pasca Seksio Sesarea

Masalah Aktual : Nyeri luka jahitan pasca seksio sesarea

1. P1A0 dengan pasca seksio sesarea

Data Subjektif

- a. Ibu melahirkan anak pertama dengan operasi seksio sesarea di RS Bhayangkara Makassar pada tanggal 28 April 2024 pukul 13.00 Wita.

Data Objektif

- a. Pengkajian dilakukan pada tanggal 28 April 2024, pukul 15.00 Wita
- b. Tampak luka bekas operasi seksio sesarea secara melintang yang dibalut menggunakan kasa steril pada abdomen.

Analisa dan interpretasi data

Ibu telah melakukan operasi seksio sesarea pada tanggal 28 April 2024 pukul 13.00 Wita dan selesai pada pukul 14.00 Wita, waktu pengkajian 15.00 Wita yang artinya sudah berada pada masa nifas 2 jam pasca seksio sesarea.

2. Nyeri luka pasca seksio sesarea

Data Subjektif

- a. Ibu melahirkan anak pertama secara seksio sesarea pada tanggal 28 April 2024 pukul 13.00 Wita.
- b. Ibu mengeluh merasakan nyeri pada luka bekas operasi seksio sesarea.
- c. Sifat nyeri yang ibu rasakan menetap pada abdomen diatas simfisis dengan luka bekas operasi seksio sesarea secara melintang.

Data Objektif

- a. Ekspresi wajah ibu tampak meringis
- b. Tampak luka bekas operasi seksio sesarea secara melintang yang dibalut menggunakan kasa steril pada abdomen.

Analisa dan interpretasi data

Tindakan pasca seksio sesarea meninggalkan sayatan pada kulit abdomen yang menyebabkan terputusnya jaringan yang telah di insisi. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya zat kimia, kemudian dibawa oleh serabut delta A dan C yang mempunyai peran membawa transmisi nyeri dari medula spinalis menuju thalamus. Otak akan mempersepsikan nyeri yang membuat pasien merasakan nyeri pada daerah insisi saat anestesi sudah hilang (Nunung, 2020)

LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Diagnosa : Ny. "P", P1A0 dengan pasca seksio sesarea

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya infeksi pada luka jahitan.

1. Infeksi pada luka jahitan

Data Subjektif

- a. Ibu melahirkan anak pertama secara seksio sesarea pada tanggal 28 April 2024 pukul 13.00 Wita.
- b. Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi seksio sesarea
- c. Sifat nyeri yang dirasakan menetap pada abdomen di atas simfisis dengan luka bekas operasi seksio sesarea secara melintang.

Data Objektif

- a. Pengkajian dilakukan pada tanggal 28 April 2024 pukul 13.00 Wita

b. Tampak luka pasca seksio sesarea secara melintang yang dibalut menggunakan kasa steril pada abdomen.

c. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/70 mmhg Suhu : 36,5°C

Nadi : 83×/menit Pernapasan : 21×/menit

Analisa dan interpretasi data

Perawatan luka adalah sebuah tindakan untuk merawat luka dan luka operasi adalah luka yang bersih sehingga sangat mudah untuk perawatannya. akan tetapi jika salah dalam melakukan perawatan maka akan berakibat fatal. Oleh karena itu, pastikan tidak salah dalam melakukan perawatan luka bekas operasi. Melakukan pembalutan luka dengan tujuan untuk mencegah infeksi silang masuk melalui luka dan mempercepat proses penyembuhan luka (Nunung, 2020).

2. Infeksi saluran kemih

Data Subjektif

a. Ibu melahirkan anak pertama dengan operasi seksio sesarea pada tanggal 28 April 2024, pukul 13.00 Wita.

Data Objektif

- a. Pengkajian dilakukan pada tanggal 28 April 2024, pukul 15.00 Wita
- b. Terpasang keteter tetap dan memakai popok dewasa.
- c. Ekstremitas atas, terpasang infus *Dextrose* disebelah tangan kiri pasien.

Analisa dan interpretasi data

Infeksi saluran kemih dapat terjadi pada pasien pasca operasi seksio sesarea, terutama pada ibu yang menggunakan keteter. Ibu akan mengalami demam dan merasakan nyeri pada saat berekemih, kemudian hasil pemeriksaan urine dikeluarkan melalui keteter yang mengandung leukosit didalamnya. Hal ini disimpulkan setelah melihat adanya peningkatan leukosit esterase (Nunung, 2020).

3. Terbukanya luka operasi

Data Subjektif

- a. Ibu melahirkan anak pertama dengan operasi seksio sesarea pada tanggal 28 April 2024, pukul 13.00 Wita.
- b. Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi seksio sesarea.

Data Objektif

- a. Pengkajian dilakukan pada tanggal 28 April 2024, pukul 15.00 Wita.
- b. Tampak luka bekas operasi seksio sesarea secara melintang yang dibaluti menggunakan kasa steril pada abdomen.

Analisa dan interpretasi data

Jahitan pada luka bekas operasi seksio sesarea bisa terbuka karena adanya beberapa faktor yaitu luka dijahit tidak sempurna, distensi perut, batuk, muntah keras dan bahkan bisa menyebabkan infeksi (Nunung, 2020).

LANGKAH IV TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI/RUJUKAN

Adanya tindakan kolaborasi yang dilakukan dengan dokter spesialis obgyn dalam hal pemberian terapi obat farmakologi.

LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

Tanggal 28 April 2024 Pukul 15.05 Wita.

A. Tujuan

1. Pasca operasi seksio sesarea berlangsung normal
2. Tingkatan nyeri luka pasca seksio sesarea dapat teratasi atau berkurang.

B. Kriteria

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah : Systole (90-120 mmhg)

 Dyastole (60-80 mmhg)

Nadi : 60-90×/menit

Suhu : 36,5°C- 37,5°C

Pernapasan : 16-24×/menit.

4. Tingkatan keluhan nyeri berkurang
5. Tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas yaitu demam, luka bekas jahitan tampak kemerahan, bengkak, terdapat pengeluaran cairan

seperti nanah atau darah, jahitan terbuka, dan adanya perdarahan yang tidak wajar pada jalan lahir.

6. Proses involusio uteri berlangsung normal yang ditandai dengan :

- a. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras.
- b. Involusio uteri baik
- c. Lokia rubra dan tidak berbau.

C. Rencana Tindakan

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Rasional :

Mencegah terjadinya infeksi silang.

2. Ucapkan salam dan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya

Rasional :

Untuk menciptakan hubungan yang baik dengan ibu.

3. Observasi tanda-tanda vital setiap 2-4 jam

Rasional :

Tanda-tanda vital sebagai salah satu indikator untuk mengetahui keadaan ibu.

4. Kaji tingkatan nyeri pada ibu

Rasional :

Untuk mengetahui tingkatan nyeri yang dirasakan pada ibu.

5. Observasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lokia

Rasional :

a) TFU adalah salah satu indikator untuk mengetahui bahwa proses involusi uteri berjalan secara normal atau tidak. Normal TFU berkurang 1 cm dalam setiap hari serta teraba bundar dan keras.

b) Kontraksi uterus untuk mengetahui apakah uterus berkontraksi dengan baik atau tidak. Apabila uterus tidak berkontraksi dengan baik maka dapat menyebabkan perdarahan dan memperlambat proses involusi uteri.

c) Involusi uteri yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya infeksi sehingga lochia mengalami perubahan warna, bau, banyaknya serta perpanjangan pengeluaran lochia.

6. Jelaskan kepada ibu penyebab nyeri yang ibu rasakan

Rasional :

Dengan menjelaskan penyebab nyeri, agar ibu dapat mengerti dan beradaptasi dengan nyeri tersebut sehingga ibu akan lebih tenang dengan kondisinya.

7. Beritahu kepada ibu cara mengurangi nyeri yang dirasakan

a) Nyeri ringan

Dengan melakukan Teknik relaksasi nafas dalam

b) Nyeri sedang

Dengan melakukan Teknik rangsangan seperti mengompres air hangat/dingin

c) Nyeri berat

Dengan melakukan pemberian obat terapi farmakologi

Rasional :

Agar nyeri yang ibu rasakan dapat berkurang

8. Beritahu kepada ibu kandungan obat *durogesic patch* yang melekat pada dada bagian sebelah kiri yaitu sebagai analgetik yang dapat mengurangi rasa nyeri pasca seksio sesarea.

Rasional :

Agar ibu mengetahui kandungan atau fungsi obat yang melekat pada dadanya.

9. Anjurkan kepada ibu untuk menjaga obat *durogesic patch* yang dapat dipakai hingga 72 jam, agar tetap bersih dan kering sampai pada hari ketiga.

Rasional :

Agar kadar obat *durogesic patch* tidak berkurang atau rusak

10. Anjurkan kepada ibu untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan melakukan mobilisasi dini

Rasional :

Dapat membantu dalam mengurangi rasa nyeri dan mencegah terjadinya tromosis dan tromboemboli.

11. Jelaskan kepada ibu manfaat melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan mobilisasi dini

Rasional :

Teknik relaksasi nafas dalam adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengalihkan perhatian ibu terhadap nyeri yang dirasakan. Relaksasi juga dapat meningkatkan suplay O₂ yang akan masuk kedalam tubuh ibu sehingga dapat mengurangi nyeri yang dirasakan. Pada saat bergerak atau melakukan mobilisasi dini, otot-otot perut akan menjadi kuat dan bisa

mengurangi rasa nyeri. Selain itu, ibu akan mendapatkan kekuatan, mempercepat proses penyembuhan, faal usus dan kandung kemih akan membaik jika bergerak karena merangsang peristaltik usus Kembali normal. Kegiatan ini juga bisa membantu organ-organ tubuh cepat bekerja sebagaimana mestinya.

12. Anjurkan kepada ibu untuk selalu makan makanan yang tinggi akan protein seperti buah (strawbery, anggur dan jeruk) sayuran hijau seperti bayam dan daun kelor, kacang-kacangan, ikan dan juga daging.

Rasional :

Agar kebutuhan nutrisi ibu terpenuhi dengan baik

13. Anjurkan kepada ibu untuk minum air putih sedikit demi sedikit jika merasa sudah tidak mual pada 6 jam pertama pasca seksio sesarea

Rasional :

Agar kebutuhan cairan ibu terpenuhi dengan baik

14. Anjurkan kepada ibu untuk tetap menyusukan bayinya secara bergantian atau *on demand* . Ibu juga bisa mengkonsumsi kacang-kacangan, sayuran (katuk, bayam, kelor dan labu kuning), dan biji-bijian yang bisa menambah produksi ASI.

Rasional :

Saat menyusukan, hisapan bayi akan merangsang pengeluaran ASI. Makanan juga menjadi sebagai salah satu faktor yang sangat berperan penting untuk menambah produksi ASI.

15. Ajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara

Rasional :

Untuk merangsang produksi ASI

16. Berikan dukungan kepada ibu untuk semangat menyusukan bayinya.

Menjelaskan bahwa hari pertama sampai hari ketiga biasanya ASI masih belum keluar. Kebutuhan makanan bayi juga belum terlalu banyak sehingga tidak perlu memberikan susu formula. Bayi menangis tidak selalu menandakan bahwa dia sedang lapar, akan tetapi itu adalah Bahasa tubuhnya karena mulai beradaptasi dengan dunia diluar rahim.

Rasional :

Agar ibu semangat dalam menyusukan bayinya

17. Jelaskan kepada ibu tentang penyebab keluarnya darah dari jalan lahir karena terjadinya involusio uteri atau proses dimana uterus akan kembali seperti ke kondisi sebelum mengalami kehamilan.

Rasional :

Agar ibu mengerti

18. Jelaskan kepada ibu pentingnya menjaga personal hygiene. Menjaga kebersihan diri terlebih disekitar luka bekas operasi, mengganti pembalut setiap 2-4 jam atau jika pembalut sudah penuh dan ibu merasa tidak nyaman.

Rasional :

Agar ibu merasa nyaman dan terhindar dari yang namanya infeksi.

19. Berikan informasi kepada ibu tentang kapan ibu boleh melakukan hubungan seksual yaitu apabila sudah tidak ada lagi darah yang keluar dan jika dimasukkan 2 jari atau lebih ibu tidak merasakan sakit lagi.

Rasional :

Agar ibu mengerti dan menghindari hubungan seksual sebelum selesai masa nifasnya.

20. Observasi pemberian cairan infus *Dextrose* secara *Intravena* yang dicampur dengan *Oxytosin* 2 ampul

Rasional :

Untuk merangsang kontraksi uterus agar tidak terjadi perdarahan

21. Observasi pengeluaran urine pada urine bag

Rasional :

Mengetahui keseimbangan cairan dalam tubuh serta kandung kemih yang penuh dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan nyeri pada ibu.

22. Berikan *Nazovel* 100 mg melalui rectum pada 6 jam pertama setelah operasi seksio sesarea

Rasional :

Untuk mengurangi nyeri pasca seksio sesarea

23. Lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk pemberian terapi obat farmakologi

Rasional :

Agar bisa mengetahui jenis obat dan jumlah dosisnya yang akan diberikan kepada pasien.

24. Berikan dan jelaskan kepada ibu manfaat obat yang diresepkan oleh dokter

- a. *Paracetamol* : Membantu mengurangi demam, pusing dan nyeri.
- b. *Lactamam* : Membantu memperlancar ASI
- c. *Ifalmin* : Membantu proses penyembuhan luka setelah operasi
- d. *Analtram* : Membantu redakan nyeri pasca seksio sesarea
- e. *Maxpofer* : Membantu pemenuhan kebutuhan zat besi, B12, asam folat, dan mineral.

Rasional :

Agar ibu mengetahui manfaat obat yang diberikan

25. Beritahu kepada ibu jadwal mengkonsumsi obat yang diberikan yaitu *paracetamol* 3×1, *Ifalmin* 3×1, *lactamam* 3×1, *analtram* 3×1, dan *maxpofer* 1×1.

Rasional :

Agar ibu mengerti mengenai jadwal minum obatnya.

26. Berikan support kepada ibu untuk semangat menjalani peran barunya sebagai ibu dan tidak perlu cemas terhadap kondisinya seperti nyeri dan luka bekas operasi akan segera membaik. Segala perubahan fisiologis adalah sesuatu yang wajar dan perlu di syukuri, hal inilah sebagai tanda atau kenangan saat mengandung sang buah hati.

Rasional :

Agar ibu merasa tenang dan tidak terjadi kecemasan yang dapat membuat ibu menjadi lemah.

27. Anjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang minimal 1-2 jam dan tidur malam 7-8 jam dalam sehari dan selalu menghindari aktivitas yang berat.

Rasional :

Dengan istirahat yang cukup dapat membantu dalam proses pemulihan.

28. Beritahu kepada ibu tentang perawatan bayi seperti memandikan, memperhatikan kebersihan, perawatan tali pusat bayi dan senantiasa menjaga kehangatan tubuh bayi.

Rasional :

Agar kebersihan dan kehangatan bayi selalu terjaga.

29. Beritahu kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir yaitu bayi tidak mau menyusu, kejang, demam $> 37,5^{\circ}\text{C}$, tali pusat bernanah dan berbau, kulit berwarna kuning, biru atau pucat. Jika terjadi salah satu dari tanda bahaya segera bawa bayi ke pusat pelayanan Kesehatan terdekat.

Rasional :

Agar tanda dan bahaya pada bayi bisa dihindari atau segera ditangani dengan cepat.

30. Anjurkan kepada suami dan keluarga untuk membantu ibu dalam merawat bayinya.

Rasional :

Agar ibu tidak merasakan kelelahan dan berujung ke stress.

31. Anjurkan kepada ibu untuk senantiasa selalu berdoa dan berdzikir serta senantiasa berprasangka baik kepada Allah SWT atas semua yang dialaminya.

Rasional :

Agar ibu merasa tenang dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.

32. Buat jadwal kunjungan masa nifas hingga minggu keenam

Rasional :

Untuk memantau perkembangan ibu dan membantu jika terdapat keluhan yang ibu rasakan.

LANGKAH VI IMPLEMENTASI

Tanggal 28 April 2024 Pukul 15. 10 Wita

1. Mengucapkan salam dan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya dan senantiasa menciptakan hubungan yang baik dengan ibu.

Hasil : Telah dilakukan dan ibu merasa senang

2. Mengobservasi TTV 2 jam pasca seksio sesarea

Tekanan darah : 110/70 mmhg Suhu : 36,5°C

Nadi : 83×/menit Pernapasan : 21×/menit.

Hasil : TTV dalam batas normal

3. Mengkaji tingkatan nyeri yang ibu rasakan, ekspresi wajah tampak meringis

Hasil : Diukur menggunakan visual analogue, nyeri yang ibu rasakan pada tingkat 3

4. Memberitahu ibu cara mengurangi nyeri ringan dengan melakukan teknik relaksasi nafas dalam

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Menjelaskan kepada ibu manfaat melakukan teknik relaksasi nafas dalam

Hasil : Ibu mengerti manfaat melakukan teknik relaksasi nafas dalam

6. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochia

Hasil : TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras, pengeluaran lochia rubra dan tidak berbau.

7. Mengobservasi cairan infus *dextrose* yang dicampur dengan *Oxytosin* 2 ampul

Hasil : Telah dilakukan dan tetesan 28x/menit

8. Mengobservasi pengeluaran urine

Hasil : Urine sebanyak ± 450 ml yang tertampung didalam urine bag.

9. Memberikan support kepada ibu untuk selalu semangat dalam menjalani peran barunya sebagai seorang ibu dan tidak perlu cemas terhadap kondisinya seperti nyeri yang dirasakan dan luka bekas operasi seksio sesarea akan segera membaik.

Hasil : Telah dilakukan

10. Menganjurkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir serta selalu berprasangka baik kepada Allah SWT atas semua yang dialaminya.

Hasil : Selalu membaca dzikir :

11. Membuat jadwal kunjungan nifas

Hasil : Telah dilakukan

LANGKAH VII EVALUASI

Tanggal 28 April 2024 Pukul 15.20 Wita

1. Keadaan umum ibu baik
2. Tanda-tanda vital dalam batas normal
3. Nyeri luka jahitan pasca seksio sesarea pada ibu dengan nyeri sedang yang diukur menggunakan visual analogue berada pada tingkat 3
4. Tidak terdapat tanda-tanda infeksi
5. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras, TFU 2 jari dibawah pusat.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PASCA SEKSIO SESAREA
PADA NY "P"**

DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR

TANGGAL 28 APRIL 2024

No. Register : 4634xx

Tanggal Masuk : 28 April 2024 Jam : 10.05 Wita

Tanggal Operasi : 28 April 2024 Jam : 13.00 Wita

Tanggal Pengkajian : 28 April 2024 Jam : 15.00 Wita

Nama Pengkaji : Rezky Amelindah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny. "P" / Tn. "S"

Umur : 15 Tahun / 18 Tahun

Nikah/Lamanya : 1x / 1 Tahun

Suku : Makassar /Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Dangko Lr. 31

Data Subjektif (S)

1. Ibu melahirkan anak pertamanya pada tanggal 28 April 2024 pukul 13.00 Wita.

2. Ibu mengeluh merasakan nyeri pada luka bekas operasi seksio sesarea.
3. Sifat nyeri yang dirasakan menetap pada abdomen diatas simfisis dengan luka bekas operasi seksio sesarea secara melintang.
4. Ibu mengeluh merasa pusing saat membuka mata
5. Ibu merasa mual jika diajak berbicara terlalu lama.

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran ibu composmentis
3. Ekspresi wajah tampak meringis
4. Tampak *durogesic patch* bersih dan kering yang melekat pada dada sebelah kiri
5. Belum ada pengeluaran kolostrum
6. Tampak luka bekas operasi seksio sesarea secara melintang yang dibaluti menggunakan kasa steril.
7. Terpasang keteter tetap dan memakai popok
8. Pemeriksaan laboratorium 2 jam pasca seksio sesarea tanggal 28 April 2024 yaitu Hb : 10.0 gr/dl.

Assesment (A)

Ny. "P" P1A0 Pasca seksio sesarea 2 jam yang lalu

Planning (P)

Tanggal 28 April 2024 Pukul : 15.00 Wita

1. Mengucapkan salam dan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya dan menciptakan hubungan yang baik dengan ibu

Hasil : Telah dilakukan dan ibu merasa senang

2. Mengobservasi keadaan umum ibu dan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/70 mmhg

Nadi : 83x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernapasan : 21x/menit

Hasil : Keadaan umum ibu baik dan TTV dalam batas normal.

3. Mengkaji tingkatan nyeri yang dirasakan ibu ekspresi wajah ibu tampak meringis

Hasil : Diukur menggunakan visual analogue, nyeri berada pada tingkat 3.

4. Memberitahu ibu cara mengurangi nyeri ringan dengan melakukan teknik relaksasi nafas dalam.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukan teknik relaksasi nafas dalam

5. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan teknik relaksasi nafas dalam

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lokia

Hasil : TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus teraba bundar dan keras, pengeluaran lokia rubra dan tidak berbau.

7. Mengobservasi cairan infus *Dextrose* secara *Intravena* yang dicampur dengan 2 ampul *Oxytosin*

Hasil : Telah dilakukan dan 28 tpm

8. Mengobservasi pengeluaran urine

Hasil : Jumlah urine yang terdapat didalam urine bag yaitu ± 450 ml

9. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT serta senantiasa selalu berprasangka baik kepadanya

Hasil : Ibu selalu membaca dzikir pada saat waktu senggang

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Terjemahnya :

Aku mohon ampun kepada Allah yang tiada tuhan (berhak diusembah) kecuali Dia, Dzat yang maha hidup dan Dzat yang maha berdiri sendiri, dan saya bertaubat kepada-Nya.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PASCA SEKSIO SESAREA
PADA NY "P" DENGAN PASCA SEKSIO SESAREA 6 JAM
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 28 APRIL 2024**

No. Register : 4634xx

Tanggal Masuk : 28 April 2024 Jam : 10.05 Wita

Tanggal Operasi : 28 April 2024 Jam : 13.00 Wita

Tanggal Pengkajian : 28 April 2024 Jam : 19.00 Wita

Nama Pengkaji : Rezky Amelindah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny. "P" / Tn. "S"

Umur : 15 Tahun / 18 Tahun

Nikah/Lamanya : 1x / 1 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Dangko Lr. 31

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengeluh masih merasakan nyeri pada luka bekas operasi seksio sesarea saat bergerak
2. Ibu masih merasakan mual jika diajak berbicara terlalu lama
3. Ibu mengatakan ASInya belum keluar

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi wajah ibu tampak meringis saat bergerak
4. Tampak *durogasic patch* bersih dan kering yang melekat pada dada sebelah kiri
5. Belum ada pengeluaran ASI
6. Tampak luka bekas operasi seksio sesarea secara melintang yang dibaluti menggunakan kasa steril
7. TFU 2 jari dibawah pusat
8. Kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras
9. Pengeluaran lokia rubra dan tidak berbau.

Assesment (A)

Ny. "P" P1A0 Pasca seksio sesarea 6 jam dengan nyeri pada tingkat 2

Planning (P)

Tanggal 28 April 2024

Pukul 19.00 Wita

1. Mengobservasi keadaan umum ibu dan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/80 mmhg

Nadi : 81x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernapasan : 20x/menit

Hasil : Keadaan umum ibu baik dan TTV dalam batas normal.

2. Mengkaji tingkatan nyeri yang dirasakan ibu, ekspresi wajah ibu tampak meringis

Hasil : Diukur menggunakan visual analogue, nyeri berada pada tingkat 2.

3. Menjelaskan kepada ibu tentang penyebab nyeri disebabkan karena terputusnya jaringan otot dan rangsangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi. Dengan adanya luka ini maka akan merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul sifat nyeri

Hasil : Ibu mengerti tentang penyebab nyeri yang dirasakannya

4. Memberitahu kepada ibu kandungan obat *durogestic patch* yang melekat pada dada sebelah kiri

Hasil : Ibu mengerti

5. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga obat *durogestic patch* agar tetap bersih dan kering hingga hari ketiga

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia menjaganya dengan baik

6. Mengajarkan kepada ibu untuk senantiasa melakukan mobilisasi dini dengan miring kiri/kanan dan mulai belajar duduk di atas tempat tidur

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukan mobilisasi dini

7. Menjelaskan kepada ibu manfaat melakukan mobilisasi dini untuk mencegah terjadinya thrombosis dan tromboemboli

Hasil : Ibu mengerti manfaat dalam melakukan mobilisasi dini

8. Menganjurkan kepada ibu untuk minum air putih sedikit demi sedikit jika merasa tidak mual

Hasil : Ibu minum air putih sedikit demi sedikit

9. Menganjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang tinggi akan protein seperti buah (strawberry, anggur dan jeruk), sayuran hijau seperti (bayam dan daun kelor), kacang-kacangan dan ikan gabus karena sangat baik untuk membantu proses penyembuhan luka.

Hasil : Ibu selalu mengkonsumsi makanan seperti nasi, sayur bayam, ikan gabus dan kacang-kacangan untuk memperlancar proses produksi ASI

10. Menganjurkan ibu untuk menyusukan bayinya secara *on demand* di kedua payudaranya

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

11. Menjelaskan kepada ibu bahwa hari pertama sampai hari ketiga biasanya ASI belum keluar, oleh karena itu ibu tidak perlu merasa khawatir dengan kondisinya sekarang ini

Hasil : Ibu mengerti

12. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya darah dari jalan lahir karena terjadinya involusio uteri atau proses dimana uterus akan kembali ke keadaan sebelum mengalami kehamilan

Hasil : Ibu mengerti

13. Menjelaskan kepada ibu tentang pentingnya menjaga *personal hygiene* seperti mengganti pembalut setiap 2-4 jam dan jika pembalut sudah penuh sehingga membuat ibu merasa tidak nyaman

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia untuk menjaga kebersihan personal hygiene

14. Mengobservasi pemberian cairan infus *Dextrose* secara *Intravena* yang dicampur dengan 2 ampul *Oxytosin*

Hasil : Telah dilakukan

15. Mengobservasi pengeluaran urine

Hasil : ±160 ml

16. Memberikan obat *nazovel* 100 mg melalui rectum untuk mengatasi nyeri pada 6 jam pasca seksio sesarea

Hasil : Telah dilakukan

17. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk pemberian terapi obat farmakologi

Hasil : Telah dilakukan

18. Memberikan dan menjelaskan kepada ibu manfaat obat yang telah diresepkan oleh dokter

Hasil : Telah dilakukan

19. Memberitahu kepada ibu jadwal mengkonsumsi obat yang telah diberikan yaitu *paracetamol* 3x1, *lactamam* 3x1, *maxpofer* 1x1, dan *ilfamin* 3x1.

Hasil : Telah dilakukan

20. Memberikan support kepada ibu untuk semangat menjalani peran barunya sebagai seorang ibu dan tidak perlu cemas terhadap kondisinya, nyeri yang dirasakan dan luka bekas operasi seksio sesarea akan segera membaik.

Hasil : Telah dilakukan

21. Menganjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 7-8 jam dalam sehari dan selalu menghindari melakukan aktivitas yang berat.

Hasil : Ibu mengerti

22. Mengingatkan kepada ibu agar senantiasa berdoa dan membaca dzikir

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Hasil : Ibu selalu membaca doa dan berdzikir pada saat waktu senggang.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PASCA SEKSIO SESAREA
PADA NY "P" DENGAN PASCA SEKSIO SESAREA HARI KE 1
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 29 APRIL 2024**

No. Register : 4634xx
Tanggal Masuk : 28 April 2024 Jam : 10.05 Wita
Tanggal Operasi : 28 April 2024 Jam : 13.00 Wita
Tanggal Pengkajian : 29 April 2024 Jam : 13.00 Wita

Nama Pengkaji : Rezky Amelindah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny. "P" / Tn. "S"
Umur : 15 Tahun / 18 Tahun
Nikah/Lamanya : 1x / 1 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
Alamat : Jl. Dangko Lr. 31

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengeluh masih merasakan nyeri pada saat ingin bangun atau berdiri
2. Ibu mengatakan infusnya telah dibuka pagi ini pada jam 10.00 Wita
3. Ibu mengatakan ASI-nya belum keluar
4. Ibu mengatakan masih melekat obat *durogesic patch* pada bagian dada sebelah kiri
5. Ibu mengatakan sudah membersihkan dirinya pagi ini
6. Ibu belum BAB semenjak setelah operasi
7. Ibu mengatakan telah diberikan terapi obat melalui anusya
8. Ibu akan merawat bayinya dibantu oleh suami dan keluarganya.

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran ibu composmentis
3. Tampak ekspresi ibu tersenyum akan tetapi masih terlihat menahan nyeri

4. Pemeriksaan TTV dalam batas normal

Tekanan darah : 110/80 mmhg

Nadi : 80x/menit

Suhu : 36,6°C

Pernapasan : 20x/menit

5. Tampak *durogestic patch* bersih dan kering yang masih melekat pada dada sebelah kiri
6. Belum ada pengeluaran ASI
7. TFU 3 jari dibawah pusat
8. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
9. Pengeluaran lochia rubra dan tidak berbau

Assesment (A)

Ny. "P", P1A0 Pasca Seksio Sesarea hari pertama

Planning (P)

Tanggal 29 April 2024 Pukul 13.10 Wita

1. Mengobservasi keadaan umum ibu dan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmhg

Nadi : 82x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernapasan : 20x/menit

Hasil : Keadaan umum ibu baik dan TTV dalam batas normal.

2. Mengkaji tingkatan nyeri yang dirasakan ibu, ekspresi wajah ibu tersenyum akan tetapi masih terlihat menahan nyeri

Hasil : Diukur menggunakan visual analogue, nyeri berada pada tingkat 1

3. Memberitahu kepada ibu jika masih merasakan nyeri, maka lakukan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan

Hasil : Ibu selalu melakukan teknik relaksasi nafas dalam

4. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga obat *durogesic patch* agar tetap bersih dan kering hingga hari ketiga

Hasil : Ibu mengerti

5. Menganjurkan kepada ibu untuk senantiasa melakukan mobilisasi dini dengan membiasakan berjalan dengan sendirinya

Hasil : Ibu sudah mulai bisa berjalan dengan sendirinya

6. Menganjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang tinggi akan protein seperti buah (strawberry, anggur dan jeruk), sayuran hijau seperti (bayam dan daun kelor), kacang-kacangan dan ikan gabus karena sangat baik untuk membantu proses penyembuhan luka.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

7. Menganjurkan ibu untuk menyusukan bayinya secara *on demand* di kedua payudaranya

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Menjelaskan kepada ibu bahwa hari pertama sampai hari ketiga biasanya ASI belum keluar, oleh karena itu ibu tidak perlu merasa khawatir dengan kondisinya sekarang ini

Hasil : Ibu mengerti

9. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara yang bertujuan untuk merangsang produksi ASI

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

10. Menjelaskan kepada ibu tentang pentingnya menjaga *personal hygiene* seperti mengganti pembalut setiap 2-4 jam dan jika pembalut sudah penuh sehingga membuat ibu merasa tidak nyaman

Hasil : Ibu mengerti

11. Mengingatkan kepada ibu jadwal untuk mengkonsumsi obat yang telah diberikan yaitu *lactamam 3x1*, *analtram 3x1*, dan *ilfamin 3x2*.

Hasil : Telah dilakukan

12. Menganjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 7-8 jam dalam sehari dan senantiasa menghindari melakukan aktivitas yang berat.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

13. Memberitahu kepada ibu tentang perawatan bayi seperti memandikan bayi, memperhatikan kebersihan bayinya, perawatan tali pusat bayinya dan selalu menjaga kehangatan bayi

Hasil : Ibu mengerti

14. Memberitahu kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi yaitu bayi tidak mau menyusu, kejang, demam $> 37,5^{\circ}\text{C}$, tali pusat bernanah dan bau, kulit menjadi kuning, biru atau pucat. Jika salah satu tanda bahaya itu terjadi maka segera membawa bayinya ke pusat pelayanan Kesehatan terdekat.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

15. Mengajukan suami atau keluarga selalu membantu ibu dalam, merawat bayinya agar tidak terlalu merasakan kelelahan dan berujung stress

Hasil : Telah dilakukan

16. Mengingatkan kepada ibu agar senantiasa berdoa dan membaca dzikir

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Hasil : Ibu selalu membaca doa dan berdzikir pada saat waktu senggang.

17. Memberitahu kepada ibu bahwa kunjungan nifas selanjutnya dilakukan pada tanggal 4 Mei 2024

Hasil : Ibu mengerti dan dengan senang hati bisa bertemu dikunjungan berikutnya.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PASCA SEKSIO SESAREA
PADA NY "P" DENGAN PASCA SEKSIO SESAREA 1 MINGGU
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 4 MEI 2024**

No. Register : 4634xx

Tanggal Kunjungan : 4 Mei 2024 Jam : 20.00 Wita

Tanggal Pengkajian : 4 Mei 2024 Jam : 20.10 Wita

Nama Pengkaji : Rezky Amelindah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny. "P" / Tn. "S"

Umur : 15 Tahun / 18 Tahun

Nikah/Lamanya : 1x / 1 Tahun

Suku : Makassar /Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Dangko Lr. 31

Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah tidak merasakan nyeri

2. Ibu mengatakan ASInya sudah mulai lancar keluar sejak 3 hari setelah pasca seksio sesarea
3. Ibu mengatakan mengkonsumsi vitamin pelancar ASI
4. Ibu mengatakan tali pusat bayinya sudah mulai kering dan terlepas
5. Ibu sudah bergerak dan berjalan sendiri, serta melakukan aktivitas ringan lainnya.

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi wajah tampak bahagia
4. Pemeriksaan tanda-tanda vital
Tekanan darah : 110/80 mmhg
Nadi : 81x/menit
Suhu : 36,5°C
Pernapasan : 20x/menit
5. TFU yaitu pertengahan antara pusat dan simfisis
6. Tampak luka bekas operasi seksio sesarea masih terbaluti kasa steril
7. Pengeluaran lochia serosa dengan warna kuning kecoklatan dan tidak berbau

Assesment (A)

Ny. "P", P1A0 Pasca Seksio Sesarea 1 Minggu Postpartum

Planning (P)

Tanggal 4 Mei 2024

Pukul : 20.10 Wita

1. Memberikan dukungan dan support kepada ibu agar tetap semangat menjalani peran barunya sebagai seorang ibu. Segala perubahan fisiologis adalah sesuatu yang sangat wajar dan perlu di syukuri, hal inillah sebagai tanda atau kenang-kenangan saat mengandung sang buah hati tercinta.

Hasil : Ibu merasa senang dan bersemangat

2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu baik dan TTV dalam batas normal

Tekanan darah : 110/80 mmhg

Suhu : 36,5°C

Nadi : 81x/menit

Pernapasan : 20x/menit

Hasil : Ibu mengerti

3. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menyusukan bayinya secara bergantian atau *on demand* di kedua payudara. Ibu juga boleh mengkonsumsi kacang-kacangan, sayuran (bayam, daun kelor dan labu kuning) serta biji-bijian yang bisa menambah produksi ASI

Hasil : Ibu selalu menyusukan bayinya secara *on demand* dan selalu mengkonsumsi daun kelor dan biji-bijian untuk menambah produksi ASI.

4. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara yang bertujuan untuk merangsang produksi ASI

Hasil : Ibu selalu melakukan perawatan payudara

5. Memberikan dukungan kepada ibu untuk semangat menyusukan bayinya dan tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan.

Hasil : Ibu mengerti

6. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu menjaga *personal hygiene* terlebih dahulu di sekitar luka bekas operasi, mengganti pembalut 2-4 jam atau jika pembalut sudah penuh dan ibu merasa tidak nyaman

Hasil : Ibu selalu menjaga kebersihan personal hygienennya dan mengganti pembalutnya setiap 2 jam.

7. Mengingatkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 7-8 jam dalam sehari dan selalu menghindari aktiviutas yang berat

Hasil : Ibu biasanya tidur siang \pm 1 jam dalam sehari dan tidur malam \pm 5-6 jam dalam sehari.

8. Mengingatkan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi yaitu bayi tidak mau menyusu, kejang, demam $> 37,5^{\circ}\text{C}$, talin pusat bernanah dan bau, kulit menjadi kuning, biru atau pucat. Jika salah satu tanda bahaya itu terjadi maka segera bawa bayi ke pusat pelayanan kesehatan terdekat.

Hasil : Ibu masih mengingat tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir.

9. Menganjurkan kepada keluarga untuk selalu membantu ibu dalam merawat bayinya agar tidak terlalu merasakan kelelahan dan berujung stress.

Hasil : Telah dilakukan dan keluarganya selalu membantu dalam merawat bayinya.

10. Mengingatkan kepada ibu agar senantiasa berdoa dan membaca dzikir

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Hasil : Ibu selalu membaca doa dan berdzikir pada saat waktu senggang.

11. Memberitahu kepada ibu bahwa kunjungan nifas berikutnya dilakukan pada tanggal 11 Mei 2024

Hasil : Ibu mengerti dan dengan senang hati untuk bisa bertemu dikunjungi berikutnya.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PASCA SEKSIO SESAREA
PADA NY "P" DENGAN PASCA SEKSIO SESAREA 2 MINGGU
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 11 MEI 2024**

No. Register : 4634xx
Tanggal Kunjungan : 11 Mei 2024 Jam : 12.50 Wita
Tanggal Pengkajian : 11 Mei 2024 Jam : 13.00 Wita
Nama Pengkaji : Rezky Amelindah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny. "P" / Tn. "S"
Umur : 15 Tahun / 18 Tahun
Nikah/Lamanya : 1x / 1 Tahun
Suku : Makassar /Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
Alamat : Jl. Dangko Lr. 31

Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah bisa merawat bayinya dan melakukan aktivitas fisik yang ringan

2. Ibu selalu rutin menyusukan bayinya secara bergantian di kedua payudaranya
3. Ibu mengatakan rutin melakukan pumping agar payudaranya tidak sakit
4. Ibu mengatakan darah yang keluar hanya bercak-bercak
5. Ibu mengatakan selalu menjaga kebersihan dirinya dengan mengganti pembalutnya setiap 2 jam
6. Ibu mengatakan tidak ada masalah untuk BAB dan BAK

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi wajah ibu tampak ceria
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah : 100/70 mmhg

Nadi : 82x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernapasan : 20x/menit

5. Tinggi fundus uteri tidak teraba
6. Luka bekas operasi seksio sesarea tampak kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi
7. Pengeluaran lochia alba dengan warna putih dan tidak berbau

Assesment (A)

Ny. "P", P1A0 Pasca Seksio Sesarea 2 Minggu Postpartum

Planning (P)

Tanggal 11 Mei 2024

Pukul 13.00 Wita

1. Memberikan support kepada ibu agar selalu semangat menjalani peran barunya sebagai seorang ibu

Hasil : Ibu merasa senang

2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah : 100/70 mmhg

Nadi : 82x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernapasan : 20x/menit

Hasil : Ibu mengerti

3. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu menjaga personal hygienennya

Hasil : Ibu selalu menjaga kebersihan personal hygiene

4. Memberikan dukungan kepada ibu untuk selalu semangat menyusukan bayinya dan tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan apapun itu hingga bayinya berusia 6 bulan

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan apapun kepada anaknya hingga berusia 6 bulan

5. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu mengkonsumsi makanan yang tinggi akan protein dan istirahat yang cukup

Hasil : Ibu selalu mengkonsumsi makanan seperti nasi, sayur bayam dan daun kelor, ikan, ayam serta buah-buahan. Biasanya ibu tidur siang \pm 1 jam dalam sehari dan tidur malam \pm 5-6 jam dalam sehari.

6. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kehangatan bayinya

Hasil : Ibu selalu menjaga kebersihan bayinya dengan cara mengganti pakaian bayinya jika sudah kotor dan selalu mengganti popok bayinya jika sudah full. Menjaga kehangatan bayinya dengan cara membedong dan memakaikan topi serta kaos tangan dan juga kaki.

7. Memberikan informasi kepada ibu tentang alat kontrasepsi dan jenis-jenis alat kontrasepsi yang akan digunakan

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia menggunakan KB implant secepatnya.

8. Memberikan informasi kepada ibu tentang baby blues

Hasil : Ibu mengerti tentang informasi baby blues

9. Memberikan informasi kepada ibu tentang kapan bisa mulai melakukan hubungan seksual yaitu apabila sudah tidak ada lagi darah yang keluar dan jika dimasukkan 2 jari atau lebih sudah tidak merasakan sakit

Hasil : Ibu mengerti

10. Mengingatkan kepada keluarga pasien untuk selalu membantu dan terlibat dalam merawat bayinya agar ibu tidak terlalu merasakan kelelahan hingga berujung stress

Hasil : Keluarga pasien selalu membantu dalam merawat bayinya.

11. Mengingatkan kepada ibu agar senantiasa berdoa dan membaca dzikir

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Hasil : Ibu selalu membaca doa dan berdzikir pada saat waktu senggang.

12. Memberitahu kepada ibu bahwa kunjungan nifas berikutnya dilakukan pada tanggal 22 Mei 2024

Hasil : Ibu mengerti dan dengan senang hati untuk bisa bertemu dikunjungi berikutnya.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PASCA SEKSIO SESAREA
PADA NY "P" DENGAN PASCA SEKSIO SESAREA 4 MINGGU
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 22 Mei 2024**

No. Register : 4634xx
Tanggal Kunjungan : 22 Mei 2024 Jam : 16.00 Wita
Tanggal Pengkajian : 22 Mei 2024 Jam : 16.10 Wita
Nama Pengkaji : Rezky Amelindah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny. "P" / Tn. "S"
Umur : 15 Tahun / 18 Tahun
Nikah/Lamanya : 1x / 1 Tahun
Suku : Makassar /Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
Alamat : Jl. Dangko Lr. 31

Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah menggunakan KB implant pada tanggal 20 Mei 2024

2. Ibu mengatakan anak pertamanya keluar dari Rumah Sakit pada tanggal 15 Mei 2024
3. Ibu sudah bisa merawat bayi kembarnya dan melakukan aktivitas fisik secara ringan.
4. Ibu mengatakan rutin melakukan pumping agar payudaranya tidak sakit.
5. Ibu mengatakan anaknya mendapatkan ASI Eksklusif

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
 2. Kesadaran composmentis
 3. Ekspresi wajah ibu tampak ceria
 4. Tanda-tanda vital dalam batas normal
- Tekanan darah : 110/70 mmhg
- Nadi : 83x/menit
- Suhu : 36,7°C
- Pernapasan : 22x/menit
5. Tinggi fundus uteri tidak teraba
 6. Pengeluaran lochia alba dengan warna putih dan tidak berbau

Assesment (A)

Ny. "P", P1A0 Pasca Seksio Sesarea 4 Minggu Postpartum

Planning (P)

Tanggal 22 Mei 2024

Pukul 16.10 Wita

1. Memberikan support kepada ibu agar selalu semangat dalam menjalani peran barunya sebagai seorang ibu

Hasil : Ibu tampak bahagia dan merasa senang

2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah : 110/70 mmhg

Nadi : 83x/menit

Suhu : 36,7°C

Pernapasan : 22x/menit

Hasil : Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaannya

3. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan personal hygiene

Hasil : Ibu selalu menjaga kebersihan hygienenya

4. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menyusukan anaknya di kedua payudara secara *on demand*

Hasil : Ibu selalu rutin memberikan ASI kepada anaknya

5. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup.

Hasil : Ibu selalu rutin mengkonsumsi makanan seperti nasi, sayur kelor dan bayam, ayam, ikan serta buah apel. Setelah anak pertamanya keluar

dari rumah sakit, ibu sudah jarang tidur siang dan tidur malam \pm 5-6 jam dalam sehari.

6. Mengingatkan kepada keluarga pasien agar senantiasa membantu ibu dalam merawat kedua anaknya

Hasil : Keluarga pasien selalu membantu dalam merawat kedua anaknya

7. Mengingatkan kepada ibu agar senantiasa berdoa dan membaca dzikir

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Hasil : Ibu selalu membaca doa dan berdzikir pada saat waktu senggang.

8. Memberitahu kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan ulang pada tanggal 3 Juni 2024

Hasil : Ibu mengerti dan dengan senang hati untuk bisa bertemu dikunjungi berikutnya.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PASCA SEKSIO SESAREA
PADA NY "P" DENGAN PASCA SEKSIO SESAREA 6 MINGGU
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 3 JUNI 2024**

No. Register : 4634xx
Tanggal Kunjungan : 3 Juni 2024 Jam : 14.00 Wita
Tanggal Pengkajian : 3 Juni 2024 Jam : 14.05 Wita
Nama Pengkaji : Rezky Amelindah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny. "P" / Tn. "S"
Umur : 15 Tahun / 18 Tahun
Nikah/Lamanya : 1x / 1 Tahun
Suku : Makassar /Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
Alamat : Jl. Dangko Lr. 31

Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah mulai bisa melakukan aktivitas seperti biasa, akan tetapi menghindari aktivitas yang terlalu berat.

2. Ibu mengatakan tidak ada keluhan selama ber KB
3. Ibu mengatakan selalu menjaga kebersihan personal hygiene
4. Ibu mengatakan tidak ada masalah dalam pemberian ASI kepada anaknya

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran ibu composmentis
3. Ekspresi wajah ibu terlihat bahagia
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah : 110/80 mmhg

Nadi : 86x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernapasan : 23x/menit

Assesment (A)

Ny. "P", P1A0 Pasca Seksio Sesarea 6 Minggu Postpartum

Planning (P)

Tanggal 3 Juni 2024 Pukul 14.05 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa keadaan ibu baik dan tanda-tanda vitalnya dalam batas normal

Hasil :

Tekanan darah : 110/80 mmhg

Nadi : 86x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernapasan : 23x/menit

2. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan personal hygienennya

Hasil : Ibu selalu menjaga kebersihan personal hygienennya dengan mengganti pakaian dalam setiap kali basah atau lembab dan mandi 2x dalam sehari serta gosok gigi 2x dalam sehari.

3. Memberikan dukungan kepada ibu untuk selalu semangat dalam memberikan susu kepada kedua anaknya, serta tidak memberikan makanan tambahan apapun hingga bayi berusia 6 bulan.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia untuk tidak memberikan makanan tambahan apapun kepada bayinya hingga berusia 6 bulan.

4. Menganjurkan ibu untuk rutin mengganti pembalutnya setiap 2-4 jam atau ketika sudah merasakan penuh

Hasil : Ibu selalu mengganti pembalutnya setiap 2 jam atau setiap penuh

5. Mengkaji skala pengukuran postpartum blues secara sederhana

Hasil : Di ukur menggunakan skala pengukuran secara sederhana berada pada tingkat I

6. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap mengonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup agar kesehatan ibu tetap terjaga.

Hasil : Ibu selalu mengkonsumsi makanan yang tinggi akan protein. Tidur siang ± 2 jam dan tidur malam $\pm 6-7$ jam dalam sehari.

7. Mengingatkan kepada ibu agar senantiasa berdoa dan membaca dzikir

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Hasil : Ibu selalu membaca doa dan berdzikir pada saat waktu senggang.

8. Memberitahu kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan ulang pada tanggal 16 Juni 2024

Hasil : Ibu mengerti dan dengan senang hati untuk bisa bertemu dikunjungi berikutnya.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PASCA SEKSIO SESAREA
PADA NY "P" DENGAN PASCA SEKSIO SESAREA 8 MINGGU
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 16 JUNI 2024**

No. Register : 4634xx

Tanggal Kunjungan : 16 Juni 2024 Jam : 10.00 Wita

Tanggal Pengkajian : 16 Juni 2024 Jam : 10.05 Wita

Nama Pengkaji : Rezky Amelindah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny. "P" / Tn. "S"

Umur : 15 Tahun / 18 Tahun

Nikah/Lamanya : 1x / 1 Tahun

Suku : Makassar /Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Dangko Lr. 31

Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari, akan tetapi masih menghindari aktivitas yang terlalu berat

2. Ibu rutin menyusukan anaknya secara *on demand* dikedua payudara
3. Ibu mengatakan rutin melakukan pumping jika merasakan payudaranya terasa penuh
4. Ibu selalu rutin menjaga kebersihan personal hygienennya
5. Ibu mengatakan sudah tidak ada keluhan

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi wajah ibu tampak bahagia
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah :100/70 mmHg

Nadi : 82x/menit

Suhu : 36,6°C

Pernapasan : 22x/menit

Assesment (A)

Ny. "P", P1A0 Pasca Seksio Sesarea 8 Minggu Postpartum

Planning (P)

Tanggal 16 Juni 2024 Pukul : 10.05 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu

Tekanan darah : 100/70 mmHg

Nadi : 82x/menit

Suhu : 36,6°C

Pernapasan : 22x/menit

2. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan personal hygienennya

Hasil : Ibu selalu menjaga kebersihan personal hygienennya dengan baik

3. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu semangat dalam menyusukan kedua anaknya secara on demand dikedua payudara, serta tidak memberikan makanan tambahan apapun hingga bayi berusia 6 bulan.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia untuk tidak memberikan makanan tambahan apapun kepada bayinya hingga berusia 6 bulan.

4. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup

Hasil : Ibu selalu mengkonsumsi makanan yang tinggi bergizi. Tidur siang ±2 jam dan tidur malam ±6-7 jam dalam sehari.

5. Mengingatkan kepada ibu agar senantiasa berdoa dan membaca dzikir

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Hasil : Ibu selalu membaca doa dan berdzikir pada saat waktu senggang.

Tabel 3.1
Kunjungan Masa Nifas

Kunjungan	Tanggal	Waktu	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
I	4/05/2024 20.10 Wita Di Rumah Pasien	I minggu pasca seksio searea	<p>Data Subjektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu sudah tidak merasakan nyeri Mengatakan ASI-nya keluar sejak 3 hari setelah pasca seksio sesarea Mengatakan tali pusat bayinya sudah mulai kering dan terlepas Ibu sudah bergerak dan berjalan sendiri serta melakukan aktivitas ringan lainnya. <p>Data Objektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> Keadaan umum ibu baik Kesadaran composmentis Ekspresi wajah tampak Bahagia TTV dalam batas normal TFU pertengahan antara pusat dan simfisis Tampak luka bekas operasi seksio sesarea masih terbaluti kasa steril Pengeluaran lokia serosa berwarna kuning kecoklatan dan tidak berbau 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan dan support kepada ibu Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menyusukan bayinya secara <i>on demand</i> Mengingatkan kepada ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga personal hygiene dan istirahat yang cukup Memberikan dukungan kepada ibu untuk semangat menyusukan bayinya dan tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan apapun kepada bayinya hingga berusia 6 bulan Mengingatkan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir Mengingatkan kepada ibu agar senantiasa berdoa dan membaca dzikir "<i>Astaghfirullaahal'adziim, alladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaiih</i>" Memberitahu kepada ibu jadwal kunjungan nifas berikutnya 	<ol style="list-style-type: none"> Ibu merasa senang dan bersemangat Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaannya Ibu tetap menyusukan anaknya secara <i>on demand</i> Ibu istirahat dengan cukup dan tidak melakukan aktivitas berat Ibu mengetahui tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir

II	11/05/2024 13.00 Wita Di Rumah Pasien	2 minggu pasca seksio sesarea	<p>Data Subjektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu sudah bisa merawat bayinya dan melakukan aktivitas fisik yang ringan 2. Ibu rutin melakukan pumping agar payudaranya tidak sakit 3. Ibu rutin menyusukan kedua bayinya secara <i>on demand</i> di kedua payudara 4. Mengatakan darah yang keluar hanya bercak-bercak 5. Mengatakan tidak ada masalah BAB dan BAK <p>Data Objektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum ibu baik 2. Kesadaran composments 3. TTV dalam batas normal 4. TFU tidak teraba 5. Pengeluaran lokia alba dan tidak berbau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan support kepada ibu agar selalu semangat dalam menjalani peran barunya 2. Menyampaikan hasil pemeriksaan keadaan ibu 3. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu menjaga personal hygiene 4. Memberikan dukungan kepada ibu untuk selalu semangat dalam menyusukan bayinya dan tidak memberikan susu formula atau MPASI hingga berusia 6 bulan 5. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu mengkonsumsi makanan yang tinggi akan protein dan istirahat yang cukup 6. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu menjaga kebersihan dan kehangatan bayinya 7. Memberikan informasi kepada ibu tentang alat kontrasepsi dan jenis-jenisnya 8. Memberikan informasi kepada ibu tentang baby blues 9. Memberikan informasi kepada ibu tentang kapan bisa melakukan hubungan seksual 10. Mengingatkan kepada ibu agar senantiasa berdoa dan membaca dzikir "<i>Astaghfirullaahal'adziim, alladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu wa atuubu ilaiih</i>" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaannya 2. Ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan 3. Ibu selalu istirahat dengan cukup dan tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat 4. Ibu selalu rutin menyusukan bayinya secara <i>on demand</i>
----	---	--	---	---	--

III	22/05/2024 16.10 Wita	4 minggu pasca seksio sesarea	<p>Data Subjektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatakan sudah menggunakan KB implant 2. Mengatakan anak pertamanya keluar dari RS pada tanggal 15 Mei 2024 3. Ibu sudah bisa merawat bayi kembarnya dan melakukan aktivitas fisik secara ringan 4. Ibu rutin melakukan pumping agar payudaranya tidak sakit 5. Mengatakan anaknya Full ASI Eksklusif <p>Data Objektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum ibu baik 2. Kesadaran composmentis 3. Ekspresi wajah ibu tampak ceria 4. TTV dalam batas normal 5. TFU tidak teraba 6. Pengeluaran lokia alba dengan warna putih dan tidak berbau. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan support kepada ibu agar selalu semangat dalam menjalani peran barunya sebagai ibu 2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa keadaan ibu baik dan TTV dalam batas normal 3. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan personal hygiene dan istirahat yang cukup 4. Mengingatkan kepada ibu tetap menyusukan anaknya yang kedua di payudara secara <i>on demand</i> 5. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi 6. Mengingatkan kepada keluarga pasien agar senantiasa membantu ibu dalam merawat kedua anaknya 7. Mengingatkan kepada ibu agar senantiasa berdoa dan membaca dzikir "<i>Astaghfirullaahal'adziim, alladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu wa atuubu ilaiih</i>" 8. Memberitahu kepada ibu jadwal kunjungan berikutnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu sudah menggunakan KB impant 2. Ibu mengetahui hasil pemeriksaannya dalam batas normal 3. Ibu mengerti dan berdia melakukan apa yang telah dianjurkan 4. Ibu selalu semangat dalam meawat anaknya 5. Ibu selalu rutin membaca dzikir yang telah diberikan
-----	--------------------------	--	---	--	---

IV	3/06/2024 14.05 Wita Di Rumah Pasien	6 minggu pasca seksio sesarea	<p>Data Subjektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa akan tetapi menghindari aktivitas yang terlalu berat 2. Mengatakan tidak ada keluhan selama ber KB 3. Mengatakan selalu menjaga kebersihan personal hygiene 4. Mengatakan tidak ada masalah dalam pemberian ASI kepada anaknya 5. Ibu mengatakan telah mendapatkan setelah pasca melahirkan <p>Data Objektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum ibu baik 2. Kesadaran composmentis 3. Ekspresi wajah ibu terlihat bahagia 4. TTV dalam batas normal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu 2. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan personal hygiene dan istirahat yang cukup 3. Menganjurkan ibu untuk rutin mengganti pembalut setiap 2-4 jam atau ketika sudah full 4. Memberikan dukungan kepada ibu untuk selalu semangat dalam memberikan susu kepada kedua anaknya serta tidak memberikan makanan tambahan apapun hingga bayi berusia 6 bulan 5. Mengkaji skala pengukuran postpartum blues secara sederhana 6. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi 7. Mengingatkan kepada ibu agar senantiasa berdoa dan membaca dzikir "<i>Astaghfirullaahal'adziim, alladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu wa atuubu ilaiih</i>" 8. Memberitahu kepada ibu jadwal kunjungan berikutnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaannya 2. Ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan 3. Ibu selalu semangat dalam merawat kedua anaknya 4. Skala pengukuran postpartum blues berada pada tingkat I 5. Ibu selalu mengkomsumsi makanan yang tinggi akan protein dan istirahat yang cukup 6. Ibu selalu menjaga kebersihan personal hygiennya 7. Ibu selalu berdoa dan membaca dzikir yang telah diberikan
----	--	--	---	---	--

V	16 Juni 2024 10.05 Wita Di Rumah Pasien	8 minggu pasca seksio sesarea	<p>Data Subjektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari, akan tetapi masih menghindari aktivitas yang terlalu berat 2. Ibu rutin menyusukan anaknya secara <i>on demand</i> dikedua payudara 3. Ibu selalu rutin menjaga kebersihan personal hygienennya 4. Ibu mengatakan sudah tidak ada keluhan <p>Data Objektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum ibu baik 2. Kesadaran composmentis 3. Ekspresi wajah ibu tampak bahagia 4. TTV dalam batas normal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu 2. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan personal hygiene. 3. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu semangat dalam menyusukan kedua bayinya secara <i>on demand</i> 4. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup 5. Mengingatkan kepada ibu untuk senantiasa berdzikir dan berdoa agar selalu diberikan Kesehatan untuk dirinya dan kedua anaknya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaannya bahwa keadaannya baik dan TTV dalam batas normal 2. Ibu selalu semangat dalam menyusuka kedua anaknya 3. Ibu selalu berdoa dan berdzikir
---	---	--	---	---	--

Sumber : Data Primer

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kesenjangan antara konsep kasus dan teori dasar pada implementasian asuhan kebidanan pada Ny. "P" dengan nyeri luka jahitan pasca seksio sesarea di RS Bhayangkara Makassar tanggal 28 April- 16 Juni 2024.

Untuk memudahkan dan menguraikan kesenjangan antara teori dan studi kasus, maka penulis menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari 7 langkah varney dan soap sebagai berikut:

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Pada Langkah ini, kita harus mengumpulkan data atau semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi ibu. Untuk memperoleh data bisa kita lakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan penunjang.

Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang penulis temukan pada kasus Ny. "P" umur 15 tahun P₁A₀ pasca seksio sesarea 2 jam lalu di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada tanggal 28 April 2024 dengan riwayat pasca seksio sesarea. Ibu mengatakan mulai merasakan nyeri pada luka bekas jahitan seksio sesarea, sifat nyeri yang dirasakan menetap pada

abdomen diatas simfisis dengan luka bekas operasi seksio sesarea secara melintang, ibu juga merasakan pusing ketika membuka mata dan ingin mual ketika diajak berbicara terlalu lama.

Ibu mengatakan ini kehamilan pertama dan tidak pernah mengalami keguguran. Ibu tidak pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, asma, diabetes melitus dan penyakit serius lainnya. Ibu juga tidak pernah menderita penyakit hepatitis, TBC, HIV/AIDS atau penyakit menular lainnya. Ibu tidak memiliki Riwayat penyakit turunan dalam keluarga. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit kelamin. Ibu tidak pernah memiliki riwayat ketergantungan obat-obatan, alkohol serta tidak ada riwayat alergi. Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB sebelumnya dan sekarang ibu memakai KB Implant.

Berdasarkan data yang diambil dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, jumlah ibu nifas pasca seksio sesarea pada tahun 2021 sebanyak 237 kasus, Tahun 2022 sebanyak 586 kasus dan Tahun 2023 terhitung mulai januari- juni sebanyak 361 kasus.

Pada kunjungan pertama yang dilakukan di RS Bhayangkara Makassar didapatkan hasil pemeriksaan, ibu mengalami keluhan nyeri pada luka bekas operasi seksio sesarea, nyeri yang dirasakan menetap pada abdomen diatas simfisis dengan luka bekas operasi secara melintang, merasakan pusing Ketika sedang membuka mata, ingin mual ketika diajak berbicara terlalu lama, keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tampak ekspresi wajah ibu meringis ketika bergerak, tampak luka bekas operasi seksio sesarea secara

melintang yang dibaluti menggunakan kasa steril, terpasang keteter tetap dan masih menggunakan popok, hasil pemeriksaan laboratorium 2 jam pasca seksio sesarea tanggal 28 April 2024 yaitu Hb : 10.0 gr/dl. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi : 83x/menit, Suhu : 36,5°C dan Pernapasan : 21x/menit. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras. Pengeluaran lochia rubra dan tidak berbau.

Pada kunjungan kedua di RS Bhayangkara Makassar didapatkan hasil pemeriksaan dengan keluhan nyeri pada luka bekas operasi seksio sesarea saat bergerak, merasakan mual jika diajak berbicara terlalu lama, ibu mengatakan ASI-nya belum keluar. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tampak ekspresi ibu meringis bila bergerak. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan Darah : 100/80 mmHg, Nadi : 81x/menit, Suhu : 36,5°C dan pernapasan : 20x/menit. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus teraba bundar dan keras. Pengeluaran lochia rubra dan tidak berbau.

Pada kunjungan ketiga di RS Bhayangkara Makassar didapatkan hasil pemeriksaan dengan keluhan masih merasakan nyeri pada saat ingin bangun atau berdiri, infusnya telah dibuka setelah 24 jam pasca seksio sesarea, ibu mengatakan ASI-nya belum keluar, ibu mengatakan masih melekat obat *durogesic patch* pada bagian dadanya, mengatakan sudah membersihkan dirinya pagi ini, ibu belum BAB semenjak operasi, ibu mengatakan telah

diberikan terapi obat melalui anusya. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tampak ekspresi ibu tersenyum akan tetapi masih terlihat menahan nyeri, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan Darah : 110/80 mmHg, Nadi : 80x/menit, Suhu : 36,6⁰C dan Pernapasan : 20x/menit. Tampak *durogesic patch* bersih dan kering yang masih melekat pada dada sebelah kiri, belum ada pengeluaran ASI, TFU 3 jari dibawah pusat, kontraksi uterus teraba bundar dan keras. Pengeluaran lokia rubra dan tidak berbau.

Pada kunjungan keempat dirumah pasien, ibu sudah tidak merasakan nyeri, mengatakan ASInya sudah mulai lancar keluar sejak 3 hari setelah pasca seksio sesarea, ibu mengatakan mengkonsumsi vitamin pelancar ASI, ibu mengatakan tali pusat bayinya sudah mulai kering dan terlepas, ibu sudah bergerak dan berjalan dengan sendirinya serta melakukan aktivitas ringan. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, ekspresi wajah ibu tampak bahagia, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah : 110/80 mmHg, Nadi : 81x/menit, Suhu : 36,5⁰C dan Pernapasan : 20x/menit. Tinggi fundus uteri yaitu pertengahan antara pusat dan simfisis, tampak luka bekas operasi seksio sesarea masih terbaluti kasa steril dan pengeluaran lokia serosa dengan warna kuning kecoklatan dan tidak berbau.

Pada kunjungan kelima dirumah pasien, ibu sudah bisa merawat bayinya dan melakukan aktivitas fisik yang ringan, ibu selalu rutin melakukan pumping agar payudaranya tidak sakit, ibu mengatakan rutin menyusukan bayinya secara bergantian dikedua payudara, mengatakan darah yang keluar

hanya bercak-bercak dan ibu mengatakan selalu menjaga kebersihan dirinya dengan mengganti pembalutnya setiap 2 jam serta mengatakan tidak ada masalah dalam BAB dan BAK. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, ekspresi wajah ibu tampak ceria, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah : 100/70 mmHg, Nadi : 82x/menit, Suhu : 36,5°C dan Pernapasan : 20x/menit, Tinggi fundus uteri tidak teraba, luka bekas operasi seksio sesarea tampak kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Pengeluaran lochia alba dengan warna putih dan tidak berbau.

Kunjungan keenam dirumah pasien, ibu mengatakan sudah menggunakan KB implant pada tanggal 20 Mei 2024, mengatakan anak pertamanya keluar dari rumah sakit pada tanggal 15 Mei 2024, ibu sudah bisa merawat bayi kembarnya dan melakukan aktivitas fisik secara ringan, ibu mengatakan bisa merawat bayi kembarnya dan melakukan aktivitas fisik secara ringan, mengatakan rutin melakukan pumping agar payudaranya tidak sakit dan mengatakan anaknya mendapatkan ASI Eksklusif. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, ekspresi wajah ibu tampak ceria, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah : 110/70 mmHg, Nadi : 83x/menit, Suhu : 36,7°C dan Pernapasan ; 22x/menit. Tinggi fundus uteri tidak teraba dan ada pengeluaran lochia alba dengan warna putih dan tidak berbau.

Kunjungan ketujuh dirumah pasien, ibu mengatakan mulai bisa melakukan aktivitas seperti biasa, akan tetapi masih menghindari aktivitas

terlalu berat, mengatakan tidak ada keluhan selama ber KB, ibu mengatakan selalu menjaga kebersihan personal hygienennya, mengatakan tidak ada masalah dalam pemberian ASI kepada anaknya, ibu mengatakan telah mendapatkan haid setelah pasca melahirkan. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, ekspresi wajah ibu terlihat bahagia, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah : 110/80 mmHg, Nadi : 86x/menit, Suhu : 36,5⁰C dan Pernapasan ; 23x/menit.

Kunjungan kedelapan dirumah pasien, ibu sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari akan tetapi masih menghindari aktivitas yang terlalu berat, ibu selalu rutin menyusukan anaknya secara *on demand* dikedua payudara, ibu mengatakan rutin melakukan pumping jika merasakan payudaranya terasa penuh, ibu selalu menjaga kebersihan personal hygienennya dan mengatakan sudah tidak ada keluhan. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, eskpresi wajah ibu tampak bahagia, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah ; 100/70 mmHg, Nadi ; 82x/menit, Suhu : 36,6⁰C dan Pernapasan : 22x/menit.

Berdasarkan hasil uraian yang dijelaskan, ada persamaan antara teori dan gejala serta keluhan yang dirasakan pasien pada kasus tersebut, penulis tidak menemukan hambatan apapun karena saat pengumpulan data pasien, bidan dan dokter yang ada di RS Bhayangkara Makassar bersedia memberikan data atau informasi yang ada hubungannya dengan asuhan yang telah

diberikan kepada ibu. Hal inilah yang memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan menyusun data.

Dalam konsep dasar yang telah dipaparkan, ditemukan pada studi kasus secara garis besar tidak ada kesenjangan.

Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Berdasarkan konsep dan teori dalam penegakkan suatu diagnosa/masalah kebidanan harus berdasarkan pada pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data subjektif dan data objektif.

Diagnosa aktual yang diidentifikasi pada Ny. "P" P₁A₀ dengan pasca seksio sesarea 2 jam postpartum.

Berdasarkan data yang diperoleh masalah aktualnya adalah ibu dengan nyeri pada luka bekas operasi dimana penegakkan diagnosa diperoleh dari data subjektif ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi seksio sesarea, nyeri semakin dirasakan ibu saat bergerak, akan tetapi ibu sudah bisa menggerakkan tungkai bawahnya. Diperoleh dari data objektif yaitu ekspresi wajah tampak meringis, luka bekas operasi seksio sesarea dibaluti menggunakan kasa steril, juga didapatkan dari hasil mengukur nyeri yang dirasakan dengan visual analogue ialah berada pada tingkat 3 yaitu nyeri sedang.

Pada kasus Ny. "P" data yang diperoleh salah satu faktor adanya nyeri karena rangsangan pada ujung-ujung saraf di permukaan kulit. Terjadi juga kerusakan jaringan secara aktual dan potensial. Intensitas dan Kesimpulan tingkat nyeri begitu penting karena hal ini akan menjadi penentu jenis pengobatan yang akan diberikan terutama pada pemberian terapi farmakologis.

Nyeri menurut *International Association For The Study Of Pain (IASP)* ialah suatu pengalaman emosional dan juga sensorik yang berhubungan dengan kerusakan jaringan secara aktual dan potensial. Konsep lama menjelaskan bahwa proses nyeri hanya bergantung pada jalur dan intensitas nyeri yang timbul hanya dipengaruhi dengan besarnya stimulus yang didapatkan (Nunung, 2020).

Tindakan pasca seksio sesarea meninggalkan sayatan pada kulit abdomen yang menyebabkan terputusnya jaringan yang telah di insisi. Hal tersebut yang mengakibatkan timbulnya zat kimia, kemudian dibawa oleh serabut delta A dan C yang mempunyai peran membawa transmisi nyeri dari medulla spinalis menuju thalamus. Otak akan mempersepsikan nyeri yang membuat pasien merasakan nyeri pada daerah insisi saat efek anestesi sudah hilang (Nunung, 2020).

Berdasarkan data yang terkumpul dari pengkajian yang telah dilakukan ada persamaan dalam diagnose aktual yaitu ibu merasakan nyeri pada luka bekas operasi seksio sesarea. Hal penguat penegakkan diagnosa ibu

merasakan nyeri yaitu ekspresi wajah ibu yang meringis dan adanya luka bekas jahitan seksio sesarea yang menjadi tanda akan adanya jaringan sebelumnya terikat menjadi putus. Berdasarkan data tersebut ditarik benang merah bahwa terdapat persamaan antara teori dan tidak ada kesenjangan dengan diagnosa aktual yang ditegakkan sehingga memudahkan perumusan tindakan selanjutnya.

Langkah III. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Dalam menegakkan masalah potensial, bidan diharuskan melakukan identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Dilangkah ini penulis mengidentifikasi diagnosa potensial atau masalah potensial. Langkah ini bidan dituntut agar bisa mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial yang mungkin saja terjadi, akan tetapi juga menyiapkan tindakan untuk mengantisipasi atau menangani agar masalah potensial tidak terjadi.

Masalah potensial yang mungkin terjadi pada kasus ibu nifas dengan nyeri luka jahitan pasca seksio sesarea ialah infeksi luka jahitan, sub involusio uteri, infeksi saluran kemih, dan terbukanya luka operasi.

Kulit ialah bagian yang bisa menjaga tubuh dari adanya kuman. Jaringan kulit adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kulit, jika jaringan pada kulit mengalami kerusakan maka memungkinkan atau memberikan jalan untuk kuman masuk ke dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan terjadinya infeksi (Nunung, 2020).

Infeksi saluran kemih bisa terjadi pada pasien dengan pasca seksio sesarea, terutama pada ibu yang sedang menggunakan kateter. Ibu mengalami demam dan merasakan nyeri saat ingin buang air kecil, hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan melalui kateter mengandung leukosit didalamnya. Hal inilah dapat disimpulkan setelah melihat adanya peningkatan leukosit esterase (Nunung, 2020) .

Jahitan pada luka bekas operasi seksio sesarea bisa terbuka karena adanya beberapa faktor diantaranya yaitu luka jahitan tidak dijahit dengan sempurna, distensi perut, batuk dan muntah keras serta bisa berujung pada infeksi (Nunung, 2020).

Jika nyeri luka jahitan pasca seksio sesarea tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah potensial yang terjadi yaitu infeksi luka jahitan.

Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi/Rujukan

Adanya tindakan kolaborasi yang dilakukan dengan dokter spesialis obgyn dalam pemberian terapi obat farmakologi. Pada langkah ini bidan akan mengidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn atau dokter umum dan ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi pasien.

Tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera dan rujukan pada Ny. "P" dengan pasca seksio sesarea.

Langkah V. Rencana Tindakan

Perencanaan

Penatalaksanaan awal yang dilakukan yaitu mengukur tingkat nyeri yang sedang dirasakan ibu, kemudian menyusun tindakan untuk menangani atau mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan. menganjurkan kepada ibu untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan melakukan mobilisasi dini yang dimulai dengan menggerakkan tungkai bawahnya, menganjurkan ibu untuk selalu makan makanan yang tinggi akan protein seperti buah (strawberry, anggur dan jeruk), sayuran hijau seperti bayam dan daun kelor, kacang-kacangan, ikan dan juga daging untuk membantu proses penyembuhan luka, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter dan selalu membaca dzikir agar hati ibu lebih tenang.

Pada kunjungan pertama yang diberikan pada Ny. "P" di RS Bhayangkara Makassar ialah ucapkan salam dan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya dan menciptakan hubungan yang baik dengan ibu. Observasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, kaji tingkatan nyeri yang dirasakan ekspresi wajah ibu tampak meringis, beritahu ibu cara mengurangi nyeri ringan dengan melakukan teknik relaksasi nafas dalam, observasi TFU, kontraksi uterus dan pengeluaran lochia, observasi cairan infus *Dextrose* secara *Intravena* yang dicampur dengan 2 ampul *Oxytosin*, observasi pengeluaran urine dan anjurkan ibu untuk senantiasa berdoa dan membaca dzikir.

Pemantauan harus tetap dilakukan pada Ny. "P" untuk memastikan konseling dan terapi yang diberikan benar dan sesuai dengan anjuran dokter atau bidan.

Pada kunjungan kedua di RS Bhayangkara Makassar menyusun tindakan yang akan dilakukan pada Ny."P" yaitu observasi tanda-tanda vital, kaji tingkatan nyeri ekspresi wajah ibu tampak meringis, jelaskan kepada ibu tentang penyebab nyeri, beritahu kepada ibu kandungan obat *durogesic patch* dan anjurkan untuk menjaga obat *durogesic patch* agar tetap bersih dan kering, anjurkan ibu untuk senantiasa melakukan mobilisasi dini dengan miring kiri/kanan, jelaskan kepada ibu manfaat melakukan mobilisasi dini, anjurkan kepada ibu untuk minum air putih sedikit demi sedikit jika merasa tidak mual, ingatkan kepada ibu untuk makan-makanan yang tinggi akan protein seperti buah (strawbery, anggur dan jeruk), sayuran hijau seperti (bayam, dan daun kelor), kacang-kacangan dan ikan gabus untuk membantu proses penyembuhan luka, anjurkan kepada ibu untuk menyusukan kedua bayinya secara *on demand* dikedua payudara, jelaskan kepada ibu bahwa hari pertama sampai hari ketiga biasanya ASI belum keluar, jelaskan kepada ibu penyebab keluarnya darah dari jalan lahir, jelaskan kepada ibu pentingnya menjaga *personal hygiene*, observasi pemberian cairan infus dextrose yang dicampur 2 ampul *oxytosin*, berikan obat *Nazovel* 100 mg melalui rectum untuk mengatasi nyeri, lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn dalam pemberian terapi obat farmakologi, jelaskan kepada ibu manfaat obat

yang telah diresepkan dan jadwal mengkonsumsi obat tersebut, berikan support kepada ibu untuk tetap semangat dalam menjalani peran barunya sebagai ibu, anjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dan ingatkan kepada ibu agar senantiasa membaca doa dan berdzikir

Pada kunjungan ketiga di RS Bhayangkara Makassar, menyusun tindakan yang akan dilakukan yaitu observasi keadaan umum dan tanda-tanda vital ibu, kaji tingkatan nyeri ekspresi wajah tersenyum akan tetapi masih terlihat menahan nyeri, beritahu kepada ibu jika masih merasakan nyeri maka lakukan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan, anjurkan kepada ibu untuk senantiasa melakukan mobilisasi dini dengan membiasakan berjalan dengan sendirinya, ingatkan kepada ibu untuk makan-makanan yang tinggi akan protein untuk membantu proses penyembuhan luka, anjurkan kepada ibu untuk menyusukan bayinya secara *on demand* di kedua payudaranya, ajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara, jelaskan kepada ibu tentang pentingnya menjaga personal hygiene, ingatkan kepada ibu jadwal mengkonsumsi obat yang telah diberikan, ingatkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup, beritahu kepada ibu tentang perawatan bayi, beritahu kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, anjurkan kepada suami atau keluarga untuk selalu membantu ibu dalam merawat bayinya agar tidak terlalu kecapean, ingatkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir dan beritahu kepada ibu bahwa kunjungan nifas selanjutnya dilakukan pada tanggal 4 Mei 2024.

Pada kunjungan keempat di rumah pasien, menyusun tindakan yang akan dilakukan yaitu berikan dukungan dan support kepada ibu agar tetap semangat dalam menjalani peran barunya sebagai ibu, sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga, anjurkan kepada ibu untuk tetap menyusukan bayinya secara *on demand* di kedua payudara, ingatkan kepada ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara, berikan memberikan susu formula atau makanan tambahan apapun hingga bayi berusia 6 bulan, ingatkan kepada ibu untuk selalu menjaga kebersihan personal hygiene dan istirahat yang cukup, ingatkan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, ingatkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa dan membaca dzikir dan beritahu kepada ibu jadwal kunjungan nifas berikutnya tanggal 11 Mei 2024.

Pada kunjungan kelima di rumah pasien, menyusun tindakan yaitu berikan support kepada ibu, sampaikan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital ibu, ingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan personal hygiene, berikan dukungan kepada ibu untuk selalu semangat menyusukan bayinya, ingatkan kepada ibu untuk selalu mengkonsumsi makanan yang tinggi akan protein dan istirahat yang cukup, ingatkan kepada ibu untuk selalu menjaga kehangatan bayinya, berikan informasi kepada ibu tentang alat kontrasepsi dan baby blues, berikan informasi kepada ibu tentang kapan bisa melakukan hubungan seksual, ingatkan kepada keluarga untuk selalu membantu ibu

dalam merawat anaknya, ingatkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir, beritahu kepada ibu jadwal kunjungan nifas berikutnya.

Pada kunjungan keenam di rumah pasien, menyusun tindakan yaitu berikan support kepada ibu agar selalu semangat dalam menjalani peran barunya sebagai ibu, sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga, ingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan personal hygiene dan istirahat yang cukup, ingatkan kepada ibu untuk tetap menyusukan kedua bayinya secara *on demand* dikedua payudara, ingatkan kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang tinggi akan protein, ingatkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir, beritahu kepada ibu jadwal kunjungan nifas berikutnya tanggal 3 Juni 2024.

Pada kunjungan ketujuh di rumah pasien, menyusun tindakan yaitu sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu, ingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan personal hygiene dan istirahat yang cukup, berikan dukungan kepada ibu untuk selalu semangat dalam memberikan susu kepada anaknya serta tidak memberikan makanan tambahan apapun hingga bayi berusia 6 bulan, anjurkan kepada ibu untuk rutin mengganti pembalut setiap 2-4 jam atau ketika sudah full, kaji skala pengukuran postpartum blues secara sederhana, ingatkan kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, ingatkan untuk senantiasa berdoa dan membaca dzikir serta beritahu kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan nifas berikutnya pada tanggal 16 Juni 2024.

Pada kunjungan kedelapan di rumah pasien, menyusun tindakan yaitu sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu, ingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan personal hygienennya, ingatkan kepada ibu untuk selalu semangat dalam menyusukan kedua anaknya secara *on demand* di kedua payudara, ingatkan kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup serta senantiasa untuk berdoa dan berdzikir.

ERACS (*Enhanced Recovery After Caesarian Surgery*) ialah suatu program yang mempercepat proses pemulihan setelah seksio sesarea. Beberapa pusat persalinan yang menggunakan ERASCS memperlihatkan keunggulannya yaitu mengurangi rawat inap di rumah sakit, menurunkan insiden terjadinya komplikasi serta membantu pengembalian fungsional menjadi lebih cepat (Tika et al., 2022).

Dilihat dari data diatas, tidak ada kesenjangan antara teori dengan tinjauan umum manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lapangan.

Langkah VI. Implementasi

Pada langkah ini dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan luka jahitan seksio sesarea.

Berdasarkan anamnesa yang telah dilakukan pada Ny. "P" pada pemeriksaan di RS Bhayangkara Makassar diperoleh hasil pemeriksaan Keadaan umum ibu baik, Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi : 83x/menit, Suhu : 36,5⁰C dan Pernapasan :

21x/menit. Ekspresi wajah tampak meringis diukur menggunakan visual analogue nyeri berada pada tingkat 3, Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras. Pengeluaran lokia rubra dan tidak berbau, melakukan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri, tetesan cairan infus *Dextrose* 28 tpm, pengeluaran urine dalam *urine bag* yaitu ± 450 ml.

Pada kunjungan kedua di RS Bhayangkara Makassar didapatkan hasil pemeriksaan yaitu Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tampak ekspresi ibu meringis bila bergerak diukur menggunakan *visual analogue* nyeri berada pada tingkat 2. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan Darah : 100/80 mmHg, Nadi : 81x/menit, Suhu : 36,5°C dan pernapasan : 20x/menit. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus teraba bundar dan keras. Pengeluaran lokia rubra dan tidak berbau, minum air putih sedikit karena sudah tidak terlalu mual, Nazovel masuk melalui rectum untuk mengurangi nyeri, ibu bergerak miring kanan dan miring kiri juga mulai belajar duduk ditempat tidur, mengkonsumsi obat paracetamol 1, lactamam 1, dan ifalmin 1.

Pada kunjungan ketiga di RS Bhayangkara Makassar didapatkan hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan Darah : 110/80 mmHg, Nadi : 80x/menit, Suhu : 36,6°C dan Pernapasan : 20x/menit. Ekspresi wajah ibu tersenyum akan tetapi masih terlihat menahan nyeri diukur menggunakan visual analogue nyeri berada

pada tingkat I, TFU 3 jari dibawah pusat, kontraksi uterus teraba bundar dan keras. Pengeluaran lokia rubra dan tidak berbau, dilakukan perawatan payudara untuk merangsang kontraksi, ibu memakai pembalut, sudah bisa merawat bayinya, terlihat bahagia menjalani peran barunya sebagai ibu, suami dan keluarga membantu dalam merawat bayinya, senantiasa membaca doa dan dzikir yang telah dianjurkan.

Pada kunjungan keempat dirumah pasien, Keadaan umum ibu dan bayi baik, kesadaran composmentis, ekspresi wajah ibu tampak bahagia, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah : 110/80 mmHg, Nadi : 81x/menit, Suhu : 36,5⁰C dan Pernapasan : 20x/menit. Tinggi fundus uteri yaitu pertengahan antara pusat dan simfisis, tampak luka bekas operasi seksio sesarea masih terbaluti kasa steril dan pengeluaran lokia serosa dengan warna kuning kecoklatan dan tidak berbau. ibu terlihat semangat dalam merawat bayinya, tetap melakukan perawatan payudara, ibu rutin mengkonsumsi kacang-kacangan dan daun kelor untuk menambah produksi Asinya, ibu mendapatkan istirahat yang cukup, Alhamdulillah sejauh ini tidak ada tanda-tanda bahaya pada bayinya, suami dan keluarga membantu ibu dalam merawat bayinya, ibu selalu membaca doa dan berdzikir.

Pada kunjungan kelima dirumah pasien, ibu sudah bisa merawat bayinya dan melakukan aktivitas fisik yang ringan, ibu selalu rutin melakukan pumping agar payudaranya tidak sakit, ibu rutin menyusukan bayinya secara bergantian dikedua payudara, ibu selalu menjaga kebersihan dirinya dengan

mengganti pembalutnya setiap 2 jam, ibu tidak pernah memberikan susu formula atau makanan tambahan apapun, ibu selalu mengkonsumsi makanan seperti nasi, sayur bayam dan kelor, ikan serta buah-buahan. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, ekspresi wajah ibu tampak ceria, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah : 100/70 mmHg, Nadi : 82x/menit, Suhu : 36,5⁰C dan Pernapasan : 20x/menit, Tinggi fundus uteri tidak teraba, luka bekas operasi seksio sesarea tampak kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Pengeluaran lokia alba dengan warna putih dan tidak berbau. Ibu mengerti tentang informasi baby blues dan keluarga selalu membantu ibu dalam merawat bayinya, rutin membaca doa dan berdzikir.

Kunjungan keenam dirumah pasien, ibu bisa merawat bayi kembarnya dan melakukan aktivitas fisik secara ringan, ibu rutin melakukan pumping agar payudaranya tidak sakit, anaknya mendapatkan ASI Eksklusif, ibu selalu menjaga kebersihan personal hygienennya, selalu rutin mengkonsumsi sayur kelor, ayam. Ikan dan buah apel dan istirahat yang cukup. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, ekspresi wajah ibu tampak ceria, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah : 110/70 mmHg, Nadi : 83x/menit, Suhu : 36,7⁰C dan Pernapasan ; 22x/menit. Tinggi fundus uteri tidak teraba dan ada pengeluaran lokia alba dengan warna putih dan tidak berbau, keluarga selalu membantu dalam merawat bayinya dan senantiasa berdoa dan berdzikir.

Kunjungan ketujuh dirumah pasien, ibu mulai bisa melakukan aktivitas seperti biasa, akan tetapi masih menghindari aktivitas terlalu berat, ibu selalu menjaga kebersihan personal hygienennya, tidak ada masalah dalam pemberian ASI kepada anaknya, ibu telah mendapatkan haid setelah pasca melahirkan. setelah dilakukan pengukuran postpartum blues menggunakan skala pengukuran secara sederhana berada pada tingkat 0. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, ekspresi wajah ibu terlihat bahagia, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah : 110/80 mmHg, Nadi : 86x/menit, Suhu : 36,5°C dan Pernapasan : 23x/menit.

Kunjungan kedelapan dirumah pasien, ibu sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari akan tetapi masih menghindari aktivitas yang terlalu berat, ibu selalu rutin menyusukan anaknya secara *on demand* dikedua payudara, ibu selalu menjaga kebersihan personal hygienennya dan mengatakan sudah tidak ada keluhan. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, ekspresi wajah ibu tampak bahagia, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah ; 100/70 mmHg, Nadi ; 82x/menit, Suhu : 36,6°C dan Pernapasan : 22x/menit. Ibu selalu rutin membaca doa dan berdzikir kepada Allah SWT.

Pada kasus Ny "P" dengan nyeri luka jahitan pasca seksio sesarea, ditegakkan diagnosa berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik dan observasi. Perencanaan asuhan dan penatalaksanaan.

Langkah VII. Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan dan edukasi yang diberikan kepada ibu, pemenuhan kebutuhan sudah benar atau belum, apakah edukasi sudah jelas dan dimengerti. Perencanaan bisa dianggap efektif jika memang caranya benar dalam memberikan asuhan.

Pada langkah ini dilakukan evaluasi akan keefektifan dari asuhan yang telah diberikan kepada pasien, seperti pemenuhan kebutuhan terhadap bantuan apakah sudah tepat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang sudah diidentifikasi pada langkah sebelumnya di diagnosa dan masalah aktual/potensial. Perencanaan dinilai efektif atau berhasil jika dalam pemberian asuhan dilakukan dengan benar. Langkah-langkah dalam penatalaksanaan biasanya merupakan hasil dari pengkajian yang memberikan penjelasan terkait proses pemikiran yang dapat mempengaruhi tindakan juga berorientasi terhadap proses klinis sebab langkah dalam penatalaksanaan tersebut berlangsung di klinik dan keberhasilan bergantung pada klien dan situasi pada klinik.

Setelah memberikan asuhan, hasil evaluasi yang didapatkan pada pelaksanaan pemberian asuhan 28 April- 16 Juni 2024 ialah masa nifas yang berlangsung normal, dimana keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, tingkat nyeri yang dirasakan ibu berkurang setelah diberikan asuhan teknik relaksasi nafas dalam, melakukan mobilisasi dini, dan terapi farmakologi. Tidak ada tanda-

tanda infeksi pada luka pasca seksio sesarea dan proses involusio uteri berjalan dengan normal ditandai dengan pengeluaran lochia yang sesuai dan tidak berbau. Tetap menyusukan bayinya secara *on demand* dan tidak memberikan susu formula juga makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan, menghindari aktivitas berat, makan makanan yang bergizi untuk produksi ASI dan penyembuhan luka, kebersihan ibu dan bayi terjaga dengan baik, dan senantiasa berdoa, berdzikir, bersyukur dan selalu mengingat Allah SWT. Dengan demikian hasil asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny "P" berhasil dengan berkurang dan teratasi nyeri pasca seksio sesarea. Keluhan dan kebutuhan ibu teratasi, maka disimpulkan masa nifas berlangsung normal.

Kasus Ny "P" dilihat pada evaluasi terfokus yaitu penurunan tingkat nyeri yang dirasakan oleh ibu pasca seksio sesarea dengan pemberian asuhan teknik relaksasi nafas dalam dan melakukan mobilisasi dini serta terapi farmakologi, dan istirahat yang cukup membuat tingkatan nyeri pasca seksio sesarea yang dirasakan ibu berkurang dan teratasi.

Pendokumentasian

Pendokumentasian pada Ny "P" dimulai saat kunjungan pertama pasca seksio sesarea di RS Bhayangkara Makassar pada tanggal 28 April 2024. Telah dikumpulkan data secara subjektif dan objektif, sesuai dengan data yang merujuk pada dignosa pasien. Dari hasil diagnosa aktual dan potensial yang

ditegakkan, dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk pemberian terapi farmakologi baik itu secara oral, intravena, dan rectum.

Intervensi yang telah disusun berdasarkan kebutuhan kondisi pasien, kemudian di implementasikan sesuai urutannya. Intervensi mulai disusun saat kunjungan pertama, kunjungan kedua, hingga kunjungan kedelapan. Dimana terbagi 3 kali kunjungan di RS Bhayangkara Makassar dan 5 kali kunjungan berikutnya di rumah pasien. Intervensi yang diberikan dalam pencegahan terjadinya masalah potensial atau komplikasi ialah dengan memantau tanda-tanda vital, menangani nyeri yang dirasakan, menjaga kebersihan luka bekas operasi, kontraksi uterus serta pengeluaran lochia. Evaluasi dilakukan saat kunjungan pertama sampai kunjungan kedelapan, dengan menanyakan tingkatan nyeri, kondisi luka bekas seksio sesarea, dan pengeluaran lochia.

BAB V

PENUTUP

A . Kesimpulan

Berdasarkan asuhan kebidanan yang telah dilakukan dan pembahasan asuhan kebidanan pada Ny "P" dengan luka jahitan pasca seksio sesarea di RS Bhayangkara Makassar menggunakan metode 7 langkah Varney. Dimana diawali dengan pengumpulan data awal hingga evaluasi, penulis bisa membuat kesimpulan :

1. Pengkajian dilakukan dengan mengumpulkan semua data melalui anamnesa, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Data yang didapatkan pada data subjektif khususnya keluhan utama ialah ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi seksio sesarea hingga pemeriksaan terakhir ibu sudah tidak lagi merasakan nyeri. Data objektif yang didapatkan keadaan umum ibu baik, tampak ekspresi meringis, pengeluaran lochia rubra, pemeriksaan Hb yaitu 10 g/dl hingga pemeriksaan terakhir keadaan umum baik, ekspresi wajah tampak bahagia, tidak ada tanda-tanda infeksi luka jahitan dan pengeluaran lochia alba, pemeriksaan Hb yaitu 13 g/dl artinya kadar *hemoglobin* dalam batas normal.
2. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual telah diimplementasikan dengan mengumpulkan data subjektif dan objektif sehingga ditegakkan diagnosa kebidanan pada Ny "P" dengan pasca seksio sesarea

3. Identifikasi diagnosa / masalah potensial telah diimplementasikan pada Ny "P" dengan pasca seksio sesarea ialah infeksi luka jahitan, sub involusio uteri, infeksi saluran kemih, dan terbukanya luka operasi.
4. Tindakan segera / kolaborasi / rujukan telah diidentifikasi pada Ny "P" pasca seksio sesarea, tidak ada data yang menunjang.
5. Rencana tindakan yang telah disusun pada Ny "P" dengan pasca seksio sesarea berdasarkan identifikasi diagnosa / masalah aktual dan potensial yang bisa terjadi.
6. Implementasi yang telah dilakukan pada Ny "P" dengan pasca seksio sesarea semua rencana tindakan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.
7. Evaluasi pada Ny "P" dengan pasca seksio sesarea dengan asuhan yang telah diimplementasikan berhasil, dilihat dari tingkatan nyeri berkurang, tidak ada tanda-tanda infeksi luka jahitan dan involusio uteri baik.

B. Saran

1. Bidan

Bidan diharapkan dapat berperan dalam menurunkan angka kejadian seksio sesarea dengan memberikan dan memperhatikan keadaan ibu saat konseling antenatal care. Selain untuk mempersiapkan persalinan, juga memikirkan masalah yang mungkin akan terjadi. Menciptakan suasana konseling yang nyaman melalui komunikasi yang baik antara bidan, dokter maupun pasien.

2. Rumah Sakit

Pelayanan di RS Bhayangkara Makassar sangat baik dan memuaskan. Tetapi disarankan untuk memperhatikan pasien setelah operasi sampai 2 jam postpartum. Kadar nyeri yang mungkin di artikan sebagai hal wajar pada pasien pasca seksio sesarea akan menjadi komplikasi jika tidak dipantau dengan baik.

3. Institusi

Untuk Institusi Penulis berharap hasil penelitian ini bisa menjadi sumber referensi atau jembatan untuk mahasiswa lain mengetahui lebih jauh tentang pasca seksio sesarea, tingkatan nyeri dan juga penanganannya.

4. Pasien

Pasien diharapkan bisa lebih mencari tahu tentang pentingnya ASI eksklusif, makanan yang baik dan makanan yang harus dihindari pada kasus seksio sesarea, perawatan diri, perawatan pada bayi, dan terkhusus perawatan luka pasca seksio sesarea.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, R., Koeryaman, M. T., & DA, I. A. (2020). Gambaran Tingkat Cemas, Mobilisasi, Dan Nyeri Pada Ibu Poat Operasi Seksio Sesarea DI RSUD dr. Slamet Garut. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi*, 20(2), 223. <https://doi.org/10.36465/jkbth.v20i2.613>

Atikah, N., Andryani. A, Z. Y., & Setiawati, D. (2020). Manajemen Asuhan Kebidanan Masa Nifas Pada Ny "S" Dengan Nyeri Luka Jahitan Perineum Pada Tanggal 24 Juli-03 September 2019 Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun 2019. *Jurnal Midwifery*, 2(2), 78–84. <https://doi.org/10.24252/jm.v2i2a4>

Blues, B., Nifas, I., & Studi, I. (2023). *Baby Blues Syndrome in Postpartum Mothers and Islamic Perspective: A Qualitative Study in Gowa , Indonesia Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*. 4(1), 118–130. <https://doi.org/10.24252/diversity.v4i1.40634>

Dewi, S. (2020). *Fisio-Patologi Kehamilan, Persalinan Dan Kasih Sayang Universal*. Alauddin University Press.

Diarfah, A. dian. (2023). *Psikososial Kebidanan*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Hazaini, Y., Masthura, S., & Oktaviyana, C. (2022). Hubungan Konsumsi Makanan Pada Ibu Nifas Dengan Proses Penyembuhan Luka Post-Op Sectio Caesarea di RSUD Teungku Peukan Aceh Barat Daya The Correlation Between Food Consumption and Wound Healing Process Among Postpartum Mothers With Post-Op Section Caesare. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 8(2), 2615–109. <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/download/2310/1171>

Juliathi, N. L. P., Marhaeni, G. A., & Dwi Mahayati, N. M. (2020). Gambaran Persalinan dengan Sectio Caesarea di Instalasi Gawat Darurat Kebidanan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Kebidanan (The Journal Of Midwifery)*, 9(1), 19–27.

Kasmiati. (2023). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

Maharani, K., Qomariyah, Q., & Juwariyah, S. (2022). Pemberian Senam Postnatal Terhadap Pengeluaran Lochea Pada Ibu Post Partum. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 9(1), 13–17. <https://doi.org/10.48092/jik.v9i1.180>

Nunung, N. (2020). *Asuhan Kebidanan postpartum, dilengkapi dengan asuhan kebidanan post sectio caesarea*. PT Refika Aditama.

Purwanti, N. W. D., Astiti, N. K. E., Dewi, I. G. A. A. N., Sanjaya, I. N. H., Wirata, I. N., & Utarini, G. A. E. (2022). The inclination of psychological disorder of post

sectio caesarean based on characteristic. *JNKI (Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 10(3), 205. [https://doi.org/10.21927/jnki.2022.10\(3\).205-213](https://doi.org/10.21927/jnki.2022.10(3).205-213)

Saleha, S. (2009). *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Salemba Medika.

Saputri, E. M. (2020). Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada 6 jam s/d 6 hari. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 10(1), 29–37.

Saragih, E. P. (2023). Mobilisasi Dini, Asupan Nutrisi dan Personal Hygiene dan Hubungannya dengan Proses Penyembuhan Luka Post Operasi Sectio Caesarea. *SIMFISIS: Jurnal Kebidanan Indonesia*, 3(1), 526–533. <https://doi.org/10.53801/sjki.v3i1.171>

Setiyowati, D. A., & Maringga, E. G. (2022). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Post SC Dengan Nyeri Luka Jahitan Di Wilayah Kerja Rumah Sakit Amelia Kabupaten Kediri. *Jurnal Kebidanan Manna*, 51–56.

Tika, T. T., Sidharti, L., Himayani, R., & Rahmayani, F. (2022). Metode ERACS Sebagai Program Perioperatif Pasien Operasi Caesaragus. *Jurnal Medika Hutama*, 03(02), 2386–2391.

Wahyuningsih, H. puji. (2018). *Asuhan Kebidanan Nifas Dan Menyusui* (Cetakan pe). Kementerian kesehatan republik indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan di RS Bhayangkara Makassar
(Senin, 29 April 2024)



Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah
(Sabtu, 4 Mei 2024)



Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah
(Sabtu, 11 Mei 2024)



Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah
(Rabu, 22 Mei 2024)



Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah
(Senin, 3 Juni 2024)



Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah
(Minggu, 16 Juni 2024)



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
J.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepik/fkik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD"

No.D.021/KEPK/FKIK/IV/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Rezky Amelindah
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PASCA SEKSIO SESAREA DI RS
 BHAYANGKARA MAKASSAR"**

**"MANAGEMENT OF MIDWIFERY CARE POST CAESAREAN SECTION AT
 BHAYANGKARA HOSPITAL, MAKASSAR"**


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2025.

This declaration of ethics applies during the period April 16, 2024 until April 16, 2025.

April 16, 2024
 Professor and Chairperson,


 H. H. Ismail, S.Si., M.Si.



Lampiran 7 Keterangan Layanan Etik

(Selasa, 16 April 2024)


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 03273/Un.06/LP2M/PP.00.9/03/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Rezky Amelindah
 NIM : 70400121014
 Semester/T.A. : VI (Enam)/T.A. 2024-2025
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Kebidanan
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo, Kec. Romang Polong
 No. HP. : 085825226365

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Dengan judul Skripsi: **Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio Sesarea Di RS Bhayangkara Makassar**.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **RS Bhayangkara Makassar** dari tanggal **26/April/2024** sampai **7/Juni/2024**.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


 Samata, 18 April 2024
 Ketua
 Dr. Rosulih, S. Ag., M. Th. I.
 NIP. 197212311999032004

Lampiran 8 Rekomendasi Izin Penelitian LP2M

(Kamis, 18 April 2024)


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 9060/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala RS. Bhayangkara Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B.02732/Un.06/LP2M/PP.00.9/4/2024 tanggal 20 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: REZKY AMELINDAH	
Nomor Pokok	: 70400121014	
Program Studi	: Kebidanan	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)	
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 Romang, Polong-Gowa	

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" Manajemen Asuhan Kebidanan Pasca Seksio Sesarea Di RS Bhayangkara Makassar "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 April s.d 07 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 April 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**




ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Portingal*.

Lampiran 9 Izin Penelitian PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

(Sabtu, 20 April 2024)



Lampiran 10 Izin Penelitian di RS Bhayangkara Makassar

(Jumat, 26 April 2024)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Penulis**

Nama : Rezky Amelindah
Nim : 70400121014
Tempat/ Tanggal lahir : Bulukumba, 18 Desember 2003
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Samata
Nama Orang Tua
a. Ayah : Abd. Wahab Sunusi
b. Ibu : Hasmawati

B. Riwayat Pendidikan

TK Aisyiyah (2007-2009)
SD Negeri 136 Salobundang (2009-2015)
SMP Negeri 29 Bulukumba (2015-2018)
SMAN 3 Bulukumba (2018-2021)
UIN Alauddin Makassar (2021-Sekarang)