

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL PADA Ny "N" DENGAN
PREEKLAMPSIA RINGAN DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
TANGGAL 25 MEI-21 JULI TAHUN 2024**



RISALAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

NURFADILLAH ISTIQOMAH
NIM: 70400121028

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESAHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN RISALAH


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfadillah Istiqomah
NIM : 70400121028
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar, 13 Maret 2003
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Risalah ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain maka Risalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 15 Juni 2024
Dzulhijjah 1445 H

Penyusun



Nurfadillah Istiqomah
70400121028

PERSETUJUAN RISALAH

Nama : Nurfadillah Istiqomah

NIM : 70400121028


Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny "N" Dengan
Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tanggal 25
Mei S/D 21 Juli 2024.


Risalah ini telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Risalah Program
Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Firdayanti, S.SiL, M.Keb
NIP. 197511132006042001


Dr.Bd.Hj.Sitti Saleha S.SiL, SKM., M.keb
NIP. 197501262006042001

Diketahui oleh

Ketua Prodi Kebidanan



Anieq Mumthi'ah AlKautzar, S.ST, M.Keb
NIP. 19890116 201903 2009

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tanggal 25 Mei S/D 21 Juli 2024**”, yang disusun **NURFADILLAH ISTIQOMAH** Mahasiswa Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa 25 Juni 2024, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 25 Juli 2024
18 Dzulhijjah 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes
Sekertaris : Zelna Yuni Andryani A, S.ST., M.Keb
Pembimbing I : Firdayanti, S.Si.T., M.Keb
Pembimbing II : Dr. Bd. Hj. Sitti Saleha S.SiT., SKM., M.Keb
Penguji I : Dr. dr. Nadyah M.Kes
Penguji II : Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag



Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes
NIP. 198106212006040005

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tanggal 25 Mei S/D 21 Juli 2024”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, sang revolusioner sejati sang perombak peradaban yang menggulung tikar-tikar kemungkar dan membentangkan tikar-tikar ketauhidan.

Karya tulis ilmiah ini kami susun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan program studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Saya ingin menyatakan terimakasih yang sebesar besarnya kepada berbagai pihak yang berperan penting dalam proses penelitian, penulisan, dan penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. Karya ini bukanlah usaha yang kami tempuh sendiri, melainkan kolaborasi berbagai individu dan institusi yang turut serta mendukung.

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A.Ph.D Selaku Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Ibu Dr.dr.Dewi Setiawati, Sp.OG.,M.Kes Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar periode 2023-2027, beserta seluruh Dosen dan Staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Terimakasih pula kami ucapkan kepada wakil dekan I, wakil dekan II, wakil dekan III, serta seluruh staf administrasi akademik UIN Alauddin Makassar.
4. Ibunda Anieq Mumti'ah Al-Kautsar S,ST., M.Keb selaku ketua prodi kebidanan UIN Alauddin Makassar Terimakasih banyak atas segala arahan dan bimbingannya.
5. Ibu Firdayanti S.SiT., M.Keb selaku pembimbing I pada penyusunan Risalah ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas saran, bimbingan dan arahan dari ibu agar risalah ini dapat tersusun dengan sistematis.
6. Ibu Dr. Bd. Hj. Sitti Saleha S.SiT., SKM., M.Keb Selaku pembimbing II, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Ibu Dr. dr. Nadyah M.Kes selaku penguji akademik yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga bagi penulis.
8. Ibu Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag sebagai penguji integrasi yang telah memberikan saran dan masukan yang berharga bagi penulis.
9. Segenap Dosen khususnya dosen Prodi Kebidanan dan para staf akademik Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang


telah membantu dalam urusan persuratan dan membimbing penulis selama penyusunan Risalah ini.

10. Kepala Puskesmas Kassi-Kassi beserta seluruh staf yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian sehingga penulis bisa Menyusun risalah ini

11. Kedua Orang Tua saya Bapak Mustari dan Ibu Nurlia, adik saya, Chagiya, ENZIM, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih penulis ucapkan atas segala dukungan dan support yang diberikan kepada penulis agar tetap semangat dalam Menyusun risalah ini.

Besar harapan penulis agar risalah ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Kesehatan.

Samata, Juli 2024



Nurfadillah Istiqomah
NIM: 70400121028

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN RISALAH	II
HALAMAN PERSETUJUAN RISALAH	III
PENGESAHAN RISALAH	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	XI
ABSTRAK.....	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penulisan.....	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II PEMBAHASAN	14
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	14
1. Pengertian Kehamilan.....	14

2.	Konsep Dasar Kehamilan	15
3.	Kebutuhan-Kebutuhan Pada Ibu Hamil	21
B.	Tinjauan Umum Tentang Preeklampsia.....	24
1.	Pengertian Preeklampsia.....	25
2.	Klasifikasi Preeklampsia	25
C.	Tinjauan Teori Preeklampsia Ringan	27
1.	Penyebab Preeklampsia	27
2.	Tanda Dan Gejala Preeklampsia Ringan	28
3.	Patofisiologi Preeklampsia.....	29
4.	Dampak Preeklampsia Ringan.....	32
5.	Penatalaksanaan Preeklampsia Ringan.....	35
6.	Penatalaksanaan Preeklampsia Berat	37
7.	Manajemen Asuhan Kebidanan.....	37
BAB III STUDI KASUS		46
A.	Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny "N" Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kasi-Kassi Tanggal 25 Mei S/D 14 Juni 2024.....	46
1.	Langkah I: Identifikasi Data Dasar	52
2.	Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	66
3.	Langkah III Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial.....	68
4.	Langkah IV Tindakan Segera Kolaborasi Dan Rujukan.....	69
5.	Langkah V Rencana Asuhan	72
6.	Langkah VI implementasi	74
7.	Langkah VII Evaluasi.....	75
B.	Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 28 Mei 2024	82

C. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 31 Mei 2024	84
D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 04 Juni 2024	89
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 07 Juni 2024.....	96
F. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 10 Juni 2024.....	104
G. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 12 Juni 2024.....	111
H. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 14 Juni 2024.....	118
I. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 06 Juni 2024.....	
J. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 21 Juni 2024.....	
K. Matriks Kunjungan	146
L. Lembar Pemilihan Sampelv	153
BAB IV PEMBAHASAN	154
A. Langkah I: Identifikasi Data Dasar	154
B. Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual.....	158
C. Langkah III Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial.....	159
D. Langkah IV Tindakan Segera Kolaborasi Dan Rujukan.....	161
E. Langkah V Rencana Asuhan	162
F. Langkah VI implementasi	163
G. Langkah VII Evaluasi.....	164
BAB V PENUTUP	166
A. Kesimpulan.....	166
B. Saran	168
DAFTAR PUSTAKA	169

LAMPIRAN171

DAFTAR RIWAYAT HIDUP176



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Daftar Tabel

Table 3.1 Riwayat Kunjungan Anc

Table 3.2 Matriks Kunjungan.....



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
RISALAH, JUNI 2024

Nama : Nurfadillah Istiqomah

Pembimbing I : Firdayanti

Pembimbing II : Sitti Saleha

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANA IBU HAMIL PADA NY "N" DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN DI PUSKESMAS KASSI-KASSI TAHUN 2024

Hipertensi yang terjadi dalam kehamilan adalah salah satu gejala dari preeklampsia. Pada laporan terbaru Tahun 2023 bulan 2 Angka kematian ibu di seluruh dunia diperkirakan mencapai 287.000 kematian ini sama dengan kurang lebih 800 kematian perharinya, atau sekitar satu kematian per 2 menit, hal ini menyebabkan kasus preeklampsia menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi ibu hamil.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidnan Ibu Hamil Pada Ny"N" Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2024 hingga tanggal 14 Juni 2024. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus sesuai dengan 7 Langkah varney sera SOAP yang dilakukan pada kunjungan rumah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Ny "N" Dengan Preeklampsia ringan, pada kasus ini menggunakan penerapan 7 Langkah varney dan SOAP diperoleh data ibu berusia 19 Tahun, dengan keluhan sakit kepala menetap dan pembengkakan pada kedua kaki, berdasarkan data yang didapatkan tekanan darah 150/100 mmHg, albumin+1. Asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu yaitu menjelaskan tanda bahaya kehamilan, pemantauan dj, pemberian obat oral nevidipin 1x1.

Kesimpulan dari hasil studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian. Asuhan menunjukkan bahwa ibu sudah dalam keadaan umum baik, kesadaran composmentis, dan TTV dalam batas normal. Asuhan yang telah diberikan ditandai dengan semua tindakan yang telah direncanakan dan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan.

Kata Kunci: Ibu Hamil Pada Ny "N" Dengan Preeklampsia Ringan, 7 langkah Varney

ABSTRACT

DEPARTMENT OF MIDWIFERY
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC WRITING, JUNE 2024

Name : Nurfadillah Istiqomah
Advisor I : Firdayanti
Advisor II : Sitti Saleha

MIDWIFERY CARE MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN MRS "N" WITH MILD PREECLAMPSIA AT PRIMARY HEALTH CENTER OF KASSI-KASSI IN 2024

Hypertension that occurs in pregnancy is one of the symptoms of preeclampsia. Also, in the latest report in 2023 month 2, the number of maternal deaths worldwide is estimated to reach 287,000 deaths. This is equal to approximately 800 deaths per day, or about one death per 2 minutes, this causes preeclampsia cases to be a very dangerous threat to pregnant women.

This study aimed to carry out the management of midwifery care for pregnant women on Mrs. "N" with mild preeclampsia at the Kassi-Kassi Primary Health Center which began on May 25, 2024 until June 14, 2024. The method used in this research was a case study in accordance with the 7 steps of Varney and SOAP conducted at home visits.

Based on the study that had been conducted on Mrs. "N" with mild preeclampsia, the 7 steps of Varney and SOAP were used. The woman was 19-year-old with complaints of persistent headaches and swelling of both legs. Data obtained including blood pressure was in 150/100 mmHg and albumin value was +1. Midwifery care provided to the mother was explaining the danger signs of pregnancy, monitoring fetal health rate, and administering oral medication of Nevidipine once a day.

In conclusion, the 7 steps of Varney and SOAP were used for the completion of midwifery care process. Midwifery care showed that the mother was in good general condition, composmentis consciousness, and vital signs were within normal limits. The midwifery care that had been planned, could be implemented properly without any obstacles.

Keywords: pregnant women, mild preeclampsia, 7 steps of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

AKI (*Angka Kematian Ibu*) meningkat pesat di seluruh dunia, pada tahun 2017 menembus angka 810 perempuan meninggal setiap harinya dikarenakan komplikasi pada masa kehamilan serta persalinan, AKI pada negara berkembang adalah 462 Per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada negara maju adalah 11/100.000 kelahiran hidup (Handayani, 2022).

Sedangkan AKI menurut WHO (World Health Organization) Tahun 2020 sebanyak 295.000 kematian dengan penyebab kematian ibu paling banyak adalah tekanan darah tinggi selama kehamilan (preeklampsia dan eklampsia), pendarahan, infeksi postpartum, dan aborsi yang tidak aman. Pada laporan terbaru Tahun 2023 bulan 2 Angka kematian ibu di seluruh dunia diperkirakan mencapai 287.000 kematian ini sama dengan kurang lebih 800 kematian perharinya, atau sekitar satu kematian per 2 menit (WHO, 2023).

Menurut WHO tahun 2020 kehamilan yang tidak terpantau secara intensif maka dapat menyebabkan peningkatan resiko terjadinya komplikasi terhadap kehamilan yang berujung pada kematian. Setiap menit wanita meninggal di seluruh dunia dikarenakan komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Bisa dikatakan 1400 wanita meninggal setiap harinya dan lebih

dari 500.000 wanita meninggal setiap tahunnya dikarenakan kehamilan dan persalinan (Handayani, 2022).

Preeklampsia merupakan penyakit yang menyerang ibu hamil yang dapat ditandai dengan peningkatan tekanan darah ($TD \geq 140/90$ mmHg), edema (pembengkakan pada tungkai dan wajah) dan proteinuria (kadar protein dalam urine meningkat). Efek preeklampsia pada ibu khususnya adalah eklampsia dan sindrom HELLP (*Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelet*) hancurnya eritrosit, peningkatan enzim hati, dan jumlah sel darah putih yang rendah mungkin terjadi, sehingga menyebabkan kematian pada ibu bahkan janin yang dikandungnya (Haslan, 2022).

Menurut organisasi Kesehatan dunia yaitu WHO, Secara keseluruhan, preeklampsia dan eklampsia menyebabkan sekitar 14% dari jumlah kematian maternal setiap tahun, atau sekitar 50.000 - 75.000 kematian. Preeklampsia diketahui sebagai penyebab utama kelahiran preematur (Iqrayanti, 2019).

Sampai saat ini penyebab dari preeklampsia belum diketahui dengan pasti. Salah satu teori yang paling dikenal adalah bahwa penyebab dari preeklampsia merupakan iskemia placenta, akan tetapi teori ini belum bisa secara pasti ditetapkan sebagai penyebab preeklampsia, bukan tanpa alasan, akan tetapi banyak faktor yang menjadi pertimbangan dikarenakan ada banyak faktor yang bisa menyebabkan preeklampsia,

bukan hanya dari segi faktor ibu tetapi juga mempunyai faktor external dan internal. Adapun beberapa contohnya yaitu usia ibu saat hamil, berapa kali hamil, usia kehamilan, *IMT* (Indeks Massa Tubuh), *Gemelli* atau kehamilan ganda, status sosial ekonomi, mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya, dan riwayat kesehatan keluarga (Erawati, 2022).

Preeklampsia biasanya terjadi pada ibu yang pertama kali hamil, ibu yang hamil diatas umur 40 tahun serta usia di bawah 20 tahun. preeklampsia merupakan penyebab paling banyak kematian ibu dan janin. Pada negara berkembang seperti Indonesia, preeklampsia ini merupakan hal yang sangat darurat (Haslan, 2022).

Preeklampsia diperkirakan membunuh 50.000 hingga 60.000 wanita hamil setiap tahunnya. Preeklampsia diketahui menjadi penyebab utama kelahiran prematur. Preeklampsia adalah sindrom kehamilan sistemik yang berasal dari plasenta akibat invasi trofoblas plasenta yang tidak tepat, diikuti dengan disfungsi endotel ibu yang meluas. Seluruh gejala klinis preeklampsia disebabkan oleh peradangan endotel glomerulus, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, dan respon inflamasi sistemik yang menyebabkan kerusakan organ sehingga menyebabkan preeklampsia (Azmi et al., 2022).

Salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan angka kejadian preeklampsia adalah dengan meningkatkan pelayanan antenatal terpadu.

Mendeteksi risiko preeklampsia dapat dilakukan di layanan kesehatan primer.

Untuk mengatasi permasalahan terkait preeklampsia dan eklampsia, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat preeklampsia dengan menggalakkan pelayanan ANC (*antenatal care*) (Handayani 2022).

Berdasarkan data WHO yang diperoleh pada tahun 2018, kejadian preeklampsia di seluruh dunia adalah sekitar 31,4%, indeks preeklampsia pada negara berkembang sekitar 1,8% hingga 18%, sedangkan indeks preeklampsia di negara maju adalah 1,3-6%, sedangkan angka kejadian preeklampsia di Indonesia adalah 128.273/tahun setara dengan sekitar 5,3%. Angka kejadian preeklampsia di Indonesia terus meningkat, hingga pada tahun 2020 angka kejadian preeklampsia menembus 9,4%. Angka preeklampsia di provinsi Jawa timur pada tahun 2019 menyumbang 27,27% dari 575.485 kelahiran dan ditahun 2020 sebesar 30,88% dari 568.295 kelahiran (Agrevita, 2021).

Pada tahun 2015 dinas kesehatan provinsi Sul-Sel memperoleh data ibu hamil yang menderita preeklampsia sekitar 68 ibu hamil, 78 orang ibu hamil pada tahun 2016, dan 96 orang pada tahun 2017. Pada tahun 2017, provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tingkat kematian yang cukup tinggi, yakni 103 orang dengan kematian ibu hamil 28 orang atau

sekitar 17,6%, ibu bersalin 47 orang atau sekitar 48,3% dan ibu pasca bersalin (nifas) 40 orang atau sekitar 35,1%. dengan penyebab kematian ibu paling tinggi adalah preeklampsia yaitu 68%, sedangkan pendarahan sebanyak 30% dan infeksi sebanyak 4% (Agrevita, 2021).

Pada tahun 2018 sampai 2019, terjadi penurunan kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan dari 4.226 menjadi 4.221. Penyebab utama kematian ibu pada tahun 2019 adalah pendarahan dengan 1.280 kasus, diikuti oleh hipertensi dalam kehamilan dengan 1.066 kasus, dan infeksi dengan 207 kasus. Pada tahun 2020, jumlah ibu hamil yang menderita hipertensi mencapai 23,15% sedangkan pada tahun 2021 angkanya meningkat menjadi 25,74% (Annisa, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh pada puskesmas kassia-kassia tahun 2023 didapatkan angka kejadian preeklampsia pada bulan Januari sebanyak 2 orang, bulan Februari 1 orang, bulan Maret 2 orang, bulan April 5 orang, bulan Mei 2 orang, bulan Juni 3 orang, bulan Juli 4 orang, bulan Agustus 3 orang, dan pada bulan September 2 orang, maka dari itu jumlah keseluruhan sebanyak 24 orang.

Berdasarkan data yang diuraikan pada pembahasan diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Melakukan manajemen pelayanan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan preeklampsia ringan di puskesmas Kassi Kassi sesuai dengan 7 langkah Varney.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan secara umum

Bisa mengaplikasikan pelayanan kebidanan secara maksimal pada Ny "N"

Dengan preeklampsia ringan di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2024.

2. Tujuan secara khusus

a. Dilaksanakannya Anamnesis/pengkajian Ibu Hamil Pada Ny "N"

Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2024.

b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual Ibu Hamil Pada Ny "N"

Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2024.

c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial Ibu Hamil Pada Ny "N"

Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2024.

d. Dilakukannya identifikasi tindakan segera/kolaborasi dan rujukan Ibu

Hamil pada Ny "N" Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2024

e. Ditetapkannya rencana asuhan kebidanan Ibu Hamil Pada Ny "N"

Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2024.

- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang sudah disusun Ibu Hamil Pada Ny “N” Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2024.
- g. Diketuainya hasil tindakan yang telah dilakukan Ibu Hamil Pada Ny “N” Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2024.
- h. Mendokumentasikan atau mencatat semua hasil anamnesis dan semua tindakan asuhan yang telah diberikan pada Ibu Hamil Pada Ny “N” Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2024.

D. Manfaat Penulisan

Berikut adalah beberapa manfaat penelitian dalam kasus ini:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya dan dapat dijadikan sebagai sarana menambah ilmu bagi peneliti untuk mengetahui dan memahami kejadian preeklampsia ringan pada ibu hamil. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis dan mendokumentasikan penelitian lebih lanjut mengenai asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan preeklampsia ringan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi ibu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada ibu mengenai pelayanan kebidanan baagi ibu hamil dengan preeklampsia ringan.

b. Manfaat bagi peneliti

Menambah pengalaman serta wawasan peneliti akan berbagai fenomena yang terjadi, terkhususnya pada kasus ibu hamil dengan preeklampsia ringan. Dan sebagai wadah bagi peneliti untuk menuangkan dan menerapkan teori yang dipelajari selama perkuliahan kepada pasien dan masyarakat baik dalam segi ilmu kesehatan maupun spiritual.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya terkait tentang asuhan pada ibu hamil dengan preeklampsia ringan.

E. Metode penulisan

Pada penyusunan penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Penulis mempelajari berbagai referensi buku-buku dari perpustakaan, Ebook, berbagai referensi jurnal yang diperoleh dari internet dan literatur lain yang berhubungan dengan preeklampsia.

2. Studi kasus

Penulis menerapkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan tujuh Langkah Varney dalam study kasus ibu hamil dengan preeklampsia ringan, Langkah Langkah tersebut mencakup pengumpulan data dasar, Identifikasi diagnosa dan potensial, pelaksanaan Tindakan kooperatif, penyusunan rencana asuhan kebidanan yang akan dilakukan, mengimplementasikan rencana yang telah disusun, evaluasi tindakan asuhan yang telah diberikan, dan mendokumentasikan semua Tindakan yang telah dilakukan.

Adapun beberapa cara teknik pengumpulan data yaitu:

a. Anamnesis atau wawancara

Untuk keperluan penelitian ini, penulis menggunakan metode pertanyaan terbuka atau wawancara yang dilakukan terhadap pasien, anggota keluarganya, dan orang lain yang mungkin dapat memberikan beberapa informasi yang diperlukan untuk lebih memahami kondisi pasien.

b. Pemeriksaan fisik

Melakukan pemeriksaan fisik sistematis pada pasien secara *head to toe* dengan cara berikut:

- 1) Inspeksi (melihat) adalah proses pengamatan dan analisis menggunakan mata, pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah pasien atau klien memiliki gejala yang tidak normal dan atau memperluas cakupan pemeriksaan fisik.
- 2) Palpasi (meraba) pemeriksaan ini dilakukan dengan cara meraba dan mengusap tubuh pasien. Prosedur ini dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada organ atau pembuluh darah pasien.
- 3) Perkusi (mengetuk) merupakan metode penerepan mengetuk yang dilakukan dibebberapa bagian tubuh, termasuk perut dan tempurung lutut
- 4) Auskultasi (mendengar) adalah metode pemeriksaan dengan menggunakan pendengaran melalui alat seperti lenek, dopler, dan stetoskop.

c. Pengkajian psikososial, ekonomi, dan spiritual

Study psikososial pada klien mencakup evaluasi stabilitas emotional, dan respon terhadap kondisi yang dihadapinya. ini juga mencakup pola interaksi klien dengan keluarga, lingkungan tetangga

petugas kesehatan, serta bagaimana keyakinan/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selain itu study ini juga mempertimbangkan persiapan biaya untuk proses persalinannya.

3. Studi pendokumentasian

Penulis mendokumentasikan semua data subjektif dan data objektif yang telah diperoleh termasuk pemeriksaan penunjang, selanjutnya menetapkan diagnosa baik aktual maupun potensial serta melakukan tindakan emergency jika ada indikasi, langkah selanjutnya adalah penetapan rencana, implementasi rencana, dan evaluasi, semua langkah didokumentasikan termasuk setiap kunjungan.

4. Diskusi

Melakukan tanya jawab dengan bidan atau dokter yang menangani secara langsung pasien tersebut serta melakukan diskusi dengan dosen pembimbing institusi serta pembimbing lahan agar karya tulis ilmiah ini dapat tersusun secara sistematis.

F. Sistematika penulisan

Pada BAB I sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penyusunan Karya tulis Ilmiah ini terdiri dari beberapa bab diantaranya Pada BAB ini pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II, pada tinjauan pustaka akan membahas secara detail tentang tinjauan umum tentang kehamilan, tinjauan umum tentang *Antenatal care*, tinjauan khusus tentang preeklampsia, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Pada BAB III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah verney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada BAB IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktik yang dilaksanakan di Kassi-Kassi dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan preeklampsia ringan.

Pada BAB V yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, serta temuan dapat pengetahuan yang didapat dari hasil asuhan. Selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan umum tentang kehamilan

1. Pengertian kehamilan

Kehamilan adalah proses fisiologis dan merupakan hal alamiah bagi seorang perempuan, apabila tidak mendapat asuhan yang tepat dan tidak ada deteksi sedini mungkin akan komplikasi yang tepat maka akan berujung pada komplikasi yang fatal atau dapat menyebabkan kematian pada ibu. Apabila seorang perempuan mempunyai rahim yang sehat, sudah mengalami menstruasi dan melakukan hubungan seks maka kehamilan sudah dapat terjadi (Kasmiati, 2023).

Kehamilan adalah proses yang sangat istimewa, terjadi pada organ reproduksi wanita yang berlangsung selama kurang lebih 280 hari lamanya atau setara dengan 40 minggu lamanya sejak hari pertama haid terakhir ibu. Pada kehamilan prosesnya diawali dengan fertilisasi kemudian ber implantasi/nidasi pada dinding uterus dan berkembang hingga janin siap untuk dilahirkan (Wulandari 2022) .

2. Konsep dasar kehamilan

a. Definisi kehamilan

Kehamilan bisa di definisikan sebagaimana berikut:

1) Kehamilan yaitu dimulai dari masa konsepsi (pembuahan hingga bayi lahir. kehamilan berlangsung selama 280 hari/40 minggu atau bisa dihitung 9 bulan 7 hari Kehamilan yaitu proses bertemunya sel sperma laki-laki dan sel ovum pada perempuan di dalam tuba fallopi, kemudian terjadi proses konsepsi dan nidasi, serta implantasi di dinding uterus/rahim, yang lebih tepatnya pada dinding endometrium. Setelah konsepsi proses ini dapat terjadi pada hari ke 6 atau 7 (Kasmiati, 2023)

2) Kehamilan adalah perubahan kehidupan. Saat jutaan sperma masuk ke sistem reproduksi seorang perempuan secara bertahap, gerombolan sperma bersaing untuk membuahi telur (ovum), yang akan dibuahi oleh satu sperma terbaik Sehingga terjadi pembuahan, yang dikenal sebagai Zigot. Setelah pembuahan selesai, sel membelah menjadi embrio, yang kemudian masuk ke dalam uterus untuk implantasi (Setiawati, 2020).

b. Tanda adanya kehamilan

Pada kehamilan terdapat tiga tanda kehamilan yaitu, tanda pasti hamil tanda kemungkinan hamil, dan tanda ketidakpastian hamil.

1) Tanda pasti pada kehamilan

Salah satu tanda bahwa telah terjadi kehamilan secara pasti yaitu terabanya janin atau bagian-bagian tubuh janin di dalam rahim, dan terdengarnya denyut jantung janin. Selain palpasi harus juga didukung dengan pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) agar lebih jelas gambaran bagian bagian janin, bentuk janin, serta tampaknya kantong kehamilan. Kantong kehamilan akan mulai tampak pada usia kehamilan 6-7 minggu, denyut jantung janin sudah bisa terdeteksi usia kehamilan 5 sampai 7 minggu, adapun pergerakan janin sudah bisa dilihat pada usia kehamilan 6 sampai 7 minggu pasca konsepsi. Dengan menggunakan USG, kepala janin, bokong serta panjang kepala sudah bisa kita ukur pada usia 13 minggu, USG juga menjadi alat untuk menghitung usia kehamilan yang paling akurat.

Allah berfirman dalam Qs.Al-mu'minun/12:14.

تَمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal

daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.”

Tafsiran:

Sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Ada segolongan ahli tafsir menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini ialah keturunan Adam termasuk kita sekalian, yang berasal dari air mani. Dari hasil penelitian ilmiah, sebenarnya air mani itu pun berasal dari tanah setelah melalui beberapa proses perkembangan.

Makanan yang merupakan hasil bumi, yang dimakan oleh manusia, dan alat pencernaannya berubah menjadi cairan yang bercampur dengan darah yang menyalurkan bahan-bahan hidup dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia ke seluruh bagian anggotanya. Jika manusia itu meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam kubur di dalam tanah, maka badannya akan hancur lebur dan kembali menjadi tanah lagi. Menurut para saintis, Tahapan-tahapan dalam embriologi manusia sebagai berikut:

- a) Nutfah, atau dalam bahasa Arabnya nutfah, mempunyai arti sedikit air, atau setetes air. Hal ini jelas mendeskripsikan air yang sedikit yang

dipancarkan lelaki saat bersanggama. Air yang sedikit ini mengandung sperma. Sperma atau spermatozoa terdapat di dalam air yang menjijikkan dan berbentuk ikan yang berekor panjang (ini adalah salah satu arti kata sulalah. Dalam surah AsSajdah/32 ayat 8, air mani disebut sebagai "... Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang diremehkan..." Surah Al-Insan/76 ayat 2 dan AsSajdah/32 ayat 8 berkaitan dengan kandungan dari air mani. Ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa air mani terdiri atas empat macam lendir yang berbeda yang dihasilkan oleh empat kelenjar yang berbeda, yaitu kelenjar biji pelir, kelenjar saluran seminal, kelenjar prostat, dan kelenjar saluran kencing.

- b) Setelah sel telur dibuahi, dan menempelkan diri di dinding uterus dan memperoleh makanan dari ibunya, maka ia akan tumbuh cepat. Pada waktu dua sampai tiga minggu kemudian, apabila dilihat dengan mata telanjang, ia akan berubah dari bentukan lintah atau alaqah ke bentukan mudgah atau daging yang telah dikunyah. Pola yang terakhir ini sebetulnya dibentuk oleh adanya tonjolan dan lekukan, yang pada waktunya nanti akan menjadi organorgan dalam (jantung, usus) dan luar (kaki, tangan). Surah Al-Hajj/22: 5 menambahkan satu catatan dari embrio. Dalam ayat ini, mudigah dideskripsikan dengan tambahan "yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya Ini

menggambarkan hal yang terjadi pada tahap diferensiasi, dimana banyak organ mulai berkembang dalam waktu yang tidak bersamaan. Sehingga menimbulkan situasi antara selesai di bagian lain namun belum sempurna di bagian lainnya.

- c) Dua tahapan terakhir yang disebutkan pada surah Al- Mu'minun/23: 14 bercerita tentang pembentukan tulang belulang setelah tahap mudigah. Pada akhirnya, cerita diakhiri dengan memberinya "baju", yang terdiri atas daging dan otot. Apabila kita mengikuti pertumbuhan embrio, maka kira-kira pada umur empat minggu suatu proses diferensiasi mulai berjalan. Dalam proses ini kelompok-kelompok sel pada embrio akan berubah bentuk dan mulai membentuk organorgan berukuran besar. Salah satu yang berkembang pertama kali adalah tulang tengkorak. Proses ini akan disusul kemudian oleh pembentukan calon otot, telinga, mata, ginjal, jantung dan banyak lagi. (Quran Kemenag, 2019).

2) Tanda kemungkinan hamil

Ada beberapa tanda yang kemungkinan bisa menunjukkan terjadinya kehamilan,

- a) Tes pack positif
- b) Uterus/rahim membesar sesuai usia kehamilan
- c) Tanda pasti Hegar

- d) Tanda chadwick
- e) Tanda goodel
- f) Munculnya tanda braxton hick

3) Tanda ketidakpastian hamil

- a) Tidak haid (*amenorhea*)
- b) Mual dan muntah
- c) Mengidam/pica
- d) Payudara membesar dan menegang
- e) Anoreksia
- f) Sering buang air kecil (BAK)
- g) Susah bab
- h) Upulis pada gusi
- i) Adanya perubahan pada abdomen

3. Kebutuhan-kebutuhan pada ibu hamil

a. Kebutuhan nutrisi

Dalam kondisi kehamilan nutrisi sangat mempengaruhi ibu dan derajat kesehatannya saat hamil yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandungnya, ibu hamil diharuskan untuk selalu memperhatikan makanan yang dikonsumsinya

setiap hari agar dapat mencukupi kebutuhan zat gizi yang diperlukan selama masa kehamilan, persiapan persalinan hingga nifas (Kasmiati, 2023).

Pola makan harus mengandung kalori yang cukup, banyak nutrisi dan protein, Nutrisi yang tepat dapat mempercepat proses pemenuhan dan pemulihan kesehatan pada ibu, secara alami juga mempengaruhi produksi ASI nantinya (Saleha, 2009).

Pada saat ibu hamil ini merupakan fase dimana ibu mengalami fase stres fisiologis yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. ibu hamil juga sangat rawan terkena masalah malnutrisi.

b. Personal hygiene

Ibu hamil harus menjaga personal hygiene dikarenakan pada saat hamil terjadinya peningkatan sekresi lendir pada vagina serta peningkatan frekuensi BAK yang akan mengakibatkan daerah vagina menjadi lembab. Selain personal hygiene ibu juga diharuskan untuk menjaga kebersihan badan seperti mandi dan mengganti pakaian, dikarenakan pada saat kehamilan terjadi peningkatan metabolisme tubuh sehingga terjadi pengeluaran keringat yang berlebihan. Serta menjaga kebersihan gigi dan mulut.

c. Kebutuhan eliminasi

Pada saat hamil ibu mengalami beberapa ketidaknyamanan salah satunya adalah konstipasi dan buang air kecil menjadi lebih sering karena pembesaran uterus menekan kandung kemih.

d. Kebutuhan olahraga

Olahraga pada masa kehamilan dapat membantu mempersiapkan tubuh menghadapi persalinan, menjaga dan melatih psikologis ibu secara bertahap agar nyaman menghadapi persalinan sehingga proses persalinan berjalan lancar dan mudah. Olah raga saat hamil penting untuk melancarkan peredaran darah, terutama pada anggota tubuh bagian bawah. Olahraga juga dapat meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan nafsu makan saat makan, dan melancarkan pencernaan.

e. Kebutuhan imunisasi

Ibu hamil harus aktif memperkuat imunitas terhadap antigen yang didapat melalui Vaksinasi. Vaksinasi Tetanus merupakan salah satu upaya menurunkan angka kematian bayi akibat infeksi tetanus. Vaksinasi dasar tetanus (TT) dilakukan dua kali selama kehamilan. Interval minimum vaksinasi TT.

f. Kebutuhan pemantauan ANC rutin

Meminimalkan terjadinya *missed opportunity* pada ibu hamil dalam memperoleh pelayanan antenatal terpadu berkualitas dan komprehensif. Agar dapat mendeteksi dini apakah ada gangguan, penyakit atau kelainan yang diderita oleh ibu hamil. Melakukan intervensi terhadap gangguan penyakit atau gangguan pada ibu hamil sedini mungkin.

B. Tinjauan Umum Tentang Preeklampsia

1. Pengertian preeklampsia

Preeklampsia merupakan kondisi yang terjadi pada ibu hamil dengan keadaan hipertensi atau tekanan darah tinggi yang terjadi, pada usia kehamilan yang lebih dari 20 minggu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan preeklampsia akan berlanjut sampai persalinan hingga masa nifas (Fitriani, 2020).

Preeklampsia merupakan keadaan hipertensi yang dialami oleh ibu hamil pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu atau bisa terjadi setelah persalinan, yang ditandai dengan tekanan darah meningkat 140/90 mmHg (Situmorong, 2016).

Preeklampsia adalah sekelompok gejala yang terdiri dari hipertensi (TD \geq 140/90 mmHg) dan proteinuria (\geq 0,3 g/24 jam)

setelah 20 minggu kehamilan, saat tekanan darah wanita pada awalnya normal. Faktor risiko terjadinya preeklampsia antara lain nuliparitas, riwayat preeklampsia, wanita multipara dengan pasangan berbeda, riwayat hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, dan hiperkoangulopati (Noor, 2021).

Preeklampsia merupakan kondisi khusus yang terjadi pada kehamilan yang ditandai dengan adanya disfungsi dari plasenta dan respons maternal terhadap adanya inflamasi sistemik dengan aktivasi endotel dan koagulasi. Adapun diagnosis dari preeklampsia bisa ditegakkan hanya jika berdasarkan adanya hipertensi spesifik pada saat kehamilan yang disertai dengan gangguan pada organ lain pada usia kehamilan diatas 20 minggu (Handayani, 2022). Preeklampsia merupakan keadaan hipertensi atau tekanan darah tinggi yang timbul pada usia kehamilan diatas 20 minggu yang di ikuti dengan adanya protein urinaria. preeklampsia merupakan keadaan hipertensi dengan keadaan khusus dengan keterlibatan multisistem biasanya lebih sering terjadi pada usia kehamilan yang semakin tua.

2. Klasifikasi preeklampsia

Preeklampsia dibagi menjadi 2 kategori yaitu:

a. Preeklampsia ringan

Preeklampsia ringan merupakan kondisi adanya hipertensi yang diikuti dengan adanya protein urinaria dan juga adanya edema/bengkak, pada usia kehamilan diatas 20 minggu atau segera setelah partus. Adapun tanda dan gejala preeklampsia ringan yaitu meningkatnya tekanan darah 140 sampai 160 mmHg dengan selang pemeriksaan 2 kali selang 6 jam pada kondisi sedang istirahat, serta dengan kenaikan akibat gangguan lainnya

b. Preeklampsia berat

Preeklampsia berat merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah pada saat kehamilan, dimana hasil pemeriksaan tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih disertai dengan adanya protein urinaria serta edema pada usia kehamilan diatas 20 minggu

Adapun tanda dan gejala dari preeklampsia berat adalah adanya nyeri kepala yang menetap (tidak mereda hanya dengan obat analgetik biasa), nyeri pada abdomen, pandangan kabur, sianosis, edema paru hingga adanya gangguan kesadaran.

c. Eklampsia

Eklampsia merupakan komplikasi akut pada wanita hamil, yang diawali dengan tanda-tanda preeklampsia sebelumnya hingga timbulnya kejang hingga koma. Tanda dan gejala preeklampsia yaitu nyeri kepala yang hebat, pandangan kabur, nyeri pada abdomen, edema paru dan disertai dengan kejang/koma.

C. Tinjauan Teori Preeklampsia Ringan

1. Penyebab Preeklampsia

a. Usia ibu

Pada usia yang sudah tua akan lebih cenderung mengalami komplikasi pada kehamilan dan persalinannya yaitu meliputi, diabetes, hipertensi, janin kembar, abortus spontan, persalinan pervaginam dengan bantuan alat, Cesar, post term dan BBLR (berat bayi lahir rendah) Adapun faktor resiko yang dikaitkan dengan preeklampsia yaitu multipara, mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya hingga kronis, usia > 35 tahun dan obesitas.

b. Status gravida

Ibu yang pertama kali hamil mempunyai resiko lebih tinggi untuk terkena preeklampsia, yaitu 7-10% beresiko terkena preeklampsia, dikarenakan keadaan patologis telah terjadi sejak implantasi sehingga menyebabkan timbulnya iskemia pada plasenta yang kemudian menjadi sindrom inflamasi. (Kasmiati, 2023).

c. Riwayat hipertensi

Wanita hamil dengan riwayat penyakit pembuluh darah pribadi atau keluarga seperti hipertensi kronis dan diabetes beresiko lebih tinggi terkena preeklampsia (Hasibuan hafizah, 2021).

d. Pemeriksaan Antenatal Care yang tidak adekuat

Tujuan pemeriksaan kehamilan adalah untuk mengidentifikasi dan mencegah kelainan yang mungkin terjadi sedini mungkin, memperbaiki dan menjaga kondisi tubuh ibu selama hamil, melahirkan dan menyusui (Hasibuan hafizah, 2021).

e. Stres

Wanita yang mempunyai tekanan pekerjaan (bekerja) cenderung memiliki resiko akan mengalami preeklampsia lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja (Noor, 2021).

2. Tanda dan gejala preeklampsia ringan

Tanda dan gejala preeklampsia ringan antara lain:

- a. Meningkatnya tekanan darah >140/90 mmHg
- b. Protein urinaria 0,3 gr/dl
- c. Pertambahan berat badan 1 kg atau lebih dalam seminggu
- d. Pembengkakan pada mata, wajah dan jari
- e. Sakit kepala sementara, tidak ada gangguan penglihatan
- f. Tidak ada nyeri pada ulu hati

3. Patofisiologi preeklampsia

Patofisiologi pasti dari preeklampsia masih belum diketahui.

Namun, ada beberapa teori yang telah dikemukakan yang mungkin menjelaskan sebagian besar kelainan yang terlihat pada proses

penyakit

ini.

- a. Plasenta tidak normal

Preeklampsia pada dasarnya adalah penyakit plasenta. Salah satu teori yang paling diterima mengenai preeklampsia adalah plasenta abnormal. Pada kehamilan normal, trofoblas memulai invasi ke dalam pembuluh darah miometrium dengan merombak arteri spiralis ibu, mengubahnya dari arteriola yang kecil, berotot,

dan memiliki resistensi lebih tinggi menjadi arteri kaliber besar dengan kapasitas tinggi dan aliran darah bebas.

Remodeling biasanya dimulai pada akhir trimester pertama dan selesai pada usia kehamilan 18-20 minggu. Kegagalan proses remodeling menyeluruh ini menyebabkan menetapnya arteri spiralis dengan resistensi tinggi yang menghambat perfusi plasenta sehingga menyebabkan keadaan "hipoksemia relatif" yang berpuncak pada disfungsi sel endotel ibu. Disfungsi sel endotel sistemik ibu bermanifestasi dalam tanda dan gejala yang mencerminkan vasokonstriksi ibu dan kerusakan Multi organ.

Hipoperfusi plasenta merupakan penyebab dan akibat dari plasenta abnormal yang menjadi lebih jelas seiring dengan meningkatnya kebutuhan unit fetoplasenta seiring dengan perkembangan kehamilan. Perubahan patologis lanjut yang terlihat pada jaringan plasenta berkorelasi dengan iskemia termasuk atherosclerosis, nekrosis fibrinoid, trombosis, sklerosis arteriola, dan infark.

b. Faktor imunologi

Preeklampsia cenderung mempengaruhi kehamilan pertama (naif terhadap antigen ayah/janin) dan paparan berulang terhadap

antigen ayah/janin cenderung menurunkan risiko penyakit ini. Selain itu, situasi lain yang membatasi paparan terhadap antigen ayah seperti pasangan baru pada kehamilan berikutnya dan jarak antar kehamilan yang panjang, penggunaan kontrasepsi penghalang, atau konsepsi melalui inseminasi buatan menyebabkan risiko preeklampsia yang lebih tinggi.

Diketahui juga bahwa wanita yang hamil melalui donasi sel telur memiliki risiko preeklampsia lebih dari dua kali lipat dibandingkan bentuk reproduksi lainnya. Kehamilan yang dikandung melalui teknik reproduksi berbantuan memiliki peningkatan preeklampsia empat kali lipat dibandingkan dengan kehamilan yang dikandung secara alami. Kelainan yang terlihat pada preeklampsia serupa dengan kelainan yang terlihat pada penyakit graft versus host. implantasi plasenta yang tidak normal diduga disebabkan oleh peningkatan aktivitas sel NK akibat konflik antara gen ibu dan ayah. Hal ini sebagian mungkin dimediasi melalui aktivitas sel dendritik karena peningkatan infiltrasi sel dendritik terlihat pada biopsi plasenta pada preeklampsia.

c. Faktor genetik

Pengamatan yang menunjukkan bahwa wanita yang baru pertama kali hamil dan memiliki riwayat keluarga dengan

preeklampsia memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena preeklampsia dibandingkan wanita yang baru pertama kali hamil dan tidak memiliki riwayat keluarga dengan preeklampsia.

Risiko terjadinya preeklampsia meningkat secara signifikan pada wanita yang sebelumnya pernah menderita preeklampsia.

Pasangan pria yang ibunya menderita preeklampsia lebih besar kemungkinannya untuk terkena preeklampsia seorang Wanita yang hamil dari pria yang sebelumnya menderita preeklampsia mempunyai resiko lebih tinggi terkena penyakit ini. Sebagian besar data menunjukkan bahwa gen ibu dan ayah mempunyai peran dalam cacat pembentukan plasenta dan preeklampsia berikutnya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipoksia dan iskemia plasenta adalah jalur utama dalam patogenesis preeklampsia dengan pelepasan faktor vasoaktif ke dalam sirkulasi ibu dan disfungsi sel endotel yang menyebabkan tanda dan gejala preeklampsia. Preeklampsia diakibatkan oleh endotel yang mengeluarkan vasoaktif yang didominasi vasokonstriktor.

4. Dampak preeklampsia ringan

a. kematian janin dalam rahim

kerusakan pembuluh darah akan merusak system vaskularisasi darah, yang mengganggu pertukaran oksigen dan nutrisi melalui plasenta dari ibu ke janin, sehingga akan menyebabkan kematian janin dalam rahim.

b. premature

Preeklampsia dapat menyebabkan kelahiran prematur dikarenakan ibu hamil yang memiliki tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit, yang akan mengurangi pasokan oksigen ke organ dan janin.

c. Solusio placenta

Solusio plasenta merupakan keadaan plasenta yang terlepas ataupun terkelupas sebelum mencapai kala III, tempat implantasi normal plasenta yaitu terletak pada fundus atau corpus uteri, tekanan darah tinggi meningkatkan resiko pendarahan yang abnormal antara plasenta dan dinding rahim.

d. Pertumbuhan janin terhambat

Ibu yang mengalami preeklampsia akan sangat berpengaruh pada pembuluh darah arteri yang akan mengalirkan darah ke placenta, apabila placenta tidak mendapat pasokan darah yang memadai

makan akan berdampak pada pasokan oksigen dan nutrisi bayi didalam kandungan ibu. Hal tersebut yang menyebabkan pertumbuhan janin akan terhambat.

e. Kematian

Preeklampsia yang tidak ditangani sedini mungkin dan terus berlanjut kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian pada penderitanya, dengan cara merusak terlebih dahulu merusak organ-organ seperti jantung. Pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh , maka akan menyebabkan jantung bekerja lebih ekstra dari biasanya dikarenakan tekanan darah yang tinggi. Oleh karena jantung yang harus bekerja lebih keras maka akan menyebabkan otot jantung menjadi kaku dan bengkak.

Firman Allah pada QS.Al-Lukman/31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ

أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.598) (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.598)

Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun”

Tafsiran:

(14) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dikarenakan orang tuanya telah mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang teramat sangat. Maka dari itu seorang anak wajib berbakti dan membalas segala jerih payang yang telah dilakukan oleh oleh orang tuanya.

5. Penatalaksanaan preeklampsia ringan

pada pasien preeklampsia dengan rawat jalan maka ibu dianjurkan untuk diet cukup protein, rendah lemak, garam dan karbohidrat, menganjurkan ibu untuk lebih banyak beristirahat, melakukan pemberian obat nefidipin 10 mg 1x1 selama 7 hari (berdasarkan resep dokter), melakukan kunjungan ulang setiap 1 minggu serta melakukan penilaian tekanan darah, protein urine dan menilai odema.

Apabila 2 minggu menjalani pengobatan dan belum ada tanda tanda perbaikan dari tanda tanda sebelumnya ataupun muncul satu atau lebih yang mengarah ke preeklampsia berat maka pasien akan dianjurkan untuk dirawat inap.

Pada usia kehamilan dibawah 37 minggu dan menderita preeklampsia dan tekanan darahnya mengalami penurunan selama perawatan maka kehamilan akan diakhiri pada usia kehamilan aterm 37 minggu atau lebih atau hingga persalinan dan dipertimbangkan untuk menunggu hingga tafsiran persalinan, persalinan dapat dilakukan secara normal, tetapi apabila selama perawatan tekanan darah tidak mengalami penurunan ataupun semakin meningkat maka akan di tunggu hingga usia kehamilan 37 minggu.

Adapun pada pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu pemeriksaan laboratorium dan keterangan lain yang menyangkut dengan kondisi serta keadaan ibu, pada pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg- $\leq 160/110$ mmHg, pada pemeriksaan urine analysis didapatkan protein urine ≥ 300 mg/24 jam (+1), kenaikan Berat bada 1 Kg atau lebih perminggu, memantau adanya odema pada ektramitas atas, bawah ataupun wajah, atau bila didapatkan tanda-tanda preeklampsia berat.

6. penatalaksanaan preeklampsia berat

apabila preeklampsia terus berkembang dan mengarah ke preeklampsia berat maka pengobatan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Melakukan tirah baring kearah kiri secara intermiten
- b. Memasang infus RL atau ringer dekstrose 5%
- c. Segera rujuk ibu ke rumah sakit
- d. Melakukan pemberian anti kejang atau antikoovulsan magnesium sulfat ($MgSO_4$) sebagai salah satu cara untuk mencegah dan mengatasi kejang pada kasus preeklampsia berat serta eclampsia

7. Manajemen asuhan kebidanan

- a. Langkah-langkah manajemen kebidanan Asuhan Kebidanan menggunakan manajemen 7 langkah verney yaitu:
 - 1) Langkah I: Identifikasi Data Dasar

Untuk menilai keadaan klien perlu dilakukan pengumpulan data dasar meliputi riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan penunjang. Dari hasil anamnesis atau data subyektif yang dilakukan akan didapatkan data bahwasanya klien mengeluh sering pusing, pembengkakan pada tungkai, serta pandangan kabur, usia ibu, usia kehamilan, riwayat hipertensi sebelumnya, riwayat kesehatan keluarga, riwayat kehamilan sebelumnya.

Hasil pemeriksaan yang didapatkan oleh bidan atau objektif meliputi adanya tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dan $\leq 160/110$

mmHg, berat badan mengalami peningkatan 1 kg per minggu, protein urinaria $\geq 0,3$ gr/dl dalam kurun waktu 24 jam atau +1, serta adanya pembengkakan pada tungkai serta wajah pada pemeriksaan fisik umum.

2) Langkah II (Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual)

Setelah dilakukan anamnesis serta pemeriksaan fisik umum dan penunjang dapat disimpulkan bahwa data subjektif ibu sering mengeluh pusing, pembengkakan pada tungkai, serta pandangan kabur, Dan pada data obyektif ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 20 minggu, peningkatan tekanan darah menjadi $\geq 140/90$ mmHg dalam interval 6 jam, pembengkakan pada tungkai dan wajah, proteinuria +1, serta penambahan berat badan sebesar 1 kg per minggu maka akan didiagnosis menderita preeklampsia ringan.

3) Langkah III (Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial)

Dalam kasus preeklampsia ringan, bidan atau penyedia layanan kesehatan lain dapat mengidentifikasi perkembangan menjadi preeklampsia berat jika terjadi peningkatan tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg disertai dengan proteinuria $>+2$ dan gejala lain yang mencakup komplikasi ginjal, otak, hati, sistem

kardiovaskular, seperti sakit kepala parah, gangguan penglihatan yang signifikan dan hiperrefleksia.

4) Langkah IV (Tindakan Segera, Kolaborasi Dan Rujukan)

Dalam kasus preeklampsia ringan, jika tekanan darah \leq 160/110 mmHg, proteinuria \leq +2 dan tidak ada tanda-tanda kejang atau syok setelah dua kunjungan ANC berturut-turut, Tindakan segera tidak diperlukan. Jika pasien mengalami syok atau kejang, tindakan darurat akan dilakukan bersama dokter dengan melakukan tindakan darurat atau rujukan.

Pada preeklampsia berat, resiko yang dapat terjadi termasuk syok atau kejang, kematian ibu, kelahiran premature, resiko bayi berat lahir rendah, solusio plasenta, serta peningkatan risiko kematian pada bayi baru lahir.

5) Langkah V (Menyusun Rencana Asuhan Kebidanan)

Bagi ibu hamil dengan preeklampsia ringan, maka akan dilakukan pemeriksaan kehamilan atau kunjungan rumah rutin setiap minggu. Memantau Tekanan darah ibu, pemantauan berat badan dan mendeteksi dini adanya komplikasi. setelah 2 minggu pengobatan rawat jalan tidak mengalami perubahan, berat badan ibu bertambah 1kg/minggu atau lebih selama 2 minggu berturut-turut atau banyak gejala preeklampsia yang muncul. Jika

setelah 1 minggu pengobatan tidak ada perubahan, maka preeklampsia ringan dianggap preeklampsia berat.

Apabila kondisi ibu membaik sebelum 1 minggu pengobatan dan kehamilan belum aterm, maka pasien akan melanjutkan pengobatan selama 2 hari lagi sebelum diperbolehkan pulang. Dan perawatan akan dilanjutkan secara rawat jalan. Mengajarkan ibu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Serta menganjurkan ibu untuk membaca doa Nabi Ayyub

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنَا أَنُّارٌ حَمَلٌ حَمِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".

6) Langkah VI (Pelaksanaan Asuhan)

Bagi ibu hamil dengan preeklampsia ringan, maka akan dilakukan pemeriksaan kehamilan atau kunjungan rumah rutin setiap minggu. Tekanan darah ibu, pemantauan berat badan dan mendeteksi dini adanya komplikasi. Namun bila setelah 2 minggu rawat jalan tidak ada perubahan, maka dilakukan rawat inap

dengan kriteria tetap tidak berubah setelah 2 minggu rawat jalan yaitu berat badan ibu bertambah 1kg atau lebih/minggu selama 2 minggu berturut-turut, atau salah satu dari gejala berikut ini muncul atau lebih dari satu gejala preeklampsia berat.

Apabila pengobatan sudah membaik sebelum 1 minggu dan janin masih prematur, maka pasien akan melanjutkan pengobatan selama 2 hari lagi sebelum diperbolehkan pulang. Perawatan akan dilanjutkan secara rawat jalan. Menganjurkan ibu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Serta mengajarkan ibu untuk membaca doa ketika sakit

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنَا أَنُّارٌ حَمَلَ لِرَّ حَمِيمٍ

Terjemahnya:

"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".7) Langkah VII

7). (Evaluasi)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tekanan darahnya sudah kembali normal atau tidak, apakah protein

urinanya masih positif atau negatif, apakah sudah tidak ada edema, serta keluhan keluhan yang ibu keluhkan sebelumnya sudah hilang atau berkurang.

mengevaluasi tidak terjadinya tanda-tanda yang mengarah kepada preeklampsia berat seperti peningkatan tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg disertai proteinuria $>+2$ dan gejala lainnya yang berkaitan dengan ginjal, otak, hati dan sistem kardiovaskular, sakit kepala, gangguan penglihatan parah dan hiper refleksia. serta asuhan yang telah diberikan kepada pasien telah benar dan maksimal sesuai dengan yang telah disusun pada rencana asuhan kebidanan pada langkah sebelumnya.

b. Manajemen asuhan kebidanan SOAP

Untuk melakukan pendokumentasian SOAP kita dapat menggunakan 4 metode atau langkah yaitu:

1) Data subjektif (S)

Dari hasil anamnesis atau data subyektif yang dilakukan akan didapatkan data klien mengeluh sering pusing, pembengkakan pada tungkai, kabur, usia ibu, usia kehamilan, riwayat hipertensi sebelumnya, riwayat kesehatan keluarga, riwayat kehamilan sebelumnya. Hasil pemeriksaan yang didapatkan oleh bidan atau Data objektif meliputi adanya tekanan

darah >140/90 mmHg dan <160/110 mmHg, berat badan mengalami peningkatan 1 kg per minggu. protein urinaria >0,3 gr/dl dalam kurun waktu 24 jam atau +1, serta adanya pembengkakan pada tungkai serta wajah pada pemeriksaan fisik umum.

2) Data objektif (O)

Hasil pemeriksaan yang didapatkan oleh bidan atau objektif meliputi adanya tekanan darah >140/90 mmHg dan <160/110 mmHg, berat badan mengalami peningkatan 1 kg per minggu, protein urinaria >0,3 gr/dl dalam kurun waktu 24 jam atau +1, serta adanya pembengkakan pada tungkai serta wajah pada pemeriksaan fisik umum.

3) Assasment (A)

Setelah dilakukan anamnesis serta pemeriksaan fisik umum dan penunjang ditemukan adanya tanda-tanda seperti tekanan darah >140/90 mmHg, protein urine +1 nyeri kepala, pandangan kabur, serta pembengkakan pada tungkai maka dapat didiagnosis preeklampsia ringan.

4) Planning (P)

Bagi ibu hamil dengan preeklampsia ringan, akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan rutin setiap minggu. namun jika setelah 2 minggu perawatan rawat jalan tidak ada perubahan, maka perawatan rawat inap adalah jika berat badan ibu bertambah 1 kg atau lebih perminggu selama 2 minggu berturut turut ,atau jika terdapat suatu atau lebih dari 1 gejala preeklampsia berat.

Jika setelah 1 minggu perawatan rawat inap tidak terjadi perubahan, maka preeklampsia ringan dianggap sebagai preeklampsia berat. Namun, jika kondisi pasien membaik sebelum 1 minggu perawatan rawat inap dan ibu dalam keadaan baik, maka pasien akan melanjutkan pengobatan selama 2 hari lagi sebelum diperbolehkan pulang.

Perawatan akan dilanjutkan secara rawat jalan. Serta dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah tekanan darahnya sudah kembali normal atau tidak, apakah protein urinenya masih positif atau negatif, apakah sudah tidak ada edema, serta keluhan keluhan yang ibu keluhkan sebelumnya sudah hilang atau berkurang.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY “N” DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
TANGGAL 25 MEI 2024**

No. Register :xxxxxx
Tanggal Masuk :25 Mei 2024 pukul : 11.40 wita
Tanggal Pengkajian :25 Mei 2024 pukul : 11.40 wita
Pengkaji : Nurfadillah Istiqomah

Langkah I: Identifikasi Data Dasar

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny “N”/Tn “R”
Umur :19 tahun/22 tahun
Nikah/lamanya :1x ± 1 tahun
Suku : makassar/Makassar
Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMA/SMA
Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
Alamat : Jl xxx

B. Riwayat keluhan utama

1. Keluhan utama: ibu datang ke puskesmas kassi-kassi dengan keluhan sakit kepala disertai dengan pembengkakan pada kaki

2. Riwayat keluhan utama: ibu mengatakan telah mengalami sakit kepala serta pembengkakan pada kaki sejak 3 hari yang lalu yaitu pada tanggal 22 Mei 2024

C. Riwayat kehamilan sekarang

1. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya
2. HPHT Tanggal 26 Oktober 2023
3. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 7 bulan
4. Ibu merasakan pergerakan janin pertama kali usia kehamilan 5 bulan
5. Ibu mengatakan pergerakan janin kuat dirasakan pada kuadran kanan perut ibu hingga sekarang
6. Ibu melakukan kunjungan Antenatal care sebanyak 3 x dan mendapatkan imunisasi *Tetanus Toksoid* pada tanggal 25 Mei 2024

Tabel kunjungan antenatal care 3.1

No	tanggal	Kunjungan ke	BB	TD	Keluhan
1.	06 Desember 2023	Pertama	50 kg	120/70 mmHg	Mual
2.	14 Februari 2024	Kedua	55 kg	120/70 mmHg	Tidak ada
3.	13 Maret 2024	Ketiga	58 kg	120/70 mmHg	Tidak ada

D. Riwayat menstruasi

Ibu mendapatkan men pertama pada usia \pm 12 tahun, siklus menstruasi 28 hari, lamanya 3-5 hari, dan mengalami Disminorhe sedang pada saat terjadi menstruasi.

E. Riwayat keluarga berencana

Ibu tidak pernah memakai alat kontrasepsi apapun sebelumnya

F. Riwayat Kesehatan lalu

1. Ibu tidak mempunyai Riwayat penyakit menular dan menurun
2. Ibu tidak mempunyai Riwayat penyakit asma, DM dan jantung
3. Ibu tidak mempunyai Riwayat alergi terhadap makanan dan obat-obatan
4. Ibu tidak mempunyai Riwayat hipertensi sebelumnya dan tekanan darah pada saat sebelum hamil dalam batas normal yaitu antara 100-120 mmHg, dan diastole 70-90 mmHg
5. Ibu tidak mempunyai Riwayat ketergantungan obat-obatan terlarang, alcohol ataupun rokok.

G. Riwayat social budaya, ekonomi dan spiritual

1. Ini merupakan pernikahan yang pertama
2. Keluarga serta suami sangat senang dengan kehamilan ibu
3. Pengambil Keputusan utama dalam keluarga adalah suami

4. Ibu merasa sedikit cemas dengan keadaanya yang sekarang
5. Tulang punggung dalam rumah tangga adalah suami
6. ibu senantiasa berdoa untuk Kesehatan dirinya dan bayinya.

H. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1. Nutrisi

Sebelum hamil	Selama hamil
Makan :3 x sehari,	Makan :3 x
jenis makanan dan sayur,	jenis makan nasi,lauk nasi, lauk dan sayur
dengan porsi sedang	dengan porsi sedang
Minum :7-8 gelas sehari	Minum: 6-8 gelas sehari

2. Eliminasi

Sebelum hamil	Selama hamil
BAB :1 x sehari	BAB : 1-2 x sehari
BAK :3-4 x sehari	BAK : 4-5 X sehari

3. Istirahat

Sebelum hamil	Selama hamil
Tidur siang :1 jam sehari	Tidur malam : 7-8 jam sehari
Tidur malam : 7-8 jam sehari	Tidur siang :1-2 jam sehari

4. Personal hygiene

Sebelum hamil

Mandi :2x sehari dengan menggunakan sabun mandi

Mengganti pakaian :2 x sehari

Sikat gigi : 2 x sehari dengan pasta gigi

Keramas :3 x seminggu dengan menggunakan shampo

Selama hamil : tidak ada perubahan

I. Pemeriksaan Fisik Umum

1. Keadaan umum ibu lemah

2. Kesadaran komposmentis

3. HTP :03 Agustus 2024

4. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah :150/100 mmHg

Nadi : 83 x permenit

Suhu :36,6° C

Pernafasan :20 x permenit

5. Tinggi badan :162 cm

6. Lila :30 cm

7. Berat badan sebelum hamil:50 Kg

Berat badan selama hamil : 62 Kg

8. Pemeriksaan fisik head to toe

- a. Wajah : simetris kiri kanan,tidak ada cloasma gravidarum, ibu tampak sedikit cemas
- b. Mata : kedua mata ibu tidak anemis dan tidak icterus
- c. Mulut : bibir tidak pucat,tidak ada caries pada gigi, tidak ada gigi yang tanggal, lidah bersih
- d. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar limfe,tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid serta vena jugularis
- e. Payudara : payudara, simetris kiri kanan, hiperpigmentasi areola mammae, putting susu menonjol, serta tidak terdapat benjolan dan nyeri tekan
 - a. Abdomen : tidak terdapat luka bekas operasi,terdapat striae gravidarum dan linea nigra, pembesaran perut sesuai usia kehamilan
 - Leopold I : TFU Pertengahan pusat dan *prosesus xipioideus*, 27 cm, teraba bokong
 - Leopold II : PUKI
 - Leopold III : Kepala
 - Leopold IV : BAP
 - LP : 98 cm
 - TBJ : 2.646 gram

Auskultasi : Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah
perut ibu, teratur frekuensi 147 x permenit

- f. Genetalia : tidak ada odema dan varises
- g. Anus : tidak terdapat *hemoroid*
- h. Ekstramitas : Simetris kiri dan kanan, tidfak ada varises,terdapat odema pada kedua kaki, refleks patella kanan(+), kiri (+).

9. Pemeriksaan penunjang

a. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 12,5 gr/dl

Albumin : positif 1 (+)

Reduksi : negatif (-)

HbsAg : Negatif (-)

Gol darah : 0

b. Pemeriksaan USG

Telah melakukan pemeriksaan USG pada tanggal 25 Mei 2024 dilakukan oleh dr obgyne Hasil USG : Tunggal, Hidup, Presentase Kepala, Usia Kehamilan 30-32 Minggu, Jenis Kelamin Laki-laki,TBJ 2.700 gram.

Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Diagnosa: G1P0A0, Gestasi 30 minggu 1 Hari, Situs Memanjang, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik dengan keadaan ibu preeklampsia ringan,

1. G1P0A0

a. Data subjektif

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya, ibu merasakan Gerakan janin pertama kali pada usia kehamilan \pm 5 bulan hingga sekarang.

b. Data objektif

Tampak linea nigra dan striae alba, tidak ada luka bekas operasi, pembesaran perut sesuai usia kehamilan

Leopold I : TFU pertengahan pusat dan *processus xipioideus* 27 cm

teraba bokong

Leopold II : PUKI

LEOPOLD III : Kepala

Leopold IV : BAP

Auskultasi : Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 147 x permenit.

c. Analisa dan interpretasi data

Pada saat melakukan pemeriksaan abdomen terdapat linea nigra dan striae gravidarum yang menandakan bahwa kehamilan pertama, terdengarnya denyut jantung janin serta terabanya bagian bagian janin merupakan salah satu tanda bahwa terjadi kehamilan (Prawihardjo, 2014)

2. Gestasi 30 minggu 1 hari

a. Data subjektif

Ibu mengatakan hari pertama haid terakhirnya tanggal 26 oktober 2023, dan ibu mengatakan bahwa usia kehamilannya sekarang yaitu ± 7 bulan.

b. Data objektif

Leopold I: TFU Pertengahan pusat dan *proessus xipoideus*, 27 cm, teraba bokong, berdasarkan rumus *niagle* taksiran persalinan 03 Agustus 2024

c. Analisa dan interpretasi data

Pada perhitungan usia kemilan menggunakan rumus niagle dari HPHT tanggal 26 Oktober 2023 sampai tanggal pengkajian 25

Mei 2024 maka didapatkan bahwa usia kehamilan pada saat ini adalah 30 minggu 1 hari (fajar, 2016)

3. Situs memanjang

a. Data subjektif

Ibu mengatakan pergerakan jain kuat dirasakan pada kuadran kanan perut ibu hingga sekarang

a. Pada pemeriksaan palpasi

Leopold I : TFU Pertengahan pusat dan *prosesus xipoides*, 27 cm, teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

Auskultasi : Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 147 x permenit.

b. Analisa dan interpretasi data

Salah satu tanda bahwa telah terjadi kehamilan secara pasti yaitu terabanya janin atau bagian-bagian tubuh janin di dalam rahim, dan terdengarnya denyut jantung janin. Selain palpasi harus juga didukung dengan pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) agar lebih jelas gambaran bagian bagian janin, bentuk janin, serta tampaknya kantong kehamilan (kasmiasi, 2023).

4. Intrauterine

a. Data subjektif

Ibu mengatakan pergerakan janin kuat pada kuadran kanan perut ibu

b. Data objektif

Ibu tidak merasakan nyeri pada saat pemeriksaan palpasi pada abdomen, TFU sesuai dengan usia kehamilan dan pada saat pemeriksaan Leopold teraba bagian janin

Leopold I : TFU Pertengahan pusat dan *prosesus xiploideus*, 27 cm,
teraba bokong

Leopold II : PUKI Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

pemeriksaan USG menunjukkan adanya kantong kemilan.

c. Analisa dan interpretasi data

Kehamilan intrauterine dapat dipastikan sejak awal kehamilan, yaitu pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, janin teraba dan berada didalam rahim (chandranita, dkk 2010)

5. Tunggal

a. Data subjektif

Ibu mengatakan pergerakan janin kuat pada kuadran kanan perut ibu

b. objektif

Ibu tidak merasakan nyeri pada saat pemeriksaan palpasi pada abdomen, pemeriksaan USG menunjukkan adanya kantong kemilan, TFU sesuai dengan usia kehamilan dan pada saat

pemeriksaan Leopold teraba bagian janin

Leopold I : TFU Pertengahan pusat dan *prosessus xipioideus*, 27 cm, teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

Auskultasi : Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 147 x permenit.

c. Analisa dan interpretasi data

Dikatakan janin Tunggal apabila pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan palpasi didapatkan 1 kepala, 1 punggung, dan djj terdengar jelas kuat dan teratur pada 1 titik perut ibu (Mangkuji,dkk, 2012).

6. Hidup

a Data subjektif

Ibu mengatakan pergerakan jain kuat dirasakan pada kuadran kanan perut ibu hingga sekarang

b objektif

Auskultasi : Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 147 x permenit.

c Analisa dan interpretasi data

Untuk dapat menegakkan diagnose janin hidup dan dalam keadaan baik ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan yaitu djj terdengar jelas kuat dan teratur dengan frekuensi 120-160x permenit,serta terdapat gerakan aktif pada janin (Prawihardjo 2014).

7. Keadaan janin baik

a Data subjektif

Ibu mengatakan pergerakan janin kuat dirasakan pada kuadran kanan perut ibu hingga sekarang

b Data objektif

Auskultasi: Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 147 x permenit.

c Analisa dan interpretasi data

Pada ibu yang pertamakali hamil pergerakan janin akan dirasakan pada usia kehamilan \pm 18 sampai 20 minggu sedangkan pada ibu multigravida dapat merasakan pergerakan janin lebih awal yaitu usia kehamilan \pm 16 minggu,dengan frekuensi denyut jantung janin 120-160 x permenit (pantiawati,2010).

8. Ibu dengan preeklampsia ringan

a. Data subjektif

Ibu mengeluh sakit kepala dan pusing disertai pembengkakan pada kedua kaki dari 3 hari yang lalu yaitu pada tanggal 22 Mei 2024, ibu tidak mempunyai Riwayat hipertensi sebelum hamil ataupun riwayat hipertensi dari keluarga

b. Data objektif

Tekanan darah : 150/100 mmHg

Ekstremitas : terdapat odema pada kedua kaki

Albumin : positif 1 (+)

c. Analisa dan interpretasi data

Preeklampsia merupakan penyakit yang menyerang ibu hamil yang dapat ditandai dengan peningkatan tekanan darah ($TD \geq 140/90$ mmHg), edema (pembengkakan pada tungkai dan wajah) dan proteinuria (kadar protein dalam urine meningkat) (Haslan 2022).

Langkah III : Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial

Diagnosa potensial : kematian janin dalam Rahim, premature, solusio placenta pertumbuhan janin terhambat, preeklampsia berat dan kematian.

1. Data subjektif

Ibu mengeluh sakit kepala dan pusing disertai pembengkakan pada kedua kaki dari 3 hari yang lalu yaitu pada tanggal 22 Mei 2024, ibu tidak

mempunyai Riwayat hipertensi sebelum hamil ataupun riwayat hipertensi dari keluarga.

2. Data objektif

Tekanan darah : 150/100 mmHg

Ekstremitas : terdapat odema pada kedua kaki

Albumin : positif 1 (+)

3. Analisa dan interpretasi data

kerusakan pembuluh darah akan merusak system vaskularisasi darah, yang mengganggu pertukaran oksigen dan nutrisi melalui plasenta dari ibu ke janin, sehingga akan menyebabkan kematian janin dalam rahim.

Preeklampsia dapat menyebabkan kelahiran prematur dikarenakan ibu hamil yang memiliki tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit, yang akan mengurangi pasokan oksigen ke organ dan janin.

Solusio plasenta merupakan keadaan plasenta yang terlepas ataupun terkelupas sebelum mencapai kala III, tempat implantasi normal plasenta yaitu terletak pada fundus atau corpus uteri.

Ibu yang mengalami preeklampsia akan sangat berpengaruh pada pembuluh darah arteri yang akan mengalirkan darah ke placenta, apabila placenta tidak mendapat pasokan darah yang memadai maka akan berdampak pada pasokan oksigen dan nutrisi bayi didalam

kandungan ibu. Hal tersebut yang menyebabkan pertumbuhan janin akan terhambat.

Preeklampsia berat merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah pada saat kehamilan, dimana hasil pemeriksaan tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih disertai dengan adanya protein urinaria serta edema pada usia kehamilan diatas 20 minggu (Kasmiati 2023).

Preeklampsia yang tidak ditangani sedini mungkin dan terus berlanjut kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian pada penderitanya, dengan cara merusak terlebih dahulu merusak organorgan seperti jantung. Pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, maka akan menyebabkan jantung bekerja lebih ekstra dari biasanya dikarenakan tekanan darah yang tinggi. Oleh karena jantung yang harus bekerja lebih keras maka akan menyebabkan otot jantung menjadi kaku dan bengkak.

Langkah IV : Perlunya Tindakan Segera Kolaborasi dan Rujukan

Apabila mengalami kejang atau syok maka akan dilakukan tindakan segera dan berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk tindakan emergency atupun melakukan rujukan. sebelum merujuk tenaga kesehatan dapat memberikan MgSO₄ pada pasien preeklampsia/eklampsia sebagai upaya tenaga kesehatan mencegah kejang ataupun kejang berulang.

Langkah V : Rencana Tindakan

Tanggal 25 Mei 2024 Pukul 11.45 wita

1. Tujuan

- a. Keadaan ibu dan janin baik
- b. Preeklampsia ringan teratasi
- c. Kehamilan berlangsung normal hingga aterm

2. Kriteria

a. TTV dalam batas normal

1) Tekanan darah: sistole:90-120 mmHg

Diastole: 60-90 mmHg

2) Nadi : 60-100 kali permenit

3) Pernafasan : 16-24 kali permenit

4) Suhu : 36,5-37,5°C

b. Tidak adanya protein urine

c. Preeklampsia dapat teratasi dengan tekanan darah dalam baas normal, tidak terdapat protein urine,serta tidak adanya tanda bahaya pada ibu dan janin

d. Odema pada kaki ibu berkurang atau sembuh

e. Djj bayi dalam batas normal 120-160 kali permenit

3. Intervensi

Tanggal 25 Mei 2024 Pukul 11.35 wita

- a. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga bahwasanya tekanan darah ibu diatas batas normal, serta adanya protein urine yang merupakan salah satu tanda bahaya pada kehamilan

Rasional: Agar Ibu mengetahui tentang kondisi dirinya, perkembangan kehamilan dan pertumbuhan janinnya

- b. Memberikan edukasi pada ibu tentang preeklampsia ringan serta cara mengatasi dan memantau preeklampsia agar tidak bertambah parah

Rasional : dengan memberikan edukasi pada ibu tentang preeklampsia maka ibu dapat mengerti dengan kondisi yang sedang ibu alami saat ini,serta agar ibu dapat memantau apabila ada tandatanda yang sudah mengarah pada preeklampsia berat.

- c. Memberikan HE tentang

- 1) Istirahat yang cukup

Rasional : adanya fungsi fisiologis pada tubuh maka istirahat merupakan hal yang sangat penting dijaga bagi ibu hamil karena akan sangat mempengaruhi beban kerja jantung serta sebagai relaksasi pada otot-otot.

- 2) Nutrisi yang cukup

Rasional : Pada saat ibu hamil ini merupakan fase dimana ibu mengalami fase stres fisiologis yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. ibu hamil juga sangat rawan terkena masalah malnutrisi.

3) Menjaga personal hygiene

Rasional: Ibu hamil harus menjaga personal hygiene dikarenakan pada saat hamil terjadinya peningkatan sekresi lendir pada vagina serta peningkatan frekuensi BAK yang akan mengakibatkan daerah vagina menjadi lembab.

d. Menjelaskan pada 10 tanda bahaya kehamilan

Rasional: dengan mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan maka ibu dapat mengenali dan mengantisipasi jika terdapat salah satu tanda bahaya yang dialami oleh ibu, hal ini juga sebagai deteksi dini dan pencegahan terjadinya tanda bahaya kehamilan pada ibu

e. Memeriksa denyut jantung janin

Rasional : memastikan janin dalam keadaan baik

f. Memberikan dukungan psikologis serta spiritual pada ibu dengan melibatkan keluarga dan suami

Rasional : memberikan dukungan psikologis dan spiritual dapat membantu proses pemulihan ibu agar ibu lebih semangat dan optimis dengan keadaanya.

g. Memberikan terapi obat nefidipin 10 mg 1x1 per oral

Rasional : untuk membantu penurunan tekanan darah pada ibu

Langkah VI : implementasi

Tanggal 25 Mei 2024 Pukul 11.45 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga bahwasanya tekanan darah ibu diatas batas normal, serta adanya protein urine yang merupakan salah satu tanda bahaya pada kehamilan

Hasil: ibu mengerti dengan keadaanya dan merasa cemas dengan keadaannya

2. Memberikan edukasi pada ibu tentang preeklampsia ringan serta cara mengatasi dan memantau preeklampsia agar tidak bertambah parah

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan bidan

3. Memberikan HE tentang

- a. Nutrisi

Pada saat ibu hamil ini merupakan fase dimana ibu mengalami fase stres fisiologis yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. ibu hamil juga sangat rawan terkena masalah malnutrisi. Menganjurkan ibu mengkonsumsi makan bergizi dan melakukan diet rendah garam.

- b. Istirahat yang cukup

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang 1-2 jam,tidur malam 7-8 jam

c. Personal hygiene

Menganjurkan ibu menjaga personal hygiene dengan mengganti pakasian dan CD tiap kotor atau lembab agar mencegah terjadinya infeksi

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan anjuran bidan

4. Menjelaskan pada 10 tanda bahaya kehamilan

- a. Sakit kepala yang menetap
- b. Mual muntah berlebihan
- c. Pergerakan janin kurang aktif
- d. Nyeri perut yang hebat
- e. Pendarahan pervaginam
- f. Kejang
- g. Demam
- h. Pandangan kabur
- i. Bengkak pada wajah serta ekstremitas
- j. Ketuban pecah dini

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan bidan

5. Memeriksa denyut jantung janin

Hasil : djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 147 x permenit

6. Memberikan dukungan psikologis serta spiritual pada ibu dengan melibatkan keluarga dan suami, menganjurkan ibu untuk mengurangi stress serta senantiasa berdoa untuk kesehatan ibu dan janinnya

Hasil : ibu merasa tenang

7. Memberikan terapi obat nefidipin 10 mg 1x1 per oral Hasil telah diberikan obat nefidipin 10 mg 1x1 per oral.

Langkah VII : Evaluasi

Tanggal 25 Mei 2024 Pukul 11.40 wita

1. Keadaan ibu preeklampsia ringan ditandai dengan

Tekanan darah : 150/100 mmHg

Albumin positif 1 (+)

Ekstramitas : terdapat odema pada kedua kaki

2. Keadaan janin baik ditandai dengan djj janin dalam batas normal
3. Tidak terjadi syok pada ibu
4. Ibu telah mengerti dengan keadaanya
5. Ibu mengerti dengan penjelasan bidan tentang nutrisi,istirahat,dan personal hygiene
6. Ibu mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan
7. Ibu merasa tenang setelah di berikan dukungan psikologis dan spiritual
8. Ibu telah diberikan obat nefidipin 10 mg 1x1 per oral.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY "N" DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
TANGGAL 28 MEI 2024**

No. Register :xxxxxxx

Tanggal Kunjungan :28 Mei 2024 Pukul: 16.00. wita

Tanggal Pengkajian :28 Mei 2024 Pukul: 16.00 wita

Pengkaji : Nurfadillah Istiqomah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "N"/Tn "R"

Umur :19 tahun/22 tahun

Nikah/lamanya :1x ± 1 tahun

Suku : makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : IRT/Wiraswasta

Alamat : Jl xxx

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih sakit kepala
2. Ibu mengatakan masih terdapat bengkak pada kedua kaki
3. Ibu mengatakan HPHT Tanggal 28 Oktober 2023

4. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
5. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 7 bulan
6. Ibu mengatakan merasakan pergerakan janinnya pertama kali pada usia kehamilan \pm 5 bulan
7. mengatakan merasakan pergerakan janinnya kuat di rasakan pada sebelah kanan perut ibu
8. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut hebat saat hamil
9. Ibu mengatakan telah mendapatkan imunisasi hepatitis 1x di puskesmas kassi-kassi tanggal 25 mei 2023
10. Ibu mengatakan sedikit cemas dengan keadaannya sekarang
11. Ibu mengatakan tidak mempunyai Riwayat hipertensi, dm dan jantung sebelumnya

Data objektif (O)

1. Keadaan ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HPL: 03 Agustus 2024
4. Usia Kehamilan 30 minggu 4 hari
5. TB : 162 cm
6. BB sebelum hamil : 50 Kg

BB sekarang : 62 Kg
7. LILA : 30 cm
8. TTV
Tekanan darah : 140/100
Suhu : 36,5 °c
Nadi : 83x permenit
Pernafasan : 21x permenit

9. Pemeriksaan head to toe

a. Wajah

Wajah simetris kiri kanan, ekspresi ibu tampak sedikit cemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak terdapat odema dan nyeri tekan

b. Mata

Mata simetris kiri kanan conjungtiva merah muda sklera putih

c. Mulut

Bibir lembab, gigi tidak ada yang tanggal serta tidak terdapat caries pada gigi

d. Leher

Tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan vena jugularis

e. Payudara

Payudara simetris kiri kanan, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak terdapat benjolan dan nyeri tekan

f. Abdomen

Inspeksi: Tampak linea nigra dan striae livide, tidak ada luka bekas operasi, pembesaran perut sesuai usia kehamilan.

Palpasi:

Leopold I : TFU Pertengahan pusat dan *prosesus xiphoideus*,
28 cm, teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 101 cm

TBJ : 2.828

Auskultasi: DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 146 x permenit

g. Genetalia

Tidak ada odema dan nyeri tekan

h. Anus

Tidak ada hemoroid

i. Ekstramitas

Ekstramitas simetris kiri kanan, terdapat oedema dan tidak ada varises. Refleks patella kanan (+) kiri (+).

j. Pemeriksaan laboratorium

1) Hb : 12,5 gr/dl

2) Albumin : positif 1 (+)

3) Reduksi :-

4) Golongan darah :-

5) HbsAg :-

6) USG : Telah melakukan pemeriksaan USG pada

tanggal 25 Mei 2024 dilakukan oleh dr obgyne Hasil USG :

Tunggal, Hidup, Presentase Kepala, Usia Kehamilan 30-32

Minggu, Jenis Kelamin Laki-laki, TBJ 2.700 gram.

Assasment (A)

Diagnosa Aktual: GIP0A0, Gestasi 31 minggu Situs Memanjang, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik dengan keadaan ibu preeklampsia ringan

Diangosa Potensial: Antisipasi terjadi preeklampsia berat serta pertumbuhan janin terhambat

Planning (P)

Tanggal 28 Mei 2024 Pukul 16.00 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan bahwa ibu masih dalam keadaan preeklampsia ringan

Hasil : ibu mengerti dengan keadaannya dan tampak sedikit cemas

2. Memantau denyut jantung janin

Hasil: Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu teratur, dengan frekuensi 146x/i

3. Memberikan *health education* (HE) Tentang

a. Istirahat yang cukup

Istirahat/tidur pada malam hari 7-8 jam dan tidur pada siang hari 1-2 jam

b. Nutrisi

Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, susu dan sayur-sayuran hijau, minum lebih banyak air putih, dan menganjurkan ibu menghindari makanan junkfood

c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu menjaga personal hygiene dengan mengganti pakaian 2x sehari, dan mengganti CD apabila kotor atau lembab.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan.

4. Menjelaskan pada ibu 10 tanda bahaya kehamilan

- a. Sakit kepala yang menetap
- b. Mual muntah berlebihan
- c. Pergerakan janin kurang aktif
- d. Nyeri perut yang hebat
- e. Pendarahan pervaginam
- f. Kejang
- g. Demam

- h. Pandangan kabur
- i. Bengkak pada wajah serta ekstremitas
- j. Ketuban pecah dini

Hasil : ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya pada kehamilan

5. Menganjurkan ibu untuk merendam kakinya dengan air hangat dengan tambahan sedikit garam agar memperlancar peredaran darah, perendaman ini dilakukan selama 15-20 menit.

Hasil : ibu bersedia mengikuti arahan bidan

6. Memberikan terapi obat nefidipin 10 Mg 1x1 per oral sesuai dengan instruksi dokter untuk diminum setiap hari

Hasil: ibu bersedia mengkonsumsi obat yang diberikan

7. Memberikan dukungan psikologis dengan menganjurkan ibu mengurangi stress dan tidak perlu khawatir dengan keadaannya sekarang

Hasil: ibu merasa lega dengan penjelasan bidan

8. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa demi Kesehatan ibu dan janinnya dan menganjurkan ibu untuk membaca doa Ketika sakit

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنَا أَنْتَارُ حَمَلًا رَبِّمِينِ

Hasil : ibu merasa lebih tenang

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY "N" DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
TANGGAL 31 MEI 2024**

No. Register :xxxxxxx

Tanggal Kunjungan :31 Mei 2024 Pukul: 15.00. wita

Tanggal Pengkajian :31 Mei 2024 Pukul: 15.00 wita

Pengkaji : Nurfadillah Istiqomah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "N"/Tn "R"

Umur :19 tahun/22 tahun

Nikah/lamanya :1x ± 1 tahun

Suku : makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : IRT/Wiraswasta

Alamat : Jl xxx

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sakit kepalanya sudah mulai berkurang
2. . Ibu mengatakan masih terdapat bengkak pada kedua kaki
3. Ibu mengatakan HPHT Tanggal 28 Oktober 2023

4. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
5. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 7 bulan
6. Ibu mengatakan merasakan pergerakan janinnya pertama kali pada usia kehamilan \pm 5 bulan
7. mengatakan merasakan pergerakan janinnya kuat di rasakan pada sebelah kanan perut ibu
8. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut hebat saat hamil
9. Ibu mengatakan telah mendapatkan imunisasi hepatitis 1x di puskesmas kassi-kassi tanggal 25 mei 2023
10. Ibu mengatakan sedikit cemas dengan keadaannya sekarang
11. Ibu mengatakan tidak mempunyai Riwayat hipertensi, dm dan jantung sebelumnya

Data objektif (O)

1. Keadaan ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HPL : 03 Agustus 2024
4. Usia Kehamilan 31 minggu
5. TB : 162 cm
6. BB sebelum hamil :50 Kg
BB sekarang : 62 Kg

7. LILA : 30 cm

8. TTV

Tekanan darah : 140/100

Suhu : 36,5 °c

Nadi : 85 x permenit

Pernafasan : 20x permenit

9. Pemeriksaan head to tue

a. Wajah

Wajah simetris kiri kanan, ekspresi ibu tampak sedikit cemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak terdapat odema dan nyeri tekan

b. Mata

Mata simetris kiri kanan tidak congiungtiva merah muda sklera putih

c. Mulut

Bibir lembab, gigi tidak ada yang tanggal serta tidak terdapat caries pada gigi

d. Leher

Tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid, tidak ada pembesaran kelenjar live dan vena jugularis

e. Payudara

Payudara simetris kiri kanan, putting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak terdapat benjolan dan nyeri tekan

f. Abdomen

Inspeksi: Tampak linea nigra dan striae livide, tidak ada luka bekas operasi, pembesaran perut sesuai usia kehamilan.

Palpasi:

Leopold I : TFU Pertengahan pusat dan *prosessus xipioideus*,

28 cm, teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 101 cm

TBJ : 2.828

Auskultasi : DJJ terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 145 x permenit

g. Genitalia

Tidak ada odema dan nyeri tekan

h. Anus

Tidak ada hemoroid

i. Ekstramitas

Esktramitas simetris kiri kanan, terdapat oedema dan tidak ada varises. refleks patella kanan (+) kiri (+).

j. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 12,5 gr/dl

Albumin : positif 1 (+)

Reduksi : -

Golongan darah : -

HbsAg : -

USG : Telah melakukan pemeriksaan USG pada tanggal

25 Mei 2024 dilakukan oleh dr obgyne Hasil USG : Tunggal,

Hidup, Presentase Kepala, Usia Kehamilan 30-32 Minggu, Jenis

Kelamin Laki-laki, TBJ 2.700 gram.

Assasment (A)

Diagnosa Aktual: GIP0A0, Gestasi 31 minggu Situs Memanjang, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik dengan keadaan ibu preeklampsia ringan

Diangosa Potensial: Antisipasi terjadi preeklampsia berat serta pertumbuhan janin terhambat

Planning (P)

Tanggal 31 Mei 2024 Pukul 15.10 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan bahwa ibu masih dalam keadaan preeklampsia ringan

Hasil : ibu mengerti dengan keadaannya dan tampak sedikit cemas

2. Memantau denyut jantung janin

Hasil: Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu teratur, dengan frekuensi 145x/i

3. Memberikan *health education* (HE) Tentang

a. Istirahat yang cukup

Istirahat/tidur pada malam hari 7-8 jam dan tidur pada siang hari 1-2 jam

b. Nutrisi

Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, susu dan sayur-sayuran hijau, minum lebih banyak air putih,

dan menganjurkan ibu untuk diet rendah garam serta menganjurkan ibu menghindari makanan junkfood

c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu menjaga personal hygiene dengan mengganti pakaian 2x sehari, dan mengganti CD apabila kotor atau lembab.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan

4. Menjelaskan pada ibu 10 tanda bahaya kehamilan

- a. Sakit kepala yang menetap
- b. Mual muntah berlebihan
- c. Pergerakan janin kurang aktif
- d. Nyeri perut yang hebat
- e. Pendarahan pervaginam
- f. Kejang
- g. Demam
- h. Pandangan kabur

- i. Bengkak pada wajah serta ekstremitas
- j. Ketuban pecah dini

Hasil : ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya pada kehamilan

5. Menganjurkan ibu untuk merendam kakinya dengan air hangat dengan tambahan sedikit garam agar memperlancar peredaran darah, perendaman ini dilakukan selama 15-20 menit.

Hasil : ibu bersedia mengikuti arahan bidan

6. Memberikan terapi obat nefidipin 10 Mg 1x1 per oral sesuai dengan instruksi dokter untuk diminum setiap hari

Hasil : ibu bersedia mengonsumsi obat yang diberikan

7. Memberikan dukungan psikologis dengan menganjurkan ibu mengurangi stress dan tidak perlu khawatir dengan keadaannya sekarang, menganjurkan ibu

Hasil : ibu merasa lega dengan penjelasan bidan

8. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa demi Kesehatan ibu dan janinnya dan menganjurkan ibu untuk membaca doa Ketika sakit

وَأَيُّهَا ذُنَادِي رَبِّهَا نِمَسْنِي الضَّرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ

Hasil : ibu merasa lebih tenang

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY "N" DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
TANGGAL 04 JUNI 2024**

No. Register :xxxxxx

Tanggal Kunjungan :04 Juni 2024

Pukul: 17.00. wita

Tanggal Pengkajian :04 Juni 2024

Pukul: 17.00 wita

Pengkaji : Nurfadillah Istiqomah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "N"/Tn "R"

Umur :19 tahun/22 tahun

Nikah/lamanya :1x ± 1 tahun

Suku : makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : IRT/Wiraswasta

Alamat : Jl xxx

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sakit kepalanya sudah mulai berkurang
2. . Ibu mengatakan bengkak pada kakinya sudah mulai berkurang
3. Ibu mengatakan HPHT Tanggal 28 Oktober 2023

4. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
5. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 7 bulan
6. Ibu mengatakan merasakan pergerakan janinnya pertama kali pada usia kehamilan \pm 5 bulan
7. mengatakan merasakan pergerakan janinnya kuat di rasakan pada sebelah kanan perut ibu
8. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut hebat saat hamil
9. Ibu mengatakan sedikit cemas dengan keadaannya sekarang
10. Ibu mengatakan tidak mempunyai Riwayat hipertensi, dm dan jantung sebelumnya

Data objektif (O)

1. Keadaan ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HPL : 03 Agustus 2024
4. Usia Kehamilan 31 minggu 4 hari
5. TB : 162 cm
6. BB sebelum hamil : 50 Kg
BB sekarang : 64 Kg
7. LILA : 30 cm

8. TTV

Tekanan darah : 130/90

Suhu : 36,5 °c

Nadi : 86 x permenit

Pernafasan : 20x permenit

9. Pemeriksaan head to toe

a. Wajah

Wajah simetris kiri kanan, ekspresi ibu tampak sedikit cemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak terdapat odema dan nyeri tekan

b. Mata

Mata simetris kiri kanan tidak conjungtiva merah muda sklera putih

c. Mulut

Bibir lembab, gigi tidak ada yang tanggal serta tidak terdapat caries pada gigi

d. Leher

Tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid, tidak ada pembesaran kelenjar live dan vena jugularis

e. Payudara

Payudara simetris kiri kanan, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak terdapat benjolan dan nyeri tekan

f. Abdomen

Inspeksi: Tampak linea nigra dan striae livide, tidak ada luka bekas operasi, pembesaran perut sesuai usia kehamilan.

Palpasi:

Leopold I : TFU Pertengahan pusat dan *proessus xipoideus*,

28 cm, teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 101 cm

TBJ : 2.856

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 144 x permenit

g. Genetalia

Tidak ada odema dan nyeri tekan

h. Ekstramitas

Ekstramitas simetris kiri kanan, terdapat oedema dan tidak ada varises. refleks patella kanan (+) kiri (+)

i. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 12,5 gr/dl

Albumin : positif 1 (+)

Reduksi : -

Golongan darah : -

HbsAg : -

USG : Telah melakukan pemeriksaan USG pada tanggal

25 Mei 2024 dilakukan oleh dr obgyne Hasil USG : Tunggal, Hidup, Presentase Kepala, Usia Kehamilan 30-32 Minggu, Jenis Kelamin Laki-laki, TBJ 2.700 gram.

Assasment (A)

Diagnosa Aktual: GIP0A0, Gestasi 31 minggu 4 hari Situs Memanjang, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik dengan keadaan ibu preeklampsia ringan .

Diangosa Potensial: Antisipasi terjadi preeklampsia berat serta pertumbuhan janin terhambat .

Planning (P)

Tanggal 04 Juni 2024 Pukul 17.05 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan bahwa tekanan darah ibu sudah mulai menurun dari sebelumnya
Hasil : ibu mengerti dengan keadaannya dan ibu tampak sedikit lega dengan penjelasan bidan
2. Memantau denyut jantung janin
Hasil: Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu teratur, dengan frekuensi 144x/i
3. Memberikan *health education* (HE) Tentang

a. Istirahat yang cukup

Istirahat/tidur pada malam hari 7-8 jam dan tidur pada siang hari 1-2 jam

b. Nutrisi

Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, susu dan sayur-sayuran hijau, minum lebih banyak air putih, dan menganjurkan ibu untuk diet rendah garam serta menganjurkan ibu menghindari makanan junkfood

c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu menjaga personal hygiene dengan mengganti pakaian 2x sehari, dan mengganti CD apabila kotor atau lembab.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan

4. Menjelaskan pada ibu 10 tanda bahaya kehamilan

- a. Sakit kepala yang menetap
- b. Mual muntah berlebihan
- c. Pergerakan janin kurang aktif
- d. Nyeri perut yang hebat
- e. Pendarahan pervaginam
- f. Kejang
- g. Demam
- h. Pandangan kabur
- i. Bengkak pada wajah serta ekstremitas
- j. Ketuban pecah dini

Hasil: ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya pada kehamilan

5. Menganjurkan ibu untuk merendam kakinya dengan air hangat dengan tambahan sedikit garam agar memperlancar peredaran darah, perendaman ini dilakukan selama 15-20 menit.

Hasil: ibu bersedia mengikuti arahan bidan

6. Memberikan terapi obat nefidipin 10 Mg 1x1 per oral sesuai dengan instruksi dokter untuk diminum setiap hari

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi obat yang diberikan

7. Memberikan dukungan psikologis dengan menganjurkan ibu mengurangi stress dan tidak perlu khawatir dengan keadaannya sekarang, menganjurkan ibu

Hasil : ibu merasa lega dengan penjelasan bidan

8. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa demi Kesehatan ibu dan janinnya dan menganjurkan ibu untuk membaca doa Ketika sakit

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنَا أَنُّارِحْمَلٍ ۚ ۝١٠١

Hasil : ibu merasa lebih tenang.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY "N" DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
TANGGAL 07 JUNI 2024**

No. Register :xxxxxx

Tanggal Kunjungan :07 Juni 2024

Pukul: 17.20. wita

Tanggal Pengkajian :07 Juni 2024

Pukul: 17.20 wita

Pengkaji : Nurfadillah Istiqomah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "N"/Tn "R"

Umur :19 tahun/22 tahun

Nikah/lamanya :1x ± 1 tahun

Suku : makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : IRT/Wiraswasta

Alamat : Jl xxx

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sakit kepalanya sudah mulai berkurang
2. Ibu mengatakan bengkak pada kakinya sudah mulai berkurang
3. Ibu mengatakan HPHT Tanggal 28 Oktober 2023

4. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
5. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 7 bulan
6. Ibu mengatakan merasakan pergerakan janinnya pertama kali pada usia kehamilan \pm 5 bulan
7. mengatakan merasakan pergerakan janinnya kuat di rasakan pada sebelah kanan perut ibu
8. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut hebat saat hamil
9. Ibu mengatakan telah mendapatkan imunisasi hepatitis 1x di puskesmas kassi-kassi tanggal 25 mei 2023
10. Ibu mengatakan sedikit cemas dengan keadaannya sekarang
11. Ibu mengatakan tidak mempunyai Riwayat hipertensi, dm dan jantung sebelumnya

Data objektif (O)

1. Keadaan ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HPL: 03 Agustus 2024
4. Usia Kehamilan 32 minggu
5. TB : 162 cm
6. BB sebelum hamil :50 Kg

BB sekarang : 64 Kg

7. LILA : 30 cm

8. TTV

Tekanan darah : 130/80

Suhu : 36,5 °c

Nadi : 88 x permenit

Pernafasan : 20x permenit

9. Pemeriksaan head to tue

a. Wajah

Wajah simetris kiri kanan,ekspresi ibu tampak sedikit cemas,tidak ada cloasma gravidarum,tidak terdapat odema dan nyeri tekan

b. Mata

Mata simetris kiri kanan tidak congjunctiva merah muda sklera putih

c. Mulut

Bibir lembab,gigi tidak ada yang tanggal serta tidak terdapat caries pada gigi

d. Leher

Tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid,tidak ada pembesaran kelenjar live dan vena jugularis

e. Payudara

Payudara simetris kiri kanan,putting susu

menonjol,hiperpigmentasi areola mammae, tidak terdapat benjolan dan nyeri tekan

f. Abdomen

Inspeksi: Tampak linea nigra dan striae livide, tidak ada luka bekas operasi,pembesaran perut sesuai usia kehamilan.

Palpasi:

Leopold I : TFU Pertengahan pusat dan *prosessus xipioideus*, 28 cm, teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 103 cm

TBJ : 2.884

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 146 x permenit

g. Genetalia

Tidak ada odema dan nyeri tekan

h. Anus

Tidak ada hemoroid

i. Ekstramitas

Esktramitas simetris kiri kanan,terdapat oedema dan tidak ada varises.refleks patella kanan (+)kiri (+).

j. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 12,5 gr/dl

Albumin : positif 1 (+)

Reduksi : -

Golongan darah : -

HbsAg : -

USG : Telah melakukan pemeriksaan USG pada tanggal

25 Mei 2024 dilakukan oleh dr obgyne Hasil USG : Tunggal, Hidup,

Presentase Kepala, Usia Kehamilan 30-32 Minggu, Jenis Kelamin

Laki-laki, TBJ 2.700 gram.

Assasment (A)

Diagnosa Aktual: GIP0A0, Gestasi 32 minggu, Situs Memanjang, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik dengan keadaan ibu preeklampsia ringan

Diangosa Potensial: Antisipasi terjadi preeklampsia berat serta pertumbuhan janin terhambat

Planning (P)

Tanggal 07 Mei 2024 Pukul 17.25 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan bahwa tekanan darah ibu sudah menurun dari sebelumnya

Hasil : ibu mengerti dengan keadaannya dan tampak laga dengan penjelasan bidan

2. Memantau denyut jantung janin

Hasil: Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu teratur, dengan frekuensi 146x/i

3. Memberikan *health education* (HE) Tentang

a. Istirahat yang cukup

Istirahat/tidur pada malam hari 7-8 jam dan tidur pada siang hari 1-2 jam

b. Nutrisi

Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, susu dan sayur-sayuran hijau, minum lebih banyak air putih, dan menganjurkan ibu untuk diet rendah garam serta menganjurkan ibu menghindari makanan junkfood.

c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu menjaga personal hygiene dengan mengganti pakaian 2x sehari, dan mengganti CD apabila kotor atau lembab.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan

4. Menjelaskan pada ibu 10 tanda bahaya kehamilan

a. Skait kepala yang menetap

b. Mual muntah berlebihan

c. Pergerakan janin kurang aktif

d. Nyeri perut yang hebat

- e. Pendarahan pervaginam
- f. Kejang
- g. Demam
- h. Pandangan kabur
- i. Bengkak pada wajah serta ekstremitas
- j. Ketuban pecah dini

Hasil : ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya pada kehamilan

5. Menganjurkan ibu untuk merendam kakinya dengan air hangat dengan tambahan sedikit garam agar memperlancar peredaran darah, perendaman ini dilakukan selama 15-20 menit.

Hasil : ibu bersedia mengikuti arahan bidan

6. Memberikan terapi obat nefidipin 10 Mg 1x1 per oral sesuai dengan instruksi dokter untuk diminum setiap hari

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi obat yang diberikan

7. Memberikan dukungan psikologis dengan menganjurkan ibu mengurangi stress dan tidak perlu khawatir dengan keadaannya sekarang,

Hasil : ibu merasa lega dengan penjelasan bidan

9. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa demi Kesehatan ibu dan janinnya dan menganjurkan ibu untuk membaca doa Ketika sakit

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنَا أَنزَارٌ حَمَلٌ حَمِيمٌ

Hasil : ibu merasa lebih tenang

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY "N" DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
TANGGAL 10 JUNI 2024**

No. Register :xxxxxxx

Tanggal Kunjungan :10 Juni 2024 Pukul: 17.20. wita

Tanggal Pengkajian :10 Juni 2024 Pukul: 17.20 wita

Pengkaji : Nurfadillah Istiqomah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "N"/Tn "R"

Umur :19 tahun/22 tahun

Nikah/lamanya :1x ± 1 tahun

Suku : makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : IRT/Wiraswasta

Alamat : Jl xxx

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan sakit kepala
2. . Ibu mengatakan kakinya sudah tidak bengkak lagi

3. Ibu mengatakan HPHT Tanggal 28 Oktober 2023
4. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
5. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 7 bulan
6. Ibu mengatakan merasakan pergerakan janinnya pertama kali pada usia kehamilan \pm 5 bulan
7. mengatakan merasakan pergerakan janinnya kuat di rasakan pada sebelah kanan perut ibu
8. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut hebat saat hamil
9. Ibu mengatakan telah mendapatkan imunisasi hepatitis 1x di puskesmas kassi-kassi tanggal 25 mei 2023
10. Ibu mengatakan sedikit cemas dengan keadaannya sekarang
11. Ibu mengatakan tidak mempunyai Riwayat hipertensi, dm dan jantung sebelumnya

Data objektif (O)

1. Keadaan ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HPL : 03 Agustus 2024
4. Usia Kehamilan 32 minggu 3 hari
5. TB : 162 cm
6. BB sebelum hamil : 50 Kg

BB sekarang : 63 Kg

7. LILA : 30 cm

8. TTV

Tekanan darah : 120/90

Suhu : 36,5 °c

Nadi : 87 x
permenit

: 20x

Pernafasan permenit

9. Pemeriksaan head to toe

a. Wajah

Wajah simetris kiri kanan, ekspresi ibu tampak sedikit cemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak terdapat odema dan nyeri tekan

b. Mata

Mata simetris kiri kanan tidak congestiva merah muda sklera putih

c. Mulut

Bibir lembab, gigi tidak ada yang tanggal serta tidak terdapat caries pada gigi.

d. Leher

Tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid, tidak ada pembesaran kelenjar live dan vena jugularis

e. Payudara

Payudara simetris kiri kanan, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak terdapat benjolan dan nyeri tekan

f. Abdomen

Inspeksi: Tampak linea nigra dan striae livide, tidak ada luka bekas operasi, pembesaran perut sesuai usia kehamilan.

Palpasi:

Leopold I : TFU Pertengahan pusat dan *prosesus xiphoideus*, 28 cm, teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala Leopold IV : BAP

LP : 103 cm

TBJ : 2.884

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 148 x permenit

g. Genetalia

Tidak ada odema dan nyeri tekan

h. Anus

Tidak ada hemoroid

i. Ekstramitas

Ekstramitas simetris kiri kanan, tidak ada odem dan tidak ada varises. refleks patella kanan (+) kiri (+).

j. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 12,5 gr/dl

Albumin : negative (-)

Reduksi : -

Golongan darah : -

HbsAg : -

USG : Telah melakukan pemeriksaan USG pada tanggal 25 Mei 2024 dilakukan oleh dr obgyne Hasil USG : Tunggal, Hidup, Presentase Kepala, Usia Kehamilan 30-32 Minggu, Jenis Kelamin Laki-laki, TBJ 2.700 gram.

Assasment (A)

Diagnosa Aktual: GIP0A0, Gestasi 32 minggu 3 hari Situs Memanjang, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu dan janin baik
Diangosa Potensial: -

Planning (P)

Tanggal 10 Mei 2024 Pukul 17.25 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa tekanan darahnya sudah mulai Kembali normal

Hasil : ibu mengerti dan merasa lega dengan penjelasan bidan

2. Memantau denyut jantung janin

Hasil: Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu teratur, dengan frekuensi 148x/i

3. Memberikan *health education* (HE) Tentang

a. Istirahat yang cukup

Istirahat/tidur pada malam hari 7-8 jam dan tidur pada siang hari 1-2 jam

b. Nutrisi

Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah buahan, susu dan sayur sayuran hijau, minum lebih banyak air putih, dan menganjurkan ibu untuk diet rendah garam serta menganjurkan ibu menghindari makanan junkfood

c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu menjaga personal hygiene dengan mengganti pakaian 2x sehari, dan mengganti CD apabila kotor atau lembab.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan

4. Menjelaskan pada ibu 10 tanda bahaya kehamilan

- a. Sakit kepala yang menetap
- b. Mual muntah berlebihan
- c. Pergerakan janin kurang aktif
- d. Nyeri perut yang hebat
- e. Pendarahan pervaginam
- f. Kejang

- g. Demam
- h. Pandangan kabur
- i. Bengkak pada wajah serta ekstremitas
- j. Ketuban pecah dini

Hasil : ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya pada kehamilan

5. Memberikan dukungan psikologis dengan menganjurkan ibu mengurangi stress dan tidak perlu khawatir dengan keadaannya sekarang, menganjurkan ibu

Hasil : ibu merasa lega dengan penjelasan bidan

6. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa demi Kesehatan ibu dan janinnya dan menganjurkan ibu untuk memperbanyak berdzikir

Hasil : ibu merasa lebih tenang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY "N" DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
TANGGAL 12 JUNI 2024**

No. Register :xxxxxxx

Tanggal Kunjungan :12 Juni 2024 Pukul: 17.00. wita

Tanggal Pengkajian :12 Juni 2024 Pukul: 17.00 wita

Pengkaji : Nurfadillah Istiqomah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "N"/Tn "R"

Umur :19 tahun/22 tahun

Nikah/lamanya :1x ± 1 tahun

Suku : makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : IRT/Wiraswasta

Alamat : Jl xxx

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan sakit kepala
2. . Ibu mengatakan kakinya sudah tidak bengkak lagi

3. Ibu mengatakan HPHT Tanggal 28 Oktober 2023
4. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
5. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 7 bulan
6. Ibu mengatakan merasakan pergerakan janinnya pertama kali pada usia kehamilan \pm 5 bulan
7. mengatakan merasakan pergerakan janinnya kuat di rasakan pada sebelah kanan perut ibu
8. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut hebat saat hamil
9. Ibu mengatakan telah mendapatkan imunisasi hepatitis 1x di puskesmas kassi-kassi tanggal 25 mei 2023
10. Ibu mengatakan sedikit cemas dengan keadaannya sekarang
11. Ibu mengatakan tidak mempunyai Riwayat hipertensi, dm dan jantung sebelumnya

Data objektif (O)

1. Keadaan ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HPL : 03 Agustus 2024
4. Usia Kehamilan 32 minggu 3 hari
5. TB : 162 cm
6. BB sebelum hamil : 50 Kg

BB sekarang : 64 Kg

7. LILA : 30,5 cm

8. TTV

Tekanan darah : 120/80

Suhu : 36,5 °c

Nadi : 89 x permenit

Pernafasan : 20x permenit

9. Pemeriksaan head to tue

a. Wajah

Wajah simetris kiri kanan,ekspresi ibu tampak sedikit cemas,tidak ada cloasma gravidarum,tidak terdapat odema dan nyeri tekan

b. Mata

Mata simetris kiri kanan tidak congjungtiva merah muda sklera putih

c. Mulut

Bibir lembab,gigi tidak ada yang tanggal serta tidak terdapat caries pada gigi

d. Leher

Tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid,tidak ada pembesaran kelenjar live dan vena jugularis

e. Payudara

Payudara simetris kiri kanan, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak terdapat benjolan dan nyeri tekan

f. Abdomen

Inspeksi: Tampak linea nigra dan striae livide, tidak ada luka bekas operasi, pembesaran perut sesuai usia kehamilan.

Palpasi:

Leopold I : TFU Pertengahan pusat dan *prosessus xipoides*, 29 cm, teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala Leopold IV : BAP

LP : 103 cm

TBJ : 2.987 gram

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 148 x permenit

g. Genetalia

Tidak ada odema dan nyeri tekan

h. Anus

Tidak ada hemoroid

i. Ekstramitas

Ekstramitas simetris kiri kanan, tidak ada odem dan tidak ada varises, refleks patella kanan (+) kiri (+).

j. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 12,5 gr/dl

Albumin : negative (-)

Reduksi : -

Golongan darah : -

HbsAg : -

USG : Telah melakukan pemeriksaan USG pada tanggal 25 Mei 2024 dilakukan oleh dr obgyne Hasil USG : Tunggal, Hidup, Presentase Kepala, Usia Kehamilan 30-32 Minggu, Jenis Kelamin Laki-laki, TBJ 2.700 gram.

Assasment (A)

Diagnosa Aktual: GIP0A0, Gestasi 32 minggu 5 hari Situs Memanjang, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu dan janin baik
Diangosa Potensial: -

Planning (P)

Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 17.05 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa tekanan darahnya sudah mulai Kembali normal

Hasil : ibu mengerti dan merasa lega dengan penjelasan bidan

2. Memantau denyut jantung janin

Hasil: Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu teratur, dengan frekuensi 148x/i

3. Memberikan *health education* (HE) Tentang

a. Istirahat yang cukup

Istirahat/tidur pada malam hari 7-8 jam dan tidur pada siang hari 1-2 jam

b. Nutrisi

Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah buahan, susu dan sayur sayuran hijau, minum lebih banyak air putih, dan

c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu menjaga personal hygiene dengan mengganti pakaian 2x sehari, dan mengganti CD apabila kotor atau lembab.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan

4. Menjelaskan pada ibu 10 tanda bahaya kehamilan

- a. Sakit kepala yang menetap
- b. Mual muntah berlebihan
- c. Pergerakan janin kurang aktif
- d. Nyeri perut yang hebat
- e. Pendarahan pervaginam
- f. Kejang
- g. Demam

- h. Pandangan kabur
- i. Bengkak pada wajah serta ekstremitas
- j. Ketuban pecah dini

Hasil : ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya pada kehamilan

5. Memberikan dukungan psikologis dengan menganjurkan ibu mengurangi stress dan tidak perlu khawatir dengan keadaannya sekarang, menganjurkan ibu

Hasil : ibu merasa lega dengan penjelasan bidan

6. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa demi Kesehatan ibu dan janinnya dan menganjurkan ibu untuk memperbanyak berdzikir

Hasil : ibu merasa lebih tenang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY "N" DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
TANGGAL 14 JUNI 2024**

No. Register :xxxxxxx

Tanggal Kunjungan :14 Juni 2024 Pukul: 17.30. wita

Tanggal Pengkajian :14 Juni 2024 Pukul: 17.30 wita

Pengkaji : Nurfadillah Istiqomah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "N"/Tn "R"

Umur :19 tahun/22 tahun

Nikah/lamanya :1x ± 1 tahun

Suku : makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : IRT/Wiraswasta

Alamat : Jl xxx

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan sakit kepala
2. . Ibu mengatakan kakinya sudah tidak bengkak lagi

3. Ibu mengatakan HPHT Tanggal 28 Oktober 2023
4. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
5. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 7 bulan
6. Ibu mengatakan merasakan pergerakan janinnya pertama kali pada usia kehamilan \pm 5 bulan
7. mengatakan merasakan pergerakan janinnya kuat di rasakan pada sebelah kanan perut ibu
8. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut hebat saat hamil
9. Ibu mengatakan telah mendapatkan imunisasi hepatitis 1x di puskesmas kassi-kassi tanggal 25 mei 2023
10. Ibu mengatakan sedikit cemas dengan keadaannya sekarang
11. Ibu mengatakan tidak mempunyai Riwayat hipertensi, dm dan jantung sebelumnya

Data objektif (O)

1. Keadaan ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HPL : 03 Agustus 2024
4. Usia Kehamilan 32 minggu 3 hari
5. TB : 162 cm
6. BB sebelum hamil :50 Kg

BB sekarang : 64 Kg

7. LILA : 30,5 cm

8. TTV

Tekanan darah : 110/90

Suhu : 36,5 °c

Nadi : 87x

permenit

: 20x

Pernafasan : 20x permenit

9. Pemeriksaan head to toe

a. Wajah

Wajah simetris kiri kanan, ekspresi ibu tampak sedikit cemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak terdapat odema dan nyeri tekan

b. Mata

Mata simetris kiri kanan tidak congestiva merah muda sklera putih

c. Mulut

Bibir lembab, gigi tidak ada yang tanggal serta tidak terdapat caries pada gigi.

d. Leher

Tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid, tidak ada pembesaran kelenjar live dan vena jugularis

e. Payudara

Payudara simetris kiri kanan, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak terdapat benjolan dan nyeri tekan

f. Abdomen

Inspeksi: Tampak linea nigra dan striae livide, tidak ada luka bekas operasi, pembesaran perut sesuai usia kehamilan.

Palpasi:

Leopold I : TFU Pertengahan pusat dan *prosessus xipoides*, 29 cm, teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala Leopold IV : BAP

LP : 103 cm

TBJ : 2.987 gram

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 145 x permenit

g. Genetalia

Tidak ada odema dan nyeri tekan

h. Anus

Tidak ada hemoroid

i. Ekstramitas

Esktramitas simetris kiri kanan, tidak ada odema dan tidak ada varises, refleks patella kanan (+)kiri (+).

j. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 12,5 gr/dl

Albumin : negative (-)

Reduksi : -

Golongan darah : -

HbsAg : -

USG : Telah melakukan pemeriksaan USG pada tanggal 25 Mei 2024 dilakukan oleh dr obgyne Hasil USG : Tunggal, Hidup, Presentase Kepala, Usia Kehamilan 30-32 Minggu, Jenis Kelamin Laki-laki, TBJ 2.700 gram.

Assasment (A)

Diagnosa Aktual: GIP0A0, Gestasi 33 minggu Situs Memanjang, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu dan janin baik

Diangosa Potensial: -

Planning (P)

Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 17.35 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa tekanan darahnya sudah mulai Kembali normal

Hasil : ibu mengerti dan merasa lega dengan penjelasan bidan

2. Memantau denyut jantung janin

Hasil: Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu teratur, dengan frekuensi 148x/i

3. Memberikan *health education* (HE) Tentang

a. Istirahat yang cukup

Istirahat/tidur pada malam hari 7-8 jam dan tidur pada siang hari 1-2 jam

b. Nutrisi

Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah buahan, susu dan sayur sayuran hijau, minum lebih banyak air putih, dan

c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu menjaga personal hygiene dengan mengganti pakaian 2x sehari, dan mengganti CD apabila kotor atau lembab.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan

4. Menjelaskan pada ibu 10 tanda bahaya kehamilan

a. Sakit kepala yang menetap

b. Mual muntah berlebihan

c. Pergerakan janin kurang aktif

d. Nyeri perut yang hebat

e. Pendarahan pervaginam

f. Kejang

g. Demam

- h. Pandangan kabur
- i. Bengkak pada wajah serta ekstremitas
- j. Ketuban pecah dini

Hasil : ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya pada kehamilan

5. Memberikan dukungan psikologis dengan
menganjurkan ibu mengurangi stress dan tidak perlu
khawatir dengan keadaannya sekarang, menganjurkan ibu

Hasil : ibu merasa lega dengan penjelasan bidan

6. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa demi Kesehatan ibu dan
janinnya dan menganjurkan ibu untuk memperbanyak berdzikir

Hasil : ibu merasa lebih tenang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL

PADA NY "N" DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN

DI PUSKESMAS KASSI-KASSI

TANGGAL 06 JULI 2024

No. Register :xxxxxxx

Tanggal Kunjungan : 06 Juli 2024

Pukul: 15.30. wita

Tanggal Pengkajian : 06 Juli 2024

Pukul: 15.30 wita

Pengkaji : Nurfadillah Istiqomah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "N"/Tn "R"

Umur :19 tahun/22 tahun

Nikah/lamanya :1x ± 1 tahun

Suku : makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : IRT/Wiraswasta

Alamat : Jl xxx

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan sakit kepala
2. . Ibu mengatakan kakinya sudah tidak bengkak lagi

3. Ibu mengatakan HPHT Tanggal 28 Oktober 2023
4. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
5. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 8 bulan
6. Ibu mengatakan merasakan pergerakan janinnya pertama kali pada usia kehamilan \pm 5 bulan
7. mengatakan merasakan pergerakan janinnya kuat di rasakan pada sebelah kanan perut ibu
8. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut hebat saat hamil
9. Ibu mengatakan telah mendapatkan imunisasi hepatitis 1x di puskesmas kassi-kassi tanggal 25 mei 2023
10. Ibu mengatakan sedikit cemas dengan keadaannya sekarang
11. Ibu mengatakan tidak mempunyai Riwayat hipertensi, dm dan jantung sebelumnya

Data objektif (O)

1. Keadaan ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HPL : 03 Agustus 2024
4. Usia Kehamilan 35 minggu 4 hari
5. TB : 162 cm
6. BB sebelum hamil :50 Kg

BB sekarang : 65 Kg

7. LILA : 30,7 cm

8. TTV

Tekanan darah : 110/80

Suhu : 36,5 °c

Nadi : 89x permenit

Pernafasan : 20x permenit

8. Pemeriksaan head to toe

a. Wajah

Wajah simetris kiri kanan, tidak ada cloasma gravidarum, tidak terdapat odema dan nyeri tekan

b. Mata

Mata simetris kiri kanan tidak congjunctiva merah muda sklera putih

c. Mulut

Bibir lembab, gigi tidak ada yang tanggal serta tidak terdapat caries pada gigi.

d. Leher

Tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid, tidak ada pembesaran kelenjar live dan vena jugularis

e. Payudara

Payudara simetris kiri kanan, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi: Tampak linea nigra dan striae livide, tidak ada luka bekas operasi, pembesaran perut sesuai usia kehamilan.

Palpasi:

Leopold I : TFU 3 Jari dibawah px
31 cm, teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 105 cm

TBJ : 3.225 gram

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 147 x permenit

k. Genetalia

Tidak ada odema dan nyeri tekan

l. Anus

Tidak ada hemoroid

m. Ekstramitas

Esktramitas simetris kiri kanan,tidak ada odema dan tidak ada varises, refleks patella kanan (+)kiri (+).

n. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 12,5 gr/dl

Albumin : negative (-)

Reduksi : -

Golongan darah : -

HbsAg : -

USG : Telah melakukan pemeriksaan USG pada tanggal 25 Mei 2024 dilakukan oleh dr obgyne Hasil USG : Tunggal, Hidup,

Presentase Kepala, Usia Kehamilan 30-32 Minggu, Jenis Kelamin Laki-laki,TBJ 2.700 gram.

Assasment (A)

Diagnosa Aktual: GIP0A0, Gestasi 35 minggu 4 hari Situs Memanjang, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu dan janin baik

Diangosa Potensial: -

Planning (P)

Tanggal 06 Juli 2024 Pukul 15.35 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa tekanan darahnya sudah mulai Kembali normal

Hasil : ibu mengerti dan merasa lega dengan penjelasan bidan

2. Memantau denyut jantung janin

Hasil: Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu teratur, dengan frekuensi 147x/i

3. Memberikan *health education* (HE) Tentang

a. Istirahat yang cukup

Istirahat/tidur pada malam hari 7-8 jam dan tidur pada siang hari 1-2 jam

b. Nutrisi

Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah buahan, susu dan sayur sayuran hijau, minum lebih banyak air putih, dan

c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu menjaga personal hygiene dengan mengganti pakaian 2x sehari, dan mengganti CD apabila kotor atau lembab.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan

4. Menjelaskan pada ibu 10 tanda bahaya kehamilan

a. Sakit kepala yang menetap

b. Mual muntah berlebihan

c. Pergerakan janin kurang aktif

d. Nyeri perut yang hebat

e. Pendarahan pervaginam

- f. Kejang
- g. Demam
- h. Pandangan kabur
- i. Bengkak pada wajah serta ekstremitas
- j. Ketuban pecah dini

Hasil : ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya pada kehamilan

5. Memberikan dukungan psikologis dengan menganjurkan ibu mengurangi stress dan tidak perlu khawatir dengan keadaannya sekarang, menganjurkan ibu .

Hasil : ibu merasa lega dengan penjelasan bidan

6. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa demi Kesehatan ibu dan janinnya dan menganjurkan ibu untuk memperbanyak berdzikir

Hasil : ibu merasa lebih tenang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL

PADA NY "N" DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN

DI PUSKESMAS KASSI-KASSI

TANGGAL 21 JULI 2024

No. Register :xxxxxxx
Tanggal Kunjungan : 21 Juli 2024 Pukul: 15.00. wita
Tanggal Pengkajian : 21 Juli 2024 Pukul: 15.00 wita
Pengkaji : Nurfadillah Istiqomah

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "N"/Tn "R"
Umur :19 tahun/22 tahun
Nikah/lamanya :1x ± 1 tahun
Suku : makassar/Makassar
Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMA/SMA
Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
Alamat : Jl xxx

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan sakit kepala
2. . Ibu mengatakan kakinya sudah tidak bengkak lagi
3. Ibu mengatakan HPHT Tanggal 28 Oktober 2023
4. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
5. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 9 bulan
6. Ibu mengatakan merasakan pergerakan janinnya pertama kali pada usia kehamilan \pm 5 bulan
7. mengatakan merasakan pergerakan janinnya kuat di rasakan pada sebelah kanan perut ibu
8. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut hebat saat hamil
9. Ibu mengatakan telah mendapatkan imunisasi hepatitis 1x di puskesmas kassi-kassi tanggal 25 mei 2023
10. Ibu mengatakan sedikit cemas dengan keadaannya sekarang
11. Ibu mengatakan tidak mempunyai Riwayat hipertensi, dm dan jantung sebelumnya

Data objektif (O)

1. Keadaan ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HPL : 03 Agustus 2024

4. Usia Kehamilan 37 minggu 5 hari

5. TB : 162 cm

6. BB sebelum hamil :50 Kg

BB sekarang : 65 Kg

7. LILA : 30,7 cm

8. TTV

Tekanan darah : 110/90

Suhu :36,5 °c

Nadi :87x permenit

Pernafasan :20x permenit

9. Pemeriksaan head to toe

a. Wajah

Wajah simetris kiri kanan, tidak ada cloasma gravidarum,tidak terdapat odema dan nyeri tekan

b. Mata

Mata simetris kiri kanan tidak congjunctiva merah muda sklera putih

c. Mulut

Bibir lembab,gigi tidak ada yang tanggal serta tidak terdapat caries pada gigi.

d. Leher

Tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid,tidak ada pembesaran kelenjar live dan vena jugularis

e. Payudara

Payudara simetris kiri kanan, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi: Tampak linea nigra dan striae livide, tidak ada luka bekas operasi, pembesaran perut sesuai usia kehamilan.

Palpasi:

Leopold I : TFU 3 Jari dibawah px

32 cm, teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 106 cm

TBJ : 3.392 gram

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu, teratur dengan frekuensi 145 x permenit

o. Genetalia

Tidak ada odema dan nyeri tekan

p. Anus

Tidak ada hemoroid

q. Ekstramitas

Ekstramitas simetris kiri kanan, tidak ada odema dan tidak ada varises, refleksi patella kanan (+) kiri (+).

r. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 12,5 gr/dl

Albumin : negative (-)

Reduksi : -

Golongan darah : -

HbsAg : -

USG : Telah melakukan pemeriksaan USG pada tanggal 25 Mei 2024 dilakukan oleh dr obgyne Hasil USG : Tunggal, Hidup, Presentase Kepala, Usia Kehamilan 30-32 Minggu, Jenis Kelamin Laki-laki, TBJ 2.700 gram.

Assasment (A)

Diagnosa Aktual: GIP0A0, Gestasi 37 minggu 5 hari Situs Memanjang, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu dan janin baik

Diagnosa Potensial: -

Planning (P)

Tanggal 21 Juli 2024 Pukul 15.05 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa tekanan darahnya sudah mulai Kembali normal

Hasil : ibu mengerti dan merasa lega dengan penjelasan bidan

2. Memantau denyut jantung janin

Hasil: Djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu teratur, dengan frekuensi 145x/i

3. Memberikan *health education* (HE) Tentang

- a. Istirahat yang cukup

Istirahat/tidur pada malam hari 7-8 jam dan tidur pada siang hari 1-2 jam

- b. Nutrisi

Menganjurkan ibu mengkomsumsi makanan bergizi seperti buah buahan, susu dan sayur sayuran hijau, minum lebih banyak air putih, dan

- c. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu menjaga personal hygiene dengan mengganti pakaian 2x sehari, dan mengganti CD apabila kotor atau lembab.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan

4. Menjelaskan pada ibu 10 tanda bahaya kehamilan

- a. Sakit kepala yang menetap

- b. Mual muntah berlebihan
- c. Pergerakan janin kurang aktif
- d. Nyeri perut yang hebat
- e. Pendarahan pervaginam
- f. Kejang
- g. Demam
- h. Pandangan kabur
- i. Bengkak pada wajah serta ekstremitas
- j. Ketuban pecah dini

Hasil : ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya pada kehamilan

5. Memberikan dukungan psikologis dengan menganjurkan ibu mengurangi stress dan tidak perlu khawatir dengan keadaannya sekarang, menganjurkan ibu .

Hasil : ibu merasa lega dengan penjelasan bidan

6. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa demi Kesehatan ibu dan janinnya dan menganjurkan ibu untuk memperbanyak berdzikir

Hasil : ibu merasa lebih tenang

Matriks Kunjungan

No	Hari / Tanggal	Masa Kunjungan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1	Sabtu / 28 Mei 2024 Pukul : 15.00 WITA Dirumah Pasien	Kunjungan 1	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu masih merasakan sakit kepala, dan masih bengkak pada kakinya Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan perut ibu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> KU ibu baik BB: 62 kg Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> TD: 140/100 P: 21x/i S : 36,5 °c N: 83x/i Pemeriksaan fisik terfokus <ol style="list-style-type: none"> Abdomen Pembesaran perut sesuai usia kehamilan Leopold : TFU 29 cm, bokong Leopold II : PUKI Leopold III : KEPALA Leopold IV : BAP Ekstramitas Terdapat odema pada kedua kaki, refleks patella kanan (+) kiri (+). Protein urine +1 	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu Hasil: ibu mengerti dengan keadaannya Memantau denyut jantung janin Memberikan (HE) Tentang <ol style="list-style-type: none"> Istirahat yang cukup Nutrisi <i>Personal hygiene</i> Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan Menjelaskan pada ibu tanda bahaya kehamilan Hasil: ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya kehamilan Menganjurkan ibu merendam kakinya dengan air hangat dengan tambahan sedikit garam Hasil: ibu bersedia mengikuti arahan bidan Memberikan terapi obat nivedipin 10 mg 1x1 per oral Hasil: ibu bersedia mengkonsumsi obat yang diberikan Memberikan dukungan psikologis Hasil: ibu tenang Menganjurkan ibu senantiasa berdoa Hasil: ibu merasa lebih tenang setelah berdzikir 	<ol style="list-style-type: none"> Ibu masih dalam keadaan preeklampsia ringan TD: 140/100 S : 36,5 °c P : 21x/i N : 83x/i Tekanan darah ibu sudah sedikit menurun dari sebelumnya Protein urine +1 Keadaan janin baik ditandai dengan djj dalam batas normal

2	<p>Jum'at / 31 Mei 2024 Pukul : 16.10 WITA</p> <p>Di Rumah Pasien</p>	Kunjungan 2	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sakit kepala ibu mulai berkurang kepala, dan masih bengkak pada kakinya 2. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan perut ibu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KU ibu baik 2. BB: 62 kg 3. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. TD: 140/100 P :20x/i b. S : 36,5 °c N:85x/i 4. Pemeriksaan fisik terfokus <ol style="list-style-type: none"> a. Abdomen Pembesaran perut sesuai usia kehamilan Leopold 1 :TFU 29 cm bokong Leopold II : PUKI Leopold III :KEPALA Leopold IV : BAP b. Ekstramitas Terdapat odema pada kedua kaki, refleks patella kanan (+) kiri (+). 5. Protein urine +1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu Hasil: ibu mengerti dengan keadaannya 2. Memantau denyut jantung janin 3. Memberikan (HE) Tentang <ol style="list-style-type: none"> a. Istirahat yang cukup b. Nutrisi c. <i>Personal hygiene</i> <p>Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menjelaskan pada ibu 10 tanda bahaya kehamilan Hasil: ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya kehamilan 5. Menganjurkan ibu merendam kakinya dengan air hangat dengan tambahan sedikit garam Hasil: ibu bersedia mengikuti arahan bidan 6. Memberikan terapi obat nivedipin 10 mg 1x1 per oral Hasil: ibu bersedia mengkonsumsi obat yang diberikan 7. Memberikan dukungan psikologis Hasil: ibu tenang 8. Menganjurkan ibu senantiasa berdoa Hasil: ibu merasa lebih tenang setelah berdzikir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu masih dalam keadaan preeklampsia ringan TD: 140/100 S : 36,5 °c P : 20x/i N : 85x/i 2. Tekanan darah ibu sudah masih sama dengan pemeriksaan sebelumnya 3. Protein urine +1 4. Keadaan janin baik ditandai dengan djg dalam batas normal
---	---	-------------	--	---	--

3	<p>Selasa / 4 Juni 2024 Pukul : 17.00 WITA</p> <p>Di Rumah Pasien</p>	Kunjungan 3	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sakit kepala ibu mulai berkurang kepala, dan masih bengkak pada kakinya 2. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan perut ibu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KU ibu baik 2. BB: 62 kg 3. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. TD: 130/90 P :20x/i b. S : 36,5 °c N:86x/i 4. Pemeriksaan fisik terfokus <ol style="list-style-type: none"> a. Abdoment Pembesaran perut sesuai usia kehamilan Leopold 1 :TFU 29 cm bokong Leopold II : PUKI Leopold III :KEPALA Leopold IV : BAP b. Ekstramitas Terdapat odema pada kedua kaki, refleks patella kanan (+) kiri (+). 5. Protein urine +1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu Hasil: ibu mengerti dengan keadaannya 2. Memantau denyut jantung janin 3. Memberikan (HE) Tentang <ol style="list-style-type: none"> a. Istirahat yang cukup b. Nutrisi c. <i>Personal hygiene</i> Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan 4. Menjelaskan pada ibu tanda bahaya kehamilan Hasil: ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya kehamilan 5. Menganjurkan ibu merendam kakinya dengan air hangat dengan tambahan sedikit garam Hasil: ibu bersedia mengikuti arahan bidan 6. Memberikan terapi obat nivedipin 10 mg 1x1 per oral Hasil: ibu bersedia mengkonsumsi obat yang diberikan 7. Memberikan dukungan psikologis Hasil: ibu tenang 8. Menganjurkan ibu senantiasa berdoa Hasil: ibu merasa lebih tenang setelah berdzikir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah ibu sudah mulai menurun TD: 130/90 S : 36,5 °c P : 20x/i N : 86x/i 2. Protein urine +1 3. Keadaan janin baik ditandai dengan djj dalam batas normal 4. Ibu bersedia dikunjungi pada kunjungan berikutnya
---	---	-------------	--	--	--

4	<p>Jum'at / 07 Juni 2024 Pukul 17.20 WITA</p> <p>Di Rumah Pasien</p>	<p>Kunjungan 4</p>	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sakit kepala ibu mulai berkurang kepala, dan masih bengkak pada kakinya 2. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan perut ibu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KU ibu baik 2. BB: 62 kg 3. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. TD: 130/80 P :20x/i b. S : 36,5 °c N:88x/i 4. Pemeriksaan fisik terfokus <ol style="list-style-type: none"> a. Abdomen Pembesaran perut sesuai usia kehamilan Leopold 1 :TFU 29 cm bokong Leopold II : PUKI Leopold III :KEPALA Leopold IV : BAP b. Ekstramitas Terdapat odema pada kedua kaki, refleks patella kanan (+) kiri (+). 5. Protein urine +1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu Hasil: ibu mengerti dengan keadaannya 2. Memantau denyut jantung janin 3. Memberikan (HE) Tentang <ol style="list-style-type: none"> a. Istirahat yang cukup b. Nutrisi c. <i>Personal hygiene</i> <p>Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menjelaskan pada ibu tanda bahaya kehamilan Hasil: ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya kehamilan 5. Menganjurkan ibu merendam kakinya dengan air hangat dengan tambahan sedikit garam Hasil: ibu bersedia mengikuti arahan bidan 6. Memberikan terapi obat nivedipin 10 mg 1x1 per oral Hasil: ibu bersedia mengkonsumsi obat yang diberikan 7. Memberikan dukungan psikologis Hasil: ibu tenang 8. Menganjurkan ibu senantiasa berdoa Hasil: ibu merasa lebih tenang setelah berdzikir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah ibu sudah mulai menurun TD: 130/90 S : 36,5 °c P : 20x/i N : 86x/i 2. Protein urine +1 3. Keadaan janin baik ditandai dengan djj dalam batas normal 4. Ibu melakukan anjuran bidan untuk merendam kakinya dengan air yang diberi sedikit garam 5. Ibu bersedia dikunjungi pada kunjungan berikutnya
---	--	------------------------	---	--	--

5	<p>senin / 10 Juni 2024 Pukul 17.20 WITA</p> <p>Di Rumah Pasien</p>	<p>Kunjungan 5</p>	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu sudah tidak merasakan sakit kepala, dan kakinya sudah tidak bengkak lagi 2. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan perut ibu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KU ibu baik 2. BB: 62 kg 3. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. TD: 120/90 P :20x/i b. S : 36,5 °c N:88x/i 4. Pemeriksaan fisik terfokus <ol style="list-style-type: none"> a. Abdoment Pembesaran perut sesuai usia kehamilan Leopold 1 :TFU 29 cm bokong Leopold II : PUKI Leopold III :KEPALA Leopold IV : BAP b. Ekstramitas Tidak ada odema pada kedua kaki, refleks patella kanan (+) kiri (+). 5. Protein urine (-) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu Hasil: ibu mengerti dengan keadaannya 2. Memantau denyut jantung janin 3. Memberikan (HE) Tentang <ol style="list-style-type: none"> a. Istirahat yang cukup b. Nutrisi c. <i>Personal hygiene</i> Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan 4. Menjelaskan pada ibu tanda bahaya kehamilan Hasil: ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya kehamilan 5. Memberikan dukungan psikologis Hasil: ibu tenang 6. Menganjurkan ibu senantiasa berdoa Hasil: ibu merasa lebih tenang setelah berdzikir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah ibu sudah normal TD: 120/90 S : 36,5 °c P : 20x/i N : 87x/ 2. Protein urine: Negatif(-) 3. Keadaan janin baik ditandai dengan dj dalam batas normal 4. Ibu merasa senang dengan keadaannya 5. Ibu bersedia dikunjungi pada kunjungan berikutnya
---	---	------------------------	---	--	--

6	Rabu / 12 Juni 2024 Pukul 17.00 WITA Di Rumah Pasien	Kunjungan 6	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu sudah tidak merasakan sakit kepala, dan kakinya sudah tidak bengkak lagi Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan perut ibu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> KU ibu baik BB: 62 kg Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> TD: 120/80 P :20x/i S : 36,5 °c N:87x/i Pemeriksaan fisik terfokus <ol style="list-style-type: none"> Abdoment Pembesaran perut sesuai usia kehamilan Leopold 1 :TFU 29 cm bokong Leopold II : PUKI Leopold III :KEPALA Leopold IV : BAP Ekstramitas Tidak ada odema pada kedua kaki, refleks patella kanan (+) kiri (+). Protein urine (-) 	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu Hasil: ibu mengerti dengan keadaannya Memantau denyut jantung janin Memberikan (HE) Tentang <ol style="list-style-type: none"> Istirahat yang cukup Nutrisi <i>Personal hygiene</i> Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan Menjelaskan pada ibu tanda bahaya kehamilan Hasil: ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya kehamilan Memberikan dukungan psikologis Hasil: ibu tenang Menganjurkan ibu senantiasa berdoa Hasil: ibu merasa lebih tenang setelah berdzikir 	<ol style="list-style-type: none"> Tekanan darah ibu sudah normal TD: 120/90 S : 36,5 °c P : 20x/i N : 87x/ Protein urine: Negatif(-) Keadaan janin baik ditandai dengan dj dalam batas normal Ibu merasa senang dengan keadaannya Ibu bersedia dikunjungi pada kunjungan berikutnya
---	---	----------------	--	--	---

7	<p>jumat / 14 Juni 2024 Pukul 17.00 WITA</p> <p>Di Rumah Pasien</p>	<p>Kunjungan 7</p>	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu sudah tidak merasakan sakit kepala, dan kakinya sudah tidak bengkak lagi 2. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan perut ibu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. KU ibu baik 7. BB: 62 kg 8. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. TD: 120/80 P :20x/i b. S : 36,5 °c N:89x/i 9. Pemeriksaan fisik terfokus <ol style="list-style-type: none"> a. Abdomen Pembesaran perut sesuai usia kehamilan Leopold 1 :TFU 29 cm bokong Leopold II : PUKI Leopold III :KEPALA Leopold IV : BAP b. Ekstramitas Tidak ada odema pada kedua kaki, refleks patella kanan (+) kiri (+). 10. Protein urine (-) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu Hasil: ibu mengerti dengan keadaannya 2. Memantau denyut jantung janin 3. Memberikan (HE) Tentang <ol style="list-style-type: none"> a. Istirahat yang cukup b. Nutrisi c. <i>Personal hygiene</i> Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan 4. Menjelaskan pada ibu tanda bahaya kehamilan Hasil: ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya kehamilan 5. Memberikan dukungan psikologis Hasil: ibu tenang 6. Menganjurkan ibu senantiasa berdoa Hasil: ibu merasa lebih tenang setelah berdzikir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah ibu sudah normal TD: 110/90 S : 36,5 °c P : 20x/i N : 85x/i 2. Protein urine: Negatif(-) 3. Keadaan janin baik ditandai dengan dj dalam batas normal 4. Ibu merasa senang dengan keadaannya 5. Ibu bersedia dikunjungi pada kunjungan berikutnya
---	---	------------------------	---	---	---

8	Sabtu / 06 Juli 2024 Pukul 15.35 WITA Di Rumah Pasien	Kunjungan 8	DS : 1. Ibu sudah tidak merasakan sakit kepala, dan kakinya sudah tidak bengkak lagi 2. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan perut ibu DO: 1. KU ibu baik 2. BB: 65 kg 3. Pemeriksaan TTV a. TD: 110/80 P:20x/i b. S : 36,5 °c N:89x/i 4. Pemeriksaan fisik terfokus a. Abdoment Pembesaran perut sesuai usia kehamilan Leopold I :TFU 31 cm bokong Leopold II : PUKI Leopold III :KEPALA Leopold IV : BAP b. Ekstramitas Tidak ada odema pada kedua kaki, refleks patella kanan (+) kiri (+). 5. Protein urine (-)	1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu Hasil: ibu mengerti dengan keadaannya 2. Memantau denyut jantung janin 3. Memberikan (HE) Tentang a. Istirahat yang cukup b. Nutrisi c. <i>Personal hygiene</i> Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan 4. Menjelaskan pada ibu tanda bahaya kehamilan Hasil: ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya kehamilan 5. Memberikan dukungan psikologis Hasil: ibu tenang 6. Menganjurkan ibu senantiasa berdoa Hasil: ibu merasa lebih tenang setelah berdzikir	6. Tekanan darah ibu sudah normal TD: 110/80 S : 36,5 °c P : 20x/i N : 89x/ 7. Protein urine: Negatif(-) 8. Keadaan janin baik ditandai dengan dj dalam batas normal 9. Ibu merasa senang dengan keadaannya 10. Ibu bersedia dikunjungi pada kunjungan berikutnya
---	--	----------------	---	---	--

9	Minggu/21 Juli 2024 Pukul 15.00 WITA Di Rumah Pasien	Kunjungan 9	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu sudah tidak merasakan sakit kepala, dan kakinya sudah tidak bengkak lagi 2. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan perut ibu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KU ibu baik 2. BB: 65 kg 3. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. TD: 110/90 P:20x/i b. S : 36,5 °c N:89x/i 4. Pemeriksaan fisik terfokus <ol style="list-style-type: none"> a. Abdoment Pembesaran perut sesuai usia kehamilan Leopold 1 :TFU 32 cm bokong Leopold II : PUKI Leopold III :KEPALA Leopold IV : BAP b. Ekstramitas Tidak ada odema pada kedua kaki, refleks patella kanan (+) kiri (+). 5. Protein urine (-) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu Hasil: ibu mengerti dengan keadaannya 2. Memantau denyut jantung janin 3. Memberikan (HE) Tentang <ol style="list-style-type: none"> a. Istirahat yang cukup b. Nutrisi c. <i>Personal hygiene</i> <p>Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukan arahan bidan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menjelaskan pada ibu tanda bahaya kehamilan Hasil: ibu mengerti tentang 10 tanda bahaya kehamilan 5. Memberikan dukungan psikologis Hasil: ibu tenang 6. Menganjurkan ibu senantiasa berdoa Hasil: ibu merasa lebih tenang setelah berdzikir 	<p>Tekanan darah ibu sudah normal</p> <p>TD: 110/90 S : 36,5 °c P : 20x/i N : 85x/</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protein urine: Negatif(-) 2. Keadaan janin baik ditandai dengan djg dalam batas normal 3. Ibu merasa senang dengan keadaannya 4. Ibu bersedia dikunjungi pada kunjungan berikutnya
---	---	----------------	--	--	---

PEMILIHAN SAMPEL KASUS PREEKLAMPSIA RINGAN

MYN

KARAKTERISTIK SAMPEL		Keterangan	
		ya	tidak
Usia	≤ 20	✓	
	≥ 35		
Paritas	20-35		
	Primipara	✓	
	Multipara		
Ucia Kehamilan	≤ 10 minggu		
	≥ 10 minggu	✓	
Protein Urine	+1	✓	
	≥ 2		
Odema	Ada	✓	
	Tidak Ada		
Riwayat Keluarga Hipertensi	Ada Riwayat Hipertensi		
	Tidak Ada Riwayat hipertensi	✓	✓
Riwayat Penyakit Penyakit	Ada Riwayat		
	Tidak Ada Riwayat		✓

BAB IV

PEMBAHASAN

pada uraian ini akan dijelaskan secara sederhana asuhan yang diberikan kepada NY "N" yang menderita preeklampsia ringan di puskesmas kassi-kassi dari awal pemeriksaan terdeteksinya di puskesmas kassi - kassi hingga preeklampsia yang diderita Ny"N" berkurang, asuhan ini dilakukan sebanyak 1 kali kunjungan di puskesmas kassi-kassi dan dilanjutkan dengan kunjungan rumah sebanyak 7 kali hingga pasien benar-benar sembuh.

Kasus ini akan di uraikan dengan manajemen 7 langkah varney yang meliputi : identifikasi data dasar, perumusan diagnosa/masalah aktual, merumuskan diagnosa/masalah potensial, perlunya tindakan segera kolaborasi dan emergency, intervensi,inplementasi,serta evaluasi tindakan atau asuhan yang telah diberikan kepada pasien.

A. Langkah II Identifikasi Data Dasar

Pada tahap ini, pengkajian yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk penilaian kondisi klien, riwayat kesehatannya, pemeriksaan fisik sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan baru atau catatan sebelumnya, dan meninjau data laboratorium. Pada tahap ini, bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat tentang kondisi klien dari berbagai sumber.

(Fatimah 2017)

BAB ini akan memuat pembahasan mengenai asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny "N" dengan preeklampsia ringan di puskesmas kassi-kassi. Adapun data tentang klien didapatkan dengan mengumpulkan berbagai informasi sejak awal pemeriksaan hingga selama proses pemberian asuhan berjalan. Adapun sumber informasi yang dianggap kongkrit didapat dari anamnesis klien yang disebut dengan data subjektif dan data yang dikumpulkan oleh bidan secara objektif.

Pasien Ny "N" umur 19 tahun G1P0A0, datang ke puskesmas kassikassi untuk memeriksakan kehamilan dan keadaannya dengan keluhan merasakan sakit kepala yang menetap disertai dengan pembengkakan pada kedua kakinya, keluhan yang dialami ibu sejak 3 hari yang lalu, ibu mengatakan hari pertama haid terakhirnya yaitu pada tanggal 26 oktober 2023, ibu mengatakan usia kehamilannya kurang lebih 7 bulan dan merasakan pergerakan janin pertama kali pada usia kehamilan 5 bulan dan dirasakan hingga sekarang.

Ibu mengatakan selama kehamilannya pernah mengalami mual muntah pada trimester awal tetapi tidak ada komplikasi yang serius selama kehamilannya, ibu mengatakan tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi apapun, ibu tidak mempunyai Riwayat hipertensi sebelum hamil, ibu tidak memiliki Riwayat penyakit serius seperti jantung, diabetes melitus, dan sebagainya, pola makan sebelum dan sesudah hamil tidak terlalu mengalami perubahan, serta kebiasaan sehari hari

ibu tidak mengalami hambatan apapun.ibu sering mengkonsumsi makanan junk food,serta kurang istirahat.

Pada pemeriksaan fisik umum didapat keadaan umum ibu tampak lemas, kesadaran komposmentis, ekspresi wajah ibu tampak sedikit cemas dengan keadaannya, konjungtiva merah muda sklera putih, tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfe serta vena jugularis, payudara tampak simetris kiri kanan, hiperpigmentasi areola mammae, serta pada pemeriksaan abdomen didapatkan TFU pertengahan Pusat dan prosesus xipoideus, 28 cm, Pada fundus teraba bokong, pada leopard II teraba punggung kiri, leopard III teraba kepala dan pada leopard IV Belum masuk pintu atas panggul.

pada pemeriksaan auskultasi djj terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 147x permenit, janin hidup, dan intrauterine, selain anamnesis juga dilakukan pemeriksaan penunjang seperti hemoglobin 12,5 gr/dl, Reuduksi (-), HbsAg (-), serta protein urine positif 1 (+1). Ibu juga melakukan pemeriksaan USG pada tanggal 25 Mei 2024 dilakukan oleh dokter obgyne dengan hasil Tunggal, Hidup, Presentase kepala, usia kehamilan 30-32 minggu,Jenis kelamin laki-laki TBJ 2.700 gram.

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi terjadinya preeklampasia adalah usia ibu, yaitu ≤ 20 tahun,berdasarkan hasil anamnesis usia adalah 19 tahun yang merupakan usia yang rentan

terjadi preeklampsia.maka dari itu perlu tidak ditemukan ada nya kesenjangan teori dengan data yang diperoleh oleh penulis (Erawati 2022).

Preeklampsia merupakan kondisi yang terjadi pada ibu hamil dengan keadaan hipertensi atau tekanan darah tinggi yang terjadi, pada usia kehamilan yang lebih dari 20 minggu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan preeklampsia akan berlanjut sampai persalinan hingga masa nifas (Fitriani, 2020).

Preeklampsia merupakan keadaan hipertensi atau tekanan darah tinggi yang timbul pada usia kehamilan diatas 20 minggu yang di ikuti dengan adanya protein urinaria. preeklampsia merupakan keadaan hipertensi dengan keadaan khusus dengan keterlibatan multisistem biasanya lebih sering terjadi pada usia kehamilan yang semakin tua (Kasmiati, 2023).

Jadi, secara anamnesis Pada kasus Ny "N" umur 19 tahun G1POAO usia kehamilan lebih dari 20 minggu merupakan beberapa faktor pendukung yang menyebabkan preeklampsia, ibu juga mengeluh sakit kepala yang menetap disertai dengan bengkak pada kedua kakinya, Pada pemeriksaan tanda tanda vital, didapatkan tekanan darah 150/100 mmHg, dan hasil dari pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan protein didapatkan hasil positif 1 (+1), hal ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kesenjangan antara teori dengan penerapan manajemen asuhan kebidanan.

B. Langkah II Identifikasi diagnosa/masalah aktual

Pada langkah ini ditegakkan diagnosis yang tepat terhadap masalah yang dialami pasien berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan menjadi diagnosa atau masalah aktual dimana kata diagnosa ini digunakan karena adanya beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan, akan tetapi membutuhkan penanganan yang tepat dimana penanganan ini dimuat dalam beberapa rencana asuhan yang akan diimplementasikan pada klien.

Preeklampsia adalah sekelompok gejala yang terdiri dari hipertensi (TD \geq 140/90 mmHg) dan proteinuria (\geq 0,3 g/24 jam) setelah 20 minggu kehamilan, saat tekanan darah wanita pada awalnya normal. Faktor risiko terjadinya preeklampsia antara lain nuliparitas, riwayat preeklampsia, wanita multipara dengan pasangan berbeda, riwayat hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, dan hiperkoagulopati (Noor, 2021).

Dari tinjauan kasus Ny "N" datang ke puskesmas kassi-kassi dengan keluhan sakit kepala yang menetap disertai dengan bengkak pada kedua kakinya, pada pemeriksaan tanda tanda vital, didapatkan tekanan darah 150/100 mmHg, dan hasil dari pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan protein didapatkan hasil positif 1 (+1).

Berdasarkan analisa data yang didapatkan dari data awal maka, diagnosa/masalah aktual pada Ny "N" yaitu: G1POAO gestasi 30 minggu

1 hari, Situs Memanjang, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik dengan keadaan ibu preeklampsia ringan (Noor, 2021).

Pada pengkajian data yang di lakukan dapat ditegakkan diagnosa serta masalah berdasarkan manajemen asuhan kebidanan yang didukung oleh beberapa data yang diperoleh dari anamnesis , data subjektif maupun data objektif yang diperoleh dari hasil anamnesis yang dilakukan (Noor, 2021).

Adapun diagnosa atau masalah aktual yang dapat ditegakkan pada Ny "N" preeklampsia ringan ditinjau dari hasil anamnesis bahwa ini merupakan kehamilan pertama dengan usia ibu ≤ 20 tahun, ibu tidak mempunyai Riwayat hipertensi sebelum hamil, berat badan sebelum hamil yaitu 50 kg dan pada saat pengkajian 62 kg, dengan beberapa gejala yang telah dialami ibu seperti sakit kepala yang menetap, tekanan darah 150/110 mmHg serta data penunjang yaitu pemeriksaan protein urine +1 (Noor, 2021).

Sehingga dalam penentuan masalah aktual tidak terjadi kesenjangan antara teori yang dipelajari dengan kasus yang terjadi dilapangan. sehingga peneteori dan studi kasus pada Ny "N" secara garis besar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yang ditegakkan sehingga memperlihatkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

C. Langkah III, Identifikasi Diagnosa/masalah Potensial

Tinjauan literatur manajemen kebidanan mencakup identifikasi masalah potensial, melakukan antisipasi, jika memungkinkan, dan mengamati klien. Klien diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk situasi di mana diagnosa atau masalah potensial ini benar-benar terjadi berdasarkan masalah atau diagnosis yang sudah diidentifikasi.

Pengambilan keputusan dalam manajemen asuhan kebidanan termasuk mempersiapkan klien untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi. Diagnosa/masalah potensial yang dapat ditemukan dalam studi kasus Ny "N" Ada kesamaan antara teori yaitu: kematian janin dalam Rahim, premature, solusio plasenta, pertumbuhan janin terhambat, preeklampsia berat dan kematian (Kasmiati 2023).

kerusakan pembuluh darah akan merusak system vaskularisasi darah, yang mengganggu pertukaran oksigen dan nutrisi melalui plasenta dari ibu ke janin, sehingga akan menyebabkan kematian janin dalam rahim. Preeklampsia dapat menyebabkan kelahiran prematur dikarenakan ibu hamil yang memiliki tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit, yang akan mengurangi pasokan oksigen ke organ dan janin (Kasmiati 2023).

Solusio plasenta merupakan keadaan plasenta yang terlepas ataupun terkelupas sebelum mencapai kala III, tempat implantasi normal plasenta yaitu terletak pada fundus atau corpus uteri tekanan darah tinggi

meningkatkan resiko pendarahan yang abnormal antara plasenta dan dinding rahim. Ibu yang mengalami preeklampsia akan sangat berpengaruh pada pembuluh darah arteri yang akan mengalirkan darah ke placenta, apabila placenta tidak mendapat pasokan darah yang memadai maka akan berdampak pada pasokan oksigen dan nutrisi bayi didalam kandungan ibu. Hal tersebut yang menyebabkan pertumbuhan janin akan terhambat (Kasmiati 2023).

Preeklampsia berat merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah pada saat kehamilan, dimana hasil pemeriksaan tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih disertai dengan adanya protein urinaria serta edema pada usia kehamilan diatas 20 minggu (Kasmiati 2023).

Preeklampsia yang tidak ditangani sedini mungkin dan terus berlanjut kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian pada penderitanya, dengan cara merusak terlebih dahulu merusak organorgan seperti jantung. Pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, maka akan menyebabkan jantung bekerja lebih ekstra dari biasanya dikarenakan tekanan darah yang tinggi. Oleh karena jantung yang harus bekerja lebih keras maka akan menyebabkan otot jantung menjadi kaku dan bengkak (Kasmiati 2023).

C. Langkah IV. Tindakan Emergency/Kolaborasi p

ada kasus Ny "N" Tidak diperlukan tindakan emergency dikarenakan kondisi pasien masih dalam kategori ringan yaitu tekanan darah ibu ≤ 160

mmHg, protein urine +1, pembengkakan hanya pada ekstremitas dan kesadaran ibu masih kompos mentis sehingga tidak memerlukan tindakan emergency.

Apabila ibu mengalami kenaikan tekanan darah ≥ 160 mmHg, protein urine +2 hingga terjadi kejang atau syok maka akan dilakukan tindakan segera dan berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk tindakan emergency ataupun melakukan rujukan. Sebelum merujuk tenaga kesehatan dapat memberikan MgSO₄ pada pasien preeklampsia/eklampsia sebagai upaya tenaga kesehatan mencegah kejang ataupun kejang berulang (Setiawati, 2020).

E. Langkah V. Rencana Tindakan

Proses perencanaan asuhan kebidanan harus berdasarkan identifikasi masalah serta mengantisipasi diagnosa dan atau masalah lain yang muncul akan tetapi harus di rumuskan tinjauan yang akan dicapai serta kriteria keberhasilan yang diinginkan. pada perencanaan tindakan akan disusun berdasarkan tingkat beratnya masalah dan kebutuhan klien, Pertumbuhan janin terhambat merupakan masalah yang mengancam keselamatan bayi dan tindakan segera. Sedangkan masalah potensial yang mungkin terjadi pada klien jika tidak ditangani segera akan mengarah ke preeklampsia berat hingga eklampsia (Kasmiati 2023).

Pada manajemen asuhan kebidanan, rencana tindakan yang komprehensif harus disetujui oleh klien dan mencakup indikasi yang muncul

berdasarkan kondisi klien, hubungannya dengan masalah yang dialami klien, dan antisipasi dengan bimbingan dan konseling. Rencana tindakan juga harus berdasarkan rasionalitas yang relevan dan diakui (Setiawati, 2020).

Rencana asuhan pada Ny "N" dengan preeklampsia ringan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial adalah memberikan edukasi pada klien tentang preeklampsia yang dialaminya agar ibu dapat menghindari hal-hal dapat memperparah keadaannya, memberikan health education tentang pemenuhan istirahat dan nutrisi yang cukup bagi ibu karena kebutuhan ibu dan janinnya serta menjaga personal hygiene dengan mengganti pakaian dan cd tiap kali kotor atau lembab (Setiawati, 2020).

Menjelaskan 10 tanda bahaya kehamilan agar ibu dapat mengenal lebih dini jika ibu mengalami salah satu tanda yang dijelaskan. memeriksa denyut jantung janin, dikarenakan preeklampsia dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin serta menghambat jalannya nutrisi dan oksigen ke janin maka kita perlu untuk memeriksa denyut jantung janin tiap kali kunjungan, apabila ibu mengalami tanda seperti pandangan kabur, keluar air secara tiba tiba atau terdapat pengeluaran darah dari vagina agar memeriksakan dirinya ke fasilitas Kesehatan terdekat (Setiawati, 2020).

Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu untuk mengurangi stress pada ibu serta agar ibu lebih tenang dan tidak cemas dengan keadaannya, menganjurkan ibu senantiasa berdzikir dan mengajarkan doa Ketika sakit. Memberikan terapi obat nevidipin 1x1 per oral

untuk menurunkan tekanan darah ibu yang diatas normal. Menganjurkan ibu untuk merendam kakinya dengan air hangat dengan tambahan sedikit garam agar memperlancar peredaran darah ibu serta meringankan bengkak yangn terjadi pada kaki ibu (Kasmiati 2023).

Asuhan yang diberikan pada ibu sesuai dengan rencana asuhan yang telah disusun pada Langkah sebelumnya. Semua asuhan diberikan telah dilaksanakan tanpa ada hambatan apapun, ibu juga bekerja sama dengan baik dengan bersedia melakukan apa yang diberitahukan oleh peneliti, maka dai itu tidak ditemukan adanya kesenjangan antara asuhan yang diberikan dengan teori .

F. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini, rencana asuhan dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan yang disebutkan pada langkah kelima dilaksanakan dengan aman dan efisien. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaannya. Bidan juga bertanggung jawab untuk menjalankan rencana asuhan bersama yang menyeluruh dalam kasus di mana mereka bekerja sama dengan dokter dan mengurus pasien yang mengalami masalah. Mengoptimalkan manajemen akan mengurangi waktu dan meningkatkan kualitas asuhan (Kasmiati 2023).

Mengimplementasikan rencana asuhan secara menyeluruh dengan tetap mamantau perkembangan serta pertumbuhan janin secara intensif setiap pertemuan, bukan hanya pertumbuhan janin tetapi juga masalah

Kesehatan ibu bisa ditangani dengan cara memantau tekanan darah, protein urine, dan denyut jantung janin.

Manajemen asuhan kebidanan yang akan dilakukan harus menjamin adanya rasa aman dan efisien klien, pengimplementasian asuhan kebidanan dapat dilakukan keseluruhan oleh bidan atau dilaksanakan Sebagian oleh pasien yang bersangkutan serta juga bisa bekerjasama dengan nakes lainnya sesuai dengan rencana tindakan yang direncanakan, pada kasus preeklampsia ringan Ny "S", semua Tindakan yang di rencanakan sudah terlaksana secara keseluruhan dengan baik tanpa hambatan yang berarti serta adanya kerja sama yang baik dari ibu dan dukungan keluarga serta petugas Kesehatan yang berada di di puskesmas kassi-kassi.

G. Evaluasi

Pada manajemen asuhan kebidanan evaluasi merupakan Langkah terakhir dalam pendokumentasian asuhan, yaitu dengan mengevaluasi apasaja tujuan yang sudah tercapai serta membandingkan data yang di kumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan mengevaluasi apasaja rencana asuhan yang sudah tercapai maupun yang tidak tercapai disertai dengan alasan mengapa rencana asuhan tersebut tidak tercapai (Kasmiati 2023).

Evaluasi adalah Langkah yang paling terakhir pada manajemen asuhan kebidanan, Dimana keberhasilan serta kemajuan dari asuhan yang telah diberikan kepada klien berjalan sesuai rencana asuhan atau tidak. Pada

Langkah ini juga dilakukan evaluasi tentang seberapa efektif asuhan yang telah diberikan pada Langkah sebelumnya (Kasmiati 2023).

Pada evaluasi kasus Ny "N" asuhan yang berhasil di implementasikan dan terdapat progress yang signifikan terhadap kemajuan serta penyembuhan pasien, tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, sudah tidak ada odema pada ekstremitas, protein urine negative serta denyut jantung janin dalam batas normal.

Setelah dilakukan pemantauan selama 8 pekan diperoleh data bahwa keadaan ibu sudah baik ditandai dengan tekanan darah yang sudah dalam kategori normal yaitu 110\90 mmHg, Sudah tidak ditemukan pembengkakan pada kedua kaki, ibu sudah tidak mengeluhkan sakit kepala, serta pada pemeriksaan penunjang sudah tidak ditemukan adanya protein pada urine ibu yang menandakan bahwa ibu sudah dalam keadaan baik maka diagnose preeklampsia sudah teratasi dan tidak terjadi tanda-tanda yang disebutkan pada langkah III.

Berdasarkan kasus ibu hamil dengan preeklampsia ringan pada Ny "N" di puskesmas kassi-kassi setelah kunjungan 1 kali di puskesmas serta 7 kali kunjungan rumah tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang mengarah pada masalah potensial. Oleh karena itu secara garis besar kasus preeklampsia ringan pada Ny "N" tidak ditemukan adanya kesenjangan.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari beberapa teorin dan diimplementasikan langsung di lapangan dengan kasus asuhan kemilan dengan preeklampsia ringan di puskesmas kassi-kassi maka pada BAB ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Pada Langkah I berdasarkan data yang di dapatkan yaitu data subjektif dan objektif, meliputi anamnesis data, ibu tidak memiliki riwayat hipertensi, pemeriksaan fisik umum ibu dalam keadaan lemas, data objektif tekanan darah 150/100 mmHg, ditemukan adanya odema serta pemeriksaan penunjang protein urine (+).
2. Langkah II diagnosa pada Ny "N" dengan preeklampsia ringan dapat ditegakkan berdasarkan beberapa temuan setelah dilakukan anamnesis, yaitu ibu mengeluhkan sakit kepala yang menetap, dengan pembengkakan pada kedua kaki, serta pada pemeriksaan tekanan darah didapatkan tekanan darah 150/100 mmHg dan pemeriksaan protein urine (+). Maka diagnosa actual GIP0A0, Gestasi 31 minggu Situs Memanjang, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik dengan keadaan ibu preeklampsia ringan.

3. Langkah III pada kasus Ny "N" masalah potensial yang mungkin akan terjadi pada preeklampsia ringan adalah kematian janin dalam Rahim, premature, solusio plasenta, pertumbuhan janin terhambat, preeklampsia berat dan kematian.
4. Langkah IV pada kasus ny "N" tidak diperlukann Tindakan segera atau kolaborasi dikarenakan kondisi ibu yang tidak terlalu parah, ibu tidak mengalami syok, tidak ada tanda-tanda gawat janin, serta tidak ada pertumbuhan janin terhambat.
5. Langkah V rencana tindakan yang telah penulis susun bertujuan agar ibu mendapatkan penanganan yang tepat dan aman, sesuai dengan kondisinya serta untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kemungkinan preeklampsia ringan berkembang menjadi preeklampsia berat.
6. Langkah VI tindakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa rencana perawatan yang telah disusun dapat tercapai melalui Kerjasama antar bidan dan petugas lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan bagi pasien.
7. Langkah VII evaluasi tindakan yang diberikan pada Ny "N" dengan preeklampsia ringan telah dilakukan seoptimal mungkin dan sesuai dengan standar pelayanan/rencana asuhan kebidanan shingga komplikasi yang mungkin terjadi dapat diatasi. keadaan ibu baik, ibu sudah tidak mengeluh sakit kepala, Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal 110/90 mmHg, sudah tidak ditemukan adanya odema, protein urine negative.

8. Pendokumentasian dilaksanakan pada awal kunjungan sampai di puskesmas kassi kassi, sampai dengan kunjungan rumah. Dilakukan dengan memulai pengkajian saat pasien datang dengan tekanan darah tinggi, kemudian dilanjutkan hingga tekanan darah kembali normal.

B. Saran

1. Bagi pasien

- a. Mengajak ibu untuk lebih banyak istirahat
- b. Menganjurkan ibu untuk selalu memperhatikan kondisi dan kesehatannya.
- c. Menganjurkan ibu mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang
- d. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi obat secara teratur sesuai instruksi yang diberikan.

2. Saran untuk bidan

Pelayanan yang profesional adalah kunci dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Perinatal (AKP). Oleh karena itu, bidan perlu terus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya, melalui program pendidikan, pelatihan dan seminar agar dapat menjadi bidan yang berkualitas. Bidan juga harus memberikan asuhan yang sesuai dengan wewenangnya. Pengembangan manajemen kebidanan penting karena menjadi landasan bagi bidan dalam menangani masalah klien dan berbagai kasus yang muncul.

3. Saran untuk institusi

Penyediaan fasilitas/alat-alat memadai untuk penunjang pelaksanaan tugas-tugas kebidanan dan untuk penunjang pelaksanaan tugas-tugas kebidanan dan keterampilan bidan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

- Agrevita, A. (2021). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Preeklamsia Post Operasi Sectio Caesarea Dengan Gangguan Pemenuhan Rasa Nyaman (Nyeri) Di Rsud Labuang Baji Makassar Tugas Akhir Ners.*
- Annisa. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Preeklampsia.*
- Azmi, K., Purnamasari, I., Nurvembrianti, I., Ampera No, J., & Barat, K. (2022). *Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny. N Dengan Preeklamsia Berat Dan By. Ny. N Di Kota Pontianak Program Studi Diii Kebidanan Politeknik 'Aisyiyah Pontianak.*
- Erawati. (2022). *Skripsi Hubungan Faktor Usia Ibu Hamil Dengan Kejadian Pre Eklampsia Di Puskesmas Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.*
- Handayani. (2022). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Hamil Trimester Iii Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.*
- Hasibuan Hafizah. (2021). Hafizah Hasibuan. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Ny "R" Dengan Preeklampsia Ringan Pada Kehamilan Trimester Iii Di Pmb Mona Padangsidimpuan.*
- Haslan. (2022). Dampak Kejadian Preeklamsia Dalam Kehamilan Terhadap Pertumbuhan Janin Intrauterine. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandihsada*,445–454. <https://doi.org/10.35816/jiskh.V11i2.810>
- Iqrayanti. (2019). *Menajmen Asuhan Kebidanan. 2.*

Kasmiati, M. Keb. (2023). *Buku Asuhan Kehamilan* (Ira Antika Putri, Ed.).

Pt.Literasi Nusantara Abadi Grup.

Monitoring Progress On Universal Health Coverage And The Health-Related

Sustainable Development Goals In The Who South-East Asia Region 2022

Update Sdgs, Uhc And Financial Protection: Leaving No One Behind.

(2023). [Http://Apps.Who.Int/Bookorders](http://apps.who.int/bookorders).

Noor. (2021). *Konsep Preeklampsia:Patomekanisme Dan Pencegahan.*

Konsep Preeklampsia:Patomekanisme Dan Pencegahan .

Qur'an Kemenag. (2006). *Al-Qur'an Kemenag.*

Saleha, S. (2009). *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas.* Salemba Medica.

Setiawati. (2020). *Fisio-Patologi Kehamilan, Persalinan Dan Kasih Sayang*

Universal (H. Iskandar, Ed.). [Http://Ebooks.Uin-](http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/)

[Alauddin.Ac.Id/](http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/) Wulandari, Tenri, Saleha, S., & Inayah Sari, J. (2022).

Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny "N" Dengan

Abortus Inkomplit Di Rsud Syekh Yusuf Kab. Gowa Tahun

2019.Jurnalmidwifery,4(1),718.[https://Doi.Org/10.24252/Jmw.V4i1](https://doi.org/10.24252/jmw.v4i1)

.27715

DOKUMENTASI KUNJUNGAN





ALAUDDIN
MAKASSAR

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION "

No.D.025/KEPK/FKIK/V/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Nurfadillah Istiqomah
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL DENGAN PREEKLAMPSIA
RINGAN DI PUSKESMAS KASSI-KASSI TAHUN 2024"

"MANAGEMENT OF MIDWIFERY CARE FOR PREGNANT WOMEN WITH MILD
PREECLAMPSIA AT KASSI-KASSI HEALTH CENTER YEAR 2024"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.

This declaration of ethics applies during the period May 14, 2024 until May 14, 2025.

May 14, 2024

Professor and Chairperson,



Dr. apt. Ismail, S.Si., M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alaudidin.ac.id website lp2m.uin-alaudidin.ac.id

Nomor : B- 03481/Un.06/LP2M/PP.00.9/05/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Nurfadillah Istiqomah
NIM : 70400121028
Semester/T.A. : VI (Enam)T.A. 2023-2024
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Alamat : dusun kanite desa popo
No. HP. : 081564718213

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Dengan judul Skripsi: **Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2024.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Puskesmas Kassi-Kassi** dari tanggal **16/Mei/2024-12-Juli-2024.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 10764/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-03481/Un.06/LP2M/PP.00.9/05/2024 tanggal 05 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : NURFADILLAH ISTIQOMAH
Nomor Pokok : 70400121028
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Gowa
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara, dengan judul :

" **Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2024.** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 Mei s/d 11 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firdayanti, S.Si.T., M.Keb
NIP : 197611132006042001
Jabatan : Pembimbing 1/Promotor

Dan

Nama : Dr. Bd. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb
NIP : 197601262006042001
Jabatan : Pembimbing 2/Ko promotor

Sebagai pembimbing skripsi dari :

Nama : Nurfadillah Istiqomah
NIM : 70400121028
Jenjang : Diploma III
Program Studi : Kebidanan
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Menyatakan menyetujui yang bersangkutan melakukan penelitian dengan judul "Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Dengan Preeklampsia Ringan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2024"

Mengetahui,

Pembimbing 1/Promotor

(Firdayanti, S.Si.T., M.Keb)

Pembimbing 2/Ko promotor

(Dr. Bd. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M.Keb)

RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Peneliti

Nama Lengkap : Nurfadillah Istiqomah
NIM : 70400121028
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar 13 Maret 2003
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Fakultas : Kebidanan
Alamat : kanite desa popo
Telepon : 081564718213
Email : dhillaistiqomah@gmail.com

2. Nama Orang Tua

Ayah : Mustari
Ibu : Nurlia

3. Riwayat pendidikan

SD Inpress Kanite (2009 – 2015)
MTS Bontomarannu (2015 – 2018)
SMKN 1 Takalar (2018 – 2021)
UIN Alauddin Makassar (2021 – 2024)