

**HUBUNGAN USIA, JUMLAH PARITAS, DAN OBESITAS DENGAN
KEJADIAN MIOMA UTERI DI RS IBNU SINA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Kedokteran pada Program Studi Pendidikan Dokter
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

AFDALIA AMANDA

NIM : 70600120032

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afdalia Amanda
NIM : 70600120032
Tempat/Tanggal Lahir : Watampone, 07 Agustus 2002
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Sultan Alauddin, Kompleks Permatas Sari
Judul : Hubungan Usia, Jumlah Paritas dan Obesitas dengan Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 1 Maret 2024

Penyusun



Afdalia Amanda


NIM:70600120032

PERSETUJUAN UJIAN HASIL SKRIPSI

Pembimbing penulisan skripsi Afdalia Amanda, NIM 70600120032, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul ; “Hubungan Usia, Jumlah Paritas dan Obesitas dengan Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di seminarkan


Makassar, 1 Maret 2024

Pembimbing 1



dr. Rauly Rahmadhani, M.Kes., Sp.N

Pembimbing 2



dr. Abd. Rahman, M.Kes., Sp.B

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Hubungan Usia, Jumlah Paritas dan Obesitas dengan Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar**" yang disusun oleh Afdalia Amanda, NIM 70600120032, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 02 Februari 2024, bertepatan dengan 22 Rajab 1445 Hijriah, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 19 Februari 2024

9 Syawal 1445 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed	(.....)
Pembimbing I	: dr. Raully Ramadhani, M.Kes, Sp.N	(.....)
Pembimbing II	: dr. Abd. Rahman, M.Kes, Sp.B	(.....)
Penguji I	: dr. Sari Ifdiana Jalal, M.Kes, Sp. OG	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. Abdul Rahim Yunus M,A	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar

Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.

NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk, kemudahan dan keberkahan dalam penulisan skripsi penelitian dengan judul **“Hubungan Usia, Jumlah Paritas, dan Obesitas dengan Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar”** dalam rangka penyelesaian salah satu tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis menyampaikan terimakasih dan memeberikan penghargaan setinggi-tingginya secara tulus dan ikhlas kepada kedua orangtua atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini. Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku rektor beserta dengan jajarannya yang senantiasa memfasilitasi dan mendukung seluruh kegiatan Prodi Pendidikan Dokter
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan
3. dr. Jelita Inayah Sari M.Biomed selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh ilmu

4. dr. Rauly Ramadhani, M.Kes., Sp.N dan dr. Abd. Rahman, M.Kes., Sp.B selaku dosen pembimbing penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis
5. dr. Sari Ifdiana Jalal. M.Kes, Sp.OG dan Prof Dr. Abd Rahim Yunus, M.A selaku dosen penguji penelitian yang telah meluangkan waktu untuk memberi saran dan kritikan kepada penulis
6. Kedua orang tua dan keluarga besar telah membantu memberikan arahan agar selesainya skripsi ini
7. Sahabat-sahabt yang telah memberikan dukukngan semangat dan arahan kepada penulis
8. Teman-teman APONEUROSIS yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam menyelesaikan rangkaian proses penulisan tugas akhir ini. Semoga skripsi penelitian ini bermanfaat bagi pembacanya.

Makassar, 11 Januari 2024

Penyusun



Afdalia Amanda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>B. Rumusan Masalah.....</i>	<i>3</i>
<i>C. Hipotesis.....</i>	<i>3</i>
<i>D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....</i>	<i>4</i>
<i>E. Kajian Pustaka.....</i>	<i>5</i>
<i>F. Tujuan Penelitian.....</i>	<i>8</i>
<i>G. Manfaat Penelitian.....</i>	<i>8</i>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
<i>A. Mioma Uteri.....</i>	<i>10</i>
<i>B. Kajian Integrasi Keislaman.....</i>	<i>28</i>
<i>C. Kerangka Teori.....</i>	<i>32</i>
<i>D. Kerangka Konsep.....</i>	<i>33</i>
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
<i>A. Desain Penelitian.....</i>	<i>34</i>
<i>B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....</i>	<i>34</i>
<i>C. Populasi dan Sampel Penelitian.....</i>	<i>35</i>
<i>D. Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>36</i>
<i>E. Instrumen Penelitian.....</i>	<i>36</i>

<i>F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....</i>	<i>37</i>
<i>G. Alur Penelitian</i>	<i>39</i>
<i>H. Etika Penelitian.....</i>	<i>40</i>
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
<i>A. Hasil Penelitian.....</i>	<i>42</i>
<i>B. Pembahasan.....</i>	<i>47</i>
<i>C. Keterbatasan.....</i>	<i>53</i>
<i>D. Kelebihan Penelitian.....</i>	<i>54</i>
BAB V PENUTUP.....	55
<i>A. Kesimpulan.....</i>	<i>55</i>
<i>B. Saran.....</i>	<i>55</i>
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60



DAFTAR SINGKATAN

RS	: Rumah Sakit
Kemenag RI	: Kementerian Agama Republik Indonesia
IGF-1	: <i>Insulin Like Growth Factor</i>
TGF	: <i>Transforming Growth Factor</i>
EGF	: <i>Epidermal Growth Factor</i>
USG	: Ultrasonografi
MRI	: <i>Magnetic Resonance Imaging</i>
H1/Ha	: Hipotesis Tandingan/Alternatif
H0	: Hipotesis Nol
Q.S	: Al-Qur'an Surah
SWT	: <i>subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>sallahu alaihi wasallam</i>
SPSS	: <i>Statistical Package for the Social Science</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Definisi Operasional.....	4
Tabel 1. 2. Kajian Pustaka.....	5
Tabel 4. 1. Distribusi Karakteristik.....	78
Tabel 4. 2. Distribusi Variabel Penelitian.....	80
Tabel 4. 3. Hubungan Usia dengan Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar.....	81
Tabel 4. 4. Hubungan Jumlah Paritas dengan Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar.....	82
Tabel 4. 5. Hubungan Obesitas dengan Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar.....	82




DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Teori.....	32
Bagan 2. 2 Kerangka Konsep	33
Bagan 3. 1 Kerangka Alur Penelitian.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Klasifikasi Mioma Uteri	23
Gambar 2. Pemeriksaan Penunjang Mioma Uteri.....	33



Hubungan Usia, Jumlah Paritas, dan Obesitas dengan Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar

Afdalia Amanda¹, Raully Rhamadhani², Abd. Rahman³, Sari Ifdiana Jalal⁴, Abd. Rahim Yunus⁵

^{1,2,3}Program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: *1afdaliaamanda0017@gmail.com

ABSTRAK

Kesehatan reproduksi merupakan masalah pada wanita dan sangat penting untuk diperhatikan dari seluruh elemen masyarakat. Perkiraan pada sepuluh tahun mendatang, sembilan juta orang meninggal akibat mioma uteri. Selain itu mioma uteri juga menyebabkan subfertilitas maupun infertilitas serta abortus dan premature pada kehamilan. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini sebanyak 106 data yang ada pada Rekam Medik di RS Ibnu Sina Makassar dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil penelitian didapatkan dari 106 responden didapatkan yang mengalami mioma uteri sebanyak 53 orang (50.0%), Tidak mioma uteri sebanyak 53 orang (50.0%). Frekuensi data dengan kelompok usia <35 Tahun sebanyak 12(11.3%), kelompok usia 35-45 Tahun sebanyak 37(34.9%) serta kelompok usia >45 Tahun sebanyak 57 (53.8%). Frekuensi kelompok Jumlah Paritas dengan status nullipara sebanyak 51(48.1%), status primipara sebanyak 12 (11.3%), status multipara sebanyak 39 (36.8%) serta status grandemultipara sebanyak 4 (3.8%). Frekuensi kelompok status obesitas yang mengalami obesitas sebanyak 48 (45.3%) dan yang tidak mengalami obesitas sebanyak 58 (54.7%). Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara usia dengan *p-value* (0.245), jumlah paritas dengan *p-value* (0.279) dan obesitas dengan *p-value* (0.845) dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar.

Kata Kunci: Kejadian Mioma Uteri, Usia, Jumlah Paritas, Obesitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Relationship between Age, Number of Parities, and Obesity with the Incidence of Uterine Myoma at Ibnu Sina Hospital Makassar

Afdalia Amanda¹, Raully Rahmadhani², Abd. Rahman³, Sari Ifdiana Jalal⁴, Abd. Rahim Yunus⁵

^{1,2,3}Program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: *¹afdaliaamanda0017@gmail.com

ABSTRACT

Reproductive health is a problem for women and is very important for all elements of society to pay attention to. It is estimated that in the next ten years, nine million people will die from uterine myoma. Apart from that, uterine myoma also causes subfertility or infertility as well as abortion and prematurity in pregnancy. The design of this research is descriptive quantitative research with a cross sectional approach. The sample for this research was 106 data from the medical records at Ibnu Sina Hospital Makassar using purposive sampling technique. This research uses secondary data. The research results obtained from 106 respondents found that 53 people (50.0%) had uterine myoma, 53 people (50.0%) did not have uterine myoma. The frequency of data for the <35 years age group was 12 (11.3%), the 35-45 years age group was 37 (34.9%) and the >45 years age group was 57 (53.8%). Frequency of Number of Parity groups with nullipara status was 51 (48.1%), primipara status was 12 (11.3%), multipara status was 39 (36.8%) and grandemultipara status was 4 (3.8%). The frequency of the obese status group who were obese was 48 (45.3%) and who did not suffer obesity was 58 (54.7%). Conclusion: There is no relationship between age with p-value (0.245), number of parities with p-value (0.279) and obesity with p-value (0.845) with the incidence of uterine myoma at Ibnu Sina Hospital Makassar.

Keyword: Incidence of Uterine Myoma, Age, Parity Amount, Obesity

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Kesehatan reproduksi pada wanita merupakan masalah yang penting untuk mendapatkan perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan. Kesehatan reproduksi sangat berpengaruh dan mempunyai peran yang penting terhadap kelanjutan generasi penerus pada suatu negara (Rahayu et al., 2017).

Menurut (Jariah et al., 2020), beberapa masalah Kesehatan pada wanita yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi adalah mioma uteri, kanker serviks, kanker mammae, kanker ovarium, gangguan haid dan lain-lain. Adapun mioma uteri merupakan penyakit yang menduduki urutan kedua setelah kanker serviks. Kejadian mioma uteri menduduki peringkat kedua terbanyak setelah servitis (Jariah et al., 2020).

Menurut WHO dalam penelitian (Priyatni & Sri Rahayu, 2019) setiap tahun jumlah penderita penyakit mioma uteri bertambah mencapai 6,25 juta orang. Dalam 10 tahun mendatang diperkirakan akan mencapai 9 juta orang yang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit mioma uteri (Jariah et al., 2020). Ditemukan wanita penderita ginekologi yang dirawat di rumah sakit sebanyak 2,39% - 11,7% di negara Indonesia dan paling sering ditemukan pada

wanita umur 35-45 tahun ($\pm 25\%$) serta jarang terjadi pada wanita umur 20 tahun dan pasca *menopause* (Astuti et al., 2020).

Mioma uteri juga dapat menyebabkan terjadinya subfertilitas wanita, sehingga menyebabkan seringnya abortus spontan dan prematuritas pada kehamilan. Mioma uteri yang ukurannya kurang dari 5 cm umumnya tidak membesar selama kehamilan, sedangkan mioma uteri dengan ukuran lebih dari 5cm sering kali akan membesar selama kehamilan sehingga dapat mengganggu kehamilan (Wijaya & Dwistayani, 2022).

Berdasarkan data yang didapatkan di RS Ibnu Sina Makassar, didapatkan hasil pasien yang terdiagnosis mioma uteri pada tahun 2021 sebanyak 26 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 31 kasus, serta pada bulan januari sampai oktober tahun 2023 sebanyak 28 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kasus mioma uteri pada tahun 2022 sebanyak 5 kasus. RS Ibnu Sina makassar merupakan salah satu rumah sakit rujukan dan melayani kasus obstetric dan ginekologi salah satunya tumor atau mioma uteri, namun belum ada penelitian terbaru mengenai mioma uteri (RS Ibnu Sina Makassar, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Usia, Jumlah Paritas, dan Obesitas dengan Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan usia, jumlah paritas, dan obesitas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar ?.

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

- a. Tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar
- b. Tidak terdapat hubungan antara jumlah paritas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar
- c. Tidak terdapat hubungan antara obesitas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Terdapat hubungan antara usia dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar
- b. Terdapat hubungan antara jumlah paritas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar
- c. Terdapat hubungan antara obesitas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1. 1. Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Usia	Umur wanita saat mengalami kejadian mioma uteri yang dinyatakan dalam tahun	Rekam Medis	1. <35 tahun : 1 2. 35-45 tahun : 2 3. >45 tahun : 3 (Lubis PN, 2020)	Ordinal
2.	Jumlah Paritas	Jumlah anak lahir hidup pasien	Rekam Medis	1. Nulipara : 1 2. Primipara : 2 3. Multipara : 3 4. Grandemultipara : 4 (Wulandari et al., 2021)	Ordinal
3.	Obesitas	Data pasien yang menunjukkan IMT >25,0 di pada saat terdiagnosis mioma uteri	Rekam Medis	1. Obesitas : 1 2. Tidak Obesitas : 2 (Ningrum et al., 2018)	Ordinal

Variabel Dependen					
1.	Kejadian Mioma Uteri	Wanita yang mengalami kondisi adanya tumor jinak menempel di sel otot rahim dengan pemeriksaan histopatologi	Rekam Medis	1. Mioma uteri : 1 2. Tidak mioma uteri : 2 (Wiyati et al., 2022)	Ordinal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas dan menganalisis hubungan usia, jumlah paritas, dan obesitas terhadap kejadian mioma uteri di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar tahun 2022-2023. Instrumen penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu rekam medik.

E. Kajian Pustaka

Sebagai komponen yang memperkuat penelitian, peneliti mengutip beberapa penelitian yang terkait sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka

No	Penelitian/Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
1.	Laning et al., 2019	Faktor Risiko yang Berhubungan dengan	Penelitian analitik observasional dengan rancangan	Pengambilan sampel menggunakan Total sampling	Instrumen penelitian yang digunakan	Variabel lama penggunaan kontrasepsi hormonal dan obesitas tidak ada hubungan dengan

		Kejadian Penyakit Mioma Uteri	<i>case control..</i>	dengan perbandingan 1:1. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 82 Responden.	adalah kuesioner.	kejadian penyakit mioma uteri, sedangkan variabel usia <i>menarche</i> , paritas dan riwayat keluarga dari hasil analisis menyatakan ada hubungan dengan kejadian penyakit mioma uteri.
2.	Sahari, 2022	Hubungan Paritas dengan Kejadian Mioma Uteri di Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi	Penelitian analitik dengan pendekatan desain potong lintang (<i>cross-sectional</i>)	Total sampel sebanyak 94 sampel	Data sekunder yang dikumpulkan dari data pasien	Terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian mioma uteri di Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi.
3.	Harnanik Nawangsari, Liliek Pratiwi, 2023	Pengetahuan dengan Sikap dalam Pencegahan Mioma Uteri Pada Mahasiswa	Penelitian metode deskriptif korelasional dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Total sampel sebanyak 60 sampel	Data primer yang diambil dengan menggunakan lembar kuisisioner	Ada hubungan pengetahuan dengan sikap dalam pencegahan mioma uteri pada mahasiswa
4.	Wulandari et al., 2021	Hubungan Usia dan Paritas dengan Kejadian Mioma Uteri di RSUD Wangaya Denpasar	Penelitian analitik observasional dengan pendekatan retrospektif.	Total sampel sebanyak 144 sampel	Data sekunder yang diambil dari rekam medis di Bagian Obstetri dan Ginekologi RSUD Wangaya Denpasar pada	Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dan paritas dengan kejadian mioma uteri di RSUD Wangaya Denpasar tahun 2016-2017.

		Tahun 2016-2017			bulan Januari tahun 2016 hingga Desember 2017.	
5.	Sulistyo wati & Lina, 2019	Hubungan Faktor Risiko dengan Kejadian Mioma Uteri di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dan RS-BLUD Kota Tanjungpinang Tahun 2018	Penelitian yang dilakukan adalah penelitian analitik dengan pendekatan retrospektif	Total sampel pada penelitian ini adalah 43	Data primer dan data sekunder dari catatan direkam medis dan buku register instalasi rawat inap obstetri dan ginekologi RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepri dan RS-BLUD Kota Tanjungpinang.	Terdapat hubungan bermakna antara umur dan paritas, dengan kejadian mioma uteri, namun tidak terdapat hubungan bermakna antara obesitas dan kehamilan dengan kejadian mioma uteri.
6.	Pattinassary et al., 2023	Karakteristik Status Obstetri pada Pasien Mioma Uteri di Rsd Dr. M. Haulussy Ambon Tahun 2018-2021	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Total sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 119 pasien mioma uteri.	Data sekunder dari rekam medik pasien mioma uteri di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon, pada tahun 2018-2021.	Karakteristik usia pada pasien mioma uteri terbanyak ditemukan pada usia 30 – 45 tahun. Karakteristik pasien mioma uteri paling banyak terjadi pada pasien dengan jumlah paritas multipara. Karakteristik pasien mioma uteri paling banyak terjadi pada pasien yang belum

						pernah mengalami abortus.
--	--	--	--	--	--	---------------------------

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan usia, jumlah paritas, dan obesitas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan usia terhadap kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar
- b. Mengetahui hubungan jumlah paritas terhadap kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar
- c. Mengetahui hubungan obesitas terhadap kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi sendiri dapat dijadikan sebagai salah satu wadah dalam mengaplikasikan pengetahuan dan ilmu yang didapatkan dalam bidang penelitian serta meningkatkan wawasan mengenai hubungan usia, jumlah paritas, dan obesitas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar. Selain itu, peneliti dapat melatih diri untuk berfikir secara ilmiah terkhusus tentang mioma uteri.

2. Bagi Rumah Sakit

Bagi rumah sakit diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang nantinya dijadikan pertimbangan dan pengembangan promosi kesehatan wanita maupun ibu dan pembuatan kebijakan dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan ginekologi.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan informasi pada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya yang berhubungan dengan kasus ginekologi atau kelainan reproduksi, sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan khususnya mioma uteri.

4. Bagi Instansi

- 1) Memberikan informasi dan gambaran tambahan kepada institusi di bidang kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai hubungan usia, jumlah paritas, dan obesitas dengan kejadian mioma uteri.
- 2) Memberikan bahan bacaan dan referensi sekaligus menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai mioma uteri di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Mioma Uteri*

1. Definisi

Mioma uteri adalah suatu tumor jinak dari otot polos dinding uterus yaitu myometrium. Nama lain dari tumor jinak ini adalah *leiomyoma uteri*, *uterine fibroid* dan *fibrinoma uteri* (Wiyati et al., 2022).

Mioma uteri merupakan neoplasma jinak yang berasal dari myometrium dan jaringan ikat yang menumpangnya. Disebut juga dengan istilah fibromyoma, leiomyoma, dan fibroid (Supriyatiningih, 2017).

Mioma uteri atau yang lebih dikenal dengan fibroid adalah tumor jinak yang berasal dari otot polos Rahim. Sel tumor terbentuk dari mutase genetic, kemudian berkembang karena produksi hormon esterogen dan progesterone. (Wijaya & Dwistayani, 2022)

2. Epidemiologi

Sebanyak 70% kasus menimpa wanita yang berusia 50 tahun, dimana 30% hingga 40% kasus saat *perimenopause* serta 20% hingga 25% kasus saat wanita mulai memasuki usia reproduksi, data-data tersebut diambil dari data epidemiologi. Sampai saat ini data statistik nasional mioma uteri belum tersedia. Penelitian retrospektif di Manado mendapatkan persentase terbanyak pada rentang usia 36-45 tahun dengan status dominan

nulipara. Mortalitas umumnya karena anemia berat akibat perdarahan hebat. Mortalitas akibat komplikasi pembedahan 0,4-1,1/1000 operasi. (Prawirohardjo, 2015)

Mioma uteri lebih banyak ditemukan pada wanita berkulit hitam, karena wanita berkulit hitam memiliki lebih banyak hormon estrogen dibanding wanita kulit putih. Pernah ditemukan 200 sarang mioma dalam satu uterus pada wanita kulit hitam, dimana biasanya hanya 5-20 sarang saja. Penelitian Baird di Amerika Serikat tahun 2003 terhadap 1364 wanita dengan usia 35-49 tahun, 478 diantaranya menderita mioma uteri yaitu dengan proporsi 35%. Penelitian Sale-Ojeme di London Hospital pada tahun 2008 melaporkan proporsi penderita mioma uteri sebanyak 14,06% yaitu 586 orang dari 2.304 kasus ginekologi. Pada penelitian Management of Uterine Fibroid at The University of Nigeria Teaching Hospital Rnugu tahun 2006 melaporkan proporsi mioma uteri 9,8% dari seluruh kasus ginekologi yaitu 190 kasus dari 1939 kasus ginekologi. Penelitian Daym A di Tikur Anbessa Teaching Hospital, Addis Ababa, Ethiopia tahun 2004 mencatat penderita mioma uteri sebanyak 588 kasus (Lestari, 2016)

Di Indonesia mioma uteri ditemukan 2,3%-11,7% pada semua penderita ginekologi yang dirawat. Jarang sekali mioma ditemukan pada wanita berumur 20 tahun, paling banyak pada umur 35-45 tahun. Mioma ini lebih sering didapati pada wanita nulipara (Prawirohardjo, 2015).

3. Klasifikasi

Menurut letaknya, mioma dapat dibedakan menjadi :

a. Mioma intramural

Mioma intramural terdapat di dinding uterus di antara serabut myometrium. Bila tumor ini besar maka uterus menjadi berbentuk modular dan asimetris. Bila tumor sangat besar maka akan menjadi mioma submukosum dan subserosum (Supriyatiningasih, 2017).

b. Mioma subserosum

Mioma tumbuh keluar di dekat permukaan luar sehingga menonjol ke cavum pelvis atau cavum abdomen. Tumor ini dapat memiliki tangkai yang Panjang. Dapat juga vaskularisasi tambahan dari omentum sehingga tampak seperti tumor primer yang berasal dari omentum. Mioma ini dapat tumbuh hingga menempel pada jaringan lain, misalnya pada ligamentum atau omentum kemudian membebaskan diri dari uterus menjadi mioma parasite(wandering/parastitic fibroid), selain itu mioma ini juga tumbuh di tengah jaringan ligamentum latum menjadi intra limenter (Supriyatiningasih, 2017).


c. Mioma submukosum

Mioma berasal dari bawah endometrium dan menonjol ke dalam rongga uterus. Tipe ini merupakan yang paling sering menimbulkan gejala. Gejala yang paling sering ditimbulkan adalah perdarahan uteri yang abnormal yang disebutkan oleh penekanan terhadap pembuluh darah yang memvaskularisasi endometrium di atasnya atau oleh kontak

dengan endometrium yang berdekatan. Terkadang mioma submukosum ini memiliki tangkai yang Panjang dan dapat keluar melalui serviks menjadi mioma geburt. Gejala mioma yang berhubungan dengan persalinan adalah timbulnya cramping pain pada perut bagian bawah atau pelvis, biasanya disertai dengan hipermenorea. Bila tumor ini dikeluarkan melalui serviks biasanta terjadi ulserasi pada permukaannya sehingga rentan terjadi infeksi dan perdarhan (Supriyatningsih, 2017).

d. Mioma servical

Paling sering terjadi pada bagian posterior sehingga asimptomatik. Bila tumbuh di bagian anterior dapat menekan vesica urinaria. Mioma servikal dapat menimbulkan mucus yang berlebihan dan discharge vagina yang berlebihan, dyspareunia dismenorea dan infertilitas (Supriyatningsih, 2017).



4. Etiologi

Meskipun banyak penelitian mioma uteri, namun etiologi mioma uteri belum diketahui. Hal yang terpenting adalah bahwa semua sel dalam fibroid yang diberikan berasal dari sel tunggal, tetapi penyebab transformasi dari myometrium normal menjadi sel leiomyoma masih belum jelas (Kurniasari, 2018).

5. Faktor Risiko

a. Usia

Menurut (Flake et al., 2003) telah banyak studi epidemiologi yang membuktikan bahwa peningkatan usia mempengaruhi prevalensi mioma uteri. Perkembangan dan pertumbuhan mioma uteri sebenarnya mengalami peningkatan pesat pada wanita di akhir-akhir masa reproduktif. Menurut (Anwar et al., 2011) mioma uteri terjadi pada 20% - 25% perempuan di usia reproduktif, yaitu berumur 35-45 tahun. Mioma uteri jarang ditemukan sebelum usia pubertas dan hampir tidak pernah ditemukan pada usia *menopause*.

Pada usia sebelum *menarche* kadar estrogen rendah dan meningkat pada usia reproduktif, kemudian akan turun pada usia *menopause* (Said, 2004). Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan umur dengan mioma uteri disebabkan karena faktor hormonal.

b. Jumlah Paritas

Peningkatan paritas dapat menurunkan angka kejadian mioma uteri, dan wanita yang berisiko lebih tinggi terkena mioma uteri adalah wanita yang melahirkan >3 kali dibandingkan dengan wanita yang memiliki 1-2 anak saja. Kehamilan pada saat usia 25-29 tahun dapat menghambat terjadinya pembesaran mioma uteri. Wanita yang belum pernah hamil berisiko mengalami mioma uteri karena berhubungan dengan pengaruh paparan hormon seks, estrogen, dan progesterone (Fadillah, 2021).

Beberapa penelitian telah menunjukkan adanya hubungan antara jumlah paritas dengan risiko terjadinya mioma uteri. Risiko relatif mioma uteri pada wanita multipara 0,5 % dibandingkan dengan wanita nulipara (Flake et al., 2003). Hasil penelitian tersebut juga sependapat dengan (Prawirohardjo, 2015), yang mengatakan bahwa perempuan nulipara mempunyai risiko yang tinggi untuk terjadinya mioma uteri, sedangkan perempuan multipara mempunyai risiko yang lebih rendah untuk terjadinya mioma uteri.

Namun pada penelitian lain mengatakan bahwa mioma uteri lebih sering ditemukan pada wanita nulipara atau wanita yang kurang subur. Mioma uteri berkembang pada wanita multipara dengan wanita nulipara, hal ini berkaitan juga dengan keadaan hormonal. Beberapa penelitian menemukan hubungan saling berbalik antara paritas dengan munculnya mioma uteri. Hal ini disebabkan besarnya reseptor estrogen yang berkurang dilapisan miometrium setelah kehamilan (Yosi Apriyani, 2013).

c. Obesitas

Beberapa penelitian epidemiologi menemukan peningkatan risiko perkembangan mioma berhubungan dengan obesitas dan diabetes melitus. Faktor umum yang berkontribusi terhadap hubungan ini adalah resistensi insulin, yang diyakini bertanggungjawab atas risiko berkembangnya mioma pada wanita obesitas, bersamaan dengan peningkatan kadar IGF-1 dan androgen (Sparic et al., 2016)

Menurut (Setiati, 2009) pada dasarnya obesitas terjadi karena energi yang didapat lewat makanan melebihi energi yang dikeluarkan. Ketidakseimbangan ini didapat dari berlebihan yang energinya diperoleh dan atau berkurangnya energi yang dikeluarkan untuk metabolisme tubuh, termoregulasi dan aktivitas fisik. Estrogen dapat dihasilkan secara eksogen (luar ovarium) seperti sel-sel adipose (sel lemak) yang berhubungan dengan konversi hormon androgen menjadi estrogen oleh enzim aromatase di jaringan lemak, sehingga terjadi peningkatan jumlah estrogen tubuh pada wanita dengan berat badan berlebih. (Prawirohardjo, 2015) mengemukakan ukuran besar kecilnya mioma uteri juga dipengaruhi oleh jumlah kalori. Makin gemuk seseorang, makin banyak timbunan kalorinya dan membuat mioma tumbuh cepat. Hal ini karena Obesitas dianggap sebagai satu faktor risiko terjadinya mioma uteri (Manta et.al., 2016).

Menurut McWilliams dan Chennathukuzhi, 2017, menyatakan bahwa IMT berkorelasi dengan meningkatnya insidensi mioma uteri dimana

untuk setiap penambahan 10 kg berat badan, risiko terjadinya mioma uteri meningkat lebih dari 20%. Selain itu, studi lain juga secara spesifik menyatakan bahwa adanya kenaikan 6% risiko menderita mioma uteri untuk setiap unit kenaikan Indeks Massa Tubuh (IMT). Penemuan serupa juga melaporkan risiko mioma uteri meningkat pada wanita yang memiliki lemak lebih dari 30%. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh (Tak et al, 2016) peningkatan dalam obesitas diikuti oleh peningkatan dalam konversi androgen adrenal yang bersirkulasi menjadi estrogen akibat akumulasi jaringan adiposa oleh enzim aromatease di jaringan lemak. Hasilnya terjadi peningkatan jumlah esterogen tubuh (Laning et al., 2019).

d. Genetic

Risiko kejadian tumor akan meningkat 2,5 kali lipat pada keturunan pertama pasien mioma uteri (Lubis PN, 2020).

e. *Menarche*

Menarche dini pada usia kurang dari 10 tahun akan meningkatkan risiko mioma uteri akibat sel Rahim terus terpapar esterogen (Lubis PN, 2020).

6. Patofisiologi

Mioma uteri sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mioma uteri diawali dari satu sel neoplasia didalam otot polos myometrium yang terus tumbuh. Mioma uteri lebih banyak dijumpai pada wanita dengan obesitas. Pertumbuhan miom

dipengaruhi oleh steroid seks, estrogen progesteron dan beberapa faktor pertumbuhan. Pada kehamilan miom akan bertambah besar, dan keluhannya akan meningkat, tetapi pembesaran ini terutama hanya terjadi pada kehamilan trimester pertama. Pada beberapa miom terutama yang berukuran besar ada yang mengecil pada akhir kehamilan. Kehamilan dengan miom kemungkinan terjadinya premature 15-20%, gangguan pertumbuhan janin intra uterine 10% dan kelainan letak 20% (Wiyati et al., 2022).

Sejumlah faktor dihubungkan dengan kejadian mioma uteri yang dikenal dengan nama lain leiomyoma uteri yaitu hormonal, proses inflamasi, dan growth factor. *Mutase genetic* menyebabkan produksi reseptor estrogen di bagian dalam myometrium bertambah signifikan. Sebagai kompensasi, kadar estrogen menjadi meningkat akibat aktivitas aromatisasi yang tinggi. Enzim ini membantu proses aromatisasi androgen menjadi estrogen. Estrogen akan meningkatkan proliferasi sel dengan cara menghambat jalur apoptosis, serta merangsang produksi sitokin dan platelet derived growth factor (PDGF) dan epidermal growth factor (EGF). Estrogen juga akan merangsang terbentuknya reseptor progesterone terutama di bagian luar myometrium.

Progesterone mendasari terbentuknya tumor melalui perangsangan insulin like growth factor (IGF-1), transforming growth factor (TGF), dan EGF. Peranan progesterone yang merangsang proto-onkogen, beta cell lymphoma -2 (BCL-2), suatu inhibitor apoptosis dan menemukan bukti

bahwa gen ini lebih banyak diproduksi saat fase sekretori siklus menstruasi. Siklus hormonal inilah yang melatarbelakangi berkurangnya volume tumor pada saat *menopause* (Lubis PN, 2020).

7. Patogenesis

Ada tiga teori terjadinya mioma uteri :

a. Teori cell nest/genioblast (sell immature/sell embryonal)

Teori ini menyatakan bahwa di antara sel-sel myometrium normal terdapat sarang-sarang sel embryonal. Sel-sel ini lebih sensitive dalam mengikat estrogen (Supriyatiningasih, 2017).

b. Teori hiperestrogen

Percobaan yang dilakukan oleh Lipschuta yang memberikan estrogen pada kelinci percobaan ternyata menimbulkan tumor fibromatosa baik pada permukaan maupun pada tempat lain dalam testostosterone. Efek fibromatosa ini dapat dicegah dengan pemberian preparate progesterone atau testostosterone. Pada manusia, esterogen yang diperoleh dari luar tubuh biasanya berasal dari kontrasepsi, sedangkan dari dalam produksi esterogen dipengaruhi oleh glandula hipofisis dan ovarium (Supriyatiningasih, 2017).

c. Teori reseptor

Reseptor esterogen pada mioma ternyata lebih banyak daripada sel-sel myometrium normal (Supriyatiningasih, 2017).

8. Manifestasi Klinis

Sebagian besar kasus mioma uteri ditemukan secara kebetulan pada pemeriksaan ginekologik karena tumor ini bersifat asimtomatik. Gejala dari mioma bervariasi tergantung dari ukuran, jumlah, dan lokasinya. Kebanyakan wanita dengan mioma bersifat asimtomatis; gejala muncul dalam 10-40% wanita yang menderita penyakit ini. Adapun gejala yang mungkin timbul antara lain:

- Perdarahan Uterus Abnormal (PUA)

Perdarahan Uterus Abnormal merupakan gejala yang paling sering dihubungkan dengan mioma uteri, muncul hingga >30% wanita yang menderita penyakit ini. Tipe perdarahan yang muncul adalah perdarahan berlebih saat periode menstruasi yaitu >80 ml (heavy menstruation bleeding), intermenstrual bleeding, atau kedua-duanya (Sirait, 2021).

- Nyeri

Mioma yang tidak berkomplikasi biasanya tidak menyebabkan nyeri. Nyeri akut dihubungkan dengan mioma, biasanya disebabkan oleh torsio mioma yang bertangkai (peduncle) atau infark yang progresif menjadi degenerasi dalam mioma. Nyeri bisa timbul akibat kontraksi miometrium yang disebabkan oleh mioma subserosum. Beberapa pasien dengan mioma intramural mengeluhkan dismenore yang muncul lagi setelah beberapa tahun periode menstruasi bebas nyeri. Nyeri akibat mioma bisa muncul saat berhubungan seksual (dispareunia)(Sirait, 2021).

- Gangguan Penekanan

Gangguan ini tergantung dari besar dan letak mioma uteri. Penekanan pada kandung kemih akan menyebabkan poliuri, pada uretra dapat menyebabkan retensio urin, pada ureter dapat menyebabkan hidroureter dan hidronefrosis, pada rektum dapat menyebabkan konstipasi, pada pembuluh darah dan pembuluh limfe di panggul dapat menyebabkan edema tungkai dan nyeri panggul (Sirait, 2021).

- Infertilitas

Infertilitas adalah kegagalan untuk hamil setelah ≥ 1 tahun melakukan hubungan seksual tanpa pelindung. Infertilitas dapat ditemukan pada wanita yang mengalami mioma uteri, hal ini disebabkan karena pertumbuhan dari mioma uteri dapat mengganggu transport sperma untuk bertemu dengan ovum serta mengganggu proses implantasi embrio (Sirait, 2021).

- Kelainan berhubungan dengan kehamilan

Kehamilan memiliki efek yang bervariasi dan tidak terprediksi pada pertumbuhan mioma, tergantung dari genetik individu, faktor pertumbuhan, dan reseptor mioma lokal. Sebagian besar mioma tidak bertambah ukurannya selama kehamilan. Jarang keberadaan mioma dalam kehamilan menimbulkan luaran yang

tidak diinginkan. Adapun beberapa efek yang dapat ditimbulkan mioma dalam kehamilan seperti abortus, persalinan preterm, ketuban pecah dini (KPD), pertumbuhan janin terhambat (PJT), plasenta previa, solusio

plasenta, perdarahan post partum (HPP), rest placenta. Kehamilan dengan adanya mioma meningkatkan risiko untuk operasi Caesar (Sirait, 2021).

9. Penegakan Diagnosis

a. Anamnesis

Gejala utama yang didapatkan (Lubis PN, 2020) :

1. Terasa adanya desakan pada perut bagian bawah yang membuat tidak nyaman, nyeri pinggang area bawah saat menstruasi disertai perut nyeri, sembelit, poliuri, sensasi kenyang dan terasa nyeri saat melakukan hubungan seks.
2. Adanya semacam hambatan saat menstruasi yakni menorrhagia-menometrorrhagia disertai gumpalan darah, perdarahan vagina di luar siklus haid, perdarahan yang berkepanjangan, dismenorrhagia. Umumnya lebih berat khususnya pada mioma tipe submucosa.
3. Keluhan sekunder yaitu sering mengalami abortus spontan atau sulit hamil, persalinan prematuritas, infertilitas, dan keluhan akibat anemia. Terutama terjadi pada mioma submukosum. Mioma intramural dengan ukuran $>2,5$ cm dapat mengganggu proses persalinan normal

b. Pemeriksaan Fisis

Ditemukan adanya kondisi anemis yang ditandai adanya tangan dan kaki yang pucat serta konjungtiva (Lubis PN, 2020).

1. Palpasi abdomen
 - Teraba tumor bagian bawah abdomen, padat, mobile atau terfiksir
 - Konsistensi padat atau padat kenyal
2. Pemeriksaan dalam
 - Teraba uterus membesar, mungkin berbenjol-benjol
 - Teraba Mobile atau terfiksir


c. Pemeriksaan Penunjang

1. Laboratorium darah dengan melakukan pemeriksaan hemoglobin atau hematokrit dilakukan pada pasien dengan perdarahan vaginal yang berlebihan. Untuk mengetahui tingkat kehilangan darah dan penggantian yang adekuat. Anemia adalah akibat paling sering akibat mioma, hal tersebut disebabkan karena terdapat perdarahan uterus yang banyak dan cadangan zat besi yang habis. Pemeriksaan profil koagulasi dan waktu perdarahan dilakukann bila ada riwayat diathesis perdarahan (Lubis PN, 2020).
2. USG-transvaginal/abdominal akan menampilkan kondisi uterus yang membesar. USG transabdominal dapat menegakkan mioma uteri dengan sensitivitas, spesifisitas, dan predictive value 100%. Sedangkan USG transvaginal memiliki sensitivitas 90%, spesifisitas 98% dan predictice value 90-98% (Supriyatiningih, 2017).

3. Histeroskopi digunakan untuk melihat adanya mioma uteri submucosa, jika mioma kecil serta bertangkai. Mioma tersebut sekaligus dapat diangkat.
4. MRI sangat akurat dalam menggambarkan jumlah, ukuran, dan lokasi mioma tetapi jarang diperlukan. Pada MRI, mioma tampak sebagai massa gelap berbatas tegas dan dapat dibedakan dari myometrium normal. MRI dapat mendeteksi lesi sekecil 3 mm yang dapat dilokalisasi dengan jelas termasuk mioma (Lubis PN, 2020).
5. Biopsi berguna untuk membedakan mioma dan leiomyosarcoma serta menentukan jenis mioma. Biopsi juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknik *fine needle aspiration biopsy* (FNAB). Setiap tumor yang dicurigai sebagai mioma harus dievaluasi secara histologis dan menyeluruh, terutama untuk aktivitas mitosis, atypia, dan bukti nekrosis. Secara histologis mioma tidak menunjukkan adanya ketiga hal tersebut sehingga dapat dibedakan dengan leiomyosarcoma. Pada pemeriksaan histologis mioma ditemukan nodul terdiri atas serabut otot polos yang menebal dan saluran vaskulariasis yang dikelilingi kapsul tipis. Pembentukan trombus, sel lemak, dan infiltrat limfositik ditemukan pada tumor ini. Tumor otot polos yang berhubungan dengan EBV terdiri dari pola vesikular yang berdiferensiasi baik, sitoplasma eosinofilik cerah, dan inti memanjang dan tumpul yang menunjukkan atypia yang bervariasi. Dapat terlihat nekrosis dan aktivitas mitosis yang bervariasi (Lubis PN, 2020).

6. Secara histopatologi, mioma uteri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu (Lubis PN, 2020) :

- *Cellular leiomyoma* yang lebih dominan bagian selulernya, tidak terdapat nucleus atipikal dan indeks mitosisnya rendah ($\leq 4/10$ *high power field*)
- *Leiomyoma with bizarre nuclei (atypical/symplastic leiomyoma)* ditandai dengan *bizarre pleomorphic nuclei*. Pada jenis ini aktivitas mitosisnya juga rendah, dan bila terdapat karioreksis bisa disalah artikan sebagai mitosis atipikal.
- *Mitotically active leiomyoma* yang memiliki gambaran mitosis tinggi (>10 mitosis per 10 HPF), tidak memiliki nukleus atipikal dan tidak terdapat nekrosis. Mioma jenis ini sering terjadi akibat pengaruh hormonal dan paling sering ditemukan pada usia reproduktif.
- *Dissecting('cotyledenoid')leiomyoma* yang ditandai dengan adanya perubahan hidrofilik pada gambaran sel tumor.
- *Diffuse leiomyomatosis* merupakan jenis yang paling jarang, merupakan tipe paling invasif yang sering mengenai kavum peritoneum dan histopatologis mirip gambaran tumor ganas.
- Kondisi borderline yang jarang, namun masih mungkin ganas, adalah *smooth muscle tumours of uncertain malignant potential* (STUMP) yang memiliki aktivitas mitosis intermediate (5- 10 mitosis per 10 HPF), memiliki gambaran miksoid, nekrosis, serta terdapat nukleus atipikal dan sel epiteloid.



Gambar 2. Pemeriksaan Penunjang Mioma Uteri

Gambar tersusun searah jarum jam menunjukkan (Sparic et al., 2016):

- a) Pemindaian transversal transvaginal menunjukkan mioma koprak posterior
- b) Pemindaian transvaginal eco Doppler mendeteksi pseudokapsul mioma sebagai "cincin api"
- c) MRI panggul T2 menunjukkan peningkatan mioma koprak posterior dengan cincin putih
- d) Gambar laparoskopik menunjukkan enukleasi mioma yang dikelilingi pseudokapsul. Tanda panah menunjukkan

pseudokapsul mioma, sebagai jaringan ikat fibrovaskular yang mengelilingi mioma

- e) Gambar laparotomi menunjukkan mioma uterus besar yang dikelilingi oleh pseudokapsul selama enukleasi dari miometrium.

10. Tatalaksana

a. Terapi Konservatif

Dalam 10 tahun terakhir terdapat usaha dalam melakukan pengobatan terhadap mioma uterus dengan GnRH agonis. Selama kurang lebih 3 bulan melakukan pengobatan mioma uteri dengan cara GnRH menghasilkan degenerasi hialin di myometrium hingga uterus menjadi kecil. Apabila pengobatan GnRH dihentikan maka mioma yang lisut akan tumbuh kembali karena adanya pengaruh dari esterogen oleh karena mioma itu masih mengandung reseptor esterogen dalam konsentrasi tinggi (POGI, 2013).

b. Terapi Operatif

Apabila mioma menampakkan gejala yang tidak dapat ditangani dengan pengobatan konservatif maka tindakan yang dilakukan antara lain:

- Miomektomi

Miomektomi yakni melakukan pengangkatan sarang mioma tanpa mengambil uterus. Tindakan ini cocok untuk wanita yang

ingin mempertahankan fungsi reproduksinya serta dapat dikerjakan dengan cara ekstirpasi lewat vagina seperti pada mioma submukosum (Djuwantono, 2018).

- Histerektomi

Histerektomi adalah tindakan terpilih yaitu dengan pengangkatan uterus dan dapat dilakukan secara perabdomen atau pervaginam. Umumnya dilakukan demi mencegah timbulnya kanker serviks. Adanya tindakan ini sangat sesuai bagi wanita yang sudah berusia >40 tahun yang enggan untuk menambah keturunan serta yang memiliki tumor yang lebih besar dari kehamilan 12 minggu disertai adanya gangguan penekanan atau tumor yang cepat membesar (Djuwantono, 2018).

c. Terapi medikamentosa

Terapi medikamentosa yang dapat memperkecil volume atau menghentikan pertumbuhan mioma uteri secara menetap belum tersedia pada saat ini. Terapi medikamentosa masih merupakan terapi tambahan atau terapi pengganti sementara dari terapi operatif.

Adapun preparat yang selalu digunakan untuk terapi medikamentosa adalah analog GRH, progesterone, danazol, gestrinon, tamoksifen, goserelin, anti-prostaglandin, agen-agen lain (gossipol, amantadine) (Lubis PN, 2020).

11. Tindakan Preventif

Tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diagnose dini dan pengobatan yang tepat. Adapun tindakan lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dapat diberikan penyuluhan tentang mioma uteri dan menganjurkan mengonsumsi makanan yang tinggi serat seperti sayuran dan buah. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan manajemen nyeri karena salah satu gejala yang dialami oleh pasien mioma uteri adalah nyeri abdomen. Pencegahan tersier dapat dilakukan pada penderita paca-operasi yang harus mendapatkan asupan gizi yang cukup dalam masa pemulihannya seperti memberikan pengetahuan tentang asupan yang bergizi untuk penderita mioma post-operasi (Pratama et al., 2021).

12. Komplikasi

- Degenerasi ganas

Mioma uteri yang menjadi leiomyosarkoma ditemukan hanya berkisar sekitar 0,32-0,6% dari seluruh mioma. Keganasan biasanya baru ditemukan pada pemeriksaan histologis dari uterus yang telah diangkat. Kecurigaan terjadinya keganasan apabila didapatkan mioma menjadi cepat membesar, apalagi pembesaran tersebut terjadi setelah wanita tersebut masuk ke dalam masa *menopause* (Supriyatiningih, 2017).

- Torsi

Bila terjadi torsi akan timbul gangguan sirkulasi akut sehingga tumor mengalami nekrosis. Tumor yang mengalami nekrosis, terutama jika subserosum akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat, terjadilah sindroma abdomen akut (Supriyatiningih, 2017).

13. Prognosis

Prognosis mioma uteri sangat rendah tetapi dapat kambuh walau telah dilakukan miomektomi. Mioma dapat menyebabkan infertilitas dan jika terjadi bersamaan dengan kehamilan umumnya meningkatkan risiko persalinan section caesaria (Lubis PN, 2020).

B. *Kajian Integrasi Keislaman*

Dalam hadits Rasulullah saw. bersabda:

“Barangsiapa yang di pagi hari tubuhnya sehat, dadanya tenteram dan ia mempunyai persediaan makan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia ini diperuntukkan baginya” (HR.Turmudzi).

Dalam agama kita diperintah oleh Rasulullah SAW agar berdoa minta dianugerahi dua kesehatan, yakni kesehatan agama dan kesehatan dunia.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman membuktikan bahwa ada beberapa penyakit yang telah muncul pada waktu tertentu. Yang tidak dapat sembuh dan kemudian penderita sembuh dalam waktu singkat atau lama. Hal ini disebabkan oleh faktor- faktor personal maupun kemajuan sarana dan prasarana.

selama ini dia telah diberi rahmat sehat yang banyak. Namun Kesehatan yang dimilikinya itu sering kali di abaikan, bahkan mungkin disia-siakan. Padahal ia mempunyai harga yang sangat bernilai tiada tolak ukur dan bandingannya (Kemenag RI, 2019).

Q.S An-Najm ayat 39

وَأَنْ لَّا يَكْفُرْ بِاللَّهِ
الَّذِي بَدَأَهُ
وَأَنْ لَّا يَكْفُرْ بِاللَّهِ
الَّذِي بَدَأَهُ

Artinya :

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-mishbah mengemukakan bahwa seorang manusia tidak memperoleh balasan selain dari apa yang telah diusahakannya. Menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi:

“(Dan bahwasanya) bahwasanya perkara yang sesungguhnya itu ialah (seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya), yaitu memperoleh kebaikan dari usahanya yang baik, maka dia tidak akan memperoleh kebaikan sedikit pun dari apa yang diusahakan oleh orang lain.


Sehat dan sakit merupakan karunia Allah tak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Apabila mendapat anugerah sakit, kita tidak boleh berdiam diri tanpa usaha untuk sembuh, tetapi kita dituntut untuk ikhtiar semaksimal mungkin. Adapun hasilnya tetap merupakan ketentuan Allah.

”Disamping itu setiap muslim yang sakit di perintahkan pula untuk berobat kepada ahlinya dan perbuatan tersebut juga bernilai ibadah sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. : “Allah tidak menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Ikhtiar untuk sembuh dari sakit harus disertai semangat, kesabaran dan keyakinan untuk sehat kembali. Hal itu akan mempermudah dalam menjalani pengobatan, baik secara medis (dokter), serta tak lupa harus


C. Kerangka Teori

Bagan 2.1. Kerangka Teori



D. Kerangka Konsep

Bagan 2.2 Kerangka Konsep



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif, kemudian menggunakan jenis penelitian analitik observasional dengan korelasi pendekatan *cross sectional*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RS Ibnu Sina Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2023 – Januari tahun 2024.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang ada dalam penelitian ini adalah kejadian mioma uteri.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah usia, jumlah paritas, dan obesitas.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek yang ada dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar yang terdiagnosis mioma uteri. Jumlah kelompok kasus pada tahun 2022 sebanyak 31 kasus dan pada bulan januari-oktober tahun 2023 sebanyak 24 kasus sehingga total sebanyak 55 kasus.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana memilih sampel dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang telah ditentukan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel minimal

N : jumlah sampel populasi = 55

e : *error margin* = 0,05

$$n = \frac{55}{1 + (55 \times 0,05^2)} = 48,351 \text{ dibulatkan } 48$$

Dari hasil tersebut, maka didapatkan jumlah sampel minimal pada penelitian ini sebanyak 48 kasus kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar.

Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yaitu :

a. Kriteria Inklusi

- a) Wanita yang mengalami dan tidak mengalami mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar
- b) Memiliki data lengkap yang tercatat di rekam medik
- c) Memiliki keluhan perdarahan uterus abnormal

b. Kriteria Eksklusi

- a) Wanita yang sedang hamil
- b) Wanita yang terdiagnosis penyakit kronik lainnya.

a) Metode Pengumpulan Data

Pengambilan sampel menggunakan data sekunder, yaitu dilakukan dengan mencatat variabel yang dibutuhkan dalam rekam medik pasien mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar dengan mengambil 53 kasus dengan mioma uteri dan 53 kasus yang tidak mengalami mioma uteri (perbandingan 1:1).

b) Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rekam medik wanita yang terdapat di RS Ibnu Sina Makassar tahun 2022-2023. Data yang digunakan adalah rekam medik pasien yang terdiagnosis mioma uteri dan tidak mioma uteri.

c) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a. Teknik Editing

Dalam proses *editing* data, data yang sudah diperoleh dari pengumpulan data pasien rekam medik, dilakukan pengecekan kembali untuk melihat kelengkapan data.

b. Coding

Dalam penelitian ini, data yang di-*coding* adalah usia, jumlah paritas, obesitas dan mioma uteri.

- Usia dengan *code*

- | | |
|----------------|---|
| 1) <35 tahun | 1 |
| 2) 35-45 tahun | 2 |
| 3) >45 tahun | 3 |

- Jumlah paritas dengan *code*

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Nulipara | 1 |
| 2) Primipara | 2 |
| 3) Multipara | 3 |
| 4) Grandemultipara | 4 |

- Obesitas dengan *code*

- | | |
|-------------------|---|
| 1) Obesitas | 1 |
| 2) Tidak obesitas | 2 |

- Mioma uteri dengan *code*

- | | |
|----------------------|---|
| 1) Mioma uteri | 1 |
| 2) Tidak Mioma uteri | 2 |

c. Data Entry atau Processing

Memasukkan *code* yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan data yang telah diperoleh ke dalam aplikasi SPSS

d. Cleaning

Melakukan pemeriksaan ulang data dari *entry* data di computer untuk menghindari perbedaan antara data computer dan koding lembar *check-list* observasi.

2. Analisis Data


Data yang diperoleh dari rekam medik RS Ibnu Sina Makassar akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi. Data rekam medik akan dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data tersebut diolah menggunakan *Statistical Package For the Social Sciences* (SPSS). Data yang dianalisis sebagai berikut :

a. Analisis Univariat

Analisis univariat dapat digunakan untuk menjelaskann karakteristik masing-masing variabel, variabel dalam penelitian ini adalah usia, jumlah paritas dan, obesitas. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Analisa data univariat untuk mengolah data deskriptif tentang hubungan antar variabel dengan mioma uteri yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan presentasi.


b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang menguji antara korelasi kedua variabel dalam penelitian, yaitu variabel independen dengan variabel dependen penelitian. Analisis ini menguji hipotesis peneliti. Analisis data yang digunakan adalah *Chi Square* dengan bantuan *software* uji statistik. Uji *statistic chi square* digunakan untuk mengetahui terdapat hubungan bermakna antara variabel independent dan dependen dengan bantuan aplikasi SPSS



d) Alur Penelitian

Bagan 3.1 Kerangka Alur Penelitian




e) Penyajian Data

Penyajian data akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi

f) Etika Penelitian

Peneliti akan mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan di RS Ibnu Sina Makassar dari bulan Desember 2023 hingga Januari 2024 diperoleh total sampel adalah 106 data, yaitu sampel data mioma uteri dan non mioma uteri. Hasil penelitian yang didapatkan diuraikan secara rinci dalam tabel dan penjelasan sebagai berikut.

1. Analisis Univariat

Tabel 4.1. Distribusi Karakteristik

Karakteristik	n (%)
Usia	
<35 tahun	12 (11,3%)
35-45 tahun	37 (34,9%)
>45 tahun	57 (53,8%)
Jumlah Paritas	
Nulipara	51 (48,1%)
Primipara	12 (11,3%)
Multipara	39 (36,8%)
Grandemultipara	4 (3,8%)
Status Obesitas	
Obesitas	48 (45,3%)
Tidak Obesitas	58 (54,7%)
Status Menikah	
Sudah menikah	95 (89,6%)
Belum Menikah	11 (10,4%)

Sumber: Data Sekunder, 2024

Pada tabel 4.1. di atas ditunjukkan distribusi karakteristik dari 106 sampel yang terdiri dari usia, jumlah paritas, status gizi, status menikah, dan agama. Pada usia <35 tahun sebanyak 12 (11,3%) data, usia 35-45 tahun sebanyak 37 (34,9%) data, dan usia >48 tahun sebanyak 57 (53,8%) data. Kemudian untuk kategori jumlah paritas dengan nulipara sebanyak 51 (48,1%)

data, kemudian multipara sebanyak 39 (36,8%) data, yang primipara sebanyak 12 (11,3%) data, dan grandemultipara sebanyak 4 (3,8%).

Kategori status obesitas, distribusi status didapatkan frekuensi sebanyak 48 (45,3%) yang mengalami obesitas dan sebanyak 58 (54,7%) yang tidak mengalami obesitas. Adapun pada kategori status menikah menunjukkan sebanyak 95 (89,6%) sudah menikah dan sebanyak 11 (10,4%) yang belum menikah.

Tabel 4.2. Distribusi Variabel Penelitian

Variabel	n (%)
Usia	
<35 tahun	12 (11,3%)
35-45 tahun	37 (34,9%)
>45 tahun	57 (53,8%)
Jumlah Paritas	
Nulipara	51 (48,1%)
Primipara	12 (11,3%)
Multipara	39 (36,8%)
Grandemultipara	4 (3,8%)
Status Obesitas	
Obesitas	48 (45,3%)
Tidak Obesitas	58 (54,7%)
Kejadian Mioma Uteri	
Mioma uteri	53 (50,0%)
Tidak Mioma uteri	53 (50,0%)

Sumber: Data Sekunder, 2024

Pada tabel 4.2. ditunjukkan distribusi variabel yang didapatkan dalam penelitian. Pada variabel independen yakni kejadian mioma uteri dengan frekuensi yang mengalami mioma uteri sebanyak 53 (50,0%) dan yang tidak mengalami mioma uteri sebanyak 53 (50,0%).

Pada variabel dependen pada penelitian ini adalah usia, jumlah paritas, dan obesitas. Dengan data terkait usia didapatkan frekuensi usia <35 tahun sebanyak 12 (11,3%) data, usia 35-45 tahun sebanyak 37 (34,9%) data, dan usia >48 tahun sebanyak 57 (53,8%) data. Data terkait jumlah paritas didapatkan frekuensi sebanyak 51 (48,1%) pasien nulipara atau tidak pernah melahirkan, sebanyak 12 (11,3%) pasien multipara atau pernah melahirkan satu kali anak lahir hidup, sebanyak 39 (36,8%) pasien multipara atau melahirkan 2-4 anak lahir hidup, dan sebanyak 4 (3,8%) pasien dengan status grandemultipara atau melahirkan anak lahir hidup sebanyak. Data terkait status obesitas didapatkan frekuensi sebanyak 48 (45,3%) yang mengalami obesitas dan sebanyak 58 (54,7%) yang tidak mengalami obesitas.

2. Analisis Bivariat

Tabel 4.3. Hubungan Usia dengan Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar

Usia	Kejadian Mioma Uteri				Total	<i>p-value</i>
	Mioma		Tidak Mioma			
	n	(%)	n	(%)		
<35 tahun	4	3,8	8	7,5	12	11,3
35-45 tahun	22	20,8	15	14,2	37	34,9
>45 tahun	27	25,5	30	28,3	57	53,8

Sumber: Data Sekunder, 2024

Pada tabel 4.3. disajikan tabulasi silang dan hasil uji *chi square* hubungan usia dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar menunjukkan tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian mioma uteri. Hasil dalam penelitian ini didapatkan nilai *p-value* usia dan kejadian mioma

uteri adalah 0,245 tidak memenuhi kriteria nilai $\alpha < 0,05$. Selain itu, wanita dengan usia >45 tahun memiliki faktor lebih besar mengalami mioma uteri dibandingkan dengan usia <35 tahun dan 35-45 tahun.

Tabel 4. 4. Hubungan Jumlah Paritas dengan Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar

Jumlah Paritas	Kejadian Mioma Uteri						<i>p-value</i>
	Mioma		Tidak Mioma		Total		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
Nulipara	30	28,3	21	19,8	51	48,1	0,279
Primipara	6	5,7	6	5,7	12	11,3	
Multipara	16	15,1	23	21,7	39	36,8	
Grandemultipara	1	0,9	3	2,8	4	3,8	

Sumber: Data Sekunder, 2024

Pada tabel 4.4. didapatkan tabulasi silang dan hasil Uji *Chi Square* hubungan jumlah paritas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar menunjukkan tidak terdapat hubungan antara jumlah paritas dengan kejadian mioma uteri. Hasil dalam penelitian ini didapatkan nilai *p-value* jumlah paritas dan kejadian mioma uteri adalah 0,279 tidak memenuhi kriteria nilai $\alpha < 0,05$.

Tabel 4.5. Hubungan Obesitas dengan Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar

Status Obesitas	Kejadian Mioma Uteri						<i>p-value</i>
	Mioma		Tidak Mioma		Total		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
Obesitas	25	23,6	23	21,7	48	45,3	0,845
Tidak Obesitas	28	26,4	30	28,3	58	54,7	

Sumber: Data Sekunder, 2024

Pada tabel 4.5. didapatkan tabulasi silang dan hasil Uji *Chi Square* hubungan obesitas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar menunjukkan tidak terdapat hubungan antara obesitas dengan kejadian mioma uteri. Hasil dalam penelitian ini didapatkan nilai *p-value* obesitas dan mioma uteri adalah 0,845 tidak memenuhi kriteria nilai $\alpha < 0,05$

B. Pembahasan

1. Hubungan usia dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah selesai, didapatkan hasil mayoritas usia wanita yang mengalami mioma uteri adalah usia >45 tahun dengan jumlah 27 (25,5%) data. Hasil pengolahan data menggunakan analisis *pearson chi-square* diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,245. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh (Ade Dinda et al., 2021) menggunakan metode pendekatan retrospektif dengan sampel 144 responden dan *p-value* 0,616 tidak memenuhi kriteria nilai $\alpha < 0,05$ didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan dari usia dengan kejadian mioma uteri.

Dari hasil penelitian didapatkan mayoritas usia >45 tahun lebih banyak mengalami mioma uteri dibanding dengan usia <45 tahun, yang seharusnya usia berisiko terkena mioma uteri terdapat pada usia 35-45 tahun dikarenakan pada usia sebelum menarche kadar estrogen rendah, dan akan meningkat pada usia

reproduksi, serta turun pada usia menopause (Ridwan et al., 2021). Umumnya usia menopause dimulai dari usia 45 tahun, maka usia >45 tahun akan mengalami penurunan jumlah kadar esterogen di dalam tubuh. Hal tersebut yang mendasari tidak adanya hubungan yang bermakna antara usia dan kejadian mioma uteri pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan (Ridwan et al., 2021) menggunakan metode *case control* dengan sampel 101 responden dan *p-value* 0,031 memenuhi kriteria nilai $\alpha < 0,05$ didapatkan bahwa terdapat hubungan dari usia dengan kejadian mioma uteri dengan hasil analisis diperoleh OR 2,318 yang artinya usia berisiko (35-45 tahun) berpeluang mengalami mioma uteri 2,3 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang berusia tidak berisiko (< 35 tahun dan >45 tahun).

Penelitian ini tidak sejalan dengan (Asmaul et al., 2018) dengan menggunakan metode pendekatan *case control* dengan sampel sebanyak 152 responden dan *p-value* 0,000 memenuhi kriteria $\alpha < 0,05$ didapatkan bahwa terdapat hubungan antara umur dengan kejadian mioma uteri dengan hasil analisis diperoleh OR 4,317 yang artinya responden berusia lebih dari 35 tahun 4,3 kali lebih besar berpeluang mengalami mioma uteri dibandingkan responden berusia <35 tahun. Dan di perkuat oleh Wikjosastro yaitu kasus mioma tertinggi pada usia 35-49 tahun yang disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan mioma uteri di pengaruhi oleh stimulasi hormon esterogen yang disekressikan oleh ovarium. Umumnya mioma uteri jarang timbul sebelum *menarche* dan sesudah *menopause* banyak mioma uteri menjadi lisut, hanya 10% saja yang masih tumbuh lanjut.

Berdasarkan data yang didapatkan diketahui bahwa lebih banyak wanita dengan usia >45 tahun mengalami mioma uteri. Hal tersebut dapat disebabkan karena pada usia sebelum *menarche* kadar esterogen rendah, meningkat pada usia reproduksi, dan turun kembali pada usia *menopause*. Kadar esterogen yang meningkat tinggi tersebut menjadi salah satu faktor risiko terjadinya peningkatan mioma uteri. (Prawirohardjo, 2007)

Jarang sekali mioma uteri ditemukan pada wanita yang berusia <20 tahun. Mioma uteri sangat sering memberikan gejala klinis pada usia 35-45 tahun yang tumbuh karena stimulasi hormon esterogen. Hormon esterogen akan disekresikan oleh ovarium ketika pubertas dan meningkat secara berangsur-angsur. (Melissa Conrad Stoppler, 2006)

Pada penelitian (Emmey Grames, 2020) mengatakan bahwa perkiraan mioma uteri tumbuh dengan waktu tiga tahun yang akan membentuk ukuran sebesar tangan di kepal. Usia menjadi salah satu faktor risiko terjadinya mioma uteri dikarenakan adanya stimulasi hormon esterogen dari sekresi ovarium yang mempengaruhi perkembangan dan juga pertumbuhan mioma uteri (Meilani et al., 2020).

Pertambahan hormon dalam tubuh setiap orang berbeda-beda, sehingga distribusi mioma uteri pada kelompok usia bervariasi. Penelitian (Fitri Indriyana, 2020) menyebutkan bahwa wanita yang akan mengalami masa reproduksi lebih mudah mengalami masalah yang berhubungan dengan organ reproduksi, wanita yang berusia 41-50 tahun memiliki prevalensi sangat sering pada kejadian mioma uteri dan rentan tidak menimbulkan gejala apapun.

Setelah beberapa tahun berikutnya akan merasakan gejala seperti mual, muntah, cepat letih dan perdarahan uterus abnormal. Bertambahnya usia wanita akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan mioma uteri namun mengecil saat *postmenopause* (Perwitosari, 2019)

2. Hubungan jumlah paritas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah selesai, didapatkan hasil mayoritas wanita dengan jumlah paritas yang mengalami mioma uteri adalah nullipara dengan jumlah 30 (28,3%) data. Hasil pengolahan data menggunakan analisis *pearson chi-square* diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,245. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara jumlah paritas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar. Maka dari itu, tidak terdapat hubungan bermakna antara nullipara yaitu wanita yang sama sekali tidak pernah melahirkan anak hidup, namun mayoritas wanita dengan jumlah paritas nullipara mengalami mioma uteri dan di ikuti oleh wanita dengan jumlah paritas multipara lalu primipara dan terakhir adalah grandemultipara.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh (Novitasari et al., 2019) menggunakan metode *cross sectional* dengan sampel 141 dan *p-value* 0,000 memenuhi kriteria nilai $\alpha < 0,05$ didapatkan bahwa terdapat hubungan dari jumlah paritas dengan kejadian mioma uteri. Penelitian ini menunjukkan bahwa paritas berisiko yaitu nullipara dan primipara pada ibu yang mengalami mioma uteri berpeluang 2,24 kali lebih besar dibandingkan pada ibu dengan paritas yang tidak berisiko yaitu multipara dan grandemultipara.

Berdasarkan data yang didapatkan diketahui bahwa lebih banyak wanita dengan nulipara mengalami mioma uteri. Hal ini dapat disebabkan oleh sekresi esterogen yang berasal dari ovarium sehingga terjadi proliferasi jaringan uterus (Prawirohardjo, 2017). Dan di dukung (Hoffmann BL, et al., 2012) tentang multiparitas dapat menurunkan risiko mioma uteri yang dikaitkan pada masa ibu menyusui dan wanita yang *postpartum* dikarenakan menyusui dapat menyebabkan penekanan pada hormon ovarium salah satunya estrogen yang mempengaruhi perkembangan mioma pada uterus. Hal tersebut juga dapat dikaitkan tentang proses *remodeling myometrium postpartum*.

Pada penelitian (Jannah M, et al., 2015) menjelaskan proses *remodeling* bertanggungjawab pada penurunan ukuran mioma uteri. myometrium akan kembali ke ukuran asal, sirkulasi (aliran darah), dan berat asal melalui proses apoptosis (kematian jaringan) dan diferensiasi (pemisahan). Mioma uteri akan kekurangan suplai darah serta nutrisi ketika *postpartum* akibat vaskular uterus yang kembali pada keadaan atau ukuran asal.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Laning et al., 2019) yang memiliki hasil dari analisis menggunakan metode case control dengan uji *chi-square* pada 82 sampel dengan nilai *p-value* sebesar 0,014 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian mioma uteri. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang mengalami paritas ≤ 1 berisiko 4.132 kali lebih besar mengalami mioma uteri dibanding dengan responden yang mengalami paritas >1 .

3. Hubungan obesitas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah selesai dilakukan, didapatkan hasil mayoritas mioma uteri terjadi pada wanita yang tidak mengalami obesitas dengan jumlah 28 (26,4%) data. Hasil pengolahan data menggunakan analisis *fisher exact test* diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,845. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara obesitas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar. Dalam penelitian ini terdapat hubungan bermakna ada pada wanita yang tidak obesitas dengan jumlah 28 (26,4%) data dibandingkan dengan wanita yang obesitas dengan jumlah 25 (23,6%).

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh (Laning et al., 2019), menggunakan metode *case control* dengan sampel 82 responden dengan nilai *p-value* 0,007 dan memenuhi kriteria nilai $\alpha < 0,05$ didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan dari obesitas dengan kejadian mioma uteri. Hasil analisis OR didapatkan 1,915 yang berarti wanita dengan obesitas berpeluang mengalami mioma uteri 1,9 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang tidak obesitas.

Pada teori (Prawirohardjo, 2017) di bahas bahwa jumlah kalori akan mempengaruhi pertumbuhan ukuran mioma uteri, dimana semakin gemuk seseorang maka akan lebih mudah mengalami mioma uteri karena orang tersebut memiliki banyak kalori yang tertimbun di tubuhnya dan mengakibatkan percepatan tumbuh mioma uteri. Obesitas merupakan kejadian dimana

seseorang memiliki IMT $>25 \text{ kg/bb}^2$ dan menjadi penyebab konversi hormon androgen adrenal menjadi esterogen dan mengurangi hormon sex-binding globulin. Peningkatan hormon esterogen dapat meningkatkan potensi terjadinya pertumbuhan mioma uteri. Hal ini memicu tidak adanya hubungan yang signifikan antara obesitas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina makassar dikarenakan mayoritas penderita mioma uteri adalah tidak mengalami obesitas yaitu seseorang yang tidak memiliki jumlah kalori yang banyak sehingga memicu pertumbuhan mioma uteri.

Hasil dari penelitian ini tidak di dukung oleh penelitian sebelumnya yaitu oleh (Ridwan et al., 2021), menggunakan metode *case control* dengan sampel 101 responden dengan nilai *p-value* 0,007 dan memenuhi kriteria nilai $\alpha < 0,05$ didapatkan bahwa terdapat hubungan dari obesitas dengan kejadian mioma uteri. Hasil analisis OR didapatkan 2,965 yang berarti wanita dengan obesitas berpeluang mengalami mioma uteri 2,9 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang tidak obesitas.

Berdasarkan data yang didapatkan diketahui bahwa lebih banyak wanita dengan obesitas mengalami mioma uteri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh konversi hormon androgen menjadi esterogen oleh enzim aromatease di jaringan lemak. Sehingga terjadi peningkatan pada jumlah hormon esterogen di dalam tubuh dan menyebabkan perkembangan tumor dimana bergantung pada tingkat esterogen yang tinggi dan spesifik terhadap obesitas atau asupan makanan juga dapat berperan penting (Laning et al., 2019).

C. Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan di RS Ibnu Sina Makassar pada bulan Desember Tahun 2023 hingga Januari Tahun 2024 untuk mengetahui hubungan usia, jumlah paritas, dan obesitas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut.


1. Pengambilan data sekunder secara mandiri dengan membuka buku rekam medik sehingga validitas data sangat bergantung dengan validitas data yang ada pada rekam medis
2. Beberapa data terkait jumlah paritas, berat badan, dan tinggi badan sulit ditemukan pada rekam medik
3. Peneliti tidak meneliti hubungan faktor genetic dan usia menarche disebabkan jarang tertulis di rekam medik.

D. Kelebihan Penelitian

Selain keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini yang mencari hubungan usia, jumlah paritas dan obesitas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar, terdapat beberapa kelebihan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini memiliki sampel yang cukup banyak yakni 106 sampel sehingga data yang didapatkan bervariasi dari usia, jumlah paritas, dan status gizi setiap data.
2. Penelitian ini dilakukan di RS Ibnu Sina Makassar yang merupakan rumah sakit pendidikan dan juga rumah sakit rujukan yang melayani

berbagai poli salah satunya poli obstetri dan ginekologi sehingga terdapat data pasien yang mengalami mioma uteri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari hubungan usia, jumlah paritas, dan obesitas dengan kejadian mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar dengan menggunakan uji *chi square* maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tidak terdapat hubungan antara usia, jumlah paritas dan obesitas dengan kejadian mioma uteri terhadap wanita yang mengalami mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar
2. Tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian mioma uteri terhadap wanita yang mengalami mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar dengan menggunakan analisis *pearson chi-square* dan diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,245.
3. Tidak terdapat hubungan antara jumlah paritas dengan kejadian mioma uteri terhadap wanita yang mengalami mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar dengan menggunakan analisis *pearson chi-square* dan diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,279.
4. Tidak terdapat hubungan antara obesitas dengan kejadian mioma uteri terhadap wanita yang mengalami mioma uteri di RS Ibnu Sina Makassar dengan menggunakan analisis *fisher exact test chi-square* dan diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,845.

B. Saran

1. Bagi RS Ibnu Sina Makassar

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan referensi kesehatan yang berkaitan dengan obstetri dan genikologi sehingga dapat dilakukan kebijakan dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan ginekologi salah satunya tindakan preventif mioma uteri.

2. Bagi UIN Alauddin Makassar

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan kepada UIN Alauddin Makassar di bidang ilmu pengetahuan khususnya kesehatan ibu dan anak salah satunya mioma uteri.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi agar wanita lebih memperhatikan pola menstruasi dan melakukan *medical check-up* secara rutin sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan sejak dini. Diharapkan juga wanita melakukan pemeriksaan IVA (*visual inspection with acetic acid*) pada usia 35-45 tahun agar bisa melakukan deteksi secara dini kanker serviks

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti etiologi dari mioma uteri dan juga dapat meningkatkan ketelitian pada saat melakukan penelitian yaitu pada kelengkapan data. Diharapkan juga dapat meneliti hubungan peningkatan esterogen dengan kejadian mioma uteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A., Al Kautzar, A. M., & Darmawansyah, D. (2020). Gangguan Sistem Reproduksi pada Ny “S” dengan Mioma Submukosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 04 Februari – 25 Februari Tahun 2019. *Jurnal Midwifery*, 2(1), 10–19. <https://doi.org/10.24252/jmw.v2i1.13150>
- Basir, R. A., Saharuddin, Rahman, A., Fauziah, H., & Damis, R. (2023). Faktor Internal Stres Pengasuhan Ibu Dengan Anak Usia Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 22(1), 89–99. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v22i1.419>
- Djuwantono, T. (2018). Terapi GnRH Agonis Sebelum Histerektomi atau Miomektomi. In *Farmacia* (Vol. 19, Issue 12). Farmacia. <https://doi.org/10.7150/ijms.75203>
- Fadillah, A. M. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN MIOMA UTERI DI RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG*.
- Flake, G. P., Andersen, J., & Dixon, D. (2003). Etiology and pathogenesis of uterine leiomyomas: A review. *Environmental Health Perspectives*, 111(8), 1037–1054. <https://doi.org/10.1289/ehp.5787>
- Harnanik Nawangsari, Liliek Pratiwi, Y. L. (2023). Pengetahuan dengan Sikap dalam Pencegahan Mioma Uteri Pada Mahasiswa. *MALAHAYATI NURSING JOURNAL*, 5(6), 1808–1812.
- Jariah, A., Abeng, A. T., & Erawati, M. (2020). Mioma Uteri. *Window of Midwifery Journal*, 01(02), 46–55.
- Kementrian Agama RI. (2019). *Tafsir Ilmi Penciptaan Manusia Dalam Prespektif Al-Quran dan Sains*. DIPA Lajnah Pentasihihan Mushaf Al-Quran.
- Kementrian Agama RI. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV. Jumanatul Ali.
- Kurniasari, T. (2013). KARAKTERISTIK MIOMA UTERI DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA PERIODE JANUARI 2009 - JANUARI 2010. *UNIVERSITAS SEBELAS MARET*, 6–11.
- Laning, I., Manurung, I., & Sir, A. (2019). Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Penyakit Mioma Uteri. *Lontar : Journal of Community Health*, 1(3), 95–102. <https://doi.org/10.35508/ljch.v1i3.2174>
- Lestari, S. (2016). Karakteristik Penderita Mioma Uteri Di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Periode 2012-2013. *Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang*, 48 halaman.
- Lubis PN. (2020). Diagnosis dan Tatalaksana Mioma Uteri. *Cermin Dunia Kedokteran*, 3(3), 196–200.
- Meilani, N. S., Mansoer, F. A. F., Nur, I. M., & Argadireja, D. S. (2020). Hubungan Usia dan Paritas dengan Kejadian Mioma Uteri di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 *The Relationship Of Age and Parity with Incidence of Uterine Myoma in RSUD Al-Ihsan Province West Java Year 2017*. 2(22), 18–21.
- Melissa Conrad Stoppler, M. (2006). *Uterine Fibroids (Benign Tumor of The Uterus)*. https://www.emedicinehealth.com/slideshow_pictures_uterine_fibroids/article_em.htm
- Ningrum, N. W., Rahman, R. T. A., & Mahmudah, M. (2018). Hubungan Obesitas Dan Riwayat Keluarga Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Ruang Poli Kandungan RSUD


- dr.H.Moch. Ansari Saleh banjarmasin Tahun 2016. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Keperawatan*, 9(1), 85–94.
<https://ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id/index.php/dksm/article/view/307>
- Novitasari, A., Lestari, G. I., & Fairus, M. (2019). Faktor Usia Ibu dan Paritas Meningkatkan Kejadian Mioma Uteri. *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, 11(1), 21. <https://doi.org/10.26630/jkm.v11i1.1766>
- Pattinasarany, C. G., Riyanti, N., Rahawarin, H., Resnawaldi, A., Sinanu, J., & Ambon, A. T. M. H. (2023). Hasil Penelitian Karakteristik Status Obstetri pada Pasien Mioma Uteri di Rsud Dr . M . Haulussy Ambon Tahun 2018-2021 Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura Ambon Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura Ambo. 5(April), 31–39.
- POGI. (2014). *Konsensus tatalaksana pendarahan uterus abnormal karena efek samping kontrasepsi*. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi. [http://pogijaya.or.id/wp-content/uploads/2013/Konsensus Tatalaksana PUA Cetak.pdf](http://pogijaya.or.id/wp-content/uploads/2013/Konsensus_Tatalaksana_PUA_Cetak.pdf).
- Pratama, A., Sinolungan, M., & Setyawati, T. (2021). Mioma uteri merupakan neoplasma jinak yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat yang menumpangnya . Dikenal juga dengan sebutan fibromioma , leiomioma atau pun fibroid (1). 3(2), 95–104.
- Prawirohardjo, S. (2015). *Buku ajar obstetri dan ginekologi : ilmu bedah obstetri PT BINA PUSTAKA Sarwono Prawirohardjo JAKARTA , 2015* (T. Priyatini, D. Ocviyanti, & A. K. Harzif (eds.)).
- Prijatni, I., & Sri Rahayu. (2019). Modul Bahan Ajar Cetak Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. In E. B. A. Darmanto & Sonia (Ed.), *Kementrian Kesehatan. Pusdik SDM Kesehatan BPPSDMK*. Retrieved Desember 2019.
- Rahayu, A., Noor, M. S., Yulidasari, F., Rahman, F., & Andini Octaviana Putri. (2017). Kesehatan Reproduksi Remaja & Lansia. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Ridwan, M., Lestari, G. I., & Fibrila, F. (2021). Hubungan Usia Ibu, Obesitas Dan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Dengan Kejadian Mioma Uteri. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 8(1), 11–22.
<https://doi.org/10.36743/medikes.v8i1.268>
- Sahari, R. (2019). HUBUNGAN PARITAS DENGAN KEJADIAN MIOMA UTERI DI RUMAH SAKIT ABDUL MANAP KOTA JAMBI Rini. In *jurnal kesehatan*.
- Sari, A. E. P., & Darmawansyih, R. R. dan. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Yang Bekerja Di Wilayah Kerja Puskesmas Bulurokeng. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(1), 163–173.
<https://katadata.co.id/berita/2020/01/06/baru-83-peserta-bpjs-kesehatan-per-akhir-2019->
- Sirait, B. I. (2021). Ginekologi. In B. I. Sirait (Ed.), *Kesehatan* (Vol. 1). UKI Press.
- Sparic, R., Mirkovic, L., Ph, D., Malvasi, A., Tinelli, A., Ph, D., Ginekologi, K., Serbia, P. K., Fakultas, S., Beograd, U., Obstetri, S. D., Sakit, R., Maria, S., Terjemahan, I. K., Negeri, U., Moskow, W., Divisi, R., & Endoskopi, B. (2016). *Epidemiologi Mioma Uterus : Tinjauan*. 9(4), 424–435. <https://doi.org/10.22074/ijfs.2015.4599>
- Sulistiyowati, N., & Lina, A. (2019). Hubungan Faktor Risiko Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Rsud Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Dan Rs-Blud Kota *Jurnal Cakrawala Kesehatan: Kumpulan Jurnal ...*, 10(01), 18–27. Mioma Uteri;

Faktor Risiko

- Supriyatiningih. (2017). *Buku Ajar Pengetahuan Obstetri dan Ginekologi untuk Pendidikan Profesi Dokter*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wijaya, K. A., & Dwistayani, N. M. Y. (2022). MANAGEMENT MULTIPLE UTERINE MYOMA IN PREGNANCY: A CASE REPORT. *MAJALAH ILMIAH METHODODA*, 12(8.5.2017), 2003–2005.
- Wiyati, P. S., Iskandar, T. M., & Pramono, M. B. A. (2022). Buku Ajar Masalah Ginekologi Umum (Bagian I). In *Masalah Ginekologi Umum* (Issue Bagian I).
- Wulandari, A. D., Cahyawati, P. N., & Kurniawan, K. A. (2021). Hubungan Usia dan Paritas dengan Kejadian Mioma Uteri di RSUD Wagaya Denpasar Tahun 2016-2017. *Bali Health Journal*, 5(2), 104–110. <http://ejournal.unbi.ac.id/index.php/BHJ>
- Yosi Apriyani, S. S. (2013). ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN MIOMA UTERI DI RSUD dr. ADHYATMA SEMARANG. *Jurnal kesehatan*, 2(5), 36–46. <http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jurkeb/article/view/105>



Lampiran 1.1 Etik Penelitian


KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepik.fik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.E.028/KEPK/FKIK/XII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Afdalia Amanda
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"HUBUNGAN USIA, JUMLAH PARITAS, DAN OBESITAS DENGAN KEJADIAN MIOMA UTERI DI RS IBNU SINA MAKASSAR"


"THE RELATIONSHIP OF AGE, NUMBER OF PARITY, AND OBESITY WITH THE INCIDENT OF UTERINE MYOMA AT IBNU SINA HOSPITAL MAKASSAR"


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024.

This declaration of ethics applies during the period December 19, 2023 until December 19, 2024.

December 19, 2023
 Professor and Chairperson,

 Dr. Ischimy Ismail, S.Si., M.Si., Apt.



Lampiran 1.2 Surat Izin Penelitian BALITBANGDA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 30944/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RS Ibnu Sina Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5449/Un.06/LP2M/PP.00.9/12/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: AFDALIA AMANDA	
Nomor Pokok	: 70600120032	
Program Studi	: Pendidikan Dokter	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa	



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN USIA, JUMLAH PARITAS, DAN OBESITAS DENGAN KEJADIAN MIOMA UTERI DI RS IBNU SINA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Desember 2023 s/d 06 Januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



Lampiran 1.3 Tabel data pasien

No.		Diagnose	Usia (tahun)	Jumlah Paritas	BB (kg)	TB (cm)	IMT (kg/bb ²)	Agama	Status menikah
1		Mioma uteri	48	2	70,2	156	28,8	Islam	Sudah menikah
2		Mioma uteri intramural	54	5	65	155	27,1	Islam	Sudah menikah
3		Mioma uteri	52	0	37,7	155	15,7	Islam	Sudah menikah
4		Mioma uteri submukosa	34	1	60	155	25	Islam	Sudah menikah
5		Mioma uteri	36	0	57,4	156	23,4	Islam	Sudah menikah
6		Mioma uteri	51	3	55	155	22,9	Islam	Sudah menikah
7		Mioma uteri	51	0	40	150	17,8	Islam	Sudah menikah
8		Adenomyosis	45	0	36,5	150	16,2	Islam	Sudah menikah
9		Mioma uteri	36	0	43,8	152	18,6	Islam	Sudah menikah
10		Mioma uteri	69	7	65	150	28,9	Islam	Sudah menikah
11		Mioma uteri	44	2	61,4	156	25,1	Islam	Sudah menikah
12		Multiple uteri mioma	43	0	86,7	159	34,4	Islam	Sudah menikah
13		Mioma uteri	27	0	61,2	152	26,48	Islam	Belum menikah
14		Mioma uteri intramural	46	0	65,4	165	24,02	Islam	Sudah menikah
15		Mioma uteri	36	0	102,7	170	35,53	Islam	Sudah menikah
16		Mioma uteri	61	0	53,9	156	22,1	Islam	Sudah menikah
17		Mioma uteri + NOK	38	0	63	147	29,1	Islam	Sudah menikah
18		Mioma uteri	61	2	53,8	154	22,8	Islam	Sudah menikah
19		Mioma uteri	71	0	37	145	17,6	Islam	Belum menikah
20		Mioma uteri	38	4	54	160	21	Islam	Sudah menikah
21		Mioma uteri	48	0	50	148	22,83	Islam	Sudah menikah
22		Mioma uteri	43	0	52	155	21,6	Islam	Sudah menikah
23		Mioma Uteri	49	1	65	152	28,1	Islam	Sudah menikah
24		Mioma uteri	64	0	52	160	22,80	Islam	Sudah menikah
25		Mioma uteri	48	2	74	155	30,8	Islam	Sudah menikah
26		Mioma uteri	52	0	44	156	18,08	Islam	Belum menikah
27		Mioma uteri	44	0	55	156	22,6	Kristen	Sudah menikah
28		Mioma uteri	43	0	48	153,3	20,4	Islam	Sudah menikah
29		Mioma uteri	43	2	50,1	150	22,2	Islam	Sudah menikah
30		Mioma uteri	62	1	70,4	148	32,14	Islam	Sudah menikah
31		Mioma uteri intramural	41	2	73	156	30	Islam	Sudah menikah
32		Mioma uteri + NOK	50	2	54	160	21,9	Islam	Sudah menikah
33		Mioma uteri	34	1	40	154	16,8	Islam	Sudah menikah
34		Mioma uteri	47	3	60	150	26,7	Islam	Sudah menikah
35		Leiomyoma uteri	38	4	61	150	27,11	Islam	Sudah menikah
36		Mioma uteri	45	2	59,5	150	26,4	Islam	Sudah menikah
37		Mioma uteri	44	1	72	148	32,9	Islam	Sudah menikah
38		Mioma uteri	44	0	55	155	22,9	Islam	Belum menikah
39		Mioma uteri	54	3	71	155	29,5	Kristen	Sudah menikah
40		Mioma uteri	35	0	58	154,6	23,7	Hindu	Belum menikah
41		Mioma uteri	38	0	42	160	16,4	Islam	Sudah menikah
42		Mioma uteri	49	2	40,7	145	19,5	Islam	Sudah menikah
43		Mioma uteri	49	0	58	152	25,1	Islam	Sudah menikah
44		Mioma uteri	43	0	50	156	20,5	Islam	Sudah menikah
45		Leiomyoma uteri	42	0	59	150	26,6	Islam	Sudah menikah
46		Mioma uteri	29	0	60	153	25,6	Islam	Belum menikah
47		Mioma uteri	52	3	65	155	27,02	Islam	Sudah menikah
48		Mioma uteri	47	0	58	163	21,8	Islam	Sudah menikah
49		Mioma uteri	53	3	74,7	151	32,76	Islam	Sudah menikah
50		Mioma uteri intramural	48	0	55	148	25,1	Islam	Sudah menikah
51		karsinoma	58	0	48	149	20,22	Kristen	Sudah menikah
52		Mioma uteri	39	1	60	155	25,0	Islam	Sudah menikah
53		Mioma uteri	49	2	54	155	22,5	Islam	Sudah menikah

No.		Diagnose	Usia	Jumlah Paritas	BB	TB	IMT	Agama	Status Menikah
1		Hyperplasia endometrium	42	1	62,5	154	26,36	Islam	Sudah menikah
2		Kista endometrium	47	2	55	155	22,9	Islam	Sudah menikah
3		Ca endometrium	44	0	40	150	17,7	Islam	Sudah menikah
4		NOK	62	5	58	145	27,6	Kristen	Sudah menikah
5		Ca endometrium	38	3	48	145	22,8	Islam	Sudah menikah
6		Ca ovarium st 3b	50	1	59	153	25,2	Islam	Sudah menikah
7		Polip endoserviks	40	2	80	150	35,6	Kristen	Sudah menikah
8		Ca ovarium	47	0	54	160	18,69	Islam	Sudah menikah
9		Kt ca ovarium	55	0	52,5	155	21,8	Islam	Sudah menikah
10		Kt ca ovarium	51	0	65	153	27,8	Islam	Sudah menikah
11		Kt Ca endometrium	64	7	58	148	26,5	Islam	Sudah menikah
12		Perdarahan abnormal pervagina	29	2	55	154	23,2	Islam	Sudah menikah
13		Kt Ca endometrium	58	0	47	150	20,8	Islam	Belum menikah
14		Hyperplasia endometrium non atipik	57	4	52,6	150	23,4	Islam	Sudah menikah
15		Hyperplasia endometrium	58	0	32	155	13,33	Islam	Sudah menikah
16		Perdarahan uterus abnormal ec hyperplasia endometrium	43	4	76	155	31,6	Islam	Sudah menikah
17		Ca endometrium	49	0	50	150	22,2	Islam	Sudah menikah
18		Ca ovarium	60	3	39	155	16,2	Islam	Sudah menikah
19		Ca ovarium st 3b	23	2	55	155	22,9	Islam	Sudah menikah
20		Tumor uterus	37	0	68	150	30,2	Islam	Sudah menikah
21		Ca endometrium	34	0	73	155	30,4	Islam	Sudah menikah
22		Perdarahan uterus abnormal	33	1	64	158	25,6	Islam	Sudah menikah
23		Tumor endometrium	60	4	55	148	25,1	Islam	Sudah menikah
24		Ca endometrium st 1a	51	3	37	140	18,8	Islam	Sudah menikah
25		Perdarahan uterus abnormal	50	3	67	154	28,25	Islam	Sudah menikah
26		Ca endometrium	44	1	40	155	16,6	Islam	Sudah menikah
27		Kista endometriosis	41	0	70	167	25,1	Islam	Sudah menikah
28		Tuba ovarium abaes	26	0	51	155	21,2	Islam	Belum menikah
29		Massa ovarium kistik	62	4	45,4	155	18,7	Islam	Sudah menikah
30		Ca endometrium	49	1	62	157	25,2	Kristen	Sudah menikah
31		Kista endometrium ovarium kiri	39	7	60	150	26,7	Islam	Sudah menikah
32		Perdarahan uterus abnormal	22	0	68	163	25,2	Islam	Sudah menikah
33		Kt ca ovarium	50	0	42	150	18,7	Islam	Sudah menikah
34		Ca ovarium st 3b	43	0	31	148	14,2	Islam	Belum menikah
35		Perdarahan uterus abnormal	73	3	30	145	16,2	Islam	Sudah menikah
36		Ca ovarium	62	8	36	146	16,08	Islam	Sudah menikah
37		Ca endometrium st 3	63	1	50	157	20,3	Islam	Sudah menikah
38		Hyperplasia endometrium	51	5	71	152	30,7	Islam	Sudah menikah
39		Kista endometrium	35	2	51	155	21,25	Islam	Sudah menikah
40		Tumor uterus	25	2	57	150	25,3	Islam	Sudah menikah
41		Tumor korpus uteri	53	3	46	150	20,4	Islam	Sudah menikah
42		Perdarahan uterus abnormal	47	3	57	150	25,3	Islam	Sudah menikah
43		Ca uterus	44	0	50	150	22,2	Islam	Sudah menikah
44		NOK	38	0	43	150	19,1	Islam	Belum menikah
45		Ca ovarium	31	2	65,6	155	27,9	Islam	Sudah menikah
46		Kt ca ovarium	43	0	55	161	21,2	Kristen	Sudah menikah
47		Ca ovarium	52	0	86,9	150	38,7	Islam	Sudah menikah
48		Kt ca endometrium	63	0	41	150	18,22	Islam	Sudah menikah
49		Perdarahan uterus	49	5	55	148	25,1	Islam	Sudah menikah
50		Ca serviks	47	0	54	159	21,4	Islam	Sudah menikah
51		Ca ovarium st 3c	35	2	40	152	17,31	Islam	Sudah menikah
52		Ca endometrium	52	0	51	150,5	22,67	Islam	Sudah menikah
53		Tumor ovarium	49	3	62	154	26,1	Islam	Sudah menikah

M A K A S S A R

Lampiran 1.4 Surat Selesai Meneliti

"IBNU SINA" HOSPITAL
TEACHING HOSPITAL
OF UMI FOUNDATION



مستشفى ابن سينا
مؤسسة الأوقاف
لجامعة المسلمين الإندونيسية

RUMAH SAKIT "IBNU SINA" YW-UMI MAKASSAR
Jl. Urip Sumoharjo km.5 no. 264 Telp (0411) 452917/452958. Fax (0411) 425397



SURAT KETERANGAN

No : 001/B.09/III.2/RS.IBNUSINA/I/2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Afdalia Amanda
NIM : 70600120032
Judul : Hubungan Usia, Jumlah Paritas dan Obesitas dengan
Kejadian Mioma Uteri di RS Ibnu Sina Makassar

Benar yang tersebut namanya di atas telah selesai melakukan Penelitian di RUMAH SAKIT IBNU SINA YW-UMI pada 30 Desember 2023 – 14 Januari 2024

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar 25 Januari 2024

Mengetahui,
Direktur Pendidikan & SDM

Kabid. Penelitian, Publikasi & Peng.
Masyarakat



Dr.dr Shofiyah Latief, M.Kcs.Sp.Rad(K)-PRP,MHPE,FISQua, dr. Sidrah Darma, Sp.A

Cc. Arsip



Lampiran 1.5 Hasil SPSS

Frequencies

		Statistics				
		Diagnosa penyakit	Usia pasien	Jumlah Paritas	Status Obesitas	Status Gizi
N	Valid	106	106	106	106	106
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		1.50	2.42	1.96	1.55	2.80
Std. Error of Mean		.049	.067	.098	.049	.114

Frequency Table

Diagnosa penyakit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Terdiagnosis Mioma Uteri	53	50.0	50.0	50.0
	Tidak Terdiagnosis Mioma Uteri	53	50.0	50.0	100.0
Total		106	100.0	100.0	

Usia pasien

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 35 tahun	12	11.3	11.3	11.3
	35-45 tahun	37	34.9	34.9	46.2
	> 45 tahun	57	53.8	53.8	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

Jumlah Paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Nulipara	51	48.1	48.1	48.1
	Primipara	12	11.3	11.3	59.4
	Multipara	39	36.8	36.8	96.2
	Grandemultipara	4	3.8	3.8	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

Status Obesitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mengalami Obesitas	48	45.3	45.3	45.3
	Tidak Mengalami Obesitas	58	54.7	54.7	100.0
Total		106	100.0	100.0	

Crosstabs**Case Processing Summary**

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Diagnosa penyakit * Usia pasien	106	100.0%	0	0.0%	106	100.0%

Diagnosa penyakit * Usia pasien Crosstabulation

		Usia pasien			Total
		< 35 tahun	35-45 tahun	> 45 tahun	
Diagnosa penyakit	Terdiagnosis Mioma Uteri	Count	4	22	27
		% of Total	3.8%	20.8%	25.5%
	Tidak Terdiagnosis Mioma Uteri	Count	8	15	30
		% of Total	7.5%	14.2%	28.3%
Total		Count	12	37	57
		% of Total	11.3%	34.9%	53.8%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.816 ^a	2	.245
Likelihood Ratio	2.849	2	.241
Linear-by-Linear Association	.020	1	.888
N of Valid Cases	106		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.00.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Diagnosa penyakit * Jumlah Paritas	106	100.0%	0	0.0%	106	100.0%

Diagnosa penyakit * Jumlah Paritas Crosstabulation

			Jumlah Paritas				Total
			Nulipara	Primipara	Multipara	Grandemultipara	
Diagnosa penyakit	Terdiagnosis Mioma Uteri	Count	30	6	16	1	53
		% of Total	28.3%	5.7%	15.1%	0.9%	50.0%
	Tidak Terdiagnosis Mioma Uteri	Count	21	6	23	3	53
		% of Total	19.8%	5.7%	21.7%	2.8%	50.0%
Total		Count	51	12	39	4	106
		% of Total	48.1%	11.3%	36.8%	3.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.845 ^a	3	.279
Likelihood Ratio	3.906	3	.272
Linear-by-Linear Association	3.743	1	.053
N of Valid Cases	106		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Diagnosa penyakit * Status Obesitas	106	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
--	-----	--------	---	------	-----	--------

Diagnosa penyakit * Status Obesitas Crosstabulation

		Status Obesitas		Total	
		Mengalami Obesitas	Tidak Mengalami Obesitas		
Diagnosa penyakit	Terdiagnosis Mioma Uteri	Count	25	28	53
		% of Total	23.6%	26.4%	50.0%
	Tidak Terdiagnosis Mioma Uteri	Count	23	30	53
		% of Total	21.7%	28.3%	50.0%
Total		Count	48	58	106
		% of Total	45.3%	54.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.152 ^a	1	.696		
Continuity Correction ^b	.038	1	.845		
Likelihood Ratio	.152	1	.696		
Fisher's Exact Test				.845	.423
Linear-by-Linear Association	.151	1	.698		
N of Valid Cases	106				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.00.

b. Computed only for a 2x2 table

M A K A S S A R

Lampiran 1.6 Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama | : Afdalia Amanda |
| 2. NIM | 70600120032 |
| 3. Jurusan | : Pendidikan Dokter |
| 4. Tempat/Tanggal Lahir | : Watampone/07 Agustus 2002 |
| 5. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Alamat | : Jl. Arung Teko Permai NO D7 |
| 8. Orang Tua | |
| Ayah | : H. Muh. Anas |
| Ibu | : Hj. Hamsiah |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------|------------------|
| 1. SD | : SDN 22 JEPPE'E |
| 2. SMP | : SMPN 20 BURU |
| 3. SMA | : SMAN 3 BURU |

Penulis melanjutkan studi S1 di UIN Alauddin Makassar pada jurusan Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan