

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN BBLR DENGAN
POLA NAPAS TIDAK EFEKTIF MENGGUNAKAN INTERVENSI
MUSIK *LULLABY* DI RUANG NICU RSUP DR. WAHIDIN
SUDIROHUSODO MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR AZIZAH, S.Kep
NIM. 70900122050

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Azizah, S.Kep
NIM : 70900122050
Tempat/Tgl.Lahir : Watampone, 27 Maret 2000
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Profesi Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien BBLR dengan Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Musik *Lullaby* di Ruang NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tugas akhir ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 8 Januari 2024

Penyusun,


Nur Azizah, S.Kep
NIM:70300122045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "*Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien BBLR dengan Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Musik Lullaby di Ruang NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*" yang disusun oleh Nur Azizah, S.Kep Nim: 70900122050, Mahasiswa Jurusan Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 27 Desember 2023, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Profesi dalam Ilmu Kesehatan, program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan.

Gowa, 24 April 2024
15 Syawal 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqasy I	: Muthahharah, S.Kep., Ns, M.Kep	(.....)
Munaqasy II	: Baso Pallawagau, Lc., Ma	(.....)
Pembimbing I	: Eka Hadrayani, S.Kep., Ns, M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Nurhidayah, S.Kep., Ns, M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
NIP: 19810621 200604 2 005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara (i) Nur Azizah, S.Kep NIM: 70900122050, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien BBLR dengan Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Musik *Lullaby* di ruang NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 4 Desember 2023

Menyetujui,



Eka Hadrayani, S.Kep., Ns., M.Kep
Pembimbing I



Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep
Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya lah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tugas akhir ini dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien BBLR dengan Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Musik *Lullaby* di Ruang NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar” sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Ners. Dan tak lupa pula kita panjatkan shalawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengganti bendera kejahiliaan menjadi bendera tauhid seperti yang kita rasakan saat ini. *Lailahailallah muhammadarrasulullah.*

Dalam usaha menyelesaikan tugas akhir ini penulis dihadapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan, namun atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak dan terlebih atas izin Allah SWT akhirnya hambatan dan tantangan tersebut dapat diatasi serta mencapai tahap penyelesaian.

Dalam pembuatan karya tugas akhir ini tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan. Oleh karena itu, tidak hanya menabur garam di laut, kritik dan saran penyempurnaan yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amiin. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, terkasih dan sayang, Ayahanda tersayang H. Ambotang dan Ibunda tercinta Hj. Siti Salmi atas kasih sayang, doa beserta dukungan semangat dan bantuan moril maupun materilnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Begitu pula dengan saudari saya yakni

kak Mardati dan adek Nur Hasanah yang senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh jajarannya yang telah memberi penulis kesempatan dalam menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, serta para wakil dekan, beserta seluruh staf akademik yang memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Hasnah, S.Sit, S.Kep, Ns, M.Kes selaku Ketua Prodi Profesi Ners dan Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes sebagai Sekretaris Prodi Profesi Ners serta dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Profesi Ners yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan karya tulis akhir ini.
4. Eka Hadrayani, S.Kep., Ns, M.Kep selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhidayah, S.Kep., Ns, M.Kep selaku Pembimbing II, yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
5. Muthahharah, S.Kep., Ns, M.Kep selaku Penguji I dan Bapak Baso Pallawagau, Lc., Ma selaku Penguji Agama atas saran, kritik, arahan dan bimbingannya yang diberikan sehingga penulis dapat menghasilkan karya terbaik yang dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain.

6. Bapak Andi Budianto Adi Putra, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan berjalan.
7. Keluarga besar, tante, om, sepupu yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, yang selalu mendukung, memberi bantuan moril dan materinya serta selalu menasehati penulis dalam keadaan apapun.
8. Teman Se-angkatan Program Studi Profesi Ners angkatan XXII (Ners XXII) atas kebersamaannya bergandengan tangan saling merangkul satu sama lain, baik suka maupun duka dalam proses menggapai cita.
9. Kepada sahabat-sahabat saya, Naya, Ayu, Novi, Kak Wahdaniar, Kak Hilda, dan Kak Hesti yang selalu menjadi partner, memberikan perhatian, motivasi, menasehati, serta membantu penulis untuk menyelesaikan proses penyusunan tugas akhir ini.
10. Kepada *special person* M. Zulkifli, S.Ag saya ucapkan banyak terima kasih karena telah banyak membantu saya selama penyusunan tugas akhir ini hingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
11. Kepada HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual dalam mencapai tujuan insan cita pencipta, pengabdian dan bernafaskan islam, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.


Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan

dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya.

Hadanallahu Ilaa Sabilissalam,

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Makassar, 10 Agustus 2023



DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Konsep Medis	6
B. Konsep Asuhan Keperawatan	19
C. <i>Evidence Based Practice in Nursing</i> (EBPN)	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Rancangan Studi Kasus	39
B. Subyek Studi Kasus	39
C. Fokus Studi Kasus	40
D. Instrument Studi Kasus	40
E. Prosedur Pengambilan Data	40
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus	41
G. Analisis Data dan Penyajian Data	41
H. Etika Studi Kasus	41
BAB IV LAPORAN KASUS	43
A. Pengkajian	43
B. Diagnosis Keperawatan	55
C. Intervensi Keperawatan	56
D. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan	58
BAB V PEMBAHASAN	66
A. Analisis Asuhan Keperawatan	66
B. Analisis Intervensi EBPN	76
C. Keterbatasan	81
BAB VI PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

LAMPIRAN.....	89
RIWAYAT HIDUP.....	94




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Intervensi Keperawatan Pola Napas Tidak Efektif.....	29
Tabel 2.2 Intervensi Keperawatan Defisit Nutrisi	30
Tabel 2.3 Intervensi Keperawatan Termoregulasi Tidak Efektif.....	31
Tabel 2.4 Intervensi Keperawatan Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah.....	32
Tabel 2.5 Intervensi Keperawatan Risiko Infeksi.....	32
Tabel 2.6 Intervensi Keperawatan Risiko Gangguan Integritas Kulit	33
Tabel 4.1 Pengkajian Nyeri Neonatus.....	44
Tabel 4.2 Data Fokus	53
Tabel 4.3 Analisis Data.....	53
Tabel 4.4 Diagnosis Keperawatan	55
Tabel 4.5 Intervensi Keperawatan	56
Tabel 4.6 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan	58
Tabel 4.7 Perkembangan Hasil Pemberian Intervensi Musik Lullaby.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Penilaian Maturitas Neuromuskular.....	45
Gambar 4.2 Penilaian Maturitas Fisik.....	46



ABSTRAK

Nama : Nur Azizah
Nim : 70900122050
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien BBLR dengan Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Musik *Lullaby* di ruang NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Pendahuluan: Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan penyebab terbanyak kematian pada bayi khususnya neonatal. *World Health Organization* (WHO) melaporkan pada tahun 2019, sebanyak 2,4 juta bayi baru lahir meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan akibat BBLR. Kasus BBLR di dunia mencapai lebih dari 20 juta (15.5%) kelahiran hidup per tahun dan 96.5% terjadi di negara berkembang. Komplikasi yang paling mempengaruhi bayi dengan BBLR adalah gangguan pernapasan. Gangguan pernafasan yang sangat serius pada bayi baru lahir atau neonatus berkontribusi pada tingginya morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami BBLR dengan masalah pola nafas tidak efektif menggunakan intervensi Musik *Lullaby* di ruang perawatan NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. **Metode:** Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana pengkajian dilakukan secara intensif, mendalam, dan terperinci untuk memperoleh data yang dalam mengenai keadaan atau kondisi pasien. Setelah ditemukannya masalah dilakukan pemberian intervensi. Pemberian intervensi musik *lullaby* diberikan selama 3 hari dengan durasi 30 menit. **Hasil:** Setelah dilakukan pemberian intervensi musik *lullaby* pada By. Ny. E dengan masalah BBLR yang mengalami pola napas tidak efektif menunjukkan adanya perubahan pada frekuensi napas By. Ny. E menjadi lebih stabil. Pernapasan bayi yang awalnya 66 x/menit setelah diberikan musik *lullaby* menjadi normal yakni 45 x/menit dan lebih stabil. **Kesimpulan:** Musik *lullaby* berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan pada bayi BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif sehingga terapi ini dapat dijadikan terapi komplementer dalam memberikan asuhan keperawatan pada bayi di ruang NICU.

Kata Kunci : BBLR, Pola Napas Tidak Efektif, Musik Lullaby

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Nur Azizah
Nim : 70900122050
Title : *Analysis of Nursing Care for LBW Patients with Ineffective Breathing Patterns Using Lullaby Music Intervention in the NICU Room at RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*

Introduction: Low birth weight (LBW) is the most common cause of death in babies, especially neonates. The World Health Organization (WHO) reported that in 2019, as many as 2.4 million newborn babies died in the first 28 days of life due to LBW. LBW cases in the world reach more than 20 million (15.5%) live births per year and 96.5% occur in developing countries. The complication that most affects LBW babies is respiratory problems. Very serious respiratory disorders in newborns or neonates contribute to high morbidity, mortality and costs of care. **Purpose:** This study aims to determine the analysis of nursing care for LBW babies with ineffective breathing pattern problems using the Lullaby Music intervention in the NICU treatment room at RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. **Method:** In writing this scientific paper, the type of research used is a case study, where the assessment is carried out intensively, in-depth and in detail to obtain in-depth data regarding the condition or condition of the patient. After a problem is discovered, intervention is carried out. Lullaby music intervention was given for 3 days with a duration of 30 minutes. **Results:** After giving lullaby music intervention to By. Mrs. E with LBW problems who experiences an ineffective breathing pattern shows a change in respiratory frequency By. Mrs. E becomes more stable. The baby's breathing, which was initially 66 x/minute after being given lullaby music, became normal, namely 45 x/minute and was more stable. **Conclusion:** Lullaby music has an effect on respiratory frequency in LBW babies with ineffective breathing pattern problems, so this therapy can be used as a complementary therapy in providing nursing care to babies in the NICU room.

Keywords : LBW, Ineffective Breathing Pattern, Lullaby Music

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BBLR atau Berat Badan Lahir Rendah, merupakan kondisi BB bayi yang baru lahir <2500 gram tanpa memperhatikan usia kehamilan. Bayi yang lahir dengan kondisi BBLR mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dalam dua puluh delapan hari pertama kehidupannya (Widianti & Fitriahadi, 2023). Badan Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 2,4 juta bayi baru lahir meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan dengan penyebab kematian diantaranya BBLR, asfiksia, infeksi, dan kelainan kongenital. Menurut WHO, bayi dengan BBLR memiliki resiko kematian 20 kali lebih besar dari bayi dengan berat badan normal (Fitriani & Harahap, 2023).

Kasus BBLR di dunia mencapai lebih dari 20 juta (15.5%) kelahiran hidup per tahun dan 96.5% terjadi di negara berkembang. Kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik menduduki peringkat ketiga kelahiran hidup dengan BBLR (Unicef, 2019). Kejadian di Asia *south-central* dengan angka kejadian 27,1% bayi dengan BBLR. Prevalensi di wilayah Asia lainnya bervariasi dari 5,9% hingga 15,4% (Anil K. C *et al.*, 2020).

Di Indonesia pada tahun 2020 BBLR menjadi penyebab kematian neonatal terbanyak. Menurut laporan dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, sebanyak 3,1% dari total 4.747.077 bayi yang dilahirkan pada tahun tersebut memiliki BBLR. Data Direktorat Gizi Masyarakat tahun 2020 menunjukkan terdapat sekitar 3,4% bayi dengan BBLR dilaporkan oleh 25 dari 34 provinsi di Indonesia (Kemenkes RI, 2021). Sejumlah 20.266 kematian neonatal, 35,2% kematian disebabkan oleh BBLR, asfiksia 27,4%, kelainan kongenital 11,4%, infeksi 3,4%, tetanus neonatorium 0,3%, COVID-19 0,0% dan lain-lain 22,5% (Fitriani & Harahap, 2023).

Prevalensi kejadian BBLR di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 mencapai angka 5,4%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2021 bahwa tahun 2018 jumlah

kematian neonatal menunjukkan sebesar 39 kasus, 33 kasus pada tahun 2019, 35 kasus pada tahun 2020. Tahun 2021 jumlah kematian neonatal meningkat menjadi 61 kasus Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021 (2022).

Dampak jangka panjang yang mungkin terjadi akibat dari BBLR antara lain gangguan perkembangan, penglihatan (*retinopati*), pendengaran, penyakit paru kronis, kenaikan angka kesakitan dan frekuensi kalainan bawaan, serta sering masuk rumah sakit. Komplikasi langsung yang terjadi pada BBLR, yaitu hipotermia, gangguan cairan dan elektrolit, hiperbilirubinemia, sindroma gawat napas, paten duktus arterioisus, infeksi, perdarahan intraventrikuler, apnea of prematurity dan anemia. Dampak tersebut dapat dikurangi dengan pemberian perawatan kesehatan yang berkualitas (Yanti *et al.*, 2023).

Komplikasi yang paling mempengaruhi bayi dengan BBLR adalah gangguan pernapasan. Gangguan pernafasan yang sangat serius pada bayi baru lahir atau neonatus berkontribusi pada tingginya morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan. Pada neonatus, gangguan pernapasan yang sering ditemukan adalah sindroma gawat nafas (*respiratory distress syndrome*). Gangguan ini terjadi pada saat kelahiran atau beberapa jam setelah bayi lahir. Neonatus dengan gangguan pernapasan memerlukan dukungan suplai oksigen dengan menggunakan ventilasi mekanik (S.A.M *et al.*, 2013).

Bayi yang menggunakan ventilasi mekanik membutuhkan pemantauan saturasi oksigen, frekuensi denyut jantung dan frekuensi pernafasan, guna mengetahui apakah suplai oksigen yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan oksigenasi jaringan tubuh dan mendapatkan perawatan di ruangan perawatan intensif neonatus (NICU/*Neonatal Intensive Care Unit*). Pemberian oksigen tambahan memang bermanfaat. Akan tetapi juga dapat menimbulkan efek samping yang membahayakan apabila diberikan dalam jangka waktu yang lama dengan konsentrasi yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan intervensi lain sebagai upaya meminimalkan pemberian oksigen. Salah satu upaya membatasi penggunaan oksigen adalah dengan memberikan terapi musik (Azmi *et al.*, 2017).

Terapi musik merupakan terapi komplementer di ruangan digunakan untuk meningkatkan perkembangan dan promotif maturasi pada bayi prematur. Musik digunakan untuk menenangkan, meningkatkan kemampuan menerima stimulasi, meningkatkan refleks hisap, mengurangi rasa nyeri, meningkatkan vital signs, meningkatkan hubungan ibu dan bayi dan mempersingkat lama rawat (Annisa & Mentari, 2021).

Musik *lullaby* merupakan musik pengantar tidur yang mempunyai struktur suara yang menenangkan, mempunyai irama yang konstan dan stabil serta melodi yang tenang dan tidak mengejutkan yang dapat mempengaruhi irama gerakan jantung dan pernapasan sehingga dapat menstabilkan denyut jantung, frekuensi bernafas dan saturasi oksigen (Triana *et al.*, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azmi *et al* (2017), didapatkan bahwa adanya perbedaan rata-rata *heart rate*, *respiration rate* dan saturasi oksigen pada hari pertama sebelum terapi musik *lullaby* diberikan dibandingkan dengan hari ketiga setelah terapi musik *lullaby* diberikan dengan nilai *p value* <0,05 untuk *heart rate*, *p value* <0,05 untuk *respiration rate* dan *p value* <0,05 untuk saturasi oksigen. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian oleh Yanti *et al* (2023), bahwa terdapat perbedaan hasil sebelum dan sesudah dilakukan intervensi terapi musik *lullaby* selama KMC yaitu dari pernapasan takypnea menjadi pernapasan normal.

Berdasarkan uraian masalah diatas terkait dengan kejadian BBLR, maka peneliti tertarik untuk melakukan intervensi pemberian terapi musik *lullaby* pada bayi Ny. E dengan BBLR yang mengalami gangguan pola napas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada Karya Tulis Akhir ini adalah “Bagaimana analisis keperawatan pada bayi yang mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif menggunakan intervensi Musik *Lullaby* di ruang perawatan NICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar?”

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif menggunakan intervensi Musik *Lullaby* di ruang perawatan NICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada bayi yang mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif.
- b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada bayi yang mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif.
- c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada bayi yang mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif.
- d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada bayi yang mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif.
- e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada bayi yang mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif.
- f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif menggunakan intervensi Musik *Lullaby*.

D. Manfaat


1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya karya tulis akhir ini, menjadi sebuah harapan karya ini bisa menjadi bahan referensi untuk meningkatkan keilmuan dan menjadi pedoman atau acuan dalam praktik keperawatan selanjutnya khususnya di ruang perawatan NICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam memberikan intervensi pada bayi yang mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif.

2. Manfaat Aplikatif

Karya tulis akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rujukan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait

pemberian intervensi musik *lullaby* untuk masalah pola napas tidak efektif pada bayi yang mengalami BBLR.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Medis

1. Pengertian

Menurut WHO (2014) BBLR adalah berat badan saat lahir kurang dari 2.500 gram. BBLR adalah neonatus dengan berat badan lahir pada saat kelahiran kurang dari 2.500 gram sampai 2.499 gram tanpa memandang masa kehamilan. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir (Kusuma *et al.*, 2022).

Berat bayi lahir rendah (BBLR) adalah mereka yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia kehamilan. Berat lahir adalah berat badan yang diukur 1 (satu) jam setelah lahir. Dua jenis berat badan lahir rendah (BBLR) adalah BBLR yang disebabkan oleh preterm birth (PTB yaitu persalinan pada usia kehamilan 37 minggu) dan BBLR yang disebabkan oleh *Intrauterine Growth Restriction* (IUGR atau bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan >37 minggu tetapi dengan berat lahir <2.500 gram). Teori lain adalah bahwa anak-anak BBLR berisiko tumbuh dan kembang lebih lambat dari pada bayi yang lahir dengan berat lahir normal, namun pada beberapa kasus bayi dengan berat lahir rendah dapat meninggal saat lahir (Manik *et al.*, 2023).

2. Etiologi

Menurut Utami *et al* (2022), penyebab terjadinya berat bayi lahir rendah yakni antara lain:

- a. Premature atau kelahiran bayi sebelum 37 minggu yang disebabkan oleh kondisi fisik dan psikologis ibu.
- b. Ukuran janin yang kecil pada saat kehamilan atau tidak sesuai usia kehamilan yaitu berat untuk kehamilan kurang dari 10 persentil atau keadaan dari keduanya.
- c. Hambatan pertumbuhan janin berkaitan dengan posisi janin didalam Rahim ibu.

Ada beberapa faktor risiko terjadinya berat bayi lahir rendah menurut Utami *et al* (2022) yakni sebagai berikut :

a. Faktor ibu

1) Usia ibu

Ibu dengan usia <20 atau >35 tahun berisiko melahirkan bayi dengan kondisi BBLR. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan organisasi kesehatan dunia (WHO), yaitu usia yang paling aman adalah 20-35 tahun pada saat usia reproduksi, hamil, dan melahirkan.

2) Gizi kurang saat kehamilan

Ketidakcukupan asupan nutrisi saat masa kehamilan menjadi pemicu terjadinya kelahiran kurang bulan (prematuur). Asupan makanan yang kurang dan aktivitas fisik yang tinggi mengakibatkan kurangnya nutrisi yang didapat oleh janin selama dalam kandungan.

3) Jarak kehamilan

Jarak kehamilan ibu dapat menjadi faktor kelahiran bayi BBLR dengan jarak <2 tahun yang berisiko 3 x lebih besar.

4) Pola hidup

Orang tua perokok aktif maupun hanya sebatas orang yang menghirup asap rokok. Paparan asap rokok dapat menyebabkan janin kekurangan oksigen dalam kandungan dan penurunan aliran darah pada janin mengganggu pertumbuhan anak dalam kandungan.

5) Infeksi dan penyakit kronis

Kondisi ibu dengan penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan tekanan darah tinggi berisiko mengalami kelahiran BBLR.

b. Faktor kehamilan

Kondisi selama masa kehamilan dapat berisiko terjadinya BBLR karena adanya gangguan nutrisi ibu ke janin, faktor plasenta atau ari-ari seperti tekanan darah tinggi selama kehamilan

(eklamsia/preeklamsia), kehamilan kembar, ketuban pecah sebelum waktu kelahiran, dan perdarahan saat kehamilan yang terjadi sebelum proses persalinan.

c. Faktor janin

Pertumbuhan janin dalam kandungan juga berisiko terjadinya BBLR karena terpapar oleh bahan teratogenic yang dapat menyebabkan kelainan saat lahir atau kelainan kongenital, kelainan kromosom, dan infeksi dalam rahim.

Selain itu, ada faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kejadian BBLR menurut Setyowati & Baroroh (2023) antara lain:

a. Faktor plasenta

Faktor plasenta yang dapat menyebabkan bayi BBLR juga dapat menjadi salah satu faktor. Kelainan plasenta dapat disebabkan oleh hidramnion, plasenta previa, solution plasenta, sindrom tranfusi bayi kembar (sindrom parabiostatik), dan ketuban pecah dini.

b. Faktor lingkungan

Banyak masyarakat yang menganggap remeh adanya faktor lingkungan ini. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan BBLR, yaitu tempat tinggal di dataran tinggi, terkena radiasi, serta terpapar zat beracun.

3. Klasifikasi

Klasifikasi BBLR menurut *American Academy of Pediatrics* (AAP) dalam Agustina *et al* (2023) yakni sebagai berikut:

a. Berdasarkan masa kehamilan

- 1) Preterm adalah usia kehamilan <37 minggu
- 2) Late preterm adalah usia kehamilan antara 34-36 minggu
- 3) Early preterm adalah usia kehamilan antara 22-34 minggu
- 4) Aterm adalah usia kehamilan antara 37-41 minggu
- 5) Posterm adalah usia kehamilan >42 minggu

b. Berdasarkan berat lahir

- 1) Bayi dengan berat badan lahir amat sangat rendah atau *Extremely Low Birthweight* (ELBW) dimana bayi dengan berat lahir < 1.000 gram.
- 2) Bayi dengan berat lahir sangat rendah atau *Very Low Birthweight* (VLBW) dimana bayi dengan berat lahir <1.500 gram.
- 3) Bayi dengan berat lahir rendah atau *Low Birthweight* (LBW) dimana bayi dengan berat lahir <2.500 gram.

4. Patofisiologi

Menurut Nurlaila & Riyanti (2019), semakin kecil dan semakin premature bayi itu maka akan semakin tinggi resiko gizinya. Beberapa faktor yang memberikan efek pada masalah gizi pada BBLR yakni:

- a. Menurunnya simpanan zat gizi padahal cadangan makanan di dalam tubuh sedikit, hamper semua lemak, glikogen dan mineral seperti zat besi, kalsium, fosfor dan seng di deposit selama 8 minggu terakhir kehamilan. Dengan demikian bayi preterm mempunyai potensi terhadap peningkatan hipoglikemia, anemia dan lain-lain. Hipoglikemia menyebabkan bayi kejang terutama pada bayi BBLR Prematur.
- b. Kurangnya kemampuan untuk mencerna makanan. Bayi preterm mempunyai lebih sedikit simpanan garam empedu, yang diperlukan untuk mencerna dan mengabsorpsi lemak dibandingkan dengan bayi aterm.
- c. Belum matangnya fungsi mekanis dari saluran pencernaan, koordinasi antara refleks hisap dan menelan belum berkembang dengan baik sampai kehamilan 32-34 minggu, padahal bayi BBLR kebutuhan nutrisinya lebih tinggi karena target pencapaian BB nya lebih besar. Penundaan pengosongan lambung dan buruknya motilitas usus terjadi pada bayi preterm.
- d. Paru yang belum matang dengan peningkatan kerja napas dan kebutuhan kalori yang meningkat. Potensial untuk kehilangan panas akibat luas permukaan tubuh tidak sebanding dengan BB dan

sedikitnya lemak pada jaringan di bawah kulit. Belum optimalnya sistem saraf pengaturan suhu tubuh mempengaruhi ketidakstabilan suhu BBLR. Bayi terbiasa di suhu 36°C-37 °C ketika di dalam kandungan. Saat dilahirkan bayi berada pada suhu lingkungan yang lebih rendah. Perbedaan suhu ini berpengaruh pada kehilangan panas tubuh bayi. Kehilangan panas ini akan meningkatkan kebutuhan kalori.

Secara umum bayi BBLR ini berhubungan dengan usia kehamilan yang belum cukup bulan (prematuur) disamping ini juga disebabkan dismaturitas. Artinya bayi lahir cukup cukup usia bulan (usia kehamilan 38 minggu), tetapi berat badan lahirnya lebih kecil dari masa kehamilannya, yaitu tidak mencapai mencapai 2.500 gram. Masalah ini terjadi karena adanya gangguan gangguan pertumbuhan bayi sewaktu dalam kandungan yang disebabkan oleh penyakit ibu seperti adanya kelainan plasenta, infeksi, hipertensi dan keadaan-keadaan lain yang menyebabkan suplai makanan ke bayi menjadi berkurang. Gizi yang baik diperlukan seorang ibu hamil agar pertumbuhan janin tidak mengalami hambatan dan selanjutnya akan melahirkan bayi dengan berat normal. Dengan kondisi kesehatan yang baik, sistem reproduksi normal, tidak menderita sakit, dan tidak ada gangguan gizi pada masa prahamil maupun saat hamil, ibu akan melahirkan bayi lebih besar dan lebih sehat dari pada ibu dengan kondisi kehamilan yang sebaliknya. Ibu dengan kondisi kurang gizi kronis pada masa hamil sering melahirkan bayi BBLR, vitalitas rendah dan kematian yang tinggi (Sriyanah & Efendi, 2023).

5. Manifestasi Klinis

Menurut Setyowati & Baroroh (2023), tanda dan gejala dari BBLR dapat dibagi berdasarkan prematuritas dan dismaturitas. Tanda dan gejala dari prematuritas yaitu:

- a. Berat lahir bernilai sekitar <2.500 gram, Panjang badan <45 cm, lingkaran dada < 30 cm, lingkar Kepala < 33 cm.
- b. Masa gestasi kurang dari 37 minggu.
- c. Kulit tipis dan mengkilap dan lemak subkutan kurang.

- d. Tulang rawan telinga yang sangat lunak.
- e. Lanugo banyak terutama di daerah punggung.
- f. Putting susu belum terbentuk dengan bentuk baik.
- g. Pembuluh darah kulit masih banyak terlihat.
- h. Labia minora belum bisa menutup pada labia mayora pada bayi jenis kelamin perempuan, sedangkan pada bayi jenis kelamin laki-laki belum turunnya testis.
- i. Pergerakan kurang, lemah serta tonus otot yang mengalami hipotonik.
- j. Menangis dan lemah.
- k. Pernapasan kurang teratur.
- l. Sering terjadi serangan apnea.
- m. Refleks tonik leher masih lemah.
- n. Refleks menghisap serta menelan belum mencapai sempurna.

Selain prematuritas juga ada dismaturitas dengan tanda dan gejala sebagai berikut:

- a. Kulit pucat ada seperti noda
- b. Meconium atau feses kering, keriput, dan tipis
- c. *Verniks caseosa* tipis atau bahkan tidak ada
- d. Jaringan lemak dibawah kulit yang masih tipis
- e. Bayi tampak gersk cepat, aktif, dan kuat
- f. Tali pusat berwarna kuning agak kehijauan

6. Komplikasi

Menurut Rufaindah *et al* (2022), pada BBLR terjadi komplikasi dikarenakan fungsi sistem dan struktur organ tubuh masih sangat muda/imatur/premature sehingga belum berfungsi dengan optimal. Adapun komplikasi yang dapat timbul antara lain:

- a. Susunan saraf pusat

Aktivitas refleks yang belum maksimal disebabkan oleh adanya gangguan pada proses menghisap dan menelan.

b. Komplikasi saluran pernapasan

Akibat defisiensi surfaktan dalam alveoli yang berfungsi mengembalikan alveoli dapat terjadi *Idiopathic Respiratory Distress Syndrome* (IRDS). Pertumbuhan surfaktan paru mencapai maksimum pada minggu ke-35 kehamilan, sehingga pada BBLR yang lahir kurang dari usia gestasi yang matur akan lebih berisiko mengalami gangguan pernapasan. Defisiensi surfaktan menyebabkan gangguan kemampuan paru untuk mempertahankan stabilitasnya, alveolus akan kembali kolaps setiap akhir ekspirasi sehingga untuk pernapasan berikutnya dibutuhkan tekanan negative into toraks yang lebih besar yang disertai usaha inspirasi yang kuat. Tanda klinis bayi yang mengalami Sindrom Gawat Napas, yaitu pernapasan cepat, sianosis perioral, merintih saat ekspirasi dan terjadi retraksi substernal dan interostal. Jika kondisi tersebut tidak ditangani segera akan mengakibatkan gagal napas pada bayi dan dapat berujung pada kematian.

Hidup dan mati merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini. Dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim dua hal ini merupakan sesuatu yang harus kita yakini, khususnya tentang kematian yang menjadi rahasia yang tak dapat diperkirakan kapan terjadinya (Syamsuri, 2018).

Dalam al-Qur'an Allah swt berfirman didalam QS. Al-Mulk ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَفُورُ

Terjemahannya:

“Allah lah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012)

Menurut Romadlon (2019) sebagaimana ia mengutip dari Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya yang menjelaskan bahwa terdapat dua permasalahan pada potongan ayat al-ladzi khalaqa al-mawta wa al-hayata. Pendapat Pertama dikatakan: makna dari ayat tersebut adalah

Allah menciptakan makhluk untuk mati dan hidup, yakni kematian di dunia dan kehidupan di akhirat. Adapun alasan mendahulukan kematian dari pada kehidupan karena kematian itu mengandung paksaan yang lebih dekat sebagaimana mendahulukan anak perempuan dari pada anak laki-laki. Pendapat ini mengacu ada surat Asy-Syura ayat ke 49 dan dikatakan bahwa kematian didahulukan karena dia lebih dahulu, karena segala sesuatu dalam permulaannya berada pada keadaan mati; seperti embrio, debu, dll.

Adapun terkait dengan kematian terkadang akan dekat dengan istilah kelahiran, yang dimana ketika disisi lain terjadi kematian maka disisi lain akan terjadi kelahiran seorang bayi yang akan memulai kehidupan dimuka bumi ini. Lahirnya seorang bayi tentu akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi mereka yang telah menantikan kelahiran bayi tersebut. Maka tatkala ketika bayi tersebut lahir maka sambutlah dia dengan doa yang baik, seperti doa berikut ini :

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرَزَقْتَ
بِرَّهُ

Artinya :

“Semoga keberkahan kepada kamu pada apa yang dianugerahkan kepadamu, dan engkau bersyukur kepada Zat yang memberi, dan semoga dia dewasa dan engkau dianugerahkan kebaktiannya.”(Sahroji, 2017)

c. Pusat termoregulasi belum sempurna

Hal ini mengakibatkan BBLR mudah mengalami hipotermia. Bayi yang lahir dengan berat yang rendah memiliki lemak subkutan yang sedikit, belum matangnya sistem saraf pengaturan suhu tubuh, luas permulaan tubuh relatif lebih besar disbanding berat badannya sehingga mudah kehilangan panas.

d. Metabolisme

Produksi enzim glukoronil transferase ke sel hati belum sempurna sehingga mudah terjadi ikterus neonatus. Hiperbilirubinemia pada bayi

jika tidak segera diatasi, akan menyebabkan terjadinya *Kern Ikterus*, yang dapat menimbulkan gejala sisa pada bayi. Dalam mempertahankan kadar glukosa dalam darah, bayi aterm dapat mempertahankan 50-60 mg/dL selama 72 jam, sedangkan untuk BBLR hanya mampu dalam kadar 40 mg/dL. Hipoglikemia terjadi jika kadar glukosa dalam darah <20 mg/dL.

e. Imunoglobulin masih rendah

Hal ini mengakibatkan bayi BBLR mudah terkena infeksi. Kulit dan selaput lender membrane pada BBLR tidak memiliki perlindungan seperti bayi yang lahir secara aterm, sehingga membuat BBLR mudah mengalami infeksi.

f. Ginjal belum berfungsi sempurna

Filtrasi glomerulus belum sempurna sehingga mudah mengalami keracunan obat dan menderita asidosis metabolik.

7. Penatalaksanaan

Menurut Agustina *et al* (2023), penatalaksanaan yang dilakukan pada bayi dengan BBLR yakni sebagai berikut:

a. Bantuan respirasi

Tujuan penatalaksanaan ini adalah untuk mempertahankan oksigen tetap tercukupi. Apneu merupakan masalah pernapasan yang sering mengakibatkan penyakit berat pada bayi dengan premature karena disebabkan surfaktan belum diproduksi dengan sempurna sehingga paru juga belum matang yang dapat mengakibatkan *Respiratory Distress Syndrome* (RDS). Keadaan ini perlu dilakukan resusitasi pada bayi yaitu dengan memposisikan bayi, membersihkan jalan napas, rangsang taktil, menghangatkan bayi, dan terapi oksigen jika dibutuhkan berdasarkan keadaan bayi. Bayi diberikan oksigen 100% dapat memberikan efek edema pada paru bayi dan *retinopathy of prematurity*.

b. Termoregulasi

Permasalahan yang muncul pada termoregulasi terjadi karena kulit yang tipis dan lemak subkutan yang sedikit, serta pusat kontrol yang terdapat pada otak belum matur sehingga bayi masih kesulitan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Yang dapat dilakukan untuk menjaga agar suhu tubuh bayi dengan cara metode kanguru (*PK/Kangaroo Mother Care*), pemberian pemancar panas (lampu hangat), ruangan yang hangat serta bayi diletakkan dalam inkubator.

c. Pencegahan infeksi

Semua bayi baru lahir diberikan asuhan kebidanan dalam pencegahan infeksi. BBLR sangat rentan terhadap penyakit karena imunitas seluler dan humoral yang belum maksimal. Cara yang dapat dilakukan agar bayi terhindar dari infeksi sebagai berikut:

- 1) Menjaga kebersihan diri, penolong maupun ruangan dan alat yang maupun digunakan selama persalinan
- 2) Perawatan terhadap tali pusat
- 3) Pemberian ASI eksklusif
- 4) Melakukan cuci tangan sebelum menyentuh/memegang bayi
- 5) Melakukan tindakan sterilisasi alat kesehatan bekas pakai
- 6) Tidak diperkenankan bagi petugas atau orang tua dan keluarga yang sedang sakit atau sedang sakit infeksi untuk memasuki ruang perawatan bayi sampai dinyatakan sembuh, dan disarankan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat mengunjungi bayi

d. Nutrisi

Mekanisme ingesti dan digesti makanan yang belum berkembang secara maksimal pada BBLR menyebabkan bayi mengalami kesulitan dalam pemenuhan nutrisinya. Pemenuhan nutrisi bayi dengan BBLR dapat melalui oral, parenteral dan atau enteral dengan tetap memperhatikan kemampuan menghisap, menelap, dan bernapas. Bayi dengan kemampuan yang terbatas dapat menyebabkan apnea, bradikardia, dan penurunan saturasi oksigen. Pada bayi premature,

masih terbatas pada kapasitas lambung, dan masih mudah mengalami distensi abdomen yang dapat mempengaruhi pernapasan.

e. Keseimbangan cairan dan elektrolit

Bayi dengan BBLR sering kali mendapatkan cairan parenteral sebagai asupan tambahan kalori air, dan elektrolit. Kandungan air ekstraseluler pada bayi cukup bulan lebih rendah dibandingkan dengan bayi preterm, yaitu 70% bayi cukup bulan dan sampai 90% bayi preterm, sehingga keseimbangan cairan dan elektrolit sangat penting. Keadaan ini disebabkan karena kapasitas osmotik diuresis bayi BBLR yang preterm masih sangat terbatas pada ginjal dan permukaan tubuhnya lebih luas sehingga sangat rentan terhadap kehilangan cairan dan elektrolit.

8. Pemeriksaan Penunjang

Menurut Santoso (2021), pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada BBLR adalah sebagai berikut:


a. Radiologi

- 1) Pada umur 8 jam dapat dimulai foto thoraks pada bayi baru lahir dengan usia gestasi yang belum cukup bulan. Terdapatnya *retikulogranular* pada *parenkim* dan bronkogram udara pada gambaran foto thoraks pada bayi dengan penyakit membran hyalin yang disebabkan oleh kekurangan surfaktan. Gambaran *white lung* hanya tampak pada kondisi berat.
- 2) Pada umur 2 hari USG kepala terutama pada bayi dengan usia kehamilan 35 minggu akan dimulai untuk mengetahui adanya hidrocefalus atau perdarahan intrakranial dengan memvisualisasi ventrikel dan struktur otak garis tengah dengan fontanel anterior yang terbuka


b. Laboratorium

- 1) Pada hari pertama setelah lahir (menurun bila ada sepsis) terdapat jumlah sel darah putih : 18.000/mm³, netrofil meningkat sampai 23.000-24.000/mm³.

- 2) Hematokrit (Ht) : 43%- 61 % (peningkatan sampai 65 % atau lebih menandakan polisitemia, penurunan kadar menunjukkan anemia atau hemoragic prenatal/perinatal).
- 3) Hemoglobin (Hb) : 15-20 gr/dl (kadar lebih rendah berhubungan dengan anemia atau hemolisis berlebihan).
- 4) Nilai bilirubin normal total adalah : 6 mg/dl pada hari pertama kehidupan, 8 mg/dl 1-2 hari, dan 12 mg/dl pada 3-5 hari.
- 5) Elokترولit harus dipantau (Na, K, Cl) : biasanya dalam batas normal pada awalnya.
- 6) Pemeriksaan Analisis Gas Darah (AGD)



9. Penyimpangan KDM



B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian

Menurut Saputra *et al* (2023), pengkajian keperawatan adalah proses mengumpulkan data atau informasi pasien secara sistematis dan berkelanjutan termasuk mengorganisir data, validasi dan mendokumentasikan data pasien. Data yang dikumpulkan mengandung seluruh informasi yang saling berkaitan yang dikumpulkan oleh perawat dan tenaga profesional kesehatan lain secara lengkap dengan tujuan membantu meningkatkan status kesehatan pasien melalui rencana asuhan keperawatan yang komprehensif dan efektif.

Menurut Sari *et al* (2023), asuhan keperawatan merupakan data dasar klien yang komprehensif mencakup riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan diagnostik dan laboratorium serta informasi dari tim kesehatan serta keluarga klien yang meliputi:

- a. Identitas : Usia ibu saat hamil, usia kehamilan, kehamilan dengan penyakit penyerta.
- b. Riwayat kesehatan
 - 1) Keluhan utama: PB < 45 cm, LD < 30 cm, LK < 33 cm.
Kesadaran apatis, daya hisap lemah atau bayi tak mau minum, hipotonia letargi, dan mungkin terjadi kelumpuhan otot ekstrasvaskuler.
 - 2) Riwayat penyakit sekarang
Bayi dengan ukuran fisik : UK < 37 minggu, BB < 2500 gram, panjang badan < 45 cm. Gambaran fisik : kepala lebih besar dari badan, kulit tipis transparan, rambut lanugo banyak, lemak subkutan tipis, daya hisap lemah atau bayi tak mau minum, tangis yang melengking.
 - 3) Riwayat penyakit dahulu
Bayi beresiko mengalami BBLR, jika ibu mempunyai riwayat penyakit seperti hipertensi, placenta previa, kehamilan kembar,

malnutrisi, kebiasaan ibu merokok, minum alkohol, ibu yang menderita penyakit malaria, dan lain-lain.

4) Riwayat kehamilan dan melahirkan

Adanya riwayat melahirkan sebelumnya dan pada saat partus siapakah yang berperan dalam proses dalam pertolongan partus tersebut. Riwayat pemberian ANC terpadu termasuk didalamnya.

5) Riwayat imunisasi

Pemberian vaksin tetanus diberikan 2 kali pada ibu hamil, yaitu TT (tetanus) I diberikan setelah bulan ke-3 dan TT II diberikan dengan interval minimal 1 bulan, serta tidak boleh < 1 bulan sebelum persalinan agar kadar anti tetanus serum bayi mencapai kadar optimal. Bila ibu hamil belum mendapatkan polio, berikan vaksin polio yang aman untuk ibu hamil.

6) Riwayat nutrisi

Masalah pemberian ASI pada BBLR terjadi karena ukuran tubuh bayi dengan BBLR kecil, kurang energi, lemah, lambungnya kecil dan tidak dapat menghisap. Bayi BBLR dengan kehamilan lebih dari 35 minggu dan berat lahir lebih dari 2000 gram umumnya bisa langsung menyusui.

c. Kebutuhan dasar

- 1) Pola nutrisi : refleks sucking lemah, volume lambung kurang, daya absorpsi kurang atau lemah sehingga kebutuhan nutrisi terganggu.
- 2) Pola personal hygiene : perawat dan keluarga pasien harus menjaga kebersihan pasien, terutama saat BAB dan BAK, saat BAB dan BAK harus diganti popok khusus bayi BBLR yang kering dan halus.
- 3) Pola aktivitas : gerakan kaki dan tangan lemah.
- 4) Pola eliminasi: BAB yang pertama kali keluar adalah mekonium, produksi urin rendah, frekuensi BAB normal pada neonatus adalah lebih dari 4x dalam sehari sedangkan frekuensi BAK normal lebih 6x dalam sehari, volume urin normal berkisar antara 1-2 ml/kg

berat badan per jam, jadi bila berat badan bayi 2,5-5 kg urin yang dihasilkan berkisar 60-240 ml dalam sehari.

5) Pola tidur : bayi cenderung lebih banyak tidur.

d. Pemeriksaan fisik

1) Keadaan umum

- a) Pada umumnya pasien dengan BBLR dalam keadaan lemah, bayi terlihat kecil, pergerakan masih kurang dan lemah.
- b) Nadi: 180 kali per menit, kemudian menurun sampai 120- 140 x/ menit
- c) Pernapasan: 80 kali per menit, kemudian menurun sampai 40x/ menit
- d) Suhu: kurang dari 36,5°C

2) Pemeriksaan ABCD

- a) Antropometri pada bayi dengan BBLR terutama berat badan terbagi menjadi 3 yaitu : BBLR berat antara 1500- 2500 gram, BBLSR berat antara 1000-1500 gram, dan BBLAR berat kurang dari 1000 gram, lingkaran dada < 33 cm.
- b) Biokimia, pada bayi BBLR sering dijumpai adanya peningkatan kadar hemoglobin, eritrosit karena imaturitas dari sel dan belum sempurnanya enzim.
- c) Clinical, pada BBLR berat badan bayi belum memenuhi standar yakni 2500 gram dan pada kasus ini biasanya juga terjadi kelemahan reflek atau fungsi menghisap.
- d) Diet makanan atau nutrisi yang diberikan biasanya hanya ASI dan susu formula khusus BBLR jika disarankan oleh dokter.

3) Pemeriksaan fisik head to toe

a) Kepala

Inspeksi : biasanya pada BBLR kepala lebih besar dari badan, kulit tipis, ubun ubun besar dan kecil belum menutup

Palpasi : pada BBLR rambut tipis dan halus, lingkaran kepala < 33 cm.

b) Mata

Inspeksi : mata simetris, pupil isokor, terdapat banyak lanugo pada area pelipis, konjungtiva anemis.

c) Hidung

Inspeksi : terdapat pernafasan cuping hidung akibat gangguan pola nafas, terpasang selang oksigen 1-2 liter /menit.

Palpasi : pada BBLR tulang hidung masih lunak, karena tulang rawan belum sempurna.

d) Mulut

Inspeksi : pucat, sianosis, mukosa bibir kering, terpasang selang OGT.

e) Telinga

Inspeksi : pada BBLR terlihat banyak lanugo, daun telinga imatur.

Palpasi: daun telinga pada BBLR lunak.

f) Wajah

Inspeksi: warna kulit merah karena hipertermia, bentuk simetris, lanugo banyak, keriput seperti orang tua.

g) Leher

Inspeksi: pada BBLR mudah terjadi gangguan pernafasan akibat dari inadekuat jumlah surfaktan, jika hal ini terjadi biasanya didapatkan retraksi suprasternal.

h) Paru-paru

Inspeksi: biasanya pada BBLR pernafasan tidak teratur, otot bantu pernafasan, lingkaran dada

Palpasi : dinding dada elastis, puting susu belum terbentuk.

Perkusi: terdapat suara sonor.

Auskultasi: jika bayi mengalami gangguan pernafasan biasanya bayi mendengkur, jika terjadi aspirasi mekonium maka terdapat suara ronchi.

i) Jantung

Inspeksi: biasanya ictus cordis nampak di CS mid klavikula.

Palpasi : ictus cordis teraba ICS 4 mid clavicula sinistra

Perkusi: area jantung redup.

Auskultasi: S1 S2 tunggal, normalnya heart rate 120-160 kali/ menit

j) Abdomen

Inspeksi : bentuk silindris, perut buncit berarti adanya asites atau tumor, perut cekung adanya hernia diafragma.

Palpasi : hepar bayi terletak 1-2 cm dibawah aureus estate pada garis papila mammae, lien tidak teraba.

Auskultasi : bising usus timbul 1 sampai 2 jam sesudah masa kelahiran bayi.

k) Umbilicus

Inspeksi : tali pusarnya layu, apakah terdapat pendarahan ataukah tidak, terdapat tanda - tanda infeksi di tali pusarnya.

l) Genetalia

Inspeksi : pada neonatus aterm testis perlu turun, diketahui terdapat kelainan letak muara uretra dalam neonatus laki-laki, neonatus perempuan diketahui dari labia mayor serta labia minor, terdapat sekresi mucus keputihan, terkadang perdarahan.

m) Anus

Inspeksi : perhatikan adanya darah pada tinjanya, frekuensi BAB dan warna dari feses.

n) Ekstremitas

Inspeksi : warna biru, gerakan lemah, akral dingin, lihatlah apakah terdapat patah tulang maupun kelumpuhan syaraf maupun kondisi jari-jari tangan dan jumlah jarinya.

o) Refleksi

Inspeksi : pada neonatus preterm post asfiksia berat reflek moro serta sucking lemah. Reflek moro bisa menyampaikan keterangan tentang kondisi struktur syaraf pusat maupun terdapat patah tulang.

2. Diagnosis Keperawatan

Menurut Hidayat (2021), diagnosis keperawatan adalah sebuah keputusan klinik pada individu, keluarga atau masyarakat baik aktual maupun potensial tentang masalah kesehatan atau kehidupan. Adapun diagnosis keperawatan yang sering muncul pada BBLR menurut Kusumaningsih *et al* (2023) adalah sebagai berikut:

a. Pola napas tidak efektif

1) Definisi

Inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi yang adekuat.

2) Penyebab

- a) Hambatan upaya napas (misal nyeri saat bernapas, kelemahan otot pernapasan)
- b) Deformitas dinding dada
- c) Deformitas tulang dada
- d) Posisi tubuh yang menghambat ekspirasi paru
- e) Efek agen non farmakologis
- f) Kecemasan

3) Gejala dan tanda mayor

- a) Subjektif : Dyspnea
- b) Objektif : Penggunaan otot bantu pernapasan, fase ekspirasi memanjang, pola napas abnormal (takipnea, bradypnea, hiperventilasi, kussmaul).

4) Gejala dan tanda minor

- a) Subjektif : Ortopnea

- b) Objektif : Pernapasan cuping hidung, diameter thoraks anterior posterior meningkat, tekanan ekspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun, ekskursi dada berubah.
- b. Defisit nutrisi
- 1) Definisi
Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme.
 - 2) Penyebab
 - a) Ketidakmampuan menelan makanan
 - b) Ketidakmampuan mencerna makanan
 - c) Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrient
 - d) Peningkatan kebutuhan metabolisme
 - e) Faktor ekonomi
 - f) Faktor psikologis
 - 3) Gejala dan tanda mayor
 - a) Subjektif : Tidak tersedia
 - b) Objektif : Berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal.
 - 4) Gejala dan tanda minor
 - a) Subjektif : Cepat kenyang setelah makan, kram/nyeri abdomen, nafsu makan menurun.
 - b) Objektif : Bising usus hiperaktif, otot pengunyah lemah, otot menelan lemah, membrane mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, rambut rontok berlebihan, diare.
- c. Termoregulasi tidak efektif
- 1) Definisi
Kegagalan mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal.
 - 2) Penyebab
 - a) Stimulasi pusat termoregulasi hipotalamus
 - b) Fluktuasi suhu lingkungan
 - c) Proses penyakit

- d) Proses penuaan
 - e) Dehidrasi
 - f) Ketidaksesuaian pakaian untuk suhu lingkungan
 - g) Peningkatan kebutuhan oksigen
 - h) Perubahan laju metabolisme
 - i) Suhu lingkungan ekstrim
 - j) Ketidakadekuatan suplai lemak subkutan
 - k) Berat badan ekstrem
 - l) Efek agen farmakologis
- 3) Gejala dan tanda mayor
- a) Subjektif : Tidak tersedia
 - b) Objektif : Kulit dingin/hangat, menggigil, suhu tubuh fluktuatif.
- 4) Gejala dan tanda minor
- a) Subjektif : Tidak tersedia
 - b) Objektif : Piloereksi, CRT >3 detik, tekanan darah meningkat, pucat, frekuensi napas meningkat, kejang, takikardi, kulit kemerahan, dasar kuku sianotik.
- d. Ketidakstabilan kadar glukosa darah
- 1) Definisi
Variasi kadar glukosa darah naik/turun dari rentang normal.
 - 2) Penyebab
Hiperglikemia
 - a) Disfungsi pankreas
 - b) Resistensi insulin
 - c) Gangguan toleransi glukosa darah
 - d) Gangguan glukosa puasa
 - Hipoglikemia*
 - 1) Penggunaan insulin
 - 2) Hyperinsulinemia
 - 3) Disfungsi hati

- 4) Disfungsi ginjal kronis
 - 5) Efek agen farmakologis
 - 6) Tindakan pembedahan neoplasma
 - 7) Gangguan metabolic bawaan
- 3) Gejala dan tanda mayor

Hiperglikemia

- a) Subjektif : Lelah dan lesu.
- b) Objektif : Kadar glukosa darah/urin tinggi.

Hipoglikemia

- a) Subjektif : Mengantuk dan pusing.
 - b) Objektif : Gangguan koordinasi, kadar glukosa dalam darah/urin rendah.
- 4) Gejala dan tanda minor

Hiperglikemia

- a) Subjektif : Mulut kering dan haus meningkat.
- b) Objektif : Jumlah urine meningkat.

Hipoglikemia

- a) Subjektif : Palpitasi dan mengeluh lapar.
- b) Objektif : Gemetar, kesadaran menurun, perilaku aneh, sulit bicara, dan berkeringat.

e. Risiko infeksi

- 1) Definisi
Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik.
- 2) Faktor risiko
 - a) Penyakit kronis (misal diabetes melitus)
 - b) Efek prosedur invasive
 - c) Malnutrisi
 - d) Peningkatan paparan organisme pathogen lingkungan
- 3) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer
 - a) Gangguan peristaltik
 - b) Kerusakan integritas kulit

- c) Perubahan sekresi pH
 - d) Penurunan kerja siliaris
 - e) Ketuban pecah lama
 - f) Ketuban pecah sebelum waktunya
 - g) Merokok
 - h) Statis cairan tubuh
- 4) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder
- a) Penurunan hemoglobin
 - b) Imunosupresi
 - c) Leukopenia
 - d) Supresi respon inflamasi
 - e) Vaksinasi tidak adekuat
- f. Risiko gangguan integritas kulit atau jaringan
- 1) Definisi
Berisiko mengalami kerusakan kulit (dermis dan/atau epidermis) atau jaringan (membrane mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago kapsul sendi dan/atau ligamen).
 - 2) Faktor risiko
 - a) Perubahan sirkulasi
 - b) Perubahan status nutrisi (kelebihan atau kekurangan)
 - c) Kelebihan atau kekurangan volume cairan
 - d) Penurunan mobilitas
 - e) Bahan kimia iritatif
 - f) Suhu lingkungan yang ekstrem
 - g) Faktor mekanis (misal penekanan, gesekan) atau faktor listrik (elektrodiatermi, energi listrik bertegangan tinggi)
 - h) Terapi radiasi
 - i) Kelembaban
 - j) Proses penuaan
 - k) Neuropati perifer
 - l) Perubahan pigmentasi

- m) Perubahan hormonal
- n) Penekanan pada tonjolan tulang
- o) Kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan/melindungi integritas jaringan (PPNI, 2016).

3. Intervensi Keperawatan

Adapun intervensi keperawatan yang dilakukan pada bayi BBLR berdasarkan PPNI (2018) yakni sebagai berikut:

- a. Pola napas tidak efektif
 - 1) Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan Pola Napas membaik.
 - 2) Kriteria hasil : Dispnea menurun, penggunaan otot bantu napas menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, frekuensi napas membaik, dan kedalaman napas membaik.
 - 3) Intervensi keperawatan

Tabel 2.1 Intervensi Keperawatan Pola Napas Tidak Efektif

Intervensi Keperawatan	Rasional
<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, dan usaha napas). 2. Monitor bunyi napas tambahan (misal gurgling, mengi, wheezing, ronkhi kering). 3. Monitor sputum (jumlah, warna, dan aroma). <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahankan kepatenan jalan napas dengan <i>head-tilt</i> dan <i>chin-lift</i> (<i>jaw-thrust</i> jika curiga trauma cervical). 2. Posisikan semi-fowler atau fowler. 3. Lakukan fisioterapi dada, jika perlu. 4. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. 5. Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakea. 6. Keluarkan sumbatan benda padat dengan <i>forsep McGill</i>. 7. Berikan oksigen, jika perlu 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan bunyi napas dapat menunjukkan atelectasis, ronkhi mengi menunjukkan akumulasi sekret, ketidakmampuan membersihkan jalan napas menimbulkan penggunaan otot bantu dan peningkatan kerja napas. 2. Mengetahui adanya suara napas tambahan yang menghalangi jalan napas. 3. Mengetahui sputum yang dihasilkan. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mempertahankan dan memelihara kepatenan jalan napas. 2. Untuk mengurangi sesak. 3. Untuk membantu mengeluarkan sekret dan mengurangi sesak. 4. Untuk membantu membersihkan sekret dan melonggarkan jalan napas. 5. Untuk menghindari terjadinya hipoksemi akibat penghisapan jalan napas. 6. Untuk membebaskan jalan napas dari benda asing. 7. Untuk mencegah terjadinya gagal napas.

<p>Edukasi</p> <p>1. Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak kontraindikasi.</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, dan mukolitik, jika perlu.</p>	<p>Edukasi</p> <p>1. Untuk memenuhi cairan tubuh</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1. Pemberian bronkodilator untuk melebarkan jalan napas, ekspektoran untuk merangsang pengeluaran sputum, dan mukolitik untuk menghancurkan formasi sputum atau tidak lagi bersifat kental.</p>
--	---

b. Defisit nutrisi

- 1) Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan Status Nutrisi membaik.
- 2) Kriteria hasil : Porsi makan yang dihabiskan meningkat, kekuatan otot menelan meningkat, berat badan membaik, indeks masa tubuh (IMT) membaik, nafsu makan membaik.
- 3) Intervensi keperawatan

Tabel 2.2 Intervensi Keperawatan Defisit Nutrisi

Intervensi Keperawatan	Rasional
<p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi status nutrisi. 2. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi. 3. Monitor asupan makanan. 4. Monitor berat badan. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu 2. Sajikan makanan dengan suhu yang sesuai 3. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. 4. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan diet yang diprogramkan. <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan, jika perlu. 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui status nutrisi agar dilakukan perencanaan yang tepat untuk diberikan. 2. Mengetahui jenis kebutuhan nutrisi yang diperlukan pasien. 3. Mengetahui asupan makanan pasien. 4. Mengetahui berat badan bayi. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk membersihkan rongga mulut pasien dari kotoran sisa makanan. 2. Agar suhu makanan yang masuk sesuai dengan suhu dalam tubuh pasien. 3. Untuk mencegah terjadinya konstipasi. 4. Agar kebutuhan akan kalori dan protein terpenuhi. <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar klien tidak kelebihan asupan nutrisi. <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar nutrisi pasien terpenuhi dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tubuh pasien.

c. Termoregulasi tidak efektif

- 1) Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan Termoregulasi membaik.
- 2) Kriteria hasil : Kulit merah menurun, pucat menurun, takikardia menurun, takipnea menurun, bradikardia menurun, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik, dan pengisian kapiler membaik.
- 3) Intervensi keperawatan

Tabel 2.3 Intervensi Keperawatan Termoregulasi Tidak Efektif

Intervensi Keperawatan	Rasional
<p>Regulasi Temperatur</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor suhu tubuh bayi stabil. 2. Monitor suhu tubuh tiap dua jam. 3. Monitor warna kulit. 4. Monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia/hipertermia. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang alat pemantau. 2. Tingkatkan asupan nutrisi dan cairan. 3. Bedong bayi. 4. Masukkan bayi bblr kedalam plastik. <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demonstrasikan teknik perawatan pmk untuk bayi bblr.. <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian antipiretik, jika perlu. 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui perubahan suhu tubuh bayi dalam kondisi normal. 2. Mengetahui perubahan suhu tubuh bayi tiap dua jam. 3. Untuk mengetahui reaksi dari perubahan suhu tubuh. 4. Untuk mengetahui tanda dan gejala yang muncul akibat perubahan suhu. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memantau suhu tubuh bayi. 2. Agar bayi tidak dehidrasi. 3. Memberikan lingkungan hangat pada bayi. 4. Untuk mempertahankan suhu bayi. <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar keluarga mengetahui teknik melakukan pmk pada bayi untuk menstabilkan suhu tubuh bayi. <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada bayi.

d. Ketidakstabilan kadar glukosa darah

- 1) Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan Kestabilan Kadar Glukosa Darah meningkat.
- 2) Kriteria hasil : Mengantuk menurun, mulut kering menurun, rasa haus menurun, kadar glukosa dalam darah membaik, kadar glukosa dalam urine membaik, dan jumlah urine membaik.

3) Intervensi keperawatan

Tabel 2.4 Intervensi Keperawatan Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah

Intervensi Keperawatan	Rasional
<p>Manajemen Hipoglikemia</p> <p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi tanda dan gejala hipoglikemia.</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Berikan karbohidrat sederhana. 2. Pertahankan akses intravena.</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Anjurkan monitor kadar glukosa darah.</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1. Kolaborasi pemberian dextrose. 2. Kolaborasi pemberian glucagon</p>	<p>Observasi</p> <p>1. Mengetahui tanda dan gejala hipoglikemia pada bayi.</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Untuk memenuhi kadar glukosa darah dalam tubuh. 2. Untuk mematenkan akses intravena.</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Untuk mengetahui perubahan kadar glukosa dalam tubuh.</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1. Untuk mencukupi kadar gula dalam tubuh. 2. Untuk menambah kadar glukosa dalam tubuh.</p>

e. Risiko infeksi

- 1) Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan Tingkat Infeksi meningkat.
- 2) Kriteria hasil : Kebersihan tangan meningkat, kebersihan badan meningkat, demam menurun, kemerahan menurun, dan kadar sel darah putih membaik.
- 3) Intervensi keperawatan

Tabel 2.5 Intervensi Keperawatan Risiko Infeksi

Intervensi Keperawatan	Rasional
<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Monitor tanda dan gejala infeksi.</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Batasi jumlah pengunjung. 2. Cuci tangan sebelum sesudah kontak dan dengan lingkungan pasien. 3. Pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi.</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi. 2. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar.</p>	<p>Observasi</p> <p>1. Mengetahui adanya tanda dan gejala infeksi yang timbul.</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Mencegah terjadinya infeksi nosocomial dari orang lain. 2. Mencegah terjadinya infeksi melalui tangan. 3. Untuk meminimalisir terjadinya infeksi.</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Agar keluarga mengetahui tanda dan gejala infeksi. 2. Agar keluarga mengerti cara mencuci</p>

Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian imunisasi.	tangan yang benar untuk mencegah infeksi. Kolaborasi 1. Memperkuat daya tahan tubuh bayi.
---	--

f. Risiko gangguan integritas kulit atau jaringan

- 1) Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan Integritas Kulit meningkat.
- 2) Kriteria hasil : Kerusakan jaringan menurun, perdarahan menurun, hematoma menurun, suhu kulit membaik, dan tekstur membaik.
- 3) Intervensi keperawatan

Tabel 2.6 Intervensi Keperawatan Risiko Gangguan Integritas Kulit atau Jaringan

Intervensi Keperawatan	Rasional
Perawatan Integritas Kulit Observasi 1. Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Terapeutik 1. Ubah posisi tiap 2 jam sekali. 2. Gunakan produk berbahan ringan/alami dan hipoalergik pada kulit sensitif.	Observasi 1. Untuk mengetahui penyebab dari gangguan integritas kulit. Terapeutik 1. Untuk mempertahankan aliran darah. 2. Untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah terjadinya alergi.

4. Implementasi Keperawatan

Menurut Prastiwi et al (2023), implementasi adalah pelaksanaan dari rencana intervensi untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap implementasi dimulai setelah rencana intervensi disusun dan ditujukan pada nursing order untuk membantu klien dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tahap-tahap implementasi yakni sebagai berikut:

a. Tahap I : Persiapan

Pada tahap ini menuntut perawat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam tindakan meliputi:

- 1) Review tindakan keperawatan yang diidentifikasi pada tahap perencanaan.
- 2) Menganalisa pengetahuan dan keterampilan keperawatan yang diperlukan.

- 3) Mengetahui komplikasi dari tindakan keperawatan yang mungkin muncul.
- 4) Menentukan dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan.
- 5) Mempersiapkan lingkungan yang kondusif sesuai dengan tindakan.
- 6) Mengidentifikasi aspek hukum dan etik terhadap resiko dari potensi tindakan.

b. Tahap II : Pelaksanaan

Fokus tahap pelaksanaan tindakan perawatan adalah kegiatan pelaksanaan tindakan dari perencanaan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional. Pendekatan ini meliputi:

- 1) Independent adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat tanpa petunjuk dan perintah dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Tipe tindakan independent keperawatan dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu tindakan diagnostik, tindakan terapeutik, tindakan edukatif, dan tindakan merujuk.
- 2) Interdependen menjelaskan suatu kegiatan yang memerlukan suatu kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya, misalnya tenaga sosial, ahli gizi, fisioterapi dan dokter.
- 3) Dependen ini berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindakan medis. Tindakan tersebut menandakan suatu cara dimana tindakan medis dilaksanakan.

c. Tahap III : Dokumentasi

Pelaksanaan tindakan keperawatan harus diikuti oleh pencatatan yang lengkap dan akurat terhadap suatu kejadian dalam proses keperawatan.

5. Evaluasi Keperawatan

Menurut (Mustamu et al., 2023), evaluasi keperawatan adalah suatu proses sistematis dan terencana yang dilakukan pada akhir tahap perawatan untuk membandingkan hasil kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah tindakan keperawatan yang telah dilakukan efektif dalam meningkatkan kondisi kesehatan pasien atau perlu dilakukan pendekatan

lain. Evaluasi keperawatan juga dapat membantu perawat dalam mengevaluasi kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan. Data subjektif dan objektif yang dikumpulkan selama proses perawatan digunakan dalam evaluasi keperawatan untuk menentukan tindakan selanjutnya yang harus diambil dalam perawatan pasien.

C. Evidence Based Practice in Nursing (EBPN)

1. Pengertian

Terapi musik merupakan terapi komplementer di ruangan intensif neonatologi digunakan untuk meningkatkan perkembangan dan promotif maturasi pada bayi prematur. Musik digunakan untuk menenangkan, untuk meningkatkan kemampuan menerima stimulasi, meningkatkan refleks hisap, mengurangi rasa nyeri, meningkatkan hubungan ibu dan bayi dan mempersingkat lama rawat (Annisa & Mentari, 2021).

Terapi musik merupakan suatu bentuk pengobatan yang bersifat holistik dimana langsung menuju ke gejala penyakit. Keberhasilan terapi ditentukan dari kerjasama antara orang tua dan bayi secara keseluruhan (Yanti et al., 2023).

Musik lullaby merupakan musik pengantar tidur yang mempunyai struktur suara yang menenangkan, mempunyai irama yang konstan dan stabil serta melodi yang tenang dan tidak mengejutkan yang dapat mempengaruhi irama gerakan jantung dan pernapasan (Triana et al., 2023).

Musik lullaby memberikan efek yang menenangkan. Musik lullaby sering digunakan dalam stimulasi multimodal. Musik lullaby termasuk dalam musik klasik Brahm atau Mozart, musik daerah atau nyanyian ibu yang dapat mengatur perilaku bayi untuk dapat fokus pada dirinya dan juga menenangkan yang dikomunikasikan secara emosional (Azmi et al., 2017).

2. Tujuan

Menurut (Nurhasanah, 2020), tujuan pemberian terapi musik *lullaby* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan perkembangan dan promotif maturasi pada bayi prematur.
- b. Untuk menenangkan, meningkatkan fungsi fisiologis, meningkatkan kemampuan menerima stimulasi, meningkatkan refleks hisap, mengurangi rasa nyeri, meningkatkan hubungan ibu dan bayi dan mempersingkat lama rawat.

3. Prosedur Pemberian Musik *Lullaby*

Adapun Langkah-langkah untuk melakukan pemberian terapi musik *lullaby* menurut Nurhasanah (2020) yakni sebagai berikut:

- a. Pre Interaksi
 - 1) Mengukur respirasi rate pasien.
 - 2) Mempersiapkan alat yakni jam tangan, audio musik *lullaby* (*Brahm's Lullaby*), alat pengukur kebisingan suara musik yaitu sound level meter, dan lembar observasi tanda-tanda vital.
 - 3) Mengidentifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontra indikasi.
 - 4) Mencuci tangan.
- b. Fase Orientasi
 - 1) Mengucapkan salam
 - 2) Memperkenalkan diri
 - 3) Menjelaskan tujuan, prosedur tindakan, dan lamanya tindakan dilakukan selama \pm 30 menit pada keluarga pasien.
 - 4) Menanyakan kesediaan orang tua klien untuk dilakukan tindakan pada pasien.
 - 5) Mendekatkan alat-alat.
- c. Fase Kerja
 - 1) Membatasi stimulasi eksternal seperti cahaya, suara pengunjug/petugas kesehatan selama mendengarkan musik.
 - 2) Mengatur posisi pasien senyaman mungkin.
 - 3) Mendekatkan musik dalam jarak 15-20 cm dari telinga pasien.
 - 4) Pastikan volume musik tidak terlalu keras (<75 dB).

- 5) Memutar musik *lullaby* selama \pm 30 menit.
 - 6) Mengukur kembali respirasi setelah dilakukan terapi musik *lullaby* selama 30 menit.
- d. Fase Terminasi
- 1) Mengevaluasi respon pasien setelah mendengarkan musik.
 - 2) Merapikan pasien dan memberikan posisi yang nyaman.
 - 3) Mencuci tangan.
- e. Dokumentasi
- 1) Catat tanggal dan waktu dilakukan tindakan.
 - 2) Catat respon klien selama dilakukan tindakan.
 - 3) Catat hasil kestabilan pernafasan sebelum dan sesudah dilakukan terapi musik *lullaby*.


4. Artikel Utama & Pendukung

- a. Artikel Utama :
- (Triana, H., Utami, N., & Sari, I. M. (2023). *Penerapan Terapi Musik Lullaby Respiration Rate Pada Bayi Prematur Di Ruang Perinatologi Rsud Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen*. Jurnal Imliah Ilmu Kesehatan, 1(3))
- b. Artikel Pendukung :
- (Yanti, P. A., Dewi Noorratri, E., & Utami, N. (2023). *Penerapan Terapi Musik Terhadap Respirasi Bayi Berat Badan Lahir Rendah Selama Kangaroo Mother Care Di Ruang Perinatologi Rsud Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen*. Jurnal Ilmu Kesehatan. <https://journal-mandiracendikia.com/jikmc>)
- c. Artikel Pendukung :
- (Annisa, R., & Mentari, F. T. (2021). *Penerapan Terapi Sentuhan Dan Musik Lullaby Terhadap Peningkatan Suhu Tubuh Pada Bayi Prematur*. Jurnal Masker Medika, 9(1), 416–432.)
- d. Artikel Pendukung :

(Azmi, L., Fatimah, S., Emaliyawati, E., & Keperawatan, F. (2017). *Pengaruh Terapi Musik Lullaby Terhadap Heart Rate, Respiration Rate, Saturasi Oksigen Pada Bayi Prematur*. In *JKP* (Vol. 5))

e. Artikel Pendukung :

(S.A.M, R., Rustina, Y., & Syahreni, E. (2013). *Memperbaiki Saturasi Oksigen, Frekuensi Denyut Jantung, dan Pernafasan Neonatus yang Menggunakan Ventilasi Mekanik Dengan Terapi Musik*. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 16(3), 154–160.)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dimana peneliti memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif, mendetail, dan mendalam terhadap suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang meliputi individu, kelompok, Lembaga, dan masyarakat (Widiyono *et al.*, 2023).

Metode penelitian studi kasus ini merupakan metode yang mana dalam pengambilan data atau pengkajian dilakukan dengan cara merinci dan mendalam untuk mengetahui kondisi pasien. Pengumpulan data diawali dengan melakukan observasi, pemeriksaan fisik, wawancara kepada keluarga pasien dan perawat yang bertugas serta mendokumentasikan hasil pengkajian yang didapatkan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menegaskan suatu masalah keperawatan dan menyusun intervensi kemudian dilakukan implementasi serta evaluasi selama tiga hari.

B. Subyek Studi Kasus

Subjek dalam studi kasus ini adalah Bayi Ny “E” usia 8 hari yang. Subjek dalam penelitian ini adalah bayi yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi
 - a. Bayi yang dirawat di ruang perawatan NICU
 - b. Bayi dengan diagnosis medis BBLR
 - c. Orangtua bayi bersedia bayi dijadikan subjek penelitian
2. Kriteria Eksklusi
 - a. Bayi dengan penyakit jantung bawaan
 - b. Bayi yang pulang atau meninggal sebelum tiga hari implementasi

C. Fokus Studi Kasus

Dalam studi kasus ini difokuskan untuk melakukan asuhan keperawatan pada bayi dengan BBLR yang mengalami masalah pola napas tidak efektif dengan intervensi terapi musik *lullaby*.

D. Instrument Studi Kasus

Menurut Kurniawan (2021), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, mengukur fenomena, dan menganalisis data sesuai dengan masalah yang dihadapi dengan subjek atau sampel yang diamati. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah format asuhan keperawatan, lembar observasi tanda-tanda vital, audio musik *lullaby*, alat pengukur kebisingan suara musik yaitu sound level meter dan alat pengukur waktu.

E. Prosedur Pengambilan Data

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan data pada studi kasus ini yakni sebagai berikut:

1. Persiapan

Peneliti pada tahap ini mengusulkan tema dan judul kepada dosen pembimbing terkait studi kasus yang akan diteliti dan merekomendasikan intervensi berbasis *Evidence Based Practice in Nursing* (EPBN). Selanjutnya peneliti menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan terapi musik *lullaby*.

2. Pengumpulan data

Data diperoleh dari hasil observasi, pemeriksaan fisik, dan wawancara kepada perawat dan orangtua bayi Ny "E" di ruang perawatan NICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

3. Penyusunan laporan

Laporan disusun berdasarkan dengan panduan penulisan karya tulis ilmiah yang telah ditetapkan sebagai pedoman.

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Penelitian ini dilakukan di ruang perawatan NICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 24 Juni 2023.

G. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dilakukan untuk menentukan intervensi yang akan dilakukan kepada subjek studi kasus berdasarkan proses asuhan keperawatan yakni pengkajian yang dilanjutkan dengan mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai masalah keperawatan, kemudian melakukan analisa data untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Selanjutnya menyusun intervensi keperawatan yang akan dilakukan sesuai dengan data subjek penelitian. Setelah menyusun intervensi keperawatan dilakukan implementasi sesuai perencanaan yang disusun sebelumnya dan mengevaluasi hasil dari tindakan yang dilakukan kepada subjek penelitian dengan menilai SOAP.

H. Etika Studi Kasus

Etika penelitian adalah standar yang dijunjung peneliti ketika melakukan pekerjaannya. Dalam hal etika penelitian, sebagian besar berkaitan dengan aturan yang harus dipatuhi peneliti ketika melakukan penelitiannya (Herdiawanto & Hamdayama, 2021). Karena etika penelitian sangat penting, peneliti di bidang keperawatan selalu mendapatkan otorisasi sebelum memulai penelitian apa pun. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam memberikan asuhan keperawatan pada studi kasus ini yakni:

1. Confidentiality (Kerahasiaan)


Peneliti hanya menggunakan data yang telah diperoleh untuk kepentingan penelitian dan tidak akan membagikannya kepada orang lain. Untuk melindungi privasi responden, dalam penelitian ini hanya inisial nama yang digunakan.

2. Beneficence (Berbuat baik)

Dalam penelitian ini diharapkan agar memperoleh manfaat semaksimal mungkin untuk masyarakat pada umumnya dan terkhususnya untuk subjek penelitian.

3. Non Maleficience (Tidak merugikan)

Dalam penelitian ini tidak menimbulkan kondisi yang berpotensi akan membahayakan kondisi subjek penelitian.



BAB IV
LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

1. Identitas

a. Data Bayi

Nama : By. Ny. E
BB/PB : 2.114 Gr/44,5 Cm
Jenis Kelamin : Perempuan
Apgar Score : 5
Tanggal Lahir : 13 Juni 2023

b. Data Orang Tua

Nama Ibu : Ny. E
Umur : 38 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Alamat : Sinjai
Nama Suami : Tn. A
Umur : 39 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Alamat : Sinjai

2. Data Umum

Keluhan Utama : Sesak

Riwayat Penyakit Sekarang : Bayi lahir secara *section Caesar* dengan indikasi ibu dengan tumor pada Rahim. Usia gestasi 36 minggu. Bayi lahir dengan BB 2.015 gram dengan sesak dan apgar skor 5.

3. Pemeriksaan Fisik

a. Pengkajian Nyeri

Neonatal/Infant Pain Score (NIPS)

Tabel 4.1 Pengkajian Nyeri pada Neonatus

No.	Kategori	Skor
1.	Ekspresi Wajah	0
	Otot wajah rileks, ekspresi netral (0)	
	Otot wajah tegang, alis berkerut, rahang dan dagu mengunci (1)	
2.	Tangisan	0
	Tenang, tidak menangis (0)	
	Mengerang, sebentar-sebentar menangis (1)	
	Terus-menerus menangis, menangis kencang melengking (2)	
3.	Pola Napas	1
	Rileks, napas reguler (0)	
	Pola napas berubah : tidak teratur, lebih cepat dari biasanya, tersedak, menahan napas (1)	
4.	Tangan	0
	Rileks, otot tangan tidak kaku, kadang bergerak tidak beraturan (0)	
	Rileks, otot tangan tidak kaku, kadang fleksi/ekstensi yang kaku, meluruskan tangan tapi dengan cepat melakukan fleksi/ekstensi yang kaku (1)	
5.	Kaki	0
	Rileks, otot kaki tidak kaku, kadang bergerak tidak beraturan (0)	
	Fleksi/ekstensi yang kaku, meluruskan kaki tapi dengan cepat melakukan fleksi/ekstensi yang kaku (1)	
6.	Kesadaran	0
	Tidur pulas atau cepat bangun, tenang (0)	
	Rewel, gelisah dan meronta-ronta (1)	
Nilai Total Skor		1
Keterangan : 0-2 : Nyeri ringan 3-4 : Nyeri sedang > 4 : Nyeri berat		Nyeri Ringan

Interpretasi : Nyeri ringan (0-2)

b. Penilaian Ballard Score

Penilaian Maturitas Neuromuskular

Gambar 4.1 Penilaian Maturitas Neuromuskular

Score	-1	0	1	2	3	4	5
Posture							
Square window (wrist)	 $> 90^\circ$	 90°	 60°	 45°	 30°	 0°	
Arm recoil		 180°	 $140-180^\circ$	 $110-140^\circ$	 $90-110^\circ$	 $< 90^\circ$	
Popliteal angle	 180°	 160°	 140°	 120°	 100°	 90°	 $< 90^\circ$
Scarf sign							
Heel to ear							

Postur : 2

Square widow : 2

Arm coil : 3

Popliteal angle : 3

Scarf sign : 3

Heel to ear : 3

Total skor : 16

Penilaian Maturitas Fisik

Gambar 4.2 Penilaian Maturitas Fisik

Skin	Sticky, friable, transparent	Gelatinous, red, translucent	Smooth, pink; visible veins	Superficial peeling and/or rash; few veins	Cracking, pale areas; rare veins	Parchment, deep cracking; no vessels	Leathery, cracked, wrinkled		
Lanugo	None	Sparse	Abundant	Thinning	Bald areas	Mostly bald		Maturity Rating	
Plantar surface	Heel-toe 40–50 mm: -1 < 40 mm: -2	> 50 mm, no crease	Faint red marks	Anterior transverse crease only	Creases, anterior 2/3	Creases over entire sole		Score	Weeks
Breast	Imperceptible	Barely perceptible	Flat areola, no bud	Stippled areola, 1–2 mm bud	Raised areola, 3–4 mm bud	Full areola, 5–10 mm bud		-10	20
Eye/Ear	Lids fused loosely: -1 tightly: -2	Lids open; pinna flat; stays folded	Slightly curved pinna; soft; slow recoil	Well curved pinna; soft but ready recoil	Formed and firm, instant recoil	Thick cartilage, ear stiff		-5	22
Genitals (male)	Scrotum flat, smooth	Scrotum empty, faint rugae	Testes in upper canal, rare rugae	Testes descending, few rugae	Testes down, good rugae	Testes pendulous, deep rugae		0	24
Genitals (female)	Clitoris prominent, labia flat	Clitoris prominent, small labia minora	Clitoris prominent, enlarging minora	Majora and minora equally prominent	Majora large, minora small	Majora cover clitoris and minora		5	26
								10	28
								15	30
								20	32
								25	34
								30	36
								35	38
								40	40
								45	42
								50	44

Kulit : 2

Lanugo : 2

Garis Plantar : 3

Payudara : 3

Mata/telinga : 3

Genetalia perempuan : 2

Total Skor : 15

Interpretasi Hasil

Skor Maturitas Neuromuskuler : 16

Skor Maturitas Fisik : 15

Total Ballard Score : 31 (36 Minggu)

c. Pengukuran Antropometri

Berat badan : 2.114 Gr

Panjang badan : 44,5 Cm

Lingkar kepala : 29 Cm

Lingkar dada : 28 Cm

LILA : 8 Cm

Lingkar perut : 29 Cm

d. Pengukuran Tanda Vital

Kondisi umum : Pasif
Suhu : 37,1 °C
Nadi : 159 x/menit
Pernapasan : 65 x/menit
Tekanan darah : Tidak dikaji
SPO₂ : 98%

e. Refleks

Sucking : Blum ada
Grasping : Ada
Rooting : Belum ada
Swallowing : Belum ada
Babinski : Ada
Moro : Ada
Breathing : Ada
Eyeblink : Tidak dilakukan
Pupillary : Tidak dilakukan
Crawling : Tidak dilakukan
Menelan : Tidak dilakukan

f. Tonus Otot

Tampak bayi letargis
Gerakan bayi tampak pasif

g. Pemeriksaan Head to Toe

- 1) Kepala
 - a) Frontal anterior : Lunak dan datar
 - b) Sutura sagitalis : Tepat
 - c) Gambaran wajah : Simetris
 - d) Molding caput succedaneum & chepalohematoma : Tidak ada
- 2) Mata
 - a) Tampak mata simetris
 - b) Tampak mata bersih

- c) Tidak terdapat konjungtivitis
 - d) Tidak terdapat perdarahan konjungtiva
 - e) Tampak sklera tidak ikterik
- 3) Mulut
- a) Tidak terdapat labioschisis
 - b) Tidak terdapat stomatitis
 - c) Terpasang OGT
- 4) THT
- a) Telinga tampak normal
 - b) Tampak tidak ada serumen
 - c) Telinga tampak simetris
 - d) Hidung tampak normal
 - e) Tampak tidak ada pernapasan cuping hidung
 - f) Terpasang alat bantu napas mode CPAP FiO₂ 30% flow 8L/menit
 - g) Tidak terdapat pembesaran tiroid
- 5) Respirasi
- a) Pergerakan dada tampak simetris
 - b) Terdapat retraksi dinding dada
 - c) Bunyi napas kiri dan kanan sama
 - d) Bunyi napas bronkovesikuler
 - e) Tidak ada ronchi dan wheezing
 - f) Pernapasan cepat 65 x/menit
- 6) Kardiovaskuler
- a) Tidak tampak iktus cordis
 - b) Bunyi jantung S1 lup - S2 dup
 - c) CRT <3 detik
- 7) Gastrointestinal
- a) Abdomen teraba supel
 - b) Lingkar perut 29 cm
 - c) Peristaltic usus normal

- d) BAB frekuensi 2 kali
- e) BAK 6,6 cc/jam
- 8) Ekstremitas
 - a) Ekstremitas atas : Kedua tangan lengkap, jari-jari lengkap.
 - b) Gerakan ekstremitas atas : Gerakan pasif
 - c) Ekstremitas bawah : Kedua kaki lengkap, jari-jari lengkap.
 - d) Gerakan ekstremitas bawah : Gerakan pasif
 - e) Nadi :
 - Perifer : Teraba keras
 - Brachial kanan : Teraba keras
 - Brachial kiri : Teraba keras
 - Femoral kanan : Teraba lemah
 - Femoral kiri : Teraba lemah
- 9) Umbilicus
 - a) Tampak tali pusar mulai mengering
 - b) Tidak tampak adanya tanda infeksi
- 10) Genetalia
 - a) Jenis kelamin perempuan
 - b) Tampak labia mayora dan labia minora sama-sama menonjol
- 11) Integument
 - a) Warna kulit merah muda
 - b) Kulit tipis dan lembut
 - c) Kulit teraba hangat
 - d) Suhu 37,1 °C
 - e) Menggunakan penghangat radian (infant warmer)

4. Riwayat Antenatal Care

- a. Jumlah kunjungan : Ny. E mengatakan selama hamil dirinya melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 7 kali yakni pada trimester pertama sebanyak 2 kali di puskesmas dekat tempat tinggal, pada

- trimester kedua dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali yakni 2 kali di puskesmas dan 1 kali di dokter kandungan, pada trimester ketiga dilakukan pemeriksaan 2 kali di dokter kandungan.
- b. Bidan/dokter : Ny. E mengatakan memeriksakan kehamilannya pada bidan di puskesmas dan dokter kandungan di RS.
- c. Pend.kes yang didapat : Ny. E mengatakan selama hamil diberikan edukasi terkait pemenuhan nutrisi selama hamil dan juga prosesi persalinan secara section Caesar.
- d. HPHT : 21 Agustus 2022
- e. Kenaikan BB selama hamil : Ny. E mengatakan selama hamil BBnya naik 13 Kg
- f. Komplikasi obat : Ny. E mengatakan tidak memiliki riwayat tidak cocok terhadap obat.
- g. Obat-obat yang didapat : Ny. E mengatakan diberikan obat penambah darah dan vitamin saat pemeriksaan kehamilan.
- h. Riwayat hospitalisasi : Tn. A mengatakan istrinya bersalin di RSUP Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 13 Juni 2023, usia kehamilan belum cukup bulan dan persalinan dilakukan secara section Caesar akibat adanya tumor dirahim Ny. E selama kehamilan.
- i Golongan darah ibu : Tn. A mengatakan golongan darah Ny. E adalah B⁺.

5. Riwayat Intranatal Care

- a. Awal persalinan : Ny. E mengatakan merasakan nyeri di perut tembus kebelakang.
- b. Lama persalinan : Tn. A mengatakan lama persalinan istrinya yakni kurang lebih 3 jam.
- c. Cara melahirkan : Tn. A mengatakan istrinya melahirkan dengan cara section Caesar.
- d. Komplikasi persalinan : Tn. A mengatakan tidak ada masalah selama proses persalinan istrinya.
- e. Terapi yang diberikan : Ny. E tidak mengetahui terapi apa saja yang diberikan.
- f. Jumlah cairan ketuban : Ny. E tidak mengetahui jumlah cairan ketubannya.
- g. Anastesi yang diberikan : Ny. E tidak mengetahui jenis anastesi apa yang diberikan.
- h. Ada/tidak meconium : Tn. A mengatakan ada meconium.

6. Riwayat Postnatal Care

- a. Usaha napas : Bayi menggunakan alat bantu ventilator mode CPAP.
- b. Apgar score menit pertama : Apgar skor menit pertama adalah 5
- c. Kebutuhan resusitasi : Tidak dilakukan resusitasi
- d. Kebutuhan nutrisi : Perawat mengatakan nutrisi bayi diperoleh dari cairan parenteral dan susu formula yang masuk melalui OGT.
- e. Adanya trauma lahir : Tn. A mengatakan tidak mengetahui adanya trauma lahir.
- f. Keluarnya urin : Perawat mengatakan ada urine yang keluar.
- g. BAB : Perawat mengatakan ada BAB yang keluar.

8. Pemeriksaan Penunjang

a. Laboratorium

1) Analisa Gas Darah (Tanggal : 15/06/2023)

Kesan : Analisa gas darah dalam batas normal

2) Elektrolit (Tanggal : 20/06/2023)

Kesan : Elektrolit dalam batas normal

3) Hematologi (Tanggal : 20/06/2023)

Kesan : Nilai RBC dan HGB dibawah batas normal menandakan anemia.

b. USG

USG Kepala (Tanggal : 20/06/2023)

Kesan : Tidak tampak tanda-tanda perdarahan pada USG Kepala saat ini.

9. Terapi

a. Rawat infant warmer

b. Terpasang alat bantu napas mode CPAP dengan FiO_2 30% flow 8 L/menit

c. Terpasang OGT

d. Nutrisi parenteral 120 cc dengan kecepatan 2,8 cc/jam/intravena

e. Enteral : 8 x 30 cc (susu formula)

f. Ampicillin 100 mg/12 jam/intravena

g. Gentamisin 8 mg/24 jam/intravena

h. Dobutamine 4 mg kecepatan 0,08 cc/jam

i. Dextrose 10% 2,5 cc/24 jam

DATA FOKUS

Tabel 4.2 Data Fokus

Data Subjektif	Data Objektif
Tidak tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesak 2. Terdapat retraksi dinding dada 3. Pernapasan cepat 65 x/menit 4. Nadi : 159 x/menit 5. SPO₂ : 98 % 6. Berat badan : 2.114 Gr 7. Panjang badan : 44,5 Cm 8. Lingkar kepala : 29 Cm 9. Lingkar dada : 28 Cm 10. Lingkar perut : 29 Cm 11. LILA : 8 Cm 12. Rooting refleks belum ada 13. Sucking refleks belum ada 14. Refleks menelan belum ada 15. Usia gestasi 36 minggu 16. S : 37,1 °C 17. Warna kulit merah muda 18. Kulit tipis dan lembut 19. Kulit teraba hangat

ANALISA DATA

Tabel 4.3 Analisa Data

Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
DS : Tidak tersedia DO : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesak 2. Terdapat retraksi dinding dada 3. Pernapasan cepat 65 x/menit 4. Nadi : 159 x/menit 5. SPO₂ : 98 % 	Faktor Ibu (penyakit) ↓ Bayi lahir belum cukup bulan ↓ BBLR ↓ Fungsi organ belum maksimal ↓ Pertumbuhan dinding dada belum sempurna ↓ Vesikel paru imature ↓ Infusisensi pernapasan ↓ Disease membrane hyaline	Pola Napas Tidak Efektif

	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Produksi surfaktan menurun</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Alveolus kolaps</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ventilasi berkurang</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Takipnea</p>	
<p>DS :</p> <p>Tidak tersedia</p> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berat badan : 2.114 Gr 2. Panjang badan : 44,5 Cm 3. Lingkar kepala : 29 Cm 4. Lingkar dada : 28 Cm 5. Lingkar perut : 29 Cm 6. LILA : 8 Cm 7. Rooting refleks belum ada 8. Sucking refleks belum ada 9. Refleks menelan belum ada 	<p style="text-align: center;">Faktor Ibu (penyakit)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bayi lahir belum cukup bulan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">BBLR</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Fungsi organ belum maksimal</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Imaturitas septum-septum</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Vital</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tidak mampu mengingesti nutrien</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Refleks menelan belum sempurna</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penurunan simpanan nutrisi</p>	Defisit Nutrisi
<p>DS :</p> <p>Tidak tersedia</p> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia gestasi 36 minggu 2. S : 37,1 °C 3. Pernapasan cepat 65 x/menit 4. Nadi : 159 x/menit 5. SPO₂ : 98 % 6. Warna kulit merah muda 7. Kulit tipis dan lembut 8. Kulit teraba hangat 9. Berat badan : 2.114 Gr 	<p style="text-align: center;">Faktor Ibu (penyakit)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bayi lahir belum cukup bulan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">BBLR</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Fungsi organ belum maksimal</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Imaturitas septum-septum</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Vital</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Fluktuasi temperature abnormal</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Berkurangnya lemak subkutan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Suhu tidak stabil</p>	Termoregulasi Tidak Efektif

B. Diagnosis Keperawatan

Tabel 4.4 Diagnosis Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan
1.	Pola Napas Tidak Efektif berhubungan dengan Hambatan Upaya Napas dibuktikan dengan : DS : Tidak tersedia DO : 1. Sesak 2. Terdapat retraksi dinding dada 3. Pernapasan cepat 65 x/menit 4. Nadi : 159 x/menit 5. SPO ₂ : 98 %
2.	Termoregulasi Tidak Efektif berhubungan dengan Berat Badan Ekstrim dibuktikan dengan : DS : Tidak tersedia DO : 1. Usia gestasi 36 minggu 2. S : 37,1 °C 3. Pernapasan cepat 65 x/menit 4. Nadi : 159 x/menit 5. SPO ₂ : 98 % 6. Warna kulit merah muda 7. Kulit tipis dan lembut 8. Kulit teraba hangat 9. Berat badan : 2.114 Gr
3.	Defisit Nutrisi berhubungan dengan Peningkatan Kebutuhan Metabolisme dibuktikan dengan : DS : Tidak tersedia DO : 1. Berat badan : 2.114 Gr 2. Panjang badan : 44,5 Cm 3. Lingkar kepala : 29 Cm 4. Lingkar dada : 28 Cm 5. Lingkar perut : 29 Cm 6. LILA : 8 Cm 7. Rooting refleks belum ada 8. Sucking refleks belum ada 9. Refleks menelan belum ada

C. Intervensi Keperawatan

Tabel 4.5 Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan	Rencana Tindakan Keperawatan		
		Luaran Keperawatan	Intervensi	Rasional
1.	<p>Pola Napas Tidak Efektif berhubungan dengan Hambatan Upaya Napas dibuktikan dengan :</p> <p>DS :</p> <p>Tidak tersedia</p> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesak 2. Terdapat retraksi dinding dada 3. Pernapasan cepat 65 x/menit 4. Nadi : 159 x/menit 5. SPO₂ : 98 % 	<p>(L.01004) Pola Napas</p> <p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam maka diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dispnea cukup menurun dari skor 1 ke skor 4. 2. Frekuensi napas cukup membaik dari skor 1 ke skor 4. 	<p>(I.01011) Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas 2. Monitor pola napas 3. Monitor saturasi oksigen <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahankan kepatenan jalan napas 2. Posisikan <i>quarter prone</i> 3. Berikan oksigen 4. Berikan terapi musik <i>lullaby</i> (EBN) 	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menilai adanya perubahan pada frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas bayi. 2. Untuk menilai adanya perubahan pada pola napas bayi 3. Untuk menilai adanya perubahan persentase oksigen dalam tubuh bayi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar jalan napas bayi tetap stabil 2. Posisi <i>quarter prone</i> dapat menstabilkan frekuensi napas bayi 3. Untuk mengurangi sesak pada bayi 4. Untuk menstabilkan frekuensi napas bayi
2.	<p>Termoregulasi Tidak Efektif berhubungan dengan Berat Badan Ekstrim dibuktikan dengan :</p> <p>DS :</p> <p>Tidak tersedia</p> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia gestasi 36 minggu 2. S : 37,1 °C 	<p>(L.14134) Termoregulasi</p> <p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam maka diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Takipnea cukup 	<p>(I.14578) Regulasi Temperatur</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor suhu bayi sampai stabil (36,5 °C – 37,5 °C) 2. Monitor warna dan suhu kulit 3. Monitor frekuensi pernapasan dan nadi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi 	<p>Regulasi Temperatur</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menilai perubahan suhu tubuh bayi 2. Untuk menilai perubahan warna dan suhu kulit bayi 3. Untuk menilai perubahan tanda vital bayi

	<p>3. Pernapasan cepat 65 x/menit 4. Nadi : 159 x/menit 5. SPO₂ : 98 % 6. Warna kulit merah muda 7. Kulit tipis dan lembut 8. Kulit teraba hangat 9. Berat badan : 2.114 Gr</p>	<p>menurun dari skor 1 ke skor 4. 2. Suhu tubuh cukup membaik dari skor 1 ke skor 4.</p>	<p>yang adekuat 2. Sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien</p>	<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada bayi 2. Agar suhu tubuh bayi tetap stabil
3.	<p>Defisit Nutrisi berhubungan dengan Peningkatan Kebutuhan Metabolisme dibuktikan dengan : DS : Tidak tersedia DO : 1. Berat badan : 2.114 Gr 2. Panjang badan : 44,5 Cm 3. Lingkar kepala : 29 Cm 4. Lingkar dada : 28 Cm 5. Lingkar perut : 29 Cm 6. LILA : 8 Cm 7. Rooting refleks belum ada 8. Sucking refleks belum ada 9. Refleks menelan belum ada</p>	<p>(L.03018) Berat Badan Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam maka diharapkan berat badan cukup membaik dari skor 1 ke skor 4.</p>	<p>(I.03120) Manajemen Nutrisi Parenteral Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor kepatenan akses intravena 2. Monitor asupan nutrisi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan nutrisi parenteral sesuai indikasi 2. Gunakan infusio pump 3. Berikan nutrisi selain nutrisi parenteral 	<p>Manajemen Nutrisi Parenteral Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga akses intravena tetap paten untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi 2. Untuk menilai asupan nutrisi bayi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi 2. Agar nutrisi yang masuk sesuai kebutuhan bayi 3. Agar menambah asupan nutrisi bayi

D. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

Tabel 4.6 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan	Waktu	Implementasi	Evaluasi
Kamis, 22 Juni 2023				
1.	Pola Napas Tidak Efektif berhubungan dengan Hambatan Upaya Napas	00.08	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas Hasil : P : 66 x/menit, napas cepat, dan terdapat retraksi dinding dada. 2. Memonitor pola napas Hasil : Tampak pola napas bayi cepat (Takipnea) 3. Memonitor saturasi oksigen Hasil : SPO₂ : 97% <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kepatenan jalan napas Hasil : Melakukan pembersihan jalan napas dan memperbaiki posisi CPAP. 2. Memposisikan <i>quarter prone</i> Hasil : Bayi diposisikan <i>quarter prone</i> dan tampak nyaman. 3. Memberikan oksigen Hasil : Terpasang CPAP FiO₂ 30% flow 8 L/m Peep 6 cmH₂O. 4. Memberikan terapi musik <i>lullaby</i> (EBN) Hasil : Bayi tampak tenang Sebelum, P : 65 x/menit Setelah, P : 59 x/menit 	<p>Kamis, 22 Juni 2023 pukul 07.00 WITA</p> <p>S : -</p> <p>O : P : 62 x/menit SPO₂ : 96%</p> <p>Tampak pola napas bayi cepat, terdapat retraksi dinding dada.</p> <p>A : Pola Napas Tidak Efektif belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas 2. Monitor pola napas 3. Monitor saturasi oksigen <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahankan kepatenan jalan napas 2. Posisikan <i>quarter prone</i> 3. Berikan oksigen 4. Berikan terapi musik <i>lullaby</i> (EBN)
		00.08		
		00.08		
		00.20		
		06.15		
		00.10		
		00.30		

2.	Termoregulasi Tidak Efektif berhubungan dengan Berat Badan Ekstrim	<p>00.08</p> <p>00.30</p> <p>06.00</p> <p>00.10</p> <p>00.08</p> <p>00.30</p> <p>01.00</p> <p>00.10</p> <p>00.10</p>	<p>Regulasi Temperatur</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor suhu bayi sampai stabil (36,5 °C – 37,5 °C)</p> <p>Hasil :</p> <p>S : 37,2 °C</p> <p>S : 37,0 °C</p> <p>S : 37,1 °C</p> <p>2. Memonitor warna dan suhu kulit</p> <p>Hasil : Tampak kulit warna merah muda dan teraba hangat.</p> <p>3. Memonitor frekuensi pernapasan dan nadi</p> <p>Hasil :</p> <p>P : 66 x/menit N : 167 x/menit</p> <p>P : 65 x/menit N : 164 x/menit</p> <p>P : 59 x/menit N : 161 x/menit</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat</p> <p>Hasil : Terpasang cairan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,8 cc/jam</p> <p>2. Menyesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien</p> <p>Hasil : Suhu infant warmer 34,2 °C</p>	<p>Kamis, 22 Juni 2023 pukul 07.00 WITA</p> <p>S : -</p> <p>O : S : 37,2 °C P : 62 x/menit</p> <p>Tampak pola napas bayi cepat.</p> <p>Tampak kulit warna merah muda dan teraba hangat.</p> <p>A : Termoregulasi Tidak Efektif belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi</p> <p>Regulasi Temperatur</p> <p>Observasi</p> <p>1. Monitor suhu bayi sampai stabil (36,5 °C – 37,5 °C)</p> <p>2. Monitor warna dan suhu kulit</p> <p>3. Monitor frekuensi pernapasan dan nadi</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat</p> <p>2. Sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien</p>
3.	Defisit Nutrisi berhubungan dengan Peningkatan Kebutuhan Metabolisme	<p>00.12</p> <p>00.12</p>	<p>Manajemen Nutrisi Parenteral</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor kepatenan akses intravena</p> <p>Hasil : Tampak akses vena paten</p> <p>2. Memonitor asupan nutrisi</p>	<p>Kamis, 22 Juni 2023 pukul 07.00 WITA</p> <p>S : -</p> <p>O : BB : 2.114 Gr</p> <p>Terpasang OGT</p> <p>Terpasang cairan nutrisi parenteral dengan</p>

			<p>Hasil : Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,8 cc/jam.</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Memberikan nutrisi parenteral sesuai indikasi Hasil : Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,8 cc/jam.</p> <p>2. Menggunakan infusio pump Hasil : Terpasang infus pump</p> <p>3. Memberikan nutrisi selain nutrisi parenteral Hasil : Bayi diberikan susu formula 30 cc/3 jam</p>	<p>kecepatan 2,8 cc/jam dan susu formula 30 cc/3 jam.</p> <p>A : Defisit Nutrisi belum teratasi P : Lanjutkan Intervensi Manajemen Nutrisi Parenteral</p> <p>Observasi</p> <p>1. Monitor kepatenan akses intravena 2. Monitor asupan nutrisi</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Berikan nutrisi parenteral sesuai indikasi 2. Berikan nutrisi selain nutrisi parenteral</p>
Jum'at, 23 Juni 2023				
1.	Pola Napas Tidak Efektif berhubungan dengan Hambatan Upaya Napas	<p>14.20</p> <p>14.20</p> <p>14.20</p> <p>15.40</p> <p>16.00</p>	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas Hasil : P : 60 x/menit, napas cepat, dan terdapat retraksi dinding dada.</p> <p>2. Memonitor pola napas Hasil : Tampak pola napas bayi cepat (Takipnea)</p> <p>3. Memonitor saturasi oksigen Hasil : SPO₂ : 97%</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Mempertahankan kepatenan jalan napas Hasil : Melakukan pembersihan jalan napas dan memperbaiki posisi CPAP.</p> <p>2. Memosisikan <i>quarter prone</i> Hasil : Bayi diposisikan <i>quarter prone</i> dan tampak nyaman.</p>	<p>Jum'at, 23 Juni 2023 pukul 21.00 WITA</p> <p>S : -</p> <p>O : P : 54 x/menit SPO₂ : 98%</p> <p>Tampak pola napas bayi cepat, terdapat retraksi dinding dada.</p> <p>A : Pola Napas Tidak Efektif belum teratasi P : Lanjutkan Intervensi Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <p>1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas 2. Monitor saturasi oksigen</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Pertahankan kepatenan jalan napas 2. Posisikan <i>quarter prone</i> 3. Berikan oksigen 4. Berikan terapi musik <i>lullaby</i> (EBN)</p>

		14.20	3. Memberikan oksigen Hasil : Terpasang CPAP FiO ₂ 25% flow 8 L/m Peep 6 cmH ₂ O.	
		17.00	4. Memberikan terapi musik <i>lullaby</i> (EBN) Hasil : Bayi tampak tenang Sebelum, P : 58 x/menit Setelah, P : 51 x/menit	
2.	Termoregulasi Tidak Efektif berhubungan dengan Berat Badan Ekstrim	14.20 17.00 20.00 17.00 14.20 17.00 20.00 14.30 14.30	<p>Regulasi Temperatur</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Memonitor suhu bayi sampai stabil (36,5 °C – 37,5 °C) Hasil : S : 37,0 °C S : 37,3 °C S : 37,2 °C Memonitor warna dan suhu kulit Hasil : Tampak kulit warna merah muda dan teraba hangat. Memonitor frekuensi pernapasan dan nadi Hasil : P : 60 x/menit N : 152 x/menit P : 58 x/menit N : 155 x/menit P : 55 x/menit N : 151 x/menit <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat Hasil : Terpasang cairan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam Menyesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan 	<p>Jum'at, 23 Juni 2023 pukul 21.00 WITA</p> <p>S : - O : S : 37,1 °C P : 54 x/menit Tampak pola napas bayi cepat. Tampak kulit warna merah muda dan teraba hangat.</p> <p>A : Termoregulasi Tidak Efektif belum teratasi P : Lanjutkan Intervensi</p> <p>Regulasi Temperatur</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitor suhu bayi sampai stabil (36,5 °C – 37,5 °C) Monitor warna dan suhu kulit Monitor frekuensi pernapasan dan nadi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat Sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien


			pasien Hasil : Suhu infant warmer 34,2 °C	
3.	Defisit Nutrisi berhubungan dengan Peningkatan Kebutuhan Metabolisme	14.30 14.30 14.30 18.00	<p>Manajemen Nutrisi Parenteral</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor kepatenan akses intravena Hasil : Tampak akses vena paten 2. Memonitor asupan nutrisi Hasil : Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan nutrisi parenteral sesuai indikasi Hasil : Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam. 2. Memberikan nutrisi selain nutrisi parenteral Hasil : Bayi diberikan susu formula 30 cc/3 jam 	<p>Jum'at, 23 Juni 2023 pukul 21.00 WITA</p> <p>S : -</p> <p>O : BB : 2.114 Gr Terpasang OGT Terpasang cairan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam dan susu formula 30 cc/3 jam.</p> <p>A : Defisit Nutrisi belum teratasi P : Lanjutkan Intervensi Manajemen Nutrisi Parenteral</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor kepatenan akses intravena 2. Monitor asupan nutrisi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan nutrisi parenteral sesuai indikasi 2. Berikan nutrisi selain nutrisi parenteral
Sabtu, 24 Juni 2023				
1.	Pola Napas Tidak Efektif berhubungan dengan Hambatan Upaya Napas	14.00 14.00 14.50	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas Hasil : P : 47 x/menit terdapat retraksi dinding dada. 2. Memonitor saturasi oksigen Hasil : SPO₂ : 98% <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kepatenan jalan napas 	<p>Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 21.00 WITA</p> <p>S : -</p> <p>O : P : 45 x/menit SPO₂ : 99% Masih terdapat retraksi dinding dada namun berkurang. Terpasang O₂ nasal kanul 8 L/menit</p> <p>A : Pola Napas Tidak Efektif belum teratasi P : Pertahankan Intervensi Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p>

		17.00	Hasil : Melakukan pembersihan jalan napas dan memperbaiki posisi nasal kanul.	1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas
		14.00	2. Memposisikan <i>quarter prone</i> Hasil : Bayi diposisikan <i>quarter prone</i> dan tampak nyaman.	2. Monitor saturasi oksigen
		19.30	3. Memberikan oksigen Hasil : Terpasang nasal kanul 8 L/menit.	Terapeutik 1. Pertahankan kepatenan jalan napas
			4. Memberikan terapi musik <i>lullaby</i> (EBN) Hasil : Bayi tampak tenang Sebelum, P : 43 x/menit Setelah, P : 38 x/menit	2. Posisikan <i>quarter prone</i> 3. Berikan oksigen 4. Berikan terapi musik <i>lullaby</i> (EBN)
2.	Termoregulasi Tidak Efektif berhubungan dengan Berat Badan Ekstrim	14.00	Regulasi Temperatur Observasi 1. Memonitor suhu bayi sampai stabil (36,5 °C – 37,5 °C) Hasil : S : 37,1 °C	Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 21.00 WITA S : - O : S : 37,3 °C P : 45 x/menit Tampak kulit warna merah muda dan teraba hangat.
		15.00	S : 37,2 °C	A : Termoregulasi Tidak Efektif belum teratasi P : Pertahankan Intervensi
		17.00	S : 37,0 °C	Regulasi Temperatur
		17.00	2. Memonitor warna dan suhu kulit Hasil : Tampak kulit warna merah muda dan teraba hangat.	Observasi 1. Monitor suhu bayi sampai stabil (36,5 °C – 37,5 °C)
		14.00	3. Memonitor frekuensi pernapasan dan nadi Hasil : P : 47 x/menit N : 149 x/menit	2. Monitor warna dan suhu kulit 3. Monitor frekuensi pernapasan dan nadi
		17.00	P : 44 x/menit N : 143 x/menit	Terapeutik 1. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat
		19.30	P : 43 x/menit N : 145 x/menit	2. Sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien
		14.00	Terapeutik 1. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang	

		14.00	<p>adekuat Hasil : Terpasang cairan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam</p> <p>2. Menyesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien Hasil : Suhu infant warmer 34,2 °C</p>	
3.	Defisit Nutrisi berhubungan dengan Peningkatan Kebutuhan Metabolisme	<p>14.10</p> <p>14.10</p> <p>14.10</p> <p>18.00</p>	<p>Manajemen Nutrisi Parenteral</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor kepatenan akses intravena Hasil : Tampak akses vena paten</p> <p>2. Memonitor asupan nutrisi Hasil : Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam.</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Memberikan nutrisi parenteral sesuai indikasi Hasil : Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam.</p> <p>2. Memberikan nutrisi selain nutrisi parenteral Hasil : Bayi diberikan susu formula 30 cc/3 jam</p>	<p>Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 21.00 WITA</p> <p>S : -</p> <p>O : BB : 2.240 Gr</p> <p>Terpasang OGT</p> <p>Terpasang cairan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam dan susu formula 30 cc/3 jam.</p> <p>A : Defisit Nutrisi belum teratasi</p> <p>P : Pertahankan Intervensi</p> <p>Manajemen Nutrisi Parenteral</p> <p>Observasi</p> <p>1. Monitor kepatenan akses intravena</p> <p>2. Monitor asupan nutrisi</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Berikan nutrisi parenteral sesuai indikasi</p> <p>2. Berikan nutrisi selain nutrisi parenteral</p>

Tabel 4.7 Perkembangan Hasil Pemberian Intervensi Musik *Lullaby*

No.	Waktu	Pre Intervensi	Post Intervensi
1.	Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 00.30 WITA	Frekuensi pernapasan 65 x/menit	Frekuensi pernapasan 59 x/menit
2.	Jumat, 23 Juni 2023 Pukul 17.00 WITA	Frekuensi pernapasan 58 x/menit	Frekuensi pernapasan 51 x/menit
3.	Sabtu, 24 Juni 2023 Pukul 19.30 WITA	Frekuensi pernapasan 43 x/menit	Frekuensi pernapasan 38 x/menit



BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

1. Analisis pengkajian keperawatan

Pada laporan ini, peneliti melakukan pengkajian pada bayi di ruang perawatan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. Pengkajian merupakan tahap pertama dalam proses keperawatan dengan mengumpulkan data secara sistematis untuk menentukan status kesehatan dan fungsional kerja serta respon klien pada saat ini dan seelumnya. Dari pengkajian, dapat disusun databased atau data dasar mengenai kebutuhan, masalah kesehatan dan respon klien terhadap masalah. Tahap pengkajian diawali dengan mengumpulkan riwayat kesehatan keperawatan, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, mencatat data laboratorium, memvalidasi data, mengelompokkan data dan mendokumentasikan data (Prastiwi *et al.*, 2023).

Pada penelitian ini, pengkajian dilakukan tanggal 21 Juni 2023 pada By. Ny. E dengan usia 8 hari berjenis kelamin perempuan. By. Ny. E merupakan bayi yang mengalami BBLR lahir dengan berat 2.015 gram, usia gestasi 36 minggu. Menurut WHO (2014) BBLR adalah berat badan saat lahir kurang dari 2.500 gram yang diukur satu jam setelah bayi dilahirkan (Kusuma *et al.*, 2022). Ada beberapa faktor risiko terjadinya BBLR menurut Utami *et al* (2022) adalah faktor ibu (usia <20 atau >35 tahun, gizi kurang saat hamil, jarak kehamilan, pola hidup, infeksi dan penyakit kronik), faktor kehamilan, dan faktor janin. Berdasarkan hasil wawancara dalam kasus ini, Tn. A mengatakan bayi lahir secara section Caesar karena Ny. E memiliki tumor dirahimnya sehingga bayi lahir sebelum usia gestasinya.

Pada pengkajian tersebut ditemukan bayi tampak sesak, lemah, terdapat retraksi dinding dada, bunyi napas bronkovesikuler, pernapasan cepat 65 x/menit, nadi : 159 x/menit. Dari data tersebut peneliti

menganalisis bahwa pasien mengalami pola napas tidak efektif atau terdapat *Respiratory Distress Neonatal* (RDN), hal ini sejalan dengan teori Dwi Kartiningsih *et al* (2023), bahwa gangguan yang sering muncul pada bayi baru lahir dalam beberapa jam setelah lahir adalah *Respiratory Distress of Newborn* (RDN) atau gangguan pernapasan pada bayi baru lahir. Manifestasi klinis pada bayi yang mengalami gangguan pernapasan atau RDN adalah pernapasan tidak teratur, adanya retraksi dinding dada, terdapat suara napas tambahan, pernapasan cuping hidung dan takikardia. Menurut analisis peneliti, terjadinya pola napas tidak efektif pada bayi diakibatkan karena kondisi berat badan bayi yang kurang dari 2.500 gram yakni 2.015 gram dan bayi lahir diusia gestasi kurang dari 37 minggu sehingga kondisi organ paru-paru bayi belum berfungsi secara baik. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh bahwa Zulfiani *Latinapa et al* (2022) bayi premature atau bayi kurang bulan berpotensi mengalami RDN.

Berikutnya dilakukan pengkajian fisik lainnya didapatkan data bahwa kulit teraba hangat, warna kulit merah muda, kulit tipis dan lembut, suhu 37,1 °C, berat badan : 2.114 gram, panjang badan : 44,5 cm, lingkar kepala : 29 cm, lingkar dada : 28 cm, lingkar perut : 29 cm, LILA : 8 cm, rooting refleks belum ada, sucking refleks belum ada, dan refleks menelan belum ada. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kondisi By. Ny. E sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Setyowati & Baroroh (2023) bahwa manifestasi klinis pada BBLR adalah berat lahir kurang dari 2.500 gram, panjang badan <45 cm, lingkaran dada < 30 cm, lingkar Kepala < 33 cm, masa gestasi kurang dari 37 minggu, kulit tipis, pergerakan kurang, refleks menghisap serta menelan belum mencapai sempurna.

2. Analisis diagnosis keperawatan

Diagnosis keperawatan ditegakkan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan yang saat ini dialami (Ahsan & Dewi, 2021). Diagnosis keperawatan pada By. Ny. E

dari hasil pengkajian dan pemeriksaan fisik terhadap pasien diperoleh 3 masalah keperawatan yang ditegakkan yakni sebagai berikut:

a. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas

Pada bayi dengan BBLR atau premature menunjukkan tanda dan gejala yang dialami seperti pernapasan cepat dan tidak teratur serta pernapasan lebih dari 60x/menit. Peneliti menegakkan diagnosis pola napas tidak efektif karena pada By. Ny. E mengalami kondisi sesak, terdapat retraksi dinding dada, pernapasan cepat 65 x/menit, nadi : 159 x/menit. Diagnosis keperawatan yang ditegakkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjani *et al* (2022), bahwa pada BBLR mengalami ketidakefektifan pola napas yang disebabkan karena imaturitas otot-otot pernapasan. Penelitian yang dilakukan oleh Khamidah (2022) juga menunjukkan bahwa bayi dengan BBLR cenderung mengalami gangguan pernapasan atau pola napas tidak efektif dimana terjadinya inspirasi dan ekspirasi yang tidak memberi ventilasi secara adekuat. Kondisi ini dapat terjadi karena keterlambatan perkembangan maturitas paru atau tidak adekuatnya jumlah surfaktan dalam paru. Surfaktan adalah suatu kompleks lipoprotein, merupakan bagian dari permukaan yang ada di alveoli, untuk mencegahnya kolapsnya alveolus tersebut. Surfaktan dihasilkan oleh sel-sel pernapasan di alveoli. Surfaktan yang tidak adekuat dapat menyebabkan kolaps alveolus dan daya berkembang paru kurang sehingga bayi akan mengalami sesak nafas dan pola pernapasan tidak teratur.

b. Termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan berat badan ekstrim

Salah satu masalah yang sering dialami oleh BBLR adalah ketidak mampuan untuk mempertahankan suhu tubuh yang ditandai dengan kulit teraba hangat/dingin, menggigil, pucat, pernapasan cepat, kulit kemerahan dan lain-lain. Dari hasil pengkajian pada By. Ny. E didapatkan data bahwa suhu : 37,1 °C, pernapasan cepat 65 x/menit, nadi : 159 x/menit, warna kulit merah muda, kulit tipis dan lembut,

kulit teraba hangat. Berdasarkan data tersebut peneliti menegakkan diagnosis keperawatan termoregulasi tidak efektif karena kondisi yang dialami pasien sesuai dengan tanda dan gejala yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, kasus ini juga sesuai dengan penelitian oleh Mariska (2022) bahwa bayi baru lahir tidak mampu mengatur temperatur tubuhnya secara maksimal. Akibatnya bayi mudah mengalami kedinginan. Pada bayi baru lahir mekanisme pengaturan suhu tubuh masih lemah, sehingga suhu tubuh perlu untuk dipertahankan agar bayi tidak kehilangan panas. Termoregulasi tidak efektif ini terjadi karena penguapan yang bertambah akibat dari kurangnya jaringan lemak dibawah kulit, permukaan tubuh relatif lebih luas dibandingkan dengan berat badan, otot yang tidak aktif, produksi panas yang berkurang.

- c. Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme

Pada By. Ny. E mengalami defisit nutrisi disebabkan karena berat badan bayi saat lahir yakni 2.015 gram yang termasuk dalam berat bayi lahir rendah yakni kurang dari 2.500 gram. Mekanisme ingesti dan digesti makanan yang belum berkembang secara maksimal pada BBLR menyebabkan bayi mengalami kesulitan dalam pemenuhan nutrisinya sehingga berisiko mengalami kekurangan nutrisi (Agustina *et al.*, 2023). Menurut analisis peneliti menunjukkan adanya kesesuaian antara teori yang diungkapkan oleh Setyowati & Baroroh (2023) dan kondisi pasien pada kasus ini, yang mana By. Ny. E yang lahir dengan berat 2.015 gram, berat badan : 2.114 gram, panjang badan : 44,5 cm, lingkar kepala : 29 cm, lingkar dada : 28 cm, lingkar perut : 29 cm, LILA : 8 cm, rooting refleks belum ada, sucking refleks belum ada, dan refleks menelan belum ada.

3. Analisis intervensi keperawatan

Intervensi keperawatan yang disusun berdasarkan diagnosis yang ditegakkan merujuk pada buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia

yang terdiri dari observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Perencanaan keperawatan yang disusun berdasarkan kondisi pasien yang dialami untuk mengatasi masalah yang muncul pada pasien.

a. Diagnosis pola napas tidak efektif diberikan intervensi manajemen jalan napas

Intervensi keperawatan yang diberikan pada diagnosis keperawatan pola napas tidak efektif berdasarkan pada buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2018) yakni Manajemen Jalan Napas. Tujuan diberikannya intervensi tersebut adalah diharapkan pola napas membaik berdasarkan pada buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2019) dengan kriteria hasil yakni dispnea cukup menurun dan frekuensi napas cukup membaik. Agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diberikan intervensi keperawatan berupa yakni *observasi* : 1) monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas, 2) monitor pola napas, 3) monitor saturasi oksigen. *Terapeutik* : 1) pertahankan kepatenan jalan napas, 2) posisikan *quarter prone*, 3) berikan oksigen, 4) berikan terapi musik *lullaby*.

Untuk mempertahankan kestabilan pernapasan pasien pada kasus ini diberikan intervensi keperawatan berupa terapi musik *lullaby*. Sebelum diberikan terapi musik, bayi diposisikan dengan posisi *quarter prone*. Menurut Oktiawati *et al* (2023), pemberian posisi *quarter prone* berfungsi untuk menstabilkan frekuensi pernapasan dan meningkatkan saturasi oksigen pada bayi dengan masalah gangguan pernafasan. Pemberian terapi musik *lullaby* dengan posisi *quarter prone* dapat menurunkan frekuensi pernapasan, meningkatkan saturasi oksigen, dan menurunkan detak jantung sehingga memberikan kestabilan heodinamik bayi. Pada penelitian oleh Triana *et al* (2023) didapatkan bahwa terapi musik *lullaby* dapat menurunkan frekuensi napas dalam rentang normal. Terapi musik ini mempunyai struktur suara yang menenangkan, mempunyai irama yang konstan dan stabil

serta melodi yang tenang dan tidak mengejutkan yang dapat mempengaruhi irama gerakan jantung dan pernapasan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penurunan frekuensi pernapasan setelah diberikan terapi musik *lullaby* pada BBLR dengan masalah pernapasan. Selain itu, pemberian oksigen yakni ventilasi *non invasive* salah satunya adalah CPAP telah menjadi standar pengobatan pada bayi dengan masalah pernapasan. Bayi dengan masalah pernapasan atau RDN diberikan alat bantu napas untuk meminimalkan resistensi jalan napas dan kerja pernapasan serta mengurangi penggunaan otot bantu pernapasan (Musfirah *et al.*, 2022).

b. Diagnosis termoregulasi tidak efektif diberikan intervensi regulasi temperatur

Intervensi keperawatan yang diberikan pada diagnosis keperawatan termoregulasi tidak efektif berdasarkan pada buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2018) yakni regulasi temperatur. Tujuan diberikannya intervensi tersebut adalah diharapkan termoregulasi membaik berdasarkan pada buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2019) dengan kriteria hasil yakni takipnea cukup menurun dan suhu tubuh cukup membaik. Agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diberikan intervensi keperawatan berupa yakni *observasi* : 1) monitor suhu bayi sampai stabil ($36,5^{\circ}\text{C} - 37,5^{\circ}\text{C}$), 2) monitor warna dan suhu kulit, 3) monitor frekuensi pernapasan dan nadi. *Terapeutik* : 1) tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat, 2) sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien.

Pada kasus ini, untuk menjaga kestabilan suhu tubuh bayi agar tidak mengalami hipotermia atau kehilangan panas, bayi ditempatkan dalam *infant warmer*. *Infant warmer* adalah suatu alat elektromedik yang digunakan untuk memberikan kenyamanan dan kehangatan pada bayi yang baru dilahirkan, dimana bayi tersebut membutuhkan suhu yang sesuai dengan rahim ibu yaitu antara $34^{\circ}\text{C} - 37^{\circ}\text{C}$, ini dimaksud

agar suhu tubuh bayi dapat disesuaikan dengan lingkungannya (Hidayati *et al.*, 2020).

c. Diagnosis defisit nutrisi diberikan intervensi manajemen nutrisi parenteral

Intervensi keperawatan yang diberikan pada diagnosis keperawatan defisit nutrisi berdasarkan pada buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2018) yakni manajemen nutrisi parenteral. Tujuan diberikannya intervensi tersebut adalah diharapkan berat badan cukup membaik berdasarkan pada buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2019). Agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diberikan intervensi keperawatan berupa yakni *observasi* : 1) monitor kepatenan akses intravena, 2) monitor asupan nutrisi. *Terapeutik* : 1) berikan nutrisi parenteral sesuai indikasi, 2) gunakan infusion pump, 3) berikan nutrisi selain nutrisi parenteral.

Pemenuhan kebutuhan nutrisi pada bayi dengan BBLR perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi dalam jangka panjang. Penatalaksanaan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dapat dilakukan dengan pemberian nutrisi parenteral maupun enteral atau kombinasi dengan keduanya. Nutrisi parenteral merupakan cara pemberian nutrisi dan energi secara intravena yang bertujuan untuk memberikan kecukupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang diperlukan untuk metabolisme dan pertumbuhan bayi baru lahir yang mempunyai problem klinik yang berat, di mana belum/tidak memungkinkan untuk diberikan nutrisi enteral. Selain pemberian nutrisi secara parenteral bayi juga diberikan nutrisi secara enteral untuk menyokong pertumbuhan ekstrauterin tanpa menyebabkan efek yang merugikan terhadap pertumbuhan dan fungsi sistem organnya (Panuluh, 2020).

4. Analisis implementasi keperawatan

Implementasi keperawatan pada By. Ny. E dilakukan selama 3 hari dimulai pada tanggal 22 – 24 Juni 2023 di ruang perawatan *Neonatal*

Intensive Care Unit (NICU) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi keperawatan yang telah disusun berdasarkan buku SIKI dan SLKI. Sebelum memberikan implementasi pada By. Ny. E peneliti melakukan *informed consent* dengan orang tua bayi, kemudian sebelum bertemu dengan bayi tidak lupa untuk melakukan *hand hygiene* untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial pada bayi.

Pada hari pertama untuk diagnosis pola napas tidak efektif tampak pernapasan bayi 66 x/menit, napas cepat, dan terdapat retraksi dinding dada. Tampak pola napas bayi cepat (takipnea) dengan saturasi oksigen 97%. Bayi dilakukan pembersihan jalan napas dan memperbaiki posisi CPAP FiO₂ 30% flow 8 L/m Peep 6 cmH₂O. Kemudian bayi diberikan posisi *quarter prone* dan bayi tampak nyaman. Selain itu bayi diberikan terapi musik *lullaby* selama 30 menit. Sebelum diberikan terapi musik pernapasan bayi 65 x/menit dan setelah diberikan terapi musik pernapasan bayi menjadi 59 x/menit.

Pada hari kedua, pernapasan bayi cepat dengan saturasi oksigen 97% dan masih terdapat retraksi dinding dada. Dilakukan pembersihan jalan napas dan memperbaiki posisi CPAP CPAP FiO₂ 25% flow 8 L/m Peep 6 cmH₂O. Kemudian bayi diberikan posisi *quarter prone* dan bayi tampak nyaman. Pernapasan bayi sebelum diberikan intervensi musik *lullaby* yakni 58 x/menit dan setelah diberikan terapi musik *lullaby* selama 30 menit pernapasan bayi menjadi 59 x/menit.

Pada hari ketiga, bayi terpasang nasal kanul 8 L/menit dengan saturasi oksigen 98%. Bayi diberikan posisi *quarter prone* dan bayi tampak nyaman. Pernapasan bayi sebelum diberikan intervensi musik *lullaby* yakni 43 x/menit dan setelah diberikan terapi musik *lullaby* selama 30 menit pernapasan bayi menjadi 38 x/menit.

Diagnosis kedua yakni termoregulasi tidak efektif pada hari pertama dilakukan monitor suhu tubuh bayi, monitor warna dan suhu kulit yakni pertama S : 37,2 °C dengan N : 167 x/menit, kemudian S : 37,0 °C dengan

N : 164 x/menit, selanjutnya S : 37,1 °C dengan N : 161 x/menit, kulit teraba hangat dan tampak warna merah muda. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat yakni memberikan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,8 cc/jam dan menyesuaikan suhu lingkungan *infant warmer* yakni 34,2 °C.

Pada implementasi hari kedua dilakukan pemantauan suhu bayi yakni pertama S : 37,0 °C dengan N : 152 x/menit, kemudian S : 37,3 °C dengan N : 155 x/menit, selanjutnya S : 37,2 °C dengan N : 151 x/menit. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat dengan pemberian cairan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam dan menyesuaikan suhu lingkungan *infant warmer* yakni 34,2 °C.

Pada implementasi hari ketiga dilakukan pemantauan suhu bayi yakni pertama S : 37,1 °C dengan N : 149 x/menit, kemudian S : 37,2 °C dengan N : 143 x/menit, selanjutnya S : 37,0 °C dengan N : 145 x/menit. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat dengan pemberian cairan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam. Tampak warna kulit merah muda dan teraba hangat.

Untuk diagnosis ketiga yakni defisit nutrisi pada hari pertama dilakukan monitor kepatenan akses intravena, tampak akses vena paten. Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,8 cc/jam menggunakan infusion pump, kemudian bayi diberikan susu formula 30 cc/3 jam. Pada implementasi hari kedua, dilakukan monitor kepatenan akses intravena, tampak akses vena paten. Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam menggunakan infusion pump, kemudian bayi diberikan susu formula 30 cc/3 jam. Pada hari ketiga, bayi dilakukan monitor kepatenan akses intravena, tampak akses vena paten. Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,8 cc/jam menggunakan infusion pump, kemudian bayi diberikan susu formula 30 cc/3 jam.

5. Analisis evaluasi keperawatan

Evaluasi keperawatan adalah suatu proses sistematis dan terencana yang dilakukan pada akhir tahap perawatan untuk membandingkan hasil

kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah tindakan keperawatan yang telah dilakukan efektif dalam meningkatkan kondisi kesehatan pasien atau perlu dilakukan pendekatan lain. Evaluasi keperawatan dilakukan dengan dua tahap yakni tahap pertama evaluasi formatif dimana dilakukan ketika memberikan tindakan perawatan pada pasien dengan melihat respon pasien. Tahap kedua adalah evaluasi sumatif dimana dilakukan setelah pasien menjalani serangkaian tindak keperawatan (Mustamu *et al.*, 2023).

a. Evaluasi formatif

Pada diagnosis pola napas tidak efektif diawal pengkajian diperoleh data pasien sesak, terdapat retraksi dinding dada dan pernapasan 66 x/menit, saturasi 97%. Setelah implementasi hari pertama, pernapasan menurun menjadi 62 x/menit, SPO₂ : 96%, masih terdapat retraksi dinding dada, dan terpasang CPAP FiO₂ 30% flow 8 L/m Peep 6 cmH₂O, sehingga intervensi dilanjutkan. Evaluasi hari kedua setelah pemberian implementasi pernapasan 54 x/menit, pola napas cepat, masih terdapat retraksi dinding dada dan masih terpasang CPAP FiO₂ 25% flow 8 L/m Peep 6 cmH₂O, intervensi masih dilanjutkan. Evaluasi hari ketiga diperoleh pernapasan 45 x/menit dengan SPO₂ : 99%, retraksi dinding dada berkurang, terpasang nasal kanul 8 L/menit. Terdapat kestabilan pada pola napas bayi sehingga intervensi masih perlu dipertahankan untuk dimplementasikan agar bayi bisa bernapas dengan baik.

Pada diagnosis termoregulasi tidak efektif diawal pengkajian didapatkan hasil S: 37,1°C, kulit warna merah muda dan teraba hangat. Setelah dilakukan implementasi hari pertama suhu *infant warmer* diatur menjadi 34,2 °C suhu bayi menjadi 37,1°C, suhu kulit masih teraba hangat, sehingga intervensi masih dilanjutkan. Pada hari kedua suhu *infant warmer* tetap 34,2°C, suhu bayi masih 37,1°C, kulit warna merah muda dan teraba hangat, intervensi tetap dilanjutkan untuk mempertahankan suhu bayi. Pada implementasi hari ketiga suhu *infant*

warmer tetap 34,2 °C, kulit warna merah muda dan teraba hangat, suhu 37,3 °C.

b. Evaluasi sumatif

Implementasi keperawatan yang diberikan pada By. Ny. E diberikan selama 3 hari dimulai dari tanggal 22 - 24 Juni 2023 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun dengan diagnosis pola napas tidak efektif, termoregulasi tidak efektif, dan defisit nutrisi. Dari 3 diagnosis tersebut belum teratasi dan masih memerlukan pemantauan. Pada diagnosis pola napas tidak efektif, setelah diberikan implementasi terapi musik *lullaby* menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, walaupun bayi masih membutuhkan bantuan alat pernapasan berupa nasal kanul, namun pernapasan bayi menjadi lebih stabil. Untuk diagnosis termoregulasi tidak efektif belum teratasi dan masih perlu dilanjutkan untuk mempertahankan suhu bayi tetap normal, sehingga perawatan di *infant warmer* masih dilanjutkan. Pada diagnosis defisit nutrisi menunjukkan perubahan berat badan pada bayi namun belum mencapai berat badan normal sehingga intervensi masih perlu dilanjutkan.

B. Analisis Intervensi EBPN

Dalam kasus ini masalah pola napas tidak efektif merupakan masalah utama yang dialami pasien, tindakan utama yang diberikan adalah pemberian oksigen untuk menunjang kelangsungan hidup bayi. Pemberian terapi oksigen yang dilakukan adalah menggunakan Ventilator *Continuous Positive Airway Pressure* (CPAP). Penggunaan CPAP ini dapat meningkatkan kepatenan paru-paru serta memberi kestabilan pada dinding dada, mengurangi resistensi pada saluran pernapasan, fungsi diafragma meningkat, mempertahankan persendian surfaktan, mencegah atelataksis dan menurunkan risiko terjadinya dysplasia bronkopulmonalis (Kuswati, 2021).

Selain pemberian terapi oksigen, pemberian *intervensi Eviden Based Practice in Nursing* (EBPN) pada masalah keperawatan utama yaitu pola napas tidak efektif adalah dengan melakukan terapi musik *lullaby*. Musik

lullaby merupakan musik pengantar tidur yang mempunyai struktur suara yang menenangkan, mempunyai irama yang konstan dan stabil serta melodi yang tenang dan tidak mengejutkan yang dapat mempengaruhi irama gerakan jantung dan pernapasan. Hal ini diungkapkan oleh Azmi *et al* (2017) bahwa adanya pengaruh pemberian terapi musik *lullaby* pada saturasi oksigen, frekuensi denyut jantung dan frekuensi pernapasan pada neonatus yang menggunakan ventilasi mekanik. Mendengarkan musik dapat meningkatkan relaksasi, mengurangi persepsi terhadap nyeri dan memberikan stimulasi suara yang akan mempengaruhi fungsi fisiologis. Musik dapat mempengaruhi sistem saraf otonom dan merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi hormon endorphine dan serotonin. Hormon endorphine dan serotonin dapat memberikan perasaan tenang dan berperan dalam menurunkan rasa nyeri, sehingga membuat rasa tenang.

Untuk masalah pola napas tidak efektif pada kasus ini diberikan terapi musik *lullaby* untuk menstabilkan frekuensi napas pada bayi. Pemberian terapi ini diberikan selama 3 hari dengan durasi 30 menit menggunakan *Brahm lullaby* yang menunjukkan adanya perubahan pada frekuensi pernapasan By. Ny. E menjadi lebih baik dan stabil. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti *et al* (2023) bahwa penerapan musik *lullaby* dapat membuat pernapasan bayi BBLR menjadi stabil yaitu dari pernapasan takypnea menjadi normal dan terapi ini lebih efektif digunakan sebagai terapi non farmakologis untuk menurunkan frekuensi pernapasan sehingga BBLR dengan riwayat gangguan pernapasan dapat teratasi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Triana *et al* (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan terapi musik *lullaby* dilakukan selama 3 hari dengan frekuensi selama 30 menit dalam sehari, pada bayi premature terjadi penurunan frekuensi nafas, nafas dalam batas normal dan bayi tampak lebih tenang dan rileks. Sebelum diberikan terapi musik *lullaby* di hari ke-1 sampai hari ke-3 respiration rate pada kedua pasien terdapat perbedaan yang signifikan. Sesudah pemberian terapi musik *lullaby* dari hari ke-1 sampai hari ke-3 respiration rate pada kedua pasien mengalami penurunan. Hasil

penurunan didapatkan rata rata sebelum dan sesudah dilakukan terapi musik *lullaby* selama 3 hari berturut turut dengan frekuensi 30 menit dalam sehari *respiration rate* pada kedua responden dalam batas normal. Penerapan terapi musik *lullaby* dapat dijadikan terapi non-farmakologis *Respiration* atau intervensi pada bayi prematur yang berada di NICU.

Menurut peneliti, terapi musik *lullaby* sangat baik dan bermanfaat pada bayi. Dari hasil beberapa penelitian membuktikan bahwa pemberian terapi musik *lullaby* sangat efektif terhadap status hemodinamika pada bayi dengan BBLR. Terapi ini dapat dapat menurunkan frekuensi napas, menurunkan frekuensi, jantung dan meningkatkan saturasi oksigen. Selain itu, terapi ini dapat memberikan ketenangan pada bayi, sehingga bayi dengan disstres pernapasan dapat mengurangi kebutuhan terhadap oksigen. Pada penelitian lain juga pemberian terapi musik *lullaby* mampu menstabilkan suhu tubuh bayi BBLR dan membuat bayi menjadi lebih nyaman.

Janin yang berada dalam kandungan sudah dapat mendengarkan atau merasakan suara yang menenangkan yang didengar oleh bayi prematur dari aliran darah saat didalam rahim dan suara detak jantung ibu secara terus menerus. Perkembangan pendengaran janin sudah berfungsi penuh pada usia kehamilan 28-32 minggu, sehingga pada awal usia gestasi 32 minggu janin sudah dapat mendengar suara ibu berbicara atau menyanyi untuk dirinya sendiri dan janin. Selain itu janin dapat menanggapi suara-suara yang ada terutama yang terkait dengan nada dan irama atau suara musik. Musik memiliki irama yang dapat memengaruhi irama gerakan denyut jantung dan pernafasan manusia. Jika suara musik yang diterima adalah suara yang menenangkan dan teratur secara berulang-ulang, maka suara musik akan memberikan impuls pada hipotalamus untuk merespon kelenjar medula adrenal untuk menekan pengeluaran hormon epinefrin dan nor-epinefrin atau pelepasan katekolamin ke dalam pembuluh darah menjadi berkurang. Akibatnya konsentrasi katekolamin dalam plasma menjadi rendah, sehingga denyut jantung menurun dan konsumsi oksigen berkurang, yang akhirnya

menjadikan frekuensi pernafasan menjadi lambat (Antonilda Ina & Sofiana Itary Edison, 2018).

Dalam penelitian ini pemberian terapi musik *lullaby* selama 3 hari dengan durasi 30 menit menggunakan musik *Brahm lullaby* menunjukkan nilai signifikan dalam menstabilkan frekuensi pernafasan pada bayi. Pernafasan By. Ny. E awalnya 66 x/menit berada di atas normal dan setelah diberikan terapi selama 3 hari, pernafasan By. Ny. E menjadi 45 x/menit yang menunjukkan pernafasan bayi menjadi stabil dan normal. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Musik mempengaruhi sistem saraf otonom dan merangsang kelenjar hipofisis untuk mengasikkan hormon endorfin dan serotonin. Kedua hormon ini dapat memberikan perasaan tenang dan berperan dalam penurunan nyeri, sehingga membuat nyaman. Kondisi yang tenang membuat bayi dapat beristirahat dan menyimpan energinya serta menggunakan oksigen secara minimal. Hal ini membuat frekuensi pernafasan dan denyut jantung bayi menjadi stabil.

Dari hasil pembahasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa terapi musik *lullaby* berpengaruh pada frekuensi pernafasan pada bayi BBLR sehingga terapi ini dapat dijadikan sebagai terapi alternatif atau terapi komplementer dalam memberikan asuhan keperawatan pada bayi di ruang perawatan NICU. Intervensi ini dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk melaksanakan asuhan keperawatan, namun pada pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi status kesehatan bayi.

Nabi Muhammad saw. bersabda dalam riwayat Imam Muslim :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ
دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath-Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari

Jabir dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'Azza wa Jalla." (Imam Muslim)

Dalam hadis di atas dapat dipahami, bahwa Hadits di atas mengisyaratkan diizinkan seseorang Muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah SWT penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembumbuhan kadang terjadi dalam waktu yang agak lama, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan (Rahayu, 2021).

Namun satu hal yang perlu dipahami oleh umat Islam bahwa Allah swt. menurunkan penyakit bersama dengan obatnya tinggal bagaimana manusia itu sendiri yang berikhtiar kepada Allah untuk senantiasa memohon akan pertolongan Allah swt. itu sendiri. Setiap manusia pasti memiliki masalah kemudian Allah swt. senantiasa memberikan jalan bagi hambanya yang mengalami kesulitan dan ia tahu bahwa hambanya dapat melalui masalah tersebut.

Pada QS. Al-Baqarah awal ayat 286, Allah swt. berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahannya:


“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012)

Menurut Tafsir Quraish Shihab bahwa ayat ini menjelaskan Allah tidak membebani hamba-hamba-Nya kecuali dengan sesuatu yang dapat dilaksanakan. Adapun dalam kitab Tafsir Jalalayn bahwa ayat ini menjelaskan Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya), artinya sekadar kesanggupannya (TafsirQ.com, 2015).

C. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pemberian terapi musik *lullaby* ini hanya pada saat jadwal praktik peneliti sesuai shift sehingga tidak

ada monitoring lanjutan setelah shift peneliti selesai. Selain itu, perlunya memperhatikan suasana lingkungan dari kebisingan sebelum memberikan terapi musik *lullaby* agar terapi ini dapat diberikan secara maksimal.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengkajian yang dilakukan pada By. Ny. E didapatkan data bahwa bayi dengan BBLR mengalami pola napas tidak efektif. Data pengkajian yang diperoleh pada bayi yakni bayi tampak sesak, lemah, terdapat retraksi dinding dada, bunyi napas bronkovesikuler, pernapasan cepat 65 x/menit, nadi : 159 x/menit. Terjadi ketidakefektifan pola napas pada bayi diakibatkan karena kondisi berat badan lahir bayi kurang dari 2.500 gr yakni 2.015 gram dan bayi lahir diusia gestasi 36 minggu sehingga fungsi organ paru-paru bayi belum sempurna.
2. Diagnosis keperawatan utama yang ditemui pada kasus By. Ny. E adalah dengan masalah BBLR mengalami pola napas tidak efektif.
3. Dalam kasus ini, penyusunan intervensi keperawatan disesuaikan dengan kondisi yang dialami bayi yang diperoleh dari hasil pengkajian. Intervensi EBPN dalam kasus ini adalah pemberian terapi musik *lullaby* pada bayi BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif.
4. Tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan intervensi keperawatan yang disusun. Implementasi keperawatan dilakukan selama 3 hari dengan memberikan terapi musik *lullaby* selama 30 menit menggunakan *Brahm lullaby*.
5. Implementasi keperawatan yang diberikan pada By. Ny. E dilakukan selama 3 hari dimulai tanggal 22 – 24 Juni 2023 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun pada diagnosis utama menunjukkan adanya perubahan kearah yang lebih baik, meskipun bayi masih menggunakan alat bantu pernapasan, namun pernapasan bayi menjadi lebih stabil.
6. Setelah dilakukan pemberian intervensi terapi musik *lullaby* pada By. Ny. E dengan masalah BBLR yang mengalami pola napas tidak efektif menunjukkan adanya perubahan pada frekuensi napas By. Ny. E menjadi lebih stabil. Pernapasan bayi awalnya 66 x/menit setelah diberikan terapi musik *lullaby* menjadi normal yakni pernapasan 45 x/menit. Maka dapat

disimpulkan bahwa terapi musik *lullaby* berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan bayi dengan berat bayi lahir rendah yang mengalami masalah pola napas tidak efektif.

B. Saran

1. Bagi Profesi Keperawatan

Karya tulis ini dapat digunakan sebagai sumber bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, khususnya saat menggunakan terapi komplementer.

2. Bayi Pelayanan Rumah Sakit

Karya tulis ini dapat membantu pihak rumah sakit terutama dalam bidang keperawatan pada perawat NICU dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami masalah BBLR dengan pola napas tidak efektif.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Penulisan ini diharapkan menjadi bahan referensi pendukung dalam mengembangkan teori mengenai proses pelaksanaan asuhan keperawatan pada bayi yang dirawat di NICU.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Revinel, Aritonang, J., Pratama, R. M. K., Nurita, S. R., & Nengsih. (2023). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Bayi dan Balita S1 Kebidanan* (Agustina, Ed.; Tim MCU Group). Mahakarya Citra Utama.
- Ahsan, & Dewi, E. S. (2021). *Knowledge Management & Penerapannya pada Asuhan Keperawatan Pencegahan Infeksi Nosokomial*. Tidar Media.
- Anil K. C, Basel, P. L., & Singh, S. (2020). Low birth weight and its associated risk factors: Health facility-based case-control study. In *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234907>.
- Anjani, P., Murniati, M., & Suryani, R. L. (2022). *Manajemen Jalan Napas Untuk Mengatasi Masalah Ketidakefektifan Pola Napas Pada Pasien BBLR Di Ruang Soka RSUD Majenang*. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6), 634–641. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.287>
- Annisa, R., & Mentari, F. T. (2021). *Penerapan Terapi Sentuhan Dan Musik Lullaby Terhadap Peningkatan Suhu Tubuh Pada Bayi Prematur*. *Masker Medika*, 9(1), 416–432. <https://doi.org/10.52523/maskermedika.v9i1.454>
- Antonilda Ina, A., & Sofiana Itary Edison, M. (2018). *Pengaruh Pemberian Terapi Musik Lullaby Terhadap Saturasi Oksigen Pada Bayi Prematur*. *Riset Media Keperawatan*, 1(2), 17–23.
- Azmi, L., Fatimah, S., Emaliyawati, E., & Keperawatan, F. (2017). *Pengaruh Terapi Musik Lullaby terhadap Heart Rate, Respiration Rate, Saturasi Oksigen pada Bayi Prematur*. In *JKP* (Vol. 5).
- Dwi Kartiningsih, T., Peristiowati, Y., & Prasetyo, J. (2023). *Keterlibatan Keluarga Pasien Dalam Perawatan Bayi Dengan Respiratory Distress Of Newborn Yang Menjalani Perawatan Intensive Di Ruang Nicu Rsud Dr. R. Koesma Tuban*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*, 2. <https://journal-mandiracendikia.com/jikmc>
- Fitriani, W. N., & Harahap, N. (2023). *Analisis Faktor Maternal dan Kualitas Pelayanan Antenatal dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(04), 304–311. <https://doi.org/10.33221/jikm.v12i04.2254>
- Herdiawanto, H., & Hamdayama, J. (2021). *Dasar-Dasar Penelitian Sosial* (I. Fahmi, Miya, & Rendy, Eds.). Kencana.
- Hidayat, A. A. (2021). *Analisis Diagnosis Keperawatan dengan Sistem Pakar* (N. A. Aziz & E. Mazayudha, Eds.). Health Books Publishing.

- Hidayati, N., Puspitasari, Y., & Anggraeni, S. (2020). *Perbandingan Inisiasi Menyusui Dini Dan Infant Warmer Pada Persalinan Spontan Terhadap Suhu Tubuh Bayi Baru Lahir di RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri*. Journal Of Midwifery.
- Kemendes RI. (2021). *Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGU) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Khamidah, M. (2022). *Asuhan Keperawatan Anak dengan Masalah Keperawatan Pola Nafas Tidak Efektif Pada Diagnosa Medis Respiratory Distress Syndrome (Rds) Di Ruang Neonatal Intensive Care Unit (Nicu) RSUD Ra Basoeni Mojokerto*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Sehat PPNI.
- Kurniawan, H. (2021). *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian* (R. Gunadi, Z. A. Sari, & T. S. Putri, Eds.). Penerbit Deepublish.
- Kusuma, D. C. R., Sunarti, A., Susilawati, S., Kartikasari, M. N. D., Rismayana, Kiftiyah, Sultina, Marbun, M., & Elfina. (2022). *Pengantar Kebidanan Komunitas* (Oktavianis & R. M. Sahara, Eds.). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Kusumaningsih, F. S., Saidah, Q., Riyantini, Y., Devi, N. L. P. S., Rasmita, D., Noviana, U., Fabanjo, I. J., Nuryanti, Y., Puspita, L. M., Indriati, G., Rahmawati, I., Suryati, & Purwati, N. H. (2023). *Asuhan Keperawatan Anak Dengan Kelainan Kongenital Dan Bayi Risiko Tinggi* (P. I. Daryaswanti, Efitra, & Y. Agusdi, Eds.). PT. Sonpedia.
- Kuswati, R. (2021). *Efektivitas Penggunaan Continuous Positive Airway Pressure (Cpap) Pada Bayi Baru Lahir Kurang Bulan Dengan Respiratory Distress Syndrome (Rds) Di Rsu Al Islam H.M Mawardi Sidoarjo*. Stikes Majapahit.
- Manik, R., Amarta, T. A. S., Imelda, Tirtawati, G. A., Murdayah, Rahyuning, R. T., Murtiyarini, I., Fithriani, Marisi, R. E. M., Lontaan, A., Danaz, A. F., Hapsari, V. D., & Fadmiyanor, I. (2023). *Bunga Rampai Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal* (Rahmawati & Saida, Eds.). PT Media Pustaka Indo.
- Mariska, S. R. (2022). *Asuhan Keperawatan pada Bayi Berat Lahir Rendah dengan Masalah Keperawatan Resiko Termoregulasi Tidak Efektif*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Musfirah, Latinapa, R. Z., Erika, K. A., & Kadir, A. (2022). *Respiratory Distress of Newborn dengan Pemantauan Respirasi dan Alih Baring untuk*

Mengatasi Hiperbilirubinemia di Ruang Neonatal Intensive Care Unit: Studi Kasus. Journal of Bionursing, 4, No. 3, 181–185.

- Mustamu, A. C., Fabanyo, R. A., Mobalen, O., & Djamanmona, R. F. (2023). *Buku Ajar Metodologi Keperawatan* (M. Nasrudin & G. Riskiawan, Eds.). PT Nasya Expanding Management.
- Nurhasanah, D. (2020). *Pengaruh Terapi Musik Lullaby Terhadap Peningkatan Berat Badan dan Kestabilan Respirasi Pada Bayi Prematur Di Ruang Neonatal Intensive Care Unit : Literature Review.*
- Nurlaila, & Riyanti, E. (2019). *Buku Panduan Perawatan Metode Kangguru* (Dita & Anwar, Eds.). Leutikaprio.
- Panuluh, S. M. (2020). *Studi Literatur : Asuhan Keperawatan Pada Bblr Dengan Masalah Pemenuhan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh.* Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Definisi dan Tindakan Keperawatan.* Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI, T. P. S. D. (2016). *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI, T. P. S. D. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Prastiwi, D., Sholihat, S., Wulan, I. P., Astuti, N. M., Anies, N. F., Antari, G. A. A., Suryati, Zentrato, M. L. V., Febrianti, T., Djuwitaningsih, S., & Ulfa, M. (2023). *Metodologi Keperawatan* (Efitra, I. K. Sari, & Y. Agusdi, Eds.). PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021. (2022). *Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021.*
- Rahayu, K. M. (2021, May 20). *Jenis Obat Dalam Al-Qur'an Dan Hadist.* Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Romadlon, S. (2019). *Penciptaan Kematian Dan Kehidupan Dalam Tafsir Sufi Ruh Al-Ma'ani Karya Al-Alusi (Studi Analisis Surat Al-Mulk Ayat 2).* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Rufaindah, E., Muzayyana, Sulistyawati, E., Hasnita, Y., Sari, N. A. M. E., Citrawati, N. K., Yanti, N. L. G. P., Mustikawati, N., Patemah, Mariyam, Meiriza, W., Wulandari, I. S., Badi'ah, A., Oviana, A., Rahayu, S., & Mayasari, D. (2022). *Tatalaksana Bayi Baru Lahir* (M. Martini, R. Birrang, & M. Aprikasari, Eds.). Media Sains Indonesia.

- Sahroji, M. I. (2017, November 6). *Keislaman: Doa Saat Menjenguk Bayi yang Baru Lahir*. NuOnline.
- S.A.M, R., Rustina, Y., & Syahreni, E. (2013). *Memperbaiki Saturasi Oksigen, Frekuensi Denyut Jantung, dan Pernafasan Neonatus yang Menggunakan Ventilasi Mekanik Dengan Terapi Musik*. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 16(3), 154–160. <https://doi.org/10.7454/jki.v16i3.324>
- Santoso, H. (2021). *Asuhan Keperawatan Pada Bayi Ny. Mn. Bblr Dengan Hipotermi Dengan Penerapan Perawatan Metode Kanguru*. Universitas Aufa Royhan.
- Saputra, M. K. F., Herniyatun, Fadila, E., Haerianti, M., Suryani, M., Rakinaung, N. E., Achmad, V. S., Yuwanto, M. A., & Arafah, S. (2023). *Metodologi Keperawatan* (N. Sulung, M. Sari, & T. P. Wahyuni, Eds.).
- Sari, M. T., Monalisa, Handayani, G. L., Halimah, Pesak, E., Armina, Ponidjan, T. S., Nuryanti, E., Dewi, V., Sambo, M., Triana, W., Madu, Y. G., Eliezer, B., Suryaningsih, C., Ekawaty, F., Mangun, M., & Sarimin, D. S. (2023). *Bunga Rampai Keperawatan Anak* (W. S. Hajri & Y. E. Burhanuddin, Eds.). PT Media Pustaka Indo.
- Setyowati, A., & Baroroh, I. (2023). *Buku Ajar Kegawatdaruratan Maternal Neonatal* (G. Riskiawan, Ed.). PT Nasya Expanding Management.
- Sriyanah, N., & Efendi, S. (2023). *Buku Ajar Keperawatan Anak* (Z. Hanum, R. Wijayanti, & D. Hardini, Eds.). Omera Pustaka.
- Syamsuri, S. (2018). *Hakikat Kematian Pada Manusia Perspektif Fakh Al-Din Al-Razi Dalam Kitab Mafatih Al-Ghaib*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- TafsirQ.com. (2015). Surat Al-Baqarah Ayat 286. In *TafsirQ.com*. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-286#tafsir-jalalayn>
- Triana, H., Utami, N., & Sari, I. M. (2023). *Penerapan Terapi Musik Lullaby Respiration Rate Pada Bayi Prematur Di Ruang Perinatologi Rsud Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen*. *Jurnal Imliah Ilmu Kesehatan*, 1(3).
- Unicef. (2019). *Neonatal Mortality*. <https://Data.Unicef.Org/Topic/Child-Survival/Neonatal-Mortality/>.
- Utami, R., Ugrasena, I. D. G., Ernawati, & Arief, Y. S. (2022). *Kesiapan Kepulangan Bayi Berat Lahir Rendah (Bagi Keluarga)* (R. Wahyudi, B. Firmansyah, & O. Imtihana, Eds.). Airlangga University Press.

- Widianti, E., & Fitriahadi, E. (2023). *Anemia Pada Ibu Hamil Sebagai Faktor Risiko Kejadian BBLR*. Indonesian Journal of Professional Nursing, 4(1), 6. <https://doi.org/10.30587/ijpn.v4i1.5617>
- Widiyono, Aryani, A., Putra, F. A., Herawati, V. D., Indiyati, Suwarni, A., Sutrisno, Hermawati, E., & Azmi, L. F. D. (2023). *Buku Mata Ajar Konsep Dasar Metodologi Penelitian Keperawatan* (Widiyono, Ed.; 1st ed.). Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Yanti, P. A., Dewi Noorratri, E., & Utami, N. (2023). *Penerapan Terapi Musik Terhadap Respirasi Bayi Berat Badan Lahir Rendah Selama Kangaroo Mother Care Di Ruang Perinatalogi Rsud Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen*. Jurnal Ilmu Kesehatan. <https://journal-mandiracendikia.com/jikmc>
- Zulfiani Latinapa, R., Ayu Erika, K., Kadir, A., Profesi Ners Fakultas Keperawatan, M., Hasanuddin, U., Fakultas Keperawatan, D., & NICU RSUP Wahidin Sudirohusodo, P. (2022). *Respiratory Distress of Newborn dengan Pemantauan Respirasi dan Alih Baring untuk Mengatasi Hiperbilirubinemia di Ruang Neonatal Intensive Care Unit: Studi Kasus*. Journal of Bionursing, 4(3), 181–185.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1 : Jurnal Utama dan Pendukung

Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Vol.1, No.3 Juni, 2023

PENERAPAN TERAPI MUSIK LULLABY RESPIRATION RATE PADA BAYI PREMATUR DI RUANG PERINATOLOGI RSUD Dr. SOEHADI PRIONEGORO SRAGEN

Heni Triana¹, Neny Utami¹, Irma Mustika Sari²
^{1,3} Universitas 'Aisyiyah Surakarta, Indonesia
 e-mail: henitriana52329@gmail.com

Abstrak

Kelahiran bayi prematur masih menjadi masalah kesehatan bayi di Indonesia maupun diberbagai negara karena kelahiran bayi prematur menyumbang 60% penyebab kematian neonatus. Masalah yang terjadi terkait dengan kelahiran bayi prematur yang terjadi sebelum usia gestasi 37 minggu dan biasanya diikuti dengan berat badan kurang dari 2500 gram pada saat lahir. Perawatan bayi prematur yang dapat dilakukan dengan memberikan terapi musik. Penerapan ini bertujuan untuk mengetahui hasil implementasi pemberian terapi musik Lullaby terhadap Respiration rate pada bayi premature di RSUD dr. Soehadi Prionegoro Sragen. penerapan dilakukan dengan metode deskriptif studi kasus kepada 2 responden yang mengalami gangguan pada respiration rate selama 3 hari berturut turut dengan frekuensi 1 kali dalam sehari selama 30 menit, berdasarkan hasil penerapan yang sudah dilakukan terdapat penurunan pada Respiration rate pada bayi premature sebelum dan sesudah diberikan terapi music Lullaby. Penerapan terapi musik Lullaby dapat dijadikan terapi non-farmakologis Respiration atau intervensi pada bayi prematur yang berada di NICU.

Kata kunci : Bayi Prematur, Respiration Rate, Musik Lullaby

Abstract

Preterm birth is still an infant health problem in Indonesia and in several countries because preterm birth accounts for 60% of the causes of neonatal mortality. Problems that occur are related to the birth of premature babies that occur before 37 weeks of gestation and are usually followed by a body weight of less than 2500 grams at birth. Premature infant care can be done by providing music therapy. This application aims to determine the results of the implementation of giving Lullaby music therapy to Respiration rate in premature babies at RSUD dr. Soehadi Prionegoro Sragen. The application was carried out with descriptive case study method to 2 respondents who experienced disturbances in respiration rate for 3 consecutive days with a frequency of 1 time a day for 30 minutes. Based on the results of the application that has been done there is a decrease in Respiration rate in premature babies before and after being given Lullaby music therapy. The application of Lullaby music therapy can be used as a non-pharmacological Respiration therapy or intervention in premature infants who are in the NICU.

Keywords: Premature Infants, Respiration Rate, Lullaby Music

PENDAHULUAN

Bayi prematur lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram. Bayi prematur memiliki risiko tinggi untuk gangguan perkembangan mulai dari tingkat ringan sampai dengan berat yang memiliki dampak terjadinya kecacatan. Sehingga ilmu dan teknologi yang dikembangkan saat ini tidak hanya untuk membuat bayi prematur dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya tetapi juga dapat mengejar ketertinggalan perkembangan akibat kelahiran prematurnya (Kristyaningsih dan Rahmawati, 2019).

Bayi prematur sering mengalami masalah yang berhubungan dengan komplikasi karena keadaan prematurnya yang berhubungan dengan anemia prematuritas, sindrom distress pernapasan, retinopati prematuritas, paten duktus arteriosus,

P-ISSN 2985-427X| E-ISSN 2965-4253 Hal. 149

JURNAL MASKER MEDIKA Volume 9, Nomor 1, Juni 2021
 e-ISSN : 2654-8658 p-ISSN : 2301-8631
<https://jmm.ikestmp.ac.id>
 10.52923/jmm.ikestmp.v9n1.454

PENERAPAN TERAPI SENTuhan DAN MUSIK LULLABY TERHADAP PENINGKATAN SUHU TUBUH PADA BAYI PREMATUR

Anissa Rahmania¹, Febi Try Mentari²

¹Dosen DIII Keperawatan IKesT Muhammadiyah Palembang
²Mahasiswa DIII Keperawatan IKesT Muhammadiyah Palembang

Korespondensi Email: 1

ABSTRAK

Pendahuluan: Bayi prematur adalah bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi kurang dari 37 minggu dan dengan berat badan yang rendah menyebabkan perawatan pada bayi prematur harus dilakukan dengan baik terutama menjaga kestabilan suhu dan frekuensi denyut jantung. Terapi sentuhan merupakan salah satu terapi nonfarmakologis yang dapat diberikan pada bayi prematur. Tujuan penelitian mengidentifikasi pengaruh terapi sentuhan terhadap suhu bayi prematur. **Metode:** Penelitian artikel penelitian beberapa database menggunakan kata kunci tertentu dalam periode tahun 2015-2020. Hasil penelusuran didapatkan 10 artikel menggunakan intervensi keperawatan, hanya 6 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis kritis terhadap 6 artikel dilakukan berdasarkan desain populasi, sampel, perlakuan, temuan dan kesimpulan. **Hasil dan Pembahasan:** Penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas penerapan terapi sentuhan dan musik lullaby dengan peningkatan suhu tubuh. **Kesimpulan:** Sehingga disarankan bagi para medis dan masyarakat untuk dapat memberikan asuhan terapi sentuhan dan musik untuk meningkatkan suhu tubuh pada bayi prematur sebagai terapi alternatif non-farmakologi.

Kata kunci: Musik, lullaby, prematur, vital signs dan Bayi prematur, sentuhan, suhu

APPLICATION OF TOUCH AND MUSIC THERAPY LULLABY TOWARDS INCREASED BODY TEMPERATURE IN PREMATURE INFANTS

ABSTRACT

Background: Premature babies are infants who are born with a gestation period of less than 37 weeks and with a low weight causing treatment in premature infants should be done well especially to maintain temperature stability and heart rate frequency. Touch therapy is one of the non-pharmacological therapies that can be administered to premature babies. The research objective is to identify the influence of touch therapy on premature infant temperatures. **Method:** Searching for research articles on multiple databases using certain keywords in the 2015-2020 time period, search results gained 10 articles using nursing interventions, only 6 articles that meet the inclusion criteria. Critical analysis of 6 articles based on population design, samples, treatment, findings and conclusions. **Results and discussion:** Research reveals that the effectiveness of the application of touch therapy and lullaby music with body temperature improvement. **Conclusion:** So it is advisable for medical and community to be able to provide touch therapy and music care to increase body temperature in premature infants as a non-pharmacological alternative therapy.

Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 15 No.3, November 2013, hal 154-160
 p-ISSN 1410-4491, e-ISSN 2354-9261

MEMPERBAIKI SATURASI OKSIGEN, FREKUENSI DENYUT JANTUNG, DAN PERNAFASAN NEONATUS YANG MENGGUNAKAN VENTILASI MEKANIK DENGAN TERAPI MUSIK

Rahmadewita S.A.M.^{1,2*}, Yeni Rustina¹, Elif Syahrem³

¹Ramah Sakit Umum Pasir De. M. Djamil Padang, Sumatera Barat 25993, Indonesia
²Program Studi Magister Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Depok 16224, Indonesia
³ Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, Depok 16224, Indonesia

* E-mail: rahmadewita@ubohs.com

Abstrak

Neonatus yang menggunakan ventilasi mekanik akibat gangguan pernapasan mengalami masalah oksigenisasi dan frekuensi denyut jantung. Berbagai upaya perlu dilakukan agar neonatus yang sedang lebatan oksigen dapat diminimalkan, salah satu upaya tersebut adalah terapi musik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi musik terhadap saturasi oksigen, frekuensi denyut jantung dan frekuensi pernafasan neonatus yang menggunakan ventilasi mekanik. Penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan pretest-posttest without control melibatkan 13 neonatus yang dipilih secara konsekutif. Intervensi yang diberikan adalah terapi musik dengan Beethoven's 1 Lullaby selama 30 menit dengan headphone. Pengumpulan data menggunakan observasi dan dianalisis dengan Paired t test. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan bermakna antara rerata saturasi oksigen, frekuensi denyut jantung dan frekuensi pernafasan sebelum dan setelah pemberian terapi musik. Pada saturasi oksigen terjadi penurunan, selanjutnya pada frekuensi denyut jantung dan pernapasan mengalami penurunan. Terapi musik juga digunakan sebagai pendamping strategi medis untuk memperbaiki oksigenisasi pada neonatus yang menggunakan ventilasi mekanik.

Kata Kunci: denyut jantung neonatus, pernapasan, saturasi oksigen, terapi musik, ventilasi mekanik

Abstract

Improving Oxygen Saturation, Heart Rate, and Respiratory Rate of Neonates Using Mechanical Ventilation with Music Therapy. Neonates using mechanical ventilation cause of respiratory disorder experience oxygenation and heart rate problems. Interventions should be made in order to calm neonates so that the need of oxygen can be minimized, one of these interventions is music therapy. This study aimed to identify the effect of music therapy on oxygen saturation, heart rate and respiratory rate of neonates using mechanical ventilation. This quasi-experiments study with a pretest-posttest design without control involved 13 neonates selected by consecutive sampling. Data collected through observation and analyzed by paired t test. There was a significant difference on the average of oxygen saturation, heart rate and respiratory rate of infants using mechanical ventilation before and after music therapy (p value <0.05). Music therapy can be used as a complementary medical therapies to improve oxygenation in neonates using mechanical ventilation.

Keywords: heart rate, mechanical ventilation, music therapy, neonate, oxygen saturation, respiratory rate

Pendahuluan

Gangguan pernafasan yang sangat serius pada bayi baru lahir atau neonatus berkontribusi pada tingginya morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan. Pada neonatus, gangguan pernafasan yang sering ditemukan adalah sindroma gawat nafas (respiratory distress syndrome). Gangguan ini terjadi pada saat kelahiran atau beberapa

jam setelah bayi lahir (Johnson, Flood & Spinks, 2002; Sweet et al., 2013; Speer, 2012).

Perawatan neonatus dengan sindroma gawat nafas memerlukan observasi yang cermat dan intensif karena perkembangan gambaran klinisnya yang terjadi dengan cepat (Sarasin, Handayani & Kusuma, 2003). Bayi yang usula nafasnya tidak sanggup mempertahankan nilai

JIK-MC Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia
 Volume 2, Nomor 8 Agustus 2023

PENERAPAN TERAPI MUSIK TERHADAP RESPIRASI BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH SELAMA KANGAROO MOTHER CARE DI RUANG PERINATOLOGI RSUD dr. SOEHADI PRIONEGORO SRAGEN

Puput Ari Yanti¹, Erika Dewi Nooratri², Neny Utami³

^{1,2} Profesi Ners, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 'Aisyiyah Surakarta
³ Ramah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soehadi Prionegoro Sragen
 Email: ariyanti.puput.10@gmail.com

ABSTRAK

BBLR mempunyai kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan ekstra urine akibat ketidakmatangan sistem organ tubuhnya seperti paru – paru, jantung, ginjal dan sistem pencernaan. Prevalensi BBLR di Indonesia sebanyak 6,2%. Kabupaten Sragen tahun 2021 sebanyak 6,1%. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan BBLR yaitu dengan terapi musik selama Kangaroo Mother Care (KMC). Tujuan: untuk mengetahui hasil frekuensi pernapasan saat penerapan terapi musik selama KMC di Ruang Perinatologi RSUD dr. Soehadi Prionegoro Sragen Metode: Jenis penelitian ini studi kasus yang menggunakan metode penelitian deskriptif pretest posttest design dan menggunakan pengukuran frekuensi pernapasan bayi. Hasil: hasil penerapan terhadap 2 responden yang dilakukan selama 3 hari dengan frekuensi 60 menit sehari menunjukkan ada pengaruh terapi musik selama KMC. Kesimpulan: Terdapat perbedaan hasil sebelum dan sesudah dilakukan intervensi terapi musik selama KMC yaitu dari pernapasan takyepa menjadi pernapasan normal.

Kata Kunci : BBLR, terapi music, KMC

ABSTRACT

LBW babies have difficulty adapting to extra-urine life due to the immaturity of their organ systems such as the lungs, heart, kidneys and digestive system. The prevalence of LBW in Indonesia is 6.2%. Sragen Regency in 2021 is 6.1%. One way to overcome the problem of LBW is with music therapy during Kangaroo Mother Care (KMC). Purpose: to find out the results of respiratory frequency when applying music therapy during KMC in the Perinatology Room at RSUD dr. Soehadi Prionegoro Sragen Method: This type of research is a case study using a descriptive research method pretest posttest design and using measurements of the baby's respiratory frequency. Results: the results of the application to 2 respondents which were carried out for 3 days with a frequency of 60 minutes a day showed that there was an effect of music therapy during KMC. Conclusion: There were differences in the results before and after the music therapy intervention during KMC, namely from tachypnea to normal breathing.

Keywords: LBW, music therap, KMC

Lampiran 2 : Dokumentasi



Lampiran 3 : Hasil Uji Turnitin

KTA NUR AZIZAH.docx

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	6%
2	eprints.umpo.ac.id Internet Source	3%
3	dspace.umkt.ac.id Internet Source	2%
4	repo.stikesicme-jbg.ac.id Internet Source	1%
5	repositori.widyagamahusada.ac.id Internet Source	1%
6	dwimahendrayanti.blogspot.com Internet Source	1%
7	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1%
8	anyflip.com Internet Source	1%
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%

10	journal-mandiracendikia.com Internet Source	1%
11	repository.poltekkesbengkulu.ac.id Internet Source	1%
12	media.neliti.com Internet Source	1%
13	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
14	Dewi Modjo, Muriyati Rokani, Stevanny Polontalo. "Pengaruh Perawatan Metode Kanguru terhadap Peningkatan Suhu Tubuh pada Bayi BBLR di Ruang Nicu RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo", MAHESA : Malahayati Health Student Journal, 2024 Publication	1%
15	repository.poltekeskupang.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 27 Maret 2000 di Watampone, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dari pasangan H. Ambotang, S.Pd dan Dra. Hj. Siti Salmi. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan formal dimulai pada tahun 2005 di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2006, penulis melanjutkan pendidikan di SDN

010 Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2012 - 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Yasrib Soppeng Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, pada tahun 2022 penulis lulus di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Profesi Ners pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan.

Penulis bergabung dalam beberapa organisasi internal maupun eksternal kampus. Bergabung di Ikatan Alumni Pesantren Yasrib Soppeng (IAPYS) Wilayah Makassar dan Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) Koperti UINAM. Penulis juga pernah bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar dan Badan Semi Otonom Sanggar Seni Rufaidah HMJ Keperawatan UINAM.