

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN POST *SECTIO*
CAESAREA DENGAN MENYUSUI TIDAK EFEKTIF
MENGUNAKAN INTERVENSI PIJAT LAKTASI DI
RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ners
Pada Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SURYANI, S.Kep
NIM:70900122052

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS ANGKATAN XXII
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryani, S.Kep

NIM : 70900122052

Tempat/Tgl. Lahir : Parado Rato, 9 Juni 2000

Jurusan/Prodi/Konsetrasi : Profesi Ners

Fakultas : Kedokteran dan ilmu kesehatan

Alamat : Samata Gowa

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Paisein Post *Sectio Caesarea* Dengan Menyusui Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 06 Desember 2023

Penulis,



Suryani

70900122052

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Sectio Caesarea Dengan Menyusui Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP. Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar", yang disusun oleh Suryani, S.Kep, NIM : 70900122052, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 27 Desember 2023 M bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.Hasnah,S.Sit.,S.Kep.,Ns.,M.Kes	: (.....)
Sekretaris	: Eny Sutria, S.Kep.,Ns., M.Kes	: (.....)
Munaqisy I	: Dr.Hasnah,S.Sit.,S.Kep.,Ns.,M.Kes	: (.....)
Munaqisy II	: Baso Pallawagau , Lc.,Ma	: (.....)
Pembimbing I	: Nurhidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kep	: (.....)
PembimbingII	: Nurul Fadhilah Gani, S.Kep.,Ns.,M.Kep	: (.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
Nip. 810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang selalu tercurahkan dan tiada henti diberikan kepada hamba-Nya, serta salam dan shalawat juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan teman-teman seperjuangan. Merupakan suatu kehormatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pesein Post *Sectio Caesarea* Dengan Menyusui Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar.”

Tugas akhir ners ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat meraih gelar pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penyusunan tugas akhir ners ini penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna dan pada saat penyusunan tentunya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ners. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.Og., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran

dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Dr Hasnah, S.Kep.Ns.,M.Kes selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Seluruh Dosen Program studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Nurhidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing I dan Nurul Fadhilah Gani ,S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu merampungkan tugas akhir ners.
6. Dr Hasnah, S.Kep.Ns.,M.Kes selaku penguji I dan Baso Pallawagau, Lc., Ma selaku penguji II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik.
7. Terima kasih untuk Ama dan Ina selalu mengusahakan pendidikan untuk anakmu, terima kasih karena selalu menjadi penyemangat hidup, terima kasih selalu mendoakan setiap saat, sehingga penulis bisa menyelesaikan profesi ners tepat waktu.
8. Terima kasih kepada adik-adikku atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang turut mendukung dan mendoakan penulis.
10. Terima kasih untuk teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk selalu semangat.

11. Terima kasih rumah cinta (Impar Makassar) sudah hadir sebagai wadah untuk penulis berproses, terima kasih untuk senior, teman-teman seperjuangan, dan adik-adik, terima kasih sudah membantu dan selalu memberikan semangat untuk penulis.
12. Kepada rekan-rekan mahasiswa (i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan tugas akhir ners ini.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah berusaha bertahan sejauh ini, terima kasih untuk selalu mau diajak perang dengan isi kepala, dan terima kasih karena sudah bisa membuktikan bahwa kamu bisa melewati semuanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, 20 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Medis	7
B. Konsep Asuhan Keperawatan	28
C. <i>Evidence Based Practice In Nursing</i>	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	41
B. Subjek Penelitian	41
C. Fokus Penelitian	41
D. Instrumen Penelitian	42
E. Prosedur Pengambilan Data	42
F. Tempat dan Waktu Penelitian	43
G. Analisis Data dan Penyajian Data	44
H. Etika Penelitian	44
BAB IV LAPORAN KASUS	45
A. Pengkajian	47

B. Diagnosis Keperawatan	61
C. Intervensi	62
D. Implementasi.....	66
E. Evaluasi.....	66
BAB V PEMBAHASAN	79
A. Analisis Asuhan Keperawatan	79
B. Analisis Intervensi <i>Evidence Based Practice In Nursing</i>	86
BAB VI PENUTUP	90
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92
Daftar Pustaka.....	95
Lampiran	98
Daftar Riwayat Hidup	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 SOP Pijat Laktasi	39
Tabel 4.1 Riwayat Kehamilan dan Pesalinan yang lalu	46
Tabel 4.2 Terapi Obat	52
Tabel 4.3 Hasil Laboratorium	53
Tabel 4.4 Klasifikasi Data	56
Tabel 4.5 Analisa Data	58
Tabel 4.6 Intervensi Keperawatan	63
Tabel 4.7 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan	76



ABSTRAK

Nama :Suryani,S.Kep

NIM :70900122052

Judul :Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Post Sectio Caesarea* Dengan Menyusui Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar

Latar Belakang: Post partum merupakan kondisi ibu yang baru saja melahirkan, Salah satu yang perlu diperhatikan dalam masa post partum adalah menyusui. Pada masa ini proses menyusui adalah penting, karena tahap ini sang ibu memberikan makanan pada bayi berupa Air Susu Ibu (ASI) dari payudara ibu secara efektif. Data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menjelaskan bahwa hanya 32,6% dari ibu post partum yang menyusui secara eksklusif. Di asia tenggara capaian ASI eksklusif menunjukkan angka tidak banyak berbeda. Sebagai perbandingan, cakupan ASI di india mencapai 46%, di philipinan 34%, di vietnam 27% dan myanmar 24%. Anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif empat belas kali lebih mungkin untuk bertahan hidup dalam enam bulan pertama kehidupan dibandingkan anak yang tidak disusui. **Tujuan:** melakukan asuhan keperawatan pada pasien post section caesarea dengan menyusui tidak efektif menggunakan intervensi pijat laktasi. **Metode:** metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, pendokumentasian. Pelaksanaan pijat laktasi dilakukan sebanyak 1 kali sehari dalam 3 hari p emberian. **Hasil:** analisis studi kasus pada pasien post partum dengan menyusui tidak efektif menggunakan pijat laktasi didapatkan hasil peningkatan produksi ASI. **Kesimpulan:** berdasarkan hasil evaluasi bahwa pemberian pijat laktasi dengan durasi \pm 15 menit selama 3 hari menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi ASI setelah pemberian. Hal ini menunjukkan bahwa pijat laktasi efektif dilakukan dalam membantu peningkatan produksi ASI.

Kata Kunci: menyusui tidak efektif, pijat laktasi, *post sectio caesarea*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Post partum merupakan kondisi ibu yang baru saja melahirkan. Masa post partum disebut juga masa nifas yang dimulai setelah kelahiran plasenta atau tali pusat dan berakhir sampai alat-alat reproduksi kembali normal seperti pada saat sebelum hamil yang berlangsung kurang lebih 6 minggu. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam masa post partum adalah menyusui. Pada masa ini proses menyusui adalah penting, karena tahap ini sang ibu memberikan makanan pada bayi berupa Air Susu Ibu (ASI) dari payudara ibu secara efektif. Salah satu peran ibu yang terpenting setelah melahirkan adalah sesegera mungkin untuk memberikan ASI pada bayi baru lahir atau sering disebut inisiasi menyusui dini atau permlaan menyusui dini (Vivi, 2023)

Data United Nations Children's Fund (UNICEF) menjelaskan bahwa hanya 32,6% dari ibu post partum yang menyusui secara eksklusif. Di asia tenggara capaian ASI eksklusif menunjukkan angka tidak banyak berbeda. Sebagai perbandingan, cakupan ASI di india mencapai 46%, di philipinan 34%, di vietnam 27% dan myanmar 24%. Anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif empat belas kali lebih mungkin untuk bertahan hidup dalam enam bulan pertama kehidupan dibandingkan anak yang tidak disusui. Mulai menyusui pada hari pertama setelah lahir dapat mengurangi resiko kematian bayi baru lahir hingga 45% (UNICEF, 2016) (Fitriani, 2021).

Data di Indonesia, hanya 1 dari 2 bayi berusia di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, dan hanya sedikit lebih dari 5% anak yang masih mendapatkan ASI pada usia 23 bulan. Artinya, hampir setengah dari seluruh anak Indonesia tidak menerima gizi yang mereka butuhkan selama dua tahun pertama kehidupan. Lebih dari 40% bayi diperkenalkan terlalu dini kepada makanan pendamping ASI, yaitu sebelum mereka mencapai usia 6 bulan, dan makanan yang diberikan sering kali tidak memenuhi kebutuhan gizi bayi (World Health Organization (WHO), 2020).

Fenomena yang ada bahwa sebagian besar ibu post partum tidak mampu memproduksi ASI dengan lancar, baik pada ibu persalinan normal maupun persalinan SC, dikarenakan proses kelahiran itu sendiri dan masa post partum sangat mengekspos ibu pada stres dan kelelahan yang berlebihan sehingga mempengaruhi produksi ASI (Yuni Puji Widiastuti, 2020)

Sebagai salah satu tindakan persalinan *Sectio Caesarea* memiliki efek samping. Salah satu efek samping yang ditimbulkan adalah tidak adanya produksi ASI pada 24-48 jam setelah tindakan *Sectio Caesarea* (Ralista, 2020). Terdapat beberapa faktor penyebab yang memicu terjadinya keluhan produksi ASI terhambat pada ibu post *Sectio Caesarea*, salah satunya adalah akibat adanya nyeri post operasi. Nyeri yang timbul saat post operasi dapat menghambat produksi oksitosin sehingga ASI tidak akan diproduksi (Pujiati, 2019). Kondisi ini akan mempengaruhi pemberian ASI, ketika ibu melakukan gerakan untuk memberikan ASI akan menimbulkan nyeri. Hal tersebut dapat

menyebabkan ibu menjadi enggan untuk memberikan ASI pada bayi sehingga dapat menyebabkan masalah penurunan status gizi pada bayi (Arifin, 2019).

Menyusui yang tidak efektif dapat juga diatasi dengan cara farmakologi yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Adapun non farmakologi dilakukan dengan pola makan gizi seimbang untuk ibu menyusui, mobilisasi dini, pijat laktasi dan perawatan payudara. (Handayani & Rustiana, 2020). Menurut SIKI, 2018 intervensi pada pasien dengan menyusui tidak efektif diberikan adalah edukasi menyusui dan konseling laktasi (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016).

Tindakan yang dapat mempengaruhi produksi ASI adalah pijat laktasi. Pijat laktasi adalah pijatan yang dilakukan di area kepala, leher, punggung, tulang belakang dan payudara. Ketika tulang belakang dilakukan pemijatan timbul reaksi neurogenic sehingga kerja saraf parasimpatis menjadi cepat untuk menyampaikan perintah ke otak bagian belakang (Utami, 2021). Hal ini bertujuan untuk membantu menimbulkan efek relaksasi sehingga mampu meningkatkan pengeluaran hormon prolaktin dan oksitosin memiliki peran penting dalam pengeluaran ASI (Rahmawati, 2019). Tindakan Pijat laktasi menjadi salah satu alternatif pada ibu pasca melahirkan yang ada permasalahan dalam menghasilkan ASI selain pemberian obat.

Adapun penelitian (Azizah et al., 2023) yang menyatakan ibu post partum yang mengalami gangguan produksi ASI bisa diatasi dengan pijat laktasi sehingga meningkatkan produksi ASI, karena jaringan payudara yang

banyak mengandung pembuluh limfa dan pembuluh darah, maka pembuluh darah yang tersumbat menjadi penyebab tidak lancarnya produksi dan aliran ASI.

Berdasarkan pada fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil kasus yang dituangkan dalam sebuah karya tulis akhir dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Paisein Post *Sectio Caesarea* Dengan Menyusui Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Wahidin Sudirohusodo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana Analisis Asuhan Keperawatan Pada Paisein Post *Sectio Caesarea* Dengan Menyusui Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Wahidin Sudirohusodo.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis Analisis Asuhan Keperawatan Pada Paisein Post *Sectio Caesarea* Dengan Menyusui Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Wahidin Sudirohusodo

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien post *Sectio Caesarea* dengan masalah menyusui tidak efektif
- b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien post *Sectio Caesarea* dengan masalah menyusui tidak efektif
- c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien post *Sectio Caesarea* dengan masalah menyusui tidak efektif
- d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien post *Sectio Caesarea* dengan masalah menyusui tidak efektif
- e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien post *Sectio Caesarea* dengan masalah menyusui tidak efektif
- f. Untuk menganalisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post *Sectio Caesarea* Dengan Menyusui Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Wahidin Sudirohusodo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi dasar praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan Pasien Post *Sectio Caesarea* Dengan Menyusui Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Wahidin Sudirohusodo

2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi non-farmakologi dalam pemberian asuhan keperawatan Pasaen Post *Sectio Caesarea* Dengan Menyusui Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Wahidin Sudirohusodo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Medis

1. Konsep Masa Nifas

a. Definisi Post Partum

Post partum atau masa nifas adalah masa setelah persalinan selesai yang bermula dari lahirnya janin beserta plasentanya yang biasanya masa nifas ini berakhir dalam waktu 6 minggu atau 40 hari hingga organorgan kandungan kondisinya kembali seperti sebelum hamil seperti penurunan tinggi fundus uteri berada 3 jari dibawah pusat, Involusi uteri dimana uterus kondisinya kembali seperti sebelum hamil dengan berat sekitar 60 gram (Sulfianti, 2021)

b. Etiologi Post Partum

Mekanisme pasti yang memicu terjadinya post partum berawal dari proses persalinan yang tidak diketahui secara pasti, hal ini memicu timbulnya beberapa teori yang berkaitan dengan mulainya persalinan.

Teori penyebab terjadinya persalinan menurut (Sulfianti, 2021) yaitu :

1) Teori kerenggangan rahim

Pada umumnya otot rahim pasti memiliki kemampuan untuk merenggang pada batas tertentu, biasanya setelah melebihi batasnya maka rahim akan berkontraksi yang tentu saja akan

memicu terjadinya proses persalinan.

2) Teori penurunan hormon progesteron

Jika produksi hormon progesteron sedang terjadi penurunan 1-2 minggu menjelang persalinan, hal ini akan mengakibatkan sensitifnya otot rahim terhadap oksitosin dan prostaglandin memicu timbulnya kontraksi yang memicu persalinan.

3) Distensi rahim

Semakin usia kehamilan bertambah maka otot-otot rahim akan terus semakin merenggang dan membesar sehingga pada otot-otot rahim terjadi iskemia hal ini akan mengganggu pada sirkulasi uterus dan plasenta kemudian menyebabkan timbulnya kontraksi.

4) Teori plasenta menjadi tua

Hal ini karena bertambahnya usia kehamilan, maka plasenta juga semakin tua yang akan mengakibatkan menurunnya kadar estrogen dan progesteron sehingga bisa kejang pada pembuluh darah dan menimbulkan kontraksi

c. Patofisiologi Post Partum

Berawal pada kehamilan yang umurnya (37-42) dalam usia normal, lalu ketika sudah memasuki tanda-tanda kontraksi melahirkan (inpartu) sampai akhir keluarnya bayi beserta plasenta lalu ibu disebut postpartum setelah masa ini terjadi banyak perubahan pada ibu yaitu perubahan fisiologis dan emosional.

Pada perubahan fisiologis post partum umumnya akan terjadi trauma di jalan lahir juga kelemahan ligament, fascia dan otot-otot pada ibu sesudah persalinan, hal ini bisa mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari karena masih perlu bantuan keluarga serta bisa memunculkan masalah keperawatan intoleransi aktivitas, terganggu aktivitas dapat menurunkan gerakan peristaltik dan otot tonus menurun di usus sehingga mengakibatkan konstipasi. ketika pengeluaran janin menggunakan cara episiotomy (irisan bedah) pada perineum untuk memperlebar vagina dalam membantu proses kelahiran, di perineum terjadi putusnya jaringan sehingga area sensorik akan terangsang dengan mengeluarkan hormon bradikinin, histamin serta serotonin yang kemudian di medulla spinalis di teruskan ke batang otak, lalu ke thalamus sehingga nyeri di korteks serebri terangsang, memicu munculnya gangguan rasa nyaman yang menyebabkan nyeri akut.

Pada proses persalinan pasti terjadi perdarahan umumnya 300-400 cc yang mengakibatkan organ genitalia pada ibu menjadi kotor setelah proses kelahiran juga perlindungan pada luka kurang serta adanya robekan pada perineum. jika tidak ditangani dengan baik bisa terjadi invasi bakteri sebagai akibatnya timbul masalah keperawatan resiko infeksi. Trauma kandung kemih terjadi setelah keluarnya janin sebagai akibatnya ibu pasca melahirkan tidak dapat berkemih ada edema serta memar di uretra karena terjadinya

dilatasi, menyebabkan jumlah urin yang keluar menjadi berlebih dan biasanya ada residu pada urin sebagai akibatnya timbul masalah keperawatan gangguan eliminasi urin.

Setelah melahirkan ibu ada merasa cemas karena akan menjadi orang tua dan merawat bayinya hal ini bisa memunculkan ansietas dan kesiapan menjadi orang tua, setelah melahirkan juga biasanya akan terjadi Laktasi alami dipengaruhi oleh hormon estrogen serta peningkatan prolaktin, untuk merangsang pembentukan kolostrum di air susu ibu, namun terkadang dapat terjadi peningkatan suplai darah dipayudara dari uterus yang berinovasi serta terjadi retensi (kelebihan) darah pada pembuluh payudara sehingga akan bengkak, keras serta terjadi penyempitan di duktus intiverus. Maka akan menyebabkan tidak keluarnya ASI dan timbul masalah keperawatan menyusui tidak efektif (Nuryani, 2018)

d. Klasifikasi

Masa nifas dibagi dalam 3 tahap, yaitu puerperium dini (immediate puerpereum), puerpereum intermedial (early puerperium), dan remotepuerperium (later puerperium) (Sulfianti, 2021)

- 1) Puerperium dini (immediate puerperium) yaitu pemulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan (waktu 0-24 jam postpartum). Dalam agama islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari

- 2) Puerperium intermedial (early puerperium) yaitu suatu masa dimana pemulihan dari organ-organ reproduksi secara menyeluruh selama kurang lebih 6-8 minggu.
- 3) Remote puerperium (later puerperium) yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan yang sempurna secara bertahap terutama jika selama masa kehamilan dan persalinan ibu mengalami komplikasi, waktu untuk sehat bisa berminggu-minggu, bulan bahkan tahun.

e. Perubahan Fisiologi Selama Nifas

Secara garis besar terdapat tiga proses penting dimasa nifas, yaitu sebagai berikut (Nuryani, 2018)

- 1) Pengecilan rahim atau involusi uteri
- 2) Kekentalan darah (hemokonsentrasi) kembali normal
- 3) Proses laktasi atau menyusui

Rahim adalah organ tubuh yang spesifik dan unik karena dapat mengecil serta membesar dengan menambah atau mengurangi jumlah selnya. Pada wanita yang tidak hamil, berat rahim sekitar 30 gram dengan ukuran kurang lebih sebesar telur ayam. Selama kehamilan, rahim makin lama semakin membesar. Setelah bayi lahir, umumnya berat rahim menjadi sekitar 1000 gram dan dapat diraba kira-kira setinggi 2 jari di bawah umbilicus. Secara alamiah rahim kembali mengecil perlahan-lahan kebentuknya semula setelah 6 minggu dengan perkiraan beratnya sekitar 40-

60 gram. Ibu seringkali beranggapan bahwa masa nifas sudah selesai pada saat ini. Namun, sebenarnya rahim akan kembali keposisinya yang normal dengan berat 30 gram dalam waktu 3 bulan setelah masa nifas (Nuryani, 2018)

f. Perubahan Psikologis Selama Nifas

Setelah persalinan ibu perlu waktu untuk menyesuaikan diri, menjadi dirinya lagi, dan merasa terpisah dengan bayinya sebelum dapat menyentuh bayinya. Perasaan ibu oleh bayinya bersifat kompleks dan kontradiktif. Banyak ibu merasa takut disebut sebagai ibu yang buruk, emosi yang menyakitkan mungkin dipendam sehingga sulit dalam koping dan tidur. Ibu menderita dalam kebiasuannya sehingga menimbulkan distress karena kemarahan terhadap situasi (Hidayati, 2017). Adaptasi psikologis pada periode postpartum merupakan penyebab stress emosional terhadap ibu baru. Bahkan bisa menjadi kondisi yang sulit jika terjadi perubahan fisik yang hebat. Factorfaktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua pada masa postpartum, yaitu (Sulfianti, 2021)

- 1) Respons dan dukungan dari keluarga dan teman
- 2) Hubungan antara pengalaman melahirkan dan harapan serta aspirasi
- 3) Pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lain d. Pengaruh budaya

g. Perawatan Pada Masa Nifas

Perawatan masa nifas yang membantu ibu hingga masa nifas berakhir sebagai berikut (Sulfianti, 2021):

- 1) Pengalaman Wanita Masa nifas adalah hal yang sangat luar biasa, maka dari itulah wanita yang sedang berada pada masa tersebut, sangat memerlukan banyak masukan dari para tenaga kesehatan dan pihak keluarga agar dirinya mampu memiliki banyak pengetahuan sebagai seorang ibu. Hal ini memiliki kaitan mengenai pantangan tertentu yang biasanya sering melingkupi perasaan serta pikiran seorang ibu nifas. Sebenarnya tidak banyak pantangan yang menjadi momok untuk ibu nifas, hanya saja beberapa himbauan yang mungkin diberikan oleh tenaga medis kiranya akan membantu ibu nifas untuk melalui masa barunya yang berperan sebagai ibu dari bayinya. Selain itu, beberapa hal mengenai nutrisi tidak ada pantangan kecuali memang terjadi alergi tertentu atau bahkan makanan yang memang membahayakan bagi ibu nifas. Serta berkaitan dengan peran baru sebagai ibu, dan dukungan dari sekitar yang akan mampu memberikan semangat serta wawasan lebih yang akan membantu ibu nifas memulai peran baru tersebut.

- 2) Merawat Bayi

Dalam merawat bayi barunya, seorang ibu nifas tentu memerlukan banyak sekali himbauan bahkan wawasan dari

tenaga kesehatan yang telah memiliki banyak ilmu dan pengetahuan. Hal ini akan membawa masa nifas ibu hamil menjadi jauh lebih menyenangkan dan selalu memberikan harapan baru. Dengan banyak nasihat mengenai perawatan bayi baru lahir dari petugaskesehatan akan memberikan pola pikir yang berbeda bagi ibu nifas. Hal tersebut merupakan sebuah ilmu yang didapat dari pendidikan dan pengalaman. Keluarga yang memberikan dukungan, juga membantu ibu nifas semakin semangat menghadapi masa barunya.

3) Adat dan Budaya

Memang benar adanya, sebuah adat istiadat serta budaya akan sangat mempengaruhi pengolahan pola pikir serta langkah dari ibu nifas terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sang buah hati. Hal ini dikarenakan, sebuah adat dan budaya menjadi tempat tinggal yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan adat maupun budaya masing-masing daerah dan wilayah tempat tinggal dari ibu nifas tersebut. Jadi, perlunya tenaga kesehatan memilih untuk tetap memberikan banyak masukan maupun wawasan lebih. Jika sebuah adat tidak memberikan dampak negatif, tentu saja akan terdapat dukungan dari tenaga kesehatan untuk terlaksananya adat maupun budaya tersebut. Begitu pula pada lingkup keluarga yang akan menjadikan budaya dan adat sebagai sebuah dukungan agar ibu nifas mengikuti adat dan

budaya secara baik dan benar.

4) Nutrisi

Pada masa nifas atau transisi menjadi ibu baru, maka ibu nifas bukan berarti melupakan kebutuhan dirinya, dan hanya memperhatikan kebutuhan dari bayinya. Harus tetap terdapat keseimbangan yang nantinya mampu menjadikan ibu dan bayi sama-sama sehat. Maka dari itulah, asupan nutrisi yang tepat dan seimbang untuk ibu nifas sangat penting. Hal ini dikarenakan oleh kebutuhan bayinya yang tentu didapatkan dari sang bunda. Jadi, justru penting tentang adanya asupan sehat seimbang bagi ibu nifas, sehingga secara langsung akan terpenuhi pula kebutuhan dari sang buah hati tercinta. Adapun beberapa makanan yang perlu dihindari ibu nifas adalah makanan yang mengandung pengawet makanan, makanan fast food yang kurang akan nilai gizi, kopi, hingga makanan yang mampu memberikan rangsangan tertentu, misalnya saja cabai, merica, dll.

5) Diet Nifas

Caranya adalah dengan mengonsumsi keseimbangan yang memang dibutuhkan tubuh ibu nifas yang sangat memerlukan asupan gizi seimbang sekaligus kesehatan seorang wanita. Dengan menu diet protein akan menjadi asupan yang membantu dalam pemenuhan nutrisi ibu nifas. Bukan hanya itu, namun ibu nifas juga dapat menambahkan dengan serat serta vitamin yang

nantinya akan melindungi atau menjadi benteng ibu nifas dari berbagai macam penyakit atau kelelahan yang kiranya mudah menyerang ibu nifas.

6) Eliminasi

Eliminasi juga menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk juga dipenuhi oleh ibu nifas serta bayi baru lahir. dengan eliminasi yang lancar dari ibu nifas serta bayinya maka akan berdampak bagi kesehatan keduanya. Maka dari itulah perlunya tenaga kesehatan dan sanak keluarga untuk juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan eliminasi dari ibu nifas dan bayi baru lahir. Stres memang dapat terjadi pada masa transisi yang dialami oleh ibu nifas, namun umumnya hanya akan terjadi dalam sementara waktu dan akan segera kembali. Dalam ulasan medis, buang air kecil atau berkemih yang tepat bagi ibu nifas adalah 2 hingga 4 jam pertama usai persalinan. Sedangkan buang air besar atau defekasi biasanya akan lancar setelah 24 jam pertama setelah proses melahirkan usai.

7) Produksi ASI

Produksi ASI (Air Susu Ibu) merupakan hal yang mutlak adanya untuk bayi. Inilah asupan satu-satunya yang tepat didapatkan oleh bayi dari ialahir hingga dirinya berusia enam bulan pertaanya. Maka dari itulah, anda dapat menggunakan beberapa cara yang saling berkaitan satu dengan lainnya, seperti misalnya

mengenai asupan nutrisi hingga istirahat yang pas dan tepat. Hal ini akan membuat produksi ASI sangat berpengaruh. Begitu pula dengan manfaat ASI yang sangat luar biasa hebatnya. Dengan pelaksanaan ASI yang dijalankan seorang ibu nifas dengan bayinya, maka akan terdapat banyak hal menakjubkan yang mampu terjadi. Misalnya saja mempercepat proses involusi uterus atau kembalinya rahim ke bentuk semula seperti sedia kala. Bukan hanya itu, akan terdapat kasih sayang yang dalam antara ibu dan bayinya yang mampu tercipta. Jadi, risiko depresi atau stres pasca salin akan sangat sedikit atau bahkan nihil.

8) Kebersihan Diri

Kebersihan diri tersebut sangat penting bagi ibu nifas dan bayinya, tentu saja penting. Masa nifas adalah masa seorang ibu yang akan rentan terhadap infeksi, begitu pula bagi bayi baru lahir, masa awal kehidupannya adalah masa transisi yang tidak lain menjadi masa yang juga rawan terhadap daya tahan tubuhnya terhadap penyakit dan infeksi.

9) Ambulasi

Ambulasi sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari ibu nifas, biasanya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan akan memberikan himbauan, terhadap ibu nifas dengan segera untuk mencegah terjadinya kelelahan setelah persalinan yang memiliki batasan maksimal tertentu,

seperti batasan 4 jam pasca salin. Ambulasi dapat diawali dengan menggerakkan kaki, memiringkan tubuh ke arah kiri dan juga ke arah kanan, duduk, hingga bangun dari tempat tidur yang dilakukan oleh ibu nifas.

2. Konsep ASI

a. Pengertian

Air susu ibu adalah susu yang diproduksi seorang ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum bisa mencerna makanan padat. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindungi dalam melawan penyakit (Linda, 2019)

b. Keuntungan pemberian ASI

Pemberian ASI bagi bayi juga memberikan keuntungan jangka panjang pada anak, diantaranya: terhindar dari penyakit alergi, asma, obesitas, dan bahkan beberapa jenis kanker. Penelitian juga telah membuktikan bahwa ASI tidak hanya membuat bayi anda sehat tetapi juga membuat mereka lebih cerdas. Bagi ibu yang menyusui juga memberikan banyak manfaat. Hormon yang dihasilkan saat menyusui akan mengurangi pendarahan yang mungkin terjadi pasca persalinan dan membantu rahim mengecil kembali ke ukuran semula. Menyusui juga dapat mengurangi resiko terjadinya beberapa penyakit pada ibu, diantaranya: kanker payudara. Ibu yang menyusui anaknya akan hidup lebih bersih dan teratur serta lebih

memperhatikan kesehatan tubuh lingkungan agar bayi nya tetap sehat (Linda, 2019)

c. Keunggulan ASI

Dilihat dari kandungan nutrisinya, ASI masih merupakan makanan yang terbaik dan telah memenuhi kebutuhan bayi dari 0 hingga 6 bulan lebih tinggi hingga 100%. ASI mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan enzim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh sehingga ASI akan mengurangi resiko dari berbagai jenis kekurangan gizi. Selain itu, ASI juga dibutuhkan bagi otak, mata, dan pembuluh darah yang sehat. ASI dapat mencegah anemia pada bayi karena mengandung zat besi yang dapat diserap lebih baik dari pada zat besi dari sumber lainnya. Selain itu, ASI juga membuat bayi tidak akan kekurangan nutrisi, karena ASI mampu memenuhi kebutuhan energi bayi (Linda, 2019)

d. Proses Produksi ASI

ASI diproduksi dari hasil kerja sama antara faktor hormonal dan saraf. Untuk membahas mengenai bagaimana ASI dapat diproduksi, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormone seks yang diproduksi oleh rahim untuk merangsang pertumbuhan organ seks, seperti payudara dan rambut pubik, serta mengatur siklus menstruasi. Hormon estrogen juga berperan menjaga tekstur dan fungsi payudara membesar dan merangsang pertumbuhan kelenjar ASI. Selain itu,

hormon estrogen memperkuat dinding rahim saat terjadi kontaksi menjelang persalinan. Payudara terdiri atas kumpulan kelenjar dan jaringan lemak yang terletak di antara kulit dan tulang dada bagian dalam payudara terdiri dari jaringan lemak dan jaringan berserat yang saling berhubungan, yang mengikat payudara dan mempengaruhi bentuk serta ukuran payudara. Terdapat juga pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Kelenjar di dalam payudara yang dikenal sebagai kelenjar lobule membentuk lobe atau kantung penghasil susu akan menghasilkan susu setelah seorang perempuan melahirkan. Terdapat sekitar 15-20 kantung penghasil susu pada setiap payudara, yang dihubungkan dengan saluran susu yang terkumpul di dalam puting.

ASI tidak diproduksi selama kehamilan karena ada faktor-faktor yang menekan pelepasan hormon prolaktin. Salah satunya berkat kerja hormone estrogen bisa kita bayangkan jika susu sudah diproduksi sejak awal kehamilan sementara belum ada yang menhisapnya, para ibu tentu harus membuang ASI setiap hari. Proses produksi sampai air susu memenuhi payudara sekitar satu hari hingga tiga hari. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir apabila air susu belum keluar atau yang keluar hanya sedikit sekali pada hari-hari pertama yang diproduksi payudara saat produksi ASI dimulai. Cairan kolostrum berbentuk encer, manis, dan mudah dicerna. Awalnya kolostrum berbentuk kental dan berwarna kuning, semakin

dekat dengan perslinan, kolostrum semakin encer dan warnanya memucat.

ASI diproduksi setiap saat sebelum, selama dan sesudah bayi menyusu. ASI yang telah diproduksi disimpan dalam payudara ibu. Volume ASI yang disimpan di payudara akan lebih banyak jika masa jeda waktu menyusu berikutnya lebih lama. Volume ASI yang disimpan dalam payudara relative bervariasi pada tiap ibu dan tidak ditentukan dari ukuran payudara. ASI tidak akan pernah habis 100% meskipun bayi telah menyusu payudara setiap saat. Penelitian lakasi membuktikan, bayi tidak akan menghabiskan semua stok ASI pada payudara. Makin banyak dan sering bayi minum ASI, makin cepat ASI diproduksi. Jadi, jangan berfikir menyusui, memompa, atau memerah ASI seperti meminum air di dalam gelas dengan sedotan begitu diminum akan berkurang.

Pada beberapa hari pasca melahirkan, ASI mulai diproduksi oleh organ penghasil ASI. Pada hari pertama produksi ASI tidak ditentukan dari beberapa banyak ASI akan dikeluarkan. Tetapi, setelah beberapa hari kemudian produksi ASI sangat ditentukan dari berapa banyak ASI yang dikeluarkan, baik dengan cara disusui atau dipompa. Seterusnya organ produksi ASI akan mulai mengurangi produksi ASI hingga jumlahnya sesuai dengan kebutuhan bayi. Pada minggu pertama umumnya ibu memproduksi ASI melebihi kapasitas yang dibutuhkan bayi, terutama jika ibu menyusui dengan

baik. Di masa tersebut banyak ibu mengalami rembesan ASI atau payudara terasa penuh atau bengkak kondisi ini tidak akan berlangsung lama. Pada masa tersebut organ produksi ASI ibu sedang dalam proses penyesuaian terhadap jumlah ASI yang dibutuhkan bayi. Sekitar minggu keenam hingga bula ketiga kadar prolaktin akan dimulai berkurang secara bertahap hingga akhir masa menyusui. Pada masa tersebut payudara mulai terasa tidak penuh, rembesan ASI yang diproduksi ibu selalu berubah dari waktu ke waktu. Di menit-menit awal menyusui, ASI kaya akan protein, rendah lemak dan cenderung lebih encer seperti susu formula yang kebanyakan air. ASI yang dinamakan susu awal atau foremilk ini berfungsi untuk mengenyangkan saat menyusui, ibu tidak dapat membedakan secara pasti antara foremilk dan hindmilk karena perubahannya berlangsung secara perlahan (Linda, 2019)

e. Kandungan ASI

Kandungan ASI nyaris tak tertandingi. ASI mengandung zat gizi yang secara khusus diperlukan untuk menunjang proses pertumbuhan kembang otak dan memperkuat daya tahan alami tubuhnya (Wijaya FA, 2019). Kandungan ASI yang utama terdiri dari: laktosa, lemak, protein, garam dan mineral dan vitamin

f. Faktor Penghambat Produksi ASI

Selain produksi ASI bisa ditingkatkan dengan jalan terus menyusui setiap kali bayi menginginkan, ada beberapa hal yang bisa

menghambat produksi ASI diantaranya sebagai berikut (Linda, 2019):

1) Adanya feedback inhibitor

Feedback inhibitor yaitu suatu faktor lokal, yakni bila saluran ASI penuh, maka mengirim impuls untuk mengurangi produksi. Cara mengatasi adanya feedback inhibitor ini adalah dengan mengosongkan saluran secara teratur yaitu dengan pemberian ASI eksklusif dan tanpa jadwal (on- demand).

2) Stress/ rasa sakit

Adanya stress/ rasa sakit maka akan menghambat atau inhibisi pengeluaran oksitosin. Misalnya pada saat sinus laktiferus penuh/ payudara sudah bengkak.

3) Penyapihan

Merupakan penghentian menyusuan sebelum waktunya. Upaya penyapihan di antaranya disebabkan karena faktor ibu bekerja sehingga tidak mau repot menyusui bayi

g. Mekanisme Produksi ASI

Ibu yang normal dapat menghasilkan ASI kira-kira 550-1000ml setiap hari, jumlah ASI dapat dipengaruhi oleh faktor (Linda, 2019):

- 1) Makanan : Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimakan ibu, apabila makanan ibu secara teratur dan cukup mengandung gizi yang diperlukan akan mempengaruhi produksi ASI, kelenjar pembuat ASI tidak dapat bekerja dengan sempurna

tanpa makanan yang cukup. Untuk membentuk produksi ASI yang baik, makanan ibu harus memenuhi jumlah kalori, protein, lemak, dan vitamin serta mineral yang cukup. Selain itu ibu dianjurkan minum lebih banyak kurang lebih 8-12 gelas/hari

- 2) Ketenangan jiwa dan pikiran : Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh faktor kejiwaan, ibu yang selalu dalam keadaan tertekan, sedih, kurang percaya diri dan berbagai bentuk ketegangan emosional akan menurunkan volume ASI bahkan tidak akan terjadi produksi ASI. Untuk memproduksi ASI yang baik harus dalam keadaan tenang.
- 3) Penggunaan alat kontrasepsi: Pada ibu yang menyusui bayinya penggunaan alat kontrasepsi hendaknya diperhatikan karena pemakaian kontrasepsi yang tidak tepat dapat mempengaruhi produksi ASI.
- 4) Perawatan payudara: Dengan merangsang buah dada akan mempengaruhi hipofisis untuk mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen lebih banyak lagi serta hormon oksitosin
- 5) Anatomis buah dada: Bila jumlah lobus dalam buah dada berkurang,lobules pun berkurang. Dengan demikian produksi ASI juga berkurang karena sel-sel yang menghisap zat-zat makan dari pembuluh darah akan berkurang.
- 6) Fisiologi: Terbentuknya ASI dipengaruhi hormon prolaktin

yang merupakan hormon laktogenik yang menentukan dalam hal pengadaan dan mempertahankan sekresi air susu.

- 7) Faktor istirahat: Bila kurang istirahat akan mengalami kelemahan dalam menjalankan fungsinya dengan demikian pembentukan dan pengeluaran ASI berkurang.
- 8) Faktor isapan anak: Bila ibu menyusui anak segera jarang dan berlangsung sebentar maka hisapan anak berkurang dengan demikian pengeluaran ASI berkurang.
- 9) Faktor obat-obatan: Diperkirakan obat-obat yang mengandung hormone mempengaruhi hormon prolaktin dan oksitosin yang berfungsi dalam pembentukan dan pengeluaran ASI. Apabila hormon-hormon ini terganggu dengan sendirinya akan mempengaruhi pembentukan dan pengeluaran ASI.

3. Konsep Menyusui

Menyusui merupakan suatu cara yang tidak ada duanya dalam memberikan makanan yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat. Selain itu, mempunyai status biologis serta kejiwaan yang unik terhadap kesehatan ibu dan bayi. Zat-zat anti infeksi yang terkandung dalam ASI membantu melindungi bayi terhadap penyakit. Akan tetapi, menyusui tidak selamanya dapat berjalan dengan normal. Tidak sedikit ibu akan mengeluh seperti adanya pembengkakan payudara akibat penumpukan ASI karena pengeluaran yang tidak lancar atau pengisapan oleh bayi (Metti, 2019)

Keluarnya hormon oksitosin menstimulasi turunnya susu(milk ejection/let down reflek). Oksitosin menstimulasi otot disekitar payudara untuk memeras ASI keluar.Para ibu mendeskripsikan sensasi pengeluaran ASI dengan berbedabeda. Beberapa ibu ada yang merasakan geli di payudara dan ada juga yang merasakan sedikit sakit, tetapi ada juga yang tidak merasakan apa-apa. Reflek pengeluaran asi tidak selalu konsisten, khususnya pada masa-masa awal setelah melahirkan. Tetapi reflek ini bisa juga distimulasi dengan hanya memikirkan tentang bayi, atau mendengar suara bayi, sehingga terjadi pengeluaran ASI (Metti, 2019). Sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah:233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Kemenag, 2020).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami keharusan seorang ibu agar senantiasa menyusui anaknya secara sempurna yaitu dua tahun penuh dan dibolehkan kurang jika ada kemaslahatannya. Kaum wanita baik yang berstatus isteri maupun dalam keadaan ditalak. Dalam tafsir al-misbah M Quraisy Shihab bahwa ayat ini mengandung redaksi berita, tetapi bermaknakan perintah yang sangat dianjurkan kepada ibu agar memberikan ASI kepada anaknya. Setelah dijelaskan kewajiban ibu menyusukan anaknya Qurais Shihab menguraikan kewajiban bagi ibu dan hak anak atas ibunya. Dalam hal ini al-quran menginsyarkan ibu menyusukan anaknya sampai masa penyusuan di anggap sempurna itu dua tahun. Oleh karena itu jika masa penyusuan yang melebihi dari masa dua tahun itu, dari masa penyusuan tidak di anggap termasuk penyusuan yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dengan semua jumlah hal dari anak kandung. Meskipun diperintahkan bahwa

masa dua tahun dianggap masa yang sempurna bagi penyusuan, akan tetapi hal ini tidak menjadi wajib, karena dalam kutipan sepenggal ayat selanjutnya menjelaskan “*para ibu hendaknya menyusukan anak anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*” dapat disimpulkan bahwasanya tuntutan bagi orang tua yang ingin menyempurnakan masa penyusuannya dan apabila keduanya sepakat untuk mengurangi masa penyusuannya yaitu kurang dari dua tahun, tidaklah apa-apa akan tetapi, meski anjuran atau perintah yang ditetapkan merupakan kewajiban, masa dua tahun merupakan masa minimal untuk menyempurnakan masa penyusuan karena ASI adalah asupan makanan terbaik (M Quraisy Shihab, 2003)

B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian Keperawatan

Berikut pengkajian keperawatan pada pasien dengan pos partum

(Yuliana, 2020)

a. Biodata

Mengkaji identitas klien dan suami yang meliputi: nama, umur, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, dan alamat

b. Status Perkawinan meliputi umur kawin dan lama kawin

c. Keluhan Utama

d. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

e. Riwayat kehamilan sekarang meliputi: HPHT, Berapa kali pemeriksaan kehamilan, keluhan hamil muda dan selama hamil,

- Imunisasi TT berapa kali, penyuluhan yang pernah didapat
- f. Riwayat kesehatan yang lalu (penyakit yang pernah di derita)
misalnya hipertensi, diabetes, jantung, paru-paru dan hepatitis
 - g. Riwayat kesehatan keluarga: penyakit yang diderita oleh keluarga
baik yang menahun maupun yang menular, riwayat keturunan
kembar
 - h. Pola kebiasaan sehari-hari
 - i. Pola nutrisi: makan dan minum terakhir sebelum bersalin
 - j. Pola Eliminasi: BAK dan BAB terakhir sebelum bersalin serta
keluhannya
 - k. Pola istirahat: dirumah dan selama di kamar bersalin
 - l. Pola seksual: seksual yang dilakukan sebelum bersalin
 - j. Data Psikososial
Hubungan dengan suami, anggota keluarga yang lain dan harapan
terhadap kehamilan ini
 - k. Data sosial budaya
Keadaan lingkungan yang berhubungan dengan persalinan
 - l. Pemeriksaan fisik umum
Meliputi keadaan umum seperti kesadaran, postur tubuh, cara
berjalan dan raut wajah selain itu melakukan pemeriksaan tanda-
tanda vital
 - m. Pemeriksaan fisik head to toe
 - j. Inspeksi dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki

k. Palpasi:

- 1) Kepala: memeriksa keadaan kulit kepala, warna rambut, rontok atau tidak
- 2) Muka: apakah pucat atau oedem
- 3) Mata: Bentuk, conjungtiva, sklera, palpebra
- 4) Hidung: bentuk, ada polip, infeksi atau kelainan
- 5) Telinga: bentuk, ada kelaianan atau tidak
- 6) Mulut: bentuk, bibir, gigi apakah ada caries atau menggunakan gigi palsu, mukosa, mulut dan lidah
- 7) Leher: pembesaran kelenjar thyroid dan vena jugularis
- 8) Ketiak: pembesaran kelenjar limphe
- 9) Dada: bentuk simetris kanan dan kiri, ada pembesaran hiperpigmentasi areola, puting susu dan adanya pengeluaran cairan, konsistensi dan kolostrum (+/-)
- 10) Perut: bentuk, pigmentasi, linea, striae, luka bekas operasi, TFU sesuai dengan masa nifas
- 11) Genetalia: kebersihan, keadaan perineum (luka basah atau kering), lochea
- 12) Anus: varises, haemorrhoid
- 13) Ekstremitas: tangan dan kaki bentuk, varises oedem dan sebagainya

l. Perkusi: reflek patella

n. Pemeriksaan penunjang

o. Kesimpulan pengkajian

2. Diagnosis Keperawatan

Adapun diagnosis keperawatan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) yang mungkin muncul pada pasien post *Sectio Caesarea* sebagai berikut:

- a. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik
- b. Gangguan Mobilitas Fisik berhubungan dengan nyeri
- c. Menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI
- d. Resiko infeksi dibuktikan dengan Faktor Resiko efek prosedur invasif.

3. Intervensi Keperawatan

Menurut (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) intervensi keperawatan pada pasien post *Sectio Caesarea* yakni:

- a. Nyeri Akut

Intervensi Keperawatan: Manajemen Nyeri

Observasi

- 1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri.
- 2) Identifikasi skala nyeri
- 3) Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri
- 4) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup

Rasional:

- 1) Mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri dari pasien
- 2) Mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien
- 3) Mengetahui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien
- 4) mengetahui seberapa besar rasa nyeri mempengaruhi kualitas hidup pasien

Terapeutik

- 1) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal)
- 2) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri

Rasional:

- 1) Mengurangi tingkat nyeri pasien/ mengalihkan pasien dari rasa nyerinya
- 2) Mengurangi resiko factor yang dapat memperberat nyeri

Edukasi

- 1) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri.
- 2) Jelaskan strategi mengatasi nyeri
- 3) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri

Rasional:

- 1) Memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien
- 2) Membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul

- 3) Pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul

Kolaborasi

Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.

Rasional:

Mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien

b. Menyusui tidak efektif

Intervensi Keperawatan: Edukasi Menyusui

Observasi

- 1) Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi
- 2) Identifikasi tujuan atau keinginan menerima informasi

Rasional:

- 1) Agar pasien dapat menerima informasi
- 2) Agar pasien mengetahui tujuan yang dilakukan

Terapeutik

- 1) Jelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi
- 2) Ajarkan 4 posisi menyusui dan perlekatan
- 3) Ajarkan perawatan payudara postpartum (mis. memerah asi, pijat payudara, pijat oksitosin)

Rasional:

- 1) Agar ibu mengetahui manfaat pemberian ASI di bandingkan dengan susu formula
- 2) Agar posisi ibu dan bayi tetap benar

- 3) Agar payudara ibu serta ASI nya tetap lancar

Edukasi

- 1) Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan
- 2) Dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui
- 3) Libatkan sistem pendukung: suami, keluarga, tenaga kesehatan dan masyarakat

Rasional:

- 1) Untuk memfasilitasi pasien media pendkes
- 2) Agar ibu lebih semangat untuk menyusui anaknya
- 3) Agar ibu merasa didukung untuk menyusui

c. Resiko Infeksi

Intervensi Keperawatan: Pencegahan Infeksi

Observasi: Monitor tanda dan gejala infeksi local dan sistemik

Rasional: Untuk mengetahui tanda dan gejala infeksi local dan sistemik
Terapeutik: Pertahankan tehnik aseptik pada pasien yang beresiko tinggi
Rasional: Klien dapat melakukan atau menerapkan tehnik aseptik jika klien memiliki penyakit yang beresiko tinggi

Edukasi:

- 1) Jelaskan tanda dan gejala infeksi
- 2) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi
- 3) Anjurkan meningkatkan asupan cairan

Rasional:

- 1) Agar klien mampu mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi
- 2) Agar klien mampu meningkatkan asupan nutrisinya
- 3) Agar klien mampu meningkatkan asupan cairannya

Kolaborasi: Anjurkan pemberian imunisasi, jika perlu

Rasional: Bisa di berikan kepada bayi dan anak jika perlu agar tidak terkena infeksi lagi

d. Gangguan Mobilitas Fisik

Intervensi Keperawatan : Dukungan Mobilisasi

Observasi :

- 1) Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya
- 2) Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan
- 3) Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi
- 4) Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi

Rasional :

- 1) Untuk mengetahui adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya
- 2) Untuk mengetahui toleransi fisik melakukan pergerakan
- 3) Untuk memantau frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi
- 4) Untuk memantau kondisi umum selama melakukan mobilisasi

Terapeutik :

- 1) Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis: pagar

tempat tidur)

- 2) Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu
- 3) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan

Rasional :

- 1) Untuk mengetahui aktivitas mobilisasi dengan alat bantu
- 2) Agar pasien bisa melakukan pergerakan
- 3) Agar pasien bisa mendapatkan dukungan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan

Edukasi:

- 1) Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi
- 2) Anjurkan melakukan mobilisasi dini
- 3) Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis: duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi)

Rasional:

- 1) Agar pasien bisa mengetahui tujuan dan prosedur mobilisasi
- 2) Agar pasien bisa melakukan pergerakan
- 3) Agar pasien bisa melakukan aktivitas sederhana

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik dan

menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Proses pelaksanaan implementasi harus berpusat kepada kebutuhan klien, faktor-faktor lain yang memengaruhi kebutuhan keperawatan, strategi implementasi keperawatan, dan kegiatan komunikasi (Rahmi, 2019)

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan aspek penting dalam proses keperawatan karena hal tersebut memberitahukan kepada perawat mengenai pencapaian tujuan. Waktu dilakukan evaluasi adalah berdasarkan rentang waktu yang diharapkan untuk intervensi bekerja. Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan pendekatan SOAP (Hawks, 2022) yaitu:

- a. **S** : Respon objektif klien terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan
- b. **O** : Respon objektif terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan
- c. **A** : Kesimpulan diambil dari analisis data subjektif dan objektif yang diperoleh dari klien. Jika masalah telah teratasi, belum teratasi, atau muncul masalah baru
- d. **P** : Rencana tindak lanjut berdasarkan analisis respon klien terhadap tindakan keperawatan yang diberikan

C. Evidence Based Practice In Nursing (EBPN)

1. Definisi

Pijat Laktasi merupakan istilah yang merujuk pada pijat ibu menyusui. Pijat laktasi ini di khususkan untuk ibu menyusui karena menitikberatkan pada titik-titik rangsang ASI. Pijat laktasi pada

umumnya dilakukan kepada seorang ibu yang memiliki masalah akan produksi ASI, ibu yang memiliki produksi ASI tidak lancar sangat dianjurkan untuk melakukan pijat laktasi. Pijat laktasi dilakukan diarea punggung dan payudara, pemijatan dilakukan pada keadaan payudaranya normal, bengkak, atau tidak lancar, dan pada kasus ibu ingin relaksasi maka dibantu dengan pijat pada bagian-bagian tubuh tertentu yang memberikan dampak positif terhadap kondisi pikiran dan tubuh ibu, memberi efek tenang, menormalkan sirkulasi darah, serta meningkatkan pasokan ASI (Hasanah, Andriyani, & Tengah, 2023)

2. Tujuan

- a. Menenangkan pikiran
- b. Relaksasi tubuh
- c. Menormalkan aliran darah
- d. Mengatasi bengkak
- e. Meningkatkan suplay ASI
- f. Mencegah sumbatan pada payudara


3. Indikasi

- a. Ibu menyusui yang mempunyai masalah ASI
- b. Ibu yang mempunyai masalah ASI tidak lancar
- c. Relaksasi

Tabel 2.1 Standar Operasional Prosedur Pijat Laktasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pijat Laktasi	
Pengertian	Pijat laktasi pada umumnya dilakukan kepada seorang ibu yang memiliki masalah akan produksi ASI, ibu yang memiliki produksi ASI tidak lancar sangat di anjurkan untuk melakukan pijat laktasi.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> a) Menenangkan pikiran b) Relaksasi tubuh c) Menormalkan aliran darah d) Mengatasi bengkak e) Meningkatkan suplay ASI f) Mencegah sumbatan pada payudara
Setting	Pasien dengan keadaan duduk di kursi dan perawat berada di belakang pasien
Alat dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> a. Kursi b. Baby oil c. Waslap d. Baskom
Proses	<p>Pra interaksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak waktu dengan pasien 2. Menyiapkan alat dan mendekati ke pasien 3. Menyiapkan lingkungan yang nyaman 4. Mengatur posisi pasien 5. Mencuci tangan.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Orientasi Salam Terapeutik <ol style="list-style-type: none"> a. Perawat mengucapkan salam terhadap pasien b. Perawat menanyakan nama panggilan klien. 2. Evaluasi dan Validasi <ol style="list-style-type: none"> a. Tanyakan tentang perasaan pasien saat ini. b. Menanyakan masalah yang dirasakan. 3. Kontrak <ol style="list-style-type: none"> a. Perawat menjelaskan tujuan pijat laktasi b. Perawat menjelaskan prosedur tindakan
Tahap Kerja	<p>Tahap Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencuci tangan 2. Lakukan pemijatan mulai dari leher, bahu, punggung dan payudara lakukan gerakan tersebut 6 kali 3. Siapkan baby oil untuk kita balurkan ke punggung dan daerah yang akan kita pijat 4. Gerakan pertama memijat pada daerah leher dengan gerakan turun naik 5. Gerakan kedua memijat pada daerah bahu dengan menggunakan ibu jari 6. Gerakan ketiga susuri tulang belakang lalu pijat diantara sisi tulang belakang dari bawah keatas dengan gerakan memutar ibu jari setelah sampai ke atas tarik ke samping 7. Gerakan keempat tarik dari sisi bawah ke atas dan ke samping 8. Gerakan kelima lakukan gerakan mengusap menyamping dengan jempol di kedua sisi punggung belakang dari bawah sampai atas 9. Gerakan keenam love sign menggunakan punggung –punggung jari 10. Gerakan ketujuh pijat di daerah sekitar tulang belikat kiri dan kanan dengan gerakan kebawah 11. Gerakan kedelapan memijat area payudara membentuk kupu-kupu dari dada,tengah hingga bawah payudara dan sekitar ketiak

	<p>12. Gerakan kesembilan kompres payudara menggunakan air hangat selama 5 menit</p> <p>13. Gerakan kesepuluh pijat lembut bagian luar areola menggunakan posisi C-Hold</p>
Tahap Terminasi	<p>1. Evaluasi Tindakan</p> <p>2. Kontrak waktu untuk selanjutnya</p> <p>3. Berpamitan pada pasien</p> <p>4. Cuci tangan</p> <p>5. Dokumentasi</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Studi kasus (*case study*) adalah suatu bagian dari metodologi penelitian yang dalam pembahasannya peneliti dituntut agar lebih cermat, mendalam, serta teliti untuk mengungkapkan suatu kasus ataupun peristiwa, baik itu bersifat perorangan atau berkelompok (Hidayat, 2019)

Pada penulisan karya tugas akhir ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah melakukan ‘Studi Kasus’ dimana dalam penyajiannya dilakukan secara mendalam untuk melihat suatu keadaan atau kondisi pasien dengan cara menyeluruh dan tersistematis. Pengumpulan data diawali dengan *informed consent*, lalu memulai proses wawancara kepada keluarga pasien dan pasien, kemudian melakukan observasi, pemeriksaan fisik, serta pendokumentasian. Setelah data terkumpul kemudian melakukan analisis data dan memberikan intervensi berdasarkan EBPN (*Eviden Based Practice in Nursing*) yaitu pijat laktasi, dimana implementasi dilakukan satu kali sehari selama tiga hari pemberian.

B. Subjek Studi Kasus

Dalam studi kasus ini, subjek yang digunakan ialah bersifat individu atau pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut

1. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2017)

Adapun kriteria inklusi pada studi kasus ini sebagai berikut:

- a. Ibu nifas yang mengalami gangguan pengeluaran ASI
- b. Ibu nifas bersedia menjadi responden
- c. Ibu nifas yang melahirkan secara SC
- d. Kooperatif

2. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi merupakan kriteria dari subjek penelitian yang tidak boleh ada dan jika mempunyai kriteria eksklusi maka subjek harus dikeluarkan dari penelitian (Adiputra, Trisnadewi, Oktaviani, 2021).

Adapun kriteria eksklusi pada studi kasus ini sebagai berikut

- a. Pasien tidak kooperatif
- b. Pasien yang pindah rawat ke ruang rawat intensif atau rumah
- c. Pasien tidak bersedia menjadi responden

C. Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah analisis asuhan keperawatan pada pasien post *Sectio Caesarea* dengan menyusui tidak efektif menggunakan intervensi pijat laktasi di RSUP Wahidin Sudirohusodo.

D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh, mengukur dan menganalisis data dari subjek atau sampel yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti (Kurniawan, 2021). Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu format asuhan keperawatan post partum yakni :

1. Format pengkajian keperawatan terdiri dari: data umum pasien, riwayat kehamilan, riwayat ginekologi, kepala leher, abdomen, perineum dan genital, ekstermitas, eliminasi, istirahat dan kenyamanan, keadaan mental dan kemampuan menyusui.
2. Format klasifikasi Data yang terdiri dari data subjektif dan data objektif
3. Format analisis data terdiri dari: data, etiologi, dan masalah
4. Format diagnosis keperawatan
5. Format rencana asuhan keperawatan terdiri dari: diagnosis keperawatan, luaran keperawatan menggunakan SLKI, rencana intervensi menggunakan SIKI, dan rasional.
6. Format implementasi keperawatan dan terdiri dari: diagnosis keperawatan, hari dan tanggal implementasi.
7. Format evaluasi keperawatan yang digunakan SOAP

E. Prosedur Pengambilan Data

Pengambilan data sudah dilakukan setelah peneliti mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Berikut adalah tahapan-tahapan pengambilan data pada studi kasus ini:

1. Persiapan
 - a. Persiapan yang dilakukan yaitu mencari literatur-literatur terkait masalah apa yang sering dialami ibu post partum

b. Mendapatkan persetujuan dari pembimbing untuk melakukan intervensi sesuai masalah yang dialami

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan wawancara, pemeriksaan kesehatan fisik dan observasi data subjektif dan objektif

3. Penyusunan laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah

F. Tempat dan Waktu Pengambilan data Studi Kasus

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan di ruang nifas RSUP Wahidin Sudirohusodo

2. Waktu

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juli 2023

G. Analisa Data dan Penyajian Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan untuk meninjau, mengelompokkan, mensistematisasikan, menafsirkan, dan memvalidasi data sehingga suatu fenomena memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah. Analisis data disebut juga sebagai pengolahan data dan interpretasi data (Siyoto, 2015)

Analisis data dilakukan sejak peneliti sedang melakukan praktik klinik di RSUP Wahidin Sudirohusodo, pada saat melakukan pengumpulan data sampai dengan data terkumpul semua. Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan fenomena atau fakta, kemudian membandingkan teori yang ada yang selanjutnya dituangkan dalam opini pembahasan. Teknik yang

digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban dari penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil intervensi wawancara yang mendalam. Teknik analisis digunakan dengan cara observasi oleh peneliti dan studi dokumentasi yang menghasilkan data untuk selanjutnya diinterpretasikan oleh peneliti dibandingkan teori yang ada untuk memberikan rekomendasi dalam intervensi tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data dimana data disajikan dalam bentuk uraian naratif serta sintesis kemudian dikemukakan dalam bentuk interpretasi hasil.

H. Etika Studi Kasus

Peneliti juga menerapkan prinsip-prinsip etik dalam melakukan penelitian ini gunanya untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan dampak yang timbul selama kegiatan penelitian (Nursalam, 2014) yaitu:

1. *Informed Consent* (Penjelasan Sebelum Penelitian)

Responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan sebelum penelitian dilaksanakan. Tujuan *informed consent* adalah agar responden mengerti maksud dan tujuan penelitian, jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak-hak responden.

2. *Anonymity* (Tanpa Nama)

Anomity adalah tindakan untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, hanya akan diminta untuk memberikan kode/inisial yang merupakan huruf awalan dari nama responden. Contoh (Ny.S).

3. *Beneficience* (manfaat)

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini akan mendapatkan manfaat secara langsung dengan diberikan pijat laktasi untuk meningkatkan produksi Asi. Selain itu dapat menjadi referensi petugas kesehatan dalam memberikan intervensi pijat laktasi pada pasien yang mengalami menyusui tidak efektif.

4. *Confidentially* (Kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian



BAB IV
LAPORAN KASUS

PENGAJIAN MASA NIFAS/POST PARTUM

Nama Mahasiswa: Suryani

Tanggal Pengkajian : 17 Juli 2023

NIM : 70900122052

Ruangan/RS

: Pinang/RSWS

I. DATA UMUM KLIEN

1. Inisial klien : Ny A
2. Usia : 28 tahun
3. Status perkawinan : Menikah
4. Pekerjaan : IRT
5. Pendidikan terakhir: S1

Riwayat Kehamilan dan Persalinan yang Lalu

Tabel 4.1 Riwayat Kehamilan dan Pesalinan yang lalu

No	Tahun	Tipe Persalinan	Penolong	Jenis kelamin	BB lahir	Keadaan bayi waktu lahir	Masalah kehamilan
1	2020	Caesar	Dokter RS Bahagia	Perempuan	3,3 Kg	Normal	Tidak ada
2	2023	Caesar	Dokter RS Wahidin	Perempuan	3,1 Kg	Normal	Tidak ada

Pengalaman menyusui : Ya

Berapa lama : 2 thn

Riwayat Kehamilan saat ini

1. Berapa kali periksa kehamilan: Pasien Mengatakan 6 kali
2. Masalah kehamilan: Tidak ada masalah

Riwayat Persalinan

1. Jenis persalinan : Post SC
2. Tgl/Jam : 17 Juli 2023 jam 11.00 WITA
3. Jenis kelamin bayi : Perempuan, BB/PB: 3,1 kg/49 cm,
4. Perdarahan: perdarahan 400 cc
5. Masalah dalam persalinan: tidak ada masalah

Riwayat Ginekologi

1. Masalah ginekologi: Tidak ada masalah
2. Riwayat KB: Pasien mengatakan pernah KB di tahun 2021

II. DATA UMUM KESEHATAN SAAT INI

1. **Status obstetrik** : G 2 P 2 A 0

Bayi Rawat Gabung : Ya

2. **Keadaan umum** : Baik

Kesadaran : Composmentis, E4V5M6

BB/TB : 60 kg/155 cm

3. **Tanda vital** : TD : 110/70 mmHg Nadi: 99x/m

Suhu: 36,5°C Pernapasan: 24x/mnt

4. **Kepala Leher**

a. Kepala

Bentuk normo chepal tidak ada benjolan, tidak ada bekas jahitan, kulit kepala bersih, tidak berketombe, tidak berbau, rambut berwarna hitam dan tidak mudah rontok

b. Mata

Bentuk simetris, dilatasi pupil normal, fungsi penglihatan baik, kongjungtiva tidak anemis warna merah muda, sklera tidak ikterik

c. Telinga

Bentuk simetris, tidak ada serumen, bersih, tidak ada peradangan maupun pendarahan

d. Hidung

Bentuk simetris, tidak ada pendarahan, bersih, tidak ada secret, tidak keluar cairan dari hidung

e. Mulut

Bersih tidak berbau, lidah bersih, tidak ada pembesaran tonsil, tidak pucat, tidak kering, gusi tidak mudah berdarah dan tidak ada gigi berlubang

f. Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada pembesaran kelenjar tyroid dan tidak ada distensi vena jugularis

Masalah Khusus: Tidak ada masalah

5. Dada

a. Jantung

Suara jantung S1, S2: lup-dup, reguler, tidak ada suara abnormal yang ditemui

b. Paru

Suara napas vesikuler, tidak ada retraksi otot dada

c. Payudara

Tampak besar, simetris dan tidak ada benjolan

d. Puting susu

Nampak puting susu pasien menonjol keluar

e. Pengeluaran ASI: pasien mengatakan cemas karna ASInya belum terlalu lancar keluar, pasien mengatakan ASI kurang banyak, nampak ASI keluar sedikit, bayi nampak menangis saat disusui, nampak bayi menghiap terus menerus, BAK bayi kurang dari 8 kali dalam 24 jam dan terdapat produksi ASI 20 ml

Masalah Khusus: Menyusui Tidak Efektif

6. **Abdomen**

Terdapat bekas jahitan luka post SC

P: Pasien mengeluh nyeri luka bekas operasi caesar

Q: Pasien mengatakan nyeri seperti tersayat

R: Pasien mengatakan nyeri pada abdomen terutama pada bekas luka operasi

S: Skala nyeri 6 (nrs)

T: Pasien mengatakan nyerinya hilang timbul kurang lebih 1 menit

Pasien nampak meringis

Fundus Uteri : setinggi pusat

Kontraksi : Baik

Fungsi pencernaan : Normal

Masalah Khusus : Nyeri luka bekas SC

7. Perineum dan Genital

Vagina : integritas kulit elastis, tidak ditemukan adanya edema, tidak ada memar dan hematoma

Perineum : utuh, Tanda REEDA

R : Kemerahan tidak

E : Edema tidak

E : Ekimosis tidak

D : Dischargeserum tidak ada

A : Approximat baik

Kebersihan : bersih

Lokia : Jenis/warna : merah Konsistensi : kental Bau : amis

Hemorrhoid: tidak ada

Masalah khusus : tidak ada masalah

8. Ekstremitas

Edema : tidak

Varises : tidak

Ekstermitas bawah

Edema : tidak

Varises : tidak

Masalah khusus : tidak ada masalah

9. Eliminasi

Urin : pasien terpasang cateter urine, produksi kurang lebih 90 cc/jam

Fekal : pasien mengatakan belum BAB setelah operasi SC, kebiasaan BAB sebelum operasi 1 kali/hari

Masalah Khusus : tidak ada masalah

10. Istirahat dan Kenyamanan

Pola tidur : pasien mengatakan biasanya tidur malam pukul 22.00-05.00 WITA

Pola tidur saat ini : pasien mengatakan saat ini tidurnya kadang terganggu disebabkan oleh nyeri luka bekas operasi dan pasien hanya tidur kurang lebih 6 jam

Keluhan ketidaknyamanan : nyeri pada bagian perut post sc

11. Mobilisasi dan Latihan

Tingkat mobilisasi : pasien mengatakan bisa bergerak meskipun pelan-pelan

Kekuatan otot $\frac{5}{5} \mid \frac{5}{5}$

Latihan/senam : pasien mengatakan perlahan melakukan aktifitas

Masalah khusus : tidak ada masalah

12. Nutrisi dan Cairan

Asupan nutrisi : Pasien mengatakan biasa makan 1-3x/hari, pasien

mengatakan menghabiskan 1 porsi makannya

Asupan cairan: pasien mengatakan minum 800 ml/hari

Masalah khusus : tidak ada masalah

13. Keadaan Mental

Adaptasi psikologis : pasien mengatakan mudah beradaptasi dengan kondisinya yang baru karena sudah pernah merasakan hal yang sama

Penerimaan terhadap bayi : pasien mengatakan sangat menerima dan bersyukur atas kelahiran anaknya

Masalah khusus : tidak ada masalah

14. Kemampuan menyusui: Pasien mengatakan mampu menyusui

anaknya walaupun terkendala dengan ASI yang kurang lancar

III. Obat-obatan yang dikonsumsi saat ini :

No	Nama Obat	Dosis dan Rute	Fungsi
1.	Ranitidine	50 mg/8jam melalui intravena	untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi asam lambung, seperti maag dan tukak lambung
2.	ketorolac	30 mg/8jam melalui intravena	untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, obat ini sering digunakan setelah operasi atau prosedur medis yang bisa menyebabkan nyeri
3.	Ceftriaxone	2 gr/24jam melalui intravena	obat ini berkerja dengan cara membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi di dalam tubuh

Tabel 4.2 Terapi Obat

IV. Hasil Laboratorium

Tanggal	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
17 Juli 2023	RDW SD	40.5	37.0-54.0
	RDW CV	13.4	10.0-15.0
	PDW	11.1	10.0-18.0
	NEUT	78.0	52.0-75.0
	LIMPH	42.0	20.0-40.0
	MONO	3.4	2.00-8.00
	EO	1.00	1.00-3.00
	BASO	1.00	1.00-3.00
	Led 1		P<20
	WBC	19.7	4.00-10.0
	RBC	4.19	4.00-6.00
	HCT	37	37.0-48.0
	GDS	88	140
	Ureum	15	15-38
	Kretinin	0.9	0.7-1.4
	MCHC	34	31.5-35.0
	PLT	264	150-400
	MPV	9.5	6.50-11.0
	PCT	0.15	0.15-0.50

Tabel 4.3 Hasil Laboratorium

I. Rangkuman Hasil Pengkajian

1. Pasien mengatakan mampu menyusui anaknya walaupun terkendala dengan ASI yang kurang lancar
2. Pasien mengatakan biasa makan 1-3x/hari, pasien mengatakan menghabiskan 1 porsi makannya

3. pasien mengatakan biasanya tidur malam pukul 22.00-05.00 WITA
4. pasien mengatakan saat ini tidurnya kadang terganggu disebabkan oleh nyeri luka bekas operasi dan pasien hanya tidur kurang lebih 6 jam
5. pasien mengatakan perlahan melakukan aktifitas

6. Terdapat bekas jahitan luka post SC

P: Pasien mengeluh nyeri luka bekas operasi caesar

Q: Pasien mengatakan nyeri seperti tersayat

R: Pasien mengatakan nyeri pada abdomen terutama pada bekas luka operasi

S: Skala nyeri 6 (nrs)

T: Pasien mengatakan nyerinya hilang timbul kurang lebih 1 menit

7. Pasien nampak meringis

8. Pasien mengatakan cemas karna ASInya belum terlalu lancar keluar

9. Pasien mengatakan ASI kurang banyak

10. Nampak ASI keluar sedikit

11. Bayi nampak menangis saat disusui

12. Nampak bayi menghisap tidak terus menerus

13. BAK bayi kurang dari 8 kali dalam 24 jam

14. Terdapat produksi ASI 20 ml

15. WBC : 19.7

16. NEUT : 78.0

17. LIMPH : 42.0

18. TTV :

TD : 110/70 mmHg

N : 99x/m

S : 36,5


P : 24x/m

V. KLASIFIKASI DATA

Data Subjektif	Data Objektif
1. Pasien mengatakan cemas karna ASInya masih sedikit yang keluar	1. Terdapat bekas jahitan luka post SC
2. Pasien mengatakan ASI kurang banyak	2. S : Skala nyeri 6 (nrs)
3. Pasien mengatakan biasa makan 1-3x/hari, pasien mengatakan menghabiskan 1 porsi makannya	3. Pasien Nampak meringis
4. pasien mengatakan biasanya tidur malam pukul 22.00-05.00 WITA	4. Nampak ASI sedikit keluar
5. pasien mengatakan saat ini tidurnya kadang terganggu disebabkan oleh nyeri luka bekas operasi dan pasien hanya tidur kurang lebih 6 jam	5. Bayi nampak menangis saat disusui
6. pasien mengatakan perlahan melakukan aktifitas	6. Nampak bayi menghisap tidak terus menerus
7. P : Pasien mengeluh nyeri luka bekas operasi caesar	7. BAK bayi kurang dari 8 kali dalam 24 jam
8. Q : Pasien mengatakan nyeri seperti tersayat	8. Terdapat produksi ASI 20 ml
	9. WBC : 19.7
	10. NEUT : 78.0
	11. LIMPH : 42.0
	12. TTV
	TD: 110/70 mmHg
	N: 99x/m


<p>9. R : Pasien mengatakan nyeri pada abdomen terutama pada bekas luka operasi</p> <p>10. S : skala nyeri 6</p> <p>11. T : Pasien mengatakan nyerinya hilang timbul kurang lebih 1 menit</p>	<p>S: 36,5</p> <p>P: 24x/m</p>
---	--------------------------------

Tabel 4.4 Klasifikasi Data



ANALISA DATA

DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
-------------	-----------------	--------------------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P : Pasien mengeluh nyeri luka bekas operasi caesar 2. Q : Pasien mengatakan nyeri seperti tersayat 3. R : Pasien mengatakan nyeri pada abdomen terutama pada bekas luka operasi 4. T : Pasien mengatakan nyerinya hilang timbul kurang lebih 1 menit <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bekas jahitan luka post SC 2. Pasien nampak meringis 3. S: skala nyeri 6 (nrs) 4. TTV <p>TD: 110/70 mmHg</p> <p>N: 99x/m</p> <p>S: 36,5</p> <p>P: 24x/m</p>	<p><i>Sectio Caesarea</i></p> <p>↓</p> <p>Terputusnya kontinuitas jaringan</p> <p>↓</p> <p>Merangsang pengeluaran zat bradikinin dan histamin</p> <p>↓</p> <p>Merangsang reseptor nyeri</p> <p>↓</p> <p>Ke Spinal Cord</p> <p>↓</p> <p>Hipotalamus</p> <p>↓</p> <p>Nyeri dipersepsikan</p> <p>↓</p> <p>Nyeri Akut</p>	<p>Nyeri Akut</p>
--	---	-------------------

<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan cemas karna ASInya belum terlalu lancar keluar 2. Pasien mengatakan ASI kurang banyak <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nampak ASI keluar sedikit 2. Bayi nampak menangis saat disusui 3. Nampak bayi menghisap tidak terus menerus 4. BAK bayi kurang dari 8 kali dalam 24 jam 5. Terdapat produksi ASI 20 ml 	<p>Tindakan <i>Sectio Caesarea</i></p> <p>↓</p> <p>Adaptasi post partum</p> <p>Fisiologis</p> <p>↓</p> <p>Laktasi</p> <p>↓</p> <p>prolaktin menurun</p> <p>↓</p> <p>produksi ASI menurun</p> <p>↓</p> <p>Menyusui Tidak Efektif</p>	<p>Menyusui Tidak Efektif</p>
<p>Faktor resiko efek prosedur invasif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bekas jahitan luka post SC 2. WBC: 19.7 3. NEUT: 78.0 4. LIMPH: 42.0 	<p><i>Sectio Caesarea</i></p> <p>↓</p> <p>Adanya luka operasi</p> <p>↓</p> <p>Perkembangan kuman patogen</p> <p>↓</p> <p>Resiko Infeksi</p>	<p>Resiko Infeksi</p>

Tabel 4.5 Analisa Data

DIAGNOSIS KEPERAWATAN

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik
2. Menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI
3. Resiko infeksi dibuktikan dengan faktor resiko efek prosedur invasif



INTERVENSI KEPERAWATAN

No	Diagnosis Keperawatan	Rencana Tindakan Keperawatan		
		Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
1	<p>Nyeri Akut b/d agen pencedera fisik (prosedur operasi) d/d</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P : Pasien mengeluh nyeri luka bekas operasi caesar 2. Q : Pasien mengatakan nyeri seperti tersayat 3. R : Pasien mengatakan nyeri pada abdomen terutama pada bekas luka operasi 	<p>Tingkat Nyeri (L.08066)</p> <p>Setelah dilakukan intervensi 3x24 jam maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluhan nyeri menurun - Meringis menurun 	<p>Manajemen Nyeri (I.08238)</p> <p>Tindakan :</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan Strategi meredakan nyeri 2. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri 2. Untuk mengetahui tingkat nyeri pasien <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Untuk memberikan terapi non farmakologis guna mengurangi nyeri <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Agar pasien bisa meredakan nyerinya secara mandiri 5. Agar pasien tidak semata-mata menggunakan obat dalam mengatasi nyerinya <p>Kolaborasi</p>

	<p>4. T : Pasien mengatakan nyerinya hilang timbul kurang lebih 1 menit</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bekas jahitan luka post SC 2. Pasien nampak meringis 3. S: skala nyeri 6 (nrs) 4. TTV <p>TD: 110/70 mmHg</p> <p>N: 99x/m</p> <p>S: 36,5</p> <p>P: 24x/m</p>		<p>mengurangi rasa nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Agar membantu mengurangi rasa nyeri
2	<p>Menyusui tidak efektif b/d ketidakadekuatan suplai asi d/d</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan 	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam maka, diharapkan status menyusui membaik dengan kriteria hasil:</p>	<p>Pijat Laktasi (I. 03134)</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor kondisi mammae dan puting 2. Identifikasi keinginan ibu 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui kondisi mammae dan puting susu ibu 2. Untuk mengetahui keinginan ibu untuk menyusui 3. Untuk mengetahui apakah ibu

	<p>cemas karna ASInya belum terlalu banyak keluar</p> <p>2. Pasien mengatakan ASI kurang banyak</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nampak ASI keluar sedikit 2. Bayi nampak menangis saat disusui 3. Nampak bayi menghisap tidak terus menerus 4. BAK bayi kurang dari 8 kali dalam 24 jam 5. Terdapat produksi ASI 20 ml 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tetesan/pancaran ASI : meningkat b. Suplai ASI adekuat: Meningkat c. Hisapan bayi : meningkat 	<p>untuk menyusui</p> <p>3. Identifikasi pengetahuan ibu tentang menyusui</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisikan ibu dengan nyaman 2. Pijat mulai dari leher,bahu,punggung dan payudara 3. Pijat dengan lembut 4. Dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui dengan memberikan pujian terhadap perilaku positif ibu 5. Libatkan suami dan keluarga <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan 2. Jelaskan manfaat tindakan 	<p>mempunyai pengetahuan mengenai menyusui</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar ibu merasa nyaman dengan posisinya 2. Agar merasa rileks dan dapat meningkatkan suplay ASI 3. Agar ibu merasa nyaman 4. Supaya ibu merasa bahagia dan merasa didukung 5. supaya keluarga bisa melakukan secara mandiri <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. agar ibu mengetahui tujuan dan prosedur tindakan yang dilakukan 2. agar ibu mengetahui manfaat dari tindakan yang dilakukan
3	<p>Resiko infeksi b/d faktor resiko efek prosedur</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam maka</p>	<p>Pencegahan Infeksi (I.14539)</p> <p>Observasi</p>	<p>Observasi</p> <p>Untuk mengetahui tanda dan gejala terkena infeksi</p>

<p>invasif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bekas jahitan luka post SC 2. WBC: 19.7 3. NEUT: 78.0 4. LIMPH: 42.0 	<p>tingkat infeksi (L.14137) menurun dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyeri menurun - Hasil pemeriksaan lab membaik 	<p>Monitor tanda gejala infeksi lokal dan sistematis</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perawatan kulit pada area luka 2. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 2. Ajarkan cara memeriksa kondisi infeksi 	<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memutuskan pemindahan mikroorganisme 2. Untuk mengurangi kemungkinan penyebaran dari mikroorganisme <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui tanda dan gejala terkena infeksi 2. Agar pasien mengetahui cara memeriksa luka yang infeksi
---	---	---	---

Tabel 4.6 Intervensi Keperawatan

IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

Implementasi hari 1

No	Diagnosis Keperawatan	Hari/Tgl/Jam	Implementasi	Evaluasi	Nama Jelas
1.	Nyeri Akut b/d agen pencedera fisik (prosedur operasi)	Selasa, 18 juli 2023 (08.50)	<p>Manajemen Nyeri (I.08238)</p> <p>Tindakan :</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil: nyeri dirasakan pada bagian abdomen post operasi SC, nyeri dirasakan seperti tersayat, nyeri hilang timbul 2. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil: skala nyeri 6 3. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal Hasil: Pasien nampak meringis <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 	<p>Selasa, 18 juli 2023 (12.30 WITA)</p> <p>S : P : post operasi SC</p> <p>Q : pasien mengatakan nyerinya seperti tersayat</p> <p>R : pasien mengatakan nyeri dibagian abdomen</p> <p>T : pasien mengatakan nyerinya hilang timbul</p> <p>O :</p> <p>- Pasien nampak meringis</p>	Suryani

			<p>Hasil: diberikan terapi murottal dan relaksasi nafas dalam</p> <p>Edukasi</p> <p>5. Mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Hasil: diajarkan tehnik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>6. Mengkolaborasi pemberian analgetik</p> <p>Hasil: diberikan ketorolac 30 mg/8jam melalui intravena</p>	<p>- S : Skala nyeri 6 (NRS)</p> <p>A : Nyeri Akut belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi skala nyeri</p> <p>Terapeutik</p> <p>2. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>3. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu</p>	
2	Menyusui tidak efektif b/d ketidakadekuatan suplai asi	Selasa, 18 juli 2023 (09.00)	<p>Pijat Laktasi (I.03134)</p> <p>Observasi</p> <p>1. Monitor kondisi mammae dan puting</p> <p>Hasil: kondisi mammae tidak lecet, puting susu menonjol keluar dan nampak ASI</p>	<p>Selasa, 18 juli 2023 (13.40 WITA)</p> <p>S : Pasien mengatakan ASInya mulai lancar keluar</p> <p>O : Terdapat produksi ASI 35</p>	

		<p>menetes sedikit</p> <p>2. Identifikasi keinginan ibu untuk menyusui Hasil: Pasien mengatakan sangat ingin menyusui bayinya</p> <p>3. Identifikasi pengetahuan ibu tentang menyusui Hasil: pasien mengetahui tentang menyusui</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Posisikan ibu dengan nyaman Hasil: pasien diposisikan duduk di kursi</p> <p>2. Pijat mulai dari leher,bahu,punggung dan payudara Hasil: pasien merasa rileks setelah dilakukan pemijatan</p> <p>3. Pijat dengan lembut Hasil: dilakukan pijat dengan lembut</p> <p>5. Dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui dengan memberikan pujian terhadap perilaku positif ibu Hasil: pasien merasa bahagia didukung untuk menyusui</p> <p>6. Libatkan suami dan keluarga Hasil: suami dan keluarga mendampingi pasien setiap dilakukan tindakan</p>	<p>ml, nampak ada peningkatan tetesan ASI keluar ,tidak ada bengkak pada area payudara, bayi menangis saat disusui</p> <p>A : masalah belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi</p> <p>Pijat Laktasi (I.03134)</p>	
--	--	---	--	--

			<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan Hasil: pasien mengerti mengenai tujuan dan prosedur tindakan yang dilakukan 2. Jelaskan manfaat tindakan Hasil: pasien mengatakan mengerti mengenai manfaat tindakan yang diberikan 		
3	<p>Resiko infeksi d/d Faktor resiko</p>	<p>Selasa, 18 juli 2023 (09.25)</p>	<p>Pencegahan Infeksi (I.14539) Observasi Memonitor tanda dan gejala infeksi Hasil: terdapat luka operasi sepanjang 10-15 cm, luka operasi hari kedua Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perawatan kulit pada area luka Hasil: mengganti perban 2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien Hasil: petugas kesehatan selalu menerapkan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan bersentuhan dengan pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi 	<p>Selasa, 18 juli 2023 (.00 WITA)</p> <p>S : pasien mengatakan tidak pernah merasakan panas ataupun melihat ada kemerahan diluka bekas jahitan operasi, keluarga masih jarang melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan pasien O : tidak ada tanda dan gejala infeksi ditemukan seperti kemerahan maupun panas A : risiko infeksi belum teratasi P : lanjutkan intervensi</p>	

			<p>Hasil: karena adanya luka bekas operasi pasien mengenai tanda dan gejala infeksi</p> <p>4. Mengajarkan cara memeriksa kondisi infeksi</p> <p>Hasil: pasien mengerti mengenai cara memeriksa kondisi infeksi pada luka</p>	pencegahan infeksi (I.14539)	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

Implementasi hari II

No	Diagnosis Keperawatan	Hari/Tgl/waktu	Implementasi	Evaluasi	Nama Jelas
1.	Nyeri Akut b/d agen pencedera fisik (prosedur operasi)	Rabu, 19 juli 2023 (09.00)	<p>Manajemen Nyeri (I.08238)</p> <p>Tindakan :</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p>Hasil: Nyeri dirasakan pada bagian abdomen post operasi SC sudah berkurang, nyeri hilang timbul</p> <p>2. Mengidentifikasi skala nyeri</p> <p>Hasil: skala nyeri 6</p>	<p>Rabu, 19 juli 2023 (13.00 WITA)</p> <p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan nyerinya berkurang dibandingkan sebelumnya <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien nampak meringis - S : Skala nyeri 4 (NRS) 	

			<p>3. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal Hasil: Pasien nampak meringis</p> <p>Terapeutik</p> <p>4. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil: diberikan terapi murottal dan relaksasi nafas dalam</p> <p>Edukasi</p> <p>5. Mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil: diajarkan tehnik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>6. Mengkolaborasi pemberian analgetik Hasil: diberikan ketorolac 30 mg/8jam melalui intravena</p>	<p>A : Nyeri Akut belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <p>Manajemen Nyeri (I.08238)</p> <p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi skala nyeri</p> <p>Terapeutik</p> <p>2. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>3. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu</p>	
2	Menyusui tidak efektif b/d ketidakadekuatan suplai asi	Rabu, 19 juli 2023 (09.20)	<p>Pijat Laktasi (I.03134)</p> <p>Observasi</p> <p>1. Monitor kondisi mammae dan puting Hasil: kondisi mammae tidak lecet, puting</p>	<p>Rabu, 19 juli 2023 (13.15)</p> <p>S : pasien mengatakan ASInya sudah lancar</p>	

		<p>susu menonjol keluar, nampak ASI mulai lancar keluar</p> <p>2. Identifikasi keinginan ibu untuk menyusui Hasil: Pasien mengatakan sangat ingin menyusui bayinya</p> <p>3. Identifikasi pengetahuan ibu tentang menyusui Hasil: pasien mengetahui tentang menyusui</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Posisikan ibu dengan nyaman Hasil: pasien diposisikan duduk di kursi</p> <p>2. Pijat mulai dari leher, bahu, punggung dan payudara Hasil: pasien merasa rileks setelah dilakukan pijat dan terdapat ASI menetes</p> <p>3. Pijat dengan lembut Hasil: dilakukan pijat dengan lembut</p> <p>7. Dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui dengan memberikan pujian terhadap perilaku positif ibu Hasil: pasien merasa bahagia didukung untuk menyusui</p> <p>8. Libatkan suami dan keluarga Hasil: suami dan keluarga mendampingi</p>	<p>O: Terdapat produksi ASI 80 ml, nampak ASI menetes lancar, tidak ada bengkak pada area payudara, bayi menghisap terus menerus, bayi tidak menangis saat disusui</p> <p>A : masalah teratasi</p> <p>P : Pertahankan Intervensi</p> <p>Pijat Laktasi (I.03134)</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pasien setiap dilakukan tindakan</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan Hasil: pasien mengerti mengenai tujuan dan prosedur tindakan yang dilakukan 2. Jelaskan manfaat tindakan Hasil: pasien mengatakan mengerti mengenai manfaat tindakan yang diberikan 		
3	Resiko infeksi d/d Faktor resiko	Rabu, 19 juli 2023 (09.30)	<p>Pencegahan Infeksi (I.14539)</p> <p>Observasi</p> <p>Memonitor tanda dan gejala infeksi Hasil: terdapat luka operasi sepanjang 10-15 cm, luka operasi hari kedua</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perawatan kulit pada area luka Hasil: mengganti perban 2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien Hasil: petugas kesehatan selalu menerapkan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan bersentuhan dengan pasien 	Rabu, 19 juli 20223 (13.00 WITA)	<p>S : pasien mengatakan tidak pernah merasakan panas ataupun melihat ada kemerahan diluka bekas jahitan operasi</p> <p>O : tidak ada tanda dan gejala infeksi ditemukan seperti kemerahan maupun panas</p> <p>A : resiko infeksi teratasi</p> <p>P : Intervensi dipertahankan</p> <p>pencegahan infeksi (I.14539)</p>

			<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan tanda dan gejala infeksi Hasil: karena adanya luka bekas operasi pasien mengenai tanda dan gejala infeksi Mengajarkan cara memeriksa kondisi infeksi Hasil: pasien mengerti mengenai cara memeriksa kondisi infeksi pada luka 		
--	--	--	--	--	--

Implementasi hari III

No	Diagnosis Keperawatan	Waktu	Implementasi	Evaluasi	Nama Jelas
1.	Nyeri Akut b/d agen pencedera fisik (prosedur operasi)	Kamis 20 juli 2023 (09.10)	<p>Manajemen Nyeri (I.08238)</p> <p>Tindakan :</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil: Nyeri dirasakan pada bagian abdomen post operasi SC sudah berkurang, nyeri 	<p>Kamis 20 juli 2023 (14.00 WITA)</p> <p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasien mengatakan nyerinya sudah berkurang <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> S : Skala nyeri 3 (NRS) 	

			<p>hilang timbul</p> <p>2. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil: skala nyeri 4</p> <p>3. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal Hasil: sesekali pasien meringis</p> <p>Terapeutik</p> <p>4. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil: diberikan terapi murottal dan relaksasi nafas dalam</p> <p>Edukasi</p> <p>5. Mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil: diajarkan tehnik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>6. Mengkolaborasi pemberian analgetik Hasil: tidak ada obat analgetik diberikan</p>	<p>A : Nyeri Akut belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <p>Manajemen Nyeri (I.08238)</p> <p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi skala nyeri</p> <p>Terapeutik</p> <p>2. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>3. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu</p>	
2	Menyusui tidak efektif b/d ketidakadekuatan suplai asi	Kamis 20 juli 2023 (09.20)	<p>Pijat Laktasi (I.03134)</p> <p>Observasi</p> <p>1. Monitor kondisi mammae dan puting</p>	<p>Kamis, 20 Juli 2023 (13.50)</p> <p>S : pasien mengatakan merasa</p>	

			<p>Hasil: kondisi mammae tidak lecet, puting susu menonjol keluar</p> <p>2. Identifikasi keinginan ibu untuk menyusui Hasil: Pasien mengatakan sangat ingin menyusui bayinya</p> <p>3. Identifikasi pengetahuan ibu tentang menyusui Hasil: pasien mengetahui tentang menyusui</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Posisikan ibu dengan nyaman Hasil: pasien diposisikan duduk di kursi</p> <p>2. Pijat mulai dari leher, bahu, punggung dan payudara Hasil: pasien merasa rileks setelah dilakukan pijat dan terdapat ASI menetes</p> <p>3. Pijat dengan lembut Hasil: dilakukan pijat dengan lembut</p> <p>4. Dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui dengan memberikan pujian terhadap perilaku positif ibu Hasil: pasien merasa bahagia didukung untuk menyusui</p> <p>5. Libatkan suami dan keluarga Hasil: suami dan keluarga mendampingi</p>	<p>senang produksi ASI sudah lancar</p> <p>O: Terdapat produksi ASI 135 ml, nampak ASI menetes lancar, tidak ada bengkak pada area payudara, bayi menghisap terus menerus, bayi tidak menangis saat disusui karna ASI lancar</p> <p>A : masalah teratasi</p> <p>P : Pertahankan Intervensi</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>pasien setiap dilakukan tindakan</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan Hasil: pasien mengerti mengenai tujuan dan prosedur tindakan yang dilakukan 2. Jelaskan manfaat tindakan Hasil: pasien mengatakan mengerti mengenai manfaat tindakan yang diberikan 		
3	<p>Resiko infeksi d/d</p> <p>Faktor resiko</p>	<p>Kamis 20 juli</p> <p>2023</p> <p>(09.30)</p>	<p>Pencegahan Infeksi (I.14539)</p> <p>Observasi</p> <p>Memonitor tanda dan gejala infeksi Hasil: tidak ada tanda dan gejala infeksi</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perawatan kulit pada area luka Hasil: mengganti perban 2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien Hasil: petugas kesehatan selalu menerapkan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan bersentuhan dengan pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi 	<p>Rabu, 19 juli 20223</p> <p>(13.00 WITA)</p> <p>S : pasien mengatakan bekas jahitan luka operasi tidak kemerahan</p> <p>O : tidak ada tanda dan gejala infeksi ditemukan</p> <p>A : resiko infeksi teratasi</p> <p>P : Intervensi dihentikan</p> <p>pencegahan infeksi (I.14539)</p>	

			<p>Hasil: karena adanya luka bekas operasi pasien mengenai tanda dan gejala infeksi</p> <p>4. Mengajarkan cara memeriksa kondisi infeksi</p> <p>Hasil: pasien mengerti mengenai cara memeriksa kondisi infeksi pada luka</p>		
--	--	--	--	--	--

Tabel 4.7 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan



BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

1. Analisis Pengkajian Keperawatan

Pada laporan kasus ini penulis melakukan pengkajian pada Ny.A usia 28 tahun, pengkajian dilakukan pada hari Senin, 17 Juli 2023, didapatkan hasil pengkajian yakni pasien mengeluh cemas karna ASI nya belum terlalu lancar keluar, pasien mengatakan ASI kurang banyak, terdapat produksi ASI 20 ml, bayi nampak menangis saat disusui, nampak bayi menghisap tidak terus menerus, nampak ASI keluar sedikit. Selain itu didapatkan juga data lainnya pasien mengeluh nyeri pada jahitan luka post *Sectio Caesarea*, pasien mengatakan nyeri seperti tersayat, skala nyeri 6 pasien nampak meringis, pada hasil lab didapatkan hasil WBC 19.7.

Dari data hasil pengkajian pada pasien didapatkan hasil bahwa pasien memiliki keluhan ASI kurang lancar. Dalam standar diagnosis keperawatan Indonesia (2017) kondisi dimana ibu dan bayi mengalami ketidakpuasan atau kesulitan pada proses menyusui. Tindakan pembedahan atau operasi dapat menimbulkan berbagai keluhan dan gejala. Salah satunya keluhan yang dialami ibu melahirkan *Sectio Caesarea* adalah ASI nya kurang lancar menurut Novianasari 2023 faktor persalinan dapat juga berdampak pada keberhasilan ASI eksklusif dan

ibu dengan post *Sectio Caesarea* memiliki resiko lebih tinggi untuk memberikan ASI pada bayinya karena tingkat kecemasan ibu hak ini menyebabkan terganggunya pengeluaran oksitosin dalam merangsang reflek aliran ASI.

2. Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan pada pasien dari hasil pengkajian dan pemeriksaan fisik didapatkan 3 masalah keperawatan yang dapat ditegakkan yaitu: Diagnosis keperawatan pertama menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI dibuktikan dengan data subjektif pasien mengatakan cemas karna ASInya belum terlalu lancar keluar, pasien mengatakan ASI kurang banyak dan data objektifnya bayi nampak menangis saat disusui, nampak ASI keluar sedikit, nampak bayi menghisap tidak terus menerus, BAK bayi kurang dari 8 kali dalam 24 jam sejalan dengan teori yang terdapat dalam buku SDKI (2017) yang menjelaskan bahwa menyusui tidak efektif adalah kondisi dimana ibu dan bayi mengalami ketidakpuasan atau kesulitan pada proses menyusui. Diagnosis keperawatan yang kedua nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (prosedur operasi) dibuktikan dengan data subjektif pasien mengeluh nyeri luka bekas operasi caesarea, pasien mengeluh nyeri seperti tersayat, pasien mengatakan nyeri pada bagian abdomen skala nyeri 6 (sedang) dengan durasi nyeri hilang timbul kurang lebih 1 menit dengan tanda-tanda vital TD: 110/70 mmHg, N: 99x/m, P: 24x/m, S: 36,5°C. Diagnosa keperawatan yang ketiga resiko

infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif dengan data yang diperoleh terdapat bekas jahitan SC, WBC 19.7 dan suhu 36,5 celcius.

3. Analisis Intervensi Keperawatan

Masalah keperawatan menyusui tidak efektif yang menjadi fokus masalah keperawatan yang di prioritaskan oleh peneliti dimana kondisi menyusui tidak efektif ini membuat pemberian ASI menjadi rendah sehingga dapat menjadi ancaman bagi bayi khususnya bagi kelangsungan hidup bayi pada saat pertumbuhan dan perkembangan, oleh karena itu peneliti memberikan intervensi pijat laktasi untuk meningkatkan produksi ASI.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Putri Dian Priharja, 2023) mengatakan bahwa intervensi pijat laktasi memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap pengeluaran ASI pada ibu post partum. Maka dapat di asumsikan bahwa intervensi pijat laktasi perlu juga dilakukan untuk ibu post partum agar memberikan efek rileks sehingga dapat menstimulasikan hormon oksitosin dan membantu pengeluaran produksi ASI. Dan intervensi pijat laktasi ini sangat membantu untuk masalah ASI tidak lancar.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah et al., 2023) dapat dideskripsikan bahwa terdapat perbedaan produksi ASI sebelum dan sesudah diberikan pijat laktasi, produksi ASI sebelum dilakukan pemijatan yaitu 50 ml sedangkan setelah dilakukan pijat laktasi

produksi nya menjadi meningkat 250 ml.

penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Aprilianti, 2018) didapatkan hasil pada ibu postpartum yang mendapatkan pijat laktasi lebih cepat dari pada ibu postpartum yang mendapatkan pijat oksitosin, dengan demikian sangat efektif apabila bidan dapat memberikan pijat laktasi, dimana pemijatan ini merangsang otot-otot dalam pembuluh darah di dalam pembuluh darah di dalam payudara untuk memproduksi ASI sehingga dapat meningkatkan volume ASI pada ibu.

4. Analisis Implementasi Keperawatan

Pada pemberian pijat laktasi dilakukan selama 3 hari pada tanggal 18-20 Juli 2023 di Ruang Nifas RSUP Wahidin Sudirohusodo dan didapatkan hasil : Implementasi keperawatan pada masalah menyusui tidak efektif yang pertama dilakukan pada jam 9.00 WITA sebelum diberikan intervensi pada pasien dilakukan observasi terlebih dahulu dengan memonitor kondisi mammae dan puting dengan hasil kondisi mammae tidak lecet dan puting susu menonjol dan nampak tetesan ASI keluar sedikit. mengidentifikasi keinginan ibu untuk menyusui pasien mengatakan sangat ingin menyusui anaknya. mengidentifikasi pengetahuan ibu tentang menyusui, pasien mengatakan mengetahui tentang menyusui.

Selanjutnya memposisikan pasien dengan nyaman dan kemudian dilakukan pijat laktasi mulai dari leher, bahu, punggung dan payudara.

Pemijatan ini dilakukan dengan durasi kurang lebih 15 menit dan setiap gerakan pemijatan diulangi 6 kali dan respon pasien merasa rileks.

Implementasi Keperawatan hari kedua dilakukan pada tanggal 19 Juli 2023 jam 9.20 WITA sebelum dilakukan intervensi pasien akan dilakukan observasi terlebih dahulu dengan memonitor kondisi mammae dan puting, posisikan pasien dengan nyaman kemudian memberikan pijat laktasi kurang lebih 15 menit hasil setelah diberikan pemijatan pasien merasa rileks dan nampak ASI mulai lancar menetes.

Implementasi keperawatan hari ketiga dilakukan pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 09.20 WITA dengan dilakukan observasi terlebih dahulu dengan memonitor kondisi mammae dan puting, memonitor kondisi pasien. Kemudian memberikan intervensi pijat laktasi dan hasil pasien mengatakan merasa rileks dan terdapat tetesan ASI pada saat pijat payudara dan nampak ASI lancar keluar

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Jahriani, 2019) intervensi pijat laktasi dapat melancarkan produksi ASI, setelah pijat laktasi dilakukan, aroela akan mengirimkan ke neurohiposife untuk memproduksi dan melepaskan secara intermiten. Pijat laktasi juga akan mencegah sumbatan saluran ASI dan menormalkan aliran darah sehingga merangsang sel otot-otot di sekeliling alveoli dan berkontraksi membuat ASI yang telah terkumpul didalamnya mengalir ke saluran-saluran duktus

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rabbika, 2021) tentang produksi ASI pada ibu postpartum dengan hasil analisa menunjukkan bahwa ada pengaruh pijat laktasi terhadap produksi ASI pada ibu post partum dengan $p\text{-value} = 0.000$. dengan demikian pijat laktasi efektif terhadap produksi ASI pada ibu post partum.

Penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh (Lismawati, 2021) yang berjudul pengaruh pijat laktasi terhadap jumlah produksi ASI pada ibu menyusui yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap produksi ASI sebelum dan sesudah dilakukan pijat laktasi pada ibu post partum dengan nilai $p\text{-value} = 0,002 < 0,05$ untuk itu, bagi tenaga kesehatan atau bidan perlu mengajarkan pijat laktasi pada ibu mulai dari ibu memeriksakan kehamilannya pada trimester III atau menyarankan untuk ibu hamil/suami/pendamping cara melakukan pijat laktasi sehingga pada saat masa menyusui, ibu dan keluarga bisa melakukan dan menerapkannya tanpa adanya pendampingan dari petugas kesehatan atau bidan.

Hal ini sejalan juga dengan penelitian (Anita Oktafiani, 2021) yang menunjukkan bahwa rata-rata produksi ASI meningkat dan ada pengaruh pijat laktasi terhadap jumlah produksi ASI pada ibu menyusui dengan nilai $p = 0,001 < 0,05$. Untuk itu, pijat laktasi disarankan menjadi salah satu terapi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi ASI dan diterapkan pada ibu yang menyusui sehingga dapat mencegah sumbatan

saluran ASI dan menormalkan aliran darah yang melancarkan pengeluaran ASI.

5. Analisis Evaluasi Keperawatan

Setelah dilakukan intervensi pijat laktasi didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan produksi ASI, bayi menghisap terus menerus, bayi tidak menangis saat disusui dan pasien nampak rileks.. Intervensi pijat laktasi dilakukan selama 3 hari berturut-turut,. Pemberian intervensi pertama pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pada pukul 09.000 WITA kemudian di evaluasi pada pukul 14.40 hasil yang didapatkan produksi ASI 35 ml, ASI mulai lancar keluar. pemberian intervensi hari kedua Rabu, 19 Juli 2023 pada pukul 09.20 WITA kemudian di evaluasi pada pukul 13.15 hasil yang didapatkan produksi ASI 80 ml dan ada peningkatan 45 ml dari hari pertama, terdapat ASI lancar keluar. Pemberian intervensi hari ketiga kamis, 20 Juli 2023 pukul 09.20 kemudian di evaluasi pada pukul 13.50 hasil yang didapatkan produksi ASI 135 ml dan ada peningkatan 55 ml dari hari kedua, terdapat ASI lancar keluar dan memancar. Berdasarkan hal ini peneliti berasumsi bahwa intervensi pijat laktasi ini ternyata sangat efektif dan semakin sering dilakukan hasil yang diperoleh juga akan semakin bagus dan pijat laktasi juga bukan hanya dilakukan oleh perawat tetapi bisa juga dilakukan oleh pasien itu sendiri atau keluarga.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Fahmi, 2022) yang

mengatakan efek terhadap produksi ASI, produksi ASI lebih banyak dan ASI keluar lancar lebih awal yaitu pada hari kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produksi ASI ibu nifas dari 2,45 ml naik sebesar 9,80 ml. Hasil uji statistik didapatkan nilai sebesar 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh setelah dilakukan pijat laktasi terhadap produksi ASI

Sejalan juga dengan penelitian (Nisa, 2021) menunjukkan bahwa produksi ASI sebelum pijat laktasi didapatkan semuanya memiliki produksi ASI kurang dan setelah dilakukan pijat laktasi didapatkan sebagian besar memiliki produksi ASI yang lancar. Menurut asumsi peneliti, produksi ASI pada ibu nifas sebelum dilakukan pijat mengalami masalah ASI yaitu tidak lancar, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya rangsangan terhadap hormon yang mempengaruhi proses laktasi. Setelah dilakukan pijat laktasi produksi ASI ibu bertambah karena pijat laktasi dapat menenangkan pikiran ibu, membuat tubuh rileks, menormalkan aliran darah, mencegah sumbatan saluran ASI sehingga meningkatkan suplay ASI dan bayi dapat menyusu dengan baik.

B. Analisis Intervensi EPBN

Pemijatan laktasi ini menghasilkan ASI yang lebih meningkat. Pengeluaran ASI ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu produksi dan pengeluaran. Produksi ASI dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan sedangkan pengeluaran dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Hormon oksitosin akan

keluar melalui rangsangan ke puting susu melalui isapan mulut bayi atau melalui pijatan pada tulang belakang ibu bayi, dengan dilakukannya pemijatan ini ibu akan merasa tenang, rileks, meningkatkan ambang rasa nyeri dan mencintai bayinya, sehingga dengan begitu hormon oksitosin keluar dan ASI pun cepat keluar (Indria Uswatun, 2022)

Hormon oksitosin sangat berperan dalam proses pengeluaran ASI. Beberapa ibu post partum sering kali mengalami ketid klancaran pengeluaran Asi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi ASI yaitu perilaku menyusui, psikologis ibu, fisiologis ibu, sosial kultural ibu dan bayi, berat badan lahir bayi. Salah satu cara meningkatkan produksi ASI, salah satunya adalah dengan melakukan pemijatan laktasi (Indria Uswatun, 2022).

Berdasarkan pada penelitian dengan jumlah 30 responden, menunjukkan bahwa 15 responden pada kelompok intervensi dengan nilai rata-rata 123,33 dengan standar deviasi 11,28 , dan 15 responden pada kelompok kontrol dengan nilai 88,00 dengan standar deviasi 7,74. Dengan pengujian menggunakan uji statistik t-test independen didapatkan nilai $p=0,000$ lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$. Dengan demikian ada pengaruh pijat laktasi terhadap produksi ASI pada ibu post partum.

Penelitian ini juga sejalan dengan Malta, 2016. Dimana ia menjelaskan bahwa pijat laktasi adalah salah satu cara untuk mengurangi ketegangan dan memberikan rasa rileks yang dapat berdampak positif pada kelancaran produksi ASI karena refleks let down berjalan dengan baik. Studi penelitian

yang dilakukan Agustina Catur Setyaningrum dengan jumlah 22 responden didapatkan produksi ASI sebelum perlakuan didapatkan data tidak ada perbedaan signifikan (p value=0,073), sedangkan setelah perlakuan terdapat perbedaan yang signifikan (p value=0.010). ini menunjukkan adanya pengaruh pijat terhadap produksi ASI pada ibu post partum

Penelitian ini sejalan juga dengan Umy Naziroh dengan hasil penelitian 25 responden, sebelum dilakukan pemijatan sebagian responden pengeluaran ASI nya lancar sejumlah 0 (0%), cukup lancar sejumlah 8 ibu (32%), kurang lancar sejumlah 17 ibu (68%), sesudah dilakukan pemijatan sebagian responden pengeluaran ASI nya lancar sejumlah 25 ibu (100%). Penelitian ini menggunakan uji statistik Wilcoxon dimana menunjukkan bahwa nilai $p = 0.000 < \alpha (0,05)$ sehingga H_1 diterima. Kesimpulannya ini menunjukkan adanya pengaruh pijat terhadap kelancaran ASI pada ibu post partum di kab. Sidoarjo.

Asumsi peneliti menjelaskan bahwasannya pijat laktasi yang diterapkan peneliti mampu meningkatkan produksi ASI pada ibu post partum dan semakin sering dilakukan pijat laktasi akan semakin bagus pula hasilnya dan beberapa penelitian juga yang mendukung bahwasannya dilakukan pijat laktasi volume produksi ASI ibu menyusui mayoritas memiliki volume produksi ASI bertambah baik.

C. Keterbatasan

Keterbatasan dalam studi kasus ini yaitu pijat laktasi hanya diberikan satu kali dalam sehari dikarenakan kondisi pasiennya juga yang harus istirahat dan pergantian shift sehingga peneliti tidak bisa melakukan lebih dari satu kali dalam sehari.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada pasien yang menjadi responden, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pijat laktasi terbukti bermanfaat untuk meningkatkan produksi ASI dan memberikan rasa nyaman pada ibu.
2. Pengkajian dilakukan pada Ny.A berusia 28 tahun dengan status obstetrik G2P1A0 dan memiliki riwayat persalinan *Sectio Caesarea*
3. Diagnosis keperawatan menyusui tidak efektif, nyeri akut, dan resiko infeksi.
4. Intervensi keperawatan yang menjadi fokus peneliti ini yakni pijat laktasi untuk mengatasi masalah menyusui tidak efektif
5. Pelaksanaan implementasi keperawatan dilakukan selama 3 hari berturut-turut dalam upaya untuk meningkatkan produksi ASI
6. Proses evaluasi keperawatan pada pasien didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan produksi ASI
7. Pijat laktasi membuat pasien merasa rileks sehingga dapat menstimulus produksi hormon prolaktin dan oksitosin pada ibu menyusui untuk

meningkatkan produksi ASI.

B. Saran

Berdasarkan hasil studi kasus, ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti yang kiranya dapat menjadi pertimbangan:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memakai dua reposnden untuk melihat perbandingan bagaimana reaksi intervensi yang diberikan apakah antara pasien yang satu dengan yang kedua yang memiliki masalah yang sama apakah hasilnya juga akan sama.

2. Bagi Perawat

Sebagai referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan di ruangan dimana tindakan ini bisa menjadi sakah satu tindakan non farmakologi untuk mengatasi masalah gangguan menyusui tidak efektif pada ibu post partum.

3. Bagi institusi Pendidikan

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien menyusui tidak efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Trisnadewi, Oktaviani, R. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Anita Oktafiani. (2021). Pengaruh Pijat Laktasi Terhadap Jumlah Produksi Asi pada Ibu Menyusui. *Scientia Journal*, vol 10 no.
- Aprilianti. (2018). Pijat laktasi dan pijat oksitosin terhadap onset laktasi. *IIm Bidan*, vol 31 no.
- Arifin. (2019). *Produksi Asi pada Ibu Post Sectio Caesarea di Rumah Sakit Umum Sundari Medan*.
- Azizah, E. N., Prasetyarini, A., Damanik, C., Meihartati, T., Studi, P., & Kebidanan, I. (2023). *Pengaruh pijat laktasi terhadap kelancaran pengeluaran asi pada ibu post partum di wilayah kerja puskesmas baqa kota samarinda*. 86–94.
- Fahmi. (2022). Produksi Asi pada Ibu menyusui di BPM Mas Rolan Maternity And Neonatal. *Jurnal Kebidanan*, vol 10(2).
- Fitriani. (2021). Efektifitas Pijat Laktasi pada Pengeluaran Asi Ibu Post Partum di Puskesmas Aliyang Kota Pontianak. *Jurnal Kebidanan Khatulistiwa*, Vol 7 no 1, 9–14.
- Hasanah, I. U., Andriyani, A., & Tengah, J. (2023). *Penerapan Pijat Laktasi untuk Meningkatkan Produksi ASI pada Ibu Post Partum*. 02(01), 17–23.
- Hawks, B. dan H. (2022). *Dasar-dasar Keperawatan medik Bedah*. Elsevier Health Sciences.
- Hidayat. (2019). *Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian*. 1–13.
- Hidayati, S. (2017). *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah.
- Indria Uswatun. (2022). Penerapan Pijat Laktasi Terhadap Produksi ASI pada Ibu Post Partum. *Working Paper Universitas Aisyiyah Surakarta*.
- Jahriani. (2019). Pengaruh Pijat Laktasi Terhadap Produksi Asi pada Ibu Menyusui di Kelurahan Sendang Sari Kabupaten Asahan. *Excellent*

Midwifery Kournal, vol 2 no 2.

- Kurniawan. (2021). *Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. CV Budi Utama.
- Linda, E. (2019). *ASI Eksklusif* (T. Wiryanto, ed.). Jawa tengah: Yayasan Jamiul Fawaid.
- Lismawati. (2021). *Pengaruh pijat laktasi terhadap jumlah produksi Asi*. 1–7.
- M Quraisy Shihab. (2003). *Tafsir al-misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Metti, E. (2019). *Pengaruh Manajemen Laktasi Paket Breasts Terhadap Masalah Laktasi Ibu Menyusui Di Wilaya Kerja Puskesmas Nanggalo Padang*. vol XIII n.
- Nisa, Z. H. (2021). Pengaruh Sebelum dan Sesudah dilakukan Pijat Laktasi Terhadap Produksi Asi pada Ibu Post Partum di TPBM MA Depok. *Jurnal Ilmiah Kesehatan BPI, vol 5 no 2*.
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Pendekatan praktis Jakarta: Salemba Medika.
- Nuryani, P. (2018). *Modul Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Prodi Kebidanan Magetan.
- Pujiati. (2019). *Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada bayi*.
- Putri Dian Priharja, K. K. (2023). Pengaruh Pijat Laktasi Terhadap Pengeluaran ASI pada Ibu Post Partum Di RSUD Cengkareng. *Jurnal of Midwifery, vol 11 no.*
- Rabbika. (2021). *Efektifitas pijat laktasi terhadap produksi Asi pada ibu nifas di puskesmas purwanegara*. vol 10 no.
- Rahmawati, P. (2019). Analisis Faktor yang mempengaruhi Produksi ASI pada ibu menyusui yang berkerja. *Jurnal Ners Dan Kebidanan*.
- Rahmi. (2019). *Dokumentasi Keperawatan*. Bumi Medika.
- Ralista. (2020). *Asuhan Keperawatan pada klien Post Sectio Caesarea dengan Ketidakefektifan Pemberian ASI di Ruang Kalimaya Bawah Rumah Sakit Umum Daerah DR Slamet Garut*. 15–28.
- Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

- Sulfianti. (2021). *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas*. Yayasan Kita Menulis.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*.
Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Utami, R. (2021). Loving Lactation Of massage Effectiveness to Accelerating Laction Onset. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 55–66.
- Vivi Rinasa, M. S. (2023). *ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU POST PARTUM SPONTAN: MENYUSUI TIDAK EFEKTIF DENGAN INTERVENSI PIJAT*. 90.
- Wijaya FA. (2019). *Nutrisi Ideal untuk Bayi 0-6 Bulan*. vol 46 no.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Pekan Menyusui dunia UNICEF dan WHO menyerukan pemerintah dan pemangku kepentingan agar mendukung semua ibu menyusui di indonesia*.
- Yulianan dan Hul Hakim. (2020). *Emodemo Dalam Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Yuni Puji Widiastuti, R. pradara J. (2020). *Kelancaran produksi asi pada ibu post partum dengan operasi sesar*. (October 2019), 282–290.

Lampiran

Lampiran 1: Jurnal Utama EPBN



INDOGENIUS

Vol. 02 No. 01 Hal. 17-23

ISSN 2828-1365



9 772626 138001

Penerapan Pijat Laktasi untuk Meningkatkan Produksi ASI pada Ibu *Post Partum*

Indria Uswatun Hasanah¹, Annisa Andriyani²
¹Universitas 'Aisyiyah Surakarta, Indonesia

Korespondensi : Indria Uswatun Hasanah
Email : Indriuswatun14@gmail.com
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No.10 Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah, 089615298282

ABSTRAK

Tujuan: Untuk mengetahui hasil penerapan pijat laktasi terhadap peningkatan produksi ASI pada ibu *post partum*.
Metode: Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan. Intervensi yang dilakukan adalah pijat laktasi pada ibu *post partum*. Pijat laktasi dilaksanakan selama 7 hari dan untuk pengukurannya pada hari 1 sampai hari ke 7.
Hasil: Setelah diberikan intervensi pijat laktasi, produksi ASI meningkat dari 50 mL menjadi 250 mL pada Ny. M, dan 200 mL pada Ny. L.
Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan produksi ASI setelah dilakukan pijat laktasi.

Kata Kunci: ASI, Laktasi, Pijat, Post-partum

Pendahuluan

Air susu ibu (ASI) adalah sejenis makanan yang baik untuk mencapai semua kebutuhan fisik bayi. ASI mengandung sebagian besar bernutrisi hormon elemen dan kekebalan tubuh seorang bayi. Setelah itu bayi hanya akan mendapatkan ASI sampai bayi berumur enam bulan, setelah bayi umur enam bulan bayi akan diberikan makanan pendamping untuk ASI sampai bayi genap umur dua tahun (Nurkhofifah, 2021). ASI adalah jenis cairan hidup yang mengandung sel yang berbentuk darah putih yang begitu kompleks dan sangat unik. ASI yang di produksi dari kelenjar susu seorang ibu untuk menyusui bayinya. Keberhasilan proses ibu untuk menyusui bayinya ini hanya dapat berpegaruh oleh kondisi ibu sesudah dan sebelum ibu menyusui bayinya (Fiorenz, 2021).

Di Indonesia hanya ada satu dari dua bayi di bawah usia 6 bulan yang hanya bisa mendapat ASI eksklusif saja, dan lebih dari 5% anak masih menyusu ibunya pada bayi usia 23 bulan. Artinya, hanya setengahnya saja dari anak Indonesia yang tidak mendapatkan nutrisi yang hanya dibutuhkan dalam dua tahun pertama pada masa kehidupannya. Lebih dari 40% bayinya dapat memperkenalkan makanan untuk pendampingan ASI, sebelum mereka berusia

17 | Penerapan Pijat Laktasi untuk Meningkatkan Produksi ASI pada Ibu *Post Partum*

10.56359/ig.v2i1.133

Lampiran II: Standar Operasional Prosedur Pijat Laktasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pijat Laktasi	
Pengertian	Pijat laktasi pada umumnya dilakukan kepada seorang ibu yang memiliki masalah akan produksi ASI, ibu yang memiliki produksi ASI tidak lancar sangat dianjurkan untuk melakukan pijat laktasi.
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> g) Menenangkan pikiran h) Relaksasi tubuh i) Menormalkan aliran darah j) Mengatasi bengkak k) Meningkatkan suplay ASI l) Mencegah sumbatan pada payudara
Setting	Pasien dengan keadaan duduk di kursi dan perawat berada di belakang pasien
Alat dan Bahan	<ul style="list-style-type: none"> e. Kursi f. Baby oil g. Waslap h. Baskom
Proses	<p>Pra interaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> 6. Kontrak waktu dengan pasien 7. Menyiapkan alat dan mendekatkan ke pasien 8. Menyiapkan lingkungan yang nyaman 9. Mengatur posisi pasien 10. Mencuci tangan.
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Tahap Orientasi Salam Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> a. Perawat mengucapkan salam terhadap pasien b. Perawat menanyakan nama panggilan klien. 4. Evaluasi dan Validasi <ul style="list-style-type: none"> a. Tanyakan tentang perasaan pasien saat ini. b. Menanyakan masalah yang dirasakan. 5. Kontrak <ul style="list-style-type: none"> a. Perawat menjelaskan tujuan pijat laktasi b. Perawat menjelaskan prosedur tindakan
Tahap Kerja	<p>Tahap Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> 14. Mencuci tangan 15. Lakukan pemijatan mulai dari leher, bahu, punggung dan payudara lakukan gerakan tersebut 6 kali 16. Siapkan baby oil untuk kita balurkan ke punggung dan daerah yang akan kita pijat 17. Gerakan pertama memijat pada daerah leher dengan gerakan turun naik 18. Gerakan kedua memijat pada daerah bahu dengan menggunakan ibu jari

	<p>19. Gerakan ketiga susuri tulang belakang lalu pijat diantara sisi tulang belakang dari bawah keatas dengan gerakan memutar ibu jari setelah sampai ke atas tarik ke samping</p> <p>20. Gerakan keempat tarik dari sisi bawah ke atas dan ke samping</p> <p>21. Gerakan kelima lakukan gerakan mengusap menyamping dengan jempol di kedua sisi punggung belakang dari bawah sampai atas</p> <p>22. Gerakan keenam love sign menggunakan punggung – punggung jari</p> <p>23. Gerakan ketujuh pijat di daerah sekitar tulang belikat kiri dan kanan dengan gerakan kebawah</p> <p>24. Gerakan kedelapan memijat area payudara membentuk kupu-kupu dari dada,tengah hingga bawah payudara dan sekitar ketiak</p> <p>25. Gerakan kesembilan kompres payudara menggunakan air hangat selama 5 menit</p> <p>26. Gerakan kesepuluh pijat lembut bagian luar areola menggunakan posisi C-Hold</p>
Tahap Terminasi	<p>6. Evaluasi Tindakan</p> <p>7. Kontrak waktu untuk selanjutnya</p> <p>8. Berpamitan pada pasien</p> <p>9. Cuci tangan</p> <p>10. Dokumentasi</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Karya Tugas Akhir Ners dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien *Post Sectio Caesarea* dengan Menyusui Tidak Efektif Menggunakan Pijat Laktasi di RSUP Wahidin Sudirohusodo” bernama lengkap Suryani, S.Kep lahir di Parado pada tanggal 05 Mei 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Abd Salam dan Ibu Rosdiana. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Inpres Parado 2 pada tahun 2006-2012, selanjutnya pada tahun 2012-2015 penulis menempuh pendidikan menengah pertama di MTs Al-Mukhlisin Salama Parado, selanjutnya pada tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan menengah atas di MA Al-Mukhlisin Salama Parado. Karena penulis sangat tertarik dengan dunia kesehatan akhirnya penulis melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan S1 Keperawatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan di kampus Penulis sendiri aktif di beberapa organisasi internal kampus dan eksternal kampus, Pada tahun 2019 penulis pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Bima Dompu (HMBD) UIN Alauddin Makassar, pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan periode 2019-2020, wakil ketua HMIJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar periode 2020-2021, sekretaris umum Ikatan Mahasiswa Parado (IMPAR) Makassar periode 2020-2021, dan menjadi pengurus di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Kesehatan tahun 2021 dan pada tahun 2022. Dan pada tahun

2022 dengan usaha dan doa serta dukungan dari kedua orang tua penulis mendapatkan gelar sarjana keperawatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan profesi ners di kampus yang sama.

