

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA SINDROM GERIATRI  
*IMMOBILITY* DENGAN MASALAH GANGGUAN MOBILITAS FISIK  
MENGUNAKAN TERAPI *MASSAGE* MANURAK  
DI SENTRA GAU MABAJI GOWA**



**Tugas Akhir Ners**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ners Pada  
Program Studi Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**SITI NURAINI IRWAN**

**NIM:70900123011**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2024**

## PENGESAHAN KTI

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul " *Analisis Asuhan Keperawatan Pada Sindrom Geriatri Immobility Dengan Masalah Gangguan Mobilitas Fisik Menggunakan Terapi Massage Manurak Di Sentra Gau Mabaji* " yang disusun oleh Siti Nuraini Irwan, NIM: 70900123011, Mahasiswa Program Studi Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 05 Juni 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ners dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Profesi Ners.

Gowa, 07 Oktober 2024  
04 Rabiul Akhir 1446 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati., Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hasnah, S. Sit., S. Kep., Ns., M. Kes	(.....)
Munaqisy I	: Rasdyanah, S. Kep., Ns., M. Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh Raswan, S. Pd. M. Pd. I	(.....)
Pembimbing I	: Eny Sutria, S. Kep., Ns., M. Kep	(.....)
Pembimbing II	: Aidah Fitriani., S. Kep., Ns., M. Kep	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dewi Setiawati., Sp. OG., M. Kes  
19810621 200604 2 005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan Tugas Akhir Ners saudari(i) Siti Nuraini Irwan NIM: 70900123011, mahasiswa program studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Aluddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Sindrom Geriatri *Immobility* Dengan Masalah Gangguan Mobilitas Fisik Menggunakan Terapi *Massage* Manurak Di Sentra Gau Mabaji Gowa”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut ialah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 31 Mei 2024



**Eny Sutria. S.Kep..Ns..M.Kep**

**Pembimbing I**

**Aidah Fitriani. S.Kep..Ns..M.Kep**

**Pembimbing II**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala. Karena berkat izin dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir Ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Sindrom Geriatri *Immobility* Dengan Masalah Gangguan Mobilitas Fisik Menggunakan Terapi *Massage* Manurak Di Sentra Gau Mabaji Gowa”. Tak lupa pula Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan sekarang ini.

Penyusunan Karya Akhir Ners ini merupakan salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Ners dari Program Studi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa didalam penyusunan Karya Akhir Ners ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang banyak memberikan doa, dukungan dan semangat serta energi positif hingga Karya Akhir Ners ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tulus, penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Alm. Ayahanda H. Irwan Piara, SE.,M.A.B, seseorang yang biasa saya sebut sebagai papa dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Allhamdulillah kini saya telah berada ditahap kedua, banyak hal yang menyakitkan yang telah saya lalui, tanpa sosok papa dan tanpa figur yang mengarahkan sudah

cukup babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu jawaban atas pengabdianku untukmu, maaf jikalau ini sangat cukup terlambat jika dibandingkan dengan umurmu. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, pada perjalanan ini harus saya lewati sendiri dan lagi-lagi tanpa kau temani.

2. Ibunda Hj. Sumyati Zikir Robo, S.Pd, sosok perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, kerja keras dan sudah menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada pada tahap ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi mama agar selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian dalam hidup saya.
3. Hj. Hawa Piara, seseorang yang darahnya juga ikut mengalir dalam tubuh saya, sosok perempuan yang saya kenal dengan sebutan nenek. Terimakasih sudah membimbing, merawat dan ikut membesarkan saya sejak kecil. Terimakasih untuk semua berkat doa dan dukungan sehingga saya bisa berada pada tahap ini. Menjadi salah cucu dari sosok dirimu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan. Semoga kebaikanmu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.
4. Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus ini.
5. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG. M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, para wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengelolah, serta mengurus administrasi selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. Hasnah, S.SIT.,S.Kep., Ns., M.Kep selaku Ketua Program Studi Ners dan Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes, selaku Sekretaris Program Studi Ners beserta staf dan

dosen pengajar yang telah ikhlas dan sabar memberi bimbingan, gagasan, serta motivasi selama penulis menempuh Pendidikan di Jurusan Keperawatan.

7. Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing I dan Aidah Fitriani, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya dengan ikhlas untuk mengarahkan, membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
8. Rasdiyanah, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku penguji I dan Dr. Muh Raswan, S.Pd.M. Pd.I selaku penguji agama yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan tanggapan yang membangun sehingga penulis dapat mengskripsikan karya yang berkualitas.
9. Para dosen dan seluruh staf program studi profesi ners yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam pendidikan
10. Muhammad Jabir Irwan dan Siti Nursafa Irwan, saudara/i terbaik yang selalu kebersamai meniti pahitnya kehidupan hingga diusia sekarang. Terimakasih sudah menguatkan dan sudah mau tumbuh bersama untuk mewujudkan impian mama dan Alm. papa.
11. Nurul Humairah, Della Safitra dan Nofyani Fahriska sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menemani penulis hingga pada tahap ini, meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apapun yang menjadi impian saya.
12. Kepada keluarga besar teman-teman seperjuangan program profesi ners angkatan XXIII yang telah memberikan support, bantuan dan kebersamai dalam menempuh pendidikan
13. *Last but not least*, kepada diri sendiri, Siti Nuraini Irwan. Terimakasih telah berusaha dan bertahan sejauh ini. Terimakasih telah mampu mengendalikan diri. Maaf sudah mengambil jatah istirahatmu terlalu sering, maaf sudah cukup keras

kediri sendiri dan maaf sudah memaksamu bekerja seperti mesin. Mari menjadi lebih kuat setelah ini, tumbuh lebih dewasa lagi, dan berjuang lebih giat lagi. Ini merupakan pencapaian kedua yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, yang lisan maupun tulisan selama penulis menimba ilmu di kampus peradaban yang saya banggakan dan cintai Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tidak menutup kemungkinan dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak di sadari oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang sifatnya membangun untuk kemajuan ilmu penelitian. Karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wata'ala. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 31 Mei 2024

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**Siti Nuraini Irwan. S.Kep**

**NIM:70900113011**

## DAFTAR ISI

<b>Sampul</b>	
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Abstrak (Indonesia).....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Teori Sindrom Geriatri Immobility.....	7
B. Konsep Keperawatan .....	11
C. Pendekatan Teori Yang Digunakan .....	37
D. Evidence Based Practice In Nursing.....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Rancangan Studi Kasus .....	49
B. Subyek Studi Kasus .....	49
C. Fokus Studi Kasus .....	49

D. Instrumen Studi Kasus .....	50
E. Prosedur Pengambilan Data.....	50
F. Tempat/Waktu Pengambilan Data.....	51
G. Analisis Data Dan Penyaji Data.....	51
H. Etika Studi Kasus.....	52
<b>BAB IV LAPORAN KASUS</b>	
A. Pengkajian.....	54
B. Diagnosis .....	77
C. Intervensi .....	79
D. Implementasi.....	83
E. Evaluasi.....	97
F. Analisis Intervensi terapi massage manurak.....	100
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis pengkajian.....	104
B. Analisis diagnosis .....	106
C. Analisis intervensi.....	110
D. Analisis implementasi.....	111
E. Analisis evalausi .....	113
F. Analisis Intervensi EBPN .....	115
G. Keterbatasan.....	121
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>132</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Derajat Kekuatan Otot .....	18
Tabel 2.2 Gangguan Mobilitas Fisik .....	23
Tabel 2.3 Nyeri Kronik .....	24
Tabel 2.4 Nyeri Akut .....	24
Tabel 2.5 Intoleransi Aktivitas .....	25
Tabel 2.6. Defisit Perawatan Diri .....	26
Tabel 2.7 Intervensi Dukungan Ambulasi .....	28
Tabel 2.8 Intervensi Manajemen Nyeri .....	29
Tabel 2.9 Intervensi Manajemen Energi .....	32
Tabel 2.10 Intervensi Perawatan Diri .....	33
Tabel 2.11 Intervensi Pencegahan Jatuh .....	34
Tabel 2.12 SOP Terapi Massage Manurak .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Effleurage</i> .....	39
Gambar 2.2 <i>Friction</i> .....	40
Gambar 2.3 <i>Tapotement Beating</i> .....	41
Gambar 2.4 <i>Tapotement Hacking</i> .....	41
Gambar 2.5 <i>Tapotement Clapping</i> .....	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

Nama : Siti Nuraini Irwan

NIM : 70900123011

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Sindrom Geriatri *Immobility* Dengan Masalah Gangguan Mobilitas Fisik Menggunakan Terapi *Massage* Manurak Di Sentra Gau Mabaji Gowa

---

Latar Belakang: Sindrom geriatri *immobility* pada lansia yang mengalami masalah gangguan mobilitas fisik adalah tidak dapat bergerak bebas /tirah baring lama dengan gerak anatomi tubuh menghilang akibat perubahan fungsi fisiologis. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan fisiologis pada lansia. Berbagai masalah kesehatan pada lansia yang menjadi kondisi kronik adalah penyakit sendi yang menyebabkan terjadinya *immobility*. Salah satu intervensi non farmakologis yang dapat diberikan adalah terapi *massage* manurak.

Tujuan: diketahui analisis asuhan keperawatan pada sindrom geriatri *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas fisik menggunakan terapi *massage* manurak di Sentra Gau Mabaji Gowa.

Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, subjek yang digunakan ialah adalah lansia yang mengalami masalah *immobility* dengan gangguan mobilitas fisik, yang berusia >60 tahun. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah format pengkajian lansia dan standar operasional prosedur (SOP) serta lembar observasi Elderly Mobility Scale (EMS) dalam melakukan intervensi terapi *massage* manurak.

Hasil: Pemberian terapi *massage* manurak dilakukan selama 4 x 24 jam atau 4 hari didapatkan hasil bahwa setelah pemberian intervensi terjadi peningkatan dari skor 4 meningkat ke skor 7 dengan kategori bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar, seperti berpindah tempat, ke toilet, dan berpakaian.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil evaluasi kasus intervensi terapi *massage* manurak efektif dalam meningkatkan kekuatan otot dan pergerakan ekstermitas pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas.

**Kata Kunci : *Massage* Manurak, *Immobility*, Lansia,**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Lansia adalah tahap akhir dari siklus hidup manusia, dimana manusia tersebut pastinya akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun mental. Proses penuaan merupakan proses alami yang dapat menyebabkan perubahan anatomis, psikologis, dan biokimia pada jaringan tubuh yang dapat mempengaruhi fungsi, kemampuan badan dan jiwa (Nugroho, 2014). Lansia merupakan seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut proses penuaan. Meningkatnya usia lansia berarti akan bertambahnya masalah kesehatan pada lansia. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan fisiologis pada lansia. Berbagai masalah kesehatan pada lansia yang menjadi kondisi kronik adalah penyakit sendi yang menyebabkan terjadinya *immobility* (Purwandari, 2023). *Immobility* adalah dimana seseorang tidak dapat bergerak bebas /tirah baring lama dengan gerak anatomi tubuh menghilang akibat perubahan fungsi fisiologis.

Data *World Health Organization* (WHO) di kawasan Asia Tenggara populasi Lansia sebesar 8% atau sekitar 142 juta jiwa. Jumlah lansia di Indonesia berdasarkan badan pusat statistik (BPS) Pada tahun 2022, jumlah lansia usia 60 tahun ke atas sebesar 10,8% atau sekitar 29,3 juta orang. Jumlah tersebut diproyeksikan akan berlipat ganda menjadi 1,5 miliar pada tahun 2050. Jumlah lansia di provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 1.001.919 jiwa berdasarkan badan pusat statistik pada tahun 2022. Kemudian jumlah lansia di kabupaten Gowa berdasarkan badan

pusat statistik 2022, tercatat jumlah penduduk lansia 8.91 ribu jiwa. Jumlah lansia yang tercatat di Sentra Gau Mabaji sebanyak 26 jiwa dan terdapat 5 lansia yang mengalami sindrom *immobility*.

Proses penuaan pada lansia akan mengakibatkan organ-organ tubuh mengalami perubahan anatomik dan fungsinya (Pinontoan et al., 2015). Tubuh akan menjadi semakin rentan mengalami gangguan kesehatan seperti menurunnya fungsi-fungsi organ, dikarenakan semakin bertambahnya usia. Salah satu yaitu menurunnya kekuatan dan keseimbangan tubuh lansia. Berkurangnya kepadatan tulang dan struktur otot mengalami penuaan (Kusumo, 2020).

Seiring dengan pertambahan usia pada lansia akan terjadi penurunan fungsi dan kemampuan tubuh yang berlangsung secara berkesinambungan dengan menurunnya kekuatan otot. Perubahan menyeluruh pada seorang lanjut usia terutama pada fisiknya akan berkaitan dengan menurunnya kemampuan jaringan tubuh salah satunya fungsi fisiologis di sistem muskuloskeletal. Hambatan mobillitas akibat perubahan patologis pada sistem muskuloskeletal berupa penurunan kekuatan dan ketangkasan otot, kontraktur yang membatasi mobilitas sendi, kekakuan dan nyeri pada sendi. Selain perubahan fisiologis, lansia juga mengalami perubahan morfologis. Efek dari perubahan morfologis otot adalah penurunan kekuatan otot, penurunan fleksibilitas, dan penurunan kinerja fungsional otot. Kekuatan otot pada lansia akan berkurang 10- 15% per minggu dan sebanyak 5,5% dapat hilang setiap hari pada kondisi istirahat dan mobilitas sepenuhnya (Adriani & Sary, 2019)

Kepadatan tulang dan struktur otot yang mengalami penurunan dapat disebabkan oleh banyak faktor. Penurunan massa otot merupakan salah satunya.

Pada umur 40 tahun akan mulai terjadi proses penurunan kekuatan otot dan pada usia 75 tahun proses tersebut akan semakin cepat (Setiorini, 2021) Kebocoran kalsium dari kelompok protein dalam sel otot yang disebut ryanodine merupakan penyebab menurunnya kekuatan otot pada lansia. Kebocoran tersebut akan mengakibatkan berkurangnya kalsium yang memicu kontraksi otot melemah (Pinontoan et al., 2015) Hasil penelitian Lintin & Miranti (2019), mengenai hubungan penurunan kekuatan otot dan massa otot dengan proses penuaan pada individu lanjut usia yang sehat secara fisik menyebutkan kekuatan otot yang menurun akan mengakibatkan kehilangan kekuatan otot, diakibatkan dengan adanya penambahan usia yang akan menurunkan jumlah dan ukuran serabut skelet. Penurunan kekuatan otot pada lansia memiliki prevalensi yang tinggi yaitu 40,9%. Pada lansia salah satu bagian tubuh yang mengalami penurunan kekuatan otot adalah pada ekstremitas bawah. Kekuatan otot ekstremitas bawah mengalami penurunan dikarenakan adanya proses degenerasi. Faktor yang paling penting untuk seorang berdiri, bergerak, dan melakukan aktivitas sehari-hari adalah kekuatan otot ekstremitas bawah, dengan adanya penurunan kekuatan otot.

Berdasarkan penelitian Pratiwi et al (2021), mengenai gambaran kekuatan otot pada lansia di Ryukyu Medicals Okinawa Japan pada 68 responden. Sebanyak 24 responden lansia usia 60-74 tahun, 35 responden lansia usia 75-90 tahun, dan sebanyak 9 responden usia lebih dari 90 tahun. Secara keseluruhan dari 68 responden memiliki kekuatan otot yang rendah pada setiap gerakan. Berdasarkan pengukuran pada kaki kanan sebanyak 27 responden memiliki kekuatan otot kaki kanan dapat melawan tahanan tetapi masih lemah. Pada pengukuran kaki kiri sebanyak 21 responden memiliki kekuatan otot kaki dapat melawan tahanan tetapi

masih lemah. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan otot akan semakin menurun seiring dengan penambahan usia atau proses penuaan.

Akibat penurunan/kelemahan kekuatan otot yaitu atrofi otot, hemiplegia (kelumpuhan), paraplegia dan malformasi (Hall & Guyton, 2014). Penanganan dibutuhkan segera untuk mengurangi kekakuan pada otot dan meningkatkan pergerakan ialah yaitu Terapi Massage. Terapi Massage bermanfaat untuk merileksasikan otot-otot yang tegang (Aslan & Altın, 2022; Daryanti et al., 2022), dan melancarkan peredaran darah. Otot yang tidak rileks akan mengganggu peredaran darah, pembuluh limfe, dan persarafan (Anwar et al., 2022). Akibatnya, peredaran darah menjadi kurang lancar dan saraf menjadi kurang sensitif. Oleh sebab itu perlu penanganan yang memadai dengan perencanaan yang tepat untuk dapat mengatasi masalah kelemahan otot yang dapat mempengaruhi tugas fungsional sehari-hari (Kunaryanti et al., 2018).

Terapi Massage juga mampu meningkatkan kekuatan otot ekstremitas. Pemijatan/massage merupakan pengobatan yang diyakini dapat mencegah dan memulihkan kesehatan, serta sudah diakui oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) (Amirudin et al., 2018). Massage mampu memperlancar peredaran darah, mengendurkan otot yang tegang, meningkatkan produksi hormon endorphine, meningkatkan sirkulasi darah dan limfe, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan range of movement (ROM), meningkatkan elastisitas jaringan, dan merelaksasikan otot (Graha, 2019). Salah satu terapi massage yaitu terapi massage manurak. Terapi ini terdiri dari manipulasi Effleurage, Friction, dan Tapotement yang memiliki manfaat untuk merangsang keluarnya endorfin, menurunkan tingkat kekakuan otot, dan mengurangi rasa nyeri. Gerak dalam massage manurak terdiri dari loosening,

stretching, dan proprioceptive neuROMuscular facilitation (PNF). Gerak dalam massage manurak memiliki manfaat untuk meningkatkan ruang gerak sendi (ROM) dan mengembalikan posisi sendi jika terjadi pergeseran (Reposisi) (Alfen, 2022).

Berdasarkan urian diatas, maka penulis merasa penting untuk menganalisis terkait “asuhan keperawatan pada sindrom geriatri *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas fisik menggunakan terapi *massage* manurak di Sentra Gau Mabaji Gowa”.

## **B. Rumusan masalah**

Bagaimana “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Sindrom Geriatri *Immobility* Dengan Masalah Gangguan Mobilitas Fisik Menggunakan Terapi *Massage* Manurak Di Sentra Gau Mabaji Gowa”?

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan umum**

Diketahui analisis asuhan keperawatan pada sindrom geriatri *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas fisik menggunakan terapi *massage* manurak di Sentra Gau Mabaji Gowa.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Diketahui analisis hasil pengkajian pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility*
- b. Diketahui analisis diagnosis pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility*
- c. Diketahui analisis intervensi pada lansia yang mengalami sindrom geriatri

*immobility*

- d. Diketahui analisis implementasi pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility*
- e. Diketahui analisis evaluasi pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility*
- f. Diketahui analisis asuhan keperawatan pada sindrom geriatri *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas fisik menggunakan terapi *massage* manurak

#### **D. Manfaat**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca sehingga menjadi referensi untuk pembuatan artikel atau jurnal kesehatan yang membahas tentang asuhan keperawatan sindrom geriatri *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas fisik menggunakan terapi *massage* manurak

##### 2. Manfaat Aplikatif

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pemberian intervensi pada lansia yang mengalami sindrom geriatris *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas fisik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep teori sindrom geriatri *immobility*

##### 1. Definisi

Sindrom geriatri merupakan serangkaian kondisi klinik pada orang tua yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan dikaitkan dengan kecatatatan (disfungsi status fungsional). Sindrom geriatri memiliki lima karakteristik yang membedakan gejala penuaan yaitu multipatologi (memiliki lebih dari satu penyakit kronis degeneratif), daya cadangan faali menurun karena fungsi organ yang menurun, gejala dan penyakit yang tidak jelas tandanya, mengalami penurunan status fungsional, dan malnutrisi. (Sunarti, 2019)

Sindrom geriatri yang biasa ditemui pada lansia adalah *immobility* (kondisi dimana seseorang tidak bergerak), *instabilitas* (mudah terjatuh karena gangguan keseimbangan), *inkontinensia urin dan alvi/fekal* (keluarnya urin yang tidak terkendali dan diwaktu yang tidak tepat), *insomnia* (gangguan tidur), *infaction* (infeksi), *impairment of senses* (gangguan fungsi indra), *inanination* (gangguan gizi), *iatrogenik* (masalah yang disebabkan tindakan medis atau obat-obatan), *insomnia* (gangguan pola tidur), *intellectual impairment* (gangguan fungsi kognitif) *isolation* (isolasi atau menarik diri), *impecunity* (berkurangnya kemampuan memperoleh keuangan), *impaction* (konstipasi), *immune deficiency* (gangguan sistem imun) dan *impotence* (gangguan fungsi seksualitas). (Kamila, 2023)

*Immobility* adalah keadaan tidak bergerak atau tirah baring selama 3 (tiga)

hari atau lebih, diiringi gerak anatomis tubuh yang menghilang akibat perubahan fungsi fisiologis. *Immobility* merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup besar di bidang geriatri, sebagai akibat dari penyakit atau masalah psikososial yang diderita pasien. Immobilitas menyebabkan komplikasi lain yang lebih besar pada pasien geriatri bila tidak ditangani dengan baik. Misalnya, gangguan keseimbangan (*instabilitas*) akan memudahkan pasien geriatri terjatuh dan dapat mengalami patah tulang (Sunarti, 2019)

## 2. Penyebab sindrom geriatri *immobility*

Penyebab dari sindrom geriatri *immobility* dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik fisik, psikologis, dan lingkungan dapat menyebabkan *immobility* pada lansia. Beberapa penyebab utama *immobility* pada lansia ialah adanya rasa nyeri, lemah, kekuatan otot menurun, ketidakseimbangan, dan masalah psikologis. Rasa nyeri yang dirasakan baik dari tulang (osteoporosis, osteomalasia, penyakit paget, metastase kanker pada tulang, trauma), sendi (osteoarthritis, arthritis ramatoid, gout), otot (polimialgi, pseudoklaudikasio), atau masalah pada kaki dapat menyebabkan *immobility* (Sunarti, 2019).

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan bahwa datangnya sehat sakit dari dia sendiri, dan kita sebagai manusia perlu mencari tahu cara memperoleh penyembuhan, hal tersebut telah dicantumkan pada firman Allah pada Qs. Asy Syu'ara' /26:80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِدْتُ

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” (Qs Asy Syu’ara’ /26:80)

Dalam tafsir al misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut menandakan bahwa sehat sakit adalah suatu kepastian dalam hidup manusia yang harus dicari kesembuhannya. Nabi Ibrahim a.s menegaskan bahwa penyerahan diri keada Allah terhadap suatu penyakit yang diderita bukan berarti upaya manusia untuk mencapai kesembuhan atau pemulihan tidak diperlukan lagi. Sekian dari banyaknya hadis Nabi saw. Yang memerintahkan umatnya untuk berobat. Kemudian ucapan Nabi Ibrahim a.s hanya bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala penyebab penyakit adalah dari Allah swt. Maksud dari penjelasan ayat ini bahwa Allah yang menyembuhkan manusia dari sakit, Allah berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita oleh seseorang, meskipun demikian, manusia juga harus mencari tahu cara untuk memperoleh kesembuhan itu (Shihab 2012).

### 3. Manifestasi klinis sindrom geriatri *immobility*

Manifestasi klinis pada sindrom geriatri *immobility* menurut (Sunarti, 2019)

- a. Gangguan immobilisasi permanen
- b. Tidak mampu bergerak atau beraktivitas sesuai kebutuhan
- c. Keterbatasan menggerakkan sendi
- d. Adanya gangguan aktivitas
- e. Penurunan ADL dibantu orang lain

- f. Kehilangan daya tahan
- g. Kekuatan otot menurun
- h. Atrofi

4. Pemeriksaan diagnostik sindrom geriatri *immobility*

Pemeriksaan diagnostik sindrom geriatri *immobility* dapat dilakukan dengan cara melakukan pengkajian atau anamnesis secara menyeluruh, antara lain:

- a. Melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap sistem tubuh, seperti pengkajian tentang sistem kardiovaskular, sistem muskuloskeletal (gangguan mobilitas, kekakuan sendi, penurunan kekuatan otot, sistem eliminasi (inkontinensia tinja dan inkontinensia urin), sistem saraf pusat, dan sistem pernapasan baik saluran pernapasan bagian atas maupun saluran pernapasan bagian bawah
- b. Pengkajian terkait kebiasaan buruk bagi kesehatan seperti minum alkohol atau kebiasaan merokok
- c. Pengkajian terhadap lingkungan dan keseharian lansia, misalnya kondisi rumah tempat tinggal
- d. Pengkajian terkait obat yang dikonsumsi atau pernah dikonsumsi sebelumnya
- e. Pengkajian nutrisi
- f. Pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang
- g. Pemeriksaan penunjang biasanya dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami pasien, pemeriksaan umum Yang dilakukan adalah pemeriksaan

darah rutin, EKG, pemeriksaan foto thorax, dan sebagainya

5. Penatalaksanaan sindrom geriatri *immobility*

Penatalaksanaan sindrom geriatri *immobility* menurut Sunarti (2019) dibagi menjadi dua cara yaitu dengan cara farmakologis dan non- farmakologis, antara lain:

a. Farmakologis

Cara yang dapat dilakukan pada pasien yang mengalami sindrom *immobility* adalah dengan cara pemberian antikogulan seperti LDG (*Low dose heparin*) dan LMWH (*low molecular weight heparin*) yaitu profilaksis yang efektif untuk pasien gangguan mobilisasi

b. Non farmakologi

Salah satu cara nonfarmakologis yang kita lakukan yaitu relaksasi benson secara rutin dan teratur untuk mengurangi rasa nyeri dan memperlancar sirkulasi darah khususnya pada lansia yang mengalami tirah baring lama, hal ini disebabkan karena saat menghirup nafas mendapatkan oksigen yang sangat diperlukan tubuh untuk membersihkan darah dan mencegah kerusakan jaringan otak akibat kekurangan oksigen (hipoksia). Saat tarik nafas panjang otot-otot dinding perut menekan iga bagian bawah kearah belakang serta mendorong sekat diafragma ke atas dapat berakibat meninggikan tekanan intra abdominal, sehingga dapat merangsang aliran darah menjadi meningkat keseluruh tubuh terutama organ-organ vital seperti otak, sehingga O<sub>2</sub> tercukupi didalam otak dan tubuh menjadirileks

## B. Konsep Asuhan Keperawatan

### 1. Pengkajian keperawatan (Fokus pengkajian *immobility*)

Pengkajian keperawatan pada lansia adalah suatu tindakan peninjauan situasi lansia untuk memperoleh data dengan maksud menegaskan situasi penyakit, diagnosis masalah, penetapan kekuatan, dan kebutuhan promosi kesehatan lansia. Data yang dikumpulkan mencakup data subjektif dan objektif meliputi data bio, psiko, sosial, dan spiritual, data yang berhubungan dengan masalah lansia serta data tentang keluarga dan lingkungan yang ada (Kholifah, 2016).

#### a. Identitas Klien

Anamnesa identitas pasien meliputi nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, agama, alamat, tanggal masuk PSTW (Nasrullah, 2016).

#### b. Identitas Penanggung Jawab

Identitas penanggung jawab sangat perlu untuk memudahkan dan jadi penanggung jawab klien selama perawatan, data yang terkumpul meliputi nama, umur, pendidikan, pekerjaan, hubungan dengan klien dan alamat.

#### c. Keluhan Utama

Keluhan utama pasien dengan gangguan muskuloskeletal akibat penyakit degenerasi yang menyebabkan gangguan mobilitas menurut Hermayudi dan Ariani (2017) adalah sebagai berikut :

### 1) Nyeri

Biasanya nyeri pada muskuloskeletal, nyeri saat bergerak, Identifikasi apakah nyeri timbul setelah diberi aktivitas atau Gerakan. Nyeri saat bergerak merupakan satu tanda masalah persendian. Degenerasi panggul menimbulkan nyeri selama badan bertumpu pada sendi tersebut. Degenerasi pada lutut menimbulkan nyeri selama dan setelah berjalan. Nyeri pada osteoartritis makin meningkat pada suhu dingin. Identifikasi apakah nyeri dapat diatasi dengan obat tertentu.

### 2) Kekakuan Sendi

Identifikasi sendi yang mengalami kekakuan, lamanya kekakuan tersebut dan apakah selalu terjadi remisi kekakuan beberapa kali sehari. Pada penyakit degenerasi sendi sering mengalami kekakuan yang meningkat pada pagi hari setelah bangun tidur kekakuan sendi yang meningkat pada pagi hari setelah bangun tidur.

### 3) Bengkak

Penyakit degenerasi sendi sering kali tidak timbul bengkak pada awal serangan, tetapi muncul setelah beberapa minggu terjadi nyeri.

### 4) Deformitas dan Imobilitas

Identifikasi kapan terjadinya apakah tiba-tiba atau bertahap, apakah menimbulkan keterbatasan gerak, apakah semakin memburuk dengan aktivitas, apakah klien menggunakan alat bantu.

### 5) Perubahan Sensori

Identifikasi apakah ada penurunan rasa pada bagian tubuh tertentu, menurunnya rasa atau sensasi tersebut berkaitan dengan nyeri. Penekanan pada saraf dan pembuluh darah akibat bengkak, tumor atau fraktur dapat menyebabkan menurunnya sensasi

d. Riwayat Penyakit Sekarang

Pengkajian riwayat kesehatan pasien sekarang terdiri dari alasan pasien yang menjadi penyebab terjadinya keluhan atau hambatan dalam gangguan mobilitas seperti adanya nyeri, kelemahan otot, kelelahan, tingkat gangguan mobilitas, daerah terganggunya akibat gangguan mobilitas dan lama terjadinya gangguan mobilitas (Nasrullah, 2016).

e. Riwayat Penyakit Dahulu

Riwayat penyakit dahulu dikaji yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan mobilitas contohnya adanya riwayat penyakit sistem neurologis (kecelakaan serebrovaskular, trauma kepala, peningkatan tekanan intrakranial, myasthenia gravis, guillain-barre, cedera medula spinalis dan lain-lain), riwayat penyakit sistem (kardiovaskuler infark miokard, gagal jantung kongestif), riwayat penyakit sistem pernapasan (penyakit paru obstruksi menahun, pneumonia dan lain-lain), Riwayat pemakaian obat sedatif, hipnotik, depresan sistem saraf pusat, laksansia dan lain-lain ( Nasrullah, 2016).

f. Riwayat Penyakit Keluarga

Riwayat penyakit keluarga perlu diketahui untuk menentukan hubungan genetik yang perlu diidentifikasi, misalnya penyakit DM yang

merupakan predisposisi penyakit sendi degeneratif, TBC, artritis, riketsia, osteomyelitis, dan lain-lain (Hermayudi dan Ariani, 2017)

g. Pemeriksaan Fisik

1) Keadaan Umum

Keadaan umum pasien biasanya ditemukan kelemahan (Aspiani, 2014 dalam Regina, 2018)

2) Kesadaran

Lansia dengan gangguan muskuloskeletal biasanya memiliki kesadaran kompos mentis. Pada kasus yang lebih parah klien dapat mengeluh pusing dan gelisah

3) Sistem Pernapasan

Pengkajian sistem pernafasan harus dilakukan minimal setiap 2 jam pada klien dengan keterbatasan aktivitas. Pengkajian pada sistem ini dapat terdiri dari:

- a) Inspeksi: Pergerakan dinding dada selama siklus inspirasi dan ekspirasi penuh. Jika klien mempunyai area atelektasis, gerakan dadanya menjadi asimetris (Nasrullah, 2016).
- b) Auskultasi: Seluruh area paru-paru untuk mengidentifikasi gangguan suara nafas, crackles, atau mengi. Auskultasi berfokus pada area paru-paru yang yang tergantung karena sekresi paru cenderung menumpuk di area bagian bawah (Nasrullah, 2016).

4) Sistem Kardiovaskuler

Pengkajian sistem kardiovaskuler yang harus dilakukan pada pasien

gangguan mobilitas adalah :

- a) Memantau tekanan darah, tekanan darah klien harus diukur, terutama saat tekanan dara berubah dari berbaring (rekumben) ke duduk atau berdiri akibat risiko terjadinya hipotensi ortostatik (Nasrullah, 2016).
- b) Mengevaluasi nadi apeks maupun nadi perifer, berbaring dalam posisi rekumben meningkatkan beban kerja jantung dan meningkat denyut nadi. Pada beberapa klien, terutama lansia, jantung tidak dapat mentoleransi peningkatan beban kerja dan berkembang menjadi gagal jantung. Suara jantung ketiga yang terdengar dibagian apeks merupakan indikasi awal gagal jantung kongestif. Memantau nadi perifer memungkinkan perawat mengevaluasi kemampuan jantung memompa darah (Nasrullah, 2016).
- c) Observasi adanya tanda-tanda adanya stasis vena (mis. Edema dan penyembuhan luka yang buruk), edema mengindikasikan ketidakmampuan jantung menagani peningkatan beban kerja. Karena edema bergerak diarea tubuh yang menggantung, pengkajian klien imobilisasi harus meliputi sakrum, tungkai dan kaki. Jika jantung tidak mampu mentoleransi peningkatan beban kerja, maka area tubuh perifer seperti tangan, kaki, hidung, dan daun telinga akan lebih dingin dari daerah pusat tubuh. Perawat mengkaji sistem vena karena *trombosis vena profunda* merupakan bahaya dari keterbatasan mobilitas. Embolus adalah trombus yang terlepas, berjalan mengikuti sistem sirkulasi ke paru-paru atau otak dan mengganggu sirkulasi (Nasrullah, 2016).

Untuk mengkaji trombosis vena profunda, perawat melepas stocking elastis klien dan atau sequential compression devices (SCDs) setiap 8 jam dan mengobservasi betis terhadap kemerahan, hangat, kelembaban. Tanda homan (Homan's sign) atau nyeri betis pada kaki dorsifleksi, mengidentifikasi kemungkinan adanya trombus, tetapi tanda ini tidak selalu ada. Ketika melakukan hal ini perawat menandai sebuah. Di setiap betis 10 cm dari tengah patela. Lingkar betis diukur setiap hari menggunakan tanda tersebut untuk penempatan alat pengukur. Penigkatan satu bagian diameter merupakan indikasi awal trombosis. Trombosis vena profunda juga dapat terjadi di paha untuk itu pengukuran paha harus dilakukan setiap hari apabila klien cenderung terjadi trombosis. Pada beberapa klien, trombosis vena profunda dapat dicegah dengan latihan aktif dan stoking elastis (Nasrullah, 2016).

##### 5) Sistem Metabolik

Ketika mengkaji fungsi metabolik, perawat menggunakan pengukuran antropometri untuk mengevaluasi atrofi otot, menggunakan pencatatan asupan dan haluaran serta data laboratorium untuk mengevaluasi status cairan elektrolit maupun kadar serum protein, mengkaji penyembuhan luka untuk mengevaluasi perubahan transport nutrisi, mengkaji asupan makanan dan pola eliminasi klien untuk menentukan perubahan fungsi gastrointestinal (Nasrullah, 2016).

Pengukuran asupan dan haluaran nutrisi membantu perawat untuk

menentukan apakah terjadi keseimbangan cairan. Dehidrasi dan edema dapat meningkatkan laju kerusakan kulit pada klien dengan gangguan mobilitas. Pengukuran laboratorium terhadap kadar elektrolit darah dapat mengindikasikan ketidakseimbangan elektrolit. Apabila klien dengan gangguan mobilitas mempunyai luka maka penyembuhan luka menunjukkan indikasi nutrisi yang dibawa ke jaringan. Kemajuan penyembuhan yang normal yang diindikasikan bahwa kebutuhan metabolisme jaringan luka terpenuhi. Pada umumnya anoreksia terjadi pada klien gangguan mobilitas. asupan makanan klien harus dikaji terlebih dahulu sebelum makanan diberikan. Ketidakseimbangan nutrisi dapat dihindari apabila perawat mengkaji pola makan klien dan makanan yang disukai sebelum keadaan gangguan mobilitas (Nasrullah, 2016).

#### 6) Sistem Muskuloskeletal

Kelainan muskuloskeletal utama dapat diidentifikasi selama pengkajian meliputi penurunan tonus otot, kehilangan masa otot, dan kontraktur. Gambaran pengukuran antropometrik mengidentifikasi kehilangan tonus dan massa otot. Pengkajian rentang gerak adalah penting karena merupakan data dasar yang hasil pengukurannya nanti dibandingkan untuk mengevaluasi terjadi kehilangan mobilisasi sendi. Berikut ini pengkajian derajat kekuatan otot (Nasrullah, 2016).

**Tabel 2.1 Derajat Kekuatan Otot**

<b>Skala</b>	<b>Persentase Kekuatan Otot (%)</b>	<b>Karakteristik</b>
0	0	Paralisis Sempurna
1	10	Tidak ada gerakan, kontraksi otot dapat dipalpasi atau dilihat
2	25	Gerakan otot penuh melawan gravitasi
3	50	Gerakan yang normal melawan gravitasi
4	75	Gerakan penuh yang normal melawan gravitasi dan melawan tahanan minimal
5	100	Kekuatan normal, gerakan penuh yang normal melawan gravitasi dan tahanan penuh

#### 7) Sistem Integumen

Biasanya ditemukan turgor kulit menurun. Kulit dapat mengalami atrofi akibat imobilitas yang lama. Selain itu, perpindahan cairan antar-kompartemen pada area tubuh yang menggantung dapat mengganggu keutuhan dan kesehatan dermis dan jaringan subkutan. Pada akhirnya kondisi ini akan menyebabkan penurunan elastisitas kulit. Selain itu ditemukan kerusakan kulit pada pasien dengan gangguan mobilitas. Kondisi dengan gangguan mobilitas dapat mengganggu sirkulasi dan suplai nutrisi menuju area tertentu. Ini mengakibatkan iskemia dan nekrosis jaringan superficial yang dapat menimbulkan ulkus dekubitus (Ambarwati, 2014).

#### 8) Sistem Eliminasi Klien

Status eliminasi klien harus dievaluasi setiap shift, dan total asupan dan haluaran dievaluasi setiap 24 jam. Perawat harus menentukan bahwa

klien menerima jumlah dan jenis cairan melalui oral atau parenteral dengan benar. Ketidakadekuatan asupan dan haluaran atau ketidakseimbangan cairan dan elektrolit dapat meningkatkan resiko gangguan sistem ginjal, terjadi perubahan dari infeksi berulang menjadi gagal ginjal. Dehidrasi juga meningkatkan risiko kerusakan kulit, pembentukan thrombus, infeksi pernafasan, dan konstipasi. Status eliminasi juga meliputi frekuensi dan konsistensi pengeluaran feses (Nasrullah, 2016).

9) Pengkajian status fungsional menggunakan Indeks Katz terdiri dari 6 pertanyaan untuk mencocokkan kondisi lansia dengan skor yang didapatkan

10) Pengkajian status kognitif dan efektif dengan menggunakan *Short Portable Mental* (SPMSQ) terdiri dari 10 pertanyaan dengan interpretasi kesalahan 0-2: fungsi intelektual utuh, kesalahan 3-4: fungsi intelektual ringan, kesalahan 5-7: fungsi intelektual sedang, kesalahan 8-10: fungsi intelektual berat (Damanik & Hasan, 2019).

11) Pengkajian skala depresi geriatri (Geriatric Depression Scale/GDS) dengan *Short Form* terdiri dari 15 pertanyaan dengan interpretasi 0-5: Normal, 6-10: Kemungkinan depresi dan >10: Depresi

12) Pengkajian skala jatuh morse (Morse Fall Scale/MFS) yang terdiri dari 6 pertanyaan. Adapun interpretasinya yaitu tidak berisiko jatuh: 0-24, berisiko rendah: 25-50 dan berisiko tinggi  $\geq 51$

13) Pengkajian status sosial dengan menggunakan APGAR keluarga

yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan total skor 10. Adapun interpretasi penilaian 0-5: fungsi sosial kurang dan 6-10: fungsi sosial baik

14) Pengkajian Barthel Indeks yang terdiri dari 13 pertanyaan. Interpretasi penilaiannya lansia mandiri: 130, lansia ketergantungan sebagian: 60-125 dan lansia ketergantungan total: 55

15) Penilaian potensi dekubitus (Skor Norton) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan interpretasi 15-20: kecil sekali/tidak terjadi, 12-15: kemungkinan kecil terjadi

16) Identifikasi aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan MMSE (Mini Mental Status Exam) dengan mengkaji orientasi, registrasi, perhatian, kalkulasi dan mengingat kembali

17) Pengkajian Keseimbangan yang terdiri dari beberapa pertanyaan dengan melakukannya secara langsung. Adapun interpretasinya 0-5: risiko jatuh rendah, 6-10: risiko jatuh sedang dan 11-15: risiko jatuh tinggi

18) Pengkajian waktu duduk dan berdiri pasien, interpretasinya  $\leq 10$  detik: risiko jatuh rendah, 11-19 detik: risiko jatuh sedang, 20-29 detik: risiko jatuh tinggi dan  $\geq 30$  detik: gangguan mobilitas dan risiko jatuh tinggi (Damanik & Hasan, 2019)

## 2. Diagnosis keperawatan

Diagnosis keperawatan yang dapat terjadi pada lansia dengan sindrom geriatri *immobility* (SDKI, 2017), sebagai berikut:

### a. Gangguan mobilitas fisik

Definisi: keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas

secara mandiri

#### Penyebab

- 1) Kerusakan integritas struktur tulang
- 2) Perubahan metabolisme
- 3) Ketidakbugaran fisik
- 4) Penurunan kendali otot
- 5) Penurunan massa otot
- 6) Penurunan kekuatan otot
- 7) Keterlambatan perkembangan
- 8) Kekakuan sendi
- 9) Malnutrisi
- 10) Gangguan muskuloskeletal
- 11) Gangguan neuromuskular
- 12) Indeks massa tubuh di atas persentil ke 75 sesuai usia
- 13) Efek agen farmakologis
- 14) Program pembatasan gerak
- 15) Nyeri
- 16) Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik
- 17) Kecemasan
- 18) Gangguan kognitif
- 19) Keengganan melakukan pergerakan
- 20) Gangguan sensori persepsi

**Tabel 2.2 Gangguan Mobilitas Fisik**

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
Subjektif 1. Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas Objektif 1. Kekuatan otot menurun 2. Rentang gerak (ROM) menurun	Subjektif 1. Nyeri saat bergerak 2. Enggan melakukan pergerakan 3. Merasa cemas saat bergerak Objektif 1. Sendi kaku 2. Gerakan tidak terkoordinasi 3. Gerakan terbatas 4. Fisik lemah

b. Nyeri kronik

Definisi: pengalaman sensorial atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan berat dan konstan, yang berlangsung lebih dari 3 bulan.

Penyebab:

- 1) Kondisi muskuloskeletal kronik
- 2) Kerusakan sistem saraf
- 3) Penekanan saraf
- 4) Infiltrasi tumor
- 5) Ketidakseimbangan neurotransmitter, neuromodulator, dan reseptor
- 6) Gangguan imunitas (mis. Neuropati terkait HIV, virus varicella-zoster)
- 7) Gangguan fungsi metabolik
- 8) Riwayat posisi kerja statis
- 9) Peningkatan indeks massa tubuh
- 10) Kondisi pasca trauma
- 11) Tekanan emosional
- 12) Riwayat penganiayaan (mis. Fisik, psikologis, seksual)
- 13) Riwayat penyalahgunaan obat/zat

Batasan karakteristik

**Tabel 2.3 Nyeri Kronik**

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
Subjektif 1. Mengeluh nyeri 2. Merasa depresi (tertekan) Objektif 1. Tempak meringis 2. Gelisah 3. Tidak mampu menuntaskan aktivitas	Subjektif 1. Merasa takut mengalami cederaberulang Objektif 1. Bersikap protektif (mis. Menghindari nyeri) 2. Waspada 3. Pola tidur berubah 4. Anoreksia 5. Fokus menyempit 6. Berfokus pada diri sendiri

c. Nyeri akut

Definisi: pengalaman sensori atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan berat dan konstan, yang berlangsung kurang dari 3 bulan.

Penyebab:

- 1) Agen pencedera fisiologis (mis. Inflamasi, Iskemia, neoplasma)
- 2) Agen pencedera kimiawi (mis. Terbakar, bahan kimia iritan)
- 3) Agen pencedera fisik (mis. Abses, amputasi, trrbakar, terpototng, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan)

Batasan karakteristik

**Tabel 2.4 Nyeri Akut**

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
Subjektif 1 Mengeluh nyeri Objektif 1. Tempak meringis 2. Bersikap protektif (mis. Menghindari nyeri) 3. Gelisah 4. Frekuensi nadi meningkat 5. Sulit tidur	Subjektif (tidak tersedia) Objektif 1. Tekanan darah meningkat 2. Pola napas berubah 3. Nafsu makan berubah 4. Proses berpikir terganggu 5. Menarik diri 6. Berfokus pada diri sendiri 7. Diaforesis

d. Intoleransi aktivitas

Definisi: keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri

Penyebab:

- 1) Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen
- 2) Tirah baring
- 3) Kelemahan *Immobility*
- 4) Gaya hidup monoton

Batasan karakteristik

**Tabel 2.5 Intoleransi Aktivitas**

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
Subjektif 1. Mengeluh lelah 2. Frekuensi jantung meningkat >20% dan konsisi istirahat	Subjektif 1. Dyspnea saat/setelah beraktivitas 2. Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas 3. Merasa lemah Objektif 1. Tekanan darah berubah 2. Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah beraktivitas 3. Gambaran EKG menunjukkan iskemia 4. sianosis

e. Defisit perawatan diri

Definisi: tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatandiri

Penyebab:

- 1) Gangguan muskuloskeletal
- 2) Gangguan neuromuskuler
- 3) Kelemahan
- 4) Gangguan psikologis dan/ psikotik
- 5) Penurunan motivasi/ minat

Batasan karakteristik

**Tabel 2.6 Defisit perawatan diri**

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
Subjektif 1. Menolak melakukan perawatan diri Objektif 1. Tidak mampu mandi/mengeakan pakaian/makan/ketoilet/berhias secara mandiri 2. Minat melakukan perawatan diri kurang	Subjektif (tidak tersedia) Objektif (tidak tersedia)

f. Risiko jatuh

Definisi: berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh

Faktor risiko:

- 1) Berusia >65 tahun (pada dewasa) atau < 2 tahun (pada anak)
- 2) Riwayat jatuh
- 3) Anggota gerak bawah prostesis (bautan)
- 4) Penggunaan alat bantu berjalan
- 5) Penurunan tingkat kesadaran
- 6) Perubahan fungsi kognitif
- 7) Lingkungan tidak aman (mis. Licin, gelap, lingkungan asing)
- 8) Kondisi pasca operasi
- 9) Hipotensi ortostatik
- 10) Perubahan kadar glukosa darah
- 11) Anemia
- 12) Kekuatan otot menurun
- 13) Gangguan pendengaran
- 14) Gangguan keseimbangan
- 15) Gangguan penglihatan (mis. Glukoma, katarak, ablasio retina, neruritis optikus)
- 16) Neuropati

### 3. Intervensi keperawatan

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan data dari masalah yang ditemukan.

Intervensi yang dapat diterapkan berdasarkan (SIKI, 2018) pada lasnia dengan sindrom geriatri *immobility* antara lain :

#### a. Gangguan mobilitas fisik

Tujuan: setelah dilakukan tindakan selama ... x 24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan

Kriteria hasil:

- 1) Pergerakan ekstremitas meningkat
- 2) Kekuatan otot meningkat
- 3) Rentang gerak (ROM) meningkat
- 4) Nyeri menurun
- 5) Kecemasan menurun
- 6) Kaku sendi menurun
- 7) Gerakan tidak terkoordinasi menurun
- 8) Gerakan terbatas menurun
- 9) Kelemahan fisik menurun

**Tabel 2.7 Intervensi Dukungan ambulasi**

Intervensi	Rasional
<p>Dukungan ambulasi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya</li> <li>2. Identifikasi toleransi fisik melalui pergerakan</li> <li>3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi</li> <li>4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengurangi cedera pada bagian tubuh lain</li> <li>2. Untuk meminimalkan gerakan pada bagian tersebut</li> <li>3. Untuk mengidentifikasi faktor resiko terkena penyakit lain</li> <li>4. Untuk menghindari terjadinya komplikasi</li> </ol>
<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu</li> <li>2. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu</li> <li>3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memudahkan proses mobilisasi</li> <li>2. Agar memudahkan melakukan pergerakan</li> <li>3. Untuk membantu proses mobilisasi tersebut</li> </ol>
<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi</li> <li>2. Anjurkan melakukan mobilisasi ini</li> <li>3. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar pasien paham mengenai prosedur tindakan yang diberikan</li> <li>2. Untuk meminimalisir pergerakan mobilisasi yang banyak</li> <li>3. Agar pasien dan keluarga dapat melakukannya dengan individu</li> </ol>

b. Nyeri kronik

Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan nyeri kronik menurun dengan

Kriteria hasil:

- 1) Keluhan nyeri menurun
- 2) Merasa depresi menurun
- 3) Gelisah menurun
- 4) Perasaan takut mengalami cedera berulang menurun
- 5) Sikap protektif menurun
- 6) Pola tidur membaik

7) Anoreksia menurun

8) Fokus membaik

**Tabel 2.8 Intervensi Manajemen Nyeri**

Intervensi	Rasional
<p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas intensitas nyeri</li> <li>2. Identifikasi skala nyeri</li> <li>3. Identifikasi respon nyeri nonverbal</li> <li>4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</li> <li>5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri</li> <li>6. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri</li> <li>7. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup</li> <li>8. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan</li> <li>9. Monitor efek samping penggunaan analgetik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>2. Untuk mengetahui skala nyeri</li> <li>3. Untuk mengetahui mimik wajah yang diperlihatkan pasien saat nyeri muncul</li> <li>4. Untuk mengetahui apa saja yang memperberat dan memperingan keadaan nyeri</li> <li>5. Untuk mengetahui pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri</li> <li>6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya terhadap respon nyeri</li> <li>7. Untuk mengetahui pengaruh nyeri pada kualitas hidup</li> <li>8. Untuk mengetahui keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan</li> <li>9. Untuk mengetahui efek samping penggunaan analgetik</li> </ol>
<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aroma terapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain)</li> <li>2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. Suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)</li> <li>3. Fasilitasi istirahat dan tidur</li> <li>4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien dengan menggunakan teknik nonfarmakologis</li> <li>2. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien dan memberikan kenyamanan</li> <li>3. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien</li> <li>4. Agar strategi yang diberikan bisa efektif dalam meredakan nyeri</li> </ol>
<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri</li> <li>2. Jelaskan strategi meredakan nyeri</li> <li>3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri</li> <li>4. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memberikan pemahaman agar pasien tidak gelisah saat nyeri timbul</li> <li>2. Untuk mengontrol mengatasi nyeri ketika nyeri muncul</li> <li>3. Untuk memajemen nyeri secara mandiri</li> <li>4. Penggunaan analgetik yang tepat</li> </ol>

5. Ajarkan teknik nonfarmakologis 3. untuk mengurangi rasa nyeri	dapat mengurangi rasa nyeri 5. Untuk menghindari peningkatan nyeri
Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian analgetik,jika perlu	2. Untuk membantu menekan rasa nyeri

c. Nyeri akut

Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperaeatan selama ... x 24 jam,  
diharapkan nyeri akut menurun dengan

Kriteria hasil:

- 1) Keluhan nyeri menurun
- 2) Meringis menurun
- 3) Sikap protektif menurun
- 4) Gelisah menurun
- 5) Frekuensi nadi membaik
- 6) Kesulitan tidur membaik
- 7) Tekanan darah membaik
- 8) Pola napas membaik
- 9) Nafsu makan membaik
- 10) Prioses berpikir membaik
- 11) Mearik diri membaik
- 12) Berfokus pada diri sendiri menurun
- 13) Diaforesis menurun

d. Intoleransi aktivitas

Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan

Kreteria hasil:

- 1) Frekuensi nadi menurun
- 2) Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat
- 3) Kecepatan berjalan meningkat
- 4) Jarak berjalan meningkat
- 5) Kekuatan tubuh bagian atas meningkat
- 6) Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat
- 7) Keluhan lelah menurun
- 8) Dispnea saat aktivitas menurun
- 9) Dispnea setelah aktivitas menurun
- 10) Perasaan lemah menurun
- 11) Aritmia saat aktivitas menurun
- 12) Aritmia setelah aktivitas menurun
- 13) Sianosis menurun
- 14) Tekanan darah membaik

**Tabel 2.9 Intervensi Manajemen Energi**

Intervensi	Rasional
<p>Manajemen energi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan</li> <li>2. Monitor kelelahan fisik dan emosional</li> <li>3. Monitor pola dan jam tidur</li> <li>4. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui faktor penyebab kelelahan agar dapat menentukan intervensi yang sesuai</li> <li>2. Mengetahui adanya kelelahan baik fisik maupun emosional</li> <li>3. Pola tidur yang kurang baik dapat mempengaruhi tingkat kelelahan</li> <li>4. Mengetahui hambatan selama melakukan aktivitas</li> </ol>
<p>Teraupetik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus</li> <li>2. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau pasif</li> <li>3. Berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan</li> <li>4. Fasilitasi duduk disisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi paparan stimulus yang dapat mempengaruhi kondisi pasien</li> <li>2. Meningkatkan rentang gerak pasien, melancarkan peredaran darah dan mencegah kelemahan</li> <li>3. Mengalihkan pasien dari kelelahan</li> <li>4. Meningkatkan aktivitas pasien</li> </ol>
<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan tirah baring</li> <li>2. Ajarkan melakukan aktivitas secara bertahap</li> <li>3. Anjurkan menghubungi perawat jika ada tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang</li> <li>4. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan istirahat</li> <li>2. Agar dapat beradaptasi dalam melakukan aktivitas sederhana</li> <li>3. Memberikan intervensi lebih lanjut jika kelelahan tidak berkurang</li> <li>4. Mengurangi kelelahan</li> </ol>
<p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asupan makanan dapat meningkatkan aktivitas dan imunitas pasien</li> </ol>

e. Defisit perawatan diri

Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam,

diharapkan perawatan diri meningkat dengan

Kriteria hasil:

- 1) Kemampuan memberi asuhan meningkat
- 2) Kemampuan merawat pasien meningkat
- 3) Kemampuan menyelesaikan tugas merawat pasien meningkat
- 4) Kekhawatiran dirawat kembali menurun
- 5) Kekhawatiran kelanjutan perawatan menurun

**Tabel 2.10 Intervensi Perawatan Diri**

Intervensi	Rasional
Perawatan diri Observasi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi usia dan budaya dalam membantu kebersihan diri</li> <li>2. Identifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan</li> <li>3. Monitor kebersihan tubuh (mis. rambut, mulut, kulit, kuku)</li> <li>4. Monitor integritas kulit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memandirikan pasien sesuai dengan umur</li> <li>2. Mengetahui jenis bantuan yang dibutuhkan pasien</li> <li>3. Menentukan intervensi lebih lanjut</li> <li>4. Mencegah terjadinya iritasi padakulit pasien</li> </ol>
Terapeutik <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan peralatan mandi (mis. sabun, sikat gigi, shampoo, pelembab kulit)</li> <li>2. Sediakan lingkungan yang aman dan nyaman</li> <li>3. Fasilitasi menggosok gigi, sesuai kebutuhan</li> <li>4. Fasilitasi mandi, sesuai kebutuhan</li> <li>5. Pertahankan kebiasaan kebersihandiri</li> <li>6. Berikan bantuan sesuai tingkat kemandirian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempermudah pasien untuk mandi, keramas, gosok gigi</li> <li>2. Agar pasien menjadi nyaman</li> <li>3. Agar mempermudah menggosokgigi</li> <li>4. Memudahkan pasien mandi</li> <li>5. Agar pasien biasa dalam menjaga kebersihan diri</li> <li>6. Memandirikan pasien sesuai dengan umur</li> </ol>
Edukasi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan</li> <li>2. Ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien, jika perlu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman pasien tentang manfaat mandi terhadap kesehatan</li> <li>2. Agar keluarga dapat termotivasi menjaga kebersihan pasien</li> </ol>

f. Risiko jatuh

Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan tingkat jatuh menurun dengan

Kriteria hasil:

- 1) Jatuh dari tempat tidur menurun
- 2) Jatuh saat berdiri menurun
- 3) Jatuh saat duduk menurun
- 4) Jatuh saat berjalan menurun
- 5) Jatuh saat dipindahkan menurun
- 6) Jatuh saat naik tangga menurun
- 7) Jatuh saat di kamar mandi menurun
- 8) Jatuh saat membungkuk menurun

**Tabel 2.11 Intervensi pencegahan jatuh**

Intervensi	Rasional
<p>Pencegahan jatuh</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi faktor risiko jatuh</li> <li>2. Identifikasi risiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi</li> <li>3. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan faktor risiko</li> <li>4. Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala</li> <li>5. Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenal perilaku dan faktor-faktor yang berpotensi mengakibatkan jatuh.</li> <li>2. Memonitor adanya risiko jatuh guna melakukan pencegahan</li> <li>3. Mengenal keadaan lingkungan sekitar yang berkontribusi terhadap risiko jatuh</li> <li>4. Mengetahui tingkat risiko jatuh</li> <li>5. Untuk meningkatkan keamanan dan kemandirian pasien</li> </ol>
<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orientasi ruangan pada pasien dan keluarga</li> <li>2. Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci</li> <li>3. Pasang handrell tempat tidur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengenal ruangan dan mengidentifikasi tempat yang memiliki risiko jatuh</li> <li>2. Meminimalisir risiko jatuh dari tempat tidur atau kursi roda</li> <li>3. Dapat menciptakan aktivitas yang mandiri dengan aman dan nyaman</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Atur tempat tidur mekanis pada posisi terendah</li> <li>5. Tempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat dari nurse station</li> <li>6. Dekatkan bell pemanggil dalam jangkauan pasien</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dapat merasa takut jatuh karena perubahan ukuran dan tinggi tempat tidur</li> <li>5. Memudahkan perawat untuk mengawasi pasien dengan risiko jatuh</li> <li>6. Membuat pasien memiliki rasa aman, dapat mengatur diri dan mengurangi ketakutan karena ditinggal sendiri</li> </ol>
<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah</li> <li>2. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin</li> <li>3. Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</li> <li>4. Anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri</li> <li>5. Ajarkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan risiko terjatuh</li> <li>2. Membantu pasien untuk berjalan dengan langkah yang menetap/mempertahankan keseimbangan diri dengan mencegah terjadinya kaki terkilir</li> <li>3. Meminimalisir risiko jatuh</li> <li>4. Meminimalisir risiko jatuh</li> <li>5. Membuat pasien memiliki rasa aman dan mengurangi ketakutan karena ditinggal sendiri</li> </ol>

#### 4. Implementasi keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan salah satu ide dari rencana tindakan dalam membantu mencapai tujuan secara khusus. Proses pelaksanaannya diawali dengan penyusunan rencana tindakan dan ditujukan kepada perintah keperawatan (*nursing orders*) dalam membantu pasien mencapai tujuan yang diinginkan

#### 5. Evaluasi keperawatan

Evaluasi keperawatan adalah langkah terakhir dalam proses tindak lanjut. Langkah evaluasi ini akan menilai keberhasilan tindakan yang telah dilakukan. Adapun evaluasi keperawatan menurut Danamik (2019) terbagi menjadi beberapa tahap

##### 1) Evaluasi struktur

Evaluasi struktur adalah evaluasi yang memfokuskan pada kondisi lingkungan tempat pemberian atau peleyanan keperawatan dengan memperhatikan tata cara pemberian pelayananan keperawatan karena hal ini dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses keperawatan

## 2) Evaluasi proses

Evaluasi proses adalah evaluasi yang memfokuskan pada kinerja perawat dalam melakukan asuhan keperawatan baik pada saat melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan fisik, keakuratan dalam merumuskan suatu diagnose keperawatan, serta kemampuan perawat dalam melaksanakan itervensi keperawatan yang sesuai dengan standar operasional prosedur

## 3) Evaluasi hasil

Evaluasi hasil adalah evaluasi yang berfokus pada respon klien setelah diberikan intervensi keperawatan dengan memperhatikan tujuan pencapaian dan kriteri hasil.

Hasil evaluasi yang menentukan apakah masalah teratasi, teratasi sebagian, atau tidak teratasi, adalah dengan cara membandingkan antara SOAP (*Subjektive, Objektive, Assesment, Planning*) dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan.

S : (Subjective) adalah informasi berupa ungkapan yang didapat dari lansia setelah tindakan diberikan.

O : (Objective) adalah informasi yang didapat berupa hasil pengamatan, penilaian, pengukuran yang dilakukan oleh perawat setelah tindakan dilakukan.

A : (Assessment) adalah membandingkan antara informasi subjective dan objective dengan tujuan dan kriteria hasil, kemudian diambil kesimpulan bahwa masalah teratasi, teratasi sebagian, atau tidak teratasi. P : (Planning) adalah rencana keperawatan lanjutan yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisis.

### **C. Pendekatan teori yang digunakan**

Pendekatan teori yang digunakan adalah teori Adaptasi Roy yang dikembangkan oleh Callista Roy. Model Keperawatan adaptasi Roy adalah model keperawatan yang bertujuan membantu seseorang untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan hubungan interdependensi selama sehat sakit. Teori adaptasi Callista Roy memandang klien sebagai suatu system adaptasi. Model adaptasi Roy menguraikan bahwa bagaimana individu mampu meningkatkan kesehatannya dengan cara mempertahankan perilaku secara adaptif karena menurut Roy, manusia adalah makhluk holistic yang memiliki sistem adaptif yang selalu beradaptasi (Marriner, 1998).

Roy menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk biopsikososial sebagai kesatuan yang utuh. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu dihadapkan berbagai persoalan yang kompleks, sehingga dituntut untuk selalu beradaptasi. Penggunaan coping atau mekanisme pertahanan diri, merupakan suatu peran dan fungsi guna memelihara integritas diri dari keadaan rentang sehat sakit dari keadaan disekitar (Tomey & Aligood, 2006).

Seperti halnya yang terjadi pada lansia, semakin bertambahnya usia semakin menurunnya kondisi fisik/fisiologis yang ditandai dengan kulit yang mulai keriput, penglihatan dan pendengaran berkurang, gigi ompong, mudah

lelah, gerakan lamban karena adanya penurunan kekuatan otot. Hal ini mengakibatkan timbulnya gangguan di dalam mencukupi kehidupannya sehingga dapat mempengaruhi *Activity of Daily Living (ADL)* yaitu kemampuan seseorang untuk mengurus dirinya sendiri, dimulai dari bangun tidur, mandi, berpakaian dan seterusnya meningkatkan bantuan orang lain (Karmila, 2023). Perubahan-perubahan atau kemunduran yang dialami lanjut usia sangat membawa stres, baik untuk hal baik maupun hal yang lebih buruk (Dohanis et al, 2023). Oleh sebab itu dalam Model Adaptasi Roy, lansia diharapkan untuk mampu beradaptasi dengan keadaan yang terjadi. Penelitian ini juga didukung oleh pernyataan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Putri bahwa lansia yang tinggal di panti mengakibatkan perubahan peran lansia dalam menyesuaikan diri, dimana lansia akan mengalami paparan terhadap lingkungan dan teman baru yang mengharuskan lansia beradaptasi secara positif atau negatif (Putri, Fitriana, Ningrum, & Sulastri, 2015).

#### **D. Evidence based practice in nursing (EBPN)**

##### **1. EBPN Massage Manurak**

###### **a. Pengertian Massage Manurak**

Massage Manurak merupakan salah satu jenis massage yang dikembangkan dari jenis-jenis massage yang telah ada sebelumnya. Massage manurak dikembangkan oleh profesor Wara Kushartanti. Kata “Manurak” merupakan singkatan dari manual dan gerak. Manual dalam massage manurak terdiri dari manipulasi *Effleurage, Friction, dan Tapotement* (Alfen, 2022). Manipulasi yang diberikan memiliki manfaat untuk merangsang keluarnya endorfin, menurunkan tingkat kekakuan otot, dan mengurangi rasa nyeri. Gerak dalam massage manurak terdiri dari *loosening, stretching, dan proprioceptive*

*neuROMuscular facilitation (PNF)*. Gerak dalam massage manurak memiliki manfaat untuk meningkatkan ruang gerak sendi (ROM) dan mengembalikan posisi sendi jika terjadi pergeseran (Reposisi).


b. Manipulasi massage manurak

1) Manual

a) *Effleurage*

*Effleurage* merupakan aplikasi *Gate Control Theory* karena manipulasi ini dilakukan dengan menstimulus permukaan kulit dengan cara memijat permukaan tubuh (Sarli & N Sari, 2018). Gerakan pada manipulasi *Effleurage* menggunakan seluruh permukaan tangan yang digerakkan pada bagian yang akan dimassage. Gosokan pada daerah yang akan dimassage harus dilakukan secara pelan dan lembut agar menciptakan kenyamanan dan relaksasi yang maksimal. Manipulasi ini bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah, memberi tekanan sehingga menurunkan ketegangan otot, menghangatkan otot, dan meningkatkan relaksasi fisik dan mental (Sari *et al.*, 2019)

Gambar 2. 1 *Effleurage* pada pergelangan tangan




b) *Friction*

Manipulasi *Friction* (Menggerus) merupakan manipulasi dengan cara menggerus menggunakan ujung jari dan telapak tangan, Penggerusan dengan ujung jari digunakan saat daerah perkenaan berlekuk dan sempit, sedangkan gerusan menggunakan telapak tangan untuk daerah otot yang lebar. Graha (2019)

menjelaskan tujuan manipulasi *Friction* adalah memecah myoglosis, merangsang serabut saraf dan otot-otot yang berada di permukaan tubuh.

Gambar 2.2 Gerakan *Friction*




### c) *Tapotement*

Menurut Alfen (2022) *Tapotement* merupakan manipulasi dengan gerakan menepuk pada bagian otot dengan posisi tangan mengepal, telapak tangan telungkup, dan menggunakan telapak tangan bagian ulnaris. manipulasi *Tapotement* bertujuan untuk memperlancar peredaran darah, merangsang keluarnya hormon endorfin, memperlancar metabolisme tubuh, dan meningkatkan tonus pada otot. Manipulasi *Tapotement* terdiri dari beberapa jenis yaitu *Beating*, *Hacking*, dan *clapping* yang dijelaskan sebagai berikut.


*Tapotement Beating* dilakukan dengan kedua tangan dipukulkan secara berirama dengan posisi telapak tangan menggenggam. Telapak tangan pada sisi bawah merupakan daerah yang digunakan karena memiliki tekstur lunak dan tebal. Pemberian *Tapotement Beating* memiliki tujuan untuk memberikan rangsangan pada pusat saraf *spinal* dan saraf disekitarnya sehingga dapat mendorong keluar sisa metabolisme. (Riza Galih Mustika, 2020).

Gambar 2. 3 *Tapotement Beating*




*Tapotement Hacking* dilakukan dengan menyusun jari-jari secara vertikal. Pemukulan dilakukan tangan kanan dan kiri secara bergantian dengan posisi jari rileks dan dilakukan secara cepat. *Tapotement Hacking* bertujuan untuk merangsang saraf tepi sehingga menstimulus peredaran darah semakin lancar.

Gambar 2. 4. *Tapotement Hacking*



*Tapotement Clapping* dilakukan dengan posisi telapak tangan membentuk cekungan. Posisi telapak tangan cekung membuat pukulan telapak tangan dibantu dengan bantalan udara sehingga menciptakan rasa hangat dan mengurangi tingkat nyeri pada jaringan otot. Manipulasi *Clapping* bertujuan untuk merangsang saraf tepi, memperlancar peredaran darah, dan menurunkan tingkat nyeri

Gambar 2.5. *Tapotement Clapping*



## 2) Gerak (*stretching*)

### a) Pengertian Gerak (*stretching*)

Persiapan tubuh yang harus dilakukan sebelum melakukan aktivitas berat adalah melakukan pemanasan. Bentuk gerakan pemanasan yang direkomendasikan dan paling sering digunakan yaitu gerakan *stretching*. Pengertian *stretching* menurut Riza (2020) merupakan suatu proses meregangkan bagian tubuh dengan tujuan untuk mengadakan perubahan fisiologis untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas olahraga.

Pendapat lain disampaikan oleh Monayo & Akuba (2019) *stretching* merupakan aktivitas meregangkan otot sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas otot dan meningkatkan jangkauan ruang gerak persendian, menurunkan rasa nyeri pada otot dan persendian, dan meningkatkan aliran darah. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *stretching* merupakan suatu gerak meregangkan bagian tubuh seperti otot dan persendian dengan tujuan tubuh siap untuk melakukan aktivitas.

### b) Jenis Gerak (*stretching*)

Gerakan *stretching* memiliki beberapa jenis salah satu di antaranya adalah *stretching* statis dan *stretching* dinamis. Pengertian *stretching* statis menurut Karunia Saraswati et al (2019) merupakan suatu gerakan mengulur

bagian tubuh dan mempertahankan dalam posisi tertentu selama beberapa waktu dengan tujuan meningkatkan kelenturan dan fleksibilitas tubuh dan menurunkan tingkat ketegangan otot. Gerakan *stretching* statis merupakan *stretching* yang paling sering dilakukan karena aman dan meningkatkan rasa nyaman. Gerakan *stretching* dinamis adalah bentuk *stretching* yang dilakukan dengan menggerakkan anggota tubuh secara berirama tanpa mempertahankan di posisi ruang gerak sendi terjauh (Suharjana, 2010). Gerakan *stretching* dinamis memiliki manfaat meningkatkan ruang gerak sendi secara progresif, di sisi lain gerakan *stretching* dinamis perlu dilakukan secara hati-hati karena dapat menyebabkan rasa nyeri dan cedera pada otot apabila dilakukan secara berlebihan.

c) Manfaat Gerak (*stretching*)

*Stretching* telah banyak diteliti oleh para ahli karena memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Menurut Borges *et al.* (2021) *stretching* memiliki manfaat yaitu meningkatkan ruang gerak sendi (ROM), menurunkan kekakuan pada muskuloskeletal, dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Bohajar-Lax *et al.* (2015) yaitu *stretching* yang dilakukan secara terstruktur dapat meningkatkan ekstensibilitas otot. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *stretching* memiliki manfaat untuk meningkatkan ruang gerak sendi (ROM), menurunkan kekakuan otot, dan meningkatkan fleksibilitas tubuh

c. Tujuan massage manurak

Massage manurak mampu memperlancar peredaran darah, mengendurkan otot yang tegang, meningkatkan produksi hormon endorphine, meningkatkan sirkulasi darah dan limfe, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan range of movement (ROM), meningkatkan elastisitas jaringan, dan merelaksasikan otot

(Graha, 2019).

d. Indikasi

Lansia yang mengalami nyeri dan kekakuan pada otot

e. Kontraindikasi

Lansia yang mengalami penyakit kulit, luka bakar, demam, peradangan, fraktur diarea perawatan dan edema diarea perawatan.

f. Prosedur massage manurak

1) Tahap orientasi

Tahap orientasi adalah tahap dimana perawat melakukan perkenalan diri kepada pasien agar pasien lebih dekat serta percaya kepada perawat.

- a) Mengucapkan salam
- b) Perkenalkan diri perawat kepada pasien
- c) Menanyakan identitas pasien
- d) Jelaskan tindakan apa yang akan dilakukan kepada pasien
- e) Berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan jawab seluruh pertanyaan pasien
- f) Tanyakan kesiapan pasien
- g) Kontrak waktu dan tempat pada pasien

2) Tahap kerja

a) Persiapan alat



(1) Lotion / Minyak

(2) Kain

b) Pelaksanaan

**Tabel 2.12 SOP Terapi Massage Manurak**

No	Gambar	Keterangan	Repetisi Durasi
1		<p><i>Friction</i> pada otot lengan dimulai dari pergelangan hingga siku baik pada posisi dorsal maupun posisi ventral. Penekanan pada friction disesuaikan dengan kondisi otot sampel/responden. Untuk arah bisa dilakukan naik maupun turun.</p>	<p>1x 4 menit</p>
2		<p><i>Tapotement</i> dari pergelangan hingga siku dilakukan dengan teknik claping.</p>	<p>1x 2 menit</p>
3		<p><i>Effleurage</i> dimulai dari pergelangan hingga siku.</p>	<p>1x 5 menit</p>
4		<p><i>Traction</i> pada pergelangan tangan dengan arah depan. Tujuan dari traction adalah memberikan ruang pada sendi. Pada saat <i>ditraction</i>, badan sampel/responden condong ke belakang.</p>	<p>1x 1 menit</p>

5		<p>Jepit pergelangan tangan hingga memiliki rongga, kemudian sampel/responden melakukan gerakan fleksi, ekstensi, inversi, eversi, dan rotasi.</p>	<p>1x 2,5 menit</p>
6		<p><i>Stretch</i> atau tarik telapak tangan ke arah ekstensi, dilakukan sendiri oleh sampel/responden, stretch hingga batas nyeri.</p>	<p>1x 10 detik</p>
7		<p><i>Stretch</i> atau tarik telapak tangan ke arah fleksi, dilakukan sendiri oleh sampel/responden, stretch hingga batas nyeri.</p>	<p>1x 10 detik</p>
8		<p>PNF dilakukan sendiri oleh sampel/responden dengan melakukan gerakan fleksi, kemudian melawan gerakan tersebut dengan gerakan ekstensi agar dapat merasakan batas nyeri dari stretch yang dirasakan ketika PNF.</p>	<p>1x 10 detik</p>

### 3) Tahap terminasi

- a) Rapiakan alat yang telah digunakan
  - b) Rapiakan pasien
  - c) Evaluasi respon pasien
  - d) Kontrak selanjutnya (waktu, topik/kegiatan, tempat)
- g. Kriteria evaluasi

Setelah dilakukan intervensi massage manurak kekuatan otot pasien meningkat.

h. Jurnal utama dan pendukung

1) Jurnal Utama

Penulis: Sundari Putri Rahayu, Tahun: 2023

Judul: Efektivitas Kombinasi Masase Manurak Dan inframerah terhadap Penurunan Nyeri, Peningkatan Rom dan fungsi Gerak Cedera Pergelangan Tangan

Sumber: Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi masase manurak dan inframerah efektif menurunkan nyeri, meningkatkan ROM, dan fungsi gerak pada cedera pergelangan tangan

2) Jurnal pendukung

Penulis : Huswatun Khasanah, Tahun : 2021

Judul: Efektivitas Massage dan Latihan Rom (Range Of Motion) Terhadap Kekuatan Otot pada Pasien Stroke Di Rsud Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

Sumber: jurnal Muhammadiyah Gombang

Hasil penelitian: Terapi *massage* dan Latihan ROM efektif meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara

3) Jurnal Pendukung

Penulis : Fahmi Indra Winata, Tahun :2022

Judul : Pengaruh terapi manurak terhadap penyembuhan cedera

pergelangan pekerja kerajinan tangan keramik di pabrik mustik Desa  
Klampok Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah

Sumber : Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta

4)Jurnal pendukung

Penulis: Milos Daki, Lazar Toski, Vladimir Ili, Sasa Duri, Milivoj

Dopsaj and Jozef simenko , Tahun : 2023

Judul: The Effects of Massage Therapy on Sport and Exercise  
Performance: A Systematic Review

Jurnal publikasi: jurnal Sports

Hasil penelitian: Setelah dilakukan intervensi didapatkan hasil bahwa  
ada pengaruh pemberian terapi pijat pada olahraga dan latihan

5) Jurnal pendukung

Penulis: Hasbi et all, Tahun : 2024

Judul: Pengaruh Massage metode manurak terhadap penurunan  
Denyut Nadi Recorvery pada pemain bola voli putra cendana

Jurnal publikasi: Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi

Hasil penelitian: Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat  
maasage metode manurak memiliki pengaruh yang sangat signifikan  
terhadap penurunan denyut nadi recorvery pada pemain bola voli  
putra cendana

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Rancangan studi kasus**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. studi kasus adalah sebuah eksplorasi ke suatu kasus atau beragam kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi. studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali kasus dalam suatu waktu dan kegiatan, selain itu, dengan mengumpulkan data secara detail dan menentukan topic serta subjek peneliti, menetapkan area atau lokasi, menentukan metode tepat, memastikan teknik akumulasi data yang relevan, menelaah hasil data, serta menarik kesimpulan dan penyelidikan dari penelitian (Assyakurrohim et al. 2022).

#### **B. Subyek studi kasus**

Subjek yang digunakan dalam studi kasus penelitian ini adalah lansia yang mengalami masalah *immobility* dengan gangguan mobilitas fisik, lansia yang berusia  $\geq 60$  tahun, tidak mengalami gangguan pendengaran, mampu diajak berkomunikasi dan bersedia menjadi reponden.

#### **C. Fokus studi kasus**

Fokus studi kasus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas fisik menggunakan intervensi massage terapi pijat manurak di Sentra Gau Mabaji Gowa.

#### **D. Instrumen studi kasus**

Instrumen yang digunakan pada kasus ini adalah format pengkajian lansia dan standar operasional prosedur (SOP) serta lembar observasi Elderly Mobility Scale (EMS) dalam melakukan intervensi terapi massage manurak. Analisa data pada kasus ini untuk melihat tingkat kekuatan otot sebelum perlakuan massage terapi manurak setelah perlakuan massage terapi manurak perlu melakukan pengkajian berbaring ke duduk, duduk ke berbaring, duduk ke berdiri, berdiri, bergerak, jalan kaki berjangka waktu (6 meter) dan jangkauan fungsional dengan skor penilaian <10 : pasien dengan tingkat ketergantungan dalam manuver mobilitas memerlukan bantuan dengan ADL dasar, seperti berpindah tempat, toileting, dan berpakaian, 10-13 : pasien ketergantungan yang berada pada ambang batas mobilitas dan hanya memerlukan bantuan dalam beberapa manuver mobilitas seerta >14 pasien mampu melakukan manuver mobilitas secara mandiri dalam ADL.

#### **E. Prosedur pengambilan data**

Prosedur pengambilan data dilakukan setelah diberi izi untuk melakukan penelitian di Sentra Gau mabaji gowa. Adapun tahapan dalam melakukan studi kasus antara lain:

##### **1. Persiapan**

Mencari beberpa literatur terkait masalah yang dialami lansia serta intervensidalam menagangan masalah yang dialami lansia.

Melakukan pengajuan judul studi kasus sesuai masalah yang dialami lansia.

Mendapatkan persetujuan pembimbing untuk melakukan intervensi sesuai masalah yang dialami lansia

## 2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara dilakukan selama satu pekan pada lansia

## 3. Penyusunan laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan dalam penulisan karya tulis ilmiah

### **F. Tempat/waktu pengambilan data**

Penelitian studi kasus ini dilakukan di Sentra gaul mabaji gowa yang dilaksanakan pada tanggal mulai pengkajian 19 Maret 2024 sampai 28 Maret 2024.

### **G. Analisis data dan penyajian data**

Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subjek studi kasus yaitu menggunakan lima proses keperawatan dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. pengolahan data yang sudah didapatkan dari hasil pengkajian dari proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian memasukan data yang telah didapatkan kedalam tabel analisa data dan kemudian dilakukan kategorisasi data untuk menentukan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan keadaan pasien berdasarkan Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dan menentukan kriteria hasil yang ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditetapkan dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP setelah dilakukan tindakan khususnya pemberian massage terapi manurak, penyajian

data disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan serta menggambarkan bagaimana hasil pengkajian sampai dengan evaluasi.

#### **H. Etika studi kasus**

Menurut Dharma (2017), etika penelitian yang mendasari penyusunan studi kasus antara lain:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Penelitian harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Subjek memiliki hak asasi dan kebebasan untuk menentukan pilihan ikut atau menolak penelitian (*autonomy*). Tidak boleh ada paksaan atau penekanan tertentu agar subjek bersedia ikut dalam penelitian. Subjek dalam penelitian juga berhak mendapatkan informasi yang terbuka dan lengkap tentang pelaksanaan penelitian meliputi tujuan dan manfaat penelitian, prosedur penelitian, resiko penelitian, keuntungan yang mungkin didapat dan kerahasiaan informasi;

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek (*respect for privacy and confidentiality*)

Manusia sebagai subjek penelitian memiliki privasi dan hak asasi untuk mendapatkan kerahasiaan informasi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa penelitian menyebabkan terbukanya informasi tentang subjek. Sehingga peneliti perlu merahasiakan berbagai informasi yang menyangkut privasi subjek yang tidak ingin identitas dan segala informasi tentang dirinya diketahui oleh orang lain. Prinsip ini dapat diterapkan dengan cara meniadakan identitas seperti nama dan alamat subjek kemudian diganti dengan kode tertentu. Dengan demikian segala informasi yang menyangkut identitas subjek tidak terekspos secara luas

3. Menghormati keadilan dan inklusivitas (*respect for justice inclusiveness*)

Prinsip keterbukaan dalam penelitian mengandung makna bahwa penelitian dilakukan secara jujur, tepat, cermat, hati-hati dan dilakukan secara profesional. Sedangkan prinsip keadilan mengandung makna bahwa penelitian memberikan keuntungan dan beban secara merata sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan subjek.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*Balancing harm and benefits*)

Prinsip mengandung makna bahwa setiap penelitian harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi subjek penelitian dan populasi dimana hasil penelitian akan diterapkan (*beneficience*). Kemudian meminimalisir resiko /dampak yang merugikan bagi subjek penelitian (*nonmaleficience*). Prinsip ini yang harus diperhatikan oleh peneliti ketika mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan persetujuan etik dari komite etik penelitian. Peneliti harus mempertimbangkan rasio antara manfaat dan kerugian/resiko dari penelitian

**BAB IV**  
**LAPORAN KASUS**

**A. PENGKAJIAN KEPERAWATAN**

**I. DATA DEMOGRAFI**

Nama Lansia : Ny. F  
Umur : 103 tahun  
Alamat : Jln. Poros Malino Km. 29 Kompleks PSTW Gau Mabaji  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jumlah Keturunan  
- Anak : 1 (meninggal)  
- Cucu : 0  
Nama Suami/Istri : Tn. A (almarhum)  
Umur : -  
Tgl Pengkajian : 19 Maret 2024

**II. PENGKAJIAN**

**A. Fisik**

*Wawancara*

**□ Alasan Masuk**

Klien masuk di Sentra Gau Mabaji dibawa oleh Dinas Sosial. Klien mengatakan klien tidak mempunyai keluarga, anak dan suaminya sudah meninggal. Pada saat dikaji klien mengatakan klien sulit menggerakkan kedua ekstermitas bawah, klien merasa cemas saat bergerak, klien mengatakan seluruh aktivitasnya menggunakan kursi roda, klien nampak lemah, klien nampak tidak bisa berdiri, dan berjalan, nampak gerakan terbatas. Keluhan lain, klien mengeluh sering lupa dengan sesuatu yang ingin dikerjakan, klien mengatakan tidak mengingat tahun lahirnya dan berapa usianya, klien nampak menarik diri, terkadang tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain, klien

mengatakan ia lebih suka menyendiri dikamar dibandingkan keluar.

#### **Keluhan Utama**

Sulit menggerakkan kedua ektermitas bawah

#### **Pandangan lanjut usia tentang kesehatannya:**

Klien mengatakan bahwa sehat dan sakit itu berasal Allah SWT, jadi klien tidak merasa risau dan tetap tenang dalam menghadapi sakitnya.

#### **Kegiatan yang mampu dilakukan lanjut usia:**

Klien mengatakan kegiatan yang mampu dilakukan yaitu makan dan minum serta ganti pakaian secara mandiri, akan tetapi semua aktivitas yang dilakukan smuanya menggunakan kursi roda, klien tidak mampu berdiri maupun berjalan, klien hanya mampu bergeser dari tempat tidur ke kursi roda.

#### **Kebiasaan lanjut usia merawat diri sendiri:**

Klien mengatakan jarang bersih-bersih karena kondisi yang ia alami, klien mengatakan biasanya mandi hanya lap-lap badan saja itupun 2 hari sekali, jarang sikat gigi dan cuci rambut.

#### **Kekuatan fisik lanjut usia:**

##### Kekuatan otot dan sendi:

Klien mengatakan fungsi ototnya menurun, klien mengatakan seluruh aktivitasnya menggunakan kursi roda, klien nampak lemah, klien nampak tidak bisa berdiri, dan berjalan, nampak gerakan terbatas.

Kekuatan otot:

3		3
0		0

##### Penglihatan dan pendengaran:

Penglihatan : klien mampu melihat jenis pohon-pohon yang ada diluar kamarnya walaupun kelihatan jauh. Klien mampu mengenali jenis pohon apa yang ditunjukkan diskitar kamarnya.

Pendengaran: Klien mampu mendengarkan orang berbicara, Klien tampak bagus merespon balik saat diberikan saat melakukan pertanyaan, dan pendengaran klien tampak bagus.

❑ **Kebiasaan makan, minum, istirahat/tidur, buang air besar/kecil:**

Klien mengatakan makan 3 kali dalam sehari yaitu saat sarapan pagi, siang dan malam hari, klien mengatakan minum habis 2 gelas/harinya. Klien mengatakan tidurnya cukup dan teratur klien, klien tidak ada keluhan buang air kecil, klien merasa kencing kurang lebih 5-6 kali dalam sehari, berbau khas, untuk BAB klien mengatakan tidak kesulitan BAB, klien biasanya BAB 1 kali/ hari, klien mengatakan BAB nya sedikit, lembek, berwarna kuning dan berbau khas.

❑ **Kebiasaan gerak badan/olahraga/senam lanjut usia:**

Klien mengatakan tidak berolahraga, hanya saja setiap hari jumat klien sering ikut kegiatan senam lansia.

❑ **Perubahan-perubahan fungsi tubuh yang sangat bermakna dirasakan:**

Klien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah otot dan sendi. Klien mengatakan jika dulu dia masih dapat beraktivitas seperti biasa, akan tetapi semakin bertambahnya umur, dan kejadian yang pernah ia alami, klien sulit dalam melakukan berdiri berjalan dan bergerak .

❑ **Kebiasaan lanjut usia dalam memelihara kesehatan dan kebiasaan dalam minum obat:**

Klien mengatakan pola makan baik, klien mengatakan jarang memeriksakan kesehatannya dan tidak ada obat khusus yang dikonsumsi

❑ **Masalah-masalah seksual yang dirasakan:** Klien mengatakan tidak memiliki masalah

*Pemeriksaan Fisik*

**1. Temperatur : 36,5°C**

- Tempat pengukuran : Pada aksila

**2. Pulse (denyut nadi)**

➤ Kecepatan : 66x/menit

➤ Irama : Reguler

Tempat pengukuran : Arteri radialis pada pergelangan tangan

### 3. Respirasi (Pernapasan)

- Kecepatan : 20x/menit
- Irama : Teratur
- Kedalaman : Dada bergerak secara simetris
- Bunyi : Vesikuler

### 4. Tekanan darah : 150/70 mmHg

Posisi pengukuran : Klien dalam posisi duduk, pemeriksaan pada lengan atas sebelah kiri

### 5. Berat dan tinggi badan terakhir : Tidak bisa diukur, karena pasien mengalami deformitas dan susah untuk berdiri

### 6. Tingkat orientasi

- a. Waktu : Saat ditanya tanggal klien menjawab salah, saat ditanya bulan dan tahun berapa hari ini, klien menjawab bulan Maret 2024
- b. Tempat : Saat ditanya klien berada dimana sekarang, di ruang apa, di daerah mana, klien menjawab di Sentra Gau mabaji, di asrama 1
- c. Orang : Saat klien ditanya siapa yang ajak ia bercerita, klien mengatakan mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar.

### 7. Memory (ingatan) : klien mengeluh sering lupa dengan sesuatu yang ingin dikerjakan, klien mengatakan tidak mengingat tahun lahirnya dan berapa usianya

### 8. Tidur :

- a. Kuantitas (lama tidur) : pada malam hari  $\pm 8$  jam, sedangkan pada siang hari  $\pm 4-5$  jam
- b. Kualitas : Kualitas tidur klien baik
- c. Pola : Pola tidur klien tidak ada masalah

### 9. Istirahat

- a. Kuantitas (lama tidur) : klien selalu beristirahat di dalam kamar

sambil berbaring

b. Kualitas : Kualitas istirahat klien baik

c. Pola : Istirahat teratur, tidak ada masalah

**10. Penyesuaian psikososial :** Klien mengatakan merasa puas akan kehidupannya, tidak mengalami masalah batin, klien nampak menarik diri, terkadang tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain, klien mengatakan ia lebih suka menyendiri dikamar dibandingkan keluar

### **Sistem Persyarafan**

1. Kesimetrian raut wajah : Raut wajah klien tampak simetris kiri dan kanan

2. Tingkat kesadaran:

➤ Snile (pikun) : Klien nampak pikun

➤ Daya ingat : Daya ingat klien nampak menurun/tidak kuat

3. Mata

➤ Pergerakan : Baik mampu mengikuti gerakan tangan pemeriksa

➤ Penglihatan : Klien mampu melihat tetapi menggunakan kacamata jika objek yang dilihat jauh

➤ Penyakit penyerta : tidak ada

4. Pupil

➤ Kesamaan : Isokor

5. Ketajaman penglihatan : kurang baik, klien harus menggunakan kacamata jika objek yang dilihat dari jauh

6. Sensori *deprivation* (gangguan sensorik) : Tidak ada gangguan

7. Ketajaman pendengaran

➤ Apakah menggunakan alat bantu dengar : Tidak

➤ Tinitus : Tidak

➤ Serumen : Tidak

8. Rasa sakit dan nyeri :

Klien tidak ada keluhan nyeri. Vital sign:

TD: 150/70 mmHg, N: 66 x/menit

RR: 20 x/menit, S: 36,5°C

### **Sistem Kardiovaskuler**

1. Sirkulasi perifer
  - Warna : Merah muda
  - Waktu : 2 detik
2. Denyut nadi apikal : Normal
3. Pembengkakan vena jugularis : Tidak ada pembengkakan
4. Pusing : Klien mengatakan kadang-kadang merasa pusing
5. Nyeri dada : Tidak ada nyeri dada
6. Edema : tidak ada edema

### **Sistem Gastrointestinal**

1. Status gizi : Tidak, IMT = Tidak bisa diukur, karena pasien mengalami deformitas dan susah untuk berdiri
2. Pemasukan diet : Klien mengatakan tidak melakukan diet
3. Anoreksia : Tidak
4. Mual : Tidak Ada
5. Muntah : Tidak Ada
6. Mengunyah dan menelan : Baik
7. Keadaan gigi : Klien mengatakan giginya tinggal beberapa, klien tidak menggunakan gigi palsu, gigi klien sudah banyak tercabut, gigi klien nampak menguning
8. Rahang : Normal, tidak ada kelainan pada rahang
9. Rongga mulut : Normal, tidak terdapat stomatitis
10. Keadaan perut : terdapat nyeri perut bagian kanan
11. Konstipasi (sembelit) : Tidak mengalami sembelit

12. Diare : Klien mengatakan BAB 2 x/hari
13. Intontinesia alvi : Klien mengatakan merasakan sensasi ketika hendak buang air kecil/besar

#### **Sistem Genitourinarius**

1. Warna dan bau urin : Berwarna kuning jernih dan bau khas urin
2. Distensi kandung kemih : Tidak ada distensi kandung kemih
3. Inkontinensia : Tidak terjadi inkontinensia
4. Tekanan/desakan : Tidak ada tekanan atau desakan
5. Pemasukan cairan : 5-6 gelas
6. Pengeluaran cairan : 5-7 kali sehari
7. Disuria : Tidak mengalami disuria
8. Seksualitas
  - Minat melaksanakan hubungan seks : Klien mengatakan ia sudah tua.

#### **Sistem Kulit**

1. Kulit
  - Temperatur : 36,7°C
  - Tingkat kelembaban : Kulit nampak kering
  - Keadaan luka : Tidak ada luka
  - Turgor (kekenyalan kulit) : Kulit tampak keriput dan turgor kulit elastis
2. Jaringan parut : Tidak ada jaringan parut
3. Keadaan kuku : Panjang dan kotor
4. Keadaan rambut : pendek dan bersih
5. Gangguan-gangguan umum : Tidak ada

#### **Sistem Muskuloskeletal**

1. Kontraktur

- Otot : mengalami penurunan kekuatan otot
  - Tendon : terjadinya penurunan fungsi tendon
  - Gerakan sendi : mengalami penurunan fungsi sendi, sendi mengalami penurunan
2. Tingkat mobilisasi
- Ambulasi : Klien mengatakan jika ingin ke WC itupun menggunakan kursi roda.
  - Gerakan : Lambat, gemetar saat bergeser dari tempat tidur ke kursi roda.
  - Kekuatan otot : lemah
- |   |   |
|---|---|
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
- Kemampuan melangkah atau berjalan : Klien tidak mampu melangkah ataupun berjalan
3. Pemeriksaan sendi : Tidak ditemukan adanya krepitasi pada kedua lutut. Lutut klien tidak bengkak, terdapat deformitas, riwayat jatuh: pernah jatuh semasa gadis
4. Paralisis : Tidak
5. Kifosis : Tidak
6. Deformitas : Ya, pada kedua ekstermitas bawah

## B. Psikologis

- Pengenalan masalah-masalah utama : Klien menyadari bahwa klien tidak dapat berdiri dan berjalan, klien menyadari bahwa usianya yang sudah tua menyebabkan tubuhnya tidak sekuat dulu lagi
- Sikap terhadap proses penuaan : Klien mengatakan bahwa penyakit yang dideritanya karena dirinya sudah tua, dan klien tetap bersyukur karena diberi kesehatan untuk menjalani hidupnya yang sekarang .
- Perasaan dibutuhkan : Klien mengatakan selalu merasa dibutuhkan, terutama oleh petugas di Sentra
- Pandangan terhadap kehidupan : Klien mengatakan harus bersemangat

dalam menjalani kehidupan meskipun sekarang klien sekarang hanya sebatang kara

- Koping stressor : Klien mengatakan ketika lelah langsung beristirahat dan ketika klien memiliki masalah, klien akan berdoa dan shalat
- Penyesuaian diri : Klien mampu berkomunikasi, namun nampak menarik diri dari lingkungan, klien lebih suka menyendiri
- Kegagalan : klien mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengalami kegagalan
- Harapan saat ini dan yang akan datang : Klien berharap agar selalu diberikan kesehatan agar umurnya panjang kelak.
- Fungsi kognitif
  - Daya ingat : Daya ingat klien menurun/tidak kuat, klien nampak pikun
  - Proses pikir : Klien mampu berkomunikasi dengan baik, pembicaraan klien dapat dipahami dengan baik
  - Alam perasaan : Klien merasa sedih karena kondisi yang ia alami.
  - Orientasi : klien tidak mampu mengetahui hari ini hari selasa, klien mampu mengetahui bahwa ia berada di sentra gau mabaji
  - Kemampuan dalam penyelesaian masalah : Klien mengatakan penyelesaian masalah dibantu oleh petugas kesehatan di Sentra Gau Mabaji

### C. Sosial Ekonomi

- Sumber keuangan

Klien mengatakan sumber ekonomi dari Sentra Gau Mabaji Gowa

- Kesibukan dalam mengisi waktu luang

Mendengar radio dan duduk-duduk disamping kamar.

- Teman tinggal

Tinggal bersama teman sebaya di ruangan asrama Sentra Gau Mabaji Gowa.

- Kegiatan organisasi

Tidak ada

- Pandangan terhadap lingkungannya

Klien mengatakan suka dengan lingkungannya

- Yang biasa mengunjungi

Tidak ada

- Penyaluran hobi/kegiatan sesuai fasilitas yang ada : klien mengatakan biasanya hanya duduk-duduk disamping kamar dan mendengar radio

#### **D. Spiritual**

- Agama : islam

- Kegiatan ibadah : Klien sering melaksanakan shalat

- Kegiatan keagamaan : berdoa

- Cara lanjut usia menyelesaikan masalah : Klien mengatakan menyelesaikan masalah dengan berdoa dan berdiskusi dengan petugas Sentra Gau mabaji

- Penampilan lansia : Klien tampak kurang rapih

#### **E. Psikososial**

- Tingkat ketergantungan : Klien masih mampu melakukan kegiatan secara mandiri, seperti makan dan ke kamar mandi walaupun harus menggunakan kursi roda

- Fokus diri : Klien mengatakan peduli dengan kondisinya

- Perhatian : Klien saat diajak berbicara kebanyakan mengangguk

- Rasa kasih sayang : Klien menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada petugas dan mahasiswa yang sering diajak klien untuk berbicara

## PENGAJIAN STATUS FUNGSIONAL

INDEKS KATZ	
SCORE	KRITERIA
A	Kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah, ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi
B √	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali satu dari fungsi tersebut (berpindah)
C	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi dan satu fungsi tambahan
D	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian dan satu fungsi tambahan
E	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil dan satu fungsi tambahan
F	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, berpindah dan satu fungsi Tambahan
G	Ketergantungan pada enam fungsi tersebut

**Interpretasi :**

**Beri tanda (√) pada point yang sesuai kondisi klien Analisis**

**Hasil : klien mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, kecuali salah satu saja dari fungsi diatas (berpindah)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGKAJIAN STATUS KOGNITIF DAN AFEKTIF

### Penilaian :

<i>Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)</i>				
Score		No	Pertanyaan	Jawab
+	-			
	-	1	Tanggal berapa hari ini ?	Klien menjawab tanggal 17
	-	2	Hari apa sekarang ini ? (hari, tanggal, tahun)	Klien menjawab hari Kamis, 17 maret 2024
+		3	Apa nama tempat ini ?	Klien menjawab Sentra Gau Mabaji
	-	4a	Berapa nomor telpon anda ?	Klien mengatakan tidak menggunakan hp
+		4b	Dimana alamat anda ? (tanyakan hanya bila klien tidak mempunyai no.telepon)	Klien menjawab di Gowa
	-	5	Berapa umur anda ?	Klien menjawab sekitar 60an
	-	6	Kapan anda lahir ?	Klien mengatakan lupa tanggalnya
+		7	Siapa presiden sekarang ?	Klien mengatakan Pak Jokowi
+		8	Siapa presiden sebelumnya ?	Klien mengatakan Jokowi 2 periode dan sebelumnya SBY
+		9	Siapa nama kecil ibu anda ?	Klien mengatakan aminah
	-	10	Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru, semua secara menurun	Klien tidak mampu menjawab

- Kesalahan 0– 2            fungsi intelektual utuh
- Kesalahan 3– 4            fungsi intelektual ringan
- **Kesalahan 5– 7            fungsi intelektual sedang**
- Kesalahan 8– 10            fungsi intelektual berat

**SKALA DEPRESI GERIATRIK (*GERIATRIC  
DEPRESSION SCALE / GDS*) (*Short Form*)**

No	Pertanyaan	Ya	Tdk
1	Apakah pada dasarnya anda puas dengan kehidupan anda?	0√	1
2	Apakah anda telah banyak meninggalkan kegiatan dan minat/kesenangan anda?	1√	0
3	Apakah anda merasa kosong dengan kehidupan yang dijalani saat ini?	1√	0
4	Apakah anda sering bosan ?	1	0√
5	Apakah anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu ?	0√	1
6	Apakah anda takut sesuatu akan terjadi pada anda ?	1	0√
7	Apakah anda merasa bahagia di setiap waktu ?	0	1√
8	Apakah anda merasa tidak berdaya?	1√	0
9	Apakah anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari, daripada pergi dan melakukan sesuatu yang baru ?	1√	0
10	Apakah anda memiliki banyak masalah dengan daya ingat dibandingkan kebanyakan orang?	1√	0
11	Apakah anda berpikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini?	0	1√
12	Apakah anda merasa Saya sangat tidak berharga/ berguna?	1	0√
13	Apakah anda merasa penuh semangat?	0√	1
14	Apakah anda merasa tidak memiliki harapan?	1	0√
15	Apakah anda berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada anda?	1	0√
	<b>Skor</b>		7

**Penilaian :**

0 – 5 : Normal

**6 – 10 : Kemungkinan depresi**

>10 : Depresi

**SKALA JATUH MORSE (MORSE FALL SCALE/ MFS)**

No.	Item	Skala	Skor
1	<b>Riwayat jatuh</b> Apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir?	Tidak	0
		Ya	25
2	<b>Diagnosis sekunder</b> Apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit?	Tidak	0
		Ya	15
3	<b>Alat bantu pergerakan</b> <i>Bed rest</i> /dibantu perawat		0
	Walker/kruk/tongkat		15
	Berpegangan pada benda sekitar (kursi, meja, lemari)		30
4	<b>Terapi intravena:</b> Apakah saat ini lansia terpasang infus?	Tidak	0
		Ya	20
5	<b>Gaya berjalan/cara berpindah</b>	Normal	0
		Lemah	10
		Gangguan/tidak normal	20
6	<b>Status mental</b>	Lansia menyadari kondisinya	0
		Lansia mengalami keterbatasan daya ingat	15
Total nilai			75

**Keterangan:**

Tingkat Risiko	Nilai MPS	Tindakan
Tidak berisiko	0 -24	Perawatan dasar
Risiko rendah	25 - 50	Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar
<b>Risiko tinggi</b>	<b>≥ 51</b>	<b>Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi</b>

## PENGKAJIAN STATUS SOSIAL

APGAR Keluarga					
No	Fungsi	Uraian	Selalu	Kadang	Hampir tidak pernah
			2	1	0
1	Adaptasi	Saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga (teman-teman) saya untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan saya	√		
2	Hubungan	Saya puas dengan cara keluarga (teman-teman) saya membicarakan sesuatu dengan saya dan mengungkapkan masalah dengan saya		√	
3	Pertumbuhan	Saya puas bahwa keluarga (teman-teman) saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan aktivitas atau arah baru			√
4	Afeksi	Saya puas dengan cara keluarga (teman-teman) saya mengekspresikan afek dan berespons terhadap emosi-emosi saya, seperti marah, sedih atau mencintai		√	
5	Pemecahan	Saya puas dengan cara teman-teman saya dan saya menyediakan waktu bersama-sama		√	
<b>SKOR</b>			<b>5</b>		

**Penilaian :**

**0 – 5 Fungsi sosial kurang**

**6 – 10 Fungsi sosial baik**

## BARTHEL INDEKS

No	Kriteria	Dengan Bantuan	Mandiri	Keterangan
1	Makan	5	10	Frekuensi : 3 kali Jumlah : Dihabiskan Jenis : Nasi dan Lauk
2	Minum	5	10	Frekuensi : 4-5 kali Jumlah : Sedang Jenis : Air putih
3	Berpindah dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya	5 – 10	15	Mandiri
4	Personal toilet (cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi)	0	5	Frekuensi : 2 hari sekali
5	Keluar masuk toilet (membuka pakaian, menyeka tubuh, menyiram)	5	10	Klien mengatakan masuk toilet menggunakan kursi roda
6	Mandi	5	15	Frekuensi : 2 hari sekali, hanya di lap basah
7	Jalan di permukaan datar	0	5	Tidak Mampu berjalan sendiri
8	Naik turun tangga	5	10	Klien tidak mampu berdiri dan berjalan
9	Mengenakan pakaian	5	10	Dengan bantuan
10	Kontrol bowel (BAB)	5	10	Frekuensi : 2-3 kali sehari
11	Kontrol bladder (BAK)	5	10	Mampu toileting sendiri
12	Olahraga/latihan	5	10	Terkadang senam pada hari jumat
13	Rekreasi/pemanfaatan waktu luang	5	10	Selama sakit klien tidak pernah ikut rekreasi
Total			100	

**Keterangan :**

- 130 : Mandiri
- 60-125 : Ketergantungan sebagian
- 55 : Ketergantungan total
-

## PENILAIAN POTENSI DEKUBITUS (SKOR NORTON)

*Kondisi Fisik Umum: Lumayan*

- |                 |   |
|-----------------|---|
| a) Baik         | 4 |
| b) Lumayan      | 3 |
| c) Buruk        | 2 |
| d) Sangat buruk | 1 |

*Kesadaran: Kompos Mentis*

- |                  |   |
|------------------|---|
| a) Kompos mentis | 4 |
| b) Apatis        | 3 |
| c) Sopor         | 2 |
| d) Koma          | 1 |

*Aktivitas: Ambulan*

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| a) Ambulan                | 4 |
| b) Ambulan dengan bantuan | 3 |
| c) Hanya bisa duduk       | 2 |
| d) Tiduran                | 1 |

*Mobilitas: bergerak bebas*

- |                        |   |
|------------------------|---|
| a) Bergerak bebas      | 4 |
| b) Sedikit terbatas    | 3 |
| c) Sangat terbatas     | 2 |
| d) Tidak bisa bergerak | 1 |

*Inkontinen: Tidak*

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| a) Tidak                       | 4 |
| b) Kadang-kadang               | 3 |
| c) Sering Inkontinesia urin    | 2 |
| d) Inkontinensia alvi dan urin | 1 |

---

15

Interpretasi :

**15-20 : Kecil sekali/tak terjadi**

12-15 : Kemungkinan kecil terjadi


< 12 : Kemungkinan besar terjadi

**Identifikasi aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan MMSE (*Mini Mental Status Exam*)**

- Orientasi
- Registrasi
- Perhatian
- Kalkulasi
- Mengingat kembali

No.	Aspek Kognitif	Nilai Maks	Nilai Klien	Kriteria
1	Orientasi Waktu	5	3	Menyebutkan dengan benar : (Nilai 1 untuk tiap jawaban) Tahun Bulan Hari Musim Tanggal
	Orientasi Tempat	5	5	Dimana kita sekarang berada? (Nilai 1 untuk setiap jawaban) Kota Propinsi/Kabupaten/Kecamatan <input type="checkbox"/> Di ruangan mana Di lantai berapa Nama wisma.....
2	Registrasi	3	3	Sebutkan nama 3 obyek/benda (oleh pemeriksa), 1 detik untuk menyebutkan masing-masing obyek. Kemudian tanyakan kepada klien ketiga obyek yang disebutkan tadi. (Nilai 1 untuk setiap jawaban) <input type="checkbox"/> Obyek kasur <input type="checkbox"/> Obyek gelas <input type="checkbox"/> Obyek infus
3	Perhatian dan kalkulasi	5	0	Minta klien mengeja 5 kata dari belakang, misal "BAPAK" K A P A B  Minta klien hitung mundur dari 100 ke bawah dengan pengurangan 5. Berhenti setelah mendapat nilai 75.

				(Nilai 1 setiap jawaban benar)
4	Mengingat	3	3	Minta klien untuk mengulangi ketiga obyek pada No.2 (registrasi) tadi. Bila benar, 1 poin untuk masing-masing obyek. <ul style="list-style-type: none"> <li>• kasur</li> <li>• gelas</li> <li>• bunga</li> </ul>
5	Bahasa (9) Menamai	2	2	Tunjukkan pada klien suatu benda dan tanyakan namanya pada klien. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (pulpen)</li> <li><input type="checkbox"/> (handphone)</li> </ul>
	Pengulangan	1	1	Minta klien untuk mengulang kata berikut : “Tak ada jika, dan, atau, tetapi.” Bila benar, nilai satu poin. Pernyataan benar 2 buah (contoh : tak ada, tetapi)
	Pemahaman	3	3	Minta klien untuk mengikuti perintah berikut yang terdiri dari 3 langkah : Ambil kertas di tangan anda, lipat dua, dan taruh di lantai.” Ambil kertas di tangan anda Lipat dua Taruh di lantai
	Membaca			
	Menulis			
	Menggambar	1	1	Perintahkan pada klien untuk hal Berikut (bila aktivitas sesuai perintah nilai 1 point) “Tutup mata Anda”
		1	0	Perintahkan pada klien untuk menulis satu kalimat dan menyalin gambar. Saya ingin cepat sembuh

		1	0	Perintahkan klien untuk menggambar, gambar di bawah ini :  
--	--	---	---	---

Interpretasi hasil : klien berada pada skor 21 yaitu Aspek Kognitif dan fungsi mental ringan



## ANALISIS DATA

NO.	DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
1.	<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan klien sulit menggerakkan kedua ekstermitas bawah</li> <li>- Klien merasa cemas saat bergerak</li> <li>- Klien mengatakan seluruh aktivitasnya menggunakan kursi roda</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien tampak lemah</li> <li>- Klien nampak tidak bisa berjalan dan berdiri</li> <li>- Sendi Kaku</li> <li>- Gerakan Terbatas</li> <li>- Kekuatan otot menurun 3 3 0 0</li> <li>- Rentang gerak (ROM) menurun</li> <li>- Pengkajian Status Fungsional Score : B (klien mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, kecuali salah satu saja dari fungsi berpindah)</li> <li>- Skor EMS : 4 (bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar)</li> <li>- Terdapat deformitas pada kedua ekstermitas bawah</li> <li>- Barthel Indeks : 100</li> <li>- (Ketergantungan Sebagian)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Penuaan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Perubahan fisik/biologis</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penurunan fungsi muskuloskeletal</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penurunan massa, kelemahan otot, kekakuan sendi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Gangguan mobilitas fisik</p>	<p><b>Gangguan mobilitas Fisik</b></p>

<p>2.</p>	<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengeluh sering lupa dengan sesuatu yang ingin dikerjakan</li> <li>- Klien mengatakan tidak mengingat tahun lahirnya dan berapa usianya</li> <li>- Klien mengatakan tidak mampu mengingat penyebab kakinya susah digerakkan</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien tidak mampu melakukan kemampuan yang dipelajari sebelumnya</li> <li>- Score SPMSQ : 6 (Fungsi Intelektual Sedang)</li> <li>- Score MMSE :21 (Aspek Kognitif dan fungsi mental ringan)</li> </ul>	<p>Proses penuaan ↓ Penurunan fungsi neurologi ↓ Ketidakadekuatan stimulus intelektual ↓ Gangguan orientasi, ketidakadekuatan memori, demensia ↓ Gangguan memori</p>	<p><b>Gangguan memori</b></p>
<p>3.</p>	<p><b>DS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan ia lebih suka menyendiri dikamar dibandingkan keluar</li> </ul> <p><b>DO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien nampak menarik diri</li> <li>- Terkadang tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain</li> <li>- Afek Sedih</li> <li>- Score Status Sosial : 5 (Fungsi Sosial Kurang)</li> </ul>	<p>Gangguan Tugas Perkembangan :Tahap Dewasa Akhir ↓ Internal Stressor &amp; Eksternal Stressor ↓ Koping Individu Tidak Efektif ↓ Perubahan perilaku psikososial ↓ Menarik Diri Dari Sosial ↓ <b>Risiko Jatuh</b></p>	<p><b>Isolasi Sosial</b></p>

<p>4.</p>	<p><b>Ds :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan jarang bersih-bersih karena kondisi yang ia alami</li> <li>- Klien mengatakan biasanya mandi hanya lap-lap badan saja itupun 2 hari sekali, jarang sikat gigi dan cuci rambut</li> </ul> <p><b>DO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nampak gigi klien kuning</li> <li>- Klien nampak tidak bisa berjalan dan berdiri</li> <li>- Sendi Kaku</li> <li>- Gerakan Terbatas</li> <li>- Minat melakukan perawatan diri Kurang</li> <li>- Barthel Indeks : 100 (Ketergantungan Sebagian)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Penuaan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Perubahan fisik/biologis</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penurunan Kekuatan otot</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Sulit bergerak</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Defisit Perawatan Diri</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Defisit Perawatan Diri</b></p>
<p>5.</p>	<p><b>Faktor Risiko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketajaman penglihatan : kurang baik karena klien hanya mampu melihat objek jauh saat menggunakan kacamata</li> <li>- Skala jatuh morse : 65 Risiko tinggi, Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar resiko tinggi</li> <li>- Umur Klien : 103 tahun</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Usia &gt;60 Tahun</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penurunan Kekuatan Otot</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Gangguan Keseimbangan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Riwayat Jatuh</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Risiko Jatuh</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Risiko Jatuh</b></p>

## B. DIAGNOSIS KEPERAWATAN

No	Diagnosis Keperawatan
1	<p><b>(D.0054) Gangguan Mobilitas Fisik b.d Penurunan kekuatan otot d.d: DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan klien sulit menggerakkan kedua ekstermitas bawah</li> <li>- Klien merasa cemas saat bergerak</li> <li>- Klien mengatakan seluruh aktivitasnya menggunakan kursi roda</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien tampak lemah</li> <li>- Klien nampak tidak bisa berjalan dan berdiri</li> <li>- Sendi Kaku</li> <li>- Gerakan Terbatas</li> <li>- Kekuatan otot menurun</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">3      3 0      0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rentang gerak (ROM) menurun</li> <li>- Pengkajian Status Fungsional Score : B (klien mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, kecuali salah satu saja dari fungsi berpindah)</li> <li>- Skor EMS : 4 (bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar)</li> <li>- Terdapat deformitas pada kedua ekstermitas bawah</li> <li>- Barthel Indeks : 100 (Ketergantungan Sebagian)</li> </ul>
2	<p><b>(D.0062) Gangguan Memori b.d proses penuaan d.d :</b></p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengeluh sering lupa dengan sesuatu yang ingin dikerjakan</li> <li>- Klien mengatakan tidak mengingat tahun lahirnya dan berapa usianya</li> <li>- Klien mengatakan tidak mampu mengingat penyebab kakinya susah digerakkan</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien tidak mampu melakukan kemampuan yang dipelajari sebelumnya</li> <li>- Score SPMSQ : 6 (Fungsi Intelektual Sedang)</li> <li>- Score MMSE :21 (Aspek Kognitif dan fungsi mental ringan)</li> </ul>
3	<p><b>(D.0121) Isolasi Sosial b.d ketidakmampuan menjalin hubungan yang memuaskan d.d</b></p> <p><b>DS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan ia lebih suka menyendiri dikamar dibandingkan keluar</li> </ul> <p><b>DO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien nampak menarik diri</li> <li>- Terkadang tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain</li> <li>- Afek Sedih</li> <li>- Score Status Sosial : 5 (Fungsi Sosial Kurang)</li> </ul>

4	<p><b>(D.0109) Defisit Perawatan Diri b.d kelemahan d.d:</b></p> <p><b>Ds :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan jarang bersih-bersih karena kondisi yang ia alami</li> <li>- Klien mengatakan biasanya mandi hanya lap-lap badan saja itupun 2 hari sekali, jarang sikat gigi dan cuci rambut</li> </ul> <p><b>DO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nampak gigi klien kuning</li> <li>- Klien nampak tidak bisa berjalan dan berdiri</li> <li>- Sendi Kaku</li> <li>- Gerakan Terbatas</li> <li>- Minat melakukan perawatan diri kurang</li> <li>- Barthel Indeks : 100 (Ketergantungan Sebagian)</li> </ul>
5	<p><b>Resiko Jatuh d/d :</b></p> <p><b>Faktor Risiko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketajaman penglihatan : kurang baik karena klien hanya mampu melihat objek jauh saat menggunakan kacamata</li> <li>- Skala jatuh morse : 65 Risiko tinggi, Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar resiko tinggi</li> <li>- Umur Klien : 103 tahun</li> </ul>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### C. INTERVENSI KEPERAWATAN

No	Diagnosis Keperawatan	Kriteria Evaluasi	Intervensi	Rasional
1	<p><b>(D.0054) Gangguan Mobilitas Fisik b.d Penurunan kekuatan otot d.d:</b></p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan klien sulit menggerakkan kedua ekstermitas bawah</li> <li>- Klien merasa cemas saat bergerak</li> <li>- Klien mengatakan seluruh aktivitasnya menggunakan kursi roda</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien tampak lemah</li> <li>- Klien nampak tidak bisa berjalan dan berdiri</li> <li>- Sendi Kaku</li> <li>- Gerakan Terbatas</li> <li>- Kekuatan otot menurun 3 3 0 0</li> <li>- Rentang gerak (ROM) menurun</li> <li>- Pengkajian Status Fungsional Score : B (klien mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, kecuali salah satu saja dari fungsi berpindah)</li> <li>- Skor EMS : 4 (bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar)</li> <li>- Terdapat deformitas pada kedua ekstermitas bawah</li> <li>- Barthel Indeks :100 (Ketergantungan Sebagian)</li> </ul>	<p><b>Mobilitas Fisik (L.05042)</b></p> <p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 4x24 jam maka mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pergerakan ekstermitas meningkat</li> <li>2. Kekuatan otot meningkat</li> </ol>	<p><b>(L.082571) Terapi Pemijatan</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kontraindikasi terapi pemijatan</li> <li>- Identifikasi kesediaan dan penerimaan dilakukan pemijatan (Terapi <i>Massage</i> Manurak)</li> <li>- Monitor respons terhadap pemijatan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilihlah area tubuh yang akan dipijat</li> <li>- Siapkan lingkungan yang hangat, nyaman dan privasi</li> <li>- Gunakan lotion atau minyakurut untuk mengurangi gesekan</li> <li>- Lakukan pemijatan dengan teknik yang tepat</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jelaskan tujuan dan prosedur terapi</li> <li>- Anjurkan beristirahat setelah dilakukan</li> </ul>	<p><b>Terapi Pemijatan Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui kontra indikasi terapi pemijatan (mis. Penurunan trombosit gangguan integritas kulit)</li> <li>- Agar klien bersedia untuk dipijat</li> <li>- Untuk mengetahui respons terhadap pemijatan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memilih area tubuh yang akan dipijat (mi ekstermitas atas dan bawah)</li> <li>- Menciptakan lingkungan yang nyaman</li> <li>- Agar rileks dan mengurangi gesekan</li> <li>- Meningkatkan kekuatan otot</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui tujuan dan prosedur</li> </ul>

			pejijatan	tindakan yang diberikan - Agar klien rileks
2	<p><b>(D.0062) Gangguan Memori b.d proses penuaan d.d</b></p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengeluh sering lupa dengan sesuatu yang ingin dikerjakan</li> <li>- Klien mengatakan tidak mengingat tahun lahirnya dan berapa usianya</li> <li>- Klien mengatakan tidak mampu mengingat penyebab kakinya susah digerakkan</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien tidak mampu melakukan kemampuan yang dipelajari sebelumnya</li> <li>- Score SPMSQ : 6 (Fungsi Intelektual Sedang)</li> <li>- Score MMSE :21 (Aspek Kognitif dan fungsi mental ringan)</li> </ul>	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan memori meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbalisasi kemampuan mengingat perilaku tertentu yang pernah dilakukan</li> <li>2. Verbalisasi kemampuan mengingat peristiwa</li> </ol>	<p><b>(1.06188) Latihan Memori Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi masalah memori yang dialami</li> <li>- Identifikasi kesalahan terhadap orientasi</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan</li> <li>- Fasilitasi mengingat kembali pengalaman masa lalu, jika perlu</li> <li>- Stimulasi menggunakan memori pada peristiwa yang baru terjadi</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajarkan teknik memori yang tepat</li> </ul>	<p><b>Latihan Memori Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui masalah memori yang dialami</li> <li>- Mengetahui kesalahan terhadap orientasi</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar menstimulasi memori klien</li> <li>- Memfasilitasi klien mengingat masa lalu</li> <li>- Agar menstimulasi memori klien</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan memori pada klien</li> </ul>
3.	<p><b>(D.0121) Isolasi Sosial b.d ketidakmampuan menjalin hubungan yang memuaskan d.d</b></p> <p><b>DS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan ia lebih suka menyendiri dikamar dibandingkan keluar</li> </ul>	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan keterlibatan sosial meningkat dengan kriteria hasil:</p>	<p><b>(1.13498) Promosi Sosialisasi Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang</li> </ul>	<p><b>Promosi Sosialisasi Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain</li> </ul>

	<p><b>DO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien nampak menarik diri</li> <li>- Terkadang tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain</li> <li>- Afek Sedih</li> <li>- Score Status Sosial : 5 (Fungsi Sosial Kurang)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minat Interaksi meningkat</li> <li>2. Minat terhadap aktivitas meningkat</li> <li>3. Afek sedih menurun</li> </ol>	<p>lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan</li> <li>- Motivasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok</li> <li>- Motivasi berinteraksi diluar lingkungan</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan berinteraksi dengan orang lain</li> <li>- Anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui hambatan melakukan interaksi dengan orang lain</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan</li> <li>- Agar mampu melakukan aktivitas baru dan kegiatan berkelompok</li> <li>- Agar mampu berinteraksi diluar lingkungan</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan interaksi sosial klien dengan orang lain</li> <li>- Melibatkan klien dalam kegiatan sosial</li> </ul>
4	<p><b>(D.0109) Defisit Perawatan Diri b.d kelemahan d.d:</b></p> <p><b>Ds :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan jarang bersih-bersih karena kondisi yang ia alami</li> <li>- Klien mengatakan biasanya mandi hanya lap-lap badan saja itupun 2 hari sekali, jarang sikat gigi dan cuci rambut</li> </ul> <p><b>DO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nampak gigi klien kuning</li> <li>- Klien nampak tidak bisa berjalan dan berdiri</li> </ul>	<p>Setelah diberikan tindakan keperawatan 3x24 jam di harapkan Perawatan diri meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan kebersihan diri meningkat</li> <li>2. Mempertahankan kebersihan mulut meningkat</li> <li>3. Minat melakukan perawatan diri meningkat</li> </ol>	<p><b>(1.11348) Dukungan Perawatan Diri Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tingkat kemandirian</li> <li>- Identifikasi alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias dan makan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>Fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan</p> <p><b>Edukasi</b></p>	<p><b>Dukungan Perawatan Diri Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui tingkat kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari</li> <li>- Untuk mengetahui tingkat kemandirian pasien</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>Membantu pasien dalam melakukan perawatan diri</p> <p><b>Edukasi</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sendi Kaku</li> <li>- Gerakan Terbatas</li> <li>- Minat melakukan perawatan diri kurang</li> <li>- Barthel Indeks : 100 (Ketergantungan Sebagian)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membiasakan pasien dalam melakukan perawatan diri</li> </ul>
5.	<p><b>Resiko Jatuh d/d :</b></p> <p><b>Faktor Risiko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketajaman penglihatan : kurang baik karena klien hanya mampu melihat objek jauh saat menggunakan kacamata</li> <li>- Skala jatuh morse : 65 Risiko tinggi, Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar resiko tinggi</li> <li>- Umur Klien : 103 tahun</li> </ul>	<p>(L.14138) Tingkat Jatuh Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jatuh saat duduk menurun</li> <li>2. Jatuh saat dipindahkan cukup menurun</li> </ol>	<p><b>(I. 14540) Pencegahan Jatuh</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi faktor risiko jatuh</li> <li>- Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh</li> <li>- Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah</li> <li>- Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin</li> <li>- Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</li> </ul>	<p><b>Pencegahan Jatuh Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengenal perilaku dan faktor-faktor yang berpotensi mengakibatkan jatuh</li> <li>- Mengenal keadaan lingkungan sekitar yang berkontribusi pada risiko jatuh</li> <li>- Mengetahui tingkat risiko jatuh</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminimalisir risiko jatuh dari tempat tidur atau kursi roda</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunkan risiko terjatuh</li> <li>- Membantu klien berjalan dengan langkah tetap untuk mempertahankan keseimbangan diri dan mencegah terjadinya kaki terkilir</li> <li>- Meminimalisir risiko jatuh</li> <li>- Meminimalisir risiko jatuh</li> </ul>

## D. IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

Tgl	Kode Diagnosis	Jam	Implementasi	Evaluasi				
20/3/2024	I	09.15 WITA	<p><b>(I.082571) Terapi Pemijatan Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi kontraindikasi terapi pemijatan Hasil : telah mengidentifikasi kontraindikasi terapi pemijatan</li> <li>- Mengidentifikasi kesediaan dan penerimaan dilakukan pemijatan (Terapi <i>Massage Manurak</i>) Hasil : klien setuju dan menerima dilakukan pemijatan</li> <li>- Memonitor respons terhadap pemijatan Hasil : Klien tampak senang dan nyaman dilakukan pemijatan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memilih area tubuh yang akan dipijat Hasil : area tangan yang akan dipijat adalah kaki</li> <li>- menyiapkan lingkungan yang hangat, nyaman dan privasi Hasil : klien nyaman dengan lingkungan</li> <li>- Gunakan lotion atau minyak urut untuk mengurangi gesekan Hasil : digunakan lotion untuk mengurangi gesekan</li> <li>- Melakukan pemijatan dengan teknik yang tepat Hasil : dilakukan pemijatan sesuai dengan SOP</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan tujuan dan prosedur terapi Hasil : Klien paham dengan tujuan prosedur yang dijelaskan</li> <li>- Menganjurkan beristirahat setelah dilakukan pemijatan Hasil : klien setuju untuk beristirahat</li> </ul>	<p>S: klien mengatakan agak lebih nyaman setelah dilakukan terapi pemijatan</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekuatan otot :</li> </ul> <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekstermitas bawah klien tampak masih lemah dan kaku.</li> <li>- Skor EMS : 4 (bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar)</li> </ul> <p>A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi <b>(I.082571)</b></p> <p><b>Terapi Pemijatan Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor respons terhadap pemijatan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilihlah area tubuh yang akan dipijat</li> <li>- Gunakan lotion atau minyak urut untuk mengurangi gesekan</li> <li>- Lakukan pemijatan dengan teknik yang tepat (Terapi <i>Massage Manurak</i>)</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan beristirahat setelah dilakukan pemijatan</li> </ul>	3	3	0	0
3	3							
0	0							

20/3/2024	II	09.40 WITA	<p><b>(1.06188) Latihan Memori Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi masalah memori yang dialami Hasil : Telah di indentifikasi masalah memori yang dialami klien Fungsi Intelektual Sedang</li> <li>- Mengidentifikasi kesalahan terhadap orientasi</li> <li>- Hasil : kesalahan terhadap orientasi Aspek Kognitif dan fungsi mental ringan</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan Hasil : Klien mengulangi tanggal berapa hari ,bulan dan tahun ini</li> <li>- Fasilitasi mengingat kembali pengalaman masa lalu, jika perlu Hasil : Klien mengatakan klien kangen masa-masa gadisnya</li> </ul> <p><b>Edukasi</b> mengajarkan teknik memori yang tepat Hasil : diajarkan mengenai orientasi realita</p>	<p>S: klien mengatakan lupa hari , bulan dan tahun berapa sekarang</p> <p>O: klien tampak masih sering bingung saat ditanya</p> <p>A: Masalah gangguan memori belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi <b>(1.06188)</b></p> <p><b>Latihan Memori Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi masalah memori yang dialami</li> <li>- Identifikasi kesalahan terhadap orientasi</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan</li> <li>- Fasilitasi mengingat kembali pengalaman masa lalu, jika perlu</li> <li>- Stimulasi menggunakan memori pada peristiwa yang baru terjadi</li> </ul> <p><b>Edukasi</b> Ajarkan teknik memori yang tepat</p>
21/3/2024	III	10.15 WITA	<p><b>(1.13498) Promosi Sosialisasi Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain Hasil : klien tampak menarik diri</li> <li>- Mengidentifikasi hambatan melakukan interaksi</li> </ul>	<p>S: klien mengatakan termotivasi untuk berinteraksi dengan orang lain</p> <p>O: klien Terkadang menolak berinteraksi dengan orang lain</p> <p>A: Masalah isolasi sosial belum teratasi</p>

			<p>dengan orang lain  Hasil : Klien lebih suka menyendiri</p> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memotivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan  Hasil : motivasi klien meningkat dalam keterlibatan dalam suatu hubungan</li> <li>- Memotivasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok  Hasil : motivasi klien meningkat dalam beraktivitas dan kegiatan kelompok</li> <li>- Memotivasi berinteraksi diluar lingkungan  Hasil : klien termotivasi untuk berinteraksi di luar lingkungan</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganjurkan berinteraksi dengan orang lain  Hasil : klien setuju untuk berinteraksi dengan orang lain</li> <li>- Menganjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan</li> <li>- Hasil : klien setuju untuk ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan</li> </ul>	<p>P: Lanjutkan intervensi <b>(1.13498)</b></p> <p><b>Promosi Sosialisasi Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain</li> <li>- Identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan</li> <li>- Motivasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok</li> <li>- Motivasi berinteraksi diluar lingkungan</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan berinteraksi dengan orang lain</li> <li>- Anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan</li> </ul>
21/3/2024	IV	10.30 WITA	<p><b>(1.11348) Dukungan Perawatan Diri Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memonitor tingkat kemandirian  Hasil : klien mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, kecuali salah satu saja dari fungsi diatas (berpindah)</li> <li>- Mengidentifikasi alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias dan makan</li> </ul>	<p>S: klien mengatakan belum mandi O: klien tampak masih kotor  A: masalah defisit perawatan diri belum teratasi  P: Lanjutkan intervensi  <b>(1.11348) Dukungan Perawatan Diri Observasi</b></p>

			<p>Hasil : Klien mengatakan menggunakan sabun ,shampo dan alat menyikat gigi, baju dan parfum dan piring</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan Hasil : klien hanya ketergantungan berpindah untuk membersihkan diri klien hanya ingin melakukan sendiri.</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajarkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan</li> </ul> <p>Hasil: klien melakukan perawatan diri sesuai kemampuan klien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tingkat kemandirian</li> <li>- Identifikasi alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias dan makan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan</li> </ul>
22/3/2024	V	11.00 WITA	<p><b>14540) Pencegahan Jatuh Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi faktor risiko jatuh</li> </ul> <p>Hasil : faktor resiko jatuh klien di karenakan kekuatan otot ekstremitas bawahnya yang lemah dan nyeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh</li> </ul> <p>Hasil : lantai klien kadang basah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala Hasil : Skala jatuh morse risiko tinggi</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci</li> </ul> <p>Hasil : kursi roda selalu dalam kondisi terkunci saat duduk</p> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajarkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah</li> </ul> <p>Hasil : Klien setuju dan memanggil perawat apabila</p>	<p>S: klien mengatakan tidak bisa jalan hanya menggunakan kursi roda</p> <p>O: klien tampak hanya menggunakan kursi roda</p> <p>A: masalah risiko jatuh belum teratasi P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>14540) Pencegahan Jatuh Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi faktor risiko jatuh</li> <li>- Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh</li> <li>- Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah</li> <li>- Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin</li> </ul>

			<p>membutuhkan bantuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</li> </ul> <p>Hasil : klien setuju dengan anjuran untuk menjaga keseimbangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</li> </ul>				
22/3/2024	I	09.25 WITA	<p><b>(I.082571) Terapi Pemijatan Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi kesediaan dan penerimaan dilakukan pemijatan (Terapi <i>Massage</i> Manurak)</li> </ul> <p>Hasil : klien setuju dan menerima dilakukan pemijatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memonitor respons terhadap pemijatan</li> </ul> <p>Hasil : Klien tampak senang dan nyaman dilakukan pemijatan</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memilih area tubuh yang akan dipijat</li> </ul> <p>Hasil : area tangan yang akan dipijat adalah kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>- menyiapkan lingkungan yang hangat, nyaman dan privasi</li> </ul> <p>Hasil : klien nyaman dengan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gunakan lotion atau minyakurut untuk mengurangi gesekan</li> </ul> <p>Hasil : digunakan lotion untuk mengurangi gesekan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemijatan dengan teknik yang tepat</li> </ul> <p>Hasil : dilakukan pemijatan sesuai dengan SOP</p> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan tujuan dan prosedur terapi</li> </ul> <p>Hasil : Klien paham dengan tujuan prosedur yang dijelaskan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganjurkan beristirahat setelah dilakukan pemijatan</li> </ul> <p>Hasil : klien setuju untuk beristirahat</p> </p>	<p>S: klien mengatakan agak lebih nyaman setelah dilakukan terapi pemijatan</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekuatan otot :</li> </ul> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">3</td> <td style="padding: 0 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">0</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ektermitas bawah klien tampak masih lemah dan kaku</li> <li>- Skor EMS : 4 (bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar)</li> </ul> <p>A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi <b>(I.082571)</b></p> <p><b>Terapi Pemijatan Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor respons terhadap pemijatan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gunakan lotion atau minyakurut untuk mengurangi gesekan</li> <li>- Lakukan pemijatan dengan teknik yang tepat (Terapi <i>Massage</i> Manurak)</li> </ul>	3	3	0	0
3	3							
0	0							

23/3/2024	II	09.50 WITA	<p><b>(1.06188) Latihan Memori Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi masalah memori yang dialami Hasil : Telah di indentifikasi masalah memori yang dialami klien Fungsi Intelektual Sedang</li> <li>- Mengidentifikasi kesalahan terhadap orientasi</li> <li>- Hasil : kesalahan terhadap orientasi Aspek Kognitif dan fungsi mental ringan</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan Hasil : Klien mengulang tanggal berapa hari ,bulan dan tahun ini</li> <li>- Fasilitasi mengingat kembali pengalaman masa lalu, jika perlu Hasil : Klien mengatakan klien kangen masa-masa gadisnya</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajarkan teknik memori yang tepat Hasil : diajarkan mengenai orientasi realita</li> </ul>	<p>S: klien mengatakan hari sabtu, bulan maret dan tahun 2024</p> <p>O: klien tampak masih sering bingung saat ditanya</p> <p>A: Masalah gangguan memori belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi <b>(1.06188)</b></p> <p><b>Latihan Memori Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi masalah memori yang dialami</li> <li>- Identifikasi kesalahan terhadap orientasi</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan</li> <li>- Fasilitasi mengingat kembali pengalaman masa lalu, jika perlu</li> <li>- Stimulasi menggunakan memori pada peristiwa yang baru terjadi</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <p>Ajarkan teknik memori yang tepat</p>
23/3/2024	III	10.25 WITA	<p><b>(1.13498) Promosi Sosialisasi Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi kemampuan melakukan interaksi</li> </ul>	<p>S: klien mengatakan termotivasi untuk berinteraksi dengan orang lain</p> <p>O: klien Terkadang menolak berinteraksi</p>

			<p>dengan orang lain  Hasil : klien sudah mampu sedikit mau berinteraksi dengan orang lain</p> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memotivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan  Hasil : motivasi klien meningkat dalam keterlibatan dalam suatu hubungan</li> <li>- Memotivasi berinteraksi diluar lingkungan  Hasil : klien m a u diajak untuk melakukan TAK</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganjurkan berinteraksi dengan orang lain  Hasil : klien setuju untuk berinteraksi dengan orang lain</li> <li>- Menganjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan</li> <li>- Hasil : klien setuju untuk ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan</li> </ul>	<p>dengan orang lain</p> <p>A: Masalah isolasi sosial belum teratasi P:  Lanjutkan intervensi</p> <p><b>(1.13498) Promosi Sosialisasi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain</li> <li>- Identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan</li> <li>- Motivasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok</li> <li>- Motivasi berinteraksi diluar lingkungan</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan berinteraksi dengan orang lain</li> <li>- Anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan</li> </ul>
24/3/2024	IV	10.40 WITA	<p><b>(1.11348) Dukungan Perawatan Diri</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memonitor tingkat kemandirian</li> </ul> <p>Hasil : klien mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, kecuali salah satu saja dari fungsi</p>	<p>S: klien mengatakan ia sudah mandi tadi pagi</p> <p>O: Nampak gigi klien masih kuning</p> <p>A: masalah defisit perawatan diri belum Teratasi</p>

			<p>diatas (berpindah)</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan Hasil : klien hanya ketergantungan berpindah untuk membersihkan diri klien hanya ingin melakukan sendiri.</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan</li> </ul> <p>Hasil: klien melakukan perawatan diri sesuai kemampuan klien</p>	<p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>(1.11348) Dukungan Perawatan Diri Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tingkat kemandirian</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan</li> </ul>
24/3/2024	V	11.10 WITA	<p><b>14540) Pencegahan Jatuh Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh</li> </ul> <p>Hasil : lantai klien kadang basah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala Hasil : Skala jatuh morse risiko tinggi</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci</li> </ul> <p>Hasil : kursi roda selalu dalam kondisi terkunci saat duduk</p>	<p>S: klien mengatakan tidak bisa jalan hanya menggunakan kursi roda</p> <p>O: klien tampak hanya menggunakan kursi roda</p> <p>A: masalah risiko jatuh belum teratasi P:</p> <p>Lanjutkan intervensi</p> <p><b>14540) Pencegahan Jatuh Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi faktor risiko jatuh</li> <li>- Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh</li> <li>- Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala</li> </ul>

			<p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah Hasil : Klien setuju dan memanggil perawat apabila membutuhkan bantuan</li> <li>- Menganjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh Hasil : klien setuju dengan anjuran untuk menjaga keseimbangan</li> </ul>	<p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah</li> <li>- Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin</li> <li>- Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</li> </ul>				
25/3/2024	I	11.10 WITA	<p><b>(I.082571) Terapi Pemijatan Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi kesediaan dan penerimaan dilakukan pemijatan (Terapi <i>Massage</i> Manurak) Hasil : klien setuju dan menerima dilakukan pemijatan</li> <li>- Memonitor respons terhadap pemijatan Hasil : Klien tampak senang dan nyaman dilakukan pemijatan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memilih area tubuh yang akan dipijat Hasil : area tangan yang akan dipijat adalah kaki</li> <li>- menyiapkan lingkungan yang hangat, nyaman dan privasi Hasil : klien nyaman dengan lingkungan</li> <li>- Gunakan lotion atau minyakurut untuk mengurangi gesekan Hasil : digunakan lotion untuk mengurangi gesekan</li> <li>- Melakukan pemijatan dengan teknik yang tepat Hasil : dilakukan pemijatan sesuai dengan SOP</li> </ul>	<p>S: klien mengatakan agak lebih nyaman setelah dilakukan terapi pemijatan</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekuatan otot :</li> </ul> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">3</td> <td style="padding: 0 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">0</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ektermitas bawah klien tampak masih lemah dan kaku tetapi sudah bisa merasakan rangsangan</li> <li>- Skor EMS : 5 (bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar)</li> </ul> <p>A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi <b>(I.082571)</b></p> <p><b>Terapi Pemijatan Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kesediaan dan penerimaan dilakukan pemijatan (Terapi <i>Massage</i> Manurak)</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gunakan lotion atau minyakurut untuk</li> </ul>	3	3	0	0
3	3							
0	0							

				<p>mengurangi gesekan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lakukan pemijatan dengan teknik yang tepat</li> </ul>
25/3/2024	II	11.20 WITA	<p><b>(1.06188) Latihan Memori Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi masalah memori yang dialami Hasil : Telah di indentifikasi masalah memori yang dialami klien Fungsi Intelektual Sedang</li> <li>- Mengidentifikasi kesalahan terhadap orientasi</li> <li>- Hasil : kesalahan terhadap orientasi Aspek Kognitif dan fungsi mental ringan</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan Hasil : Klien mampu mengulangi apa yang diajarkan, seperti nama presiden, dan nama tempat</li> <li>- Fasilitasi mengingat kembali pengalaman masa lalu, jika perlu Hasil : Klien mengatakan klien waktu masih gadis masih cantik</li> </ul> <p><b>Edukasi</b> mengajarkan teknik memori yang tepat Hasil : diajarkan mengenai orientasi realita</p>	<p>S: klien mengatakan sekarang ia berada di Sentra Gau Mabaji, dan presiden sekarang Jokowi</p> <p>O: klien tampak masih sering bingung saat ditanya</p> <p>A: Masalah gangguan memori belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi <b>(1.06188)</b></p> <p><b>Latihan Memori Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi masalah memori yang dialami</li> <li>- Identifikasi kesalahan terhadap orientasi</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan</li> <li>- Fasilitasi mengingat kembali pengalaman masa lalu, jika perlu</li> <li>- Stimulasi menggunakan memori pada peristiwa yang baru terjadi</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajarkan teknik memori yang tepat</li> </ul>

26/3/2024	III	10.25 WITA	<p><b>(1.13498) Promosi Sosialisasi Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain Hasil : klien tampak menarik diri</li> <li>- Mengidentifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain Hasil : Klien mengatakan sudah senang berinteraksi dengan orang</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memotivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan Hasil : motivasi klien meningkat dalam keterlibatan dalam suatu hubungan</li> <li>- Memotivasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok Hasil : motivasi klien meningkat dalam beraktivitas dan kegiatan kelompok</li> <li>- Memotivasi berinteraksi diluar lingkungan Hasil : klien termotivasi untuk berinteraksi di luar lingkungan</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganjurkan berinteraksi dengan orang lain Hasil : klien telah berinteraksi dengan orang lain</li> <li>- Menganjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan Hasil : klien ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan (kegiatan TAK)</li> </ul>	<p>S: klien mengatakan senang karena ikut serta dalam kegiatan TAK</p> <p>Klien mengatakan termotivasi untuk melakukan interaksi dengan orang lain</p> <p>O: klien tampak senang ikut serta dalam kegiatan TAK</p> <p>A: Masalah isolasi sosial teratasi P: Pertahankan intervensi</p>
-----------	-----	------------	---	--

26/3/2024	IV	11.10 WITA	<p><b>(1.11348) Dukungan Perawatan Diri</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memonitor tingkat kemandirian Hasil : klien mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, kecuali salah satu saja dari fungsi diatas (berpindah)</li> <li>- Mengidentifikasi alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias dan makan Hasil : Klien mengatakan menggunakan sabun ,shampo dan alat menyikat gigi, baju dan parfum dan piring</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan Hasil : klien hanya ketergantungan berpindah untuk membersihkan diri klien hanya ingin melakukan sendiri.</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan Hasil: klien melakukan perawatan diri sesuai kemampuan klien</li> </ul>	<p>S: klien mengatakan sudah mandi O: klien tampak bersih dan wangi A: masalah defisit perawatan diri teratasi P: Pertahankan intervensi</p>
26/3/2024	V	11.30 WITA	<p><b>(14540) Pencegahan Jatuh Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi faktor risiko jatuh Hasil : faktor resiko jatuh klien di karenakan kekuatan otot ekstremitas bawahnya yang lemah dan nyeri</li> <li>- Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh Hasil : lantai klien kadang basah</li> <li>- Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala Hasil : Skala jatuh morse risiko tinggi</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam</li> </ul>	<p>S: klien mengatakan aktivitasnya menggunakan kursi roda O: klien tampak menggunakan kursi roda A: masalah risiko jatuh belum teratasi P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>(14540) Pencegahan Jatuh</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi faktor risiko jatuh</li> <li>- Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh</li> <li>- Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala</li> </ul>

			<p>kondisi terkunci  Hasil : kursi roda selalu dalam kondisi terkunci saat duduk</p> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah</li> </ul> <p>Hasil : Klien setuju dan memanggil perawat apabila membutuhkan bantuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</li> </ul> <p>Hasil : klien setuju dengan anjuran untuk menjaga keseimbangan</p>	<p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah</li> <li>- Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin</li> <li>- Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</li> </ul>				
28/3/2024	I	10.10 WITA	<p><b>(I.082571) Terapi Pemijatan</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi kesediaan dan penerimaan dilakukan pemijatan (Terapi <i>Massage</i> Manurak)</li> </ul> <p>Hasil : klien setuju dan menerima dilakukan pemijatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memonitor respons terhadap pemijatan</li> </ul> <p>Hasil : Klien tampak senang dan nyaman dilakukan pemijatan</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memilih area tubuh yang akan dipijat</li> </ul> <p>Hasil : area tangan yang akan dipijat adalah kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gunakan lotion atau minyak urut untuk mengurangi gesekan</li> <li>- Hasil : digunakan lotion untuk mengurangi gesekan</li> <li>- Melakukan pemijatan dengan teknik yang tepat Hasil : dilakukan pemijatan sesuai dengan SOP</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganjurkan beristirahat setelah dilakukan pemijatan Hasil : klien setuju untuk beristirahat</li> </ul>	<p>S: klien mengatakan nyaman setelah dilakukan terapi pemijatan</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekuatan otot :</li> </ul> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">3</td> <td style="padding: 0 10px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">0</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 0 10px;">0</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekstermitas bawah klien tampak masih lemah dan kaku tetapi sudah bisa merasakan rangsangan</li> <li>- Skor EMS : 7 (bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar)</li> </ul> <p>A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi <b>(I.082571)</b></p> <p><b>Terapi Pemijatan Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kesediaan dan penerimaan dilakukan pemijatan (Terapi <i>Massage</i> Manurak)</li> <li>- Monitor respons terhadap pemijatan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilihlah area tubuh yang akan dipijat</li> </ul>	3	3	0	0
3	3							
0	0							

				<ul style="list-style-type: none"><li>- Siapkan lingkungan yang hangat, nyaman dan privasi</li><li>- Gunakan lotion atau minyakurut untuk mengurangi gesekan</li></ul>
--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## E. EVALUASI KEPERAWATAN

No	Hari/Tgl	Diagnosis	Waktu	Evaluasi (SOAP)	Nama jelas				
1	Kamis, 28 Maret 2024	Gangguan Mobilitas Fisik	11.00 WITA	<p>S: klien mengatakan nyaman setelah dilakukan terapi pemijatan</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekuatan otot :</li> </ul> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">3</td> <td style="padding: 0 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">0</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ektermitas bawah klien tampak masih lemah dan kaku tetapi sudah bisa merasakan rangsangan</li> <li>- Skor EMS : 7 (bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar)</li> </ul> <p>A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>(I.082571) Terapi Pemijatan</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kesediaan dan penerimaan dilakukan pemijatan (Terapi <i>Massage</i> Manurak)</li> <li>- Monitor respons terhadap pemijatan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilihlah area tubuh yang akan dipijat</li> <li>- Siapkan lingkungan yang hangat, nyaman dan privasi</li> </ul> <p>Gunakan lotion atau minyak urut untuk mengurangi gesekan</p>	3	3	0	0	Nurain
3	3								
0	0								
2	Senin, 25 Maret 2023	Gangguan Memori	12.45 WITA	<p>S: klien mengatakansesekarang ia berada di Sentra Gau Mabaji, dan presiden sekarang Jokowi</p> <p>O: klien tampak masih sering bingung saat ditanya</p> <p>A: Masalah gangguan memori belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>(1.06188) Latihan Memori Observasi</b></p>	Nurain				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi masalah memori yang dialami</li> <li>- Identifikasi kesalahan terhadap orientasi</li> </ul> <p><b>Teraupetik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan</li> <li>- Fasilitasi mengingat kembali pengalaman masa lalu, jika perlu</li> <li>- Stimulasi menggunakan memori pada peristiwa yang baru terjadi</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajarkan teknik memori yang tepat</li> </ul>	
3	Selasa, 26 Maret 2024	Isolasi Sosial	12.45 WITA	<p>S: klien mengatakan senang karena ikut serta dalam kegiatan TAK</p> <p>Klien mengatakan termotivasi untuk melakukan interaksi dengan orang lain</p> <p>O: klien tampak senang ikut serta dalam kegiatan TAK</p> <p>A: Masalah isolasi sosial teratasi</p> <p>P: Pertahankan intervensi</p>	<b>Nurain</b>
4	Selasa, 26 Maret 2024	Defisit Perawatan Diri	12.30 WITA	<p>S: klien mengatakan sudah mandi</p> <p>O: klien tampak bersih dan wangi</p> <p>A: masalah defisit perawatan diri teratasi</p> <p>P: Pertahankan intervensi</p>	<b>Nurain</b>
5	Selasa, 26 Maret 2024	Resiko Jatuh	13.00 WITA	<p>S: klien mengatakan aktivitasnya menggunakan kursi roda</p> <p>O: klien tampak menggunakan kursi roda</p> <p>A: masalah risiko jatuh belum teratasi P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>(14540) Pencegahan Jatuh</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi faktor risiko jatuh</li> <li>- Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh</li> <li>- Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci</li> </ul>	<b>Nurain</b>

				<b>Edukasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah</li><li>- Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin</li><li>- Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</li></ul>	
--	--	--	--	---	--




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**F. Analisis Intervensi Terapi *Massage* Manurak Pada Ny. F Yang Mengalami *Immobility* Dengan Masalah Gangguan Mobilitas**

a. Analisis Intervensi Terapi *Massage* Manurak

Skala Mobilitas Lansia  
Ems (Elderly Mobility Scale)



M A K A S A R Grafik 4.1

Berdasarkan grafik 4.1 menunjukkan hasil interpretasi :


- Hari pertama pada tanggal 20/08/2024 sebelum pemberian intervensi menunjukkan Ny. F berada pada skor 4 dengan kategori bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar, seperti berpindah tempat, pergi ke toilet, dan berpakaian
- Hari pertama pada tanggal 20/08/2024 setelah melakukan intervensi menunjukkan Ny. F Ny. F berada pada skor 4 dengan kategori bergantung

dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar, seperti berpindah tempat, ke toilet, dan berpakaian

- c. Hari kedua pada tanggal 22/03/2024 setelah dilakukan intervensi menunjukkan Ny. F masih berada pada skor 4 dengan kategori bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar, seperti berpindah tempat, ke toilet, dan berpakaian
- d. Hari ketiga pada tanggal 25/03/2024 setelah dilakukan intervensi mengalami peningkatan menunjukkan Ny. F berada pada skor 5 dengan kategori bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar, seperti berpindah tempat, ke toilet, dan berpakaian
- e. Hari keempat pada tanggal 28/03/2024 setelah dilakukan intervensi mengalami peningkatan menunjukkan Ny. F berada pada skor 7 dengan kategori bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar, seperti berpindah tempat, ke toilet, dan berpakaian .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

b. Analisis Kekuatan Otot Pada Ny. F setelah diberikan Terapi *Massage* Manurak



Grafik 4.2

Berdasarkan grafik 4.2 menunjukkan hasil interpretasi :

- c. Hari pertama pada tanggal 20/08/2024 sebelum pemberian intervensi kekuatan otot pada Ny. F berada pada skor 3 untuk ekstermitas atas dextra, 3 ekstermitas atas sinistra, 0 ekstermitas bawah dextra dan 0 ekstermitas bawah sinistra. Dengan hasil pengkajian ekstermitas bawah klien tampak masih lemah dan kaku.
- d. Hari pertama pada tanggal 20/08/2024 setelah pemberian intervensi kekuatan otot pada Ny. F berada pada skor 3 untuk ekstermitas atas dextra, 3 ekstermitas atas sinistra, 0 ekstermitas bawah dextra dan 0 ekstermitas bawah sinistra. Dengan hasil pengkajian ekstermitas bawah klien tampak masih lemah dan kaku.
- e. Hari kedua pada tanggal 22/03/2024 setelah pemberian intervensi kekuatan otot pada Ny. F berada pada skor 3 untuk ekstermitas atas dextra, 3 ekstermitas atas

sinistra, 0 ektermitas bawah dextra dan 0 ektermitas bawah sinistra. Dengan hasil pengkajian ektermitas bawah klien tampak masih lemah dan kaku.

- f. Hari ketiga pada tanggal 25/03/2024 setelah pemberian intervensi kekuatan otot pada Ny. F berada pada skor 3 untuk ektermitas atas dextra, 3 ektermitas atas sinistra, 0 ektermitas bawah dextra dan 0 ektermitas bawah sinistra. Dengan hasil pengkajian ektermitas bawah klien tampak masih lemah dan kaku tetapi sudah bisa merasakan rangsangan.
- g. Hari keempat pada tanggal 28/03/2024 setelah pemberian intervensi kekuatan otot pada Ny. F berada pada skor 3 untuk ektermitas atas dextra, 3 ektermitas atas sinistra, 0 ektermitas bawah dextra dan 0 ektermitas bawah sinistra. Dengan hasil pengkajian ektermitas bawah klien tampak masih lemah dan kaku tetapi sudah bisa merasakan rangsangan.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Pengkajian

Pengkajian pada Ny. F di lakukan pada tanggal 19 Maret 2024 di Sentra Gau Mabaji Gowa. Saat ini Ny F berumur 103 tahun ia mengeluh sulit menggerakkan kedua ekstermitas bawah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriani & Sary (2019) bahwa seiring dengan pertambahan usia pada lansia akan terjadi penurunan fungsi dan kemampuan tubuh yang berlangsung secara berkesinambungan dengan menurunnya kekuatan otot.

Pada saat dikaji Ny.F mengatakan seluruh aktivitasnya menggunakan kursi roda, ia merasa cemas saat bergerak. Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Rohaedi et al (2016) penyebab proses penuaan (*aging process*) mengakibatkan adanya penurunan produktivitas, dikarenakan sebagian besar sistem tubuh mengalami kehilangan atau penurunan fungsi setiap tahunnya seperti penurunan tingkat mobilitas. Penurunan produktivitas usia lanjut akan menyebabkan kelompok usia lanjut mengalami penurunan kemampuan muskuloskeletal seperti kekuatan otot ekstremitas bawah yang dapat juga menurunkan aktivitas fisik, sehingga akan mempengaruhi lansia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Pemeriksaan uji kekuatan otot pada Ny. F didapatkan bahwa Ny.F mengalami penurunan kekuatan otot dimana kedua kaki klien tidak dapat diangkat. Pada ekstremitas bawah kanan dan kiri klien tidak mampu mengangkat kakinya dengan masing-masing (skor 0), pada ekstremitas atas kedua tangan

kanan dan kiri mampu di gerakkan dan diangkat namun klien tidak mampu melawan tekanan yang diberikan didapatkan (skor 3) pada kedua ekstremitas atas. Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh nugroho (2023) mobilisasi adalah suatu gangguan gerak dimana pasien mengalami ketidakmampuan berpindah posisi selama tiga hari atau lebih, dengan gerak anatomi tubuh menghilang akibat perubahan fungsi fisiologi. Berdasarkan hasil pengkajian Ny. F tampak tidak dapat berdiri dan berjalan, sendi kaku dan gerakan terbatas. Hal ini sejalan dengan teori Dohanis et al (2023) menjelaskan bahwa penurunan kekuatan otot pada ekstremitas bawah pada lansia dapat menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan mempertahankan keseimbangan tubuh pada lansia sehingga dapat menyebabkan terjadinya risiko jatuh dan mengalami kesulitan untuk berjalan.

Pengkajian pada Ny. F didapatkan hasil pengkajian bahwa Ny.F memiliki riwayat jatuh dan hasil pemeriksaan skala jatuh morse didapatkan hasil skor penilaian 65 dan Barthel Indeks 100 yang artinya klien mengalami risiko jatuh tinggi dan memiliki ketergantungan sebagian. Hal ini sesuai dengan teori Nugroho (2023) menjelaskan bahwa salah satu permasalahan yang dialami adalah masalah keseimbangan tubuh. Lansia memiliki resiko jatuh tinggi dikarenakan gangguan keseimbangan postural yang dialami akibat dari proses penuaan yang akan mengalami kelemahan otot yang tentunya dapat menurunkan kekuatan. penurunan otot ektrimitas bawah dapat mengakibatkan kelambatan gerak, langkah pendek, kaki tidak dapat menapak dengan kuat dan lebih mudah goyah dan menurunnya mobilitas lansia sehingga menyebabkan akan terjadinya risiko jatuh tinggi pada lansia. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sholehudin (2023) Risiko jatuh dapat disebabkan oleh kondisi tubuh yang sedang

mengalami rasa sakit, terutama yang mengalami gangguan ekstremitas sehingga mengakibatkan keterbatasan fisik/ gerak, mengurangi kapasitas untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, kegagalan sistem pernapasan dan muskuloletal, kerusakan fisik, fraktur pada panggul radius, ulna, humerus, kaki, leher, injuri seperti luka memar, lecet dan terkilir.

## **B. Analisis diagnosis**

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisis data terdapat 5 diagnosis keperawatan yang ditegakkan pada klien yaitu gangguan mobilitas fisik b/d penurunan kekuatan otot, gangguan memori b/d proses penuaan, isolasi sosial b/d ketidakmampuan menjalin hubungan yang memuaskan, defisit perawatan diri b/d kelemahan, dan resiko jatuh.

Berdasarkan teori sebelumnya, kemungkinan diagnosis keperawatan yang akan muncul pada klien dengan gangguan mobilitas fisik menurut SDKI (2017) adalah sebagai berikut :

- a. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot
- b. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis
- c. Defisit Perawatan diri berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal
- d. Resiko jatuh dibuktikan dengan gangguan keseimbangan

Pada penelitian ini terdapat 3 diagnosa keperawatan yang sesuai dengan teori yang dipaparkan diantaranya adalah gangguan mobilitas fisik, defisit perawatan diri, dan resiko jatuh. Sedangkan diagnosa keperawatan nyeri akut tidak dapat ditegakkan pada klien yang diteliti.

Menurut SDKI (2017) nyeri akut merupakan Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang 3 bulan. Nyeri akut dapat ditegakkan apabila saat dilakukan pengkajian klien tampak meringis, bersikap protektif (mis. waspada, posisi menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, dan diaforesis. Tanda dan gejala tersebut tidak ditemukan pada klien yang diteliti sehingga diagnosa keperawatan nyeri aku tidak dapat ditegakkan pada Ny. F.

Terdapat 2 diagnosis keperawatan yang ditegakkan tidak sesuai dengan teori yang ada yaitu diagnosis gangguan memori dan isolasi sosial. Gangguan memori ialah ketidakmampuan mengingat beberapa informasi atau perilaku. Gangguan memori dapat ditegakkan jika klien mengalami mengeluh pernah mengalami pengalaman lupa, tidak mampu mempelajari keterampilan baru, tidak mampu mengingat informasi faktual, tidak mampu mengingat perilaku tertentu yang pernah dilakukan, tidak mampu mengingat peristiwa, lupa melakukan perilaku pada waktu yang telah dijadwalkan, merasa mudah lupa dan tidak mampu melakukan kegiatan yang dipelajari sebelumnya (SDKI, 2017). Sedangkan pada waktu dilakukan pengkajian Ny.F mengeluh sering lupa dengan sesuatu yang ingin dikerjakan, klien tidak mengingat tahun lahirnya dan berapa usia, klien mengatakan tidak mampu mengingat penyebab kakinya susah digerakkan, dan berdasarkan hasil pengkajian klien tidak mampu melakukan kemampuan yang dipelajari

sebelumnya, hasil score SPMSQ 6 dan score MMSE 21 yang artinya Ny. F memiliki fungsi intelektual sedang dan aspek kognitif dengan fungsi mental ringan. Hal ini sejalan dengan teori Rasyid et al (2017) mengatakan bahwa kemunduran fungsi kognitif pada lansia dimanifestasikan seperti kesulitan ingatan atau mudah lupa, kemampuan pengambilan keputusan yang melemah dan kinerja yang lebih lambat, hal ini biasanya disebabkan oleh gangguan pada susunan saraf pusat, seperti gangguan oksigenasi otak, penyakit alzheimer dan kekurangan nutrisi dan salah satunya degenerasi/penuaan yang dimana dapat menyebabkan demensia dari penurunan fungsi kognitif.

Menurut SDKI (2017) diagnosis isolasi sosial ialah adalah ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain. Isolasi sosial dapat ditegakkan apabila klien memiliki tanda dan gejala merasa ingin sendirian, merasa tidak aman di tempat umum, merasa berbeda dengan orang lain, merasa asyik dengan pikiran sendiri, merasa tidak mempunyai tujuan yang jelas, menarik diri, tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan, afek datar, afek sedih, riwayat ditolak, menunjukkan permusuhan, tidak mampu memenuhi harapan orang lain, kondisi difabel, tindakan tidak berarti, tidak ada kontak mata, perkembangan terlambat, dan tidak bergairah/lesu. Sedangkan pada saat dilakukan pengkajian pada Ny. F, klien mengatakan ia lebih suka menyendiri dikamar dibandingkan keluar, klien nampak menarik diri dengan hasil score status sosial 5 yang artinya fungsi sosial kurang. Hal ini sejalan Ayu diah (2013) bahwa usia menua merupakan periode transisional dimana seseorang mengalami perubahan tidak hanya masalah kesehatan saja, tetapi juga dalam

peran sosial yang dimana dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kesempatan untuk partisipasi sosial. Pada umumnya masalah yang paling banyak terjadi pada lansia adalah kesepian, kesepian terjadi saat klien mengalami terpisah dari orang lain dan mengalami gangguan sosial

### **C. Analisis Intervensi**

Diagnosis keperawatan utama pada kasus ini ialah gangguan mobilitas fisik, Intervensi keperawatan dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan mobilitas fisik bersumber dari buku (SIKI,2018) yaitu terapi pemijatan ialah memberikan stimulasi kulit dan jaringan dengan berbagai teknik gerakan dan tekanan tangan untuk meredakan nyeri, meningkatkan relaksasi, memperbaiki sirkulasi, dan/atau stimulasi pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan anak. Pada kasus Ny.F salah satu rencana tindakan yang akan dilakukan dengan meningkatkan pergerakan dan kekuatan otot dengan cara message manurak. Menurut Arroyo-Morales et al (2011) message manurak dapat memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan aliran darah, mengurangi ketegangan otot, meningkatkan rangsangan saraf, meningkatkan ruang gerak sendi, mengurangi edema, meningkatkan hormon endorpine dan rasa sejahtera.

Terapi message manurak merupakan gabungan dari terapi message dan latihan ROM. Hal ini sejalan dengan penelitian Aslan & Atln (2022), pemijatan bermanfaat untuk merileksasikan otot-otot yang tegang melancarkan peredaran darah, dan limfe sedangkan menurut In & Jung, (2022) latihan ROM dapat mencegah terjadinya penurunan fleksibilitas sendi dan kekakuan sendi yang terjadi pada seseorang.

Pada diagnosis kedua gangguan memori dengan dengan intervensi keperawatan yaitu latihan memori pada klien. Latihan memori ialah mengajarkan kemampuan untuk meningkatkan daya ingat (SIKI,2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Ulvia kurniawati (2022) dalam penelitian pada lansia yang mengalami gangguan memori dengan memberikan latihan memori pada klien lansia mampu meningkatkan daya ingatannya.

Pada diagnosis ketiga isolasi sosial dengan intervensi keperawatan yaitu promosi sosialisasi, yang bersumber pada buku (SIKI,2018). Promosi Sosialisasi adalah meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2013), yang menekankan pada kebutuhan akan interaksi sosial sebagai suatu cara untuk mengurangi kesepian dan isolasi sosial yang terjadi pada lansia. Dengan dilakukannya promosi sosialisasi, lansia akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain dan cenderung lebih aktif berinteraksi dengan lingkungan luar.

Pada diagnosis selanjutnya ialah defisit perawatan diri, intervensi keperawatan dapat dilakukan untuk mengatasi defisit perawatan diri bersumber dari buku (SIKI,2018) yaitu dukungan perawatan diri ialah dimana kita sebagai memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perawatan diri klien. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutejo (2019), personal hygiene merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bisa dikenal dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu kita sebagai keluarga maupun orang terdekat perlu memfasilitasi lansia dalam memenuhi kebutuhan personal hygiene.

Pada diagnosis selanjutnya ialah Resiko jatuh, intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi resiko jatuh yaitu pencegahan jatuh ialah mengidentifikasi dan menurunkan resiko jatuh akibat perubahan kondisi fisik atau psikologis. Hal ini serupa dengan penelitian (Ramic et al, 2023) menggunakan strategi pencegahan bahaya jatuh pada lansia yang mengalami resiko jatuh menggunakan *Balance training program*.

#### **D. Analisis Implementasi**

Proses implementasi keperawatan pada Ny. F diberikan selama 4x 24 jam atau selama 4 hari dengan dimulai dari hari kamis 20 maret, 22 maret, 25 maret dan sampai pada 28 maret 2024 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun. Diagnosis utama yaitu gangguan mobilitas fisik telah diberikan intervensi terapi pijatan yaitu massage manurak yang dilakukan sebanyak 4 kali dan di implementasikan dengan menstimulus permukaan kulit dengan cara memijat, menggerus, dan memukul pada permukaan tubuh. Massage manurak mampu memperlancar peredaran darah, mengendurkan otot yang tegang, meningkatkan produksi hormon endorphine, meningkatkan sirkulasi darah dan limfe, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan range of movement (ROM), meningkatkan elastisitas jaringan, dan merelaksasikan otot (Graha, 2019).

Diagnosis keperawatan kedua ialah gangguan memori dengan pelaksanaan implementasi memberikan latihan memori pada klien. Implementasi ini dilakukan oleh penulis selama 3x24 jam kali pada tanggal 20, 23 dan 25 maret 2024. Latihan memori yang diimplementasikan pada pasien terdiri dari menstimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali

diucapkan, dan memfasilitasi klien untuk mengingat pengalaman masa lalu. Hal ini sejalan dengan penelitian Shinta et al (2019) dalam penelitian latihan kognitif pada lansia dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan logika, memelihara fungsi kognif, dan meningkatkan daya ingat pada lansia.

Diagnosis keperawatan ketiga ialah isolasi sosial dengan pelaksanaan implementasi dukungan promosi sosialisasi pada klien. Implementasi ini dilakukan oleh penulis selama 3 x 24 jam pada tanggal 21, 23 dan 26 maret 2024. Promosi sosialisai yang diimplementasikan pada klien terdiri dari memotivasi berinteraksi diluar lingkungan, menganjurkan berinteraksi dan menganjurkan untuk ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Hal ini sejalan Keliat (2016), promosi sosialisai merupakan salah satu intervensi keperawatan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan klien dalam bersosialisasi.

Diagnosis keperawatan selanjutnya ialah defisit perawatan diri dengan pelaksanaan implementasi dukungan perawatan diri pada klien. Implementasi ini dilakukan oleh penulis selama 3 x 24 jam pada tanggal 21, 24 dan 26 maret 2024. Dukungan perawatan diri yang diimplementasikan pada pasien terdiri dari memonitor tingkat kemandirian pasien, memfasilitasi, membantu serta menganjurkan klien melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. Hal ini sejalan dengan serupa dengan penelitian Viona et al (2017) dukungan perawatan diri sangat efektif dalam meningkatkan status kesehatan, dimana individu secara sadar dan atas inisiatif pribadi menjaga kesehatan guna membentuk kemandirian demi mencapai taraf kesehatan.

Diagnosis kelima yakni risiko jatuh diberikan intervensi pencegahan

jatuh dan di implementasikan dengan menghitung risiko jatuh menggunakan skala morse, memastikan roda tempat tidur dalam keadaan terkunci, pasang *handrail* tempat tidur dan mengedukasi pasien untuk memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah (2022) menjelaskan bahwa pada diagnosis risiko jatuh peneliti memberikan implementasi dengan cara menghitung risiko jatuh menggunakan skala morse, memastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci, pasang *handrail* tempat tidur, mengedukasi untuk memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Hal ini disebabkan karena pasien berusia 103 tahun, kekuatan otot pasien menurun, pasien mengalami kekakuan pada sendi, sulit bergerak, dan skala morse didapatkan nilai 65 skor pasien mengalami risiko tinggi jatuh sehingga perlu dilakukan pencegahan jatuh.

#### **E. Analisis Evaluasi**

Hasil evaluasi pada diagnosis pertama yaitu gangguan mobilitas fisik, dilakukan implementasi sebanyak 4 kali dengan kriteria hasil pergerakan ekstermitas meningkat dan rentang gerak (ROM) meningkat didapatkan hasil evaluasi masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi dengan hasil sebelum diberikan intervensi yaitu klien mengatakan tidak bisa berjalan dan hanya menggunakan kursi roda. Dan setelah beberapa kali diberikan intervensi hasil Skor EMS meningkat dari skor 4 ke 7 dimana <10 klien masih bergantung dalam manuver mobilitas, dan memerlukan bantuan ADL dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil evaluasi pada diagnosis kedua yaitu gangguan memori, dilakukan implementasi sebanyak 3 kali dengan kriteria hasil verbalisasi kemampuan

mengingat perilaku tertentu yang pernah dilakukan, dan verbalisasi kemampuan mengingat peristiwa didapatkan hasil evaluasi masalah gangguan memori belum teratasi dengan hasil pasien belum mampu hanya mengingat dan mengulang sebagian apa yang telah dilakukan dimana kemampuan mengingat klien sebelum diberikan intervensi tidak mampu mengatakan hari, bulan dan tahun dan setelah 3 kali diberikan intervensi dapat mengatakan hari sabtu, bulan maret, tahun 2024, dan klien mampu mengatakan nama presiden dan nama tempat yang sekarang ditinggali.

Hasil evaluasi pada diagnosis ketiga yaitu isolasi sosial, dilakukan implementasi sebanyak 3 kali diharapkan keterlibatan sosial meningkat dengan kriteria hasil minat interaksi meningkat, minat terhadap aktivitas meningkat, dan afek sedih menurun, didapatkan hasil evaluasi masalah isolasi sosial teratasi dimana kemampuan bersosialisasi sebelum diberikan klien mengatakan termotivasi untuk berinteraksi dengan orang lain dan setelah 3 kali diberikan intervensi klien mengatakan senang ikut serta dalam kegiatan TAK (Terapi aktivitas kelompok) bersama dengan yang lain.

Hasil evaluasi pada diagnosis selanjutnya yaitu defisit perawatan diri, dilakukan implementasi sebanyak 3 kali diharapkan perawatan diri meningkat dengan kriteria hasil mempertahankan kebersihan diri meningkat, mempertahankan kebersihan mulut meningkat dan melakukan perawatan diri meningkat. didapatkan hasil evaluasi masalah defisit perawatan diri teratasi dimana sebelum diberikan klien mengatakan belum mandi, klien nampak kotor dan nampak gigi klien kuning dan setelah 3 kali diberikan intervensi klien klien

tampak bersih dan wangi.

Hasil evaluasi pada diagnosis kelima yaitu resiko jatuh, dilakukan implementasi sebanyak 3 kali diharapkan tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil jatuh saat duduk menurun, dan jatuh saat dipindahkan cukup menurun, didapatkan hasil evaluasi masalah defisit resiko jatuh tidak terjadi selama perawatan, dimana , kursi roda klien selalu dalam kondisi terkunci.

## **F. Analisis Intervensi Terapi *Massage Manurak* Pada Ny. F Yang Mengalami *Immobility* Dengan Masalah Gangguan Mobilitas**

### **a. Analisis Intervensi Terapi *Massage Manurak***

Prioritas masalah pada kasus Ny. F ialah gangguan mobilitas fisik. Intervensi yang diberikan berupa terapi *massage manurak* guna untuk meningkatkan kekuatan otot pada klien berdasarkan *evidence based nursing*. Berdasarkan penelitian menurut Polastri *et al* (2019) & Kong *et al* (2013) terapi *massage* merupakan manipulasi yang positif dalam merehabilitasi berbagai gangguan patologis yang berhubungan dengan sistem muskuloskeletal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2019) perlakuan *masase manurak* efektif dalam menurunkan nyeri, meningkatkan ROM, meningkatkan kekuatan otot, dan fungsi gerak pada cedera pergelangan tangan dengan nilai sig. 0,005 pada nyeri langsung dan fungsi 48 jam serta nilai sig.0,002 pada ROM Eversi.

Berdasarkan grafik 4.1 menunjukkan hasil pencapaian implementasi dengan pemberian intervensi terapi *massage manurak* menggunakan skala ukur

EMS (Elderly Mobility Scale) dengan hasil pada tanggal 28/03/2024 setelah dilakukan intervensi mengalami peningkatan menunjukkan Ny. F berada pada skor 7, walaupun masih dalam kategori kategori bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar, seperti berpindah tempat, ke toilet dan berpakaian. Hal ini dapat dibuktikan dengan poin bergerak dari bergerak dengan alat bantu jalan tetapi tidak menentu / tidak aman menjadi independen dengan alat bantu.

Selama pemberian intervensi pasien merasa rileks dan nyaman. Maka dapat disimpulkan bahwa terapi *massage* manurak relaksasi napas dalam ini efektif dalam meningkatkan kekuatan otot dan pergerakan ekstermitas pada lansia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Field (2016) terapi *massage* memiliki efek menguntungkan pada berbagai kondisi fisiologis diantaranya menurunkan depresi, sindrom nyeri, radang sendi, meningkatkan kekuatan otot, memperlancar peredaran darah, fibromyalgia, hipertensi, kondisi autoimun, asma, gangguan saraf, dan mengurangi kadar kortisol. Senada dengan Arroyo-Morales et al (2011) *massage* manurak dapat memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan aliran darah, mengurangi ketegangan otot, meningkatkan rangsangan saraf, meningkatkan ruang gerak sendi, mengurangi edema, meningkatkan hormon endorpine dan rasa sejahtera.

Terapi *massage* manurak merupakan gabungan dari terapi *massage* dan latihan ROM. Menurut Ali (2015) terapi *massage* bermanfaat untuk meningkatkan aliran darah pada tubuh, sirkulasi darah yang lancar dapat meningkatkan sistem peredaran darah yang baik ke seluruh jaringan pada tubuh. Sedangkan penelitian menurut Bakar & Surani (2016) latihan ROM (*Range of*

*Motion*) merupakan salah satu teknik untuk mengembalikan sistem pergerakan, dan untuk memulihkan kekuatan otot untuk bergerak kembali memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari seperti.

Menurut (Kurniasanti & Ismerini, 2022) pemijatan dapat mengembalikan fungsi ekstremitas. Hal ini di dukung oleh hasil penelitian (Wiguna & Hersika Asmawariza, 2020) pengaruh pemijatan kaki terhadap kekuatan otot ekstremitas pasien stroke, hal ini dapat disebabkan karena pemberian pemijatan dapat memperbaiki sirkulasi (Ainun et al., 2021) dan darah dalam tubuh (Hasheminia et al., 2021), sehingga akan merelaksasikan otot yang mengeras dan merangsang perbaikan alamiah pada abnormalitas skeletal dan kekuatan otot dapat meningkat. *Massage* mempunyai dua pengaruh kuat terhadap tubuh, yaitu efek mekanis dan fisiologis. Efek mekanis langsung berpengaruh pada kinerja *Massage* merangsang kulit dan jaringan, rangasangan ini memiliki efek menghangatkan tubuh dan memberikan tekanan pada pembuluh darah mendorong ke jantung. Sementara itu pada efek fisiologis adalah efek tidak langsung yang diakibatkan oleh tekanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi konsentrasi sistem hormonal dan saraf (Syarifudin & Roepajadi, 2019)

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Marliana (2011) Latihan Range Of Motion (ROM) merupakan latihan pergerakan maksimal yang dilakukan oleh sendi, dan menjadi salah satu bentuk latihan yang memiliki fungsi untuk pemeliharaan fleksibilitas sendi dan kekuatan otot pada pasien stroke (Marliana, 2011). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah gangguan motorik pada pasien stroke salah satunya adalah dengan memberikan terapi

Range Of Motion (ROM) yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan pada otot agar tidak terjadi kelumpuhan pada ekstremitas yang mengalami penurunan kekuatan otot. Hal ini sejalan dengan penelitian Hutahaean et al. (2020) pemberian ROM dapat meningkatkan kekuatan otot sebesar 83% pada nilai kekuatan otot 4. Begitu juga hasil penelitian Anggriani et al., (2018) yang menyatakan bahwa dengan pemberian latihan pasif ROM dapat meningkatkan kekuatan otot sebesar 52,2% dengan nilai 3. Beberapa penelitian menyatakan terapi fisik dapat meningkatkan kekuatan otot salah satunya adalah latihan ROM.

Pemberian intervensi pada lansia dengan gangguan mobilitas bertujuan untuk menyehatkan tubuh yang sehat sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam QS Al-Ar-Rum/30:54 :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (الرُّوم/30:54)

Terjemahannya :

“Allah SWT. yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian Allah SWT. menjadikan setelah kelemahan itu kekuatan. Kemudian Dia (Allah SWT.) menjadikan sesudah kekuatan itu menjadi kelemahan dan beruban. Dia (Allah SWT.) menciptakan apa yang dikehendaki dan Dialah (Allah SWT.) yang maha mengetahui dan lagi mahakuasa”

Penafsiran ayat diatas berdasarkan dalam tafsir Al-Misbah mendiskripsikan pertumbuhan fisik. Ada kelemahan manusia yang menghadapi banyak tantangan dan godaan menjadikan rasa semangatnya kendor. Di sisi lain, terdapat kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. berupa kekuatan jiwa dalam menghadapi tantangan. (Qurais shihab, 2012)

Ketertaitan QS Ar-Rum/30:54 dengan penelitian ini ialah segala makhluk yang Allah SWT. ciptakan terdapat kelemahan dan kekuatan. Oleh sebab itu,

memasuki tahap usia lansia >60 tahun akan mengalami berbagai penurunan masalah kesehatan serta semangat hidup yang kurang sehingga membutuhkan banyak pendekatan diri kepada yang maha kuasa dan dorongan semangat hidup untuk meningkatkan status kesehatannya sehingga dalam penelitian ini salah satu pemberian intervensi yang dapat diberikan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas melalui terapi *massage* manurak agar meningkatkan kekuatan lansia dalam memenuhi aktifitasnya sehari-hari.

Berdasarkan asumsi peneliti, lansia dengan masalahh gangguan mobilitas fisik dalam melakukan aktifitas sehari-harinya dapat di cegah melalui terapi non farmakologis berupa latihan yang tidak memberatkan lansia untuk melaksanakannya dan dapat dilakukan secara mandiri. Dalam penelitian ini, pemberian intervensi terapi *massage* manurak dapat meningkatkan status kesehatan lansia terutama pada lansia yang terdapat masalah pada gangguan pergerakan ekstermitas penurunan kekuatan otot.

#### b. Analisis Kekuatan Otot Pada Ny. F setelah diberikan Terapi *Massage* Manurak

Penurunan kekuatan otot merupakan faktor penting terhadap penurunan aktivitas fungsional dan terjadinya disabilitas pada lanjut usia (Visser *et al.*, 2005). Kekuatan otot sangat berkorelasi dengan massa otot namun jumlah massa otot yang sama mampu menghasilkan tingkat kekuatan yang berbeda. Dengan demikian, ukuran kekuatan otot yang harus digunakan untuk menentukan penurunan kekuatan otot (Rolland *et al.*, 2008). Oleh sebab itu dalam penelitian ini intervensi yang

dilakukan disertai dengan adanya pengukuran kekuatan otot sebelum dan setelah diberikan intervensi terapi massage manurak.

Berdasarkan grafik 4.2 menunjukkan hasil pengukuran kekuatan otot sebelum dan setelah pemberian intervensi terapi *massage* manurak dengan hasil pada tanggal 28/03/2024 setelah pemberian intervensi kekuatan otot pada Ny. F berada pada skor 3 untuk ektermitas atas dextra, 3 ektermitas atas sinistra, 0 ektermitas bawah dextra dan 0 ektermitas bawah sinistra. Dengan hasil pengkajian ektermitas bawah klien tampak masih lemah dan kaku tetapi sudah bisa merasakan rangsangan. Hal ini disebabkan karena adanya proses penuaan berhubungan dengan perubahan fungsional tubuh manusia. Pertambahan usia, diikuti dengan perubahan komposisi tubuh, yang berupa penurunan massa otot dan massa tulang. Perubahan yang berkaitan dengan proses penuaan terjadi setelah 50 tahun kehidupan. Perubahan tersebut tampak signifikan pada massa tubuh yang hilang 1-2% setiap tahunnya dan penurunan kekuatan 1,5-5% setiap tahun (Keller & Engelhardt, 2013).

Menurut Setiorini (2021) ia menjelaskan bahwa pada umur 40 tahun akan mulai terjadi proses penurunan kekuatan otot dan pada usia 75 tahun proses tersebut akan semakin cepat. Kebocoran kalsium dari kelompok protein dalam sel otot yang disebut ryanodine merupakan penyebab menurunnya kekuatan otot pada lansia. Kebocoran tersebut akan mengakibatkan berkurangnya kalsium yang memicu kontraksi otot melemah (Pinontoan et al., 2015). Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al (2021), mengenai gambaran kekuatan otot pada lansia di Ryukyu Medicals Okinawa Japan pada 68 responden. Sebanyak 24 responden lansia usia 60-74 tahun, 35 responden lansia

usia 75-90 tahun, dan sebanyak 9 responden usia lebih dari 90 tahun. Secara keseluruhan dari 68 responden memiliki kekuatan otot yang rendah pada setiap gerakan. Berdasarkan pengukuran pada kaki kanan sebanyak 27 responden memiliki kekuatan otot kaki kanan dapat melawan tahanan tetapi masih lemah. Pada pengukuran kaki kiri sebanyak 21 responden memiliki kekuatan otot kaki dapat melawan tahanan tetapi masih lemah. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan otot akan semakin menurun seiring dengan penambahan usia atau proses penuaan.

Berdasarkan asumsi peneliti, semakin bertambahnya usia maka semakin meningkat masalah kesehatan yang dialami oleh lansia. Salah satunya ialah masalah gangguan mobilitas fisik yang disebabkan karena adanya penurunan kekuatan otot dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Dalam penelitian ini, pengukuran kekuatan otot pada lansia tidak mengalami perubahan, tetapi terdapat sedikit perubahan setelah pemberian intervensi terapi *massage* manurak Ny. F sudah dapat merasakan rangsan walaupun ektermitas bawah klien tampak masih lemah dan kaku.

### **c. Keterbatasan Penelitian**

Pada karya tulis ilmiah ini di Sentra Gau Mabaji Gowa memiliki keterbatasan penelitian yaitu perlunya pemberian intervensi dengan rentang waktu yang cukup lama agar keefektifan pemberian intervensi terapi *massage* manurak ini dapat berpengaruh dengan maksimal pada lansia. Selain itu intervensi terapi *massage* manurak masih kurang diteliti untuk dijadikan dalam referensi.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilaksanakan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Hasil pengkajian dilakukan pada Ny. F di Sentra Gau Mabaji Gowa diperoleh data bahwa Ny. F mengalami *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas yang ditandai dengan keluhan utama klien sulit menggerakkan kedua ekstermitas bawah.
2. Diagnosis keperawatan yang didapatkan pada Ny. F yakni gangguan mobilitas fisik, gangguan memori, isolasi sosial, defisit perawatan diri dan resiko jatuh.
3. Intervensi keperawatan yang akan diterapkan pada Ny. F yakni Terapi Pemijatan : *Massage Manurak*, latihan memori, promosi sosialisasi, dukungan perawatan diri, pencegahan resiko jatuh.
4. Implementasi keperawatan yang telah dilaksanakan pada Ny. F pada diagnosis gangguan mobilitas fisik selama 4 x 24 jam atau selama 4 hari serta pada diagnosis gangguan memori, isolasi sosial, defisit perawatan diri dan resiko jatuh dilakukan selama 3x24 jam atau selama 3 hari diberikan pada klien sesuai dengan intervensi yang telah ditetapkan.
5. Hasil evaluasi keperawatan pada Ny. F didapatkan bahwa diagnosis keperawatan pada gangguan mobilitas fisik belum teratasi, gangguan memori belum teratasi, isolasi sosial teratasi, defisit perawatan diri teratasi dan resiko jatuh tidak teratasi.
6. Hasil analisis EBPN terapi *massage manurak* dilakukan selama 4 x 24 jam atau 4 hari didapatkan bahwa sebelum pemberian intervensi menunjukkan Ny. F berada pada skor 4 dengan kategori bergantung dalam manuver mobilitas dan setelah

pemberian intervensi meningkat ke skor 7 walaupun masih berada pada kategori yang sama yaitu bergantung dalam manuver mobilitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa intervensi terapi *massage* manurak efektif dalam meningkatkan kekuatan otot dan pergerakan ekstermitas pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas.

## **B. Saran**

### a. Bagi institusi

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas.

### b. Bagi pelayanan kesehatan

Karya tulis ilmiah ini dapat dilakukan oleh perawat sebagai bahan referensi dalam pemberian asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah gangguan mobilitas dengan pemberian intervensi *massage* manurak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, A., & Sary, N. (2019). Pengaruh Latihan Range Of Motion (Rom) Aktif Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Ekstremitas Bawah Lansia. *Real In Nursing Journal*, 2(3), 118.
- Ainun, K., Kristina, K., & Leini, S. (2021). Terapi foot massage untuk menurunkan dan menstabilkan tekanan darah pada penderita hipertensi. *Abdimas Galuh*.
- Alfen, Z. (2022). Keefektifan Terapi Manurak Terhadap Peningkatan Range Of Motion dan Penurunan Nyeri Pasien Cedera Pergelangan Tangan di Bengkel Therapy Massage Mafaza. In *Universitas Negeri Yogyakarta* (Issue 8.5.2017). Universitas Negeri Yogyakarta
- Ali, S. G. (2015). Efektifitas Terapi *Massage* dan Terapi Latihanpembebanan Dalam Meningkatkan Range of Movementpasca Cedera Ankle Ringan. *Medikora*, XIII(1).
- Ambarwati, Fitri R. (2014). Konsep Kebutuhan Dasar Manusia. Yogyakarta; Dua Satria Offset.
- Amirudin, Z., Anonim, T., & Saleh, R. (2018). Efek Kombinasi Masasekstrematas Atas Pasien Pasca Stroke Iskemik. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* Vol 14, 82-89.
- Anggriani, dkk. 2018. *Pengaruh Rom (Range Of Motion) Terhadap Kekuatan Otot Ekstremitas Pada Pasien Stroke Non Hemoragic*. *Jurnal Riset Hesti Medan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018
- Anwar, N., Irwan, A. M., Saleh, A., &(2022). Effect of Foot Massage on Decreasing Blood Pressure and Anxiety in Older People with Hypertension in Indonesia. *Journal of Health ....* <https://doi.org/10.1177/09720634221087786>.
- Arroyo-Morales, M., Fernández-Lao, C., Ariza-García, A., Toro-Velasco, C., Winters, M., Díaz-Rodríguez, L., Cantarero-Villanueva, I., Huijbregts, P., & Fernández-De-las-Peñas, C. (2011). Psychophysiological effects of preperformance massage before isokinetic exercise. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(2), 481–488.
- Aslan, K. S. Ü., & Altın, S. (2022). Aromatherapy and foot massage on happiness, sleep quality, and fatigue levels in patients with stroke: A randomized controlled trial. *European Journal of Integrative Medicine*

- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. 2022. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3 (01): 1–9.
- Ayu Diah Amalia. 2013. Kesepian dan Isolasi Sosial yang Dalam Lanjut Usia: Tinjauan dari Perspektif. *Sosiologis, Informasi*, Vol. 18, No.02, hal. 203-209
- Bakara, B., & Surani, S. (2016). Latihan Range Of Motion (Rom) Pasif terhadap Rentang Sendi Pasien Pasca Stroke. *Idea Nursing Journal*, 7(2), 12-18
- Bohajar-Lax, Á., Vaquero-Cristóbal, R., Espejo-Antúnez, L., & López-Miñarro, P. Á. (2015). The effect of a hamstring stretching protocol on hamstring extensibility in adolescent students: Influence of the class session weekly distribution | Efecto de un programa de estiramiento de la musculatura isquiosural sobre la extensibilidad isquiosural en . *Nutricion Hospitalaria*, 32(3), 1241–1245
- Borges, M., Cini, A., Sonda, F. C., Souza da Rocha, E., Felappi, C. J., Vaz, M. A., & Lima, C. S. (2021). Triceps surae muscle-tendon unit mechanical property changes during 10 minutes of stretching. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 27, 591–596.
- Damanik Sri M. & Hasian, 2019. Modul Bahan Ajar Keperawatan Gerontik. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia
- Dohanis, Putri Dj., and Nirva Rantesigi. 2023. "Foot Massage Dan Latihan Range Of Montion Dapat Mengatasi Gangguan Mobilitas Fisik Pada Lansia Dengan Stroke." *Madago Nursing Journal* 4(2).
- Field, T. (2016a). Massage therapy | research review. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 24, 19–31. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2016.04.005>
- Graha, A. S. (2019). *Massage terapi cedera olahraga*. UNY PRESS
- Damanik, S. M. (2019). Buku Keperawatan Gerontik. Universitas Kristen Indonesia, 26–127
- Guyton, A. C., Hall, J. E., 2014. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 12. Jakarta : EGC. 995.
- Hasbi , Muhammad Riyan Hidayatullah , Lalu Moh Yudha Isnaini ,Sylvana Yaka Saputra, S. M. Fernanda Iragraha .2024.Pengaruh Massage

- Metode Manurak terhadap Penurunan Denyut Nadi Recovery pada Pemain Bola Voli Putra Cendana. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi* P-ISSN 2337-9561 Vol. 10, No. 1, Hal. 196-202, Januari 2024 E-ISSN 2580-1430
- Hasheminia, A., Salehi, S., Khaledifar, A., & ... (2021). Effect of hand and foot surface stroke massage on pain intensity and anxiety level in hospitalized patients with acute coronary syndrome: a clinical trial. *International*
- Hermayudi, A., & Ariani. (2017). *Penyakit Daerah Tropis*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Hutahaean, R. E., dkk. 2020. *Pengaruh Range of Motion terhadap Kekuatan Otot pada Pasien Stroke Iskemik di Rumah Sakit Umum HKBP Balige*. *Indonesian Trust Health Journal*, 3(1), 278–282
- In, T. S., & Jung, K. S. (2022). Effect of Whole-body Vibration on Range of Motion, Muscle Activation, Upper Extremity Function, and Quality of Life in Patients with Stroke. *Journal of the Korea Entertainment Industry*
- Kamila, A. (2023). Hubungan Tingkat Activity of Daily Living ( Adl ) Dengan Kualitas Tidur Pada Lansia Di Kelurahan Surakarta. Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 1–14
- Karunia Saraswati, N. L. P. G., Adiputra, L. M. I. S. H., & Pramana Putra, P. Y. (2019). Pemberian Static Stretching Exercise Dapat Meningkatkan Fungsional Punggung Bawah Pada Penjahit. *Jurnal Ergonomi Indonesia (The Indonesian Journal of Ergonomic)*, 5(2), 67
- Keliat, B. A (2016) *Keperawatan Jiwa : Terapi Aktivitas Kelompok*. Jakarta: EGC.
- Khasana, huswatun. 2021. Efektivitas Massage dan Latihan Rom (Range Of Motion) Terhadap Kekuatan Otot pada Pasien Stroke Di Rsud Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Universitas Muhammadiyah

## Gombong

- Kong, L. J., Zhan, H. S., Cheng, Y. W., Yuan, W. A., Chen, B., & Fang, M. (2013). Massage Therapy for Neck and Shoulder Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM*, 2013, 613279.
- Kunaryanti, Andriyani A, Wylandari R. Hubungan Tingkat pengetahuan tentang Diabetes Melitus dengan Perilaku Mengontrol Gula Darah pada pasien Diabetes Melitus Rawat Jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. *J Kesehatan*.2018
- Kurniasanti, N. A., & Ismerini, H. (2022). Foot Massage Sebagai Intervensi Keperawatan Terhadap Tekanan Darah Pada Pasien Stroke Di Ruang Intensive Care Unit (ICU): Case Report. *Prosiding Seminar Nasional*
- Kusumo, M. P. (2020). *Buku Lansia*. November, 1–60.
- Lintin, G. B. R. and Miranti (2019) ‘Hubungan Penurunan Kekuatan Otot dan Massa Otot dengan Proses Penuaan pada Individu Lanjut Usia yang Sehat Secara Fisik’, *Jurnal Kesehatan Tadulako*, 5(1), pp. 1–62.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2012.
- Marliana. (2011). Pengaruh Latihan ROM terhadap Peningkatan Kekuatan Otot pada Pasien Stroke Iskemik di RSUDZA Banda Aceh. *Idea Nursing Journal*, 3, 11-20. ISSN: 2087-2879
- Marriner, A..1998. *Nursing Theoriest And Their Works*. (4<sup>th</sup> ed). Philadelphia : Lippincott :Raven Publisher
- Milos Daki, Lazar Toski, Vladimir Ili, Sasa Duri, Milivoj Dopsaj and Jozef simenko. 2023. The Effects of Massage Therapy on Sport and Exercise Performance: A Systematic Review.. *Sports* 2023, 11, 110
- Monayo, E. R., & Akuba, F. (2019). Pengaruh Stretching Exercise Terhadap Penurunan Skala Nyeri Sendi Lutut Pada Pasien Osteoartritis. *Jambura Nursing Journal*, 1(1), 1–10
- Nasrullah, Dede. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik Jilid I Dengan*

- Pendekatan Asuhan Keperawatan NANDA, NIC-NOC. Jakarta Timur : TIM.
- Nugroho, 2014. Keperawatan Gerontik dan Geriatrik Edisi 3. Jakarta: EGC. Pabl oetal. 2014. Effect of Tai Chi Chuan on The Elderly Balance: A Semi Experimental Study. Rev. Bras. Geriatri, Rio De Joinero, Vol. 17 (2) : 373 – 381
- Nugroho, Rizal Andrianto (2023) Penerapan teknik effleurage massage dengan virgin coconut oil dalam pemenuhan kebutuhan aman nyaman pada pasien bed rest dengan diabetes melitus di ruang dahlia rsud muntilan, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Nurhikmah. 2022. Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia Yang Mengalami Immobility dengan masalah Nyeri menggunakan Relaksasi Benson Di RSUP DR Wahidin Sudirohudono Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Pinontoan P M dan Marunduh 2015, „Gambaran Kekuatan Otot Pada Lansia Di Bplu Senja Cerah Paniki Bawah“, April 2015.
- Polastri, M., Clini, E. M., Nava, S., & Ambrosino, N. (2019). Manual Massage Therapy for Patients with COPD: A Scoping Review. *Medicina (Kaunas, Lithuania)*, 55(5), E151. <https://doi.org/10.3390/medicina55050151>
- Purwandari, Atik. Konsep kebidanan sejarah dan profesionalisme. Jakarta: EGC; 2023. h. 7
- Putri, S. T., Fitriana, L. A., Ningrum, A., & Sulastrri, A. (2015). Studi komparatif : kualitas hidup Lansia yang tinggal bersama keluarga dan panti. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 1(1), 1–6. doi:10.17509/jpki.v1i1.1178
- Qurais shihab. 2012. "Tafsir Al-Misbah". Jakarta: Lentera hati
- Ramic. E., Selmanovic. S., Alibasic., Dzananovic. D., Dzac. F., Ramic. I. (2017). The Frequency of Multifactorial Syndromes in Geriatrics of

- Tuzla Canton Population. *Mater Sociomed.* Vol.29(4): 268-271.
- Rasyid, I., Syafrita, Y. and Sastri, S. (2017) ‘Hubungan Faktor Risiko dengan Fungsi Kognitif pada Lanjut Usia Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang’, *Jurnal Kesehatan Andalas*, 6(1), p. 49. doi: 10.25077/jka.v6i1.643.
- Riza Galih Mustika, R. (2020). Perbedaan Respon antara Sport Massage dan Swedish Massage dengan Variasi Tekanan Massage terhadap Kecepatan Lari pada Atlet Popda Sleman. In *Universitas Negeri Yogyakarta*
- Rohaedi, et. al. (2016). Tingkat kemandirian lansia dalam activities daily living di panti sosial tresna werdha senja rawi. *Jurnal Pendidikan keperawatan Indonesia*, 2 (1), 16 – 21
- Rolland, Y., Czerwinski, S., Abellan Van Kan, G., Morley, J.E., Cesari, M., Onder, G., *et al.*, 2008. Sarcopenia: its assessment, etiology, pathogenesis, consequences and future perspectives. *J Nutr Health Aging*. 12(7): 433–450
- Sari, D. P. (2019). Pengaruh Terapi Massage Effleurage terhadap Penurunan Nyeri Haid Pada Remaja Putri di Klaten. *Motorik Jurnal Ilmu Kesehatan*, 14(2), 123–126
- Sarli, D., & N Sari, F. (2018). the Effect of Massage Therapy With Effleurage Techniques As a Prevention of Baby Blues Prevention on Mother Postpartum. *International Journal of Advancement in Life Sciences Research*, 1(3), 15–21.
- Setiorini, A. 2021. Kekuatan Otot pada Lansia. *Anggi Setiorini | Kekuatan Otot Pada Lansia JK Unila |*, 5(3), 69–74
- Shinta Uly Noor Situmorang, Widyatuti. 2019. Asuhan Keperawatan Pada Lansia Dengan Kerusakan Memori Melalui Intervensi Latihan Handball. *Jurnal Ners Widya Husada* Volume 6 No 2, Hal 41 - 48, Juli 2019, P-Issn 2356-3060
- Sholehudin, Moch Arif (2023) Efektivitas Intervensi Balance Exercise

- Terhadap Masalah Keperawatan Risiko Jatuh Pada Lansia Di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember. Vocational Education thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Suharjana, F. (2010). Pengaruh Hasil Latihan Peregangan Statis Dan Dinamis Terhadap Kelentukan Tungkai Menurut Jenis Sex Anak Kelas 3 Dan 4 Sekolah Dasar. *Jurnal Olahraga Prestasi*, 6(2), 83–92
- Sunarti, Sri, dkk. 2019. Prinsip Dasar Kesehatan Lanjut Usia (GERIATRI), UB Press. Magelang: 2019.
- Sundari Putri Rahayu. 2023. Efektivitas Kombinasi Masase Manurak Dan inframerah terhadap Penurunan Nyeri, Peningkatan Rom dan fungsi Gerak Cedera Pergelangan Tangan. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*
- Sutejo. (2019). Keperawatan Jiwa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Syarifudin, A., & Roepajadi, J. (2019). Pengaruh Mekanis *Massage* Lokal Ekstremitas Bawah Sebagai Pemulihan Pasif Terhadap Kekuatan Otot Tungkai Atlet Jujitsu. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 8(1)
- Tomey and Aligood M.R.2006.Nursing theoriest, utilization and aplication. Mosby:Elservier
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standart Diagnosis Keperawatan Indonesia. 3rd edn. Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018) Standart Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2018) Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Edisi I. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Viona Aprillia Tani, James Siwu, Sefti Rompas. 2017. Hubungan konsep diri dan perawatan diri pada lansia di BPLU Senja Cerah Propinsi

Sulawesi Utara.e-journal Keperawatan (e-Kp) Volume 5 Nomor 2, Agustus 2017.

Visser, M., Goodpaster, B.H., Kritchevsky, S.B., Newman, A.B., Nevitt, M., Rubin, S.M., 2005. Muscle mass, muscle strength, and muscle fat infiltration as predictors of incident mobility limitations in well-functioning older persons. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 60(3): 324–333

Wiguna, R. I., & Hersika Asmawariza, L. (2020). Pengaruh Akupresur Stroke 14 Titik Terhadap Rentang Gerak Ekstermitas Atas dan Bawah pada Pasien Stroke Non Hemoragik. *Professional Health Journal*, 2(1), 51–63.

Winatha, Fahmi Indra. 2022. Pengaruh Terapi Manurak Terhadap Penyembuhan Cedera Pergelangan Tangan Pekerja Kerajinan Tangan Keramik Di Pabrik Mustika Desa Klampok Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Universitas Negeri Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R



## Lampiran I

### Instrumen Penelitian

<b>SKOR SKALA MOBILITAS LANSIA EMS (Elderly Mobility Scale)</b>		20/03/ 2024	22/03/ 2024	25/03/ 2024	28/03/ 2024
Berbaring ke Duduk	2 Mandiri 1 Membutuhkan bantuan 1 orang 0 Membutuhkan bantuan 2+ orang	2	2	2	2
Duduk ke Berbaring	2 Mandiri 1 Membutuhkan bantuan 1 orang 0 Membutuhkan bantuan 2+ orang	2	2	2	2
Duduk ke Berdiri	3 Mandiri dalam waktu kurang dari 3 detik 2 Independen dalam waktu lebih dari 3 detik 1 Membutuhkan bantuan 1 orang 0 Membutuhkan bantuan 2+ orang	0	0	1	1
Berdiri	3 Berdiri tanpa bantuan dan mampu menjangkau 2 Berdiri tanpa bantuan namun membutuhkan bantuan untuk mencapainya 1 Berdiri tetapi membutuhkan bantuan 0 Berdiri hanya dengan bantuan fisik dari orang lain	0	0	0	0
Bergerak	3 Mandiri (+/- tongkat) 2 Independen dengan alat bantu 1 Bergerak dengan alat bantu jalan tetapi tidak menentu/tidak aman 0 Membutuhkan bantuan fisik untuk berjalan atau pengawasan terus-menerus	0	0	1	2
Jalan kaki berjangka waktu (6 meter)	3 Di bawah 15 detik 2 16 – 30 detik 1 Lebih dari 30 detik 0 Tidak dapat menempuh jarak 6 meter	0	0	0	0
Jangkauan Fungsional	4 Lebih dari 20 cm. 2 10 - 20cm.	0	0	0	0

	0 Di bawah 10 cm.				
	SKOR	4/ 20	4/ 20	5/ 20	7/ 20
	Inisial Perawat	Ain	Ain	Ain	Ain

## Lampiran I

### Penilaian :

- <10 : pasien seperti ini bergantung dalam manuver mobilitas; memerlukan bantuan dengan ADL dasar, seperti berpindah tempat, toileting, dan berpakaian
- 10-13 : pasien ketergantungan ini berada pada ambang batas dalam hal mobilitas yang aman dan kemandirian dalam ADL. Mereka hanya memerlukan bantuan dalam beberapa manuver mobilitas
- >14 : mampu melakukan manuver mobilitas secara mandiri dalam ADL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

**Lampiran II**  
**Dokumentasi**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Siti Nuraini Irwan, lahir di Kota Ternate, Maluku Utara pada tanggal 02 Februari 2002. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, dari Alm. Bapak H. Irwan Piara dan Ibu Hj. Sumyati Zikir Robo. Penulis menempuh pendidikan dimulai di TK. Pembina 1 Kota Ternate pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya yaitu ke jenjang pendidikan Sekolah Dasar yakni di SD Negeri 46 Kota Ternate sampai pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 1 Kota Ternate dan tamat pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA Negeri 1 Kota Ternate dan berhasil lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis berhasil memasuki bangku perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SPAN-PTKIN di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan menjadi mahasiswa pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan. Dan Pada tahun 2023 penulis melanjutkan Studi Profesi Ners di universitas yang sama. Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT., dengan semangat belajar yang baik serta dukungan dari kedua orang tua, sahabat, teman angkatan, dan pembimbing. Penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Sindrom Geriatri *Immobility* Dengan Masalah Gangguan Mobilitas Fisik Menggunakan Terapi *Massage* Manurak Di Sentra Gau Mabaji Gowa”