

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU HAMIL  
DENGAN MASALAH KEKURANGAN ENERGI KRONIK  
(KEK) MELALUI PENINGKATAN LITERASI KESEHATAN  
MENGUNAKAN *TELENURSING* DI PUSKESMAS  
BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA**



**Tugas Akhir Ners**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Ners Jurusan Keperawatan Pada  
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**RABIYATUL AWALIYAH, S.Kep**  
**70900123013**

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2024**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pada Ibu Hamil Dengan Masalah Kekurangan Energi Kronik (KEK) Melalui Peningkatan Literasi Kesehatan Menggunakan *Telenursing* Di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa”, yang disusun oleh Rabiyyatul Awaliyah, NIM: 70900123013, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 M, bertepatan dengan 5 Zulhijah 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan.

Gowa, 2 Juli 2024 M

10 Zulhijah 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG, M.Kes (.....)

Sekretaris : Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy I : Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy II : Titi Mildawati, S.Pd.I, M.Pd.I (.....)

Pembimbing I : Nurul Fadhillah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Pembimbing II : Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG, M.Kes  
NIP: 19810621 200604 2 005

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa melimpahkan segudang nikmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Akhir yang berjudul **“Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Hamil Dengan Masalah Kekurangan Energi Kronik (KEK) Melalui Peningkatan Literasi Kesehatan Menggunakan Telenursing Di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa”**. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat meraih gelar Ners (Ns) Jurusan Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2024.

Dalam melakukan penyusunan karya tulis akhir ini, penulis sangat menyadari bahwa didalam penyusunan karya tulis akhir ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang banyak memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat hingga skripsi ini mampu diselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang satinggi-tingginya kepada orang tua tercinta bapak La Sarimin, S.Pd.,M.Pd dan Ibunda Siti Nurhayati, S.Pd, serta kedua adik yang saya sayangi Abdullah Muhamad Faqih dan Muhamad Ihsan Farhan atas kasih sayang dan rasa cinta yang tulus, doa, serta materilnya.. Tak lupa juga dengan keluarga-keluarga saya yang senantiasa mendoakan, memberikan nasehat dan dorongan serta telah

banyak berkorban agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik, semoga Allah SWT membalasnya dengan Rahmat, Rahim, Keberkahan yang melimpah dan juga kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Selain itu ucapan terimakasih sebesar-besarnya, penghormatan serta penghargaan paling tinggi disampaikan kepada :

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta segenap pegawai akademik yang telah membantu administrasi penulis
3. Dr. Hasnah, S. Kep., Ns., M. Kes sebagai Ketua Prodi Profesi Ners dan Eny Sutria, S. Kep., Ns., M. Kes selaku Sekretaris Prodi Profesi Ners, beserta staf dosen atas ilmu yang telah diberikan sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan karya tulis akhir ini
4. Nurul Fadhilah Gani, S. Kep., Ns., M. Kep. selaku Pembimbing I, dan Nurhidayah, S. Kep., Ns., M. Kep. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta membina penulis dengan setulus hati sampai karya tulis akhir ini dapat diselesaikan
5. Dr. Hasnah, S. Sit., S. Kep., Ns., M. Kes selaku Penguji I dan Titi Mildwati, S. Pd. I., M. Pd. I selaku Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran yang membangun serta membina penulis dengan setulus hati sampai karya tulis akhir ini dapat diselesaikan

6. Kepala Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa serta perawat dan bidan penanggung jawab yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis
7. Kepada rekan-rekan mahasiswa (i) Program Studi Profesi Ners angkatan 23 yang telah kebersamai selama perjalanan menempuh perkuliahan
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu-persatu yang telah banyak mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian karya tulis akhir ini.

Akhir kata yang penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja terjadi. Bahwa kesalahan tersebut murni dari penulis sebagai manusia dan segala hal positif serta yang bermanfaat dalam tulisan ini datangnya dari Allah SWT. Penulis sangat berkenan menerima kritik dan saran untuk melengkapi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Makassar, 05 Juni 2024  
Penulis,

Rabiyatul Awaliyah  
NIM: 70900123013

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Teori.....	10
1. Tinjauan Umum Kekurangan Energi Kronik (KEK) .....	10
2. Tinjauan Umum Literasi Kesehatan.....	20
3. Tinjauan Umum <i>Telenursing</i> .....	26
4. Tinjauan Umum Kehamilan.....	32
5. Tinjauan Umum Integrasi Keislaman.....	42
B. Konsep Asuhan Keperawatan.....	46
1. Pengkajian Keperawatan .....	46
2. Diagnosis Keperawatan.....	49
3. Intervensi Keperawatan.....	56
4. Implementasi Keperawatan .....	61
5. Evaluasi Keperawatan .....	61
C. Pendekatan Teori Keperawatan Yang Digunakan .....	62
D. Evidence Based Practice In Nursing (EBPN).....	63
BAB III METODE PENELITIAN .....	67
A. Rancangan Studi Kasus.....	67
B. Subjek Studi Kasus .....	67
C. Fokus Studi Kasus.....	68
D. Instrument Studi Kasus .....	68

E. Pengambilan Data .....	69
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus .....	69
G. Analisis Data dan Penyajian Data .....	69
H. Etika Studi Kasus .....	70
<b>BAB IV LAPORAN KASUS .....</b>	<b>72</b>
A. Pengkajian Prenatal.....	72
B. Diagnosis Keperawatan.....	87
C. Intervensi Keperawatan.....	86
D. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan .....	92
E. Evaluasi Rekap Tingkat Pengetahuan.....	121
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>123</b>
A. Analisis Asuhan Keperawatan .....	123
1. Analisis Pengkajian Keperawatan.....	123
2. Analisis Diagnosis Keperawatan.....	125
3. Analisis Intervensi Keperawatan.....	130
4. Analisis Implementasi Keperawatan .....	134
5. Analisis Evaluasi Keperawatan.....	138
B. Analisis Intervensi EBPN .....	140
C. Keterbatasan Penelitian.....	144
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>145</b>
A. Kesimpulan .....	145
B. Saran .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>147</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Umum.....	72
Tabel 4. 2 Riwayat Kehamilan dan Persalinan Yang Lalu Klien 1 .....	72
Tabel 4. 3 Riwayat Kehamilan dan Persalinan Yang Lalu Klien 2 .....	73
Tabel 4. 4 Riwayat Kehamilan dan Persalinan Yang Lalu Klien 3 .....	73
Tabel 4. 5 Riwayat Ginekologi .....	73
Tabel 4. 6 Riwayat Kehamilan Saat Ini .....	74
Tabel 4. 7 Data Umum Kesehatan Saat Ini.....	76
Tabel 4. 8 Klasifikasi Data.....	80
Tabel 4. 9 Analisa Data Klien 1 .....	82
Tabel 4. 10 Analisa Data Klien 2.....	85
Tabel 4. 11 Analisa Data Klien 3.....	87
Tabel 4. 12 Diagnosis Keperawatan .....	90
Tabel 4. 13 Intervensi Keperawatan .....	91
Tabel 4. 14 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan.....	120
Tabel 4. 15 Rekap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil .....	121
Tabel 4. 16 Rekap Hasil Pemantauan Nutrisi Selama 6 Hari .....	122





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perkembangan Janin.....	33
-------------------------------------	----



## ABSTRAK

Nama : Rabiyatul Awaliyah

NIM : 70900123013

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Hamil Dengan Masalah Kekurangan Energi Kronik (KEK) Melalui Peningkatan Literasi Kesehatan Menggunakan *Telenursing* Dengan Media Poster Dan *Whatsapp Group* Di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa

---

---

**Latar belakang:** Kesehatan ibu hamil di Indonesia masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat yang penting untuk diperhatikan. Salah satu masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian ialah masalah Kekurangan Energi Kronik (KEK) akibat kekurangan asupan nutrisi. Ketidakberhasilan ibu dalam mengatur nutrisi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai literasi kesehatan kebutuhan nutrisi. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan yaitu peningkatan literasi kesehatan melalui *telenursing* yang merupakan suatu strategi untuk membantu meningkatkan pengetahuan literasi kesehatan dan manajemen nutrisi. **Tujuan:** Untuk mengetahui analisis asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan masalah KEK melalui peningkatan literasi kesehatan menggunakan *telenursing* di Puskesmas Bontomarannu. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah *case study* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, serta pendokumentasian keperawatan. Pengkajian dilakukan pada tiga orang ibu hamil dengan LILA <23 cm. **Hasil:** Setelah dilakukan implementasi dan evaluasi keperawatan dengan peningkatan literasi kesehatan diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pengetahuan setelah diberikan edukasi literasi kesehatan dan edukasi nutrisi. Selain itu, ibu hamil juga mampu mengatur kebutuhan nutrisi bagi kehamilan. **Kesimpulan:** Melalui peningkatan literasi kesehatan kebutuhan nutrisi menggunakan *telenursing* efektif untuk digunakan pada ibu hamil yang di prediksi mengalami KEK. **Saran:** Merekomendasikan kepada instansi agar dapat dipertimbangkan untuk menggunakan *telenursing* dalam pelayanan kesehatan khususnya edukasi dan pendampingan bagi ibu hamil sebagai salah satu strategi dalam mengatasi KEK pada ibu hamil. **Kata Kunci:** Ibu hamil, Kekurangan Energi Kronik (KEK), literasi kesehatan, *telenursing*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesehatan ibu hamil adalah fondasi fundamental bagi kesehatan ibu dan bayi di masa depan. Masa kehamilan merupakan periode krusial di mana terjadi perkembangan pesat pada janin, dan kondisi kesehatan ibu sangatlah berpengaruh terhadap proses ini (Kolantung *et al*, 2021). Kesehatan ibu hamil di Indonesia masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat yang penting untuk diperhatikan. Berbagai jenis masalah kehamilan diantaranya preeklampsia dan eklampsia, anemia, diabetes gestasional, perdarahan postpartum, infeksi, kelahiran prematur, dan Kekurangan Energi Kronik (KEK) (Kemenkes RI, 2021).

Kekurangan energi kronik (KEK) adalah keadaan dimana ibu hamil mengalami kekurangan energi (kalori dan protein) yang berlangsung lama minimal 3 bulan yang disebabkan oleh asupan makanan yang tidak seimbang, ibu hamil dikategorikan KEK apabila pengukuran LILA < 23,5 cm. Penentuan status KEK pada ibu hamil tidak hanya berdasarkan pengukuran LILA, tetapi juga perlu mempertimbangkan riwayat KEK pada kehamilan sebelumnya, riwayat persalinan BBLR, pemeriksaan antropometri, dan pemeriksaan laboratorium (Kemenkes RI, 2023). Kejadian KEK umumnya disebabkan oleh beberapa hal yang berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan dan rentannya konsumsi makanan (pola makan tidak tepat) yang mana hal tersebut

dipengaruhi oleh kemiskinan, pendidikan yang rendah, serta adat ataupun kepercayaan yang didalamnya termasuk tabu makanan (Sandra, 2018).

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2023) menyatakan bahwa prevalensi risiko KEK pada ibu hamil masih terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 17,3%. Tingginya prevalensi tersebut membuat ditetapkannya penurunan persentase ibu hamil KEK menjadi salah satu dari beberapa Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 dalam Renstra Kemenkes tahun 2020. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut diharapkan persentase KEK pada ibu hamil di Indonesia dapat mengalami penurunan menjadi 16%. Saat ini prevalensi risiko KEK sebesar 16,2% yang mana artinya pencapaian tersebut belum mencapai target.

Berdasarkan hasil laporan (Riskesdas, 2018) prevalensi KEK di provinsi Sulawesi Selatan sebesar 13,8% serta hasil pemantauan gizi di Kota Makassar pada tahun 2022, prevalensi KEK pada ibu hamil sebanyak 2.996 orang ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK). Angka yang terbaru juga didapatkan bahwa di Puskesmas Bontomarannu sebanyak 88 orang ibu hamil tahun 2023 mengalami KEK.

KEK mempunyai dampak kesehatan terhadap ibu dan janin, antara lain dapat meningkatkan resiko tinggi BBLR, keguguran, lahir premature, kematian ibu dan bayi baru lahir (Pertiwi *et al.*, 2020). Selain itu, KEK juga berdampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dampak kesehatan fisik meliputi kelelahan yang parah, penurunan kekuatan dan daya tahan, sistem kekebalan tubuh lemah, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, dan komplikasi

kehamilan. Sedangkan dampak kesehatan mental meliputi depresi dan kecemasan, kesulitan berkonsentrasi, iritabilitas dan mudah marah, dan penurunan kualitas hidup (Fakhriyah *et al*, 2021)

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hajj/22:2

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ  
وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝٢

Terjemahnya:

“Pada hari kamu melihatnya (guncangan itu), semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusunya, setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras.” (QS Al-Hajj/22:2)

Bahaya kehamilan dengan status gizi kurang pada janin adalah pertumbuhan, pembentukan, dan perkembangan organ janin kurang optimal, fungsi organ janin kurang optimal, di khawatirkan akan terjadi cacat bawaan pada bayi yang lahir, ukuran kepala bayi kecil sehingga perkembangan otak tidak optimal, bayi lahir premature, berat bayi lahir rendah yaitu kurang dari 2500 gram, dan ini memungkinkan terjadinya kematian pada bayi. Dampak lain gizi kurang saat hamil juga terjadi ketika ibu menjalani persalinan. Seperti persalinan sulit, prematur, pendarahan setelah persalinan, dan persalinan dengan operasi (SC) karena kondisi ibu yang cenderung lemah dan kurang bertenaga untuk melahirkan normal (Pratiwi, 2020).

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh serta melihat dari beberapa masalah kesehatan ibu hamil, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam membantu ibu hamil untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menyarankan agar ibu hamil selama kehamilannya wajib

melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali secara teratur, serta mendorong ibu hamil untuk mengikuti penyuluhan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan rutin dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga salah satu upaya yang dapat dilakukan secara langsung oleh tenaga kesehatan untuk mengatasi masalah kehamilan yaitu dengan memberikan edukasi secara langsung. Dalam memberikan edukasi untuk mengatasi masalah kehamilan pada ibu hamil, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil (Simbolong & Rahmadi, 2018)

Literasi kesehatan merupakan salah satu determinan kesehatan terbesar yang penting untuk meningkatkan pelayanan sosial dan pembangunan ekonomi individu, sejauh mana individu memiliki kapasitas untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan dasar dan layanan yang diperlukan untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat. Manfaat literasi kesehatan pada ibu hamil adalah meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku ibu untuk memahami tentang kehamilan serta dapat membantu mengurangi keluhan yang dialami selama kehamilan (Gani *et al.*, 2022).

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Alaq/96:1-5

﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ  
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝﴾

Terjemahnya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS Al-Alaq/96:1-5).

Dalam QS Al-Alaq/96:1-5 mengandung banyak pelajaran penting tentang pentingnya literasi, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Umat muslim harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan literasi dan menuntut ilmu pengetahuan agar dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, QS Al-Alaq/96: 1-5 menjadi landasan fundamental bagi literasi dalam Islam. Ayat-ayat ini bukan hanya perintah untuk membaca, menulis, dan mengajar, tetapi juga merupakan panduan untuk menjadikan literasi sebagai alat untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Secara global, literasi kesehatan di dunia masih sangat bervariasi. Menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, sebagian besar orang dewasa (53%) memiliki literasi kesehatan menengah, (22%) memiliki literasi kesehatan dasar, (14%) memiliki literasi kesehatan dasar dan hanya (12%) yang berada dalam kategori lanjut. Sementara itu literasi kesehatan di Indonesia masih tergolong rendah dengan nilai 73,83%, sedangkan pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 76,3% (WHO, 2021). Hasil laporan tahunan (Kominfo, 2021) menyatakan bahwa status literasi digital Indonesia masih rendah, seperti di wilayah barat (Aceh, Sumatera, Jawa dan Banten) sekitar 3,43%, di wilayah tengah (Bali, Kalimantan dan Sulawesi) sekitar 3,57% dan di wilayah timur daerah (Maluku dan Papua) sekitar 3,44%. Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Gowa, tingkat literasi kesehatan ibu hamil masih rendah yaitu sekitar 57,1% (Gani *et al*, 2022)



Dari beberapa data di atas menunjukkan bahwa angka literasi kesehatan pada ibu hamil masih sangat rendah. Adapun jika ibu hamil memiliki literasi kesehatan yang rendah akan menimbulkan beberapa dampak bagi kesehatannya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa literasi kesehatan yang rendah akan berdampak pada literasi kesehatan terkait dengan perilaku perawatan yang kurang selama kehamilan. Bentuk perawatan kehamilan seperti perawatan diri (kulit, gigi dan mulut, serta perawatan kuku), payudara, imunisasi, senam hamil, pemeriksaan kehamilan, serta gizi untuk perkembangan janin (Tamalla *et al*, 2022).

Adapun jika ibu hamil memiliki tingkat literasi kesehatan yang tinggi atau baik dapat menguntungkan bagi ibu hamil itu sendiri. Jika ibu hamil memiliki tingkat literasi kesehatan yang baik maka akan membantu untuk meningkatkan pemahaman tentang perawatan kesehatan bagi ibu, menurunkan terjadinya komplikasi, dan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Untuk itu, perhatian khusus dan program yang tepat masih diperlukan untuk meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil (Riyanti *et al.*, 2023).

Berdasarkan pemaparan dari beberapa penelitian di atas, untuk membantu meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil ada beberapa cara yang dapat dilakukan salah satunya dengan pemberian edukasi. Dalam memberikan edukasi kesehatan terkait asuhan kehamilan pada ibu hamil dapat diberikan melalui beberapa media informasi seperti melalui brosur, pamflet, poster, buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan beberapa media lainnya (Hapsari *et al*, 2022).

Media lain yang dapat digunakan yaitu media teknologi dengan melihat perkembangan zaman dimana penggunaan teknologi sudah sangat berkembang dan teknologi dalam pelayanan kesehatanpun semakin berkembang. Media tersebut dikenal dengan nama *telenursing*. *Telenursing* adalah praktik pemberian asuhan keperawatan yang diberikan dari jarak jauh melalui teknologi komunikasi. Program *telenursing* ini bertujuan untuk memudahkan klien mengakses informasi kesehatan dengan lebih mudah dan memberikan manfaat dalam hal pengurangan waktu dan biaya yang diperlukan untuk berobat ke pelayanan kesehatan (Pratiwi, 2020).

Pemanfaatan media *telenursing* dalam pelayanan kesehatan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada klien atau ibu hamil dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan menggunakan media *poster*. Media *poster* merupakan media yang sering digunakan oleh tenaga kesehatan sebagai media yang memfalisasi pengembangan aspek kognitif hingga keterampilan individu dalam lingkup komunitas. Penggunaan *poster* sebagai sarana penyuluhan kesehatan yang memiliki kelebihan dalam hal memberikan visualisasi yang baik sehingga memudahkan proses penyerapan pengetahuan serta penyampaian informasi melalui *poster* dapat meningkatkan minat belajar dan mudah diterima oleh penerima pesan (Kurdanti *et al*, 2020).

Selain dengan menggunakan media *poster*, terdapat media yang sedang populer saat ini dan telah digunakan oleh masyarakat sehingga dapat digunakan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi kesehatan yakni melalui *Whatsapp Group*. *Whatsapp Group* merupakan aplikasi media sosial yang juga

digunakan sebagai media komunikasi yang sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Aplikasi *Whatsapp Group* dapat digunakan untuk mengirimkan file, pesan, gambar, dan obrolan *online* secara cepat dan mudah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan masalah kekurangan energi kronik (KEK) melalui peningkatan literasi kesehatan menggunakan *telenursing* di Puskesmas Bontomarannu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diperoleh rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Akhir ini yaitu “Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan masalah Kekurangan Energi Kronik (KEK) melalui peningkatan literasi kesehatan menggunakan *telenursing* di Puskesmas Bontomarannu?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Diketahui analisis asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan masalah Kekurangan Energi Kronik (KEK) melalui peningkatan literasi kesehatan menggunakan *telenursing* di Puskesmas Bontomarannu

### **2. Tujuan Khusus**

a. Diketahui pengkajian keperawatan pada ibu hamil dengan masalah Kekurangan Energi Kronik (KEK)

- b. Diketahui diagnosis keperawatan pada ibu hamil dengan masalah Kekurangan Energi Kronik (KEK)
- c. Diketahui intervensi keperawatan pada ibu hamil dengan masalah Kekurangan Energi Kronik (KEK)
- d. Diketahui implementasi keperawatan pada ibu hamil dengan masalah Kekurangan Energi Kronik (KEK)
- e. Diketahui evaluasi keperawatan pada ibu hamil dengan masalah Kekurangan Energi Kronik (KEK).

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu bisa menambah dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam melakukan suatu penelitian, dapat berpikir terbuka, dan logis khususnya meningkatkan pemahaman tentang literasi informasi khususnya literasi kesehatan

##### **2. Bagi Pendidikan**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan EBP (*Evidence Based Practice*) dalam edukasi kesehatan atau keperawatan, yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan ataupun perawat dalam meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil.

##### **3. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan intervensi keperawatan serta sebagai salah satu bentuk intervensi untuk meningkatkan literasi kesehatan khususnya untuk ibu hamil.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Teori**

##### **1. Tinjauan Umum Kekurangan Energi Kronik (KEK)**

###### **a. Definisi**

Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun. Cara untuk mengetahui risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil dengan pengukuran LILA. Namun pengukuran LILA tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Ibu hamil dengan KEK pada batas 23,5 cm mempunyai resiko 2,0087 kali untuk melahirkan BBLR dibandingkan dengan ibu yang mempunyai LILA lebih dari 23,5 cm (Kurdanti *et al*, 2020)

Kekurangan energi kronis merupakan suatu keadaan dimana status gizi seseorang berada pada kondisi yang kurang baik. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan dan sumber energi yang mengandung zat mikro. Kebutuhan wanita hamil akan meningkat dari biasanya dimana pertukaran dari hampir semua beban terjadi sangat aktif terutama pada trimester III. Karena itu peningkatan jumlah konsumsi makan perlu ditambah, terutama konsumsi pangan sumber energi untuk memenuhi semua kebutuhan ibu dan janin, maka kurang mengkonsumsi kalori akan menyebabkan malnutrisi atau biasanya disebut KEK. Kontribusi dari terjadinya KEK ibu hamil akan mempengaruhi tumbuh kembang janin antara lain dapat meningkatkan resiko BBLR (Retnaningtyas *et al*, 2022)

## **b. Etiologi**

Menurut (Putri *et al.*, 2023) etiologi KEK terdiri dari:

### 1) Jumlah asupan makanan

Kebutuhan makanan bagi ibu hamil lebih banyak dari pada kebutuhan wanita yang tidak hamil. Upaya mencapai gizi masyarakat yang baik atau optimal dimulai dengan penyediaan pangan yang cukup. Penyediaan pangan dalam negeri yaitu : upaya pertanian dalam menghasilkan bahan makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buahbuahan. Pengukuran konsumsi makanan sangat penting untuk mengetahui kenyataan apa yang dimakan oleh masyarakat dan hal ini dapat berguna untuk mengukur gizi dan menemukan faktor diet yang menyebabkan malnutrisi

### 2) Usia ibu hamil

Semakin muda dan semakin tua umur seseorang ibu yang sedang hamil akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur muda perlu tambahan gizi yang banyak karena selain digunakan pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri, juga harus berbagi dengan janin yang sedang dikandung. Sedangkan untuk umur tua perlu energi yang besar juga karena fungsi organ yang melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal, maka memerlukan tambahan energi yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang berlangsung. Sehingga usia yang paling baik adalah lebih dari 20 tahun dan kurang dari 35 tahun, dengan diharapkan gizi ibu hamil akan lebih baik

### 3) Beban kerja/aktifitas

Aktifitas dan gerakan seseorang berbeda-beda, seorang dengan gerak yang otomatis memerlukan energi yang lebih besar dari pada mereka yang hanya duduk diam saja. Setiap aktifitas memerlukan energi, maka apabila semakin banyak aktifitas yang dilakukan, energi yang dibutuhkan juga semakin banyak. Namun pada seorang ibu hamil kebutuhan zat gizi berbeda karena zat-zat gizi yang dikonsumsi selain untuk aktifitas/ kerja zat-zat gizi juga digunakan untuk perkembangan janin yang ada dikandung ibu hamil tersebut. Kebutuhan energi rata-rata pada saat hamil dapat ditentukan sebesar 203 sampai 263 kkal/hari, yang mengasumsikan penambahan berat badan 10-12 kg dan tidak ada perubahan tingkat kegiatan

### 4) Penyakit infeksi

Malnutrisi dapat mempermudah tubuh terkena penyakit infeksi dan juga infeksi akan mempermudah status gizi dan mempercepat malnutrisi, mekanismenya yaitu:

- a) Penurunan asupan gizi akibat kurang nafsu makan, menurunnya absorpsi dan kebiasaan mengurangi makanan pada waktu sakit
- b) Peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat diare, mual, muntah dan perdarahan yang terus menerus
- c) Meningkatnya kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit atau parasit yang terdapat pada tubuh

### 5) Pemeriksaan kehamilan

Dalam memantau status gizi ibu hamil, seorang ibu harus melakukan kunjungan ketenaga kesehatan. Karena pemeriksaan



kenaikan berat badan perlu dilakukan dengan teliti, jangan sampai wanita hamil terlalu gemuk untuk menghindari kesulitan melahirkan dan bahkan jangan terlalu kurus karena dapat membahayakan keselamatan dirinya dan janin yang dikandungnya

6) Pengetahuan ibu tentang gizi

Pemilihan makanan dan kebiasaan diet dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap terhadap makanan dan praktek/ perilaku pengetahuan tentang nutrisi melandasi pemilihan makanan. Pendidikan formal dari ibu rumah tangga sering kali mempunyai asosiasi yang positif dengan pengembangan pola-pola konsumsi makanan dalam keluarga. Beberapa studi menunjukkan bahwa jika tingkat pendidikan dari ibu meningkat maka pengetahuan nutrisi dan praktek nutrisi bertambah baik. Usaha-usaha untuk memilih makanan yang bernilai nutrisi semakin meningkat, ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai pengetahuan nutrisi akan memilih makanan yang lebih bergizi dari pada yang kurang bergizi

7) Pendapatan keluarga

Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Pada rumah tangga berpendapatan rendah, 48 sebanyak 60 persen hingga 80 persen dari pendapatan riilnya dibelanjakan untuk membeli makanan. Artinya pendapatan tersebut 70-80 persen energi dipenuhi oleh karbohidrat (beras dan penggantinya) dan hanya 20 persen dipenuhi oleh sumber energy lainnya seperti lemak dan protein. Pendapatan yang meningkat akan

menyebabkan semakin besarnya total pengeluaran termasuk besarnya pengeluaran untuk pangan.

### **c. Patofisiologi**

Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil terjadi ketika tubuh ibu tidak mendapatkan cukup energi (kalori dan protein) untuk memenuhi kebutuhan metabolisme basal, aktivitas fisik, dan pertumbuhan janin selama periode kehamilan. Kondisi ini dapat berakibat serius bagi kesehatan ibu dan janin.

Patofisiologi penyakit gizi kurang terjadi melalui lima tahapan yaitu: pertama, ketidakcukupan zat gizi. Apabila ketidakcukupan zat gizi ini berlangsung lama maka persediaan / cadangan jaringan akan digunakan untuk memenuhi ketidakcukupan itu. Kedua, apabila ini berlangsung lama, maka akan terjadi kemerosotan jaringan, yang ditandai dengan penurunan berat badan. Ketiga, terjadi perubahan biokimia yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium. Keempat, terjadi perubahan fungsi organ seperti hati, ginjal, sistem imun. Kelima, terjadi perubahan anatomi.

Proses terjadinya KEK merupakan akibat dari faktor lingkungan dan faktor manusia yang didukung oleh kekurangan asupan zat-zat gizi, maka simpanan zat gizi pada tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila keadaan ini berlangsung lama maka simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan (Mardani, 2020)

### **d. Manifestasi Klinis**

Adapun tanda dan gejala kekurangan energi menurut (Nadrah & Handayani, 2024) yaitu:

- 1) Lingkar lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm
- 2) Badan kurus
- 3) Konjungtiva pucat
- 4) Tekanan darah kurang dari 100/80 mmHg
- 5) Hemoglobin kurang dari normal (<11 gr%)
- 6) Nafsu makan berkurang
- 7) Mual dan Muntah
- 8) Badan lemas
- 9) Mata berkunang-kunang.

**e. Penatalaksanaan**

Menurut (Sandra, 2018) penatalaksanaan KEK sebagai berikut:

- 1) Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan harus meliputi enam kelompok, yaitu makanan yang mengandung protein (hewani dan nabati), susu dan olahannya (lemak), roti dan biji-bijian (karbohidrat), buah dan sayur-sayuran
- 2) Menyusun menu seimbang bagi ibu hamil, ibu hamil membutuhkan tambahan energi/kalori untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, plasenta, jaringan payudara dan cadangan lemak. Tambahan energi yang diperlukan selama hamil yaitu 27.000 – 80.000 Kkal atau 100 Kkal/hari. Sedangkan energi yang dibutuhkan oleh janin untuk tumbuh dan berkembang adalah 50-95 Kkal/hari. Kebutuhan tersebut terpenuhi dengan mengkonsumsi sumber tenaga (kalori/energi) sebanyak 9 porsi, sumber zat pembangun (protein) sebanyak 10 porsi dan sumber zat pengatur sebanyak 6 porsi dalam sehari. Setelah menyusun menu seimbang perlu juga dibuat prosentase pembagian makan dalam sehari yaitu:

- a) Makan pagi : jam 07.00 : 25%
  - b) Selingan pagi : jam 10.00 : 10%
  - c) Makan siang : jam 12.00 : 25%
  - d) Selingan sore : jam 15.00 : 10%
  - e) Makan malam : jam 18.00 : 20%
  - f) Selingan malam : jam 20.00 : 10%
- 3) Memberikan ibu makanan tambahan (PMT bagi ibu hamil) PMT pemulihan bumil KEK adalah makanan bergizi yang diperuntukkan bagi ibu hamil sebagai makanan tambahan untuk pemulihan gizi. PMT Pemulihan bagi ibu hamil dimaksudkan sebagai tambahan makanan, bukan sebagai pengganti makanan sehari-hari. PMT dilakukan berbasis bahan makanan lokal dengan menu khas daerah yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Mulai tahun 2012 sampai sekarang Kementerian Kesehatan RI menyediakan anggaran untuk kegiatan PMT pemulihan bagi balita kurang gizi dan ibu hamil KEK melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). PMT diberikan kepada ibu yang hamil setiap hari selama 90 hari berturut-turut atau dikondisikan dengan keadaan geografis dan sumber daya kader masyarakat yang membantu proses memasak PMT (Panduan Penyelenggaraan PMT (Pemulihan Bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil)
- 4) Peningkatan suplementasi tablet Fe pada ibu hamil dengan memperbaiki sistem distribusi dan monitoring secara terintegrasi dengan program lainnya seperti pelayanan ibu hamil dll
- 5) Rutin memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal

- 6) Pemantauan berat badan dan pengukuran LILA, pengukuran dilakukan dengan pita LILA dan ditandai dengan sentimeter, dengan batas ambang 23,5 cm (batas antara merah dan putih). Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran masa tubuh. Masa tubuh sangat sensitive terhadap perubahan-perubahan yang mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, menurunnya nafsu makan atau menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi.

**f. Pemeriksaan Penunjang**

Selain pemeriksaan fisik dan antropometri beberapa pemeriksaan penunjang untuk membantu mendiagnosis KEK pada ibu hamil menurut (Sandra, 2018) meliputi:

- 1) Pemeriksaan darah
  - a) Hemoglobin (Hb), kadar Hb yang rendah (anemia) dapat menjadi tanda KEK
  - b) Hematokrit (Ht) adalah persentase sel darah merah dalam darah. Kadar Ht yang rendah dapat menjadi tanda anemia
  - c) Serum albumin adalah protein yang dibuat oleh hati. Kadar albumin yang rendah dapat menjadi tanda KEK
  - d) Transferin adalah protein yang mengangkut zat besi dalam darah. Kadar transferin yang rendah dapat menjadi tanda kekurangan zat besi
  - e) Seng adalah mineral penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Kadar seng yang rendah dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan

- f) Folates adalah vitamin B yang penting untuk perkembangan otak dan saraf janin. Kadar folates yang rendah dapat meningkatkan risiko cacat tabung saraf pada janin.
- 2) Pemeriksaan lain
- a) Tes gula darah dapat dilakukan untuk mendeteksi diabetes gestasional, yang dapat memperburuk KEK
  - b) Urinalisis dapat dilakukan untuk mendeteksi infeksi saluran kemih, yang dapat menyebabkan anemia
  - c) USG (Ultrasonografi) dapat dilakukan untuk memantau pertumbuhan janin dan mendeteksi kelainan janin.

**g. Komplikasi**

Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius, baik bagi ibu maupun janin. Berikut beberapa komplikasi yang dapat terjadi menurut (Anjelika *et al.*, 2021)

- 1) Pada ibu
- a) Anemia, Kekurangan zat besi dan vitamin B12 yang umum terjadi pada KEK dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil. Anemia dapat menyebabkan kelelahan, pusing, dan sesak napas
  - b) Perdarahan, KEK dapat meningkatkan risiko perdarahan saat persalinan, baik karena atonia uteri (rahim tidak berkontraksi dengan baik setelah melahirkan) maupun ruptur uteri (robeknya rahim)
  - c) Berat badan tidak bertambah, ibu hamil dengan KEK umumnya tidak mengalami kenaikan berat badan yang normal selama

kehamilan. Hal ini dapat berakibat pada bayi lahir rendah (BBLR) dan berbagai komplikasi lainnya

- d) Preeklampsia, KEK meningkatkan risiko preeklampsia yaitu kondisi tekanan darah tinggi dan kerusakan ginjal yang terjadi pada kehamilan. Preeklampsia dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan janin, seperti HELLP syndrome dan eklampsia
  - e) Infeksi, KEK dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ibu, sehingga meningkatkan risiko terkena infeksi. Infeksi selama kehamilan dapat berbahaya bagi ibu dan janin.
- 2) Pada janin
- a) Keguguran, KEK dapat meningkatkan risiko keguguran, yaitu kematian janin di dalam kandungan sebelum usia 20 minggu
  - b) Kematian janin dalam kandungan, KEK juga dapat meningkatkan risiko kematian janin dalam kandungan setelah usia 20 minggu
  - c) Bayi lahir rendah (BBLR), Ibu hamil dengan KEK berisiko tinggi melahirkan bayi dengan berat badan rendah (BBLR). BBLR memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kesehatan dan kematian
  - d) Asfiksia intra partum, KEK dapat meningkatkan risiko asfiksia intra partum (kematian janin saat melahirkan), karena janin tidak mendapatkan oksigen yang cukup
  - e) Cacat lahir, KEK dapat meningkatkan risiko cacat lahir pada bayi, seperti cacat tabung saraf dan kelainan jantung



- f) Kematian neonatal: Bayi yang lahir dari ibu dengan KEK memiliki risiko lebih tinggi untuk meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan.
- 3) Komplikasi jangka panjang
- a) Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak yang lahir dari ibu dengan KEK berisiko mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, seperti stunting dan keterlambatan mental
  - b) Penyakit kronis: Anak-anak yang lahir dari ibu dengan KEK juga berisiko lebih tinggi untuk menderita penyakit kronis di kemudian hari, seperti diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi.

## 2. Tinjauan Umum Literasi Kesehatan

### a. Definisi

Menurut *National Assessment of Adults Literacy* di Amerika Serikat, literasi kesehatan adalah kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang kesehatan dari informasi tertulis dan dapat dikembangkan oleh masyarakat sebagai informasi kesehatan yang akan digunakan sesuai dengan tujuannya. Misalnya kemampuan membaca label obat, brosur informasi kesehatan, memahami informasi yang disampaikan petugas kesehatan dan membaca petunjuk kesehatan yang diberikan.

Literasi kesehatan adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami dan menggunakan informasi dan layanan kesehatan untuk mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan menurut WHO literasi kesehatan adalah tingkat pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan

diri untuk berperilaku yang bertujuan meningkatkan kesehatan personal dan komunitas melalui perubahan perilaku personal dan komunitas melalui perubahan perilaku personal dan lingkungan. Tingkat pengetahuan yang dimaksud dalam literasi kesehatan tersebut tidak hanya berbasis pada media digital, tetapi juga termasuk kemampuan memahami informasi kesehatan di berbagai media lainnya.

**b. Tujuan**

Tujuan literasi kesehatan itu sendiri adalah sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi, dan untuk mempermudah dalam melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan atau informasi kesehatan.

Individu yang rajin mencari informasi khususnya kesehatan diharapkan menjadi individu yang bijak dan dapat mencari sendiri informasi tentang kesehatan. Informasi atau literasi kesehatan yang diperoleh setiap individu dapat diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individunya. Seperti halnya dalam penelitian ini, ibu hamil atau wanita yang telah hamil harus mulai mengetahui informasi kesehatan apa yang harus dia dapatkan, informasi ini dapat diperoleh melalui literasi kesehatan untuk ibu hamil yang tersedia baik online maupun di buku atau dari kerabat dan petugas kesehatan. medis. Dengan demikian, tujuan literasi kesehatan adalah menyadarkan individu akan pentingnya kesehatan ibu hamil untuk berkembang.

**c. Klasifikasi**

Menurut *National Assessment of Adult Literacy*, literasi kesehatan dibagi menjadi beberapa dimensi, yakni (Tamalla *et al.*, 2022):

- 1) *Document literacy*, merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan seseorang untuk mencari, memahami dan menggunakan teks dalam berbagai format (baris, daftar, kolom, matriks dan grafik)
- 2) *Process literacy*, merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan seseorang untuk mencari, memahami dan menggunakan informasi dari bacaan (rangkaiannya kalimat dalam paragraf)
- 3) *Quantitative literacy*, merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan seseorang untuk melakukan perhitungan, menggunakan informasi dan angka dalam bahan-bahan tercetak.

Konsep literasi kesehatan sangat luas dan dipengaruhi oleh beberapa determinan. Determinan tersebut meliputi determinan pribadi seperti: usia, jenis kelamin, keadaan psikologis, kompetensi umum, status sosial demografi, ras, status sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, literasi kesehatan individu, determinan masyarakat dan lingkungan (kondisi demografi, budaya, bahasa) . dan sistem komunitas) dan-determinan sosial (dukungan dan hubungan keluarga), perilaku sehat, perilaku sakit, status kesehatan (kematian, morbiditas, persepsi kesehatan dan kesejahteraan). Determinan tersebut sangat dipengaruhi oleh determinan situasional di masyarakat.

#### **d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil**

Menurut *National Assesment of Adult Literacy* (NAAL), menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi kesehatan seseorang diantaranya (Zarcadoolas *et al.*, 2019) :

- 1) Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil tahu dari manusia, yang sekedar menjawab “*what*” misalnya apa air, apa manusia, apa alam dan lain sebagainya. Pengetahuan itu mempunyai sasaran tertentu, mempunyai metode atau pendekatan untuk mengkaji obyek tersebut sehingga memperoleh hasil yang dapat disusun secara sistematis dan diakui secara universal, maka terbentuklah ilmu.

## 2) Akses Informasi Kesehatan

Akses informasi kesehatan mempunyai peran penting dalam menentukan literasi kesehatan. Informasi kesehatan reproduksi melalui sumber yang akurat sangat perlu untuk individu sebagai suatu pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Jika remaja sudah memperoleh informasi kesehatan reproduksi dengan benar maka individu tersebut akan memiliki pengetahuan, sikap, dan tingkah laku yang baik mengenai proses reproduksi

## 3) Tingkat Pendidikan

Pendidikan diartikan sebagai usaha untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaannya. Pendidikan merupakan suatu upaya pembelajaran pada masyarakat agar masyarakat mau melakukakn tindakan-tindakan (praktik) untuk memelihara atau mengatasi masalah-masalah dan meningkatkan kesehatannya. Individu dengan pendidikan rendah, cenderung berperilaku yang dapat beresiko terhadap kesehatannya.

## 4) Umur

Umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan, salah satu satuan yang mengukur keberadaan suatu

mahluk, baik yang hidup ataupun yang mati. Maka dari itu umur diukur sejak ia dilahirkan hingga masa kini. Seiring bertambahnya umur seseorang akan mengalami penurunan kemampuan untuk berfikir dan kemampuan fungsi sensorisnya keadaan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan untuk berfikir, hal itu dapat mempengaruhi kemampuan membaca dan menangkap informasi, sehingga dapat berpengaruh pada tingkat literasi kesehatan (Latif, 2020).

#### 5) Etnis

Budaya yang dimiliki berbagai etnis mempengaruhi kepercayaan kesehatan, konsep antara sehat dan sakit dan cara menafsirkan pesan kesehatan. Rendahnya literasi kesehatan pada ibu hamil akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang pencegahan kematian atau bahaya yang dialami ibu hamil. Selain itu, pentingnya literasi kesehatan juga harus dijadikan budaya agar kesehatan pada ibu hamil tetap terjaga sampai dengan melahirkan.

#### 6) Bahasa

Literasi Kesehatan membutuhkan kemampuan untuk dapat membaca dan menulis dalam bahasa nasional, berhitung, berpikir kritis dan membuat keputusan. Bahasa serta budaya yang melatarbelakangi bahasa tersebut berpengaruh dalam cara seseorang mendapat dan mengaplikasikan kemampuan ini.

#### **e. Dampak Literasi Kesehatan Rendah**

Seseorang yang mengelola informasi yang di dapatkannya secara aktif, mengingat dalam pustaka atau media yang tersedia saat ini tidak sedikit juga memberikan informasi yang kurang benar ataupun belum

diuji kebenarannya. Dampak dari literasi kesehatan yang rendah adalah dapat terjadi status kesehatan yang lebih buruk, kurangnya pemahaman dalam penggunaan layanan kesehatan dan pencegahan penyakit, kurangnya pengetahuan tentang perawatan media dan kondisi medis, tingkat kepatuhan yang kurang, hasil laporan kesehatan yang buruk, serta terjadinya peningkatan biaya perawatan kesehatan (Gogia, 2019).

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil menurut (Zarcadoolas *et al.*, 2019) yakni sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik yang ditujukan kepada individu atau kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya.
- 2) Mengikuti seminar workshop, seminar dan workshop sama-sama mendapatkan teori dari pembicara. Tapi, dengan melalui workshop seseorang akan mengetahui apa yang menjadi skillnya (kemampuan) dan mengembangkan skill tersebut menjadi suatu keahliannya dengan cara praktek secara langsung.
- 3) Mengikuti Pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan melatih atau mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan di sendiri atau orang lain, yang terkait dengan kompetensi tertentu yang dianggap berguna.
- 4) Mengikuti kelas diskusi, kelas diskusi ini berguna untuk pemecahan masalah yang dialami oleh seseorang serta memberikan kesempatan kepada individu untuk mengetahui apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialaminya.

### 3. Tinjauan Umum *Telenursing*

#### a. Definisi

*Telenursing* adalah praktik keperawatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi, dimana perawat berinteraksi dengan klien tanpa tatap muka, mengirim serta menerima data status kesehatan klien, memulai dan mengirimkan intervensi, memantau dan mencatat respon klien serta mengevaluasi hasil perawatan (Snooks, 2014) .

*Telenursing* merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan keperawatan di bidang kesehatan, dimana jarak fisik antara perawat dengan klien, atau antar banyak perawat cukup jauh. Sebagai bagian dari telemedicine, dan bagian dari aplikasi medis dan non-medis seperti telemedicine, konseling jarak jauh, dan pemantauan jarak jauh (Gogia, 2019).

Keperawatan jarak jauh merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan keperawatan di bidang kesehatan, dimana jarak fisik antara perawat dengan klien atau antara perawat dengan klien cukup jauh. Pelayanan kesehatan khususnya keperawatan jarak jauh dengan menggunakan media teknologi informasi (internet) memberikan kemudahan bagi masyarakat. Waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan juga semakin singkat. Klien hanya dapat tinggal di rumah dan melakukan kontak melalui internet atau melalui video conference untuk mendapatkan informasi kesehatan, perawatan bahkan pengobatan.

#### b. *Telenursing* Dalam Pelayanan Keperawatan

Dalam lingkup asuhan keperawatan, ada yang namanya *telenursing* yang dapat menyelesaikan masalah kesehatan bersama dengan rekan sejawat atau tenaga kesehatan lainnya. Dalam dunia keperawatan,

*telehealth* dikenal dengan istilah keperawatan atau *telenursing*. *Telenursing* merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan jarak jauh antara perawat dengan klien, atau antar beberapa perawat. *Telenursing* menunjukkan pemanfaatan teknologi komunikasi oleh perawat untuk meningkatkan pelayanan klien (Royani; Asmirajanti, 2021)

Praktik penggunaan *telehealth* dalam pelayanan keperawatan dapat memungkinkan terjadinya komunikasi yang sinkron, dengan pesan instan dan transmisi audio-video secara real time dengan bertukar pesan dengan teks, gambar, atau audio-video yang sudah direkam. Penggunaan media tersebut dapat membantu spesialis jarak jauh untuk mengevaluasi klien atau untuk memberikan kelincahan dan kegunaan untuk menggambarkan kasus klinis menggunakan deskripsi tekstual. Berbagai modalitas praktik *telehealth* menggunakan platform, berikut penjelasan terkait platform menurut (Boro & Hariyati, 2020) sebagai berikut:

#### 1) *Teleconsultasi*

Dalam *teleconsultation*, klien berinteraksi langsung dengan profesional kesehatan menggunakan platform *telehealth*. Intervensi profesional lainnya dengan klien di ruangan yang sama adalah opsional. Dalam hal ini, platform *telehealth* memungkinkan interaksi menggunakan audio, video, atau keduanya secara real time. Berbagai platform memungkinkan untuk menghubungkan sensor, perangkat yang dapat dikenakan, dan perangkat lain sehingga memungkinkan untuk mengirimkan sinyal dan data fisik dan



biometrik serta fisiologis termasuk glukosa darah, tekanan darah, dan detak jantung untuk membantu profesional kesehatan mengevaluasi klien dari jarak jauh.

## 2) *Telemonitoring*

*Platform telemonitoring* ini diharapkan mampu mengumpulkan data, merekam data, dan mengirimkan data dengan cara mendeskripsikan data secara berkala atau memonitoring saat ada tanda bahaya. *Platform telemonitoring* memantau aktivitas fisik klien dan catatan individu tentang makanan dan kalori yang dikonsumsi dalam sehari dan mengirimkan data untuk dianalisis oleh para profesional. Profesional kemudian dapat bertindak berdasarkan data yang diterima untuk membantu klien menurunkan berat badan. Di sini *platform telemonitoring* digunakan dengan partisipasi aktif klien.

## 3) *Telediagnosis*

*Telediagnosis* mengacu pada diagnosis jarak jauh ("tele" berarti jarak jauh, diawali dengan diagnosis). *Platform telediagnostik* memastikan bahwa rekaman gambar dan video mempertahankan kualitas diagnostik bahkan setelah menjalani prosedur kompresi untuk transmisi.

Penggunaan standar Digital Imaging and *Communications in Medicine* (DICOM) adalah persyaratan yang disarankan untuk memungkinkan lalu lintas file yang padat tanpa mengurangi efisiensi penggunaan. Batasannya mungkin kecepatan koneksi yang rendah untuk transmisi data atau batasan bandwidth. Oleh karena itu, menyeimbangkan kualitas gambar, efisiensi penggunaan, dan

bandwidth yang tersedia merupakan tantangan signifikan bagi *platform telediagnostik*. Di *platform telediagnostik*, praktisi perawatan kesehatan dapat mengirimkan laporan pemeriksaan klinis di *platform*, juga termasuk informasi klien dan hasil pemeriksaan itu sendiri untuk mendapatkan pendapat medis dari spesialis perawatan kesehatan jarak jauh.

#### 4) *Teleeducation*

*Tele-edukasi* didefinisikan sebagai teknologi komunikasi yang digunakan untuk meningkatkan informasi kesehatan dan pelayanan kesehatan di daerah yang bermasalah dengan kondisi geografis, ataupun dalam kondisi mengakses dan menggunakan internet.

Program *tele-edukasi* telah digunakan dalam berbagai bentuk di sector kesehatan untuk meningkatkan akses dalam pengembangan pendidikan layanan jarak jauh sebagai praktik terbaik dalam program kesehatan. Pengembangan ini merupakan kebutuhan nyata dan solusi untuk membantu pelayanan pendidikan kesehatan jarak jauh. Adapun manfaat penerapan *tele-edukasi* atau *telehealth* adalah dapat membantu klien yang mengalami kesulitan transportasi, jadwal kerja yang tidak fleksibel, dan masih banyak lagi.

Pendidikan jarak jauh menggunakan sumber daya teknologi untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu untuk memungkinkan komunikasi antara elemen-elemen ini. Karena evolusinya yang canggih, di antara alasan lain, tidak mungkin lagi mengabaikan fasilitasi yang dihasilkan dari konvergensi solusi komunikasi dalam Masyarakat Digital.

#### 5) *Telesurveillance / teletracking*

*Teletracking* menggunakan kuesioner dan protokol untuk mempelajari kejadian dari perilaku yang ditentukan, kondisi komorbiditas, atau kondisi klinis individu. Berbagai *platform* menyediakan satu atau lebih protokol referensi untuk pengetahuan domain, yaitu evaluasi kondisi kesehatan mental. Sementara beberapa *platform* menggunakan kuesioner dan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya, *platform* lain memungkinkan pengguna untuk membuat instrumen dan kuesioner yang dilaporkan sendiri. *Teletracking* digunakan dengan perangkat seluler dan smartphone atau memiliki antarmuka *web* yang mengirimkan data yang dikumpulkan ke server. Transmisi data yang tidak sinkron atau offline berguna untuk pengawasan jarak jauh, yang memungkinkan para manajer memiliki kemampuan untuk mendeteksi epidemi secara dini.

### c. Manfaat

Keperawatan jarak jauh memiliki beberapa keunggulan menurut (Asmirajanti, 2019) yakni sebagai berikut :

- 1) Efektif dan efisien dari segi biaya pengobatan, klien dan keluarganya dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan medis (Dokter Umum, IGD, Rumah Sakit dan panti jompo).
- 2) Dengan sumber daya yang minimal, dapat meningkatkan dan memperluas layanan perawatan Anda tanpa batasan geografis.
- 3) Keperawatan jarak jauh dapat mengurangi rawat inap.
- 4) Klien dewasa dengan penyakit kronis perlu sering diperiksa dan dipantau, yang dapat memakan biaya. Keperawatan jarak jauh dapat

meningkatkan layanan kepada klien kronis secara gratis dan meningkatkan penggunaan teknologi.

- 5) Kami mampu mengurangi biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan dan meningkatkan akses ke perawatan kesehatan tanpa menghabiskan sumber daya yang signifikan.

Selain manfaat di atas, keperawatan jarak jauh dapat digunakan dalam bidang pendidikan keperawatan (model pembelajaran jarak jauh) dan pengembangan penelitian keperawatan berbasis informatika kesehatan. *Telenursing* juga dapat digunakan di kampus dengan konferensi video, pembelajaran online, dan pembelajaran jarak jauh multimedia.

#### **d. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan *Telenursing***

Keperawatan jarak jauh dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi di bidang asuhan untuk memberikan informasi dan pelayanan asuhan jarak jauh. Menurut (Komariah *et al.*, 2021) model layanan ini memiliki keunggulan sebagai berikut:

- 1) Mengurangi waktu tunggu dan mengurangi kunjungan yang tidak perlu.
- 2) Mempersingkat jumlah hari perawatan dan mengurangi biaya perawatan.
- 3) Mendukung kebutuhan kesehatan. Mengurangi akses ke tenaga kesehatan di daerah terpencil.
- 4) Ini berguna dalam kasus kronis dan kasus keperawatan dan harus diobati dengan layanan kesehatan rumah.

- 5) Mendorong petugas kesehatan dan wilayah untuk mengakses pakaian dalam mekanisme seperti konferensi video dan internet dalam penyedia layanan.
- 6) Meningkatkan jumlah penutup layanan perawatan yang merata dalam jumlah yang lebih luas.
- 7) Dapat digunakan dalam bidang pendidikan keperawatan, pengembangan penelitian keperawatan berbasis pendidikan jarak jauh, informatika kesehatan dan peningkatan pengasuh serta kepuasan klien.
- 8) Meningkatkan dan meningkatkan layanan perawatan yang diberikan. Kualitas layanan perawatan di rumah.
- 9) Dengan penerapan keperawatan jarak jauh, kepuasan klien dan keluarganya dapat lebih ditingkatkan, dan kepatuhan dapat ditingkatkan, sehingga rasa aman (safety) pemberi perawatan dan klien dapat ditingkatkan. Keperawatan jarak jauh disediakan bagaimana konsumen memanggil perawat untuk nasihat kesehatan. Sejak perawat terlatih khusus dapat memberikan pendidikan dan dukungan, ini berguna karena pelanggan harus dapat menghubungi secara langsung.

#### **4. Tinjauan Umum Kehamilan**

##### **a. Definisi**

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai janin lahir. Lama kehamilan normal dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir (HPMT) yaitu 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari). Masa kehamilan dibagi menjadi tiga trimester yang masing-masing terdiri dari 13 minggu atau tiga bulan menurut hitungan kalender. Trimester pertama secara umum dipertimbangkan berlangsung pada minggu pertama

hingga ke-12 (12 minggu), trimester ke dua pada minggu ke-13 hingga ke-27 (15 minggu, dan trimester ketiga pada minggu ke-28 hingga ke-40 (13 minggu). Selama kehamilan seorang wanita akan mengalami perubahan dalam yang meliputi perubahan fisiologis dan psikologis (Ayustawati, 2019)



Gambar 2. 1 Perkembangan Janin

Menurut Faderasi Obstetri Ginekologi International, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi sampai dengan lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester I berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 sampai ke-27) dan trimester 3 berlangsung 13 minggu (minggu ke-28 sampai minggu ke-40).

Kehamilan merupakan proses yang normal dan alamiah pada seorang wanita di mana dalam masa kehamilan terjadi perubahan fisiologi yang meliputi perubahan fisik, psikologis dan sosial. Kehamilan adalah hal yang luar biasa karena menyangkut perubahan fisiologis, biologis dan psikis yang mengubah hidup seorang wanita. kehamilan dengan kasus khusus misalnya hamil bermasalah kecemasan yang menghantui ibu hamil juga mempengaruhi turun naiknya kadar hormon. Selain itu,ibu yang menjalani kehamilan dengan kasus khusus,

misalnya hamil bermasalah atau pernah mengalami keguguran juga mengalami keguguran juga mengalami kecemasan.

## **b. Proses Terjadinya Kehamilan**

Proses terjadinya kehamilan menurut (Fitriani *et al.*, 2021) yaitu sebagai berikut:

### 1) Ovum

Meiosis pada wanita menghasilkan sebuah telur atau ovum. Proses ini terjadi di dalam ovarium, khususnya pada folikel ovarium. Ovum dianggap subur selama 24 jam setelah ovulasi.

### 2) Sperma

Ejakulasi pada hubungan seksual dalam kondisi normal mengakibatkan pengeluaran satu sendok teh semen, yang mengandung 200-500 juta sperma, ke dalam vagina. Saat sperma berjalan tuba uterina, enzim-enzim yang dihasilkan disana akan membantu kapasitas sperma. Enzim-enzim ini dibutuhkan agar sperma dapat menembus lapisan pelindung ovum sebelum fertilisasi.

### 3) Fertilisasi

Fertilisasi berlangsung di ampula (seperti bagian luar) tuba uterina. Apabila sebuah sperma berhasil menembus membran yang mengelilingi ovum, baik sperma maupun ovum akan berada di dalam membran dan membran tidak lagi dapat ditembus oleh sperma lain. Dengan demikian, konsepsi berlangsung dan terbentuklah zigot Implantasi Zona peluzida berdegenerasi dan trofoblas melekatkan dirinya pada endometrium rahim, biasanya

pada daerah fundus anterior atau posterior. Antara 7 sampai 10 hari setelah konsepsi, trofoblas mensekresi enzim yang membantunya membenamkan diri ke dalam endometrium sampai seluruh bagian blastosis tertutup.

#### 4) Implantasi

Zona peluzida berdegenerasi dan trofoblas melekatkan dirinya pada endometrium rehim, biasanya pada daerah fundus anterior atau posterior. Antara 7 sampai 10 hari setelah konsepsi, trofoblas mensekresi enzim yang membantunya membenamkan diri ke dalam endometrium sampai seluruh bagian blastosis tertutup.

### c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan menurut (Anggraini & Yetti, 2017) antara lain:

#### 1) Faktor Fisik

##### a) Status kesehatan

Jika seorang wanita hamil memiliki status kesehatan yang tidak baik atau sedang menderita suatu penyakit maka ia perlu mendapatkan pertolongan medis untuk merencanakan apa saja yang diperlukan dan memutuskan apakah ia sebaiknya melahirkan di RS atau tidak. Dan jika seorang wanita yang sedang hamil pernah sebelumnya menderita suatu penyakit seperti Hepatitis, infeksi kandung kemih, penyakit ginjal, TBC dan lain-lain, maka bidan perlu mengkaji kembali kondisi wanita tersebut untuk mengetahui apakah ia masih menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Hal ini sangat penting karena beberapa penyakit yang dibawa ibu dapat



berdampak pada bayi yang dikandungnya seperti sifilis atau campak Jerman yang dapat menyebabkan cacat bawaan.

b) Status gizi

Selama masa kehamilan ibu merupakan sumber nutrisi bagi bayi yang dikandungnya. Apa yang ibu makan akan mempengaruhi kondisi bayi. Apabila wanita hamil memiliki status gizi kurang selama kehamilannya maka ia berisiko memiliki bayi dengan kondisi kesehatan yang buruk. Dan wanita dengan status gizi baik akan melahirkan bayi yang sehat.

c) Gaya hidup

Gaya Hidup seperti: Perokok, mengkonsumsi obat-obatan, alkohol, rokok, minuman beralkohol dan obat-obatan adalah hal yang sangat berbahaya bagi ibu dan bayinya. Semua benda tersebut dapat terserap dalam darah ibu kemudian terserap dalam darah bayi melalui sistem sirkulasi plasenta selama kehamilan. Sangat dianjurkan pada ibu hamil terutama selama trimester I untuk menghindari rokok, minuman beralkohol dan obat-obatan yang tidak dianjurkan oleh dokter atau bidan.

2) Faktor Psikologis

a) Stressor internal dan eksternal

Faktor psikologis yang berpengaruh dalam kehamilan dapat berasal dari dalam diri ibu hamil (internal) dan dapat juga berasal dari faktor luar diri ibu hamil. Faktor psikologis yang mempengaruhi kehamilan berasal dari dalam diri ibu dapat berupa latar belakang kepribadian ibu dan pengaruh perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan

Sedangkan faktor psikologis yang berasal dari luar diri ibu dapat berupa pengalaman ibu misalnya ibu mengalami masa anak-anak yang bahagia dan mendapatkan cukup cinta kasih, berasal dari keluarga yang bahagia sehingga mempunyai anak dianggap sesuatu yang diinginkan dan menyenangkan maka ia pun akan terdorong secara psikologis untuk mampu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Selain itu pengalaman ibu yang buruk tentang proses kehamilan atau persalinan yang meninggalkan trauma berat bagi ibu dapat juga menimbulkan gangguan emosi yang mempengaruhi kehamilannya

b) Dukungan keluarga

Dukungan keluarga yang dapat diberikan agar kehamilan dapat berjalan lancar antara lain: Memberikan dukungan pada ibu untuk menerima kehamilannya, memberi dukungan pada ibu untuk menerima dan mempersiapkan peran sebagai ibu; memberi dukungan pada ibu untuk menghilangkan rasa takut dan cemas terhadap persalinan; memberi dukungan pada ibu untuk menciptakan ikatan yang kuat antara ibu dan anak yang dikandungnya melalui perawatan kehamilan dan persalinan yang baik; menyiapkan keluarga lainnya untuk menerima kehadiran anggota keluarga baru

c) Dukungan suami

Ada empat jenis dukungan yang dapat diberikan sebagai calon ayah bagi anaknya antara lain: Dukungan emosi yaitu suami sepenuhnya memberi dukungan secara psikologis kepada istrinya dengan menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada

kehamilannya serta peka terhadap kebutuhan dan perubahan emosi ibu hamil; dukungan instrumental yaitu dukungan suami yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan fisik ibu hamil dengan bantuan keluarga lainnya; dukungan informasi yaitu dukungan suami dalam memberikan informasi yang diperolehnya mengenai kehamilan; dukungan penilaian yaitu memberikan keputusan yang tepat untuk perawatan kehamilan istrinya.

### 3) Faktor Lingkungan, Sosial, Budaya dan Ekonomi

#### a) Faktor lingkungan

Banyak alasan mengapa ibu mengalami kesulitan untuk menjadi sehat terutama ibu hamil, beberapa alasan antara lain karena kemiskinan, kurangnya pelayanan medik, kurang pendidikan dan pengetahuan, termasuk pengaruh sosial budaya berupa kepercayaan yang merugikan atau membahayakan

#### b) Kebiasaan adat istiadat

Bidan atau perawat harus dapat mengkaji apakah ibu hamil menganut atau mempunyai kepercayaan atau adat kebiasaan tabu setempat yang berpengaruh terhadap kehamilan. Kemudian menilai apakah hal tersebut bermanfaat, netral (tidak berpengaruh pada keamanan atau kesehatan), tidak jelas (efek tidak diketahui/tidak dipahami) atau membahayakan. Terutama bila faktor budaya tersebut dapat menghambat pemberian asuhan yang optimal bagi ibu hamil. Bidan harus mampu mencari jalan untuk menolongnya atau meyakinkan ibu untuk mengubah kebiasaannya dengan memberikan penjelasan yang

benar. Tentu saja hal ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang berperan dalam keluarga dan masyarakat

c) Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan berhubungan dengan tempat ibu mendapatkan pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya sampai ibu dapat melahirkan dengan aman. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dengan jarak yang mudah terjangkau akan memberi kemudahan bagi ibu hamil untuk sering memeriksakan kehamilannya dan untuk mendapatkan penanganan dalam keadaan darurat

d) Sosial ekonomi

Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi kehamilan ibu karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ibu selama kehamilan antara lain makanan sehat, bahan persiapan kelahiran, obat-obatan, tenaga kesehatan dan transportasi/sarana angkutan.

**d. Perubahan Fisiologi dan Psikologi Pada Kehamilan**

1) Perubahan fisiologi pada ibu hamil

Menurut (Machfoeds *et al.*, 2018) adapun perubahan fisiologi pada ibu hamil antara lain:

a) Uterus

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima dan melindungi masa konsepsi (janin, amnion) sampai persalinan. Uterus mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk bertambah besar dengan cepat selama kehamilan dan pulih

kembali seperti keadaan semula dalam beberapa minggu setelah persalinan.

b) Servik

Satu bulan setelah konsepsi servik akan menjadi lebih lunak dan kebiruan.

c) Ovarium

Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan pematangan folikel baru juga ditandai. Folikel ini berfungsi maksimal 6-7 minggu awal kehamilan setelah itu akan berperan sebagai penghasil progesterone dalam jumlah dan relatif normal.

d) Vagina dan Perineum

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan hyperemia terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum dan vulva, sehingga pada vagina akan terlihat berwarna keunguan yang dikenal tanda chadwick.

e) Kulit

Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna menjadi kemerahan, kusam, dan kadang-kadang juga akan mengenai daerah payudara dan paha. Perubahan ini dikenal dengan nama striae gravidarum dan pada multipara selain striae gravidarum itu seringkali ditemukan garis berwarna perak berkilau yang merupakan sikatrik dari striae gravidarum.

f) Payudara

Pada awal kehamilan perempuan akan merasakan payudaranya menjadi lebih lunak. Setelah bulan kedua akan

bertambah ukurannya dan vena-vena dibawah kulit akan lebih terlihat. Puting payudara akan lebih

2) Perubahan psikologi pada ibu hamil

Segera setelah terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh, maka akan muncul berbagai macam ketidaknyamanan secara fisiologis pada ibu misalnya mual, muntah, keletihan, dan pembesaran pada payudara. Hal ini akan memicu perubahan psikologis. Adapun perubahan psikologis tersebut antara lain:

a) Trimester pertama

- (1) Ibu membenci kehamilannya, kecemasan, merasakan kekecewaan, penolakan, dan kesedihan
- (2) Mencari tahu secara aktif apakah memang benar-benar hamil dengan memperhatikan perubahan pada tubuhnya dan sering memberitahukan kepada orang lain apa yang dirahasiakan
- (3) Hasrat melakukan seks berbeda-beda, ada yang meningkat ada yang menurun
- (4) Bagi seorang suami sebagai seorang ayah akan timbul kebanggaan, tetapi bercampur dengan keprihatinan akan kesiapa untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

b) Trimester kedua

- (1) Ibu merasa sehat dan sudah terbiasa dengan kadar hormon yang tinggi, serta rasa tidak nyaman akibat kehamilan sudah mulai berkurang
- (2) Ibu sudah menerima kehamilannya dan dapat mulai menggunakan energi dan pikirannya lebih konstruktif

(3) Ibu merasa terlepas dari rasa kecemasan dan rasa tidak nyaman seperti yang dirasakannya pada trimester pertama.

c) Trimester ketiga

(1) Ibu tidak sabar menunggu kehadiran bayinya b. Ibu khawatir akan bayinya yang akan segera lahir sewaktu-waktu

(2) Ibu khawatir bayinya lahir tidak normal

(3) Ibu bersikap lebih melindungi bayinya dan menghindari orang atau benda yang di anggap membahayakan bayinya

(4) Ibu merasa takut akan sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada saat melahirkan

(5) Tidak nyaman dengan kehamilannya, ibu meras dirinya jelek dan aneh.

## 5. Tinjauan Umum Integrasi Keislaman

### a. Kekurangan Energi Kronik (KEK)

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS Al-Baqarah/2:168)

Dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, baik dari hewan, tumbuh-tumbuhan maupun pohon-pohonan yang diperoleh dengan cara yang halal dan memiliki kandungan yang baik, tidak jorok. Dan janganlah kalian mengikuti jalan setan yang menggoda kalian secara bertahap. Sesungguhnya setan itu

adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan orang yang berakal sehat tidak boleh mengikuti musuhnya yang selalu berusaha keras untuk mencelakakan dan menyesatkannya. Ayat tersebut juga mengingatkan untuk selalu memilih makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, larangan untuk mengonsumsi makanan yang haram atau melebihi takaran yang diperbolehkan.

#### b. Literasi Kesehatan

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:121

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

Terjemahnya:

“Orang-orang yang telah Kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya, itulah orang-orang yang beriman padanya. Siapa yang ingkar padanya, merekalah orang-orang yang rugi.” (QS Al-Baqarah/2:121)

Pada ayat tersebut menggambarkan membahas tentang literasi kesehatan, memberikan landasan moral dan spiritual bagi umat Islam untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik kesehatan mereka. Dengan memahami dan menerapkan ayat ini, umat Islam dapat menjadi individu yang lebih sehat dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan diri sendiri dan orang lain.

#### c. Telenursing

Allah SWT berfirman dalam QS An-Naml/27:28

اِذْهَبْ بِكِتَابِي هٰذَا فَاَلْقِهٖ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۝



Terjemahnya:

“Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan!”(QS An-Naml/27:28)

Tafsiran pada ayat ini menurut Al-Jalalain yaitu (“Pergilah membawa surahku ini, lalu jatuhkan kepada mereka) kepada ratu Balqis dan kaumnya (kemudian berpalinglah) pergilah (dari mereka) dengan tidak terlalu jauh dari mereka (lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.”) yakni, jawaban atau reaksi apakah yang bakal mereka lakukan. Kemudian burung Hud-hud membawa surah itu lalu mendatangi ratu Balqis yang pada waktu itu berada di tengah-tengah bala tentaranya. Kemudian burung Hud-hud menjatuhkan surah Nabi Sulaiman itu ke pangkuannya. Ketika ratu Balqis membaca surah tersebut, tubuhnya gemetar dan lemas karena takut, kemudian ia memikirkan isi surah tersebut.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan kemajuan zaman yang membuat segi kehidupan semakin lama semakin berkembang dan kemungkinan di masa mendatang bisa saja pekerjaan manusia akan digantikan oleh teknologi. Pada zaman dahulu orang banyak menggunakan kentongan atau lonceng untuk memberikan informasi kepada semua orang dan menggunakan merpati untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Dari pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi yang terkandung di dalam QS An-Naml/27:28 adalah teknologi informasi, karena di dalamnya termuat cerita Nabi Sulaiman as yang mengirimkan surat kepada Ratu Balqis melalui perantara

burung Hud-hud yang pada saat itu merupakan alat yang digunakan untuk saling bertukar informasi. Mengaplikasikan pada zaman sekarang terkait cara manusia menyampaikan informasi dengan menggunakan handphone, komputer, dll. Adapun teknologi yang bisa digunakan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi ataupun dalam mengontrol keadaan klien yakni dengan menggunakan media yang bernama *Telenursing*.

#### d. Kehamilan

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Mu'minun/23:12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ  
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا ۚ  
فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۖ

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.” (QS Al-Mu'minun/23:12-14)

Dari ayat diatas memberikan gambaran yang indah tentang keagungan Allah SWT dalam menciptakan manusia. Ayat-ayat tersebut menjelaskan proses perkembangan janin di dalam rahim dengan detail yang menakjubkan, dan menunjukkan bahwa Allah SWT adalah Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Proses penciptaan ini berlangsung dalam beberapa tahap dan setiap tahap memiliki peran

penting untuk membentuk manusia yang sempurna. Sebagai manusia hendaklah bersyukur kepada Allah SWT atas karunia penciptaan manusia dan menjaga kesehatan dan kehormatan diri sebagai manusia.

## **B. Konsep Asuhan Keperawatan**

### **1. Pengkajian Keperawatan**

Pengkajian Antenatal Care (ANC) menurut (Kemenkes RI, 2020) yaitu:

- a. Identitas klien meliputi umur, pendidikanm pekerjaan, suku , agama, identitas suami,dan alamat.
- b. Riwayat kesehatan sekarang.
  - 1) Keluhan utama : dinyatakan alasan klien datang dengan kehamilan dan keluhan-keluhannya
  - 2) Riwayat kesehatan : dinyatakan penyakit yang diderita dan pernah diderita baik akut maupun kronis serta penyakit menular dan keturunan
  - 3) Riwayat menstruasi : dinyatakan fisiologi reproduksi (usia, menarche,siklus, lama menstruasi, masalah-masalah menstruasi/amenorrhoe,pendarahan ireguler, nyeri hebat, pendarahan sampai menggumpal selama menstruasi dan lain-lain)
  - 4) Riwayat penyakit seksual termasuk penggunaan alat kontrasepsi
  - 5) Riwayat penyakit ginekologi (molahidatidosa, tumor kandungan, tumor ovarium)
  - 6) Riwayat kesehatan keluarga: dinyatakan penyakit-penyakit dan masalah kesehatan dalam keluarganya

c. Riwayat obstetrik

Untuk mengetahui riwayat kehamilan, persalinan, abortus dan anak hidup dimilikisaat periksa kehamilan sekarang

- 1) Paritas ibu hamil GPA
- 2) Hari pertama menstruasi terakhir/HTHP
- 3) Usia ehamilan biasanya ditulis dalam minggu
- 4) Gerakan janin pertama kali dirasakan ibu
- 5) Keluhan yang dirasakan selama kehamilan saat memeriksa kehamilannya
- 6) Penggunaan obat-obatan selama kehamilan
- 7) Adaptasi kehamilan serta reaksi bagi ibu hamil, pasangan/ suaminya, maupun keluarganya.

d. Kebutuhan dasar manusia /klien

- 1) Presepsi dan pemeliharaan kesehatan; pengetahuan tentangkeperawatan kehamilan sekarang
- 2) Pola nutrisi/ metabolik: intake makanan dan cairan selama kahamilan
- 3) Pola eliminasi, defekasi dan miksi
- 4) Pola aktivitas dan latihan; kemampuan perawatan diri; meliputi makan dan minum
- 5) Mandi, toileting, berpakaian, mobilitas, ambulasi, termasuk oksigenasi
- 6) Pola tidur dan istirahat; lama tidur, gangguan tidur, banntuan dan kebiasaan untuk membantu tidur, serta perasaan saat bangun tidur

- 7) Pola prepsual; penglihatan, pendengaran, pengecap dan sensasi
  - 8) Pola persepsi diri; pandangan klien tentang kehamilannya, kecemasan, dan konsep diri
  - 9) Pola seksual dan reproduksi: fertilitas, libido, menstruasi, kontrasepsi
  - 10) Pola peran hubungan; komunikasi, hubungan dengan orang lain, kemampuan keuangan
  - 11) Pola manajemen coping-stress; perubahan terbesar dalam hidup akhir-akhir ini
  - 12) Sistem nilai dan keyakinan; pandangan klien tentang agama dan kegiatan keagamaan
- e. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik pertama memberi data dasar untuk mengkaji perubahan-perubahan selanjutnya dan menetapkan kebutuhan dasar akan informasi tentang struktur genitalia yang sekaligus dengan demonstrasi peralatan yang digunakan serta penjelasan prosedur penggunaannya. Interaksi membutuhkan pendekatan seksama, sensitif dan lembut disertai sikap mawas terhadap fakta yang ditemukan. Pemeriksaan spesifik klien (antenatal care) yang meliputi:

- 1) Pemeriksaan kepala: amati kemungkinan adanya kloasma gravidum, odema, conjuciva anemis, mulut/ bibir kering, stomatis, gingvitis maupun careis gigi
- 2) Pemeriksaan leher; kemungkinan adanya pembesaran kelenjar tiroid

- 3) Pemeriksaan dada: pada payudara diperiksa ukuran, areolamana, keadaan puting susu serta kebersihannya
- 4) Pemeriksaan abdomen; adakah striae gravidium (linea alba/ nigra) serta memeriksa fundus uteri untuk menentukan umur kehamilan serta letak presesntasi janin yang berada di fundus uteri, daan memeriksa letak atau posisi punggung janinn untuk menentukakn letak denyut jantung janin, menentukan bagian janin terhadap pintu atas panggul
- 5) Pemeriksaan genetalia luar dan pemeriksaan genetalia dalam termasuk palpasi binual dan rektovaginal
- 6) Pemeriksaan panggul: dilakukan pada ibu hamil yang diprediksi resiko adanya panggul sempit seperti bertubuh sangat pendek, berjalan pincang, adanya kelianan tulang belakang dan pada kehamilan primi gravida
- 7) Pemeriksaan esktremitas: pada ekstremitas bawah kemungkinan adanya edema bila ditekan menggunakan jari telunjuk cekung 2 mm makan nilai positif 1, bila cekung 4 mm, positif 2 cekung 6 mm positif 3 cekung > 6 mm positif 4 kemungkinan adanya tanda pre eklamsia, termasuk adanya tanda refleks haner patella berlebihan dan cepat. Bila patella refleks negatif kemungkinan ibu hamil kekurangan vitamin B1.

## **2. Diagnosis Keperawatan**

Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada masa kehamilan berdasarkan buku Tim Pokja (SDKI PPNI, 2018) yaitu:

- a. Intoleransi Aktivitas

- 1) Definisi : Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari
  - 2) Batasan karakteristik:
    - a) Gejala dan tanda mayor  
Subjektif:
      - (1) Mengeluh lelahObjektif
      - (1) Frekuensi jantung meningkat  $>20\%$  dari kondisi istirahat
    - b) Gejala dan tanda minor  
Subjektif:
      - (1) Dyspnea saat/setelah aktivitas
      - (2) Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas
      - (3) Merasa lelahObjektif
      - (1) TD berubah  $>20\%$  dari kondisi istirahat
      - (2) Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktivitas
      - (3) Gambaran EKG menunjukkan iskemia
      - (4) Sianosis
  - 3) Penyebab
    - a) Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen
    - b) Tirah baring
    - c) Kelemahan
    - d) Imobilitas
    - e) Gaya hidup monoton
- b. Ansietas

1) Definisi : Kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman

2) Batasan karakteristik

a) Gejala dan tanda mayor

Subjektif:

- (1) Merasa bingung
- (2) Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi
- (3) Sulit berkonsentrasi

Objektif

- (1) Tampak gelisah
- (2) Tampak tegang
- (3) Sulit tidur

b) Gejala dan tanda minor

Subjektif:

- (1) Mengeluh pusing
- (2) Anoreksia
- (3) Palpitasi
- (4) Merasa tidak berdaya

Objektif

- (1) Frekuensi napas meningkat
- (2) Frekuensi nadi meningkat
- (3) Tekanan darah meningkat
- (4) Diaphoresis



(5) Tremor

(6) Muka tampak pucat

3) Penyebab

- a) Krisis situasional
- b) Kebutuhan tidak terpenuhi
- c) Krisis maturasional
- d) Ancaman terhadap konsep diri
- e) Ancaman terhadap kematian
- f) Kekhawatiran mengalami kegagalan
- g) Disfungsi sistem keluarga
- h) Hubungan orang tua-anak tidak memuaskan
- i) Faktor keturunan (temperamen mudah teragitasi sejak lahir)
- j) Penyalahgunaan zat
- k) Terpapar bahaya lingkungan (mis. toksin, polutan dan lain-lain)
- l) Kurang terpapar informasi

c. Gangguan Pola Tidur

1) Definisi : Gangguan kualitas dan kuantitas tidur akibat faktor eksternal

2) Batasan karakteristik

- a) Gejala dan tanda mayor

Subjektif:

- (1) Mengeluh kesulitan tidur
- (2) Mengeluh sering terjaga
- (3) Mengeluh tidak puas tidur
- (4) Mengeluh pola tidur berubah
- (5) Mengeluh istirahat tidak cukup

Objektif

(1) (tidak tersedia)

b) Gejala dan tanda minor

Subjektif:

(1) Mengeluh kemampuan beraktivitas menurun

Objektif

(1) (tidak tersedia)

3) Penyebab

a) Hambatan lingkungan

b) Kurang kontrol tidur

c) Kurang privasi

d) *Restraint fisik*

e) Ketiadaan teman tidur

f) Tidak familiar dengan peralatan tidur

d. Defisit Nutrisi atau Defisit nutrisi

1) Definisi : Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme

2) Batasan karakteristik

a) Gejala dan tanda mayor

Subjektif:

(1) (tidak tersedia)

Objektif

(1) Berat badan menurut minimal 10% dibawah rentang ideal

b) Gejala dan tanda minor

Subjektif:

(1) Cepat Kenyan setelah makan

- (2) Kram/nyeri abdomen
- (3) Nafsu makan menurun

Objektif

- (1) Bising usus hiperaktif
- (2) Otot pengunyah lemah
- (3) Otot menelan lemah
- (4) Membrane mukosa pucat
- (5) Sariawan
- (6) Serum albumin turun
- (7) Rambut rontok berlebihan
- (8) Diare

3) Penyebab

- a) Ketidakmampuan menelan makanan
- b) Ketidakmampuan mencerna makanan
- c) Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrient
- d) Peningkatan kebutuhan metabolisme
- e) Faktor ekonomi
- f) Faktor psikologis

e. Gangguan Rasa Nyaman

- 1) Definisi : perasaan kurang senang, lega dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan dan sosial
- 2) Batasan karakteristik
  - a) Gejala dan tanda mayor

Subjektif:

- (1) Meneluh tidak nyaman

Objektif

(1) Gelisah

b) Gejala dan tanda minor

Subjektif:

(1) Mengeluh sulit tidur

(2) Tidak mampu rileks

(3) Mengeluh kedinginan/kepanasan

(4) Merasa gatal

(5) Mengeluh mual

(6) Mengeluh lelah

Objektif

(1) Menunjukkan gejala distress

(2) Tampak merintih

(3) Pola eliminasi berubah

(4) Postur tubuh berubah

(5) Iritabilitas

3) Penyebab

a) Gejala penyakit

b) Kurang pengendalian situasional/lingkungan

c) Ketidakaekuatan sumber daya mis (mis. dukungan finansial, sosial dan pengetahuan)

d) Kurangnya privasi

e) Gangguan stimulus lingkungan

f) Efek samping terapi (mis. medikasi, radiasi, kemoterapi)

g) Gangguan adaptasi kehamilan.

### 3. Intervensi Keperawatan

Berikut intervensi dan standar luaran keperawatan menurut (PPNI SIKI; PPNI SLKI, 2018)

Diagnosis	Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
Intoleransi aktivitas	<p>Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Frekuensi nadi menurun</li> <li>Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat</li> <li>Kecepatan berjalan meningkat</li> <li>Jarak berjalan meningkat</li> <li>Kekuatan tubuh bagian atas meningkat</li> <li>Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat</li> <li>Keluhan lelah menurun</li> <li>Dispnea saat aktivitas menurun</li> <li>Dispnea setelah aktivitas menurun</li> <li>Perasaan lemah menurun</li> <li>Aritmia saat aktivitas menurun</li> <li>Aritmia setelah aktivitas menurun</li> <li>Sianosis menurun</li> <li>Tekanan darah membaik</li> <li>Frekuensi napas membaik</li> </ol>	<p><b>Manajemen Energi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan</li> <li>Monitor kelelahan fisik dan emosional</li> <li>Monitor pola dan jam tidur</li> <li>Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (misalnya cahaya, suara, kunjungan)</li> <li>Lakukan latihan gerak pasif dan/atau aktif</li> <li>Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan</li> <li>Fasilitasi duduk di tempat tidur, jika tidak berpindah atau berjalan</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anjurkan tirah baring</li> <li>Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap</li> <li>Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan</li> </ol> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan</li> </ol>

Ansietas	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun</li> <li>Perilaku gelisah menurun</li> <li>Perilaku tegang menurun</li> <li>Pola tidur membaik</li> <li>Frekuensi pernapasan membaik</li> <li>Frekuensi nadi membaik</li> <li>Tekanan darah membaik</li> <li>Kontak mata membaik</li> </ol>	<p><b>Reduksi Ansietas</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi saat tingk ansietas</li> <li>berubah misalnya kondisi, waktu, stressor.</li> <li>Monitor tanda-tanda ansietas.</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan</li> <li>Pahami situasi yang membuat ansietas</li> <li>Dengarkan dengan penuh perhatian</li> <li>Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan</li> <li>Memotivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasikan secara actual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis</li> <li>Anjurkan mengungkapkan perasaan dan konsepsi</li> <li>Latih kegiatan pengalihan untutu mengurangi ketegangan.</li> </ol> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kolaborasi pemberian obat</li> </ol>
Gangguan pola tidur	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan pola tidur membaik dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keluhan sulit tidur menurun</li> <li>Keluhan sering terjaga menurun</li> </ol>	<p><b>Dukungan Tidur</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi pola aktivitas dan tidur</li> <li>Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/ psikologis)</li> <li>Identifikasi makanan dan minuman yang</li> </ol>

	<p>c. Keluhan tidak puas tidur menurun</p> <p>d. Keluhan pola tidur berubah menurun</p> <p>e. Keluhan istirahat tidak cukup menurun</p> <p>f. Kemampuan beraktivitas meningkat.</p>	<p>mengganggu tidur (mis. kopi, teh, alkohol, makan mendekati waktu tidur, minum banyak air sebelum tidur)</p> <p>d. Identifikasi obat tidur yang dikonsumsi</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Modifikasi lingkungan (mis. Pencahayaan, kebisingan, suhu, matras dan tempat tidur)</p> <p>b. Batasi waktu tidur siang, jika perlu</p> <p>c. Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur</p> <p>d. Tetapkan jadwal tidur rutin</p> <p>e. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis. Pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur)</p> <p>f. Sesuaikan jadwal pemberian obat dan/atau tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga</p> <p><b>Edukasi</b></p> <p>a. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit</p> <p>b. Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur</p> <p>c. Anjurkan menghindari makanan/minuman yang mengganggu tidur</p> <p>d. Anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur REM</p> <p>e. Ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur (mis. psikologis, gaya hidup, sering berubah <i>shift</i> bekerja)</p>
--	---	--

		f. Ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara non farmakologi lainnya
Defisit nutrisi atau defisit nutrisi	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan</p> <p>Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Porsi yang dihabiskan meningkat</li> <li>Kekuatan otot pengunyah meningkat</li> <li>Kekuatan otot menelan meningkat</li> <li>Serum albumin meningkat</li> <li>Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat</li> <li>Pengetahuan tentang pilihan makanan meningkat</li> <li>Pengetahuan tentang makanan yang sehat meningkat</li> <li>Pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat</li> <li>Penyiapan dan penyimpanan makanan yang aman meningkat</li> <li>Penyiapan dan penyimpanan minuman yang aman meningkat</li> <li>Sikap terhadap makanan/minuman sesuai dengan tujuan kesehatan meningkat</li> <li>Perasaan cepat kenyang menurun</li> <li>Nyeri abdomen menurun</li> <li>Berat badan membaik</li> <li>Indeks Massa Tubuh (IMT) membaik</li> </ol>	<p><b>Manajemen Nutrisi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi status nutrisi</li> <li>Identifikasi makanan yang disukai</li> <li>Monitor asupan makanan</li> <li>Monitor berat badan</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu</li> <li>Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai</li> <li>Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi</li> <li>Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anjurkan posisi duduk, jika mampu</li> </ol> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan, jika perlu</li> </ol>



	p. Frekuensi makan membaik	
Gangguan rasa nyaman	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan status kenyamananmeningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak nyaman menurun</li> <li>gelisah menurun</li> <li>Kebisingan menurun</li> <li>Keluhan sulit tidur menurun</li> <li>Keluhan kedinginan menurun</li> <li>Keluhan kepanasan menurun</li> <li>Gatal menurun</li> <li>Mual menurun</li> <li>Lelah menurun</li> <li>Merintih menurun</li> <li>Menangis menurun</li> <li>Iritabilitas menurun</li> </ol>	<p><b>Manajemen Nyeri</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>Identifikasi skala nyeri</li> <li>Identifikasi respon nyeri non verbal</li> <li>Identifikasifaktor yang memperberat dan memperingan nyeri</li> <li>Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri</li> <li>Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup</li> <li>Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan</li> <li>Monitor efek samping analgetik</li> </ol> <p><b>Teraupetik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis.TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin)</li> <li>Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)</li> <li>Fasilitasi istirahat dan tidur</li> <li>Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri</li> <li>b. Jelaskan strategi meredakan nyeri</li> <li>c. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri</li> <li>d. Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu</li> </ul>
--	--	---

Tabel 2. 1 Intervensi Konsep Asuhan Keperawatan

#### 4. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan adalah pelaksanaan tindakan yang telah ditentukan dengan maksud agar kebutuhan klien terpenuhi secara optimal. Pelaksanaan tindakan keperawatan adalah implementasi keperawatan terhadap klien secara urut sesuai prioritas masalah yang sudah dibuat dalam rencana tindakan asuhan keperawatan, termasuk didalamnya nomor urut dan waktu ditegakkannya suatu pelaksanaan asuhan keperawatan.

Menurut implementasi merupakan pelaksanaan perencanaan keperawatan oleh perawat. Seperti tahap-tahap yang lain dalam proses keperawatan, fase pelaksanaan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

- a. Validasi (pengesahan) rencana keperawatan
- b. Menulis/mendokumentasikan rencana keperawatan
- c. Memberikan asuhan keperawatan
- d. Melanjutkan pengumpulan data.

#### 5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan serta pengkajian ulang rencana keperawatan. Evaluasi menilai respon klien yang meliputi Subjek, Objek, Pengkajian kembali (Assesment), Rencana tindakan (Planning). Evaluasi merupakan langkah terakhir dari proses keperawatan

untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil akhir yang teramati dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat dalam rencana keperawatan.

### C. Pendekatan Teori Keperawatan Yang Digunakan

Salah satu masalah yang biasa terjadi pada ibu hamil adalah Kekurangan Energi Kronik (KEK) yang berkaitan dengan ketidakpatuhan dalam mengonsumsi makanan. Hal tersebut berkesinambungan dengan teori keperawatan yang dikemukakan oleh Dorothea Elizabeth Orem tentang “Perawatan Diri”. Dorothea lahir pada tanggal 15 Juli 1914 dan wafat pada tanggal 22 Juni 2007. Ia mendapat gelar doctor kehormatan pada tahun 1976 dengan latar belakang pendidikan tinggi, Orem disebut sebagai *Ners Teorist*.

Kebutuhan dari perawatan diri menurut Orem meliputi pemeliharaan udara, air/cairan, makanan, proses eliminasi normal, keseimbangan antara istirahat dan aktifitas, keseimbangan antara interaksi sosial dan solitud, pencegahan bahaya bagi kehidupan manusia, fungsi, dan kesejahteraan manusia, serta upaya untuk meningkatkan fungsi dan perkembangan individu dalam kelompok sosial sesuai dengan potensi, keterbatasan, dan juga keinginan untuk normal. Kebutuhan perawatan diri ini merupakan sifat umum bagi setiap manusia, berkaitan dengan proses kehidupan dan pemeliharaan integritas struktur dan fungsi manusia.

*Self-care* atau perawatan diri adalah sebuah kontribusi berkelanjutan orang dewasa bagi eksistensinya, kesehatannya dan kesejahteraannya. *Self-care* menggambarkan dan menjelaskan beberapa manfaat dari perawatan diri guna mempertahankan hidup, kesehatan dan juga kesejahteraannya jika dilakukan secara efektif, upaya perawatan diri ini dapat memberi kontribusi bagi integritas struktural fungsi dan perkembangan manusia (Risnah & Irwan, 2020)

Teori *self-care* ini dapat diterapkan untuk membantu ibu hamil dengan KEK mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan nutrisi serta meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Dengan menerapkan teori ini, tenaga kesehatan dapat memberikan asuhan yang komprehensif dan berpusat pada ibu untuk membantu ibu hamil dengan KEK menjalani kehamilan yang sehat dan melahirkan bayi yang sehat serta kesejahteraan yang optimal.

Hubungan antara teori Orem dengan intervensi yang diberikan adalah memberikan pemahaman kepada ibu hamil untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsi untuk meningkatkan perawatan diri serta derajat kesehatan. Diharapkan dengan memberikan edukasi dapat diperoleh peningkatan literasi kesehatan dan *self-care* pada ibu hamil dengan masalah defisit pengetahuan dan defisit nutrisi.

#### **D. Evidence Based Practice In Nursing (EBPN)**

##### **1. Literasi Kesehatan Manajemen Nutrisi pada Ibu Hamil**

###### **a. Definisi**

Literasi kesehatan adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, menilai, dan menggunakan informasi kesehatan untuk membuat keputusan yang tepat terkait kesehatannya. Bentuk literasi kesehatan yang dilakukan adalah manajemen nutrisi dengan menghimbau ibu hamil untuk memahami, memilih, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang demi memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan.

###### **b. Tujuan**

Dengan edukasi nutrisi yang tepat, ibu hamil KEK dapat meningkatkan pengetahuannya tentang gizi seimbang, mengubah pola makan menjadi lebih sehat, mengatasi komplikasi kehamilan,

meningkatkan kesehatan ibu dan janin, mempersiapkan diri untuk menyusui, mencegah stunting pada anak, dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan edukasi nutrisi yang tepat dan berkelanjutan, ibu hamil KEK dapat memperoleh kehamilan yang sehat dan melahirkan bayi yang sehat dan cerdas.

c. Indikasi

Edukasi nutrisi pada ibu hamil KEK perlu dilakukan sedini mungkin, terutama jika terdapat indikasi-indikasi seperti riwayat KEK, tanda dan gejala KEK, hasil pemeriksaan kehamilan yang menunjukkan KEK, faktor risiko KEK, dan kebiasaan makan yang tidak sehat.

d. Prosedur Penatalaksanaan dan Rasional

<b>Prosedur Pemberian</b>	<b>Rasional</b>
<p><u>Fase Pra Interaksi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kontrak waktu</li> <li>2. Memeriksa kesiapan klien dan menciptakan suasana yang nyaman bagi klien</li> <li>3. Menyiapkan alat dan bahan</li> </ol> <p><u>Fase Orientasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi salam dan menyapa klien</li> <li>2. Memvalidasi keadaan klien</li> <li>3. Menjelaskan tujuan</li> <li>4. Menanyakan persetujuan dan kesiapan klien sebelum melakukan tindakan</li> </ol> <p><u>Fase Kerja</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Definisi literasi kesehatan melalui <i>Whatsaap Group</i></li> <li>2. Menjelaskan manfaat literasi kesehatan melalui <i>Whatsaap Group</i></li> <li>3. Menjelaskan cara meningkatkan literasi kesehatan melalui <i>Whatsaap Group</i></li> </ol>	<p><u>Fase Pra interaksi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk membangun hubungan saling percaya antara klien dan perawat</li> <li>2. Mengetahui kesiapan klien dan membuat klien nyaman</li> <li>3. Sebagai media untuk melakukan edukasi kesehatan</li> </ol> <p><u>Fase Orientasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai kalimat pembuka sebelum melakukan kegiatan</li> <li>2. Mengetahui keadaan klien sebelum memberikan edukasi</li> <li>3. Agar klien memahami tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan</li> <li>4. Memastikan persetujuan klien sebelum memulai kegiatan</li> </ol> <p><u>Fase Kerja</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah pengetahuan terkait Definisi literasi kesehatan Menambah pengetahuan terkait manfaat literasi kesehatan</li> </ol>

<p>4. Menjelaskan cara untuk mendapatkan informasi kesehatan melalui <i>Whatsaap Group</i></p> <p>5. Menjelaskan kebutuhan nutrisi ibu hamil sesuai usia kehamilan melalui <i>Whatsaap Group</i></p> <p>6. Memberikan kesempatan untuk bertanya bila ada sesuatu yang tidak dipahami melalui <i>Whatsaap Group</i></p> <p><u>Fase Terminasi</u></p> <p>1. Mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan</p> <p>2. Melakukan kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya</p> <p>3. Mengakhiri kegiatan, memberi salam kepada klien</p> <p>4. Dokumentasikan kegiatan</p>	<p>2. Menambah pengetahuan terkait cara meningkatkan literasi kesehatan</p> <p>3. Menambah pengetahuan terkait cara untuk mendapatkan informasi kesehatan</p> <p>4. Menambah pengetahuan terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil</p> <p>5. Agar klien tidak memiliki rasa penasaran terkait dengan informasi yang diberikan</p> <p><u>Fase Terminasi</u></p> <p>1. Mengetahui sejauh mana pemahaman klien setelah diberikan edukasi</p> <p>2. Sebagai persetujuan untuk pertemuan selanjutnya</p> <p>3. Sebagai kalimat penutup diakhir kegiatan</p> <p>4. Sebagai bukti bahwa kegiatan telah dilakukan.</p>
---	--

Tabel 2. 2 Prosedur Penatalaksanaan EBPN

e. Kriteria Evaluasi

Setelah diberikan intervensi peningkatan literasi kesehatan dan edukasi nutrisi diharapkan klien mampu memahami dan menerapkan secara mandiri dengan kriteria hasil:

- 1) Pengetahuan meningkat (5)
- 2) Status nutrisi membaik (5)

f. Artikel Utama dan Pendukung

Artikel	Penulis	Tahun	Judul	Sumber
Utama	Ummi Kulsum dan Dyah Ayu Wulandari	2022	Upaya Menurunkan Kejadian KEK pada Ibu Hamil Melalui Pendidikan Kesehatan	Jurnal Pengmas Kesehatan, Vol.01, No.1

Pendukung	Shalsabila Cindy Ramadhan ti, Satriani, Amiruddin, Dini Indo Virawati	2023	<i>Effectiveness of the Booklet on Knowledge and Attitudes Regarding Prevention of Chronic Energy Deficiency</i>	<i>Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)</i> , Vol. 2, No.10.
Pendukung	Nurul Fadhilah Gani, Huriati, Nurhidayah, Nur Risma	2022	<i>Telenursing Improving Health Literacy Among Pregnant Women</i>	Jurnal Life Birth
Pendukung	Nailatun Nadrah, Rika Handayani, Novica Jolyarni D.	2024	Edukasi Tentang Kurang Energi Kronik Dan Pemberian Makanan Isi Piringku pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Janji	Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.4, No.1.

Tabel 2. 3 Artikel Utama dan Pendukung

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan Studi Kasus

Studi kasus merupakan suatu teknik mempelajari seseorang atau individu secara mendalam untuk membantu memperoleh penyesuaian diri yang lebih baik. Studi kasus (case study) adalah suatu bagian dari metodologi penelitian yang dalam pembahasannya peneliti dituntut agar lebih cermat, mendalam, serta teliti untuk mengungkapkan suatu kasus ataupun peristiwa, baik itu bersifat perorangan atau berkelompok (Bahri, 2023)

Pada penulisan Karya Tugas Akhir ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah melakukan ‘Studi Kasus’ dimana dalam penyajiannya dilakukan secara mendalam untuk melihat suatu keadaan atau kondisi klien dengan cara menyeluruh dan tersistematis. Pengumpulan data diawali dengan *informed consent*, lalu memulai proses wawancara kepada klien dan keluarga, kemudian melakukan observasi, pemeriksaan fisik, serta pendokumentasian. Setelah data terkumpul kemudian melakukan analisis data dan memberikan intervensi berdasarkan EBPN (*Eviden Based Practice in Nursing*) yaitu edukasi literasi kesehatan dan Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil melalui *Telenursing Whatsapp Group*, dimana implementasi dilakukan selama 2 minggu. Terakhir dilakukan evaluasi berdasarkan EBPN sebelum dan sesudah pemberian intervensi pada ibu hamil.

#### B. Subjek Studi Kasus

Dalam studi kasus ini, subyek yang digunakan ialah bersifat individu atau klien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:



### 1. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Adapun kriteria inklusi pada studi kasus ini sebagai berikut:

- a. Ibu hamil yang bersedia menjadi subjek studi kasus
- b. Ibu hamil dengan ukuran LILA <23 cm.

### 2. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi merupakan kriteria dari subjek penelitian yang tidak boleh ada dan jika subjek mempunyai kriteria eksklusi maka subjek harus dikeluarkan dari penelitian. Adapun kriteria eksklusi pada studi kasus ini sebagai berikut:

- a. Klien yang tidak bersedia diberikan intervensi selama 2 minggu.

## C. Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus pada karya tugas akhir ini yaitu melakukan asuhan keperawatan pada klien yang mengalami Kekurangan Energi Kronik dengan menggunakan intervensi edukasi literasi kesehatan dan edukasi kebutuhan nutrisi ibu hamil melalui *Telenursing Via Whatsapp Group*.

## D. Instrument Studi Kasus

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh, mengukur dan menganalisis data dari subjek atau sampel yang berkaitan dengan objek atau masalah yang diteliti. Dalam studi kasus ini, instrument yang digunakan adalah lembar pengkajian asuhan keperawatan maternitas dan lembar observasi *pre* dan *post* untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kebutuhan nutrisi ibu hamil.

## **E. Pengambilan Data**

1. Tahap persiapan
  - a. Mahasiswa (i) mengajukan judul terkait studi kasus yang akan diteliti dan mengajukan intervensi berbasis *Evidence Based Practice in Nursing* (EBPN) kepada dosen yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing
  - b. Mahasiswa (i) melakukan koordinasi dengan Bidan Penanggungjawab Poli KIA Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk menjelaskan prosedur studi kasus yang akan dilakukan
  - c. Mahasiswa (i) menjelaskan kepada klien dan keluarga terkait tindakan yang akan dilakukan
  - d. Mahasiswa (i) menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam melakukan edukasi literasi kesehatan dan kebutuhan nutrisi ibu hamil
2. Pengumpulan data  
Pengumpulan data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara
3. Penyusunan laporan  
Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah.

## **F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus**

Studi kasus ini dilakukan di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa tepatnya di Poli KIA pada tanggal 4 - 9 Desember 2023.

## **G. Analisis Data dan Penyajian Data**

Analisis data adalah serangkaian kegiatan untuk meninjau, mengelompokkan, mensistematisasikan, menafsirkan, dan memvalidasi data sehingga suatu fenomena memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah. Analisis data disebut juga sebagai pengolahan data dan interpretasi data

Analisis data dilakukan sejak peneliti turun praktek kelapangan, mulai dari awal pengumpulan data hingga semua data terkumpul. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta melalui pengkajian keperawatan, membandingkan dengan teori yang ada dan dituangkan melalui opini pembahasan. Teknik yang digunakan yaitu dengan menarasikan jawaban yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian akan diinterpretasikan oleh peneliti untuk memberikan intervensi terkait masalah yang ditemukan. Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data dimana data yang disajikan dalam bentuk uraian naratif serta sintesis kemudian dikemukakan dalam memberikan interpretasi hasil.

#### **H. Etika Studi Kasus**

Dalam melakukan studi kasus, seorang peneliti harus berpedoman pada Kode Etik yang merupakan pedoman etik yang berlaku dalam setiap kegiatan studi kasus yang melibatkan peneliti, pihak-pihak yang diteliti, dan masyarakat yang akan menerima dampak dari hasil studi kasus. Masalah etika pada penelitian yang menggunakan subjek manusia menjadi isu sentral yang berkembang pada saat ini. Prinsip-prinsip etika dalam melakukan studi kasus ini digunakan untuk melindungi subyek atau klien dari berbagai kekhawatiran dan implikasi yang muncul selama kegiatan studi kasus. peneliti menyoroti bahwa ada beberapa etik yang perlu difokuskan yaitu:

1. **Beneficience (Manfaat) dan Non Maleficience (Tidak Merugikan)**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya dan pihak yang disurvei pada khususnya. Manfaat yang diharapkan dari studi kasus ini antara lain hasil studi kasus dapat menambah pengetahuan tentang literasi kesehatan dan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dan menjadi masukan serta sumber informasi bagi

pihak puskesmas khususnya di bidang keperawatan dan pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan. Dalam studi kasus ini, peneliti memiliki kewajiban untuk tidak membahayakan subyek penelitian.

2. *Anomity* (Tanpa Nama) dan *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Anomity adalah ukuran kerahasiaan, peneliti tidak akan memberikan nama subyek, sehingga subyek hanya akan dituliskan inisialnya pada laporan studi kasus ini. Peneliti tidak memberikan informasi mengenai identitas dan kerahasiaan subyek. Dengan kata lain, informasi yang diperoleh peneliti tidak akan dibagikan kepada orang lain dan hanya akan digunakan untuk kepentingan karya tugas akhir. Seperti dalam penelitian ini, hanya beberapa huruf pertama dari nama yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan subyek penelitian. Dalam studi kasus ini, peneliti harus menghormati hak-hak subyek atau klien tersebut.

3. *Justice* (Adil)

Prinsip keadilan yang ditekankan dalam studi kasus ini adalah peneliti menjamin perlakuan dan manfaat yang sama bagi semua elemen atau subjek penelitian. Dalam hal ini juga peneliti tidak akan melakukan diskriminasi terhadap subjek baik dari segi gender, agama, etnis, dan sebagainya.

## BAB IV

### LAPORAN KASUS

#### A. Pengkajian Prenatal

Nama Mahasiswa : Rabiyyatul Awaliyah  
NIM : 70900123013  
Tanggal Pengkajian : 7 Desember 2023  
Ruangan : Poli KIA Puskesmas Bontomarannu

##### 1. Data Umum Klien

Data	Klien 1	Klien 2	Klien 3
Inisial Klien	Ny.A	Ny.H	Ny.U
Usia	18 tahun	25 tahun	21 tahun
Status Perkawinan	Menikah	Menikah	Menikah
Pekerjaan	IRT	IRT	IRT
Pendidikan	SMP	SMA	SMP

Tabel 4. 1 Data Umum

##### Riwayat Kehamilan Dan Persalinan Yang Lalu

###### Klien 1

Tahun	Jenis Persalinan	Penolong	JK	BB Lahir	Keadaan Bayi Lahir	Masalah Kehamilan
-	-	-	-	-	-	-

Tabel 4. 2 Riwayat Kehamilan dan Persalinan Yang Lalu Klien 1

Pengalaman menyusui : ya/tidak. Klien mengatakan belum pernah menyusui

Berapa lama : -

###### Klien 2

Tahun	Jenis Persalinan	Penolong	JK	BB Lahir	Keadaan Bayi Lahir	Masalah Kehamilan
2018	Normal	Bidan	Laki-laki	3000 gr	Sehat, bayi menangis ketika lahir	-
2020	Sectio Caeserea	Dokter	Perempuan	2300 gr	BBLR, bayi tidak	KEK

					menangis saat lahir	
--	--	--	--	--	---------------------	--

Tabel 4. 3 Riwayat Kehamilan dan Persalinan Yang Lalu Klien 2

Pengalaman menyusui : ya/tidak. Klien mengatakan pernah menyusui selama 1 tahun

Berapa lama : Sejak bayi pertama lahir tahun 2018

**Klien 3**

Tahun	Jenis Persalinan	Penolong	JK	BB Lahir	Keadaan Bayi Lahir	Masalah Kehamilan
2018	Sectio Caeserea	Dokter	Perempuan	2700 gr	Sehat, bayi menangis ketika lahir	-
2021	Sectio Caeserea	Dokter	Laki-Laki	2300 gr	BBLR, bayi tidak menangis ketika lahir	KEK

Tabel 4. 4 Riwayat Kehamilan dan Persalinan Yang Lalu Klien 3

Pengalaman menyusui : ya/tidak. Klien mengatakan pernah menyusui

Berapa lama : Sejak bayi pertama lahir tahun 2018, pada anak kedua ibu tidak menyusui karena produksi ASI kurang

**Riwayat Ginekologi**

Data	Klien 1	Klien 2	Klien 3
Masalah ginekologi	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah
Riwayat KB	Klien mengatakan belum pernah KB	Klien mengatakan pernah KB, dengan menggunakan pil	Klien mengatakan pernah KB, dengan menggunakan pil

Tabel 4. 5 Riwayat Ginekologi

**Riwayat Kehamilan Saat Ini:**

Data	Klien 1	Klien 2	Klien 3
HPHT	23-07-2023	5-09-2023	15-10-2023
Taksiran Partus	30-04-2024	12-06-2024	22-07-2024
BB/TB sebelum hamil	45 kg/154 cm	47 kg/154 cm	45 kg/153 cm
BB/TB saat hamil	48 kg/154 cm	48 kg/154 cm	46 kg/153 cm

LILA	19 cm	20 cm	20,5 cm
TFU	21 cm	-	-
DJJ	120 x/i	140 x/i	150 x/i
Usia gestasi	22 minggu	15 minggu	10 minggu

Tabel 4. 6 Riwayat Kehamilan Saat Ini

## 2. Data Umum Kesehatan Saat Ini

Data	Klien 1	Klien 2	Klien 3
Status obstetric	G1 P0 A0	G3 P2 A0	G3 P2 A0
Keluhan utama	Nyeri perut bagian bawah	Mual dan muntah	Mual dan muntah
Riwayat keluhan utama	Klien mengatakan nyeri perut bagian bawah dirasakan sejak 4 hari yang lalu, klien mengatakan sering BAK di malam hari	Klien mengatakan mual muntah dirasakan sejak 1 minggu yang lalu, klien mengatakan malas makan dan mudah lelah, klien mengatakan sering BAK di malam hari	Klien mengatakan mual muntah dirasakan sejak 3 hari yang lalu, klien mengatakan malas makan dan mudah lelah, klien mengatakan sering BAK di malam hari
Keadaan umum	Composmentis BB: 48 kg TB : 154 cm	Composmentis BB : 48 kg TB : 154 cm	Composmentis BB : 46 kg TB : 153 cm
Vital sign	TD : 110/80 mmHg N : 90 x/i RR : 21 x/i S : 36,8°C	TD : 110/70 mmHg N : 87 x/i RR : 19 x/i S : 36,6°C	TD : 100/80 mmHg N : 89 x/i RR : 19 x/i S : 36,5°C
<b>Pemeriksaan Fisik</b>			
Kepala	Bentuk kepala bulat dan simetris, tidak ada luka, tidak ada edema, keadaan kulit kepala bersih, rambut lurus dan tidak rontok	Bentuk kepala bulat dan simetris, tidak ada luka, tidak ada edema, keadaan kulit kepala bersih, rambut lurus dan tidak rontok	Bentuk kepala bulat dan simetris, tidak ada luka, tidak ada edema, keadaan kulit kepala bersih, rambut lurus dan tidak rontok
Mata	<u>Inspeksi:</u> mata tampak bersih, simetris, pupil isokor, sclera berwarna putih,	<u>Inspeksi:</u> mata tampak bersih, simetris, pupil isokor, sclera	<u>Inspeksi:</u> mata tampak bersih, simetris, pupil isokor, sclera

	konjungtiva pink, tampak ada kantong mata, mata cekung	berwarna putih, konjungtiva pink	berwarna putih, konjungtiva pink
Telinga	<u>Inspeksi:</u> simetris kiri dan kanan, tidak terdapat serumen/sekret, fungsi pendengaran baik <u>Palpasi:</u> tidak ada nyeri tekan	<u>Inspeksi:</u> simetris kiri dan kanan, tidak terdapat serumen/sekret, fungsi pendengaran baik <u>Palpasi:</u> tidak ada nyeri tekan	<u>Inspeksi:</u> simetris kiri dan kanan, tidak terdapat serumen/sekret, fungsi pendengaran baik <u>Palpasi:</u> tidak ada nyeri tekan
Hidung	<u>Inspeksi:</u> bentuk hidung normal, fungsi penciuman bagus, hidung tampak bersih, dan tidak ada secret, tidak ada pernapasan cuping hidung. <u>Palpasi:</u> Tidak ada nyeri tekan, tidak ada edema	<u>Inspeksi:</u> bentuk hidung normal, fungsi penciuman bagus, hidung tampak bersih, dan tidak ada secret, tidak ada pernapasan cuping hidung. <u>Palpasi:</u> Tidak ada nyeri tekan, tidak ada edema	<u>Inspeksi:</u> bentuk hidung normal, fungsi penciuman bagus, hidung tampak bersih, dan tidak ada secret, tidak ada pernapasan cuping hidung. <u>Palpasi:</u> Tidak ada nyeri tekan, tidak ada edema
Mulut	<u>Inspeksi:</u> mulut bersih, tidak ada gigi palsu, gigi rapat berwarna putih, mukosa bibir kering	<u>Inspeksi:</u> mulut bersih, tidak ada gigi palsu, gigi rapat berwarna putih, mukosa bibir kering	<u>Inspeksi:</u> mulut bersih, tidak ada gigi palsu, gigi rapat berwarna putih, mukosa bibir kering
Leher	<u>Inspeksi:</u> tidak ada pembesaran kelenjar tiroid <u>Palpasi:</u> tidak ada nyeri tekan	<u>Inspeksi:</u> tidak ada pembesaran kelenjar tiroid <u>Palpasi:</u> tidak ada nyeri tekan	<u>Inspeksi:</u> tidak ada pembesaran kelenjar tiroid <u>Palpasi:</u> tidak ada nyeri tekan
Paru-Paru	<u>Inspeksi:</u> normal chest, pengembangan dada simetris, tidak ada retraksi otot dada, tidak ada tanda jejas <u>Palpasi:</u> tidak ada nyeri tekan <u>Perkusi:</u> sonor	<u>Inspeksi:</u> normal chest, pengembangan dada simetris, tidak ada retraksi otot dada, tidak ada tanda jejas <u>Palpasi:</u> tidak ada nyeri tekan <u>Perkusi:</u> sonor	<u>Inspeksi:</u> normal chest, pengembangan dada simetris, tidak ada retraksi otot dada, tidak ada tanda jejas <u>Palpasi:</u> tidak ada nyeri tekan <u>Perkusi:</u> sonor



	<u>Auskultasi:</u> bunyi napas vesikuler, tidak ada bunyi napas tambahan	<u>Auskultasi:</u> bunyi napas vesikuler, tidak ada bunyi napas tambahan	<u>Auskultasi:</u> bunyi napas vesikuler, tidak ada bunyi napas tambahan
Jantung	<u>Inspeksi:</u> tidak tampak iktus kordis, tidak ada pembesaran <u>Palpasi:</u> tidak ada nyeri tekan, tidak ada palpitasi <u>Perkusi:</u> Pekak jantung <u>Auskultasi:</u> BJ I/II murni regular, lup-dup, murmur tidak terdengar	<u>Inspeksi:</u> tidak tampak iktus kordis, tidak ada pembesaran <u>Palpasi:</u> tidak ada nyeri tekan, tidak ada palpitasi <u>Perkusi:</u> Pekak jantung <u>Auskultasi:</u> BJ I/II murni regular, lup-dup, murmur tidak terdengar	<u>Inspeksi:</u> tidak tampak iktus kordis, tidak ada pembesaran <u>Palpasi:</u> tidak ada nyeri tekan, tidak ada palpitasi <u>Perkusi:</u> Pekak jantung <u>Auskultasi:</u> BJ I/II murni regular, lup-dup, murmur tidak terdengar
Payudara	<u>Inspeksi:</u> tampak besar dan simetris, puting susu berwarna gelap dan menonjol keluar	<u>Inspeksi:</u> tampak besar dan simetris, puting susu berwarna gelap dan menonjol keluar	<u>Inspeksi:</u> tampak besar dan simetris, puting susu berwarna gelap dan menonjol keluar
Abdomen	Lingkar perut 87 cm	Lingkar perut 70 cm	Lingkar perut 72 cm
Perineum dan Genital	Klien mengatakan mandi dan mengganti pakaian dalam 2x sehari yaitu pagi dan sore, tidak ada varises, tidak ada keputihan, tidak ada hemorhoid	Klien mengatakan mandi dan mengganti pakaian dalam 2x sehari yaitu pagi dan sore, tidak ada varises, tidak ada keputihan, tidak ada hemorhoid	Klien mengatakan mandi dan mengganti pakaian dalam 2x sehari yaitu pagi dan sore, tidak ada varises, tidak ada keputihan, tidak ada hemorhoid
Ekstremitas	<u>Atas:</u> tidak ada edema dan varises <u>Bawah:</u> tidak ada edema dan varises	<u>Atas:</u> tidak ada edema dan varises <u>Bawah:</u> tidak ada edema dan varises	<u>Atas:</u> tidak ada edema dan varises <u>Bawah:</u> tidak ada edema dan varises
Eliminasi	<u>Urine:</u> klien mengatakan kebiasaan BAK ± 10-11 x/hari, warna urine kekuning-	<u>Urine:</u> klien mengatakan kebiasaan BAK ± 10-11 x/hari, warna urine kekuning-	<u>Urine:</u> klien mengatakan kebiasaan BAK ± 10-11 x/hari, warna urine kekuning-

Tabel 4. 7 Data Umum Kesehatan Saat Ini

	kuningan dan tidak ada darah Fekal: klien mengatakan BAB lancer 1x/hari dengan konsistensi lunak	kuningan dan tidak ada darah Fekal: klien mengatakan BAB lancer 1x/hari dengan konsistensi lunak	kuningan dan tidak ada darah Fekal: klien mengatakan BAB lancer 1x/hari dengan konsistensi lunak
Mobilitas dan Latihan	Klien mampu berjalan sendiri, kekuatan otot:  $\begin{array}{c c} 5 & 5 \\ \hline 5 & 5 \end{array}$ Klien mengatakan tidak pernah melakukan senam ibu hamil	Klien mampu berjalan sendiri, kekuatan otot:  $\begin{array}{c c} 5 & 5 \\ \hline 5 & 5 \end{array}$ Klien mengatakan kadang-kadang mengikuti senam hamil 2x sebulan	Klien mampu berjalan sendiri, kekuatan otot:  $\begin{array}{c c} 5 & 5 \\ \hline 5 & 5 \end{array}$ Klien mengatakan tidak pernah melakukan senam ibu hamil
Nutrisi dan Cairan	Klien mengatakan malas makan, klien tidak suka makan sayur, klien minum $\pm$ 8-10 gelas/hari	Klien mengatakan makan 3x/hari tapi hanya 5-6 sendok, klien mengatakan suka makan bakso, klien mengatakan jarang makan buah, klien minum $\pm$ 8 gelas/hari	Klien mengatakan hanya makan di siang hari, klien tidak suka makan sayur, klien mengatakan tidak suka makan ikan, klien makan buah sesekali, klien minum $\pm$ 8-10 gelas/hari
Keadaan Mental	Klien mengatakan sangat bahagia dengan kehamilannya, klien mengatakan cemas dengan kehamilan pertamanya	Klien mengatakan sangat bahagia dan bersyukur dengan kehamilannya	Klien mengatakan sangat bahagia dan bersyukur dengan kehamilannya
<b>Pola Hidup Selama Kehamilan</b>			
Pemeriksaan Kehamilan	Klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan	Klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan	Klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan

Senam hamil	Tidak pernah melakukan senam hamil	Tidak pernah melakukan senam hamil	Tidak pernah melakukan senam hamil
Pengetahuan kesehatan tentang kehamilan	Klien tidak mengetahui literasi kesehatan bagi ibu hamil	Klien tidak mengetahui literasi kesehatan bagi ibu hamil	Klien tidak mengetahui literasi kesehatan bagi ibu hamil
Cara memperoleh informasi	Klien mengatakan informasi kehamilan hanya didapatkan dari keluarga	Klien mengatakan informasi kehamilan didengar dari orang-orang sekitar	Klien mengatakan informasi kehamilan didapatkan dari internet dan puskesmas
<b>Pola Hidup Yang Meningkatkan Risiko Kehamilan</b>			
Rencana tempat melahirkan	Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas
Kesiapan mental ibu dan keluarga	Klien mengatakan cemas dengan kehamilan pertamanya	Klien mengatakan takut kalau bayinya BBLR ketika lahir	Klien mengatakan takut kalau bayinya BBLR ketika lahir
Pengetahuam tentang tanda-tanda melahirkan, cara menangani nyeri, proses persalinan	Klien mengatakan tanda-tanda melahirkan adalah pecah ketuban	Klien mengatakan tanda-tanda melahirkan adalah pecah ketuban	Klien mengatakan tanda-tanda melahirkan adalah pecah ketuban
Perawatan payudara	Tidak pernah diajarkan perawatan payudara	Tidak pernah melakukan perawatan payudara	Klien mengatakan pernah diajar tapi lupa cara melakukan perawatan payudara

### KLASIFIKASI DATA

	Data Subjektif	Data Objektif
<b>Klien 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan nyeri perut bagian bawah dirasakan sejak 4 hari yang lalu</li> <li>- Klien mengatakan sering sulit tidur karena sering BAK dimalam hari</li> <li>- Klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan</li> <li>- Tidak pernah melakukan senam hamil</li> <li>- Klien tidak mengetahui literacy kesehatan bagi ibu hamil</li> <li>- Klien mengatakan informasi kehamilan hanya didapatkan dari keluarga</li> <li>- Klien mengatakan cemas dengan kehamilan pertamanya</li> <li>- Tidak pernah diajarkan perawatan payudara</li> <li>- Klien mengatakan malas makan, klien tidak suka makan sayur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G1 P0 A0</li> <li>- Usia gestasi 22 minggu</li> <li>- BB/TB sebelum hamil 45 kg/154 cm</li> <li>- BB/TB saat hamil 48 kg/154 cm</li> <li>- LILA 19 cm</li> <li>- Lingkar perut 87 cm</li> <li>- Klien tampak belum mengetahui pemilihan nutrisi selama kehamilan</li> </ul>
<b>Klien 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan mual muntah dirasakan sejak 1 minggu yang lalu</li> <li>- Klien mengatakan malas makan dan mudah lelah</li> <li>- klien mengatakan sering BAK dimalam hari</li> <li>- Klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan</li> <li>- Tidak pernah melakukan senam hamil</li> <li>- Klien tidak mengetahui literacy kesehatan bagi ibu hamil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G3 P2 A0</li> <li>- Usia gestasi 15 minggu</li> <li>- BB/TB sebelum hamil 47 kg/154 cm</li> <li>- BB/TB saat hamil 48 kg/154 cm</li> <li>- LILA 20 cm</li> <li>- Lingkar perut 70 cm</li> <li>- Riwayat persalinan BBLR</li> <li>- Riwayat KEK pada kehamilan sebelumnya</li> <li>- Klien tampak belum mengetahui pemilihan nutrisi selama kehamilan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan informasi kehamilan didengar dari orang-orang sekitar</li> <li>- Klien mengatakan takut kalau bayinya BBLR ketika lahir</li> <li>- Tidak pernah melakukan perawatan payudara</li> <li>- Klien mengatakan makan 3x/hari tapi hanya 5-6 sendok, klien mengatakan suka makan bakso, klien mengatakan jarang makan buah</li> </ul>	
<b>Klien 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan mual muntah dirasakan sejak 3 hari yang lalu</li> <li>- Klien mengatakan malas makan dan mudah lelah</li> <li>- klien mengatakan sering BAK dimalam hari</li> <li>- Klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan</li> <li>- Tidak pernah melakukan senam hamil</li> <li>- Klien tidak mengetahui literacy kesehatan bagi ibu hamil</li> <li>- Klien mengatakan informasi kehamilan hanya didapatkan dari internet</li> <li>- Klien mengatakan takut kalau bayinya BBLR ketika lahir</li> <li>- Klien mengatakan pernah diajar tapi lupa cara melakukan perawatan payudara</li> <li>- Klien mengatakan hanya makan di siang hari, klien tidak suka makan sayur, klien mengatakan tidak suka makan ikan, klien makan buah sesekali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G3 P2 A0</li> <li>- Usia gestasi 10 minggu</li> <li>- BB/TB sebelum hamil 45 kg/153 cm</li> <li>- BB/TB saat hamil 46 kg/153 cm</li> <li>- LILA 20,5 cm</li> <li>- Lingkar perut 72 cm</li> <li>- Riwayat persalinan BBLR</li> <li>- Riwayat KEK pada kehamilan sebelumnya</li> <li>- Klien tampak belum mengetahui pemilihan nutrisi selama kehamilan</li> </ul>

Tabel 4. 8 Klasifikasi Data

## ANALISA DATA

### Analisa data Klien 1

Data	Etiologi	Masalah
<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan nyeri perut bagian bawah dirasakan sejak 4 hari yang lalu</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia gestasi 22 minggu</li> </ul>	<p>Kehamilan</p> <p>↓</p> <p>Perubahan fisiologis</p> <p>↓</p> <p>Pembesaran uterus</p> <p>↓</p> <p>Perubahan skeletal &amp; persendian</p> <p>↓</p> <p>Berat uterus meningkat</p> <p>↓</p> <p>Perubahan pusat gravitasi</p> <p>↓</p> <p>Penekanan pada daerah simpisis</p> <p>↓</p> <p>Gangguan rasa nyaman</p>	<p><b>Gangguan Rasa Nyaman</b></p>
<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan</li> <li>- Tidak pernah melakukan senam hamil</li> <li>- Klien tidak mengetahui literasi kesehatan bagi ibu hamil</li> <li>- Klien mengatakan informasi kehamilan hanya didapatkan dari keluarga</li> <li>- Tidak pernah diajarkan perawatan payudara</li> </ul>	<p>Kehamilan</p> <p>↓</p> <p>Faktor sosial dan budaya</p> <p>↓</p> <p>Sumber informasi hanya dari keluarga</p> <p>↓</p> <p>Keengganan untuk mencari informasi</p> <p>↓</p> <p>Kurang akses informasi</p> <p>↓</p> <p>Defisit pengetahuan</p>	<p><b>Defisit Pengetahuan</b></p>

<b>DO: -</b>		
<b>DS:</b> - Klien mengatakan cemas dengan kehamilan pertamanya <b>DO: -</b>	Kehamilan ↓ Adaptasi kehamilan ↓ Perubahan hormon serotonin ↓ Cemas dengan kondisi saat ini	<b>Ansietas</b>
<b>DS:</b> - Klien mengatakan malas makan, klien jarang makan makan sayur <b>DO:</b> - Faktor psikologis (keengganan untuk makan) - BB/TB saat hamil 48 kg/154 cm - LILA 19 cm - Lingkar perut 87 cm - Klien tampak belum mengetahui pemilihan nutrisi selama kehamilan	Kehamilan ↓ Adaptasi kehamilan ↓ Perubahan psikologis ↓ Keengganan untuk makan ↓ Ukuran LILA abnormal ↓ Kekurangan energi kronis	<b>Defisit Nutrisi</b>
<b>DS:</b> - Klien mengatakan sering sulit tidur karena sering BAK dimalam hari <b>DO:</b> - Tampak ada kantong mata - Mata cekung	Kehamilan ↓ Adaptasi kehamilan ↓ Peningkatan hormon hCG ↓ Produksi urine meningkat ↓ Frekuensi BAK meningkat ↓ Terbangun pada malam hari ↓ Perubahan pola tidur	<b>Gangguan Pola Tidur</b>

Tabel 4. 9 Analisa Data Klien 1

## Analisa data Klien 2

Data	Etiologi	Masalah
<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan</li> <li>- Tidak pernah melakukan senam hamil</li> <li>- Klien tidak mengetahui literacy kesehatan bagi ibu hamil</li> <li>- Klien mengatakan informasi kehamilan didengar dari orang-orang sekitar</li> <li>- Tidak pernah melakukan perawatan payudara</li> <li>- Klien mengatakan makan 3x/hari tapi hanya 5-6 sendok, klien mengatakan suka makan bakso, klien mengatakan jarang makan buah</li> <li>- Klien mengatakan makan 3x/hari tapi hanya 5-6 sendok, klien mengatakan suka makan bakso, klien mengatakan jarang makan buah</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- G3 P2 A0</li> <li>- Usia gestasi 15 minggu</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Kehamilaan ↓ Faktor sosial dan budaya ↓ Sumber informasi hanya dari keluarga ↓ Keengganan untuk mencari informasi ↓ Kurang akses informasi ↓ Defisit pengetahuan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Defisit Pengetahuan</b></p>
<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan mual muntah</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Kehamilan ↓ Adaptasi kehamilan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Nausea</b></p>



<p>dirasakan sejak 1 minggu yang lalu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klien mengatakan malas makan dan mudah lelah</li> </ul> <p><b>DO: -</b></p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Perubahan hormone estrogen dan progesteron</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Muncul rasa mual dan muntah</p>	
<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan takut kalau bayinya BBLR ketika lahir</li> </ul> <p><b>DO: -</b></p>	<p style="text-align: center;">Kehamilan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Adaptasi kehamilan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Perubahan hormon serotonin</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Cemas dengan kondisi saat ini</p>	<p><b>Ansietas</b></p>
<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan mual muntah dirasakan sejak 1 minggu yang lalu</li> <li>- Klien mengatakan malas makan dan mudah lelah</li> <li>- Klien mengatakan makan 3x/hari tapi hanya 5-6 sendok, klien mengatakan suka makan bakso, klien mengatakan jarang makan buah</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor psikologis (keengganan untuk makan)</li> <li>- BB/TB sebelum hamil 47 kg/154 cm</li> <li>- BB/TB saat hamil 48 kg/154 cm</li> <li>- LILA 20 cm</li> <li>- Lingkar perut 70 cm</li> <li>- Riwayat persalinan BBLR</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Kehamilan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Adaptasi kehamilan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Perubahan psikologis</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Keengganan untuk makan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ukuran LILA abnormal</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kekurangan energi kronis</p>	<p><b>Defisit Nutrisi</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riwayat KEK pada kehamilan sebelumnya</li> <li>- Klien tampak belum mengetahui pemiliha nutrisi selama kehamilan</li> </ul>		
--	--	--

Tabel 4. 10 Analisa Data Klien 2

### Analisa data Klien 3

Data	Etiologi	Masalah
<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan</li> <li>- Tidak pernah melakukan senam hamil</li> <li>- Klien tidak mengetahui literacy kesehatan bagi ibu hamil</li> <li>- Klien mengatakan informasi kehamilan hanya didapatkan dari internet</li> <li>- Klien mengatakan pernah diajar tapi lupa cara melakukan perawatan payudara</li> <li>- Klien mengatakan hanya makan di siang hari, klien tidak suka makan sayur, klien mengatakan tidak suka makan ikan, klien makan buah sesekali</li> </ul> <p><b>DO:</b></p>	<p style="text-align: center;">           Kehamilan            ↓            Faktor sosial dan budaya            ↓            Sumber informasi hanya dari keluarga            ↓            Keengganan untuk mencari informasi            ↓            Kurang akses informasi            ↓            Defisit pengetahuan         </p>	<p><b>Defisit Pengetahuan</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- G3 P2 A0</li> <li>- Usia gestasi 10 minggu</li> </ul>		
<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan mual muntah dirasakan sejak 3 hari yang lalu</li> <li>- klien mengatakan malas makan dan mudah lelah</li> <li>- DO: -</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Kehamilan ↓ Adaptasi kehamilan ↓ Perubahan hormone estrogen dan progesteron ↓ Muncul rasa mual dan muntah</p>	<b>Nausea</b>
<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan takut kalau bayinya BBLR ketika lahir</li> <li>- DO: -</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Kehamilan ↓ Adaptasi kehamilan ↓ Perubahan hormon serotonin ↓ Cemas dengan kondisi saat ini</p>	<b>Ansietas</b>
<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan mual muntah dirasakan sejak 3 hari yang lalu</li> <li>- Klien mengatakan malas makan dan mudah lelah</li> <li>- Klien mengatakan hanya makan di siang hari, klien tidak suka makan sayur, klien mengatakan tidak suka makan ikan, klien makan buah sesekali</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor psikologis (keengganan untuk makan)</li> <li>- BB/TB sebelum hamil 45 kg/153 cm</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Kehamilan ↓ Adaptasi kehamilan ↓ Perubahan psikologis ↓ Keengganan untuk makan ↓ Ukuran LILA abnormal ↓ Kekurangan energi kronis</p>	<b>Defisit Nutrisi</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- BB/TB saat hamil 46 kg/153 cm</li> <li>- LILA 20,5 cm</li> <li>- Lingkar perut 72 cm</li> <li>- Riwayat persalinan BBLR</li> <li>- Riwayat KEK pada kehamilan sebelumnya</li> <li>- Klien tampak belum mengetahui pemiliha nutrisi selama kehamilan</li> </ul>		
---	--	--

Tabel 4. 11 Analisa Data Klien 3

## B. Diagnosis Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan
<b>Klien 1</b>	
1	<p>Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan</li> <li>- Tidak pernah melakukan senam hamil</li> <li>- Klien tidak mengetahui literacy kesehatan bagi ibu hamil</li> <li>- Klien mengatakan informasi kehamilan hanya didapatkan dari keluarga</li> <li>- Tidak pernah diajarkan perawatan payudara</li> <li>- Klien mengatakan malas makan, klien tidak suka makan sayur</li> </ul> <p><b>DO: -</b></p>
2	<p>Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan malas makan, klien jarang makan makan sayur</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor psikologis (keengganan untuk makan)</li> <li>- BB/TB saat hamil 48 kg/154 cm</li> <li>- LILA 19 cm</li> <li>- Lingkar perut 87 cm</li> <li>- Klien tampak belum mengetahui pemilihan nutrisi selama kehamilan</li> </ul>
3	<p>Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan nyeri perut bagian bawah dirasakan sejak 4 hari yang lalu</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia gestasi 22 minggu</li> </ul>
4	<p>Ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan cemas dengan kehamilan pertamanya</li> </ul> <p><b>DO: -</b></p>
5	<p>Gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan sering sulit tidur karena sering BAK di malam hari</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampak ada kantong mata</li> <li>- Mata cekung</li> </ul>
<b>Klien 2</b>	
1	<p>Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan</li> <li>- Tidak pernah melakukan senam hamil</li> <li>- Klien tidak mengetahui literacy kesehatan bagi ibu hamil</li> <li>- Klien mengatakan informasi kehamilan didengar dari orang-orang sekitar</li> <li>- Tidak pernah melakukan perawatan payudara</li> <li>- Klien mengatakan makan 3x/hari tapi hanya 5-6 sendok, klien mengatakan suka makan bakso, klien mengatakan jarang makan buah</li> <li>- Klien mengatakan makan 3x/hari tapi hanya 5-6 sendok, klien mengatakan suka makan bakso, klien mengatakan jarang makan buah</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- G3 P2 A0</li> <li>- Usia gestasi 15 minggu</li> </ul>
2	<p>Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan mual muntah dirasakan sejak 1 minggu yang lalu</li> <li>- Klien mengatakan malas makan dan mudah lelah</li> <li>- Klien mengatakan makan 3x/hari tapi hanya 5-6 sendok, klien mengatakan suka makan bakso, klien mengatakan jarang makan buah</li> </ul>

	<p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor psikologis (keengganan untuk makan)</li> <li>- BB/TB sebelum hamil 47 kg/154 cm</li> <li>- BB/TB saat hamil 48 kg/154 cm</li> <li>- LILA 20 cm</li> <li>- Lingkar perut 70 cm</li> <li>- Riwayat persalinan BBLR</li> <li>- Riwayat KEK pada kehamilan sebelumnya</li> <li>- Klien tampak belum mengetahui pemiliha nutrisi selama kehamilan</li> </ul>
3	<p>Nausea berhubungan dengan kehamilan dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan mual muntah dirasakan sejak 1 minggu yang lalu</li> <li>- klien mengatakan malas makan dan mudah lelah</li> </ul> <p><b>DO: -</b></p>
4	<p>Ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan takut kalau bayinya BBLR ketika lahir</li> </ul> <p><b>DO: -</b></p>
<b>Klien 3</b>	
1	<p>Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan</li> <li>- Tidak pernah melakukan senam hamil</li> <li>- Klien tidak mengetahui literacy kesehatan bagi ibu hamil</li> <li>- Klien mengatakan informasi kehamilan hanya didapatkan dari internet</li> <li>- Klien mengatakan pernah diajar tapi lupa cara melakukan perawatan payudara</li> <li>- Klien mengatakan hanya makan di siang hari, klien tidak suka makan sayur, klien mengatakan tidak suka makan ikan, klien makan buah sesekali</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- G3 P2 A0</li> <li>- Usia gestasi 10 minggu</li> </ul>
2	<p>Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan mual muntah dirasakan sejak 3 hari yang lalu</li> <li>- Klien mengatakan malas makan dan mudah lelah</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan hanya makan di siang hari, klien tidak suka makan sayur, klien mengatakan tidak suka makan ikan, klien makan buah sesekali</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor psikologis (keengganan untuk makan)</li> <li>- BB/TB sebelum hamil 45 kg/153 cm</li> <li>- BB/TB saat hamil 46 kg/153 cm</li> <li>- LILA 20,5 cm</li> <li>- Lingkar perut 72 cm</li> <li>- Riwayat persalinan BBLR</li> <li>- Riwayat KEK pada kehamilan sebelumnya</li> <li>- Klien tampak belum mengetahui pemiliha nutrisi selama kehamilan</li> </ul>
3	<p>Nausea berhubungan dengan kehamilan dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan mual muntah dirasakan sejak 3 hari yang lalu</li> <li>- Klien mengatakan malas makan dan mudah lelah</li> </ul> <p><b>DO: -</b></p>
4	<p>Ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan dibuktikan dengan:</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan takut kalau bayinya BBLR ketika lahir</li> </ul> <p><b>DO:-</b></p>

Tabel 4. 12 Diagnosis Keperawatan

### C. Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Rencana Tindakan Keperawatan		
		Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
1	Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka tingkat pengetahuan membaik dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perilaku sesuai anjuran meningkat (5)</li> <li>- Perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat (5).</li> </ul>	<p><i>Edukasi Kesehatan (I.12383)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</li> <li>2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat</li> </ol> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan menggunakan poster dan <i>Whatsapp group</i></li> <li>2. Berikan kesempatan untuk bertanya</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan</li> <li>2. Ajarkan perilaku hidup sehat</li> </ol>	<p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui kesiapan klien menerima informasi yang akan disampaikan</li> <li>2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hidup sehat</li> </ol> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai persiapan sebelum melakukan pendidikan kesehatan</li> <li>2. Mengetahui feedback klien terhadap materi yang disampaikan</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar klien mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan</li> <li>2. Membiasakan klien untuk hidup sehat</li> <li>3. Membantu klien untuk mempertahankan perilaku hidup sehat.</li> </ol>



			3. Ajarkan strategi yang dapat meningkatkan perilaku hidup sehat.	
2	Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka status kenyamanan meningkat dengan kriteria hasil: - Keluhan nyeri menurun (5).	<p><i>Terapi Relaksasi (I.09326)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan</li> <li>2. Periksa tekanan darah, frekuensi nadi, dan suhu sebelum dan sesudah latihan</li> <li>3. Monitor respon terhadap terapi relaksasi</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat</li> <li>2. Gunakan relaksasi napas dalam dan dzikir sebagai strategi penunjang</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan tujuan, manfaat teknik relaksasi napas dalam dan dzikir</li> <li>2. Anjurkan mengambil posisi nyaman</li> <li>3. Anjurkan rileks dan merasakan sensasi rileks</li> </ol>	<p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui apakah klien pernah menggunakan teknik relaksasi sebelumnya atau tidak</li> <li>2. Mengetahui vital sign sebelum dan sesudah pemberian intervensi</li> <li>3. Mengetahui respon klien terhadap terapi relaksasi yang diberikan</li> </ol> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar memberikan perasaan tenang saat melakukan terapi</li> <li>2. Sebagai terapi relaksasi untuk meningkatkan status kenyamanan</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan terapi relaksasi yang mudah dipahami dan dilakukan oleh klien</li> <li>2. Memberikan rasa nyaman saat diberikan intervensi</li> </ol>

			<p>4. Anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih</p> <p>5. Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi napas dalam dan dzikir.</p>	<p>3. Agar klien merasakan manfaat dari terapi yang diberikan</p> <p>4. Agar klien dapat melakukan teknik relaksasi secara mandiri</p>
3	Nausea berhubungan dengan kehamilan	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka tingkat nausea menurun dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluhan mual menurun (5)</li> <li>- Perasaan ingin muntah menurun (5).</li> </ul>	<p><i>Manajemen Mual (I.03117)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi faktor penyebab mual</li> <li>2. Monitor mual (frekuensi dan durasi)</li> </ol> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangi atau hilangkan keadaan penyebab mual</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan istirahat dan tidur yang cukup</li> </ol> <p><i>Manajemen Muntah (I.103117)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi faktor penyebab muntah</li> </ol> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangi atau hilangkan keadaan penyebab muntah</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan memperbanyak istirahat.</li> </ol>	<p><i>Manajemen Mual</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui penyebab mual</li> <li>2. Mengetahui frekuensi dan durasi mual dalam sehari</li> </ol> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghindari faktor penyebab mual</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kondisi tubuh agar tetap fit</li> </ol> <p><i>Manajemen Muntah</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui penyebab muntah</li> </ol> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghindari faktor penyebab muntah</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kondisi tubuh agar tetap fit.</li> </ol>

4	<p>Ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun (5).</li> </ul>	<p><i>Terapi Relaksasi (I.09326)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan</li> <li>2. Periksa tekanan darah, frekuensi nadi, dan suhu sebelum dan sesudah latihan</li> <li>3. Monitor respons terhadap terapi relaksasi</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat</li> <li>2. Gunakan relaksasi napas dalam dan dzikir sebagai strategi penunjang</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan tujuan, manfaat teknik relaksasi napas dalam dan dzikir</li> <li>2. Anjurkan mengambil posisi nyaman</li> <li>3. Anjurkan rileks dan merasakan sensasi rileks</li> <li>4. Anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih</li> </ol>	<p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui apakah klien pernah menggunakan teknik relaksasi sebelumnya atau tidak</li> <li>2. Mengetahui vital sign sebelum dan sesudah pemberian intervensi</li> <li>3. Mengetahui respon klien terhadap terapi relaksasi yang diberikan</li> </ol> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar memberikan perasaan tenang saat melakukan terapi</li> <li>2. Sebagai terapi relaksasi untuk meningkatkan status kenyamanan</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan terapi relaksasi yang mudah dipahami dan dilakukan oleh klien</li> <li>2. Memberikan rasa nyaman saat diberikan intervensi</li> <li>3. Agar klien merasakan manfaat dari terapi yang diberikan</li> </ol>
---	---	--	---	--

			5. Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi napas dalam dan dzikir.	4. Agar klien dapat melakukan teknik relaksasi secara mandiri 5. Agar klien dapat melakukan teknik relaksasi dengan benar dan baik.
5	Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka status nutrisi membaik dengan kriteria hasil: - Pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat meningkat (5) - Berat badan membaik (5).	<i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i> <b>Observasi:</b> 1. Identifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima informasi <b>Terapeutik:</b> 1. Persiapkan materi dan media edukasi 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan <b>Edukasi:</b> 1. Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien 2. Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.	<b>Observasi:</b> 1. Mengetahui kesiapan untuk menerima informasi <b>Terapeutik:</b> 1. Sebagai persiapan sebelum melakukan pendidikan kesehatan 2. Mengatur dan menyepakati jadwal untuk melakukan pendidikan kesehatan <b>Edukasi:</b> 1. Membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi melalui edukasi makanan yang sehat 2. Mengetahui asupan makanan yang dikonsumsi sudah sesuai atau belum.

6	Gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang control tidur	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka pola tidur membaik dengan kriteria hasil: - Keluhan sulit tidur menurun (5)	<p><i>Edukasi Aktivitas/Istirahat (I.12362)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</li> </ol> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat</li> <li>2. Berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat</li> <li>2. Ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat</li> </ol>	<p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan menerima informasi</li> </ol> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai persiapan sebelum melakukan edukasi</li> <li>2. Agar klien memahami isi dari topik edukasi</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar klien memiliki jadwal aktivitas/istirahat yang teratur</li> <li>2. Agar klien mengetahui kapan harus istirahat</li> </ol>
---	---	---	--	--

Tabel 4. 13 Intervensi Keperawatan

#### D. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

Hari/Tanggal/Jam	No. Dx Keperawatan	Implementasi	Evaluasi	Nama Jelas
<b>Klien 1</b>				
Kamis/07-12-2023/ 10.00 WITA	II dan III	<p><i>Terapi Relaksasi (I.09326)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan</li> <li>Memeriksa tekanan darah, frekuensi nadi, dan suhu sebelum dan sesudah latihan</li> <li>Memonitor respon terhadap terapi relaksasi</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> klien mengatakan sesekali pernah melakukan terapi relaksasi napas dalam</p> <p><u>Hasil:</u> vital sign sebelum latihan: TD 110/80 mmHg N 87 x/menit P 20 x/menit S 36,6°C</p> <p>Vital sign setelah latihan: TD 110/80 mmHg N 93 x/menit P 20 x/menit S 36,6°C</p>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan sesekali pernah melakukan terapi relaksasi napas dalam</li> <li>- Klien merasa nyaman</li> <li>- Klien merasa rileks</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mampu mendemonstrasikan terapi yang diajarkan</li> <li>- Vital sign sebelum latihan: TD 110/80 mmHg N 87 x/menit P 20 x/menit S 36,6°C</li> <li>- Vital sign sesudah latihan: TD 110/80 mmHg N 93 x/menit P 20 x/menit S 36,6°C</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan rasa nyaman</li> </ul>	Rabiyatul

		<p>Hasil: klien mengatakan perasaannya nyaman</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat <u>Hasil:</u> telah diberikan terapi relaksasi dengan nada suara yang lembut</li> <li>2. Menggunakan relaksasi napas dalam dan dzikir sebagai strategi penunjang <u>Hasil:</u> telah diberikan terapi relaksasi napas dalam kolaborasi dengan terapi dzikir</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan tujuan, manfaat teknik relaksasi napas dalam dan dzikir <u>Hasil:</u> telah dijelaskan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kenyamanan</li> <li>2. Menganjurkan mengambil posisi nyaman <u>Hasil:</u> klien dalam posisi nyaman (duduk dikursi)</li> <li>3. Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi rileks</li> </ol>	<p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan intervensi</li> </ul>	
--	--	--	---	--

		<p><u>Hasil:</u> klien merasa rileks</p> <p>4. Menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih</p> <p><u>Hasil:</u> telah diajarkan kepada klien terapi relaksasi napas dalam kolaborasi dengan terapi dzikir</p> <p>5. Mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi napas dalam dan dzikir</p> <p><u>Hasil:</u> klien mampu mengulangi terapi yang diajarkan</p>		
Kamis/07-12-2023/ 11.00 WITA	V	<p><i>Edukasi Aktivitas/Istirahat (I.12362)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <p>1. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</p> <p><u>Hasil:</u> klien bersedia menerima informasi</p> <p><b>Terapeutik:</b></p> <p>1. Menyediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat</p>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan paham terkait kebutuhan istirahat bagi ibu hamil</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien antusias menerima informasi</li> <li>- Klien kooperatif pada saat proses pelaksanaan edukasi</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan pola tidur teratasi</li> </ul>	Rabiyatul



		<p><u>Hasil:</u> telah mempersiapkan materi terkait kebutuhan istirahat bagi ibu hamil</p> <p>2. Berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya</p> <p><u>Hasil:</u> klien kooperatif saat proses pemberian edukasi</p> <p><b>Edukasi:</b></p> <p>1. Anjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat</p> <p><u>Hasil:</u> klien menyusun jadwal istirahat pada siang hari</p> <p>2. Ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat</p> <p><u>Hasil:</u> klien mengetahui kapan waktu harus beristirahat</p>	<p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan intervensi</li> </ul>	
Kamis/11-01-2024/ 17.10 WITA	I	<p><i>Edukasi Kesehatan (I.12383)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <p>1. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</p> <p><u>Hasil:</u> klien setuju untuk menerima informasi via <i>whatsapp group</i></p>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan paham terkait literasi kesehatan</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien antusias menerima informasi</li> <li>- Klien merespon chat pada <i>group whatsapp</i></li> </ul> <p><b>A:</b></p>	Rabiyatul

		<p>2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat</p> <p><u>Hasil:</u> klien mengatakan malas mencari informasi</p> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> telah tersedia materi literasi kesehatan dalam bentuk poster</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memberikan kesempatan untuk bertanya</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> klien tidak bertanya</p> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> telah dijelaskan bahwa pola hidup yang tidak sehat akan mempengaruhi faktor kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengajarkan perilaku hidup sehat</li> </ol>	<p>- Defisit pengetahuan teratasi</p> <p><b>P:</b></p> <p>- Pertahankan intervensi</p>	
--	--	---	--	--

		<p><u>Hasil:</u> telah diajarkan perilaku hidup sehat melalui <i>telenursing</i></p> <p>3. Mengajarkan strategi yang dapat meningkatkan perilaku hidup sehat</p> <p><u>Hasil:</u> telah dianjurkan untuk selalu mencari informasi kesehatan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari</p>		
Kamis/11-01-2024/ 17.36 WITA	IV	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <p>1. Mengidentifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima informasi</p> <p><u>Hasil:</u> klien setuju untuk menerima informasi via <i>whatsapp group</i></p> <p><b>Terapeutik:</b></p> <p>1. Mempersiapkan materi dan media edukasi</p> <p><u>Hasil:</u> telah mempersiapkan materi terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil</p> <p>2. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan</p>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan paham terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien antusias menerima informasi</li> <li>- Klien merespon chat pada <i>group whatsapp</i></li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit nutrisi belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi <i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p>	Rabiyatul

		<p><u>Hasil:</u> klien setuju untuk melakukan pendidikan kesehatan via <i>whatsapp group</i></p> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> telah dijelaskan kebutuhan nutrisi ibu hamil sesuai dengan usia kehamilan dengan menggunakan media poster</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> klien dan keluarga mampu mengontrol asupan nutrisi sesuai dengan usia kehamilan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> <li>Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.</li> </ol>	
Jum'at/12-01-2023/ 16.31 WITA	IV	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></p> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> </ol>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klien mengatakan akan mengirimkan foto makanan</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klien mengirimkan gambar menu makanan</li> </ul>	Rabiyatul

		<p><u>Hasil:</u> klien mampu mengikuti anjuran makanan yang harus dikonsumsi sesuai usia kehamilan dengan mengirimkan foto makanan pada <i>whatsapp group</i></p> <p>2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan</p> <p><u>Hasil:</u> klien dan keluarga mampu mengontrol asupan nutrisi sesuai dengan usia kehamilan</p>	<p>(nasi, telur, tahu, sayur daun singkong)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien merespon chat pada <i>group whatsapp</i></li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit nutrisi belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi <i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> <li>2. Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.</li> </ol>	
Senin/15-01-2024/10.49 WITA	IV	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></p> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> </ol>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan akan mengirimkan foto makanan</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengirimkan gambar menu makanan</li> </ul>	Rabiyatul

		<p><u>Hasil:</u> klien mampu mengikuti anjuran makanan yang harus dikonsumsi sesuai usia kehamilan dengan mengirimkan foto menu makanan (nasi,sayur, ikan) pada <i>whatsapp group</i></p> <p>2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan</p> <p><u>Hasil:</u> klien dan keluarga mampu mengontrol asupan nutrisi sesuai dengan usia kehamilan</p>	<p>(nasi, ayam, sayur bayam, wortel)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien merespon chat pada <i>group whatsapp</i></li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit nutrisi belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi <i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> <li>2. Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.</li> </ol>	
Minggu/21-01-2024/ 18.05 WITA	IV	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></p> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> </ol>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan akan mengirimkan foto makanan</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengirimkan gambar menu makanan</li> </ul>	Rabiyatul

		<p><u>Hasil:</u> klien mampu mengikuti anjuran makanan yang harus dikonsumsi sesuai usia kehamilan dengan mengirimkan foto menu makanan (nasi, sayur, ikan) pada <i>whatsapp group</i></p> <p>2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan</p> <p><u>Hasil:</u> klien dan keluarga mampu mengontrol asupan nutrisi sesuai dengan usia kehamilan</p>	<p>(nasi, ayam, udang, tahu, sayur kangkung)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien merespon chat pada <i>group whatsapp</i></li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit nutrisi belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi <i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> <li>2. Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.</li> </ol>	
Senin/22-01-2024/11.50 WITA	IV	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></p> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> </ol>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan akan mengirimkan foto makanan (nasi, ayam, sayur sawi, wortel)</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengirimkan gambar menu makanan</li> </ul>	Rabiyatul

		<p><u>Hasil:</u> klien mampu mengikuti anjuran makanan yang harus dikonsumsi sesuai usia kehamilan dengan mengirimkan foto menu makanan (nasi, sayur, ikan) pada <i>whatsapp group</i></p> <p>2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan</p> <p><u>Hasil:</u> klien dan keluarga mampu mengontrol asupan nutrisi sesuai dengan usia kehamilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien merespon chat pada <i>group whatsapp</i></li> <li>- Makanan yang dikonsumsi sesuai dengan anjuran</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit nutrisi teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan intervensi</li> </ul>	
<b>Klien 2</b>				
Kamis/07-12-2023/ 10.50 WITA	III	<p><i>Terapi Relaksasi (L09326)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <p>1. Mengidentifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan</p> <p><u>Hasil:</u> klien mengatakan sesekali pernah melakukan terapi relaksasi napas dalam</p> <p>2. Memeriksa tekanan darah, frekuensi nadi, dan suhu sebelum dan sesudah latihan</p> <p><u>Hasil:</u> vital sign sebelum latihan: TD 120/80 mmHg</p>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan sesekali pernah melakukan terapi relaksasi napas dalam</li> <li>- Klien merasa nyaman</li> <li>- Klien merasa rileks</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mampu mendemonstrasikan terapi yang diajarkan</li> <li>- Vital sign sebelum latihan: TD 120/80 mmHg N 92 x/menit P 20 x/menit</li> </ul>	Rabiyatul



		<p>N 92 x/menit  P 20 x/menit  S 36,5°C  Vital sign setelah latihan:  TD 120/90 mmHg  N 90 x/menit  P 19 x/menit  S 36,6°C</p> <p>3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi  Hasil: klien mengatakan perasaannya nyaman</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>1. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat  <u>Hasil:</u> telah diberikan terapi relaksasi dengan nada suara yang lembut</p> <p>2. Menggunakan relaksasi napas dalam dan dzikir sebagai strategi penunjang  <u>Hasil:</u> telah diberikan terapi relaksasi napas dalam kolaborasi dengan terapi dzikir</p>	<p>S 36,5°C  - Vital sign sesudah latihan:  TD 120/90 mmHg  N 90 x/menit  P 19 x/menit  S 36,6°C</p> <p><b>A:</b>  - Gangguan rasa nyaman</p> <p><b>P:</b>  - Pertahankan intervensi</p>	
--	--	--	--	--

		<p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan tujuan, manfaat teknik relaksasi napas dalam dan dzikir  <u>Hasil:</u> telah dijelaskan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kenyamanan</li> <li>2. Menganjurkan mengambil posisi nyaman  <u>Hasil:</u> klien dalam posisi nyaman (duduk dikursi)</li> <li>3. Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi rileks  <u>Hasil:</u> klien merasa rileks</li> <li>4. Menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih  <u>Hasil:</u> telah diajarkan kepada klien terapi relaksasi napas dalam kolaborasi dengan terapi dzikir</li> <li>5. Mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi napas dalam dan dzikir  <u>Hasil:</u> klien mampu mengulangi terapi yang diajarkan</li> </ol>		
--	--	--	--	--

<p>Kamis/11-01-2024/ 17.10 WITA</p>	<p>I</p>	<p><i>Edukasi Kesehatan (I.12383)</i>  <b>Observasi:</b>  1. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi  <u>Hasil:</u> klien setuju untuk menerima informasi via <i>whatsapp group</i>  2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat  <u>Hasil:</u> klien mengatakan malas mencari informasi  <b>Terapeutik:</b>  1. Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan  <u>Hasil:</u> telah tersedia materi literasi kesehatan dalam bentuk poster  2. Memberikan kesempatan untuk bertanya  <u>Hasil:</u> klien tidak bertanya  <b>Edukasi:</b>  1. Menjelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan</p>	<p><b>S:</b>  - Klien mengatakan paham terkait literasi kesehatan  <b>O:</b>  - Klien antusias menerima informasi  - Klien merespon chat pada <i>group whatsapp</i>  <b>A:</b>  - Defisit pengetahuan teratasi  <b>P:</b>  - Pertahankan intervensi</p>	<p>Rabiyatul</p>
---	----------	--	---	------------------

		<p><u>Hasil:</u> telah dijelaskan bahwa pola hidup yang tidak sehat akan mempengaruhi faktor kesehatan</p> <p>2. Mengajarkan perilaku hidup sehat</p> <p><u>Hasil:</u> telah diajarkan perilaku hidup sehat melalui <i>telenursing</i></p> <p>3. Mengajarkan strategi yang dapat meningkatkan perilaku hidup sehat</p> <p><u>Hasil:</u> telah dianjurkan untuk selalu mencari informasi kesehatan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari</p>		
Kamis/11-01-2024/ 17.40 WITA	IV	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <p>1. Mengidentifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima informasi</p> <p><u>Hasil:</u> klien setuju untuk menerima informasi via <i>whatsapp group</i></p> <p><b>Terapeutik:</b></p> <p>1. Mempersiapkan materi dan media edukasi</p>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan paham terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien antusias menerima informasi</li> <li>- Klien merespon chat pada <i>group whatsapp</i></li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit nutrisi belum teratasi</li> </ul>	Rabiyatul

		<p><u>Hasil:</u> telah mempersiapkan materi terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil</p> <p>2. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan</p> <p><u>Hasil:</u> klien setuju untuk melakukan pendidikan kesehatan via <i>whatsapp group</i></p> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> telah dijelaskan kebutuhan nutrisi ibu hamil sesuai dengan usia kehamilan dengan menggunakan media poster</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> klien dan keluarga mampu mengontrol asupan nutrisi sesuai dengan usia kehamilan.</p>	<p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi <i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> <li>2. Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.</li> </ol>	
--	--	--	---	--

Jum'at/12-01-2023/ 16.31 WITA	IV	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></p> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> klien mampu mengikuti anjuran makanan yang harus dikonsumsi sesuai usia kehamilan dengan mengirimkan foto makanan pada <i>whatsapp group</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> klien dan keluarga mampu mengontrol asupan nutrisi sesuai dengan usia kehamilan</p>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klien mengatakan akan mengirimkan foto makanan</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klien mengirimkan gambar menu makanan (nasi, ayam, sambal tomat)</li> <li>Klien merespon chat pada <i>group whatsapp</i></li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Defisit nutrisi belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lanjutkan intervensi <i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> <li>Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.</li> </ol>	Rabiyatul
Senin/15-01-2024/ WITA	IV	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></p> <p><b>Edukasi:</b></p>	<p><b>S:</b></p>	Rabiyatul

		<p>1. Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</p> <p><u>Hasil:</u> klien mampu mengikuti anjuran makanan yang harus dikonsumsi sesuai usia kehamilan dengan mengirimkan foto menu makanan (nasi, sayur, ikan) pada <i>whatsapp group</i></p> <p>2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan</p> <p><u>Hasil:</u> klien dan keluarga mampu mengontrol asupan nutrisi sesuai dengan usia kehamilan</p>	<p>- Klien mengatakan akan mengirimkan foto makanan</p> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengirimkan gambar menu makanan (nasi, tempe, sayur toge)</li> <li>- Klien merespon chat pada <i>group whatsapp</i></li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit nutrisi belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi <i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> <li>2. Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.</li> </ol>	
--	--	--	--	--

<p>Minggu/21-01-2024/ 18.05 WITA</p>	<p>IV</p>	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i>  <b>Edukasi:</b>  1. Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien  <u>Hasil:</u> klien mampu mengikuti anjuran makanan yang harus dikonsumsi sesuai usia kehamilan dengan mengirimkan foto menu makanan (nasi,sayur, tahu, tempe) pada <i>whatsapp group</i>  2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan  <u>Hasil:</u> klien dan keluarga mampu mengontrol asupan nutrisi sesuai dengan usia kehamilan</p>	<p><b>S:</b>  - Klien mengatakan akan mengirimkan foto makanan  <b>O:</b>  - Klien mengirimkan gambar menu makanan (nasi, ayam, sayur sawi, wortel)  - Klien merespon chat pada <i>group whatsapp</i>  <b>A:</b>  - Defisit nutrisi belum teratasi  <b>P:</b>  - Lanjutkan intervensi <i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i>  <b>Edukasi:</b>  1. Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien  2. Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.</p>	<p>Rabiyatul</p>
--------------------------------------	-----------	---	--	------------------



<p>Senin/22-01-2024/11.50 WITA</p>	<p>IV</p>	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i>  <b>Edukasi:</b>  1. Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien  <u>Hasil:</u> klien mampu mengikuti anjuran makanan yang harus dikonsumsi sesuai usia kehamilan dengan mengirimkan foto menu makanan (nasi,sayur, tahu, tempe) pada <i>whatsapp group</i>  2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan  <u>Hasil:</u> klien dan keluarga mampu mengontrol asupan nutrisi sesuai dengan usia kehamilan</p>	<p><b>S:</b>  - Klien mengatakan akan mengirimkan foto makanan  <b>O:</b>  - Klien mengirimkan gambar menu makanan (nasi, ayam, sayur sawi, wortel)  - Klien merespon chat pada <i>group whatsapp</i>  - Makanan yang dikonsumsi sesuai dengan anjuran  <b>A:</b>  - Defisit nutrisi teratasi  <b>P:</b>  - Pertahankan intervensi</p>	<p>Rabiyatul</p>
<p><b>Klien 3</b></p>				
<p>Kamis/07-12-2023/11.15 WITA</p>	<p>III</p>	<p><i>Terapi Relaksasi (I.09326)</i>  <b>Observasi:</b>  1. Mengidentifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan</p>	<p><b>S:</b>  - Klien mengatakan sesekali pernah melakukan terapi relaksasi napas dalam  - Klien merasa nyaman  - Klien merasa rileks</p>	<p>Rabiyatul</p>

		<p><u>Hasil:</u> klien mengatakan sesekali pernah melakukan terapi relaksasi napas dalam</p> <p>2. Memeriksa tekanan darah, frekuensi nadi, dan suhu sebelum dan sesudah latihan  <u>Hasil:</u> vital sign sebelum latihan:  TD 130/90 mmHg  N 89 x/menit  P 29 x/menit  S 36,7°C  Vital sign setelah latihan:  TD 120/90 mmHg  N 90 x/menit  P 20 x/menit  S 36,7°C</p> <p>3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi  <u>Hasil:</u> klien mengatakan perasaannya nyaman</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>1. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat  <u>Hasil:</u> telah diberikan terapi relaksasi dengan nada suara yang lembut</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mampu mendemonstrasikan terapi yang diajarkan</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vital sign sebelum latihan:  TD 130/90 mmHg  N 89 x/menit  P 29 x/menit  S 36,7°C</li> <li>- Vital sign sesudah latihan:  TD 120/90 mmHg  N 90 x/menit  P 20 x/menit  S 36,7°C</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan rasa nyaman</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan intervensi</li> </ul>	
--	--	---	---	--

		<p>2. Menggunakan relaksasi napas dalam dan dzikir sebagai strategi penunjang</p> <p><u>Hasil:</u> telah diberikan terapi relaksasi napas dalam kolaborasi dengan terapi dzikir</p> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan tujuan, manfaat teknik relaksasi napas dalam dan dzikir</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> telah dijelaskan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kenyamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menganjurkan mengambil posisi nyaman</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> klien dalam posisi nyaman (duduk dikursi)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi rileks</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> klien merasa rileks</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> telah diajarkan kepada klien terapi relaksasi napas dalam kolaborasi dengan terapi dzikir</p>		
--	--	---	--	--

		<p>5. Mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi napas dalam dan dzikir</p> <p><u>Hasil:</u> klien mampu mengulangi terapi yang diajarkan</p>		
Kamis/11-01-2024/ 17.10 WITA	I	<p><i>Edukasi Kesehatan (I.12383)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <p>1. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</p> <p><u>Hasil:</u> klien setuju untuk menerima informasi via <i>whatsapp group</i></p> <p>2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat</p> <p><u>Hasil:</u> klien mengatakan malas mencari informasi</p> <p><b>Terapeutik:</b></p> <p>1. Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan</p> <p><u>Hasil:</u> telah tersedia materi literasi kesehatan dalam bentuk poster</p>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat ditelpon klien mengatakan paham terkait literasi kesehatan</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien antusias menerima informasi</li> <li>- Klien mengangkat telpon via <i>whatsaap</i> dan menjawab pertanyaan dengan kooperatif</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit pengetahuan teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan intervensi</li> </ul>	Rabiyatul

		<p>2. Memberikan kesempatan untuk bertanya  <u>Hasil:</u> klien tidak bertanya</p> <p><b>Edukasi:</b></p> <p>1. Menjelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan  <u>Hasil:</u> telah dijelaskan bahwa pola hidup yang tidak sehat akan mempengaruhi faktor kesehatan</p> <p>2. Mengajarkan perilaku hidup sehat  <u>Hasil:</u> telah diajarkan perilaku hidup sehat melalui <i>telenursing</i></p> <p>3. Mengajarkan strategi yang dapat meningkatkan perilaku hidup sehat  <u>Hasil:</u> telah dianjurkan untuk selalu mencari informasi kesehatan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari</p>		
Kamis/11-01-2024/ 17.36 WITA	IV	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></p> <p><b>Observasi:</b></p> <p>1. Mengidentifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima informasi</p>	<p><b>S:</b></p> <p>- Klien mengatakan paham terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil via telpon <i>whatsapp</i></p>	Rabiyatul

		<p><u>Hasil:</u> klien setuju untuk menerima informasi via <i>whatsapp group</i></p> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan materi dan media edukasi</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> telah mempersiapkan materi terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> klien setuju untuk melakukan pendidikan kesehatan via <i>whatsapp group</i></p> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> </ol> <p><u>Hasil:</u> telah dijelaskan kebutuhan nutrisi ibu hamil sesuai dengan usia kehamilan dengan menggunakan media poster</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan</li> </ol>	<p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien antusias menerima informasi</li> <li>- Klien mengangkat telpon telpon via <i>whatsaap</i> dan menjawab pertanyaan secara kooperatif</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit nutrisi belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi <i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</li> <li>2. Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.</li> </ol>	
--	--	--	--	--

		<p><u>Hasil:</u> klien dan keluarga mampu mengontrol asupan nutrisi sesuai dengan usia kehamilan.</p>		
<p>Jum'at/12-01-2023/ 16.31 WITA</p>	<p>IV</p>	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i>  <b>Edukasi:</b>  1. Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien  <u>Hasil:</u> klien tidak mengirimkan foto menu makanan pada <i>whatsapp group</i> tetapi mengangkat telpon dan menyebutkan menu makanan  2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan  <u>Hasil:</u> Asupan nutrisi klien dapat dimonitor melalui telepon via <i>whatsapp</i></p>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien menyebutkan menu makanannya yaitu nasi, sayur kelor, tempe, ikan, buah jeruk</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien tidak mengirimkan gambar menu makanan</li> <li>- Klien menjawab telpon <i>whatsaap</i> dan menyebutkan menu makanan</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit nutrisi belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi <i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis</li> </ol>	<p>Rabiyatul</p>

			<p>makanan yang dibutuhkan klien</p> <p>2. Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.</p>	
<p>Senin/15-01-2024/ WITA</p>	<p>IV</p>	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></p> <p><b>Edukasi:</b></p> <p>1. Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</p> <p><u>Hasil:</u> klien tidak mengirimkan foto menu makanan pada <i>whatsapp group</i> tetapi mengangkat telepon dan menyebutkan menu makanan</p> <p>2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan</p> <p><u>Hasil:</u> Asupan nutrisi klien dapat dimonitor melalui telepon <i>whatsapp</i></p>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien menyebutkan menu makanannya yaitu nasi, sayur, ayam, tahu</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengangkat telepon serta menyebutkan jenis makanan via <i>whatsapp</i></li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit nutrisi belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi <i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p> <p>1. Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</p>	<p>Rabiyatul</p>



			2. Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.	
Minggu/21-01-2024/ 18.05 WITA	IV	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></p> <p><b>Edukasi:</b></p> <p>1. Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</p> <p><u>Hasil:</u> klien tidak mengirimkan foto menu makanan pada <i>whatsapp group</i> tetapi mengangkat telepon serta menyebutkan menu makanan</p> <p>2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan</p> <p><u>Hasil:</u> Asupan nutrisi klien dapat dimonitor melalui via telepon <i>whatsapp</i></p>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien menyebutkan menu makanannya yaitu nasi, sayur, ikan, buah apel</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien tidak mengirimkan gambar menu makanan</li> <li>- Klien mengangkat telepon <i>whatsapp</i> serta menyebutkan jenis makanan yang dikonsumsi</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit nutrisi belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi <i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p> <p>1. Jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</p>	Rabiyatul

			2. Ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan.	
Senin/22-01-2024/11.50 WITA	IV	<p><i>Edukasi Nutrisi (I.12395)</i></p> <p><b>Edukasi:</b></p> <p>1. Menjelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan klien</p> <p><u>Hasil:</u> klien tidak mengirimkan foto menu makanan pada <i>whatsapp group</i> tetapi klien mengangkat telepon dan menyebutkan menu makanan</p> <p>2. Mengajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan</p> <p><u>Hasil:</u> Asupan nutrisi klien dapat dimonitor melalui via telepon <i>whatsapp</i></p>	<p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien menyebutkan menu makanannya yaitu nasi, sayur, ikan, buah jeruk</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien tidak mengirimkan gambar menu makanan</li> <li>- Klien mengangkat telepon <i>whatsapp</i> serta menyebutkan makanan yang dikonsumsi</li> <li>- Makanan yang dikonsumsi sesuai dengan anjuran</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit nutrisi teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan intervensi</li> </ul>	Rabiyatul

Tabel 4. 14 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

## E. Evaluasi Rekap Tingkat Pengetahuan

Evaluasi tingkat pengetahuan dari hari ke hari setelah diberikan intervensi keperawatan berupa edukasi literasi kesehatan dan edukasi nutrisi ibu hamil pada klien didapatkan peningkatan pengetahuan yang dibuktikan pada hasil observasi *pre-test* dan *post-test* sebagai berikut:

Pernyataan	Klien 1		Klien 2		Klien 3	
	<i>Pre</i>	<i>Post</i>	<i>Pre</i>	<i>Post</i>	<i>Pre</i>	<i>Post</i>
Ibu mengetahui defenisi literasi kesehatan	0	1	0	1	0	1
Ibu mengetahui manfaat literasi kesehatan	0	1	0	1	0	1
Ibu mengetahui tempat untuk mengakses informasi kesehatan	0	1	1	1	1	1
Ibu mengetahui jenis kebutuhan nutrisi sesuai dengan usia kehamilan	0	1	0	1	1	1
Ibu mampu mengonsumsi makanan sesuai anjuran usia kehamilan diantaranya: karbohidrat (nasi, jagung, singkong), protein (telur, tahu, tempe), asam folat (ayam, ikan, daging), vitamin (sayur dan buah), zat besi (sayuran hijau), kalsium (susu)	0	1	0	1	0	1
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

Tabel 4. 15 Rekap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil

Keterangan:

0 (tidak tahu)

1 (tahu)

Sumber Makanan	Implementasi Pemantauan Nutrisi																	
	Klien 1						Klien 2						Klien 3					
Karbohidrat (nasi, jagung, singkong)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protein (tempe, tahu, telur)	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Asam folat (ikan, ayam, daging)	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vitamin (buah-buahan)	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zat besi (sayuran hijau)	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Kalsium (susu)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 4. 16 Rekap Hasil Pemantauan Nutrisi Selama 6 Hari



## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Asuhan Keperawatan**

##### **1. Analisis Pengkajian Keperawatan**

Pada laporan kasus ini, penulis melakukan pengkajian pada ibu hamil di Poli KIA Puskesmas Bontomarannu. Pengkajian dilakukan dengan metode wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan studi (rekam medis). Penulis melakukan pengkajian pada tiga orang klien, klien pertama Ny.A berusia 18 tahun dengan status obstetric G1P0A0, usia gestasi 22 minggu, LILA 19 cm, lingkar perut 87 cm, BB/TB 45 kg/154 cm, klien mengatakan nyeri perut bagian bawah dirasakan sudah 4 hari, klien mengatakan cemas dengan kehamilan pertamanya, klien kurang terpapar informasi mengenai kehamilan.

Klien kedua yaitu Ny.H berusia 25 tahun dengan status obstetric G3P2A0, usia gestasi 15 minggu, LILA 20 cm, lingkar perut 70 cm, BB/TB 48kg/154 cm, klien mengatakan mual muntah dirasakan sudah 1 minggu, klien mengatakan takut kalau bayinya BBLR ketika lahir, klien kurang terpapar informasi tentang kehamilan. Klien ketiga yaitu Ny.U berusia 21 tahun dengan status obstetric G3P2A0, usia gestasi 10 minggu, LILA 20,5 cm, lingkar perut 72 cm, BB/TB 46 kg/153 cm, klien mengatakan mual muntah dirasakan sudah 3 hari, klien mengatakan malas makan, klien kurang terpapar informasi mengenai kehamilan.

Dari data hasil pengkajian pada ketiga klien didapatkan hasil bahwa ketiga klien rata-rata memiliki data dan keluhan utama yang sama yaitu kurang terpapar informasi tentang kehamilan dan ukuran LILA dibawah normal. Ukuran LILA kurang dari 23,5 cm dan kurang terpapar informasi mengenai kebutuhan nutrisi dapat mempengaruhi nafsu makan sehingga cenderung untuk mengalami KEK.

Penelitian yang dilakukan (Masdiah *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengetahuan ibu hamil dan kejadian KEK. Ibu hamil dengan tingkat pengetahuan yang rendah lebih berisiko mengalami KEK dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah akses informasi dan tingkat pendidikan. Pengetahuan menjadi salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi gizi selama kehamilan. Pengetahuan yang baik tentang nutrisi seimbang ibu biasanya mempengaruhi sikap pemenuhan gizi selama kehamilan. Pola konsumsi makanan adalah salah satu faktor yang berhubungan dengan kekurangan energi kronik (KEK).

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Triwahyuningsih & Prayugi, 2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan pengetahuan atau informasi tentang gizi yang dimiliki lebih baik sehingga bisa memenuhi asupan gizinya. Hal ini dipengaruhi dari faktor ekonomi keluarga. Pendidikan ibu hamil tinggi dengan daya beli yang rendah mengakibatkan kebutuhan gizi ibu selama hamil baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum terpenuhi, akhirnya ibu mengalami KEK.

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan dua klien mempunyai riwayat KEK pada kehamilan sebelumnya dan riwayat persalinan BBLR. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Hardiati & Thasliyah, 2022) ibu dengan status KEK diketahui dapat meningkatkan risiko untuk bayi lahir dengan kondisi BBLR hingga 2,654 kali lebih besar daripada ibu yang tidak KEK. Mekanisme yang terjadi dalam hal ini dapat dijelaskan melalui penurunan kuantitas maupun kualitas terhadap transfer zat gizi ibu melalui plasenta karena terjadinya degradasi volume darah dan cardiac output pada ibu hamil. Tidak adekuatnya asupan nutrisi yang dimiliki oleh ibu hamil membuat minimnya zat gizi yang dapat disalurkan pada janin melalui plasenta,

termasuk ukuran plasenta yang cenderung lebih kecil daripada ibu dengan tidak KEK. Rendahnya kualitas maupun kuantitas nutrisi inilah yang berperan dalam menghambat tumbuh kembang janin, termasuk rendahnya berat badan hingga kurang dari 2500-gram pada saat kelahiran.

Selain itu, studi kasus ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Purwati & Rizqiyani, 2018) menunjukkan bahwa pada ibu hamil dengan KEK mayoritas paritas ibu hamil yang sudah pernah melahirkan, karena ibu kurang peduli akan nutrisi yang dikonsumsi ibu yang sudah beberapa kali hamil dan melahirkan, maka kemungkinan banyak akan ditemui keadaan kesehatan terganggu (anemia, kurang gizi).

Berdasarkan data dari ketiga klien serta beberapa penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa didapatkan dua masalah yang muncul yaitu defisit pengetahuan dan defisit nutrisi. Menurut (Kemenkes RI, 2023) tanda klinis ibu hamil mengalami KEK adalah LILA < 23,5 cm, penambahan berat badan selama kehamilan < 9 kg, riwayat KEK pada kehamilan sebelumnya, dan riwayat persalinan BBLR. Sedangkan, data yang ditemukan pada ketiga klien terkait dengan tanda klinis KEK yaitu LILA < 23,5 cm, riwayat KEK pada kehamilan sebelumnya, serta riwayat persalinan BBLR. Dari uraian diatas, dinyatakan terdapat persamaan antara teori dengan tanda klinis yang timbul pada ibu hamil KEK. Hal tersebut menandakan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

## **2. Analisis Diagnosis Keperawatan**

Diagnosis keperawatan merupakan dasar dalam penyusunan rencana tindakan asuhan keperawatan, sangat perlu untuk didokumentasikan dengan baik. Diagnosis keperawatan pada ke dua klien dari hasil pengkajian dan pemeriksaan fisik terdapat 6 masalah keperawatan yang dapat ditegakkan yaitu:

a. Defisit Pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi

Defisit pengetahuan adalah ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu (SDKI PPNI, 2018). Pada klien pertama diperoleh data klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan, klien tidak pernah melakukan senam hamil, klien tidak mengetahui literasi kesehatan bagi ibu hamil, klien mengatakan informasi kehamilan hanya didapatkan dari keluarga, tidak pernah diajarkan perawatan payudara, klien mengatakan malas makan, klien tidak suka makan sayur. Pada klien kedua diperoleh data klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan, tidak pernah melakukan senam hamil, klien tidak mengetahui literasi kesehatan bagi ibu hamil, klien mengatakan informasi kehamilan didengar dari orang-orang sekitar, tidak pernah melakukan perawatan payudara, klien mengatakan makan 3x/hari tapi hanya 5-6 sendok, klien mengatakan suka makan bakso, klien mengatakan jarang makan buah, status obstetric G3 P2 A0 dan usia gestasi 15 minggu. Pada klien ketiga diperoleh data klien mengatakan baru pertama kalinya melakukan pemeriksaan kehamilan, tidak pernah melakukan senam hamil, klien tidak mengetahui literasi kesehatan bagi ibu hamil, klien mengatakan informasi kehamilan hanya didapatkan dari internet, klien mengatakan pernah diajar tapi lupa cara melakukan perawatan payudara, klien mengatakan hanya makan di siang hari, klien tidak suka makan sayur, klien mengatakan tidak suka makan ikan, klien makan buah sesekali, status obstetric G3P2A0, dan usia gestasi 10 minggu.

Data-data yang telah diuraikan diatas telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam buku (SDKI PPNI, 2018) bahwasanya gejala dan tanda mayor untuk diagnosis defisit pengetahuan yaitu menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran, menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah, dan menjalani pemeriksaan



yang tidak tepat. Pernyataan tersebut didukung juga oleh penelitian yang dikemukakan oleh (Putri *et al.*, 2023) bahwa defisit pengetahuan pada ibu hamil adalah kondisi di mana seorang ibu hamil tidak memiliki informasi yang cukup atau memiliki informasi yang salah tentang kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi. Hal ini dapat berakibat pada berbagai masalah kesehatan, baik bagi ibu maupun bayinya. Penyebab defisit pengetahuan adalah kurang akses informasi, informasi yang salah, dan kurangnya edukasi.

b. Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis

Masalah keperawatan ini mengakibatkan asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme (SDKI PPNI, 2018) masalah ini sangat membahayakan ibu dan janin karena mengarah pada penyakit yang serius yaitu Kekurangan Energi Kronis (KEK). Pada klien pertama didapatkan data objektif BB/TB saat hamil 48 kg/154 cm dan LILA 19 cm. Pada klien kedua didapatkan data objektif 48 kg/154 cm dan LILA 20 cm. Pada klien ketiga didapatkan data BB/TB 46 kg/153 cm dan LILA 20,5 cm.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih & Wahyuni, 2022) menyatakan bahwa defisit nutrisi pada ibu hamil dapat berbahaya bagi ibu dan janin karena asupan makanan yang tidak seimbang akan menyebabkan kecacatan lahir, BBLR, kematian janin, anemia, kelahiran prematur dan kesehatan ibu yang buruk.

c. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan

Gangguan rasa nyaman adalah perasaan kurang senang, lega, dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan dan sosial (SDKI PPNI, 2018). Masalah ini hanya dialami oleh klien pertama dengan data klien mengatakan nyeri perut bagian bawah dirasakan sejak 4 hari yang lalu dan usia gestasi 22 minggu. Data yang dikeluhkan oleh klien sesuai dengan penjelasan gejala dan

tanda mayor dalam buku (SDKI PPNI, 2018) dimana klien mengeluh tidak nyaman yang diakibatkan dengan kondisi klinis terkait yaitu kehamilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2020) menyatakan bahwa gangguan rasa nyaman pada ibu hamil adalah keluhan umum yang dialami oleh banyak wanita selama masa kehamilan. Keluhan ini dapat bervariasi dari ringan hingga berat dan terjadi pada setiap trimester. Penyebab gangguan rasa nyaman pada ibu hamil berbeda-beda tergantung pada trimester dan kondisi masing-masing ibu. Penyebab umum antara lain, perubahan hormonal, peningkatan volume darah, perubahan postur tubuh, kurang tidur, dan stress. Berdasarkan teori dan hasil penelitian dapat diartikan bahwa tidak ada kesenjangan antara keluhan yang dialami klien dan teori dari hasil penelitian.

d. Ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan

Ansietas adalah kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman (SDKI PPNI, 2018). Pada klien pertama diperoleh data klien mengatakan cemas dengan kehamilan pertamanya. Pada klien kedua dan ketiga diperoleh data yang sama bahwa klien mengatakan takut kalau bayinya BBLR ketika lahir. Data yang dikeluhkan oleh klien sesuai dengan gejala dan tanda mayor dalam buku (SDKI PPNI, 2018) yaitu merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi.

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pertiwi *et al.*, 2020) yang menjelaskan bahwa ansietas pada ibu hamil adalah perasaan cemas dan khawatir yang berlebihan yang dialami selama kehamilan. Hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi, mengingat banyak perubahan fisik, emosional, dan sosial yang dialami wanita selama masa kehamilan. Penyebab

ansietas pada ibu hamil yaitu perubahan hormonal, riwayat kecemasan, stress, kurang tidur, dan kekurangan nutrisi.

e. Nausea berhubungan dengan kehamilan

Nausea adalah perasaan tidak nyaman pada bagian belakang tenggorok atau lambung yang dapat mengakibatkan muntah. Masalah keperawatan ini hanya dialami oleh dua klien, pada klien kedua diperoleh data klien mengatakan mual muntah dirasakan sudah 1 minggu yang lalu dan klien mengeluh malas makan dan mudah lelah. Pada klien ke-1 diperoleh data klien mengatakan mual muntah dirasakan sudah 3 hari dan klien mengatakan malas makan dan mudah lelah. Keluhan yang dialami oleh klien sesuai dengan penjelasan gejala dan tanda mayor dalam buku (SDKI PPNI, 2018) yaitu mengeluh mual, merasa ingin muntah, dan tidak berminat makan.

Pernyataan tersebut didukung pada penelitian yang dilakukan oleh (Heryunanto *et al.*, 2022) bahwa nausea atau mual sering disebut juga *morning sickness*, yang merupakan gangguan yang sangat umum dialami ibu hamil, terutama pada trimester pertama. Penyebab mual pada hamil terkait dengan beberapa faktor yaitu peningkatan hormon, sensitivitas terhadap bau dan rasa, dan kosongnya lambung.

f. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur

Gangguan pola tidur adalah gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal. Masalah keperawatan ini dialami oleh klien pertama, dimana data yang diperoleh adalah klien mengatakan sering sulit tidur karena sering BAK di malam hari, tampak ada kantong mata, dan mata cekung. Keluhan yang dialami klien sesuai dengan penjelasan tanda dan gejala dalam buku (SDKI PPNI, 2018) yaitu mengeluh sulit tidur serta terdapat pula kondisi klinis terkait kehamilan.

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Palifiana & , Wulandari, 2018) bahwa Gangguan pola tidur merupakan salah satu keluhan umum yang dialami ibu hamil, terutama pada trimester pertama. Salah satu faktor yang sering menyebabkan gangguan tidur ini adalah sering buang air kecil (BAK) di malam hari. Hal ini dapat mengganggu kualitas tidur dan berakibat pada kelelahan dan kelemahan pada ibu hamil. Faktor penyebab diantaranya, perubahan hormon, pembesaran rahim, peningkatan volume darah, serta kecemasan/stress. Adapun upaya untuk mengatasi gangguan pola tidur yaitu memperbanyak minum air putih disiang hari, mengurangi minum air putih dimalam hari, meninggikan kaki saat tidur, menjaga pola tidur yang teratur, membuat suasana kamar tidur yang nyaman, melakukan teknik relaksasi, menghindari kafein dan nikotin, serta konsultasi dengan dokter (bila perlu). Dengan mengetahui faktor penyebab dan upaya mengatasinya, ibu hamil dapat meningkatkan kualitas tidurnya dan menjaga kesehatan selama kehamilan.

### **3. Analisis Intervensi Keperawatan**

Intervensi keperawatan yang diberikan pada ketiga klien yang menjadi responden meliputi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Analisis intervensi dengan masalah utama yang diberikan pada diagnosis defisit pengetahuan adalah edukasi kesehatan peningkatan literasi kesehatan dengan rencana tindakan meliputi, observasi: Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi dan identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat. Terapeutik: Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan menggunakan poster dan *Whatsapp group* dan berikan kesempatan untuk bertanya. Edukasi: jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. ajarkan perilaku hidup sehat, ajarkan strategi yang dapat meningkatkan perilaku hidup sehat (SIKI PPNI, 2018).

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Waryana *et al.*, 2019) bahwa edukasi mengenai kesehatan untuk peningkatan pengetahuan sangat ditentukan oleh jenis media yang digunakan terutama jika menggunakan media dalam bentuk poster ataupun video yang merangsang lebih dari satu indra.

Analisis intervensi dengan masalah gangguan rasa nyaman dan ansietas adalah terapi rileksasi dengan tindakan keperawatan meliputi, observasi: identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan, periksa tekanan darah, frekuensi nadi, dan suhu sebelum dan sesudah latihan, monitor respon terhadap terapi relaksasi. Terapeutik: gunakan nada suara lembut dengan irama lambat, gunakan relaksasi napas dalam dan dzikir sebagai strategi penunjang. Edukasi: jelaskan tujuan, manfaat teknik relaksasi napas dalam dan dzikir, anjurkan mengambil posisi nyaman, anjurkan rileks dan merasakan sensasi rileks, anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih, demonstrasikan dan latih teknik relaksasi napas dalam dan dzikir (SIKI PPNI, 2018).

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian (Mulyati *et al.*, 2021) bahwa kecemasan ibu hamil yang mendapatkan relaksasi diafragma didapatkan hasil nilai t yaitu 19,879 dengan rata-rata kecemasan sebelum mendapatkan relaksasi diafragma yaitu 53,80 sedangkan rata-rata yang sudah diberikan relaksasi diafragma yaitu 39,00 yang berarti terdapat pengaruh relaksasi diafragma terhadap penurunan rasa cemas pada ibu hamil.

Analisis intervensi dengan masalah nausea adalah manajemen mual dan manajemen muntah dengan tindakan keperawatan meliputi, observasi: identifikasi faktor penyebab mual/muntah dan monitor mual/muntah (frekuensi dan durasi). Terapeutik: kurangi atau hilangkan keadaan penyebab mual/muntah. Edukasi: anjurkan istirahat dan tidur yang cukup. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Esin *et al.*, 2023) bahwa manajemen mual/muntah bisa dilakukan

dengan tindakan terapeutik yaitu melalui aromaterapi. Penggunaan aromaterapi dapat diberikan melalui beberapa cara, antara lain inhalasi, berendam, pijat, dan kompres. Berdasarkan keempat cara tersebut. Mekanisme kerja perawatan aromaterapi dalam tubuh manusia berlangsung melalui dua sistem fisiologis, yaitu sirkulasi tubuh dan sistem penciuman, serta dapat mempengaruhi kondisi psikis, daya ingat, dan emosi seseorang.

Analisis intervensi dengan masalah defisit nutrisi adalah edukasi nutrisi melalui *whatsapp group* dengan tindakan keperawatan meliputi, observasi: identifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima informasi. Terapeutik: persiapkan materi dan media edukasi dan jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Edukasi: jelaskan kepada klien/keluarga makanan yang harus dihindari dan jenis makanan yang dibutuhkan ibu hamil dan ajarkan klien/keluarga memonitor asupan makanan (SIKI PPNI, 2018)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Zaidah & Maisuroh, 2022) menyatakan bahwa intervensi edukasi nutrisi merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dengan kekurangan energi kronik (KEK). Edukasi nutrisi dapat membantu ibu hamil KEK untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka dengan baik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin yang optimal dan mengatasi komplikasi kehamilan. Dengan edukasi nutrisi tersebut diharapkan ibu hamil dapat meningkatkan asupan energi dan protein, memilih makanan yang bergizi, serta memperbaiki kebiasaan makan.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh (Septiani & Sulistiawati, 2022) menyatakan bahwa dengan memberikan edukasi nutrisi yang tepat kepada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK) dapat diterapkan untuk membuat pilihan makanan yang sehat dan bergizi sehingga ibu dapat menjalani kehamilan yang sehat dan melahirkan bayi yang sehat dan kuat. Selain itu, manfaat

edukasi nutrisi bagi ibu hamil meliputi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya gizi, meningkatkan asupan gizi protein, memperbaiki kebiasaan makan, dan meningkatkan kesehatan/kualitas hidup ibu dan bayi.

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan (Ambarawati *et al.*, 2022) bahwa media poster dapat memberikan bentuk informasi menarik, efektif, serta mudah diterima oleh masyarakat khususnya ibu hamil. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan media poster sebagai media edukasi lebih mudah menarik minat dan mudah dipahami.

Selain itu, edukasi melalui *telenursing* juga dapat dilakukan sebagai pendampingan dalam mengatasi KEK pada ibu hamil. *Telenursing* juga membantu klien dan keluarga untuk ikut berpartisipasi aktif dalam perawatan terutama *self-management* untuk penyakit kronis. Sistem ini memfasilitasi perawat memberikan informasi dan dukungan yang akurat secara *online*. *Telenursing* dapat meningkatkan keinginan diri dan meningkatkan kesadaran klien dalam kepatuhan perilaku sehat terkait dengan penyakit (Boro & Hariyati, 2020)

Analisis intervensi dengan masalah gangguan pola tidur adalah edukasi istirahat/aktivitas dengan tindakan keperawatan meliputi observasi: identifikasi kesiapan menerima informasi. Terapeutik: sediakan materi dan media pengaturan aktivitas/istirahat, berikan kesempatan klien bertanya. Edukasi: anjurkan menyusun jadwal aktivitas/istirahat, ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat (SIKI PPNI, 2018). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Oktapianti & Triyanti, 2023) bahwa edukasi tentang higiene tidur selama 30 menit kepada ibu hamil trimester 1 dapat meningkatkan kualitas tidur mereka secara signifikan, yang ditunjukkan dengan berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk tertidur, peningkatan durasi tidur nyenyak, dan berkurangnya frekuensi terbangun di malam hari.



#### 4. Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan pada ketiga klien dilaksanakan pada 07 Desember 2023 sampai dengan 22 Januari 2024. Sebelum implementasi untuk diagnosis defisit pengetahuan diberikan didapatkan data subjektif bahwa klien mengatakan baru pertama kali memeriksa kehamilan, klien tidak pernah melakukan senam hamil, klien tidak mengetahui literasi kesehatan, klien mengatakan malas makan. Pada saat pelaksanaan implementasi respon klien sangat terbuka yang dibuktikan dengan antusias klien untuk menerima informasi serta antusias klien untuk mengikuti proses pemantauan nutrisi. Setelah diberikan intervensi yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan ketiga klien yaitu memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil dengan media poster melalui *Whatsapp Group* didapatkan hasil bahwa ketiga klien mengatakan paham terkait literasi kesehatan, klien antusias menerima informasi, klien mampu menyebutkan pengertian literasi kesehatan, manfaat literasi kesehatan, dan tempat mengakses informasi kesehatan. Akan tetapi satu klien (Ny.U) tidak merespon *chat whatsapp group* pada saat pemberian edukasi, namun pada saat ditelepon melalui *whatsapp* klien kooperatif serta menjawab pertanyaan dari peneliti.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Patimah *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa pendidikan kesehatan melalui poster berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan mengenai gizi ibu hamil dan menyusui dengan tingkat persentasi peningkatan sebesar 19,4%. Penelitian yang seiring juga dikemukakan oleh (Salamah, 2019), bahwa terjadi peningkatan literasi kesehatan setelah diberikan edukasi sebesar 15.4%. Peningkatan literasi kesehatan juga dapat didorong dengan adanya suatu program, berdasarkan salah satu penelitian menyebutkan bahwa program *parenting education* dinyatakan efektif untuk meningkatkan literasi kesehatan.



Selain dari diagnosis diatas, didapatkan pula diagnosis defisit nutrisi yang diberikan intervensi edukasi nutrisi dengan media poster serta pemantauan nutrisi selama 6x dengan mengirimkan gambar menu makanan melalui *whatsapp group*. Didapatkan hasil pada hari pertama, klien 1 (Ny.A) mengonsumsi nasi, telur, tahu, sayur daun singkong, dan minum susu dipagi hari; klien 2 (Ny.H) mengonsumsi nasi, ayam, sambal tomat, minum susu dipagi hari; klien 3 (Ny.U) mengonsumsi nasi, ikan, tempe, sayur kelor, buah jeruk, minum susu dipagi hari. Pada hari kedua, klien 1 (Ny.A) mengonsumsi nasi, ayam, sayur bayam, wortel, minum susu dipagi hari; klien 2 (Ny. H) mengonsumsi nasi, tempe, sayur toge, minum susu dipagi hari; klien 3 (Ny.U) mengonsumsi nasi, ayam, tahu sayur minum susu dipagi hari. Pada hari ketiga, klien 1 (Ny. A) mengonsumsi nasi, ayam, udang, tahu, sayur kangkung, minum susu dipagi hari; klien 2 (Ny.H) mengonsumsi nasi, ayam, sayur sawi, wortel, minum susu dipagi hari; klien 3 (Ny. U) mengonsumsi nasi, sayur, ikan, buah apel, minum susu dipagi hari. Pada hari keempat, klien 1 (Ny A) mengonsumsi nasi, ayam, tahu, sayur sawi, wortel, minum susu dipagi hari; klien 2 (Ny.H) mengonsumsi nasi, ayam, sayur sawi, wortel, minum susu dipagi hari; klien 3 (Ny.U) mengonsumsi nasi, sayur, ikan, tahu, buah jeruk, minum susu dipagi hari. Pada hari kelima, klien 1 (Ny.A) mengonsumsi nasi, ayam, sayur kangkung, buah naga, minum susu dipagi hari; klien 2 (Ny.H) mengonsumsi nasi, sayur kacang panjang, wortel, tahu, buah mangga, minum susu dipagi hari; klien 3 (Ny.U) mengonsumsi nasi, ayam, tempe, sayur wortel, minum susu dipagi hari. Pada hari keenam, klien 1 (Ny.A) mengonsumsi nasi, ikan, sayur, buah papaya minum susu dipagi hari; klien 2 (Ny H) mengonsumsi nasi, tahu, ayam, sayur, buah semangka, minum susu dipagi hari; klien 3 (Ny.U) mengonsumsi nasi, sayur kelor, ikan, tahu, buah papaya, minum susu dipagi hari.

Setelah dilakukan intervensi, diperoleh hasil dari ketiga klien bahwa terdapat peningkatan pengetahuan mengenai kebutuhan nutrisi selama hamil serta klien mampu mengikuti anjuran makanan yang dikonsumsi setiap harinya yang dibuktikan dengan foto menu makanan. Namun, satu klien (Ny.U) tidak mengirimkan foto menu makanan pada *whatsapp group* tetapi klien menyebutkan menu makanan yang dikonsumsi melalui telepon via *whatsapp*.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Nadrah & Handayani, 2024), menyatakan bahwa edukasi nutrisi pada ibu hamil dengan media booklet dan poster sangat efektif dalam memberikan tambahan informasi tentang kebutuhan asupan gizi pada ibu hamil selama masa kehamilan, ibu hamil mampu mengonsumsi makanan yang mengandung gizi. Edukasi yang diberikan pada ibu hamil selama kunjungan *antenatal* yaitu konsumsi gizi selama kehamilan agar tidak terjadi KEK, sehingga janin dalam kandungan juga dapat berkembang dengan sehat. Dengan konsumsi gizi seimbang selama hamil, akan mengatasi komplikasi baik pada janin maupun pada ibu, komplikasi selama antenatal dan intrapartum, mengatasi berat lahir rendah dan prematuritas.

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian (Hapsari *et al.*, 2022) bahwa edukasi nutrisi terbukti menjadi intervensi yang efektif untuk mengatasi KEK pada ibu hamil. Diperoleh hasil bahwa edukasi nutrisi dapat membantu ibu hamil dengan KEK untuk meningkatkan asupan gizi, mencapai status gizi yang optimal, dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, edukasi nutrisi perlu menjadi bagian penting dari program *antenatal care* untuk mencegah dan mengatasi KEK pada ibu hamil. Edukasi nutrisi harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ibu hamil.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Pastuty *et al.*, 2018) menyatakan bahwa pemantauan nutrisi adalah salah satu langkah penting dalam mengatasi KEK

pada ibu hamil. Pemantauan nutrisi dapat membantu mengidentifikasi ibu hamil dengan KEK secara dini dan memberikan intervensi yang tepat untuk mencegah komplikasi. Adapun mekanisme kerja pemantauan nutrisi diantaranya, pemantauan nutrisi dapat membantu mengidentifikasi ibu hamil dengan KEK secara dini sehingga intervensi dapat diberikan lebih cepat dan efektif, ibu hamil dengan KEK diberikan edukasi suplemen gizi serta pendampingan untuk meningkatkan asupan makanan dalam mencapai status gizi yang optimal, selanjutnya pemantauan nutrisi dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan ibu hamil dan memastikan efektivitas intervensi.

Pendapat lain juga dituangkan dalam hasil penelitian (Ramadhanti & Virawati, 2023), bahwa pendidikan nutrisi dengan media poster dan leaflet efektif dalam peningkatan pengetahuan ibu hamil mengenai upaya untuk mengatasi KEK . Pendidikan memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi pengetahuan dan sikap seseorang, karena melalui pendidikan seseorang memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang belum diketahui sebelumnya. Dalam konteks ini, responden penelitian diberikan pengetahuan tambahan tentang upaya pencegahan kekurangan energi kronis melalui pendidikan gizi menggunakan sarana poster dan leaflet.

Selain dari diagnosis defisit pengetahuan dan defisit nutrisi, terdapat pula diagnosis lain yaitu gangguan rasa nyaman, mual, ansietas, dan gangguan pola tidur. Intervensi dari tiga diagnosis ini dilaksanakan sekaligus pada tanggal 07 Desember 2024. Klien diberikan implementasi terapi relaksasi nafas dalam untuk diagnosis gangguan rasa nyaman dan ansietas, implementasi manajemen mual dan manajemen muntah untuk diagnosis mual, serta implementasi edukasi waktu aktivitas/istirahat. Setelah intervensi yang dipilih diimplementasikan diperoleh hasil bahwa ketiga klien mampu mendemonstrasikan terapi relaksasi napas dalam sesuai

dengan instruksi, mampu menyebutkan item-item penting dari intervensi manajemen mual dan muntah, serta mampu mengidentifikasi waktu untuk aktivitas/istirahat perharinya.

## 5. Analisis Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan pada ketiga klien dilaksanakan pada 07 Desember 2023 sampai dengan 22 Januari 2024. Evaluasi keperawatan merupakan kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan, untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Penilaian keberhasilan adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai. Tahap evaluasi keperawatan merupakan mengkaji atau mengobservasi respon klien terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan oleh perawat dengan mengacu pada standar atau kriteria hasil yang telah ditetapkan pada rumusan tujuan. Evaluasi dibagi menjadi dua bagian yaitu evaluasi proses atau formatif dilakukan setiap selesai melaksanakan tindakan dan evaluasi hasil atau sumatif dilakukan dengan membandingkan respon klien pada tujuan khusus dan umum yang telah ditentukan.

### a. Evaluasi formatif

Pada diagnosis defisit pengetahuan setelah dilakukan implementasi didapatkan evaluasi formatif dari ketiga klien yaitu klien paham terkait literasi kesehatan serta akan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada diagnosis defisit nutrisi didapatkan evaluasi untuk hari pertama menu makanan yang dikonsumsi oleh klien belum sesuai dengan anjuran dimana klien 1 (Ny.A) tidak mengonsumsi karbohidrat, klien 2 (Ny.H) tidak mengonsumsi protein dan zat besi, klien 3 (Ny.U) tidak mengonsumsi zat besi. Pada evaluasi hari kedua diperoleh bahwa dua klien belum mengonsumsi makanan sesuai anjuran dimana klien 1 (Ny.A) tidak mengonsumsi protein, klien 2 (Ny.H) tidak mengonsumsi asam folat dan vitamin, sedangkan klien 3 (Ny.U) sudah mengonsumsi makanan

yang sesuai dengan anjuran. Pada evaluasi hari ketiga diperoleh bahwa ketiga klien belum mengonsumsi makanan sesuai anjuran dimana klien 1 (Ny.A) tidak mengonsumsi vitamin, klien 2 (Ny.H) tidak mengonsumsi protein, klien 3 (Ny.U) tidak mengonsumsi protein. Pada evaluasi hari keempat diperoleh satu klien belum mengonsumsi makanan sesuai anjuran dimana klien 1 (Ny.A) sudah mengonsumsi makanan sesuai anjuran, klien 2 (Ny.H) tidak mengonsumsi protein, klien 3 (Ny.U) sudah mengonsumsi makanan sesuai anjuran. Pada evaluasi hari kelima diperoleh satu klien belum mengonsumsi makanan sesuai anjuran dimana klien 1 (Ny. A) sudah mengonsumsi makanan sesuai anjuran, klien 2 (Ny.H) tidak mengonsumsi asam folat, klien 3 (Ny.U) sudah mengonsumsi makanan sesuai anjuran. Pada evaluasi hari kelima diperoleh bahwa ketiga klien sudah mengonsumsi makanan sesuai dengan anjuran.

Selain itu, untuk diagnosis ansietas dan gangguan rasa nyaman pada ketiga klien diperoleh evaluasi formatif data subjektif yaitu klien merasa nyaman, klien merasa rileks, serta evaluasi formatif data objektif yaitu klien mampu mendemonstrasikan terapi relaksasi napas dalam yang diajarkan.

b. Evaluasi sumatif

Implementasi keperawatan pada ketiga klien dilaksanakan pada 07 Desember 2023 sampai dengan 22 Januari 2024 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun, dengan masalah defisit pengetahuan, gangguan rasa nyaman, nausea, ansietas, dan defisit nutrisi. Dari diagnosis defisit pengetahuan dan defisit nutrisi menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, dimana pada awal pengkajian klien mengatakan tidak tahu mengenai literasi kesehatan dan klien tidak tahu mengenai kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Peningkatan pengetahuan tersebut dibuktikan juga pada hasil lembar observasi dimana pada saat *pre-test* ketiga klien mengalami keterbatasan pengetahuan dan kurang tepat

dalam menjawab 5 pertanyaan yang diberikan, setelah dilakukan *post-test* klien mampu menjawab 5 pertanyaan dengan benar. Sedangkan, untuk peningkatan kebutuhan nutrisi dapat dilihat pada lembar observasi pemantuan nutrisi sebanyak 6x bahwa terjadi perubahan menu makanan setiap harinya. Setelah diberikan intervensi secara bertahap klien memperoleh peningkatan pengetahuan terkait literasi kesehatan dan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil sehingga masalah defisit pengetahuan dan defisit nutrisi teratasi namun klien harus tetap dipantau untuk memaksimalkan intervensi yang telah diberikan.

Selain itu, pada diagnosis gangguan rasa nyaman dan ansietas menunjukkan pula perubahan kearah yang lebih baik, dimana pada awal pengkajian klien Ny.A mengatakan nyeri perut bagian bawah dan klien Ny.H dan Ny. U mengatakan cemas serta khawatir terhadap kehamilan. Namun, setelah dilakukan intervensi klien mampu mendemonstrasikan terapi relaksasi napas dalam untuk mengatasi masalah ansietas dan gangguan rasa nyaman. Akan tetapi, masalah ini dianggap belum teratasi dan masih membutuhkan perhatian lebih lanjut karena masalah ini akan terus muncul pada ibu hamil trimester 1.

## **B. Analisis Intervensi EBPN**

Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil didefinisikan sebagai kondisi dimana ibu hamil mengalami kekurangan energi (kalori dan protein) yang berlangsung lama (kronik) minimal 3 bulan, yang mengakibatkan gangguan kesehatan pada ibu hamil. Cara mengatasi kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil dapat dilakukan dengan pemberian edukasi tentang gizi seimbang kepada ibu hamil dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu hamil. Edukasi yang berkelanjutan dan terstruktur merupakan kunci penting dalam mengatasi KEK. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang dan pola makan sehat, diharapkan

angka KEK di Indonesia dapat diturunkan dan kesehatan ibu hamil serta janinnya dapat terjaga (Umami Kulsum & Dyah Ayu Wulandari, 2022)

Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan pendampingan melalui *telenursing*. Adapun manfaat pendampingan *telenursing* adalah meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan ibu hamil (terutama daerah terpencil, membantu mendeteksi KEK secara dini, meningkatkan edukasi dan konseling gizi bagi ibu hamil, memberikan dukungan psikologis bagi ibu hamil, dan meningkatkan motivasi dan kepatuhan pengobatan KEK. Bentuk penerapan melalui *telenursing* dalam mengatasi KEK yaitu dengan pengembangan *platform telenursing* khusus untuk ibu hamil dengan KEK dan peningkatan edukasi dan promosi tentang layanan *telenursing* kepada ibu hamil (Zarcadoolas *et al.*, 2019)

Analisis intervensi untuk kekurangan energi kronik (KEK) dengan masalah keperawatan defisit pengetahuan dan defisit nutrisi dengan pemberian intervensi berbasis *Eviden Based Practice in Nursing* (EBPN) dengan melakukan intervensi peningkatan literasi kesehatan kebutuhan nutrisi ibu hamil menggunakan *telenursing* dengan media poster dan *Whatsapp Group*. Literasi kesehatan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengikuti petunjuk dengan benar (Mardani, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian (Andriani *et al.*, 2020) menyatakan bahwa pengaruh pemberian pendidikan kesehatan melalui *telenursing* efektif untuk digunakan karena *telenursing* yang dapat digunakan untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan, kualitas perawatan, dan kepuasan klien. Dengan kemajuan teknologi, *telenursing* kemungkinan akan terus berkembang dan memainkan peran yang semakin penting dalam sistem perawatan kesehatan di masa depan.

Terdapat hasil penelitian yang mendukung pentingnya edukasi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil yang dilakukan oleh (Retnaningtyas *et al.*, 2022) menyatakan bahwa



penyuluhan kesehatan mengenai “pengetahuan nutrisi pada ibu hamil”, dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang gizi seimbang untuk ibu hamil, manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil, masalah yang berhubungan dengan gizi ibu hamil, kebutuhan nutrisi pada ibu hamil, menu seimbang pada ibu hamil, tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil dan pengaruh keadaan gizi terhadap proses persalinan. Hal tersebut terbukti dari rekap hasil kuesioner sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Sebelum diberikan penyuluhan sebanyak 3 ibu hamil (30%) dengan pengetahuan baik dan setelah kegiatan terdapat peningkatan menjadi 8 ibu hamil (80%) dengan pengetahuan baik. Hal ini menunjukkan peserta sangat antusias untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya nutrisi pada ibu hamil.

Penelitian serupa dilakukan oleh (Delima *et al.*, 2023) yang menyebutkan bahwa rerata pengetahuan ibu hamil sebelum diberikan edukasi tentang gizi ibu hamil melalui media poster adalah 19,78 dan rerata pengetahuan ibu hamil sesudah diberikan edukasi tentang gizi ibu hamil melalui media poster adalah 26,61. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan edukasi tentang gizi ibu hamil melalui media poster terhadap peningkatan pengetahuan gizi ibu hamil. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Patimah *et al.*, 2022), menyatakan bahwa kelebihan atau manfaat dari pemberian pendidikan kesehatan dengan media poster yaitu mudah dipahami, mudah diakses, lebih efektif dan efisien, memiliki tampilan yang menarik, dan informasi yang diberikan lebih tahan lama. Penggunaan media poster dalam pemberian pendidikan kesehatan memiliki beberapa keunggulan yaitu media informasi yang disampaikan menarik, informasi yang mudah diterima dan dipelajari oleh ibu hamil, serta pesan yang disampaikan mudah mengadopsi perilaku positif. Hal ini menyatakan bahwa media yang menarik akan memberikan rasa percaya diri, sehingga dapat mempercepat perubahan kognitif afektif dan psikomotorik.



Penelitian tersebut didukung oleh (Mardani, 2020), yang menyatakan bahwa media sosial (*Whatsapp Group*) merupakan salah satu media online yang dapat digunakan untuk memberikan, menambah dan meningkatkan tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang preeklamsia. Media *Whatsapp* dapat mempermudah dalam memperoleh informasi tentang kesehatan kehamilannya dan dapat mempermudah untuk berdiskusi antar ibu hamil dalam mencari solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Menurut (Tamalla *et al.*, 2022), mengatakan bahwa layanan pesan teks berbasis seluler memiliki potensi dan manfaat untuk meningkatkan cakupan praktik ANC yang direkomendasikan. Pesan yang disampaikan melalui aplikasi mobile juga berpotensi mempengaruhi perilaku kesehatan ibu dan anak secara positif.

Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa penggunaan *WhatsApp group* memiliki pengaruh dalam meningkatkan pengetahuan ibu hamil sebesar 56,6% dan sikap yang menjadi positif untuk mengatasi terjadinya kekurangan energi kronik. Kemudahan dalam penggunaan, serta mudahnya berbagi informasi dengan berbagai bentuk media, membuat edukasi ini dapat diterima oleh ibu hamil dengan baik. Hasil penelitian ini menekankan bahwa perlu adanya kegiatan serupa untuk terus berbagi informasi mengenai pencegahan kekurangan energi kronik ataupun seputar kehamilan agar ibu tetap sehat dan melahirkan generasi cerdas (Melati & Afifah, 2021)

Berdasarkan beberapa pernyataan dari hasil riset diatas, peneliti berasumsi bahwa melalui edukasi kesehatan dan edukasi nutrisi menggunakan *telenursing* dengan media poster dan *whatsapp group* efektif untuk digunakan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK). Dengan adanya *telenursing* berbasis layanan jarak jauh akan menghemat biaya dan mempermudah ibu hamil yang terkendala jarak dari pusat pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

1. Studi kasus hanya fokus pada satu atau beberapa individu, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas
2. Karakteristik individu yang diteliti mungkin tidak mewakili populasi secara keseluruhan, sehingga hasil penelitian mungkin tidak berlaku untuk semua ibu hamil dengan KEK.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada tiga klien yang menjadi responden, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengkajian keperawatan pada laporan kasus ini dilakukan pada ibu hamil di Poli KIA Puskesmas Bontomarannu yang mengalami KEK dengan nilai pengukuran LILA <23,5 cm. Pengkajian dilakukan dengan metode wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan mencatat dokumentasi klien (rekam medis). Penulis melakukan pengkajian pada tiga orang klien pada tanggal 7 Desember 2024
2. Diagnosis keperawatan yang ditegakkan yaitu defisit pengetahuan, ansietas, gangguan rasa nyaman, mual, dan defisit nutrisi
3. Intervensi keperawatan yang dilakukan pada ibu hamil dengan masalah KEK adalah edukasi peningkatan literasi kesehatan dan edukasi nutrisi ibu hamil melalui *telenursing*
4. Implementasi keperawatan pemantauan nutrisi melalui pendampingan *telenursing* yang diberikan pada ketiga klien secara bertahap mulai dari tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 22 Januari 2024
5. Hasil evaluasi keperawatan yang diperoleh pada klien melalui lembar observasi *pre-test* dan *post-test* adalah terjadi peningkatan pengetahuan sehingga dinyatakan dapat teratasi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil studi kasus, ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti yang kiranya dapat menjadi pertimbangan

### 1. Bagi Puskesmas Bontomarannu

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan referensi dalam memenuhi intervensi defisit pengetahuan dan defisit nutrisi pada ibu hamil serta dapat menggunakan telenursing dalam pelayanan kesehatan, khususnya edukasi dan pendampingan bagi ibu hamil

### 2. Bagi institusi keperawatan

Dengan adanya studi kasus ini diharapkan dapat berguna atau dijadikan bahan masukan dan menjadi referensi tambahan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran untuk kemajuan profesi keperawatan dalam bidang pengetahuan dan teknologi.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti lain dapat menindak lanjuti dan menjadikan studi ini salah satu referensi yang dapat dikembangkan agar lebih sempurna dan bermanfaat serta mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai faktor lain yang dapat meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarawati, K., Rakhmawati, N., & Ekacahyaningtyas, M. (2022). Pengaruh edukasi video infografis tentang nutrisi terhadap pengetahuan ibu hamil dalam pencegahan kelahiran berat badan lahir rendah. *Naskah Publikasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Surakarta*, 36, 1–11. <https://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/3734/>
- Andriani, Y., Maidaliza, M., & Alvaensi, R. I. (2020). Pemberian Pendidikan Kesehatan Melalui Telenursing terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Pencegahan Keputihan Patologis pada Remaja. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 2(2), 81–87. <https://doi.org/10.31539/jka.v2i2.1630>
- Anggraini, & Yetti. (2017). *Asuhan Kehamilan, Persalinan Dan Nifas*. Nuha Medika.
- Anjelika, Ihsan, M. H., & Dammalewa, J. Q. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kek pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kolono Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ilmiah Karya Kesehatan*, 2(1), 25–34. <https://stikesk-kendari.e-journal.id/jikk>
- Asmirajanti, M. (2019). *Telenursing (Pelayanan Keperawatan Jarak Jauh)*. E-book Keperawatan: Health Books Publishing.
- Ayustawati. (2019). *Kehamilan : Buku Kesehatan Reproduksi*. Deepublish Publisher.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kesehatan Indonesia 2022*.
- Bahri, S. (2023). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Media Sains Indonesia.
- Boro, M. F. V., & Hariyati, R. T. S. (2020). Implementasi Telenursing Dalam Praktik Keperawatan : Studi Literatur. *Carolus Journal of Nursing*, 2(2), 161–169. <https://doi.org/10.37480/cjon.v2i2.40>
- Esin, Husaidah, S., & Jeepi, N. (2023). Pengaruh Aromaterapi Pappermint Terhadap Intensitas Mual Muntah Pada Ibu Hamil Dengan Hiperemesis Gravidarum Di Rsud Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2023. *JK: Jurnal Kesehatan*, 1(6), 814–826.
- Fadhilah Gani, N., Nurhidayah, & Hasnah. (2022). Edukasi Model Proceed-Precede untuk Meningkatkan Health Literacy Ibu Hamil di Puskesmas Bajeng, Gowa. *Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 13 Nomor 2(April), 323–329.
- Fakhriyah, Setiawan, M. I., Lasari, H. H., Zaliha, & Lestari, D. (2021). *Buku Ajar Kekurangan Energi Kronik (KEK)*. CV Mine.
- Fitriani, L., Firawati, & Raehan. (2021). *Buku Ajar Kehamilan (1st ed.)*. Deepublish

Publisher.

- Gani, N. F., Huriati, Nurhidayah, & Nur Risma. (2022). Telenursing Improving Health Literacy Among Pregnant Women. *Jurnal Life Birth*, 6(3), 133–147. <https://doi.org/10.37362/jlb.v6i3.934>
- Gogia, S. (2019). *Fundamental Of Telemedicane and Telehealth*. Stacy Masucci.
- Hapsari, Y. I., Rozi, F., Asyifa, M. N. F., Putranegara, S., & Balqis, S. P. (2022). Edukasi dan Konseling Gizi Kepada Ibu Hamil KEK. *Jurnal Bina Desa*, 4(2), 195–203.
- Hardiati, R. H., & Thasliyah, D. (2022). Kekurangan Energi Kronis (KEK) sebagai Faktor Risiko Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR): Literature Review. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2(2), 6–11. <https://doi.org/10.69503/medika.v2i2.122>
- Heryunanto, D., Putri, S., Izzah, R., Ariyani, Y., & Kharin Herbawani, C. (2022). Gambaran Kondisi Kekurangan Energi Kronis Pada Ibu Hamil Di Indonesia, Faktor Penyebabnya, Serta Dampaknya. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 1792–1805. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v6i2.4627>
- Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu* (3rd ed.). Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2023). *Pedoman Surveilans Gizi Dan KIA*.
- Kolantung, P. M., Mayulu, N., & Kundre, R. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Kehamilan Dengan Kepatuhan Melakukan Antenatal Care (Anc): Systematic Review. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 40. <https://doi.org/10.35790/jkp.v9i2.36780>
- Komariah, M., Maulana, S., Platini, H., & Pahria, T. (2021). A scoping review of telenursing's potential as a nursing care delivery model in lung cancer during the COVID-19 pandemic. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 14, 3083–3092. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S337732>
- Kurdanti, W., Khasana, T. M., & Wayansari, L. (2020). Lingkar lengan atas, indeks massa tubuh, dan tinggi fundus ibu hamil sebagai prediktor berat badan lahir. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 16(4), 168. <https://doi.org/10.22146/ijcn.49314>
- Latif. (2020). Literasi Kesehatan Mahasiswa tingkat pertama di Politeknik Negeri Media Kreatif. *Jurnal Kajian Dan Terapan Media*.
- Machfoeds, L., Sheroan, M., & Cavadjoz, H. (2018). *Keperawatan Maternitas* (8th ed.).

Elsevier Morby.

- Mardani. (2020). Peningkatan Literasi kesehatan Digital bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga di posyandu Flamboyan Kabupaten Bekasi. *Jurnal Of Dedicators Community, Vol 4, No1, 57–67.*
- Masdiah, F., Saputri, eneng emi, & Ratnasari, F. (2021). PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN PENDAPATAN KELUARGA TERHADAP KURANG ENERGI KRONIK (KEK) PADA IBU HAMIL The Effect of Knowledge Level and Family Income On Chronic Energy Lack In Pregnant Mothers. *Nusantara Hasana Journal, 1(4), 147–152.*
- Melati, I. P., & Afifah, C. A. N. (2021). Edukasi Gizi Pencegahan Stunting Berbasis Whatsapp Group Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil. *Jurnal Pangan Kesehatan Dan Gizi Universitas Binawan, 1(2), 61–69.* <https://doi.org/10.54771/jakagi.v1i2.153>
- Mulyati, Y., Novita, A., & Trisna, N. (2021). Pengaruh Relaksasi Diafragma, Relaksasi Otot Progresif dan Relaksasi Nafas terhadap Penurunan Rasa Cemas pada Ibu Hamil Trimester III. *SIMFISIS Jurnal Kebidanan Indonesia, 1(2), 66–77.* <https://doi.org/10.53801/sjki.v1i2.21>
- Nadrah, N., & Handayani, R. (2024). Edukasi Tentang Kurang Energi Kronik Dan Pemberian Makanan Isi Piringku pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Janji. *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 152–158.*
- Ningsih, N. S., & Wahyuni, I. S. (2022). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian KEK Pada Ibu Hamil. 5(2), 94–100.*
- Oktapianti, R., & Triyanti, D. (2023). *Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Kekurangan Energi Kronik Saat Hamil Melalui Penyuluhan Kesehatan Di Puskesmas Pembina Palembang. 1(2), 11–14.*
- Palifiana, D. A., & Wulandari, S. (2018). Hubungan Ketidaknyamanan dalam Kehamilan dengan Kualitas Tidur Ibu Hamil Trimester III di Klinik Pratama Asih Waluyo Jati. *Prosiding Seminar Nasional, 8, 31–40.* <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11435>
- Pastuty, R., KM, R., & Herawati, T. (2018). Efektifitas Program Pemberian Makanan Tambahan-Pemulihan Pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik Di Kota Palembang.



*Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(3), 179–188.  
<https://doi.org/10.26553/jikm.v9i3.310>

- Patimah, S., Sharief, S. A., Nukman, N., & Yusuf, R. A. (2022). Peningkatan Literasi Gizi Kesehatan Perempuan sebagai Upaya Pencegahan Malnutrisi pada Kelompok Rawan Gizi di Level Keluarga. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 580–586. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i4.3094>
- Pertiwi, H. W., Martini, T., Handayani, M., Program, ), S1, S., Stikes, K., & Utomo, E. (2020). Hubungan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Dengan Perubahan Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK). *Jurnal Kebidanan*, XII(1), 111–120.
- PPNI. (2018a). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia* (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2018b). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia* (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI, T. P. S. D. (2018c). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Pratiwi, A. sri. (2020). Risiko Kekurangan Energi Kronis (Kek) Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Payung Sekaki Pekanbaru. *Ensiklopedia of Journal*, 2(1), 184–192.
- Purwati, A. E., & Rizqiyani, A. T. (2018). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK). *Prosiding Kebidanan*, 64–68.
- Putri, A. A., Salsabila, S., Gizi, J., Kedokteran, F., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2023). Dampak Penyakit KEK Pada Ibu Hamil. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(3), 7. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i3.1525>
- Ramadhanti, S. C., & Virawati, D. I. (2023). *Effectiveness of the Booklet on Knowledge and Attitudes Regarding Prevention of Chronic Energy Deficiency Efektivitas Booklet Terhadap Pengetahuan dan Sikap Terkait Pencegahan Kekurangan Energi Kronis*. 2(10), 1683–1698.
- Retnaningtyas, E., Retnoningsih, Kartikawati, E., Nuning, Sukemi, Nilawati, D., Nurfajri, & Denik. (2022). Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Melalui Edukasi Mengenai Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 19–24.
- Riskesdas. (2018). *Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018. Data Ibu Hamil*



- Kekurangan Energi Kronik*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Risnah; Irwan, M. (2020). Falsafah Dan Teori Keperawatan Dalam Integritas Keilmuan. In *Alauddin University Press*.
- Riyanti, F. S., Usman, A. N., Nontji, W., Sunarno, I., & Syam, Y. (2023). Makanan Pantangan Pada Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK). *Journal Of Telenursing*, 4(1), 88–100.
- Royani; Asmirajanti, M. (2021). Penerapan Telenursing Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan Home Care : Kajian Literatur. *Indonesian Journal of Nursing Health Science ISSN*, 6(1), 6–15.
- Salamah, U. (2019). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri terhadap Perilaku Penanganan Dismenore. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 9, 123–127.
- Sandra, C. (2018). Penyebab Kejadian Kekurangan Energi Kronis Pada Ibu Hamil Risiko Tinggi Dan Pemanfaatan Antenatal Care Di Wilayah Kerja Puskesmas Jelbuk Jember. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(2), 136. <https://doi.org/10.20473/jaki.v6i2.2018.136-142>
- Septiani, B. D. S., & Sulistiawati, F. (2022). Edukasi Pedoman Umum Gizi Seimbang Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) di Desa Batu Kuta Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. *Abdonesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 45–49. <https://doi.org/10.69503/abdonesia.v2i2.227>
- Simbolong, D., & Rahmadi, A. (2018). *Pencegahan Dan Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) Dan Anemia Pada Ibu Hamil* (1st ed.). Deepublish Publisher.
- Snooks, K. (2014). *Pengantar Telenursing*.
- Tamalla, N. P., Azinar, M., Tamalla, P. N., & Azinar, M. (2022). Literasi Kesehatan terhadap Perilaku Perawatan Kehamilan Usia Remaja. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(1), 47–53.
- Triwahyuningsih, R. Y., & Prayugi, A. N. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil*. 8(November), 116–121.
- Ummi Kulsum, & Dyah Ayu Wulandari. (2022). Upaya Menurunkan Kejadian KEK pada Ibu Hamil Melalui Pendidikan Kesehatan. *Jurnal Pengemas Kesehatan*, 1(01), 27–30. <https://doi.org/10.52299/jpk.v1i01.6>

- Waryana, W., Sitasari, A., & Febritasanti, D. W. (2019). Intervensi media video berpengaruh pada pengetahuan dan sikap remaja putri dalam mencegah kurang energi kronik. *Action: Aceh Nutrition Journal*, 4(1), 58. <https://doi.org/10.30867/action.v4i1.154>
- WHO. (2021). *Health Literacy The Solid Fact*.
- Zaidah, U., & Maisuroh, A. (2022). Hubungan Pola Makan Ibu Hamil dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronis (KEK) di Puskesmas Dasan Lekong. *Empiricism Journal*, 3(2), 351–357. <https://doi.org/10.36312/ej.v3i2.1051>
- Zarcadoolas, C., Pleasant, A., & Greer, D. S. (2019). Understanding health literacy: An expanded model. *Health Promotion International*, 20(2), 195–203. <https://doi.org/10.1093/heapro/dah609>



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## JURNAL RUJUKAN UTAMA

JPK: Jurnal Pengemaran Kesehatan  
STIKes Bakti Utama Pati  
Vol. 08 No. 01, Agustus 2022, Hal. 27 - 30

### Upaya Menurunkan Kejadian KEK pada Ibu Hamil Melalui Pendidikan Kesehatan

Ummi Kulsum<sup>1\*</sup>, Dyah Ayu Wulandari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Muhammadiyah Kudus, <sup>2</sup>Prodi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Karya Husada Semarang  
E-mail: ummikulsum@umkudus.ac.id

**Abstrak:** Ibu hamil dengan status gizi buruk atau mengalami KEK (Kurang Energi Kronis) cenderung melahirkan bayi BBLR dan dihadapkan pada risiko kematian yang lebih besar dibanding dengan bayi yang dilahirkan ibu dengan berat badan yang normal. Sampai saat ini masih banyak ibu hamil yang mengalami 3 masalah gizi khususnya gizi kurang seperti Kurang Energi Kronik (KEK) dan anemia. Kejadian KEK dan anemia pada ibu hamil umumnya disebabkan karena rendahnya asupan zat gizi ibu selama kehamilan bukan hanya berakibat pada ibu bayi yang dilahirkannya, tetapi juga faktor risiko kematian ibu. KEK pada ibu hamil bisa disebabkan karena faktor karakteristik ibu hamil yang terdiri dari usia, tinggi badan dan berat badan. Salah satu upaya yang dapat diberikan kepada ibu hamil yang dengan KEK adalah pemberian pendidikan kesehatan tentang kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Pemberian pendidikan kesehatan diharapkan dapat menambah pengetahuan ibu hamil tentang kebutuhan nutrisi pada ibu hamil sehingga dapat mengonsumsi makanan yang mengandung gizi sehingga ibu dan janin sehat selama kehamilan dan saat melahirkan.

**Kata Kunci:** ibu hamil, KEK, gizi ibu hamil

#### Pendahuluan

Tingginya angka kematian ibu dapat terjadi karena beberapa faktor baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu faktor tidak langsung yang sangat berperan besar dalam komplikasi pada ibu hamil maupun persalinan adalah kekurangan energi. Kekurangan energi kronis merupakan suatu kondisi dimana seorang ibu hamil menderita kekurangan asupan makan yang berlangsung dalam jangka waktu lama (menahun atau kronis) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan, sehingga peningkatan kebutuhan zat gizi pada masa kehamilan tidak dapat terpenuhi. Seorang ibu hamil akan melahirkan bayi yang sehat bila tingkat kesehatan dan gizinya berada pada kondisi yang baik. Namun, sampai saat ini masih banyak ibu hamil yang mengalami masalah gizi, khususnya gizi kurang seperti kekurangan energi kronis (KEK) dan anemia gizi.

Menurut penelitian Fadli (2019), menyatakan bahwa anemia pada ibu hamil sangat dipengaruhi oleh kecukupan konsumsi tablet Fe karena ini merupakan sumber energi untuk meningkatkan produksi darah dalam tubuh. Ibu hamil yang menderita kekurangan energi kronis dan anemia mempunyai risiko kesakitan yang lebih besar terutama pada trimester III kehamilan, dibanding dengan ibu hamil normal (Ariani, 2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kekurangan energi kronis antara lain yaitu jumlah asupan makanan, umur,

**IMPLEMENTASI TELENURSING DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN :  
STUDI LITERATUR**

Maria Franciska Vianney Boro<sup>1</sup>, Rr.Tutik Sri Hariyati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Keperawatan Kepemimpinan dan Manajemen, Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Keperawatan dan Keperawatan Dasar, Universitas Indonesia

E-mail: [viawborov@gmail.com](mailto:viawborov@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pertumbuhan dan kehadiran *telenursing* di berbagai negara menunjukkan hasil yang baik. Ini terbukti menjadi alat yang efisien untuk membantu negara mengatasi hambatan geografis dan memberikan informasi perawatan kesehatan kepada penduduk. Perawat mempunyai peranan yang penting di dalamnya untuk pemberian asuhan keperawatan agar mencapai tujuan kesehatan pasien yang optimal. *Literature review* ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi dari penggunaan *telenursing* melalui pemberian asuhan keperawatan kepada kepuasan pasien oleh perawat profesional yang terintegrasi secara sistematis dan berfokus pada efektivitas hasil dari aplikasi *telenursing* itu sendiri. *Literature review* ini menggunakan PRISMA untuk menggambarkan implementasi penggunaan *telenursing* terhadap pemberian asuhan keperawatan dan kepuasan pasien. Hasil penelitian menunjukkan *telenursing* membantu meningkatkan akses yang lebih mudah memberikan kabar tentang kondisi kesehatannya setelah proses pemulihan ataupun saat mulai terkena sakitnya kepada perawat, yang telah dipercaya dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya. Adanya *telenursing* sebagai pembaharu di bidang teknologi informasi, komunikasi, memudahkan pemantauan yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk melayani masalah kesehatan secara lebih, memberikan intervensi pendidikan, atau memberikan perawatan kesehatan.

**Kata kunci:** Asuhan keperawatan; kepuasan pasien; *telehealth*; *telenursing*

**IMPLEMENTATION OF TELENURSING IN NURSING PRACTICES:  
LITERATURE STUDY**

**ABSTRACT**

The growth and presence of *Telenursing* in various countries show good results. This has proven to be an efficient tool to help countries overcome difficulties and provide health care information for the population. Nurses have an important role in nursing care assistance



## Understanding health literacy: an expanded model

CHRISTINA ZARCAOOLAS<sup>1</sup>, ANDREW PLEASANT<sup>2</sup> and  
DAVID S. GREER<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Center for the Study of Race and Ethnicity, Brown University, Providence, RI 02912, USA and

<sup>2</sup>Department of Human Ecology, Rutgers University, New Brunswick, NJ 08901, USA and

<sup>3</sup>Division of Biology and Medicine, School of Medicine, Brown University, Providence, RI 02912, USA

### SUMMARY

A long and yet unfinished history of investigating how individual capabilities and social processes explain or predict health indicates that poor education, low literacy, poor health and early death are strongly linked around the world. However, the complexity of those relationships is not fully understood. In this article, we propose an expanded model of health literacy characterized by four domains: fundamental literacy (reading, writing, speaking and numeracy), science literacy, civic literacy and cultural

literacy. To explore the utility of this model, we examine selected pieces of the public discourse about terrorism and bioterrorism that dominated the mass media during the anthrax threat in the United States during 2001. We conclude that this model of health literacy is useful to analyze health communication, to aid in constructing more understandable and appropriate health communication, and ultimately can lead to the development of a new measure to assess health literacy skills in individuals.

**Key words:** bioterrorism; literacy; health literacy; public health

### INTRODUCTION

There is a long and yet unfinished history of investigating how individual capabilities and social processes explain or predict health. As demonstrated in major policy reports such as *Healthy People 2010*, poor education, low literacy, poor health and early death are strongly linked in the United States and around the world (Grosse and Auffrey, 1989; Hohn, 1997; US Department of Health and Human Services, 2000; Schillinger *et al.*, 2002). These are particularly important areas of investigation, especially in light of the trend evident since the beginning of the 20th century that most major advances in health are due to the application of new knowledge and technologies, such as immunizations and preventive medicine (World Bank, 2002).

In this article, we explore an expanded model of health literacy demonstrating its efficacy through the examples of public communication regarding

the anthrax threat in the United States during the fall of 2001. Moments such as the anthrax attacks are when the public actively seeks information, creating real opportunities to improve health literacy. The public's worry, apparent lack of trust in government and official information and a suggested link between risk perception and complexity of information, lead us in this article to investigate the health literacy demands of anthrax messages. Proposing an expanded model of health literacy, we discuss the anthrax threat not as a communication challenge but as a series of opportunities to improve health literacy.

### HEALTH LITERACY

The term health literacy has been used to mean many things (Hohn, 1997; Rudd, 2002). The



## EDUKASI GIZI PENCEGAHAN STUNTING BERBASIS *WHATSAPP GROUP* UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL

*Nutrition education to prevent stunting by whatsapp group on improving mother's  
knowledge and attitudes during pregnancy*

Ika Putri Melati<sup>1\*</sup>, Choirul Anna Nur Afifah<sup>1</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi S1 Gizi, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri  
Surabaya, Ketintang, Surabaya, Jawa Timur, 60231

\* Penulis korespondensi. Ika Putri Melati, Program Studi S1 Gizi, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan  
Keluarga, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Gayamsari, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia,  
Telp: +6285791152249. Email: [ika.17051334028@unesa.ac.id](mailto:ika.17051334028@unesa.ac.id)

### ABSTRACT

*Stunting is a health problem that is influenced by various factors. Including the first 1000 days of life (FDL) or the golden age starting in the womb until the child is 2 years old. One of the efforts that can be done to prevent stunting is through specific nutritional interventions by preventing and directly reducing disturbances in pregnant women. This study aims to determine the effect of stunting prevention nutrition education through WhatsApp groups as a tool in increasing the knowledge and nutritional attitudes of pregnant women. This type of quantitative research uses the True Experimental method with a pretest posttest research design with control group. The sampling technique used purposive sampling. Nutritional knowledge was analyzed using Paired Sample T-Test. The attitudes of pregnant women were analyzed by using the Independent Sample T-Test. This study shows that WhatsApp group is an effective educational tool to increase the knowledge and nutritional attitudes of pregnant women. This can be used as an alternative education for pregnant women during the Covid-19 pandemic, which makes it impossible to gather in person.*

**Keywords:** attitudes; education; knowledge; stunting; whatsapp group

### ABSTRAK

*Stunting adalah salah satu masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Termasuk 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau golden age yang dimulai sejak di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting salah satunya melalui intervensi gizi spesifik dengan mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung pada ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi gizi pencegahan stunting melalui WhatsApp group sebagai alat dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap gizi ibu hamil. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan metode True Eksperimental dengan rancangan penelitian pretesti posttest with control group. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Pengetahuan gizi dianalisis dengan Paired Sample T-Test. Sikap ibu hamil dianalisis dengan Independen Sampel T-Test Penelitian ini menunjukkan bahwa WhatsApp group sebagai alat edukasi efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap gizi ibu hamil. Hal ini dapat digunakan sebagai alternatif edukasi ibu hamil di masa pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk berkumpul secara langsung.*

**Kata kunci:** edukasi; pengetahuan; sikap; stunting; whatsapp group



## Dampak Penyakit KEK Pada Ibu Hamil

Alyssa Atikah Putri<sup>1</sup>, Shella Salsabila<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Berusan Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: [19242230028@unswarta.ac.id](mailto:19242230028@unswarta.ac.id); [2482220040@unswarta.ac.id](mailto:2482220040@unswarta.ac.id)

**Abstract.** *Chronic energy shortage in pregnant women can have a number of consequences significant negative impacts on the health and development of the mother and the fetus. The study aims to analyze the impact of chronic energy deficiency on pregnant women based on an overview of the existing literature. The study involved analysis and synthesis of a variety of reliable sources that included scientific research and related health reports. Results of literature reviews suggest that chronic energy deficiency in pregnant women can lead to a variety of health problems. Pregnant women who experience chronic energy shortages have a higher risk of experiencing persistent fatigue, inhibited weight loss, and a decrease in physical strength. In addition, chronic energy shortage can also cause problems on the mother's immune system, increase the risk of infection, and affect the body's ability to recover after childbirth. To raise awareness about the dangers of chronic energy shortages on pregnant women, further research is needed to understand the underlying mechanisms and the effectiveness of appropriate interventions. Thus, this information can be used to improve prenatal care and provide the necessary support for pregnant women to ensure optimal health and development for the mother and fetus.*

**Keyword :** *Nutrition, Pregnant Women, Nutrition problems*

**Abstrak.** *Kekurangan Energi Kronis pada ibu hamil dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan dan perkembangan ibu serta janin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekurangan energi kronis pada ibu hamil berdasarkan tinjauan literatur yang ada. Studi ini melibatkan analisis dan sintesis dari berbagai sumber terpercaya yang mencakup penelitian ilmiah dan laporan kesehatan terkait. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa kekurangan energi kronis pada ibu hamil menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Ibu hamil yang mendapat kekurangan energi kronis memiliki risiko lebih tinggi mengalami kelelahan yang berkelanjutan, penurunan berat badan yang tidak diinginkan, dan penurunan kekuatan fisik. Selain itu, kekurangan energi kronis juga dapat menyebabkan masalah pada sistem kekebalan tubuh ibu, meningkatkan risiko infeksi, dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memulihkan diri setelah melahirkan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan dampak kekurangan energi kronis pada ibu hamil, diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami mekanisme yang mendasarinya dan efektivitas intervensi yang tepat. Dengan demikian, informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan perawatan prenatal dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi ibu hamil guna memastikan kesehatan dan perkembangan yang optimal bagi ibu dan janin.*

**Kata kunci :** *KEK, Ibu hamil, Gizi*




Received Maret 07, 2023; Revised April 02, 2023; Accepted Mei 28, 2023

<sup>1</sup> Alyssa Atikah Putri, [19242230028@unswarta.ac.id](mailto:19242230028@unswarta.ac.id)







POSTER MEDIA EDUKASI

# HEALTH LITERACY PADA IBU HAMIL








Health literacy adalah kapasitas untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan yang diperlukan untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat.


### Manfaat HEALTH LITERACY bagi ibu hamil

-  **Pengetahuan kesehatan meningkat**
-  **Rutin melakukan pemeriksaan kehamilan**
-  **Makan makanan yang sehat**
-  **Perawatan diri jadi lebih baik**
-  **Berolahraga yang teratur selama hamil**


### Cara meningkatkan HEALTH LITERACY

-  **Rajin mencari informasi terkait kesehatan semasa kehamilan**
-  **Rajin membaca informasi terkait kesehatan semasa kehamilan**
-  **Menanyakan informasi yang belum di ketahui ke petugas kesehatan**


### Dimana ibu dapat mendapatkan informasi kesehatan



**Rumah sakit, Puskesmas & klinik Kesehatan**









**Petugas kesehatan seperti dokter, bidan, perawat & apoteker**



**Media kesehatan digital dan non digital**


Sumber informasi digital dapat diakses pada aplikasi:

# KEBUTUHAN NUTRISI IBU HAMIL



Nutrisi ibu hamil merupakan salah satu faktor utama penentu kesehatan ibu dan janin. Kurangnya asupan nutrisi selama kehamilan dan gaya hidup yang kurang baik, membuat janin berisiko lebih tinggi mengalami gangguan berat badan lahir rendah, hambatan tumbuh kembang, hingga cacat bawaan lahir.



Asam Folat, Kolin, dan DHA sangat penting untuk ibu hamil trimester 1 karena pada masa janin terbentuk dapat membantu pembentukan jaringan, sel otak, hingga sel lainnya.

Zat Besi, Vitamin C, Serat, Asam Lemak, Omega-3 sangat diperlukan untuk kehamilan trimester 2. Karena pada tahap ini janin mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga pemenuhan nutrisinya harus diperhatikan.



Pada saat trimester 3 ibu hamil membutuhkan banyak nutrisi untuk menyiapkan persalinan. Konsumsi kebutuhan karbohidrat dan lemak yang memadai untuk sumber tenaga saat persalinan.



### DOKUMENTASI KEGIATAN









Lampiran 4

**DOKUMENTASI LEMBAR HASIL OBSERVASI**

Klien 1

**LEMBAR OBSERVASI PRE TEST**

Nama (inisial) : Ny. A 7 Desember 2023.  
 Usia : 18 Tahun

No	Aspek Yang Dinilai	Ya	Tidak
1	Ibu mengetahui definisi literasi kesehatan		✓
2	Ibu mengetahui manfaat literasi kesehatan		✓
3	Ibu mengetahui tempat mengakses informasi kesehatan		✓
4	Ibu mengetahui jenis kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil sesuai usia kehamilan		✓
5	Ibu mampu mengonsumsi makanan sesuai anjuran usia kehamilan diantaranya: karbohidrat (nasi, jagung, singkong), protein (telur, tahu, tempe), asam folat (ayam, ikan, daging), vitamin (sayur dan buah), zat besi (sayuran hijau), kalsium (susu)		✓

**LEMBAR OBSERVASI POST TEST**

Nama (inisial) : Ny. A 22 Januari 2024  
 Usia : 18 Tahun

No	Aspek Yang Dinilai	Ya	Tidak
1	Ibu mengetahui definisi literasi kesehatan	✓	
2	Ibu mengetahui manfaat literasi kesehatan	✓	
3	Ibu mengetahui tempat mengakses informasi kesehatan	✓	
4	Ibu mengetahui jenis kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil sesuai usia kehamilan	✓	
5	Ibu mampu mengonsumsi makanan sesuai anjuran usia kehamilan diantaranya: karbohidrat (nasi, jagung, singkong), protein (telur, tahu, tempe), asam folat (ayam, ikan, daging), vitamin (sayur dan buah), zat besi (sayuran hijau), kalsium (susu)	✓	

klien 2

### LEMBAR OBSERVASI PRE TEST

Nama (inisial) : Ny. H

09 desember 2023.

Usia : 25 Tahun

No	Aspek Yang Dinilai	Ya	Tidak
1	Ibu mengetahui definisi literasi kesehatan		✓
2	Ibu mengetahui manfaat literasi kesehatan		✓
3	Ibu mengetahui tempat mengakses informasi kesehatan	✓	
4	Ibu mengetahui jenis kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil sesuai usia kehamilan		✓
5	Ibu mampu mengonsumsi makanan sesuai anjuran usia kehamilan diantaranya: karbohidrat (nasi, jagung, singkong), protein (telur, tahu, tempe), asam folat (ayam, ikan, daging), vitamin (sayur dan buah), zat besi (sayuran hijau), kalsium (susu)		✓

### LEMBAR OBSERVASI POST TEST

Nama (inisial) : Ny. H

22 Januari 2024

Usia : 25 Tahun

No	Aspek Yang Dinilai	Ya	Tidak
1	Ibu mengetahui definisi literasi kesehatan	✓	
2	Ibu mengetahui manfaat literasi kesehatan	✓	
3	Ibu mengetahui tempat mengakses informasi kesehatan	✓	
4	Ibu mengetahui jenis kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil sesuai usia kehamilan	✓	
5	Ibu mampu mengonsumsi makanan sesuai anjuran usia kehamilan diantaranya: karbohidrat (nasi, jagung, singkong), protein (telur, tahu, tempe), asam folat (ayam, ikan, daging), vitamin (sayur dan buah), zat besi (sayuran hijau), kalsium (susu)	✓	

Klien 3

### LEMBAR OBSERVASI PRE TEST

Nama (inisial): Ny. U

7 Desember 2023.

Usia : 21 Tahun

No	Aspek Yang Dinilai	Ya	Tidak
1	Ibu mengetahui definisi literasi kesehatan		✓
2	Ibu mengetahui manfaat literasi kesehatan		✓
3	Ibu mengetahui tempat mengakses informasi kesehatan	✓	
4	Ibu mengetahui jenis kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil sesuai usia kehamilan	✓	
5	Ibu mampu mengonsumsi makanan sesuai anjuran usia kehamilan diantaranya: karbohidrat (nasi, jagung, singkong), protein (telur, tahu, tempe), asam folat (ayam, ikan, daging), vitamin (sayur dan buah), zat besi (sayuran hijau), kalsium (susu)		✓

### LEMBAR OBSERVASI POST TEST

Nama (inisial): Ny. U

22 Januari 2024

Usia : 21 Tahun

No	Aspek Yang Dinilai	Ya	Tidak
1	Ibu mengetahui definisi literasi kesehatan	✓	
2	Ibu mengetahui manfaat literasi kesehatan	✓	
3	Ibu mengetahui tempat mengakses informasi kesehatan	✓	
4	Ibu mengetahui jenis kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil sesuai usia kehamilan	✓	
5	Ibu mampu mengonsumsi makanan sesuai anjuran usia kehamilan diantaranya: karbohidrat (nasi, jagung, singkong), protein (telur, tahu, tempe), asam folat (ayam, ikan, daging), vitamin (sayur dan buah), zat besi (sayuran hijau), kalsium (susu)	✓	



Sumber Makanan	Implementasi Pemantauan Nutrisi											
	Klien 1 (Ny. A)				Klien 2 (Ny. H)				Klien 3 (Ny. U)			
Karbohidrat (nasi, jagung, singkong)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protein (tempe, tahu, telur)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asam folat (ikan, ayam, daging)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vitamin (buah-buahan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zat besi (sayuran hijau)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kalsium (susu)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Karya Tulis Akhir yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Hamil Dengan Masalah Kekurangan Energi Kronik (KEK) Melalui Peningkatan Literasi Kesehatan Menggunakan *Telenursing* Di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa ” bernama lengkap Rabiyatul Awaliyah, lahir di Raha pada tanggal 25 Mei 2002, alamat Perumahan Bukit Baruga Jalan Kayu Agung II No.19. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari bapak La Sarimin, S.Pd.,M.Pd dan ibu Siti Nurhayati, S.Pd. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 10 Wakorumba Selatan pada tahun 2007-2013, selanjutnya pada tahun 2013-2016 penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Wakorumba Selatan, selanjutnya pada tahun 2016-2019 penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Raha mengambil jurusan IPA. Karena keinginan orang tua serta kecintaannya terhadap dunia kesehatan akhirnya penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jurusan Keperawatan jalur SPAN-PTKIN pada tahun 2019. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan program sarjananya pada tahun 2023 dan memperoleh gelar S.Kep. Kemudian tidak sampai disitu, penulis bertekad kuat untuk melanjutkan pendidikan pada Profesi Ners UIN Alauddin Makassar pada tahun 2023. Penulis pernah aktif di beberapa organisasi internal dan eksternal kampus, penulis aktif di organisasi yaitu HMJ Keperawatan, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia. Penulis memiliki motto hidup “Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya.”

