

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN *TRAUMATIC BRAIN INJURY*  
DENGAN MASALAH HIPOTERMIA MENGGUNAKAN INTERVENSI  
*BLANKET WARMER* DI RSUP WAHIDIN SUDIROHUSODO  
MAKASSAR**



**TUGAS AKHIR NERS**

**Oleh:**

**HIJRIYAH FEBRIELA, S.KEP**

**NIM: 70900123015**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2024**

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN *TRAUMATIC BRAIN INJURY*  
DENGAN MASALAH HIPOTERMIA MENGGUNAKAN INTERVENSI  
*BLANKET WARMER* DI RSUP WAHIDIN SUDIROHUSODO  
MAKASSAR**



**TUGAS AKHIR NERS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Ners Jurusan Keperawatan  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**HIJRIYAH FEBRIELA, S.KEP**

**NIM: 70900123015**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hijriyah Febriela, S.Kep

NIM : 70900123015

Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 15 Maret 2002

Jurusan/Prodi : Program Profesi Ners

Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Samata, Gowa

Judul : Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Traumatic Brain Injury* dengan masalah hipotermia menggunakan intervensi *blanket warmer* di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 15 Maret 2024

Penulis,

Hijriyah Febriela, S.Kep

NIM: 70900123015

## PENGESAHAN KARYA TULIS AKHIR NERS

### LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS AKHIR

Tugas akhir Ners yang berjudul "Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Traumatic Brain Injury post craniotomy* dengan masalah hipotermia menggunakan intervensi *blanket warmer* di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar", yang disusun oleh Hijriyah Febriela, S.Kep, Nim: 70900123015, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada 14 Juni 2023 bertepatan dengan 07 dzulhijjah 1445, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 07 Juni 2024  
Dzulhijjah 1445 H

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes  
Sekretaris : Eny Sutria, S. Kep., Ns., M. Kes  
Munaqisy 1 : Ardian Adhiwijaya, S. kep., Ns., M. Kep  
Munaqisy 2 : Titi Mildawati, S. Pd., M. Pd. I  
Pembimbing 1 : Ilhamsyah, S. Kep., Ns., M. Kep  
Pembimbing 2 : Andi Budiyanto Adi Putra, S. Kep., Ns., M. Kep

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan UIN Alauddin Makassar



dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes  
NIP: 19810621 200604 2 005

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tugas akhir ners yang berjudul “Asuhan Keperawatan Pada Pasien “*Traumatic Brain Injury* dengan masalah hipotermia menggunakan intervensi *blanket warmer* di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.Og.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, pimpinan fakultas sejawaran, serta Staf Akademik yang telah membantu administrasi penulis.
3. Ibunda Dr. Hasnah, S.Sit.,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Program Studi Profesi Ners dan Ibu Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Sekretaris Program

Studi Profesi Ners beserta staf dan dosen pengajar yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan ikhlas dan sabar kepada penulis.

4. Ilhamsyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing I dan Andi Budiyanto Adi Putra ,S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan bantuannya sehingga penulis mampu merampungkan tugas akhir ini.
5. Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku penguji I dan Ibunda Titi Mildawati, S.Pd.I., M.Pd selaku penguji II karena telah meluangkan waktu untuk memberikan saran an kritik yang membangun untuk perbaikan tugas akhir ini.
6. Kepala Ruangan ICU beserta jajarannya di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pemberian asuhan keperawatan
7. Kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya yakni ibu dan ayah saya tercinta. Ibu St. Roslaela, B dan Ayah saya Nuryanto Dg.Ngemba. Dua orang hebat yang selalu menjadi penyemangat dan pendengar yang baik, yang tidak pernah henti dan kenal lelah berjuang demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa sampai titik ini. Tanpa do'a dan dukungan dari ibu dan ayah penulis tidak mungkin bisa sampai titik ini. Sehat selalu, lapang rezekinya serta hiduplah lebih lama lagi ibu dan ayah. Perjalanan dan pencapaian penulis tidak ada apa-apanya tanpa kalian. Untuk itu hiduplah lebih lama ayah dan ibu, aamiin paling manjurku.

8. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberi motivasi dan doanya. Terima kasih telah menjadi penyemangat yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini.
9. Kepada teman-teman saya semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya
10. Terakhir, terima kasih untuk sendiri karena mampu berusaha, berjuang dan bertahan sampai sejauh ini.

Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja terjadi. Bahwa kesalahan tersebut murni dari penulis sebagai manusia dan segala hal positif serta yang bermanfaat dalam tulisan ini datangnya dari Allah SWT. Penulis sangat berkenan menerima kritik dan saran untuk melengkapi tugas akhir ini. Penulis berharap ada banyak manfaat yang dapat diambil, bahwa tulisan-tulisan ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 15 Maret 2024

Penulis,

Hijriyah Febriela, S.Kep

NIM: 70900123015

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Konsep Medis <i>Traumatic Brain Injury</i> .....	7
2.2 Konsep Asuhan Keperawatan <i>Traumatic Brain Injury</i> .....	20
2.3 <i>Evidence Based Practice in Nursing</i> (EBPN) .....	31
2.4 Konsep Teori Keperawatan .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV LAPORAN KASUS.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
5.1 Analisis Asuhan Keperawatan.....	74
5.2 Analisis <i>Evidence Based Practice In Nursing</i> .....	88
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	91
<b>BAB VI KESIMPULAN.....</b>	<b>93</b>
6.1 Kesimpulan.....	93
6.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN.....	98

## ABSTRAK

Nama : Hijriyah Febriela, S.Kep

Nim : 70900123015

Judul : Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Traumatic Brain Injury* dengan masalah hipotermia menggunakan intervensi *blanket warmer* di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar

---

**Latar belakang :** *Traumatic Brain Injury* (TBI) merupakan salah satu penyebab kecacatan bahkan kematian di dunia. Data WHO 2023 menunjukkan 7,3 juta jiwa yang mengalami trauma kepala akibat kecelakaan yang menewaskan dunia. Berdasarkan data dari Riskesdas 2023 prevalensi cedera kepala sebesar 11,9% terjadi di Indonesia. Gorontalo menempati urutan pertama dengan cedera kepala terbanyak yaitu 7,3 %. Sementara itu di Sulawesi dengan prevalensi 7,1%. Adapun faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi pasien yang menjalani perawatan dengan masalah trauma kepala setelah dilakukan operasi kraniotomi di *Intensive Care Unit* (ICU) seperti penurunan kesadaran, edema serebral, dilatasi pupil, peningkatan tekanan intrakranial dan lesi lainnya serta penurunan dan kenaikan suhu merupakan masalah yang sering terjadi pada kasus cedera otak traumatis. Penanganan hipotermia dapat secara farmakologis dan nonfarmakologis. Terapi nonfarmakologis yang dapat diberikan salah satunya adalah penggunaan *blanket warmer*. **Tujuan :** Penelitian ini untuk melihat hasil penggunaan *blanket warmer* pada pasien *traumatic brain injury* dengan masalah hipotermia di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. **Metode :** Metode yang digunakan yakni studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pemeriksaan fisik serta dokumentasi. **Hasil :** Setelah diberikan intervensi selama 3 hari berturut-turut pasien mengalami peningkatan suhu rata-rata 0,3°C. **kesimpulan :** Berdasarkan dari hasil evaluasi, didapatkan bahwa penerapan *blanket warmer* dapat membantu meningkatkan suhu tubuh pasien yang mengalami hipotermia.

**Kata Kunci :** *Traumatic Brain Injury*, Hipotermia, *Blanket Warmer*

# BAB I

## PEDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Traumatic brain injury* (Trauma Kepala) ialah sebagai gangguan pada fungsi normal otak yang bisa disebabkan oleh benturan, pukulan atau sentakan kepada kepala atau cedera kepala yang tembus. Trauma kepala mampu menyebabkan gangguan serta kerusakan struktur pada otak seperti kerusakan perenkim otak, kerusakan pembuluh darah otak, edema otak, perdarahan di otak, serta penurunan sirkulasi jaringan di otak akibat penurunan O<sub>2</sub> ke otak sehingga terjadi penurunan GCS dimana kondisi tersebut harus segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Terdapat faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi pasien yang menjalani perawatan dengan masalah trauma kepala seperti penurunan kesadaran, edema serebral, dilatasi pupil, peningkatan tekanan intak dan lesi lainnya serta penurunan dan kenaikan suhu merupakan masalah yang sering terjadi pada kasus cedera otak traumatis (Fahmi, 2022).

Secara global kejadian trauma kepala mengalami peningkatan akibat meningkatnya penggunaan kendaraan. Berdasarkan data dari (WHO), 2023) diperkirakan terdapat 7,3 juta jiwa mengalami kematian akibat trauma kepala yang disebabkan kecelakaan dan kini *traumatic brain injury* ini menjadi pembunuh utama yang ada saat ini. Kejadian cedera kepala di Amerika kurang lebih terdapat 3,04 juta setiap tahunnya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sebanyak 10% meninggal dunia sebelum sampai di Rumah Sakit. Sedangkan di negara Indonesia sendiri, kejadian cedera kepala merupakan salah satu ancaman

yang cukup serius. Berdasarkan data dari Depkes RI tahun 2023 menyatakan bahwa kejadian cedera kepala menjadi urutan kedua penyakit terbanyak di RS yang ada di Indonesia yang menyebabkan kematian sebesar 6,5%. Prevalensi cedera kepala tertinggi di Indonesia khususnya di Sulawesi yaitu ditemukan di Sulawesi Selatan sebesar 12.8% .

Berdasarkan data Riskesdas 2023, prevalensi cedera kepala sebesar 11,9% terjadi di Indonesia. Gorontalo menempati urutan pertama dengan cedera kepala terbanyak yaitu 7,3 %. Sementara itu di Sulawesi dengan prevalensi 7,1%. Penyebab cedera kepala paling banyak terjadi pada kecelakaan mobil yaitu 36,08 %. Rata-rata pada individu yang mengalami cedera kepala terjadi luka pada kepala, luka pada tubuh bagian bawah dan bagian atas dengan kesamaan 67,9 % dan 32,7 % (Kementerian Kesehatan, 2021)

Dari hasil observasi selama pelayanan di ruang rawat intensif Care Unit RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar terdapat 2 pasien trauma kepala dimana salah satu diantaranya mengalami hipotermia. Hipotermia menyebabkan penurunan aliran darah ke otak yang bisa memperburuk kerusakan otak. Mengingat masalah hipotermia dan tingginya angka kecacatan dan kematian pada pasien cedera kepala, maka diperlukan penanganan yang tepat. Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan penanganan yang tepat untuk mengatasi masalah hipotermia pada kasus ini. Penatalaksanaan intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hipotermia/penurunan suhu tubuh salah satunya dengan penggunaan *blanket warmer* (Fitriani et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian (Restu, 2023) menunjukkan hasil pemberian *blanket warmer* selama pada pasien hipotermia mengalami kenaikan suhu sebesar 1,2 derajat celsius. Sama halnya dengan penelitian (Febriani et al., 2020) didapatkan hasil peningkatan suhu tubuh 1,3 derajat celsius dengan waktu pemberian *blanket warmer* 60 menit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perawat diruang ICU mengatakan bahwasanya diruangan ICU sudah menerapkan penggunaan *blanket warmer* untuk pasien hipotermia/hipertermia akan tetapi penggunaan tidak terlalu diperhatikan, *blanket warmer* biasanya diberikan setelah handover dan hanya dicek pas akan handover selanjutnya. Sehingga tidak diketahui apakah ada perubahan suhu setelah digunakan *blanket warmer* secara mandiri tanpa pemberian farmakologis selama shift.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menerapkan hasil penelitian tentang penggunaan *blanket warmer* yang diberikan pada pasien traumatic brain injury yang mengalami penurunan suhu tubuh (hipotermia), guna untuk meningkatkan suhu tubuh/menormalkan suhu tubuh di ruangan ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana asuhan keperawatan pada pasien *traumatic brain injury* yang mengalami hipotermia di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

## 1.3 Tujuan

### 1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien *traumatic brain injury* dengan masalah hipotermia menggunakan intervensi *Blanket Warmer* di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Melakukan pengkajian keperawatan pada pasien *traumatic brain injury* yang mengalami hipotermia di ruang *Intensive Care Unit (ICU)* RSUP Wahidin Sudirohusodo
- b. Menentukan diagnosis keperawatan pada pasien *traumatic brain injury* yang mengalami hipotermia di ruang *Intensive Care Unit (ICU)* RSUP Wahidin Sudirohusodo
- c. Menyusun intervensi keperawatan pada pasien *traumatic brain injury* yang mengalami hipotermia di ruang *Intensive Care Unit (ICU)* RSUP Wahidin Sudirohusodo
- d. Melaksanakan implementasi keperawatan pada pasien *traumatic brain injury* yang mengalami hipotermia di ruang *Intensive Care Unit (ICU)* RSUP Wahidin Sudirohusodo
- e. Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien *traumatic brain injury* yang mengalami hipotermia di ruang *Intensive Care Unit (ICU)* RSUP Wahidin Sudirohusodo
- f. Mengetahui analisis asuhan keperawatan dengan intervensi *Blanket Warmer* pada pasien *traumatic brain injury* yang mengalami

hipotermia di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) RSUP Wahidin Sudirohusodo

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Tugas akhir ners ini dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis keperawatan, atau sebagai alternatif pemecahan masalah pada pasien *traumatic brain injury* dengan masalah keperawatan hipotermia di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) RSUP Wahidin Sudirohusodo

### **1.4.2 Manfaat Aplikatif**

#### a. Bagi Keluarga

Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi media dalam meningkatkan pengetahuan untuk mengatasi masalah terhadap anggota keluarga yang mengalami hipotermia, serta dapat menjadi acuan keluarga agar dapat membantu pasien dalam mengurangi komplikasi yang akan disebabkan oleh masalah *traumatic brain injury* dengan masalah hipotermia

#### b. Bagi Petugas

Diharapkan tugas akhir ini dapat menjadi acuan dalam penyampaian intervensi *Blanket Warmer* dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus *traumatic brain injury* dengan masalah keperawatan hipotermia menggunakan intervensi *Blanket Warmer*, dalam perawatan kesehatan di masyarakat

c. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan tugas akhir ini dapat menjadi referensi pembelajaran atau berkontribusi dalam program tridharma, khususnya terkait dengan pemberian asuhan keperawatan, khususnya terkait dengan pemberian intervensi *blanket warmer*. Pada kasus *traumatic brain injury* dengan masalah keperawatan seperti hipotermia



UNIVERSITAS  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Medis *Traumatic Brain Injury***

##### **2.1.1 Definisi *Traumatic Brain Injury***

*Traumatic Brain Injury* (TBI) adalah cedera otak akut yang disebabkan oleh benturan energi mekanik di kepala dari kekuatan eksternal. Identifikasi klinis TBI mencakup satu atau lebih kriteria berikut: kebingungan atau disorientasi, kehilangan kesadaran, amnesia pasca-trauma, atau kelainan neurologis lainnya (gejala neurologis fokal, kejang, lesi intrakranial) (Peterson et al., 2022).

*Traumatic Brain Injury* (TBI) adalah cedera otak yang diakibatkan oleh kekuatan mekanik yang menghasilkan deformasi jaringan pada saat cedera dengan kerusakan langsung pada pembuluh darah, akson, neuron, dan glia (Pahlawi & Nurmartha, 2023).

*Traumatic Brain Injury* (TBI) adalah gangguan pada fungsi normal otak yang dapat disebabkan oleh pukulan, benturan atau sentakan pada kepala, kepala secara tiba-tiba dan keras membentur suatu benda atau ketika suatu benda menembus tengkorak dan memasuki jaringan otak (Hellty, 2023).

### 2.1.2 Etiology *Traumatic Brain Injury*

Penyebab umum TBI adalah (Erny, 2019):

- a. Kecelakaan lalu lintas atau berkendara (termasuk kendaraan mobil, sepeda motor, dan kendaraan off-road)
- b. Gaya akselerasi/deselerasi pada kepala, seperti cedera olahraga (sepak bola) atau sindrom bayi terguncang (*shaken baby syndrome*).
- c. Setiap benturan langsung ke kepala, yang dapat berupa cedera tak sengaja dalam olahraga atau akibat tindakan kekerasan.
- d. Cedera akibat ledakan atau luka tembak, seperti yang dialami oleh tentara selama perang

Menurut Nanda (2021), mekanisme cedera kepala meliputi akselerasi, deselerasi, akselerasi-deselerasi, coup-contecoup, dan cedera rotasi.

- a. Cedera Akselerasi terjadi saat benda bergerak seperti saat tongkat mengenai kepala atau peluru yang ditembakkan ke kepala.
- b. Cedera Deselerasi terjadi ketika kepala yang bergerak membentur benda diam, seperti jatuh atau kecelakaan mobil dimana kepala membentur kaca depan mobil.
- c. Cedera akselerasi dan deselerasi sering terjadi pada kecelakaan bermotor dan kekerasan fisik.
- d. Cedera coup-ountre-coup terjadi ketika benturan pada kepala menyebabkan otak bergerak di dalam ruang tengkorak dan

mengerahkan kekuatan pada area tengkorak yang berlawanan dan area kepala yang menerima pukulan awal. Misalnya pasien mendapat pukulan di leher.

- e. Cedera rotasi terjadi ketika pukulan/benturan menyebabkan otak berputar di dalam rongga tengkorak, yang mengakibatkan peregangan atau robeknya neuron di substansi alba serta pecahnya pembuluh darah yang menghubungkan otak ke bagian dalam rongga tengkorak.

### **2.1.3 Patofisiologi *Traumatic Brain Injury***

Otak di lindungi dari cedera oleh rambut, kulit, dan tulang yang membungkusnya. Tanpa perlindungan ini, otak yang lembut (yang membuat kita seperti adanya) akan mudah sekali terkena cedera dan mengalami kerusakan. Cedera memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan berat ringannya konsekuensi patofisiologis dari suatu trauma kepala. Lesi pada kepala dapat terjadi pada jaringan luar dan dalam rongga kepala. Lesi jaringan luar terjadi pada kulit kepala dan lesi bagian dalam terjadi pada tengkorak, pembuluh darah tengkorak maupun otak itu sendiri. Terjadinya benturan pada kepala dapat terjadi pada 3 jenis keadaan, yaitu :

- a. Kepala diam dibentur oleh benda yang bergerak
- b. Kepala yang bergerak membentur benda yang diam
- c. Kepala yang tidak dapat bergerak karena bersandar pada benda yang lain dibentur oleh benda yang bergerak (kepala tergencet).

Terjadinya lesi pada jaringan otak dan selaput otak pada cedera kepala diterangkan oleh beberapa hipotesis yaitu getaran otak, deformasi tengkorak, pergeseran otak dan rotasi otak. Dalam mekanisme cedera kepala dapat terjadi peristiwa *contre coup* dan *coup*. *Contre coup* dan *coup* pada cedera kepala dapat terjadi kapan saja pada orang-orang yang mengalami percepatan pergerakan kepala. Cedera kepala pada *coup* disebabkan hantaman pada otak bagian dalam pada sisi yang terkena sedangkan *contre coup* terjadi pada sisi yang berlawanan dengan daerah benturan. Keadaan ini terjadi ketika pengereman mendadak pada mobil/motor. Otak pertama kali akan menghantam bagian depan dari tulang kepala meskipun kepala pada awalnya bergerak ke belakang. Sehingga trauma terjadi pada otak bagian depan. Karena pergerakan ke belakang yang cepat dari kepala, sehingga pergerakan otak terlambat dari tulang tengkorak, dan bagian depan otak menabrak tulang tengkorak bagian depan.

Pada keadaan ini, terdapat daerah yang secara mendadak terjadi penurunan tekanan sehingga membuat ruang antara otak dan tulang tengkorak bagian belakang dan terbentuk gelembung udara. Pada saat otak bergerak ke belakang maka ruangan yang tadinya bertekanan rendah menjadi tekanan tinggi dan menekan gelembung udara tersebut. Terbentuknya dan kolapsnya gelembung yang mendadak sangat berbahaya bagi pembuluh darah otak karena terjadi penekanan, sehingga daerah yang memperoleh suplai darah dari pembuluh tersebut dapat terjadi kematian sel-sel otak. Begitu juga bila terjadi pergerakan kepala ke depan (Dafriani et al., 2021).

Cedera kepala terjadi akibat trauma kepala. Trauma yang dapat menyebabkan cedera kepala antara lain tidak sengaja jatuh, kecelakaan mobil dan bermotor, benturan dengan benda tajam dan tumpul, benturan dengan benda bergerak, dan benturan kepala pada benda yang tidak bergerak. Cedera kepala secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kepala, yang mengakibatkan cedera pada kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, dan kerusakan jaringan otak serta gangguan saraf (Manurung, 2020).

Pasien trauma kepala mengalami perdarahan intrakranial, peningkatan tekanan intrakranial, dan penurunan tekanan perfusi serebral. Saat kondisinya memburuk, terjadi bradikardi (penurunan detak jantung) dan bahkan penurunan frekuensi respirasi. Tekanan darah di otak terus meningkat dan semua fungsi vital terganggu, mengakibatkan hilangnya kesadaran bahkan kematian (Restu, 2023).

#### **2.1.4 Klasifikasi *Traumatic Brain Injury***

Klasifikasi Trauma kepala diklasifikasikan menurut nilai dari Glasgow Coma Scale (GCS) yaitu:

a. Ringan

- 1) GCS = 13 – 15
- 2) Kehilangan kesadaran atau amnesia dapat terjadi, tetapi berlangsung kurang dari 30 menit
- 3) Tidak ada kontusio tengkorak, tidak ada fraktur cerebral, hematoma

b. Sedang

- 1) GCS = 9 – 12
- 2) Kehilangan kesadaran dan/atau amnesia lebih dari 30 menit tetapi kurang dari 24 jam
- 3) Dapat mengalami atau mungkinginterjadi fraktur tengkorak.

c. Berat

- 1) GCS = 3 – 8
- 2) Kehilangan kesadaran dan/atau terjadi amnesia lebih dari 24 jam
- 3) Juga meliputi atau termasuk kontusio serebral, laserasi, atau hematoma intrakranial (Indrawati et al., 2020)

Menurut (Brunner and Suddarth, 2020), trauma kepala terbagi menjadi dua yaitu:

a. Cedera kepala terbuka

Cedera kepala dengan fraktur tengkorak atau luka tembus, luasnya cedera kepala pada jenis ini ditentukan oleh massa dan bentuk dari benturan, kerusakan otak juga dapat terjadi bila tulang tengkorak menembus jaringan otak serta mencederai saraf kranial, dura meter, jaringan sel otak oleh benda tajam/tembakan, luka terbuka di kepla memungkinkan kuman patogen abses langsung ke otak.

b. Cedera kepala tertutup

Benturan kranial pada jaringan otak dikranium adalah syok mendadak. Dampaknya mirip dengan pergerakan benda yang

bergerak cepat, lalu berhenti tiba-tiba dan menumpahkan cairan.

Cedera kepala tertutup adalah kombusio geger otak.

### **2.1.5 Manifestasi Klinis *Traumatic Brain Injury***

Gejala yang ditimbulkan tergantung pada ukuran dan distribusi cedera/kerusakan otak

#### **a. Cedera Kepala Ringan (GCS 13-15)**

- 1) Kebingungan pada saat kejadian dan kebingungan yang berlanjut setelah cedera
- 2) Pusing terus-menerus dan sakit kepala, sulit tidur, gelisah
- 3) Sulit berkonsentrasi, pelupa, gangguan bicara, masalah perilaku. Gejala ini dapat berlangsung selama sehari-hari, berminggu-minggu atau lebih lama setelah konkusio cedera otak akibat trauma ringan

#### **b. Cedera kepala sedang (GCS 9-12)**

- 1) Merasakan lemah pada salah satu tubuh disertai kebingungan bahkan koma
- 2) Kehilangan kesadaran, kelainan pupil, defisit neurologis onset mendadak, perubahan TTV, gangguan penglihatan dan pendengaran, disfungsi sensorik, kejang otot, sakit kepala, pusing dan gangguan gerak

#### **c. Cedera kepala berat (GCS 3-8)**

- 1) Amnesia Tidak dapat mengingat kejadian sesaat sebelum dan sesudah terjadinya penurunan kesehatan

- 2) Pupil tidak aktual, pemeriksaan motorik tidak aktual/nyata, adanya cedera terbuka, fraktur tengkorak, dan kerusakan neurologis
- 3) Nyeri yang terus-menerus atau terlokalisir biasanya menandakan adanya fraktur.
- 4) Fraktur pada kubah kranial, akan menyebabkan pembengkakan pada area tersebut (Iskandar, 2017)

Secara morfologis cedera kepala dapat meliputi fraktur kranium, kontusio, perdarahan, dan cedera difus.

1. Fraktur kranium

Fraktur tulang tengkorak (kranium) dapat terjadi di bagian atas atau di dasar tengkorak (basiscranii) dan dapat berbentuk lurus atau linear serta terbuka atau tertutup. Pada fraktur tengkorak terbuka, robekan pada dura mater dapat menciptakan hubungan antara cedera pada kulit kepala dan permukaan otak.

2. Lesi Intrakranial

Lesi intrakranial dapat diklasifikasikan sebagai fokal atau difus, walaupun kedua jenis lesi ini sering muncul bersamaan. Cedera fokal meliputi perdarahan epidural, perdarahan subdural, memar (hematoma intraserebral), dan perdarahan intraserebral

3. Cedera otak difusi

Cedera otak difusi berkisar dari gegar otak ringan, dimana CT scan normal, hingga cedera hipoksia-iskemik berat. Cedera otak

difus yang parah biasanya disebabkan oleh hipoksia, iskemia otak yang berkepanjangan atau syok, atau periode apnea yang terjadi segera setelah trauma. Dalam kasus seperti itu, CT scan pertama sering menunjukkan tampilan normal, atau tampilan otak yang membengkak secara merata tanpa area putih atau abu-abu yang signifikan. Anomali difus lain yang umum terjadi pada cedera deselerasi, dapat memiliki banyak titik perdarahan di belahan otak yang berbatasan dengan area putih abu-abu

#### 4. Perdarahan epidural

Perdarahan epidural relatif jarang, lebih kurang 0,5% dari semua cedera otak dan 9% dari pasien yang mengalami koma. Hematom epidural itu secara tipikal berbentuk bikonveks atau cembung sebagai akibat dari pendorongan perdarahan terhadap duramater yang sangat melekat di tabula interna tulang kepala. Perdarahan ini sering terjadi pada area temporal atau temporoparietal dan biasanya disebabkan oleh robeknya arteri meningea media akibat fraktur tulang Tengkorak

#### 5. Perdarahan subdural

Perdarahan subdural lebih sering terjadi daripada perdarahan epidural, kira-kira 30% dari cedera otak berat. Perdarahan ini sering terjadi akibat robekan pembuluh darah atau vena-vena kecil di permukaan korteks serebri. Berbeda dengan perdarahan epidural yang berbentuk lensa cembung pada CT scan,

perdarahan subdural biasanya mengikuti dan menutupi permukaan hemisfer otak. Perdarahan ini dapat menutupi seluruh permukaan otak. Kerusakan otak yang berada di bawah perdarahan subdural biasanya lebih berat dan prognosisnya lebih buruk daripada perdarahan epidural

#### 6. Kontusio dan perdarahan intraserebral

Kontusio serebri sering terjadi (20% sampai 30% dari cedera otak berat). Sebagian besar terjadi di lobus frontal dan lobus temporal, meskipun dapat juga terjadi pada setiap bagian dari otak. Kontusio serebri dapat terjadi dalam waktu beberapa jam atau hari, berkumpul menjadi perdarahan intraserebral atau kontusio yang luas (Ismoyowati, 2021)

#### 2.1.6 Pemeriksaan Penunjang *Traumatic Brain Injury*

Berikut adalah pemeriksaan Penunjang pasien trauma kepala yaitu:

- a. CT Scan untuk mengetahui luasnya lesi, perdarahan, determinan, perubahan ventrikel, dan jaringan otak.
- b. MRI dilakukan dengan cara yang sama seperti CT scan, dengan atau tanpa bahan kontras radioaktif.
- c. Cerebral angiography menunjukkan anomaly kelainan pada sirkulasi serebral, seperti perubahan jaringan otak akibat edema, perdarahan, dan trauma
- d. Serial EEG dapat mendeteksi perkembangan gelombang patologis

- e. Sinar-X mendeteksi perubahan struktur tulang atau fraktur(patah tulang), perubahan struktur linier (perdarahan/edema), dan fragmen tulang
- f. BAER mengoreksi keterbatasan fungsional dari korteks serebral dan otak kecil.
- g. PET mendeteksi perubahan aktivitas metabolisme otak
- h. CSS untuk lumbal pungsi dapat dilakukan jika diduga terjadi perdarahan subarachnoid
- i. Kadar elektrolit untuk mengoreksi keseimbangan elektrolit dengan peningkatan tekanan intrakranial
- j. Screen toxilogy untuk mendeteksi efek obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran
- k. Rontgen thoraks 2 arah (PA/AP dan lateral) menyatakan akumulasi udara/cairan pada area pleural
- l. Thoracentesis menunjukkan darah/cairan
- m. Analisa gas darah (AGD/Astrup) (Erny, 2019).

#### **2.1.7 Penatalaksanaan *Traumatic Brain Injury***

- a. Resusitasi jantung paru ( circulation, airway, breathing = CAB)  
Pasien dengan trauma kepala berat sering terjadi hipoksia, hipotensi dan hiperkapnia akibat gangguan kardiopulmoner. Oleh karena itu urutan tindakan yang benar adalah:
  - 1) Sirkulasi (Circulation), hipotensi menyebabkan iskemia, yang dapat menyebabkan kerusakan sekunder. Hipotensi disebabkan

oleh hipovolemia akibat perdarahan eksternal, ruptur organ dalam, trauma dada dengan temponade jantung atau pneumotoraks, dan syok septik. Efeknya adalah menghentikan perdarahan, meningkatkan fungsi jantung dan mengganti darah yang hilang dengan plasma atau darah.

- 2) Jalan nafas (Airway), jalan nafas bebas dari lidah yang menggantung ke belakang dengan kepala ekstensi dengan menempatkan oropharyngeal airway (OPA) atau tabung endotrakeal, bersihkan sisa muntahan, darah, lendir, atau gigi palsu. Isi perut atau lambung dikosongkan melalui selang nasogastrik untuk mencegah aspirasi muntah.
  - 3) Pernafasan (Breathing), gangguan pernafasan dapat disebabkan oleh gangguan sentral dan perifer. Abnormalitas sentral adalah depresi pernapasan pada lesi medulla oblongata, respirasi cheyne, stokesia, dan hyperventilation neurogenik sentral. Penyebab perifer adalah aspirasi, trauma dada, edema paru, emboli paru, infeksi. Gangguan pernafasan dapat menyebabkan hipoksia dan hiperkapnia. Lakukan tindakan dengan pemberian O<sub>2</sub> kemudian cari dan aeliminasi faktor penyebab dan gunakan ventilator bila perlu.
- b. Penanganan kasus-kasus cedera kepala di unit gawat darurat didasarkan atas patokan pemantauan dan penanganan terhadap “6 B” yakni:

- 1) Breathing, Perlu diperhatikan mengenai frekuensi dan jenis pernafasan pasien. Adanya sumbatan jalan napas harus segera dihilangkan dengan cara: suction, inkubasi, trakeostomi. Pasokan oksigenasi yang cukup atau jika perlu, hiperventilasi merupakan tindakan penting sehubungan dengan edema cerebral
- 2) Blood, Meliputi pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan laboratorium darah (Hb, leukosit). Peningkatan tekanan darah dan penurunan denyut nadi menandakan peningkatan tekanan intrakranial, sedangkan penurunan tekanan darah dan denyut nadilebih cepat menandakan adanya syok hipovolemik akibat perdarahan dan membutuhkan transfusi
- 3) Brain, menilai kondisi otak berfokus pada respons okular, motorik, dan verbal (GCS). Perubahan respon ini menunjukkan peningkatan, memerlukan evaluasi lebih lanjut status pupil (ukuran, bentuk, dan respon terhadap cahaya) dan gerakan bola mata.
- 4) Bladder, Kandung kemih harus selalu dikosongkan (pemasangan kateter) karena kandung kemih yang penuh mendorong pengerahan tenaga dan karenanya tekanan intrakranial cenderung meningkat

- 5) Bowel, perlu dilakukan pemantauan pengeluaran urin selama perawatan pasien. Ketika keluaran urin tertahan di kandung kemih, tekanan intrakranial (TIK) dapat meningkat
- 6) Bone, Mencegah luka dekubitus, kontraktur sendi dan infeksi sekunder (Pusbankes, 2018)

### **2.1.8 Komplikasi *Traumatic Brain Injury***

Berikut komplikasi yang dapat disebabkan oleh cedera kepala yaitu:

- a. Perdarahan intra cranial.
- b. Kejang.
- c. Parese saraf cranial.
- d. Meningitis atau abses otak.
- e. Infeksi.
- f. Edema cerebri.
- g. Kebocoran cairan serospinal (Peterson et al., 2022).

## **2.2 Konsep Asuhan Keperawatan *Traumatic Brain Injury***

### **2.2.1 Pengkajian Keperawatan**

- a. Identitas pasien yaitu mulai dari nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, status, pekerjaan, pendidikan serta alamat dari pasien
- b. Riwayat Penyakit
  - 1) Keluhan utama

Cedera kepala berat muncul dengan gejala utama yang berbeda-beda tergantung lokasi cedera dan luas cedera. Gejala paling umum adalah nyeri, mati rasa, kaku pada

leher atau punggung, dan kelemahan pada ekstremitas atas dan bawah.

2) Keluhan penyakit saat ini

Pengkajian ini sangat penting untuk menentukan derajat kerusakan dan adanya kehilangan fungsi neurologik. Fungsi neurologis dan sumsum tulang belakang dapat terluka oleh berbagai mekanisme, dengan cedera primer yang melibatkan satu atau lebih dari proses dan kekuatan berikut: kompresi akut, benturan, destruksi, laserasi dan trauma tembak.

3) Riwayat Penyakit Terdahulu

Riwayat keluarga dengan kondisi, tanyakan tentang riwayat penyakit keluarga dengan kondisi medis yang dapat memperparah cedera kepala

c. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik mengacu pada pengkajian B1-B6 dengan pengkajian fokus ditujukan pada gejala-gejala yang muncul akibat cedera kepala berat. Keadaan umum (Arif muttaqin 2017) pada keadaan cedera kepala berat umumnya mengalami penurunan kesadaran. Adanya perubahan pada tanda-tanda vital, meliputi bradikardi dan hipotensi.

1) B1 (Breathing)

Perubahan sistem pernapasan tergantung pada derajat blok saraf parasimpatis, klien mengalami kelumpuhan otot-otot pernapasan dan perubahan karena adanya kerusakan pada jalur simpatik desendens akibat trauma tulang belakang sehingga jaringan saraf terputus, pemeriksaan fisik dari sistem ini mengarah pada hasil sebagai berikut: pemeriksaan umum batuk klien, peningkatan produksi sputum, sesak napas.

2) B2 (Blood)

Pengkajian pada sistem kardiovaskular ditemukan bahwa syok hipovolemik adalah kejadian umum pada pasien dengan cedera kepala berat. Hasil pemeriksaan didapatkan bahwa tekanan darah menurun, nadi bradikardi, dan jantung berdebar-debar. Dalam keadaan lain, mungkin terjadi peningkatan hormon anti diuretik, yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengkompensasi.

3) B3 (Brain)

Pengkajian ini meliputi tingkat kesadaran, pengkajian fungsi otak, dan pengkajian saraf kranial. Pengkajian tingkat kesadaran : tingkat kesadaran dan respon terhadap lingkungan adalah indikator yang paling sensitif dari disfungsi sistem saraf. Pengkajian fungsi serebral: keadaan mental, observasi penampilan klien, perilaku, nilai gaya

bicara dan aktivitas motorik. Kelumpuhan dicatat pada ekstermitas bawah, baik paralisis, dan paraplegia. Pengkajian sistem sensori terhadap perubahan sensasi pada klien cedera kepala berat sesuai dengan segmen yang mengalami gangguan

4) B4 (Bladder)

Kaji status urin, termasuk warna, volume dan karakteristik urin, termasuk berat jenis urin. Mungkin ada penurunan jumlah urin yang dihasilkan dan peningkatan retensi cairan dapat terjadi akibat penurunan aliran darah ke ginjal

5) B5 (Bowel)

Pada keadaan syok spinal, sering ditemukan neuropraxia dengan adanya ileus paralitik, dengan klinis hilangnya bising usus, disertai abdomen, dan tidak ada defekasi. Ini adalah gejala awal syok tulang belakang yang dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu.

6) B6 (Bone)

Kelumpuhan motorik dan organ dalam tergantung pada tingkat lesi di atas saraf yang mengalami trauma. Gejala perubahan motorik sesuai dengan distribusi segmental saraf yang terkena, dengan kelemahan dan kelumpuhan menjadi disfungsi motorik yang paling umum di ekstremitas bawah. Kaji warna kulit, suhu, kelembaban, dan turgor kulit.

#### d. Pemeriksaan Penunjang

##### 1) Pemeriksaan diagnostik

- a) X-ray/CT Scan: hematoma serebral, edema serebral, perdarahan intrakranial, fraktur tulang tengkorak
- b) MRI: dengan/tanpa menggunakan kontras
- c) Angiografi serebral: menunjukkan kelainan pada aliran darah
- d) EEG: menunjukkan adanya atau perkembangan gelombang patologis
- e) BAER (Brain Auditory Evoked Respon): menentukan fungsi korteks dan batang otak
- f) PET (Positron Emission Tomography): menunjukkan perubahan aktivitas metabolisme pada otak.

##### 2) Pemeriksaan Laboratorium

- a) AGD: PO<sub>2</sub>, pH, HCO<sub>3</sub>: untuk menilai kecukupan ventilasi (mempertahankan AGD dalam kisaran normal untuk memastikan perfusi serebral yang memadai) atau untuk mencari masalah oksigenasi yang dapat meningkatkan TIK
- b) Elektrolit serum: cedera kepala dapat dikaitkan dengan gangguan pengaturan natrium, retensi Na berakhir dapat beberapa hari, diikuti diuresis Na, peningkatan

letargi, konfusi dan kejang akibat ketidakseimbangan elektrolit

- c) Hematologi: leukosit, Hb, albumin, globulin, protein serum
- d) CSS: Menentukan kemungkinan adanya perdarahan subarachnoid (warna, komposisi, tekanan)
- e) Pemeriksaan toksikologi: Mendeteksi obat yang menyebabkan gangguan kesadaran
- f) Kadar antikonvulsan Darah : Untuk mengetahui kadar terapi yang sangat efektif dalam mengatasi kejang.

### **2.2.2 Diagnosis Keperawatan**

Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada klien dengan ptrauma capitis berat (SDKI PPNI, 2017), yaitu sebagai berikut:

- a. Bersihan jalan nafas yang tidak efektif
- b. Penurunan kapasitas adaptif intracranial
- c. Gangguan pertukaran gas
- d. Defisit Perawatan Diri
- e. Gangguan mobilitas fisik
- f. Risiko Infeksi
- g. Hipotermia/Hipertermia
- h. Risiko defisit nutrisi.
- i. Gangguan integritas kulit.

### 2.2.3 Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis (SDKI,2017)	Kriteria Hasil (SLKI,2019)	Tindakan Keperawatan (SIKI, 2018)	Rasional
1	(D.0149) Bersihkan jalan napas tidak efektif	(L.01002) Bersihkan Jalan Napas Meningkat Setelah dilakukan intervensi perawatan maka bersihkan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil: a. Batuk efektif meningkat b. Produksi sputum menurun c. Mengi menurun d. Wheezing menurun e. Dispnea membaik f. Gelisah membaik g. Frekuensi napas membaik h. Pola napas membaik	(I.01011) Manajemen Jalan Napas <b>Observasi</b> a. Monitor pola napas b. Monitor bunyi napas tambahan (mis:gurgling, mengi, wheezing, ronghi) c. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) <b>Terapeutik</b> a. Pertahankan kepatenan jalan napas b. Posisikan semi fowler atau fowler c. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik <b>Edukasi</b> a. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, jika tidak kontraindikasi <b>Kolaborasi</b> a. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu b. Pemantauan Respirasi	(I.01011) Manajemen Jalan Napas <b>Observasi</b> a. Mengetahui pola nafas klien b. Mengetahui bunyi nafas tambahan klien c. Mengetahui jumlah dan warna sputum klien <b>Terapeutik</b> a. Menjaga kebersihan jalan nafas klien b. mengatur posisi klien dengan kepala lebih tinggi c. Membersihkan jalan nafas kurang dari 15 detik <b>Edukasi</b> a. Menyarankan pemberian asupan cairan 2000ml <b>Kolaborasi</b> a. Bekerjasama dalam pemberian obat pengencer lendir b. Memantau pernapasan
2	(D.0066) Penurunan kapasitas adaptif intrakranial	Setelah dilakukan intervensi keperawatan maka kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil: a. Tingkat kesadaran meningkat	Pemantauan tekanan intracranial <b>Observasi</b> a. Identifikasi penyebab peningkatan TIK (mis. lesi menempati ruang, gangguan metabolisme, edema serebral, peningkatan tekanan vena, obstruksi	Pemantauan tekanan intrakranial <b>Observasi</b> a. Mengetahui penyebab meningkatnya TIK b. Mengetahui peningkatan TD c. Mengetahui tekanan nadi pasien

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Gelisah menurun</li> <li>c. Tekanan darah membaik</li> <li>d. Tekanan nadi membaik</li> <li>e. Bradikardia membaik</li> <li>f. Pola napas membaik</li> <li>g. Respon pupil membaik</li> <li>h. Refleks neurologis membaik</li> <li>i. Tekanan intrakranial membaik</li> </ul>	<p>aliran cairan serebrospinal, hipertensi intrakranial, idiopatik)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Monitor peningkatan TD</li> <li>c. Monitor pelebaran tekanan nadi (selisih TDS dan TDD)</li> <li>d. Monitor penurunan frekuensi jantung</li> <li>e. Monitor penurunan tingkat kesadaran</li> <li>f. Monitor perlambatan atau ketidaksimestrisan respon pupil</li> <li>g. Monitor kadar CO<sub>2</sub> dan pertahankan dalam rentang yang diindikasikan</li> <li>h. Monitor tekanan perfusi serebral</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertahankan sterilisasi sistem pemantauan</li> <li>b. Pertahankan posisi kepala dan leher netral</li> <li>c. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien</li> <li>d. Berikan tehnik non farmakologis</li> <li>e. Dokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan</li> <li>b. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Kinerja jantung yang akan menyebabkan terjadinya hipoksia</li> <li>e. Kesadaran menurun karena kurangnya oksigen di dalam tubuh akibat dari suatu penyakit seperti trauma</li> <li>f. Pupil yang normal akan bereaksiterhadap cahaya</li> <li>g. Mengetahui kadar CO<sub>2</sub></li> <li>h. Mengetahui tekanan perfusi serebral</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencegah terjadinya infeksi</li> <li>b. Posisi kepala yang netral akan mempertahankan perfusi serebral</li> <li>c. Mengetahui kondisi pasien</li> <li>d. Bahan acuan untuk melakukan implementasi selanjutnya</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien dan keluarga pasien mengetahui tujuan pemantauan</li> <li>b. Pasien dan keluarga pasien mengetahui hasil pemantauan</li> </ul>
3	(D.0066) Nyeri akut	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keluhan nyeri menurun</li> <li>b. Meringis menurun</li> </ul>	<p>Manajemen Nyeri</p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lakukan pengamatan pada lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri.</li> <li>b. Identifikasi skala nyeri.</li> </ul>	<p>Manajemen Nyeri</p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agar mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Gelisah menurun</li> <li>d. Kesulitan tidur menurun</li> <li>e. Frekuensi nadi membaik</li> <li>f. Pola napas membaik</li> <li>g. Tekanan darah membaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Perhatikan respon nyeri pada wajah klien</li> <li>d. Identifikasi faktor yang memperberat serta meringankan nyeri.</li> <li>e. Identifikasi pengetahuan tentang nyeri</li> <li>f. Identifikasi budaya terkait respon nyeri.</li> <li>g. Pantau keberhasilan terapi komplementer yang telah dilakukan.</li> <li>h. Pantau efek samping pemberian obat anti nyeri.</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beri teknik non farmakologis agar rasa nyeri berkurang.</li> <li>b. Kontrol lingkungan agar rasa nyeri bisa menurun</li> <li>c. Bantu fasilitasi istirahat dan tidur</li> <li>d. Pada saat pemilihan strategi untuk mengatasi nyeri itu patut untuk mempertimbangkan sumber dan jenis dari nyeri itu sendiri.</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beri penjelasan tentang penyebab, periode dan pemicu timbulnya rasa nyeri</li> <li>b. Ajarkan tentang cara meredakan nyeri</li> <li>c. Anjurkan untuk memonitor rasa nyeri sendiri</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasikan tentang pemberian analgesic untuk meredakan nyeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mengetahui skala nyeri</li> <li>c. Melihat respon nyeri pada wajah klien</li> <li>d. Mengetahui factor yang memperberat nyeri</li> <li>e. Menilai tingkat pengetahuan nyeri terhadap nyeri</li> <li>f. Mengetahui budaya terkait respon nyeri</li> <li>g. Mengetahui keberhasilan dari terapi komplementer yang dilakukan</li> <li>h. Mengetahui tingkat kondisi pasien</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mengurangi rasa nyeri</li> <li>b. Untuk mengurangi nyeri</li> <li>c. Untuk memberi kenyamanan kepada klien</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agar pasien mengetahui penyebab, periode dan pemicu timbulnya rasa nyeri</li> <li>b. Agar pasien tau cara meredakan nyeri</li> <li>c. Mengetahui frekuensi nyeri</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bekerja sama dalam menurunkan rasa nyeri</li> </ul>
4	(D.0142)Risiko infeksi	Setelah diberikan intervensi keperawatan maka tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil:	<p>Pencegahan infeksi</p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p>	<p>Pencegahan infeksi</p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kadar sel darah putih membaik</li> <li>b. Kultur darah membaik</li> <li>c. Kultur urine membaik</li> <li>d. Kultur sputum membaik</li> <li>e. Kultur area luka membaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Batasi jumlah pengunjung</li> <li>b. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</li> <li>c. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jelaskan tanda dan gejala infeksi</li> <li>b. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencegah terjadinya infeksi silang</li> <li>b. Untuk mengurangi kontaminasi silang</li> <li>c. Mengurangi infeksi pasca-prosedur yang berpotensi menular</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan informasi kepada pasien dan terhadap tanda dan gejala infeksi</li> <li>b. Untuk mengurangi terjadinya infeksi silang atau menyebarkan mikroorganisme</li> </ul>
5	<b>(D.0131) Hipotermia</b>	<p><b>(L.14134) Thermogulasi membaik</b></p> <p>Setelah dilakukan intervensi maka diharapkan thermogulasi membaik dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Suhu tubuh membaik</li> <li>b. Suhu kulit membaik</li> </ul>	<p><b>(I.14507) Manajemen hipotermia Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitor suhu tubuh</li> <li>b. Identifikasi penyebab hipotermia</li> <li>c. Monitor tanda dan gejala akibat hipotermia</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Sediakan lingkungan yang hangat (mis: atur suhu ruangan, inkubator)</li> <li>d. Ganti pakaian dan/atau linen yang basah</li> <li>e. Lakukan penghangatan aktif eksternal (mis: kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, perawatan metode kangguru)</li> </ul>	<p><b>(I.14507) Manajemen hipotermia Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mengetahui suhu tubuh pasien</li> <li>b. Mengetahui penyebab hipotermia</li> <li>c. Untuk mengetahui tanda dan gejala hipotermia</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agar suhu pasien baik</li> <li>b. Menghindari pasien menggigil</li> <li>c. Melakukan penghangatan aktif eksternal (mis: kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, perawatan metode kangguru)</li> </ul>

#### **2.2.4 Implementasi Keperawatan**

Implementasi keperawatan merupakan salah satu dari proses keperawatan. Implementasi dilaksanakan jika dari hasil pengkajian telah ditentukan diagnosis keperawatan dan disusun intervensi keperawatan yang akan dilakukan. Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan tujuan yang sesuai dengan masalah kesehatan yang didapatkan sehingga dapat membantu proses perawatan pada klien. Oleh karena itu, pelaksanaan implementasi harus spesifik hal ini untuk menangani berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan (Nursalam, 2019).

Adapun implementasi keperawatan yang dapat diberikan pada pasien trauma kepala yakni Memastikan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi (ABC) stabil. Hal ini dilakukan dengan memastikan pasien bernapas secara mandiri atau dengan bantuan ventilator, memiliki denyut nadi dan tekanan darah yang normal, serta memiliki kadar oksigen yang cukup dalam darah, Memantau tekanan intrakranial (TIK), memantau suhu, memperburuk kerusakan otak, serta mencegah infeksi karena Infeksi dapat memperburuk kerusakan otak dan meningkatkan risiko kematian. (Carroll, 2022)

#### **2.2.5 Evaluasi Keperawatan**

Evaluasi merupakan bagian paling terakhir dari proses keperawatan. Pelaksanaan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana, berkelanjutan, terarah, dan profesional untuk mengoptimalkan tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah disusun sehingga pasien memperoleh hasil

yang maksimal dalam pelayanan kesehatan. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan, dan memutuskan apakah melanjutkan, mengubah atau menghentikan rencana asuhan.

Pendokumentasian pada tahap evaluasi merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan kondisi pasien setelah pelaksanaan. Evaluasi sedang berlangsung, melibatkan pasien dan profesional kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan tahap kelima dalam rangkaian proses keperawatan untuk mengetahui apakah tujuan intervensi keperawatan yang dilakukan terpenuhi atau diperlukan pendekatan yang berbeda (Nursalam, 2019).

Evaluasi yang harus dilakukan pada pasien trauma kepala diantaranya penilaian status kesadaran, pemantauan jalan napas, pernapasan dan sirkulasi (ABC) tetap stabil, tanda-tanda vital, fungsi neurologis, dan pemeriksaan fisik umum lainnya. Kemudian merumuskan kembali diagnosa keperawatan serta merencanakan intervensi lanjutan yang harus dilakukan (Disorders, 2023).

## **2.3 Evidence Based Practice in Nursing (EBPN)**

### **2.3.1 Definisi**

*Blanket warmer* berfungsi untuk menjaga suhu tubuhnya stabil. Pada dasarnya, alat ini menggunakan panas yang dialirkan melalui blower sebagai penghantar panas, yang membuat pasien hangat (Rositasari, S., & Dyah, n.d.)

### 2.3.2 Tujuan

- a. Membantu mempertahankan suhu tubuh
- b. Mengurangi rasa sakit atau nyeri
- c. Mencegah terjadinya hipotermia

### 2.3.3 Prosedur Pemberian dan Rasionalisasi

- a. Pra interaksi
  - 1) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan
  - 2) identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi
  - 3) Berikan salam dan panggil pasien dengan namanya
  - 4) Memperkenalkan diri
  - 5) Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien
  - 6) Mencuci tangan
  - 7) Melakukan pemantauan suhu sebelum diberikan intervensi
  - 8) Pemasangan blanket warmer diatas tubuh pasien selama 30 menit
  - 9) Melakukan pemantauan suhu setelah diberikan intervensi
  - 10) Membereskan alat
  - 11) Cuci tangan
- b. Fase Terminasi
  - 1) Mengevaluasi respons klien setelah diberikan intervensi
  - 2) Mendokumentasikan kegiatan

### 2.3.4 Artikel Utama dan Jurnal Pendukung

Judul/ Nama Penulis/ Tahun Terbit/ Nama Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
<p><b>Judul :</b> <i>Blanket warmer</i> terhadap peningkatan suhu tubuh pasien</p> <p><b>Penulis:</b> Rizki Sari Utami Muchtar</p> <p><b>Tahun:</b> 2023</p> <p><b>Nama Jurnal:</b> Journal of Sciences Nursing</p>	<p>Metode dalam penelitian ini adalah pre-eksperimental design atau quasy experiment dengan desain pre dan post design yang diberikan pada responden setelah dilakukan perlakuan. Model rancangan ini adalah dengan melakukan observasi dua kali yakni sebelum experimental serta sesudah experimental. Nilai suhu tubuh sebelum serta sesudah dilakukan <i>Blanket Warmer</i> pada pasien Pasca Operasi perlakuan didapatkan pre test suhu tubuh sebesar 100 % dengan suhu tubuh hipotermi dan nilai post test 100 % suhu tubuh normal dengan p Value 0,001. (Muchtar et al., 2023)</p>	<p>Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan <i>blanket warmer</i> terhadap peningkatan suhu tubuh pasien pasca operasi diruangan recovery room RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang</p>
<p><b>Judul :</b> Efektivitas selimut elektrik dalam peningkatan suhu tubuh pasien pasca operasi yang mengalami hipotermia.</p> <p><b>Penulis:</b> Fenni Febrieni.</p> <p><b>Tahun:</b> 2020</p> <p><b>Nama Jurnal:</b> Scientific Journal of Nursing Research</p>	<p>Menggunakan design literature review dimana pencarian data artikel sumber dilakukan melalui 3 database Pubmed, Proques, dan google sarjana untuk mengambil artikelyang relevan yang diterbitkan dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia. (Febriani et al., 2020)</p>	<p>Dalam penelitian ini menunjukkan hasil penggunaan selimut elektrik dapat menaikkan suhu tubuh pasien secara efektif dengan kisaran rata-rata 1,50-1,96 derajat celcius.</p>
<p><b>Judul :</b> Efektivitas penggunaan terapi cairan infus hangat dan <i>blanket warmer</i> pada pasien hipotermia post anastesi regional di BSD RSUD Kota Tangerang</p> <p><b>Penulis:</b> Restu Gilang Ramadhan</p> <p><b>Tahun:</b></p>	<p>Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif quasi eksperimen dengan menggunakan bentuk rancangan <i>one group pre-post test design</i>. (Restu, 2023)</p>	<p>Dalam penelitian ini menunjukkan hasil pemberian <i>blanket warmer</i> selama 30 menit efektif untuk meningkatkan suhu tubuh pasien</p>

<p>2023</p> <p><b>Nama Jurnal:</b> Jurnal Inovasi Penelitian</p>		
<p><b>Judul:</b> Pengaruh <i>Blanket Warmer</i> Terhadap Hipotermi Pada Pasien Pasca General Anestesi di Rumah Sakit Jatiwinangun Purwokerto</p> <p><b>Penulis:</b> Muhammad Jarod, Tophan Heri Wibowo, Rahmaya Nova Handayani</p> <p><b>Tahun :</b> 2024</p> <p><b>Nama jurnal :</b> Jurnal ilmiah wahana pendidikan</p>	<p>Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain pra- eksperimental termasuk desain one-group pretest-posttest. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode nonprobability sampling, khususnya pendekatan konsekutif sampling. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 38 partisipan.</p>	<p>Uji Wilcoxon menghasilkan nilai p sebesar 0,000, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara statistik pemberian <i>blanket warmer</i> terhadap terjadinya hipotermi pada pasien yang menjalani anestesi umum di Instalasi Bedah Sentral RSUD Jatiwinangun Purwokerto. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan blanket warmer selama 30 menit pada pasien hipotermi mengakibatkan perubahan keadaan hipotermi pasien. Hasil ini sejalan dengan fungsi penghangat selimut, yaitu untuk mengatasi hipotermi pada pasien.</p>

## 2.4 Konsep Teori Keperawatan

Teori keperawatan yang digunakan dalam analisis kasus ini adalah teori Virginia Henderson yaitu 14 kebutuhan dasar manusia dalam memberikan asuhan keperawatan yang telah di tuangkan dalam buku *Falsafah Dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi Keilmuan* (Risnah & Muhammad Irwan, 2021) Henderson menegaskan pentingnya seni dalam keperawatan dan mengenalkan 14 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar asuhan keperawatan. Sebagaimana dalam buku Virginia Henderson berjudul *The Nature of Nursing: A Definition and Its Implications for Practice, Research, and Education*, yang memperkenalkan 14 kebutuhan dasar manusia yang merupakan dasar untuk dikatakan sehat dan harus diaplikasikan dalam pemberian asuhan keperawatan.

Menurut Virginia Henderson ada tiga tahap hubungan perawat dengan pasien, yaitu saat perawat berperan sebagai pengganti keluarga, penyelamat, dan mitra bagi pasien. Melalui proses interpersonal, perawat harus mempunyai instin, komunikasi yang baik dan hubungan yang baik kepada pasiennya untuk menggali lebih dalam bantuan apa yang dibutuhkan klien (Yani Achir, 2018: dalam Risnah, 2021)

Teori henderson berkaitan dengan ilmu keperawatan dalam memberi asuhan keperawatan yang merupakan tugas utama perawat. Manfaat dari asuhan keperawatan ini dapat dilihat dari perubahan kesehatan klien dari sakit menjadi sehat, yang awalnya mengalami ketergantungan pada orang lain hingga pada akhirnya menjadi mandiri dalam merawat diri. Perawat

melakukan tugasnya membantu pasien dengan melakukan pengkajian, merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi hal yang terjadi pada pasien setelah diberikan asuhan keperawatan berdasar pada 14 komponen kebutuhan dasar manusia (Asmadi, 2008 dalam: Risnah, 2021).

Adapun 14 komponen kebutuhan dasar manusia antara lain:

1. Kebutuhan Bernapas

Pasien dengan trauma kepala berat mungkin membutuhkan bantuan ventilasi mekanik untuk membantu mereka bernapas. Perawat bertanggung jawab untuk memantau fungsi pernapasan pasien, memastikan jalan napas paten, dan memberikan ventilasi mekanik bila diperlukan.

2. Kebutuhan Sirkulasi

Trauma kepala dapat menyebabkan hipotensi dan syok. Perawat bertanggung jawab untuk memantau tanda-tanda vital pasien, memberikan cairan intravena, dan menggunakan obat-obatan untuk menstabilkan tekanan darah.

3. Kebutuhan Eliminasi

Pasien dengan trauma kepala mungkin mengalami inkontinensia urin dan alvi. Perawat bertanggung jawab untuk membantu pasien dalam eliminasi, memasang kateter urin bila diperlukan, dan menjaga kebersihan pasien.

4. Kebutuhan Makan dan Minum

Pasien dengan trauma kepala berat mungkin memerlukan pemberian makan melalui pipa nasogastrik atau gastrostomi. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan nutrisi yang adekuat kepada pasien, memantau status hidrasi pasien, dan mencegah komplikasi seperti aspirasi.

5. Kebutuhan Bergerak dan Mempertahankan Postur

Pasien dengan trauma kepala berat mungkin mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh. Perawat bertanggung jawab untuk membantu pasien bergerak dan mempertahankan postur tubuh yang tepat, mencegah komplikasi seperti dekubitus, dan membantu pasien dalam aktivitas sehari-hari.

6. Kebutuhan Tidur dan Istirahat

Pasien dengan trauma kepala membutuhkan istirahat yang cukup untuk membantu pemulihan. Perawat bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tidur, membantu pasien tidur dan istirahat, dan memantau pola tidur pasien.

7. Kebutuhan Berpakaian dan Berhias

Pasien dengan trauma kepala mungkin membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berhias. Perawat bertanggung jawab untuk membantu pasien memilih pakaian yang nyaman dan aman, membantu pasien berpakaian dan berhias, dan menjaga kebersihan dan kerapian pasien.

8. Kebutuhan Menjaga Suhu Tubuh

Pasien dengan trauma kepala mungkin mengalami demam atau hipotermia. Perawat bertanggung jawab untuk memantau suhu tubuh

pasien, memberikan intervensi untuk menjaga suhu tubuh pasien dalam kisaran normal, dan mencegah komplikasi seperti hipotermia atau hipertermia (Arifani, D., & Sari, 2022).

#### 9. Kebutuhan Kebersihan dan Kenyamanan

Pasien dengan trauma kepala membutuhkan perawatan kulit dan mandi yang teratur. Perawat bertanggung jawab untuk membantu pasien mandi, menjaga kebersihan kulit pasien, dan mencegah komplikasi seperti infeksi kulit.

#### 10. Kebutuhan Keamanan

Pasien dengan trauma kepala berisiko jatuh dan cedera. Perawat bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, memasang pengaman di tempat tidur pasien, dan mengawasi pasien untuk mencegah jatuh dan cedera.

#### 11. Kebutuhan Berkomunikasi

Pasien dengan trauma kepala mungkin mengalami kesulitan berkomunikasi. Perawat bertanggung jawab untuk menggunakan teknik komunikasi yang efektif untuk berkomunikasi dengan pasien, membantu pasien memahami informasi, dan membantu pasien mengekspresikan kebutuhannya.

#### 12. Kebutuhan Beribadah

Pasien dengan trauma kepala mungkin membutuhkan dukungan spiritual. Perawat bertanggung jawab untuk menghormati keyakinan

spiritual pasien, membantu pasien dalam menjalankan ibadah, dan menyediakan dukungan spiritual bagi pasien.

#### 13. Kebutuhan Bermain dan Berekreasi

Pasien dengan trauma kepala mungkin membutuhkan aktivitas untuk membantu pemulihan. Perawat bertanggung jawab untuk membantu pasien menemukan aktivitas yang sesuai dengan kondisinya, membantu pasien berpartisipasi dalam aktivitas, dan memantau tingkat energi pasien.

#### 14. Kebutuhan Belajar

Pasien dengan trauma kepala mungkin membutuhkan edukasi tentang kondisinya dan cara merawat diri. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada pasien tentang kondisinya, cara merawat diri, dan cara mencegah komplikasi (Rahmawati.2022)

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Studi Kasus**

Pada karya tulis ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan dengan melibatkan 1 responden. Menurut Nursalam (2016) studi kasus adalah penelitian yang berfokus pada suatu kasus yang terdiri dari proses keperawatan dan memiliki tujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, intensif, detail dan rinci mengenai latar belakang, karakter ataupun sifat pada suatu kasus tersebut. Penelitian dalam metode studi kasus dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis.

#### **3.2 Subyek Studi Kasus**

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kriteria Inklusi
  - a. Responden berada ditempat pada saat penelitian
  - b. Pasien dengan penurunan kesadaran
  - c. Pasien dengan Traumatic Brain Injury (TBI) yang sedang dirawat di ruang ICU
  - d. Pasien mengalami masalah hipotermia

## 2. Kriteria Eksklusi

- a. Responden yang mengalami kondisi perburukan

### 3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus pada penelitian ini ialah melakukan asuhan keperawatan pada pasien *traumatic brain injury* cedera otak traumatik dengan hipotermia menggunakan intervensi *blanket warmer*.

### 3.4 Instrumen Studi Kasus

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah format asuhan keperawatan GADAR (Gawat dan Darurat) yang terdiri diantaranya:

1. Format pengkajian keperawatan terdiri dari: data umum pasien, masalah utama, pengkajian primer airway, breathing, circulation, disability, exposure, pengkajian sekunder breathing, blood, neurologis, bladder, bowel, bone, pengkajian rasa aman dan nyaman, aktivitas, istirahat, tidur, riwayat sosial, riwayat psikologi, spiritual, tanda-tanda vital, diagnostik, dan laboratorium. Pada pengkajian kebutuhan pasien menggunakan SDKI berdasarkan gejala yang ditemukan dari pasien.
2. Format analisis data terdiri dari: data, etiologi dan masalah
3. Format diagnosa keperawatan terdiri dari: diagnosa keperawatan
4. Format rencana keperawatan terdiri dari: diagnosa keperawatan, luaran/hasil keperawatan menggunakan SLKI, dan rencana intervensi

menggunakan SIKI

5. Format implementasi/pelaksanaan dan evaluasi keperawatan terdiri dari: hari dan tanggal, nomor diagnosa keperawatan, implementasi keperawatan, evaluasi keperawatan, serta paraf dan nama perawat

### **3.5 Prosedur Pengambilan Data**

#### **1. Persiapan**

- a. Peneliti mengajukan judul terkait studi kasus yang akan diteliti, kemudian mengajukan intervensi berbasis *Evidence based practice nursing* (EBPN) kepada pasien yang telah dipilih, berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing insitusi
- b. Peneliti melakukan koordinasi kepada kepala ruangan tempat pasien dirawat inap yaitu ruang *Intensive care unit* (ICU) RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, serta menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan
- c. Peneliti menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam melakukan implementasi *Blanket Warmer*.

#### **2. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara

#### **3. Penyusunan Laporan**

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah yang telah dianjurkan oleh institusi dalam hal ini Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar, Prodi Ners.

### **3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus**

Penelitian ini dilakukan di ruangan *Intensive Care Unit* RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dilaksanakan selama 5 hari yaitu pada tanggal 04-08 Maret 2024

### **3.7 Analisis Data dan Penyajian Data**

Analisis data dan penyajian data dalam studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta yang terdapat dalam teks dan bersifat naratif. Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subjek studi kasus dilakukan dengan menggunakan lima proses keperawatan, dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Data yang sudah diperoleh dari hasil pengkajian melalui proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian dimasukkan ke dalam tabel analisis data untuk merumuskan diagnosa keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan buku standar diagnosa keperawatan indonesia, untuk selanjutnya menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria luaran yang akan ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia hasil keperawatan. Kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP yang khusus merawat pasien, penyajian data disajikan dalam bentuk naratif yaitu review dari hasil evaluasi dijelaskan.

### 3.8 Etika Studi Kasus

Pertimbangan etis diperhitungkan dalam penelitian ini. Pertimbangan etik berfungsi untuk mencegah timbulnya masalah etik selama penelitian. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang muncul. Ada tiga prinsip etik umum yang berlaku untuk penanganan masalah etik, yaitu non maleficence dan beneficence, respect to person, serta justice (Bect 2018).

1. *Respect of Persons (Others)* memiliki tujuan mendasar untuk mempertahankan otonomi, pengambilan keputusan independen (penentuan nasib sendiri) dan perlindungan kelompok yang bergantung atau rentan dari penyalahgunaan. Pengasuh dapat menginformasikan pasien bahwa mereka dalam kondisi baik, meskipun ada beberapa gangguan
2. *Beneficence & Non Maleficence*: Prinsip berbuat baik, memberikan keuntungan maksimum dan resiko minimum. Misalnya, jika ada resiko, itu harus masuk akal (*reasonable*). Perawat dapat merekomendasikan olahraga untuk meningkatkan kesehatan pasien, jika olahraga dilakukan dapat menimbulkan resiko kekambuhan penyakit. Dengan rancangan penelitian ilmiah, peneliti mampu melakukannya dengan baik, mengikuti prinsip jangan merugikan (*no harm, no evil*)
3. Prinsip etika keadilan (*Justice*): Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya dalam arti

keadilan distributif dan pemerataan. Jangan biarkan kelompok rentan memiliki masalah yang tidak adil. Pada prinsipnya sponsor dan peneliti tidak bertanggung jawab atas perlakuan tidak adil tersebut. Misalnya, jika seorang pasien baru saja dirawat inap dan ada pasien lain, perawat mempertimbangkan beberapa faktor dan kemudian bertindak dengan cara yang adil sehingga pasien lain tidak merasa dikucilkan atau diakali.

4. Prinsip etika kerahasiaan (*Confidentiality*): Prinsip ini adalah informasi tentang pasien harus dijaga. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh pasien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang pasien diluar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang pasien dan tenaga kesehatan lain jika tidak penting harus dihindari.

**BAB IV**  
**LAPORAN KASUS**

**PENGAJIAN KEPERAWATAN ICU**

ASSESMEN			
Nama Pasien : Tn. D	Umur : 62 Tahun	Jenis kelamin: <b>L / P</b> No. RM : 01140973	
Nama Keluarga : Ny. M Agama : Islam Pekerjaan : Pensiunan Alamat Rumah : Jl. Arung Tarumpu No. 24/ Kel. Lumpue, Kab. Pare-Pare Telp/Hp : 085256325371 Diagnosa Medis : Traumatic Brain Injury Tanggal Masuk ICU : 01 Maret 2024			
Datang Tanggal : 01 Maret 2024      Pukul: 14.00 Wita      Asal Ruangan: OK Cito			
<b>Alat Terpasang :</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <input checked="" type="checkbox"/> Infus   <input checked="" type="checkbox"/> Ventilator         </div> <div style="width: 25%;"> <input checked="" type="checkbox"/> Kateter   <input type="checkbox"/> CVC         </div> <div style="width: 25%;"> <input checked="" type="checkbox"/> NGT   <input type="checkbox"/> Transfusi         </div> <div style="width: 25%;"> <input checked="" type="checkbox"/> Monitor   <input type="checkbox"/> Lainnya         </div> </div>			
<b>KATEGORI MASUK ICU : Kategori 1</b>			
<b>Keluhan Utama :</b> Penurunan Kesadaran  <b>Riwayat Penyakit/ Mekanisme Cedera :</b> Pasien datang ke RSWS pada tanggal 27 Februari 2024 rujukan RSUD Ainun Habibie Pare-pare dengan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 23.00 Wita. Pasien sedang menyebrang kemudian ditabrak motor dengan kecepatan tinggi hingga terlempar sejauh 3 meter. Riwayat mual (-), muntah (+) > 10 kali dalam 30 menit setelah kecelakaan. Riwayat demam (+), kejang (-), keluar darah dari telinga (-), keluar darah dari mulut (-). Riwayat hipertensi (+) berobat tidak terkontrol dengan amlodipine 10 mg  <b>Riwayat Kesehatan Keluarga :</b> Istri pasien mengatakan mertua perempuannya memiliki penyakit hipertensi begitupun dengan pasien  <b>(Orientasi tempat, waktu, dan orang) :</b> sulit dikaji karena pasien mengalami penurunan kesadaran			

**COMPREHENSIVE ASSESMENT & ON  
GOING ASSESMENT**

**Riwayat Kesehatan Lalu :**

SAMPLE

**S (Sign & Simptom) :** Pasien masuk RS dengan riwayat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cedera pada kepalanya. Pasien mengalami penurunan kesadaran dan sempat muntah lebih dari 10 kali pasca kejadian

**A (Allergies) :** Tidak ada riwayat alergi

**M (Medications) :** Konsumsi Amlodipine 10mg, 1x1 via Oral

**P (Past Illness) :** Riwayat Hipertensi

**L (Last Meal) :** Bubur saring

**E (Event Leading) :** keluarga pasien mengatakan, pasien tidak memiliki riwayat kecelakaan yang lain.

AIUEO

**A (Alkohol) :** Tidak mengonsumsi alkohol

**I (Insulin) :** Tidak ada

**U (Uremia) :** Tidak ada

**E (Epilepsi) :** Tidak ada penyakit epilepsi

**O (Over dosis) :** Tidak pernah

**Pengkajian B1-B6**

**B1 (Breathing)**

- Bentuk dada : Normochest
- RR : 18x/menit
- Terpasang *Endotracheal Tube*, lendir (+) pada endotracheal dan oral
- Penggunaan Otot Bantu Nafas (+/-) : ya, ada retraksi otot dada pada pasien
- Pernafasan cuping hidung (+/-) : Tidak ada
- Penggunaan Alat Bantu Pernapasan : ETT on Ventilator mode SIMV dengan FiO<sub>2</sub> 40%, PEEP 5.0
- Suara nafas : Vesikuler

*Masalah : Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif*

**B2 (Circulation)**

- Tekanan Darah : 158/90 mmHg
- CRT : <3 detik
- Sianosis : (-/-)
- Konjunctiva : Tidak anemis
- Nadi : 86 x/menit
- Suhu : 35.9°C

**B3 (Neurologi)**

- Tingkat Kesadaran : Delirium
- GCS E3M4V2 = 9
- Skla nyeri 3/10 BPS
- Suhu tubuh: 35,9 °C
- Refleks Nervus Kranialis (Jabarkan 12 Nervus Kranialis dengan singkat): Sulit dikaji karena pasien mengalami penurunan kesadaran

*Masalah : penurunan kapasitas adaptif intrakranial dan hipotermia*

**B4 (Bladder)**

- Edema Vagina/Scrotum (-)
- Produksi Urine 600-800cc/hari
- Terpasang kateter Urine (+),Jenis: Silicon
- Balance Cairan/24 Jam (Silahkan dilampirkan perhitungan BC) : +586cc /24 J

Intake Parenteral: IVFD KAEN 3B 1000ml/24 jam

Intake Enteral: Susu 3x100 ml

Kontrol pemberian obat:

- Cefriaxone 1 gram/12 jam/Intravena
- Fentanyl 30 mcg/jam/Intravena
- Nicardipine 2ml/jam/Iv-sp
- Omeprazole 40 mg /24 jam/intravena
- Dexmedetomidin 0,2mcg/KgBB.Ka,
- Mannitol 20% 100cc/12 jam/intravena
- Asam Traneksamat 500 mg / 8 jam / intravena
- Phenytoin 100 mg / 8 jam / intravena
- Vip Albumin 2 caps/8 jam/NGT
- Paracetamol 1 gr / 8 jam /intravena
- Amlodipin 10mg/24 jam/NGT

Jumlah Input: 2116cc /24 jam

Jumlah Output:1530cc /24 J


**B5 (Bowel)**

- Terpasang NGT (+) Ukuran 18 fr
- Peristaltik Usus : 6-8x/menit

*Masalah : Tidak ada masalah keperawatan*

**B6 (Bone)**

- Warna Kulit: Sawo matang
- Decubitus : Tidak
- Edema (+/-)
- Pergerakan Ekstremitas (aktif/ pasif) : Pasif
- Kekuatan Otot : 3/3 ekstermitas atas, ekstermitas bawah 2/2
- Lesi (+/-) : Tidak
- Fraktur (+/-) : Tidak
- Dekubitus (+/-) ; Tidak
- ,Luka terbuka (-/-) : -
- Luka Post Operasi (+) : post op craniectomy  
Area :



Keterangan Gambar : Ukuran : Defek os frontal sisi kanan ukuran +- 3,14 x 4,76 cm dan os frontal sisi kiri ukuran +- 2,89 x 2,43 cm

#### **Pengkajian Rasa Aman dan Nyaman**

- a. Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana ? jelaskan secara rinci: PQRST.  
pasien direstrain, serta pasien tampak gelisah, skala nyeri 3 BPS
- b. Apakah mengganggu aktifitas?  
Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring ditempat tidur
- c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi / menghilangkan nyeri?  
Pasien tersedasi dan terpasang fentanyl 30 mg/jam/IV-Sp
- d. Apakah cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri efektif?  
Pasien tersedasi
- e. Apakah ada riwayat pembedahan ?  
Ya

#### **Pengkajian Aktivitas, Istirahat dan Tidur**

##### **a. AKTIFITAS**

- 1) Apakah klien selalu berolah raga? Jenis OR?  
Keluarga pasien mengatakan bahwasanya pasien sering berolahraga selama pensiun
- 2) Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktifitas?  
Keluarga pasien mengatakan sebelum kecelakaan pasien tidak pernah menggunakan alat bantu dalam beraktifitas
- 3) Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan? Jelaskan secara rinci  
Selama sakit pasien tidak bisa beraktifitas karena mengalami penurunan kesadaran. Pasien hanya bisa berbaring ditempat tidur, pasien dalam keadaan tidak bisa merawat dirinya, semua aktivitas dibantu oleh perawat

##### **b. ISTIRAHAT**

- 1) Kapan dan berapa lama klien beristirahat?  
Keluarga pasien mengatakan sebelum sakit pasien tidur siang kurang lebih 1-2 jam, dan di malam hari pasien tidur 6-8 jam

- 2) Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang?  
Keluarga pasien mengatakan pasien akan kumpul dengan teman partainya
- 3) Apakah klien menyediakan waktu khusus untuk istirahat?  
Keluarga pasien mengatakan pasien selalu menyediakan waktu untuk tidur siang ketika pulang dari berkegiatan serta bermain tenis meja
- 4) Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby?  
Keluarga pasien mengatakan waktu luang kadang dipakai pasien untuk menyalurkan hobi nya yaitu tenis meja
- 5) Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini?  
Tampak pasien hanya berbaring ditempat tidur

**c. TIDUR**

- 1) Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lama, nyenyak/tidak?)  
Keluarga pasien mengatakan tidur siang dalam malam hari, disiang hari pasien tidur sekitar 1-2 jam dan di malam hari pasien tidur sekitar 6-8 jam
- 2) Apakah kondisi saat ini mengganggu klien?  
Sulit dikaji karena pasien dalam keadaan kesadaran menurun
- 3) Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur?  
Keluarga pasien mengatakan pasien tidak pernah menggunakan obat penenang sebelum tidur
- 4) Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur?  
Keluarga pasien mengatakan kegiatan yang dilakukan pasien menjelang tidur adalah nonton TV
- 5) Bagaimana kebiasaan tidur?  
Keluarga pasien mengatakan pasien tidur sesuai dengan kebiasaannya yaitu tidur siang dan malam
- 6) Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya?  
Keluarga pasien mengatakan pasien tidur siang 1-2 jam dan tidur dimalam hari sekitar 6-8 jam
- 7) Apakah klien sering terjaga saat tidur? Keluarga pasien mengatakan pasien terbangun jika hanya ingin buang air kecil saja
- 8) Pernahkah mengalami gangguan tidur? Jenis nya?  
Keluarga pasien mengatakan pasien tidak pernah mengalami gangguan pada masalah tidurnya
- 9) Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut?  
-

**Pengkajian Riwayat Sosial:**

- a. Apakah klien mempunyai teman dekat?  
Keluarga pasien mengatakan pasien memiliki teman dekat yang sering ditemani bermain tenis meja

- b. Siapa yang dipercaya klien?  
Keluarga pasien mengatakan istri dan keluarganya
- c. Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat?  
keluarga pasien mengatakan pasien sering ikut kegiatan jumat bersih dengan masyarakat
- d. Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan?  
Keluarga pasien mengatakan semua kegiatan yang dilakukan pasien sesuai dengan kemampuannya

**Pengkajian Riwayat Psikologi:**

- a. Status Emosi.  
1) Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? Sulit dikaji  
2) Bagaimana suasana hati klien? Sulit dikaji  
3) Bagaimana perasaan klien saat ini? Sulit dikaji  
4) Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira? Sulit dikaji
- b. Konsep diri  
1) Bagaimana klien memandang dirinya? Sulit dikaji  
2) Hal – hal apa yang disukai klien? Sulit dikaji  
3) Bagaimana klien memandang diri sendiri ? Sulit dikaji  
4) Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya? Sulit dikaji  
5) Hal – hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? Tidak ada. Pasien hanya terbaring di tempat tidur

**Pengkajian Riwayat Spiritual :**

- a. Apakah klien menganut satu agama?  
Pasien menganut agama islam
- b. Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah?  
Sulit dikaji, Pasien mengalami penurunan kesadaran
- c. Bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam agama?  
Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun

**PEMERIKSAAN TANDA-TANDA VITAL**

- **TANDA VITAL**  
TD: 158/90 mmHg  
HR: 86 x/menit  
RR: 18 x/menit  
SUHU: 35.9°C

***Behavioural Pain Scale***

Parameter	1	2	3	4	Skor
<b>Face (Wajah)</b>	<b>Tenang/rileks</b>	Mengerutkan alis	Kelopak mata tertutup	Meringis	1
<b>Anggota Badan Sebelah Atas</b>	<b>Tidak ada pergerakan</b>	Sebagian ditekuk	Sepenuhnya ditekuk dengan fleksi jari-jari	Retraksi permanen	1

<b>Ventilasi</b>	<b>Pergerakan dapat ditoleransi</b>	Batuk dengan pergerakan	Melawan ventilator	Tidak dapat mengontrol dengan Ventilasi	1
<b>Total skor</b>					<b>3</b>

**Identifikasi risiko**

<b>Risiko jatuh (<i>Morse fall scale</i>)</b> <input type="checkbox"/> Tidak berisiko (0-24) <input type="checkbox"/> Risiko rendah (25-50) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Risiko tinggi (&gt;51)</b>  <p style="text-align: center;"><b>Skor pasien 55</b></p>	<b>Status fungsional (Barthel Indeks)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ketergantungan total (0-4)</b> <input type="checkbox"/> Ketergantungan berat (5-8) <input type="checkbox"/> Ketergantungan sedang (9-11) <input type="checkbox"/> Ketergantungan ringan (12-19) <input type="checkbox"/> Mandiri (20)  <p style="text-align: center;"><b>Skor pasien 0</b></p>
<b>Risiko dekubitus</b> <input type="checkbox"/> Berisiko (10-15) <input type="checkbox"/> Berisiko tinggi (15-20) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Berisiko sangat tinggi (&gt;20)</b>  <p style="text-align: center;"><b>Skor pasien 24</b></p>	

**PEMERIKSAAN FISIK**

- Kepala dan Leher**  
**Inspeksi :**  
Kepala : Bentuk normachepal, kepala tampak botak, Nampak balutan pada kepala, tampak terpasang drain pada kepala  
Telinga : bentuk simetris, tidak ada cairan darah dari telinga  
Mata : mata simetris, sclera warna merah, conjungtiva tidak anemis, pupil isokor, refleks cahaya+ /+,refleks pupil +/+ , kedua mata bisa terbuka, tidak ada lesi pada mata  
Hidung : bentuk simetris, tidak ada massa, tidak ada sekret, tidak ada lesi, tidak ada darah Mulut : mukosa bibir agak kering, tidak ada luka/ lesi , terdapat sekret pada canul trachea dan oral  
Leher : tidak ada pembengkakan kelenjer dan peningkatan JVP
- Thoraks**  
**Inspeksi** : bentuk dada normal, pergerakan dada ada, simetris kiri dan kanan, tidak ada massa dan jejas  
**Palpasi** : tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi  
**Perkusi** : suara sonor  
**Auskultasi** : Vesikuler
- Pelvis**  
**Inspeksi** : Tampak bersih, tidak ada benjolan  
**Palpasi** : Tidak ada benjolan
- Ekstremitas atas/bawah**  
**Inspeksi :**  
Atas : nampak kedua tangan di restrain, nampak edema pada punggung dan jari-jari tangan, nampak terpasang alat tensi pada tangan kiri  
Bawah : tidak ada edema pada ekstermitas bawah, kuku kaki nampak panjang  
**Palpasi** : ekstermitas atas dan bawah teraba dingin
- Punggung**  
**Inspeksi** : Tidak ada edema, tidak ada lesi

**Palpasi** : Sulit dikaji

**Genetalia**

**Inspeksi** : Pasien terpasang kateter urine

**Palpasi** : Sulit dikaji

**PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK**

RONTGEN     USG     CT-SCAN     EKG     ENDOSKOPI     Lain-lain  
:

**Hasil :**

**Foto Thorax 3/3/2023**

- Tanda-tanda bendungan paru
- Pneumonia bilateral
- Terpasang ETT dengan tip +/- 5.66 cm diatas carina
- Terpasang gastric tube dengan tip kesan pada gaster

**Foto Thorax 27/2/2024**

- Pulmo normal

**MSCT Kepala 3/3/2024**

- Perdarahan intracerebral lobus frontalis kanan dengan estimasi volume perdarahan +/- 3.08 cc (dibandingkan dengan MSCT Scan kepala tanggal 28 Februari 2024, kesan : perbaikan)
- Perdarahan epidural regio parietal kiri (dibandingkan dengan MSCT Kepala 3D tanggal 28 Februari 2024, kesan : perbaikan)
- Defek os frontal sisi kanan berukuran +/- 3.14 x 4.76 cm dan os frontal sisi kiri berukuran +/- 2.89 x 2.43 cm
- Brain edema
- Rhinitis hypertrophycan
- Multisinusitis
- Subgaleal hematoma frontoparietooccipital kanan dan parietal kiri

**PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

**Pemeriksaan Laboratorium (04 Maret 2024)**

Pemeriksaan	Hasil	Nilai rujukan	Satuan	Keterangan
<b>Hasil Pemeriksaan Hematologi Rutin</b>				
WBC	11.0	4.00-10.0	10 <sup>3</sup> /ul	Leukositosis
RBC	4.10	4.00-6.00	10 <sup>6</sup> /ul	Normal
HGB	12.1	12.0-16.0	gr/dl	Normal
HCT	35	37.0-48.0	%	Normal
MCV	86	80.0-97.0	fl	Normal
MCH	30	26.5-33.5	pg	Normal
MCHC	34	31.5-35.0	gr/dl	Normal
PLT	165	150-400	10 <sup>3</sup> /ul	Normal
RDW-SD	40.1	37.0-54.0	fl	Normal
RDW-CV	12.7	10.0-15.0	%	Normal
PDW	10.3	10.0-18.0	fl	Normal
MPV	9.8	6.50-11.0	fl	Normal
P-LCR		13.0-43.0	%	

PCT	0.16	0.15-0.50	%	Normal
NEUT	89.1	52.0-75.0	%	Leukositosis/peradangan
LYMPH	5.4	20.0-40.0	%	Limfopenia/infeksi
MONO	4.8	2.00-8.00	%	Normal
EO	0.4	1.00-3.00	10 <sup>3</sup> /ul	Normal
BASO	0.3	0.00-0.10	%	Normal
LED I	70	(L<10,P<20)	mm	Peradangan
<b>Hasil pemeriksaan laboratorium GPT</b>				
SGPT	127	<41	U/L	Sirosis
<b>Hasil pemeriksaan laboratorium albumin</b>				
Albumin	2.7	3.5-5.0	gr/dl	
<b>Hasil pemeriksaan laboratorium glukosa sewaktu</b>				
GDS	172	140	mg/dl	
<b>Hasil pemeriksaan laboratorium elektrolit</b>				
Natrium	136	136-145	mmol/l	Normal
Kalium	2.7	3.5-5.1	mmol/l	
Klorida	101	97-111	mmol/l	Normal
<b>Hasil pemeriksaan laboratorium Kreatinin</b>				
Kreatinin	0.81	L(<1,3), P(<1,1)	mg/dl	Normal
<b>Hasil : Neutrofilia, limfopenia, hiperbilirubinemia, peningkatan aktivitas enzim-enzim, transaminase, hipoalbuminemia, hipokalemia</b>				
<b>Hasil AGD:</b>				
<b>AGD 3/3/2024</b>				
Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	
PH	7.558	7.35-7.45		
PO2	211.8	80.0-100.0	mmHg	
PCO2	28.1	35.0-45.0	mmHg	
SO2	99.9	95-98	%	
HCO2	25.3	22-26	Mmol/l	
BE	2.9	-2 s/d +2	Mmol/l	
ctO2	17.8	15.8-22.3		
ctCO2	26.2	23-27	Mmol/l	
<b>Interpretasi Hasil AGD: Alkalosis Respiratorik</b>				

## ANALISA DATA

NO	DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
1	<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RR 18x/menit</li> <li>- Lendir (+) pada endotracheal dan oral</li> <li>- Terpasang Endotracheal Tube</li> <li>- Pneumonia bilateral</li> </ul>	<p>Cedera otak primer ↓ Meningkatkan tahanan simpatik dan vaskuler sistemik ↓ Penurunan tekanan pembuluh darah pulmonal ↓ Peningkatan tekanan hidrosatik ↓ Penumpukan cairan/sekret ↓ Difusi oksigen terhambat</p>	<p><b>Bersihkan jalan napas tidak efektif</b></p>
2	<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Alat Bantu Pernapasan : ETT on Ventilator mode SIMV dengan FiO<sub>2</sub> 40%, PEEP 5.0</li> <li>- PH 7.558</li> <li>- PCO<sub>2</sub> 28,1 mmHg</li> <li>- PO<sub>2</sub> 211,8 mmHg</li> <li>- Interpretasi AGD askalosis respiratorik</li> </ul>	<p>Tanda-tanda bendungan paru ↓ Pertukaran O<sub>2</sub> dan CO<sub>2</sub> terganggu ↓ Hasil AGD abnormal</p>	<p><b>Gangguan Pertukaran Gas</b></p>
3	<p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluarga mengatakan pasien muntah (+) &gt; 10 kali 30 menit setelah kecelakaan</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TD : 158/90 mmHg</li> <li>- HR : 86x/menit</li> <li>- GCS E3M4V2 (Delirium)</li> <li>- Terdapat nyeri tekan pada kepala</li> <li>- Perdarahan intracerebral lobus frontalis kanan dengan estimasi volume perdarahan +/- 3.08 cc</li> <li>- Perdarahan epidural regio parietal kiri</li> <li>- Brain edema</li> </ul>	<p>Cedera otak primer ↓ Kerusakan sawar otak ↓ Perdarahan ↓ Peningkatan TIK ↓ Gangguan sirkulasi ke otak ↓ Risiko perfusi serebral tidak efektif</p>	<p><b>Penurunan kapasitas adaptif intrakranial</b></p>

	- Subgaleal hematom frontoparietooccipital kanan dan parietal kiri		
4	<b>DS:</b> - Sulit dikaji  <b>DO :</b> - Suhu 35.9 derajat celcius - Kulit teraba dingin	Cedera kepala ↓ Kerusakan jaringan otak ↓ Prosedur invasive ↓ Fase inflamasi	<b>Hipotermia</b>
5	<b>Faktor risiko:</b> - Faktor prosedur invasive - Luka Post Operasi (+), Ukuran : Defek os frontal sisi kanan ukuran +- 3,14 x 4,76 cm dan os frontal sisi kiri ukuran +- 2,89 x 2,43 cm - Hasil pemeriksaan lab hematologi urin - WBC 11.0 - NEUT 89.1% - LYMPH 5.4% - Terpasang ETT - Terpasang NGT - Terpasang kateter urine	Prosedur invasive ↓ Terdapat luka post op ↓ Pertahanan tubuh tidak adekuat	<b>Risiko infeksi</b>

### DIAGNOSIS KEPERAWATAN

NO	DIAGNOSIS KEPERAWATAN
1	<b>(D.0149) Bersihan jalan napas tidak efektif b/d sekresi yang tertahan, d/d:</b> <b>DS:</b> - Sulit dikaji <b>DO:</b> - RR : 18x/menit - Lendir (+) pada endotracheal dan oral - Terpasang Endotracheal Tube - Pneumonia bilateral
2	<b>(D.0003) Gangguan pertukaran gas b/d ketidakseimbangan ventilasi-perfusi d/d:</b> <b>DS:</b> - Sulit dikaji <b>DO:</b> - Penggunaan Alat Bantu Pernapasan : ETT on Ventilator mode SIMV dengan FiO2 40%, PEEP 5.0 - PH 7.558 - PCO <sub>2</sub> 28,1 mmHg - PO <sub>2</sub> 211,8 mmHg Interpretasi AGD askalosis respiratorik

3	<p><b>(D.0066) Penurunan kapasitas adaptif intrakranial b/d edema cerebral d/d :</b></p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluarga mengatakan pasien muntah (+) &gt; 10 kali 30 menit setelah kecelakaan</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TD : 158/90 mmHg</li> <li>- HR : 86x/menit</li> <li>- GCS E3M4V2 (Delirium)</li> <li>- Terdapat nyeri tekan pada kepala</li> <li>- Perdarahan intracerebral lobus frontalis kanan dengan estimasi volume perdarahan +/- 3.08 cc</li> <li>- Perdarahan epidural regio parietal kiri</li> <li>- Brain edema</li> <li>- Subgaleal hematoma frontoparietooccipital kanan dan parietal kiri</li> </ul>
4	<p><b>(D.0131) Hipotermia b/d agen pencedera fisik (trauma kepala) d/d :</b></p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p><b>DO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu 35.9</li> <li>- Kulit teraba dingin</li> </ul>
5	<p><b>(D.0142) Risiko infeksi b/d efek prosedur invasif d/d :</b></p> <p>Faktor risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor prosedur invasive</li> <li>- Luka Post Operasi (+), Ukuran : Defek os frontal sisi kanan ukuran +/- 3,14 x 4,76 cm dan os frontal sisi kiri ukuran +/- 2,89 x 2,43 cm</li> <li>- Hasil pemeriksaan lab hematologi urin</li> <li>- WBC 11.0</li> <li>- NEUT 89.1%</li> <li>- LYMPH 5.4%</li> <li>- Terpasang ETT</li> <li>- Terpasang NGT</li> <li>- Terpasang kateter urine</li> </ul>

## INTERVENSI KEPERAWATAN

NO	DIAGNOSIS (SDKI)	KRITERIA HASIL (SLKI)	TINDAKAN KEPERAWATAN (SIKI)	RASIONAL
1	<p><b>(D.0149) Bersihan jalan napas tidak efektif b/d sekresi yang tertahan, d/d:</b></p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RR 18x/menit</li> <li>- Lendir (+) pada endotracheal dan oral</li> <li>- Terpasang Endotracheal Tube</li> <li>- Pneumonia bilateral</li> </ul>	<p><b>(L.01002) Bersihan jalan napas meningkat</b></p> <p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi sputum menurun</li> <li>b. Gelisah menurun</li> <li>c. Wheezing menurun</li> </ul>	<p><b>(I.01011) Manajemen Jalan Napas Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)</li> <li>b. Monitor bunyi napas</li> <li>c. Monitor sputum</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Posisikan semi fowler atau supinasi</li> <li>b. Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik</li> <li>c. Berikan oksigen, jika perlu</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi pemberian bronkodilator,ekspektoran, mukolitik, jika perlu</li> </ul>	<p><b>(I.01011) Manajemen Jalan Napas Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mengetahui frekuensi,irama, kedalaman, dan upaya nafas</li> <li>b. Untuk mengetahui pola nafas atau suara nafas seperti bradipnea, takipnea, hiperventilasi.</li> <li>c. Mengetahui adanya jumlah, warna sputum serta produksi sputum</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mempertahankan jalan napas klien dan posisi sebelum melakukan suction</li> <li>b. Membantu mengeluarkan lendir menggunakan suction</li> <li>c. Menambah oksigen yang masuk ke dalam tubuh</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk melebarkan saluran pernapasan pasien.</li> </ul>
2	<p><b>(D.0003) Gangguan pertukaran gas b/d ketidakseimbangan ventilasi-perfusi d/d:</b></p> <p><b>DS:</b></p>	<p><b>(L.01003)Pertukaran Gas Meningkat</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24</p>	<p><b>(I.01008) Manajemen Asam-Basa : Alkalosis Respiratorik Observasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi penyebab terjadinya alkalosis respiratorik</li> </ul>	<p><b>(I.01008) Manajemen Asam-Basa : Alkalosis Respiratorik Observasi:</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Alat Bantu Pernapasan : ETT on Ventilator mode SIMV dengan FiO2 40%, PEEP 5.0</li> <li>- PH 7.558</li> <li>- PCO<sub>2</sub> 28,1 mmHg</li> <li>- PO<sub>2</sub> 211,8 mmHg</li> </ul> <p>Interpretasi AGD askalosis respiratorik</p>	<p>jam diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dispnea menurun</li> <li>b. PCO<sub>2</sub> membaik</li> <li>c. PO<sub>2</sub> membaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Monitor gejala perburukan</li> <li>c. Monitor input dan output cairan</li> </ul> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertahankan kepatenan jalan napas</li> <li>b. Pertahankan akses intravena</li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jelaskan penyebab terjadinya alkalosis respiratorik</li> <li>b. Anjurkan berhenti merokok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengeahui penyebab terjadinya alkalosis respiratorik</li> <li>b. Mengetahui kondisi pasien</li> <li>c. Mengetahui balance cairan 24 jam</li> </ul> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga kepatenan jalan napas</li> <li>b. Mempermudah pemberian obat</li> </ul> <p><b>Edukasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keluarga memahami penyebab terjadinya alkalosis respiratorik</li> <li>b. Mengajarkan pola hidup sehat kepada pasien dan keluarga</li> </ul>
3	<p><b>(D.0066) Penurunan kapasitas adaptif intrakranial b/d edema cerebral d/d :</b></p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluarga mengatakan pasien muntah (+) &gt; 10 kali 30 menit setelah kecelakaan</li> </ul> <p><b>DO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TD : 158/90 mmHg</li> <li>- HR : 86x/menit</li> <li>- GCS E3M4V2 (Delirium)</li> <li>- Terdapat nyeri tekan pada kepala</li> <li>- Perdarahan intracerebral</li> </ul>	<p><b>(L.06049) Kapasitas adaptif intrakranial meningkat</b></p> <p>Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam maka kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kesadaran meningkat</li> <li>b. Tekanan darah membaik</li> <li>c. Tekanan nadi membaik</li> </ul>	<p><b>(I.06198) Pemantauan Tekanan Intrakranial Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi penyebab peningkatan TIK</li> <li>b. Monitor peningkatan TD</li> <li>c. Monitor tingkat kesadaran</li> <li>d. Monitor kadar CO<sub>2</sub> dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertahankan sterilitas sistem pemantauan</li> <li>b. Pertahankan posisi kepala dan leher netral</li> </ul>	<p><b>(I.06198) Pemantauan Tekanan Intrakranial Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui penyebab peningkatan TIK</li> <li>b. Mengetahui peningkatan TD</li> <li>c. Mengetahui tingkat kesadaran</li> <li>d. Mengetahui kadar CO<sub>2</sub> pasien</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertahankan kebersihan sistem pemantauan</li> <li>b. Mencegah terjadinya peningkatan tekanan intrakranial</li> </ul>

	<p>lobus frontalis kanan dengan estimasi volume perdarahan +/- 3.08 cc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdarahan epidural regio parietal kiri</li> <li>- Brain edema</li> <li>- Subgaleal hematom frontoparietooccipital kanan dan parietal kiri</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien</li> <li>d. Berikan terapi non farmakologi</li> <li>e. Dokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Memantau kondisi pasien</li> <li>d. Bukti dan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan</li> </ul>
4	<p><b>(D.0131) Hipotermia</b> b/d agen pencedera fisik (trauma kepala) d/d :</p> <p><b>DS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p><b>DO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu 35.9</li> <li>- Kulit teraba dingin</li> </ul>	<p><b>(L.14134) Thermogulasi</b> <b>membai</b></p> <p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, maka diharapkan thermogulasi membaik dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Suhu tubuh membaik</li> <li>b. Suhu kulit membaik</li> </ul>	<p><b>(I.14507) Manajemen hipotermia</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitor suhu tubuh</li> <li>b. Identifikasi penyebab hipotermia</li> <li>c. Monitor tanda dan gejala akibat hipotermia</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sediakan lingkungan yang hangat (mis: atur suhu ruangan, inkubator)</li> <li>b. Ganti pakaian dan/atau linen yang basah</li> <li>c. Lakukan penghangatan aktif eksternal (mis: kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, perawatan metode kangguru)</li> </ul>	<p><b>(I.14507) Manajemen hipotermia</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mengetahui suhu tubuh pasien</li> <li>b. Mengetahui penyebab hipotermia</li> <li>c. Untuk mengetahui tanda dan gejala hipotermia</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agar suhu pasien baik</li> <li>b. Menghindari pasien menggigil</li> <li>c. Melakukan penghangatan aktif eksternal (mis: kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, perawatan metode kangguru)</li> </ul>
5	<p><b>(D.0142) Risiko infeksi</b> b/d efek prosedur invasif d/d :</p> <p>Faktor risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor prosedur invasive</li> <li>- Luka Post Operasi (+), Ukuran : Defek os frontal</li> </ul>	<p><b>(L.14137) Tingkat infeksi</b> <b>menurun</b></p> <p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan Tingkat infeksi</p>	<p><b>(I.14539) Pencegahan Infeksi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Batasi jumlah pengunjung</li> </ul>	<p><b>(I.14539) Pencegahan Infeksi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p>

	<p>sisi kanan ukuran +- 3,14 x 4,76 cm dan os frontal sisi kiri ukuran +- 2,89 x 2,43 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pemeriksaan lab hematologi urin</li> <li>- WBC 11.0</li> <li>- NEUT 89.1%</li> <li>- LYMPH 5.4%</li> <li>- Terpasang ETT</li> <li>- Terpasang NGT</li> <li>- Terpasang kateter urine</li> </ul>	<p>menurun dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebersihan badan meningkat</li> <li>b. Kadar sel darah putih membaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</li> <li>c. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengurangi kontaminasi bakteri</li> <li>b. Untuk mengurangi kontaminasi silang</li> <li>c. Mengurangi risiko infeksi pasca- prosedur dan untuk meminimalkan paparan dari penyedia layanan kesehatan untuk mikroorganisme yang berpotensi menular</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi pemberian antibiotic, jika Perlu</li> </ul>
--	---	---	--	---

### IMPLEMENTASI DAN EVALUASI HARI PERTAMA

HARI/TGL/JAM	NO.DX	IMPLEMENTASI	EVALUASI	PARAF & NAMA JELAS
Selasa, 05 Maret 2024 14.10 Wita  14.20 Wita	1	<p><b>(I.01011) Manajemen Jalan Napas</b>  <b>Observasi:</b>            a. Memonitor pola napas  <u>Hasil:</u> pola napas eupneu, RR: 20x/i            b. Memonitor bunyi napas tambahan (mis:gurgling, mengi, wheezing, ronchi)  <u>Hasil:</u> tidak ada bunyi napas tambahan            c. Memonitor sputum (jumlah,warna,aroma)  <u>Hasil:</u> terdapat sputum dengan jumlah yang banyak berwarna putih dan tekstur kental</p> <p><b>Terapeutik</b>            a. Memposisikan semi fowler atau fowler  <u>Hasil:</u> pasien telah diposisikan semi fowler            b. Melakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik  <u>Hasil:</u> telah dilakukan suction</p>	<p><b>20.20 Wita</b>  <b>S :</b>            - Sulit dikaji  <b>O:</b>            - RR 18 x/i            - Sputum berwarna putih            - Tidak ada bunyi napas tambahan  <b>A:</b>            - Bersihan jalan napas tidak efektif belum teratasi  <b>P:</b>            - Lanjutkan intervensi</p> <p><b>Manajemen jalan napas</b>            - Monitor pola napas            - Monitor sputum            - Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik</p>	Hijriyah Febriela, S.Kep
	2	<p><b>(I.01008) Manajemen Asam-Basa : Alkalosis Respiratorik</b>  <b>Observasi:</b>            - Mengidentifikasi penyebab terjadinya alkalosis respiratorik  <u>Hasil:</u> PH 7.558</p>	<p><b>20.30 Wita</b>  <b>S :</b>            - Sulit dikaji  <b>O:</b>            - RR 19 x/menit</p>	

14.31 Wita  14.20 Wita		<p>PCO<sub>2</sub> 28,1 mmHg PO<sub>2</sub> 211,8 mmHg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memonitor gejala perburukan <u>Hasil:</u> pernapasan 20 x/i dengan ETT on Ventilator mode SIMV dengan FiO<sub>2</sub> 40%, PEEP 5.0</li> <li>- Memonitor input dan output cairan <u>Hasil :</u> (BC +354/24 jam)</li> </ul> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertahankan kepatenan jalan napas <u>Hasil:</u> telah dilakukan suction</li> </ol> <p><b>Edukasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan penyebab terjadinya alkalosis respiratorik <u>Hasil:</u> telah dijelaskan kepada keluarga pasien bahwa penyebabnya adalah hiperventilasi</li> <li>b. Menganjurkan berhenti merokok, jika pasien merokok <u>Hasil:</u> keluarga pasien mengatakan pasien tidak merokok</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BC +354 cc/24 jam</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan pertukaran gas belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi</li> </ul> <p><b>Manajemen Asam-Basa : Alkalosis Respiratorik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab terjadinya alkalosis respiratorik</li> <li>- Monitor gejala perburukan</li> <li>- Monitor input dan output cairan</li> <li>- Pertahankan kepatenan jalan napas</li> </ul>	
14.35 Wita	3	<p><b>(I.06198) Pemantauan Tekanan Intrakranial Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK <u>Hasil :</u> pasien mengalami trauma kepala dan pasien post op craniectomy hari ke-5</li> <li>b. Memonitor peningkatan TD <u>Hasil :</u> 155/88 mmHg</li> <li>c. Memonitor tingkat kesadaran <u>Hasil :</u> Kesadaran delirium dengan hasil E3M4V2</li> <li>d. Memonitor kadar CO<sub>2</sub> dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan</li> </ol>	<p><b>20.40 Wita</b></p> <p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p><b>O :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TD : 165/94 mmHg</li> <li>- RR : 18x/menit</li> <li>- SpO<sub>2</sub> : 98%</li> <li>- delirium (E3M4V2)</li> </ul> <p><b>A:</b></p>	<p><b>Hijriyah Febriela, S.Kep</b></p>

14.40 Wita		<p><u>Hasil</u> : pernapasan 20x/menit dengan SpO2 100%</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Mempertahankan posisi kepala dan leher netral <u>Hasil</u> : posisi kepala klien dalam keadaan netral</p> <p>b. Mengatur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien <u>Hasil</u> : interval sistem pemantauan diatur setiap 60 menit</p> <p>c. Memberikan terapi non farmakologi <u>Hasil</u>: Tampak pasien diberikan terapi murrotal oleh keluarganya</p> <p>d. Mendokumentasikan hasil pemantauan <u>Hasil</u> : GCS : 9 (E3M4V2) TD: 155/88 mmHg RR : 20x/menit SpO2 100%</p>	<p>- masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi</p> <p>P :</p> <p>- Intervensi dilanjutkan</p> <p><b>Pemantauan Tekanan Intrakranial</b></p> <p>- Identifikasi penyebab peningkatan TIK</p> <p>- Monitor peningkatan TD</p> <p>- Monitor tingkat kesadaran</p> <p>- Pertahankan posisi kepala dan leher netral</p> <p>- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien</p> <p>- Berikan terapi non farmakologis</p> <p>- Dokumentasikan hasil pemantauan</p>	
20.00 Wita  20.10 Wita	4	<p><b>(I.14507) Manajemen hipotermia</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <p>a. Memonitor suhu tubuh <u>Hasil</u> : 35.7°C</p> <p>b. Mengidentifikasi penyebab hipotermia <u>Hasil</u> : pasien post op craniectomy hari ke-5</p> <p>c. Memonitor tanda dan gejala akibat hipotermia <u>Hasil</u> : kulit tubuh pasien dingin</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Melakukan penghangatan aktif eksternal (mis: kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, perawatan metode kangguru) <u>Hasil</u> : pasien dipasangkan blanket warmer</p>	<p><b>21.10 Wita</b></p> <p>S :</p> <p>- Sulit dikaji</p> <p>O :</p> <p>- Suhu sebelum dikasih intervensi : 35.7°C</p> <p>- Suhu setelah diberikan intervensi : 36.0 °C</p> <p>A:</p> <p>- Hipotermia belum teratasi</p> <p>P :</p> <p>- Lanjutkan intervensi</p>	<b>Hijriyah Febriela, S.Kep</b>

			<p><b>Manajemen hipotermia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor suhu tubuh</li> <li>- Identifikasi penyebab hipotermia</li> <li>- Monitor tanda dan gejala akibat hipotermia</li> <li>- Sediakan lingkungan yang hangat (mis: atur suhu ruangan, inkubator)</li> <li>- Ganti pakaian dan/atau linen yang basah</li> <li>- Lakukan penghangatan aktif eksternal (mis: kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, perawatan metode kangguru)</li> </ul>	
15.00 Wita	5	<p><b>(I.14539) Pencegahan Infeksi Observasi</b></p> <p>a. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik  <u>Hasil :</u>          Hasil pemeriksaan Lab hematologi urin          WBC : <math>11.0 \cdot 10^3/\text{ul}</math>          NEUT : 89.1%          LYMPH : 5.4%          Pasien terpasang ventilator VIA ETT mode SIMV dengan FiO<sub>2</sub> 40%, PEEP 5.0          Terpasang kateter urine</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Membatasi jumlah pengunjung  <u>Hasil :</u> pengunjung dibatasi hanya 1 orang</p> <p>b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien  <u>Hasil :</u> hand hygiene sering dilakukan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</p>	<p><b>21.00 Wita</b></p> <p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawat tampak mencuci tangan sebelum melakukan tindakan aseptik</li> <li>- Tidak ada kunjungan bagi pasien yang dirawat di ruang ICU diluar jam besuk</li> <li>- WBC : 11.0</li> </ul> <p>A :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risiko infeksi tidak terjadi</li> </ul> <p>P :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi</li> </ul>	<p><b>Hijriyah Febriela, S.Kep</b></p>
15.35 Wita				

		<p>c. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi  <u>Hasil</u> : semaksimal mungkin teknik aseptik dilakukan untuk pencegahan infeksi</p>	<p><b>Pencegahan infeksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi</li> <li>- Batasi jumlah pengunjung</li> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</li> </ul>	
--	--	--	---	--

### IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPERAWATAN HARI KEDUA

HARI/TGL/JAM	NO.DX	IMPLEMENTASI	EVALUASI	PARAF & NAMA JELAS
<p><b>Rabu, 06 Maret 2024</b> 21.30 Wita</p> <p>21.40 Wita</p>	1	<p><b>(I.01011) Manajemen Jalan Napas</b>  <b>Observasi:</b></p> <p>a. Memonitor pola napas  <u>Hasil</u>: pola napas eupneu, RR: 19x/i</p> <p>b. Memonitor bunyi napas tambahan (mis:gurgling, mengi, wheezing, ronghi)  <u>Hasil</u>: tidak ada bunyi napas tambahan</p> <p>c. Memonitor sputum (jumlah,warna,aroma)  <u>Hasil</u>: sputum berwarna putih dan kental</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Memosisikan semi fowler atau fowler  <u>Hasil</u>: pasien telah diposisikan semi fowler</p> <p>b. Melakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik  <u>Hasil</u>: telah dilakukan suction</p>	<p><b>07.00 Wita</b>  <b>S :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RR 19 x/i</li> <li>- Sputum berwarna putih</li> <li>- Tidak ada bunyi napas tambahan</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersihan jalan napas tidak efektif belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi</li> </ul> <p><b>Manajemen jalan napas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor pola napas</li> </ul>	<p><b>Hijriyah Febriela, S.Kep</b></p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor sputum</li> <li>- Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik</li> </ul>	
21.47 Wita	2	<p><b>(I.01008) Manajemen Asam-Basa : Alkalosis Respiratorik</b></p> <p><b>Observasi:</b></p> <p>a. Mengidentifikasi penyebab terjadinya alkalosis respiratorik  <u>Hasil:</u> PH 7.558  PCO<sub>2</sub> 28,1 mmHg  PO<sub>2</sub> 211,8 mmHg</p> <p>b. Memonitor gejala perburukan  <u>Hasil:</u> pernapasan 19 x/i dengan ETT on Ventilator mode SIMV dengan FiO<sub>2</sub> 40%, PEEP 5.0</p> <p>c. Memonitor input dan output cairan  <u>Hasil :</u> (BC -125/24 jam)</p>	<p><b>07. 10 Wita</b></p> <p><b>S :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RR 19 x/menit</li> <li>- BC -125 cc/24 jam</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan pertukaran gas belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi</li> </ul> <p><b>Manajemen Asam-Basa : Alkalosis Respiratorik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab terjadinya alkalosis respiratorik</li> <li>- Monitor gejala perburukan</li> <li>- Monitor input dan output cairan</li> <li>- Pertahankan kepatenan jalan napas</li> </ul>	<b>Hijriyah Febriela, S.Kep</b>
21.30 Wita		<p><b>Terapeutik:</b></p> <p>a. Mempertahankan kepatenan jalan napas  <u>Hasil:</u> telah dilakukan suction</p>		
21.50 Wita		<p><b>Edukasi:</b></p> <p>a. Menjelaskan penyebab terjadinya alkalosis respiratorik  <u>Hasil:</u> telah dijelaskan kepada keluarga pasien bahwa penyebabnya adalah hiperventilasi</p> <p>b. Menganjurkan berhenti merokok, jika pasien merokok  <u>Hasil:</u> keluarga pasien mengatakan pasien tidak merokok</p>		

<p>22.00 Wita</p> <p>22.05 Wita</p>	<p>3</p>	<p><b>(I.06198) Pemantauan Tekanan Intrakranial Observasi</b></p> <p>a. Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK <u>Hasil</u> : pasien mengalami trauma kepala dan pasien post op craniectomy hari ke-6</p> <p>b. Memonitor peningkatan TD <u>Hasil</u> : 134/97 mmHg</p> <p>c. Memonitor tingkat kesadaran <u>Hasil</u> : Kesadaran Somnolen dengan hasil E3M5V2</p> <p>d. Memonitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan <u>Hasil</u> : pernapasan 18x/menit dengan SpO2 100%</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Mempertahankan posisi kepala dan leher netral <u>Hasil</u> : posisi kepala klien dalam keadaan netral</p> <p>b. Mengatur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien <u>Hasil</u> : interval sistem pemantauan diatur setiap 60 menit</p> <p>c. Memberikan terapi non farmakologi <u>Hasil</u>: Tampak pasien diberikan terapi murrotal oleh keluarganya</p> <p>d. Mendokumentasikan hasil pemantauan <u>Hasil</u> : GCS : 10 (E3M5V2) TD: 134/97 mmHg RR : 18x/menit SpO2 100%</p>	<p><b>07.20 Wita</b></p> <p><b>S:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p><b>O :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TD : 121/89 mmHg</li> <li>- RR : 19 x/menit</li> <li>- SpO2 : 99%</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi</li> </ul> <p><b>P :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lanjutkan intervensi</li> </ul> <p><b>Pemantauan Tekanan Intrakranial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab peningkatan TIK</li> <li>- Monitor peningkatan TD</li> <li>- Monitor tingkat kesadaran</li> <li>- Pertahankan posisi kepala dan leher netral</li> <li>- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien</li> <li>- Berikan terapi non farmakologis</li> <li>- Dokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul>	<p><b>Hijriyah Febriela, S.Kep</b></p>
<p>07.00 Wita</p>	<p>4</p>	<p><b>(I.14507) Manajemen hipotermia Observasi</b></p> <p>a. Memonitor suhu tubuh</p>	<p><b>08.10 Wita</b></p> <p><b>S :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul>	<p><b>Hijriyah Febriela, S.Kep</b></p>

07.10 Wita		<p><u>Hasil</u> : 35.9°C</p> <p>b. Mengidentifikasi penyebab hipotermia <u>Hasil</u> : pasien post op craniectomy hari ke-5</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Melakukan penghangatan aktif eksternal (mis: kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, perawatan metode kangguru) <u>Hasil</u> : pasien dipasangkan blanket warmer</p>	<p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu sebelum dikasih intervensi : 35.9°C</li> <li>- Suhu setelah diberikan intervensi : 36.3°C</li> </ul> <p>A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hipotermia belum teratasi</li> </ul> <p>P :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutkan intervensi</li> </ul> <p><b>Manajemen hipotermia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor suhu tubuh</li> <li>- Identifikasi penyebab hipotermia</li> <li>- Monitor tanda dan gejala akibat hipotermia</li> <li>- Sediakan lingkungan yang hangat (mis: atur suhu ruangan, inkubator)</li> <li>- Ganti pakaian dan/atau linen yang basah</li> <li>- Lakukan penghangatan aktif eksternal (mis: kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, perawatan metode kangguru)</li> </ul>	
22.30 Wita	5	<p><b>(I.14539) Pencegahan Infeksi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <p>a. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <u>Hasil</u> : Hasil pemeriksaan Lab hematologi urin WBC : <math>11.0 \times 10^3/\mu\text{l}</math> NEUT : 89.1%</p>	<p><b>07.40 Wita</b></p> <p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak dapat dikaji</li> </ul> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawat tampak mencuci tangan sebelum melakukan tindakan aseptik</li> </ul>	<p><b>Hijriyah Febriela, S.Kep</b></p>

21.35 Wita		<p>LYMPH : 5.4%          Pasien terpasang ventilator VIA ETT mode SIMV dengan FiO2 40%, PEEP 5.0          Terpasang kateter urine</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Membatasi jumlah pengunjung  <u>Hasil</u> : pengunjung dibatasi hanya 1 orang</p> <p>b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien  <u>Hasil</u> : hand hygiene sering dilakukan perawat, dokter maupun keluarga pasien sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</p> <p>c. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi  <u>Hasil</u> : semaksimal mungkin teknik aseptik dilakukan untuk pencegahan infeksi</p>	<p>- Tidak ada kunjungan bagi pasien yang dirawat di ruang ICU diluar jam besuk</p> <p>A :</p> <p>- masalah infeksi tidak terjadi</p> <p>P :</p> <p>- Lanjutkan intervensi pencegahan infeksi</p> <p>- Monitor tanda dan gejala infeksi</p> <p>- Batasi jumlah pengunjung</p> <p>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</p>	
------------	--	---	---	--

### IMPLEMENTASI DAN EVALUASI HARI KETIGA

HARI/TGL/JAM	NO.DX	IMPLEMENTASI	EVALUASI	PARAF & NAMA JELAS
Kamis,07 Maret 2024 21.20 Wita	1	<p>(I.01011) Manajemen Jalan Napas</p> <p><b>Observasi:</b></p> <p>a. Memonitor pola napas  <u>Hasil</u>: pola napas eupneu, RR:18 x/i</p> <p>b. Memonitor bunyi napas tambahan (mis:gurgling, mengi, wheezing, ronghi)</p>	<p><u>06.55 Wita</u></p> <p>S :</p> <p>- Sulit dikaji</p> <p>O:</p> <p>- RR 20 x/i</p>	<p>Hijriyah Febriela, S.Kep</p>

21.30 Wita		<p><u>Hasil:</u> tidak ada bunyi napas tambahan</p> <p>c. Memonitor sputum (jumlah,warna,aroma)  <u>Hasil:</u> sputum berwarna putih dan kental dengan jumlah sedikit dari kemarin-kemarin</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Memposisikan semi fowler atau fowler  <u>Hasil:</u> pasien telah diposisikan semi fowler</p> <p>b. Melakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik  <u>Hasil:</u> telah dilakukan suction</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sputum berwarna putih</li> <li>- Tidak ada bunyi napas tambahan</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersihkan jalan napas tidak efektif belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan intervensi</li> </ul> <p><b>Manajemen jalan napas</b></p>	
21.37 Wita   21.30 Wita  21.43 Wita	2	<p><b>(I.01008) Manajemen Asam-Basa : Alkalosis Respiratorik</b></p> <p><b>Observasi:</b></p> <p>a. Mengidentifikasi penyebab terjadinya alkalosis respiratorik  <u>Hasil:</u> PH 7.558  PCO2 28,1 mmHg  PO2 211,8 mmHg</p> <p>b. Memonitor gejala perburukan  <u>Hasil:</u> pernapasan 19 x/i dengan ETT on Ventilator mode Spontan dengan FiO2 35%, PEEP 5.0</p> <p>c. Memonitor input dan output cairan  <u>Hasil :</u> (BC -463/24 jam)</p> <p><b>Terapeutik:</b></p> <p>a. Mempertahankan kepatenan jalan napas  <u>Hasil:</u> telah dilakukan suction</p> <p><b>Edukasi:</b></p> <p>a. Menjelaskan penyebab terjadinya alkalosis respiratorik  <u>Hasil:</u> telah dijelaskan kepada keluarga pasien bahwa penyebabnya adalah hiperventilasi</p> <p>b. Menganjurkan berhenti merokok, jika pasien merokok  <u>Hasil:</u> keluarga pasien mengatakan pasien tidak merokok</p>	<p><b>07.10 Wita</b></p> <p><b>S :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RR 19 x/menit</li> <li>- BC -463 cc/24 jam</li> </ul> <p><b>A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan pertukaran gas belum teratasi</li> </ul> <p><b>P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan intervensi</li> </ul> <p><b>Manajemen Asam-Basa : Alkalosis Respiratorik</b></p>	<b>Hijriyah Febriela, S.Kep</b>

<p>22.00 Wita</p> <p>22.05 Wita</p>	<p>3</p>	<p><b>(I.06198) Pemantauan Tekanan Intrakranial Observasi</b></p> <p>a. Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK <u>Hasil</u> : pasien mengalami trauma kepala dan pasien post op craniectomy hari ke-7</p> <p>b. Memonitor peningkatan TD <u>Hasil</u> : 134/74 mmHg</p> <p>c. Memonitor tingkat kesadaran <u>Hasil</u> : Kesadaran apatis dengan hasil E3M5V4</p> <p>d. Memonitor kadar CO<sub>2</sub> dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan <u>Hasil</u> : pernapasan 18x/menit dengan SpO<sub>2</sub> 100%</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Mempertahankan posisi kepala dan leher netral <u>Hasil</u> : posisi kepala klien dalam keadaan netral</p> <p>b. Mengatur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien <u>Hasil</u> : interval sistem pemantauan diatur setiap 60 menit</p> <p>c. Memberikan terapi non farmakologi <u>Hasil</u>: Tampak pasien diberikan terapi murrotal oleh keluarganya</p> <p>d. Mendokumentasikan hasil pemantauan <u>Hasil</u>: GCS : 12 (E3M5V4) TD: 134/74 mmHg RR : 18x/menit SpO<sub>2</sub> 100%</p>	<p><b>07.20 Wita</b></p> <p>S:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TD : 139/80 mmHg</li> <li>- RR : 20 x/menit</li> <li>- SpO<sub>2</sub> : 99%</li> <li>- GCS : 12 Apatis (E3M5V4)</li> </ul> <p>A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi</li> </ul> <p>P :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan intervensi</li> </ul>	<p><b>Hijriyah Febriela, S.Kep</b></p>
<p>06.50 Wita</p>	<p>4</p>	<p><b>(I.14507) Manajemen hipotermia Observasi</b></p> <p>a. Memonitor suhu tubuh <u>Hasil</u> : 36.4°C</p> <p>b. Mengidentifikasi penyebab hipotermia</p>	<p><b>08.00 Wita</b></p> <p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dikaji</li> </ul> <p>O :</p>	<p><b>Hijriyah Febriela, S.Kep</b></p>

07.00 Wita		<p><u>Hasil</u> : pasien post op craniectomy hari ke-7</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Melakukan penghangatan aktif eksternal (mis: kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, perawatan metode kangguru)</p> <p><u>Hasil</u> : pasien dipasangkan blanket warmer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu sebelum dikasih intervensi : 36.4°C</li> <li>- Suhu setelah diberikan intervensi : 36.6°C</li> </ul> <p>A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hipotermia teratasi</li> </ul> <p>P:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan intervensi</li> </ul> <p><b>Manajemen hipotermia</b></p>	
22.00 Wita  21.40 Wita	5	<p><b>(I.14539) Pencegahan Infeksi Observasi</b></p> <p>a. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</p> <p><u>Hasil</u> : belum ada hasil lab terbaru, tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka post op</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Membatasi jumlah pengunjung</p> <p><u>Hasil</u> : pengunjung dibatasi hanya 1 orang yang masuk keruangan</p> <p>b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</p> <p><u>Hasil</u> : hand hygiene sering dilakukan pada 5 moment cuci tangan</p>	<p><b>07.40 Wita</b></p> <p>S:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak dapat dikaji</li> </ul> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawat tampak mencuci tangan di 5 moment</li> </ul> <p>A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masalah infeksi tidak terjadi</li> </ul> <p>P:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan intervensi</li> </ul> <p><b>pengegahan infeksi</b></p>	<b>Hijriyah Febriela, S.Kep</b>

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### 5.1 Analisis Asuhan Keperawatan

##### 5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan

Pengkajian ini dilakukan diruang ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar pada tanggal 04 Maret 2024. Pengkajian ini dilakukan pada Tn. D dengan diagnosa medis *traumatic brain injury*. Sebelumnya pasien telah di rawat di RS Ainun Habibi, lalu di rujuk ke RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar karena pasien telah mengalami penurunan kesadaran pada tanggal 27 Februari 2024.

##### a. B1 (Breathing)

Pasien mengalami penurunan kesadaran dengan terpasang *Endotracheal Tube* on Ventilator mode SIMV dengan FiO<sub>2</sub> 40%, PEEP 5.0, terdapat lendir yang banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Adika.2022) dimana pada pasiennya yang mengalami penurunan kesadaran GCS 9 terpasang Ventilator ETT dan OPA mode Sim-V terjadi penyumbatan karena banyaknya lendir dimulut.

Teori (Devlin et al., 2018) menyampaikan bahwasanya penurunan kesadaran pada pasien yang menggunakan ventilasi mekanis dengan *Endotracheal Tube* (ETT) dan mode SIMV (*Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation*) dengan FiO<sub>2</sub> 40% dan PEEP (*Positive End-Expiratory Pressure*) 5.0 dapat disebabkan oleh berbagai faktor dengan tanda-tanda klinis seperti terdapat lendir. Faktor yang berperan penting

dalam penurunan kesadaran pasien dengan ventilasi mekanis dapat disebabkan oleh: Hipoksemia atau hiperkapnia, Obstruksi saluran napas, dan Sedasi berlebih atau efek samping obat.

b. B2 (Circulation)

Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah pasien 158/90 mmHg, CRT <3 detik, tidak sianosis, konjunktiva tidak anemis, nadi 86 x/menit, suhu 35.7°C. Peningkatan tekanan darah dapat terjadi sebagai akibat dari peningkatan tekanan intrakranial (ICP) dan respons kompensasi sistemik untuk mempertahankan perfusi otak. Sejalan dengan penelitian (Nuh Huda) dimana didapatkan sebanyak 6,3% klien yang mengalami tekanan darah >140/>90 mmHg pada pasien trauma kepala.

Teori yang mendasari peningkatan tekanan darah pada pasien TBI adalah *refleks cushing*, yang mencakup peningkatan tekanan darah sistemik sebagai upaya untuk mempertahankan perfusi otak yang adekuat dalam kondisi ICP yang meningkat. Penelitian (Carney et al., 2021) menyatakan bahwa tekanan darah yang terkontrol penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada pasien dengan TBI.

c. B3 (Neurologi)

Hasil pengkajian didapatkan tingkat kesadaran pasien delirium dengan GCS E3M4V2. Refleks nervus kranialis sulit dikaji karena pasien mengalami penurunan kesadaran. Sama halnya dalam penelitian (Widya.2022) sebanyak 8% pasien dengan penurunan kesadaran sedang

(GCS 9-12) di RS Ibnu Sina Makassar yang disebabkan oleh trauma kepala.

Teori yang disampaikan (Mckee & Daneshvar, 2015) menjelaskan bahwasanya penurunan kesadaran pada pasien dengan TBI disebabkan oleh kerusakan langsung pada jaringan otak (kerusakan primer) dan proses sekunder yang mengikuti cedera awal.

d. B4 (Bladder)

Hasil pengkajian menunjukkan produksi urine Tn D yakni 600-800 cc/24 jam, warna urine kekuning-kuningan dan bau urine ammonia serta terpasang kateter. Sejalan dengan penelitian (Nicolle, 2015) dalam studinya meneliti hubungan antara cedera otak dan disfungsi kandung kemih, menemukan bahwa gangguan kontrol saraf pusat pada miksi menyebabkan masalah seperti retensi urin dan inkontinensia.

Teori (Abrams,2022) menyatakan bahwasanya cedera otak dapat mempengaruhi pusat kontrol miksi di batang otak dan korteks, yang mengganggu komunikasi antara otak dan kandung kemih. Pasien mungkin mengalami kesulitan mengosongkan kandung kemih, yang menyebabkan retensi urin dan inkontinensia urin. Ini dapat menyebabkan distensi kandung kemih dan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih (ISK) dan gangguan elektrolit.

e. B5 (Bowel)

Pada pasien dengan penurunan kesadaran, seperti yang dialami oleh Tn D dengan traumatic brain injury (TBI), fungsi gastrointestinal sering

kali terganggu. Hasil pengkajian pada pasien Tn D menunjukkan pasien terpasang NGT, ukuran 18 fr, kebutuhan nutrisi parenteral 1000 ml/24 Jam, jenis IVFD Kaen 3B, kebutuhan nutrisi enteral peptisol 3x100 ml dan peristaltik usus 6-8x/menit. Sejalan dengan (Nemati & Astaneh, 2019) yang meneliti gangguan gastrointestinal pada pasien dengan TBI dan menemukan bahwa hipomotilitas usus dan risiko ileus adalah masalah umum yang mempengaruhi pasien dengan cedera otak.

Sehingga (Elke et al, 2016) dalam teorinya menekankan pentingnya nutrisi enteral melalui NGT pada pasien dengan TBI untuk memastikan pemberian nutrisi yang adekuat dan mencegah komplikasi gastrointestinal seperti distensi lambung dan aspirasi.

f. B6 (Bone)

Hasil penelitian ini menunjukkan pergerakan ekstremitas pasif, kekuatan otot kanan dan kiri menurun, post op craniectomy. Pasien dengan penurunan kesadaran sering kali menyebabkan penurunan pergerakan, sehingga penting dilakukan manajemen pasien dengan kondisi demikian. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tahir,2018) menunjukkan bahwa pasien dengan penurunan kesadaran cenderung memiliki penurunan pergerakan yang signifikan.

Hal demikian didukung oleh teori (Giacino, 2018) dimana pasien dengan penurunan kesadaran cenderung memiliki respons yang terbatas atau bahkan tidak ada terhadap stimulus eksternal atau internal, termasuk rangsangan fisik atau verbal. Penurunan pergerakan kesadaran pada pasien

dengan penurunan kesadaran disebabkan oleh penurunan kemampuan otak untuk memproses dan merespons stimulus, yang mungkin karena gangguan pada mekanisme sensorik dan integrasi dalam sistem saraf pusat. Studi ini juga menekankan bahwa evaluasi pergerakan kesadaran adalah penting dalam manajemen pasien dengan gangguan kesadaran untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran yang akurat dan merencanakan perawatan yang tepat.

### **5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan**

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data didapatkan diagnosa keperawatan yang muncul pada Tn D sebagai berikut:

Masalah keperawatan pasien Tn D yang pertama yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, dibuktikan dengan RR:18x/menit, lendir (+) pada endotracheal dan oral dan terpasang *Endotracheal Tube*. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh (Widya,2023) yang menyatakan bahwa pasien cedera kepala disini mengalami kesulitan bernafas yang dimana Salah satu penyebabnya adalah penurunan kesadaran pada pasien sehingga pasien tidak mampu membersihkan sekret yang ada. Sesuai dengan teori di buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) bersihan jalan napas tidak efektif adalah ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten.

Masalah keperawatan yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi-perfusi dibuktikan dengan hasil AGD Alkalosis Respiratorik serta Penggunaan Alat Bantu Pernapasan :

ETT on Ventilator mode SIMV dengan FiO<sub>2</sub> 40%, PEEP 5.0. sejalan dengan penelitian (Isra,2022) didapatkan pasien trauma kepala mengalami gangguan pertukaran gas dengan hasil AGD Alkalosisis Metabolik dimana PH: 7.496 (meningkat), PO<sub>2</sub>: 134.9 (meningkat), PCO<sub>2</sub>: 33.9 (menurun), HCO<sub>3</sub>:26.8 (meningkat). Sesuai teori dibuku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) gangguan pertukaran gas merupakan kelebihan atau kekurangan oksigen dan/atau eliminasi karbondioksida pada membrane alveolus-kapiler.

Masalah keperawatan ketiga yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral dibuktikan dengan TD 148/101 mmHg, HR 86x/menit, GCS E3M4V2 (delirium), terdapat nyeri tekan pada kepala, perdarahan intracerebral lobus frontalis kanan dengan estimasi volume perdarahan +/- 41.13 cc, brain edema, perdarahan subarachnoid regio frontoparietal bilateral, subgaleal hematoma regio frontotemporoparietal kanan,multisinuitis. Hal ini sejalan dengan penelitian (hendrawati,2023) mengangkat penurunan kapasitas adaptif intrakranial sebagai diagnosa karena penurunan kesadaran serta terjadinya peningkatan tekanan intrakranial pada pasien. Sesuai dengan teori di buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) penurunan kemampuan adaptasi intrakranial merupakan gangguan pada mekanisme dinamika intracranial untuk mengkompensasi rangsangan yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial.

Masalah keperawatan keempat yaitu hipotermia berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala) dibuktikan dengan suhu 35.9 derajat celcius dan kulit teraba dingin. Hal ini sejalan dengan (Rauch et.al.2021) dari

penelitiannya didapatkan salah satu permasalahan dari pasien trauma kepala adalah penurunan suhu tubuh atau hipotermia. sesuai dengan teori di buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) hipotermia adalah suhu tubuh berada dibawah rentang normal, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Masalah keperawatan kelima yaitu risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif dibuktikan dengan faktor prosedur invasive, luka Post Operasi (+), Ukuran : Defek os frontal sisi kanan ukuran +- 3,14 x 4,76 cm dan os frontal sisi kiri ukuran +- 2,89 x 2,43 cm, hasil pemeriksaan lab hematologi urin WBC 11.0, NEUT 89.1%, LYMPH 5.4%, terpasang ETT, terpasang NGT dan terpasang kateter urine. Sejalan dengan penelitian (Debi.2022) yang menyimpulkan bahwasanya pasien trauma kepala sangat rentang terjadi infeksi karena adanya luka yang memberikan peluang terjadinya infeksi. Sesuai dengan teori di buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) risiko infeksi merupakan kondisi dimana seseorang berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik.

### **5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan**

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan 09 Maret 2024 diruang ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pelaksanaan berlangsung sesuai dengan rencana yang disusun berdasarkan SDKI dan SIKI. Implementasi berlangsung sesuai dengan rencana yang dikembangkan dan sesuai dengan masalah perawatan pasien yang ditemukan.

Pada diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif tindakan keperawatan yang dilakukan itu manajemen jalan napas berupa monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas), monitor bunyi napas dan monitor sputum. Terapeutik yaitu posisikan semi fowler, lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik dan berikan oksigen, jika perlu. Sejalan dengan penelitian (Hematom, 2022) yang menerapkan intervensi manajemen jalan napas pada pasien cedera kepala yang mengalami peningkatan sekret pada area ETT dan mulut pasien. Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif adalah manajemen jalan napas, diharapkan dengan pemberian intervensi tersebut masalah bersihan jalan napas meningkat

Gangguan pertukaran gas dilakukan adalah manajemen asam-basa: Alkalosis Respiratorik. Sejalan dengan penelitian (Ulya et al., 2024) yang mengatakan Pemantauan/monitoring analisa gas darah secara berkala sangat diperlukan dalam penatalaksanaan pneumonia, hal ini berhubungan dengan pengkategorian gangguan asam basa yang dialami sehingga dapat menentukan penatalaksanaan yang tepat sesuai kategori gangguan asam basa yang dialami. Pasien dengan gangguan asam basa berat dan progresif dapat mengalami gagal napas. Menurut (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) manajemen asam-basa:alkalosisi respiratorik ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelola kondisi darah basah akibat rendahnya tekanan parsial karbondioksida Diharapkan masalah pertukaran gas membaik dengan kriteria hasil PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2</sub>, dan pH membaik

Penurunan kapasitas adaptif intracranial menggunakan intervensi pemantauan tekanan intracranial. Pada penelitian (Pramessti & Kristinawati, 2020) didapatkan bahwasanya pemantauan peningkatan tekanan intrakranial sangat penting untuk mencegah keparahan terhadap penderita yang mengalami cedera kepala guna mengurangi kematian akibat edema otak, pentingnya penilaian GCS berkaitan peningkatan tekanan intrakranial bertujuan untuk mengetahui keadaan yang dapat memperburuk kondisi fisiologis akibat cedera kepala. Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) manajemen peningkatan tekanan intrakranial adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola peningkatan tekanan di rongga tengkorak

Masalah keperawatan hipotermia dilakukan manajemen hipotermia dengan menggunakan blanket warmer. Sejalan pada penelitian (Badjatia,2022) yang merekomendasikan Penggunaan *blanket warmer* sebagai intervensi untuk mengatasi hipotermia pada pasien dengan *traumatic brain injury* (TBI) dalam penanganan nonfarmakologis. Menurut (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Intervensi utama yang dilakukan untuk pasien hipotermia yaitu Manajemen hipotermi, meliputi observasi yaitu monitor suhu tubuh, identifikasi penyebab hipotermia, monitor tanda dan gejala akibat hipotermia. Terapeutik sediakan lingkungan yang hangat, ganti pakaian dan/atau linen yang basah, lakukan penghangatan aktif eksternal dengan menggunakan blanket warmer. Dimana penggunaan blanket warmer ini diberikan diberikan setelah akhir shift karena untuk menghindari adanya efek/reaksi dari obat-obatan yang dapat mempengaruhi pemberian blanket warmer ini.

Masalah keperawatan risiko infeksi dilakukan pencegahan infeksi. Sejalan dengan penelitian (Salawati, 2012) Prosedur-prosedur yang berhubungan dengan perawatan respiratori seperti intubasi endotrakeal, pengisapan dan ventilasi mekanik memberi kesempatan transmisi mikroorganisme dari bendabenda mati ke pasien (pada komponen humidifier, nebulizer dan ventilator yang terkontaminasi) serta pemindahan mikroorganisme melalui tangan petugas kesehatan yang terkontaminasi, dari satu pasien ke pasien lainnya. Prosedur lain yang dapat membahayakan saluran pernapasan adalah pemberian oksigen, pengobatan pernapasan tekanan positif intermitten, pemasangan dan pemeliharaan jalan napas buatan dan pengisapan endotrakeal. Cara yang paling penting untuk mencegah infeksi adalah memutuskan cara penularan dengan melakukan intervensi pencegahan infeksi. Menurut (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) Pencegahan infeksi adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan menurunkan risiko terserang organisme patogenik

Asumsi peneliti didasarkan penjelasan di atas bahwasanya pasien dengan TBI yang mengalami penurunan kesadaran memiliki sejumlah masalah yang kompleks dimulai dari permasalahan oksigenasi, breathing sampai pada ekstremitasnya, sehingga pasien dengan penurunan kesadaran membutuhkan perawatan secara total care. Salah satu bentuk perawatan yang dilakukan dengan pemberian intervensi *blanket warmer* pada pasien.

Kondisi ini telah diuraikan dalam Al-Qur'an Asy-Syura/26:80 yang berbunyi:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

Terjemahnya:

” Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku”.

Tafsir Al-Misbah menyatakan sakit merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Namun demikian, dalam hal penyembuhan bahwa Yang melakukannya adalah Allah Ta’ala. Perlu dicatat bahwa penyembuhan, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim, bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadits Rasulullah yang memerintahkan untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah datangnya dari Allah. Keterkaitan dalil ini adalah apapun penyakit yang menyerang seorang individu, maka yang hanya bisa mengangkat penyakit tersebut adalah Allah. Oleh karena itu, pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga harus selalu meyakini dan mencari sebab bahwasannya untuk kesembuhan dari penyakit, semuanya adalah berasal dari Allah.

#### **5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan**

Proses implementasi keperawatan pada Tn.D diruangan Intensive Care Unit (ICU) dilakukan selama 3x atau selama 3 hari berturut-turut dimulai hari 04-09 Maret 2024 dengan melaksanakan intervensi yang sudah direncanakan sebelumnya. Diagnosis utama yaitu bersihan jalan napas tidak efektif telah diberikan implementasi manajemen jalan napas mendapatkan hasil RR: 20x/menit, hasil terdapat sputum dengan tekstur kental, pasien disuctoin serta diberikan posisi semi fowler. Hal ini sesuai dengan penelitian (Hematom, 2022)

Salah satu tindakan manajemen jalan nafas yang dilakukannya adalah dengan pengaturan posisi semi . Penerapan posisi semi fowler yang dilakukan pada pasien guna untuk membantu dalam mengurangi sesak nafas dan mengoptimalkan ventilasi. Menerapkan manajemen jalan nafas dengan menempatkan pasien pada posisi semi fowler terbukti dapat meningkatkan saturasi oksigen sehingga menghasilkan pola nafas yang optimal

Diagnosis keperawatan kedua yaitu gangguan pertukaran gas dengan pelaksanaan implementasi manajemen asam-basa:alkalosis respiratorik. mendapatkan hasil AGD (PH 7.558, PCO<sub>2</sub> 28,1 mmHg, PO<sub>2</sub> 211,8 mmHg), serta pernapasan 20 x/i dengan ETT on Ventilator mode SIMV dengan FiO<sub>2</sub> 40%, PEEP 5.0. dalam penelitian (Hartono, 2023) pada pasien yang terpasang ventilator perlu dilakukan perawatan dan pemantauan intensif, diantaranya dengan pemeriksaan analisis gas darah dan saturasi oksigen.

Diagnosis yang ketiga peningkatan kapasitas adaptif intrakranial dengan implementasi pemantauan tekanan intrakranial didapatkan hasil yaitu pasien mengalami trauma kepala dan pasien post op craniectomy, kesadaran Delirium dengan hasil E3M4V2 dan pernapasan 20x/menit, posisi kepala klien dalam keadaan netral, tampak pasien diberikan terapi murrotal oleh keluarganya, GCS 9 (E3M4V2), TD 155/88 mmHg, RR 20x/menit. Menurut (Hisam,2023) tekanan intrakranial khususnya tekanan darah yang sangat tinggi dapat memperburuk edema serebri sebaliknya tekanan darah terlalu rendah akan mengakibatkan iskemia otak yang pada akhirnya juga menyebabkan edema dan peningkatan tekanan intrakranial.

Setiap muslim meyakini bahwa al-qur`an diturunkan Allah swt untuk memberi hidayah kepada setiap manusia, pedoman hidup manusia dan menyembuhkan berbagai penyakit hati yang menjangkiti manusia bagi mereka yang diberi hidayah oleh Allah ‘azza wa jalla dan dirahmati-Nya. Seperti yang terdapat di dalam firman-Nya Q.S Al-Isra/17:82 :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيُدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya:

“Dan Kami turunkan dari al-Qur`an suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur`an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian.” (QS Al-Isra: 82) (Kemenag RI, 2020).

Dalam firman Allah SWT tersebut telah dijelaskan begitu jelas, bahwa al-Qur`an sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang harus digaris bawahi yaitu kalimat “bagi orang-orang yang beriman”. Maksudnya disini kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa al-Qur`an dapat menyembuhkan penyakit baik itu jasmani maupun rohani (Firdaus, 2018).

Syaikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma`ad mengatakan: “Al-Qur`an adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani, demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Dan tidaklah setiap orang diberi keahlian dan taufiq untuk menjadikannya sebagai obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan meletakkan pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kokoh, dan menyempurnakan syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya selama-lamanya”

(Firdaus, 2018).

Diagnosis keempat yaitu hipotermia dengan intervensi manajemen hipotermia dengan pemberian blanket warmer didapatkan hasil terjadi peningkatan suhu tubuh setelah diberikan implementasi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Fenni. 2020) dimana hasil penelitiannya dibutuhkan waktu 60 menit untuk mencapai suhu normal tubuh. suhu sebelum perlakuan 34,6 °C dan sesudah perlakuan 36,2°C dengan peningkatan 1,7°C. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan blanket warmer lebih cepat menaikkan suhu tubuh karena menggunakan panas melalui konveksi dengan mesin pemanas.

Sejalan dengan pandangan islam bahwa setiap manusia pernah mengalami sakit, namun manusia dibekali akal dan ilmu untuk berupaya untuk mencari obat penyembuhan termasuk dengan menggunakan alat medis seperti yang dapat membantu proses penyembuhan seraya berdo'a kepada Allah, seperti sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah sampaipun duri yang melukainya melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya” (HR. Al-Bukhari, no. 5641 dan Muslim, no. 2573)

Untuk diagnosis kelima yaitu risiko infeksi dilakukan intervensi pencegahan infeksi berupa tetap mempertahankan tehnik aseptik atau kebersihan sebelum dan setelah kontak dengan pasien. Setara dengan

penelitian (Ulya et al., 2024) mengatakan hal yang dapat dilakukan agar infeksi tidak terjadi yaitu berupa cuci tangan sebelum dan sesudah kontak ke pasien karena kebersihan tangan merupakan hal yang paling penting untuk mencegah penyebaran infeksi yang dilakukan bertujuan untuk menghilangkan semua kotoran dan debris serta menghambat atau membunuh mikroorganisme pada kulit, dimana mikroorganisme diperoleh dari kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, serta batasi jumlah pengunjung.


### **5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan**

Evaluasi sumatif pada masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif setelah diberikan intervensi selama 3 hari maka diperoleh bahwa produksi sputum klien sedikit berkurang meskipun belum maksimal berkurangnya. pada masalah gangguan pertukaran gas setelah 3 hari intervensi terjadi penurunan penggunaan alat dari mode SIM-V ke mode spontan. kemudian masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial setelah 3 hari intervensi terjadi peningkatan nilai GCS pada pasien yaitu dari GCS E2M4V3 ke GCS E3M5V4. Pada masalah hipotermia setelah dilakukan intervensi selama 3 hari terjadi peningkatan suhu rata-rata 0,3 derajat celcius. Yang terakhir pada masalah risiko infeksi setelah 3 hari intervensi tidak terjadi risiko infeksi.

## **5.2 Analisis Evidance Based Practice In Nursing**

Intervensi *blanket warmer* dilakukan sebanyak 1x/hari selama 3 hari berturut-turut dimulai tanggal 04-09 maret 2024 di ruangan ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pengimplementasian diberikan pada pasien Tn D dengan

diagnose medis *traumatic brain injury* mengalami penurunan kesadaran. Masalah keperawatan yang dialami salah satunya adalah hipotermia. Dalam penelitian ini, peneliti memilih intervensi *blanket warmer* sebagai alternative untuk mengatasi masalah hipotermia yang dialami oleh pasien.



Berdasarkan imlementasi yang telah dilakukan didapatkan penurunan suhu tubuh pasien *trauma brain injury* saat diberikan intervensi *blanket warmer*, dimana pada hari pertama suhu tubuh pasien *pre test* 35,7°C dan *post test* menjadi 36,0°C. Hari kedua menunjukkan *pre test* suhu tubuh 35,9°C dan *post test* 36,3°C. Hari ketiga suhu tubuh *pre test* 36,4°C dan *post test* 36,6°C. Hal tersebut menunjukkan efektifitas penerapan intervensi *blanket warmer* untuk mengatasi masalah hipotermia pasien dengan TBI. Sejalan dengan penelitian (Restu,2023) menunjukkan p value < 0.05 (0.000) ini artinya ada pengaruh yang bermakna terkait pemberian *blanket warmer* terhadap pasien hipotermia, Penggunaan *blanket warmer* mempunyai pengaruh yang lebih signifikan mengatasi hipotermi karena alat ini memiliki penghantar panas yang lebih efisien untuk perpindahan panas per

unit luas permukaan tubuh. Sejalan pula dengan penelitian (Faridatul, 2023) didapatkan hasil  $p$  value  $< 0.05$  (0.000) diperoleh rata-rata peningkatan suhu tubuh sebelum dan sesudah penggunaan selimut penghangat elektrik sebesar 1,544 derajat celcius. ini artinya pemberian blanket warmer terhadap pasien hipotermia ini efektif.

Mekanisme kerja *blanket warmer* dimulai dari perpindahan panas blanket kekulit tubuh manusia, Ketika kulit kontak dengan *blanket warmer* akan terjadi perpindahan secara konduksi dari blanket kekulit, kemudian suhu berpindah dari darah melalui pembuluh darah perifer. Adanya perubahan suhu pada pembuluh darah akan dideteksi sebagai termoreseptor sentral yang terletak didalam hipotalamus. Hipotalamus secara pribadi memantau taraf panas didalam darah yang mengalir melalui otak, kemudian melalui traktus desendens merangsang pusat vasomotor sehingga terjadi vasolidatasi pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah meningkat. Tingginya kecepatan suhu dalam darah menyebabkan panas dikonduksi ke bagian tubuh (kulit) dengan menggunakan efisien tinggi (Muhammad Jarod, 2024)

Penggunaan blanket warmer pada pasien dengan TBI memberikan berbagai manfaat klinis yang signifikan yaitu menjaga suhu tubuh dalam rentang normal (normotermia) untuk menghindari hipotermia atau hipertermia, yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan memperburuk kondisi cedera otak, suhu tubuh yang optimal membantu dalam menjaga laju metabolisme yang normal, yang penting untuk penyembuhan dan fungsi fisiologis, Mengurangi risiko vasokonstriksi berlebihan yang dapat terjadi pada hipotermia, sehingga meningkatkan aliran darah

dan oksigenasi jaringan, termasuk otak dan membantu mencegah komplikasi yang terkait dengan suhu tubuh yang tidak stabil, seperti infeksi, gangguan koagulasi, dan gangguan fungsi organ lainnya (Muchtar et al., 2023).

Hal tersebut menunjukkan *blanket warmer* efektif dalam menstabilkan suhu tubuh pasien TBI, namun perlu dilakukan implementasi dengan waktu yang lebih lama dengan kondisi yang lebih memungkinkan. Sesuai dengan riset yang dilakukan (Polderman, 2022) menekankan pentingnya kontrol suhu dalam pencegahan dan pengobatan cedera neurologis, serta efektifitas *blanket warmer* dalam mencegah hipotermia pada pasien TBI.

Riset (Badjatia, 2023) menunjukkan bahwa kontrol suhu tubuh yang tepat sangat penting dalam manajemen cedera otak, dengan *blanket warmer* sebagai salah satu metode yang efektif. Peran hipotermia yang diinduksi dan kontrol suhu dalam manajemen TBI, menekankan pentingnya intervensi seperti *blanket warmer*.

Asumsi peneliti mengatakan bahwasanya penggunaan *blanket warmer* sebagai intervensi pada pasien dengan TBI yang mengalami hipotermia memiliki dasar teoritis dan dukungan empiris yang kuat. Intervensi ini efektif dalam menjaga suhu tubuh, mendukung proses penyembuhan, dan mencegah komplikasi lebih lanjut, sehingga sangat penting dalam manajemen klinis pasien dengan cedera otak.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam studi kasus ini yaitu kurangnya interaksi langsung dengan pasien karena kondisi pasien dalam keadaan tersedasi sehingga kami tidak mengetahui respon langsung yang dirasakan klien setelah dilakukan intervensi. Adapun keterbatasan lain dari studi kasus ini yaitu hanya dilakukan pada satu

pasien dan sebaiknya intervensi ini dilakukan dari awal pasien masuk di ruangan sampai dengan pasien keluar untuk melihat efektivitas dari pemberian intervensi ini.



UNIVERSITAS  
**ALAUDDIN**  
MAKKASSAR

STAF

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilaksanakan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwasanya:

1. Hasil pengkajian yang dilakukan pada pasien Tn.D di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) diperoleh data Ny.D mengalami *traumatic brain injury* dengan masalah hipotermia
2. Diagnosa keperawatan yang didapatkan pada Tn.D di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) yaitu Bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, penurunan kapasitas adaptif intrakranial, hipotermia serta risiko infeksi
3. Intervensi keperawatan yang diterapkan pada Tn.D di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) yakni, Manajemen jalan napas, Manajemen asam-basa:Alkalosisi Respiratorik, pemantauan tekanan intrakranial, manajemen hipotermia (penggunaan blanket warmer) serta pencegahan infeksi
4. Implementasi keperawatan yang telah dilaksanakan pada Tn.D di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) dilakukan selama 3x sesuai dengan yang sudah direncanakan
5. Evaluasi keperawatan yang telah dilaksanakan pada Tn.D di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) dimana masalah hipotermia teratasi sedangkan masalah yang lainnya belum teratasi

6. Hasil analisis EBPN pemberian blanket warmer dilakukan selama 3x, setiap pemberian selama 60 menit. Didapatkan hasil terjadi peningkatan suhu tubuh setelah diberikan intervensi.

## 6.2 Saran

1. Bagi profesi keperawatan

karya akhir ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi perawat bagi memberikan asuhan keperawatan non farmakologis bagi pasien yang mengalami hipotermia

2. Bagi institusi pendidikan

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien hipotermia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifani, D., & Sari, R. P. (2022). *Asuhan Keperawatan pada Pasien Trauma Kepala dengan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Menurut Teori Virginia Henderson*. *Jurnal Keperawatan Airlangga*, 13(2), 189-194.
- Badjatia. (2023). Hyperthermia and fever control in brain injury. *Critical Care Medicine*, 37(7), S250–S257.
- Brunner and Suddarth. (2020). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*.
- Carney, N., Totten, A. M., O'Reilly, C., Ullman, J. S., Hawryluk, G. W. J., Bell, M. J., Bratton, S. L., Chesnut, R., Harris, O. A., Kisoorn, N., Rubiano, A. M., Shutter, L., Tasker, R. C., Vavilala, M. S., Wilberger, J., Wright, D. W., & Ghajar, J. (2017). Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. *Neurosurgery*, 80(1), 6–15. <https://doi.org/10.1227/NEU.0000000000001432>
- Carroll, L. J., Cassidy, J. D., Helfrich, M. R., & Sayre, J. (2022). *Traumatic brain injury: A review for clinicians*. *JAMA*, 327(20), 2060-2070. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29083790/>.
- Dafriani, P., Resta, H. A., & Tanjung, A. (2021). Efektifitas Penggunaan Selimut Hangat Dibandingkan Selimut Biasa Terhadap Peningkatan Suhu Pada Pasien Post Operasi di RSUD Sawahlunto. *Jurnal Kesehatan Medika Sainatika*, 12(1), 9–15.
- Devlin, J. W., Skrobik, Y., Gélinas, C., Needham, D. M., Slooter, A. J. C., Pandharipande, P. P., Watson, P. L., Weinhouse, G. L., Nunnally, M. E., Rochweg, B., Balas, M. C., Van Den Boogaard, M., Bosma, K. J., Brummel, N. E., Chanques, G., Denehy, L., Drouot, X., Fraser, G. L., Harris, J. E., ... Alhazzani, W. (2018). Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. *Critical Care Medicine*, 46(9), E825–E873. <https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000003299>
- Disorders. (2023). *Traumatic brain injury*. <https://www.ninds.nih.gov/current-research/focus-disorders/focus-traumatic-brain-injury-research>.
- Erny. (2019). Trauma Kepala Pada Anak: Klasifikasi Hingga Pemantauan Jangka Panjang. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*, 8(2), 42–58. <https://doi.org/10.30742/jikw.v8i2.620>
- Fahmi, I. (2019). DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf10308> Manajemen Hipotermia pada Pasien Cedera Kepala: Suatu Tinjauan Literatur Ismail Fahmi. 10(4), 199–202.
- Faridatul, S., & Nim, A. (2023). *Efektivitas blanket warmer terhadap suhu tubuh pasien yang mengalami hipotermi pasca operasi di recovery room instalasi bedah sentral*.
- Febriani, F., Agustina, M., & Kapadia, R. (2020). Efektivitas Selimut Elektrik Dalam Peningkatan Suhu Tubuh Pasien Pasca Operasi Yang Mengalami Hipotermia : Literature Review. *Scientific Journal of Nursing Research*, 2(2), 50. <https://doi.org/10.30602/sjnr.v2i2.1187>

- Giacino. (2018). Diagnostic criteria for disorders of consciousness: Recommendations of the American Academy of Neurology. *Neurology*, 95(10), 419–430.
- Hartono, R. (2023). *Saturasi Oksigen Dengan Pulse Oximetry Dalam 24 Jam Pada Pasien Dewasa Dengan Terpasang Ventilator Diruang ICU RS Panti Wilasa*.
- Hellty. (2023). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah* (Moh.Nasruddin (Ed.); 1 februari). PT Nasya Expanding Management. [https://www.google.co.id/books/edition/Buku\\_Ajar\\_Keperawatan\\_Medikal\\_Bedah/8R-sEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Traumatic+Brain+Injury+\(TBI\)+adalah+gangguan+pada+fungsi+normal+otak+yang+dapat+disebabkan+oleh+pukulan,+benturan+atau+sentakan+pada+kepala,+kepala+sec](https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Keperawatan_Medikal_Bedah/8R-sEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Traumatic+Brain+Injury+(TBI)+adalah+gangguan+pada+fungsi+normal+otak+yang+dapat+disebabkan+oleh+pukulan,+benturan+atau+sentakan+pada+kepala,+kepala+sec)
- Hematom, E. (2022). *APPLICATION OF AIRWAY MANAGEMENT IN PATIENTS POST CRANIOTOMY*. 3(4), 5815–5820.
- Imam Putranto, N., & Wisnu Kanita, M. (2022). *the Effect of Warmer Blanket Therapy on Body Temperature in Mutipleodontectomy Post Operation in Recovery Room Ibs Soelastrri Other Hospital, Surakarta*. 004.
- Indrawati, N., Kupa, C. N., Putri, E. M., & Lesimanuaya, L. L. (2020). Comparison of glasgow coma scale ( gcs ) and full outline of unresponsiveness ( four ) to assess mortality of patients with head injuries in critical care area : a literature review komparasi glasgow coma scale ( gcs ) dan full outline of unresponsiveness. *Jurnal Kesehatan*, 8(1), 19–27.
- Iskandar. (2017). Diagnosis Dan Penanganan Cedera Kepala Di Daerah Rural. *National Symposium & Workshop, September*, 93–103.
- Ismoyowati, T. W. (2021). Stimulasi Auditori pada Pasien Cedera Kepala dengan Penurunan Kesadaran Diri. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12(April), 167–172.
- Kemenag RI. (2020). *Al-Quran dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementrian Kesehatan, R. (2019). Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia tahun 2018. In *Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*.
- Mckee, A. C., & Daneshvar, D. H. (2015). The neuropathology of traumatic brain injury. *Handbook of Clinical Neurology*, 69(1), 139–148. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52892-6.00004-0>.The
- Muchtar, U. S. R., Suangga, F., & Kurniawan, A. (2023). Blanket Warmer Terhadap Peningkatan Suhu Tubuh Pasien PAsca Operasi. *Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nurshing Sciences)*, 12(2), 162–169. <https://jurnal.ikta.ac.id/index.php/keperawatan/>
- Muhammad Jarod. (2024). *Pengaruh Blanket Warmer Terhadap Hipotermi Pada Pasien Pasca General Anestesi di Rumah Sakit Jatiwinangun Purwokerto Muhammad*. 10(April), 711–719.
- Nemati, & Astaneh. (2019). Gastrointestinal dysfunction in patients with traumatic brain injury. *Brain Injury*, 33(1), 78–84.
- Nicolle, L. E. (2015). Infections associated with urinary catheters. In *Clinical Infectious Disease, Second Edition*.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781139855952.122>

- Nursalam. (2019). *Konsep dan Penerapan Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika.
- Pahlawi, R., & Nurmartha, A. R. (2023). *Program Fisioterapi Pada Pasien di ICU dengan Kondisi Post Craniectomy et Cause Traumatic Brain Injury : Case Report*. 6(Desember), 77–91.
- Polderman. (2022). Induced hypothermia and fever control for prevention and treatment of neurological injuries. *Lancet*, 371(9628), 1955–1969.
- Pusbankes, T. (2018). *Penatalaksanaan Penyakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Rahmawati, S. N., & Handayani, N. (2022). *Asuhan Keperawatan pada Pasien Trauma Kepala dengan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Menurut Teori Virginia Henderson*. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Makassar*, 10(1),.
- Restu Gilang Ramadhan, Wilis Sukmaningtyas, F. K. D. (2023). Efektifitas Penggunaan Terapi Cairan Infus Hangat dan Blanket Warmer Pada Pasien Hipotermi Post Anestesi Regional di IBS RSUD Kota Tangerang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(2), 463–470.
- Rositasari, S., & Dyah, V. (2017). (n.d.). *Efektifitas pemberian blanket warmer pada pasien pasca sectio caesaris yang mengalami hipotermi si RS PKU Muhammadiyah Surakarta*. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(1), 107–120.
- Salawati, L. (2012). Pengendalian Infeksi Nosokomial di ruang Intensive Care Unit Rumah Sakit. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 12(1), 47–52.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia; Definisi dan Indikator Diagnostik*. DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia; Definisi dan Tindakan Keperawatan*. DPP PPNI.
- Ulya, S. R., Nurhidayati, I., & Jufrizal, J. (2024). Asuhan Keperawatan Acute Respiratory Failure Et Causa Pneumonia di Intensive Care Unit. *Jurnal Gawat Darurat Volume*, 6(1), 21–38.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Global Status Report on Road*, World Health Organization,. Available at: <http://apps.who.int/bookorders>. *Plexus Medical Journal*.

# LAMPIRAN



UNIVERSITAS  
**ALAUDDIN**  
MAKKASSAR

STAF

**Lampiran 1: Skala Jatuh Morse (*Morse Fall Scale/ Mfs*)**

No.	Item	Skala	Skor
1	<b>Riwayat jatuh</b> Apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir?	Tidak	0
		Ya	25
2	<b>Diagnosis sekunder</b> Apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit?	Tidak	0
		Ya	15
3	<b>Alat bantu pergerakan</b> <i>Bed rest</i> /dibantu perawat		0
	Walker/kruk/tongkat		15
	Berpegangan pada benda sekitar (kursi, meja, lemari)		30
4	<b>Terapi intravena:</b> Apakah saat ini lansia terpasang infus?	Tidak	0
		Ya	20
5	<b>Gaya berjalan/cara berpindah</b> Normal		0
	Lemah		10
	Gangguan/tidak normal		20
6	<b>Status mental</b> Lansia menyadari kondisinya		0
	Lansia mengalami keterbatasan daya ingat		15
Total nilai			55

**Keterangan:**

Tingkat Risiko	Nilai MPS	Tindakan
Tidak berisiko	0 -24	Perawatan dasar
Risiko rendah	25 - 50	Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar
<b>Risiko tinggi</b>	<b>≥ 51</b>	<b>Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi</b>

**Lampiran 2 : Barthel Indeks**

No	Fungsi	Skor	Keterangan
1.	Mengendalikan rangsangan defekasi	0	Tak terkontrol/tak teratur (perlu bantuan)
		1	Kadang-kadang tak terkontrol
		2	Mandiri
2.	Mengendalikan rangsangan berkemih	0	Tak terkontrol/pakai kateter
		1	Kadang-kadang tak terkontrol (1x24 jam)
		2	Mandiri
3.	Membersihkan diri (seka muka, sisir rambut, cuci muka)	0	Butuh pertolongan orang lain
		1	Mandiri
4.	Penggunaan jamban, masuk dan keluar	0	Tergantung pertolongan orang lain
		1	Perlu pertolongan pada beberapa kegiatan tetapi dapat mengerjakan sendiri kegiatan lain
		2	Mandiri
5.	Makan	0	Tidak mampu
		1	Perlu ditolong memotong makanan
		2	Mandiri
6.	Berubah sikap dari berbaring ke duduk	0	tidak mampu
		1	Perlu banyak bantuan untuk bisa duduk (2 orang)
		2	Bantuan minimal 2 orang
		3	Mandiri
7.	Berpindah/berjalan	0	Tidak mampu
		1	Bisa (pindah) dengan kursi
		2	Berjalan dengan bantuan 1 orang
		3	Mandiri
8.	Memakai baju	0	Tergantung orang lain
		1	Sebagian dibantu (misalnya mengancing baju)
		2	Mandiri
9.	Naik turun tangga	0	Tidak mampu
		1	Butuh pertolongan
		2	Mandiri
10.	Mandi	0	Tergantung
		1	Mandiri
<b>Total skor</b>		<b>0</b>	<b>Ketergantungan total</b>

**Keterangan :**

- 20 : mandiri
- 12-19 : ketergantungan ringan
- 9-11 : ketergantungan sedang
- 5-8 : ketergantungan berat
- 0-4 : ketergantungan total

**Lampiran 3: Dokumentasi kegiatan**



## Lampiran 4: Lampiran Jurnal

**Al-Asalmiya Nursing**  
**Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)**  
<https://jurnal.ikta.ac.id/index.php/keperawatan/>  
 Volume 12, Nomor 2, Tahun 2023  
 p-ISSN: 2338-2112  
 e-ISSN: 2580-0485

**BLANKET WARMER TERHADAP PENINGKATAN SUHU TUBUH PASIEN PASCA OPERASI**

**Rizki Sari Utami Muchtar<sup>(1)</sup>, Fitriany Suangga<sup>(2)</sup>, Ade Kurniawan<sup>(3)</sup>**

(1)(2)(3)Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Awal Bros, Jl. Abuyaltama, Batam  
 \*corresponding author : [utamisari0784@gmail.com](mailto:utamisari0784@gmail.com)

**ABSTRAK**

Setiap prosedur pembedahan yang dilakukan dapat menimbulkan munculnya berbagai masalah atau keluhan tubuh seperti nyeri, malnutrisi, *wound dehiscence*, *ileus post-operative*, serta akan menimbulkan terjadinya hipotermi. Selain itu, semasa prosedur pembedahan perlu tindak anestesi buat hilangkan seluruh modalitas dari sensasi nyeri, rabaan, serta suhu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Blanket Warmer* terhadap peningkatan suhu tubuh pasien pasca operasi di ruang *Recovery Room* RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang. Jenis penelitian ini adalah pre-eksperimental design atau quasy experiment dengan desain pre dan post design yang diberikan pada responden setelah dilakukan perlakuan. Model rancangan ini adalah dengan melakukan observasi dua kali yakni sebelum experimental serta sesudah experimental. Nilai suhu tubuh sebelum serta sesudah dilakukan *Blanket Warmer* pada pasien Pasca Operasi perlakuan didapatkan pre test suhu tubuh sebesar 100 % dengan suhu tubuh hipotermi dan nilai post test 100 % suhu tubuh normal dengan p Value 0,001. Disimpulkan secara signitfikan adanya pengaruh *Blanket Warmer* terhadap peningkatan suhu tubuh pasien pasca operasi di ruang *Recovery Room* di RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang 2023.

**Kata Kunci :** *Blanket Warmer*, Suhu, Pasca Operasi

**ABSTRACT**

Every surgical procedure performed can cause various problems or bodily complaints such as pain, malnutrition, *wound dehiscence*, *post-operative ileus*, and can lead to hypothermia. In addition, during the surgical procedure, anesthesia is required to eliminate all sensations of pain, touch and temperature. This study aimed to determine the effect of the *Blanket Warmer* on increasing the body temperature of post-operative patients in the recovery room at Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang Hospital. This type of research was a pre-experimental design or quasi-experimental design with pre and post designs given to respondents after treatment. This planning model was to carry out observations twice, there were before the experiment and after the experiment. The body temperature value before and after the *Blanket Warmer* was applied to post-operative treatment patients obtained was a pre-test body temperature of 100% with a hypothermic body temperature and a post-test value of 100% normal body temperature with a p value of 0.001. The result showed that there was a significant influence of the *Blanket Warmer* on increasing the body temperature of post-operative patients in the recovery room at Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang Hospital 2023.

**Keywords:** *Blanket Warmer*, Temperature, Post-Operation

**PENDAHULUAN**

Pembedahan adalah jenis pengobatan melibatkan pembukaan atau pemaparan bagian tubuh yang harus dirawat. Menurut Krismanto & Jenie, (2021) pembedahan adalah prosedur apa

pun yang melibatkan pembuatan sayatan yang bisa mengubah proses fisiologis tubuh serta berdampak pada organ lain untuk mendiagnosis,

162 | Institut Kesehatan Dan Teknologi Al Insyirah Pekanbaru

*Al-Asalmiya Nursing / Vol. 12, No. 2, Tahun 2023*

menyembuhkan, atau mencegah penyakit, cedera, atau kelainan bentuk fisik.

Menurut Mulyo et al, (2020) menyebutkan bahwa setiap prosedur pembedahan yang dilakukan dapat menimbulkan munculnya berbagai masalah atau keluhan tubuh seperti nyeri, malnutrisi, *wound dehiscence*, *ileus post-operative*, serta akan menimbulkan terjadinya hipotermi. Selain itu, semasa prosedur pembedahan perlu tindak anestesi buat menghilangkan seluruh modalitas dari sensasi nyeri, rabaan, serta suhu.


Salah satu teknik yang sering dikenakan pada berbagai operasi pembedahan ialah anestesi umum. Suhu tubuh pasien harus selalu diawasi selama berada di bawah pengaruh obat

hipotermia. Bagi pasien pasca operasi, misalnya di *Recovery Room*, penanganannya bisa dilakukan di sana. Pasien dengan penyakit serius atau cedera dirawat di area khusus yang disediakan rumah sakit yang disebut ruang pemulihan.

Salah satu penatalaksanaan yang dapat dilakukan dalam pencegahan hipotermi pada pasien post-operative diruang *Recovery Room* yaitu melalui penggunaan *Blanket Warmer*.

Menurut Suindrayasa, (2017) menyebutkan bahwa Ketika digunakan sebagai intervensi pemanasan untuk pasien hipotermia pasca operasi, *Blanket Warmers* dapat mengurangi stres dan meningkatkan kenyamanan. Bahkan individu dengan luka bedah pasca operasi yang mengeluhkan rasa sakit

### Lampiran 5: Penyimpanan KDM



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hijriyah Febriela, S.Kep , Lahir di Makassar, 15 Maret 2002. Anak pertama dari empat bersaudara dari bapak Nuryanto Dg.Ngemba dan Ibu St. Roslaela,B. Telah menempuh pendidikan di TK Pertiwi Malakaji pada tahun 2007-2008, kemudian lanjut di SDN Center Malakaji tahun 2008-2013, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Yapit Malakaji pada tahun 2013-2016, selanjutnya ditahun 2016-2019 penulis melanjutkan SMA di *Islamic Boarding School Ummul Mukminin of Aisyiyah Province of South Sulawesi*. Pada tahun 2019 penulis lulus melalui jalur Mandiri pada Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN), Program Strata Satu (S1) . Dan pada tahun 2023 peneliti melanjutkan studi dijenjang Profesi Ners Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN). Syukur Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, do'a serta dukungan kedua orang tua, keluarga serta rekan-rekan, dan bimbingan dari para dosen Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan tak lupa berkat perjuangan keras dari penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun Karya Tulis Akhir (KTA) Profesi Ners yang berjudul: "Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Traumatic Brain Injury post craniotomy* dengan masalah hipotermia menggunakan intervensi *blanket warmer* di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar". Penulis tidak begitu aktif dalam organisasi, pada masa SMP bergabung di Pramuka, English Meeting Club (EMC), serta Osis, pada masa SMA penulis bergabung dikegiatan ekstrakurikuler Tapak Suci serta paduan suara. Pada saat diperguruan tinggi penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai anggota dana dan usaha 2021-2022 serta Ketua Koordinator Keperempuanan PMII pada tahun 2021-2022.