

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL 96% PADA DAUN
TOMAT APEL (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *Pyriforme* Alef)
TERHADAP *Propionibacterium acnes***



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR AULIA ANANDA IHWAN

NIM. 70100115053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Aulia Ananda Ihwan
NIM : 70100115053
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 29 Mei 1997
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Bau Mangga
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Pada Daun
Tomat Apel (*Lycopersicon esculentum* Mill, var.
Pyriforme Alef) Terhadap *Propionibacterium acnes*.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 25 Januari 2023

Penyusun



Nur Aulia Ananda Ihwan
NIM: 70100115053







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Pada Daun Tomat Apel (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *Pyriforme* Alef) Terhadap *Propionibacterium acnes*”** yang disusun oleh Nur Aulia Ananda Ihwan, NIM: 70100115053, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 25 Januari 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 25 Januari 2023 M
03 Rajab 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	()
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si	()
Munaqisy I	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si	()
Munaqisy II	: Dr. Hj. A. Rosmiaty Azis, M. Pd. I	()
Pembimbing I	: Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si	()
Pembimbing II	: Apt. Muh. Ikhlas Asrul, S.Farm., M.Si	()

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum.Wr.Wb. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas limpahan karuniaNya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian dan tugas akhir dengan judul **“Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun tomat (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *Pyriforme* Alef) Terhadap *Propionibacterium acnes*”**. Tidak lupa shalawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, keluarga, dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Dalam proses penyusunan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebab keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tak lupuk dari kesalahan. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran sebagai bentuk pembelajaran kedepannya.

Serta pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak terutama kepada kedua orang tua saya yang sangat sangat saya cintai tiada batas, yaitu bapak Ihwan Rum dan ibu Nurhylwa dan saudari saya Nurul haerunnisa ihwanul, Sherina ihwanul serta satu-satunya saudara laki-laki saya Rahmat Hidayat Ihwanul yang tidak lelah-lelahnya memberikan dukungan, bantuan, perhatian, kasih sayang yang melimpah, serta do'a yang selalu mengiringi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar tercinta yang selalu menjadi *support system*.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Mardan., M.AG., selaku Wakil Rektor I

Univeritas Islam Negeri Makassar. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Univeritas Islam Negeri Makassar. Prof. Dr Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Univeritas Islam Negeri Makassar. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Univeritas Islam Negeri Makassar.

2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes.,Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Univeritas Islam Negeri Makassar. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si.,M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Univeritas Islam Negeri Makassar. Dr. H. M. Faris Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Univeritas Islam Negeri Makassar. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Univeritas Islam Negeri Makassar.
3. Apt. Surya Ningsi, S.Si.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan senantiasa membimbing dalam terselesaikannya skripsi ini.
4. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Apt. Muh. Ikhlas Asrul, S.Farm.,M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan senantiasa membimbing dalam terselesaikannya skripsi ini.
6. Dwi Wahyu Leboe, S.Si.,M.Si., selaku penguji kompetensi yang senantiasa memberi saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi ini.

7. Dr. Hj. A. Rosmiaty Azis, M. Pd. I., selaku penguji agama yang senantiasa membimbing, kritik dan saran keagamaan dalam penulisan skripsi.
8. Seluruh dosen, staf, laboran dan keluarga besar Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, yang telah ikhlas dalam membantu dan memberikan berbagai informasi yang penulis butuhkan demi terselesaikannya skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini mendapatkan ridho Allah SWT dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Gowa, 25 Januari 2023

Penyusun

Nur Aulia Ananda Ihwan
NIM: 70100115053



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	3
1. Definisi Operasional.....	3
2. Ruang Lingkup	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Uraian Tanaman Tomat	7
B. Uraian Mikroba Uji	11
C. Kulit	13
D. Jerawat	20
E. Antimikroba.....	27
F. Uji Antimikroba.....	33
G. Antibakteri	36
H. Clindamycin Untuk Pengobatan Jerawat.....	37
I. Ekstraksi	38
J. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	49
A. Jenis dan Lokasi penelitian.....	49

1. Jenis Penelitian.....	49
2. Lokasi Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Populasi dan Sampel.....	49
1. Populasi.....	49
2. Sampel.....	49
D. Instrumen Penelitian.....	49
1. Alat-alat yang digunakan.....	49
2. Bahan-bahan yang digunakan.....	50
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	50
1. Penyiapan Sampel (Ekstrak Daun Tomat).....	50
2. Identifikasi Golongan Senyawa Kimia.....	51
3. Sterilisasi.....	52
4. Pembuatan Medium.....	52
5. Pengujian Aktivitas Antimikroba.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil Penelitian.....	55
1. Hasil Ekstraksi Daun Tomat.....	55
2. Hasil Uji Identifikasi Golongan Senyawa.....	55
3. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri.....	56
B. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66
RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori daya hambat bakteri menurut Davies Stout	35
Tabel 2. Hasil Ekstraksi Simplisia Daun Tomat Dengan Metode Maserasi	55
Tabel 3. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Etanol Daun Tomat	55
Tabel 4. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak etanol daun tomat.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanaman Tomat.....	7
Gambar 2. Bakteri Propionibacterium acnes	11
Gambar 3. Lapisan Kulit	14
Gambar 4. Lapisan Epidermis.....	16
Gambar 5. Whitehead komedo.....	22
Gambar 6. Blackhead komedo	22
Gambar 7. Papula.....	22
Gambar 8. Pustule	23
Gambar 9. Nodula	24
Gambar 10. Mekanisme Kerja Antibiotik.....	31
Gambar 11. Pengumpulan dan pengolahan sampel daun tomat	75
Gambar 12. Ekstraksi sampel daun tomat.....	76
Gambar 13. Hasil identifikasi golongan senyawa ekstrak etanol daun tomat.....	77
Gambar 14. Penyiapan alat dan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba ...	78
Gambar 15. Penyiapan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba.....	79
Gambar 16. Pengerjaan pengujian aktivitas antimikroba	80
Gambar 17 Hasil pengujian aktivitas daya hambat.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian.....	66
Lampiran 2. Skema Kerja Penyiapan Sampel.....	67
Lampiran 3. Skema Kerja Sterilisasi.....	68
Lampiran 4. Skema Kerja Pembuatan Medium	69
Lampiran 5. Skema Kerja Pengujian Aktivitas Antimikroba	70
Lampiran 6. Hasil Perhitungan	72
Lampiran 7. Gambar Pengamatan dan pengolahan daun tomat.....	75



ABSTRAK

Nama : Nur Aulia Ananda Ihwan
NIM : 70100115053
Jurusan : Farmasi
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Pada Daun Tomat Apel (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. Pyriforme Alef) Terhadap *Propionibacterium acnes*.

Tomat merupakan tanaman asli Benua Amerika yang tersebar dari Amerika Tengah hingga Amerika Selatan. Tanaman tomat pertama kali dibudidayakan oleh suku Inca dan suku Aztec pada tahun 700 SM. Batang dan daun tomat meski jumlahnya melimpah, hingga kini hanya sebagian dimanfaatkan sebagai kompos dan sisanya dibuang. Daun tomat tidak mungkin dikonsumsi sebagai sayuran karena kandungan glikoalkaloid. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ekstrak etanol daun tomat mempunyai aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*, untuk mengetahui berapa konsentrasi ekstrak etanol daun tomat yang dapat memberikan aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*, dan untuk mengetahui apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol daun tomat. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96%. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun tomat (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. Pyriforme Alef) terdapat golongan senyawa yang terkandung yaitu flavonoid, saponin, terpenoid dan fenol. Konsentrasi yang dapat memberikan aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne* ialah pada konsentrasi 20% dengan zona hambat 9,84mm, 40% dengan zona hambat 10,45mm, 60% dengan zona hambat 11,53mm, termasuk kategori sedang dan 80% dengan zona hambat 12,08mm termasuk kategori kuat. Sehingga ekstrak etanol daun tomat memiliki aktivitas sebagai agen antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne*.

Kata Kunci: Ekstrak daun tomat, *Lycopersicon esculentum* Mill, var. Pyriforme Alef, *Propionibacterium acnes*, antibakteri

ABSTRACT

Name : Nur Aulia Ananda Ihwan
Student Number : 70100115053
Department : Pharmacy
Title : Test of Antibacterial Activity of 96% Ethanol Extract On Apple Tomato Leaves (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *Lycopersicon esculentum* Mill. Pyriforme Alef) Against *Propionibacterium acnes*.

*Tomato is a plant native to the Americas spread from Central America to South America. The tomato plant was first cultivated by the Incas and Aztecs in 700 BC. The spread of tomatoes in Indonesia began in the Philippines and other Asian countries in the 18th century. The stems and leaves of tomatoes, although they are abundant, until now have only been partially used as compost and the rest are removed. The purpose of this study was to find out whether tomato leaf ethanol extract has activity against *Propionibacterium acnes* bacteria, to find out what concentration of tomato leaf ethanol extract can provide activity against *Propionibacterium acnes* bacteria, and to find out what are the groups of compounds contained in tomato leaf ethanol extract. Extraction was performed by maceration method using 96% ethanol solvent. The results of the studies conducted can be concluded that the extract of tomato leaves (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *Lycopersicon esculentum* Mill. Pyriforme Alef) there is a group of compounds contained, namely flavonoids, saponin, terpenoids and phenols. The concentrations that can provide antibacterial activity against *Propionibacterium acne* are at a concentration of 20% with an inhibitory zone of 9.84mm, 40% with an inhibitory zone of 10.45mm, 60% with an inhibitory zone of 11.53mm, with medium category and 80% with an inhibitory zone of 12.08mm. So that the ethanol extract of tomato leaves has activity as an antibacterial agent against acne-causing bacteria *Propionibacterium acne*.*

Keywords: Ekstrak daun tomat, *Lycopersicon esculentum* Mill, var. Pyriforme Alef

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tomat yang merupakan sayuran di pasaran yang mudah ditemukan di Indonesia hingga kini pemanfaatannya masih sangat kurang hanya didominasi oleh buahnya saja, antara lain sebagai minuman, pelengkap sayur, perawatan kecantikan, dan produk-produk inovasi lainnya. Sementara itu batang dan daun tomat meski jumlahnya melimpah, hingga kini hanya sebagian dimanfaatkan sebagai kompos dan sisanya dibuang. Daun tomat tidak mungkin dikonsumsi sebagai sayuran karena kandungan glikoalkaloid. Glikoalkaloid merupakan senyawa beracun yang apabila dikonsumsi pada manusia dalam jumlah yang banyak akan mengakibatkan sulit bernafas, mual, dan muntah (Dinnarwika, 2012).

Tanaman tomat mempunyai kemampuan yang hampir tak terbatas untuk mensintesis senyawa aromatik, yang sebagian besar adalah fenol atau turunan oksigen yang tersubstitusi. Sebagian besar adalah metabolit sekunder, setidaknya 12.000 dari yang telah diisolasi. Senyawa kimia yang berguna sebagai antimikroba dibagi menjadi beberapa kategori yaitu golongan senyawa fenolik, terpenoid, minyak atsiri, alkaloid, lektin dan polipeptida serta golongan senyawa poliasetilen (Cowan, 1999)

Penyakit kulit merupakan salah satu penyakit yang menyerang permukaan tubuh yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Penyakit yang paling sering kita jumpai pada kulit adalah jerawat yang terjadi pada usia remaja dan dewasa. Hal ini umum terjadi pada umur sekitar 14-17 tahun pada wanita, 16-19 tahun pada pria dan akan menghilang dengan sendirinya pada usia sekitar 20-30 tahun. Namun, jerawat terutama pada wanita dapat menetap sampai umur 30 tahun atau lebih (Djuanda, 2014).

Salah satu tanaman atau buah yang berfungsi sebagai anti jerawat adalah Buah Tomat (*Solanum lycopersicum*, L). Buah tomat memiliki kandungan kimia seperti alkaloid solanin (0,007%), saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat, riboflavanoid, vitamin antara lain vitamin C, vitamin A dan vitamin B1, serta mengandung karotenoid dan zat tomatin sebagai antiinflamasi atau anti radang dan antibakteri (Titin, 2009)

Jerawat adalah penyakit kulit peradangan kronik folikel polisebasea yang umumnya terjadi pada masa remaja dengan gambaran klinis berupa komedo, papul, pustule, nodus dan kista pada permukaan luar yaitu bahu, muka, leher, dada, punggung. Bentuknya seperti bisul berisi dan kadang-kadang berubah jadi keras. Pada kulit terutama wajah terdapat benjolan-benjolan kecil, berkepala kuning, berisi nanah, terasa gatal dan sedikit nyeri (Galuh, 2009).

Bakteri yang pada umumnya menginfeksi jerawat adalah *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, dan *Propionibacterium acnes*. Pengobatan jerawat di klinik kulit biasanya menggunakan antibiotik yang dapat menghambat inflamasi dan membunuh bakteri, contohnya eritromisin, doksisisiklin, tetrasiklin, dan klindamisin. Selain itu, sering juga digunakan asam azelat, benzol peroksida, dan retinoid, namun kebanyakan obat ini mengandung efek samping efek samping dalam penggunaannya sebagai obat anti jerawat antara lain iritasi, sementara penggunaan antibiotik jangka panjang selain dapat menimbulkan resistensi juga dapat menimbulkan kerusakan organ dan imunohipersensitivitas (Djajadisastra, 2013).

Propionibacterium acnes termasuk bakteri flora normal pada kulit. Patofisiologi utama terjadi karena jerawat androgen merangsang *seborrhea*, hiperkeratinisasi dan obstruksi epitelium folikuler, poliferasi *Propionibacterium acnes* dan kemudian terjadi peradangan (Knobler, 2005). *Propionibacterium*

acnes menghasilkan lipase yang memecah asam lemak bebas dari lipid kulit sehingga menyebabkan peradangan. Akibat peradangan tersebut menyebabkan *Propionibacterium acnes* berproliferasi dan memperparah lesi inflamasi dengan merangsang produksi sitokin proinflamasi (Rodiah, 2017).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak etanol daun tomat mempunyai aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*?
2. Berapa konsentrasi ekstrak etanol daun tomat yang dapat memberikan aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*?
3. Apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol daun tomat?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Uji aktivitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui dan menelusuri aktivitas dari ekstrak daun tomat sebagai antibakteri jerawat (*Propionibacterium acnes*).
- b. Antibakteri adalah zat berupa ekstrak daun tomat yang dapat menghambat atau membunuh bakteri *Propionibacterium acnes*.
- c. Ekstraksi adalah proses penarikan senyawa kimia/zat aktif yang ada pada daun tomat dengan menggunakan pelarut etanol 96%.
- d. Ekstrak adalah suatu bahan atau sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi daun tomat.
- e. Etanol adalah pelarut yang bersifat polar dan digunakan untuk menarik zat aktif yang terkandung dalam daun tomat.

- f. *Propionibacterium acnes* adalah bakteri gram positif yang bersifat patogen yang menyebabkan munculnya jerawat pada kulit wajah manusia dan digunakan sebagai bakteri uji pada penelitian ini.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah melakukan uji aktivitas daun tomat sebagai antibakteri terhadap bakteri *Propionibacterium acne*.

D. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh hasma tahun 2017 dengan judul “Potensi Penghambat Tirosinase Ekstrak Etanol Daun Tomat (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *Pyriforme Alef*)”, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekstrak etanol daun tomat sebagai penghambat tirosinase. Sampel diekstraksi dilakukan secara maserasi dalam etanol selama 3×4 jam. Uji penghambatan tirosinase dilakukan dengan arbutin sebagai pembanding. Dengan hasil penghambatan tirosinase ekstrak etanol daun tomat menunjukkan nilai IC₅₀ 78,89 µg/mL dan IC₅₀ arbutin 73,09 µg/mL. jadi dapat disimpulkan ekstrak daun tomat berpotensi sebagai penghambat tirosinase.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elly tahun 2021 dengan judul “ Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Buah Tomat (*Solanum lycopersicum* L.) Terhadap Bakteri *Propionibacterium acne*”, dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum* L.) sebagai antibakteri *Propionibacterium acne*. Sampel disortasi basah dan kering kemudian dimaserasi dengan larutan etanol 96%. Pengujian daya hambat *Propionibacterium acne* menggunakan metode difusi agar, sampel dibagi menjadi 3 konsentrasi 20%, 40%, 60%.

Klindamisin sebagai kontrol positif dan aquades sebagai kontrol negatif, menunjukkan hasil zona hambat pada konsentrasi 20% (1,08 mm), 40% (3,74 mm) 60% (5,14 mm), dan klindamisin (9,15 mm) dan uji data Kruskal-Wallis diperoleh $0,00 < 0,05$ jadi dapat disimpulkan bahwa ekstrak buah tomat menghambat pertumbuhan *Propionibacterium acne* dengan perbedaan yang signifikan.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melia tahun 2021 dengan judul “Uji Aktivitas Sediaan Krim Ekstrak Etanol Tomat (*Lycopersium esculentum* Mill.) Sebagai Anti Jerawat”, dapat disimpulkan penelitian bertujuan sediaan krim ekstrak etanol tomat sebagai antibakteri jerawat (*Staphylococcus epidermidis*) dengan metode difusi sumuran pada media Nutrient Agar. Menunjukkan hasil uji ANOVA krim ekstrak tomat 25%, 50%, 75% dan kontrol positif memiliki aktivitas antibakteri. Krim konsentrasi ekstrak 50% (11,03 mm), 75% (12,86) dengan kontrol positif (11,06) menunjukkan konsentrasi 75% memiliki aktivitas antibakteri yang lebih besar atau signifikan pada $<0,05$. Sehingga sediaan krim ekstrak etanol tomat aktivitas penghambat bakteri jerawat yang signifikan.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggita tahun 2015 dengan judul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica* (L) LESS.) terhadap *Propionibacterium acne* Penyebab Jerawat”, dapat disimpulkan penelitian bertujuan untuk mengetahui ekstrak daun beluntas dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acne*. Sampel daun beluntas dimaserasi dengan pelarut etanol 96%, metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan konsentrasi dari 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%, serta digunakan tetrasiklin sebagai pembanding. Diameter zona hambat pada konsentrasi 1% (9 mm), 2%

(7,67mm), 3% (8,67 mm), 4% (8,83 mm), dan 5% (9 mm). Analisis data menggunakan ANOVA menunjukkan bahwa diameter zona hambat ekstrak daun beluntas memiliki signifikansi $(0,605) > p (0,05)$ hasil ini menunjukkan zona hambat yang dihasilkan tidak signifikan. Sehingga daun beluntas tidak dapat digunakan sebagai antibakteri jerawat.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol daun tomat mempunyai aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*.
- b. Untuk mengetahui berapa konsentrasi ekstrak etanol daun tomat yang dapat memberikan aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*.
- c. Untuk mengetahui apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol daun tomat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menambah informasi ilmiah, pengetahuan serta gambaran kepada penulis dan masyarakat, terutama dalam pengetahuan tentang antimikroba dari bahan alam khususnya daun tomat terhadap bakteri penyebab jerawat yang akan memberikan manfaat terhadap pembuatan obat baru.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman Tomat

1. Klasifikasi (Plantamor, 2008).

Regnum	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Solanales
Famili	: Solanaceae
Genus	: Lycopersicon
Spesies	: <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill
Varietas	: <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill, var. <i>Pyriforme</i> Alef

2. Deskripsi



Gambar 1. Tanaman Tomat

Tomat merupakan tanaman asli Benua Amerika yang tersebar dari Amerika Tengah hingga Amerika Selatan. Tanaman tomat pertama kali dibudidayakan oleh suku Inca dan suku Aztec pada tahun 700 SM. Sementara itu, bangsa Eropa mulai mengenal tomat sejak Christophorus Columbus pulang berlayar dari Amerika dan tiba di pantai San Salvador pada tanggal 12 Oktober 1492. Ketika itu, Columbus diperintah oleh ratu Isabella dari Kerajaan Kastilia, Spanyol untuk mencari emas dan rempah – rempah, tetapi ia pulang justru membawa biji-bijian, seperti jagung, cabe, dan tomat. Meskipun Ratu Isabella kecewa dengan hasil yang dibawa Columbus, tetapi akhirnya biji-bijian tersebut ditanam juga oleh para petani di Spanyol dan menyebar sampai ke beberapa negara di Eropa lainnya (Wiryanta, 2008).

Penyebaran tomat di Indonesia dimulai dari Filipina dan negara-negara Asia lainnya pada abad ke-18. Pada awalnya, tomat yang pertama kali ditanam oleh suku Inca dan Suku Aztec ini masih berbuah kecil dan produktivitasnya juga masih rendah. Hal ini jelas berbeda dengan kondisi sekarang. Buah tomat yang dihasilkan bisa menghasilkan bobot 0,4 kg per buah atau 5-8 kg buah per tanaman. Selain kualitas dan kuantitas buahnya tinggi, tanaman tomat hibrida juga mampu beradaptasi pada berbagai kondisi agroklimat, mulai daerah dataran rendah, dataran menengah, hingga dataran tinggi. Bahkan ada juga varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit tertentu (Wiryanta, 2008).

Tomat tanaman yang sama sekali liar mempunyai buah buni merah yang bulat bundar, garis tengah 1-2 cm (Steenis, 2013).

Herbal yang hidup pendek, tegak, naik pelan-pelan atau bersandar pada tanaman lain, sering bercabang banyak dan berbau kuat, tidak berduri atau tidak berduri tempel, tinggi 0,5 – 2,5 m. Bagian-bagian yang hijau berambut banyak, diantara rambut biasa juga rambut kelenjar. Batang dapat dikatakan bulat,

menebal pada buku-buku, kasar dan rapuh sekali. Daun termasuk tangkainya 3-25 kali 2-15 cm. Daun lemas, bulat telur memanjang, dengan ujung runcing, yang lebih besar bergerigi berlekuk menyirip kasar. Bunga terkumpul menjadi 2 baris cabang berseling yang bertangkai, sering bercelah 2-3, yang di atas jantan, karena perkembangan tidak sempurna dari putik, cabang berseling yang muda ujungnya menggulung. Anak tangkai bunga di tengah-tengah beruas. Bunga pada tanaman yang tumbuh liar berbilangan 5, pada bentuk-bentuk yang ditanam sampai berbilangan 12. Kelopak sampai dekat pangkal terbagi dalam taju runcing. Mahkota kuning belerang, sampai dekat pangkal terbagi dalam taju yang sempit, runcing. Bakal buah bulat memanjang, bentuk bola atau jorong melintang, gundul. Buah buni bersandar pada kelopak yang membesar, sangat berubah-ubah dalam bentuk, besar dan warnanya. Biji banyak, pipih, kuning coklat. Dari amerika tropis, ditanam karena buah bunyinya yang dapat dimakan, 1-1.600 m. Di ladang dan sepanjang jalan sering menjadi liar (Steenis, 2013).

3. Morfologi

Tanaman tomat terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan biji. Tinggi tanaman tomat mencapai 2-3 meter. Sewaktu masih muda batangnya berbentuk bulat dan teksturnya lunak, tetapi setelah tua batangnya berubah menjadi bersudut dan bertekstur keras berkayu. Ciri khas batang tomat adalah tumbuhnya bulu-bulu halus di seluruh permukaannya. Akar tanaman tomat berbentuk serabut yang menyebar ke segala arah. Kemampuannya menembus lapisan tanahnya terbatas, yakni pada kedalaman 30-70cm (Wiryanta, 2008).

Daunnya yang berwarna hijau dan berbulu mempunyai panjang sekitar 20-30 cm dan lebar 15-20 cm. Daun tomat ini tumbuh di dekat ujung dahan atau cabang. Semetara itu, tangkai daunnya berbentuk bulat memanjang sekitar 7-10 cm dan ketebalan 0,3-0,5 cm (Wiryanta, 2008).

Bunga tanaman tomat berwarna kuning dan tersusun dalam dompolan dengan jumlah 5-10 bunga per dompolan atau tergantung dari variestasnya. Kuntum bunganya terdiri dari lima helai daun kelopak dan lima helai mahkota. Pada serbuk sari bunga terdapat kantong yang letaknya menjadi satu dan membentuk bumbung yang mengelilingi tangkai kepala putik. Bunga tomat dapat melakukan penyerbukan sendiri karena tipe bunganya berumah satu. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi penyerbukan silang (Wiryanta, 2008).

Bunga tomat berbentuk bulat, bulat lonjong, bulat pipih, atau oval. Buah yang masih muda berwarna hijau muda sampai hijau tua. Sementara itu, buah yang sudah tua berwarna merah cerah atau gelap, merah kekuning-kuningan, atau merah kehitaman. Selain warna-warna di atas ada juga buah tomat yang berwarna kuning (Wiryanta, 2008).

Biji tomat berbentuk pipi, berbulu, dan diselimuti daging buah. Warna bijinya ada yang putih, putih kekuningan, ada juga yang kecoklatan. Biji inilah yang umumnya dipergunakan untuk perbanyak tanaman (Wiryanta, 2008).

Sementara itu, berdasarkan bentuknya, buah tomat dibedakan menjadi lima jenis (Wiryanta, 2008).

- a. Tomat Biasa (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *commune* Bailey). Berbentuk bulat pipih tidak teratur, sedikit beralur terutama di dekat tangkai. Tomat jenis ini banyak ditemui di pasar-pasar lokal.
- b. Tomat Apel atau Pir (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *pyriforme* Alef). Berbentuk bulat seperti buah apel atau buah pir.
- c. Tomat kentang atau Tomat Daun Lebar (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *grandifolium* Bailey). Berbentuk bulat besar, padat, dan kompak. Ukuran buahnya lebih besar dibandingkan dengan tomat apel

- d. Tomat Tegak (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *validum* Bailey). Buahnya berbentuk agak lonjong dan teksturnya keras. Sementara itu, daunnya rimbun, bentuknya keriting, dan berwarna kelam. Pertumbuhan tanaman tegak dengan percabangan mengarah ke atas.
- e. Tomat Cherry (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *cerasiforme* (Dun) Alef). Buahnya yang berukuran kecil berbentuk bulat atau bulat memanjang. Warnanya merah atau kuning, tomat mungil ini berasal dari Peru dan Ekuador.

4. Nama Daerah

Tomat memiliki beberapa nama daerah seperti di Sumatera yaitu terong kaluwat, reteng, cung asam. Di Jawa yaitu ranti gendel, ranti bali, rante raja, terong sabrang, tomat. Di Sulawesi yaitu kamantes, samate, samante, komantes, antes, tamati (Siddiq, 2010).

5. Kandungan senyawa daun tomat

Daun tomat mengandung senyawa pektin, arbutin, amigdalin, dan alkaloid (Dalilmartha, 2007). Selain itu daun tomat juga mengandung senyawa saponin dan flavonoid (Astusi, 2016). Ekstrak daun tomat menunjukkan flavonoid, klorofil, karotenoid, dan total fenolik tertinggi (Beltran, 2015).

B. Uraian Mikroba Uji

1. Klasifikasi

Propionibacterium acnes



Gambar 2. Bakteri Propionibacterium acnes (Syafitri, 2020).

Domain	: Bacteria
Filum	: Actinobacteria
Kelas	: Actinomycetales
Ordo	: Actinobacteria
Famili	: Propionibacteriaceae
Genus	: Propionibacterium
Spesies	: <i>Propionibacterium acnes</i> (Jawetz, 2005).

2. Sifat dan Morfologi Bakteri

Propionibacterium acnes memiliki bentuk batang yang tidak beraturan (Pleomorfik), bercabang dan tidak bercabang, bentuk kokcoid, atau bifid, tetapi tidak berfilamen. Sel ini sering berbentuk klub dengan satu ujung bulat dan yang lain meruncing. Sel-sel terjadi secara tunggal, berdasarkan atau rantai pendek, dalam kongigurasi “V” atau “Y”, atau dalam rumpun dengan pengaturan “karakter Cina” (Hardy, 1996).

Propionibacterium acnes merupakan salah satu bakteri flora normal yang terdapat pada kulit, merupakan bakteri gram positif, pleomorfik dan bersifat anarob (Rodiah, 2017). Spesies *Propionibacterium acnes* merupakan bakteri yang terdapat pada kulit, bakteri ini ketika menginfeksi kulit dapat menyebabkan penyakit kulit. Metabolit yang dihasilkan adalah asam propionate. Pada metode pewarnaan gram bakteri ini bersifat sangat pleomorfik, bentuknya seperti kurva batang atau titik dan terkadang bentuknya bulat dimana bakteri ini ikut berperan dalam terbentuknya jerawat. Karena bakteri ini adalah bagian dari flora normal pada kulit, *Propionibacterium acnes* terkadang mengkontaminasi udara maupun kultur cairan *cerebrospinal* dengan cara menembus kulit (Jawetz, 2005).

Propionibacterium acnes memiliki bentuk batang yang tidak beraturan (Pleomorfik), bercabang dan tidak bercabang, bentuk kokcoid, atau bifid, tetapi

tidak berfilamen. Sel ini sering berbentuk klub dengan satu ujung bulat dan yang lain meruncing. Sel-sel terjadi secara tunggal, berdasarkan atau rantai pendek, dalam kongigurasi “V” atau “Y”, atau dalam rumpun dengan pengaturan “karakter Cina” (Hardy, 1996).

Propionibacterium dapat memfermentasi laktosa, sukrosa, fruktosa, galaktosa, dan beberapa pentose, tetapi kemampuan tersebut tergantung dari spesies. Suhu pertumbuhan bakteri ini pada 30-37 °C dan beberapa spesies membentuk pigmen. Salah satunya spesies *Propionibacterium* ini adalah *Propionibacterim acnes* (Sopandi, 2014).

C. Kulit


Kulit merupakan salah satu organ terluas yang terdapat pada tubuh kita. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari zat-zat yang berbahaya bila masuk kedalam tubuh. Luas permukaan kulit sekitar 1,6 m². Ketebalan kulit tergantung pada umur, jenis kelamin, dan lokasi kulit tersebut berada pada tubuh (Tranggono, 2007).

1. Struktur Kulit

Kulit manusia tersusun atas 3 (tiga) lapisan utama, lapisan pertama epidermis (non-viable dan viable epidermis), lapisan kedua dermis, dan lapisan ketiga endodermis. Ketiga lapisan tersebut berbeda dari segi anatomi, morfologi, senyawa penyusun, sifat, dan fungsinya (Isriany, 2013).

Lapisan terluar merupakan turunan dari ectoderm yang disebut epidermis. Epidermis terhubung dengan dermis oleh taut dermo-epidermic (*dermo-epidermic junction*). Di bawah dermis terdapat lapisan hypodermis (endodermis). Setiap lapisan dilalui oleh ujung-ujung saraf dan pembuluh darah. Pembuluh darah yang perifer yang melintasi kulit mengalirkan darah sebanyak 0,3 mL/jam/cm³. Total

luas area pembuluh darah intrakutan yang tersedia untuk pelintasan langsung obat ke sirkulasi sistemik sejumlah 100%-200% dari area kulit. Pada kulit terserbar adneksa kulit berupa folikel rambut dan kelenjar (Isriani, 2013).



Gambar 3. Lapisan Kulit

a. Epidermis

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang mempunyai ketebalan bervariasi antara 50 μm - 1,5 mm, tersusun dari 15-25 sel. Epidermis terbentuk dari lima lapisan sel epitelial squamosa, diantaranya yang paling umum adalah keratinosit. Keratinosit adalah sel-sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan keratin, protein struktural dari kulit, rambut dan kuku. Sel-sel ini diyakini terlibat dalam proses imun dengan pertama kali melepaskan immunoglobulin A dan kemudian interleukin-1, yang memicu pengaktifan sel-sel T (Isriani, 2013).

Epidermis berfungsi sebagai penghalang terpenting dari hilangnya air, elektrolit, dan atau nutrisi tubuh, serta menahan masuknya senyawa asing dari luar. Lapisan epidermis terdiri dari non-viable epidermis dan viable epidermis. Secara anatomi lapisan epidermis terdiri dari 5 lapisan utama yang susunannya lebih dikenal dengan istilah 'strata'. Tersusun dari luar ke dalam berturut-turut; non-viable epidermis yaitu stratum korneum dan viable epidermis yaitu stratum lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale (germinativum). Kurang lebih setengah dari keratinosit bergerak dari lapisan sel basal ke atas memulai semua lapisan-lapisan epidermis yang lain. Sambil bergerak melalui lapisan-lapisan, strukturnya berubah dan sel-sel mulai memipih, kehilangan inti, dan akhirnya kering (Isriani, 2013).

1) Stratum Korneum

Lapisan teratas epidermis, terdiri 20-30 lapisan sel yang tersusun dari keratin dan *horny scale* yang terbuat dari keratinosit mati. Keratinosit yang mati dapat mensekresi defensin, suatu peptide antimikroba yang berperan dalam pertahanan kekebalan tubuh pertama. Sel-sel bagian superfisial melakukan pergantian dengan sel-sel baru yang timbul dari *stratum germinativum* secara terus-menerus untuk regenerasi (Yousef, 2020).

2) Stratum Lucidum

Memiliki 2-3 lapisan sel, terletak tepat dibawah *stratum korneum*. Sel-sel mati dan padat sehingga tidak memiliki inti atau organel. Lapisan ini bening dan tipis karena terdiri dari eleidin, atau produk transformasi keratohylin (Yousef, 2020).

3) Stratum Granulosum


Tersusun oleh 3-4 lapisan sel yang berbentuk seperti berlian dengan butiran keratohylin basofisik dan lamellar. Butiran keratohyalin mengandung glikolipid yang menjaga antar sel saling menempel (Yousef, 2020).

4) Stratum Spinosum

Terletak di bawah *stratum granulosum*, dengan 8-10 lapisan sel. Lapisan ini memiliki karakteristik desmosome yang menempel dengan keratinosit berbentuk polyhedral dengan nucleolus yang menonjol. Sel dendritik dapat ditemukan pada lapisan ini (Yousef, 2020).

5) Stratum Basal

Merupakan lapisan terdalam dari epidermis yang mengandung melanosit, satu baris keratinosit, dan stem sel. Sel melanosit berbentuk bulat dengan sitoplasma bening, sedangkan stem sel berbentuk kuboid/kolumnar menghasilkan keratinosit yang nantinya akan bergerak ke atas untuk membuat lapisan baru (Yousef, 2020).



Gambar 4. Lapisan Epidermis

b. Dermis

Lapisan ini disebut juga korium, merupakan lapisan kulit yang terletak antara epidermis dan jaringan lemak subkutan. Tebal lapisan sekitar 1-4 mm, tergantung bagian tubuh. Dermis tersusun dari bahan mukopolisakarida. Pada dermis terdapat sel mast dan fibroblast. Sel mast memiliki situs reseptor untuk immunoglobulin E dan mengandung sejumlah senyawa penting, seperti zat yang bereaksi lambat pada proses anafilaksis, prostaglandin E dan histamin. Fibroblast mensintesis komponen penunjang struktural dari kulit (yaitu: serat-serat elastik, kolagen, dan serat retikulum) (Isriany, 2013).

Dermis mengandung jaringan padat dari serabut protein, seperti kolagen, retikulum, dan elastin yang disimpan dalam kelenjar dasar amorf dari mukopolisakarida. Serat elastik diberi nama demikian karena serat inilah yang memberi sifat elastisitas pada kulit. Komponen utama dari serat ini adalah elastin, suatu protein amorf (Isriany, 2013).

Di dalam dermis terdapat adneksa-adneksa (kelenjar) kulit seperti folikel rambut, papilla rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebacea, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung syaraf, juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit (sub kutis atau hipodermis) (Tranggono, 2007).

Fungsi dermis ini terutama melindungi tubuh dari luka, menjadikan epideris lebih fleksibel, penghalang terhadap infeksi dan sebagai organ penyimpan air. Dalam dermis terdapat kapiler darah, ujung-ujung saraf, pembuluh limfa, kelenjar keringat, folikel rambut, dan kelenjar sebacea (Isriany, 2013).

c. Endodermis (Hipodermis; Subkutan)

Hipodermis adalah lapisan terdalam dari kulit, tebalnya 0,5-2 cm tergantung pada umur, ras dan daerah merupakan kelanjutan dari dermis, terdiri

dari jaringan ikat longgar berisi selsel lemak, penghubung antara dermis dengan jaringan lain dibawahnya seperti otot. Hipodermis kaya akan jaringan penghubung yang mengandung beberapa serat elastik. Pada beberapa bagian tubuh tertentu terdapat otot polos. Lapisan ini yang melindungi organ sebelah dalam tubuh dari benturan mekanik. Jaringan berlemak mempengaruhi regulasi panas tubuh dan memberikan efek bantalan terhadap tekanan eksternal dan cedera (Isriany, 2013).

2. Fungsi Kulit

Kulit memiliki fungsi yang cukup vital bagi tubuh vital tubuh, antara lain yaitu: (Madison, 2003):

a. Fungsi absorpsi

Kulit sehat tidak mudah menyerap air, larutan, maupun benda padat. Akan tetapi cairan yang mudah menguap lebih mungkin diserap kulit, begitu pula zat yang larut dalam minyak zat yang larut dalam minyak. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembaban udara, metabolisme, dan jenis pembawa zat yang menempel di kulit.

b. Fungsi proteksi

Kulit melindungi bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik maupun mekanik, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, seperti zat-zat kimia iritan (lisol, karbo, asam atau basa kuat lainnya), gangguan panas atau dingin, gangguan sinar radiasi atau sinar UV, gangguan kuman, jamur, bakteri dan virus. Gangguan fisik dan gangguan mekanik ditangani dengan adanya bantalan subkutis, tebalnya lapisan kulit, dan serabut penunjang berfungsi sebagai pelindung bagian luar tubuh. Gangguan sinar ultraviolet di atasi dengan sel melanin yang menyerap sebagian sinar tersebut. Gangguan kimia diatasi dengan adanya lemak permukaan kulit yang berasal dari kelenjar palit kulit yang mempunyai pH 5,6-5.

c. Fungsi eksresi

Kelenjar-kelenjar pada kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau sisa metabolisme dalam tubuh misalnya NaCl, urea, asam urat, ammonia, dan sedikit lemak. Sebum yang diproduksi kelenjar palit kulit melindungi kulit dan menahan penguapan yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering.

d. Fungsi pengindra (sensori)

Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Badan ruffini yang terletak di dermis akan menerima rangsangan dingin dan panas yang diperankan oleh badan Krause. Badan taktil meissner yang terletak di papila dermis menerima rangsangan rabaan. Demikian pula badan merkel-Renvier terletak di epidermis.

e. Fungsi pengaturan suhu tubuh (termoregulasi)

Kulit mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot dinding pembuluh darah kulit. Pada suhu tubuh yang meningkat, kelenjar kulit mengeluarkan banyak keringat ke permukaan kulit dan dengan penguapan keringat tersebut terbangun pula panas tubuh. Mekanisme termoregulasi ini diatur oleh sistem saraf simpatis yang mengeluarkan zat perantara asetilkolin.

f. Fungsi pembentukan pigmen (melanogenesis)

Sel pembentukan pigmen kulit (melanosit) terletak di lapisan basal epidermis. Sel ini berasal dari rigi saraf. Jumlah melanosit serta jumlah dan besarnya melanin yang terbentuk menentukan warna kulit. Paparan sinar matahari mempengaruhi produksi melanin. Bila paparan bertambah produksi melanin akan meningkat.

g. Fungsi keratinisasi

Keratinisasi dimulai dari sel basal yang kuboid, bermitosis ke atas berubah bentuk menjadi lebih polygonal yaitu sel spinosum. Terangkat ke atas menjadi

lebih pipih, dan bergranula menjadi sel granulosum. Kemudian sel tersebut terangkat ke atas lebih pipih, dan granula serta intinya hilang dan akhirnya sampai di permukaan kulit menjadi sel mati, protoplasma mengering menjadi keras, pipih, tanpa inti yang disebut sel tanduk. Proses ini berlangsung terus-menerus dan berguna untuk fungsi rehabilitasi kulit agar dapat melaksanakan fungsi dengan baik.

h. Fungsi produksi vitamin D

Kulit juga dapat membuat vitamin D dari bahan baku 7-dihidroksi kolesterol dengan bantuan paparan sinar matahari. Namun produksi ini masih lebih rendah dari kebutuhan tubuh akan vitamin D dari luar makanan.

D. Jerawat

Jerawat adalah masalah kulit yang paling umum. Berdasarkan beberapa penelitian sekitar 80% orang akan mengalami jerawat pada usia 12-25 tahun. Sementara itu, sekitar 25% orang mulai mengalami tumbuh jerawat pada usia 25 tahun. Faktanya jerawat memang lebih banyak dialami oleh remaja dibandingkan dengan orang dewasa. Pada umumnya masalah jerawat akan berkurang bahkan hilang seiring pertambahan usia. Akan tetapi jerawat yang timbul pada usia remaja apabila tidak ditangani dengan baik atau mengalami penanganan yang salah, akan sangat memungkinkan jerawat tersebut akan menetap hingga seseorang mencapai usia lebih dari 40 tahun. Dalam kasus ini jerawat biasanya akan meninggalkan bekas yang tidak mudah untuk ditangani (Achroni, 2012).

Jerawat (*acne vulgaris*) adalah penyakit yang disebabkan oleh terganggunya aliran sebum dari benda asing yang membentuk pimple yang diikuti infeksi ringan. Benda asing ini sendiri juga dinamakan *comedo*. Dengan ini, akar penyakit adalah banyaknya sebum yang diproduksi. Kelainan ini biasanya muncul diusia pubertas atau dewasa muda pada saat kelenjar tersebut

mulai aktif. *Acne* biasanya terdapat pada wajah, yaitu pada bagian dahi, pipi, serta hidung. Selain itu, jerawat juga terdapat pada bagian dada dan punggung. Karena pada dasarnya *acne* dapat menyebabkan semacam luka di kulit, sehingga penanganan yang kurang baik dapat menyebabkan terbentuknya jaringan parut pada bekas jerawat (Wibowo, 2008).

Jerawat adalah kondisi abnormal kulit akibat terjadinya gangguan berlebih produksi kelenjar minyak yang menyebabkan penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Jerawat dapat timbul di permukaan kulit muka, bagian dada dan atas lengan. Yang sering dijumpai yaitu, ada 5 jenis jerawat (Wahyuni, 2007):

Jenis-jenis jerawat terbagi menjadi lima jenis, di antaranya:

a. Komedo tertutup (*white-head*)

Disebut juga komedo putih, kondisi ini terjadi karena pori-pori tersumbat oleh sel-sel kulit mati, keratin, minyak berlebih, dan bakteri. Namaun, berbeda dengan komedo terbuka, komedo putih timbul di bawah permukaan kulit. Inilah yang menyebabkannya disebut komedo tertutup dan warnanya tak berubah menjadi hitam seperti komedo terbuka.



Gambar 5. *Whitehead* komedo

b. Komedo terbuka (*black-head*)

Blackhead terjadi dikarenakan adanya sumbatan muara kelenjar sebum dan keringat (*apocrine*). Komedo jenis ini tumbuh dipermukaan kulit, dapat terkena udara sehingga warnanya menghitam dan terlihat jelas di kulit. Biasanya muncul di area hidung, dagu, dan pipi.



Gambar 6. *Blackhead* komedo

c. *Papula*

Jerawat jenis ini merupakan pori-pori yang mengalami iritasi cukup parah sehingga menyebabkan munculnya tonjolan kulit pink kemerahan dan tampak gatal. Biasanya pada *papula* tidak terdapat cairan di dalamnya.



Gambar 7. *Papula*

d. *Pustule*

Merupakan kelanjutan dari papula namun dengan cairan nanah kekuningan di tengahnya. Pustula dapat terjadi ketika papula yang muncul di kulit tidak segera ditangani dan terlanjut terinfeksi kotoran serta debu, sehingga kondisinya makin parah. Nanah pada pustula awalnya berwarna kemerahan, kemudian berubah menjadi kekuningan dan menonjol di permukaan kulit.



Gambar 8. *Pustule*

e. *Nodula/Kista*

Merupakan jerawat yang sudah meradang terlalu parah hingga menyebabkan munculnya tonjolan yang besar serta sangat terlihat di permukaan kulit dan menyebabkan rasa sakit apabila tersentuh. Hal ini terjadi karena peradangan pada pustula terus berlanjut sehingga beberapa unit *pilo-sebaseus* akan berubah menjadi kantong-kantong nanah. Dikenal sebagai bentuk jerawat yang paling parah, ia juga dikenal sebagai *nodular acne*. Bintik nodula adalah benjolan besar, keras dan nyeri yang terbentuk di bawah permukaan kulit. Rasa sakit yang terkait dengan jerawat nodula parah dan hanya perawatan dermatologis yang disarankan. Seiring peradangan menyebar, hal ini menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit yang mengganggu struktur dan produksi kolagen. Kehilangan kolagen dan fibrin menyebabkan kulit meresap, menciptakan bekas pada permukaan luar kulit (Fitratul M, 2018).



Gambar 9. *Nodula*

a. Terjadinya jerawat

1) Hormonal

Sekresi kelenjar sebaseus yang hiperaktif dipacu oleh pembentukan hormone testoreron (androgen) yang berlebih, sehingga pada usia pubertas akan banyak timbul jerawat pada wajah, dada, punggung, sedangkan pada wanita selain hormone androgen, produksi lipida dari kelenjar *sebaseus* dipacu oleh hormone *luteinizing* yang meningkat saat menjelang menstruasi (Mitsui, 1997).

2) Makanan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh sebuah institusi kecantikan kulit di Amerika Serikat (*Academy of Dermatology*) mengatakan bahwa jerawat tidak disebabkan oleh makanan. Tidak ada makanan yang signifikan dapat menimbulkan jerawat, tetapi ternyata sebuah hasil studi kasus yang terbaru, membuktikan hal yang bertolak belakang. Para pakar penelitian di *Colorado State University Department of Health and Exercise* menemukan bahwa makanan yang mengandung kadar gula dan kadar karbohidrat yang tinggi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menimbulkan jerawat. Secara ilmiah dapat dibuktikan bahwa

mengonsumsi terlalu banyak gula dapat meningkatkan kadar insulin dalam darah, dimana hal tersebut memicu produksi hormon androgen yang membuat kulit berminyak dan kadar minyak yang tinggi dalam kulit merupakan pemicu paling besar terhadap timbulnya jerawat (Mitsui, 1997).

3) Kosmetik

Penggunaan kosmetika yang melekat pada kulit dan menutupi pori-pori, jika tidak segera dibersihkan akan menyumbat saluran kelenjar palit dan menimbulkan jerawat yang disebut komedo. Kosmetik yang paling umum menjadi penyebab timbulnya jerawat yaitu kosmetik pelembab yang langsung menempel pada kulit.

4) Infeksi bakteri

Propionibacterium acnes biasanya ditemukan pada lesi-lesi *acne*. Berbagai *strain Propionibacterium acnes* dapat menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol, asam lemak bebas tersebut memungkinkan terjadinya lesi komedo (Mitsui, 1997).

5) Penggunaan obat-obatan

Mengonsumsi obat-obatan kortikosteroid, seperti prednisone, dexametason, dan hidrokortison yang biasanya digunakan pada pengobatan berbagai penyakit, seperti asam, lupus, rheumatoid arthritis, dan berbagai kasus inflamasi lainnya dapat menyebabkan penipisan kulit dan timbulnya jerawat (Achroni, 2012).

6) Gaya hidup yang tidak sehat

Mengonsumsi makan berminyak dan berlemak yang terlalu banyak, seperti gorengan, susu *full cream*, atau keju dapat memicu

timbulnya jerawat. Serta kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, kebiasaan bedagang dan kurang olahraga akan menyebabkan daya tahan tubuh menurun sehingga mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan akan lebih mudah muncul termasuk timbulnya jerawat (Achroni, 2012).

7) Lingkungan yang tidak bersih

Kebiasaan beag dang di lingkungan yang berdebu atau polusi udara akan membuat wajah menjadi kotor. Jika tidak rajin membersihkan wajah, debu dan kotoran yang menumpuk akan menyumbat pori-pori kulit sehingga timbulnya jerawat (Achroni, 2012)

8) Faktor keturunan atau genetik

Ketika seseorang yang memiliki riwayat dengan gangguan jerawat biasanya akan menurunkan kondisi tersebut kepada keturunannya atau kerabat terdekat (Achroni, 2012)

9) Stress

Beberapa penelitian membuktikan bahwa adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antara stress dengan tingkat keparahan jerawat. Ketika seseorang mendapatkan tekanan psikologis, tubuh akan memproduksi hormone androgen lebih banyak dapat memicu pertumbuhan jerawat (Achroni, 2012).

b. Pengobatan jerawat

Usaha pengobatan jerawat menurut Wasitaatmadja (1997) dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1) Pengobatan Topikal

Prinsip pengobatan topikal adalah mencegah pembentukan komedo (jerawat ringan), ditujukan untuk mengatasi menekan peradangan dan

kolonisasi bakteri, serta penyembuhan lesi jerawat dengan pemberian bahan iritan dan antibakteri topikal seperti; sulfur, resorsinol, asam salisilat, benzoil peroksida, asam azelat, tetrasiklin, eritromisin dan klindamisin.

2) Pengobatan Sistemik

Pengobatan sistemik ditujukan untuk penderita jerawat sedang sampai berat dengan prinsip menekan aktivitas bakteri, menekan reaksi radang, menekan produksi sebum dan mempengaruhi keseimbangan hormonal. Golongan obat sistemik misalnya: pemberian antibiotik (tetrasiklin, eritromisin, dan klindamisin).

3) Bedah kulit

Bedah kulit ditujukan untuk memperbaiki jaringan parut yang terjadi akibat jerawat. Tindakan dapat dilakukan setelah jerawat sembuh baik dengan cara bedah listrik, bedah pisau, dermabrasi atau bedah laser.

E. Antimikroba

Mikroba adalah organisme yang berukuran mikroskopis yang di antara lain terdiri dari bakteri, fungi dan virus. Bakteri merupakan mikroba yang prokariotik yang rata-rata selnya berukuran 0,5-1 x 2-5 μm , berbentuk elips, bola, batang dan spiral. Senyawa antimikroba tersebut yang dapat digolongkan sebagai antibakteri atau antifungi (Hidayah, 2016).

1. Pengertian Antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk membunuh infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservatif. Antimikroba juga dikatakan sebagai obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang merugikan manusia. Yang dimaksudkan dengan mikroba terbatas pada jasad renik yang tidak termasuk

kelompok parasit. Antimikroba sendiri dapat bersifat sebagai *baktetiostatika* dan *bakteriosida* (Syamsul, 2015).

2. Sifat Antimikroba

- a. Bakteriostatik, yaitu menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme seperti menghentikan pertumbuhan fungi, sitostatika terhadap kanker. Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, contoh sulfonamida, tetrasiklin, kloramfenikol, dan eritromisin.
- b. Bakteriosid, bersifat membunuh mikroorganisme. Dalam hal ini jumlah mikroorganisme akan berkurang bahkan habis, tidak dapat melakukan multifikasi atau berkembang biak, contohnya penisilin, sefalosporin, dan neomisin (Hidayah, 2016).
- c. Tidak menyebabkan resistensi pada kuman atau mikroba, yaitu antimikroba tidak akan menimbulkan kekebalan kepada mikroba sehingga antimikroba tidak dapat digunakan untuk menghentikan pertumbuhan mikroba pathogen lagi.
- d. Berspektrum luas, yaitu antimikroba efektif digunakan untuk berbagai spesies bakteri baik, bakteri kokus, basil, dan spiral.
- e. Tidak menimbulkan alergenik atau menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu lama, yaitu antimikroba yang digunakan dalam jangka waktu lama, yaitu antimikroba yang digunakan sebagai obat tidak menimbulkan efek samping kepada pemakai jika digunakan dalam jangka waktu lama.
- f. Zat antimikroba tetap aktif dalam plasma, cairan tubuh atau eskudat, antimikroba yang berada dalam plasma atau cairan tubuh tetap bersifat aktif dan tidak dalam keadaan berhenti tumbuh atau dormansi.

- g. Zat antimikroba dapat larut dalam air dan stabil, antimikroba dapat larut dan menyatu dalam air.

3. Prinsip Kerja Antimikroba

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya lebih toksik terhadap mikroorganismenya dibandingkan pada sel hospes. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat pada reaksi-reaksi biokimia yang penting dalam sel parasit lebih unggul dari pada pengaruhnya terhadap hospes. Disamping itu struktur sel mikroorganisme berbeda dengan struktur sel manusia (hospes, inang) (Irwan, 2017).

4. Mekanisme Kerja Antimikroba

- a. Menghambat metabolisme sel mikroba

Antimikroba yang termasuk dalam kelompok ini adalah sulfonamide, trimetoprin, asam p-aminosalisilat dan sulfon. Mikroba membutuhkan asam folat untuk kelangsungan hidupnya yang harus disintesis dari asam amino nezoat (PABA). Apabila golongan antimikroba di atas menang bersaing dengan PABA untuk diikutsertakan dalam pembentukan asam folat, maka berbentuk analog asam folat yang nonfungsional. Akibatnya, kehidupan mikroba akan terganggu.

- b. Menghambat sintesis dinding sel mikroba

Obat yang termasuk yaitu merupakan penisilin, sefalosporin, basitrasin, vankomisin dan sikloserin. Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan yaitu suatu kompleks polimer mukopeptida. Antimikroba menghambat reaksi paling dini dalam proses sintesis dinding sel dan menghambat reaksi paling dini dalam proses sintesis dinding sel dan menghambat sel mikroba

c. Mengganggu keutuhan membrane sel mikroba


Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah polimiksin dan golongan polien. Polimiksin sebagai senyawa ammonium kuartener dapat merusak membrane sel setelah bereaksi dengan fosfat dan fosfolipid membran sel mikroba. Antibiotik polien bereaksi dengan struktur sterol yang terdapat pada membrane sel sehingga mempengaruhi permeabilitas selektif membrane tersebut.

d. Menghambat sintesis protein mikroba

Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah golongan aminoglikosida, makrolida, linkomisin, tetrasiklin dan kloramfenikol. Untuk kehidupannya, sel mikroba perlu mensintesis berbagai protein. Sintesis protein berlangsung di ribosom dengan bantuan mRNA dan tRNA. Pada bakteri, ribosom terdiri atas dua sub unit yaitu ribosom 30S dan 50S. streptomisin berikatan dengan komponen ribosom 30S dan menyebabkan kode pada mRNA salah dibaca oleh tRNA pada waktu sintesis protein. Akibatnya akan terbentuk protein yang abnormal dan nonfungsional bagi sel mikroba. Eritromisin berikatan dengan ribosom 50S dan menghambat translokasi kompleks tRNA-peptida dari lokasi asam amino ke lokasi peptida. Akibatnya rantai polipeptida tidak dapat diperpanjang karena lokasi asam amino yang baru

e. Menghambat sintesis asam nukleat mikroba

Antimikroba yang termasuk dalam kelompok ini adalah rifampisin dan golongan kuinolon. Rifampisin berikatan dengan enzim polymerase-RNA sehingga menghambat sintesis RNA dan DNA oleh enzim tersebut.



Gambar 10. Mekanisme Kerja Antibiotik

5. Senyawa yang Bersifat Antimikroba

Senyawa yang mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri banyak terkandung di dalam tumbuhan. Beberapa senyawa antimikroba antara lain :

1. Saponin

Merupakan senyawa yang mempunyai kemampuan untuk melisiskan dinding sel bakteri apabila berinteraksi dengan dinding bakteri. Saponin yang dujikan langsung pada bakteri dapat meningkatkan permeabilitas membrane sel bakteri, sehingga struktur dan fungsi membran sel berubah. Hal tersebut akan mengganggu kestabilan permukaan dinding sel, memudahkan zat antibakteri masuk kedalam sel dan mengganggu metabolisme sel yang mengakibatkan terjadinya denaturasi protein bakteri.

2. Flavonoid

Merupakan senyawa fenol yang mempunyai sifat sebagai desinfektan. Karena flavonoid yang bersifat polar membuat flavonoid dapat dengan mudah menembus lapisan peptidoglikan yang juga bersifat polar, sehingga flavonoid sangat efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif. Flavonoid

mempunyai cara kerja yang sama seperti saponin dalam hal menghambat pertumbuhan bakteri, yaitu dengan mendenarurasi protein bakteri yang menyebabkan terhentinya aktivitas metabolisme sel bakteri. Terhenti aktivitas metabolisme sel bakteri. terhentinya aktivitas metabolisme mengakibatkan kematian pada sel.

3. Tanin

Merupakan senyawa yang terdapat merusak membrane sel bakteri. Senyawa tannin mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengkoagulasi protoplasma bakteri.

4. Terpenoid

Senyawa antibakteri jenis terpenoid efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri, fungi, virus, dan protozoa. Seperti pada umumnya mekanisme kerja terpenoid dalam menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengiritasi dinding sel dan mengumpulkan protein bakteri. Sehingga menyebabkan terjadinya hidrolisis dan difusi cairan sel karena adanya perbedaan tekanan osmosis.

5. Xanthone

Senyawa xanthone memiliki fungsi antioksidan tinggi sehingga dapat menetralkan dan menghancurkan radikal bebas yang memicu munculnya penyakit degeneratif.

6. Alkaloid

Merupakan senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen, umumnya berupa asam amino. Alkaloid mempunyai aktivitas antimikroba yang diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat sintesis dinding sel, menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat sintesis protein.

7. Minyak Atsiri

Minyak atsiri tersusun dari beberapa senyawa utama, yaitu citral, sitronelol dan geraniol yang bersifat antibakteri dan memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri. Selain itu, minyak atsiri mengandung senyawa-senyawa volatil seperti golongan monoterpen dan sesquiterpen yang termasuk golongan senyawa bersifat antimikroba.

F. Uji Antimikroba

Keefektifan antimikroba pada pengobatan infeksi dalam klinis tergantung pada kemampuan obat untuk membatasi atau mengurangi mikroorganisme pada tempat infeksi. Pada kebanyakan infeksi, mekanisme pertahanan lokal dan sistemik memainkan peranan penting dalam menurunkan efek patogenitas suatu mikroorganisme. Bahan-bahan atau obat-obat yang bersifat bakteriostatik terutama menghambat replikasi dari mikroorganismenya, sedangkan bahan atau obat-obat yang bersifat bakterisid menyebabkan kematian suatu mikroorganisme (Djide, 2008)

Terdapat bermacam-macam metode uji antimikroba yaitu :

1. Metode difusi

a. Metode *disc diffusion* (tes Kirby dan Bauer)

Metode ini digunakan untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan media agar. Cara ini menggunakan kertas saring dengan bentuk dan ukuran tertentu, biasanya berbentuk bulat dengan diameter 0,7–1,0 cm, yang akan dicelup pada larutan sampel dan larutan pendamping. Kertas saring tersebut dikeringkan dan diletakkan di atas media agar yang telah ditanam mikroba uji. Setelah diinkubasi akan terlihat daerah hambatan yang terbentuk.

b. *E-test*

Digunakan untuk mengestimasi MIC (minimum inhibitory concentration) atau KHM (kadar hambat minimum), yaitu konsentrasi minimal suatu agen antimikroba untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

c. *Ditch-plate technique*

Pada metode ini sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan pada parit yang dibuat dengan cara memotong media Agar dalam cawan petri pada bagian tengah secara membujur dan mikroba uji digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba.

d. *Cup-plate technique*

Di mana dibuat sumur pada media Agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi antimikroba yang akan diuji.

e. *Gradient-plate technique*

Pada metode ini konsentrasi agen antimikroba pada media Agar secara teoritis bervariasi dari 0 hingga maksimal. Media Agar dicairkan dan larutan uji ditambahkan. Campuran medium dituang ke dalam cawan petri dan diletakkan dalam posisi miring. Nutrisi kedua selanjutnya dituang di atasnya.

Plate diinkubasi selama 24 jam untuk memungkinkan agen antimikroba berdifusi dan permukaan media mengering. Mikroba uji digoreskan pada arah mulai dari konsentrasi tinggi ke rendah. Hasil diperhitungkan sebagai panjang total pertumbuhan mikroorganisme maksimum yang mungkin dibandingkan dengan panjang pertumbuhan hasil goresan. Yang perlu diperhatikan adalah hasil perbandingan yang didapat dari lingkungan padat dan cair, faktor difusi agen antimikroba dapat mempengaruhi keseluruhan hasil pada media padat.

2. Metode Dilusi

a. Metode Dilusi Cair

Metode ini mengukur MIC (minimum inhibitory concentration) atau kadar hambat minimum (KHM) dan MBC (minimum bactericidal concentration) atau kadar bunuh minimum (KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan inkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM (Hidayah, 2016).

b. Metode Dilusi Padat

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media padat (solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji (Hidayah, 2016).

Diameter zona hambat yang terbentuk dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori daya hambat bakteri menurut Davies Stout

Kategori Daya Hambat	Diameter Zona Hambat
Lemah	< 5 mm
Sedang	5-10 mm
Kuat	10-20 mm
Sangat Kuat	>20 mm

G. Antibakteri

1. Pengertian Antibakteri

Bahan ataupun obat yang digunakan dalam memberantas ataupun mengobati infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme pada manusia yaitu antibiotik, antiseptik, desinfektansia, dan preservative. Bahan atau obat tersebut digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan maupun tumbuhan harus memiliki sifat toksisitas yang selektif dalam artian zat atau obat tersebut harus bersifat toksis terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relative tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes (Djide, 2008).

2. Sifat antibakteri

a. Bakteriostatik

Suatu zat atau obat yang dapat menghambat ataupun menghentikan pertumbuhan mikroorganisme menjadi stationer, tidak dapat lagi bermultiplikasi dan berkembang baik. Contohnya obat bersifat bakteriostatik seperti sulfonamide, tetrasiklin, kloramfenikol, dan eristromisin (Djide, 2008).

b. Bakteriosida

Suatu zat atau obat yang dapat membunuh mikroorganisme disebut bersifat bakteriosida. Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang bahkan habis karena sudah tidak dapat lagi melakukan pembelahan atau tidak dapat lagi berkembang biak. Contoh obat yang bersifat bakteriosida seperti penisilin, sefalosporin, dan neomisin (Djide, 2008).

3. Prinsip Kerja Antibakteri

Suatu antibakteri memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya lebih toksis terhadap pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau

adanya reaksi biokimia obat yang penting dalam sel parasite lebih unggul daripada pengaruhnya pada hospes. Selain itu, mikroorganisme memiliki struktur yang berbeda dengan struktur sel manusia (Djide, 2008)

4. Mekanisme Kerja Antibakteri

Antibiotik dapat diklasifikasikan berdasarkan kisaran kerjanya atau spectrum mekanisme aksi, strain penghasil, serta cara biosintesis maupun berdasarkan struktur biokimianya. Berdasarkan spectrum atau kisaran kerjanya antibiotik dapat dibedakan menjadi antibiotik berspektrum sempit (*narrow spectrum*) dan antibiotik berspektrum luas (*broad spectrum*). Antibiotik berspektrum sempit hanya dapat menghambat salah satu golongan jenis bakteri saja seperti hanya dapat menghambat ataupun membunuh bakteri gram negatif atau gram positif. Sedangkan antibiotik berspektrum luas dapat menghambat atau membunuh bakteri baik dalam golongan gram positif ataupun gram negative. Suatu bakteri dengan cara mengganggu metabolisme sel bakteri, menghambat sintesis dinding sel, menghambat fungsi membran sel bakteri, menghambat sintesis protein ataupun menghambat sintesis asam nukleat (Pratiwi, 2008).

H. Clindamycin Untuk Pengobatan Jerawat

Clindamycin merupakan antibakteri linkosamid yang merupakan turunan klorid dari linkomisin. Merupakan obat yang bersifat bakteriostatik yang digunakan dalam pengobatan infeksi bakteri gram positif seperti *Pneumococci*, *Staphylococci* dan *Streptococci* (Sweetman, 2009). *Clindamycin* (klorlinkosin, *Dalacin-C*) memiliki sifat dan penggunaan yang sama dengan linkomisin yaitu bersifat bakteriostatik dengan spectrum kerja lebih sempit daripada makrolida, terutama terhadap bakteri gram positif dan anaerob. *Clindamycin* khasiatnya ± 4 kali lebih kuat dibanding linkomisin. Resorpsinya juga jauh lebih baik, sampai 90% juga pada lambung terisi. Waktu paruhnya ± 3 jam. *Clindamycin* sudah

banyak menggantikan senyawa induknya. Banyak digunakan secara topikal pada *acne* berkat efek penghambatan terhadap *Propionibacterium acnes*. Resistensi belum dilaporkan (Tjay, 2015)

Clindamycin bekerja dengan menghambat sintesis protein dengan berikatan pada subunit 50S ribosom dan menghambat translokasi peptidil-tRNA dari situs A ke situs P, dan menyebabkan kesalahan pembaca mRNA dan mengakibatkan bakteri tidak mampu menyintesis protein vital untuk pertumbuhannya (Pratiwi, 2008).

I. Ekstraksi

Ekstraksi adalah sediaan kental yang diperoleh dari mengekstraksi senyawa dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ditjen POM, 1995)

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama (Mukhriani, 2014).

Ekstraksi juga merupakan salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan satu atau lebih komponen atau senyawa dari suatu sampel dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Pada ekstraksi ini prinsip pemisahan didasarkan pada kemampuan atau daya larut analit dalam pelarut tertentu. Dengan

demikian pelarut yang digunakan harus mampu menarik komponen analit dari sampel secara maksimal (Leba, 2017).

Ekstraksi atau sari merupakan hasil penarikan oleh pelarut air atau pelarut organik dari bahan kering. Hasil penyaringan tersebut pelarutnya dihilangkan dengan cara penguapan dengan alat *rotary evaporator* sehingga diperoleh ekstrak kental (Syaifudin., 2014).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Ditjen POM, 2000).

Secara umum terdapat 4 tujuan ekstraksi:

- a. Secara kimia telah diketahui identifikasinya untuk diekstraksi dari organisme. Dalam kasus ini, prosedur yang telah dipublikasi dapat diikuti dan dibuat modifikasi yang sesuai untuk mengembangkan proses atau menyesuaikan dengan kebutuhan pemakaian.
- b. Bahan diperiksa untuk menemukan kelompok senyawa kimia tertentu. Contohnya; alkaloid, flavonoid, atau saponin meskipun struktur kimianya dari senyawa ini, bahkan keberadaannya belum diketahui dalam situasi seperti ini, metode yang umum digunakan untuk senyawa kimia yang diminati dapat diperoleh dari pustaka.
- c. Organisme (tanaman atau hewan) digunakan dalam pengobatan tradisional dan biasanya dibuat dengan berbagai cara misalnya Tradisional Chinese Medicine (TCM) sering kali membutuhkan herba yang dididihkan dalam air untuk diberikan sebagai obat. Proses ini harus ditiru sedekat mungkin jika ekstrak akan melalui kajian ilmiah biologi atau kimia lebih lanjut, khususnya jika tujuannya untuk memvalidasi penggunaan tradisional.

d. Sifat senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan cara apapun. Situasi ini utamanya dalam proses skrining dapat timbul jika tujuannya adalah menguji organisme, baik yang dipilih secara acak atau didasarkan pada penggunaan tradisional untuk mengetahui adanya senyawa dengan aktivitas biologi tertentu (Alam, 2008)

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya (Sarkes & LatifZ, 2006).

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui
2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme
3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural.

Adapun jenis-jenis ekstraksi yaitu:

1. Maserasi

Merupakan proses pengeskrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperature ruangan. Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Secar teknologi maserasi termaksud ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan (Departemen Kesehatan RI, 2000).

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industry. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai kedalam inert yang tertutup rapat pada suhu kamar.

Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai keserimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konstansi dalam sel tanaman. Setelah

proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kekurangan dari metode maserasi adalah memakan waktu yang lama, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Namun di sisi lain, metode ini dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Agoes, 2007).

Selama proses maserasi dilakukan pengocokan berulang-ulang. Upaya ini menjamin keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi yang lebih cepat didalam cairan. Sedangkan keadaan diam selama maserasi tidak memungkinkan terjadinya ekstraksi absolut. Semakin besar perbandingan simplisia terhadap cairan pengestraksi, akan semakin banyak hasil yang diperoleh (Voight, 1994)

Kelebihan ekstraksi ini adalah alat dan cara yang digunakan sangat sederhana, dapat digunakan untuk analit baik yang tahan terhadap pemanasan maupun yang tidak tahan terhadap pemanasan (Leba, 2017).

2. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi ini adalah pelarut yang selalu baru dan sempurna atau *Exhaustive extraction* yang umumnya dilakukan pada temperature ruangan. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat seperti berpori. Proses terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlah 1-5 kali bahan (Departemen Kesehatan RI, 2000)

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah percolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam percolator tidak homogen

makan pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini membutuhkan banyak pelarut dan memakan waktu yang banyak (Agoes, 2007).

Kelebihan metode ini sampeet tidak memerlukan langka tambahan, yaitu sampel sel awal telah terpisah dari ekstrak. Kekurangan yaitu kontak antara sampel padat tidak merata atau terbatas, dan pelarut dapat menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien,

3. Sokletasi

Sokletasi adalah proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sokletasi sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Caranya, serbuk bahan ditempatkan pada selongsong dengan pembungkus kertas saring, lalu ditempatkan pada alat sokletasi yang telah terpasang labu dibawahnya. Tambahkan pelarut sebanyak 2 kali sirkulasi. Pasang pendingin balik, panaskan labu, ekstraksi berlangsung minimal 3 jam dengan interval sirkulasi kira-kira 15 menit (Atun, 2014).

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa atau menggunakan kertas saring dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan kedalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih.

4. Destilasi uap

Destilasi uap adalah proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama

pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam yang terhubung dengan kondensor. Kekurangan dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 2006).

Proses destilasi lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang tahan pada suhu yang cukup tinggi, yang lebih tinggi dari titik didih pelarut yang digunakan (Darwis, 2000).

5. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Departemen Kesehatan RI, 2000).

Metode refluks sampel dimasukkan bersama pelarut kedalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 2006).

6. Infudasi

Infudasi adalah proses ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu proses infudasi berlangsung, temperature pelarut air harus mencapai 90°C selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gram maka volume air sebagai pelarut adalah 1000mL. Cara yang biasa dilakukan adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panci dengan air secukupnya selama 15 menit dihitung mulai suhu mencapai 90°C sambil sekali-kali diaduk. Saring selagi panas melalui kain flannel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume yang diinginkan. Apabila bahan mengandung minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah dingin (Atun, 2014).

J. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan

Ajaran Islam diturunkan ke muka bumi untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat, mengatur hubungan hamba dengan penciptanya, Allah Swt. Dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna syariatnya.

Kehidupan manusia yang begitu kompleks akan terasa mudah dan ringan bila umat manusia berpegang teguh pada ajaran agama islam. Peradaban islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim pada kejayaan Islam berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan dan efek dari obat-obat sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat.

Tumbuhan atau tanaman adalah makhluk Allah yang tersebar luas di bumi yang sangat bermanfaat bagi kepentingan manusia. Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Di dalam firman Allah swt dalam QS. AS-syu'ara /26 ayat 7:

وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahaan :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik?” (Kementerian Agama, 2018)

Menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah jilid 10, ayat ini membuktikan melalui uraiannya-uraiannya keniscayaan keesaan Allah swt. Karena aneka tumbuhan yang terhampar dipersada bumi sedemikian banyak dan

bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaanya konstan. Itu semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada penciptanya yang Maha Esa lagi Maha kuasa. Di sisi lain tanah yang gersang melalui hujan yang diturunkan-Nya menghidupkan yang mati. Demikian juga manusia yang mati dan telah terkubur di bumi. Allah kuasa menghidupkan mereka kembali. Serupa dengan menghidupkan pepohonan yang tumbuh di tanah yang gersang itu.

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik”. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah swt senantiasa mengisyaratkan kepada umatnya manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik itu dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral.

Allah swt menciptakan tumbuhan dan menumbuhkannya di Bumi tak lain untuk kebaikan bagi manusia. Untuk itu pentingnya ilmu pengetahuan dalam hal ini. Sehingga pengolahan dan pemanfaatan tanaman daun tomat ini dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tuntunan Islam.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nahl/16: 10-11 adalah sebagai berikut.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ
 ۱۰ يُبْدِئُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۱۱

Terjemahnya:

“Dialah, yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir.” (Kementerian Agama RI, 2018).

Menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah jilid 6 ayat ke 10, ayat di atas mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri kenikmatan Allah dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya bahwa *Dia* Yang Mahakuasa itulah, yang telah menurunkan dari arah langit, yakni awan air hujan untuk kamu manfaatkan. *Sebagiannya menjadi minuman yang segar dan sebagian lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang padanya, yakni di tempat tumbuhnya, kamu mengembalakan ternak kamu* sehingga binatang itu dapat makan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging dan bulu.

Pada ayat ke 11, ayat ini menyebut beberapa yang paling bermanfaat atau populer dalam masyarakat Arab tempat dimana turunnya al-Qur'an dengan menyatakan bahwa *Dia*, yakni Allah swt, *menumbuhkan bagi kamu dengannya, yakni dengan air hujan itu, tanaman-tanaman; dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik, dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu jadikan makanan yang halal atau minuman yang haram. Dan dari segala macam atau sebagian buah-buahan, selain yang disebut itu. Sesungguhnya pada yang demikian, yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu. Benar-benar ada tanda yang sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Mahakuasa. Tanda itu berguna bagi kaum yang memikirkan.* Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah tempat tumbuhnya berdempet, tetapi ragam dan rasanya berbeda-beda.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt. senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu

pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral. Di mana ketiganya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, mengandung suatu zat atau obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun, tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Swt. di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Terkait dengan hadist diatas, secara umum dapat ditemukan dalilnya pada hadist Nabi yang berbicara tentang penyakit dan obat, sebagai berikut :

Dari jabir bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*. Bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الظَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Harun bin Ma’ruf] dan [Abu Ath Thahir] serta [Ahmad bin ‘Isa] mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb]; Telah mengabarkan kepadaku [‘Amru] yaitu Ibnu Al Harits dari [‘Abdu Rabbih bin Sa’id] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir] dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza wajalla” (HR. Muslim, hadis no. 4084).

Hadits diatas telah diriwayatkan oleh beberapa orang rawi, yakni:

1. [Jabir] sebagai : Rawi pertama
2. [Abu Az Zubair] sebagai : Rawi kedua
3. [‘Abdu Rabbih bin Sa’id] sebagai : Rawi ketiga
4. [‘Amru] Ibnu Al Harits sebagai : Rawi keempat
5. [Ibnu Wahb] sebagai : Rawi kelima

6. [Harun bin Ma'ruf] dan [Abu Ath Thahir] serta : Rawi keenam
[Ahmad bin 'Isa] sebagai
7. Imam muslim sebagai : Rawi ketujuh/ Rawi
terakhir

Dengan demikian, maka urutan-urutan sanad dari Hadits di atas sebagai berikut:

1. [Harun bin Ma'ruf] dan [Abu Ath Thahir] serta : Sanad pertama/Awal
[Ahmad bin 'Isa] sebagai Sanad
2. [Ibnu Wahb] sebagai : Sanad kedua
3. ['Amru] Ibnu Al Harits sebagai : Sanad ketiga
4. ['Abdu Rabbih bin Sa'id] sebagai : Sanad keempat
5. [Abu Az Zubair] sebagai : Sanad kelima
6. [Jabir] sebagai : Sanad keenam/ Akhir
Sanad

Sehingga setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah SWT yang menyembuhkannya, akan tetapi Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya.

Sebagaimana juga diketahui bahwa, daun tomat mengandung beberapa senyawa, yang diketahui memiliki antibakteri yang bertujuan mengobati jerawat pada kulit manusia. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi daun tomat sebagai antibakteri *Propionibacterium acne*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini dilakukan tiga tahapan yaitu pengambilan sampel, ekstraksi, dan pengujian aktifitas antibakteri.

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah tanaman tomat yang diperoleh dari perkebunan di Desa Buluballea Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian kali ini adalah daun tomat.

D. *Instrumen Penelitian*

1. Alat-alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoklaf (Hiclave), cawan porselin, cawan petri, enkas, inkubator (Memmert), jangka sorong (Kenmaster), kompor gas, lampu spiritus, Laminar Air Flow (*LAF*) (ESCO),

lemari pendingin, lemari pengering, mangkuk, ose bulat, oven(Memmert), pinset (Yamaco), spoit 5ml (OneMed), spoit 10ml (OneMed), pipet mikro (Dragonlab), rotary evaporator (IKA), timbangan analitik (Kern), bejana maserasi, dan alat alat gelas yang terbuat dari kaca.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan adalah air suling, asam klorida (HCL), bakteri *propionibacterium acnes*, besi (III) klorida ($FeCl_3$), Dimetil Sulfoksida (DMSO), ekstrak etanol daun tomat, etanol 96% (CV.Intraco), etanol 70% (CV.Intraco), kertas perkamen, kertas saring, natrium agar (NA) (CV.Intraco), natrium klorida (NaCl), pereaksi dragendorff, piper disk blank (CV.Intraco), kapsul klindamisin (Kimia Farma), pereaksi mayer, tisu, spirtus (CV.Intraco), dan simplisia daun tomat.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Penyiapan Sampel (Ekstrak Daun Tomat)

a. Pengambilan Sampel

Sampel penelitian yang digunakan adalah daun tomat (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *Pyriforme* Alef). Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari. Daun yang digunakan adalah daun yang bagus, tidak rusak dan tidak berjamur.

b. Pengolahan Sampel

Sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan daun dari kotoran, daun yang cacat, debu, ulat. Sampel kemudian dicuci dengan air bersih mengalir, kemudian dilakukan perajangan menggunakan gunting, lalu dikeringkan dalam lemari pengering.

c. Ekstraksi Sampel

Simplisia daun tomat dimasukkan ke dalam bejana maserasi, kemudian ditambahkan pelarut etanol 96% hingga terendam seluruhnya. Bejana maserasi ditutup dan didiamkan selama 3 x 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Filtrat etanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya dengan *rotary evaporator* pada suhu 50 °C sampai diperoleh ekstrak etanol kental.

2. Identifikasi Golongan Senyawa Kimia

a. Uji alkaloid

Ekstrak ditimbang 0,5 gram dimasukkan ke dalam tabung reaksi, dilarutkan dalam HCl, kemudian ditambahkan 2-3 tetes pereaksi Dragendorf (larutan potassium bismuth iodide), jika terdapat endapan merah maka positif adanya alkaloid. Kemudian ditambahkan dengan 2-3 tetes pereaksi Mayer (larutan potassium merkuri iodide) menghasilkan endapan kuning maka positif mengandung senyawa alkaloid (Juliato, 2019).

b. Uji flavonoid

Ekstrak ditimbang sebanyak 0,5 gram ditambahkan dengan etanol 70%, kemudian ditambahkan 5-6 tetes HCl pekat, jika membentuk warna merah menunjukkan adanya flavonoid dan pembentukan warna orange menandakan adanya senyawa flavon (Endarini, 2016).

c. Uji saponin

Ekstrak ditimbang 0,5 gram ditambahkan dengan air panas sampai semua bagian ekstrak terendam kemudian dikocok kuat-kuat. Jika terdapat busa didiamkan selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 1-3 tetes HCl 1% jika busa tetap bertahan maka positif mengandung saponin (Juliato, 2019).

d. Uji terpenoid

Ekstrak ditimbang 0,5 gram ditimbang dan dilarutkan dalam 1 ml n-heksan, kemudian ditambahkan dengan 0,5 ml asam anhidrat. Campur tersebut ditetesi dengan 2 ml H_2SO_4 pekat melalui dinding tabung. Adanya senyawa terpenoid akan ditandai dengan adanya warna merah (Endarini, 2016)

e. Uji fenol

Ekstrak ditimbang 0,5 gram ekstrak ditimbang dilarutkan dengan air kemudian ditambahkan 2-3 tetes $FeCl_3$ jika hasil positif ditunjukkan dengan warna biru atau hijau (Julianto, 2019).

3. Sterilisasi

Alat-alat yang digunakan dicuci hingga bersih menggunakan deterjen, wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam air panas selama 15-30 menit. Dicuci dengan pembilasan pertama HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas Erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu $180^{\circ}C$ selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastic lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu $121^{\circ}C$ selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar (Yusmaniar, 2017).

4. Pembuatan Medium

a. Nutrient Agar

Ditimbang sebanyak 0,28 gram medium *nutrient agar* yang kemudian dilarutkan dengan air steril sebanyak 10 ml, setelah larut di sterilisasi dalam autoklaf pada suhu $121^{\circ}C$ selama 15 menit. Lalu medium siap untuk digunakan.

b. Glukosa Nutrient Agar (GNA)

Ditimbang sebanyak 2,8 gram medium NA, dan glukosa sebanyak 0,5 gram dimasukkan ke Erlenmeyer yang kemudian dilarutkan dengan aquadest sebanyak 100 ml, kemudian dipanaskan hingga larut diatas penangas air. Setelah itu disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Lalu medium siap untuk digunakan.

5. Pengujian Aktivitas Antimikroba

a. Peremajaan bakteri uji

Diambil (*Propionibacterium acnes*) yaitu bakteri penyebab jerawat satu ose dari biakan murni kemudian diinokulasi pada medium *nutrient agar* (NA) miring, lalu diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam (Yusmaniar, 2017).

b. Pembuatan konsentrasi larutan uji

Dibuat larutan uji konsentrasi 20%, 40%, 60% dan 80%. Dibuat larutan stok 80% dengan cara menimbang ekstrak 5 gram dilarutkan dengan 5 mL DMSO, lalu ditambahkan aquadest 7,5 mL. Kemudian diambil 3,75 mL dari larutan stok untuk konsentrasi 60%, diambil 2,5 mL untuk konsentrasi 40%, dan diambil 1,25 mL untuk konsentrasi 20%. Kemudian masing-masing konsentrasi dicukupkan volumenya hingga 7,5 mL.

c. Pembuatan konsentrasi Clindamycin 0,1% dan DMSO 0,1%

Pembuatan clindamycin 0,1% (kontrol positif) dengan cara serbuk clindamycin 300 mg ditimbang sebanyak mg, Kemudian dilarutkan dengan aquadest sampai 10 ml. menurut Reski Sundu (2018). Sedangkan pembuatan

DMSO 0,1 (Kontrol Negatif) dengan cara cairan DMSO 1,27 ml dicukupkan dengan 10 ml aquadest.

d. Pembuatan larutan McFarland

Larutan H_2SO_4 1% sebanyak 9,5 ml dicampurkan dengan larutan $BaCl_2$ 1,75% sebanyak 0,5 ml dalam Erlenmeyer. Dikocok sampai terbentuk larutan yang keruh. Kekeruhan ini dipakai sebagai standar kekeruhan suspensi bakteri (Victor, 1980)

e. Pembuatan suspensi bakteri

Diambil bakteri *Propionibacterium acnes* menggunakan jarum ose steril setelah diinokulasi. Kemudian disuspensikan kedalam tabung reaksi yang berisi 10 mL NaCl 0,9% hingga diperoleh kekeruhan sama dengan standar kekeruhan larutan *Mc. Farland*.

f. Pengujian aktivitas daya hambat

Pengujian aktivitas daya hambat dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan medium GNA, 20 μ L suspensi bakteri uji dituangkan dalam 10 ml medium *nutrient agar* di dalam cawan petri, dibiarkan memadat. Kemudian *piper disk blank* direndam sampel dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 80%. Dan Clindamycin 0,1% (kontrol positif), *DMSO* 0,1% (kontrol negatif), diletakkan dalam cawan petri yang telah berisi medium dan suspensi mikroba. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37° C, lalu diamati zona hambat yang terbentuk (Yusmaniar, 2017).

g. Pengukuran zona hambat

Pengukuran ini dilakukan menggunakan jangka sorong dengan cara mengukur luas zona hambat berupa zona bening di sekitar *piper disk* (Yusmaniar, 2017).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Daun Tomat

Penelitian yang dilakukan menggunakan 3 Kg daun tomat yang kemudian dikeringkan, diperoleh simplisia daun tomat sebanyak 500 gram simplisia daun tomat di ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi menggunakan larutan penyari Etanol sebanyak 5 liter, diperoleh ekstrak sebanyak 34.47 gram.

Tabel 2. Hasil Ekstraksi Simplisia Daun Tomat Dengan Metode Maserasi

Berat sampel	Berat Simplisia	Jenis Ekstrak	Berat Esktrak	% Rendamen
3 Kg	500 gram	Ekstrak kental	34.47 gram	6,89%

2. Hasil Uji Identifikasi Golongan Senyawa

Hasil ekstraksi etanol daun tomat kemudian diuji golongan senyawa kimianya untuk mengetahui kandungan senyawa yang terdapat pada daun tomat.

Tabel 3. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Etanol Daun Tomat

Golongan Senyawa	Hasil
Alkaloid	-
Flovanoid	+
Saponin	+
Terpenoid	+
Fenol	+

Ket. : (+) Terdeteksi mengandung golongan senyawa uji.

(-) Tidak terdapat golongan senyawa tertentu.

3. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri

Aktivitas antibakteri dilakukan dengan pengujian menggunakan sampel ekstraksi etanol daun tomat.

Tabel 4. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak etanol daun tomat

No	Konsentrasi (%)	Diameter zona hambat (mm)			Rata-rata	Keterangan
		1	2	3		
1	20	8,6	11,5	9,44	9,84	Sedang
2	40	9,5	12,28	9,7	10,45	Kuat
3	60	9,84	13,8	10,96	11,53	Kuat
4	80	10,56	14,8	10,9	12,08	Kuat
5	klindamisin	43,96				Sangat kuat
6	DMSO	-			-	-

Keterangan : (-) tidak ada zona hambat (*Fiana dkk, 2020*)

B. Pembahasan

Jerawat adalah penyakit kulit yang sering terjadi pada masa remaja bahkan orang dewasa yang ditandai adanya kemode, papul, pustule, nodus, dan pada wajah, leher, punggung, dan dada. Prevalensi tertinggi penderita jerawat pada wanita umur 14 – 17 tahun 83% – 85% dan pada pria umur 16 – 19 tahun 95% – 100% (Susanto, 2013).

Jerawat merupakan suatu keadaan dimana pori-pori kulit tersumbat sehingga timbul bruntusan dan abses (kantong nanah) yang meradang dan terinfeksi pada kulit. jerawat dapat disebabkan oleh aktivitas kelenjar minyak

yang berlebihan dan diperburuk oleh bakteri. Salah satunya bakteri *Propionibacterium acne* (Suryana, 2017).

Penelitian ini menggunakan daun tomat. Dimana tanaman tomat terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan biji. Tinggi tanaman tomat mencapai 2-3 meter. Daunnya yang berwarna hijau dan berbulu mempunyai panjang sekitar 20-30 cm dan lebar 15-20 cm. Bunga tanaman tomat berwarna kuning dan tersusun dalam dompolan dengan jumlah 5-10 bunga per dompolan atau tergantung dari variestasnya. Bunga tomat berbentuk bulat, bulat lonjong, bulat pipih, atau oval. Buah yang masih muda berwarna hijau muda sampai hijau tua. Sementara itu, buah yang sudah tua berwarna merah cerah atau gelap, merah kekuning-kuningan, atau merah kehitaman (Wiriyanta, 2008).

Digunakan daun tomat sebagai sampel penelitian karena pemanfaatan daun tomat masih sangat kurang dan masih sebatas penggunaan langsung. Kebanyakan masyarakat berfikir bahwa dari sebuah tanaman tomat yang dapat digunakan hanya buahnya, sementara daunnya hanya sebagai limbah.

Pengambilan sampel daun tomat dilakukan di Desa Buluballea Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel daun tomat yang telah diambil kemudian di sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memilah bagian daun yang rusak, kotoran-kotoran dan bagian tanaman yang tidak diperlukan pada penelitian ini. Setelah proses sortasi basah daun tomat kemudian dicuci bersih dengan air yang mengalir. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah ataupun kotoran yang melekat pada daun tomat.

Setelah proses pencucian daun tomat kemudian dilakukan perajangan untuk mempermudah proses pengeringan dan dikeringkan didalam lemari pengering hingga kadar air yang terkandung dalam sampel berkurang. Kadar air tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganismenya. Daun tomat yang telah

kering disortasi untuk memisahkan kotoran yang masih terdapat pada sampel. Kemudian diserbukan dengan cara di blender, sehingga pada saat proses ekstraksi kontak antara pelarut dengan sampel lebih efektif dan senyawa dapat tereskraksi dengan optimal.

Proses ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Hasil dari penyaring yang diperoleh kemudian dipekatnya dengan menggunakan alat *rotary evaporator* hingga diperoleh ekstrak kental.

Selanjutnya dilakukan uji identifikasi senyawa golongan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 2, ekstrak etanol daun tomat terdeteksi mengandung senyawa flavonoid, saponin, terpenoid, dan fenol.

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler (Nuria, 2009).

Putri ZF (2010) menyatakan mekanisme antibakteri senyawa fenol dalam membunuh mikroorganisme yaitu dengan mendenaturasi protein sel. Ikatan hidrogen yang terbentuk antara fenol dan protein menjadi rusak. Ikatan hydrogen tersebut akan mempengaruhi permeabilitas dinding sel dan membrane sitoplasma yang terganggu dapat menyebabkan ketidakseimbangan makromolekul dan ion dalam sel sehingga sel menjadi lisis.

Prasetyo (2008) menyatakan bahwa saponin merupakan senyawa metabolik sekunder yang berfungsi sebagai antiseptik sehingga memiliki kemampuan antibakteri. Adanya zat antibakteri tersebut akan menghalangi pembentukan atau pengangkutan masing-masing komponen ke dinding sel yang mengakibatkan lemahnya struktur disertai dengan penghilangn dinding sel dan

pelepasan isi sel yang akhirnya akan mematikan maupun menghambat pertumbuhan sel bakteri tersebut.

Retnowati (2011) menyatakan bahwa terpenoid sebagai zat antibakteri dengan melibatkan kerusakan membrane oleh senyawa lipofilik. Terpenoid dapat bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada membrane luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat dan merusak porin, mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri sehingga sel bakteri kekurangan nutrisi, pertumbuhan bakteri terhambat dan mati.

Pada tahap selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun tomat menggunakan metode difusi cakram dengan *paper disc* dengan medium *Glukosa Nutrient Agar* (GNA). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya diameter zona hambat bening disekitar *paper disc* pada bakteri *Propionibacterium acne*. Sebelumnya dilakukan peremajaan terlebih dahulu untuk meregenasi bakteri agar yang diperoleh bakteri yang muda dan tidak terkontaminasi. Media agar yang digunakan untuk peremajaan bakteri adalah *Nutrient Agar* (NA).

Peremajaan bakteri dilakukan dengan menanam bakteri pada media agar miring yang kemudian diinkubasi selama 24 jam dalam incubator pada suhu 37°C. inkubasi dilakukan dengan tujuan untuk mengkondisikan lingkungan pada suhu optimum perkembangan bakteri sehingga bakteri dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Larutan uji dibuat sebanyak 4 konsentrasi yaitu 20%, 40%, 60%, dan 80%. Dibuat terlebih dahulu larutan stok 80% dan kemudian diencerkan menjadi 20%, 40%, 60%. Larutan stok dibuat dengan cara menimbang 20 gram ekstrak kemudian dilarutkan dengan aquadest 25 mL.

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar dengan medium GNA, satu ose bakteri yang telah diremajakan disuspensikan kedalam botol coklat steril yang telah berisi 10 ml medium. Yang kemudian dituang kedalam cawan petri, dibiarkan memadat dan *paper disc* yang telah dijenuhkan dengan sampel pada konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 80% dengan kontrol positif antibiotik klindamisin dan kontrol negatif DMSO kemudian ditanam dalam medium. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C, lalu diamati luas zona hambat/bening yang terbentuk.

Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun tomat terhadap bakteri *Propionibacterium acne* menunjukkan terbentuknya zona bening disekitar *paper disc*. Pengukuran luas daerah zona bening yang terbentuk dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Nilai rata-rata diameter daerah zona hambat pada ekstrak etanol daun tomat terhadap bakteri *Propionibacterium acne* dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 80% adalah 9,84; 10,45; 11,53; dan 12,08 mm. Kemudian hasil uji daya hambat zona bening pada antibiotik klindamisin adalah 43,96 mm sedangkan DMSO tidak terdapat zona bening disekitar *paper disc*.

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan, dimana ekstrak etanol daun tomat memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne* dengan zona hambat antara 10 – 20 mm yang artinya menunjukan aktivitas dengan kategori kuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak daun tomat memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Propionibacterium acne*.
2. Ekstrak etanol daun tomat yang dapat memberikan aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne* ialah pada konsentrasi 20% dengan zona hambat 9,84mm, 40% dengan zona hambat 10,45mm, 60% dengan zona hambat 11,53mm dan 80% dengan zona hambat 12,08mm. 20% dengan kategori sedang dan 40% 60% 80% dengan kategori kuat.
3. Ekstrak etanol daun tomat terdeteksi mengandung golongan senyawa flavonoid, saponin, terpenoid dan fenol.

B. Saran

Sebaiknya dalam pengambilan larutan sampel uji untuk di teteskan ke *paper disc blank* menggunakan pipet mikro agar jumlah sampel uji seragam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Achroni, k. (2012). *Semua Rahasia Kulit Cantik dan Sehat Ada Disini*. Jogjakarta: Javalitera.
- Agoes, G. (2007). *Teknologi Bahan Alam*. Bandung: ITB press.
- Alam, N. d. (2008). *Komposisi Kimia dan Sifat Fungsional Pati Jagung Berbagai Varietas yang Diekstraksi dengan Pelarut Natrium Bikarbonat*. J Agroland 15 (2).
- Astusi, S. (2016). *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kloroform Daun Tomat (Solanum Lycopersicum L.), Daun Cabai Merah (Capsicum Annum L.) Dan Daun Ciplukan (Physalis Angulata L.) Dengan Metode DPPH*. Skripsi: Universitas Sebelas Maret.
- Atun, S. (2014). Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Organik Bahan Alam. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Volume 8 No.2.
- Beltran, N. P. (2015). *Total Phenolic, Flavonoid, Tomatine, and Tomatidine Contents and Antioxidant and Antimicrobial Activities of Extracts of Tomato Plant*. Mexico: Hindawi Publishing Corporation.
- Cowan, M. M. (1999). *Plant Products as Antimicrobial Agents*. Miami: Department of Microbiology Miami University.
- Dalilmарtha, S. (2007). *Atlas Tumbuhan Obat indonesia*. Jakarta: Pupsa Swara.
- Darwis, D. (2000). *Teknik Dasar Laboratorium dalam Penelitian Senyawa Bahan. [Workshop] Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Kimia Organik Bahan Alam Hayati*. Padang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.
- Departemen Kesehatan RI. (2000). *Acuan Sediaan Herbal*. Jakarta: Direktorat Jendral POM-Depkes RI.
- Dinnarwika, S. (2012). *Uji Potensi Ekstrak Etanol Daun Tomat (Solanum lycopersicon Linn) Sebagai Imsektisida terhadap Nyamuk Culex Sp. dengan Metode Elektrik*. Malang: Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.


- Ditjen POM. (1995). *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Ditjen POM. (2000). *Parameter Standar Umum Tumbuhan Obat*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Djajadisastra. (2013). *Teknologi Kosmetik Era Modern*. Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- Djide, M. N. (2008). *Dasar - dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin.
- Djuanda, S. (2014). *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Endarini, L. H. (2016). *Farmkognosi dan Fitokimia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Fitratul M, S. (2018). *Performa Identifikasi Jenis Jerawat Menggunakan Gray Level CO-Occurrence Matrix (GLCM) Dan Support Vector Machine (SVM)*. 2018: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Galuh, P. Y. (2009). *Formulasi Gel Obat Jerawat Minyak Atsiri Daun Jeruk Nipis (Citrius aurantifolia, Swingle)*. Surakarta: Muhammadiyah.
- Hidayah, D. N. (2016). *Uji Aktivitas Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (Croton oblongus burm F.) terhadap Bakteri Penyebab Jerawat*. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UINAM.
- Irwan, A. S. (2017). *Uji Aktivitas Antimikroba Hasil Fraksinasi Ekstrak Rimpang Jeringau (Acorus Calamus L.) terhadap Bakteri Patogen*. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UINAM .
- Isriany. (2013). *Formulasi Kosmetik: produk perawatan kulit dan rambut*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Jawetz, M. d. (2005). *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Salemba Medika.
- Julianto, T. S. (2019). *Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder san Skrinning Fitokimia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kementerian Agama. (2018). *Al Mumayyaz Al-qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*. Jakarta: Cipta Bagus Segara.

- Knobler, S. L. (2005). *The Infectious Etiology Of Chronic Diseases: Defining the Relationship, Enhancing the Research, and Mitigating the Effects*. Institute Of Medicine Of The National Academies.
- Leba, M. A. (2017). *Buku Ajar Ekstraksi dan Real Kromatografi*. Yogyakarta: CV. Grup Penerbitan Budi Utama.
- Madison, E. (2003). *Barrier function of the skin: "la raison de'etre" of the epidermis*. *J. invest dermatol.*
- Mitsui, T. (1997). *New Cosmetic Science*. Amsterdam: Edisi Kesatu. Elsevier Science B.V.
- Mukhriani. (2014). *Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, Dan Identifikasi Senyawa Aktif*. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan .
- Nuria, M. C. (2009). *Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Jarak Pagar (Jatropha Curcas L) terhadap Bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, dan Salmonella typhi ATCC 1480*. Mediagro.
- Plantamor. (2008). *Plantamor Situs Dunia Tumbuhan, Informasi Spesies-Pala*.
- Pratiwi, S. (2008). *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Rodiah. (2017). *Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Cabai Rawit (Capsicum frutescens L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Propionibacterium acnes dan Implementasinya Sebagai Media Pembelajaran*. Program Studi Pendidikan Biologi.
- Sarkes, S., & LatifZ, & G. (2006). *Natural Products Isolation, 2nd Edition*. New Jersey: Humana Press Inc.
- Seidel, V. (2006). *Initial and Bulk Extraction*. In Sarker SD, Latif Z, & Gray AI, editors. *Natural Products Isolation 2nd Edition*. New Jersey: Humana Press.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2012
- Siddiq, J. (2010). *Rahasia, Khasiat dan Manfaat Bumbu Dapur, Rempah- rempah dan Sayuran*. Yogyakarta: Surya Media.
- Sopandi, W. T. (2014). *Mikrobiologi Pangan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Steenis, V. C. (2013). *Flora*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Suryana, S. Y. (2017). *Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol dari Lima Tanaman terhadap Bakteri*.
- Susanto, R. C. (2013). *Penyakit Kulit dan Kelamin*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sweetman, S. C. (2009). *Martindale The Complete Drug Reference Thirty-sixth edition*. London: Pharmaceutical Press.
- Syafitri, M. (2020). *Identifikasi Bakteri Pada Jerawat (Acne) pada Wajah*. Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang.
- Syaifudin., A. (2014). *Senyawa Alam Metabolit Sekunder Teori, Konsep dan Teknik Permurnian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syamsul, M. A. (2015). *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum Sanctum L) dalam Bentuk Sediaan Gel*. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UINAM .
- Titin, Y. (2009). *Ensiklopedia Tanaman Obat Tradisional*. Jakarta: Gajah Mada Press.
- Tjay, T. H. (2015). *Obat-Obat Penting Khasiat Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya Edisi ke-7*. Jakarta: PT Alex Media.
- Tranggono, R. I. (2007). *Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Vicktor, L.(1980) *Antibiotic in Laboratory Test*. The wiliam and wilknia Company. USA.
- Wahyuni, E. (2007). *Hubungan Persepsi Tentang Jerawat dengan Kepercayaan Diri Terhadap Remaja Akhir*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wibowo, D. S. (2008). *Anatomi Tubuh Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Wiryanta, B. w. (2008). *Bertaman Tomat*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Yusmaniar, W. d. (2017). *Mikrobiologi dan Parasitologi*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.


LAMPIRAN


Lampiran 1. *Bagan Alur Penelitian*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Lampiran 2. Skema Kerja Penyiapan Sampel




Lampiran 3. Skema Kerja Sterilisasi

Lampiran 4. Skema Kerja Pembuatan Medium

a. Nutrient Agar (NA)




b. Glukosa Nutrient Agar (GNA)




Lampiran 5. Skema Kerja Pengujian Aktivitas Antimikroba


a. Peremajaan bakteri uji



b. Pembuatan konsentrasi larutan uji



c. Pembuatan suspensi bakteri



↓

Diperoleh kekeruhan sama dengan standar
kekeruhan larutan *Mc. Farland*

d. Pengujian aktivitas daya hambat

Diambil 10 mL medium GNA dituang kedalam
cawan petri dibiarkan memadat

Diambil 20 μ L suspensi bakteri lalu
dituang diatas medium GNA

Diratakan dengan spreader

Dijenuhkan *paper disk* dengan sampel pada konsentrasi 20%,
40%, 60%, dan 80% dan kontrol positif *Clindamycin* 0,1%,
kontrol negative *DMSO* 0,1 %

Diletakkan dalam cawan petri yang telah berisi
medium dan suspensi mikroba

Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37⁰ C

Diamati zona hambat yang terbentuk menggunakan
penggaris atau jangka sorong

Lampiran Hasil Determinasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
LABORATORIUM BIOLOGI

Alamat : Kampus Parangtambung Jl. Dg. Tata Raya
Tlp. (0411) 840610 Fax. (0411) 841504 Makassar 90224
Laman : <http://bio.fmipa.unm.ac.id>

No : 006/SKAP/LAB.BIOLOGI/V/2022 Makassar, 27 September 2022
Lamp :
Hal : Hasil Determinasi/Identifikasi Tumbuhan

Kepada Yth.
Nur Aulia Ananda Ihwan (70100115059)
Program Studi Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil determinasi/identifikasi tumbuhan yang saudara kirimkan ke laboratorium Botani Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Makassar, sebagai berikut:

No	No. Koleksi	Species	Familia
1	01	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill	Solanaceae

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kepala Laboratorium Biologi
EMIPA UNM.



Prof. Ostan Jumadi, S.Si, M.Phil, Ph.D.
NIP. 19701016 199702 1 001

Lampiran 6. Hasil Perhitungan

a. Perhitungan konsentrasi

1. Larutan stok 80%

$$\begin{aligned} \frac{\% b}{v} &= \frac{g/ml \text{ zat terlarut}}{100 ml \text{ Larutan}} \times 100\% \\ &= \frac{80 \div 4}{100 \div 4} = \frac{20}{25} \times 100 = \frac{2000}{25} = 80\% \end{aligned}$$

2. Pengenceran

$$\text{Diketahui} = M_1 = 80$$

$$V_2 = 5 \text{ ml}$$

$$\text{Rumus } V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 = \frac{V_2 \cdot M_2}{M_1}$$

Dibuat konsentrasi 20% 40% dan 60%

$$1) \ 20\% = \frac{5 \text{ ml} \cdot 20}{80} = 1,25$$

$$2) \ 40\% = \frac{5 \text{ ml} \cdot 40}{80} = 2,5$$

$$3) \ 60\% = \frac{5 \text{ ml} \cdot 60}{80} = 3,75$$

b. Perhitungan Clindamycin 0,1%

$$1000 \text{ ppm} = 1 \text{ mg/L}$$

$$= 1 \mu\text{g/ml}$$

$$= \frac{1 \text{ mg} \times 100 \text{ ml}}{1000 \text{ ml}}$$

$$= 0,1 \text{ mg}$$

$$= \frac{\text{Berat 1 tablet} \times 0,1 \text{ mg}}{\text{Kandungan Clindamycin}}$$


$$= \frac{300 \text{ mg} \times 0,1 \text{ mg}}{300 \text{ ml}} = 0,1 \text{ mg ad 10 ml}$$

c. Perhitungan DMSO 0,1%


$$V_1 = \frac{V_2 \cdot M_2}{M_1}$$

$$V_1 = \frac{10 \text{ ml} \cdot 0,1\%}{79,13\%}$$

$$V_1 = \frac{1}{78,13} = 1,27 \text{ ml ad } 10 \text{ ml}$$




Lampiran 7. Gambar Pengamatan dan pengolahan daun tomat




Gambar 11. Pengumpulan dan pengolahan sampel daun tomat

Keterangan: (a) Pengambilan sampel; (b) Sampel daun tomat; (c) Pencucian sampel; (d) Pengeringan sampel di lemari pengering; (e) Daun tomat yang sudah kering (simplisia); (f) Penimbangan simplisia daun tomat.




Gambar 12. Ekstraksi sampel daun tomat

Keterangan : (a) Maserasi sampel daun tomat menggunakan pelarut etanol 96%;
(b) Penyaringan sampel daun tomat; (c) Hasil penyaringan daun tomat;
(d) Proses penguapan filtrat menggunakan rotary evaporator;
(e) ekstrak kental daun tomat.




Gambar 13. Hasil identifikasi golongan senyawa ekstrak etanol daun tomat

Keterangan: (a) Negatif (-) tidak terdapat golongan senyawa alkaloid; (b) Positif (+) terdapat golongan senyawa flavonoid; (c) Positif (+) terdapat golongan senyawa saponin; (d) Positif (+) terdapat golongan senyawa terpenoid; (e) Positif (+) terdapat golongan senyawa fenol.




Gambar 14. Penyiapan alat dan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba

Keterangan : (a) Sterilisasi alat kaca menggunakan oven; (b) Penimbangan nutrient agar; (c) Glukosa PA; (d) Paper disk blank; (e) Larutan DMSO 0,1% dan clindamisin 0,1%; (f) larutan DMSO; (g) H_2SO_4 1%; (h) Barium klorida $BaCl$ 1% .




Gambar 15. Penyiapan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba

Keterangan : (a) Larutan NaCl 0,9%; (b) Larutan Mc Farland dan suspensi bakteri;
(c) Dipanaskan Nutrient Agar di atas penangas air; (d) Kapsul clindamisin; (e) Sterilisasi Aquadest dan nutrient agar di autoklaf.



Gambar 16. Pengerjaan pengujian aktivitas antimikroba

Keterangan : (a) Peremajaan bakteri uji; (b) Penuangan medium ke cawan petri menggunakan spoit; (c) Penuangan suspensi bakteri di atas nutrient agar menggunakan pipet mikro; (d) Diratakan suspensi bakteri menggunakan spreader; (e) Deletakkan paper disk yang sudah dijenuhkan dengan larutan uji di atas medium; (f) Diukur zona hambat pada cawan petri.



Gambar 17 Hasil pengujian aktivitas daya hambat

Keterangan : (a) Hasil uji daya hambat DMSO dan Klindamisin; (b) Hasil uji daya hambat ekstrak etanol percobaan 1; (c) Hasil uji daya hambat ekstrak etanol percobaan 2; (d) Hasil uji daya hambat ekstrak etanol percobaan 3.

RIWAYAT HIDUP



Nur Aulia Ananda Ihwan yang akrab disapa dengan panggilan aulia. Dilahirkan di Makassar, tepatnya pada hari Kamis, 29 Mei 1997. Penulis merupakan anak sulung dari empat bersaudara dari pasangan Ihwan Rum dan Nurhylwa. Saat ini tinggal di Sinjai bagian Utara tepatnya di jalan Sungai Tangka.

Penulis pertama kali menginjak dunia pendidikan formal di TK Pertiwi pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2003. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SDN 3 Sinjai Utara dan tamat pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sinjai Utara dan tamat pada tahun 2012, dan setelahnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Sinjai Utara dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama juga penulis berganti status dari siswa ke mahasiswa, dan di terima di salah satu perguruan tinggi negeri tepatnya di jurusan Farmasi, Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R