

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAN PARTISI DAUN ANAK DARA
(*Croton oblongus* Burm F.) TERHADAP *Propionibacterium acnes***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH :

NURUL GUFRANAH ALI

NIM : 70100120074

**JURUSAN FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Gufrannah Ali
Nim : 70100120074
Tempat/Tanggal Lahir : Polmas, 03 Mei 2002
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : S1 Farmasi
Alamat : Lembang, kec. Banggai Timur,
Majene, Sulawesi Barat
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak
dan Partisi Daun Anak Dara
(*Croton oblongus* Burm F.)
Terhadap *Propionibacterium acnes*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
MAKASSAR
Gowa, 21 Agustus 2024
Penyusun,

NURUL GUFRANAH ALI
NIM. 70100120074

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak dan Partisi Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) Terhadap *Propionibacterium acnes*” yang disusun oleh Nurul Gufranah Ali NIM. 70100120074, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi (munaqasyah) yang diselenggarakan pada hari Rabu yang bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2024 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

GOWA, 21 Agustus 2024
16 Safar 1446 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Nomor SK 2024

Ketua : Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M Kes.

Sekretaris : apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.

DEWAN PENGUJI

Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A

Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si

Apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.Si

Dr. Haeria., S.Si., M.Si

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes.
NIM. 70100120060420

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah swt tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak dan Partisi Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) Terhadap *Propionibacterium acnes*” dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana farmasi pada program studi farmasi fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi sebagai tugas akhir ini, penulis mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih terkhusus pada kedua orang tua tercinta dan tersayang bapak Ali Azis dan ibu Hj. ST. Zakiyah Dumair yang telah mencurahkan kasih sayang, merawat, dan mendidik penulis hingga saat ini. Yang selalu memberikan motivasi, dukungan moral ataupun material, dan juga doa yang tidak henti dipanjatkan untuk penulis sehingga dapat berada diposisi saat ini. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada beberapa keluarga yang kerap mendukung penulis terutama saudara yaitu adik Karimah Al-Marwazia Ali dan Fadila Tuzzahrah Cipta Ningsi Ali yang selalu mendukung, menyemangati, dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Pada kesempatan kali ini juga penulis mengucapkan rasa terima kasih dan juga penghargaan kepada beberapa pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, arahan dan juga saran yang diperoleh selama proses pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada yang terhormat:

1. Prof. H. Hamdan Juhani MA.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H, Kamaluddin Abunawas, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Muhammad Khalifa Mustamin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Prof. H. Muhammad Amry, Lc., M.Ag., Selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. apt. Isriany Ismail, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Fais Satrianegara, SKM., Mars, selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Patimah, S.Kep.,Ns.,M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si., Selaku Ketua Jurusan Farmasi dan ibu Apt. Khaerani Muchtar, S.Farm., M.Farm.Klin., Selaku Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.Si selaku pembimbing I saya yang senantiasa memberikan arahan, bantuan, serta meluangkan waktu dan fikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Dr. Haeria., S.Si., M.Si selaku pembimbing II saya yang senantiasa memberikan arahan, bantuan, dan juga dengan senang hati

meluangkan waktu dan fikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Apt. Surya Ningsi. S.Si., M.Si selaku penguji kompetensi saya yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan arahnya dalam mengatasi kekurangan pada skripsi ini.

12. Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A selaku penguji integrasi keislaman saya yang telah memberikan saran dan arahnya terutama dalam bidang integrasi keislaman dalam skripsi ini.

13. Apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si selaku pembimbing akademik saya yang senantiasa membantu dan membimbing selama proses perkuliahan penulis.

14. Bapak dan ibu dosen, serta jajaran pegawai terkhusus program studi farmasi atas ilmu pengetahuan, saran, dan segala bantuan yang telah diberikan sejak penulis menempuh Pendidikan farmasi hingga saat ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam bidang Farmasi, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengujian antibakteri tanaman herbal dan dapat dijadikan referensi sebagai penelitian lanjutan. Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Gowa, 21 Agustus 2024
Penulis

Nurul Gufranah Ali

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Defenisi Operasional.....	3
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka.....	4
F. Tujuan Penelitian	10
G. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	11
A. Uraian Anak Dara (Croton oblongus Burm F.)	11
B. Uraian Bakteri	13
C. Kulit	14
D. Antibakteri.....	20
E. Pengujian aktivitas Antibakteri	23
F. Pengukuran Zona Hambat	28
G. Sterilisasi	29
H. Skrining Fitokimia	31

I. Ekstraksi	35
J. Pemisahan Senyawa	37
K. Tinjauan Islam	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Jenis penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel.....	45
E. Instrumen Penelitian.....	45
F. Teknik Pengelolaan Sampel	46
G. Skrining Fitokimia	47
H. Pengujian Aktivitas Antibakteri.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	72
BIOGRAFI PENULIS	86

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
Tabel 1. Hasil Ekstraksi Daun Anak Dara	53
Tabel 2. Hasil Uji Skrinning Fitokimia	53
Tabel 3. Hasil Partisi Ekstrak Daun Anak Dara	54
Table 4. Hasil Pengukuran Ekstrak Etanol.....	54
Table 5. Hasil Pengukuran Partisi n-heksan	55
Table 6. Hasil Pengukuran Partisi Etil Asetat	55
Table 7. Hasil Pengukuran Partisi Air	56
Table 8. Hasil Pengukuran Kontrol Positif dan Negatif	56
Table 9. Hasil Pengukuran Mc.Farland dan Suspensi Bakteri	56



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
Gambar 1. Daun Anak Dara.....	11
Gambar 2. Bakteri <i>Propionibacterium acnes</i>	13
Gambar 3. Rumus Zona Hambat	28
Gambar 4. Hasil Pengujian Ekstrak Etanol	54
Gambar 5. Hasil Pengujian Partisi n-heksan	54
Gambar 6. Hasil Pengujian Partisi Etil Asetat.....	55
Gambar 7. Hasil Pengujian Partisi Air.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
Lampiran 1. Skema Kerja Alur Penelitian	72
Lampiran 2. Skema Kerja Ekstraksi Daun Anak Dara	73
Lampiran 3. Skema Kerja Skrining Fitokimia	74
Lampiran 4. Skema Kerja Partisi Cair-Cair Ekstrak Daun Anak Dara.....	75
Lampiran 5. Skema Kerja Pembuatan Larutan Uji	76
Lampiran 6. Skema Kerja Pengujian Aktivitas Antibakteri	77
Lampiran 7. Perhitungan	78
Lampiran 8. Dokumentasi	79
Lampiran 9. Data ANOVA	83
Lampiran 10. Surat Izin Etik Penelitian	85

ABSTRAK

Nama : Nurul Gufranah Ali

NIM : 70100120074

Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak dan Partisi Daun Anak Dara
(*Croton oblongus* Burm F.) Terhadap *Propionibacterium acnes*

Tumbuhan anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) merupakan salah satu tanaman obat yang secara empiris dimanfaatkan untuk menangani berbagai masalah pada kulit termasuk diantaranya sebagai *antiacne*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya aktivitas dari ekstrak dan partisi daun anak dara terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* menggunakan metode difusi cakram. Penelitian ini menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%, dan partisi dengan menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat, dan air. Hasil yang didapatkan adalah pada konsentrasi 25 mg/mL ekstrak etanol, partisi n-heksan, dan etil asetat memiliki hambatan sebesar $12,11 \pm 0,40$ mm, $12,57 \pm 0,63$ mm dan $8,48 \pm 0,70$ mm. Pada konsentrasi 20 mg/mL, ekstrak etanol, partisi n-heksan, dan etil asetat memiliki hambatan sebesar $8,48 \pm 0,41$ mm, $8,37 \pm 1,02$ mm dan $6,75 \pm 1,10$ mm. Pada konsentrasi 15 mg/mL ekstrak etanol dan partisi n-heksan didapatkan zona hambat sebesar $6,38 \pm 1,45$ mm dan $5,58 \pm 0,39$ mm dan pada etil asetat sebesar $4,86 \pm 0,42$ mm. Sementara untuk hasil partisi air, pada konsentrasi tersebut tidak ditemukan adanya hambatan terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*. Rata-rata zona hambat yang dihasilkan kontrol positif yakni klindamisin 10% sebesar $17,25 \pm 1,94$ mm dan kontrol negatif sebesar 0 ± 0 mm. Ekstrak dan partisi daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) memiliki hambatan yang kuat yaitu pada konsentrasi 25 mg/mL pada ekstrak etanol dan partisi n-heksan dengan hambatan sebesar $12,11 \pm 0,40$ mm dan $12,57 \pm 0,63$. Pada hasil analisis data menggunakan *one-way* ANOVA tukey ($\text{sig} < 0.05$) didapatkan, konsentrasi 25 mg/mL pada partisi n-heksan tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap kontrol positif, sedangkan pada ekstrak etanol didapatkan adanya perbedaan signifikan terhadap kontrol positif.

Kata kunci: Antibakteri, *Propionibacterium acnes*, Difusi cakram.

ABSTRACT

Nama : Nurul Gufranah Ali

NIM : 70100120074

Title : *Antibacterial Activity Test of Anak Dara Leaf Extracts and Partitions (Croton oblongus Burm F.) Against Propionibacterium acnes*

The anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) is a medicinal plant that is empirically used to treat various skin problems, including as an anti-acne. The aim of this research was to determine the activity of dara leaf extract and partitions against *Propionibacterium acnes* bacteria using the disc diffusion method. This research uses a maceration method with 96% ethanol solvent, and partition using n-hexane, ethyl acetate and water. The results obtained were that at an ethanol extract concentration of 25 mg/mL, n-hexane and ethyl acetate partitions had resistances of 12.11 ± 0.40 mm, 12.57 ± 0.63 mm and 8.48 ± 0.70 mm. At a concentration of 20 mg/mL, ethanol extract, n-hexane partition, and ethyl acetate had a resistance of 8.48 ± 0.41 mm, 8.37 ± 1.02 mm and 6.75 ± 1.10 mm. At a concentration of 15 mg/mL of ethanol extract and n-hexane partition, the inhibition zone was obtained at 6.38 ± 1.45 mm and 5.58 ± 0.39 mm and for ethyl acetate it was 4.86 ± 0.42 mm. As for the water partition results, at this concentration no resistance was found against *Propionibacterium acnes* bacteria. The average zone of inhibition produced by the positive control, namely 10% clindamycin, was 17.25 ± 1.94 mm and the negative control was 0 ± 0 mm. anak dara leaf extract and partition (*Croton oblongus* Burm F.) had strong resistance at a concentration of 25 mg/mL to ethanol extract and n-hexane partition with resistance of 12.11 ± 0.40 mm and 12.57 ± 0.63 . In the results of data analysis using Tukey's one way ANOVA ($sig < 0.05$), it was found that the concentration of 25 mg/mL in the n-hexane partition did not have a significant difference compared to the positive control, whereas in the ethanol extract there was a significant difference compared to the positive control.

Keywords: *Antibacterial, Propionibacterium acnes, Disc Diffusion.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kulit merupakan organ terluar dan terbesar tubuh yang berfungsi sebagai pertahanan serta pelindung tubuh. Kulit seringkali mengalami berbagai masalah yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan luar, salah satu masalah kulit yang sering dijumpai yakni jerawat atau *acne vulgaris*. Jerawat adalah penyakit kulit yang timbul akibat peradangan pada folikel pilosebacea yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang ada di permukaan kulit. *Propionibacterium acnes* adalah salah satu kelompok mikroorganisme yang terletak di jaringan minyak. Bakteri ini dipengaruhi oleh komposisi lipid, pH, keringat, dan sekresi minyak (sebum) pada kulit (Hikmah et al., 2023).

Folikel pilosebacea yang tersumbat dapat ditandai dengan adanya jerawat, komedo, pustula, dan nodul pada tempat seperti (muka, leher, lengan atas, dada dan punggung atas) (Sa`adah dkk, 2020).

Berdasarkan penelitian di kawasan Asia Tenggara, terdapat 40-80% kasus mengenai *acne vulgaris*. Berdasarkan Kelompok Studi Dermatologi Kosmetika Indonesia PERDOSKI (2017) di Indonesia *acne vulgaris* menempati urutan ketiga penyakit terbanyak dari jumlah pengunjung Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin di rumah sakit maupun klinik kulit. Prevelansi tertinggi yaitu pada umur 14-17 tahun, dimana pada wanita berkisar 83-85% dan pada pria yaitu pada umur 16-19 tahun berkisar 95-100% (Yusuf et al., 2020).

Pengobatan yang umum digunakan masyarakat sebagai *antiacne* saat ini merupakan pengobatan antibiotik topikal dan oral. Peningkatan penggunaan obat jerawat ditemukan pada beberapa kasus adanya kejadian resistensi antibiotik pada pemakaian jangka panjang sehingga menurunkan khasiat obat (Madelina & Sulistiyaningsih, 2018).

Allah swt menciptakan berbagai macam makhluk hidup di bumi dan alam semesta pada dasarnya memiliki peran penting dalam kehidupan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah swt yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri, menyembah dan menjunjung tinggi perintah Allah swt. Tumbuhan diciptakan oleh Allah swt tidak lain memiliki keuntungan bagi manusia dan hewan baik itu sebagai sumber bahan pangan maupun kesehatan (obat). Sebagian besar obat-obatan yang ada saat ini diperoleh merupakan dari tumbuhan. Sebanyak 80% penduduk di bumi dalam menjaga kesehatannya sangat bergantung pada obat-obatan tradisional yang menggunakan bahan alami dari tumbuhan, hewan, dan mineral (Kemenag, 2011).

Salah satu tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tanaman obat dan sudah teruji empiris sebagai pengobatan adalah tumbuhan anak dara (*Croton oblongus* Burm F.). Secara empiris tanaman yang terdapat di daerah Sinjai ini, oleh masyarakat Dusun Bongkong Kabupaten Sinjai Tengah menggunakan anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) sebagai bedak dingin yang dipercaya memiliki khasiat mengencangkan kulit selain itu anak dara juga mengobati beberapa penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim, dan penghilang bau badan (Haeria et al., 2016).

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan pencarian antibakteri dari bahan alam yang diketahui aman dibandingkan dengan obat-obat berbahan kimia.

Dari hasil penelitian Mukhriani, dkk (2016), ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus* Burm f.) terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa mikroba patogen seperti *Escherchia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio colera*. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk meneliti aktivitas antibakteri pada daun anak dara (*Croton oblongus* Burm f.) terhadap bakteri penyebab jerawat yakni bakteri *Propionibacterium acnes*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak dan partisi daun anak dara (*Croton oblongus* Burm f.) terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*?
2. Berapa konsentrasi ekstrak dan partisi daun anak dara (*Croton oblongus* Burm f.) yang memberikan aktivitas penghambatan terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* yang kuat?

C. Defenisi Operasional

1. Antibakteri

Antibakteri adalah suatu bahan yang dapat mengganggu, membunuh dan menghambat aktivitas maupun pertumbuhan bakteri.

2. *Propionibacterium acnes*

Propionibacterium acnes adalah salah satu bakteri penyebab jerawat yang dapat mengakibatkan kulit iritasi sehingga terjadi pembengkakan.

3. Ekstrak

Ekstrak adalah suatu sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi simplisia daun anak dara menggunakan pelarut metanol 96% yang mengandung senyawa-senyawa kimia aktif.

4. Partisi

Partisi adalah metode pemisahan senyawa berdasarkan tingkat kepolaran pelarut.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah fitokimia dan mikrobiologi farmasi.

E. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian Dita pertiwi, dkk pada tahun 2023 yang berjudul "Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Metanol, Etil Asetat dan N-Heksan Rimpang Lengkuas Merah (*Alpinia purpurata*, K. Sehum) Terhadap Bakteri *Propionibacterium acnes*". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui konsentrasi aktivitas antibakteri paling aktif dari Fraksi Metanol, Etil Asetat dan N-Heksan Rimpang Lengkuas Merah (*Alpinia purpurata*, K. Sehum) terhadap pertumbuhan *Propionibacterium acnes* dengan menggunakan metode difusi cakram. Adapun konsentrasi yang digunakan adalah 5%, 10%, 15%, dan 20% dengan Kontrol positif yang digunakan adalah tetrasiklin dan kontrol negatif yaitu DMSO 10%. Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan fraksi metanol, etil asetat, dan n-heksana rimpang lengkuas merah (*Alpinia purpurata*, K. Sehum) mempunyai aktivitas antibakteri pada konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%. Konsentrasi

fraksi yang paling aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acnes* adalah fraksi metanol dengan konsentrasi 20% dengan rata-rata diameter zona hambat 24,33 mm selama masa inkubasi 24 jam. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak yang digunakan berpengaruh pada zona hambat yang terbentuk.

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang diatas, memiliki persamaan yakni pada tujuan penelitian, metode pengujian, kontrol negatif dan bakteri uji yang digunakan yakni bakteri *Propionibacterium acnes*. Terdapat pula perbedaan yakni pada konsentrasi pengujian antibakteri yang digunakan serta sampel yang digunakan, pada penelitian diatas menggunakan konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20% sedangkan yang akan peneliti gunakan adalah daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) menggunakan konsentrasi 15 mg/mL, 20 mg/mL dan 25 mg/mL.

2. Berdasarkan penelitian Neni Sri Gunarti pada tahun 2021 yang berjudul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Gedi (*Abelmoschus Manihot* L.) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui aktivitas ekstrak daun gedi (*Abelmoschus manihot* L.) terhadap bakteri penyebab jerawat (*Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus aureus*) dengan menggunakan pelarut yang berbeda tingkat kepolarannya. Pada penelitian ini menggunakan kontrol positif yaitu klindamisin dan kontrol negatif yaitu DMSO. Serta menggunakan etanol sebagai pelarut pengestraksi dengan metode maserasi. Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa perbedaan kepolaran tiga pelarut yaitu n-heksan, etil asetat, dan

etanol 96% memberikan aktivitas penghambatan yang berbeda pada bakteri *Propionibacterium acne*, dan *Staphylococcus aureus*. Dimana ekstrak etanol 96% dan ekstrak etil asetat menunjukkan daya hambat yang besar dibandingkan ekstrak n-heksan terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* dengan zona hambat sebesar $34,52 \pm 1,48$ mm, $30,38 \pm 0,93$ mm, dan $21,70 \pm 2,20$ mm. untuk bakteri *Staphylococcus aureus* ekstrak etanol 96% $30,58 \pm 1,96$ mm, ekstrak etil asetat $31,06 \pm 1,18$ mm, dan ekstrak n-heksan $23,81 \pm 6,14$ mm. Daya hambat dari masing-masing pelarut termasuk kedalam kategori sangat kuat.

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang diatas, memiliki persamaan yakni pada, metode ekstraksi kontrol positif dan negatif serta bakteri uji yang digunakan yakni bakteri *Propionibacterium acnes*. Terdapat pula perbedaan yakni pada sampel yang digunakan yaitu daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.).

3. Berdasarkan penelitian Rahmatiyah, dkk pada tahun 2023 yang berjudul "Uji Antibakteri Ekstrak Daun Sirih Hitam (*Piper betle L. var. Nigra*) Terhadap Bakteri *Propionibacterium acnes*". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui konsentrasi aktivitas antibakteri Ekstrak Daun Sirih Hitam (*Piper betle L. var. Nigra*) yang termasuk ke dalam kategori penghambatan kuat. Pada penelitian ini menggunakan etanol sebagai pelarut pengestraksi dengan metode maserasi. Serta untuk pengujian aktivitas antibakteri menggunakan konsentrasi 5%, 10%, 15% dan 20 % dengan kontrol positif yaitu klindamisin dan obat jerawat komersil dan kontrol negatif yaitu aquades. Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa ekstrak

daun sirih hitam memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* yang tergolong ke dalam kategori penghambatan kuat pada konsentrasi 5%, 10%, 15% dan 20 % dengan hasil secara berturut-turut yaitu 15,17 mm, 16,91 mm, 17,56 mm, dan 18,59 mm. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak yang digunakan berpengaruh pada zona hambat yang terbentuk.

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang diatas, memiliki persamaan yakni pada tujuan penelitian, metode ekstraksi, kontrol positif, kontrol negatif dan bakteri uji yang digunakan yakni bakteri *Propionibacterium acnes*. Terdapat pula perbedaan yakni pada konsentrasi pengujian antibakteri yang digunakan serta sampel yang digunakan, pada penelitian diatas menggunakan konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20% sedangkan yang akan peneliti gunakan adalah konsentrasi 15 mg/mL, 20 mg/mL dan 25 mg/mL.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widya Hana, dkk (2021). Dengan judul penelitian "Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Belimbing Botol (*Averrhoa bilimbi* L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Propionibacterium acne* Penyebab Jerawat". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui zona hambat yang dihasilkan ekstrak etanol daun belimbing botol pada konsentrasi 10%, 20%, 40% dan 60%. Pada penelitian ini digunakan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 95% sebagai metode ekstraksi dan pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan kontrol negatif akuades dan klindamisin sebagai kontrol positif. Didapatkan hasil Ekstrak etanol daun belimbing botol (*Averrhoa bilimbi* L.) memiliki aktivitas sebagai penghambat terhadap bakteri *propionibacterium acnes* penyebab

jerawat, dengan hasil zona hambat yang dikategorikan kuat 10%, 20%, 40% dan sangat kuat 60%.

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang diatas, memiliki persamaan yakni pada tujuan penelitian, metode ekstraksi, kontrol positif dan bakteri uji yang digunakan yakni bakteri *Propionibacterium acnes*. Terdapat pula perbedaan yakni pada konsentrasi pengujian antibakteri yang digunakan serta sampel yang digunakan, pada penelitian diatas menggunakan konsentrasi 10%, 20%, 40% dan 60% sedangkan yang akan peneliti gunakan adalah konsentrasi 15 mg/mL, 20 mg/mL dan 25 mg/mL.

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhriani, dkk (2016). Dengan judul penelitian Fraksinasi Senyawa Antimikroba Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui senyawa aktif yang berperan sebagai antimikroba pada Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.). Metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi menggunakan pelarut etanol 96% dan n-heksan. Pada penelitian ini pengujian aktivitas antibakteri ekstrak digunakan metode difusi cakram, dan diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol 96% memberikan hambatan yang paling aktif dari pertumbuhan bakteri *Escherchia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio colera*. Serta didapatkan pada uji efektivitas fraksi antibakteri paling besar yakni pada konsentrasi 1500 ppm pada bakteri *Escherchia coli*, 0,81cm, *Bacillus subtilis*, 0,90 cm, *Streptococcus mutans*, 0,75 cm, dan *Staphylococcus aureus* 0,74 cm dengan nilai Rf 0,81. Hasil diidentifikasi golongan senyawa aktif fraksi A mengandung senyawa flavonoid.

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang diatas, memiliki persamaan yakni pada tujuan penelitian, sampel yang digunakan dan metode pengujian yang digunakan. Terdapat pula perbedaan pada bakteri dan konsentrasi yang digunakan. Pada penelitian diatas menggunakan bakteri uji *Escherchia coli*, *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeroginosa*, *Vibrio colera*, *Salmonella thypi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Candida albicans*, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan bakteri *Propionibacterium acnes* dengan konsentrasi 15 mg/mL, 20 mg/mL dan 25 mg/mL.

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dyah ayu, dkk (2023). Dengan judul penelitian "Uji Antibakteri Fraksi n-Heksana, Etil Asetat, Dan Air Ekstrak Etanol Daun Jeruk Purut Terhadap *Propionibacterium acnes*". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui konsentrasi aktivitas antibakteri dan daya hambat ekstrak etanol daun jeruk purut dengan metode difusi cakram sebagai uji aktivitas antibakteri. Pada penelitian ini menggunakan metode ekstraksi maserasi dengan pelarut etanol 96% dan metode fraksinasi Kromatografi Cair Vakum (KCV). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa fraksi ekstrak etanol daun jeruk purut mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acnes* dengan hasil zona hambat rata-rata aktivitas antibakteri pada kontrol positif klindamisin 0,2% ($27,78 \pm 0,59$), kontrol negatif DMSO 10 % (0) mm, fraksi etil asetat 10 % ($18,8 \pm 0,15$) mm, n-Heksana 10 % ($11,93 \pm 0,33$) mm, dan fraksi air 10 % ($10,2 \pm 0,34$) mm.

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang diatas, memiliki persamaan yakni pada tujuan penelitian, bakteri uji, kontrol positif dan negatif serta metode pengujian antibakteri. Terdapat pula perbedaan yakni pada sampel yang digunakan.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aktivitas Antibakteri dari hasil partisi ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*.
2. Untuk mengetahui berapa kosentrasi ekstrak dan partisi daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang memberikan aktivitas penghambatan terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* yang kuat.

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah mengenai aktivitas Antibakteri daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acnes* sehingga penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk digunakan dalam kehidupan manusia.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)



Gambar 1. *Croton oblongus* Burm F. (Dokumentasi Pribadi)

1. Klasifikasi

Klasifikasi anak dara menurut (Caroline. R. & Tindale. M, 1993)

sebagai berikut:

Regnum : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Class : Dicotyledonae

Sub class : Sympetalae

Ordo : Euphorbiales

Family : Euphorbiaceae

Genus : *Croton*

Spesies : *Croton oblongus* Burm F.

2. Morfologi

Tanaman anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) merupakan tanaman yang tumbuh dengan tinggi sekitar 2-3 m. Batangnya tegak, bulat, berbulu, berwarna hijau. Memiliki jenis daun tunggal yang berselang-seling, bentuknya

agak lonjong, dan ujungnya lancip. Daunnya berukuran panjang sekitar 3-5 sentimeter dan lebar 1-4 sentimeter. Batang daun berbentuk menyirip, silindris, dan berwarna hijau. Bunganya merupakan tumbuhan komposit dengan mahkota berbentuk corong, benang sari banyak, dan bentuk seperti paku di ujung tangkai dengan kelopak membulat. Tanaman ini menghasilkan buah berbentuk bulat berwarna hijau dengan diameter kira-kira 0,5 cm. (Dalimartha, 2006).

3. Kegunaan

Tanaman anak dara secara empiris digunakan sebagai masker wajah, bedak dingin, yang dinilai dapat mengencangkan kulit. Anak dara juga mengobati beberapa penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim, dan penghilang bau badan (Haeria et al., 2016).


4. Habitat

Tanaman ini dapat ditemukan tumbuh di berbagai lokasi, termasuk hutan dan rawa setinggi 700 m terutama di lereng gunung, tanah endapan, tanah berpasir, namun bisa juga ditemukan di tanah berkapur dan tanah liat (Awainah, 2016).

5. Nama Daerah

Simalakian (Sumatera Barat), Ceraken (Jawa), Roengkok (Sumatera Utara), Semoeki (Ternate), dan Kowe (Tidore), Sinjai (Anak Dara) (Dalimartha, 2006).

B. Uraian Bakteri



Gambar 2. (*Propionibacterium acnes*)(Zahrah et al., 2018)

1. Klasifikasi

Menurut (Irianto, 2006) tanaman anak dara diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria
 Divisi : Actinobacteria
 Class : Actinobacteridae
 Ordo : Actinomycetales
 Family : Propionibacteriaceae
 Genus : *Propionibacterium*
 Species : *Propionibacterium acnes*

2. Morfologi

Propionibacterium acne termasuk bakteri gram positif, berbentuk batang, anaerobik dan non-sporulasi. Beberapa strain dan varietas *Propionibacterium acnes* bersifat aerotoleran, namun bakteri ini juga menunjukkan pertumbuhan anaerobik yang unggul. *Propionibacterium acnes* merupakan bakteri anaerob yang toleran terhadap udara dan dapat menghasilkan asam propionate (Irianto, 2006)

Lipase adalah sejenis enzim yang diproduksi oleh *Proteobacterium acnes* yang berperan penting dalam berkembangnya jerawat. Lipase

bertanggung jawab atas pemecahan asam lemak bebas di kulit. Asam lemak bebas terbentuk dari lipid yang diproduksi oleh kulit. Asam lemak ini menyebabkan peradangan pada jaringan kulit (Rahmatiyah et al., 2023).

C. Kulit

1. Pengertian Kulit

Kulit merupakan organ tubuh terbesar dan memiliki lapisan jaringan di permukaannya yang bertugas untuk mengontrol suhu tubuh. Kulit juga merupakan sistem eliminasi dan detoksifikasi yang menghilangkan racun dari tubuh melalui kelenjar keringat yang terletak di bawah kulit. Fungsi kelenjar ini dikendalikan oleh kelenjar hipotalamus di otak, yang memiliki sistem kerja yang sangat bergantung pada keadaan emosi dan intensitas aktivitas fisik (Mardjan & Abrori, 2016).

Kulit terdiri dari sel dan struktur khusus yang membentuk 15% dari total berat badan orang dewasa. Kulit memiliki banyak fungsi penting, seperti melindungi tubuh dari ancaman fisik, kimia, dan biologis eksternal, membatasi kehilangan air secara berlebihan, dan berperan penting dalam termoregulasi. Kulit menyambung dengan membran mukosa yang melapisi permukaan tubuh (Peate & Nair, 2018).

Ketebalan lapisan kulit berbeda-beda menurut lokasinya di tubuh. Lapisan epidermis pada kelopak mata paling tipis, berukuran kurang dari 0,1 mm, sedangkan lapisan epidermis pada telapak tangan dan telapak kaki paling tebal, berukuran sekitar 1,5 mm. Daerah yang paling tebal adalah dermis bagian belakang, yang kira-kira 30-40 kali lebih tebal dibandingkan epidermis di atasnya (Peate & Nair, 2018).

Kulit diperbarui secara konstan. Berhubungan dengan organ-organ lain pada tubuh, kulit dapat menunjukkan berbagai disfungsi atau patologis (Irianto, 2006).

Kulit manusia adalah organ yang kompleks dan serbaguna yang sering dikaitkan dengan kecantikan dan estetika. Namun, perannya lebih dari sekadar daya tarik visual. Sifat fisiologis kulit memungkinkannya melakukan berbagai fungsi. Fungsi utama kulit adalah sebagai pelindung terhadap ancaman eksternal seperti patogen, bahan kimia, fluktuasi suhu, sinar ultraviolet, dan trauma fisik (Zulaika Harissya et al., 2023).

2. Fungsi Kulit

Kulit memiliki peranan yang cukup besar pada tubuh, adapun fungsi kulit ini meliputi:

a. Sebagai Pelindung

Adanya gesekan dan tekanan pada kulit akan memicu respons seluler pada epidermis dan dermis, dan menyebabkan penebalan kulit, terutama pada area yang sering mengalami gesekan maupun tekanan seperti telapak tangan dan telapak kaki. Hal ini menyebabkan penebalan epidermis karena pelepasan growth factor, seperti TGF- β (*Transforming Growth Factor Beta*) dan EGF (*Epidermal Growth Factor*) (Zulaika Harissya et al., 2023).

Selain itu, didalam kulit terdapat peptida molekuler kecil yang diproduksi oleh keratinosit yang memiliki peran penting dalam kekebalan bawaan inang terhadap berbagai mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, parasit, dan virus. Peptide molekuler kecil ini biasa disebut dengan *Antimicrobial Peptide* (AMP) (Zhang et al., 2021).

Menurut (Zulaika Harissya et al., 2023) terdapat beberapa jenis AMP pada kulit, antara lain :

1) Cathelicidin

Cathelicidin menyimpan AMP sebagai prekursor tidak aktif dan diaktifkan sebagai respons terhadap infeksi atau peradangan.

2) Defensin

Defensin memiliki sub tipe alfa dan beta, membantu membuat lubang pada membran sel mikroba, sehingga mengganggu integritasnya.

3) Histatin

Histatin adalah salah satu antimikroba peptida yang ada pada kulit dan bersifat anti jamur. Histatin juga dapat ditemukan pada air liur.

b. Termoregulasi

Termoregulasi adalah proses fisiologis dalam memelihara suhu tubuh internal agar selalu stabil. Kulit mengatur aliran darah melalui proses vasodilatasi dan vasokonstriksi. Pelepasan panas terjadi ketika, pembuluh darah di kulit melebar, dan menyebabkan volume darah mengalir ke permukaan tubuh. Sebaliknya pada kondisi dingin, pembuluh darah akan menyempit dan aliran darah ke permukaan kulit akan berkurang sehingga pelepasan panas tidak terjadi. Selain itu tubuh juga dapat mengatur suhu dengan pengendalian keringat. Saat suhu tubuh meningkat, saraf akan memicu aktivasi kelenjar keringat sehingga cairan keringat menyerap panas dan suhu tubuh akan menurun (Zulaika Harissya et al., 2023).

c. Fungsi Lain

Kulit juga berfungsi sebagai, pelindung terhadap sinar ultraviolet, alat identifikasi, sintesis vitamin D, Pencegah evaporasi (Zulaika Harissya et al., 2023)

3. Anatomi Kulit

a. Epidermis

Lapisan kulit yang lebih tipis dan dangkal, yang dikenal sebagai epidermis, terdiri dari empat jenis sel berbeda. Jenis sel kulit yang paling umum disebut keratinosit; menghasilkan protein keratin berserat, yang membantu melindungi epidermis. Keratin memberi kekuatan pada kuku, rambut, dan kulit (Peate & Nair, 2018).

Karena epidermis adalah jaringan epitel, ia tidak memiliki pembuluh darah. Pertukaran gas, suplai nutrisi, dan pembuangan limbah seluler terjadi melalui difusi dari pembuluh darah di dermis (Zulaika Harissya et al., 2023).

Terdapat lima sub-lapisan epidermis yang terpisah:

1) Stratum Korneum

Lapisan ini terdiri dari keratinosit mati yang tidak memiliki inti dan organel sel lainnya. Sel-sel mati ini menumpuk, meninggalkan filamen keratin yang bergabung membentuk lapisan bahan mirip tanduk. Seiring waktu, lapisan ini mungkin terkelupas (Zulaika Harissya et al., 2023). Lapisan terluar yang pipih dan mengandung 25-30 lapisan keratinosit mati (Peate & Nair, 2018).

2) Stratum Lucidum

Lapisan ini terdiri dari keratinosit yang memulai program apoptosis (kematian sel). Keratinosit ini mengandung banyak butiran keratohialin, yang dilepaskan ke ruang ekstraseluler (area antar sel) melalui eksositosis, sehingga menghasilkan lembaran kedap air. Proses ini mencegah cairan ekstraseluler bergerak naik dari kapiler di dermis, menyebabkan dehidrasi dan kekurangan nutrisi pada sel-sel di atasnya. Lapisan ini khusus terdapat

pada kulit yang tebal (Zulaika Harissya et al., 2023). Terdapat pada ujung jari, telapak tangan, dan telapak kaki. (Peate & Nair, 2018).

3) Stratum Granulosum

Lapisan ini merupakan tempat terbentuknya keratin yang terdiri dari tiga hingga lima lapisan keratinosit, lapisan ini tampak granular karena adanya keratohyalin (Peate & Nair, 2018).

4) Stratum Spinosum

stratum spinosum merupakan lapisan keratinosit dengan banyak sambungan antar sel tipe desmosom yang kuat. Desmosom adalah ikatan khusus yang menghubungkan sel-sel yang berdekatan dari dinding sampai ke sitoplasmanya oleh *intermediate filament*, sehingga sel tidak terlepas dan membantu mencegah terjadinya robekan jaringan (Zulaika Harissya et al., 2023). Lapisan epidermis yang memproduksi keratin yang juga merupakan pembentuk sel kulit, rambut dan kuku. (Peate & Nair, 2018).

5) Stratum Basale

Lapisan ini tersusun dari satu lapis sel kuboid atau kolumnar, yang juga merupakan lapisan terdalam pada lapisan kulit epidermis (Peate & Nair, 2018). Selain keratinosit, lapisan ini juga mengandung sel Merkel dan melanosit (Zulaika Harissya et al., 2023).

b. Dermis

Dermis merupakan lapisan jaringan ikat, yang terletak tepat di bawah membran basal. Dermis adalah suatu sistem dari fibrosa, filamen, dan jaringan ikat yang akan menampung masuknya stimulus yang diinduksi oleh saraf dan jaringan vaskular, dan pelengkap yang berasal dari epidermis (Sanjaya et al., 2023). Dermis mengandung berbagai sel, termasuk fibroblas, limfosit, dan sel mast. Bagian dermis yang memanjang ke arah epidermis disebut papila dermal

(atau dermal ridges), sedangkan bagian epidermis yang menonjol ke arah dermis disebut rete ridges (Zulaika Harissya et al., 2023). Dermis terdiri atas dua lapisan yaitu lapisan papilar dermis dan lapisan retikular dermis.

1. Lapisan Papilar

Lapisan ini adalah lapisan permukaan dermis yang tipis dan langsung berhubungan dengan membrana basalis epidermis. Jenis jaringannya adalah jaringan ikat longka, jaringan ini banyak dilalui oleh kapiler darah yang menyediakan pertukaran zat bagi epidermis dan memberikan rona kemerahan pada kulit. Kapiler ini membentuk jalinan yang disebut pleksus subpapilaris (Zulaika Harissya et al., 2023).

2. Lapisan Retikularis

Lapisan ini merupakan lapisan dermis, terletak di bawah lapisan papiler, dan kaya akan pembuluh darah. Jaringan pembuluh darah di dalam lapisan ini disebut sebagai pleksus subdermal (Zulaika Harissya et al., 2023).

Lapisan terbesar dari dermis yang dibentuk oleh jaringan ikat, yang mana pada lapisan ini ditemukan folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebacea, muskulus arektor pili dan beberapa reseptor sensoris kulit (Gina Inggriyani, 2022).

c. Jaringan Subkutan

Jaringan subkutan merupakan yang terdiri dari jaringan ikat dan jaringan adiposa. Lemak dalam lapisan subkutan memberikan perlindungan terhadap organ-organ dan tulang yang membantu mempertahankan suhu tubuh, bekerja dengan pembuluh darah untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal dan konsisten. Namun seiring penuaan, jaringan subkutan akan mulai menipis (Peate & Nair, 2018).

4. Penyakit dan Kelainan pada Kulit

Penyakit kulit adalah penyakit yang terjadi pada bagian luar tubuh dengan gejala umum berupa gatal, nyeri, mati rasa dan kemerahan. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh bahan kimia, sinar matahari, virus, imun tubuh yang lemah, mikroorganisme, mikroba, jamur, dan faktor personal *hygiene*. Masalah kulit yang paling sering ditemui saat ini adalah kulit kering, kulit kasar, tangan, kaki, wajah, jerawat, ruam, dermatitis kontak atau iritasi kulit, kehilangan lapisan epidermis (Irjayanti et al., 2023).

Jerawat atau *acne vulgaris* merupakan timbunan kelenjar minyak pada kulit yang terlalu aktif yang tersumbat oleh kotoran dan terjadi infeksi karena adanya bakteri. Mekanisme pembentukan *acne vulgaris*, yaitu stimulasi pada kelenjar sebacea yang menyebabkan sebum berlebih, pembentukan jerawat terkait dengan proliferasi keratinosit yang abnormal, adhesi dan diferensiasi cabang bawah folikel-folikel. Pembentukan lesi inflamasi disebabkan oleh bakteri anaerob yaitu *Propionibacterium acnes* (Sifatullah, 2021).

Sumbatan saluran kelenjar minyak dapat terjadi diantaranya karena perubahan jumlah dan konsistensi lemak kelenjar akibat pengaruh berbagai faktor, antara lain genetik, endokrin, faktor makanan, keaktifan dari kelenjar sebacea, faktor psikis, musim, infeksi bakteri (*Propionibacterium acnes*), kosmetika dan bahan kimia lainnya (Yusuf et al., 2020).

D. Antibakteri

1. Pengertian

Bakteri adalah mikroorganisme prokariotik yang sangat kecil dan dapat ditemukan di hampir semua lingkungan, termasuk tanah, air, dan di dalam tubuh makhluk hidup. Bakteri merupakan mikroorganisme bersel tunggal dengan struktur sederhana, tidak memiliki membran inti sel, dan berukuran

mikroskopis. Pengelompokan bakteri dapat dilakukan berdasarkan beberapa dasar, termasuk bentuk sel, jumlah dan posisi flagel, kebutuhan oksigen, karakteristik dinding sel, serta cara memperoleh makanan (Artati dan Moh Oman, 2019).

Bakteri memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil. Bakteri dapat mereka dapat ditemukan di berbagai lingkungan ekstrem, seperti gurun, salju, es, dan lautan. Penyebaran yang luas ini menjadikan bakteri sebagai salah satu penyebab utama penyakit pada manusia (Ni Wayan Desi Bintari et al., 2023)

Untuk menangani masalah yang disebabkan oleh bakteri, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penggunaan antibakteri. Antibakteri adalah zat atau senyawa yang memiliki kemampuan untuk menghentikan atau membunuh pertumbuhan bakteri. Senyawa antibakteri dapat berasal dari berbagai sumber, baik alami maupun sintetis, termasuk tanaman, mikroorganisme, dan proses sintesis kimiawi (Asril et al., 2024).

2. Sifat Antibakteri

Berdasarkan cara kerjanya, antibakteri diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni bakteristatik, yang bekerja dengan menghentikan pertumbuhan bakteri, dan bakterisida dengan membunuh bakteri (Rollando, 2019).

a. Bakterisidal

Antibakteri yang tergolong bakterisidal merupakan antibakteri yang secara aktif membunuh bakteri (Rahmawati, 2021).

b. Bakteristatik

Antibakteri yang tergolong bakteristatik merupakan golongan antibakteri yang bekerja dengan mencegah atau menghambat pertumbuhan bakteri (Rahmawati, 2021).

3. Mekanisme Kerja Antibakteri

a. Perusakan Dinding Sel

Salah satu mekanisme kerja dari antibakteri adalah merusak dinding sel dengan cara menghalangi sintesis atau menginaktivasi suatu enzim sehingga terjadi viabilitas dan menyebabkan lisis (Rahmawati, 2021).

Peptidoglikan merupakan komponen penting dinding sel yang dimiliki bakteri. Peptidoglikan terdiri atas residu asam N-asetilmuramat dan N-asetilglukosamin. Oleh karena itu, salah satu metode yang paling efektif untuk menghentikan pertumbuhan bakteri adalah dengan menghentikan sintesis dinding selnya; ini terutama terjadi dengan menghentikan pembentukan lapisan peptidoglikan pada dinding sel bakteri (Asril et al., 2024).

b. Perubahan Permeabilitas Sel

Mekanisme ini merupakan adanya kerusakan yang terjadi pada membran sitoplasma sehingga mengakibatkan penghambatan pertumbuhan sel, ini dikarenakan membran sitoplasma berfungsi mempertahankan bagian-bagian tertentu dalam sel serta mengatur aktivitas difusi bahan-bahan penting, dan membentuk integritas komponen seluler (Rollando, 2019). Membran sitoplasma mengeluarkan ion dan makromolekul setiap kali fungsinya terganggu, menyebabkan kerusakan atau kematian sel (Asril et al., 2024).

c. Penghambatan Kerja Enzim

Adanya penghambatan enzim ini akan menyebabkan aktivitas seluler tidak berjalan normal. Seperti sulfonamid yang bekerja dengan bersaing dengan PABA, sehingga dapat menghalangi sintesis asam folat yang merupakan asam amino esensial yang berfungsi dalam sintesis purin dan pirimidin (Rollando, 2019).

d. Penghambatan Sintesis Asam Nukleat dan Protein

Secara mekanis, inhibitor sintesis protein bekerja dengan mengganggu berbagai tahap dalam proses sintesis protein, termasuk tahap inisiasi dan pemanjangan. Ini mencakup proses seperti masuknya aminoasil tRNA, proofreading, transfer peptidil, translokasi, dan terminasi yang terjadi di ribosom (Asril et al., 2024).

DNA dan RNA yang mempunyai peran yang sangat penting sebagai bahan baku pembentukan sel bakteri. Dengan adanya penghambatan DNA dan RNA akan mengakibatkan kerusakan pada sel (Rollando, 2019). Proses transkripsi bakteri akan dihambat oleh penghambat RNA yang mana RNA yang dibuat dari materi genetik diubah menjadi protein. Sintesis DNA melibatkan tahap inisiasi, pemanjangan, dan terminasi, seperti proses polimerisasi biologis lainnya. Oleh karena itu, antimikroba ditargetkan pada tahap ini untuk mencegah pembentukan DNA (Asril et al., 2024).

E. Pengujian Aktivitas Antibakteri

1. Metode Difusi

Metode ini merupakan suatu metode untuk menguji kerentanan pertumbuhan bakteri terhadap senyawa antibakteri dalam ekstrak dengan cara mengukur respons penghambatan berdasarkan diameter zona bening (clear zone) (Rahmawati, 2021).

Teknik ini dipengaruhi oleh sejumlah variabel fisik dan kimia, serta variabel yang berkaitan dengan obat dan organisme (misalnya stabilitas obat, ukuran molekul, dan sifat medium serta kemampuan difusi). Namun, standarisasi variabel-variabel ini memungkinkan dilakukannya pengujian sensitivitas yang akurat (Jawetz et al., 2015).

a. Difusi Cakram Kertas

Metode ini dilakukan dengan membiarkan senyawa antibakteri terdifusi media agar dengan menginokulasikan pelat agar dengan biakan. Keefektifan antibakteri ditandai dengan adanya zona hambat yang terbentuk (Rahmawati, 2021).

Kelebihan dari metode ini adalah kemampuannya untuk menguji banyak sampel secara serentak dalam jumlah besar, serta tidak memerlukan banyak tenaga. Ini berarti variasi dalam konsentrasi yang digunakan dapat lebih mudah dilakukan dalam waktu pengujian yang singkat, jika dibandingkan dengan metode dilusi (Sari et al., 2022).

Selain itu keunggulan metode difusi adalah kemudahannya dalam pelaksanaan karena tidak memerlukan peralatan khusus, serta fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih agen antimikroba yang akan diuji (Yolla Arinda et al., 2019).

b. Silinder Plat

Metode ini merupakan metode difusi yang menggunakan alat berupa silinder kawat, dimana mikroba secara merata akan diletakkan pada permukaan media lalu diletakkan pencandang silinder. Bahan uji dimasukkan pada masing-masing silinder, termasuk kontrol positif dan kontrol negatif. Selanjutnya merupakan proses inkubasi pada suhu tertentu lalu kemudian zona hambat dapat diukur (Rahmawati, 2021).

c. Sumuran

Metode sumuran merupakan metode dengan membuat suatu lubang pada agar padat yang sebelumnya telah di inokulasi dengan bakteri. Yang mana pada lubang tersebut nantinya akan diisi zat antibakteri uji, lalu di inkubasi

pada suhu dan waktu tertentu kemudian dilakukan pengamatan mengenai zona hambat yang timbul (Rahmawati, 2021).

Metode pengujian aktivitas antimikroba dengan metode sumuran dimulai dengan pembuatan media dan suspensi bakteri. Penting untuk memastikan bahwa media agar telah memadat sepenuhnya sebelum membuat lubang. Lubang sumuran dibuat menggunakan alat cork borer pada media agar harus memiliki diameter yang seragam, biasanya 6 mm (Asril et al., 2024).

2. Metode Dilusi

Metode ini merupakan metode pengujian daya antibakteri untuk menentukan aktivitas antimikroba secara kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi hambat minimum dan konsentrasi bunuh minimum. Metode ini dilakukan pada media cair setelah diberi zat antimikroba atau pada media padat yang dicairkan setelah dicampur dengan zat antimikroba. Konsentrasi terendah yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme dinamakan KHM (Konsentrasi Hambat Minimum). Konsentrasi terendah antimikroba dapat membunuh 99,9% bakteri dinamakan KBM (Konsentrasi Bunuh Minimum) (Rahmawati, 2021).

Uji ini berguna untuk menguji isolat infeksi serius seperti endokarditis bakteri atau untuk memastikan hasil yang tidak jelas. Untuk menguji sensitivitas bakteri dengan metode dilusi, antibiotik diencerkan secara serial dalam agar-agar dan kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri. Dalam metode ini, pengenceran dibuat dalam volume air yang kecil dan ditambahkan ke agar-agar yang telah dicairkan dan didinginkan hingga tidak lebih dari 60°C. Metode ini memungkinkan untuk menguji jumlah bakteri dalam setiap cawan yang mengandung larutan antibiotik (Ni Wayan Desi Bintari et al., 2023).

a. Dilusi Perbenihan Cair

Dilusi perbenihan cair terbagi menjadi dua jenis yaitu makroodilusi dan mikrodilusi, kedua jenis perbenihan cair ini dibedakan pada jumlah volume yang digunakan. Untuk makrodilusi volume yang digunakan yakni 1 mL, sedangkan dalam mikrodilusi volume yang digunakan adalah 0,5 mL. Konsentrasi terendah yang menunjukkan adanya hambatan pertumbuhan bakteri disebut dengan KHM (Rahmawati, 2021).

b. Dilusi Agar

Metode pengujian ini dilakukan dengan penambahan antibakteri kedalam agar sesuai dengan pengenceran. Dilusi agar terbagi menjadi dua yaitu,

1) Metode Dilusi Cair

Metode ini umumnya digunakan untuk memperhitungkan nilai Konsentrasi Hambat Minimal (KHM). Metode dilusi cair dilakukan dengan membuat berbagai tingkat pengenceran dari agen antimikroba dalam medium cair yang sudah ditanami dengan mikroba uji (Yolla Arinda et al., 2019).

Metode ini dikenal dengan metode pengenceran tabung, yang menguji sensitivitas antibiotik dalam larutan cair, melibatkan pengujian kuantitatif terhadap konsentrasi penghambatan minimum (KHM) antibiotik terhadap bakteri yang akan diuji. Dalam metode ini, antibiotik diencerkan secara bertahap dalam tabung reaksi, dan suspensi bakteri ditambahkan. Konsentrasi antibiotik terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri diamati untuk menentukan KHM setelah diinkubasi semalaman (Ni Wayan Desi Bintari et al., 2023).

Pengenceran tertinggi yang menghambat pertumbuhan (KHM) dinilai berdasarkan tidak adanya kekeruhan di dalam tabung. Keuntungan utama dari

teknik pengenceran kaldu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi KHM, yang juga dapat dengan mudah dikonversi untuk menentukan konsentrasi KBM. Pengenceran tertinggi menunjukkan bahwa KBM setidaknya menghambat 99% pertumbuhan bakteri. Tabung yang tidak menunjukkan pertumbuhan pada subkultur media padat diinkubasi semalam pada suhu 37°C (Ni Wayan Desi Bintari et al., 2023).

2) Metode Dilusi Padat

Metode dilusi padat merupakan metode yang dilakukan dengan menanam mikroba uji pada media agar yang sudah dicampur dengan agen antimikroba untuk mengetahui Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) (Yolla Arinda et al., 2019). Adapun keuntungan metode ini adalah beberapa mikroba uji dapat diuji dengan menggunakan satu titik konsentrasi (Sari et al., 2022b).

Metode dilusi padat dilakukan dengan mengencerkan ekstrak antibakteri pada berbagai konsentrasi dan mencampurkannya dengan media agar. Setelah itu, campuran tersebut ditanami dengan bakteri dan diinkubasi. Dalam metode ini, ada atau tidaknya pertumbuhan bakteri, serta tingkat kesuburannya dengan cara menghitung jumlah koloni yang terbentuk adalah hal yang perlu diamati (Asril et al., 2024).

c. *E-test*


Berbeda dengan metode lain untuk mengukur KHM isolat bakteri, *e-test* adalah metode yang sangat mudah untuk menentukan KHM isolat bakteri, mirip dengan dilusi cair menggunakan agar. Setelah inkubasi, strip membentuk zona elips penghambatan pertumbuhan. KHM dibaca dari skala di tepi area, dan hasilnya sangat mudah untuk ditafsirkan. Memungkinkan antibiotik berdifusi ke dalam media saat strip ditempatkan di atasnya (Ni Wayan Desi Bintari et al., 2023).

Strip plastik berukuran 5 x 50 mm yang digunakan sebagai pembawa antibiotik memiliki gradien antibiotik kontinu yang diimobilisasi pada satu sisi, dengan skala interpretatif MIC yang sesuai dengan pengenceran MIC dua kali lipat pada sisi lainnya. Gradien antibiotik ini diimobilisasi pada permukaan yang berlawanan dengan skala MIC saat ditempatkan di atas agar. Hal ini memastikan bahwa antibiotik tetap stabil selama periode tertentu, yang mencakup waktu kritis bagi sebagian besar mikroorganisme yang diuji sensitivitasnya (Ni Wayan Desi Bintari et al., 2023).

F. Pengukuran Zona Hambat

Zona hambat merupakan daerah bening di sekitar cakram (di mana tidak terjadi pertumbuhan bakteri). Pengamatan terhadap media dilakukan setelah masa inkubasi 24 jam. Zona hambatan diukur dengan memperkirakan diameter vertikal dan horizontal dalam milimeter (mm) menggunakan jangka sorong (Toy et al., 2015).

Diameter zona hambat dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :



Gambar 3. Rumus Zona Hambat (Rahmah et al., 2024)

Menurut David dan Stout (1971) kekuatan daya antibakteri berdasarkan diameter zona hambat dibagi menjadi empat kategori yaitu sangat kuat (zona hambat lebih dari 20 mm), kuat (zona hambat 10-20 mm),

sedang (zona hambat 5-10 mm) dan lemah (zona hambat kurang dari 5 mm) (Nabila & Bhakti Purnamasari, 2021).

G. Sterilisasi

1. Sterilisasi Peralatan

Sterilisasi adalah proses yang dirancang untuk menghilangkan atau menghancurkan mikroorganisme (seperti protozoa, jamur, bakteri, mikoplasma, dan virus) pada benda atau peralatan. Proses ini memastikan peralatan laboratorium tetap bersih dan steril, sehingga mencegah kontaminasi (Istini, 2020).

a. Sterilisasi Basah

Proses sterilisasi menggunakan autoklaf biasanya dilakukan pada suhu tinggi dalam jangka waktu singkat, sehingga lebih efektif dibandingkan menggunakan suhu rendah dalam jangka waktu lama. Kondisi standar yang umum mencakup 115°C pada 10 psi, 121°C pada 15 psi, dan 132°C pada 27 psi (psi = pon per inci persegi). Namun, kondisi yang paling umum digunakan adalah 121°C pada 15 psi. Durasi yang biasa untuk metode sterilisasi basah ini adalah 10 hingga 15 menit. Pendekatan ini sangat efektif untuk membunuh bakteri dan spora jamur. Penting untuk diperhatikan bahwa waktu sterilisasi harus diukur setelah autoklaf mencapai kondisi standar 121°C dan 15 psi (Wulandari et al., 2021).

b. Sterilisasi Kering

Oven Pengeringan Laboratorium adalah peralatan yang digunakan untuk sterilisasi kering. Cara ini memerlukan waktu pemaparan yang lebih lama dan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode sterilisasi basah. Oven beroperasi dengan konduksi panas, pertama-tama memanaskan permukaan luar peralatan dan kemudian memindahkan panas ke dalam.

Teknik ini melibatkan suhu sangat tinggi yang dipertahankan selama beberapa jam untuk membunuh atau menghilangkan kontaminan secara efektif, seperti spora jamur dan bakteri, dari kultur jaringan (Ikenganyia et al., 2017).

Sterilisasi kering biasanya digunakan untuk peralatan laboratorium yang tidak akan meleleh, terbakar, atau berubah bentuk jika terkena suhu tinggi seperti Peralatan yang terbuat dari kaca meliputi barang-barang seperti cawan petri, pipet, tabung reaksi, dan botol kultur. Peralatan yang terbuat dari logam antara lain pisau bedah, gunting, pinset, bilah (pisau), dan spatula (Ikenganyia et al., 2017).

c. Sterilisasi Menggunakan Api

Sterilisasi peralatan logam, seperti pinset dan pisau bedah, biasanya dilakukan di dalam lemari Laminar Air Flow (LAF) menggunakan api bunsen. Sebelum dipanaskan dengan api bunsen, peralatan terlebih dahulu dicelupkan ke dalam etanol 70%. Tingkat penguapan dan sifat mudah terbakar etanol yang tinggi membuat proses ini melibatkan pembakaran, sehingga memerlukan perhatian yang cermat terhadap langkah-langkah keselamatan untuk meminimalkan risiko (Wulandari et al., 2021).

d. Sterilisasi Menggunakan Glass Bead Sterilizie

Peralatan logam juga dapat disterilkan menggunakan alat sterilisasi manik kaca. Perangkat ini beroperasi pada suhu antara 275°C dan 350°C, efektif membunuh spora jamur dan bakteri di permukaan peralatan. Untuk menggunakan metode ini, cukup masukkan peralatan ke dalam manik-manik kaca yang dipanaskan selama 10 hingga 60 detik. Pastikan peralatan dibiarkan dingin sebelum digunakan (Wulandari et al., 2021).

2. Sterilisasi Media

Media kultur jaringan harus disterilkan dengan baik karena selain mendukung pertumbuhan dan perkembangan eksplan, media juga dapat menjadi sumber kontaminasi. Dua metode yang umum digunakan untuk mensterilkan media kultur adalah autoklaf dan filtrasi membran.

a. Autoklaf

Autoklaf melibatkan penerapan tekanan 15 psi dan suhu 121°C. Untuk cairan dengan volume 1000 ml atau kurang, waktu autoklaf yang diperlukan adalah 15 hingga 20 menit. Untuk volume yang lebih besar, misalnya 2 hingga 4 liter, prosesnya memerlukan waktu 30 hingga 40 menit, dimulai sejak autoklaf mencapai suhu dan tekanan yang ditentukan (Wulandari et al., 2021).

b. Filtrasi Membran

Sterilisasi dengan menggunakan filter merupakan salah satu metode alternatif yang dapat dipilih karena banyak protein, vitamin, asam amino, ekstrak tumbuhan, hormon, dan karbohidrat yang mudah rusak atau tidak aktif oleh panas. Filter membran yang digunakan untuk metode ini tidak boleh melebihi 0,2 mikron (μm) (Wulandari et al., 2021).

H. Skrining Fitokimia

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu bahan alam mengandung senyawa metabolit sekunder adalah dengan melakukan skrining fitokimia. Skrining fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diteliti. Metode skrining fitokimia secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu pereaksi tertentu. Pemilihan pelarut dan metode ekstraksi sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan, pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang

diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan sempurna (Vifta & Advistasari, 2018).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kandungan senyawa dalam suatu tumbuhan yakni, letak geografis, suhu, iklim dan kesuburan tanah suatu wilayah. Adapun bagian dari tumbuhan yang digunakan sebagai sampel dalam uji fitokimia dapat berupa daun, batang, buah, bunga dan akarnya yang memiliki efek teraupetik dan digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan obat modern maupun obat-obatan tradisional (Muthmainnah, 2019).

1. Alkaloid

Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung atom nitrogen dan terdapat pada jaringan tumbuhan dan hewan. Sebagian besar senyawa alkaloid berasal dari tumbuhan, khususnya angiospermae. Alkaloid dapat ditemukan di berbagai bagian tumbuhan, antara lain bunga, biji, daun, ranting, akar, dan kulit kayu (Ningrum et al., 2016).

Ciri-ciri alkaloid umumnya berbentuk padat (kristal), meskipun ada juga yang seperti nikotin, berbentuk cair pada suhu kamar. Alkaloid memiliki rasa pahit pada lidah. Garam alkaloid larut dalam air, sedangkan bentuk bebas atau basanya larut dalam pelarut organik (Harbone, 1998).

2. Flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang termasuk dalam kelompok senyawa fenolik struktural, dimana benzena disubstitusi dengan gugus OH. Secara umum senyawa flavonoid terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi, senyawa ini banyak terdapat di alam dan dapat terdapat pada akar, kayu, kulit kayu, daun, batang, buah, dan bunga (Susila Ningsih et al., 2023). Flavonoid berperan dalam memberikan warna dan rasa pada biji,

bunga, dan buah, serta berkontribusi terhadap aromanya (Mierziak et al., 2014).

3. Tannin

Tannin merupakan senyawa tidak berwarna yang terdapat pada semua tumbuhan, terutama tumbuhan berkayu dan pakis. Tannin alami dapat larut dalam air dan menghasilkan warna mulai dari merah terang hingga merah tua atau coklat. Setiap turunan tannin mempunyai warna yang berbeda-beda, tergantung sumbernya (Ilham Kurniawan & Zahra, 2021).

4. Saponin

Saponin merupakan senyawa glikosida kompleks dengan berat molekul tinggi, diproduksi terutama oleh tumbuhan, hewan laut tingkat rendah, dan beberapa bakteri. Saponin juga berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan antijamur sehingga bermanfaat dalam proses penyembuhan luka (Anggraeni Putri et al., 2023).

Pada tumbuhan, saponin tersebar merata di berbagai bagian, antara lain akar, batang, umbi, daun, biji, dan buah. Saponin dapat menurunkan tegangan permukaan air sehingga mengakibatkan terbentuknya busa pada permukaan air bila dikocok (Anggraeni Putri et al., 2023).

5. Steroid

Steroid merupakan senyawa metabolit sekunder yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan. Steroid adalah lipid terpenoid yang dicirikan oleh kerangka karbon dengan empat cincin yang menyatu (Samejo et al., 2013).

I. Ekstraksi

1. Pengertian

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni (Ditjen POM, 2020).

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dengan campurannya sehingga mendapatkan suatu sediaan dengan ukuran partikel tertentu yang mengandung senyawa aktif dengan menggunakan pelarut tertentu (Goeswin Agoes, 2009).

Sediaan tersebut dinamakan ekstrak, ekstrak sendiri merupakan hasil dari sebuah proses ekstraksi dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai dimana pelarut yang digunakan akan diuapkan sehingga didapatkan suatu sediaan pekat (Ditjen POM, 2020).

2. Tujuan Ekstraksi

Ekstraksi dilakukan untuk mendapatkan suatu sediaan yang mengandung senyawa aktif yang diinginkan dan telah melalui proses pemisahan menggunakan pelarut tertentu (Candra et al., 2021).

3. Jenis-Jenis Ekstraksi

Beberapa metode ekstraksi yaitu:

a. Maserasi

Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan merendam serbuk simplisia kedalam sebuah pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diinginkan dengan atau tanpa disertai proses pemanasan (Chairunnisa et al., 2019).

Metode ini melibatkan penempatan bubuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi berlanjut hingga tercapai keseimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dan dalam sel tumbuhan. Setelah ekstraksi selesai, pelarut dipisahkan dari bahan tanaman melalui penyaringan (Mukhriani, 2014).

b. Perkolasi

Perkolasi merupakan suatu metode ekstraksi dengan cara mengalirkan atau melewati pelarut ke serbuk simplisia. Cairan pelarut yang dialirkan akan melarutkan berbagai kandungan aktif yang terdapat dalam simplisia sehingga didapatkan kandungan aktif yang diinginkan (Tutik et al., 2022).

Keuntungan dari metode ini terletak pada pemaparan sampel secara terus menerus terhadap pelarut baru. Namun, kelemahannya adalah distribusi sampel yang tidak merata di dalam perkolator dapat menghambat akses pelarut ke seluruh area. Selain itu, pendekatan ini memerlukan pelarut dalam jumlah besar dan memakan waktu yang cukup lama (Mukhriani, 2014).

c. Refluks

Refluks adalah suatu metode ekstraksi yang menggunakan pelarut temperatur titik didih tertentu, selama waktu dan jumlah pelarut tertentu yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Azhari et al., 2020).

Keuntungan dari metode ini adalah sampel diekstraksi menggunakan pelarut murni yang dikondensasikan dari uap, meminimalkan penggunaan pelarut dan waktu yang dibutuhkan. Namun, kelemahannya adalah senyawa termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak selalu berada pada titik didihnya (Mukhriani, 2014).

d. Sokletasi

Sokletasi adalah metode ekstraksi dimana dilakukan pemisahan komponen pada sampel padat menggunakan pelarut yang sama secara berulang-ulang, sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel terisolasi dengan sempurna (Ridwan et al., 2015).

e. Digestasi

Digestasi adalah maserasi dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C (Agustina Harahap, 2020).

f. Infundasi

Infundasi adalah proses ekstraksi sediaan cair dengan menyari simplisia nabati menggunakan air pada suhu 90°C selama 15 menit (Agustina Harahap, 2020).

g. Dekoktasi

Dekoktasi adalah proses ekstraksi sediaan cair dengan menyari simplisia nabati menggunakan air pada waktu yang lebih lama ± 30 menit dan temperatur sampai titik didih air (Agustina Harahap, 2020).

h. *Ultrasound- Assisted Extraction* (UAE)

Ultrasound adalah sebuah metode maserasi yang menggunakan bantuan ultrasonic (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz) yang telah

dimodifikasi. Dimana sampel diletakkan wadah. sehingga dihasilkan rongga pada sampel karena adanya tekanan mekanik pada sel (Mukhriani, 2014).

J. Pemisahan Senyawa

1. Partisi Cair-Cair

Merupakan metode pemisahan yang menggunakan dua atau lebih pelarut yang tidak saling campur dan melibatkan ekstraksi analit dari fase air ke dalam pelarut organik yang bersifat nonpolar atau agak polar. Analit-analit yang mudah terekstraksi dalam pelarut organik adalah molekul-molekul netral yang berikatan secara kovalen dengan substituen yang bersifat nonpolar atau agak polar (Herdiana & Aji, 2020).

Ekstraksi cair-cair bekerja dengan cara mencampurkan suatu larutan dengan pelarut lain yang tidak dapat bercampur dengan pelarut asal dan mempunyai massa jenis yang berbeda. Hal ini menghasilkan pembentukan dua fase terpisah setelah penambahan pelarut kedua. Proses ini menyebabkan perpindahan massa dari pelarut asli ke pelarut ekstraksi. Pergerakan zat terlarut ke dalam pelarut baru didorong oleh perbedaan potensial kimia antara kedua pelarut. Oleh karena itu, ekstraksi cair-cair merupakan proses perpindahan massa yang terjadi melalui difusi (Mirwan, 2013).

2. Partisi Padat-Cair

Prinsip ekstraksi padat-cair bergantung pada kemampuan senyawa dalam suatu padatan dilarutkan pada pelarut tertentu. Proses ekstraksi padat-cair dimulai ketika pelarut bersentuhan dengan padatan kemudian berdifusi dan melarutkan komponen yang larut. Selanjutnya terjadi proses difusi internal dimana pelarut memasuki pori-pori padatan didalam struktur sel dan terus melarutkan komponen yang dapat larut. Kontak antara pelarut dan

padatan sering kali difasilitasi oleh gaya kapiler, yang bekerja cepat pada padatan berpori (Masud & Puspitasari, 2017).

3. Kolom Kromatografi

Kromatografi kolom merupakan salah satu metode pemisahan preparatif yang mampu menghasilkan isolat dalam jumlah besar. Efisiensi pemisahan pada kromatografi kolom dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemilihan adsorben, eluen, diameter kolom, dan laju aliran (Ghanaim Fasya et al., 2018).

Kromatografi kolom merupakan teknik kromatografi yang dipengaruhi oleh tekanan gravitasi dimana fase diam yang digunakan ditempatkan dalam kolom dan fase gerak akan melewati fase diam. Kromatografi kolom menggunakan zat penyerap (fase diam) dalam wadah kaca berbentuk buret, fase gerak dituangkan di atas dan menetes di bawah (Iriani & Noor Elfa, 2017).

4. Kromatografi Cair Vakum

Prinsip kerja KCV yaitu partisi dan adsorpsi yang pemisahannya menggunakan bantuan tekanan dari pompa vakum. Fase diam pada fraksinasi KCV menggunakan Silika G60 GF254 sedangkan untuk fase gerak menggunakan pelarut dengan tingkat kepolaran meningkat. Agar senyawa larut sesuai kepolarannya digunakan pelarut dengan kepolaran yang meningkat sehingga setiap pelarut dapat melarutkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya (Haryoto et al., 2019).

K. Tinjauan Islami

Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah swt yang memiliki keuntungan bagi manusia dan hewan baik itu sebagai sumber bahan pangan maupun sebagai obat dari suatu penyakit. Sakit merupakan salah satu bentuk ujian atau cobaan yang diberikan Allah swt kepada hamba-Nya. Oleh

karena itu, manusia harus berikhtiar untuk mencari solusi dari hal tersebut, yaitu dengan mencari cara demi mendapat kesembuhan dari penyakit. Allah swt telah menciptakan berbagai macam makhluk termasuk tumbuhan yang ada disekeliling manusia. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah swt yang memiliki manfaat yang sangat besar. Hal ini telah terangkum dalam Alquran dan Hadist nabi Muhammad saw. Di dalam Alquran banyak disebutkan berbagai macam tumbuhan, termasuk tumbuhan yang dapat dimakan. Selain itu, tumbuhan juga mengandung sifat aktif yang dapat digunakan dalam pengobatan (Faradisa & Fakhruddin, 2021).

Sebagaimana dalam QS. Asy-Syu'arā'/26:7 Allah swt berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَأْتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik? (Kementrian Agama, 2022).

Dalam tafsir Al-Misbah kata *ila* pada ayat ini mengandung makna batas akhir. Berfungsi meperluas arah pandangan hingga batas akhir. Dengan demikian ayat ini mengisyaratkan manusia untuk memperluas pandangan terhadap keajaiban yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang ada dimuka bumi. Sedangkan kata karim dalam ayat tersebut digunakan untuk menggambarkan suatu hal yang baik pada setiap objek, dalam hal ini adalah tumbuhan. Tumbuhan yang baik paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2002).

Pada tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah swt mengingatkan kekuasaan-Nya dan keagungan-Nya yang telah menciptakan bumi dan telah menumbuhkan didalamnya tumbuh-tumbuhan yang baik berupa tanam-tanaman dan buah-buahan. Yang sesungguhnya dibalik itu semua terdapat

tanda-tanda atas kebesaran Allah swt yang telah menciptakan alam semesta (Abdullah, 2004).

Betapa besar kekuasaan Allah swt dan betapa luasnya nikmat-nikmat yang telah Allah swt berikan kepada hamba-hambaNya. Dengan memperhatikan apa yang telah Allah swt berikan bagi kehidupan hamba-Nya, seperti menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka macam jenis di bumi. Sesungguhnya tumbuhan yang telah Allah swt tumbuhkan itu merupakan tumbuhan yang baik dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk kehidupan hamba-Nya. Sesungguhnya dalam penciptaan itu menandakan keagungan Allah swt yang maha pengasih dan penyayang kepada hamba-hambaNya (Salim & Said, 2006).

Ayat di atas menjelaskan tentang kebesaran Allah swt dalam menciptakan bumi dan isinya, termasuk di dalamnya adalah tumbuhan yang beraneka ragam. Tumbuhan yang diciptakan adalah tumbuhan yang subur seperti biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan serta rumput yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup baik itu sebagai bahan makanan bagi manusia dan ternak dan dapat pula digunakan sebagai tanaman herbal atau tanaman obat bagi manusia.

Sebagaimana dalam QS. An-Nahl /16:11, Allah swt berfirman:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir (Kementrian Agama, 2022).

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menyebutkan bahwa, Allah swt. menumbuhkan bagi kamu dengannya yakni dengan air hujan itu tanaman-

tanaman; dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu jadikan makanan yang halal atau minuman yang haram dan dari segala macam atau sebagian buah-buahan, selain yang disebut itu. Sesungguhnya pada yang demikian yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu benar-benar ada tanda yang sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi maha kuasa. Tanda itu berguna bagi kaum yang memikirkan (Shihab M, 2002).

Pada tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, selain binatang-binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, Allah swt juga mengaruniakan nikmat-Nya berupa air hujan yang diturunkan dari langit. Sebagian air hujan ini digunakan untuk diminum sebagai air tawar yang menyegarkan, sementara sebagian lainnya dimanfaatkan untuk menyiram tumbuh-tumbuhan dan tanaman, serta membantu menyuburkannya sehingga dapat menjadi tempat penggembalaan bagi binatang-binatang ternak. Dengan air hujan, Allah swt menumbuhkan berbagai tanaman dan buah-buahan, seperti zaitun, kurma, anggur, dan banyak buah lainnya yang berbeda-beda jenis, warna, bau, dan rasa. Dalam ciptaan Allah swt yang diberikan kepada umat manusia ini terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya, dan hanya Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa yang layak disembah (Abdullah, 2003).

Allah swt mengarahkan perhatian hamba-hamba-Nya kepada tanda-tanda kekuasaan-Nya yang nyata dan nikmat-nikmat-Nya yang besar dengan menundukkan malam dan siang, serta matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bersinar di langit. Bintang-bintang tersebut berfungsi sebagai petunjuk

dalam kegelapan, sementara planet-planet yang beredar pada orbitnya juga mengikuti perintah dan ketentuan Allah swt. Selain itu, Allah swt telah menundukkan berbagai makhluk di bumi untuk manfaat manusia, termasuk hewan, tumbuhan, dan sumber daya alam lainnya. Semua ini mengandung tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi mereka yang merenung dan mempelajari dengan baik (Salim & Said, 2006).

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah swt sungguh menciptakan segala sesuatu termasuk tanaman-tanaman di bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Allah swt memerintahkan kita untuk memperhatikan bumi dan isinya termasuk didalamnya adalah tumbuhan, karena sesungguhnya didalam itu terdapat tanda kebesaran Allah swt. Yang dapat diartikan bahwa sebaiknya kita senantiasa berupaya mengkaji, meneliti, mencari tahu hingga menemukan tanda kebesaran Allah swt berupa kegunaan atau manfaat dari tumbuhan yang Allah swt ciptakan itu, sehingga dapat dimanfaatkan bagi kehidupan termasuk sebagai pengobatan.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ
قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha' bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR. Bukhari. 1907).

Karena setiap penyakit pasti ada obatnya, dalam pandangan Islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-

tumbuhan yang beraneka ragam, untuk memperoleh obat yang tepat untuk setiap penyakit tersebut dibutuhkan kerja keras, percobaan dan penelitian agar dapat diketahui efeknya secara aman dan manfaatnya secara maksimal.

Dari ayat dan hadits di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan untuk melihat dan menyadari tanda-tanda kebesaran Allah swt khususnya dalam pengobatan yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Agar manusia senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat pemberian Allah swt melalui segala sesuatu yang telah Allah swt ciptakan untuk manusia, terkhusus tumbuh-tumbuhan yang tentunya memiliki manfaat besar untuk memenuhi kebutuhan manusia.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui ada tidaknya aktivitas antibakteri pada ekstrak dan partisi daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* dan mengetahui pada konsentrasi berapa ekstrak dan partisi daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) memberikan aktivitas antibakteri.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eksperimental yang dilakukan dengan berbagai tahap yaitu ekstraksi, partisi, skrining fitokimia dan uji aktivitas bakteri dengan menggunakan metode difusi cakram.

C. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Mikrobiologi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi untuk melaksanakan proses pengolahan sampel daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) hingga didapatkan hasil partisi daun anak dara. Kemudian dilanjutkan dengan sterilisasi alat dan bahan yang digunakan serta pengujian aktivitas antibakteri pada sampel di Laboratorium Mikrobiologi.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2024 – Juni 2024

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah tumbuhan anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang diperoleh dari Desa Kanrung Manimpahoi/Caile kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.).

E. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah autoklaf HVE-50 (*Hirayama Hiclave*), alat maserasi, bunsen, blender (*Sharp*), batang pengaduk, cawan petri, cawan porselin, corong pisah (*Pyrex*), corong kaca (*Pyrex*), erlenmeyer (*Pyrex*), gelas ukur (*Iwaki*), *hot plate*, jangka sorong (*Tricle brand*), kain saring, *laminar air flow* (*ESCO*), ose bulat, *micropipet* 10-100 μL , *micropipet* 100-1000 μL (*Joanlab*), oven (*Memmert*), spatel, spoit (*Onemed*), statif dan klem, timbangan analitik, tabung reaksi (*Iwaki*, *Pyrex*), *rotary evaporator* (*IKA RV 10 basic*), rak tabung reaksi, vial, *vortex* dan *waterbath* (*Memmert*).

2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah, *aquadest* (*Onelab Waterone*), aluminium foil (*Klin Pak*), asetat anhidrida, amil alkohol, bakteri *Propionibacterium acnes*, *cotton swab* steril (*Onemed*), DMSO (*Merck*), HCl (*Emsure*), H₂SO₄ 1% (*Merck*), BaCl₂ 1%, FeCl₃, kertas saring, klindamisin, kloroform, kapas, medium Nutrient Agar (*Himedia*), NaCl 0,9% (*Mjb Pharma*), *paper disc blank* (*MN*), sampel daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.), serbuk Mg, pelarut etanol 96% (*Jk Care*),

pelarut etil asetat, pelarut n-heksan, reagen wagner (*Merck*), reagen dragendorf (*Merck*), dan *water for injection* (*Otsuka*).

F. Teknik Pengolahan Sampel

1. Pengolahan Sampel

Sebelum dilakukan maserasi terlebih dahulu dilakukan beberapa tahapan penyiapan sampel seperti dilakukan pengambilan sampel, sortasi basah, dilanjutkan dengan pencucian daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) dan perajangan. Setelah itu sampel diangin-anginkan dan dikeringkan didalam lemari pengering pada suhu 40°C selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan sortasi kering untuk memilah daun yang akan digunakan, kemudian sampel dihaluskan atau dijadikan serbuk menggunakan blender, dan dimasukkan kedalam wadah maserasi dan siap di ekstraksi (Haeria et al., 2016).

2. Ekstraksi Sampel

Sampel sebanyak 200 g yang telah dikeringkan dan dimasukkan dalam wadah maserasi. Ditambahkan pelarut etanol 96% sebanyak 1000 mL dan dipastikan sampel terendam dengan baik. Wadah maserasi ditutup dengan *aluminium foil* terlebih dahulu kemudian ditutup dengan tutup wadah maserasi dan disimpan selama 3 x 24 jam dan terlindung dari sinar matahari langsung. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk memisahkan ampas sebuk simplisia dengan filtrat menggunakan kain saring dan kertas saring. Hasil yang diperoleh dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya dengan *rotary evaporator* dengan suhu 60°C dan dipekatkan dengan *waterbath* hingga diperoleh ekstrak kental (Haeria et al., 2016).

3. Partisi Cair-cair

Ekstrak etanol kental daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) ditimbang sebanyak 5 g dan dilarutkan dengan *aquadest* 50 mL. Setelah itu dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan pelarut n-heksan sebanyak 50 mL. Kemudian dilakukan penggojogan dan didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan (fase air dan fase n-heksan). Fase air dan fase n-heksan kemudian dikeluarkan dan ditampung pada wadah yang berbeda. Fase air kemudian dimasukkan kembali ke dalam corong pisah lalu ditambahkan kembali dengan pelarut n-heksan baru sebanyak 50 mL, dilakukan hal yang sama dan proses ini diulang hingga 3 kali. Hasil n-heksan yang didapatkan selanjutnya dipekatkan menggunakan *waterbath* dan didapatkan hasil partisi n-heksan yang kental.

Hasil partisi air dimasukkan kembali ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan pelarut etil asetat sebanyak 50 mL. Kemudian dilakukan penggojogan dan didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan antara fase etil asetat dan fase air. Fase air dan fase etil asetat kemudian dikeluarkan dan ditampung pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Proses ini diulangi hingga 3 kali dan hasil etil asetat yang didapatkan selanjutnya dipekatkan menggunakan *waterbath* dan didapatkan hasil partisi etil asetat yang kental (Noviyanty & Febrianti, 2022).

G. Skrining Fitokimia

1. Alkaloid

Ekstrak etanol 96% daun anak dara ditimbang 0,5 g dan dilarutkan dengan *aquadest* 50 ml, diambil 5 ml kemudian dicampurkan dengan 5 mL HCl 1% dihomogenkan dan disaring menggunakan kertas saring sehingga didapatkan filtrat. Filtrat yang diperoleh dituangkan ke dalam dua tabung

reaksi, masing-masing sebanyak 3 mL. Tabung reaksi A diberikan pereaksi wagner dan tabung reaksi B diberikan pereaksi dragendorff. Ekstrak dinyatakan positif alkaloid ditandai dengan adanya endapan coklat untuk pereaksi wagner dan endapan coklat kemerahan untuk pereaksi dragendorff (Pagarra et al., 2022).

2. Flavonoid

Ekstrak etanol 96% daun anak dara ditimbang 0,5 g dan dilarutkan menggunakan 10 mL air suling panas, kemudian dipanaskan kembali selama 5 menit dan disaring dalam keadaan panas. Filtrat yang diperoleh diambil sebanyak 3 mL lalu ditambahkan 0,1 g serbuk Mg, HCl pekat, dan 1 mL amil alkohol lalu dihomogenkan. Flavonoid positif jika terjadi warna merah, kuning, atau jingga pada lapisan amil alkohol (Soemarie et al., 2018).

3. Steroid

Ekstrak etanol 96% dilarutkan dengan 2 mL kloroform, kemudian ditambahkan 10 tetes asetat anhidrida dan 3 tetes H₂SO₄ pekat. Hasil uji reaksi positif terpenoid ditunjukkan dengan terbentuknya warna biru kehijauan untuk hasil positif mengandung steroid, terbentuknya warna merah atau jingga menandakan positif terpenoid (Wulan Kusumo et al., 2022).

4. Saponin

Dilarutkan ekstrak etanol 0,5 g menggunakan air panas, dinginkan kemudian kocok kuat-kuat selama 10 detik. Positif saponin jika terbentuk buih setinggi 1-10 cm selama tidak kurang 10 menit dan jika ditambahkan 1 tetes HCl 2N, buih tidak hilang (Fitriani et al., 2021).

5. Tannin

Ekstrak etanol 96% daun anak dara ditimbang 0,5 g dilarutkan dalam 10 mL air suling, panas, kemudian didinginkan dan disaring. Sebanyak 1 ml

filtrat diambil dan ditambahkan pereaksi FeCl_3 sebanyak 5 tetes. Hasil uji reaksi positif tannin ditunjukkan oleh warna biru kehitaman atau hijau kehitaman (Wulan Kusumo et al., 2022).

H. Pengujian Aktivitas Antibakteri

1. Sterilisasi Alat

Sebelum pengujian aktivitas antibakteri, perlu dilakukan sterilisasi terlebih dahulu. Alat-alat yang digunakan sebelumnya dicuci dengan sabun dan air bersih, lalu keringkan. Pinset, ose dan Alat-alat gelas, seperti tabung reaksi, vial, dan cawan petri, dibungkus kemudian disterilisasi dengan metode panas kering menggunakan oven pada suhu 170°C selama satu jam. Selain itu, ose dan pinset juga disterilkan kembali dengan pemijaran di atas api bunsen sebelum digunakan. Alat yang berskala atau tidak tahan panas dan media disterilkan dalam autoklaf selama 15 menit pada suhu 121°C (Fitriani et al., 2021).

2. Pembuatan Media Pembiakan

Nutrient Agar ditimbang 0,6 g dan dilarutkan ke dalam 20 mL *aquadest* menggunakan *Erlenmeyer*. Selanjutnya dihomogenkan dengan dididihkan menggunakan *hot plate* dan sesekali diaduk hingga media larut. Media yang telah larut tersebut disterilkan dalam autoklaf selama 15 menit pada suhu 121°C . Setelah disterilkan, nutrient agar selanjutnya dituang pada cawan petri yang telah ditemeli dengan label penanda sebelumnya dan dibiarkan memadat pada suhu kamar di dalam *laminar air flow* (Hana Putri et al., 2021).

3. Inokulasi Bakteri Uji

Bakteri *Propionibacterium acnes* diambil dengan menggunakan ose, dan inokulasi pada media nutrient agar (NA) dengan metode goresan

sinambung (zig-zag). Kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 1x24 jam (Hana Putri et al., 2021).

4. Pembuatan Suspensi Bakteri

Hasil inokulasi bakteri *Propionibacterium acnes* diambil dengan kawat ose steril, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 10 mL NaCl 0,9% lalu dihomogenkan hingga diperoleh kekeruhan sama dengan standar kekeruhan larutan Mc. Farland 0,5 ($1,5 \times 10^8$ koloni/mL) (Hana Putri et al., 2021). Larutan standar McFarland 0,5 ($1,5 \times 10^8$ CFU/ml) dibuat dengan cara mencampurkan barium klorida (BaCl_2) 1% sebanyak 0,05 ml dengan asam sulfat (H_2SO_4) 1% sebanyak 9,95 ml dalam tabung reaksi kemudian dihomogenkan menggunakan *vortex*. Kekeruhan dapat dipastikan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 625 nm. nilai absorbansi Mc.Farland dan suspensi bakteri kemudian dibandingkan dan sesuai pada rentang nilai absorban 0,08 hingga 0,1. (Yanti & Rosmania, 2020).

5. Pembuatan Media Pengujian

Media Nutrient Agar sebanyak 7,2 g dilarutkan dalam 240 mL *aquadest* steril kemudian dididihkan menggunakan *hot plate*. Selanjutnya, disterilkan menggunakan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121°C. Dituang pada cawan petri masing-masing 20 mL, selanjutnya ditunggu sampai memadat di suhu kamar. Dilakukan *swab* pada media agar dengan menggunakan suspensi bakteri yang telah setara dengan standar kekeruhan Mc. Farland (Azzahra et al., 2023).

6. Pembuatan Kontrol Positif dan Kontrol Negatif

Kontrol negatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimetilsulfoksida (DMSO) 10%, dibuat dengan cara menambahkan 300 μL DMSO kedalam vial dan ditambahkan *Aqua pro Injeksi* hingga diperoleh

larutan sebanyak 3 mL. Kontrol positif yaitu klindamisin 10%, dibuat dengan menimbang sebanyak 300 mg serbuk klindamisin, kemudian dilarutkan dengan *Aqua pro Injeksi*.

7. Pembuatan Larutan Uji

Larutan uji dibuat dari ekstrak etanol 96%, partisi etil asetat, n-heksan, dan air daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) dengan konsentrasi 15 mg/mL, 20 mg/mL, dan 25 mg/mL. Konsentrasi tersebut dibuat dengan menimbang masing-masing 45 mg, 60 mg, dan 75 mg, kemudian dilarutkan menggunakan DMSO sebanyak 300 µl dan ditambahkan dengan *Aqua pro Injeksi* hingga diperoleh larutan sebanyak 3 mL.

8. Pengujian Antibakteri

Kertas cakram steril berukuran 6 mm direndam selama 30 menit dalam masing-masing vial yang berisi Ekstrak etanol 96%, partisi n-heksan, partisi etil asetat, dan partisi air daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) dengan berbagai konsentrasi, kontrol positif antibiotik klindamisin 10% dan kontrol negatif larutan DMSO 10%. Kemudian dilakukan *swab* pada media nutrient secara merata dengan suspensi antibakteri menggunakan *cotton buds* steril dan didiamkan selama 10 menit. kertas cakram yang telah direndam kemudian diletakan diatas lempeng agar menggunakan pinset sesuai dengan pola yang telah ditentukan, dimana jarak antar kertas cakram yang satu dan lainnya diberi jarak. Selanjutnya dilakukan inkubasi pada suhu 37°C selama 1x24 jam (Pertiwi et al., 2023).

9. Analisis data

Data hasil pengukuran diameter zona hambat dari setiap konsentrasi dianalisis menggunakan SPSS yaitu uji *Analysis of Variance* (ANOVA) post hoc test (tukey) dengan tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui perbedaan signifikan tiap konsentrasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persen Rendamen Ekstrak

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Daun Anak Dara

Berat simplisia (g)	Berat ekstrak (g)	% Rendemen
200	13,37	6,68%

2. Skrining Fitokimia

Tabel 2. Hasil Uji Skrining Fitokimia

Identifikasi Senyawa	Pereaksi	Hasil	keterangan
Alkaloid (dragendorf)	Reagen Dragendorf	Endapan coklat kemerahan	(+)
Alkaloid (wagner)	Reagen Wagner	Endapan coklat	(+)
Flavonoid	Serbuk Mg HCl Amil alkohol	Berwarna jingga	(+)
Tannin	FeCl ₃	Hijau kehitaman	(+)
Saponin	HCl 2N	Tidak berbusa	(-)
steroid	Kloroform, asetat anhidrida dan H ₂ SO ₄	Berwarna biru kehijauan	(+)

Keterangan :

(+) = Positif

(-) = Negatif

3. Hasil Partisi

Tabel 3. Hasil Partisi Ekstrak Etanol 96%

Sampel	Pelarut	Berat Hasil Partisi (g)
Ekstrak Anak Dara 5 g	N-heksan	2,4
	Etil asetat	0,2
	Tidak larut (Air)	1,5

4. Hasil Pengujian Aktivitas Antibakteri

a. Hasil Ekstrak Etanol Daun Anak Dara



Keterangan :

A = Klindamisin 10% (b/v)

B = Konsentrasi 15 mg/mL

C = Konsentrasi 20 mg/mL

D = Konsentrasi 25 mg/mL


E = DMSO 10% (v/v)

Gambar 5. Hasil Pengujian Ekstrak Etanol

Tabel 4. Hasil Pengukuran Ekstrak Etanol

Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata (mm)	Keterangan
	1	2	3		
15 mg/mL	5,00	6,25	7,90	$6,38 \pm 1,45$	Sedang
20 mg/mL	8,87	8,05	8,52	$8,48 \pm 0,41$	Sedang
25 mg/mL	12,57	11,97	11,80	$12,11 \pm 0,40$	Kuat

b. Hasil Partisi n-heksan Daun Anak Dara



Keterangan :

A = Klindamisin 10% (b/v)

B = Konsentrasi 15 mg/mL

C = Konsentrasi 20 mg/mL


D = Konsentrasi 25 mg/mL

E = DMSO 10% (v/v)

Gambar 6. Hasil Pengujian Partisi n-heksan

Tabel 5. Hasil Pengukuran Partisi n-heksan

Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata (mm)	Keterangan
	1	2	3		
15 mg/mL	5,52	5,22	6	5,58 ± 0,39	Sedang
20 mg/mL	9,3	7,27	8,55	8,37 ± 1,02	Sedang
25 mg/mL	13,30	12,17	12,25	12,57 ± 0,63	Kuat

c. Hasil Partisi Etil Asetat Daun Anak Dara

Keterangan :

A = Klindamisin 10% (b/v)

B = Konsentrasi 15 mg/mL

C = Konsentrasi 20 mg/mL

D = Konsentrasi 25 mg/mL


E = DMSO 10% (v/v)

Gambar 7. Hasil Pengujian Partisi Etil Asetat**Tabel 6.** Hasil Pengukuran Partisi Etil Asetat

Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata (mm)	Keterangan
	1	2	3		
15 mg/mL	5,30	4,85	4,45	4,86 ± 0,42	Lemah
20 mg/mL	8,00	6,36	5,90	6,75 ± 1,10	Sedang
25 mg/mL	9,15	8,55	7,75	8,48 ± 0,70	Sedang

M A K A S S A R

d. Hasil Partisi Air Daun Anak Dara



Keterangan :

A = Klindamisin 10% (b/v)

B = Konsentrasi 15 mg/mL

C = Konsentrasi 20 mg/mL

D = Konsentrasi 25 mg/mL

E = DMSO 10% (v/v)

Gambar 8. Hasil Pengujian Partisi Air

Tablel 7. Hasil Pengukuran Partisi Air

Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata (mm)	Keterangan
	1	2	3		
15 mg/mL	-	-	-	-	Tidak ada hambatan
20 mg/mL	-	-	-	-	Tidak ada hambatan
25 mg/mL	-	-	-	-	Tidak ada hambatan

Tablel 8. Hasil Pengukuran Kontrol Positif dan Negatif

Kontrol	Rata-rata (n)	Keterangan
K+	17,25 ± 1,94	Kuat
K-	-	Tidak menghambat

Keterangan :

n = 12

K+ = Klindamisin 10% (b/v)

K- = DMSO 10% (v/v)

Tablel 9. Hasil Pengukuran Mc.Farland dan Suspensi Bakteri

Larutan	Absorban
Mc.Farland	0,104
Suspensi Bakteri	0,100

B. Pembahasan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Keanekaragaman ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh sang pencipta kepada manusia, yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia termasuk sebagai pengobatan. Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dari ekstrak dan partisi daun anak dara terhadap salah satu bakteri penyebab jerawat yakni *Propionibacterium acnes*. Penelitian ini diawali dengan penyiapan sampel daun anak dara yang didapatkan dari Desa Kanrung Manimpahoi/Caile kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.

Daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) diesktraksi menggunakan metode maserasi. Maserasi dilakukan dengan mengeringkan daun anak dara terlebih dahulu kemudian dibuat menjadi serbuk dan dimasukkan kedalam wadah maserasi. Pelarut yang digunakan dalam proses maserasi ini merupakan pelarut etanol 96%. Pelarut etanol digunakan karena pada penelitian sebelumnya telah didapatkan hasil bahwa ekstrak etanol 96% daun anak dara merupakan ekstrak yang aktif dalam menghambat beberapa bakteri pathogen. (Mukhriani, 2014).

Sampel sebanyak 200 g direndam dengan etanol 96% sebanyak 1000 mLiter selama 3x24 jam pada ruangan tertutup dan terhindar dari cahaya matahari sambil sesekali diaduk agar senyawa dapat tersari sempurna dalam cairan penyari. Prinsip ekstraksi didasarkan pada kemampuan pelarut untuk melewati dinding sel dan memasuki rongga sel yang berisi berbagai komponen aktif. Komponen aktif ini akan terlarut dalam pelarut yang digunakan (Asworo & Widwiastuti, 2023). Hasil filtrat yang didapatkan kemudian dipekatkan

menggunakan *rotary evaporator* dan *waterbath*. Didapatkan ekstrak kental sebanyak 13,37 g dengan hasil rendamen ekstrak 6,68%.

Estrak etanol yang didapatkan kemudian dipisahkan lagi sesuai kepolarannya dengan metode partisi cair-cair menggunakan corong pisah. Adapun prinsipnya adalah melarutkan senyawa menggunakan pelarut yang berbeda kepolarannya sehingga senyawa yang terkandung didalam ekstrak larut sesuai dengan kepolaran pelarut (Mirwan, 2013). Adapun pelarut yang digunakan adalah *aquadest*, n-heksan dan etil asetat.

Partisi dilakukan dengan cara ditimbang sebanyak 5 g ekstrak etanol daun anak dara kemudian dilarutkan dalam 50 mL *aquadest*. Larutan kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan 50 mL pelarut n-heksan. Dilakukan penggojogan dengan sesekali membuka tutup corong pisah untuk membuang gas yang ada akibat proses penggojogan dan didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan yang terbentuk dipisahkan partisi air dan partisi n-heksan. partisi air dimasukkan kembali ke dalam corong pisah dan ditambah 50 mL n-heksan dikocok dan didiamkan hingga terbentuk pemisahan, proses ini dilakukan hingga 3 kali. Partisi air kembali dimasukkan kembali kedalam corong pisah kemudian ditambahkan dengan pelarut etil asetat 50 mL dan dilakukan penggojogan. Langkah yang sama dengan halnya n-heksan dan diulang sebanyak 3 kali. Hasil partisi etil asetat yang didapatkan kemudian diuapkan menggunakan *waterbath* untuk mendapatkan hasil partisi yang kental. Adapun hasil yang didapatkan pada partisi n-heksan yaitu 2,4 g, partisi etil asetat 0,2 g dan partisi air 1,5 g (Noviyanty & Febrianti, 2022).

Sebelum dilakukan pengujian aktivitas antibakteri, terlebih dahulu dilakukan sterilisasi pada alat-alat serta media yang akan digunakan. Sterilisasi dilakukan menggunakan metode panas kering dengan

menggunakan oven pada suhu 170°C selama satu jam dan panas basah menggunakan *autoclave* pada suhu 121°C selama 15 menit untuk menghilangkan atau menghancurkan mikroorganisme dan mencegah kontaminasi saat pengujian (Istini, 2020).

Untuk pembuatan suspensi bakteri, dilakukan dengan mengambil 1-2 ose bakteri yang telah diinokulasi dan diinkubasi selama 24 jam, kemudian dimasukkan kedalam 10 mL larutan NaCl. Larutan NaCl 0,9% steril digunakan karena bersifat isotonik dengan cairan sel bakteri, sehingga memungkinkan bakteri tetap hidup sebelum dipindahkan ke media kultur baru. Tujuan dari peremajaan bakteri adalah untuk mendapatkan bakteri yang aktif sehingga pertumbuhan bakteri tersebut dapat optimal (Sari et al., 2022)

Kekeruhan suspensi bakteri uji disesuaikan dengan standar McFarland no. 0,5, yang setara dengan konsentrasi $1,5 \times 10^8$ bakteri/mL dimana standar tersebut adalah standar yang digunakan pada skala laboratorium untuk percobaan kerentanan antimikroba dan percobaan hasil biakan bakteri (McFarland, 2002). Larutan standar McFarland 0,5 ($1,5 \times 10^8$ CFU/ml) dibuat dengan cara mencampurkan barium klorida (BaCl_2) 1% sebanyak 0,05 ml dengan asam sulfat (H_2SO_4) 1% sebanyak 9,95 ml dalam tabung reaksi kemudian dihomogenkan menggunakan *vortex*. Dimana keakuratan kekeruhan dapat dipastikan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 625 nm dengan nilai absorban 0,08 hingga 0,1 (Yanti & Rosmania, 2020). Pada penelitian didapatkan nilai absorbansi suspensi bakteri yaitu 0,1 dan nilai absorbansi Mc. Farland 0,104.

Uji aktivitas antibakteri daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) dilakukan dengan menggunakan metode difusi cakram. Metode difusi cakram merupakan metode pengujian aktivitas antibakteri dengan mengukur nilai

hambatan dari suatu sampel yang dapat ditandai dengan zona bening yang tercipta disekitar kertas cakram. Dalam metode ini, kertas cakram ditempatkan di atas media yang telah *diswab* dengan suspensi bakteri (Sari et al., 2022).

Pada pengujian ini digunakan 3 konsentrasi yakni, 15 mg/mL, 20 mg/mL, dan 25 mg/mL, dengan kontrol positif yakni klindamisin 10% (b/v) dan kontrol negatif yakni DMSO 10%. Klindamisin merupakan obat golongan antibiotik yang paling sering digunakan dalam pengobatan jerawat, klindamisin juga digunakan sebagai kontrol positif karena klindamisin merupakan perbandingan yang baik untuk melihat kemampuan sampel dalam menghambat bakteri. Klindamisin sebagai antimikroba yang bersifat bakteristatik maupun bakterisida yang mempunyai mekanisme membunuh bakteri dengan cara mencegah sintesis protein dari bakteri (Ayu Lestari & Qonitah, 2023). Alasan penggunaan kontrol negatif DMSO karena pada penelitian sebelumnya, DMSO tidak memberikan pengaruh aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* ditandai dengan tidak ada zona bening/hambat yang timbul di area sekitar *paper disc* sehingga tidak mempengaruhi pengujian (Pertiwi et al., 2023).

Menurut David dan Stout (1971) kekuatan daya antibakteri berdasarkan diameter zona hambat dibagi menjadi empat kategori yaitu sangat kuat (zona hambat lebih dari 20 mm), kuat (zona hambat 10-20 mm), sedang (zona hambat 5-10 mm) dan lemah (zona hambat kurang dari 5 mm) (Nabila & Bhakti Purnamasari, 2021). Dari hasil pengujian aktivitas antibakteri yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pada konsentrasi 15 mg/mL pada ekstrak etanol 96% dan partisi n-heksan daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) berada pada kategori hambatan yang sedang dengan

masing-masing diameter $6.38 \pm 1,45$ mm, $5,58 \pm 0,39$ mm, dan pada partisi etil asetat berada dikategori lemah dengan diameter $4,86 \pm 0,42$ mm terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*. Pada konsentrasi 20 mg/mL baik pada ekstrak etanol 96%, partisi n-heksan dan partisi etil asetat daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) berada pada kategori hambatan yang sedang dengan masing-masing diameter $8,48 \pm 0,41$ mm, $8,37 \pm 1,02$ mm dan $6,75 \pm 1,10$ mm. Untuk konsentrasi 25 mg/mL didapatkan hasil pada ekstrak etanol 96% dan hasil partisi n-heksan berada pada kategori hambatan yang kuat dengan masing-masing diameter $12,11 \pm 0,40$ mm dan $12,57 \pm 0,63$ mm. Untuk partisi etil asetat pada konsentrasi 25 mg/mL didapatkan hambatan berada pada kategori sedang dengan diameter $8,48 \pm 0,70$ mm. Sementara untuk hasil partisi dari air, baik pada konsentarasasi 15 mg/mL, 20 mg/mL, 25 mg/mL tidak memiliki zona bening disekitar *paper disc* yang menandakan bahwa partisi air tidak memiliki aktivitas dalam menghambat bakteri *Propionibacterium acnes* pada konsentrasi tersebut. Adapun kontrol positif yakni klindamisin 10% (b/v) didapatkan rata-rata diameter zona hambat sebesar $17,25 \pm 1,94$ mm (kategori kuat) sementara kontrol negatif yaitu DMSO 10% tidak ditemukan adanya hambatan.

Aktivitas antibakteri yang dihasilkan oleh ekstrak etanol, partisi n-heksan, dan partisi etil asetat, dipengaruhi oleh metabolit sekunder yang terkandung didalam ekstrak. Berdasarkan (tabel.2) didapatkan hasil bahwa ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tannin dan steroid. Alkaloid memiliki mekanisme dalam menghambat bakteri dengan cara merusak komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga menyebabkan lapisan dinding sel yang terbentuk tidak sempurna dan mengakibatkan lisis sel bakteri (Pertiwi et al., 2023).

Senyawa flavonoid yang terkandung pada ekstrak dapat memberikan aktivitas antibakteri dengan cara merusak membran sel. Sementara tannin memiliki aktivitas antibakteri dengan cara mengkerutkan dinding sel sehingga pertumbuhan bakteri terhambat bahkan mengalami *lisis* (Soemarie et al., 2018). Mekanisme steroid sebagai antibakteri yaitu dengan berinteraksi dengan membran fosfolipid dan membuat dinding sel menjadi rapuh dan lisis (Rahmatiyah et al., 2023).

Dari data hasil penelitian yang didapatkan dilakukan uji data menggunakan uji statistik *One-Way ANOVA tukey* menggunakan *software statistic* (SPSS), dengan tujuan untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan pada sampel yang diuji ($\text{sig} = \alpha < 0,05$). Hasil uji *One-Way ANOVA tukey* menunjukkan bahwa pada ekstrak, yang memiliki nilai hambatan berbeda signifikan adalah pada kontrol positif terhadap semua konsentrasi dan pada konsentrasi 25 mg/mL terhadap konsentrasi 15 mg/mL dan 20 mg/mL, sementara antara 20 mg/mL dan 15 mg/mL, hasil yang didapatkan tidak berbeda signifikan. Pada partisi n-heksan, didapatkan perbedaan yang signifikan yaitu pada kontrol positif terhadap konsentrasi 15 mg/mL dan 20 mg/mL sementara pada konsentrasi 25 mg/mL didapatkan hasil tidak berbeda signifikan terhadap kontrol positif. Konsentrasi 25 mg/mL terhadap konsentrasi 15 mg/mL didapatkan hasil yang berbeda signifikan, untuk konsentrasi 25 mg/mL terhadap 20 mg/mL serta 20 mg/mL terhadap 15 mg/mL hasil yang didapatkan tidak berbeda signifikan. Pada etil asetat perbedaan yang signifikan terdapat pada kontrol positif terhadap semua konsentrasi dan konsentrasi 25 mg/mL terhadap konsentrasi 15 mg/mL, sementara konsentrasi 25 mg/mL terhadap 20 mg/mL serta 20 mg/mL terhadap 15 mg/mL hasil yang didapatkan tidak berbeda signifikan. Sedangkan

pada partisi air didapatkan perbedaan signifikan hanya terdapat pada kontrol positif terhadap semua konsentrasi.

Dari penelitian yang dilakukan, ekstrak etanol, partisi etil asetat, dan partisi air didapatkan bahwa konsentrasi yang digunakan memiliki perbedaan zona hambat yang signifikan terhadap zona hambat kontrol positif. Sedangkan pada n-heksan konsentrasi 25 mg/mL didapatkan tidak berbeda signifikan terhadap klindamisin 10%. Dari ketiga konsentrasi yang digunakan diperoleh bahwa yang memiliki hambatan dikategori kuat adalah konsentrasi 25 mg/mL pada ekstrak dengan diameter hambat $12,11 \pm 0,40$ mm dan partisi n-heksan dengan diameter $12,57 \pm 0,60$ mm. Namun, hambatan yang dihasilkan tidak lebih besar dari zona hambat dari kontrol positif.

Dari hasil penelitian Mukhriani, dkk (2016), ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus* Burm f.) memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa mikroba 63entawai seperti *Escherchia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio colera*. Hal yang sama juga pada penelitian ini, dimana ekstrak dan partisi daun anak dara didapatkan memiliki aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian uji aktivitas antibakteri hasil partisi ekstrak etanol 96% daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) terhadap *Propionibacterium acnes*, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Ekstrak etanol, partisi n-heksan, dan partisi etil asetat daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) memiliki aktivitas penghambatan terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* pada konsentrasi 15 mg/mL, 20 mg/mL, dan 25 mg/mL.
2. Daun anak dara memperoleh hambatan yang kuat yaitu pada ekstrak etanol dan partisi n-heksan dikonsentrasi 25 mg/mL dengan hambatan sebesar $12,11 \pm 0,40$ mm dan $12,57 \pm 0,63$ mm. Hasil analisis data menggunakan *one-way* ANOVA tukey ($\text{sig} < 0.05$) diketahui, konsentrasi 25 mg/mL pada partisi n-heksan tidak terdapat perbedaan signifikan (*non significant*) terhadap klindamisin 10%, sedangkan pada ekstrak etanol didapatkan adanya perbedaan signifikan terhadap kontrol positif.

B. Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dari ekstrak dan partisi daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) untuk mengetahui nilai KHM dan KBM daun anak dara dalam menghambat bakteri *Propionibacterium acnes*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. M. (2003). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5. In bin M. Abdullah (Ed.), *Pustaka Imam Asy-Syaf'i*© (pp. 44–45).
- Abdullah, B. M. (2004). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6. In Abdullah Bin Muhammad (Ed.), *Pustaka Imam Asy-Syaf'i*.
- Agustina Harahap, R. (2020). Farmasi Dalam Perspektif Islam. In *CV. Manhaji*.
- Anggraeni Putri, P., Chatri, M., & Advinda, L. (2023). Characteristics of Saponin Secondary Metabolite Compounds in Plants Karakteristik Saponin Senyawa Metabolit Sekunder pada Tumbuhan. *Serambi Biologi*, 8(2), 2023.
- Artati dan Moh Oman, D. (2019). Identifikasi Bakteri Melalui Penggunaan KIT Analytical Profile Index (API) 20E. *Buletin Teknik Litkayasa Akuakultur*, 17(2), 149–153.
- Asril, M., Mahyarudin, Rini, I. A., Junairah, A. N., Hidyah, N., Fatiha, L. A., Ikerismawati, W. L. S., & Novianto, E. D. (2024). Bioteknologi Senyawa Antimikroba. In *Yayasan Kita Menulis*.
- Asworo, R. Y., & Widwiastuti, H. (2023). Pengaruh Ukuran Serbuk Simplisia dan Waktu Maserasi terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Sirsak. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*, 3(2). <https://doi.org/10.37311/ijpe.v3i2.19906>
- Awainah, N. (2016). *Standarisasi Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (Croton oblongus Burm F.)*.
- Ayu Lestari, D., & Qonitah, F. (2023). Uji Antibakteri Fraksi N-Heksana, Etil Asetat, Dan Air Ekstrak Etanol Daun Jeruk Purut Terhadap Propionibacterium Acnes. *Journal of Pharmaceutical Science and Medical Research*, 6(1), 35–45. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/pharmed>
- Azhari, Mutia, N., & Ishak. (2020). Proses Ekstraksi Minyak dari Biji Pepaya (Carica papaya) dengan Menggunakan Pelarut n-heksana. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*.
- Azzahra, F., Wiastuti, A., & Rusmadi, R. (2023). Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Etil Asetat dan n-Heksan Daun Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis. In *Indonesian Journal of Pharmaceutical Sciences and Clinical Research (IJPSCR)* (Vol. 1, Issue 1).
- Candra, L. M. M., Andayani, Y., & Wirasisya, D. G. (2021). Pengaruh Metode Ekstraksi Terhadap Kandungan Fenolik Total dan Flavonoid Total Pada Ekstrak Etanol Buncis (Phaseolus vulgaris L.). *Jurnal Pijar Mipa*, 16(3), 397–405. <https://doi.org/10.29303/jpm.v16i3.2308>
- Caroline. R., & Tindale. M. (1993). *Flora of The Sidney Region Reed*.

- Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. (2019). Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus mauritiana* L.) sebagai Sumber Saponin Effect of Temperature and Maseration Time on Characteristics of Bidara Leaf Extract (*Ziziphus mauritiana* L.) as Saponin Source. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*.
- Dalimartha, S. (2006). Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 4. In *Puspa Swara*.
- Ditjen POM. (2020). Farmakope Indonesia Edisi VI. In *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia* (6th ed.).
- Faradisa, E., & Fakhruddin, A. (2021). Beberapa Tumbuhan Obat di Dalam Alquran Ditinjau Dari Perspektif Sains. In *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* (Vol. 3, Issue 1). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/66entawai66>
- Fitriani, T., Nashihah, S., Muhammadiyah Banjarmasin, U., Kalimantan, B., & Korespondensi, S. (2021). Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Rambai (*Sonneratia caseolaris* (L) Engl) terhadap Bakteri *Propionibacterium acnes* dan *Staphylococcus epidermidis* Artikel Penelitian. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 13.
- Ghanaim Fasya, A., Purwaning Tyas, A., Annisaul Mubarakah, F., Ningsih, R., & Dwi Ridhowati Madjid, A. (2018). Variasi Diameter Kolom dan Rasio Sampel-Silika pada Isolasi Steroid dan Triterpenoid Alga Merah *Eucheuma cottonii* dengan Kromatografi Kolom Basah. *ALCHEMY: JOURNAL OF CHEMISTRY*.
- Gina Inggriyani, C. (2022). Histologi Reseptor Sensoris Kulit. *Jurnal Sinaps*, 5(3), 10–17.
- Goeswin Agoes. (2009). Teknologi Bahan Alam. In *Penerbit ITB* (p. 31).
- Haeria, sukri, & Rusdi, M. (2016). Fraksinasi dan Identifikasi Senyawa Ekstrak n-heksan Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.). *Majalah Farmasi*, 2(1), 13–16.
- Hana Putri Gerung, W., & Antasionasti, I. (2021). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Belimbing Botol (*Averrhoa Bilimbi* L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Propionibacterium acne* Penyebab Jerawat. *Pharmacon*, 10.
- Harbone, J. B. (1998). Phytochemical Methods. In *Chapman and Hall* (Third Edition).
- Haryoto, H., Frista, A., Achmad Yani Tromol Pos, J., Kartasura, P., Tengah, J., & Sains dan Kesehatan, J. (2019). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol, Fraksi Polar, Semipolar dan Non Polar dari Daun Mangrove Kacangan (*Rhizophora 66entawai66*) dengan Metode DPPH dan FRAP. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 2(2). <https://doi.org/10.25026/jsk.v2i2.129>

- Herdiana, I., & Aji, N. (2020). Fraksinasi Ekstrak Daun Sirih dan Ekstrak Gambir serta Uji Antibakteri *Streptococcus mutans*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 19. <https://doi.org/10.33221/jikes.v19io3.580>
- Hikmah, F., Hasanah, N., Program, 1, Farmasi, S., Tinggi, S., Kesehatan, I., Dharma, W., & Tangerang, H. (2023). Uji Hambat Aktivitas Bakteri *Propionibacterium acnes* Terhadap Ekstrak Etanol Rimpang Lengkuas Merah (*Alpinia purpurata* (K.) Schum). *Jurnal Medika Udayana*, 12(1), 2023. <https://doi.org/10.24843.MU.2023.V12.i1.P13>
- Ikenganyia, E., Anikwe, M., Omeje, T., & Adinde, J. (2017). Plant Tissue Culture Regeneration and Aseptic Techniques. *Asian Journal of Biotechnology and Bioresource Technology*, 1(3), 1-6. <https://doi.org/10.9734/ajb2t/2017/31724>
- Ilham Kurniawan, & Zahra, H. (2021). Review: Gallotannins; Biosynthesis, Structure Activity Relationship, Anti-inflammatory and Antibacterial Activity. *Current Biochem*, 8(1), 1-16.
- Iriani, R., & Noor Elfa, dan. (2017). Penggunaan Kitin Sebagai Alternatif Fase Diam Kromatografi Lapis Tipis Dalam Praktikum Kimia Organik. *Jurnal Vidya Karya*.
- Irianto. (2006). Mikrobiologi : Menguak Dunia Mikroorganisme Jilid 2. In *CV. Yrama Widya*.
- Irjayanti, A., Wambrauw, A., Wahyuni, I., & Maranden, A. A. (2023). Personal Hygiene with the Incidence of Skin Diseases. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12(1), 169-175. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v12i1.926>
- Istini. (2020). Pemanfaatan Plastik Polipropilen Standing Pouch Sebagai Salah Satu Kemasan Sterilisasi Peralatan Laboratorium. *INDONESIAN JOURNAL OF LABORATORY*, 2(3), 41-46.
- Jawetz, Melnick, & Adelberg's. (2015). Medical Microbiology. In *Mc Graw Hill Education*.
- Kemenag. (2011). Tumbuhan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains (Tafsir 'Ilmi). In *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- Madelina, W., & Sulistyaningsih, D. (2018). Review: Resistensi Antibiotik Pada Terapi Pengobatan Jerawat. *Farmaka*.
- Mardjan, & Abrori. (2016). Pengobatan Komplementer Holistik Modern. In *Mujahid Press Bandung*.
- Masud, F., & Puspitasari. (2017). Studi Pendahuluan Ekstraksi Bertingkat Minyak Biji Mangga Arumanis (*Mangifera Indica*) Menggunakan Pelarut N-Heksan dan Etanol. *Journal Intek*.
- McFarland. (2002). McFarland Standard Catalogue No. TM50-TM60. *Biologicals, D*.

- Mierziak, J., Kostyn, K., & Kulma, A. (2014). Flavonoids as important molecules of plant interactions with the environment. In *Molecules* (Vol. 19, Issue 10, pp. 16240–16265). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/molecules191016240>
- Mirwan, A. (2013). Keberlakuan Model HB-GFT Sistem n-Heksana-Mek-Air Pada Ekstraksi Cair-Cair Kolom Isian. *Konversi*, 2(1).
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan*, VII.
- Muthmainnah, B. (2019). Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Sekunder Dari Ekstrak Etanol Buah Delima (*Punica granatum L.*) Dengan Metode Uji Warna. *Media Farmasi*, 13(2), 36. <https://doi.org/10.32382/mf.v13i2.880>
- Nabila, R., & Bhakti Purnamasari, C. (2021). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii blume*) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Porphyromonas gingivalis* DENGAN METODE DISC DIFFUSION. In *J. Ked. Mulawarman* (Vol. 8, Issue 2).
- Ni Wayan Desi Bintari, Ms., Noor Andryan Ilsan, Ms., Istyanto, F., Rochmanah Suhartati, M., Ratih Kartika Dewi, Ms., Biomed Zuraida, M., Herlina, M., Maulin Ingraini, Mk., Seftiwan Pratami, Ms., Jumriah Nur, Ms., Doni Setiawan, Ms., Biotek Dian Rachma Wijayanti, M., & Fitriani Safari, W. (2023). Bakteriologi Untuk Mahasiswa Kesehatan. In *PT. Masagena Mandiri Medica*.
- Ningrum, R., Purwati, E., & Sukarsono. (2016). Identifikasi Senyawa Alkaloid Dari Batang Karamunting (*Rhodomyrtus tomentosa*) Sebagai Bahan Ajar Biologi Untuk SMA Kelas X. *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia*, 2.
- Noviyanty, Y., & Febrianti, R. (2022). Fraksinasi Dan Skrinning Fraksi Ekstrak Etanol Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten) Steenis) Dengan Menggunakan Metode Kromatografi Lapi Tipis. *Jurnal Ilmiah Pharmacy*, 9(2), 2406–2807.
- Pagarra, H., Biologi, J., & Biologi, P. (2022). Analisis Fitokimia dan Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus* Phytochemical Analysis and Effect of Ethanol Extract of Javanese Wood Leaves (*Lannea coromandelica*) on the Growth of *Staphylococcus aureus* Bacteria. *Jurnal Sainsmat*, XI(2), 135–143. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/sainsmat>
- Peate, I., & Nair, M. (2018). *Anatomy and Physiology for Nurses at a Glance*. In *Penerbit Erlangga*.
- Pertiwi, D., Khotimah, S., Rusmiyanto Pancaning Wardoyo, E., Hadari Nawawi, J. H., & Barat, K. (2023). Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Metanol, Etil Asetat, dan N-Heksana Rimpang Lengkuas Merah (*Alpinia purpurata*, K. Schum) terhadap Bakteri *Propionibacterium acnes*. *Protobiont*, 12(1), 1–8.

- Rahmah, A. F., Arma, U., Lestari, C., Edrizal, E., & Zia, H. K. (2024). Uji zona hambat ekstrak 69entawai teripang putih (69entawai69an scabra) 69entawai terhadap *Streptococcus sanguinis* pada Stomatitis Aftosa Rekuren secara in vitro: studi eksperimental. *Padjadjaran Journal of Dental Researchers and Students*, 8(1), 71. <https://doi.org/10.24198/pjdrs.v8i1.52551>
- Rahmatiyah, Fitriani, N., & Prasetyo, A. (2023). Uji Antibakteri Ekstrak Daun Sirih Hitam (*Piper betle* L. var. *Nigra*) Terhadap Bakteri *Propionibacterium Acnes*. *Journal of Educational and Cultural Studies*, 2, 129–132.
- Rahmawati, D. (2021). Mikrobiologi Farmasi Dasar-Dasar Mikrobiologi untuk Mahasiswa Farmasi. In *Pustaka Baru Press*.
- Ridwan, I., Meylin, Puspitasari, R., Dewi, D. R., & Ghozali, M. (2015). Pembuatan Biodiesel dengan Proses Ekstraksi Reaktif dari Ampas Perasan Kelapa. *Jurnal Fluida*, 11.
- Rollando. (2019). Senyawa Anti Bakteri dari Fungi Endofit. In *Seribu Bintang* (1st ed.).
- Sa`adah, H., Supomo, & Musaenah. (2020). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Air Kulit Bawang Merah (*Allium cepa* L.) Terhadap Bakteri *Propionibacterium acnes*. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, 2(2), 2020.
- Salim, B. H., & Said, B. H. (2006). Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6. In *PT. Bina Ilmu*.
- Samejo, M. Q., Memon, S., Bhangar, M. I., & Khan, K. M. (2013). Isolation and characterization of steroids from *Calligonum polygonoides*. *Journal of Pharmacy Research*, 6(3), 346–349. <https://doi.org/10.1016/j.jopr.2013.03.017>
- Sanjaya, G. R. W., Linawati, N. M., Arijana, I. G. K. N., Wahyuniari, I. A. I., & Wiryawan, I. G. N. S. (2023). Flavonoid dalam Penyembuhan Luka Bakar pada Kulit. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 5(2). <https://doi.org/10.25026/jsk.v5i2.1247>
- Sari, R., Apridamayanti, P., & Pratiwi, L. (2022a). Efektivitas SNEDDS Kombinasi Fraksi Etil Asetat Daun Cengkodok (*Melastoma malabathricum*)-Antibiotik terhadap Bakteri Hasil Isolat dari Pasien Ulkus Diabetik. *Pharmaceutical Journal Of Indonesia 2022*, 7(2), 105–114. <http://.pji.ub.ac.id>
- Sari, R., Apridamayanti, P., & Pratiwi, L. (2022b). Efektivitas SNEDDS Kombinasi Fraksi Etil Asetat Daun Cengkodok (*Melastoma malabathricum*)-Antibiotik terhadap Bakteri Hasil Isolat dari Pasien Ulkus Diabetik. In *Pharmaceutical Journal Of Indonesia 2022* (Vol. 7, Issue 2). <http://.pji.ub.ac.id>
- Shihab M. (2002). Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Jilid 7. In *Penerbit Lentera Hati*.

- Shihab, Moh. Quraish. (2002). Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Jilid 10. In *Penerbit Lentera Hati* (Vol. 15). Lentera Hati.
- Sifatullah, N. (2021). Jerawat (Acne vulgaris): Review Penyakit Infeksi Pada Kulit. *Jurnal UIN Alauddin*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb>
- Soemarie, Y. B., Apriliana, A., Indriastuti, M., Fatimah, N., Wijaya, H., & Samarinda, A. F. (2018). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etano Daun Glodokan Tiang (Polyalthia longifolia S.) Terhadap Bakteri Propionibacterium acnes Antibacterial Activity of Ethanol Extract of Glodokan Tiang Leaves (Polyalthia longifolia S.) Against Propionibacterium acnes bacteria. In *JFL Jurnal Farmasi Lampung* (Vol. 7, Issue 1).
- Susila Ningsih, I., Chatri, M., & Advinda, L. (2023). Flavonoid Active Compounds Found In Plants Senyawa Aktif Flavonoid yang Terdapat Pada Tumbuhan. *Serambi Biologi*, 8(2), 2023.
- Toy, T. S. S., Lampus, B. S., Hutagalung, B. S. P., Program, K. S., Pendidikan, S., Gigi, D., Kedokteran, F., Masyarakat, B. I., Studi, P., Dokter, P., Fakultas, G., Universitas, K., & Manado, S. R. (2015). Uji Daya Hambat Ekstrak Rumput Laut Gracilaria SP Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus Aureus. *Jurnal E-GiGi (EG)*, 3(1).
- Tutik, Saputri, G. A. R., & Lisnawati. (2022). Perbandingan Metode Maserasi, Perkolasi dan Ultrasonik Terhadap Aktivitas Antioksidan Kulit Bawang Merah (Allium cepa L.). *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 9.
- Vifta, R. L., & Advistasari, Y. D. (2018). Skrining Fitokimia, Karakterisasi, dan Penentuan Kadar Flavonoid Total Ekstrak dan Fraksi-Fraksi Buah Parijoto (Medinilla speciosa B.) Pytochemical Screening, Characterization, and Determination of Total Flavonoids Extracts and Fractions of Parijoto Fruit (Medinilla speciosa B.). *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 1.
- Wulan Kusumo, D., Kusuma Ningrum, E., & Hayu Adi Makayasa, C. (2022). Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Sekunder Pada Ekstrak Etanol Bunga Pepaya (Carica papaya L.) (Phytochemical Screening of Secondary Metabolites in Papaya Flowers / Carica papaya L.). *Journal Of Current Pharmaceutical Sciences*, 5(2), 2598–2095.
- Wulandari, S., Sholihatun Nisa, Y., Indarti, S., & Rr Rahmi Sri Sayekti, dan. (2021). Sterilisasi Peralatan Dan Media Kultur Jaringan. In *Agrinova: Journal of Agrotechnology Innovation* (Vol. 4, Issue 2). <https://jurnal.ugm.ac.id/Agrinova/>
- Yanti, F., & Rosmania. (2020). Perhitungan jumlah bakteri di Laboratorium Mikrobiologi menggunakan pengembangan metode Spektrofotometri. *Jurnal Penelitian Sains*, 22(2), 76–86. <http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/index>
- Yolla Arinda, N. F., Arfiana Nurul Fatimah, V., Shabrina Fitri, A., & Arinda Nur Fitriana, Y. (2019). Aktivitas Anti Bakteri Daun Sirih: Uji Ekstrak KHM

(Kadar Hambat Minimum) dan KBM (Kadar Bakterisidal Minimum). *SAINTEKS*, 16(2).

Yusuf, V. A., Nurbaiti, N., & Octavira Permatasari, T. (2020). Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Pelajar Sekolah Menengah Atas Tentang Acne Vulgaris Pada Wajah Dengan Perilaku Pengobatannya. *Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan*.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/2597>.


Zahrah, H., Mustika, A., & Debora, K. (2018). Aktivitas Antibakteri dan Perubahan Morfologi dari *Propionibacterium acnes* Setelah Pemberian Ekstrak *Curcuma xanthorrhiza*. In *Jurnal Biosains Pascasarjana* (Vol. 20, Issue 3).


Zhang, Q. Y., Yan, Z. Bin, Meng, Y. M., Hong, X. Y., Shao, G., Ma, J. J., Cheng, X. R., Liu, J., Kang, J., & Fu, C. Y. (2021). Antimicrobial peptides: mechanism of action, activity and clinical potential. In *Military Medical Research* (Vol. 8, Issue 1). BioMed Central Ltd. <https://doi.org/10.1186/s40779-021-00343-2>


Zulaika Harissya, N., dr Anggi Setiorini, Mk., & Muji Rahayu, A. (2023). Ilmu Biomedik Untuk Perawat. In *CV.EUREKA MEDIA AKSARA*.


LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja Alur Penelitian





Lampiran 2. Skema Kerja Ekstraksi Daun Anak Dara

Lampiran 3. Skema Kerja Skrining Fitokimia

Lampiran 4. Skema Kerja Partisi Cair-Cair Ekstrak Daun Anak Dara

**Lampiran 5. Skema Kerja Pembuatan Larutan Uji Aktivitas Antibakteri
Daun Anak Dara**



Lampiran 6. Skema Kerja Pengujian Aktivitas Antibakteri

Lampiran 7. Perhitungan

1. Perhitungan Rendamen Ekstrak

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{Berat Ekstrak}}{\text{Berat Simplisia}} \times 100\% \\ &= \frac{13,37}{200 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 6,68\% \end{aligned}$$

2. Perhitungan larutan uji

Dibuat larutan uji dalam 3 ml

a. 15 mg/mL

$$\frac{15 \text{ mg}}{1 \text{ mL}} = \frac{x}{3 \text{ mL}}$$

$$x = 15 \text{ mg} \times 3$$

$$x = 45 \text{ mg}$$

b. 20 mg/mL

$$\frac{20 \text{ mg}}{1 \text{ mL}} = \frac{x}{3 \text{ mL}}$$

$$x = 20 \text{ mg} \times 3$$

$$x = 60 \text{ mg}$$

c. 25 mg/mL

$$\frac{25 \text{ mg}}{1 \text{ mL}} = \frac{x}{3 \text{ mL}}$$

$$x = 25 \text{ mg} \times 3$$

$$x = 75 \text{ mg}$$

d. DMSO 10% = $\frac{10}{100} \times 3 \text{ mL} = 0,3 \text{ mL}$

$$= 300 \mu\text{L}$$


e. Klindamisin 10% = $\frac{10}{100} \times 3 \text{ mL} = 0,3 \text{ g}$

$$= 300 \text{ mg}$$


Lampiran 8. Dokumentasi



Gambar 9. Preparasi sampel (a) Pengambilan sampel (b) pencucian sampel
(c) Pengeringan sampel




Gambar 10. Ekstraksi (a) Maserasi (b) Pemekatan Ekstrak



Gambar 11. Skrinning Fitokimia (a) Blangko (b) Alkaloid (c) Flavonoid (d) tannin (e) Steroid (f) Saponin




Gambar 12. Partisi



Gambar 13. Persiapan pengujian (a) Sterilisasi (b) Inokulasi Bakteri (c) Suspensi Bakteri



Gambar 13. Pengujian



Gambar 14. Hasil Pengujian (A) Ekstrak etanol (B) n-heksan (C) Etil Asetat (D) Air

Lampiran 9. Tabel Anova

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Ekstrak_Etanol	Between Groups	181.800	3	60.600	41.001	.000
	Within Groups	11.824	8	1.478		
	Total	193.624	11			
Partisi_Nheksan	Between Groups	203.437	3	67.812	21.376	.000
	Within Groups	25.379	8	3.172		
	Total	228.816	11			
Partisi_Etil	Between Groups	330.215	3	110.072	151.812	.000
	Within Groups	5.800	8	.725		
	Total	336.015	11			
Partisi_Air	Between Groups	690.376	3	230.125	707.624	.000
	Within Groups	2.602	8	.325		
	Total	692.977	11			

Gambar 15. Tabel ANOVA

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Tukey HSD

Dependent Variable	(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Ekstrak_Etanol	Konsentrasi 15mg/ml	Konsentrasi 20mg/ml	-2.09667	.99265	.228	-5.2755	1.0821
		Konsentrasi 25mg/ml	-5.73000*	.99265	.002	-8.9088	-2.5512
		Kontrol positif	-10.25000*	.99265	.000	-13.4288	-7.0712
	Konsentrasi 20mg/ml	Konsentrasi 15mg/ml	2.09667	.99265	.228	-1.0821	5.2755
		Konsentrasi 25mg/ml	-3.63333*	.99265	.026	-6.8121	-.4545
		Kontrol positif	-8.15333*	.99265	.000	-11.3321	-4.9745
	Konsentrasi 25mg/ml	Konsentrasi 15mg/ml	5.73000*	.99265	.002	2.5512	8.9088
		Konsentrasi 20mg/ml	3.63333*	.99265	.026	.4545	6.8121
		Kontrol positif	-4.52000*	.99265	.008	-7.6988	-1.3412
	Kontrol positif	Konsentrasi 15mg/ml	10.25000*	.99265	.000	7.0712	13.4288
		Konsentrasi 20mg/ml	8.15333*	.99265	.000	4.9745	11.3321
		Konsentrasi 25mg/ml	4.52000*	.99265	.008	1.3412	7.6988

Partisi_Nheksan	Konsentrasi 15mg/ml	Konsentrasi 20mg/ml	-2.79333	1.45427	.292	-7.4504	1.8637
		Konsentrasi 25mg/ml	-6.99333*	1.45427	.006	-11.6504	-2.3363
		Kontrol positif	-10.83667*	1.45427	.000	-15.4937	-6.1796
	Konsentrasi 20mg/ml	Konsentrasi 15mg/ml	2.79333	1.45427	.292	-1.8637	7.4504
		Konsentrasi 25mg/ml	-4.20000	1.45427	.078	-8.8571	.4571
		Kontrol positif	-8.04333*	1.45427	.002	-12.7004	-3.3863
	Konsentrasi 25mg/ml	Konsentrasi 15mg/ml	6.99333*	1.45427	.006	2.3363	11.6504
		Konsentrasi 20mg/ml	4.20000	1.45427	.078	-.4571	8.8571
		Kontrol positif	-3.84333	1.45427	.110	-8.5004	.8137
	Kontrol positif	Konsentrasi 15mg/ml	10.83667*	1.45427	.000	6.1796	15.4937
		Konsentrasi 20mg/ml	8.04333*	1.45427	.002	3.3863	12.7004
		Konsentrasi 25mg/ml	3.84333	1.45427	.110	-.8137	8.5004
Partisi_Etil	Konsentrasi 15mg/ml	Konsentrasi 20mg/ml	-1.88667	.69525	.100	-4.1131	.3398
		Konsentrasi 25mg/ml	-3.61667*	.69525	.004	-5.8431	-1.3902
		Kontrol positif	-13.58333*	.69525	.000	-15.8098	-11.3569
	Konsentrasi 20mg/ml	Konsentrasi 15mg/ml	1.88667	.69525	.100	-.3398	4.1131
		Konsentrasi 25mg/ml	-1.73000	.69525	.137	-3.9564	.4964
		Kontrol positif	-11.69667*	.69525	.000	-13.9231	-9.4702
	Konsentrasi 25mg/ml	Konsentrasi 15mg/ml	3.61667*	.69525	.004	1.3902	5.8431
		Konsentrasi 20mg/ml	1.73000	.69525	.137	-.4964	3.9564
		Kontrol positif	-9.96667*	.69525	.000	-12.1931	-7.7402
	Kontrol positif	Konsentrasi 15mg/ml	13.58333*	.69525	.000	11.3569	15.8098
		Konsentrasi 20mg/ml	11.69667*	.69525	.000	9.4702	13.9231
		Konsentrasi 25mg/ml	9.96667*	.69525	.000	7.7402	12.1931
Partisi_Air	Konsentrasi 15mg/ml	Konsentrasi 20mg/ml	.00000	.46562	1.000	-1.4911	1.4911
		Konsentrasi 25mg/ml	.00000	.46562	1.000	-1.4911	1.4911
		Kontrol positif	-17.51667*	.46562	.000	-19.0078	-16.0256
	Konsentrasi 20mg/ml	Konsentrasi 15mg/ml	.00000	.46562	1.000	-1.4911	1.4911
		Konsentrasi 25mg/ml	.00000	.46562	1.000	-1.4911	1.4911
		Kontrol positif	-17.51667*	.46562	.000	-19.0078	-16.0256
	Konsentrasi 25mg/ml	Konsentrasi 15mg/ml	.00000	.46562	1.000	-1.4911	1.4911
		Konsentrasi 20mg/ml	.00000	.46562	1.000	-1.4911	1.4911
		Kontrol positif	-17.51667*	.46562	.000	-19.0078	-16.0256
	Kontrol positif	Konsentrasi 15mg/ml	17.51667*	.46562	.000	16.0256	19.0078
		Konsentrasi 20mg/ml	17.51667*	.46562	.000	16.0256	19.0078
		Konsentrasi 25mg/ml	17.51667*	.46562	.000	16.0256	19.0078

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Ekstrak_Etanol

Tukey HSD^a

Kelompok	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Konsentrasi 15mg/ml	3	6.3833		
Konsentrasi 20mg/ml	3	8.4800		
Konsentrasi 25mg/ml	3		12.1133	
Kontrol positif	3			16.6333
Sig.		.228	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Partisi_Nheksan

Tukey HSD^a

Kelompok	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Konsentrasi 15mg/ml	3	5.5800		
Konsentrasi 20mg/ml	3	8.3733	8.3733	
Konsentrasi 25mg/ml	3		12.5733	12.5733
Kontrol positif	3			16.4167
Sig.		.292	.078	.110

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Partisi_Etil

Tukey HSD^a

Kelompok	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Konsentrasi 15mg/ml	3	4.8667		
Konsentrasi 20mg/ml	3	6.7533	6.7533	
Konsentrasi 25mg/ml	3		8.4833	
Kontrol positif	3			18.4500
Sig.		.100	.137	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Partisi_Air

Tukey HSD^a

Kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
Konsentrasi 15mg/ml	3	.0000	
Konsentrasi 20mg/ml	3	.0000	
Konsentrasi 25mg/ml	3	.0000	
Kontrol positif	3		17.5167
Sig.		1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Lampiran 10. Surat Izin Kode Etik


KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210066564, E-mail: kepik_fkik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.A.085/KEPK/FKIK/V/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Nurul Gufranah Ali
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAN PARTISI DAUN ANAK DARA
(*Croton oblongus* Burm F) TERHADAP *Propionibacterium acnes*"


"TESTING FOR ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PARADISE LEAF EXTRACT AND
PARTITION (*Croton oblongus* Burm F) AGAINST *Propionibacterium acnes*"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2061, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2066. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2061 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2066 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.


Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025.

This declaration of ethics applies during the period May 08, 2024 until May 08, 2025.

May 08, 2024
 Prof. and Chairperson,

 Apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si.



BIOGRAFI PENULIS



Nurul Gufranah Ali adalah nama lengkap dari penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 03 Mei 2002 di Polmas, Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak 1 dari 3 bersaudara dari bapak Ali Azis dan ibu Hj. ST. Zakiyah Dumair. Penulis pertama kali masuk pendidikan TK pada 2005 di Yayasan Kemala Bhayangkari di Majene, SD pada tahun 2008 di SD Negeri 2 Majene, dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis mendaftar sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Majene. Dan setelah tamat SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Majene. Setelah lulus SMA, untuk melanjutkan Pendidikan penulis mengikuti beberapa Ujian masuk perguruan tinggi, dan puji Syukur penulis berhasil diterima sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan dengan program studi Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR