

PENGALAMAN BABY BLUES SYNDROME PADA IBU POSTPARTUM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan

Program Studi Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh ;

ST. NAMIRAH NURFADILLAH

NIM : 70300119031

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2023

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Namirah Nurfadillah

NIM : 70300119031

Tempat/Tgl Lahir : Sungguminasa, 03 Juni 2000

Jurusan : Keperawatan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : BTN Pao-Pao permai B13/3

Judul : Pengalaman Baby Blues Syndrome pada Ibu Post Partum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 26 Juni 2023



Penulis, St. Namirah Nurfadillah
NIM: 70300119031

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pengalaman Baby Blue Syndrome pada Ibu Post Partum" yang disusun oleh St. Namirah Nurfadillah, NIM: 70300119031, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 7 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 7 Juli 2023 M
18 Dzulhijjah 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Hj. Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep. J	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Barsihannor, M.A	(.....)
Pembimbing I	: Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep. J	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Risnah, SKM., S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 198007012006042002

M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengalaman *Baby Blues Syndrome* pada Ibu Post Partum”. Penyusunan skripsi ini merupakan suatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan (S1) pada program studi S1 Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak masukan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berperan penting dan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan berbesar hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya terkhusus kepada orangtua saya tercinta yaitu Bpk. Ridwan., S.pd., M.M dan Ibunda Hj. Herlina Hafied serta suami saya tercinta Rahmat S.Kom dan putra saya Mochammed Zhafran Al-Zidane RA dan Ahmad Zulfikar Izzan Razzaq RA yang telah memberikan saya pembelajaran dan mengenalkan saya akan tujuan hidup yang sesungguhnya dan ketiga kakak yang saya sayangi, Muhammad Rahmat Hidayatullah.,S.Kom, Sriwahyuni., S.Kep dan Muhammad Giffari Nur-HaQ., S.Pd. Tak lupa juga dengan sahabat-sahabat saya yang senantiasa mendoakan, memberikan nasehat dan dorongan serta telah banyak berkorban agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik, semoga Allah SWT membalasnya dengan Rahmat, Rahim, Keberkahan yang melimpah dan juga kebahagiaan hidup dan dunia akhirat.

Selain itu ucapan terimakasih sebesar-besarnya, penghormatan serta penghargaan paling tinggi disampaikan kepada :

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta segenap pegawai akademik yang telah berkontribusi mengelola serta mengurus pada

bagian administrasi dan memberi pelayanan kepada penulis semasa menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Dr. Muh.Anwar Hafid, S.Kep.,M.Kes sebagai Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan dan Hasnah,S.Sit.,M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, serta ikhlas dan kesabarannya dalam memberi bimbingan, semangat, gagasan, serta motivasi selama bimbingan pada penulis saat menjalani pendidikan di Jurusan Keperawatan.
4. Hj. Syisnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J selaku Pembimbing I, dan Dr. Risnah, S.KM.,S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta membina penulis dengan setulus hati sampai proposal ini dapat diselesaikan.
5. Kepala Puskesmas Samata Kabupaten Gowa serta perawat penanggung jawab dan bidan penanggung jawab yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis.
6. Kepada seluruh dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Ilmu Keperawatan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama proses belajar.
7. Kepada sahabat saya Masyita Fajriati, Tarisya Reski Andriani,Raden Sri Hasrianti, Nurbina Arifuddin dan Yulianti Wulandari selama masa perkuliahan yang mungkin tanpa kehadirannya penulis tidak dapat memiliki kenangan indah di kampus Peradaban. Terimakasih sahabatku, sungguh rejeki yang luar biasa karena telah bertemu denganmu merajut asah dan segala mimpi di empat tahun perkuliahan kita.
8. Kepada kakanda senior, Nadia Hamrawati H., S.Kep, Amalia Putri Abuba., S.Kep.,Ns. yang telah dengan senang hati memberikan support dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh sahabat di Angkatan 119amen (Keperawatan 2019) yang telah memberikan semangat dan kenangan indah di masa-masa perkuliahan.


10. Kepada seluruh keluarga besar HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual, pengalaman yang luar biasa, dan cerita yang sangat mengesankan.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu-persatu yang telah banyak mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian proposal ini.

Akhir kata yang penulis ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya untuk keperawatan jiwa. Aamiinn.

Gowa, 01 Juli 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PENGALAMAN BABY BLUES SYNDROME PADA IBU POSTPARTUM	1
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	11
A. Latar Belakang	11
B. Rumusan Masalah	18
C. Kajian Pustaka.....	19
D. Tujuan Penelitian	27
E. Manfaat Penelitian	27
BAB II.....	28
A. Baby Blues Syndrome.....	28
1. Pengertian Baby Blues Syndrome.....	28
2. Waktu dan durasi baby blues syndrome	32
3. Gejala-gejala baby blues syndrome.....	33
4. Penyebab terjadinya baby blues syndrome	35
5. Akibat dari baby blues syndrome.....	37
6. Penanganan baby blues syndrome	38
B. Postpartum (Masa Nifas).....	43
1. Pengertian Postpartum (Masa Nifas)	43
2. Tujuan Asuhan Postpartum (Masa Nifas).....	45
3. Adaptasi psikologi ibu pada masa nifas	46
4. Kategori gangguan psikologis ibu pasca partum	47
5. Kebutuhan dasar ibu postpartum.....	49
6. Gravidita.....	53
C. Model Konsep Keperawatan Cheryl Tatano Beck (Postpartum Depression Theory)	55
1. Definisi depresi postpartum	55
2. Faktor-Faktor Depresi Postpartum.....	56
3. Aspek Perawatan Depresi Postpartum	57

BAB III	59
A. Desain Penelitian.....	59
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	60
C. Populasi dan Sampel	60
1. Populasi.....	60
2. Sampel.....	60
D. Pengumpulan Data	62
1. Sumber Data.....	62
2. Metode Pengumpulan Data.....	62
3. Proses Dan Prosedur Penelitian	64
E. Analisa Data.....	68
F. Instrumen Penelitian.....	69
G. Etika Penelitian	69
1. Lembar persetujuan.....	69
2. <i>Anonimity</i>	70
3. <i>Confidentiality</i>	70
4. Otonomy	71
H. Uji keabsahan Data	71
1) <i>Credibility</i> (Validitas Internal).....	72
2) Uji <i>Transferability</i>	73
3) Uji <i>Depandability</i>	72
4) Uji <i>Konfirmability</i>	73
BAB IV	75
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
1. Puskesmas Samata	75
2. Kondisi Geografis	76
5. Visi.....	76
6. Misi.....	76
7. Karakteristik Informan.....	76
B. Hasil Penelitian	77
Tema I; Perasaan, Perilaku dan Fikiran ibu yang mengalami <i>Baby Blues Syndrome</i>	78

Tema II; Penyebab terjadinya ibu postpartum yang mengalami <i>baby blues syndrome</i>	79
Tema ke III; Kebutuhan psikososial dan spritualitas ibu postpartum pada fase <i>letting go</i>	81
C. Pembahasan Penelitian.....	83
Tema I : Perasaan, Perilaku, dan Fikiran ibu postpartum yang mengalami <i>Baby blues syndrome</i>	83
Tema II : Penyebab terjadinya <i>baby blues syndrome</i>	87
Tema III : Kebutuhan psikososial dan spritualitas ibu postpartum pada fase <i>letting go</i>	94
D. Implikasi Penelitian.....	103
1. Peneliti	103
2. Tenaga kesehatan.....	103
3. Keluarga.....	103
E. Keterbatasan Penelitian.....	103
BAB V	105
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	15
Tabel 1.2 Karakteristik Informan	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : ST. Namirah Nurfadillah

NIM : 70300119031

Judul : Pengalaman *Baby Blues Syndrome* Pada Ibu Postpartum

Baby blues syndrome merupakan depresi golongan ringan yang dirasakan oleh beberapa ibu postpartum dengan perasaan dan tingkat emosional yang tidak menentu pada minggu pertama setelah persalinan. Gejala yang dirasakan berupa seringnya menangis, timbul perasaan sedih, cemas, kualitas tidur menurun, kurangnya nafsu makan dan menyalahkan diri sendiri. Hal ini dapat berefek pada kondisi fisiologis ibu dan tumbuh kembang anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lebih mendalam tentang pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Samata Kab. Gowa, sehingga mengetahui apa saja faktor penyebab dan gejala-gejala apa saja yang dialami oleh ibu postpartum dengan *baby blues syndrome*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik analisa data menurut *Colaizzi*.

Informan berjumlah tiga orang dan hasil penelitian ini telah disusun menjadi beberapa tema yaitu; Perasaan, perilaku dan pikiran ibu yang mengalami *baby blues syndrome*: penyebab terjadinya *baby blues syndrome* pada ibu postpartum dan; kebutuhan psikososial dan spritualitas ibu postpartum pada fase *letting go*.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dukungan sosial menjadi salah satu faktor dominan yang menjadi pencetus ibu postpartum mengalami *baby blues syndrome*. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ibu mengalami *baby blues syndrome* yaitu ketidakstabilan hormone, umur, metode melahirkan, kurangnya dukungan yang didapatkan dari suami maupun keluarga, tahapan pendidikan ibu, dan kelelahan.

Kata kunci : Fenomenologi, *Baby Blues*, Depresi, Persalinan, Postpartum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Post partum atau masa nifas merupakan kondisi dimana lahirnya bayi dan plasenta yang keluar dari rahim wanita sama seperti sebelum mengandung, periode post partum terjadi selama 6 minggu yang berarti akan berlangsung selama 42 hari. Yuliana dan Hakim (2020). Periode postpartum dapat disebut sebagai masa dimana tubuh ibu akan merasakan perubahan fisik maupun psikologis. Pengalaman melahirkan akan menciptakan pengaruh yang besar bagi seorang Wanita dengan rentan usia yang tergolong masih muda dan kelahiran anak pertama.

Pada umumnya ibu postpartum akan merasakan perbedaan fisiologis ataupun psikologis. Tidak mengherankan apabila seorang ibu akan merasakan perubahan atas sikapnya. Perubahan atas sikap dan suasana hati seorang ibu dipengaruhi karena adanya peningkatan hormone kortisol pada tubuh ibu. Perubahan-perubahan yang mengakibatkan adanya perbedaan fisik dan tingkat emosional yang lebih kompleks akan memerlukan sebuah proses penyesuaian kepada pola hidup dengan proses kehamilan yang terjadi (Sofiana, 2022).

Perubahan fisiologis dari ibu postpartum meliputi perubahan pada sistem reproduksi, sistem endokrin, sistem perkemihan, abdomen, sistem gastrointestinel dan sistem muskuloskeletal. Sedangkan, proses adaptasi psikologis ialah suatu proses adaptasi postpartum yang meliputi tiga fase seperti *fase taking in*, *fase taking hold*, dan *fase letting go* (Zulfa, 2022).

Pada masa adaptasi psikososial seorang ibu akan merasakan perasaan yang tidak menentu, seperti kepanikan dan kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga kondisi ini akan membuat ibu menjadi tertekan dan merasa tidak dapat bertanggung jawab untuk merawat bayinya. Kejadian seperti inilah yang dapat disebut sebagai kegagalan beradaptasi pada psikososial. Dampak dari kegagalan adaptasi psikososial seperti gangguan postpartum blues atau biasa disebut sebagai *baby blues syndrome*, *postpartum depression*, dan *postpartum psikosis* atau gangguan kejiwaan pasca partum (Rosa *et al.*, 2021).

Terdapat tiga macam gangguan kejiwaan pada masa postpartum pada ibu yakni postpartum blues seperti *maternitas blues* atau *baby blues syndrome*, depresi postpartum dan psikososial partum. *Baby blues syndrome* merupakan suatu sindrom dengan terganggunya kestabilan emosi dengan skala ringan pada seorang ibu postpartum sebagai dampak dari proses adaptasi kelahiran bayi yang terjadi dalam beberapa jam sampai dengan 2 minggu atau 14 hari postpartum, biasanya puncak klimaks pada ketidakseimbangan emosi dan suasana hati terjadi pada hari ke tiga atau ke lima. *Baby blues syndrome* dapat diumpamakan dengan kejadian gunung es yang artinya susah untuk di kenali karena masyarakat terlanjur menganggap sepele gangguan kejiwaan dan beranggapan jika gangguan ini adalah hal yang sangat wajar terjadi pada seorang ibu yang baru saja melahirkan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada bayi mereka. Sehingga banyak seorang ibu yang tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sedang merasakan *baby blues syndrome* (Annisa. *et al.*, 2022).

Diperkirakan hampir 50-70% seluruh wanita pasca melahirkan akan mengalami *baby blues* atau *postnatal syndrome* yang terjadi pada hari ke 4-10 pasca partum Nova & Zagoto (2020). Terdapat data dari WHO (2018) yang mengatakan bahwa kejadian *postpartum blues* di seluruh dunia berkisar pada angka 0,5% hingga 60%. Sedangkan menurut Hidayatet *et al* (2022) telah terhitung sebanyak 10% hingga 19% Wanita pasca partum akan merasakan depresi postpartum. Telah dilaporkan bahwa *anxiety* postpartum dialami oleh 4% sampai 39% dari semua Wanita prenatal dan diperkirakan sekitar 16% *anxiety* dialami oleh semua Wanita.

Di Asia masalah postpartum blues tercatat sebanyak 3,5% hingga 63,3% (Klainin dan Arthur, 2019). Walaupun, angka kejadian depresi pada ibu selama masa kehamilan di negara berkembang lebih diatas dari pada di negara maju yang pravelensinya berkisar antara 7,4-13%, fasilitas Kesehatan kejiwaan khusus untuk perinatal belum banyak didapatkan di negara berkembang. Khususnya di Indonesia jumlah ibu yang mengalami *postpartum blues* atau *baby blues* diperkirakan mencapai 30% (Kemenkes RI, 2019).

Nyatanya, di Indonesia sudah terdapat data sebanyak 22,4% seorang ibu merasakan depresi pasca partum (*postpartum depression*). Sedangkan Dari hasil penelitian Aryani *et al* (2022) telah diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa sebanyak 50% ibu yang mengalami *baby blues* setelah melahirkan dan diperkirakan sejumlah 10% seorang ibu mengalami postnatal depression. Sebanyak 10 hingga 22% ibu menyatakan mengalami postpartum depression setelah baru saja melahirkan.

Ibu yang baru saja melahirkan dengan pengalaman pertamanya mengalami postpartum psikosis banyak 10 sampai 22% kasus terjadi. Sedangkan, Tulak *et al* (2019) mengemukakan pada hasil penelitian yang mereka lakukan di RS Elim Rantepao yang berada di Provinsi Sulawesi selatan terkhusus di daerah Kabupaten Toraja Utara bahwa terdapat 5 ibu postpartum yang dinyatakan mengidap *baby blues syndrome* di tahun 2017 hingga tahun 2018.

Meski dari itu terdapat beberapa faktor budaya dan kapasitas tenaga Kesehatan yang menjadi penghalang untuk menangani masalah depresi pasca partum ini secara optimal. Sistem penanggulangan Kesehatan mental perinatal tidak dapat di nomor satukan di beberapa negara termasuk di Indonesia. Pemerintah hanya membentuk sebuah program yang berfokus pada kematian ibu dan bayi yang sampai saat ini masih cukup tinggi di antara negara-negara di Asia tenggara (Kemenkes RI, 2019).

Di Indonesia sendiri angka kematian ibu masih terbilang sangat tinggi. Tercatat pada data SUPAS 2015 telah ditemukan kasus ibu meninggal sebanyak 305 kasus di setiap 100.000 kelahiran hidup. Di pulau Jawa dan Bali pada tahun yang sama terdapat kasus kematian ibu sebanyak 247 kasus. Provinsi Jawa Timur dinyatakan sebagai provinsi dengan tingkat kematian yang terbilang berada diatas dari rata-rata. SDGs telah membentuk sebuah program yang menargetkan bisa mengurangi angka kematian ibu pada tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan data terbaru yang menyatakan bahwa angka kematian ibu di Provinsi tersebut telah menunjukkan

angka 98,39 per 100.000 kelahiran hidup per tahun 2020. Di tahun yang sama pemerintah kabupaten Jember mengumumkan bahwa kabupaten mereka menjadi kota satu-satunya yang angka kematian ibu mencapai angka tertinggi sebanyak 173,53 per 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Jawa Timur. Daripada itu, Kota Madiun menjadi kota yang angka kematian ibu memperlihatkan angka terendah yakni 40,14 per 100.000 kelahiran hidup (Nursiyono dan Apriyani, 2022).

Adapun gejala yang menunjukkan adanya *baby blues syndrome* atau depresi postpartum seperti lebih sering menangis secara tiba-tiba dan menerus, timbulnya perasaan sedih, kehilangan nafsu untuk makan, menurunnya kualitas tidur sehingga menimbulkan efek lelah dan kesulitan dalam beraktifitas, selalu merasa was-was terhadap siapapun, merasa tidak diberi perhatian oleh orang disekitarnya, mulai sering menghakimi diri sendiri, tidak memiliki impian. Dampak dari semua gejala ini akan membuat seorang ibu akan mengabaikan bayi atau anak kandungnya sendiri (Fatmawati & Gartika, 2021).

Maka dari itu seorang ibu yang baru saja melewati proses persalinan yang tidak mudah sangat patut diberikan support oleh keluarga terlebih dari suami. Support yang diberikan oleh seorang suami bisa berwujud dukungan psikologis dan fisiologis maupun material. Selain daripada itu dalam kehidupan berumah tangga suami diharapkan inisiatif dalam memberikan sebuah bantuan kepada seorang istri atau ibu sehingga terciptanya perasaan nyaman karena hadirnya cinta dan perhatian di dalam rumah tangga tersebut (Aryani *et al.*, 2022).

Meskipun *syndrome baby blues* atau *postpartum depression* masih tergolong gangguan mental yang ringan tetapi jika tidak diberikan penanganan yang

baik serta tidak adanya dukungan dari orang sekitar akan membuat *syndrome* ini menjadi gangguan jiwa yang serius sehingga dapat menimbulkan beberapa anggota keluarga yang ikut merasa cemas, panik dan stress. *Baby blues syndrome* dengan skala yang ringan dapat di tangani dan dikurangi risikonya dengan memperbanyak aktivitas fisik sehingga menimbulkan energi positif yang baik untuk diri sendiri (Annisa *et al.*, 2022).

Untuk menangani dan mengurangi resiko dari *baby blues syndrome* atau *postpartum depression*, seorang ibu disarankan untuk melakukan olahraga senam atau yoga yang di anggap bisa menangani depresi sebagai pengobatan non-farmakologis Abadiavil *et al* (2021). Pada hakikatnya, ibu pasca persalinan sangat membutuhkan sebuah ajakan untuk melakukan relaksasi dengan mengamalkan sikap tawakkal atau berserah diri, menerima keadaan diri sendiri, mengampuni diri sendiri dan orang lain, serta mencoba untuk mengontrol beberapa jenis emosi yang dapat dirasakannya (Indriani, 2022).

Berdasarkan data dari Puskesmas Samata Kabupaten Gowa menyatakan bahwa pada bulan januari hingga bulan desember tahun 2021 terdapat sebanyak 108 ibu partus, 23 diantaranya merupakan ibu grandemultipara (ibu partus yang memiliki pengalaman melahirkan lebih dari 3 kali),37 diantaranya termasuk ibu multigravida (ibu partus yang telah memiliki pengalaman melahirkan) dan 48 diantaranya ialah ibu primigravida (ibu partus yang pertama kali melahirkan).

Terdapat data yang menunjukkan bahwa ibu partus yang berusia 25 tahun ke bawah berjumlah 48 orang. Sedangkan, di bulan januari hingga tanggal 15 desember 2022 terdapat ibu partus sebanyak 110 orang, 20 diantaranya termasuk


ibu grandemultipara, 35 diantaranya merupakan ibu multigravida, dan 55 diantaranya tergolong ibu primigravida. Dan tercatat sebanyak 53 ibu yang melahirkan masih berusia dibawah 25 tahun di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Berdasarkan data 2 tahun terakhir dari Puskesmas Samata Kab.Gowa terdapat peningkatan ibu primigravida dan peningkatan ibu partus yang berusia dibawah 25 tahun.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu bidan di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa, bahwasanya tingkat emosional seorang ibu partus di pengaruhi dengan pengalaman melahirkan sebelumnya, semakin banyak pengalaman melahirkan seorang ibu partus maka ibu lebih bisa mengontrol emosinya pada saat proses persalinan terjadi. Begitupun, dengan usia ibu partus, walaupun usianya terbilang masih muda tetapi jika ia memiliki pengalaman persalinan sebelumnya, maka proses persalinannya akan berjalan lancar. Sama halnya dengan, ibu partus berusia muda yang termasuk dalam kategori primigravida, maka sepanjang proses persalinan berlangsung emosinya tidak dapat terkontrol.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum (masa nifas). Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dibidang keperawatan jiwa khususnya terkait pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum (masa nifas).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas yang menyatakan bahwa dampak dari *baby blues syndrome* pada ibu postpartum dapat mengancam Kesehatan jiwa pada ibu dan menghambat tumbuh kembang anaknya. maka dapat dilakukan penelitian tentang bagaimana pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum ?.



C. Kajian Pustaka

Tabel 1: Kajian Pustaka

No	Judul/peneliti/tahun/ nama jurnal/jumlah halaman	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian /sampel/ alat ukur/ analisis data	Perbedaan Penelitian
1.	Hubungan Dukungan Suami Dengan Kejadian <i>Postpartum Blues</i> pada ibu Primipara : Rima Nurkhasanah, Erlin Novitasari, N.G.A.N Oka widowati, (2022) : Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida : 6.	Mendeskripsikan hubungan dukungan suami dengan kejadian <i>postpartum blues</i> pada ibu primipara di Praktik mandiri Bidan Agung Oka Desa gendoh, kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2021.	Dukungan suami, ibu primipara, post partum blues.	Metode analitik dengan desain cross sectional/ ibu postpartum di Praktik mandiri bidan Agung Oka/ Chi-square dengan SPSS.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Rima Nurkhasanah, Erlin Novitasari, N.G.A.N Oka widowati hanya berfokus pada hubungan dukungan suami dengan kejadian postpartum pada ibu primipara di bidan Agung Oka dengan menggunakan metode penelitian analitik dengan desain cross sectional Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengetahui bagaimana pengalaman ibu post partum yang mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel yang digunakan adalah ibu postpartum atau ibu postpartum yang pernah mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel yang digunakan

					ialah ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Samata.
2.	Hubungan dukungan sosial dengan kejadian <i>postpartum blues</i> pada ibu postpartum di wilayah kerja puskesmas pomala : Mariany ,Rosani Naim, Iis Afrianty, (2022) : Jurnal surya medika : 6.	Mendeskripsikan hubungan dukungan sosial dengan kejadian <i>postpartum blues</i> pada ibu postpartum di wilayah kerja puskesmas pomala.	Dukungan sosial, <i>Postpartum blues</i> , Ibu postpartum .	Analitik korelasi dengan desain Cross-Sectional,Ibu postpartum sebanyak 50 orang, EDPS, Kuisisioner.	Pada penelitian ini berfokus pada hubungan dukungan sosial dengan terjadinya <i>postpartum blues</i> pada ibu postpartum di wilayah kerja puskesmas pomala Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengetahui bagaimana pengalaman ibu post partum yang mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel yang digunakan adalah ibu postpartum atau ibu postpartum yang pernah mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Samata.
3.	Jenis Persalinan, Kesiapan Ibu dan Komplikasi/Penyulit Persalinan berhubungan dengan <i>Postpartum Blues</i> di Desa Sukawening : Monika Supriyanti (2022): Open acces	Untuk menganalisis hubungan antara jenis persalinan, kesiapan ibu, komplikasi/penyulit persalinan dengan kejadian <i>postpartum blues</i> .	Jenis persalinan, kesiapan ibu, komplikasi/penyulit persalinan, <i>postpartum blues</i> .	Jenis penelitian yang digunakan <i>cross-sectional</i> :sampel sebanyak 67 sampel	Pada penelitian yang di teliti oleh Monika Supriyanti membahas tentang bagaimana hubungan antara jenis persalinan, kesiapan ibu,

	Jakarta journal of health sciences: 7			:Teknik <i>tota l sampling</i> :Analisis univariat dan bivariat <i>chis quare</i> : Instrumen dalam penelitian menggunakan kuesioner.	komplikasi/penyakit persalinan dengan kejadian postpartum blues menggunakan metode penelitian kuantitatif Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengetahui bagaimana pengalaman ibu post partum yang mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel yang digunakan adalah ibu postpartum atau ibu postpartum yang pernah mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan memakai metode penelitian kualitatif.
4.	Gambaran kejadian gejala <i>baby blues</i> pada ibu postpartum berdasarkan karakteristik Rumah Sakit Dr. Slamet Garut tahun 2018 : Iceu Mulyati & Silvia Khoerunisa, (2019) : Jurnal Kesehatan Indra Husada: 7.	Pada Penelitian yang di lakukan oleh Iceu Mulyati & Silvia bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran gejala <i>baby blues</i> pada ibu postpartum berkaitan dengan karakteristik di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut.	Gambaran, Ibu postpartum di RS DR Slamet, <i>Baby blues</i> , Jenis persalinan, umur, paritas dan pekerjaan.	Metode deskriptif : Ibu postpartum di RS DR Slamet : <i>Purposive sampling</i> : Univariat.	Pada penilitian ini membahas tentang gambaran kejadian gejala <i>baby blues</i> pada ibu postpartum berkaitan dengan karakteristik di rumah sakit Dr Slamet Garut dengan populasi sampel ialah ibu postpartum yang berada di RS Dr Slamet Garut dengan metode penelitian menggunakan metode

					<p>deskriptif Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengetahui bagaimana pengalaman ibu post partum yang mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel yang digunakan adalah ibu postpartum atau ibu postpartum yang pernah mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel ialah ibu postpartum yang berada di wilayah kerja Puskesmas Samata menggunakan metode kualitatif fenomenologi.</p>
5.	<p>Penurunan gejala <i>baby blues</i> melalui terapi musik klasik mozart pada ibu postpartum : Fitri Nuriya Santy, Siti Noviana Wahid, (2019) : Jurnal kesehatan panca bhakti lampung : 8.</p>	<p>Mengetahui dan menganalisis keefektifan dari terapi musik klasik mozart untuk mengurangi gejala <i>baby blues</i> pada ibu postpartum.</p>	<p><i>Baby blues</i> , musik klasik mozart, ibu postpartum .</p>	<p>Metode kualitatif,ibu postpartum, EPDS, Skrining & kuesioner.</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri nuriya santy dan Siti Noviana Wahid berfokus pada keefektifan dari pemberian intervensi terapi musik klasik mozart pada ibu post prtum yang mengalami <i>baby blues syndrome</i> Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengetahui bagaimana pengalaman ibu</p>

					<p>post partum yang mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel yang digunakan adalah ibu postpartum atau ibu postpartum yang pernah mengalami <i>baby blues syndrome</i> menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi, sampel dari penelitian yang akan peneliti buat ialah ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Samata.</p>
6.	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya postpartum blues pada ibu postpartum di Puskesmas Umban Sari Pekanbaru. Wira Ekdeni Alfa, (2022) Jurnal menara ilmu, 9.</p>	<p>Mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya postpartum blues pada ibu postpartum di Puskesmas Umban Sari Pekanbaru.</p>	<p>Pendidikan ,Umur,Dukungan keluarga, ibu postpartum , postpartum blues.</p>	<p>Metode kuantitatif analitik korelasi dengan desain cross-sectional, accidental sampling, Kuisisioner.</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Wira Ekdeni Alfa hanya berfokus pada faktor penyebab terjadinya postpartum blues pada ibu postpartum dengan menggunakan metode kuantitatif Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengetahui bagaimana pengalaman ibu post partum yang mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel</p>

					yang digunakan adalah ibu postpartum atau ibu postpartum yang pernah mengalami <i>baby blues syndrome</i> menggunakan metode kualitatif fenomenologi.
7.	Pengalaman komunikasi ibu dengan <i>baby blues syndrome</i> dalam paradigma naratif, Mia Dwianna Widyaningtyas, (2019) Jurnal manajemen komunikasi, 12.	Mendeskrripsikan pengalaman, perasaan dan pandangan ibu mengenai <i>baby blues</i> .	Pengalaman,ibu postpartum, <i>baby blues syndrome</i> , paradigma naratif.	Studi Fenomenologi,ibu postpartum, metode collaiz, wawancara.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Mia Dwianna Widyaningtyas berfokus pada pengalaman ibu postpartum mengenai perasaan dan pandangannya terhadap <i>baby blues syndrome</i> dengan menggunakan metode study fenomenologi Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengetahui bagaimana pengalaman ibu post partum yang mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel yang digunakan adalah ibu postpartum atau ibu postpartum yang pernah mengalami <i>baby blues syndrome</i> menggunakan metode kualitatif.
8.	Hubungan Dukungan Suami Dengan	Mendeskrripsikan hubungan	Dukungan suami,post	Metode kuantitatif,	Pada penelitian yang di lakukan

	Kejadian Post Partum Blues Di Wilayah Perkotaan, Samria & Indah Haerunnisa, (2021) Jurnal kesehatan masyarakat, 6.	dukungan suami dengan kejadian postpartum blues pada ibu postpartum.	partum blues, ibu postpartum, perkotaan.	Suami dan Ibu postpartum, purposive sampling, kuesioner.	oleh Samria & Indah Haerunnisa berfokus pada hubungan dukungan suami terhadap ibu postpartum dengan postpartum blues menggunakan metode kuantitatif dengan sampel ialah suami dan ibu postpartum, Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengetahui bagaimana pengalaman ibu post partum yang mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel yang digunakan adalah ibu postpartum atau ibu postpartum yang pernah mengalami <i>baby blues syndrome</i> .
9.	Hubungan dukungan keluarga dengan kejadian <i>baby blues</i> pada Ibu postpartum di desa pulau terap tahun 2022 : Ance siallagan, Helinida saragih, Ernita rante, Rosa desri, (2022) : Jurnal ilmiah penelitian Kesehatan : 8.	Mendeskripsikan bagaimana hubungan dukungan keluarga dengan kejadian <i>baby blues</i> pada ibu Postpartum di desa pulau terap tahun 2022.	Dukungan keluarga, Ibu postpartum, <i>baby blues syndrome</i> .	Penelitian korelasional dengan pedekatan cross sectional, ibu postpartum, total sampling, kuesioner.	Pada penelitian yang di lakukan oleh Samria & Indah Haerunnisa berfokus pada hubungan dukungan suami terhadap ibu postpartum dengan postpartum blues menggunakan metode kuantitatif dengan sampel

					ialah suami dan ibu postpartum, Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengetahui bagaimana pengalaman ibu post partum yang mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel yang digunakan adalah ibu postpartum atau ibu postpartum yang pernah mengalami <i>baby blues syndrome</i> .
10.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan <i>baby blues syndrome</i> pada ibu post partum di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh City : Roza Aryani, Afriana, Faranita, (2022) : Jurnal of Healthcare Technology and Medicine : 12.	Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan <i>baby blues syndrome</i> pada ibu postpartum.	<i>Baby blues syndrome</i> , ibu postpartum .	Metode korelatif, ibu postpartum, sampling kuota, kuesioner.	Pada penelitian ini berfokus pada apa saja faktor yang berhubungan dengan <i>baby blues syndrome</i> menggunakan metode korelatif dengan sampel yaitu ibu postpartum Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengetahui bagaimana pengalaman ibu post partum yang mengalami <i>baby blues syndrome</i> dengan sampel yang digunakan adalah ibu postpartum atau ibu postpartum yang pernah mengalami <i>baby blues syndrome</i> .

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara lebih mendalam tentang pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Samata Kab.Gowa, sehingga dapat mengetahui apa saja faktor penyebab dan gejala-gejala apa saja yang dialami oleh ibu postpartum dengan *baby blues syndrome*.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai media pembelajaran, dapat memberikan pengalaman belajar dan meningkatkan pengetahuan dalam penelitian sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi Tenaga Perawat

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi praktisi keperawatan dalam melakukan perannya di dalam pelayanan Kesehatan secara professional.

3. Bagi Dinas Kesehatan dan Institusi Terkait

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi petugas kesehatan untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat pada umumnya dan ibu hamil pada khususnya tentang *baby blues syndrome* dan cara pencegahannya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Baby Blues Syndrome

1. Pengertian Baby Blues Syndrome

Baby blues syndrome merupakan pengalaman yang dirasakan oleh beberapa ibu postpartum dengan perasaan dan tingkat emosional yang tidak menentu yang dialami di hari pertama dan minggu pertama mereka menjadi seorang ibu. Sebanyak 50% hingga 80% ibu pasca partum selalu merasakan kesedihan, kemarahan, dan ansietas yang mendadak Widyaningtyas (2019). Zulfa (2022) juga menyebutkan bahwa *Baby blues syndrome* diyakini sebagai suatu masalah gangguan emosional yang ringan dan sering sekali dianggap sepele oleh ibu pasca partum, keluarga, orang sekitar maupun tenaga kesehatan. Meskipun, *baby blues syndrome* ini selalu diwajibkan oleh beberapa pihak, tetapi jika tidak diberikan penanganan yang baik maka syndrome ini akan bertumbuh menjadi gangguan kejiwaan dengan tingkat depresi yang berat. Akibat dari syndrome ini akan memberikan pengaruh yang buruk bagi keharmonisan rumah tangganya dan mengganggu proses tumbuh kembang anak.

Baby blues syndrome atau *maternity blues* menurut Hafsa (2022) merupakan kondisi yang wajar terjadi pada ibu dengan pengalaman pertama kali melahirkan. Kondisi ini disebut sebagai bentuk gangguan jiwa atau depresi postpartum dengan gejala depresi ringan yang periode terjadinya diantara hari kedua hingga hari ke 14 pasca persalinan terjadi. *Postpartum*

depression atau *baby blues syndrome* ini biasanya ditandai dengan adanya kemurungan dan perasaan lebih sensitif dari biasanya yang ibu rasakan kepada bayi mereka.

Baby blues syndrome sendiri merupakan keadaan yang terjadi pasca 7 hari persalinan yang dirasakan oleh ibu, di waktu ini ibu akan mengalami perasaan sedih dengan frekuensi terjadinya lebih sering dari sebelumnya. Postpartum blues atau biasa disebut dengan *maternity blues* atau *baby blues syndrome* ini di kaitkan dengan kejadian gunung es yang gejalanya sangat susah untuk dikenali apalagi masyarakat umum masih melihat kondisi ini sebagai hal yang sangat biasa untuk terjadi pada ibu pasca persalinan sebagai bagian dari sikap perhatian ibu kepada bayinya. Gangguan jiwa ini dapat terjadi ketika seorang ibu tidak mampu beradaptasi dengan perbedaan gaya hidup dari semenjak hamil dan melahirkan, maka tak heran jika banyak ibu yang tidak mengetahui jika sebenarnya ia sedang mengalami post partum blues atau *baby blues syndrome*.

Seorang wanita dimulai dari ia mengandung, melahirkan sampai pada proses mengasahi akan membuat emosionalnya meningkat kondisi ini yang dikenal sebagai *baby blues syndrome*. Pada agama islam telah disebutkan bahwa proses melahirkan dikatakan sebagai masa-masa yang berat dan dapat memberikan dampak bagi kesehatan jiwa seorang ibu. Hingga diakui sebagai kondisi *baby blues syndrome* ini dengan wahnun ala wahnun yang karena menurut al-Qurthubi dalam tafsirannya al-Jami'li Ahkam kalimat itu diberikan karena pada dasarnya Wanita hanyalah

mahluk yang tidak cukup kuat secara fisiologis sehingga kehamilan dianggap dapat menyebabkan kelemahan itu meningkat. Bahkan di Al-Quran telah digambarkan bahwa untuk menjadi seorang ibu maupun menjadi orang tua bukanlah hal yang tidak mudah sehingga Allah SWT berfirman pada QS Al-Luqman/31:14 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Terjemahnya :

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (QS.Luqman/31 : 14)

Kemenag mengungkapkan tafsiran pada ayat ini, ada beberapa alasan mengapa seorang anak harus berbakti kepada kedua orangtuanya. antara lain :

- a) Ayah dan ibu telah memberikan beberapa bentuk kasih sayang yang tak terhingga untuk anak-anaknya. Dimulai dari membesarkan, memberikan ia pelajaran, merawatnya dengan penuh kasih hingga melengkapi kebutuhan anak-anaknya sehingga anak tersebut tak merasa kekurangan satu pun.

- b) Seorang anak ialah benih-benih cinta, buah hati dan belahan jiwa orangtuanya. sama halnya dengan sabda Rasulullah kepada anaknya yang berbunyi " Fatimah ialah buah hatiku "
- c) Seluruh keperluan anak-anaknya, seperti minum, makan, penutup badan hingga kebutuhan yang lainnya adalah bentuk tanggung jawab dari orangtua.

Kesimpulan tafsiran ayat ini yang dikemukakan oleh Kemenag ialah kenikmatan yang tak terhingga artinya yang dirasakan oleh manusia hanyalah kenikmatan yang berasal dari Allah SWT, setelah itu kenikmatan yang di dapatkan dari orang tua atau ayah dan ibunya. Semua jenis perbuatan akan menerima respon dari perbuatan itu masing-masing. Kelakuan baik akan di balas dengan ganjaran yang baik juga dan dilipat gandakan pahalanya seperti mendapatkan balasan surga. Begitu pula dengan perbuatan yang tidak baik atau jahat suatu saat nanti akan menerima ganjaran yang serupa dengan mendapatkan balasan azab neraka.

Postpartum blues atau *baby blues syndrome* ialah kondisi terjadinya masalah afek yang masih dibatas normal seperti selalu merasakan kegelisahan dan suasana hati yang tak menentu. *Baby blues syndrome* ini terjadi di hari atau minggu pertama pasca persalinan dan biasanya akan bertambah parah di hari ke tiga hingga hari ke lima dan biasanya akan berlanjut dalam kurung waktu 14 hari pasca partum. Gangguan afek ini dialami sebanyak 50 hingga 80% wanita pasca partum ada beberapa kategori masalah kejiwaan yang berkaitan dengan masalah afektif yaitu postpartum

blues (*baby blues syndrome*), postpartum hypomania (baby pinks), depresi postpartum, dan psikosis postpartum.

Baby blues syndrome atau *postpartum blues* adalah gangguan kejiwaan yang paling banyak didapatkan pada ibu postpartum Pazriani (2021). Sedangkan menurut Sapulette *et al* (2022) postpartum atau *baby blues* merupakan depresi yang mengganggu suasana hati yang dapat menyebabkan ibu pasca partum sulit beradaptasi dengan psikologinya. Hal ini terjadi karena ibu merasa tidak dapat bertanggung jawab dengan peran barunya sehingga ibu akan merasakan kesedihan yang berlarut-larut, kecemasan yang berlebihan dan rasa bersalah.

Pada hasil penelitian *Global Health Observatory World Health Statistics* saat *Report Mental Health Atlas* di tahun 2011, mengatakan terdapat sebanyak 13% ibu postpartum di seluruh negara mengidap depresi postpartum. Menurut Pazriani (2021) menyatakan sebagian ibu yang mengidap gangguan mental dengan *baby blues syndrome* atau postpartum blues merupakan ibu yang belum siap untuk mengemban peran baru sebagai orangtua dan tidak memiliki pengalaman sebelumnya untuk menjadi orangtua adalah salah satu pencetus terjadinya postpartum depression (*baby blues syndrome*).

2. Waktu dan durasi baby blues syndrome

Postpartum depression atau yang biasa disebut dengan *baby blues syndrome* ini dapat terjadi sesaat setelah melahirkan. Menurut Barroh *et al* (2018) mengatakan bahwa *baby blues syndrome* terjadi beberapa jam

setelah proses persalinan selesai bahkan sampai dengan 2 minggu atau 14 hari postpartum, biasanya akan bertambah buruk pada hari ke 3 atau hari ke 5. Sedangkan menurut Adila *et al* (2019) *Baby blues syndrome* akan mulai kelihatan di hari ke 2 hingga hari ke 3 pasca partum dan dapat hilang di 1 hingga 2 minggu kemudian.

3. Gejala-gejala *baby blues syndrome*

Ibu yang baru saja melewati proses persalinan biasanya akan merasakan kelelahan, kecemasan dan suasana hati yang tidak stabil. Adapun gejala yang menunjukkan adanya *baby blues syndrome* atau depresi postpartum yang dialami oleh ibu postpartum yaitu lebih sering menangis secara tiba-tiba dan menerus, timbulnya perasaan sedih yang tak beralasan, kehilangan nafsu untuk makan, menurunnya kualitas tidur sehingga menimbulkan efek Lelah dan kesulitan dalam beraktifitas, selalu merasa was-was terhadap siapapun, merasa tidak diberi perhatian oleh orang terdekatnya, mulai sering menghakimi diri sendiri, dan menganggap dirinya kehilangan banyak impian. Dampak dari semua gejala ini akan membuat seorang ibu akan mengabaikan bayi atau anak kandungnya sendiri (Fatmawati & Gartika, 2021).

Selain itu, ada beberapa indikasi menurut Indriani (2022) yang menunjukkan adanya gejala-gejala *baby blues* yang dialami oleh ibu postpartum yaitu :

- a) Sikap ibu yang berbeda dari biasanya
- b) Emosi yang tidak stabil

- c) Lebih peka terhadap sesuatu
- d) Merasakan kekhawatiran secara berlebihan
- e) Kelelahan
- f) Kualitas tidur yang menurun
- g) Berat badan yang berubah
- h) Sangat sulit untuk fokus terhadap sesuatu
- i) Timbulnya rasa curiga terhadap semua orang
- j) Mendengar dan melihat sesuatu yang tidak nyata (Skizofrenia)
- k) Percaya pada hal-hal mistis dan mendengar bisikan yang gaib (Delusi)
- l) Mengabaikan bayinya

Sambas *et al* (2022) mengatakan ada beberapa gejala yang menunjukkan adanya *baby blues syndrome* pada ibu diantaranya ialah, ibu selalu merasa sedih dan tertekan sehingga ia selalu menangis tanpa alasan tertentu dan terjadi secara tiba-tiba, mudah marah, terlalu sensitif terhadap siapapun, kurang leluasanya menikmati waktu untuk diri sendiri, mengurung diri untuk tidak bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungan, sehingga ibu merasa tak becus merawat anaknya bahkan dengan tega tanpa perasaan mengacuhkan bayinya.

Sedangkan gejala *baby blues syndrome* menurut Zulfa (2022) salah satunya ialah memiliki perasaan yang tak menentu sehingga sering merasakan kesedihan secara tiba-tiba dan gangguan afek yang ditandai dengan sering menangis tanpa sebab yang tidak pasti bersamaan dengan rasa ansietas tinggi, khawatir yang berlebihan kepada bayinya. Seperti yang

dikemukakan Widyaningtyas (2019) gejala *baby blues syndrome* yang paling sering terlihat ialah adanya tetesan air mata yang frekuensi terjadinya hampir setiap saat dan ibu post partum dengan gejala *baby blues syndrome* sudah pasti akan lebih sensitive daripada sebelum persalinan terjadi.

4. Penyebab terjadinya *baby blues syndrome*

Jannah dan Latifah (2022) mengatakan ada beberapa penyebab terjadinya *baby blues syndrome* ini pada sebagian ibu pasca persalinan, Adapun penyebab yang dimaksud ialah :

a) Faktor hormonal

Adalah perubahan parameter pada hormone estrogen, progesterone, prolactin, dan estrol yang menurun bahkan meningkat. Pasca persalinan seorang ibu akan mengalami yang namanya penurunan kadar estrogen secara terus menerus. Hormone estrogen ini memiliki pengaruh pada mobilisasi enzim monoamine oksidase, sehingga dapat menyebabkan emosi yang tidak stabil, mood swing dan tekanan mental pada ibu pasca partum.

b) Faktor demografik (usia dan paritas)

Hersoni *et al.*, (2022) menyebutkan ibu dengan umur yang masih muda untuk mengalami kehamilan dapat meningkatkan dampak yang buruk bagi ibu dan anak baik dari penampilan fisik maupun psikis. Usia yang tepat bagi ibu untuk merasakan kehamilan dan persalinan berkisar antara umur 20 hingga 30 tahun. Di umur seperti ini ibu sudah dianggap bisa beradaptasi dengan peran barunya sebagai ibu yang memiliki bayi.

Sedangkan, usia dibawah 20 tahun dinilai belum cukup matang dalam segi pengetahuan, fisik, kejiwaan, tingkat emosi, dan sulit beradaptasi dengan kebiasaan barunya sebagai ibu.

c) Pengalaman maternitas dan partum

Ibu yang memiliki hambatan pada saat menjalani proses kehamilannya akan berdampak buruk kondisi ibu setelah melalui proses persalinan. Pada proses persalinan yang menghabiskan banyak tenaga dan menguras emosi akan meninggalkan kesan yang tidak baik pada psikis ibu. Contohnya, ibu yang terpaksa melakukan operasi sectio caesaria secara mendadak akan meningkatkan rasa takut dan kesakitan yang dirasakan.

d) Psikososial ibu

Psikososial yang dimaksud antaranya tingkat pengetahuan atau tingkat Pendidikan, status pernikahan, tidak mengharapkan kehamilan, masalah mental ibu di masa lalu, tingkatan ekonomi, dan dukungan psikososial yang didapatkan dari orang terdekatnya seperti suami, keluarga dan teman.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya *baby blues syndrome* di atas, menurut Aryani *et al.*,(2022) penyebab terjadinya *baby blues syndrome* yang paling banyak ialah faktor ketidakstabilan hormone, umur, metode melahirkan, support dari suami maupun keluarga,tahapan Pendidikan ibu,dan kecapekan. Selain itu, Aryani *et al.*,(2022) juga mengemukakan faktor resiko yang dapat terjadi pada postpartum

depression atau *baby blues syndrome* ialah pendapatan ekonomi yang tidak memadai, paritas, ketidakharmonisannya hubungan dengan keluarga suami dan orangtua, tidak mendapatkan bantuan dari keluarga atau orang terdekat akan merugikan diri selama proses kehamilan dan persalinan tiba.

5. Akibat dari baby blues syndrome

Postpartum blues atau *baby blues syndrome* merupakan gangguan jiwa dengan skala ringan. Tetapi, jika *baby blues syndrome* ini tidak ditangani secara cepat dan baik maka akan memperparah gangguan tersebut sehingga timbul masalah-masalah lain yang sudah pasti membuat ibu akan merasa kewalahan mengurus bayi Aryani *et al.*,(2022). Selain itu, pendapat lain mengatakan ketika gangguan psikis ini bertambah buruk akan berdampak pada keharmonisan keluarganya serta berpengaruh buruk pada tumbuh kembang anaknya (Barroh *et al.*, 2018).

Berikut dampak yang ditimbulkan karena adanya gangguan kejiwaan pada ibu postpartum dengan diagnose *baby blues syndrome* :

a) Bagi ibu

Dampak *baby blues syndrome* bagi ialah ibu akan mengalami gangguan suasana hati yang tidak stabil, sering merasa sedih hingga mengeluarkan air mata, merasa tidak tenang, kualitas tidur menurun, tidak tahu akan melakukan apa, nafsu makan yang menurun, mengalami

harga diri rendah dengan merasa tak berarti dan tak berguna, dan tidak lagi memiliki pencapaian di dalam hidup (Yuspita *et al.*, 2022).

b) Bagi anak

Baby blues syndrome juga berdampak pada tumbuh kembang anak. Biasanya anak akan mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan dengan ibunya. Resiko terjadinya masalah terhadap sikap atau tingkah laku anak serta gangguan kognitif bisa meningkat sehingga dapat mengancam kondisi anak (Hersoni *et al.*, 2022).

c) Bagi suami dan keluarga terdekat

Ketika gangguan psikis ini bertambah buruk maka akan memberikan dampak pada keharmonisan keluarganya karena ibu dengan gangguan *baby blues* ini akan lebih sering kelihatan murung, sedih, emosi yang tak bisa ia kendali, terlalu sensitive hingga mudah tersinggung serta ibu akan mengurung dirinya sendiri sehingga membuat seorang suami maupun keluarga bingung untuk menghadapi perubahan perilaku dari ibu yang mengalami *baby blues syndrome* (Barroh *et al.*, 2018).

6. Penanganan *baby blues syndrome*

Indriani (2022) mengatakan ada beberapa cara untuk mengatasi *baby blues syndrome* kepada ibu postpartum. Diantaranya ialah :

a) Ibu diharapkan bisa lebih memperbanyak mengingat kepada Allah SWT

Kita sebagai makhluk ciptaan tuhan hendaknya selalu berusaha untuk lebih dekat kepada sang pencipta. Karena Ketika kita selalu mengingat Allah maka sudah dipastikan hati dan pikiran kita merasa lebih damai. Seperti yang telah dicantumkan didalam QS al- Ra'd/13: 28 yang berbunyi :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ

Terjemahannya :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenteram.” (QS al- Ra'd/13 :28)

Tafsiran ayat ini ialah Allah SWT menyebutkan hamba yang mendapatkan tuntunan-Nya adalah orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi damai akibat sering mengingat Allah. ketika seorang hamba mengingat kepada Allah SWT maka hatinya pun merasakan kedamaian dan jiwa nya merasakan ketenangan, tak merasakan gundah gulana, takut maupun cemas akan janji Allah. Mereka senantiasa menjalani hal hal baik dan merasa suka cita karena melakukan kebaikan tersebut.

b) Suami sebagai *support system*

Seorang kepala rumah tangga atau suami memegang tanggung jawab yang sangat penting demi menghindari adanya persoalan postpartum blues atau *baby blues syndrome*, suami sangat dibutuhkan oleh seorang istri atau ibu di kondisi genting manapun. Support yang diberikan oleh seorang suami bisa berwujud dukungan psikologis dan fisiologis maupun material. Selain daripada itu dalam kehidupan berumah tangga suami diharapkan inisiatif dalam memberikan sebuah bantuan kepada seorang istri atau ibu sehingga terciptanya perasaan nyaman karena hadirnya cinta dan perhatian di dalam rumah tangga tersebut (Aryani *et al.*, 2022).

Berbeda dengan pendapat Utamidewi *et al* (2022) yang mengemukakan bahwa Ketika suami memberikan dukungan penuh dengan sadar akan adanya pembagian tugas yang akan membantu tugas ibu yang baru saja melewati proses persalinan yang bisa saja membuat ibu pasca partum mempunyai tingkat stress yang tidak stabil. Suami diharapkan dapat memberikan ibu atau istri sebuah bantuan, rasa nyaman, perhatian, cinta dan kasih sayang dipercaya dapat menjaga kestabilan emosi seorang ibu sehingga mempercepat penyembuhan dan mengurangi timbulnya masalah-masalah yang bisa muncul di masa ibu mengandung maupun gangguan psikis yang ibu alami sesudah.

c) Dukungan keluarga terdekat

Orang terdekat atau keluarga sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya postpartum blues pada ibu pasca partum. Terkadang, ibu pasca partum sangat membutuhkan dukungan dari sesama jenis kelaminnya. Seperti, ibu mertua maupun ibu kandung, ipar perempuan, sahabat perempuan dan keluarga lainnya. Women support women atau girls support girl diyakini dapat lebih mudah diterima oleh ibu pasca partum karena dipercaya bisa lebih memahami perasaan ibu, memahami beban apa yang dirasakan ibu tanpa harus menganggap ibu berlebihan dalam menghadapi peran barunya. Ibu pasca persalinan sangat membutuhkan seseorang yang bisa mendengar keluh kesahnya, memberikan nasihat atau motivasi yang baik, membentuk diri ibu menjadi sosok yang baik dan menawarkan bantuan untuk ikut membantu anaknya bisa membuat ibu memiliki jiwa yang positif (Indriani, 2022).

d) Sosialiasi atau kampanye edukasi kepada masyarakat umum

Menurut Indriani (2022) sekelompok komunitas layak difasilitasi informasi untuk menambah wawasannya terhadap wanita yang melalui proses persalinan dan mempunyai anak adalah hal yang wajar. Masyarakat harus mengetahui bahwa tiap tiap individu mempunyai mental masing-masing yang tidak bisa disama ratakan dengan semua individu. Terlebih kepada ibu yang baru saja menjalani

proses persalinan yang melelahkan akan memerlukan pengobatan tersendiri. Melalui sosialisasi ini diharapkan kedepannya masyarakat bisa lebih memperhatikan, menyemangati serta tidak mudah menyalahkan atau menganggap kondisi ibu adalah hal yang sepele.

Selain memberikan edukasi kepada masyarakat umum, tenaga Kesehatan juga harus memberikan informasi yang dianggap penting terhadap seorang ibu. Sehingga sosialisasi tersebut akan menambah kepercayaan diri ibu karena Ketika ibu lebih percaya diri akan membuat ia merasakan ketenangan untuk menjalankan peran barunya sebagai orangtua dan wawasan ibu untuk lebih mempersiapkan diri sehingga ibu terhindar dari pospartum depression atau *baby blues syndrome* (Indriani, 2022).

Sedangkan menurut Fahrina (2021) postpartum blues atau *baby blues syndrome* pada ibu postpartum dapat diatasi dengan pemberian terapi obat-obatan dengan fluoxetine tetapi kekurangan dari jenis obat ini akan membuat ibu mengalami ketergantungan obat, sering merasakan sakit di kepala, nafsu makan yang turun sehingga mengakibatkan rasa mual dan muntah. Tetapi, ada cara lain yang bisa mengatasi *baby blues syndrome* ini tanpa menggunakan obat farmakologi seperti pemberian relaksasi nafas dalam, melakukan kompres, imajinasi terbimbing, pengalihan, mendengarkan musik yang disukai, melakukan hal hal yang berbau kesenian, pemberian minyak esensial, dan menuangkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan.

B. Postpartum (Masa Nifas)

1. Pengertian Postpartum (Masa Nifas)

Menurut Hersoni *et al.*,(2022) Postpartum adalah masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar lepas dari rahim, sampai enam minggu berikutnya, disertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan, yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan lain sebagainya berkaitan saat melahirkan. Pada masa postpartum, ibu akan mengalami perubahan secara fisiologis dan psikologis, perubahan tersebut memerlukan proses adaptasi. Sedangkan menurut Yuliana dan Hakim (2020) Post partum atau masa nifas merupakan kondisi dimana lahirnya bayi dan plasenta yang keluar dari rahim wanita sama seperti sebelum mengandung, periode post partum terjadi selama 6 minggu yang berarti akan berlangsung selama 42 hari. Adapun pendapat lain mengatakan, Postpartum (masa nifas) Adalah kondisi yang terjadi setelah proses persalinan berakhir sehingga alat-alat reproduksi Rahim Kembali seperti sedia kala.

Allah SWT berfirman secara tegas dan jelas di dalam Al-Quran tentang bagaimana pengorbanan wanita ketika menjadi seorang ibu dimulai dari fase mengandung hingga fase melahirkan di dalam QS al-Ahqaf/46:15 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
 وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
 أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya :

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”(QS. Al-Ahqaf/46:15)

Tafsiran pada ayat ini menurut kemenag ialah telah kami putuskan kepadamu wahai manusia suatu amanah yang tegas untuk melakukan kebaikan kepada kedua orangtuamu dengan berbakti kepadanya baik di kehidupan duniawi maupun setelah kematian di akhirat dengan tidak melanggar kaidah-kaidah yang ada. Terutama kepada ibumu yang telah susah payah mengandungmu dengan mengalami beberapa rasa tidak nyaman yang ia derita . setelah ia mengandungmu dengan susah payah ia kemudian mulai mengasihi mu dengan memberikanmu asi selama 30 bulan lamanya. Setelah anak keturunannya sampai pada kondisi dimana fikiran dan tubuhnya lebih baik menandakan anak tersebut telah berumur 40 tahun, ia pun kemudian meminta sembari berkata “ Ya Rabb! Berikanlah hamba

petunjuk agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan terhadap diriku maupun kepada ayah dan ibuku. Berikanlah hamba kemudahan untuk melakukan amal baik yang sekiranya Engkau ridhoi dan kabulkanlah permintaanku, dan berilah kebaikan kepadaku dan keturunanku. Sesungguhnya aku meminta ampun kepadaMu atas segala kekhilafan dan sesungguhnya hamba adalah orang yang beragama Islam serta hamba merupakan golongan orang-orang yang taat dan berserah diri atas segala arahanMu.

Jannah dan Latifah (2022) mengatakan bahwa masa nifas atau postpartum terdiri dari 3 fase, diantaranya yaitu :

- a) Masa nifas dini (purperium) adalah masa penyembuhan seorang ibu postpartum yang sudah diizinkan untuk bergerak dan beraktivitas seperti berlatih untuk berdiri dan berjalan.
- b) Masa nifas intermedial (purperium) ialah masa penyembuhan pada semua alat-alat reproduksi ibu dengan jangka waktu 6 hingga 8 minggu.
- c) Masa nifas remote (purperium) fase yang dibutuhkan untuk pulih secara total terkhusus jika ibu selama mengandung atau melahirkan memiliki masalah Kesehatan yang lain. Fase pemulihan ini berkisar antara beberapa minggu, beberapa bulan maupun beberapa tahun lamanya.

2. Tujuan Asuhan Postpartum (Masa Nifas)

Menurut Aisyaroh dan Islami (2022) Pemberian asuhan pada masa postpartum (nifas) bermaksud untuk :

- a) Meningkatkan kesehatan psikologis maupun fisiologis terhadap ibu postpartum dan anak.
 - b) Untuk meminimalisir terjadinya masalah Kesehatan lain maupun komplikasi penyakit lain pada ibu postpartum.
 - c) Membawa ibu pasca persalinan ke tenaga Kesehatan yang tepat.
 - d) Memberi motivasi dan dukungan agar ibu memiliki kepercayaan diri untuk menjalankan peran barunya.
 - e) Menyarankan ibu untuk rutin melakukan suntik titanus.
 - f) Memberi edukasi tentang pemberian ASI dan MPASI anak yang baik.
 - g) Membantu ibu untuk menjalin ikatan yang baik terhadap anaknya.
3. Adaptasi psikologi ibu pada masa nifas

Seorang wanita akan lebih mudah memahami masa penyesuaian pada dirinya baik secara psikologis ataupun fisiologis di usia reproduktifnya. Setelah persalinan seorang ibu akan menghadapi beberapa fase adaptasi, seperti yang dikatakan oleh Zulfa (2022) adaptasi psikologis dan fisiologis terbagi atas 3 fase yaitu :

- a) Periode *taking in*

Pada masa ini ibu akan lebih pasif untuk menghadapi lingkungan sekitar, seperti ibu akan menerima saja apa yang terjadi disekitarnya dan akan lebih sering memperhatikan dirinya sendiri (Widiastuti *et al.*,2022).

b) Periode *taking hold*

Pada fase ini ibu akan sering merasakan kecemasan secara berlebihan, ibu merasa panik untuk mengembang peran barunya sebagai orang tua maka dari itu ibu yang berada di fase ini sangat membutuhkan motivasi dan perhatian yang lebih dari orang sekitarnya (Widiastuti *et al.*,2022)

c) Periode *letting go*

Pada fase ini ibu sudah lebih menerima kondisi barunya sebagai orang tua, kondisi tubuh yang lelah setelah melahirkan telah pulih sepenuhnya sehingga pada periode ini ibu lebih menerima peran barunya sebagai orang tua (Widiastuti *et al.*,2022).

4. Kategori gangguan psikologis ibu pasca partum

Ibu pada masa nifas sangat rentan terkena gangguan mental, meskipun gangguan mental tersebut tergolong ringan tetapi jika tidak diberikan penanganan yang baik maka akan membentuk gangguan tersebut menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Menurut (Sari & Hatrianis, 2022) terdapat tiga kategori gangguan yang dapat dialami pada ibu pasca partum diantaranya yaitu :

a) *Postpartum blues*

Postpartum blues ialah tanggapan yang bersifat natural terhadap peralihan hormone yang tidak stabil sehingga membuat kondisi fisiologis dan emosi ibu pasca partum menurun drastis. Angka ibu pasca partum yang mengalami kondisi ini berkisar antara 50 hingga 70% (Mariani *et al.*,2022).

b) *Postpartum depression*

Menurut Dwiyaniti & Tasa (2022) postpartum depresi merupakan penyakit jiwa yang tergolong berat. Kasus dari depresi postpartum ini banyak ditemukan pada ibu pasca partum. Populasi ibu pasca partum yang terkena depresi postpartum terhitung sekitar 10% hingga 15%. Faktor yang mempengaruhi adanya depresi pasca persalinan ialah adanya penyusutan estrogen plasenta dan progesteron secara drastic setelah melahirkan. Selain itu terdapat masalah dalam pusat hipotesis dan hipofisisadrenal yang mengakibatkan perubahan kortison yang menurun.

c) *Postpartum psikosis*

Psikosis postpartum ialah keadaan yang dialami oleh ibu pasca partum setelah mengidap depresi ringan yang tak ditangani dengan baik dan berubah menjadi depresi berat atau biasa disebut dengan postpartum psikosis. Resiko dari postpartum psikosis dapat mengancam kondisi ibu maupun kondisi bayi. Hal ini dapat memicu terjadinya Tindakan diluar

nalar seperti melukai diri sendiri, bunuh diri, bahkan membunuh bayi yang baru saja dilahirkannya (Harianis dan Sari, 2022).

Ibu pasca partum yang merasakan *baby blues syndrome*, postpartum depression, dan postpartum psikosis akan lebih susah untuk berhubungan dengan anak bahkan dengan keluarga dan orang disekitarnya. Dampak dari tekanan yang dirasakan ibu akan membahayakan dan membuat anak mengalami masalah pada tingkah lakunya dan gangguan kognitif. Maka dari itu, ibu yang mengalami gangguan postpartum sangat membutuhkan penanganan Kesehatan yang memumpuni di awal masa nifas ibu.

5. Kebutuhan dasar ibu postpartum

Kebutuhan dasar yang diperlukan oleh ibu pasca partum antara lain:

a) Gizi

Menurut (Sinaga *et al.*, 2022) mengatakan jika pemenuhan gizi pada ibu di masa nifas tercukupi dengan baik akan memberikan efek yang bagus untuk penyembuhan luka perineum lebih cepat. Pemenuhan gizi di masa post partum akan lebih baik jika mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi kalori yang masuk pada tubuh. Pemenuhan gizi dilakukan di enam bulan awal masa menyusui dengan kalori sebanyak 330 kkal lebih banyak dibanding sebelum kehamilan terjadi. Pada masa penyembuhan luka pada ibu postpartum sangat penting untuk memenuhi zat gizi makro ataupun mikro.

Jika pemenuhan gizi dan nutrisi pada ibu postpartum tidak tercukupi dapat memicu terjadinya masalah Kesehatan yang lain seperti infeksi pada luka. Untuk membantu metabolisme tubuh bekerja dengan baik maka diperlukan gizi yang seimbang agar mencapai 25% untuk menghasilkan ASI yang baik dan cukup demi proses tumbuh kembang pada bayi. Kebutuhan gizi dan nutrisi pada masa nifas biasanya bertambah sebanyak 3 kali dari kebutuhan sebelumnya.

b) Mobilisasi dini

Ibu postpartum sangat memerlukan perawatan khusus terutama pemberian mobilisasi dini agar proses involusi uteri lebih cepat dari biasanya. Perawatan pasca partum seperti senam hamil dapat di mulai sebelum terjadinya proses persalinan dan akan berkelanjutan setelah proses persalinan selesai. Mobilisasi dini seperti melakukan senam nifas dianggap dapat mengembalikan kondisi otot-otot abdomen bagian bawah seperti sebelum mengalami kehamilan. Otot-otot yang berkontraksi akan mempercepat tahap involusi yang terjadi disaat plasenta keluar dari alat reproduksi ketika persalinan terjadi. Pada saat proses involusi, Ambulasi yang diberikan secepat mungkin dengan pemberian yang sering sangat dibutuhkan agar proses involusi menjadi lancar dan dilakukan tindakan dengan memeriksa area lokia, konsistensi uterus serta pengukuran tinggi fundus uteri (Setianingsih dan Halimatusyadiah, 2022).

c) Personal *hygiene* ibu postpartum

Fauziyah *et al.*,(2022) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa ibu postpartum dapat mengidap luka pada perineumnya. Persalinan yang dilakukan dengan metode pervaginam sangat mudah untuk mengalami infeksi terlebih jika kebersihan di daerah sekitar perineum tidak dijaga kebersihannya. Hal ini dapat berpengaruh pada proses penyembuhan luka akibat persalinan pervaginam. Ibu pada masa nifas mengalami pendarahan yang banyak serta daerah sekitar vagina akan terasa lebih kotor maka dari itu sangat penting untuk menjaga kebersihan vula pada masa postpartum ibu.

Untuk menghindari adanya bakteri yang masuk pada daerah genetalia maka ada beberapa prosedur terapi yang sangat penting di lakukan, yaitu :

- 1) Rajin membilas organ genetalia memakai air yang mengalir dari arah luar ke dalam. Hindari penggunaan sabun yang tidak teruji secara klinis yang dapat memberi efek buruk bagi keasaman vagina.
- 2) Tidak membiarkan area genetalia lembah dan basah, maka dari itu disarankan untuk mengeringkan menggunakan handuk yang kering sesaat selesai buang air kecil maupun mandi.
- 3) Hindari penggunaan celana dalam yang ketat, dan jika dirasa celana atau pembalut dalam sudah lembab maka dianjurkan untuk menggantinya minimal sehari sebanyak 3 kali.

4) Pemenuhan kualitas tidur dan istirahat

Dalam membantu peran barunya sebagai ibu dan mendukung proses laktasi maka ibu postpartum sangat membutuhkan istirahat dan tidur yang cukup sebanyak 8 jam perhari.

Dampak kurangnya pemenuhan istirahat dan tidur ibu akan mempengaruhi asupan air susu ibu dan akan menurun jika proses involusi uterus terhambat hal ini juga dapat mengakibatkan ibu kesulitan dalam merawat bayi (Satria & Komala,2022).

5) Seksualitas pada ibu postpartum

Perubahan fisik maupun bentuk dinding vagina ibu postpartum akan Kembali ke bentuk semula sekitar 6 hingga 8 minggu setelah persalinan selesai. Di masa ini juga, darah nifas sudah tidak keluar lagi hingga secara psikis ibu sudah lebih merasa nyaman dan tidak takut untuk melakukan hubungan seksual (Nurhayati, 2022). Dalam beberapa kebiasaan yang beredar luas di masyarakat, hubungan seksualitas biasanya dilakukan setelah 40 hari pasca partum.

6) Kontrasepsi

Masa nifas ibu akan berakhir setelah 40 hari pasca partum, dimana pada masa ini berakhir maka alat reproduksi ibu telah kembali normal seperti sebelum mengandung ataupun melahirkan. Ketika masa nifas berakhir ibu akan mengalami ovulasi atau masa

subur yang membuat ibu bisa hamil kembali meskipun belum mendapatkan menstruasi. Maka dari itu Nurhayati (2022) mengatakan perlu diadakan sosialisasi edukasi tentang betapa pentingnya penggunaan alat kontrasepsi pada ibu postpartum pada akhir kehamilan dan ditinjau lagi ketika ibu melakukan kunjungan nifas. Alat kontrasepsi yang aman dan cocok untuk mendukung proses laktasi di sebagian besar ibu postpartum ialah penggunaan metode amenorhea laktasi atau biasa di singkat dengan MAL, alat kontrasepsi dengan metode suntik atau injeksi, penggunaan pil, maupun kontrasepsi yang bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama ialah IUD dan Implant.

6. Gravida

a) Definisi *Gravida*

Menurut Ginting *et al* (2022) *Gravida* merupakan angka kehamilan yang terjadi pada wanita disertai dengan angka seluruh kehamilan, adaptasi gejala seperti mengalami rasa mual dan muntah yang menurus hingga usia kehamilan ibu menginjak usia kehamilan 3 bulan.

b) Klasifikasi *gravida*

Berdasarkan jumlahnya, kehamilan seorang wanita dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1) *Primigravida*

Primigravida adalah kehamilan pertama yang dialami oleh wanita. Para wanita hamil merasakan kekhawatiran pada penghujung masa kehamilan terutama di pengalaman kehamilan yang pertama (*primigravida*). Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan terdapat 10 ibu yang sedang mengandung pada *primigravida* di trimester akhir menunjukkan 9 ibu hamil merasakan kecemasan dan Sebagian besar ibu hamil mengalami penurunan kualitas tidur (Wardani *et al.*, 2018).

2) *Multigravida*

Multigravida ialah ibu yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan. Ibu yang memiliki pengalaman hamil disertai rasa trauma dan kekhawatiran yang berlebihan diakibatkan karena adanya pengalaman pada masa kehamilan dan melahirkan yang tidak menyenangkan. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu bisa saja didapatkan karena proses kehamilan yang tidak disertai dengan adanya dukungan dari orang sekitar, perubahan ekonomi yang buruk, kondisi fisik yang tidak mendukung sehingga terjadinya *cyto section caesaria* (Wardani *et al.*, 2018).

3) *Grandemultipara*

Grandemultipara merupakan wanita atau ibu yang mempunyai anak lebih dari 4 anak bahkan lebih. Ibu dengan pengalaman hamil dan melahirkan dengan jumlah yang lebih dari 4

menganggap bahwa kehamilan dan persalinan adalah hal yang biasa saja (Rochjati, 2019).

C. Model Konsep Keperawatan Cheryl Tatano Beck (Postpartum Depression Theory)

Cheryl tatano beck selama 20 tahun terakhir telah memfokuskan penelitiannya pada bidang penelitian yang meneliti suasana hati dan ansietas gangguan postpartum. Teori Cheryl Tatano Beck memiliki perbedaan dari depresi postpartum dengan gangguan emosional, kecemasan yang terjadi pasca partum serta perspektif postpartum yang meliputi gejala, prevalensi, faktor resiko, intervensi dan dampak yang akan terjadi pada proses tumbuh kembang pada anak. Selain itu, teori ini mendeskripsikan mengenai instrument yang dapat dipakai saat skrining depresi postpartum.

1. Definisi depresi postpartum

Beck mengatakan bahwa depresi postpartum merupakan masalah gangguan emosional yang secara umum selalu dilalaikan dalam penanganan kesehatan, sehingga membuat ibu pasca partum mengalami penderitaan dengan ketakutan yang berlebihan, merasakan kebimbangan, hingga kesepian yang mendalam. Bila peristiwa ini tidak segera teratasi, dapat menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap hubungan ibu dan bayi, selain itu masalah gangguan mental bagi anak dapat terjadi dengan jangka yang panjang (Wijaya *et al.*, 2022).

Teori Cheryl Tatano Beck memiliki perbedaan dari depresi postpartum dengan gangguan emosional, kecemasan yang terjadi pasca partum serta perspektif postpartum yang meliputi gejala, prevalensi, faktor resiko, intervensi dan dampak yang akan terjadi pada proses tumbuh kembang pada anak. Selain itu, teori ini mendeskripsikan mengenai instrument yang dapat dipakai saat skrining depresi postpartum.

Konsep utama yang dikemukakan oleh Cheryl Tatano Beck terbagi dua, yaitu gangguan mood postpartum yang meliputi *Depresi Postpartum*, *Maternity Blues*, *Postpartum Psychosis*, *Postpartum Obsessive-Compulsive Disorder* dan *Postpartum-Onset Panic Disorder* serta kehilangan kendali yang terbagi atas empat tahap yaitu : mengalami intimidasi, perasaan nyaris hampir tak bernyawa, berjuang untuk bertahan hidup.

2. Faktor-Faktor Depresi Postpartum

Beck mengemukakan faktor-faktor pencetus terjadinya depresi postpartum ada 13, yaitu :

- a) Depresi prenatal
- b) Stres merawat anak
- c) Stres terhadap kehidupan
- d) Dukungan sosial
- e) Ansietas prenatal
- f) Kepuasan dalam pernikahan

- g) Riwayat depresi
- h) Tempramen bayi
- i) Maternity blues
- j) Harga diri rendah
- k) Status sosial ekonomi
- l) Status pernikahan
- m) Kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan
- n) Gangguan kualitas tidur dan makan
- o) Ansietas dan perasaan tidak aman
- p) Keadaan emosi yang tidak stabil
- q) Kebingungan mental
- r) Kehilangan jati diri
- s) Rasa bersalah dan rasa malu
- t) serta pikiran untuk bunuh diri

3. Aspek Perawatan Depresi Postpartum

Beck juga menyatakan bahwa depresi ialah hasil dari afiliasi stress fisiologis, psikologis, dan lingkungan sekitar yang dapat menambah gejala yang beragam sehingga kemungkinan besar akan muncul beberapa gejala tambahan. Beck juga mempublikasikan “Nurse program” untuk mengatasi depresi pasca partum, program ini mempunyai lima bagian perawatan yang digunakan untuk mengatasi depresi postpartum, adapun diantaranya ialah (Wijaya *et al.*, 2022) :

- a) Nourishment & needs (Nutrisi dan kebutuhan yang lain)
- b) Understanding (Pengertian)
- c) Rest and Relaxation (Istirahat dan Relaksi)
- d) Spirituality (Spiritualitas)
- e) Exercise (Latihan)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, dimana menurut Abdussamad (2022) Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang berpedoman dengan filsafat postpositivisme, dapat dipakai untuk meneliti sebuah kondisi obyek yang natural. Metode penelitian kualitatif dapat disebut sebagai sebuah eksperimen, dimana disebutkan instrument kunci di kendalikan oleh peneliti, purposive dan snowball digunakan untuk mengambil sampel sumber data. Cara pengumpulan datanya di lakukan dengan Teknik triangulasi atau teknik menyatukan. Analisis data dari metode penelitian kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna daripada generalisasi

Ada beberapa desain penelitian kualitatif yaitu desain penelitian fenomenologi, penelitian ini ialah penelitian yang dikerjakan dengan mendeskripsikan sebuah fenomena atau objek lalu dikemukakan dalam bentuk tulisan dengan kategori naratif yang bertujuan untuk memperoleh makna dari pengalaman yang individu alami. Desain yang kedua ialah *grounded theory kualitatif*, dimana penelitian ini memakai limit-limit tertentu pada perkembangan suatu ilmu terkhusus pada ilmu baru, sehingga dijadikan solusi untuk menelaah kembali teori yang muncul dari pengalaman yang ada di lapangan. Namun, prinsip dari teori harus sesuai dengan fakta dan keaslian dari peneliti. Desain terakhir yaitu kualitatif etnografi dimana desain ini dilakukan untuk menggambarkan pandangan

dari nilai-nilai, sikap, watak, keyakinan, bahasa dan tradisi dalam sebuah komunitas di masyarakat (Setiawan, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti pun menggunakan metode kualitatif dengan desain *fenomenologi* yang bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam tentang bagaimana pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan ibu postpartum sebagai informan. Data penelitian ini disusun dengan menggunakan proses wawancara secara langsung kepada ibu postpartum yang mengalami *baby blues syndrome*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kab.Gowa pada tanggal 12 Mei s/d 15 Juni 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu postpartum di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kab.Gowa.

2. Sampel

Informan pada penelitian kualitatif dilakukan penentuan sampel yang berbeda dari metode penelitian kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif berpatokan dengan perhitungan statistik. Data penelitian ini

dikumpulkan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada ibu postpartum yang memiliki pengalaman *baby blues syndrome*.

Pada penelitian kualitatif, penentuan sampel akan dilaksanakan pada saat peneliti akan memasuki lapangan tempat meneliti hingga proses penelitian berlangsung. Berdasarkan dari tujuan penelitian maka teknik pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling dimana menurut Sugiyono (2019) merupakan teknik pengambilan sumber data melalui sebuah pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang dimaksud ialah menentukan sumber data dengan memilih sampel yang akan dipakai dengan populasi yang diperlukan oleh peneliti sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian yang berpatokan dengan hasil kriteria inklusi dan eksklusi berikut :

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

a) Kriteria Inklusi

- 1) Ibu postpartum yang telah memasuki fase *letting go*
- 2) Ibu postpartum yang pernah mengalami *baby blues syndrome*
- 3) Ibu postpartum yang telah mengikuti screening *edenburgh postpartum depression scale* (EPDS) dengan jumlah skor >10
- 4) Ibu postpartum yang bersedia turut andil dalam penelitian ini

b) Kriteria Eksklusi

- 1) Ibu postpartum yang baru memasuki masa *taking in*
- 2) Ibu postpartum yang masih dalam masa *taking hold*

3) Ibu postpartum yang tidak bersedia di ambil datanya

D. Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian yaitu dari ibu postpartum yang mengalami *baby blues syndrome* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kab. Gowa.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara secara langsung terhadap ibu postpartum yang mengalami *baby blues syndrome* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kab. Gowa. Data yang diperoleh juga mempunyai jangka waktu yang panjang karena penelitian kualitatif bersifat penemuan. Namun, jangka waktu penelitian akan berlangsung dalam waktu yang singkat jika telah didapatkan sesuatu dan datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2019). Ibarat mendeskripsikan masalah, atau memahami makna, dan hasilnya konsisten tetap sama dan tak berubah serta kredibilitasnya telah diuji, maka penelitian kualitatif dinyatakan selesai, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.

Menurut Esterbeg dalam Sugiyono (2019), wawancara adalah pertemuan dua orang yang berbagi informasi dan ide melalui konsep tanya jawab, sehingga dapat ditemukan makna dari suatu pembahasan tertentu. Ada beberapa jenis wawancara, diantaranya ialah wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur.

Sugiyono (2019) mengatakan bahwa wawancara terstruktur adalah dimana ketika peneliti sudah menemukan dengan jelas mengenai informasi yang akan didapatkan. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti atau pengumpul data telah menyiapkan perlengkapan penelitian yang berisikan pertanyaan tertulis yang jawaban dari pertanyaan tersebut telah disediakan. Dalam wawancara terstruktur ini, responden akan disugahi pertanyaan yang serupa dan peneliti atau pengumpul data akan mendokumentasikannya.

Adapun juga wawancara semi terstruktur merupakan bentuk wawancara yang masuk dalam kriteria *in-depth interview*, perbedaan dari wawancara terstruktur ialah wawancara semi terstruktur pengaktualannya akan lebih bebas. Tujuan dari jenis wawancara ini, untuk mendapatkan pembahasan secara lebih terungkap, yang mana narasumber dituntut pandangannya beserta ide-idenya Sugiyono (2019). Wawancara tak berstruktur menurut Sugiyono (2019) adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak memakai patokan wawancara yang telah terstruktur dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang dipakai hanya berisikan poin-poin besar permasalahan yang akan ditanyakan, namun untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai responden, maka peneliti dapat juga menggunakan wawancara tidak terstruktur (Sugiyono., 2019). Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur agar lebih mudah dalam melakukan analisa data. Penulis melakukan wawancara kepada ibu

postpartum yang mengalami *baby blues syndrome*, karena dalam penelitian kualitatif tidak ada patokan khusus dalam melakukan wawancara dan jumlah responden akan berubah dengan seiring berlangsungnya proses penelitian.

3. Proses Dan Prosedur Penelitian

Penelitian adalah bagian dari suatu tahap-tahap aktivitas yang terstruktur, dibuat dengan cara-cara tertentu guna mempelajari, mengkaji, mengeksplorasi maupun meneliti hingga memperoleh suatu permasalahan untuk menemukan jawaban dan proses penyelesaian (Djaali, 2020). Penelitian ini legal secara administrasi berdasarkan surat keterangan layak etik dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar dengan No.C148/KEPK/FKIK/V/2023 dan juga telah mendapatkan izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi selatan dengan nomor surat 16309/S.01/PTSP/2023 dan diteruskan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa dengan nomor surat 503/559/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023 serta tercantum dalam lampiran penelitian.

Langkah awal yang harus dilakukan peneliti pada penelitian kualitatif ialah menentukan sampel yang akan digunakan pada penelitiannya yaitu dengan penentuan informan. Tetapi pada penelitian ini, peneliti melakukan penyebaran kuesioner *Edinburgh Postpartum Depression Scale* (EPDS) sebagai langkah awal para ibu postpartum yang ada di wilayah kerja

Puskesmas Samata Kab. Gowa diminta mengisi kuisioner *Edinburgh Postpartum Depression Scale* (EPDS) Ibu postpartum yang memiliki nilai EPDS lebih dari 10 dinyatakan mengalami baby blues. Penafsiran penilaian EPDS antara postpartum blues dengan depresi ialah ditinjau dari waktu yang terjadi. Skrining menggunakan EPDS yang dilaksanakan segera pasca melahirkan dan dilakukan kembali dalam jangka waktu dua minggu merupakan pengkajian postpartum blues dan jika penilaian EPDS dalam waktu satu bulan atau lebih adalah menilai depresi postpartum (Ningrum,2017). Instrumen ini telah dinyatakan valid dan reliabel dengan nilai validitas 80,1% dan reliabilitas 91-94% (Novinaldi, 2020).

Selanjutnya, ibu postpartum akan dihubungi kembali oleh peneliti untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dan kesediaan untuk terlibat. Jika ibu mengerti dan bersedia maka dilakukan kesepakatan untuk pertemuan selanjutnya yakni wawancara. Jumlah sampel (informan) pada penelitian kualitatif tidak sama dengan penelitian kuantitatif. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif tidak mengenal adanya sample minimum (*sample size*) dan lebih sering menggunakan jumlah sample yang lebih sedikit. Bahkan di kasus tertentu, penelitian kualitatif hanya memerlukan 1 informan saja.

Pada penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019) mengatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif, kenaikan sampel atau informan dapat diberhentikan jika jawaban atau data yang didapatkan konsisten sama atau datanya sudah jenuh. Wawancara yang dilakukan dengan informan lama

dan informan baru tidak dapat memberikan jawaban atau informasi baru maka penelitian dianggap telah selesai.

Berikut beberapa tahap atau prosedur yang terdapat pada penelitian kualitatif, yaitu :

a) Tahap Deskripsi

Pada proses penelitian kualitatif, peneliti atau pengumpul data berkewajiban untuk menguraikan apa yang dilihat dengan mata kepala sendiri, yang peneliti rasakan, dan dengarkan serta masalah-masalah yang ditanyakan kepada informan yang turut andil dalam suatu penelitian. Berdasarkan data yang telah didapatkan meskipun datanya beragam macam, banyak dan tidak sistematis secara pasti, peneliti harus mengetahui informasi yang didupatkannya.

b) Tahap Reduksi/Fokus

Pada step ini, semua informasi yang telah diperoleh di step pertama akan dilakukan pengurangan data oleh peneliti dan hanya berpusat pada masalah tertentu. Selain itu, peneliti juga patut menyeleksi data dengan cara memilah mana saja yang termasuk data yang memukau, penting, bermanfaat dan belum pernah ada. Data-data yang tergolong tidak penting dan tidak digunakan pada proses penelitian ini maka bisa dikesampingkan. Setelah peneliti melakukan pertimbangan, maka data-data yang diperoleh bisa dikelompokkan dan ditentukan sebagai prioritas masalah.

c). Tahap seleksi

Tahap seleksi adalah proses ketiga dalam penelitian ini, pada step ini peneliti akan mendeskripsikan prioritas masalah yang telah ditentukan menjadi lebih detail. Peneliti akan mengerjakan analisis yang lebih intensif terhadap data dan informasi yang diperoleh dari informan yang turut andil dalam penelitian, serta peneliti sudah dapat menentukan tema dari penelitiannya dengan cara membangun data yang diperoleh menjadi sebuah balai pengetahuan, ilmu atau teori yang baru.

Dari semua tahapan yang diuraikan diatas merupakan proses bagaimana cara mendapatkan informasi data atau informasi yang didapatkan secara sirkuler, berkali-kali dengan berbagai macam cara serta sumber. Selanjutnya menurut Sugiyono (2019) peneliti akan mengerjakan beberapa tahap penelitian pertama, menentukan apa-apa saja yang akan ditanyakan pada informan yang terlibat dalam penelitian. Kedua, setelah menemukan subjek apa yang akan ditanyakan, selanjutnya peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada seseorang yang ditemui dan ingin turut berpartisipasi menjadi Informan atau informan di suatu tempat tertentu. Ketiga, peneliti akan menelaah apakah jawaban yang dikemukakan oleh informan itu benar atau tidak. Keempat, jika peneliti telah menelaah dan menemukan jawaban yang benar, selanjutnya peneliti akan membuat sebuah uraian dari apa yang diperolehnya. Kelima, peneliti akan berpusat pada hasil uraian dari yang dibuatnya dengan mengidentifikasi kembali apakah kesimpulan yang telah dibuat terbukti kebenarannya atau tidak.

Untuk meyakinkan hal tersebut, peneliti dapat berkunjung kembali ke tempat penelitian berlangsung, mempertanyakan kembali pertanyaan dengan cara dan informan yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Jika peneliti telah menyakini kesimpulan dari yang peneliti buat memiliki keaslian dan keakuratan yang tinggi dan terbukti, maka kesimpulan telah dinyatakan berakhir.

E. Analisa Data

Pada penelitian ini dilakukan proses Analisa data ketika setiap mewawancarai informan dianggap berakhir. Ketika wawancara berakhir maka peneliti akan membuat salinan data dan segera menganalisa data persatu-satu. Pada penelitian ini menggunakan metode *Colaizzi*, dimana metode ini dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tersistematis, lebih detail, dan simple dalam menganalisis data. Menurut Morissan (2019) ada beberapa proses analisis yang peneliti akan kerjakan dengan berpatokan pada metode *Colaizzi*, diantaranya sebagai berikut :

1. Membaca semua salinan hasil wawancara, hasil rekaman wawancara, untuk mengetahui dan menghayati apa yang dirasakan oleh informan.
2. Selanjutnya peneliti merumuskan maksud dari pernyataan penting dari hasil wawancara. Agar hasilnya terbukti kredibilitasnya, peneliti harus kembali membaca, mendengarkan hasil wawancara dengan seksama.
3. Peneliti mengumpulkan maksud-maksud dari hasil wawancara terhadap informan, secara lebih detail.

4. Peneliti mengkategorikan maksud dari apa yang didapatkan pada hasil wawancara bersama informan ke dalam beberapa kategori tema, kemudian peneliti akan mengesahkan kembali terhadap informan.
5. Peneliti menyatukan hasil pengelompokan tema ke sebuah bentuk eksplanasi yang menyeluruh dan memikat berdasarkan dengan topik penelitian dan tujuan penelitian yang akan dicapai oleh peneliti
6. Terakhir, peneliti mengembalikan hasil yang diperoleh pada informan yang turut andil sebagai tahap akhir pengesahan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan rekaman suara pada handphone atau MP3 untuk merekam hasil wawancara dan catatan lapangan untuk mencatat hal-hal verbal yang diperoleh peneliti pada saat wawancara dengan ibu postpartum dengan *baby blues syndrome* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.

G. Etika Penelitian

Menurut Nuraeni (2018) Terdapat beberapa etika penelitian di dalam penelitian keperawatan antara lain sebagai berikut :

1. Lembar persetujuan

Lembar persetujuan atau disebut dengan *informed consent* merupakan lembar yang menguraikan subjek atau informan bersedia untuk diteliti dan diambil data-datanya, dalam lembar *informed consent* ini harus

memasukkan judul dari penelitian yang akan dilakukan serta apa saja manfaat dan kegunaannya. Peneliti pun sebaiknya menghargai dan tidak memaksa jika informan menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian yang akan dibuat.

2. *Anonimity*

Anonimity merupakan bagian terpenting terkait dengan perlindungan informan dalam penelitian keperawatan. Kegiatan dimana peneliti patut menjaga privasi informan dengan tidak mengungkapkan nama pada lembar pengumpulan data atau pada saat wawancara berlangsung. Lembar tersebut hanya berisikan inisial dari informan, seperti I.1 (Informan 1).

3. *Confidentiality*

Kerahasiaan pada etika penelitian keperawatan berarti peneliti harus memperhatikan dan menjaga semua hasil penelitian secara terkunci dan hanya pihak yang terlibat yang dapat menggunakannya termasuk dalam etika memberikan jaminan kerahasaan hasil penelitian, baik data dan informasi lainnya. Seperti, peneliti mengutarakan kepada informan yang bersangkutan dalam penelitian ini bahwa identitas dari informan akan dijamin kerahasiaannya. Peneliti juga akan membuat dokumen hasil pengumpulan data informan diantaranya lembar persetujuan penelitian, biodata atau identitas informan, hasil rekaman suara dan salinan hasil wawancara dalam folder khusus yang aksesnya hanya dimiliki oleh peneliti

seorang. Semua bentuk data yang dipakai dalam penelitian ini hanya diperlukan untuk proses dari bagian analisis hingga penyusunan laporan penelitian. Data akan dihilangkan pada saat tujuan penelitian tergapai dan diperoleh serta laporan penelitian telah berakhir. Sehingga, peneliti wajib menjamin informan agar tidak perlu merasa cemas dan takut jika data pribadi yang bersifat privasi akan terbongkar ke khalayak umum.

4. *Otonomy*

Pada penelitian ini, peneliti juga menerapkan etik otonomi dimana etik ini sangat penting di dalam lingkup keperawatan. Perawat harus menghargai harkat dan martabat pasien sebagai individu yang dapat memutuskan hal yang terbaik bagi dirinya serta perawat harus melibatkan pasien untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan.

H. Uji keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2019) keabsahan data di gunakan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan betul-betul merupakan penelitian ilmiah yang objektif, selain itu untuk mengetes data yang didapatkan. Pada uji keabsahan data ada beberapa bagian yaitu uji kredibilitas (pengesahan internal), *transferability* (pengesahan eksternal), *depenability* (reabilitas) dan terakhir ada *confirmability* (rasionalitas). Berikut penjelasan dari beberapa jenis uji keabsahan data :

1) *Credibility* (Validitas Internal)

Uji *credibility* (pengesahan internal) atau keyakinan kepada data hasil penelitian kualitatif. Teknik ini biasanya menjadi cara alternative dari konsep validitas atau pengesahan internal dari penelitian non kualitatif. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap suatu data hasil penelitian kualitatif dilaksanakan dengan beberapa proses atau step yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, hingga melaksanakan member check Sugiyono (2019). Dalam penelitian ini, data hasil penelitian dikatakan kredibel karena didalam penelitian ini terdapat persamaan dengan data yang dilaporkan peneliti dengan kejadian yang sesungguhnya terjadi pada objek yang sedang diteliti..

2) Uji *Depandability*

Pada penelitian kualitatif, *depandability* disebut reliabilitas. Sebuah penelitian disebutkan sebagai reliabilitas apabila orang lain dapat mengulangi atau menggandakan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, uji *depandability* dilaksanakan dengan cara melakukan pengecekan terhadap keseluruhan proses penelitian yang telah berlangsung. Dengan cara pengecekan yang independen atau pembimbing yang independen mengecek keseluruhan aktivitas yang dilakukan peneliti dalam turun langsung kelapangan atau tempat penelitian, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji

keabsahan data, hingga pada proses pembuatan hasil pengamatan atau kesimpulan Sugiyono (2019). Peneliti melakukan diskusi dengan pembimbing mulai dari menentukan pokok masalah, penelitian langsung dilapangan dengan arahan pembimbing, memilih informan, melakukan analisis data, melaksanakan uji keabsahan data, sampai dengan pada proses penyusunan hasil pengamatan dan kesimpulan.

3) Uji *Konfirmability*

Uji *konfirmability* pada penelitian kualitatif dikatakan juga sebagai pengujian objektivitas. Sebuah penelitian dapat dinyatakan objektif apabila hasil penelitian telah disetujui dan didukung oleh banyak orang. Penelitian ini telah dilakukan uji *konfirmability* dan dianggap sebagai menguji hasil penelitian yang di hubungkan dengan proses yang telah dilaksanakan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi proses penelitian yang telah diadakan atau dilaksanakan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*.

4) Uji *Transferability*

Transferability merupakan validasi atau pengesahan eksternal (bagian luar) pada penelitian kualitatif. Teknik pengujian ini akan memperlihatkan derajat kesesuaian atau memakai hasil penelitian ke populasi terhadap sampel tersebut diperoleh. Pertanyaan yang berhubungan dengan transfer atau mengirim sampai saat ini masih dapat digunakan atau di praktikkan dalam kondisi tertentu. Maka dari itu agar khalayak umum dapat mengerti hasil dari penelitian ini, peneliti harus membuat laporan

yang memperlihatkan atau mengutarakan deskripsi yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat diyakini. Sehingga dapat diputuskan apakah penelitian ini dapat di implementasikan di tempat lain.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Puskesmas Samata

Puskesmas Samata terletak di wilayah kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa yang di dirikan pada tahun 1987 dan mempunyai luas wilayah kerja sejumlah 755,61 km². Wilayah kerja puskesmas Samata mencakup 6 kelurahan yaitu kelurahan Samata, kelurahan Romang-polong, kelurahan Paccinongan, kelurahan Tamarunang, kelurahan Bonto Ramba dan kelurahan Mawang. Batas wilayah yang di miliki oleh Puskesmas Samata ini berada di sebelah utara yakni kota Makassar, sebelah timur terdapat kecamatan Pattallassang dan kecamatan Bonto-Marannu, sebelah barat terdapat kecamatan Tombolo dan sebelah selatan merupakan kecamatan Pallangga.

Kuantitas penduduk di wilayah kerja Puskesmas Samata pada tahun 2017 sebanyak 60.668 jiwa dengan penduduk yang jumlah laki-laknya sebanyak 30.011 orang dan jumlah perempuan sebesar 30.657 orang.

Adapun, mayoritas di sekitar wilayah kerja puskesmas Samata menganut agama islam dan mayoritas mata pencaharian penduduk beragam mulai dari PNS, Guru, Wiraswasta dan Buruh kerja. Tetapi sebagian besar di duduki oleh Wiraswasta.

2. Kondisi Geografis

Puskesmas Samata terletak di Jalan Romang-polong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini cukup strategis dan memadai, berada di tepi jalan dengan dikelilingi lingkungan yang komposisi penduduknya cukup padat.

5. Visi

Terciptanya masyarakat yang otonom serta meningkatkan kepedulian akan pentingnya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Samata.

6. Misi

- a) Mengadakan pelayanan yang bermutu dan mudah di dapatkan oleh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Samata.
- b) Membangun pola hidup yang bersih dan sehat.
- c) Melaksanakan beberapa giat pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan UKMB yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.

7. Karakteristik Informan

Penelitian ini menggunakan 3 orang ibu postpartum sebagai informan. Semua informan telah melalui skrining mandiri menggunakan kuesioner *Edinburgh postpartum depression scale* (EPDS) dengan nilai skor >10 yang berarti menyatakan bahwa ibu postpartum mengalami *baby blues syndrome*. Bahasa yang digunakan pada saat wawancara ialah

bahasa sehari-hari dan sesekali menggunakan Bahasa Indonesia.

Karakteristik informan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut

Table 1.2 Karakteristik Informan

Informan	Usia	Anak ke	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapatan	Skor EPDS
I	24	1	SMA	IRT	<Rp 3.529.181	27
II	30	2	S1	Wiraswasta	>Rp 3.529.181	27
III	23	1	SMA	Mahasiswi	<Rp 3.529.181	30

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Samata pada tanggal 12 Mei s/d 15 Juni 2023. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan hasil Analisa data menurut *Collaizi*, dari hasil wawancara dengan tiga orang ibu postpartum sebagai informan berwujud data hasil recording MP3 berupa transkrip wawancara. Setelah peneliti membuat transkrip wawancara yang dihasilkan dari rekaman audio yang digunakan pada saat meneliti, Langkah berikutnya peneliti menentukan kata kunci dari setiap jawaban yang didapatkan dari informan, menentukan kategori, hingga menghasilkan tema-tema yang disusun berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil Analisa peneliti terhadap hasil wawancara dengan para informan di wilayah kerja Puskesmas Samata tentang pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum didapatkan dan telah disusun dalam bentuk tema sebagai berikut.

Tema I; Perasaan, Perilaku dan Fikiran ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome*

Pada tema ini didapatkan tiga kategori perasaan, perilaku dan fikiran ibu postpartum pada saat mengalami *baby blues syndrome* berupa kategori I; perasaan stress, kategori II; perilaku ingin terus menangis, marah dan ingin menjauhi bayinya, serta kategori III; timbulnya fikiran diluar kendali. Kategori I didukung dengan pernyataan Informan sebagai berikut,

“Pokoknya selaluka sedikit-sedikit stress, apalagi ini kehamilanku kemarin, kehamilan yang paling kutunggu tunggu kodong karna tiga tahunka menikah baru ka lagi hamil ini.” (Informan I)

“Kayak stress-stresska waktuku hamil itu, kan tidak kutahu ki awalna bilang hamilka itu suster toh jadi suka ka lain lain memang.” (Informan II)

“Harus ka eee kapan eh matima kapang, itu kufikir kayak depresi ka, stresska.” (Informan III)

Selain itu, timbul perilaku pada ketiga informan seperti sering menangis, dan marah. Kategori ke II ini didukung oleh pernyataan Informan sebagai berikut,

“ Biasa kalo stress ka menangis menangis mami ka” (Informan I)

“Suka ka menangis-menangis suster..” (Informan II)

“Ka lain lain memang, suka ka marah marah, lain waktunya anak pertamaku suster tidak begitu ja...” (Informan II)

“Nangis terus setiap malam, terus itu eeh kayak depresi kayak eh salah ka ini kapang hamil, kayak anuka kapang ini” (Informan III)

Pada kategori ke II Informan juga merasakan perilaku ingin menjauhi bayinya. Kategori II didukung dengan pernyataan Informan sebagai berikut,

“Tidak mauka sentuh sentuh bayi ku, apalagi sakit jahitanku jadi tambah tidak mau meka gendong ki” (Informan I)

“Pernah tidak kuterima kehadirannya kalau kukasih menyusui itu kulihat ularki, jadi, kadang takut takutka lihatki sampai teriak teriakka itu suster tidak mauka susui..” (informan II)

“Malahan itu nda mau ka susui anakku karena...eee...untuk apa ku susui bapaknya saja nda adai, kenapa saya harus ku susui...” (Informan III)

Selain itu pada ketiga informan timbul kategori III yakni fikiran yang diluar kendali seperti ingin menggaruk-garuk tembok dan ingin membunuh diri sendiri, anak dan suami. Kategori ini didukung dengan pernyataan Informan sebagai berikut,

“Kadang ada perasaanku itu mauka garuk garuk tembok sangking stressku kodong dengar kata katanya orang, apalagi karena tidak ada asiku stress...” (Informan I)

“Tidak bisama lagi itu ungkapkan ki dengan kata kataku ini suster, kadang itu emosi sekalima, mau ma bunuh I bapakna, mauma bunuh I anakna, semuana mau kubunuh suster, bukan mi itu lagi kapang baby blues suster.” (Informan II)

“Berfikirma bilang eh gantung dirima, bunuh dirima tapi berfikirka kenapa saya yang mati mending suamiku sama anakku yang mati kubunuh. Jadi, saya bisa hidup sendiri-sendiri. Itu kufikirkan” (Informan III)

Perasaan, perilaku dan fikiran pada ibu postpartum yang mengalami *baby blues syndrome* ini timbul karena adanya beberapa faktor pencetus terjadinya baby blues syndrome. Hal ini dikemukakan oleh para informan yang telah peneliti wawancara pada tema kedua.

Tema II; Penyebab terjadinya ibu postpartum yang mengalami *baby blues syndrome*

Pada tema ke II Terdapat beberapa kategori faktor yang menjadi pencetus terjadinya ibu postpartum mengalami *baby blues syndrome*, kategori I; suami yang kurang perhatian atau dapat dikatakan tidak adanya dukungan dari suami, tidak ada dukungan keluarga, kategori II; kelelahan, kurang tidur

dan makan, kategori III; kondisi kesehatan ibu pada masa kehamilan, masalah kesehatan yang timbul pasca partum, serta kategori IV; pengalaman menyusui.

Pada kategori I didukung dengan pernyataan informan sebagai berikut,

“ Capek sekalimi toh dek, baru kita itu kodong lebih mauki kalo suamita urus ki suamita yang perhatikanki..” (Informan I)

“Pokoknya tidak ada dukungan suster kecuali teman teman suster, tetangga, kan saya ini suster berwiraswasta ka jadi kadang itu yang...” (Informan II)

“ Pas baru pas itu datangi juga bukan ji saya na perhatikan, tapi, main game terusji na bikin, biar kuminta bilang gendongi dulu ini” (Informan III)

Semua dari Informan yang turut andil dalam penelitian ini mengalami beberapa faktor yang mengakibatkan mereka mengalami *baby blues syndrome* yang termasuk dalam kategori II; Informan mengalami kelelahan, kurang tidur dan tidak nafsu makan. Hal ini didukung dengan pernyataan Informan berikut,

“ Eee... kewalahan meka kodong karena banyak ..eh ...apa... barusanka sudah sesar na banyak pekerjaan yang harus ku lakukan” (Informan I)

“ Dia juga menangis tongmi, kelelahan ma itu kapang suster, kelelahanma, pusingmi kepalaku suster, stress ma, sampai... itumi sampai mau kucekik karena tidak kuterima mi itu keadaanna kah kenapa bisa ada” (Informan II)

“ Kayak..Mmm..eee.. kesulitan sekalika kurasa..tapi bagaimana di hnda taumi deh...begitui dia.. Ehh, tauu..hehe mauka menangis” (Informan III)

Pada kategori ke III; Kondisi kesehatan ibu pada masa kehamilan dan setelah persalinan juga menjadi faktor pendorong *baby blues* terjadi pada ibu postpartum. Hal ini dukung dengan pernyataan berikut,

“ *Kehamilanku toh dek pecah ketuban ka jadi tiba tiba ka di sesar baru itu dari keluarganya suamiku orang melahirkan normal semua..*” (Informan I)

“ *Saya itu sempat kemarin alami pembendungan asi itu suster sampai bengkak bengkak itu payudara ku suster , itumi yang bikin stresska sempatka mau bunuh diri*” (Informan II)

“ *Eem bermasalahki ari-ariku, terpotong-potongi. Baru, Eem, Eeh, setelah tiga hari melahirkan dibawa ma lagi kerumah sakit untuk dikuret dikasih keluar itu anu ku*” (Informan III)

Pada kategori III; Ibu postpartum mempunyai pengalaman yang tidak terlalu berkesan pada saat menyusui bayi. Pengalaman inilah yang membuat ibu postpartum mengalami *baby blues syndrome*. Hal ini didukung dengan pernyataan Informan berikut,

“ *Kudengar cerita begitu, belum lagi asi ku kodong tidak keluar, tidak cepatki eh... maksudnya toh lamaki nah itumi lagi na jadikan bahan pembicaraan yang kasih stress ka* ” (Informan I)

“ *Baru saya itu kan suster bukan ka seperti ibu ibu lain yang gampang menyusui saya itu sempat kemarin alami pembendungan asi itu suster sampai bengkak bengkak itu payudara ku suster , itumi yang bikin stresska sempatka mau bunuh diri*” (Informan II)

“ *Malahan itu nda mau ka susui anakku karena...eee...untuk apa ku susui bapaknya saja nda adai, kenapa saya harus ku susui..*” (Informan III)

Dari beberapa faktor pencetus terjadinya *baby blues syndrome* yang dirasakan ibu postpartum disimpulkan bahwa dukungan sosial menjadi salah satu faktor dominan ibu postpartum mengalami *baby blues syndrome*. Hal ini dikemukakan para informan yang telah diwawancarai pada tema ketiga.

Tema ke III; Kebutuhan psikososial dan spritualitas ibu postpartum pada fase *letting go*

Pada tema ke III ditemukan beberapa kategori yang tersusun berupa cara yang dilakukan oleh Informan untuk mengatasi *Baby blues syndrome* yang mereka alami Diantaranya yaitu kategori I; memperbanyak sholat,

beristigfar, berdoa kepada Allah SWT, mengkonsumsi makanan dan minuman yang disukai, bertemu dengan teman serta bermain social media.

Kategori II; Perasaan ibu postpartum pada fase *letting go*. Hal ini didukung dengan pernyataan Informan sebagai berikut,

“ Kalo seperti itu kadang-kadang... eeh.. beristigfar mami ka terus, kah.. eeh.. banyak banyakka berdoa, sholat tahajjud, sholat taubat supaya enakki perasaanku toh dek. Biasa juga na belikan mka suamiku minuman yang kusuka makanan yang kusuka supaya enakki lagi perasaanku toh dek ” (Informan I)

“ Keluargaku, tidak ada dukungan itu mami sama Allah, berdoa sama Allah,kembali ee itu lagi kembali kepada Allah karena semuanya itu dikembalikan pada Allah toh suster. Sama Pergika jalan jalan na hiburka orang sekelilingku” (Informan II)

“ Sholat, sama main sosial media, tiktok. Itu ji..kalau biasa na lihat storyku orang-orang kayak jalan nga, ketawa-ketawa pasti lagi depresi ka pada saat itu. ” (Informan III)

Pada kategori ke III ibu postpartum telah memasuki fase *letting go* yang merupakan hari dimana ibu postpartum telah dapat beradaptasi dengan peran, aktifitas dan psikologis barunya sebagai seorang ibu. Pada kategori ini Informan yang telah berada di fase *letting go* telah dapat memenuhi kebutuhan psikososialnya berupa dukungan sosial dari orang sekitarnya sehingga para informan sudah dapat menata kembali masa depannya. Hal ini didukung dengan pernyataan Informan berikut,

“ Kayak enakmi kurasa lebih tenang meka karena.. Mmm.. mulai meka terima semuanya, suamiku juga sedikit-sedikit mulai meka na percaya urus anakku. ” (Informan I)

“ Enakmi bisama kembali menerima kenyataan karena lagi lucu-lucunya mi ini anakku yang kedua. ” (Informan II)

“ Itumi kubilang mauka kuliah, mauka tata masa depanku, inimi yang kulakukan kenapa ka bisa bangkit, andai tidak kuliah ka mungkin lama ma mati, bunuh dirima” (Informan III)

C. Pembahasan Penelitian

Tema I : Perasaan, Perilaku, dan Fikiran ibu postpartum yang mengalami Baby blues syndrome

Menurut Widyaningsih (2019) *Baby blues syndrome* merupakan pengalaman yang dirasakan oleh beberapa ibu postpartum dengan perasaan dan tingkat emosional yang tidak menentu yang dialami di hari pertama dan minggu pertama mereka menjadi seorang ibu. Sebanyak 50% hingga 80% ibu pasca partum selalu merasakan kesedihan, kemarahan, dan ansietas yang mendadak. Zulfa (2022) juga menyebutkan bahwa *Baby blues syndrome* diyakini sebagai suatu masalah gangguan emosional yang ringan dan sering sekali dianggap sepele oleh ibu pasca partum, keluarga, orang sekitar maupun tenaga kesehatan.

Wijaya (2022) pada penelitiannya mengatakan bahwa didalam model konsep keperawatan yang disusun oleh Cheryl tatano beck (*Postpartum Depression Theory*) mengungkapkan bahwa ibu yang baru saja melewati proses persalinan biasanya akan mengalami stress, merasakan kelelahan, kecemasan, suasana hati yang tidak stabil serta munculnya fikiran ingin menyakiti diri sendiri. Sedangkan menurut Fatmawati (2021) Adapun gejala yang menunjukkan adanya *baby blues syndrome* atau depresi postpartum yang dialami oleh ibu postpartum yaitu lebih sering menangis secara tiba-tiba dan menerus, timbulnya perasaan sedih yang tak beralasan, kehilangan nafsu untuk makan, menurunnya kualitas tidur sehingga

menimbulkan efek lelah dan kesulitan dalam beraktifitas. Dampak dari semua gejala ini akan membuat seorang ibu akan mengabaikan bayi atau anak kandungnya sendiri.

Pada hasil penelitian ini ditemukan analisa data yang menunjukkan ibu postpartum yang mengalami *baby blues syndrome* merasakan perasaan yang sedih, perilaku sering menangis, perasaan stress yang berkepanjangan, terlalu sensitive, sehingga munculnya pikiran yang diluar kendali seperti ingin menggaruk-garuk tembok, ingin membunuh diri sendiri, anak dan suami. Pada penelitian ini hanya dua dari tiga Informan yang merasakan bahagia pada masa kehamilan, meskipun ungkapan perasaan itu hanya berada di pembuka cerita dan selebihnya diikuti dengan ungkapan emosi-emosi yang lain.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2023) yang mengatakan ada beberapa gejala yang dirasakan ibu postpartum ketika mengalami *baby blues syndrome* yakni,merasakan perasaan sedih terus-menerus tanpa sebab, mudah marah, mudah tersinggung, cemas, merasa bersalah, tidak menerima kenyataan, kurangnya daya tarik kepada bayi sehingga mengakibatkan ibu menyalahkan kehamilan, waktu istirahat yang tidak teratur, membatasi diri untuk bergaul, bahkan meningkatnya perasaan depresi yang membuat ibu postpartum tidak dapat mengendalikan perasaannya sehingga muncul perasaan ingin menyakiti diri sendiri, anak dan suami,serta upaya bunuh diri. Jika kejadian ini berlangsung lama akan

mengakibatkan gangguan tingkah laku, gangguan kognitif yang membahayakan perkembangan anak.

Menurut asumsi peneliti dalam penelitian ini ialah, kebanyakan seorang ibu dimulai dari masa kehamilan dan masa setelah persalinan terjadi (Postpartum). Gejala yang dirasakan oleh ibu postpartum yang mengalami *baby blues syndrome* ditandai dengan adanya perasaan sedih yang berlarut-larut, munculnya ansietas berlebihan, timbul perasaan khawatir karena tidak percaya diri untuk mengurus bayinya. *Baby blues syndrome* ini dapat menimbulkan pengaruh yang berjangka pendek dan berjangka panjang sehingga dapat mengakibatkan adanya perasaan tidak mepedulikan bayi sehingga tidak tercipta ikatan diantara ibu dan bayi yang dapat mengakibatkan perkembangan kognitif anak terganggu, tidak mampu bergaul dengan orang disekitarnya. Selain itu, *baby blues syndrome* ini membagikan situasi yang tidak terlalu harmonis bagi hubungan suami istri, keluarga dan jika tidak ditangani dengan baik akan berubah menjadi depresi postpartum.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2023) mengatakan terdapat satu kemungkinan penyebab *baby blues syndrome* pada ibu postpartum, sebab tersebut adalah ketidak stabilan kadar hormone esterogen dan progesterone dalam tubuh perempuan dengan cepat sesaat setelah persalinan terjadi. Inilah yang meningkatkan perubahan kimia di otak sehingga ibu postpartum mengalami mood swing atau suasana hati yang berubah-ubah. Terlebih pada saat setelah melahirkan, kualitas tidur seorang

ibu akan sangat menurun dan tidak teratur sedangkan kondisi ibu belum sepenuhnya pulih setelah melahirkan. Hal inilah yang diyakini membuat perempuan pasca persalinan mengalami *baby blues syndrome* dengan merasakan reaksi depresi, sedih, mudah menangis, lebih sensitive, ansietas, perasaan yang tidak menentu sehingga sering kali menyalahkan diri sendiri, mengalami kualitas tidur yang menurun, nafsu makan yang menurun. Biasanya gejala ini akan menghilang dalam beberapa minggu pasca persalinan terjadi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hobeika (2023) yang mengatakan Persalinan menyebabkan perubahan penting dalam fisiologi ibu, memicu timbulnya gejala psikopatologis yang berbeda dalam intensitas dan frekuensi. Gejala psikopatologis ini meliputi berbagai bentuk kecemasan dan depresi, yang muncul ke permukaan terutama pada masa ketika ibu sedang dalam masa pemulihan fisik setelah melahirkan. Selain itu, dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesejahteraan ibu dan anak dapat dideteksi. *Baby blues* adalah kondisi jangka pendek yang dipicu oleh persalinan, menampilkan gejala ringan seperti kecemasan, perubahan suasana hati dan reaktivitas emosional yang diperkuat, dengan dampak minimal pada fungsi. *Baby blues* dilaporkan terjadi pada 15-85% wanita dalam 10 hari pertama setelah melahirkan, dengan insiden puncak pada hari kelima.

Hobeika (2023) mengemukakan bahwa kejadian *baby blues* post partum adalah hal yang biasa terjadi, sementara dan tidak memerlukan

intervensi, relevansi pengenalannya harus dicatat karena dipostulatkan sebagai faktor risiko untuk depresi postpartum berikutnya. Komplikasi psikologis yang paling relevan secara statistik dan klinis terkait dengan melahirkan anak adalah depresi pascapersalinan. Sekitar 10-15% wanita yang melahirkan dapat mengalami depresi pascapersalinan, dengan perbedaan antara kelompok populasi dan lokasi geografis. menyatakan bahwa “Postpartum Onset” (kelas gangguan depresi mayor) ditandai dengan gejala yang muncul 4-6 minggu setelah melahirkan. Lebih khusus lagi, gejala depresi pascamelahirkan meliputi gangguan nafsu makan dan tidur, kehilangan energi, perasaan bersalah, berkurangnya perhatian, dan pikiran untuk bunuh diri yang masuk akal. Temuan terbaru menunjukkan tingkat prevalensi 19,8% dari depresi postpartum setelah lahir

Tema II : Penyebab terjadinya *baby blues syndrome*

Penyebab terjadinya *baby blues syndrome* di atas, menurut Aryani *et al.*,(2022) penyebab terjadinya *baby blues syndrome* yang paling banyak ialah faktor ketidakstabilan hormone, umur, metode melahirkan, support dari suami maupun keluarga,tahapan Pendidikan ibu,dan kecapakan.

Selain itu, Aryani *et al.*,(2022) juga mengemukakan faktor resiko yang dapat terjadi pada postpartum depression atau *baby blues syndrome* ialah pendapatan ekonomi yang tidak memadai, paritas, ketidakharmonisnya hubungan dengan keluarga suami dan orangtua, tidak mendapatkan bantuan dari keluarga atau orang terdekat akan merugikan diri selama proses kehamilan dan persalinan tiba-tiba.

Faktor terjadinya *baby blues syndrome* yaitu karena adanya aspek dari masalah hormonal, seperti perubahan kadar estrogen, progesterone, prolactin, serta estroil yang menurun. Jumlah estrpgen pada saat setelah melahirkan memiliki dampak tekanan aktivitas enzim, non adrenalin, maupun serotine yang berfungsi pada pengaturan suasana hati dan masalah depresi. Munculnya rasa tidak nyaman pada fisik yang dirasakan akan menimbulkan perasaan emosi pada ibu postpartum, kegagalan dalam beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang dialami, ketidak sanggupan pada perubahan fungsi yang terjadi pada wanita. Pada penelitian ini dinyatakan Informan mengalami *baby blues syndrome* karena tidak mendapatkan dukungan dari suami dan keluarga terdekat, tidak siap menerima kehamilan, kelelahan, masalah pada saat menyusui bayi yang dimana asi belum kunjung keluar, kelelahan, kurangnya nafsu makan serta kualitas tidur yang menurun adalah hal-hal yang diyakini membuat ibu postpartum mengalami *baby blues syndrome*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliarna (2023) yang menyatakan bahwa seorang ibu postpartum yang mengalami *baby blues syndrome* pada awalnya ia mengalami jam tidur yang berantakan, kurang istirahat dan kurangnya nafsu makan. Terdapat beberapa faktor yang diyakini menjadi alasan mengapa ibu postpartum mengalami *baby blues syndrome* yaitu usia ibu, paritas, dukungan suami, pendidikan, masalah perekonomian dan pekerjaan, proses persalinan yang menimbulkan rasa trauma, masalah yang muncul sebelum dan setelah

melahirkan, pendarahan, pecah ketuban dan rasa sakit sesaat setelah dilakukan operasi SC yang tiba-tiba terjadi.

Menurut asumsi peneliti bahwasanya penyebab terjadinya *baby blues syndrome* yang paling banyak dijumpai ialah kurangnya dukungan dari suami dan keluarga, kurangnya perhatian yang didapatkan oleh seorang ibu pasca partum. Padahal, seorang ibu yang baru saja melalui proses kehamilan dan persalinan yang tidak mudah sangat memerlukan dukungan dan perhatian yang lebih dari orang terdekatnya. Pada kejadian *baby blues syndrome* yang dialami ibu postpartum diakibatkan karena faktor psikologis, diantaranya yaitu kurangnya dukungan sosial dan emosional yang diberikan dari lingkungan sekitarnya seperti suami, keluarga dan teman. Fungsi suami dan keluarga sangat dibutuhkan pada masa kehamilan dan sesaat setelah persalinan terjadi terlebih pada masa-masa merawat bayi agar dapat mengurangi resiko terjadinya *baby blues syndrome*. Dukungan yang didapatkan dari lingkungan sekitar seperti suami, keluarga dan teman terdekat sangat berperan penting kepada kondisi ibu selama hamil dan setelah melahirkan sehingga dipercaya dapat mengurangi serta mencegah terjadinya *baby blues syndrome* atau *postpartum depression*.

A Laitupa (2023) pada penelitiannya menyampaikan beberapa ibu postpartum yang sedang mengalami *baby blues syndrome* namun terkadang ia tidak menyadarinya, hal ini dikarenakan dianggap hal yang wajar terjadi pada saat setelah melahirkan. Pada proses persalinan dianggap merupakan kejadian yang normal, tetapi terkadang ibu akan merasakan ketegangan

ataupun ansietas yang tinggi dan akan mempengaruhi keadaan psikologisnya meskipun hal ini sesuatu yang wajar terjadi tetapi tidak diperbolehkan berlanjut begitu lama. Seorang ibu harus menyiapkan kesiapan dirinya untuk melalui kondisi yang akan berdampak pada tingkat stress. Kesiapan-kesiapan tersebut bukan berarti untuk melenyapkan stressor tetapi untuk mengurangi beban stressor yang dirasakan.

Menurut Laitupa (2023) Hal yang paling sangat mempengaruhi kejadian *baby blues* yang dialami ibu postpartum adalah faktor dukungan sosial yang berupa perhatian dan support sehingga ibu postpartum merasa dicintai dan disayangi. Perempuan yang merasakan *baby blues syndrome* akan merasa mereka menerima kurang dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, padahal ibu sangat menginginkannya. Peran suami dan keluarga dalam membantu ibu merawat bayi dapat mengurangi rasa lelah yang dirasakan ibu sehingga dapat meminimalisir kejadian *baby blues syndrome*. Maka dari itu, diharapkan suami dan keluarga terdekat dari ibu yang baru saja melahirkan harus memberikan lebih banyak dukungan dan bantuan yang dibutuhkan bagi ibu postpartum untuk mencegah terjadinya kejadian *baby blues syndrome*. Dukungan sosial yang diberikan kepada ibu dapat berbentuk ungkapan emosional seperti memberikan ungkapan empati, kepedulian dan perhatian terhadapnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariani (2022) mengemukakan Bahwa ibu pada masa kehamilan dan masa pasca persalinan sangat membutuhkan dukungan sosial dari orang sekitarnya. Dukungan

sosial seperti memberikan informasi yang penting dan sesuai dengan kondisi ibu, memberikan nasihat, membantu ibu ketika mengalami kesulitan di masa awal kehamilan dan setelah melahirkan, serta sikap yang baik yang dinampakkan oleh orang terdekat di lingkungan sosial ibu hamil dan ibu postpartum. Selain itu, orang terdekat yang berada di lingkungan sosial dapat selalu menunjukkan kehadirannya yang diyakini dapat memberikan efek keuntungan untuk tingkat emosional dan berpengaruh pada respon sikap ibu sebagai penerimanya. Indeks dari dukungan sosial diantaranya perhatian emosional, bantuan, pemberian informasi dan validasi kepada ibu selama masa kehamilan hingga masa post partum. Dukungan sosial dari suami merupakan perencanaan koping yang penting untuk ibu postpartum yang mengalami stres pasca melahirkan dan berfungsi sebagai strategi pencegahan untuk mengurangi *baby blues syndrome*. Suami dapat memberikan perhatian, komunikasi yang tercipta dengan baik, dan hubungan emosional yang akrab dan mendalam. Bentuk dukungan dari keluarga terutama dari orang tua ibu diantaranya yaitu komunikasi dan hubungan emosional yang baik dan hangat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Qi (2022) menyatakan hubungan pasangan merupakan perhatian yang sangat penting bagi wanita postpartum, untuk meningkatkan kepuasan pernikahan dan dukungan sosial yang dirasakan wanita postpartum dapat mencegah perkembangan atau kemunduran *postpartum depression* atau *baby blues syndrome*. Intervensi yang berfokus pada pasangan atau program untuk mempromosikan

keterlibatan ayah dalam pengasuhan diperlukan pada periode pascapersalinan awal atau bahkan lebih awal. Di Cina, selain suami, ibu mertua adalah pengasuh utama wanita pascapersalinan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kepedulian terhadap ibu mertua juga ditemukan sebagai prediktor yang signifikan terhadap *postpartum depression* atau *baby blues syndrome*. Hasil kami menggambarkan lebih jauh efek kepedulian yang dirasakan ibu mertua terhadap postpartum depression meliputi dua jalur serta kepuasan pernikahan, efek langsung dan efek tidak langsung melalui dukungan sosial. Oleh karena itu, meningkatkan hubungan antara ibu baru dengan suami atau ibu mertuanya, tidak hanya berperan penting dalam penurunan postpartum depression secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung dapat mencegah postpartum depression dan baby blues syndrome melalui peningkatan dukungan sosial.

Wijaya (2022) pada penelitiannya mengatakan bahwa di dalam konsep Keperawatan Cheryl Tatano Beck (*Postpartum Depression Theory*) Beck mengemukakan beberapa faktor pencetus terjadinya depresi postpartum ada 13, yaitu Depresi prenatal, stres merawat anak, stres terhadap kehidupan, dukungan sosial, ansietas prenatal, kepuasan dalam pernikahan, riwayat depresi, tempramen bayi, maternity blues, harga diri rendah, status sosial ekonomi, status pernikahan, kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan, gangguan kualitas tidur dan makan, ansietas dan perasaan tidak aman, keadaan emosi yang tidak stabil, kebingungan mental, kehilangan jati diri, rasa bersalah dan rasa malu, serta pikiran untuk bunuh diri. Hal ini

sejalan dengan hasil penelitian yang di dapatkan dari beberapa informan yang mengalami *baby blues syndrome* karena kurangnya dukungan sosial yang didapatkan, ansietas dan stres pada masa prenatal, *maternity blues*, kehamilan yang tidak direncanakan, gangguan kualitas tidur dan makan, keadaan emosi yang tidak stabil, rasa bersalah pada diri sendiri serta fikiran untuk melukai diri dengan cara melakukan bunuh diri. Tetapi, pada hasil penelitian yang di dapatkan pada penelitian ini mengatakan beberapa informan tidak terkena resiko *baby blues syndrome* dikarenakan masa perekenomian didalam keluarganya dirasa cukup, tidak memiliki riwayat depresi dan tempramen pada bayi, status pernikahan yang dianggap tidak menjadi masalah pada ketiga informan, tidak terjadinya gangguan harga diri rendah dan kehilangan jati diri pada setiap informan.

Sedangkan menurut Laitupa (2023) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa kesediaan orang-orang terdekat memberikan dukungan emosional seperti mendengar keluhan ibu, akan memberikan dampak positif sebagai sarana pelepasan emosi, mengurangi kecemasan, membuat ibu merasa nyaman dan tentram, diperhatikan serta dicintai saat menghadapi berbagai tekanan dalam hidup mereka. Selain faktor tersebut, persalinan Sectio Caesaria (SC) juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya *baby blues syndrome*. Ibu postpartum dengan jenis persalinan *section caesaria* lebih gampang terkena *baby blues syndrome* bahkan dapat berlanjut menjadi depresi postpartum dipadankan ibu yang melalui proses persalinan refleks. Selain menyebabkan rasa trauma, persalinan dengan

dengan metode *section caesaria* dapat meningkatkan tekanan pada perekonomian keluarga, dimana hal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya *baby blues*. Keadaan ekonomi yang kurang mengakibatkan ibu merasa khawatir tentang masa depan anaknya sehingga ibu mengalami beban yang berat yang menyebabkan terjadinya *baby blues syndrome* pasca partum.

Tema III : Kebutuhan psikososial dan spritualitas ibu postpartum pada fase *letting go*

Pada fase ini ibu sudah lebih menerima kondisi barunya sebagai orang tua, kondisi tubuh yang lelah setelah melahirkan telah pulih sepenuhnya sehingga pada periode ini ibu lebih menerima peran barunya sebagai orang tua Widiastuti *et al* (2022). Selain itu, di fase ini seorang ibu sudah dapat beradaptasi dengan psikologisnya atau biasa disebut dengan fase *letting go* merupakan hari dimana ibu postpartum telah dapat beradaptasi dengan peran dan aktifitas barunya sebagai seorang ibu. Pada penelitian ini Informan yang telah berada di fase *letting go* telah merasa tenang, dapat menerima kenyataan, dan juga menata masa depannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfa (2022) fase ini disebut sebagai masa-masa ibu postpartum dapat menerima tanggung jawab akan peran baru sebagai seorang ibu.

Peneliti pun beramsumsi bahwa di fase *letting go* ibu postpartum sudah mulai beradaptasi dengan baik sehingga sudah mulai menerima peran barunya menjadi orangtua, perasaan yang dirasakan sudah mulai tenang,

serta ibu postpartum mulai mengharapkan hal-hal yang baik terjadi sehingga ibu postpartum segera bangkit dari keterpurukan yang dirasakan pada saat mengalami *baby blues syndrome*. Jika ibu postpartum dapat menguasai dan beradaptasi dengan berbagai macam perubahan pasca partum, maka ibu diyakini tidak akan merasakan kepanikan, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan, sebaliknya jika ibu gagal dalam menyesuaikan diri dengan peran barunya atau disebut dengan mal adaptif atau masalah psikologis ibu postpartum akan merasakan ketakutan yang luar biasa, kepanikan, khawatir, selalu menangis. Jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang Panjang atau berlarut-larut maka dapat dipastikan akan muncul masalah yang mempengaruhi perkembangan anak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nusi (2022) yang mengemukakan bahwa di fase *letting go* seseorang akan menerima apapun kondisinya saat ini. Penerimaan tidak selalu menjadi tahap yang membahagiakan atau membangkitkan semangat. Tahap ini tidak berarti seseorang telah melewati kesedihan. Seseorang mungkin akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Perasaan kurang puas dalam fase ini dapat diminimalisir apabila seseorang sudah bisa bahwa masalah ini tidak akan terlalu berat jika dibandingkan hal buruk lainnya yang untungnya tidak mereka alami atau berhasil mereka lewati sebelumnya. Tahapan ini akan memikirkan objek yang hilang beralih ke objek lain, dan menerima kenyataan kehilangan. serta mulai memandang ke depan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarez (2023) yang mengungkapkan

bahwa di fase *letting go* diumpamakan sebagai fase penerimaan dimana seseorang ibu telah mengetahui kondisi sebenarnya yang telah ia alami dan merasa bahwa ia butuh pengobatan, di fase ini seorang ibu telah berdamai dengan keadaannya sehingga ibu dapat menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang ia rasakan dan akan fokus menjalani pengobatan atau terapi-terapi yang bisa membuat dirinya merasa jauh lebih baik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nova (2020) mengemukakan bahwa adaptasi psikologis oleh ibu postpartum ialah suatu akibat dari dorongan atau pancingan jiwa seorang ibu yang baru saja melahirkan. Seorang wanita dewasa didambakan dapat menjalankan peran baru sebagai seorang istri dan seorang ibu. Setiap wanita menginginkan kasih sayang, perhatian, legalisasi dari orang lain dan juga ingin diketahui, di pahami butuh perhatian dan butuh mendapatkan support dari orang terdekat seperti suami, keluarga dan teman. Terlebih lagi di saat setelah melahirkan dimana pada fase ini seorang ibu baru menampakkan gejala-gejala depresi ringan sesaat setelah melahirkan. Pada saat pemberian dukungan dan nasehat, diharapkan tenaga Kesehatan dapat mengikut sertakan suami, keluarga dan teman untuk melaksanakan asuhan pasca partum. Maka akan membentuk hubungan antar manusia yang baik, antara tenaga Kesehatan dan klien dengan terciptanya *a good human relationship* yang dapat memberikan seorang ibu support dari kebutuhan psikologis pasca melahirkan bayi.

Wijaya (2022) pada penelitiannya mengatakan bahwa didalam model konsep keperawatan yang disusun oleh Cheryl tatano beck

(*Postpartum Depression Theory*) mempublikasikan “Nurse program” untuk mengatasi depresi pasca partum, program ini mempunyai lima bagian perawatan yang digunakan untuk mengatasi depresi postpartum, adapun diantaranya ialah, *Nourishment & needs* (Nutrisi dan kebutuhan yang lain), *Understanding* (Pengertian), *Rest and Relaxation* (Istirahat dan Relaksi), *Spirituality* (Spiritualitas) dan *Exercise* (Latihan). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang didapatkan peneliti bahwa setiap informan memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan mengkonsumsi makan dan minuman yang disukai, melakukan relaksasi dan pedalaman spiritualitas yang dianggap dapat membuat perasaannya lebih tenang.

Postpartum blues atau *baby blues syndrome* pada ibu postpartum dapat diatasi dengan pemberian terapi obat-obatan dengan *fluoxetine* tetapi kekurangan dari jenis obat ini akan membuat ibu mengalami ketergantungan obat, sering merasakan sakit di kepala, nafsu makan yang turun sehingga mengakibatkan rasa mual dan muntah. Tetapi, ada cara lain yang bisa mengatasi *baby blues syndrome* ini tanpa menggunakan obat farmakologi seperti pemberian relaksasi nafas dalam, melakukan kompres, imajinasi terbimbing, pengalihan, mendengarkan musik yang disukai, melakukan hal hal yang berbau kesenian, pemberian minyak esensial, dan menuangkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan.

Berdasarkan hasil Analisa data pada penelitian ini menunjukkan bahwa ibu postpartum yang mengalami *baby blues syndrome* yang menjadi Informan pada penelitian ini melakukan berbagai macam upaya untuk

mengatasi *baby blues syndrome* yang ia alami seperti dengan memperbanyak berdoa kepada Allah SWT, memperbanyak dzikir, rajin sholat, mengkonsumsi makanan dan minuman yang disukai serta mendikstraksi diri dengan bermain social media. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Indriani (2022) yang menyatakan ada beberapa cara yang dapat dilakukan ibu *baby blues syndrome* untuk memenuhi kebutuhan spritualitasnya yaitu, mendekati diri pada Allah karena dengan mendekati diri dan banyak mengingat Allah hati akan merasa lebih tenang dan damai. Ketika seseorang berdzikir dapat menenangkan hati dari semua masalah yang ada. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam Qur'an surah yunus ayat ke 57 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي
الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahannya “Wahai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (*al-Qur'an*) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”

Tafsiran dari ayat ini ialah tiap-tiap yang bernyawa akan kembali kepadaNya. sehingga manusia di peringati, Wahai hamba Allah! sungguh, sudah tiba kepadamu ilmu yang terdiri dari kitab suci Al-Qur'an dari sang penciptaMu, obat yang dapat membuat dada mu sembuh dari dari penyakit hati serta ini merupakan penuntun ke arah yang benar dan rahmat yang tak ternilai bagi orang-orang yang betul-betul beriman. Sebutkan lah wahai Nabi Muhammad terhadap manusia dengan keberkahan Allah SWT

meliputi Agama islam dan rahmatNya, yaitu Al-Quran. sebaiknya mereka bersuka cita karena karunia dan rahmat Allah SWT itu lebih bernilai daripada yang telah mereka tabung seperti harta dan kemakmuran duniawi.

Peneliti pun berasumsi bahwa memperbanyak melakukan ibadah kepada Allah SWT adalah pilihan yang tepat pada saat mengalami *baby blues syndrome*. pada hakikatnya manusia mempunyai fitrah yang beragama dan selalu merasakan kerinduan untuk kembali dengan Tuhan yang Maha Esa, dalam pemahaman lain dapat dikatakan atau diartikan sebagai Homo Relegion atau Homo Dividian (Makhluk yang bertuhan). Dinyatakan seperti itu karena secara insting manusia pada dasarnya selalu meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sehingga, sekecil dan sebesar apapun masalah maka tempat yang paling tepat untuk kembali ialah hanya kepada Allah SWT. Selain itu, peneliti juga menyarankan kepada semua informan yang turut andil dalam penelitian ini untuk mengamalkan dua bacaan dzikir agar membuat hati tenang yaitu dengan bacaan yang pertama “*Hasbunallah wa ni'mal wakiil*”, dan kedua zikir “*la haula wala quwwata illa billah*”.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2022)

A menunjukkan bahwa terapi dzikir efektif menurunkan tingkat kecemasan. Pada kelompok intervensi, ibu hamil secara signifikan mengurangi kecemasan, dibandingkan kelompok kontrol. Berdzikir membuat seseorang untuk mempunyai kekuatan batin dalam menerima situasi yang kurang menyenangkan sertaterus meningkatkan diri untuk menggapai masa depan, mendapatkan kepuasan, mengangkat harapan, menggapai pengampunan

Tuhan, merasakan perlindungan Tuhan, dan membawa kedamaian, ketenangan dalam jiwanya. Selain itu, dzikir juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan ketenangan jiwa, dimana terdapat perbedaan bermaknas tingkat ketenangan jiwa sebelum dan setelah pemberian pelatihan dzikir, skor rata-rata sebelum 78,56 menjadi 98,33. Seseorang yang mengingat Allah akan membuat hati individu tersebut menjadi tenang dan tentram, sehingga ketenangan dan ketentraman dari hati ataupun jiwa akan membantu individu tersebut dalam mengelola emosinya. Selain itu peneliti menyarankan kepada semua informan untuk menggapai ketenangan hati tentunya harus melakukan amalan shaleh terlebih dahulu seperti mengerjakan shalat tahajjud. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW: "Salat manakah yang paling utama setelah salat wajib?" Rasulullah menjawab: "Salat tahajud." (HR Muslim).

Selain itu, Informan yang turut andil dalam penelitian inipun memiliki cara tersendiri untuk mengatasi *baby blues syndrome* yang ia rasakan dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang disukai, bertemu dengan teman-teman serta bermain social media. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adilla (2019) yang mengungkapkan bahwa penanganan *baby blues* pada ibu primipara yaitu dengan mencari hiburan, bermain youtube, dan meminta dibuatkan makanan atau dikenal dengan koping yang berfokus pada pikiran dan tindakan yang meredakan distress emosi. Makanan dapat mengubah atau menginduksi emosi melalui

stimulasi sensorik yang cepat atau kelegaan dari rasa lapar (*relief of hunger*), sebagai hasil dari penilaian kognitif terhadap perubahan dalam keadaan internal atau harapan individu. Makanan juga dapat mengubah *mood* melalui perubahan yang lambat pada kimia otak

Menurut asumsi peneliti didalam penelitian ini ialah pentingnya dilakukan Teknik distraksi dengan alih fokus perhatian pada sesuatu selain rasa tidak nyaman dapat menjadi strategi yang sangat berhasil dan mungkin merupakan mekanisme yang bertanggung jawab terhadap teknik kognitif afektif lainnya. Distraksi diduga dapat menurunkan persepsi rasa tidak nyaman dengan menstimulasi sistem kontrol desenden, yang mengakibatkan lebih sedikit stimuli rasa tidak nyaman yang ditransmisikan ke otak. Mekanisme distraksi ini dapat dijelaskan dengan adanya endorfin dan enkefalin dalam tubuh yang merupakan substansi yang berfungsi sebagai inhibitor terhadap transmisi nyeri. Endorfin dan enkefalin, substansi seperti morfin yang diproduksi oleh tubuh adalah contoh dari substansi yang menghambat transmisi impuls rasa tidak nyaman. Apabila tubuh mengeluarkan substansi-substansi ini, satu efeknya adalah hilangnya rasa tidak nyaman yang dirasakan. Substansi ini ditemukan dalam konsentrasi yang kuat adalah sistem saraf pusat

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh adilla (2029) menyatakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh ibu postpartum untuk menangani *baby blues syndrome* ialah dengan mencari hiburan yang dapat membuat ibu postpartum teralihkan dari fikiran dan perasaan ketika sedang

mengalami *baby blues syndrome*. Hal ini dapat menambah relasi yang memadai dan mengerti dengan situasi yang sedang dialami oleh ibu. Setiap ibu yang merasakan *baby blues syndrome* sangat memerlukan kesempatan untuk mengutarakan pikiran dan perasaan dari situasi yang mengancam diri ibu postpartum.

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Yang (2019) juga mengatakan bahwa ibu post partum dapat mengurangi kecemasan yang dialami dan tingkat stress yang dirasakan dengan cara terapi mendengarkan musik. Saat mendengarkan musik ibu post partum akan merasakan kenyamanan karena musik bekerja pada sistem limbik di sistem saraf yang dapat menyusun kontraksi otot-otot didalam tubuh agar berkurang dan mencegah kecemasan dan depresi. Selain itu, dapat mengurangi kekerapan denyut jantung, tekanan darah dan melenyapkan rasa nyeri. Musik juga diyakini dapat memberikan ketenangan terhadap kondisi fisik serta psikologis ibu post partum dan membuat lingkungan yang aman, nyaman dan tenang untuk bayinya sehingga dapat menciptakan hubungan batin terhadap ibu dan anak. Melalui ritme musik yang tepat dapat membagikan vitalitas dan perintah sehingga dapat membuat ibu post partum dapat mengatur pernafasannya dan menghilangkan sedikit demi sedikit rasa nyeri yang dialami.

D. Implikasi Penelitian

1. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait dengan pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum

2. Tenaga kesehatan

Hasil penelitian ini terkait dengan pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Samata, dapat dijadikan pedoman atau pegangan untuk tenaga kesehatan agar dapat lebih mengetahui tentang kendala dan hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan ibu pada masa kehamilan dan masa setelah persalinan (Nifas).

3. Keluarga

Keluarga adalah seseorang yang paling dekat dengan ibu di masa kehamilan dan masa setelah persalinan terjadi. Maka dari itu, hasil penelitian ini sangat penting sebagai bahan edukasi untuk keluarga agar dapat membantu mengurangi resiko terjadinya *baby blues syndrome*.


E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, diantaranya:

1. Ibu postpartum yang menjadi informan dan berpartisipasi dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang memiliki banyak kesibukan mengurus

anak dan suami sehingga sulit untuk menentukan waktu wawancara. Hal ini tentu mempengaruhi proses berjalannya wawancara sehingga data yang didapatkan dari hasil wawancara masih terbilang kurang.

2. Ada beberapa ibu postpartum yang hendak dijadikan Informan dalam penelitian ini menolak untuk diwawancarai sehingga informan yang berhasil didapatkan data atau diwawancarai hanya berjumlah tiga orang.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dijelaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Gejala yang dirasakan ibu postpartum yang mengalami *baby blues syndrome* atau depresi postpartum adalah lebih sering menangis secara tiba-tiba dan menerus, timbulnya perasaan sedih yang tak beralasan, kehilangan nafsu untuk makan, munculnya tindakan atau perasaan yang tidak bisa terkendalikan, menurunnya kualitas tidur sehingga menimbulkan efek lelah dan kesulitan dalam beraktifitas. Dampak dari semua gejala ini akan membuat seorang ibu akan mengabaikan bayi atau anak kandungnya sendiri.
2. Penyebab terjadinya *baby blues syndrome* yang paling banyak ialah faktor ketidakstabilan hormone, umur, metode melahirkan, kurangnya dukungan yang didapatkan dari suami maupun keluarga, tahapan pendidikan ibu, dan kelelahan.
3. Pada fase *letting go* ibu postpartum memiliki beberapa kebutuhan psikososial dan spritualitas untuk mengatasi *baby blues syndrome* menonton tontonan yang disukai dan mendengarkan musik yang disukai, memperbanyak mendekati diri kepada Allah SWT dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu, berdzikir, selain itu dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang disukai. Pada fase ini ibu sudah mulai beradaptasi dengan baik sehingga sudah mulai menerima peran barunya menjadi orangtua, perasaan yang dirasakan sudah mulai tenang, serta ibu postpartum mulai

mengharapkan hal-hal yang baik terjadi sehingga ibu postpartum segera bangkit dari keterpurukan yang dirasakan pada saat mengalami *baby blues syndrome*.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Institusi Kesehatan (Puskesmas)

Pelayanan kesehatan diharapkan lebih memperhatikan dan meningkatkan pelayanan nifas pada ibu postpartum agar dapat terdeteksi ibu postpartum yang mengalami resiko terkena *baby blues syndrome* agar dapat dilakukan pencegahan dini.

2. Bagi Perawat

Meningkatkan pengetahuan perawat tentang gejala awal terkena resiko *baby blues syndrome* yang nampak dari masa kehamilan dan setelah persalinan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara kuantitatif agar jumlah sampel penelitian lebih banyak sehingga data yang diperoleh lebih valid, reliable dan objektif. Namun, jika penelitian kualitatif dilakukan kembali, jumlah sampel dalam penelitian diharapkan lebih banyak dari penelitian ini. Dan diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap ibu postpartum yang mengalami *baby blues syndrome* dengan beberapa faktor-faktor yang dikemukakan dalam Model Konsep Keperawatan Cheryl Tatano Beck (Postpartum Depression Theory) selain dari faktor

stress terhadap kehidupan, dukungan sosial, Ansietas dan perasaan tidak aman, Kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan, Gangguan kualitas tidur dan makan, serta pikiran untuk melukai diri sendiri dan melakukan bunuh diri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2018). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, (December), 14. Retrieved From Eprints.Polsri.Ac.Id
- Abadiavil, D., Sharifi, N., Dashti, S., & Najafi, T. F. (2021). Effects Of Yoga In Pregnancy On Postpartum Depression: A Systematic. *Jurnal Ilmu Masyarakat*, 2(1).
- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Syakir Media Press.
- Adila, D. R., Saputri, D., & Niriyah, S. (2019). Pengalaman Postpartum Blues Pada Ibu Primipara. *J Ners Indones*, 9(2), 156–162.
- Aisyaroh, N., & Islami. (2022). Efektifitas Kunjungan Nifas Terhadap Pengurangan Ketidaknyamanan Fisik Yang Terjadi Pada Ibu Selama Masa Nifas. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 5(2), 67–81.
- Annisa., Saputra, M. I. R., Agnesfadia, S., & Gumelar, P. Y. (2022). Pengaruh Olahraga Terhadap Fenomena Baby Blues Syndrome (Postpartum Blues) Pada Ibu postpartum (Postpartum). *Jurnal Penelitian Ilmu Masyarakat*, 1(1).
- Aryani, Roza, Afriana, A., & Faranita, F. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Baby Blues Syndrome Pada Ibu Post Partum Di Rsud Dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh. *Journal Of Healthcare Technology And Medicine*, 8(2), 1325–1336.
- Barroh, Mazidatul, Andini, M. ., & Ridjal, T. (2018). Peran Bimbingan Dan Konseling Untuk Mengurangi Dampak Baby Blues Syndrome Pada Ibu Pasca Melahirkan. *Jurnal Thalaba Pendidikan Indonesia*, 1(1), 37–52.
- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pt Bumi Aksara.
- Dwiyanti, E., & Nabilla, T. (2022). Efektivitas Yoga Dalam Mengatasi Kecemasan Ibu Hamil Dan Depresi Postpartum: Systematic Review. *Journal of Community Mental Health and Public Policy*, 5(1), 40-49.

- Fatmawati, A., & Gartika, N. (2021). The Hubungan Kondisi Psikosl Dan Paritas Dengan Kejadian Depresi Postpartum Pada Ibu Remaja. *Faletehan Health Journal*, 8(01), 36-41.
- Farhan kamali, (2022). Edinburgh Post-natal Depression Scale (EPDS): Deteksi Dini dan Skrining Depresi Post-partum. *Jurnal kesehatan* vol. 13 no. 2.
- Fahrina, S. I. (2021). *Pengaruh Expressive Writing Therapy Terhadap Kecemasan Ibu Post Partum Di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati (Doctoral Dissertation)*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Fitri, I. (2022). *Pengaruh Terapi Murottal Al-Qurán Dan Dzikir Terhadap Kejadian Postpartum Blues Di Wilayah Kerja Puskesmas Kotak Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ginting, M. R. B., Anggraini, H., & Sari, E. P. (2022). Hubungan Gravidita, Jarak Kehamilan Dan Status Gizi Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 668–674.
- Hafsa, A. (2022). Gambaran Post Partum Blues Pada Primipara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8039–8042.
- Harianis, S., & Sari, N. I. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Post Partum Blues. *Jomis (Journal Of Midwifery Science)*, 6(1), 85–94.
- Hidayati, N. O., Damarwulan, N., Safitrie, M., Sybromillsy, A., Jannah, N. H., Rosada, A., Suwito, D. A., Monika Senja, N. D., & Rizkiawan, A. (2022). Hidayati, N. O., Damarwulan, N., Safitrie, M., Sybromillsy, A., Jannah, N. H., Rosada, A., Suwito, D. A., Monika Senja, N. D., & Rizkiawan, A. . (2022). Efek Aktivitas Fisik Terhadap Depresi Post-Partum: Studi Literatur. *Jurnal Ilmu Keperawatan Maternitas*, 5(1), 10–1.
- Hobeika, E., Malaeb, D., Obeid, S., Salameh, P., Hobeika, E., Outayek, M., ... & Hallit, S. (2023, January). Postpartum Depression and Anxiety among Lebanese Women: Correlates and Scales Psychometric Properties.

In *Healthcare* (Vol. 11, No. 2, p. 201). MDPI.

Indriani, I. (2022). Penanganan Baby Blues Syndrome Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studi Islam*, 3(1), 1–11.

Jannah, M., & Latifah, N. (2022). Literature Review: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adaptasi Psikologi (Postpartum Blues) Pada Masa Nifas (Puerperium). *Bhamada: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan (E-Journal)*, 13(1), 64–68.

Kemendes RI. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia 2018*. Kementerian Kesehatan RI.

Klainin, P., & Arthur, D. . (2019). Postpartum Depression In Asian Cultures : A Literature Review. Postpartum Depression In Asian Cultures : A Literature Review. *Int J Nurs Stud*, 4(6), 1355–1373.

Laitupa, Sitti Asma Kurniyati, Endah Purwanti, and Laili Nur Hidayati. "Pengalaman Baby blues Syndrome Pada Ibu Postpartum di Kabupaten Merauke." *Journal of Pharmaceutical and Health Research* 4.1 (2023): 117-121.

Mariany, M., Naim, R., & Afrianty, I. (2022). Hubungan Dukungan Sosial Dengan Kejadian Postpartum Blues Pada Ibu postpartum Di Wilayah Kerja Puskesmas Pomalaa: The Relationship Of Social Support With Postpartum Blues In Postpartum Mothers In The Work Area Of Pomalaa Puskesmas. *Jurnal Surya Medika (Jsm)*, 8(2), 319–324.

Morissan, M. (2019). Pembangunan Kepariwisata Dan Perubahan Sosial. *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 155–164. <https://doi.org/10.35760/Mkm.2019.V3i2.2336>

Nuraeni. (2018). Penerapan Metode Simple Additive Weighting (Saw) Dalam Seleksi Calon Karyawan. *Jurnal Swabumi*, 6(1), 63–71.

Nurhayati. (2022). Kesehatan Ibu postpartum. *Jurnal Kesehatan*, 3(1).

Nursiyono, J. A., & Apriyani, M. (2022). Determinan Kematian Ibu Di Jawa Timur

- Tahun 2020: Analisis Geographically Weighted Regression (Gwr). *Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 16(1), 89–97.
- Nusi Wiandri, S. (2022). *Penggunaan Sudut Pandang Tokoh Utama Untuk Merepresentasikan Teori 5 Stages Of Grief Kubler Ross Dalam Penulisan Skenario Film “Senandika Lara”* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta).
- Novinaldi, N., Edwardi, F., Gunawan, I., & Sarli, D. (2020). EPDSA: Aplikasi Skrining Baby Blues Berbasis Android dengan Uji Sensitivitas dan Spesifisitas. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 4(6), 1135-1141.
- Nova, silvia nova, & Zagoto, S. (2020). Gambaran Pengetahuan Ibu postpartum Tentang Adaptasi Psikologis Pada Masa Nifas Di Klinik Pratama Afiah Pekanbaru Tahun 2019. *Al-Insyirah Midwifery: Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Sciences)*, 9(2), 108–113. <https://doi.org/10.35328/kebidanan.v9i2.674>
- Prasetyaningrum, S. (2017). Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi postpartum blues. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 205-218.
- Pazriani, A. P. L. (2021). Pengalaman Ibu Yang Mengalami Baby Blues : Literature Review. *Tanjungpura Journal Of Nursing Practice And Education*, 3(1).
- Qi, W., Liu, Y., Lv, H. *et al.* Effects of family relationship and social support on the mental health of Chinese postpartum women. *BMC Pregnancy Childbirth* 22, 65 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04392-w>
- Rahma, M., Anggraini, R., & Yuningsih, Y. (2023). Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Poatpartum Tentang Baby Blues Di Bpm Lismarini . *Al-Insyirah Midwifery: Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Sciences)*, 12(1), 56–65. <https://doi.org/10.35328/kebidanan.v12i1.2335>
- Rochjati, P. (2019). *Skrining Antenatal Pada Ibu Hamil Edisi 2 (Pengenalan Faktor Risiko Deteksi Dini Ibu Hamil Risiko Tinggi*. Pusat Penerbitan Dan Percetakan

Unair.


- Rosa, E. M., Apriyanti, P., & Astuti, D. A. (2021). Husband's Support In The Taking-Hold Phase Of Postpartum (Phenomenology Study). *Open Access Macedonian Journal Of Medical Sciences*, 9(4), 97–100.
- Sambas, Komariah, E., Novia, R., & Hersoni, S. (2022). Faktor-Faktor Determinan Baby Blues Pada Ibu Postpartum. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi*, 22(1), 147–156.
- Sapulette, A. D., Ayawaila, D. D., Guntur, N. C. P., Ingrit, B. L., & Tahapary, P. A. (2022). Gambaran Depresi Postpartum Di Pusat Kesehatan Masyarakat Binong Di Tangerang. *Jurnal Keperawatan*, 14(3), 747–752.
- Setianingsih, L., & Halimatusyadiah, L. (2022). Pengaruh Senam Nifas Terhadap Kecepatan Involusiuterus Pada Ibu postpartum Di Pmb Hj . Nining Mutbaiyah Pamarayan. 10(1), 8–14.
- Setiawan, A. A. & J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.
- Sofiana, E. (2022). *Literature Review Adaptasi Psikologis Pada Ibu Postpartum (Doctoral Dissertation)*. Stikes Insan Cendekia Jombang.
- Suarez, A., & Yakupova, V. (2023). Past Traumatic Life Events, Postpartum PTSD, and the Role of Labor Support. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(11), 6048.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Cv.
- Sinaga, R., Sinaga, K., Simanjuntak, P., & Damanik, N. S. (2022). Hubungan Status Gizi Ibu postpartum Dengan Penyembuhan Luka Perineum. *Indonesian Health Issue*, 1(1), 69-75.
- Tulak, L. A., Yusriani, & Idris, F. P. (2019). Sumber Koping Pada Ibu Yang

- Mengalami Baby Blues Syndrome Di Rs. Elim Rantepao. *Jurnal Kesehatan*, 2(2), 106–115.
- Utamidewi, W., Tayo, Y., Putra, P. S., Febrianto, M., & Hafidz, A. N. (2022). Pendidikan Literasi Komunikasi Kesehatan Dalam Pencegahan Babyblues Syndrome Dan Postpartum Depression. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 6(3), 267–280.
- Wardani, H. W., Agustina, R., & Damayanti, E. A. F. (2018). *Tingkat Kecemasan Dengan Kualitas Tidur Ibu Hamil Primigravida Trimester Iii*.
- Who. (2018). *Postpartum Care Of The Mother And Newborn : A Practicalguide*. World Health Organization.
- Widyaningtyas, M. D. (2019). Pengalaman Komunikasi Ibu Dengan Baby Blues Syndrome Dalam Paradigma Naratif. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 3(2), 202.
- Widiastuti, R., Balqis, S., & Mediastuti, F. M. (2022). *Kejadian Depresi Postpartum pada Ibu yang Menikah Dini. Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Science)*, 10(2), 75-84.
- Wijaya, Y. A., Yudhawati, N. L. P. S., Andriana, K. R. F., & Ilmy, S. K. (2022, March 27). *Classification Of Nursing Theory Developed By Nursing Experts: A Literature Review*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/e6w5>
- Yang, W. J., Bai, Y. M., Qin, L., Xu, X. L., Bao, K. F., Xiao, J. L., & Ding, G. W. (2019). The effectiveness of music therapy for postpartum depression: a systematic review and meta-analysis. *Complementary therapies in clinical practice*, 37, 93-101.
- Yuliarna Yuliarna, Novila Sari, Karmila Karmila, Siska Ginting, Eva Sartika, & Nur Khadijah. (2023). Hubungan Komplikasi Kehamilan Dan Persalinan Dengan Baby Blues Syndrome Pada Ibu Pasca Persalinan Di Klinik Elly Kec. Medan Helvetia Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan*, 2(1), 171-182 <https://doi.org/10.55606/klinik.v2i1.1228>

Yuliana, W., & Hakim, B. N. (2020). *Emodemo Dalam Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Yuspita, Merlina, A., Rakhmawati, N., & Syolihah, D. (2022). Pengaruh Expressive Writing Theraphy Terhadap Baby Blues Syndrome Pada Ibu Post Partum Di Wilayah Kerja Puskesmas Kebakkramat Ii Karanganyar. *Jurnal Kusuma Husada*, 8(2).

Zulfa, N. (2022). *Efektivitas Edukasi "Bobyblu" (Booklet Baby Blues) Terhadap Kejadian Baby Blues Syndrome Di Pmb Bidan Ani, Amd. Keb. Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Kusuma Husada Surakarta.





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 1

PENJELASAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh..a

Dengan Hormat,

Saya St. Namirah Nurfadillah dengan NIM 70300119031, Mahasiswa Program Studi Keperawatan UIN Alauddin Makassar saat ini sedang meneliti tentang “Pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum (nifas)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman ibu postpartum dengan *baby blues syndrome*.

Adapun prosedur penelitian ini akan dilakukan pada ibu postpartum yang telah melewati masa nifasnya. Peneliti akan melakukan wawancara secara lebih mendalam terkait bagaimana pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum (nifas). Selain itu peneliti akan menggunakan MP3 atau rekaman suara yang ada dalam handphone. hasil wawancara bersama informan dan juga menggunakan catatan lapangan untuk mencatat hal-hal penting yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.

Penelitian ini tidak mempunyai resiko atau dampak buruk karena tidak ada perlakuan atau intervensi khusus yang diberlakukan kepada informan melainkan hanya wawancara (komunikasi dua arah) saja. Tidak ada unsur paksaan untuk partisipan dalam wawancara pada penelitian ini, dan Bapak/Ibu berhak untuk menghentikan wawancara kapanpun. Semua jawaban dan data yang diberikan akan di jaga dengan sangat baik kerahasiaannya. Data pribadi yang ditanyakan juga akan

tertutup untuk semua pihak yang tidak berkepentingan dan berdampak apapun dan tentu saja peneliti berjanji akan merahasiakan identitas informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini sesuai dengan kode etik keperawatan yang berlaku. Maka dari itu, peneliti sangat mengharapkan ketersediaan informan untuk memberikan informasi-informasi penting terkait dengan pengalaman ibu postpartum terhadap *baby blues syndrome*.

Demikian informasi ini saya sampaikan, atas partisipasi dan kesediaan waktunya, peneliti ucapkan banyak terima kasih.

Peneliti Keperawatan

St. Namirah Nurfadillah
081386642767

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 2

Lampiran 2

INFORMED CONSENT

LEMBAR PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama (Inisial) : NM
Usia : 29
Kehamilan berapa : 1
Status Pekerjaan : RT
Alamat Tinggal : Pacinongan

Setelah membaca dan mendengarkan penjelasan penelitian dan mendapat jawaban atas pertanyaan saya terhadap penelitian ini, maka saya memahami tujuan penelitian ini yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi saya dan orang lain yang juga pernah mengalami Baby blues syndrome pada masa nifas. Saya mengerti bahwa penelitian ini menjunjung tinggi hak saya sebagai partisipan.

Saya sangat memahami bahwa keikutsertaan saya menjadi partisipan dalam penelitian ini akan memberikan manfaat dan pemahaman tentang pengalaman baby blues syndrome pada ibu postpartum (nifas) Dengan menandatangani surat persetujuan ini, berarti saya telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Gowa, Mei 2023



INFORMED CONSENT

LEMBAR PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama (Inisial) : S
Usia : 50
Kehamilan berapa : 2
Status Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Tinggal : Pawang Polong

Setelah membaca dan mendengarkan penjelasan penelitian dan mendapat jawaban atas pertanyaan saya terhadap penelitian ini, maka saya memahami tujuan penelitian ini yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi saya dan orang lain yang juga pernah mengalami Baby blues syndrome pada masa nifas. Saya mengerti bahwa penelitian ini menjunjung tinggi hak saya sebagai partisipan.

Saya sangat memahami bahwa keikutsertaan saya menjadi partisipan dalam penelitian ini akan memberikan manfaat dan pemahaman tentang pengalaman baby blues syndrome pada ibu postpartum (nifas) Dengan menandatangani surat persetujuan ini, berarti saya telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Gowa, Mei 2023



Lampiran 2

INFORMED CONSENT

LEMBAR PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama (Inisial) : N.S
Usia : 23 thn
Kehamilan berapa : 1
Status Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Tinggal : Sarafa

Setelah membaca dan mendengarkan penjelasan penelitian dan mendapat jawaban atas pertanyaan saya terhadap penelitian ini, maka saya memahami tujuan penelitian ini yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi saya dan orang lain yang juga pernah mengalami Baby blues syndrome pada masa nifas. Saya mengerti bahwa penelitian ini menjunjung tinggi hak saya sebagai partisipan.

Saya sangat memahami bahwa keikutsertaan saya menjadi partisipan dalam penelitian ini akan memberikan manfaat dan pemahaman tentang pengalaman baby blues syndrome pada ibu postpartum (nifas) Dengan menandatangani surat persetujuan ini, berarti saya telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Gowa, 23 Mei 2023



M A R A S S A R

LAMPIRAN 3

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

Semua informasi yang di dapat dari pertanyaan di bawah ini akan di jaga kerahasiaannya, mohon untuk bersedia menjawab semua pertanyaan di bawah ini.

Inisial nama :

Umur: tahun

Tanggal kelahiran Bayi:

Status : singel / menikah / bercerai / janda.

Lama persalinan: lama / tidak

Agama :

Jumlah anak :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir :

Pendapatan suami /bulan :

Pilihlah jawaban yang paling mendekati keadaan perasaan anda dalam 7 hari terakhir, bukan hanya perasaan anda hari ini.

Di bawah ini ialah contoh pernyataan yang telah di sertai oleh jawabannya.

1. Saya merasa bahagia:

- a. Ya, setiap saat
- b. Ya, hampir setiap saat
- c. Tidak, tidak terlalu sering
- d. Tidak pernah sama sekali

Arti jawaban diatas ialah: “ saya merasa bahagia hampir setiap saat” dalam satu minggu terakhir ini. Mohon di lengkapi pernyataan lain di bawah ini dengan cara yang sama.

1. Saya mampu tertawa dan merasakan hal-hal yang menyenangkan

Sebanyak yang saya bisa

Tidak terlalu banyak

Tidak banyak

Tidak sama sekali

2. Saya melihat segala sesuatunya kedepan sangat menyenangkan

Sebanyak sebelumnya

Agak sedikit kurang dibandingkan dengan sebelumnya

Kurang di bandingkan sebelumnya

Tidak pernah sama sekali

3. Saya menyalakan diri saya sendiri saat sesuatu terjadi tidak sebagaimana mestinya

Ya, tiap saat

Ya, kadang-kadang

Tidak terlalu sering

Tidak pernah sama sekali

4. Saya merasa cemas atau merasa kuatir tanpa alasan yang jelas

Tidak pernah sama sekali

Jarang-jarang

Ya, kadang-kadang

d.Ya, sering sekali

5. Saya merasa takut dan panik tanpa alasan yang jelas

Ya, cukup sering

Ya, kadang-kadang

Tidak terlalu sering

Tidak pernah sama sekali

6. Segala sesuatunya terasa sulit untuk di kerjakan

Ya, hampir setiap saat saya tidak mampu menanganinya

Ya, kadang-kadang saya tidak mampu menangani seperti biasanya

Tidak terlalu, sebagian besar berhasil saya tangani

Tidak pernah, saya mampu mengerjakan segala sesuatu dengan baik

7.Saya merasa tidak bahagia sehingga mengalami kesulitan untuk tidur

Ya, setiap saat

Ya, kadang-kadang

Tidak terlalu sering

Tidak pernah sama sekali

8. Saya merasa sedih dan merasa diri saya menyedihkan

Ya, setiap saat

Ya, cukup sering

Tidak terlalu sering

Tidak pernah sama sekali

9. Saya merasa tidak bahagia sehingga menyebabkan saya menangis

Ya, setiap saat

Ya, cukup sering

Disaat tertentu saja

Tidak pernah sama sekali

10. Muncul pikiran untuk menyakiti saya sendiri

Ya, cukup sering

Kadang-kadang

Jarang sekali

Tidak pernah sama sekali

LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA

Berdasarkan penelitian yang berjudul “**Pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum (nifas)**” yang bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang bagaimana pengalaman *baby blues syndrome* pada ibu postpartum atau ibu yang masih dalam masa nifas, peneliti pun membuat pedoman wawancara ini agar informan yang berpartisipasi dalam penelitian dapat menceritakan apa saja terkait dengan pengalaman tersebut termasuk peristiwa, pendapat, dan perasaan yang di alami selama ini.

1. Apakah ibu merasakan stress semenjak masa kehamilan ibu?
2. Bagaimana yang ibu rasakan pada saat mengalami *baby blues syndrome*?
Mengapa hal itu dapat terjadi pada ibu?
3. Bagaimana cara ibu mengatasi *baby blues syndrome* itu?
4. Bagaimana pengalaman ibu/saudari mengenai dukungan dari suami, keluarga maupun orang teman terdekat anda?

LAMPIRAN 5

Penentuan kata kunci informan I

Significant statement	Kata kunci
<p>...Pokoknya selaluka sedikit-sedikit stress, apalagi ini kehamilanku kemarin, kehamilan yang paling kutunggu tunggu kodong karna tiga tahunka menikah baru ka lagi hamil ini...</p>	<p>Stress berkepanjangan</p>
<p>...apalagi ini kehamilanku kemarin, kehamilan yang paling kutunggu tunggu kodong karna tiga tahunka menikah baru ka lagi hamil ini , jadi bahagia sekalika karena tahun lalu pernah jka hamil...</p>	<p>Bahagia karena kehamilan yang dinantikan</p>
<p>...kodong karena tiga tahunka menikah baru ka lagi hamil ini , karena tahun lalu pernah jka hamil tapi karena lingkungan sekitarku kodong yang tidak mendukung...</p>	<p>Lingkungan sekitar yang tidak mendukung</p>
<p>... kemarin ini pas selesaika melahirkan banyak sekali ku dengar ceritanya, yang banding-bandingkan</p>	<p>Dibanding-bandingkan</p>

<p>ka dengan ipar-ipar ku karena kan saya anakku kodong anak perempuan</p>	
<p>... eh... apa... jahitan sesarku eeh... masih sakit sekali kurasa nah banyakmi kudengar cerita begitu,..</p>	<p>Kesakitan karena luka jahitan bekas SC</p>
<p>... kudengar cerita begitu, belum lagi asi ku kodong tidak keluar, tidak cepatki eh... maksudnya toh lamaki nah itumi lagi na jadikan bahan pembicaraan yang kasih stress ka ..</p>	<p>Asi belum keluar</p>
<p>... biasa kalo stress ka menangis menangis mami ka...</p>	<p>Sering menangis Ketika stress</p>
<p>... tidak mauka sentuh sentuh bayi ku, apalagi sakit jahitanku jadi tambah tidak mau meka gendong ki, jadi ku.....</p>	<p>Tidak ingin menyentuh dan menggendong bayi</p>
<p>...eee... kewalahan meka kodong karna banyak ..eh ...apa... barusanka sdh sesar na banyak pekerjaan yang harus ku lakukan ...</p>	<p>Kewalahan mengurus bayi</p>
<p>... capek sekalimi toh dek, baru kita itu kodong lebih mauki kalo suamita</p>	<p>Ingin diperhatikan oleh suami</p>

<p>urus ki suamita yang perhatikanki..</p> <p>...</p>	
<p>... Menangis terus jika sampaiku capek, kadang ada perasaanku itu mauka...</p>	Menangis terus
<p>...kadang ada perasaanku itu mauka garuk garuk tembok sangking stressku kodong dengar kata katanya orang, apalagi karena tidak ada asiku stress...</p>	Ingin menggaruk-garuk tembok dikarenakan tingkat stress yang tinggi
<p>... katanya orang kodong saya dek, ka.. emmm...baru sensitif sekalka semenjak hamil sampai sudah melahirkan...</p>	Terlalu sensitive semenjak hamil sampai setelah melahirkan
<p>... belumpi hilang capekku nah sudah ka ini melahirkan begadangka lagi menyusui tengah malam jadi capek skalika kurasa dek apalagi kalo...</p>	Jam tidur yang tidak teratur
<p>... eee, kayak kecapeanma tambah tidak enakmi perasaanku berubah-berubahmi suasana hatiku yang saya rasa dek..</p>	Kecapean sehingga membuat suasana hati berubah

<p>... kehamilanku toh dek pecah ketuban ka jadi tiba tiba ka di sesar baru itu dari keluarganya suamiku orang melahirkan...</p>	<p>Pecah ketuban dini sehingga harus mendapatkan tindakan cyto SC</p>
<p>... eee, karena saya kodong sesar ka na banding-bandingkan meka lagi dek, itu mi lagi yang kasih stresska menangis-menangis mka lagi dek kalo ada kudengar kayak</p>	<p>Stress yang berlebihan</p>
<p>... kalo seperti itu kadang-kadang... eee.. beristigfar mami ka terus, kah.. eehh.. banyak banyakka berdoa sholat supaya enakki perasaanku toh dek..</p>	<p>Beristigfar dan berdoa kepada Allah SWT</p>
<p>... biasa juga na belikan mka suamiku minuman yang kusuka makanan yang kusuka supaya enakki lagi perasaanku toh dek..</p>	<p>Membeli minuman dan makanan kesukaan agar suasana hati Kembali normal</p>
<p>... ini ji memang saya iparku sama mertuaku dek sama tante tantenya suamiku merasa paling pintar ki sedangkan saya yang lebih tau karena saya yang lahirkanki anakku ...</p>	<p>Tidak mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari keluarga suami</p>

<p>... kadang stress ma juga kalo suamiku lebih na ambil-ambilkan keluarganya,saya kodong merasa sendirian meka....</p>	<p>Merasa sendirian karena tidak ada dukungan</p>
<p>...sedangkan waktuku saya gadis dek seringka pergi pergi sm temanku jadi kayak kagetka dengan aktifitasku sekarang kodong...</p>	<p>Kaget dengan perubahan aktifitas sebelum menikah dan sesudah menikah</p>
<p>... kayak enakmi kurasa lebih tenang meka karena.. mmm.. mulai mka terima semuanya, suamiku juga sedikit-sedikit mulai...</p>	<p>Merasa lebih tenang karena sudah mendapatkan kepercayaan dari suami</p>

Penentuan kata kunci informan II

Significant statement	Kata kunci
<p>....Banyak sekali kendala na.. inimi ki bilanga tadi eh, kah itu nablq itu bede susternya kemarin waktu melahirkanga anu ki itu kena ki baby blues...</p>	<p>Kendala</p>
<p>...Anak ku kodong yang kedua eee, pernah tidak kuterima kehadirannya kalau kukasih menyusu...</p>	<p>Tidak menerima</p>

<p>...Suka ka menangis-menangis suster..</p>	Menangis
<p>...Suka ka juga marah-marah.. tidak kuterima i keadaanna suster...</p>	Marah
<p>...Sampai kadang ku pukul ki diriku sendiri.. pernah mentongka...</p>	Menyakiti diri sendiri
<p>...Pernah mentongka itu suster nah..kulihatki itu hari, kulihat ularki suster...</p>	Membayangkan seperti melihat ular
<p>...Tidak siapka, tidak ada perencanaan ku sama sekali suster anu ditaumi itu kalo hamil tiba tiba orang...</p>	Tidak siap, tidak ada perencanaan
<p>...kayak stress-stresska waktuku hamil itu, kan tidak kutahu ki awalna bilang hamilka itu suster toh jadi suka ka lain lain memang...</p>	Stress
<p>...ka lain lain memang, suka ka marah marah, lain waktunya anak pertamaku suster tidak begitu ja...</p>	Marah
<p>...itu kalo menangiski kayak mauka cekik ki suster, belum lagi kalo kakaknya menangis tongmi,...</p>	Mencekik

<p>...menangis tongmi, kelelahan ma itu kapang suster, kelelahanma...</p>	Kelelahan
<p>... itumi sampai mau kucekik karena tidak kuterima mi itu keadaanna kah kenapa bisa ada..</p>	Tidak menerima
<p>... takut sekalima mati, banyak sekali itu kurasa rasa suster, eee anu mami, pergika jalan jalan kah na hiburka orang sekelilingku...</p>	Mati
<p>...tidak kuterima mi itu kapang suster kehadiranna kah hadir ki kodong tiba tiba...</p>	Kehadiran
<p>...kagetki kalau tiba tiba hamil toh bu, apalagi anak pertama ta yang difikir karna belum cukup pi kasih sayang yang...</p>	Tiba-tiba hamil
<p>...tidak mengerti sekali juga, suamita itu kadang kadang minta ki begitu ee, minta di ceboki anakna yang besarka nah tidak mau suster uuuuh dedeh suster tidak bisama ...</p>	Tidak mendapatkan pengertian dari suami

<p>...tidak bisama lagi itu ungkapkan ki dengan kata kataku ini suster , kadang itu emosi sekalima, mau ma...</p>	<p>Emosi</p>
<p>...sekalima, mau ma bunuh i bapakna, mauma bunuh i anakna, semuana mau kubunuh suster , bukan mi itu lagi kapang baby blues suster. Pokoknya...</p>	<p>Ingin membunuh</p>
<p>...pokoknya tidak ada dukungan suster kecuali teman teman suster, tetangga, kan saya ini suster berwiraswasta ka jadi kadang itu yang...</p>	<p>Tidak mendapatkan dukungan dari suami</p>
<p>... mamaku mi itu kodong semuana na bantu mulai dari merawat, sampai.. merawat saya ini suster dih, merawat saya dan anakku itu ada ibu..</p>	<p>Merawat</p>
<p>...baru saya itu kan suster bukan ka seperti ibu ibu lain yang gampang menyusui saya itu sempat kemarin alami pembendungan asi itu suster sampai bengkak bengkak itu payudara</p>	<p>Tidak mudah untuk menyusui</p>

<p>ku suster , itumi yang bikin stresska sempatka mau bunuh diri...</p>	
<p>...itu sempatka itu suster berapa harika nda makan, nda enak makan, tidak enak tidur, jadi asi juga tidak ada tongmi lagi keluar..</p>	<p>Kehilangan nafsu makan dan kualitas tidur menurun</p>
<p>...keluargaku, tidak ada dukungan itu mami sama Allah, berdoa sama Allah,kembali ee itu lagi kembali kepada Allah karena semuanya itu dikembalikan pada Allah toh suster,..</p>	<p>Berdoa pada Allah</p>
<p>...enakmi bisama kembali menerima kenyataan karena lagi lucu-lucunya mi ini anakku yang kedua, inimi namanya penyakit dih...</p>	<p>Dapat menerima kenyataan</p>
<p>... pergika jalan jalan kah na hiburka orang sekelilingku, selaluka nakasih tahu bilang ada memang itu penyakit begitu kalau baru orang melahirkan ada juga yang macam macammi itu bede penyakit ka suster...</p>	<p>Bertemu dengan teman</p>

<p>...Karena kan tidak ditahu ki kodong</p> <p>bilang hamilki nah tiba tiba tidak</p> <p>ada itu keluar kah haidki biasa itu</p> <p>setiap bulan suster 28 hari saya itu</p> <p>sudah haidmi pasti ihh...</p>	<p>Kehamilan yang tiba-tiba</p>
<p>...Menjadi-jadimi itu stressku suster,</p> <p>tidak bisa ku kelola emosiku,tidak</p> <p>bisami ku kelola semuaanya eeh</p> <p>menangisma...</p>	<p>Tidak dapat mengelola tingkat emosional</p>

Penentuan kata kunci informan III

Significant statement	Kata kunci
<p>... pas hamil toh senangja, ee.. kayak</p> <p>dibilang kan anak pertama terus ini</p> <p>juga dari keluarga suami ku ini cucu</p> <p>pertama jadi kayak na perlakukanka</p> <p>keluarganya itu baik...</p>	<p>Senang atas kehamilan pertamanya</p>
<p>... Cuman ini eee dari suamiku itu</p> <p>kebetulan kuliah jadi saya LDR ka,</p> <p>eee.. Lama.. Dua bulan kayaknya</p> <p>ketemu a baru sampai ku melahirkan</p> <p>...</p>	<p>Hubungan jarak jauh</p>

<p>... Nangis terus setiap malam, terus itu eeh kayak depresi kayak eh salah ka ini kapang hamil, kayak anuka kapang ini, ...</p>	<p>Menangis terus</p>
<p>..., harus ka eee kapan eh matima kapang, itu kufikir kayak depresi ka, stress...</p>	<p>Ingin mati karena merasa depresi dan stress</p>
<p>... baru suamiku kayak..Eemm...Selingkuhki gara-gara itumi jadi tambah depresi meka, hamil tong meka na selingkuhi tong meka baru...</p>	<p>Selingkuh</p>
<p>... Depresi ka setelah melahirkan karena..eh..eh, demam ma kan kalo membengkakki payudara ta na kasih sakit ki,..</p>	<p>Depresi pasca persalinan</p>
<p>... , malahan itu nda mau ka susui anakku karena...eee...untuk apa ku susui bapaknya saja nda adai, kenapa saya harus ku susui...</p>	<p>Tidak ingin menyusui bayi</p>
<p>... Berfikirma bilang eh gantung dirima, bunuh dirima tapi berfikirka kenapa saya yang mati mending</p>	<p>Ingin bunuh diri serta membunuh anak dan suami</p>

<p>suamiku sama anakku yang mati kubunuh. Jadi, saya bisa hidup sendiri-sendiri. itu kufikirkan ...</p>	
<p>... pas baru pas itu datang juga bukan ji saya na perhatikan, tapi, main game terusji na bikin, biar kuminta bilang gendongi dulu ini...</p>	<p>Tidak di beri perhatian oleh suami</p>
<p>... nda tau mertuaku kenapaka sampai sekarang itu mertua ku, naceritai jelek teruska, sed..eh nda tau itu, selalu sembarang na bilang, nabilang mi ini ...</p>	<p>Tidak adanya perhatian dari mertua</p>
<p>... , lagi ku tata ini sekarang masa depanku, itumi kubilang mauka kuliah, mauka tata masa depanku, inimi yang kulakukan kenapa ka bisa bangkit, andai tidak kuliah ka mungkin lama ma mati, bunuh dirima...</p>	<p>Menata masa depan</p>
<p>... Nda na tau dia apa-apa, biar baby blueska dulu tidak na tau ki, cuek ji, malahan ...</p>	<p>Suami cuek</p>

<p>... Sholat, sama main sosial media, tiktok. itu ji..kalau biasa na lihat storyku orang-orang kayak jalan nga, ketawa-ketawa pasti lagi depresi ka pada saat itu. ...</p>	<p>Mengatasi stress dengan sholat dan bermain sosial media</p>
<p>... itupun datangki pas 3 hari pa setelah melahirkan baru disitu yang paling kusakit hati i karena toh yang..Aa..yang pertama kali ...</p>	<p>Kecewa kepada suami</p>
<p>... kalo di kirimkan mi uang suamiku..kalau suamiku banyak baru saya sedikit, dicerita meka itu.. kayak itu istrimu kenapa nda dikasih uang sama mamanya...</p>	<p>Dibandingkan dengan mertua</p>
<p>... eem bermasalahki ari-ariku, terpotong-potongi. baru, Eem, Eeh, setelah tiga hari melahirkan dibawa ma lagi kerumah sakit untuk dikuret dikasih keluar itu anu ku,...</p>	<p>Kuret pasca persalinan dikarenakan ari-ari yang bermasalah</p>
<p>... kayak..Mmm..ee kesulitan sekalika kurasa..tapi bagaimana dih nda taumi deh...begitui dia.. Ehh, tauu..hehe mauka menangis..</p>	<p>Kesulitan</p>

LAMPIRAN 6

Penentuan Kategori

Kata kunci	Kategori
<ul style="list-style-type: none">• Stress berkepanjangan (Informan I)• Stress (Informan II)• Ingin mati karena merasa depresi dan stress (Informan III)	Tingkat stress pada ibu postpartum
<ul style="list-style-type: none">• Kehamilan yang dinantikan (Informan I)• Senang atas kehamilan pertamanya (Informan II)	Kehamilan yang dinantikan
<ul style="list-style-type: none">• Lingkungan sekitar yang tidak mendukung (Informan I)• Merasa sendirian karena tidak ada dukungan (Informan I)• Tidak mendapatkan dukungan dari suami (Informan II)• Tidak di beri perhatian dan dukungan oleh suami (Informan III)	Tidak adanya dukungan dari suami dan keluarga

<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya perhatian dari mertua (Informan III) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menerima kehamilan • Tidak siap dengan kehamilan yang tiba-tiba (Informan II) 	Tidak adanya kesiapan ibu menyambut kehamilan
<ul style="list-style-type: none"> • Keguguran (Informan I) 	Keguguran
<ul style="list-style-type: none"> • Dibanding-bandingkan (Informan I) • Dibandingkan dengan mertua (Informan III) 	Adanya perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> • Kesakitan karena luka jahitan bekas SC (Informan I) • Kendala (Informan II) • Kuret pasca persalinan dikarenakan ari-ari yang bermasalah (Informan III) 	Kendala yang timbul setelah melahirkan
<ul style="list-style-type: none"> • Asi belum keluar (Informan I) • Tidak mudah untuk menyusui (Informasi) • Tidak ingin menyusui bayi (Informan III) 	Masalah yang timbul pada saat menyusui

<ul style="list-style-type: none"> • Sering menangis Ketika stress (Informan I) • Menangis (Informan II) • Menangis terus (Informan III) 	<p>Sering menangis</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Terlalu sensitive semenjak hamil sampai setelah melahirkan (Informan I) • Emosi setiap saat (Informan II) • Depresi pasca persalinan (Informan III) 	<p>Perasaan yang dialami oleh ibu postpartum</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bahagia karena kehamilan yang dinantikan (Informan I) • Tidak siap, tidak ada perencanaan (Informan II) • Senang atas kehamilan pertamanya (Informan III) 	<p>Perasaan ibu ketika hamil</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kewalahan mengurus bayi (Informan I) • Kecapean sehingga membuat suasana hati berubah (Informan I) 	<p>Kelelahan pada ibu postpartum</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Kelelahan (Informan II) • Kesulitan (Informan III) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Jam tidur yang tidak teratur (Informan I) • Kehilangan nafsu makan (Informan II) • Kualitas tidur menurun (Informan II) 	<p>Kualitas kebutuhan istirahat dan makan ibu postpartum menurun</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ingin menggaruk-garuk tembok dikarenakan tingkat stress yang tinggi (Informan I) • Kaget dengan perubahan aktifitas sebelum menikah dan sesudah menikah (Informan I) • Ingin membunuh (Informan II) • Ingin bunuh diri serta membunuh anak dan suami (Informan III) 	<p>Ekspresi perasaan oleh ibu postpartum yang mengalami baby blues syndrome</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Beristigfar dan berdoa kepada Allah SWT (Informan I) 	<p>Cara ibu mengatasi baby blues syndrome</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Membeli minuman dan makanan kesukaan agar suasana hati Kembali normal (Informan I) • Berdoa pada Allah SWT (Informan II) • Bertemu dengan teman (Informan II) • Mengatasi stress dengan sholat dan bermain sosial media (Informan III) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Merasa lebih tenang karena sudah mendapatkan kepercayaan dari suami (Informan I) • Dapat menerima kenyataan (Informan II) • Harapan untuk masa depan (Informan III) 	<p>Perasaan ibu postpartum setelah melewati baby blues syndrome</p>

LAMPIRAN 7

Penentuan Tema

No.	Kata kunci	Kategori	Tema
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Stress berkepanjangan (Informan I) • Stress (Informan II) • Ingin mati karena merasa depresi dan stress (Informan III) 	Tingkat stress pada ibu postpartum	Perasaan, perilaku dan pikiran ibu yang mengalami <i>Baby Blues Syndrome</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sering menangis Ketika stress (Informan I) • Menangis (Informan II) • Menangis terus (Informan III) 	Sering menangis	
	<ul style="list-style-type: none"> • Terlalu sensitive semenjak hamil sampai setelah melahirkan (Informan I) • Emosi setiap saat. (Informan II) • Depresi pasca persalinan (Informan III) 	Perasaan yang dialami oleh ibu postpartum	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ingin menggaruk-garuk tembok dikarenakan tingkat stress yang tinggi (Informan I) • Ingin membunuh (Informan II) • Ingin bunuh diri serta membunuh anak dan suami (Informan III) 	Fikiran ibu postpartum yang mengalamibaby blues syndrome	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan sekitar yang tidak mendukung (Informan I) 	Tidak adanya dukungan dari suami dan keluarga	

	<ul style="list-style-type: none"> • Merasa sendirian karena tidak ada dukungan (Informan I) • Tidak mendapatkan dukungan dari suami (Informan II) • Tidak di beri perhatian dan dukungan oleh suami (Informan III) • Tidak adanya perhatian dari mertua (Informan III) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menerima kehamilan • Tidak siap dengan kehamilan yang tiba-tiba (Informan II) 	Tidak adanya kesiapan ibu menyambut kehamilan	Penyebab terjadinya <i>Baby Blues Syndrome</i> pada ibu postpartum
	<ul style="list-style-type: none"> • Dibanding-bandingkan (Informan I) • Dibandingkan dengan mertua (Informan III) 	Adanya perbedaan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Asi belum keluar (Informan I) • Tidak mudah untuk menyusui (Informan II) • Tidak ingin menyusui bayi (Informan III) 	Masalah yang timbul pada saat menyusui	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kewalahan mengurus bayi (Informan I) • Kecapean sehingga membuat suasana hati berubah (Informan I) • Kelelahan (Informan II) • Kesulitan (Informan III) 	Kelelahan pada ibu postpartum	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jam tidur yang tidak teratur (Informan I) • Kehilangan nafsu makan (Informan II) • Kualitas tidur menurun (Informan II) 	Kualitas kebutuhan istirahat dan makan ibu postpartum menurun	
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Beristigfar dan berdoa kepada Allah SWT (Informan I) • Membeli minuman dan makanan kesukaan agar suasana hati Kembali normal (Informan I) 	Cara ibu mengatasi baby blues syndrome	

	<ul style="list-style-type: none"> • Bertemu dengan teman (Informan II) • Berdoa pada Allah SWT (Informan II) • Mengatasi stress dengan sholat dan bermain sosial media (Informan III) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Merasa lebih tenang karena sudah mendapatkan kepercayaan dari suami (Informan I) • Dapat menerima kenyataan (Informan II) • Menata masa depan (Informan III) 	Perasaan ibu postpartum pada fase <i>letting go</i>	

LAMPIRAN 8



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION "

No. C.148/KEPK/FKIK/V/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : St. Namirah Nurfadillah
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Pengalaman baby blues syndrome pada ibu postpartum"

"Experience of baby blues syndrome in postpartum mothers"


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 16/05/2023 sampai dengan tanggal 16/05/2024

This declaration of ethics applies during the period 16/05/2023 until 16/05/2024

Mei 16, 2023
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes

LAMPIRAN 9



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **16309/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3644/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 06 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ST. NAMIRAH NURFADILLAH**
Nomor Pokok : 70300119031
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGALAMAN BABY BLUES SYNDROME PADA IBU POSTPARTUM "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Mei s/d 15 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

LAMPIRAN 10



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Website: dpmpstsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/559/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Samata Kab. Gowa
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 16309/S.01/PTSP/2023 tanggal $\$(izin_tgl_permohonan)$ tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **ST NAMIRAH NURFADILLAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa / 3 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 70300119031
Program Studi : S1 Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Btn Pao-Pao Permai B13 No 3

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"Pengalaman Baby Blues Syndrome pada Ibu postpartum"

Selama : 12 Mei 2023 s/d 15 Juni 2023
Pengikut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperhunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 15 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. **BUPATI GOWA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. ketua LPM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

REGISTRASI/800/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicanik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicanik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



LAMPIRAN 11

DOKUMENTASI PENELITIAN

Informan 1



Informan 2



Informan 3



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul " Pengalaman Baby Blues syndrome pada ibu postpartum " bernama lengkap St. Namirah Nurfadillah, lahir di Sungguminasa, 03 Juni 2000. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ridwan S. Pd, M. M dengan Hj. Herlina Hafied. Menempuh pendidikan taman kanak-kanak di TK Mawar pada tahun 2005-2006. Selanjutnya pada tahun 2006-2012 penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Paccinongan Unggulan lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2012-2015 di SMPN 02 Sungguminasa, setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2016-2018 di SMAN 02 Sungguminasa yang sekarang terganti menjadi SMA 10 Gowa. pada tahun 2018 penulis sempat melanjutkan Strata 1 di Universitas Hasanuddin dengan jurusan sastra asing tetapi karena kecintaan pada dunia kesehatan penulis memilih fokus melanjutkan strata 1 di UIN Alauddin Makassar dengan jurusan S1 Keperawatan melalui jalur UMPTKIN di tahun 2019.