

**ANALISIS FAKTOR RISIKO TB PARU PADA WANITA USIA SUBUR
DI BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR
TAHUN 2023**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MERY ANDANI

MERY ANDANI NIM 70600120005

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mery Andani
NIM : 70600120005
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 04 Mei 2002
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Dusun Allu, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba
Judul : Analisis Faktor Risiko TB Paru pada Wanita Usia Subur Di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Tahun 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Agustus 2024

Penyusun




Mery Andani
NIM 70600120005

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KARYA TULIS ILMIAH

Pembimbing penulisan skripsi Mery Andani, NIM 70600120005, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: "Analisis Faktor Risiko TB Paru pada Wanita Usia Subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Tahun 2023", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Makassar, 16 Agustus 2024

Pembimbing 1



Dr. dr. Nadyah, M.Kes., Sp.MK.

Pembimbing 2



dr. Asrul Abdul Azis, Sp.P.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Faktor Risiko TB Paru pada Wanita Usia Subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Tahun 2023" yang disusun oleh Mery Andani, NIM 70600120005, mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 16 Agustus 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 16 Agustus 2024 M

11 Shafar 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati., Sp.OG., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: dr. Arlina Wiyata Gama., M.Biomed.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. dr. Nadyah., M.Kes., Sp.MK.	(.....)
Pembimbing II	: dr. Asrul Abdul Azis., Sp.P.	(.....)
Penguji I	: dr. Widyaningrum., M.Sc., Sp.PD.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Muchsin Mahfudz., M.Th.I.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dewan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes

NIP. 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor Risiko TB Paru Pada Wanita Usia Subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Tahun 2023”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M. Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M. Biomed. selaku sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter, beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

4. Dr. dr. Nadyah, M.Kes.,Sp.MK dan dr. Asrul Abdul Azis, Sp.P. selaku dosen pembimbing penelitian yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, motivasi, bimbingan, dan pemberian informasi yang tepat.
5. dr. Widyaningrum., M. Sc., Sp.PD. selaku penguji I dan Prof. Dr. Muchsin Mahfudz, S. Ag., M.Th. I selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Kepada kedua orangtua Ayahanda Basri dan Ibunda Ani, terimakasih selalu berjuang dalam memenuhi kebutuhan penulis selama menempuh pendidikan, berkat dukungan dan motivasi yang diberikan penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan selalu menemani penulis dalam proses pendewasaan diri.
9. Terima kasih kepada teman sejawat Apone20sis dan Araci yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang dari segi materi, penulisan, dan penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakannya agar menjadi karya yang bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 04 Mei 2024

Penyusun

Mery Andani



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis.....	4
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. TB Paru.....	13
B. Wanita Usia Subur.....	34
C. Hubungan antara TB Paru dengan Wanita usia subur	35
D. Integrasi Keislaman	36
E. Kerangka Teori.....	39
F. Kerangka Konsep.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Etika Penelitian	41
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Populasi dan Sampel.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Desain Penelitian	43
G. Variabel Penelitian	44
H. Instrumen Penelitian.....	45
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
J. Alur Penelitian	46
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47

B. Pembahasan	57
C. Keterbatasan Penelitian	68
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Definisi Operasional	6
Tabel 1. 2 Kajian Pustaka	9
Tabel 2. 1 Dosis Paduan OAT Kategori 1	32
Tabel 2. 2 Dosis Paduan OAT Kategori 2	32
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden	47
Tabel 4. 2 Wanita Usia Subur	48
Tabel 4. 3 Pekerjaan	48
Tabel 4. 4 Pendidikan	49
Tabel 4. 5 Status Gizi	49
Tabel 4. 6 Riwayat BCG	49
Tabel 4. 7 Riwayat Kontak TB	50
Tabel 4. 8 Riwayat Merokok.....	50
Tabel 4. 9 Riwayat DM.....	50
Tabel 4. 10 Riwayat HIV	51
Tabel 4. 11 Analisis Hubungan Pekerjaan dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023	51
Tabel 4. 12 Analisis Hubungan Pendidikan dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023	52
Tabel 4. 13 Analisis Hubungan Status Gizi dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023	53
Tabel 4. 14 Analisis Hubungan Riwayat BCG dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023	53
Tabel 4. 15 Analisis Hubungan Riwayat Kontak TB dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Periode Januari-Desember 2023.....	54
Tabel 4. 16 Analisis Hubungan Riwayat Merokok dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023.....	54
Tabel 4. 17 Analisis Hubungan Riwayat DM dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023	55
Tabel 4. 18 Analisis Hubungan Riwayat HIV dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023	55
Tabel 4. 19 Hasil Seleksi Kandidat Uji Regresi Logistik	56
Tabel 4. 20 Hasil Analisis Multivariat Uji Regresi Logistik.....	56

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Teori.....	39
Bagan 2. 2 Kerangka Konsep	40



ABSTRAK

THE RELATIONSHIP BETWEEN PULMONARY TUBERCULOSIS INCIDENCE IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH SMOKING EXPOSURE, BCG HISTORY AND TB CONTACT HISTORY

Mery Andani¹  Nadyah Haruna²  Asrul Abdul Azis³  Widyaningrum⁴ 
Muchsin Mahfudz⁵ 

^{1, 2, 3, 4} School of Medicine, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁵ Faculty of Islamic Theology and Philosophy, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history

Submitted :

Revised :

Accepted :

Keywords:

*Pulmonary Tuberculosis
Women of Childbearing
Smoking Exposure
BCG History
TB Contact History*

Kata Kunci:

*TB Paru;
Wanita Usia Subur;
Paparan Rokok;
Riwayat BCG;
Riwayat Kontak TB*

*This is an open access
article under the [CC BY-SA](#)
license:*



ABSTRACT

An infectious disease caused by *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb) infection is known as tuberculosis (TB). The prevalence of this infection is widespread across all countries and age groups, including Indonesia, with a propensity to escalate cases. TB cases in South Sulawesi in 2022 amounted to 68.8%, a rise from the CDR of 48.3 in 2021, which included female patients. This study aimed to ascertain the correlation between the incidence of pulmonary tuberculosis in women of reproductive age at BBKPM Makassar in 2023 and their smoking exposure, BCG history, and TB contact history. This investigation is quantitative in nature and employs a cross-sectional approach, utilising observational analysis. The population being studied consisted of all new cases of pulmonary tuberculosis patients at BBKPM Makassar, which amounted to 3,063 cases. A purposive sampling technique was employed to select a sample of 354 women of childbearing age. Data were collected using medical records that met the inclusion criteria of women aged 15-45 years, diagnosed with new cases of pulmonary tuberculosis, and complete medical record data. An analysis of the relationship between cigarette smoke exposure, BCG history, and TB contact history was conducted using the chi-square test. TB contact history (*p-value* 0.004), BCG history (*p-value* 0.034), and nicotine exposure (*p-value* 0.037) were the findings of the study. The study concludes that there is a notable correlation between smoking exposure, BCG history, and TB contact history, and the incidence of pulmonary TB among women of reproductive age at BBKPM Makassar in 2023. This study aims to facilitate the identification of the risk of pulmonary tuberculosis (TB) and enable early preventive measures for women of childbearing age.

ABSTRAK

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan karena infeksi *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb). Infeksi ini terdapat di semua negara dan kelompok umur termasuk Indonesia dengan kecenderungan peningkatan kasus. Di Sulawesi Selatan tahun 2022 kasus TB sebesar 68,8%, mengalami kenaikan dari CDR tahun 2021 sebesar 48,3 dengan penderita wanita di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan paparan rokok, riwayat BCG dan riwayat kontak TB dengan insidens TB Paru pada wanita usia subur di BBKPM Makassar tahun 2023. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan analisis observasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi pada penelitian adalah semua pasien TB paru kasus baru di BBKPM Makassar yang berjumlah 3.063 kasus dengan sampel 354 wanita usia subur ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan rekam medis dengan kriteria inklusi yaitu wanita usia 15-45 tahun, terdiagnosis TB paru kasus baru, dan data rekam medis lengkap. Hubungan antara paparan asap rokok, riwayat BCG dan riwayat kontak TB dianalisis dengan uji chi-square. Hasil penelitian diperoleh paparan rokok (*p-value* 0,037), riwayat BCG (*p-value* 0,034) dan riwayat kontak TB (*p-value* 0,004). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang bermakna antara paparan rokok, riwayat BCG, dan riwayat kontak TB dengan insidens TB paru pada wanita usia subur di BBKPM Makassar tahun 2023. Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam mengenali risiko TB paru dan dapat melakukan pencegahan lebih awal terkait TB paru pada wanita usia subur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan karena infeksi *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit TB sebagian besar mengenai parenkim paru (TB paru) namun bakteri ini juga memiliki kemampuan untuk menginfeksi organ lain (TB ekstra paru). TB dapat merupakan penyakit menular terdapat di semua negara dan kelompok umur (Dias & Storrer, 2022; WHO, 2022).

MOTT (*Mycobacterium Other Than Tuberculosis*), adalah kelompok bakteri *Mycobacterium* selain *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyebabkan masalah pada saluran nafas. MOTT terkadang dapat menyulitkan proses diagnosis dan pengobatan TB. BTA dapat menyerang paru-paru sehingga menyebabkan TB paru. Bakteri ini tidak hanya dapat menyerang paru-paru tetapi juga dapat menyerang kelenjar limfe, pleura, tulang, dan bagian tubuh lainnya di luar paru-paru. Penyakit TB paru adalah penyakit yang dapat menular melalui bakteri yang keluar dari lendir atau dahak penderita TB ketika mereka batuk atau bersin. Bakteri TB dapat menyebar ke udara selama bertahun-tahun, terutama di tempat gelap dan lembab (WHO, 2021b).

Menurut Laporan Global TB tahun 2022, insiden TB di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 969.000 atau 354 per 100.000 penduduk, dengan kasus TB-HIV sebesar 22.000 per tahun atau 8,1 per 100.000 penduduk. Kematian akibat TB diperkirakan sebesar 144.000 atau 52 per 100.000 penduduk, dan kematian akibat TB-HIV diperkirakan sebesar 6.500 atau 2,4 per 100.000 penduduk. Berdasarkan insiden tuberkulosis dari tahun 2000 hingga 2020,

terjadi penurunan insiden TB dan angka kematian TB, tetapi tidak terlalu tajam. Namun, pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan. Jumlah pasien TB tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 adalah wanita berusia 15 hingga 24 tahun (Report, 2022; Yusran et al., 2024).

TB merupakan penyebab kematian utama pada tahun 2019 (WHO, 2020) dan nomor dua setelah COVID-19 pada tahun 2020 akibat satu agen infeksi (WHO, 2021), meskipun faktanya penyakit ini merupakan penyakit yang dapat disembuhkan dan dicegah. Pada tahun 2020, diperkirakan 10 juta orang jatuh sakit (127 kasus per 100,000 penduduk) dan 1,5 juta meninggal karena TB di seluruh dunia (WHO, 2021). Di antara individu yang terinfeksi Mtb, sekitar 10% dapat menjadi TB aktif (MacEde et al., 2018), dan 90% sisanya menjadi infeksi dalam bentuk TB laten. Indonesia berada di peringkat 2 besar negara dengan beban TB tertinggi setelah India, diikuti oleh China di tempat ketiga (WHO, 2022).

Meskipun terdapat upaya pencegahan dan pengobatan, TB paru masih menjadi tantangan besar dalam mengendalikan penyakit ini. Wanita usia subur, terutama di daerah dengan angka TB tinggi dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, rentan terhadap infeksi TB paru. Wanita usia subur memiliki faktor risiko tertentu yang dapat meningkatkan kemungkinan mereka terkena TB paru misalnya sistem kekebalan tubuh yang lemah hal itu terjadi karena perubahan hormonal yang terjadi selama siklus menstruasi atau kehamilan sehingga meningkatkan risiko infeksi TB paru, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, di banyak negara, wanita mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang menyediakan deteksi dan pengobatan TB yang tepat waktu, kondisi sosio-ekonomi pada wanita dengan status sosio-ekonomi rendah cenderung tinggal di lingkungan yang kurang

higienis dan memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, meningkatkan risiko terpapar TB (Chanpho et al., 2020).

Diketahui bahwa Rate of Case Detection (CDR) kasus tuberkulosis pada Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 68,8%, mengalami kenaikan dari CDR tahun 2021 sebesar 48,3% (Risksedes, 2023). Pasien TB paru berjumlah 344 pada tahun 2017, 448 pada tahun 2018, 483 pada bulan Januari hingga Juli 2019 dan 3.063 kasus TB Paru pada bulan Januari-desember 2023 (BBKPM, 2023). Penelitian ini dilakukan di BBKPM Makassar pada pasien TB paru. BBKPM Makassar dipilih sebagai tempat penelitian karena balai paru terbesar di Indonesia timur, pusat rujukan paru di Indonesia timur, dan memiliki sampel yang cukup besar, terutama pasien tuberkulosis paru yang meningkat setiap tahunnya.

TB pada wanita usia subur dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan reproduksi mereka yaitu keguguran dan kehamilan tidak sehat, apabila infeksi TB yang tidak terkontrol selama kehamilan dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, atau bayi lahir dengan berat badan rendah dan gangguan menstruasi, infeksi TB paru dapat mengganggu siklus menstruasi menyebabkan ketidaksuburan atau kesulitan dalam merencanakan kehamilan (Dias And Storrer, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis tentang faktor risiko TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan pekerjaan terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar?
2. Bagaimana hubungan pendidikan terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar?
3. Bagaimana hubungan status gizi terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar?
4. Bagaimana hubungan riwayat BCG terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar?
5. Bagaimana hubungan riwayat kontak terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar?
6. Bagaimana hubungan riwayat merokok terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar?
7. Bagaimana hubungan riwayat penyakit DM terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar?
8. Bagaimana hubungan riwayat penyakit HIV terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)

- a. Tidak ada hubungan pendidikan terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- b. Tidak ada hubungan pekerjaan terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.

- c. Tidak ada hubungan riwayat BCG terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- d. Tidak ada hubungan status gizi terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- e. Tidak ada hubungan riwayat kontak terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- f. Tidak ada hubungan riwayat BCG terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- g. Tidak ada hubungan riwayat DM terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- h. Tidak ada hubungan riwayat penyakit HIV terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Ada hubungan pendidikan terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- b. Ada hubungan pekerjaan terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- c. Ada hubungan riwayat BCG terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- d. Ada hubungan status gizi terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- e. Ada hubungan riwayat kontak terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.

- f. Ada hubungan riwayat merokok terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- g. Ada hubungan riwayat penyakit DM terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- h. Ada hubungan riwayat penyakit HIV terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1. 1 *Definisi Operasional*

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1	Pendidikan	Proses pembelajaran untuk mendapatkan ilmu oleh wanita usia subur	Rekam medis	Rendah (Tidak sekolah- SMP/MTS) Tinggi (SMA/MA- Perguruan Tinggi)	Nominal
2	Pekerjaan	Suatu kegiatan yang dilakukan wanita usia subur sehari-hari.	Rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak bekerja : jika tidak memiliki pekerjaan • Bekerja : jika memiliki pekerjaan 	Nominal
3	Riwayat BCG	Riwayat responden pernah melakukan imunisasi BCG	Rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> • Iya : jika sudah imunisasi BCG • Tidak : Tidak sudah imunisasi BCG 	Nominal
4	Status Gizi	Keadaan status gizi pasien TB paru yang	Rekam medis	Dikategorikan menurut (WHO, 2021a) Underweight : < 18,5	Nominal

		diukur menggunakan indikator antropometri yaitu Indeks Massa Tubuh (IMT) yang tercatat pada rekam medis pasien		Normal : 18,5-22,9 Overweight : 23-24,9 Obesitas I : 25-29,9 Obesitas II : ≥ 30	
5	Riwayat kontak TB	Orang yang tinggal bersama atau pernah tinggal bersama di satu tempat tinggal selama satu malam atau lebih, atau sering berinteraksi di lingkungan yang sama selama 3 bulan sebelum diagnosis TB atau mulai perawatan TB	Rekam medis	Iya : Jika ada riwayat kontak penderita TB Tidak : Jika tidak ada riwayat kontak penderita TB	Nominal
6	Riwayat merokok	Kebiasaan merokok, terpapar asap rokok dari lingkungan keluarga atau lingkungan luar	Rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> • Merokok: jika ada riwayat merokok • Tidak Merokok: Jika tidak ada riwayat merokok 	Nominal
7	Riwayat penyakit DM	Kondisi dimana memiliki penyakit penyerta berupa	Rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> • Iya : jika ada riwayat DM • Tidak : jika tidak ada riwayat DM 	Nominal

		diabetes melitus			
8	Riwayat penyakit HIV	Kondisi dimana memiliki penyakit penyerta berupa HIV	Rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> • Iya : jika ada riwayat HIV • Tidak : jika tidak ada riwayat HIV 	Nominal
Variabel Dependen					
1	TB Paru	TB paru kasus baru pada wanita usia subur yang melakukan pemeriksaan tahun 2023	Rekam medis	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> • TB Bakteriologis • TB Klinis 	Nominal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas dan menganalisis faktor risiko TB paru pada wanita usia subur di Balai besar kesehatan paru masyarakat Makassar. Instrumen penelitian ini adalah rekam medis untuk mengukur hubungan variabel dependen dan independen antara bulan januari sampai bulan desember tahun 2023.

a. Kajian Pustaka

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka

No	Penelitian /Tahun	Judul	Metode Penelitian	Jumlah Sampel	Hasil
1	Feby Achirani Alwiyah (2020)	Hubungan Pengetahuan dan Pendamping Minum Obat (PMO) dengan Kepatuhan Minum Obat TBC pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Rejo Percut Sei Tuan Tahun 2020	Analitik-cross sectional	30 orang	Ada hubungan tingkat pengetahuan dan pendamping minum obat (PMO) dengan kepatuhan minum obat TBC pada wanita usia pinggiran di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Rejo Percut Sei Tuan
2	Yulianti, Hary Budiman, Endang Sari (2022)	Hubungan Pengetahuan, Kebiasaan Merokok Dan Riwayat Kontak Serumah Dengan Kejadian TB Paru	Cross sectional	100 orang	Ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok, riwayat kontak serumah dengan kejadian TB paru sedangkan tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kejadian TB paru.
3	Evi Novita, Lilis	Analisis Faktor Risiko TB Paru	cross sectional	76 orang	Ada hubungan riwayat kontak.

	Suryani, Helen Evelina Siringorigo (2023)				Status gizi, riwayat merokok, ventilasi, umur, kepadatan hunian dan pengetahuan.
4	Yohana Maria Paulyna Marpaung (2023)	Tingkat Pengetahuan penderita TB Paru Terhadap Infeksi Tuberkulosis Laten (ILTB) Di Puskesmas Lalang Dan Puskesmas Helvetia Medan Tahun 2023	Studi deskriptif dengan pendekatan cross sectional	44 orang	Terdapat tingkat pengetahuan terhadap penderita TB paru terhadap infeksi Tuberculosis laten (ILTB).
5	John Walles, Fregenet Tesfaye, Marianne Jansson, Taye Tolera Balcha, Erik Sturegård, dkk (2021)	TB Infection in Women of Childbearing Age: A Cross- sectional Study in an Antenatal Care Clinic in a Ethiopian city	diuji dalam analisis regresi logistik berganda.	1834 orang	Infeksi TBC pada wanita usia subur di Ethiopia secara independen berhubungan dengan infeksi HIV dan bertambahnya usia, menunjukkan adanya paparan terhadap TBC menular dan penularan infeksi TBC secara terus- menerus pada populasi ini.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis faktor risiko TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan pekerjaan terhadap TB Paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- b. Untuk mengetahui hubungan pendidikan terhadap TB Paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- c. Untuk mengetahui hubungan status gizi terhadap TB Paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- d. Untuk mengetahui hubungan riwayat BCG terhadap TB Paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- e. Untuk mengetahui hubungan riwayat kontak terhadap TB Paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- f. Untuk mengetahui hubungan riwayat merokok terhadap TB Paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
- g. Untuk mengetahui hubungan riwayat penyakit DM terhadap TB Paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- h. Untuk mengetahui hubungan riwayat penyakit HIV terhadap TB Paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dibidang kesehatan selama studi khususnya mengenai faktor risiko TB paru pada wanita usia subur.

2. Bagi Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah wawasan dan juga bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada masalah faktor risiko TB paru pada wanita usia subur.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi masyarakat mengenai faktor risiko TB paru pada wanita usia subur.

4. Bagi Institusi

Memberikan informasi tambahan kepada institusi di bidang kesehatan khususnya mengenai faktor risiko TB paru pada wanita usia subur dan juga memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi parameter dan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TB Paru

1. Definisi TB Paru

TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* (Mtb). Sebagian besar kuman TB menyerang paru-paru, tetapi mereka juga dapat menyerang organ lain di tubuh. Kuman penyebab TB adalah *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb) dikenal sebagai Basil Tahan Asam (BTA) karena sebagian besar sifatnya yang tahan terhadap asam pada pewarnaan. Kuman ini berbentuk batang dengan panjang 1-4 mm dan tebal 0,306 mm. Jika terkena sinar matahari langsung, Mtb cepat mati, tetapi di tempat gelap dan lembab, ia dapat bertahan hidup selama beberapa jam. Selain itu, dalam jaringan tubuh, Mtb dapat tetap tertidur selama beberapa tahun. (Maqfirah, 2018; Nopita et al., 2023)

TB paru pada manusia terbagi dalam dua bentuk yaitu TB primer, yang terjadi ketika seseorang terkena infeksi pertama kali dan TB pasca primer, yang terjadi setelah beberapa waktu seseorang terkena infeksi dan sembuh. TB pasca primer adalah bentuk yang paling sering terjadi karena kuman yang ada dalam dahak penderita. (Sri Rezeki Hamid, 2022)

2. Epidemiologi TB Paru

Data TB yang diperoleh tahun 2022 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) antara lain sebagai berikut (Riskesdes, 2023; WHO, 2022):

- 1) 1,3 juta kematian, termasuk 167.000 pasien HIV
- 2) 10,6 juta orang dengan TB aktif : 5,8 juta pria, 3,5 juta wanita, dan 1,3 juta anak
- 3) Sekitar 25% populasi dunia terinfeksi TB
- 4) 5% hingga 10% akan mengembangkan penyakit TB aktif

TB merupakan penyebab utama kematian pada orang dengan HIV

Angka kejadian kasus TB baru pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) 46% di Asia Tenggara
- 2) 23% di Afrika
- 3) 18% di Pasifik Barat

Kelompok yang paling berisiko tertular TB adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan penderita yang mempunyai sistem kekebalan tubuh lemah (seperti penderita HIV, gizi buruk, dan lain-lain). Di antara mereka yang terinfeksi jenis tuberkulosis ini, 5–10% mempunyai kemungkinan tertular tuberkulosis di kemudian hari atau dalam perjalanan. (Filia, 2023)

3. Etiologi TB Paru

Terdapat 5 bakteri yang berkaitan erat dengan infeksi TB yaitu *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium africanum*, *Mycobacterium microti* and *Mycobacterium canettii*. Mtb hingga saat ini merupakan bakteri yang paling sering ditemukan, dan menular antar manusia melalui rute udara. Kuman berukuran $0,5\text{--}4\ \mu \times 0,3\text{--}0,6\ \mu$ dan memiliki bentuk batang tipis, lurus, atau agak bengkok. Bergranular atau tidak memiliki

selubung, tetapi lapisan luarnya terdiri dari lipoid, terutama asam mikolat. Bakteri ini memiliki sifat unik, yaitu dapat menahan pencucian warna dengan asam dan alkohol. Akibatnya, bakteri ini sering disebut sebagai basil tahan asam (BTA), dan juga tahan terhadap bahan kimia dan fisik. (Kemenkes RI, 2020; Maqfirah, 2018)

TB menular dari orang ke orang lain melalui udara, kemudian melalui percik renik atau droplet inti (≤ 5 mikron μ) yang keluar ketika orang yang terinfeksi TB paru atau TB laring batuk, bersin, atau berbicara. Percik renik juga dapat dikeluarkan saat pasien TB paru melalui prosedur pemeriksaan yang menghasilkan produk aerosol seperti saat dilakukannya induksi sputum, bronkoskopi dan juga saat dilakukannya manipulasi terhadap lesi atau pengolahan jaringan di laboratorium. Percik renik, yang merupakan partikel kecil berdiameter 1-5 μ dapat menampung 1-5 basil yang bersifat infeksius, dan dapat bertahan di dalam udara sampai 4 jam. Karena ukurannya yang sangat kecil, percik renik ini memiliki kemampuan mencapai ruang alveolar dalam paru, dimana bakteri kemudian melakukan replikasi. (Kemenkes RI, 2020)

Tidak ditemukan hewan yang berperan sebagai agen penularan Mtb, namun *Mycobacterium bovis* dapat bertahan dalam susu sapi yang terinfeksi dan melakukan penetrasi ke mukosa saluran cerna serta menginvasi jaringan limfe orofaring saat seseorang mengonsumsi susu dari sapi yang terinfeksi tersebut. (Kemenkes RI, 2020)

4. Patogenesis TB Paru

Setelah inhalasi, nukleus percik renik dibawa ke percabangan trakea-bronkial untuk didepositkan di dalam bronkiolus respiratorik atau alveolus, di mana nukleus percik renik tersebut akan dicerna oleh makrofag alveolus yang

kemudian akan memproduksi sebuah respon nonspesifik terhadap basilus. Infeksi bergantung pada kapasitas virulensi bakteri dan kemampuan bakterisid makrofag alveolus yang mencernanya. Apabila basilus dapat bertahan melewati mekanisme pertahanan awal ini, basilus dapat bermultiplikasi di dalam makrofag.

Tuberkel bakteri akan tumbuh perlahan dan membelah setiap 23-32 jam sekali di dalam makrofag. *Mycobacterium* tidak memiliki endotoksin ataupun eksotoksin, sehingga tidak terjadi reaksi imun segera pada host yang terinfeksi. Bakteri kemudian akan terus tumbuh dalam 2-12 minggu dan jumlahnya akan mencapai 10^3 - 10^4 , yang merupakan jumlah yang cukup untuk menimbulkan sebuah respon imun seluler yang dapat dideteksi dalam reaksi pada uji *Tuberkulin Skin Test* (TST). Bakteri kemudian akan merusak makrofag dan mengeluarkan produk berupa tuberkel basilus dan kemokin yang kemudian akan menstimulasi respon imun.

Sebelum imunitas seluler berkembang, tuberkel basili akan menyebar melalui sistem limfatik menuju nodus limfe hilus, masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke organ lain. Beberapa organ dan jaringan diketahui memiliki resistensi terhadap replikasi basili ini. Sumsum tulang, hepar dan limpa ditemukan hampir selalu mudah terinfeksi oleh *Mycobacteria*. Organisme akan dideposit di bagian atas (apeks) paru, ginjal, tulang, dan otak, di mana kondisi organ-organ tersebut sangat menunjang pertumbuhan bakteri *Mycobacteria*. Pada beberapa kasus, bakteri dapat berkembang dengan cepat sebelum terbentuknya respon imun seluler spesifik yang dapat membatasi multiplikasinya. (Kemenkes RI, 2020)

a. TB Primer

Pada paparan pertama tuberkel basili, infeksi pertama terjadi, biasanya muncul saat anak-anak. Namun, orang yang belum pernah terpapar Mtb sebelumnya dapat terkena infeksi ini pada usia berapapun. Percikan renik yang mengandung basil dihirup dan menempati alveolus terminal paru-paru, yang biasanya terletak di bagian bawah lobus superior atau bagian atas lobus inferior. Setelah itu, basil difagositosis oleh makrofag. Ini terjadi karena produk mikobakterial dapat menghentikan makrofag alveolus untuk menjadi bakterisid, memungkinkan bakteri untuk melakukan replikasi di dalamnya. Makrofag dan monosit lain bereaksi terhadap kemokin yang dibuat. Mereka kemudian bermigrasi ke lokasi infeksi dan menghasilkan reaksi imun. Area inflamasi ini disebut *Ghon Focus*.

Basil dan antigen kemudian bermigrasi keluar dari *Ghon focus* melalui jalur limfatik menuju Limfe nodus hilus dan membentuk kompleks (*Ghon*) primer. Respon inflamasinya menghasilkan gambaran tipikal nekrosis kaseosa. Di dalam nodus limfe, limfosit T akan membentuk suatu respon imun spesifik dan mengaktifasi makrofag untuk menghambat pertumbuhan basili yang terfagositosis.

Fokus primer ini mengandung 1,000–10,000 basili yang kemudian terus melakukan replikasi. Area inflamasi di dalam fokus primer akan digantikan dengan jaringan fibrotik dan kalsifikasi, yang didalamnya terdapat makrofag yang mengandung basili terisolasi yang akan mati jika sistem imun host adekuat. Beberapa basili tetap dorman di dalam fokus primer untuk beberapa bulan atau tahun, hal ini dikenal dengan “kuman laten”. Infeksi primer biasanya bersifat asimtomatik dan akan menunjukkan menunjukkan hasil tuberkulin positif dalam 4-6 minggu setelah infeksi.

Dalam beberapa kasus, respon imun tidak cukup kuat untuk menghambat perkembangbiakan bakteri dan basili akan menyebar dari sistem limfatik ke aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan penyakit TB aktif dalam beberapa bulan. TB primer progresif pada parenkim paru menyebabkan membesarnya fokus primer, sehingga dapat ditemukan banyak area menunjukkan gambaran nekrosis kaseosa dan dapat ditemukan kavitas, menghasilkan gambaran klinis yang serupa dengan TB post primer.

b. TB Pasca Primer

Penyakit TB pasca primer terjadi pada host yang telah tertular bakteri TB sebelumnya. Ini muncul setelah periode laten yang berlangsung bulanan hingga tahunan setelah infeksi pertama, dapat karena reinfeksi atau reaktivasi kuman laten. Beberapa bulan atau beberapa tahun setelah infeksi awal, basili dorman mulai berbiak kembali di jaringan, menyebabkan reaktivasi.

Reinfeksi terjadi ketika seseorang yang pernah mengalami infeksi pertama terpapar kembali dengan orang yang terinfeksi TB aktif atau ketika sistem kekebalan host melemah karena infeksi HIV. Ini terkadang merupakan bagian dari proses infeksi primer. Setelah infeksi awal, anak lebih sering mengalami penyakit intra-torakal dibandingkan orang dewasa. Fotografi toraks mungkin dapat memperlihatkan gambaran limfadenopati intratorakal dan infiltrat pada lapang paru. TB post primer biasanya mempengaruhi parenkim paru namun dapat juga melibatkan organ tubuh lain. Karakteristik dari TB post primer adalah ditemukannya kavitas pada lobus superior paru dan kerusakan paru yang luas. Pemeriksaan sputum biasanya menunjukkan hasil yang positif dan biasanya tidak ditemukan limfadenopati intratorakal.

5. Gejala Klinis TB Paru

Gejala penyakit TB tergantung pada lokasi lesi, sehingga dapat menunjukkan manifestasi klinis sebagai berikut:(Kemenkes RI, 2020)

- 1) Batuk kurang lebih 2 minggu
- 2) Batuk berdahak
- 3) Batuk berdahak dapat bercampur darah
- 4) Dapat disertai nyeri dada
- 5) Sesak nafas

Dengan gejala lain meliputi :

- 1) Malaise
- 2) Penurunan berat badan
- 3) Menurunnya nafsu makan
- 4) Menggigil
- 5) Demam
- 6) Berkeringat di malam hari

6. Faktor Risiko TB Paru

Saat ini, faktor individu, faktor penyakit penyerta, dan faktor lingkungan, merupakan komponen yang banyak diteliti untuk mempengaruhi TB paru.

a. Faktor Individu

1) Usia

Pada kelompok yang menderita TB paru, usia tertinggi adalah antara 15 dan 55 tahun, atau usia produktif, karena pada usia ini orang menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk bekerja, dan tidak ada waktu istirahat yang cukup, yang mengurangi daya tahan tubuh.(Sunarmi & Kurniawaty, 2022)

Sistem kekebalan tubuh menurun seiring bertambahnya usia. Ini meningkatkan risiko terinfeksi penyakit TB paru dan TB laten. Seseorang yang berumur lebih dari empat puluh tahun beresiko 3 kali lebih besar untuk terinfeksi bakteri TB dibandingkan orang yang berumur kurang dari dua puluh tahun. Namun, penelitian tahun 2019 oleh Kambuno dkk. menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara status TB laten dan usia (Nopita et al., 2023).

2) Jenis Kelamin

Secara epidemiologi dibuktikan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal penyakit, insidens, dan kematian akibat TB Paru. Laki-laki mengalami lebih banyak penyakit TB Paru dibandingkan perempuan. Laki-laki lebih rentan terhadap paparan dan kerentanan terhadap *Mycobacterium tuberculosis* daripada perempuan karena mereka memiliki mobilitas yang lebih besar, seperti petani, yang membutuhkan tenaga yang lebih besar. Akibatnya, laki-laki lebih rentan terhadap paparan *Mycobacterium tuberculosis* dibandingkan perempuan yang bekerja di rumah, seperti ibu rumah tangga (Hamzani et al., 2022).

3) Pendidikan

Tingkat pendidikan harus meningkatkan pemahaman tentang tuberkulosis dan pengobatannya. Semua proses pendidikan kesehatan bergantung pada tingkat pendidikan seseorang. Orang yang menerima pendidikan yang lebih tinggi lebih memahami pesan pendidikan maupun kesehatan. Seseorang juga memiliki kesempatan yang baik untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang TB dari berbagai media saat ini. (Emir Yusuf Muhammad, 2019; Widiati & Majdi, 2021)

Sementara tingkat pendidikan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, cara berperilaku seseorang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin banyak informasi yang mereka terima, dan mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menerima informasi tersebut. Tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi jenis pekerjaan dan tingkat ekonomi keluarga. (Ruditya, 2015)

4) Pekerjaan

Pekerjaan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menghadapi risiko, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Lingkungan tempat kerja sangat penting karena dapat menjadi tempat penularan tuberkulosis dan menurunkan kualitas faal paru-paru, yaitu dengan tingginya kontaminasi debu serat ventilasi dan tingkat kebersihan tempat kerja yang buruk. Jenis pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pendapatan bulanan keluarga. Ini pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan suatu keluarga untuk menjalani gaya hidup dan faktor sosial ekonomi keluarga. (Assriyah et al., 2020; Ruditya, 2015)

Dibandingkan dengan pengangguran dan ibu rumah tangga, jenis pekerjaan seperti buruh, petani, atau nelayan merupakan faktor risiko yang paling banyak berhubungan dengan status TB. Bakteri TB tidak hanya dapat menyebar di dalam rumah tetapi juga di luar rumah, misalnya di tempat kerja atau lainnya (Hamzani et al., 2022).

5) Status Gizi

Pada kelompok umur di atas 18 tahun, indeks masa tubuh (IMT) atau Boddy Mass Index (BMI) adalah alat untuk mengetahui status gizi seseorang. Kondisi gizi yang buruk, seperti malnutrisi, yang mengurangi fungsi paru-paru. transformasi dalam analisis gas darah, dan produktivitas kerja. Seperti yang

diketahui, kuman tuberkulosis tetap tertidur selama bertahun-tahun. Jika mereka dapat bangun dan menyebarkan penyakit, maka penyakit tuberkulosis paru muncul. Oleh karena itu, status gizi yang baik adalah salah satu daya tangkal. Status gizi yang buruk juga mempengaruhi daya tahan tubuh, dan penurunan daya tahan tubuh dikaitkan dengan peningkatan infeksi kuman TB (Fitria et al., 2021; Maqfirah, 2018).

6) Riwayat Merokok

Kebiasaan merokok dapat menyebabkan kerusakan pada mekanisme pemeliharaan paru-paru dan pembersihan mucociliary. Selain itu, asap rokok dapat meningkatkan permeabilitas epitel paru-paru, mengganggu gerakan silia, meningkatkan produksi elastase, dan menurunkan antiprotease. Akibatnya, orang yang merokok lebih rentan terhadap infeksi TB (Purnamasari, 2010 ; Girsang 2011). Meskipun demikian, penelitian Kambuno dkk. 2019 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara merokok dan kondisi TB.

Studi menunjukkan bahwa ada hubungan antara merokok dan kasus TB paru. Seseorang yang merokok memiliki risiko 7,319 kali lebih tinggi untuk menderita tuberkulosis paru-paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Status merokok juga dimasukkan dalam pemodelan akhir multivariat, yang berarti bahwa faktor ini adalah salah satu faktor yang paling penting untuk jumlah kasus tuberkulosis paru-paru. Hasil studi Katiandagho, dkk. yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tatelu Kecamatan Dimembedimana, sejalan dengan temuan ini bahwa ada korelasi antara tingkat merokok dan lamanya merokok. Jumlah waktu yang dihabiskan untuk merokok juga mempengaruhi risiko tuberkulosis paru-paru, karena tubuh individu yang merokok akan menimbun racun yang terkandung dalam rokok

semakin lama, sehingga berpotensi menjadi lebih berbahaya (Dzakiyah et al., 2023).

7) Riwayat Kontak TB

Faktor kontak yang erat dengan penderita tuberkulosis paru memiliki hubungan dengan kejadian tuberkulosis paru. Berdasarkan nilai kontak OR, diketahui bahwa pernah melakukan hubungan dekat dengan penderita tuberkulosis dapat meningkatkan risiko 6,303 kali lipat untuk terkena tuberkulosis paru-paru. Faktor kontak erat dengan penderita tuberkulosis juga dimasukkan dalam pemodelan akhir multivariat, yang menunjukkan bahwa faktor ini adalah salah satu faktor yang paling dominan terhadap kejadian tuberkulosis paru-paru (Dzakiyah et al., 2023).

Orang-orang yang tinggal serumah dengan penderita memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak pernah melakukan kontak dengan penderita. Orang-orang yang paling muda dan tidak memiliki kekebalan paling berisiko terkena infeksi di antara orang-orang yang terlibat dalam kontak rumah tangga. Akibat penggunaan ruang udara yang sama dalam satu rumah, risiko untuk kuman TB meningkat pada orang yang memiliki riwayat kontak serumah. Risiko kontak penularan penyakit ke orang yang memiliki riwayat meningkat jika penderita TB tidak terdiagnosis dan tidak diobati. Semua anak, terutama balita yang tinggal di rumah atau dekat dengan penderita TB dengan BTA positif, harus diperiksa menggunakan sistem skoring. (Indrawati et al., 2023)

8) Riwayat BCG

Vaksin *Bacille Calmette-Guerin* atau BCG digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Vaksin ini mengandung bentuk bakteri (kuman) yang lemah yang menyebabkan penyakit tuberkulosis. Karena bakteri ini

dilemahkan, bakteri ini tidak dapat menyebabkan tuberkulosis pada orang yang sehat, sebaliknya membantu membentuk perlindungan (imunitas) terhadap bakteri tuberkulosis. Vaksin BCG paling efektif pada bayi dan anak-anak. Selain itu, sangat efektif dalam mencegah tuberkulosis yang parah, seperti meningitis tuberkulosis, dengan perlindungan yang 70% lebih kuat. Dosis vaksin hanya diberikan sekali, dan tidak disarankan untuk mengambil lebih dari satu dosis. Untuk memberikan efek (perlindungan) terhadap kekebalan tubuh, vaksin BCG memerlukan waktu enam hingga dua minggu belas. Vaksinasi ini hanya dapat memberikan kekebalan lima puluh hingga enam puluh persen terhadap tuberkulosis, dan seiring berjalannya waktu, vaksin ini menjadi kurang efektif pada beberapa orang, biasanya pada usia lima belas hingga lima belas tahun.(Sri Rezeki Hamid, 2022).

b. Faktor Penyakit Penyerta

1) DM

Hiperglikemia yang disebabkan oleh gangguan sekresi insulin hati, gangguan respon insulin atau kombinasi keduanya dapat menjadi tanda diabetes melitus. Tingkat gula darah tinggi atau hiperglikemia yang tidak terkontrol juga dapat mengganggu kekebalan tubuh atau sistem imun, sehingga pasien lebih mudah terinfeksi bakteri intraseluler, terutama Mtb. Kerja makrofag dapat dipengaruhi oleh hiperglikemia karena makrofag adalah salah satu sel kekebalan pertama yang melawan infeksi mikobakteri dan tempat mikobakteri berkembang selama fase infeksi.(M. Rizal Fahlahi et al., 2023).

2) HIV

Infeksi human immunodeficiency virus (HIV) menyerang sistem kekebalan tubuh. Orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, terutama mereka yang memiliki HIV, berisiko lebih tinggi terkena tuberkulosis daripada orang dengan sistem kekebalan tubuh normal. Di Afrika, orang yang terinfeksi HIV tuberkulosis lebih sering dibandingkan orang tanpa HIV.

Individu yang mengidap HIV/AIDS memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengembangkan TB karena HIV menyediakan sistem kekebalan tubuh. Penyakit lain seperti diabetes atau gagal ginjal juga dapat merusak sistem kekebalan tubuh atau mengganggu keseimbangan kimiawi tubuh, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terkena TB. (Febriyanti et al., 2024)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi pasien TB adalah daya tahan tubuh rendah, diantaranya infeksi HIV/AIDS dan malnutrisi. HIV merupakan faktor risiko yang paling kuat bagi yang terinfeksi TB menjadi sakit TB. Infeksi HIV/AIDS mengakibatkan kerusakan luas sistem daya tahan tubuh seluler (*cellular immunity*), sehingga jika terjadi infeksi penyerta, seperti tuberkulosis, maka yang bersangkutan akan menjadi sakit parah bahkan bisa mengakibatkan kematian. Bila jumlah orang terinfeksi HIV meningkat, maka jumlah pasien TB akan meningkat, dengan demikian penularan TB di masyarakat akan meningkat pula. Riwayat alamiah pasien TB yang tidak diobati adalah pasien yang tidak diobati, maka setelah 5 tahun 50% meninggal, 25% akan sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang tinggi dan 25% menjadi kasus kronis yang tetap menular. (Wijaya, 2019)

c. Faktor Lingkungan

1) Kepadatan Hunian

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa tingkat penularan TB Paru tinggi adalah tingkat kepadatan hunian dalam satu rumah tinggal. Luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni akan menyebabkan berjubel, yang tidak sehat dan mengurangi konsumsi oksigen. Selain itu, jika salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, terutama tuberkulosis, penyakit tersebut dapat mudah menular kepada anggota keluarga lainnya. Kepadatan hunian adalah perbandingan jumlah penghuni dengan luasruangan rumah yang ditempati responden dalam satuan meter persegi (m²), dengan persyaratan minimum 8 m²/orang. Kualitas bangunan dan fasilitas yang tersedia menentukan luas minimum per orang. Kepadatan hunian biasanya dinyatakan dengan m²/orang.(Sari And Elina, 2021)

2) Ventilasi

Kemungkinan penularan Mtb dari pasien TB aktif ke orang-orang di sekitar rumah tangga atau sekitarnya dapat meningkat karena kurangnya sirkulasi udara atau kurangnya ventilasi udara di rumah. Pertukaran udara dari ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan mikroorganismenya berkembang biak dengan cepat, yang mengganggu kesehatan manusia. Lubang ventilasi rumah yang melebihi 10% luas lantai dianggap memenuhi syarat kesehatan untuk luas ruangan.

Dengan sistem ventilasi silang, luas lantai harus minimal 10%, dan jendela harus dibuka secara teratur untuk pergantian udara pada pagi hari. Ventilasi yang jarang dibuka atau tertutup menyebabkan udara di dalam ruangan tidak dapat bertukar dan tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk.

Akibatnya, Mtb tidak akan bertahan lama jika terkena cahaya matahari secara langsung.

7. Cara Penularan TB Paru

Menurut Depkes RI, sumber penularan tuberkulosis paru adalah percikan dahak, juga dikenal sebagai droplet, dari penderita tuberkulosis paru BTA(+), yang batuk atau bersin. Kuman TB dapat bertahan di udara selama beberapa jam pada suhu kamar, menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak per batuk. Penularan biasanya terjadi di tempat di mana percikan dahak berlangsung lama. Sementara sinar matahari langsung membunuh kuman, ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan. Percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam kondisi yang gelap dan lembab. Jika droplet terhirup ke dalam saluran pernafasan seseorang, mereka mungkin terinfeksi. Kuman tuberkulosis dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan dan dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, saluran limfe, dan saluran nafas, atau langsung ke bagian tubuh lainnya (Kemenkes RI, 2020; Maqfirah, 2018).

8. Klasifikasi TB Paru

Menurut Kemenkes RI, ada dua klasifikasi tuberkulosis:

a. Pasien TB terkonfirmasi bakteriologis

Yaitu pasien TB yang ditemukan bukti infeksi kuman MTB berdasarkan pemeriksaan bakteriologis. Termasuk didalamnya adalah:

- 1) Pasien TB paru BTA positif.
- 2) Pasien TB paru hasil biakan MTB positif.
- 3) Pasien TB paru hasil tes cepat MTB positif.
- 4) Pasien TB ekstraparu terkonfirmasi secara bakteriologis, baik dengan BTA, biakan maupun tes cepat dari contoh uji jaringan yang terkena

- 5) TB anak yang terdiagnosis dengan pemeriksaan bakteriologis.

b. Pasien TB terdiagnosis secara klinis

Adalah pasien TB yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara bakteriologis, namun berdasarkan bukti lain yang kuat tetap didiagnosis dan ditata laksana sebagai TB oleh dokter yang menanganit. Termasuk di dalam klasifikasi ini adalah:

- 1) Pasien TB paru BTA negatif dengan hasil pemeriksaan foto toraks mendukung TB.
- 2) Pasien TB paru BTA negatif dengan tidak ada perbaikan setelah diberikan antibiotika non OAT, dan mempunyai faktor risiko TB.
- 3) Pasien TB ekstraparu yang terdiagnosis secara klinis maupun laboratoris dan histopatologis tanpa konfirmasi bakteriologis.
- 4) TB anak yang terdiagnosis dengan sistim skoring.

Pasien TB yang terdiagnosis secara klinis jika dikemudian hari terkonfirmasi secara bakteriologis harus diklasifikasi ulang menjadi pasien TB terkonfirmasi bakteriologis.

c. Berdasarkan lokasi infeksi:

- 1) Tuberkulosis paru: yaitu TB yang berlokasi di parenkim paru. TB milier dianggap sebagai TB paru karena adanya keterlibatan lesi pada jaringan paru. Pasien TB yang menderita TB paru dan ekstraparu bersamaan diklasifikasikan sebagai TB paru.
- 2) Tuberkulosis ekstra paru: TB yang terjadi pada organ selain paru, dapat melibatkan organ pleura, kelenjar limfatik, abdomen, saluran kencing, saluran cerna, kulit, meninges, dan tulang. Jika terdapat beberapa TB

ekstraparu di organ yang berbeda, pengklasifikasian dilakukan dengan menyebutkan organ yang terdampak TB terberat.

d. Berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya:

- 1) Pasien baru tuberkulosis adalah pasien yang belum pernah mendapatkan pengobatan tuberkulosis sebelumnya atau sudah pernah menelan OAT tetapi kurang dari 1 bulan (kurang dari 28 dosis).
- 2) Pasien yang pernah diobati tuberkulosis adalah pasien yang pernah meminum OAT selama 1 bulan atau lebih (lebih dari 28 dosis).

e. Berdasarkan hasil pengobatan TB paru terakhir

- 1) Pasien tuberkulosis paru yang telah dinyatakan sembuh atau menjalani pengobatan lengkap dan saat ini didiagnosis dengan TB paru berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis atau klinis. Mereka dikenal sebagai pasien kambuh karena alasan apapun, apakah itu karena reinfeksi atau karena TB benar-benar kambuh.
- 2) Pasien TB paru yang telah mengalami pengobatan sebelumnya dan dinyatakan gagal pada pengobatan terakhir mereka adalah pasien yang diobati kembali setelah gagal.
- 3) Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat, juga disebut sebagai pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (dikenal sebelumnya sebagai pengobatan pasien setelah putus berobat/default).
- 4) Lain-lain, adalah pasien TB paru yang pernah diobati namun hasil akhir pengobatan sebelumnya tidak diketahui.

f. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat

Pengelompokan pasien disini berdasarkan hasil uji sensitivitas contoh uji dari Mycobacterium tuberkulosis terhadap OAT dan dapat berupa:

- 1) Mono resistan (TB MR): resisten terhadap salah satu jenis OAT lini pertama saja
- 2) Poli resisten (TB PR): resistensi terhadap lebih dari satu jenis OAT lini pertama selain Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) secara bersamaan.
- 3) Multi Drug Resisten (TB MDR): resisten terhadap Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) secara bersamaan.
- 4) Resistan obat ekstensif (TB XDR): TB MDR yang sekaligus juga resisten terhadap salah satu OAT golongan fluorokuinolon dan minimal salah satu dari OAT lini kedua jenis injeksi (Kanamisin, Kapreomisin dan Amikasin).
- 5) Resistan Rifampisin (TB RR): resisten terhadap Rifampisin dengan atau tanpa resistensi terhadap OAT lain yang terdeteksi menggunakan metode genotip (tes cepat) atau metode fenotip (konvensional).

g. Pasien TB berdasarkan status HIV

- 1) Pasien TB dengan HIV positif (pasien ko-infeksi TB/HIV) adalah pasien TB dengan:
 - a) Hasil tes HIV positif sebelumnya atau sedang mendapatkan ART.
 - b) Hasil tes HIV positif pada saat diagnosis TB.
- 2) Pasien TB dengan HIV negatif adalah pasien TB dengan:
 - a) Hasil tes HIV negatif sebelumnya.
 - b) Hasil tes HIV negatif pada saat diagnosis TB.
- 3) Pasien TB dengan status HIV tidak diketahui adalah pasien TB tanpa ada bukti pendukung hasil tes HIV saat diagnosis TB ditetapkan.

Catatan: Apabila hasil tes HIV pasien ditemukan pada pemeriksaan selanjutnya, pasien harus diklasifikasikan kembali sesuai dengan hasil tes HIV terakhir mereka.

9. Diagnosis TB Paru

Beberapa prosedur yang perlu dilakukan untuk mendiagnosis tuberkulosis adalah sebagai berikut:(Kemenkes RI, 2020)

- a. Anamnesis pasien dan anggota keluarganya;
- b. Pemeriksaan fisik;
- c. Pemeriksaan laboratorium (darah, dahak, dan cairan otak);
- d. Pemeriksaan patologi anatomi (PA);
- e. Foto rontgen dada (foto thorax); dan
- f. Pemriksaan penunjang lain: analisis cairan pleura dan uji tuberkulin.

10. Tata Laksana TB Paru

Fokus dari pendekatan ini adalah untuk memberi tahu pasien tentang penyakit tuberkulosis dan tentang kepatuhan terhadap pengobatan yang harus mereka terima sesuai dengan rekomendasi WHO.

a. Farmakologis

Pemberian OAT sesuai panduan OAT yang digunakan di Indonesia Pengobatan TB yang adekuat harus memenuhi:

- 1) Pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi.
- 2) Diberikan dalam dosis yang tepat.
- 3) Ditelan secara teratur dan berbaring langsung oleh PMO(Pengawas Minum Obat) sampai selesai pengobatan.
- 4) Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup dipahami dalam tahap awal dan tahap lanjutan untuk mencegah kekambuhan.

Paduan OAT yang digunakan di Indonesia :

Kategori 1 : 2(RHZE)/4(HR)3**Tabel 2. 1 Dosis Paduan OAT Kategori 1**

BB	Tahap Intensif Tiap hari selama 56 Hari	Tahap Lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu
30-37 kg	2 Tablet 4KDT	2 Tablet 2KDT
38-54 kg	3 Tablet 4KDT	3 Tablet 2KDT
55-70 kg	4 Tablet 4KDT	4 Tablet 2KDT
≥ 70 kg	5 Tablet 4KDT	5 Tablet 2KDT

Sumber : (dr. A. ArifJunaedi, 2022)

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru:

- Pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis.
- Pasien TB paru terdiagnosis klinis
- Pasien TB ekstra paru

Kategori 2 : 2(RHZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3**Tabel 2. 2 Dosis Paduan OAT Kategori 2**

BB	Tahap Intensif Tiap hari selama 56 Hari		Tahap Lanjutan 3 kali seminggu
	Selama 56 Hari	Selama 28 Hari	Selama 20 Minggu
30-37 kg	2 Tab 4 KDT + 500 injeksi Streptomisin	2 Tablet 4KDT	2 Tablet 2KDT
38-54 kg	3 Tab 4 KDT + 750 injeksi Streptomisin	3 Tablet 4KDT	3 Tablet 2KDT
55-70 kg	4 Tab 4 KDT + 1000 injeksi Streptomisin	4 Tablet 4KDT	4 Tablet 2KDT
≥ 70 kg	5 Tab 4 KDT + 500 injeksi Streptomisin	5 Tablet 4KDT	5 Tablet 2KDT

Sumber : (dr. A. ArifJunaedi, 2022)

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang pernah diobati sebelumnya (pengobatan ulang):

- a. Pasien kambuh
- b. Pasien gagal pada pengobatan paduan OAT kategori 1 sebelumnya
- c. Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (lost to follow-up)

Untuk membantu dan mengevaluasi kepatuhan, harus dilakukan prinsip pengobatan dengan:

- 1) System patient-centred strategy, yaitu memilih bentuk obat, cara pemberian, cara mendapatkan obat serta kontrol pasien sesuai dengan cara yang paling mampu dilaksanakan pasien.
- 2) Pengawasan langsung menelan obat (DOT/direct observed therapy).
- 3) Pemantauan kemajuan dan hasil pengobatan pada orang dewasa dilaksanakan dengan pemeriksaan ulang dahak secara mikroskopis. Pemeriksaan dahak secara mikroskopis lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan radiologi dalam menjaga kemajuan pengobatan (Ayu Anggraini, 2023; dr. A. Arif Junaedi, 2022; Nirwesti et al., 2021)

b. Non-Farmakologis

- 1) Edukasi pasien maupun keluarga tentang penyakit tuberkulosis paru, termasuk etiologi, penyebaran, pengobatan, dan pencegahan.
- 2) Edukasi pasien tentang pentingnya mengonsumsi obat secara teratur. Edukasi keluarga untuk mengingatkan pasien untuk patuh minum obat (Yunus et al., 2023).
- 3) Mengajarkan pasien untuk melakukan pemeriksaan dahak lanjutan pada akhir bulan kedua atau ketiga, akhir bulan kelima, dan setelah selesai pengobatan. Edukasi keluarga untuk mengingatkan pasien untuk rutin melakukan pemeriksaan.

- 4) Mengingatkan pasien untuk mengambil obat secara teratur setiap 1 (satu) bulan sekali di Puskesmas sebelum obat habis.
- 5) Edukasi pasien dan keluarga tentang cara mencegah penularan penyakit, seperti menggunakan masker, etika batuk, membuang dahak di lokasi tertentu, memisahkan peralatan makan, handuk, peralatan mandi, dan pakaian antara pasien dan anggota keluarga lainnya, dan menjaga kamar tidur terpisah satu sama lain.
- 6) Memberi tahu pasien dan keluarga tentang pentingnya mengatur ventilasi udara dan pencahayaan dengan selalu membuka jendela, gorden untuk sirkulasi udara yang baik, dan berjemur secara teratur setiap pagi selama setidaknya 30 menit.
- 7) Edukasi pasien dan keluarga mengenai cuci tangan WHO sebelum dan setelah melakukan kegiatan, terutama saat batuk dan kontak dengan dahak
- 8) Edukasi pasien dan keluarga untuk tetap bersih, terutama tempat tidur mereka, dengan rajin mengganti masker, mengganti pakaian setelah mandi setidaknya dua kali sehari, dan menjaga kebersihan lingkungan (Ayu Anggraini, 2023).

B. Wanita Usia Subur

Kementerian Kesehatan RI (2020) mendefinisikan wanita usia subur adalah mereka yang berada dalam rentang usia produktif kurang lebih 15-49 tahun (Kemenkes RI, 2023). Biasanya, individu yang berusia antara 20-40 tahun dianggap dewasa muda dan sering dikaitkan dengan masa subur. Oleh karena itu, perempuan pada kelompok usia ini biasa disebut sebagai wanita usia subur, apapun status perkawinannya. Rentang usia yang biasa disebut dengan kelompok usia subur ditandai dengan besarnya kemungkinan

tercapainya kehamilan yang sehat sehingga merupakan masa yang signifikan dalam kehidupan berumah tangga seseorang (Prasetya, 2022; Rachmawati et al., 2020).

C. Hubungan antara TB Paru dengan Wanita usia subur

TB paru adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Beberapa faktor dapat menyebabkan hubungan antara TB paru dan wanita usia subur.

Wanita usia subur mungkin mengalami perubahan hormonal yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Sehingga dapat meningkatkan kepekaan terhadap infeksi, termasuk TB. Wanita usia subur yang tinggal atau bekerja di lingkungan yang juga berisiko tinggi terpapar bakteri tuberkulosis, seperti di rumah dengan anggota keluarga yang terinfeksi tuberkulosis atau di tempat kerja dengan paparan tinggi lebih mungkin terinfeksi. Kemudian kehamilan dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh wanita, meningkatkan risiko terhadap infeksi TB atau memperburuk kondisi TB yang sudah ada. Selain itu, wanita hamil mungkin membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan TB mereka untuk melindungi kesehatan dan janin.

Wanita yang terinfeksi TB paru pada usia subur dapat menularkan infeksi ini kepada anak, baik selama kehamilan, saat melahirkan, atau setelahnya, terutama jika tidak diobati dengan benar. Selain itu faktor sosio-ekonomi juga termasuk, dan juga akses terhadap layanan kesehatan yang tepat dapat memengaruhi risiko TB paru pada wanita usia subur. Wanita dengan akses terbatas terhadap pemeriksaan medis atau perawatan yang berkualitas mungkin lebih rentan terhadap TB paru.

Oleh karena itu, jika wanita usia subur mengalami gejala TB paru seperti batuk darah, demam, penurunan berat badan, dan batuk

berkepanjangan, harus segera mendapatkan perawatan medis. Untuk mengurangi risiko infeksi, vaksinasi BCG dan menjaga lingkungan bersih adalah tindakan penting lainnya.

D. Integrasi Keislaman

Islam mendorong umatnya untuk belajar dan memahami kesehatan dan penyakit dengan lebih baik. Oleh karena itu, diharapkan bahwa wanita usia subur yang terinfeksi TB paru mencari informasi akurat tentang penyakit TB dan mengikuti saran medis yang diberikan oleh profesional kesehatan.

... Allah berfirman dalam QS Al Baqarah/2: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahnya:

"Dan infakkanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuatlah kebajikan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Imad Zuhair Hafidz menafsirkan ayat ini:

"Karena berperang di jalan Allah membutuhkan harta dan biaya, maka Allah memerintahkan untuk berinfak demi menolong agama Allah dan membantu perjuangan jihad di jalan-Nya. Dan Allah juga melarang dari membahayakan diri yang dapat menjerumuskan dalam kematian akibat kebakhilan dan keengganan berinfak sehingga melemahkan perjuangan jihad di jalan Allah. Maka berinfaklah dengan baik dan ikhlaslah dalam beramal, sungguh Allah Mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada diri sendiri dan umatnya".

Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang membahayakan diri sendiri. Dalam konteks tuberkulosis, ini dapat diartikan sebagai dorongan untuk menjaga kesehatan dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah penularan penyakit, termasuk

upaya seperti menjaga kebersihan, menghindari kontak dengan orang yang sakit, dan mencari pengobatan jika diperlukan (<https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-195.html>).

... Allah berfirman dalam QS Asy Syu'ara'/26: 80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

“Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku”

Dalam Tafsir Al-Misbah, M.Quraish Shihab menafsirkan ayat ini:

“Dan disamping itu apabila aku memakan dan meminum makanan yang semestinya aku hindari atau melakukan kegiatan yang menjadikan aku sakit, maka hanya Dia pula Yang menyembuhkan aku sehingga kesehatanku kembali puli”

Pada ayat ini sakit dinisbatkan (disandarkan) kepada diri Ibrahim, padahal pada kenyataannya-Nya berasal dari takdir dan ketetapan-Nya, juga sebagai ciptaan-Nya namun sengaja disandarkan kepada diri Nabi Ibrahim sebagai etika dan santun kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim seolah mengatakan bahwa bila aku sakit, sesungguhnya tiada seorang pun selain-Nya yang dapat menyembuhkanku dengan berbagai macam sarana pengobatan apapun yang menjadi penyebab (Nurasih et al., 2023)

... Allah berfirman dalam QS Al Isra/17: 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Terjemahnya:

“Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian.”

Al Qur'an sebagai penawar atau obat untuk penyakit. Al Qurthubi dengan tegas menyatakan bahwa ada banyak pendapat tentang penafsiran kata syifa dalam ayat tersebut. Pendapat pertama adalah bahwa Al-Qur'an dapat membantu jiwa orang yang mengalami keraguan. Selain itu, Al-Qur'an membuka jiwa yang tertutup dan menyembuhkan jiwa yang rapuh. Membaca Al-Qur'an juga dapat digunakan sebagai terapi untuk menyembuhkan penyakit fisik. Ibnu Qayyim al Jauziyah juga mengatakan bahwa membaca Alqur'an dapat menyembuhkan penyakit fisik dan mental (Dani Suryaningrat et al., 2023).

Menurut riwayat Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda :

“Barangsiapa sakit lalu dia merasa tidak sanggup untuk berpuasa, maka hendaklah dia berbuka. Tidak dibolehkan seseorang untuk berpuasa sedangkan dia sakit,” (HR. Bukhari dan Muslim).


Hadis ini menjelaskan bahwa kesehatan seseorang diutamakan dalam Islam, dan tidak dianjurkan untuk berpuasa jika kesehatannya tidak memungkinkan. Hadis ini menekankan pentingnya memperhatikan kondisi kesehatan dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesehatan diri dan bayi yang dikandung, terutama bagi wanita usia subur yang mungkin menderita tuberkulosis atau penyakit kesehatan lainnya.

Menurut riwayat Aisyah ra., Rasulullah saw. bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang tidak penuh kefakihan, karena memang tidak ada jalan keluar bagi rahmat Allah itu dari sesuatu yang tercela” (HR. Bukhari dan Muslim).


Hadis ini menekankan bahwa Allah SWT menghendaki kesejahteraan dan kesehatan bagi hamba-Nya. Oleh karena itu, orang-orang beragama Islam dianjurkan untuk mencari pengobatan dan perawatan medis yang diperlukan saat mereka sakit karena mereka percaya bahwa rahmat dan kasih sayang Allah akan membimbing dan menyembuhkan mereka.

E. Kerangka Teori



Bagan 2.1 Kerangka Teori

F. Kerangka Konsep



Keterangan:

 : Variabel independen yang diteliti

 : Variabel independen yang tidak diteliti

 : Hubungan yang diteliti

 : Hubungan yang tidak diteliti

 : Variabel dependen

Bagan 2. 2 Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Etika Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan *ethical clearance* maka peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti:

1. Membawa surat pengantar kepada pihak terkait sebagai bentuk permohonan izin untuk melakukan penelitian.
2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian dengan tidak mencantumkan identitas lengkap subjek saat proses pengambilan data. Peneliti bisa menggunakan inisial sebagai pengganti identitas lengkap subjek.
3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek penelitian dalam pengambilan data.
4. Memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Data penelitian ini adalah pasien dari Januari sampai Desember tahun 2023 di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan cross-sectional yaitu data variabel independen dan dependen dikumpulkan secara bersamaan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita usia subur dengan TB paru yang berada di wilayah kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. Jumlah kelompok kasus pada bulan januari-desember tahun 2023 sebanyak 3.063 kasus.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau perwakilan yang memiliki karakteristik representasi dari populasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional*, yaitu wanita usia subur dengan TB paru di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. Besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang sudah ditentukan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{3063}{1 + 3063 \times 0,05^2} \\ &= 353,797 \text{ dibulatkan } 354 \end{aligned}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel minimal

N : jumlah sampel populasi

e : persentase batas toleransi (error margin)

Dari hasil tersebut, didapatkan jumlah sampel minimal pada penelitian ini sebanyak 354 kasus TB Paru.

Adapun kriteria inklusi dan eklusi pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi

- 1) Wanita usia 15-45 tahun.
- 3) Wanita usia subur jika memiliki riwayat penyakit DM.
- 4) Wanita usia subur jika memiliki riwayat penyakit HIV.
- 5) Terdiagnosis TB paru kasus baru.
- 6) Memiliki data lengkap yang tercatat di rekam medis.

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Wanita usia subur dibawah usia 15 tahun dan diatas 45 tahun.
- 2) Terdiagnosis TB paru kasus lama.
- 3) Data rekam medis tidak lengkap.

Pengambilan data menggunakan data sekunder, yaitu dilakukan dengan rekam medis sesuai dengan kriteria inklusi.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan sampel menggunakan data sekunder, yaitu dilakukan dengan mencatat variabel yang dibutuhkan dalam rekam medis pasien TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan paru Masyarakat Makassar.

F. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang kemudian dianalisis dengan menggunakan prosedur analisis observasional

dengan pendekatan cross-sectional yaitu data variabel independen dan dependen dikumpulkan secara bersamaan.

G. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel yang terikat dalam penelitian ini adalah TB paru pada wanita usia subur.

2. Variabel Independen

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (variabel dependen) atau menjadi sebab berubah atau munculnya variabel terikat (variabel dependen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a. Faktor Individu

- 1) Pekerjaan
- 2) Pendidikan
- 3) Status Gizi
- 4) Riwayat BCG
- 5) Riwayat Kontak TB
- 6) Riwayat Merokok

b. Faktor Penyakit Penyerta

- (1) Diabetes Melitus
- (2) HIV

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekam medis untuk mengukur variabel dependen dan variabel independen.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Tahap pengolahan data yang pertama adalah pemeriksaan data observasi. Peneliti harus meninjau informasi riwayat kesehatan untuk kelengkapan, keakuratan, dan kejelasan.

b. Coding

Tahap coding adalah kegiatan merubah data yang berbentuk huruf menjadi angka atau bilangan. Tahap ini akan memberikan kode terhadap catatan observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah mempermudah pengolahan data.

c. Tabulating

Tahap tabulating adalah tahap untuk mempersiapkan informasi yang telah diperoleh peneliti untuk diolah dengan merancang tabel analisis.

1) Processing

Pada tahap ini semua data yang telah ditabulasi akan diproses untuk dianalisis. Processing dilakukan dengan cara memasukkan hasil tabulasi ke dalam *Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS).


2) Cleaning

Tahap cleaning adalah kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan *Software Statistical Program for Social Sciences* (SPSS). Data yang diperoleh akan dilakukan analisis univariat untuk menjelaskan karakteristik dari sampel, analisis bivariat dengan uji *Chi-Square* untuk melihat hubungan variabel dependen dan independen, serta analisis multivariat dengan uji regresi logistik untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

J. Alur Penelitian



Bagan 3. 1 Kerangka alur penelitian

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar dari bulan Juni 2024 sampai Juli 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita usia subur dengan TB paru yang berada di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar bulan Januari sampai bulan Desember 2023 yang tercatat sejumlah 3.063 orang. Adapun untuk sampel penelitian yang sesuai kriteria inklusi yang telah ditetapkan diperoleh dengan menggunakan rumus slovin diperoleh total sampel adalah 354 data. Desain penelitian yang digunakan yaitu analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini menganalisis faktor risiko TB Paru yaitu pendidikan, pekerjaan, status gizi, riwayat BCG, riwayat merokok, riwayat DM, dan riwayat HIV terhadap wanita usia subur. Dari hasil penelitian didapatkan karakteristik sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Umur		
Remaja 15-25 tahun	138	39.0
Dewasa 26-45 tahun	216	61.0
Total	354	100

Sumber : Data Sekunder 2023

Analisis data dalam penelitian menggunakan aplikasi SPSS yang diuji dengan analisis univariat, uji bivariat dan uji multivariat. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian berikut dibawah ini:

1. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi frekuensi masing-masing variabel dalam penelitian. Adapun hasil analisis univariat dari variabel penelitian ini maka dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini :

a. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Dependen

Tabel 4. 2 TB Paru

Kategori	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Bakteriologis	242	68.4
Klinis	112	31.6
Total	354	100

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebanyak 68,4% responden yang terdiagnosis TB paru bakteriologis, sedangkan sebanyak 31,6% yang terdiagnosis TB paru klinis.

b. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Independen

Berikut dibawah ini merupakan variabel independen pada penelitian ini:

Tabel 4. 3 Pekerjaan

Kategori	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Tidak Bekerja	183	51.7
Bekerja	171	48.3
Total	354	100

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan sebanyak 51.7% responden yang tidak bekerja sedangkan sebanyak 48,3% responden yang bekerja.

Tabel 4. 4 Pendidikan

Kategori	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Rendah (Tidak sekolah-SMP)	200	56,5
Tinggi (SMA-Sarjana)	154	43,5
Total	354	100

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan sebanyak 56,5% responden yang tingkat pendidikan rendah, sedangkan sebanyak 43,5% responden tingkat pendidikan tinggi.

Tabel 4. 5 Status Gizi

Kategori	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Underweight <18,5	246	69.5
Normal 18,5-22,9	102	28.8
Overweight 23-24,9	5	1.4
Obesitas 1 25-29,9	1	0.3
Total	354	100

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan sebanyak 69,5% responden yang mengalami gizi underweight, sebanyak 28,8% responden yang mengalami gizi normal, sebanyak 1,4% responden yang mengalami gizi overweight, sebanyak 0,3% responden yang mengalami gizi obesitas 1.

Tabel 4. 6 Riwayat BCG

Kategori	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Tidak	218	61.6
Iya	136	38.4
Total	354	100

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan sebanyak 61,6% responden yang tidak memiliki riwayat imunisasi BCG, sedangkan sebanyak 38,4% responden yang memiliki riwayat imunisasi BCG.

Tabel 4. 7 Riwayat Kontak TB

Kategori	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Iya	280	79.1
Tidak	74	20.9
Total	354	100

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan sebanyak 79,1% responden yang memiliki riwayat kontak TB, sedangkan sebanyak 20,9% responden yang tidak memiliki riwayat kontak TB.

Tabel 4. 8 Riwayat Merokok

Kategori	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Tidak	283	79.9
Iya	71	20.1
Total	354	100

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan sebanyak 79,9% responden yang tidak memiliki riwayat merokok, sedangkan sebanyak 20,1% responden yang memiliki riwayat merokok.

Tabel 4. 9 Riwayat DM

Kategori	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Iya	232	65.5
Tidak	122	34.5
Total	354	100

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan sebanyak 65,5% responden yang memiliki riwayat DM, sedangkan sebanyak 34,5% responden yang tidak memiliki riwayat DM.

Tabel 4. 10 Riwayat HIV

Kategori	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Tidak	233	65.8
Iya	121	34.2
Total	354	100

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan sebanyak 65,8% responden yang tidak memiliki riwayat HIV, sedangkan sebanyak 34,2% responden yang memiliki riwayat HIV.

2. Analisis Bivariat

Uji analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu pekerjaan, pendidikan, status gizi, riwayat BCG, riwayat kontak TB, riwayat merokok, riwayat DM, dan riwayat HIV. Adapun hubungan antara variabel independen dengan TB Paru pada Wanita usia subur terlampir pada tabel berikut :

Tabel 4. 11 Analisis Hubungan Pekerjaan dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023

Pekerjaan	TB Paru				Total	<i>p-value</i>	
	Bakteriologis		Klinis				
	N	%	N	%			
Tidak Bekerja	111	31.4	72	20.3	183	51.7	0,001
Bekerja	131	37.0	40	11.3	171	48.3	
Total	242	68.4	112	31.6	354	100	

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan hasil analisis *chi-square* mendapatkan nilai *p-value* sebesar 0,001 sehingga nilai $p < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pekerjaan terhadap TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, sehingga hasil penelitian signifikan.

Tabel 4. 12 Analisis Hubungan Pendidikan dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023

Pendidikan	TB Paru				Total	<i>p-value</i>	
	Bakteriologis		Klinis				
	N	%	N	%	N		%
Rendah (Tidak Sekolah-SMP)	140	39.5	80	16.9	200	56.5	0,450
Tinggi (SMA-Perguruan Tinggi)	102	28.8	52	14.7	154	43.5	
Total	242	68.4	112	31.6	354	100	

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan hasil analisis *chi-square* mendapatkan nilai *p-value* sebesar 0,450 sehingga nilai $p > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pendidikan terhadap TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, sehingga hasil penelitian tidak signifikan.

Tabel 4. 13 Analisis Hubungan Status Gizi dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023

Status Gizi	TB Paru				Total	<i>p-value</i>	
	Bakteriologis		Klinis				
	N	%	N	%	N	%	
Underweight	172	48.6	74	20.9	246	69.5	0,559
Normal	65	18.4	37	10.5	102	28.8	
Overweight	4	1.1	1	0.3	5	1.4	
Obesitas 1	1	0.3	0	0.0	1	0.3	
Total	242	68.4	112	31.6	354	100	

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil analisis *chi-square* mendapatkan nilai *p-value* sebesar 0,559 sehingga nilai $p > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan status gizi terhadap TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, hasil penelitian tidak signifikan.

Tabel 4. 14 Analisis Hubungan Riwayat BCG dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023

Riwayat BCG	TB Paru				Total	<i>p-value</i>	
	Bakteriologis		Klinis				
	N	%	N	%	N	%	
Tidak	140	39.5	78	22.0	218	61.6	0,034
Iya	102	28.8	34	9.6	136	38.4	
Total	242	68.4	112	31.6	354	100	

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan hasil analisis *chi-square* mendapatkan nilai *p-value* sebesar 0,034 sehingga nilai $p < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan riwayat BCG terhadap TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, sehingga hasil penelitian signifikan.

Tabel 4. 15 Analisis Hubungan Riwayat Kontak TB dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023

Riwayat Kontak TB	TB Paru				Total	<i>p-value</i>	
	Bakteriologis		Klinis				
	N	%	N	%			
Iya	111	31.4	70	19.8	181	51.1	0,004
Tidak	131	37.0	42	11.9	173	48.9	
Total	242	68.4	112	31.6	354	100	

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan hasil analisis *chi-square* mendapatkan nilai *p-value* sebesar 0,004 sehingga nilai $p < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan riwayat kontak TB terhadap TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, sehingga hasil penelitian signifikan.

Tabel 4. 16 Analisis Hubungan Riwayat Merokok dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023

Riwayat Merokok	TB Paru				Total	<i>p-value</i>	
	Bakteriologis		Klinis				
	N	%	N	%			
Tidak	184	52.0	95	27.1	280	79.1	0,037
Iya	58	16.4	16	4.5	74	20.9	
Total	242	68.4	112	31.6	354	100	

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan hasil analisis *chi-square* mendapatkan nilai *p-value* sebesar 0,037 sehingga nilai $p < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan riwayat merokok terhadap TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, sehingga hasil penelitian signifikan.

Tabel 4. 17 Analisis Hubungan Riwayat DM dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023

Riwayat DM	TB Paru				Total	<i>p-value</i>	
	Bakteriologis		Klinis				
	N	%	N	%	N	%	
Iya	147	41.5	85	24.0	232	65.5	0,005
Tidak	95	26.8	27	7.6	122	34.5	
Total	242	68.4	112	31.6	354	100	

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan hasil analisis *chi-square* mendapatkan nilai *p-value* sebesar 0,005 sehingga nilai $p < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan DM terhadap TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, sehingga hasil penelitian signifikan.

Tabel 4. 18 Analisis Hubungan Riwayat HIV dengan TB Paru pada Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023

Riwayat HIV	TB Paru				Total	<i>p-value</i>	
	Bakteriologis		Klinis				
	N	%	N	%	N	%	
Tidak	170	48.0	63	17.8	233	65.8	0,010
Iya	72	20.3	49	13.3	121	34.2	
Total	242	68.4	112	31.6	354	100	

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan hasil analisis *chi-square* mendapatkan nilai *p-value* sebesar 0,010 sehingga nilai $p < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan riwayat HIV terhadap TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, sehingga hasil penelitian signifikan.

3. Analisis Multivariat

Hasil analisis multivariat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian TB paru dengan menggunakan uji regresi logistik.

Tabel 4. 19 Hasil Seleksi Kandidat Uji Regresi Logistik

No	Variabel	<i>p-value</i>	Keterangan
1	Pekerjaan	0,001	Kandidat
2	Pendidikan	0,450	Bukan Kandidat
3	Status Gizi	0,559	Bukan kandidat
4	Riwayat BCG	0,034	Kandidat
5	Riwayat Kontak TB	0,004	Kandidat
6	Riwayat Merokok	0,037	Kandidat
7	Riwayat DM	0,005	Kandidat
8	Riwayat HIV	0,010	Kandidat

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.19 Setelah diseleksi terdapat 6 variabel yang merupakan kandidat untuk dilakukan uji regresi logistik. Sedangkan ada 2 variabel yang dengan (*p-value* >0,25) yaitu variabel pendidikan dengan nilai (*p-value* 0,450) dan variabel status gizi dengan nilai (*p-value* 0,559), sehingga variabel pendidikan dan status gizi tidak disertakan untuk uji regresi logistik.

Tabel 4. 20 Hasil Analisis Multivariat Uji Regresi Logistik

Variabel	<i>p-value</i>	OR	CI 95%
Pekerjaan	0,009	0.523	0.321-0.852
Riwayat BCG	0,297	1.427	0.731-2.786
Riwayat Kontak TB	0.102	1.716	0.898-3.279
Riwayat Merokok	0.030	2.011	1.071-3.775
Riwayat DM	0,012	2.267	1.195-4.301
Riwayat HIV	0,936	1.026	0.545-1.933
Nagelkerke R-square	0,121	-	-

Sumber : Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel 4.20 hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa terdapat 3 variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap TB paru

pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar tahun 2023 dengan nilai $p\text{-value} < 0,05$. Variabel yang signifikan yaitu pekerjaan nilai ($p\text{-value} 0,009$), riwayat merokok dengan nilai ($p\text{-value} 0,030$), dan riwayat DM dengan nilai ($p\text{-value} 0,012$).

Berdasarkan nilai nagelkerke R square menunjukkan nilai sebesar 0,121 maka berkesimpulan sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan) sebesar 12,1%.

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa faktor-faktor yang berisiko terhadap TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar berdasarkan nilai ($OR > 1,5$) signifikan yaitu riwayat kontak TB, riwayat merokok dan riwayat DM.

Riwayat Kontak TB

Penelitian ini membuktikan bahwa orang yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TB mempunyai OR 1,716 kali berisiko mengidap TB paru dibandingkan orang yang tidak memiliki riwayat kontak TB. Hal ini sesuai dengan teori yang didapatkan bahwa orang-orang yang tinggal serumah dengan penderita TB memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak pernah melakukan kontak dengan penderita. Akibat penggunaan ruang udara yang sama dalam satu rumah, risiko untuk kuman TB meningkat pada orang yang memiliki riwayat kontak serumah. (Indrawati et al., 2023)

Ada seorang penderita TB dalam keluarga yang dapat menularkan kuman TB ke orang lain disebut riwayat pajanan TB. Mekanisme penularan TB sangat dipengaruhi oleh riwayat kontak keluarga, terutama dalam keluarga yang tinggal serumah atau bertetangga dan sering berinteraksi dengan

penderita TB. Dalam suatu keluarga, jika salah satu anggota tertular TB, anggota keluarga yang lain juga berisiko tertular dan lebih berbahaya lagi jika perilaku tidak sehat dari pengidap TB mendukungnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anti syafriyanti dkk. (2023) terkait analisis faktor risiko TB paru pada Ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan bahwa nilai *p-value* $(0,012) < 0,05$, disimpulkan bahwa terdapat hubungan faktor risiko kontak erat TB dengan TB paru di Puskesmas Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. (Syafriyanti et al., 2023) Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Alwa Ayu Azzahra dkk yang menunjukkan adanya hubungan antara riwayat kontak dengan TB paru diperoleh nilai OR 6,02 kali berisiko terkena TB paru. (Alwa Ayu Azzahra et al., 2024)

Riwayat Merokok

Pada penelitian ini, orang yang tidak merokok mempunyai OR 2,011 kali berisiko mengidap TB paru dibandingkan orang yang merokok. Dalam hal ini pada penelitian ini mungkin karena responden adalah wanita sehingga lebih banyak yang tidak merokok. Namun, kemungkinan bisa saja terpapar asap rokok di lingkungan sekitarnya. Pada teori didapatkan bahwa akibat perilaku yang berkaitan dengan merokok dapat berkontribusi pada risiko terkena TB dikarenakan dapat menutupi sistem pernapasan dan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan, membuat individu lebih rentan terhadap infeksi TB. Perokok berat maupun yang terpapar, memiliki risiko lebih tinggi terkena TB karena merokok dapat merusak paru-paru dan membuatnya lebih rentan terhadap infeksi bakteri Mtb. (Febriyanti et al., 2024)

Merokok merupakan komponen penting yang dapat mengurangi daya tahan tubuh dan membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit. Asap

rokok memengaruhi sistem kekebalan saluran pernapasan dengan bertindak sebagai immunosupresif (menekan fungsi sistem kekebalan) dan pro-inflamasi (sejenis molekul persinyalan yang diproduksi oleh sel-sel kekebalan). Merokok juga dapat meningkatkan risiko tertular *Mycobacterium tuberculosis*, perkembangan penyakit, dan kematian penderita TB. Merokok umumnya dianggap sebagai faktor risiko dari berbagai penyakit. Sekitar 1.500 bahan kimiawi terkandung dalam rokok, yang merupakan produk industri dan komoditi global. Ada tar, nikotin, benzopyrin, metilklorida, aseton, amoniak, dan karbon monoksida. (Nita et al., 2023)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Eni sari dan Elina (2021) terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Talang Pangeran kecamatan Pemulutan Barat kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 hasil uji statistik diperoleh nilai $p\text{-value } (0,000) < \alpha (0,05)$, maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan faktor risiko riwayat merokok dengan TB paru (Elina & Eni Sari, 2021). Penelitian ini didukung oleh penelitian Sri Handayani, Musfirah, dan Apriana (2024) terkait determinan kejadian tuberkulosis paru pada pasien rawat jalan di RSUD Daya Kota Makassar hasil penelitian diperoleh uji statistik $p\text{-value } 0,003 > 0,05$ yang artinya ada hubungan riwayat merokok dengan kejadian TB paru (Handayani et al., 2024). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Andriyanto dkk (2024) yang hasil penelitian diperoleh terdapat 71.4% responden yang tidak merokok yang menderita TB paru dengan nilai $p\text{-value } (0.505) > 0,05$ artinya tidak ditemukannya hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian TB Paru di Puskesmas Kota Datar dikarenakan responden perempuan dan bukan perokok.

Riwayat DM

Pada penelitian ini membuktikan bahwa orang yang DM mempunyai OR 2,267 berisiko mengidap TB paru dibandingkan orang yang tidak DM. Hal ini sesuai dengan teori yang didapatkan bahwa hiperglikimia (peningkatan gula darah) meningkat pada penderita DM dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ dan menurunkan aktivitas sistem imun. Penyakit penyerta biasanya bersifat kronis atau menahun, dan kombinasi penyakit biasanya beragam seperti DM dan penyakit lainnya. Riwayat DM adalah salah satu faktor risiko penyakit TB paru, yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap bakteri TB paru atau memperpanjang waktu pengobatan TB. (Jannah et al., 2024) DM dapat membuat immunitas penderita terganggu dan akan menjadi faktor resiko infeksi seperti TB. Pasien yang tidak dapat mengontrol baik kadar glukosa darahnya bisa menjadi predisposisi TB. Penderita DM juga bisa menjadi resiko kegagalan dalam pengobatan terapi TB dibandingkan dengan pasien yang bukan penderita DM. (Nur et al., 2022)

Pada penelitian ini didapatkan nilai *p-value* sebesar $0,005 < 0,05$ yang artinya ada hubungan riwayat DM dengan TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Tahun 2023. Penelitian ini sejalan oleh penelitian Khairun Nisak dkk (2024) terkait faktor risiko kejadian tuberkulosis (TB) Paru di wilayah kerja Puskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Hasil uji statistik dengan nilai *p-value* sebesar 0,020 ($p < 0,05$) yang artinya ada hubungan riwayat komorbid dalam hal ini DM dengan TB paru. (Nisak et al., 2024)

Disisi lain variabel pekerjaan, riwayat BCG, dan riwayat HIV tidak terbukti berisiko terhadap TB paru pada wanita usia subur. Adanya perbedaan hasil penelitian terhadap teori diduga karena terbatasnya data sehingga

pengkategorian kelompok dalam variabel kurang spesifik sebagai faktor risiko TB paru.

Pekerjaan

Pada penelitian ini, diperoleh bahwa nilai OR 0,523 kali berisiko untuk mengidap TB paru. Berdasarkan teori yang didapatkan bahwa TB terjadi karena jenis pekerjaan berkaitan dengan sosial ekonomi atau berhubungan dengan penghasilan yang didapat. Penderita TB paru yang berkerja dan mempunyai sosial ekonomi yang stabil akan mengupayakan mencari pengobatan yang cepat dan memenuhi asupan gizi yang baik, sebaliknya penderita TB yang ekonominya rendah cenderung akan kesulitan mendapatkan pengobatan dan memenuhi gizi dan asupan gizi yang buruk.(Assriyah et al., 2020; Crofton et al., 2009; Widiati & Majdi, 2021).

Namun, penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan pekerjaan terhadap TB pada wanita usia subur dengan nilai *p-value* $0,001 < 0,05$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nizam Ismail dkk (2023) terkait determinan faktor terjadinya Multidrug Resistant pada Pengobatan TB Paru (MDR-TB) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Hasil uji statistik diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,036 ($p < 0,05$) yang artinya ada hubungan pekerjaan dengan kejadian TB paru. Penelitian lain yang juga sejalan oleh penelitian ini yaitu penelitian Annisa Febriana Siregar dkk (2015) yang menyatakan bahwa penderita TB yang tidak bekerja berisiko 0,934 kali mengalami TB paru (Siregar, 2015). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Suci Fanesa Febrilia dkk (2022) terkait hubungan faktor manusia dan lingkungan rumah terhadap kejadian tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru yang diperoleh hasil uji statistik *p-value* sebesar 0,342 ($p > 0,05$) yang artinya tidak ada hubungan pekerjaan dengan

kejadian TB paru di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru. (Febrilia et al., 2022; Putriningrum, 2012)

Riwayat BCG

Hasil penelitian ini juga membuktikan pengaruh riwayat BCG terhadap TB paru pada wanita usia subur, dimana orang yang tidak pernah imunisasi BCG mempunyai nilai OR 1,427 kali berisiko mengidap TB paru dibandingkan dengan yang pernah melakukan imunisasi BCG. Pada penelitian ini kurang membuktikan risiko riwayat BCG. Namun, berdasarkan teori bahwa TB salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan Program pengembangan imunisasi, dan imunisasi BCG yang diberikan kepada bayi yang berusia 0-2 bulan. Bayi yang berusia lebih dari 2 bulan harus diberikan vaksin BCG sebelum uji tuberkulin dilakukan untuk mengidentifikasi bayi yang mungkin terpapar *Mycobacterium tuberculosis*. Tujuan utama penggunaan BCG adalah untuk mencegah TB, tetapi selama lebih dari sembilan puluh tahun pemberian vaksin, penyelidikan menunjukkan bahwa keberhasilan vaksin menunjukkan berbagai hasil. Vaksinasi BCG melindungi anak-anak selama 10 tahun. Di seluruh dunia, tingkat kekurangan vaksin BCG berkisar antara 0 dan 80%. (Febrilia et al., 2022; Hasan et al., 2023)

Pada penelitian ini diperoleh nilai *p-value* $0,034 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa ada hubungan TB Paru pada wanita usia subur. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suci Fanesa Febrilia dkk. (2022) terkait hubungan faktor manusia dan lingkungan rumah terhadap kejadian tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru yang diperoleh hasil uji statistik *p-value* sebesar 0,018 ($p < 0,05$) yang artinya ada hubungan riwayat imunisasi BCG dengan kejadian TB paru di Puskesmas

Rejosari Kota Pekanbaru. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rosmawati, Sartika, dan Chaeruddin Hasan terkait faktor Risiko kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa Kota Makassar yang memperoleh hasil uji statistik $p\text{-value}$ $(1,000) > 0,05$ yang artinya tidak ada hubungan antara imunisasi BCG dengan kejadian TB paru.

Riwayat HIV

Pada penelitian ini diperoleh nilai OR 1,026 kali berisiko mengidap TB paru pada wanita usia subur. Hal ini masih kurang membuktikan risiko riwayat HIV pada TB paru pada penelitian ini. Berdasarkan teori bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi pasien TB adalah daya tahan tubuh yang rendah, diantaranya karena infeksi HIV/AIDS dan gizi buruk. Infeksi HIV mengakibatkan kerusakan luas sistem daya tahan tubuh seluler (*cellular immunity*), sehingga jika terjadi infeksi penyerta, seperti TB maka yang bersangkutan akan menjadi sakit parah bahkan bisa mengakibatkan kematian. Di Indonesia, infeksi oportunistik tersering adalah TB, infeksi *Mycobacterium tuberculosis* disebabkan oleh infeksi HIV. Sistem kekebalan tubuh bertanggung jawab untuk memerangi infeksi, dan ada hubungan antara kedua penyakit ini. Tubuh dapat dilemahkan oleh virus HIV, yang memungkinkan infeksi lain, seperti TB, masuk dengan mudah. (Jannah et al., 2024)

Penelitian ini didapatkan nilai $p\text{-value}$ sebesar $0,010 < 0,05$ yang artinya ada hubungan riwayat HIV dengan TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Tahun 2023. Penelitian ini sejalan oleh penelitian Khairun Nisak dkk (2024) terkait faktor risiko kejadian TB Paru di wilayah kerja Puskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Hasil uji

statistik dengan nilai *p-value* sebesar 0,020 ($p < 0,05$) yang artinya ada hubungan riwayat komorbid dalam hal ini HIV dengan TB paru.

Status Gizi

Pada penelitian ini tidak membuktikan adanya hubungan status gizi dengan TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar tahun 2023 karena hasil uji statistik diperoleh sebesar (*p-value* 0,559) $> 0,05$ yang artinya tidak signifikan. Berdasarkan teori bahwa orang yang memiliki gizi buruk berisiko terkena TB paru karena secara umum kekurangan gizi sangat mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang, respon imun yang melemah akan kesulitan melawan penyakit baik yang disebabkan karena virus, bakteri, jamur, dan parasit. Faktor ini penting bagi semua kalangan baik dewasa maupun anak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Anti syafriyanti dkk. (2023) terkait analisis faktor risiko TB paru pada Ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan bahwa Gizi buruk menyebabkan daya tahan tubuh yang kurang, sehingga menyebabkan penyakit TB paru lebih sering terjadi. Hasil penelitian diperoleh nilai *p-value* (0,006) $< \alpha$ (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa status gizi merupakan faktor risiko dari TB Paru (Syafriyanti et al., 2023). Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Alwa Ayu Azzahra dkk diperoleh bahwa terdapat hubungan status gizi dengan TB paru hasil *p-value* 0,000 dan nilai OR 5,84 kali kurang gizi terserang TB paru dibandingkan yang cukup gizi. (Alwa Ayu Azzahra et al., 2024)

Pendidikan

Pada penelitian ini tidak membuktikan adanya hubungan pendidikan dengan TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat Makassar tahun 2023 karena hasil uji statistik diperoleh sebesar ($p\text{-value } 0,450 > 0,05$) yang artinya tidak signifikan. Sehingga penelitian ini tidak sesuai teori yang didapatkan bahwa tingkat pendidikan juga berperan penting dalam penanggulangan TB. Mereka yang kurang pendidikan cenderung kurang memahami tentang TB, gejalanya, pencegahannya, dan pengobatannya. Mereka juga mungkin tidak menyadari pentingnya mendapatkan perawatan medis saat mengalami gejala TB atau tidak mampu membedakan tuberkulosis dengan penyakit lain. Pendidikan dan penyuluhan tentang TB dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tersebut. (Febriyanti et al., 2024)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suci Fanesa Febrilia dkk. (2022) terkait hubungan faktor manusia dan lingkungan rumah terhadap kejadian tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru yang diperoleh hasil uji statistik $p\text{-value}$ sebesar 0,817 ($p > 0,05$) yang artinya tidak ada hubungan pendidikan dengan kejadian TB paru di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru. (Febrilia et al., 2022)

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Naziyah dkk (2024) terkait Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit tuberkulosis paru di XYZ dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $p\text{-value}$ (0,017) $< 0,05$. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan kejadian TB paru. (Sopacuaperu et al., 2024). Pada penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Evi nopita dkk. terkait angka kejadian tuberkulosis paru. Hasil penelitian diperoleh nilai $p\text{-value}$ (0,013) $< 0,05$ yang artinya ada hubungan pendidikan dengan TB paru. (Nopita et al., 2023)

Penyakit dapat berasal dari berbagai jenis seperti virus, bakteri, jamur, dan lainnya. Ada jenis yang menular dan tidak menular. Penyakit menular, juga dikenal sebagai penyakit infeksi, disebabkan oleh agen biologis seperti virus, bakteri, atau parasit. Penyakit menular tidak disebabkan faktor fisik seperti luka bakar atau kimia seperti keracunan.

Dalam agama Islam, orang-orang yang memeluknya diajarkan untuk melakukan sesuatu, bukan hanya menunggu nasib atau takdir. Jika Anda percaya bahwa Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang soleh, Anda harus bergerak maju dan menghindari ancaman. Di antara mereka, bantuan Allah datang melalui upaya hamba-Nya. Dalam hal ini yang dimaksud menghindari penyakit TB Paru.

Salah satu contoh tindakan hamba-hamba Allah yang saleh dan pasti dicintai oleh-Nya adalah hijrahnya Nabi dari Mekah untuk menghindari kekerasan kafir Quraisy, hijrahnya Nabi Musa dari Mesir untuk menghindari kekerasan Firaun, dan penghijrahan Umar bin al-Khattab dari wilayah yang sedang banjir.

... Allah berfirman dalam QS Ar Rad/13 : 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
 حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ يَوْمَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ
 ؕ وَالِ

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Dalam Tafsir Ash-Shaghir oleh Abdullah bin Abdul Aziz al-'Awaji

menafsirkan ayat ini :

“Baginya ada yang menyertainya secara bergiliran, bagi seorang hamba ada beberapa malaikat yang saling bergiliran dari depan dan belakang yang menjaganya atas perintah Allah, dari sesuatu yang bisa membinasakannya sampai datang ajalnya lalu mereka tidak menjaganya lagi. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki terhadap suatu kaum keburukan, azab dan kehancuran maka tidak ada yang dapat menolaknya, tidak ada yang bisa menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia pelindung yang melindungi perkara mereka dan mencegah dari azab yang menimpa mereka. (<https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad-ayat-11.html>)

Al-Qur'an menjelaskan bahwa penyakit dapat menyebar ke tempat lain atau orang lain, tetapi tidak secara khusus, seperti dalam kisah prajurit Fir'aun yang meminta bantuan Nabi Musa karena mendapatkan bencana dari Allah

SWT:

“Maka Kami mengirimkan kepada mereka angin topan dan belalang dan kutu-kutu dan kodok-kodok dan darah, sebagai bukti yang terpisah-pisah; tapi mereka menyombong juga; dan adalah mereka itu kaum yang durhaka. Dan tatkala telah menimpa mereka bencana itu, mereka berkata: ‘Wahai Musa! Doakanlah kami kepada Tuhanmu, dengan apa yang telah menjanjikannya kepadamu. Sesungguhnya jika engkau telah melepaskan kami dari bencana itu, sungguh kami akan percaya kepadamu, dan kami akan serahkan bersama engkau Bani Israil”

Menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsirnya, “Berturut-turut datang lima bencana lagi menimpa negeri mereka, datang dari kekuasaan Allah yang tidak dapat ditangkis oleh kekuasaan Fir'aun.” Mula-mula terjadi badai. Satu riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa hujan yang sangat lebat turun, menyebabkan banjir, yang menghancurkan semua tanaman dan meninggalkan penyakit Tho'un dan Kolera yang menyebabkan banyak orang meninggal. Seperti disebutkan dalam al-Qur'an, penyakit atau virus adalah sarana Allah SWT untuk menguji hamba-hambanya di dunia.

... Allah berfirman dalam QS At Taubah/9 : 51

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥١

Terjemahnya :

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal”.

Dalam Tafsir Misbah, Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini “Seorang mukmin harus bertawakkal, berserah diri setelah upaya terbaik karena mereka tahu bahwa apapun keputusan Allah pasti baik bagi mereka, apakah mereka bersyukur atau bersabar. Selanjutnya dikatakan bahwa Allah adalah satu-satunya pelindung kami yang selalu dekat dengan kami sehingga Dia dengan mudah menampik keburukan atas kami.” (Ruslan, 2023)

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan data sekunder berupa rekam medis sehingga data yang dicari sesuai kriteria inklusi biasanya tidak lengkap. Kemudian lokasi penelitian ini hanya mencakup di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar sehingga variabel yang diteliti masih kurang beragam. Dan Variabel penelitian ini hanya mencakup beberapa faktor risiko TB Paru pada Wanita usia subur diantaranya pendidikan, pekerjaan, status gizi, riwayat BCG, riwayat kontak TB, riwayat merokok, riwayat DM, dan riwayat HIV sehingga hasil yang diperoleh pada penelitian ini tidak mencakup keseluruhan faktor risiko terhadap TB paru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang faktor risiko TB paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar dapat disimpulkan ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan, riwayat BCG, riwayat kontak TB, riwayat merokok, riwayat DM, dan riwayat HIV dengan TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar tahun 2023. Sedangkan tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan, dan status gizi dengan TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa faktor risiko yang diteliti paling berpengaruh dengan TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar tahun 2023 yaitu riwayat DM, riwayat merokok, dan riwayat kontak TB. Adanya perbedaan hasil penelitian terhadap teori diduga karena terbatasnya data sehingga pengkategorian kelompok dalam variabel kurang spesifik sebagai faktor risiko TB paru.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

- a. Memperhatikan faktor risiko yang dapat meningkatkan TB paru khususnya pada wanita usia subur sehingga dapat dilakukan pencegahan lebih awal.
- b. Meningkatkan penghasilan keluarga dengan mencari atau menambah pekerjaan.
- c. Memberikan imunisasi BCG terhadap anak di usia 0-2 bulan.
- d. Makan makanan yang bergizi untuk memiliki status gizi yang baik dan seimbang.
- e. Menjaga kebersihan lingkungan baik rumah maupun luar rumah.
- f. Mengindari merokok ataupun paparan asap rokok.
- g. Melakukan pencegahan sedini mungkin dengan skrining jika memiliki gejala yang mengarah terhadap TB dengan cepat dan tepat ataupun skrining untuk pencegahan penyakit penyerta seperti DM dan HIV

2. Bagi Tenaga Kesehatan

- a. Petugas kesehatan diharapkan dapat mengenali faktor risiko TB paru serta melakukan usaha untuk mencegah hal tersebut serta melakukan pemeriksaan jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan faktor risiko TB paru.
- b. Petugas kesehatan diharapkan dapat mengisi rekam medik secara lengkap khususnya pada kasus TB paru serta dapat menggali lebih lengkap informasi pasien melalui anamnesis lebih mendalam dan mengisi pada rekam medik pasien untuk

mendiagnosis dengan tepat, kebutuhan kesehatan dan penelitian.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan TB paru pada wanita usia subur.
- b. Dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel yang dapat menjadi faktor risiko TB yang dapat diteliti serta dapat menggunakan data primer agar lebih memperluas informasi terkait faktor risiko TB paru pada wanita usia subur.
- c. Dapat melakukan penelitian di puskesmas, rumah sakit lainnya ataupun fasilitas kesehatan lain yang berhubungan dengan TB paru pada wanita usia subur.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim.

- Alwa Ayu Azzahra, Achmad Farich, Khoidar Amirus, Nurhalina Sari, and Agung Aji Perdana. (2024). Pengaruh Status Gizi, Keterpaparan Rokok Dan Riwayat Kontak Serumah Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Kedaton Bandar Lampung. *Professional Health Journal*, 5(2), 654–670. <https://doi.org/10.54832/phj.v5i2.719>
- Assriyah, H., Indriasari, R., Hidayanti, H., Thaha, A. R., and Jafar, N. (2020). Hubungan Pengetahuan, Sikap, Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Psikologis, Dan Inisiasi Menyusui Dini Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di Puskesmas Sudiang. *Jurnal Gizi Masyarakat Indonesia: The Journal of Indonesian Community Nutrition*, 9(1), 30–38. <https://doi.org/10.30597/jgmi.v9i1.10156>
- Ayu Anggraini, S. H. S. (2023). Penatalaksanaan Holistik Lansia Usia 68 Tahun Dengan Tuberculosis Paru Dengan Prinsip Pendekatan Kedokteran Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Wat Kandis. *Jurnal Medika Hutama*, 05(01), 3680–3693.
- Chanpho, P., Chaiear, N., and Kamsa-Ard, S. (2020). Factors associated with latent tuberculosis infection among the hospital employees in a tertiary hospital of Northeastern Thailand. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), 1–12. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186876>
- Crofton, J., Horne, N., and Miller, F. (2009). Crofton's Clinical Tuberculosis. In *Hongkong, Mc.Millan Education*. http://www.tbrieder.org/publications/books_english/crofton_clinical.pdf
- Dani Suryaningrat, Achmad Abubakar, Hasyim Haddade Farmasi, A., Pontianak, Y., Islam, U., Alauddin, N. (2023). Pandangan al- qur'an terhadap penggunaan obat dalam pengobatan penyakit. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(No. 1, April), 394–404.
- Dias, V. L., and Storrer, K. M. (2022). Prevalence of latent tuberculosis infection among patients with interstitial lung disease requiring immunosuppression. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, 48(2), 1–2. <https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20210382>
- dr. A. Arif Junaedi. (2022). Penatalaksanaan TB Paru. *Beji, Uobf Puskesmas Pasuruan, Kabupaten*, 1–7.
- Dzakiyah, R. N., Karima, U. Q., Simanjorang, C., and Apriningsih. (2023). Determinan Kejadian Tuberkulosis Paru pada Usia Dewasa di Wilayah Kerja Puskesmas Parungpanjang, Kabupaten Bogor Nurul Dzakiyah. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 14(September), 603–608.
- Elina, & Sari, E. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian

- Tuberkulosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Talang Pangeran Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Bina Husada*, 13(2), 55–61.
- Emir Yusuf Muhammad. (2019). Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Kejadian Tuberkulosis Paru. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2), 288–291. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.173>
- Febriana, S. F., Lapau, B., Zaman, K., Mitra, M., and Rustam, M. (2022). Hubungan Faktor Manusia dan Lingkungan Rumah Terhadap Kejadian Tuberkulosis di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(3), 436–442. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol8.iss3.618>
- Febriyanti, A., Laila, I., and Azzahra, R. (2024). Analisis Faktor-Faktor Risiko Penularan Tuberkulosis di Indonesia. *Seroja Husada Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(2), 194–201. <https://doi.org/10.572349/husada.v1i1.363>
- Filia, S. R. (2023). *Infeksi Laten Tuberculosis (ITBL) Pada Kontak Rumah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Puskesmas Lalang dan Puskesmas Ilevilvetia Medan. september 2023*, 1–24.
- Fitria, P. A., Rita, E., Ilmu, F., Universitas, K., Jakarta, M. (2021). Karakteristik Skrining Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tuberculosis (TB) Paru Pada Anak. *Indonesian Journal of Nursing Sciences and Practices*, 4(2), 85–92.
- Hamzani, Y. M., Maharani, B. F., and Program, P. S. (2022). Relationship of Knowledge With Drug Compliance In Tuberculosis (Pulmonary TB) Patients In RSUD DR. R. Soedjono Selong. *Journal of Public Health and Medical Studies*, 1(1), 55–72.
- Handayani, S., Musfirah, and Apriana. (2024). Determinan Kejadian Tuberkulosis Paru pada Pasien Rawat Jalan di RSUD Daya Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 6(1), 45–54.
- Hasan, C., Rosmawati, and Sartika. (2023). Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Kaluku Bodoa Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 4(6), 1028–1040.
- Indrawati, Yusran, S., and Sudayana, I. P. (2023). Analisis Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis Paru Bakteri Tahan Asam Positif Di Wilayah Kabupaten Buton Utara. *Nursing Sciences Journal*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.30737/nsj.v7i1.4149>
- Jannah, M., Wahyudi, A., Suryani, L., and Anggreny, D. E. (2024). Analisis Faktor Risiko Tuberkulosis Paru di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Analysis of Pulmonary Tuberculosis Risk Factors in UPTD Lubuk Batang Community Health Center , Ogan Komering Ulu in 2024. *BALABA*, 20(1), 39–49.
- Kemendes RI. (2020). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberculosis*.
- Kemendes RI. (2023). *Profil kesehatan Indonesia 2019*. 2(3), 1–4.
- M. Rizal Fahlahi, Said Usman, and Nizam Ismail. (2023). Determinan Faktor Terjadinya Multidrug Resistant pada Pengobatan TB Paru (MDR-TB) di

- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(1), 33–42.
<https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v2i1.1245>
- MacEda, E. B., Gonçalves, C. C. M., Andrews, J. R., Ko, A. I., Yeckel, C. W., and Croda, J. (2018). Serum Vitamin D levels and risk of prevalent tuberculosis, incident tuberculosis and tuberculin skin test conversion among prisoners. *Scientific Reports*, 8(1), 1–9.
<https://doi.org/10.1038/s41598-018-19589-3>
- Maqfirah. (2018). Faktor Risiko TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep Tahun 2017. *Skripsi*, 1–26.
- Nirwesti, W., Sriatmi, A., and Kusumawati, A. (2021). Determinan Kinerja Penatalaksanaan Tuberkulosis Paru oleh Petugas di Puskesmas Kota Semarang. *MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA*, 20(5), 348–354. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.5.348-354>
- Nisak, K., Fahdhienie, F., and Ichwansyah, F. (2024). Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis (TB) Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(1), 90–96.
<https://doi.org/10.47650/jpp.v7i1.1161>
- Nita, Y., Budiman, H., and Sari, E. (2023). Hubungan Pengetahuan, Kebiasaan Merokok Dan Riwayat Kontak Serumah Dengan Kejadian Tb Paru. *Human Care Journal*, 7(3), 724. <https://doi.org/10.32883/hcj.v7i3.2060>
- Nopita, E., Suryani, L., and Evelina Siringoringo, H. (2023). Analisis Kejadian Tuberkulosis (TB) Paru. *Jurnal Kesehatan Saelmakers PERDANA*, 6(1), 201–212. <https://doi.org/10.32524/jksp.v6i1.827>
- Nur, M., Soraya, A. F., J. A. H., and Hariani. (2022). Literatur Riview Faktor Risiko Kejadian Dm Pada Penderita TB. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 17, 146–154.
<https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jikd/article/view/1181/731>
- Nurasih, W., Amalia, F. R., Muthohar, A., Mada, U. G., Islam, U., Prof, N., Syaifuddin, K. H., Islam, U., Prof, N., and Syaifuddin, K. H. (2023). LIVING QUR ' AN DI RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO (Implementasi Surat Asy-Syu ' ara Ayat 80 dalam Pelayanan Divisi Bimbingan Rohani Islam) Pendahuluan Al-Qur ' an sebagai kitab suci umat muslim sebagai pedoman utama dalam. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 29–44.
- Prasetya, L. K. B. (2022). Karakteristik Sosiodemografi, perilaku Fertilitas Dan Preferensi Fertilitas Pada Wanita Usia Subur. *Jurnal Keluarga Berencana*, 7(2), 85–96.
- Putriningrum, R. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Dalam Pemilihan Kontrasepsi Kb Suntik Di BPS. Ruvina Surakarta. *Jurnal Kesmadaska*, 3(1), 1–11.
<http://www.jurnal.stikeskusumahusada.ac.id/index.php/JK/article/view/24/87>
- Rachmawati, A., Mulyani, E., and Handajani, D. O. (2020). Deteksi Dini Obesitas Sentral pada Wanita Usia Subur di Desa Jati Kalang Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat MARTABE*, 3, 277–280.

- Report, G. (2022). WHO: operational handbook on tuberculosis. In *Module 5: Management of tuberculosis in children and adolescents*.
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340256/9789240022614-eng.pdf>
- Riskesdes. (2023). Laporan Program Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2022. *Kemenkes RI*, 1–147.
https://tbindonesia.or.id/pustaka_tbc/laporan-tahunan-program-tbc-2021/
- Ruditya, D. N. (2015). The Relationship Between Characteristic of Tuberculosis Patient with Compliance in Check a Sputum During Treatment. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 3(2), 122.
<https://doi.org/10.20473/jbe.v3i22015.122-133>
- Ruslan, M. (2023). Konsep Pencegahan Penularan Virus Prespektif Al- Qur-An; Studi Sains Surah Al-Maidah Ayat 6. *Jurnal Ilmiah Syatiah*, 3(1), 38–53.
<https://doi.org/10.47076/jkps.v4i2.67>
- Siregar, A. F. (2015). Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dan Pekerjaan Dengan Tuberkulosis Paru Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2015. 3(2), 58–66.
<http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Sopacuaferu, S. kV, V, Wowor, T. J. ., Naziyah, Keperawatan, P. S., Kesehatan, F. I(2024). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Tuberkulosis Paru Di Xyz. *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 2(3), 166–177.
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/view/1134/1060>
- Sri Rezeki Hamid. (2022). Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis Paru Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. *Skripsi*, 1–52.
- Sunarmi, S., and Kurniawaty, K. (2022). Hubungan Karakteristik Pasien TB Paru Dengan Kejadian Tuberkulosis. *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 7(2), 182–187. <https://doi.org/10.36729/jam.v7i2.865>
- Syafriyanti, A., Wisudawan B, O., and Hadi, A. J. (2023). Analisis Faktor Risiko TB Paru pada Ibu Hamil di Puskesmas Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(4), 753–761.
<https://doi.org/10.56338/mppki.v6i4.3452>
- WHO. (2021a). FactSheet_Obesitas_Kit_Informasi_Obesitas.pdf. In *Epidemi Obesitas* (pp. 1–8).
- WHO. "Consolidated guidelines on Tuberculosis modul 6",2021.
- WHO. "Global Tuberculosis Report", 2022, *Syria Studies*. Available at :
<http://apps.who.int/bookorders.n>
- Widiati, B., and Majdi, M. (2021). Analisis Faktor Umur, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Tuberkulosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Korleko, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Sanitasi Dan Lingkungan*, 2(2), 173–184. <https://e-journal.sttl-mataram.ac.id/>
- Wijaya, I. M. K. (2019). Infeksi Hiv (Human Immunodeficiency Virus) Pada

Penderita Tuberkulosis. *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III*, 3, 295–303. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/semnasmipa/article/view/2721/2301>

Yunus, P., Pakaya, A. W., and Hadju, B. (2023). Kepatuhan minum obat pada pasien TB paru di wilayah kerja Puskesmas Telaga. *Journal of Educational Innovation and Public Health*, 1(1), 177–185.

Yusran, A., Hatta, M., Haruna, N., Natzir, R., Agus, R., and Hamid, F. (2024). Correlation between leukocyte, neutrophil, lymphocyte, and the neutrophil to lymphocyte ratio levels in Mycobacterium tuberculosis detection using rapid molecular tests. *Gaceta Medica de Caracas*, 132(Supl 1), S115–S124. <https://doi.org/10.47307/GMC.2024.132.s1.16>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Etik Penelitian

**KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN**
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016364, E-mail: kepk.fk@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXPEDITED
"ETHICAL EXPEDITED"

No.E.054/KEPK/FKIK/V/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Mery Andani
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title
"ANALISIS FAKTOR RISIKO TB PARU PADA WANITA USIA SUBUR DI BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR TAHUN 2023"
" ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR PULMONARY TB IN WOMEN OF FERTILIZING AGE AT THE MAKASSAR PUBLIC HEALTH CENTER IN 2023"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.

This declaration of ethics applies during the period Mei 31, 2024 until Mei 31, 2025.


Mei 31, 2024
and Chairperson,
Dr. apt. Isrianty Ismail, S.Si., M.Si.

Lampiran 1. 2 Surat Izin Penelitian BALITBANGDA dan LP2M


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Daengrawe No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448926
Website : <http://damptp.nsw.sulselprov.go.id> Email : pspt@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 14825/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.	Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Kota Makassar
Lampiran	: -		
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>		

di
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-6944/Un.06/LP2M/PP.00.9/06/2024 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: MERY ANDANI
Nomor Pokok	: 70600120005
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS FAKTOR RISIKO TB PARU PADA WANITA USIA SUBUR DI BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR TAHUN 2023 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 07 Juni s/d 07 Juli 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 07 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

	ASRUL SANI, S.H., M.Si. Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321.200312.1.008
---	--

Terbilang Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar
2. Penitipg



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 30, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 6965/Un.06/LP2M/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Mery Andani
NIM : 70000120005
Semester/T.A. : VIII (Delapan)/T.A. 2023-2024
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Kedokteran
Alamat : Gowa, BTN Andi Tonro
No. HP. : 087744063424

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: Analisis Faktor Risiko TB Paru Pada Wanita Usia Subur Di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Tahun 2023.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar dari tanggal Juni-Juli.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



□
□

Lampiran 1. 3 Surat Selesai Meneliti



Kementerian Kesehatan
RS Tadjuddin Chalid

Jalan Parreakkang Nomor 67 /
Jalan Pejajyang Daya Makassar, 90241
(0411) 512902
Mgs://www.rstc.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: DP.04.03/D.XXVII.4/0337/2024

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nomor: 14825/S.01/PTSP/2024 tanggal 07 Juni 2024 Penihal Izin Penelitian, maka dengan ini Kepala UPF Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar menerangkan bahwa:


Nama	: MERY ANDANI
NIM	: 70600120005
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)

Telah melaksanakan Penelitian pada tanggal 07 Juni s/d 07 Juli 2024 dengan judul:

"Analisis Faktor Risiko TB Paru pada Wanita Usia Subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Tahun 2023"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

25 Juli 2024
KEPALA UPF BBKPM MAKASSAR



dr. PITHET SANDY TULAK, Sp. P
NIP. 197168082001121005

Lampiran 1. 4 Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Mery Andani
2. NIM : 70600120005
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 04 Mei 2002
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dusun Allu, Kab. Bulukumba
8. Orang Tua
Ayah : Basri
Ibu : Ani

B. Riwayat pendidikan

1. TK : TK Abbulo Sibatang
2. SD : SDN 22 Allu
3. SMP : SMPN 10 Bulukumba
4. SMA : SMAN 15 Bulukumba

Penulis melanjutkan S1 di UIN Alauddin Makassar pada jurusan Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.