


**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA
DENGAN HALUSINASI PENDENGARAN MENGGUNAKAN
INTERVENSI KOMBINASI TERAPI ZIKIR DAN
TERAPI SUGESTI DI RSKD DADI**



Tugas Akhir Ners

Oleh:

AYU ANANDAH, S.Kep
NIM: 70900122037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA
DENGAN HALUSINASI PENDENGARAN MENGGUNAKAN
INTERVENSI KOMBINASI TERAPI ZIKIR DAN
TERAPI SUGESTI DI RSKD DADI**



Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ners
Jurusan Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

AYU ANANDAH, S.Kep

NIM: 70900122037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ayu Anandah, S.Kep
NIM : 70900122037
Tempat/Tgl.Lahir : Makassar, 15 November 1999
Jurusan : Program Studi Profesi Ners
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Abd. Kuddus Bontoa Barombong
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan Intervensi Kombinasi Terapi Zikir dan Terapi Sugesti di RSKD Dadi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSARA

Gowa, 14 Agustus 2023

Penyusun


Ayu Anandah, S.Kep
70900122037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Ayu Anandah, S.Kep NIM: 70900122037, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan Intervensi Kombinasi Terapi Zikir dan Terapi Sugesti di RSKD Dadi ”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Gowa, Agustus 2023

Pembimbing I

Hj. Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J

Pembimbing II

Eka Hadrayani, S.Kep., Ns., M.Kep

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

ALAUDDIN

MAKASSAR

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan Intervensi Kombinasi Terapi Zikir dan Terapi Sugesti di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan”, yang disusun oleh Ayu Anandah, S.Kep NIM: 70900122037, mahasiswa program studi profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan hari Jum’at, Tanggal 1 Desember 2023 M, bertepatan dengan **6 Jumadil Akhir 1445 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 1 Desember 2023 M
17 Jumadil Awal 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.,Og.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hasnah, S.Sit.,S.Kep.Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Aidah Fitriani, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Abdul Ghany, M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Hj. Rasmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J	(.....)
Pembimbing II	: Eka Hadrayani, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar,

Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.,Og.,M.Kes
NIP: 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang selalu tercurahkan dan tiada henti diberikan kepada hamba-Nya, serta salam dan shalawat juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan teman-teman seperjuangan. Merupakan suatu kehormatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis akhir ners ini yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan Intervensi Kombinasi Terapi Zikir dan Terapi Sugesti di RSKD Dadi .”

Karya tulis akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat meraih gelar pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2023. Selesaiannya penulisan karya tulis ilmiah ini penulis berharap ada banyak manfaat yang dapat diambil, bahwa tulisan-tulisan dalam penelitian ini akan menebarkan suara-suara kebermanfaatan yang akan terus memenuhi kepala kaum-kaum intelektual. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua Orang Tua ku yang tercinta, terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai semua ini Ayahanda Junardi & Ibunda Dahariah yang telah merawat dan membesarkan penulis serta kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi dan doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai ditahap ini, juga tidak lupa

ucapan terima kasih kepada pembimbing yang senantiasa mengarahkan dengan penuh kesabaran pada mahasiswanya yang sangat fakir ilmu dan ucapan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, pimpinan fakultas sejawaran, serta Staf Akademik yang telah membantu administrasi penulis.
3. Dr. Hasnah, S.Kep, Ns, M.Kes, selaku ketua Program Profesi Ners, serta dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses admistrasi dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah ini.
4. Hj. Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J, selaku pembimbing I dan Eka Hadrayani, S.Kep., Ns., M.Kep, selaku pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan dan bantuannya dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis mampu merampungkan karya tulis ini.
5. Aidah Firiani, S.Kep.,Ns.,M.Kep, selaku penguji I dan Dr. Abdul Ghany, S.Th.I.,M.Th.I, selaku penguji II dalam hal ini Penguji Agama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan karya tulis akhir ini sehingga penelitian ini dapat menjadi penelitian yang berkualitas dan komprehensif.

6. Terima kasih kepada suamiku yang tercinta, terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai semua ini yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi dan doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai ditahap ini
7. Kepada rekan-rekan mahasiswa (i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan tugas akhir ners ini.

Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja terjadi. Bahwa kesalahan tersebut murni dari penulis sebagai manusia dan segala hal positif serta yang bermanfaat dalam tulisan ini datangnya dari Allah SWT. Penulisnya sangat berkenan menerima kritik dan saran untuk melengkapi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 Agustus 2023
Penyusun,


Ayu Anandah, S.Kep
NIM:70900122037

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI


Sampul	i
Halaman Sampul	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Abstrak.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep Medis	7
B. Konsep Asuhan Keperawatan.....	23
C. Pendekatan Konsep Teori.....	30
D. Evidence Based Practice In Nursing (EBPN)	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Rancangan Studi Kasus	46
B. Subjek Studi Kasus.....	47
C. Fokus Studi Kasus	47
D. Instrumen Studi Kasus.....	47
E. Prosedur Pengambilan Data	47
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus.....	48
G. Analisis data dan Penyajian data	48
H. Etika Studi Kasus	49
BAB IV LAPORAN KASUS	51
A. Pengkajian	51

B. Diagnosis Keperawatan	63
C. Intervensi	64
D. Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan.....	67
BAB V PEMBAHASAN	74
A. Analisis Asuhan Keperawatan.....	74
B. Analisis Intervensi EBPN.....	81
C. Keterbatasan	84
BAB VI PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
Daftar Pustaka.....	90
Lampiran 1: Jurnal Utama EBPN	96
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian.....	98
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup.....	99

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tindakan Keperawatan Pada Pasien Halusinasi	30
Tabel 2.2 Artikel Dan Jurnal Pendukung Terapi Zikir	39
Tabel 2.3 Artikel Dan Jurnal Pendukung Terapi Sugesti.....	39
Tabel 4.1 Analisa Data.....	39
Tabel 4.2 Intervensi Keperawatan.....	39
Tabel 4.3 Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan	39



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Ayu Anandah, S.Kep
NIM : 70900122037
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan Intervensi Kombinasi Terapi Zikir dan Terapi Sugesti di RSKD Dadi

Latar Belakang: Kesehatan mental saat ini menjadi salah satu masalah topik permasalahan baik fisik, mental maupun spiritual karena stres yang tidak terkendali dan interaksi dengan orang lain tidak berjalan dengan baik, sehingga kesehatan jiwa menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia. Gangguan mental dengan halusinasi pendengaran dapat mengancam jiwa jika tidak diatasi. **Tujuan penulisan:** Untuk menganalisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan Intervensi Kombinasi Terapi Zikir dan Terapi Sugesti di RSKD Dadi . **Metode:** Studi Kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan pendokumentasian. Cara pemberian terapi dengan meminta pasien untuk mendengarkan, dan membaca Zikir, serta menganjurkan pasien untuk berZikir, meminta pasien untuk lebih fokus saat dilakukannya pemberian sugesti. **Hasil:** Setelah diberikan intervensi kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti yakni, pasien lebih rileks dan merasakan ketenangan jiwa serta terjadi peningkatan pengontrolan halusinasinya. **Kesimpulan:** Terapi Zikir dan terapi sugesti efektif dilakukan untuk meningkatkan pengontrolan halusinasi serta dengan terapi dapat mengingatkan pasien kepada Sang Maha Pencipta.

Kata Kunci : Halusinasi Pendengaran, terapi Zikir dan terapi sugesti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa menurut Pasal 1 dan 3 UU No. 18 Tahun 2014 adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental spiritual dan sosial sehingga menyadari kemampuannya sendiri untuk menahan tekanan dan bekerja secara produktif serta mampu mempengaruhi komunitasnya. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa sekitar 60 juta orang mengalami gangguan bipolar, 35 juta orang mengalami gangguan depresi dan 21 juta orang mengalami skizofrenia. Kesehatan mental saat ini menjadi salah satu masalah saat ini baik fisik, mental maupun spiritual karena stres yang tidak terkendali dan interaksi dengan orang lain tidak berjalan dengan baik, sehingga kesehatan mental menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia (WHO, 2017).

Hasil Survei Kesehatan Mental Rumah Tangga Indonesia (SKMRT) menyatakan bahwa dari 1.000 penduduk ada 264 orang mengalami gangguan kesehatan jiwa, artinya di setiap rumah tangga terdapat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dan diperkirakan sejak awal tahun 2010 jumlah orang yang menderita gangguan kesehatan jiwa mencapai 25% dari jumlah penduduk Indonesia (Yosep, 2016). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018 menyatakan terdapat 1-2 orang/1000 penduduk dengan gangguan jiwa di Indonesia. Prevalensi gangguan jiwa berat (skizofrenia) di Indonesia adalah 8,8%. Skizofrenia adalah gangguan mental yang berat dan kronis yang mempengaruhi 20 juta orang di seluruh dunia. Skizofrenia dapat menyebabkan delusi, perilaku tidak pantas,

bicara tidak teratur, gangguan emosi dan halusinasi.

Dari Januari hingga September 2018, ditemukan sekitar 13.292 orang dengan gangguan jiwa, menurut data terbaru dari Rumah Sakit Khusus Dadi (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 6.585 pasien gangguan jiwa dengan halusinasi, 451 waham, 1.904 menarik diri, 1.318 harga diri rendah dan defisit pengobatan 1.548 orang, percobaan bunuh diri 5 orang, perilaku kekerasan 1.145 orang. Gangguan halusinasi terjadi secara bertahap dimulai dengan kebahagiaan yang disebabkan oleh halusinasi ini dan berkembang menjadi perasaan yang mengancam jiwa. Membiarkan keadaan halusinasi pasien berlanjut mengakibatkan halusinasi parah yang dapat membahayakan orang lain dan diri sendiri. Gangguan halusinasi dibagi menjadi 5 kategori: penglihatan, perabaan, pendengaran, penciuman dan pengecapan (Agustina, 2017).

Halusinasi pendengaran adalah halusinasi yang paling sering dikaitkan dengan gangguan jiwa, seperti mendengar suara berisik, rintihan atau bisikan dalam sebuah kata atau kalimat. Orang tersebut merasa bahwa suara tersebut ditujukan kepadanya, itulah sebabnya pasien yang menderita gangguan halusinasi sering terlihat berbicara atau bertengkar dengan suara yang mereka dengar. Tanda dan gejala yang sering dialami penderita ini antara lain tertawa menyendiri tanpa alasan, ekspresi wajah tegang, berbicara sendiri, berbicara kacau, cemas, gelisah, bingung, tidak mau mengurus diri, serta sikap curiga dan menarik diri dari lingkungan sekitar (Agustina, 2017).

Gangguan halusinasi dapat diobati dengan pengobatan farmakologis dan nonfarmakologis. Pengobatan nonfarmakologis lebih sering digunakan karena

aman dan tidak menimbulkan efek samping bagi penderita halusinasi. Penatalaksanaan halusinasi keperawatan disebut sebagai Tindakan Keperawatan. Selain penerapan strategi tindakan, terapi Zikir dan terapi sugesti juga dapat dilakukan. Terapi Zikir merupakan pengobatan yang efektif dibuktikan dengan hasil penelitian oleh Damayanti (2014), yaitu dengan terapi Zikir, pasien dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengontrol halusinasinya. Selain terapi Zikir, terapi sugesti juga berpengaruh pada gangguan halusinasi. Sebuah penelitian tentang terapi sugesti Hidayat (2018), menemukan bahwa pasien merasa lebih rileks setelah terapi sugesti diberikan.

Melakukan terapi Zikir dan terapi sugesti pada pasien yang mengalami halusinasi pendengaran bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena berzikir dapat menghilangkan stress dan menenangkan hati. Sedangkan terapi sugesti, memberikan umpan balik positif kepada pasien yang mengalami halusinasi untuk memengaruhi sistem tubuh dan menciptakan rasa aman dan tenang.

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rad 13:28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah-lah hati menjadi tentram”. QS. Ar-Rad:28.

Berdasarkan masalah gangguan jiwa halusinasi yang ditemukan di ruang Sawit maka penulis menerapkan intervensi berdasarkan *Evidence Based Practice Nursing* (EBPN) yang telah diterapkan di ruangan tersebut adalah Analisis

Asuhan Keperawatan pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan Intervensi Kombinasi Terapi Zikir dan Terapi Sugesti di RSKD Dadi .

B. Rumusan Masalah

Halusinasi adalah gangguan jiwa dengan halusinasi pendengaran berat yang dapat membahayakan nyawa orang lain dan diri sendiri. Latar belakang penelitian ini merumuskan pertanyaan berdasarkan permasalahan yang ditemukan yaitu “Bagaimana Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan Intervensi Kombinasi Terapi Zikir dan Terapi Sugesti di RSKD Dadi ?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan Intervensi Kombinasi Terapi Zikir dan Terapi Sugesti di RSKD Dadi

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui analisis pengkajian pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran menggunakan intervensi kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti di RSKD Dadi
- b. Diketahui analisis diagnosis keperawatan pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran menggunakan intervensi kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti di RSKD Dadi

- c. Diketahui analisis intervensi keperawatan pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran menggunakan intervensi kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti di RSKD Dadi
- d. Diketahui analisis implementasi pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran menggunakan intervensi kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti di RSKD Dadi
- e. Diketahui analisis evaluasi pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran menggunakan intervensi kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti di RSKD Dadi
- f. Diketahui analisis hasil penerapan pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran menggunakan intervensi kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti di RSKD Dadi


D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca sehingga menjadi referensi untuk pembuatan artikel atau jurnal-jurnal kesehatan yang membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran menggunakan intervensi kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti di RSKD Dadi. Di samping itu, penelitian ini juga sebagai ranah pengembangan dan konsep intervensi pada peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Aplikatif

Intervensi terapi Zikir dan terapi sugesti efektif dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi tenaga kesehatan di rumah sakit dan masyarakat yang ingin memberikan terapi sugesti dan terapi Zikir. Terapi ini dapat menghadirkan ketenangan jiwa dan membantu pasien lebih rileks sehingga memengaruhi sistem tubuh untuk menciptakan rasa nyaman dan tenang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Medis

1. Definisi *Skizofrenia*

Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi dimana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. *Skizofrenia* sering disamakan dengan psikosis, padahal keduanya berbeda. Psikosis hanya salah satu gejala dari beberapa gangguan mental, diantaranya *Skizofrenia* (Akbar, 2021).

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pada zaman Nabi saw *Zkizofrenia* sudah ada, meskipun demikian ada suatu upaya untuk mencapai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan optimal bagi individu secara fisik, intelektual dan emosional, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingannya. Seperti dalam firman

Allah swt dalam QS. Hud (11):54

إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَاكَ بَعْضُ ءَآلِهِنَا بِسُوءٍ ۖ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهِدُونَ
أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

Terjemahannya :

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia (Hud) menjawab,

“sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah swt dan saksikanlah bahwa aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan”.

Menurut M. Quraish Shibah 2002, maksud dari ayat tersebut diatas adalah tidak ada satupun yang mampu untuk melimpahkan suatu penyakit atas dirinya seseorang selain Allah swt. Mereka persekutukan Allah swt, mempercayai dan meyakini hal-hal berhubungan dengan kemusyrikan mereka ditimpahkan penyakit gangguan jiwa karena adanya pelanggaran norma dan agama yang telah mereka lakukan. Hati mereka jauh dari Allah swt dan keimanan mereka meredup seiring dengan kepercayaannya terhadap kemusyrikan. Mereka tidak mampu menguasai diri mereka, tanpa arah sehingga merekapun menjadi gangguan jiwa. Allah swt telah memperingatkan kita agar senantiasa menjaga keimanan kita karena sesungguhnya keimananlah yang menguatkan dan menyetatkan jiwa.

2. Definisi Halusinasi

Halusinasi adalah suatu kondisi dimana seseorang kehilangan kemampuan untuk membedakan rangsangan dari dalam yaitu pikiran, dan dari luar yaitu dunia luar, sehingga penderitanya tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau tidak (Akbar, 2021). Halusinasi adalah seseorang yang mengalami perubahan karena situasi dalam jumlah dan pola rangsangan yang dihasilkan dari respon dari dalam diri sendiri atau dari lingkungan disertai dengan kerusakan respon terhadap rangsangan tersebut kutipan dari (Hendarsyah, 2015).

Halusinasi adalah salah satu gejala disfungsi sensorik pada

pasien dengan masalah kesehatan mental. Penderita mengalami sensasi berupa suara, penglihatan, penciuman, pengecapan, atau perabaan tanpa ada rangsangan yang nyata. Hendarsyah (2015) menyatakan bahwa mendengar tanpa melihat wujudnya, menertawakan, mengejek, mengancam, menghasut dan terkadang dapat mengancam jiwa. Orang dengan halusinasi terkadang menunjukkan perilaku seperti berbicara sendiri, tertawa keras, merasa takut, marah yang tidak rasional, menutup telinga dan mulut berbisik-bisik.

Halusinasi pendengaran adalah yang paling umum terjadi. Saat halusinasi terjadi, orang tersebut mendengar suara-suara. Jika halusinasi tidak segera ditangani akan semakin parah, sehingga perasaan panik dan cemas memicu kecemasan dan orang tersebut tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan (Hafizudiin, 2021). Halusinasi pendengaran adalah mendengar suara-suara yang dimulai dengan peristiwa yang mengingatkan orang tersebut akan pengalaman traumatis di masa lalu. Pengalaman ini menyebabkan rasa gagal muncul dalam dirinya, yang mempengaruhi pembentukan seseorang. Proses pembentukan keyakinan dipengaruhi oleh pembelajaran dari pengalaman masa lalu (Beck, 2011).

Halusinasi pendengaran adalah suatu kondisi di mana seseorang menerima stimulus seperti bisikan perintah atau larangan tanpa adanya rangsangan, sehingga pada penderita halusinasi sulit

membedakan antara kenyataan dan khayalan.

3. Etiologi Halusinasi

Menurut Nurhalimah (2016) mengatakan penyebab halusinasi ada 2 diantaranya :

a. Faktor Predisposisi

1) Faktor psikologis yaitu hubungan antar manusia yang tidak terjalin dengan baik, tekanan dari orang lain, serta banyaknya peran yang dilakukan dengan paksaan dapat menyebabkan peningkatan kecemasan sehingga dapat menimbulkan halusinasi.

2) Faktor perkembangan, yaitu adanya hambatan perkembangan yang dapat menghambat interaksi interpersonal, yang dapat meningkatkan stress relasional dan kecemasan hingga menimbulkan gangguan persepsi.

3) Faktor sosiokultural khususnya di masyarakat akibat perbedaan budaya, yang dapat membuat seseorang merasa terasingkan dan dijauhi, yang dampaknya dapat mengakibatkan gangguan seperti stress dan halusinasi.

4) Faktor genetik, yaitu faktor keturunan dimana orang dengan masalah gangguan jiwa juga dapat berisiko terhadap anggota keluarga lainnya.

b. Faktor Presipitasi

Secara umum stressor yang berlebihan dapat menimbulkan

berbagai gangguan persepsi yang disebabkan oleh berbagai keadaan di lingkungan pasien, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, kegagalan, penyakit terminal dan konflik yang berkelanjutan.

4. Klasifikasi Halusinasi

Halusinasi menurut Yunita (2020) ada beberapa jenis diantaranya :

- a. Halusinasi pendengaran, yaitu seringkali seseorang yang menderita dengan jenis halusinasi ini terkadang mendengar suara-suara yang tidak terlihat wujudnya dan tidak terdengar oleh orang lain.
- b. Halusinasi penglihatan adalah halusinasi dimana penglihatan pasien dapat melihat seseorang, bentuk, warna atau sesuatu yang tidak nyata yang dapat dilihat oleh pasien tetapi tidak dapat dilihat oleh orang lain.
- c. Halusinasi perabaan yaitu jenis halusinasi ini merasa bahwa ada seseorang yang menyentuhnya, atau merasa sensasi menggelitik padahal sebenarnya tidak ada.
- d. Halusinasi penciuman yaitu pada jenis ini terkadang menghirup bau yang tidak sedap seperti mencium bau melati, bau busuk yang tidak nampak wujud fisiknya.
- e. Halusinasi pengecapan yaitu penderita halusinasi yang memiliki rasa di mulutnya yang tidak ada penyebabnya.


5. Rentan Respon Halusinasi

Halusinasi adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami respon maladaptif. Keadaan maladaptif ini disebut respons neurobiologis yang rentan. Reaksi pikiran terhadap halusinasi menyebabkan maladaptif. Ketika seseorang memiliki pikiran yang sehat, mereka mampu mengenali dan merasakan rangsangan berdasarkan informasi yang diterima dari panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, pengecapan, sentuhan dan penciuman. Namun berbanding terbalik dengan orang yang mengalami halusinasi (Pardede, 2021).

Pada seseorang yang mengalami halusinasi biasanya tidak dapat merasakan rangsangan yang diterimanya dengan panca inderanya, sehingga mereka mengira bahwa apa yang dilihat, didengar, dicium, dirasa dan diraba adalah nyata dan benar terjadi, meskipun rangsangan itu tidak nyata. Pada umumnya rangsangan halusinasi tidak secara langsung mengendalikan orang itu sendiri, tergantung dari respon yang menyelesaikan masalah tersebut (Muhitht, 2015).

Adaptif ←

→ Maladaptif



a. Adaptif

Respon perilaku yang dapat diterima oleh norma sosial dan budaya disebut dengan respon adaptif. Perilaku ini berada dalam batas normal jika seseorang dapat menghadapi suatu masalah dan dapat menyelesaikannya dengan baik.

- 1) Pemikiran logis adalah cara pandang yang mengarah pada kenyataan. Persepsi yang benar adalah pandangan yang akurat dan nyata.
- 2) Emosi konsisten dengan pengalaman adalah perasaan yang timbul dari perasaan.
- 3) Perilaku sosial adalah sikap dan tingkahlaku dalam batas kewajaran.
- 4) Hubungan sosial adalah hubungan proses interaksi dengan orang lain dan lingkungan.

b. Maladaptif

Respon individu untuk memecahkan masalah muncul dari perilaku yang menyimpang dengan norma dan keyakinan, sosial budaya, dan lingkungan. Respon individu ini disebut respon maladaptif.

- 1) Gangguan pikiran adalah individu yang selalu mempertahankan pendapat dan keyakinannya. Dalam keadaan ini, seseorang tidak peduli apakah pendapatnya salah atau benar. Pikiran yang

bermasalah terus berpegang pada keyakinannya terlepas dari pendapat orang lain.

- 2) Halusinasi adalah persepsi yang salah karena tidak adanya sebab akibat dari rangsangan eksternal yang tidak realita atau tidak nyata.
- 3) Kesulitan mengendalikan emosi adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi emosional karena hatinya, seperti iri hati dan dengki terhadap orang lain.
- 4) Perilaku tidak terkontrol merupakan sesuatu yang tidak teratur.
- 5) Isolasi sosial adalah perilaku yang menyimpang yang menganggap kesepian sebagai sesuatu yang menyenangkan atau membuat dirinya merasa lebih tenang, sehingga seseorang dalam situasi ini lebih suka menyendiri dibandingkan bergabung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya.

6. Tahapan Halusinasi

Menurut Widiyawati (2020) setiap orang memiliki perbedaan dan tingkat keparahan halusinasi yang dideritanya. Ada 4 tahap halusinasi yaitu :

a. *Comforting*

Comforting merupakan fase menyenangkan dengan karakteristik nonpsikotik. Pada fase ini pasien merasakan perasaan yang mendalam rasa cemas yang berlebihan, perasaan bersalah pada orang lain, dan rasa takut yang berlebih pada sesuatu hal.

Sehingga menyebabkan pasien mengarahkan pikirannya pada hal-hal menyenangkan untuk mengatasi kesepian, kecemasan, ketakutan, dan rasa bersalah. Pasien mengetahui pikiran dan pengalamannya dan masih bisa mengendalikan kondisinya.

Karakteristiknya adalah:

- 1) Tertawa, terbahak-bahak dan tersenyum tanpa alasan
- 2) Mulut bergumam tanpa suara
- 3) Gerakan mata cepat
- 4) Berbicara dengan suara lambat
- 5) Diam dan asyik sendiri

b. *Condemning*

Condemning merupakan fase yang menjijikkan dengan karakteristik psikotik ringan, dimana pasien menyikapi suatu hal yang menjijikkan dan menakutkan sehingga mulai lepas kendali atau kemungkinan menjauh dan menarik diri lingkungannya, dan tingkat kecemasan mulai memburuk yang mengakibatkan antisipasi. Karakteristiknya adalah :

- 1) Peningkatan saraf otonom, seperti peningkatan denyut nadi
- 2) Rentang perhatian terbatas
- 3) Keasyikan dengan dunianya sendiri dan kehilangan kendali atas halusinasinya sehingga individu tersebut tidak dapat membedakan antara dunia nyata dan dunia fantasinya sendiri.
- 4) Menyalahkan orang lain

5) Isolasi

c. *Controlling*

Controlling merupakan fase ansietas berat dimana pengalaman sensori lebih berkuasa dengan karakteristik psikotik, dimana pasien mulai lebih dan berhenti melawan halusinasinya, menjadikan halusinasinya menjadi hal menarik dan kemungkinan jika halusinasinya berhenti akan mengalami kesepian. Karakteristiknya adalah :

- 1) Mengikuti perintah dari halusinasinya
- 2) Sulit berhubungan dengan orang lain
- 3) Sedikit perhatian pada orang lain/objek lain
- 4) Terlihat tanda-tanda kecemasan berat seperti keringat dingin, tremor, dan penolakan untuk mengikuti arahan dari orang lain
- 5) Halusinasinya menjadi menarik
- 6) Perilaku menolak dan tidak mau mengiktui perintah dari perawat maupun orang lain

d. *Conquering*

Conquering merupakan fase panik, pasien sudah melebur kedalam dunia halusinasinya, dengan karakteristik psikotik berat dimana pemikirannya mulai berbahaya dan jika tidak diatasi halusinasinya akan hilang beberapa jam atau hari. Karakteristiknya adalah :

- 1) Berperilaku yang tidak wajar
- 2) Kemungkinan bunuh diri
- 3) Perilaku kekerasan isolasi
- 4) Tidak dapat mengikuti perintah dari orang lain

7. Manifestasi Klinis Halusinasi

Terdapat dua data manifestasi klinis halusinasi atau tanda dan gejala halusinasi yaitu subjektif dan objektif ialah :

a. Halusinasi Pendengaran

Data Subyektif :

- 1) Pasien mendengar sesuatu yang menyuruh pasien melakukan sesuatu yang mengancam jiwa
- 2) Pasien mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap
- 3) Mendengar suara atau bunyi
- 4) Pasien mendengar suara meminta tolong atau menyuruhnya melakukan sesuatu, padahal orang tersebut sudah meninggal
- 5) Pasien mendengar suara untuk menyakiti dirinya sendiri maupun menyakiti orang lain

Data Objektif :

- 1) Mendekat pada sumber suara yang didengarnya
- 2) Tertawa, berbicara, tersenyum sendiri
- 3) Berteriak dan marah tanpa sebab
- 4) Menutup telinga sambil mulut bergerak dengan cepat tanpa suara

5) Pergerakan tangan yang tiba-tiba

b. Halusinasi Penglihatan

Data Subyektif :

- 1) Dapat melihat orang yang sudah lama meninggal
- 2) Dapat melihat makhluk gaib
- 3) Dapat melihat bayangan yang tak kasat mata
- 4) Dapat melihat hal yang menakutkan seperti monster, makhluk metodologi atau makhluk legenda pada zaman dahulu
- 5) Melihat cahaya yang sangat terang

Data Obyektif :

- 1) Tatapan mata yang tertuju pada suatu tempat tanpa ingin mengalihkan pandangan
- 2) Menunjuk ke arah tempat tersebut
- 3) Ketakutan pada objek yang dilihat

c. Halusinasi Penciuman

Data Subyektif :

- 1) Mencium bau yang menyengat seperti bau harum atau busuk yang tidak tertahankan
- 2) Pasien mengatakan sering mencium bau sesuatu

Data Obyektif :

- 1) Ekspresi wajah tegang atau gelisah seperti sedang mencium
- 2) Adanya gerakan hidung yang kempas-kempis atau cuping hidung

3) Mengarahkan hidung ke tempat tertentu

d. Halusinasi Perabaan

Data Subyektif :

- 1) Pasien merasakan seperti ada yang merayap dalam tubuhnya
- 2) Merasakan sesuatu yang menggelitik, mencubit, atau mencakar tubuhnya
- 3) Merasakan ada sesuatu di bawah kulit
- 4) Merasakan terpaan panas dan dingin tanpa adanya rangsangan
- 5) Merasa seperti tersengat aliran listrik yang tiba-tiba

Data Obyektif :

- 1) Meraba permukaan kulit, mengusap atau menggaruk
- 2) Tiba-tiba menggerakkan badannya
- 3) Terus memegangi area pada tubuhnya

e. Halusinasi Pengecapan

Data Subyektif :

- 1) Merasakan seperti sedang memakan atau meminum sesuatu
- 2) Merasakan seperti ada makanan di dalam mulutnya sehingga orang tersebut mengunyah terus menerus

Data Obyektif :

- 1) Seperti mengecap rasa sesuatu
- 2) Mulutnya seperti mengunyah
- 3) Terkadang meludah atau muntah

8. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan medis halusinasi menurut Rahayu (2016) terbagi menjadi 2 yaitu terapi farmakologi dan terapi nonfarmakologi antara lain :

a. Terapi Farmakologi

1) *Clorpromazine* (CPZ) adalah obat yang termasuk golongan antipsikotik fenotiazina yang bekerja dengan menstabilkan senyawa alami otak. Obat ini dapat digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental, seperti skizofrenia dan gangguan psikosis yang lainnya, perilaku agresif yang membahayakan pasien atau orang lain, kecemasan dan kegelisahan yang parah, serta autisme pada anak-anak. Efek yang kadang ditimbulkan mulai dari hipertensi, hipotensi, kejang, sakit kepala, mual dan muntah serta mulut kering.

2) *Haloperidol* adalah obat golongan anti psikotik yang berfungsi untuk meredakan gejala skizofrenia dan masalah perilaku, atau emosional, serta masalah kejiwaan lainnya. *Haloperidol* untuk mengatasi skizofrenia biasanya akan diberikan untuk jangka waktu panjang, kecuali ada efek yang merugikan atau berlawanan. Sedangkan jika untuk meredakan gangguan kecemasan atau agitation, *haloperidol* hanya dikonsumsi hingga gejala mereda. Efek yang terkadang ditimbulkan dari

obat ini adalah merasa pusing, mual muntah, sakit kepala, kejang, anoreksia, mulut kering serta insomnia.

- 3) *Trihexyphenidil* (THP) adalah obat yang sering dipakai sebagai penyerta pemberian obat anti psikotik jenis *fenotiazin* dan butirofenon karena khasiatnya merelaksasi otot polos dan anti spasmodik. Efek samping yang umum terjadi ; mulut kering, pusing, pandangan kabur, midrasis, fotofobia, mual, nervous, konstipasi, mengantuk, retensi urine. Pada SSP dapat terjadi ; bingung, gitasi, delirium, manifestasi psikotik, euphoria. Reaksi hipersensitif ; Glaucoma parotitis.

b. Terapi Nonfarmakologi

1) Terapi Aktivitas Kelompok

Terapi aktivitas kelompok yang sesuai dengan gangguan persepsi sensori halusinasi adalah kegiatan kelompok yang bertujuan untuk merangsang/menstimulus persepsi itu sendiri.

2) *Elektro Convulsif Therapy* (ECT)

Terapi listrik ini yaitu merupakan penanganan secara fisik dengan menggunakan arus listrik yang berkekuatan 75-100 volt, penanganan fisik ini belum diketahui secara jelas, namun penanganan ini dapat meringankan gejala skizofrenia, sehingga dengan cara ini penderita skizofrenia dapat kontak dengan orang lain.

3) Psikoterapi Zikir

Terapi Zikir merupakan terapi psikoreligious dengan menggunakan media Zikir yang dapat mengingatkan kita kepada Allah SWT yang bertujuan untuk menenangkan hati dan pikiran. Dengan membaca Zikir seseorang akan merasa lebih tenang dan telah menyerahkan segala permasalahan kepada Allah sehingga beban stress yang dirasakan mengalami penurunan (Djamaluddin, 2019).

B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian

Pengkajian keperawatan jiwa yaitu mengumpulkan data dari objektif dan data subjektif dengan cara yang sistematis, dan bertujuan membuat penentuan tindakan keperawatan bagi individu, keluarga dan komunitas (Damayanti, 2014). Gangguan halusinasi pada pengkajian meliputi :

a. Identitas Klien

Identitas klien terdiri dari nama pasien, umur, jenis kelamin, status perkawinan, Agama, tanggal masuk dan nomor rekam medik, informan, tanggal pengkajian, nomor rumah pasien, serta alamat pasien.

b. Keluhan Utama

Keluhan utama yaitu biasanya berupa senyum sendiri, bicara sendiri, tertawa sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, menarik

diri dari orang lain, ekspresi wajah tegang mudah tersinggung tidak dapat membedakan yang nyata dan tidak nyata, jengkel dan marah ketakutan biasa terdapat disorientasi waktu tempat dan orang, tidak dapat mengurus diri sendiri dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

c. Faktor Predisposisi

Faktor ini beresiko dan dapat mempengaruhi individu untuk meningkatkan stress. Stress yang didapat dari individu itu sendiri maupun dari orang sekitarnya dan mengenai keturunan, perkembangan sosial kultural serta biokimia psikologis.

- 1) Faktor Perkembangan : Perkembangan terkadang menjadi faktor pemicu terjadinya stress, seperti tidak dapat berinteraksi dengan orang lain karena kecacatan mental.
- 2) Faktor Sosiokultural : Berbagai faktor di masyarakat dapat menyebabkan seseorang merasa terasingkan oleh lingkungan sekitar akibat dari sosiokultural yang berbeda.
- 3) Faktor Biokimia : Merasakan stress yang berlebihan dialami seseorang sehingga tubuh menghasilkan zat biokimia yang mengakibatkan terjadinya halusinogenik neurokimia.
- 4) Faktor Psikologis : Hubungan dari lingkungan sekitarnya yang tidak baik, adanya peran ganda yang bertentangan dan tidak diterima oleh anak akan mengakibatkan stress dan kecemasan yang tinggi dan berakhir dengan gangguan orientasi realitas

seperti halusinasi.

5) Faktor Genetik : Pengaruh dari keturunan merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit.

d. Faktor Presipitasi yaitu adanya rangsangan lingkungan yang berulang-ulang misalnya adanya pemicu dalam kelompok sehingga mengakibatkan pasien stress, terlalu sering diajak berkomunikasi oleh hal yang tidak nyata yang berada di lingkungan, juga lingkungan sunyi/isolasi sering menjadi pencetus terjadinya halusinasi karena hal tersebut dapat meningkatkan stres dan kecemasan yang merangsang tubuh mengeluarkan zat.

e. Pengkajian Fisik yaitu hasil pengukuran tanda vital (TD, nadi, suhu, pernapasan, TB, BB) dan keluhan fisik yang dialami oleh klien. Terjadi peningkatan denyut jantung pernapasan dan tekanan darah.

f. Pengkajian Psikososial yaitu genogram yang menggambarkan tiga generasi

g. Konsep Diri

1) Citra tubuh yaitu menolak dan tidak menerima perubahan tubuh yang terjadi, menolak melihat dan menyentuh bagian tubuh yang berubah, menolak penjelasan perubahan tubuh, persepsi negatif tentang tubuh. Preokupasi dengan bagian tubuh yang hilang, mengungkapkan ketakutan akibat perubahan dan merasa putus asa.

- 2) Identitas diri yaitu ketidakpastian memandang diri, sukar menetapkan keinginan dan tidak mampu mengambil keputusan.
- 3) Peran berubah atau berhenti fungsi peran yang disebabkan penyakit, proses menua putus sekolah dan PHK.
- 4) Identitas diri yaitu mengungkapkan keputusan karena penyakitnya dan mengungkapkan keinginan yang terlalu tinggi.
- 5) Harga diri yaitu perasaan malu terhadap diri sendiri, kurang percaya diri, gangguan hubungan sosial, rasa bersalah terhadap diri sendiri, mencederai diri, dan merendahkan martabat.
- 6) Status mental, dari pengkajian ini pada gangguan halusinasi terkadang dapat ditemukan data berupa senyum sendiri, tertawa sendiri, bicara sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, menggerakkan mata dengan cepat, berbicara yang sangat pelan dan lambat, berusaha untuk menghindari orang lain, menarik diri dari orang lain, tidak dapat membedakan yang nyata dan tidak nyata.

h. Mekanisme Koping yaitu jika mendapatkan masalah , pasien merasakan ketakutan yang berlebihan, dan tidak mau menceritakan kepada orang lain. Mekanisme koping yang digunakan pasien sebagai usaha mengatasi kecemasan yang merupakan suatu kesepian nyata yang mengancam dirinya. Mekanisme koping yang sering digunakan pada halusinasi adalah :

- 1) Regresi : tidak adanya keinginan beraktivitas bahkan berhari-


hari.

- 2) Menarik diri : merasa lebih nyaman di dunianya sendiri dan merasa lebih sulit untuk mempercayai orang lain.
- 3) Proyeksi : Ketika terjadi perubahan persepsi tanggungjawabnya dilimpahkan kepada orang lain.

i. Aspek Medik yaitu terapi yang diberikan kepada pasien untuk upaya penyembuhan bisa berupa terapi farmakologi psikomotor, terapi okupasional, TAK dan rehabilitas.

2. **Diagnosis Keperawatan**

Diagnosis keperawatan yaitu pengambilan keputusan klinis untuk melakukan intervensi dengan faktor berhubungan dan batasan karakteristik disesuaikan dengan keadaan yang ditemukan pada setiap partisipan menurut (NANDA, 2015). Halusinasi persepsi sensori yang dialami oleh pasien mempunyai tahapan dan biasanya tidak dapat mengontrol drinya sehingga dapat ditegakkan Diagnosis yaitu :



3. Intervensi Keperawatan

Menurut (Dinarti, 2017), intervensi keperawatan adalah bagian dari proses keperawatan yang mencakup berbagai intervensi untuk memecahkan masalah dan mengupayakan meningkatkan derajat kesehatan pasien. Perencanaan yang dilakukan dalam suatu rangkaian kegiatan penentuan langkah-langkah pemecahan masalah dan prioritasnya, perumusan tujuan, rencana tindakan, penilaian asuhan keperawatan pada pasien/klien berdasarkan analisis data dan Diagnosis keperawatan. Adapun intervensi yang dilakukan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi meliputi :

Tabel 2.1 Tindakan Keperawatan Pada Halusinasi

Halusinasi	Pasien	Keluarga
	<p>Tindakan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengidentifikasi jenis halusinasi pasien 2) Mengidentifikasi isi halusinasi pasien 3) Mengidentifikasi waktu halusinasi pasien 4) Mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien 5) Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi 6) Mengidentifikasi respons pasien terhadap halusinasi 7) Mengajarkan pasien menghardik halusinasi 8) Menganjurkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dalam jadwal kegiatan harian <p>Tindakan 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2) Memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur 3) Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian 	<p>Tindakan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien 2) Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala halusinasi dan jenis halusinasi yang dialami pasien beserta proses terjadinya 3) Menjelaskan cara-cara merawat pasien <p>Tindakan 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan halusinasi 2) Melatih keluarga melakukan cara merawat langsung kepada pasien

	<p>Tindakan 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2) Melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan (kegiatan yang biasa dilakukan pasien dirumah) 3) Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian <p>Tindakan 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2) Melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain 3) Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian 	<p>halusinasi</p> <p>Tindakan 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu keluarga membuat jadwal aktivitas di rumah termasuk minum obat (<i>discharge planning</i>) 2) Menejlaskan follow up pasien setelah pulang
--	--	---

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi disesuaikan dengan rencana tindakan keperawatan. Strategi penerapan tindakan perawatan jiwa seperti yang ditentukan oleh masing-masing subjek. Strategi melakukan tindakan diawali dengan kontrak langsung dengan pasien untuk membangun hubungan saling percaya, kemudian memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan, dan melibatkan pasien dalam tindakan tersebut. Dokumentasikan semua tindakan yang dilakukan, kemudian tanyakan dan lihat respon pasien (Hafizudiin, 2021).

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah hasil dari tindakan yang dilakukan dan membandingkan respon pasien terhadap tujuan yang diidentifikasi.

Pasien dengan halusinasi pendengaran mampu mengendalikan halusinasinya, tidak bertindak kasar, menjalin hubungan saling percaya, dan pasien dapat minum obat secara teratur (Hafizudiin, 2021).

C. Pendekatan Konsep Teori

1. Teori Dorothy E. Jhonson

Teori Dorothy E. Jhonson berpendapat bahwa individu dipandang sebagai suatu sistem perilaku yang selalu mencapai keseimbangan dan kestabilan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternalnya, serta siap untuk menyesuaikan dan beradaptasi terhadap pengaruh yang terjadi. Sistemnya adalah:

- a. *Achievement*, merupakan tingkat pencapaian prestasi yang dicapai melalui keterampilan yang kreatif.
- b. *Agresif*, merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri atau perlindungan dan berbagai ancaman yang ada dilingkungan.
- c. *Seksual*, merupakan pemenuhan kebutuhan saling mencintai dan dicintai.
- d. *Afiliasi*, merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan tambahan dalam mempertahankan lingkungan yang kondusif dengan penyusuaian dalam kehidupan sosial, keamanan, dan kelangsungan hidup.
- e. Ketergantungan merupakan bagian dari sistem perilaku untuk memperoleh kedamaian, keamanan, dan kepercayaan

2. Teori H.J. Eysenck, J. Wilper dan B.F.Skinner

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model perilaku yang dikembangkan dari H.J. Eysenck, J.Wilper dan B.F.Skinner yaitu model terapi yang berbentuk modifikasi perilaku yang dikembangkan dari teori belajar (*learning theory*). Terapi pada model perilaku yang didapat digunakan dengan cara:

- a. Relaksasi dan *desentisasi*, dapat digunakan bersamaan. Teknik terapi bertujuan untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien.
- b. *Asertif training* adalah teknik pembelajaran yang melibatkan pengungkapan perasaan yang sebenarnya dan tidak menyakiti orang lain.
- c. *Positive training* adalah teknik pemodelan yang memberikan antusiasme dan dorongan untuk melaksanakan kegiatan yang positif, dengan teknik ini pasien dapat mengetahui dan melaksanakan secara individu dan mendorong mereka untuk bisa dan mampu melakukan tindakan positif.
- d. *Self regulasi* adalah seperangkat standar perilaku yang harus dicapai oleh pasien, yang dimana pasien tersebut diminta untuk terlibat dalam melakukan pemanataan terhadap dirinya sendiri setelah seseorang tersebut telah malakukan sesuatu, pasien kemudian dinilai ulang. Sebagai langkah terakhir, pasien diminta untuk mencoba menyemangati dan menguatkan dirinya sesuai dengan perilaku yang positif.

Sehubungan dengan teori perilaku dari H.J. Eysenck, J.Wilper dan B.F.Skinner dengan halusinasi pendengaran adalah terapi belajar. Poin pertama, yaitu terapi *desentisasi* dan relaksasi, seperti halnya terapi Zikir dapat mengurangi kecemasan dan menenangkan jiwa pada penderita halusinasi. Terapi *positive training* yaitu mendorong pasien untuk melakukan perilaku positif, seperti dengan terapi sugerti yaitu memberikan kata-kata positif yang dapat mendorong pasien kearah yang lebih baik.

D. Evidence Based Practice in Nursing (EBPN)

1. Definisi Terapi Zikir

Terapi Zikir merupakan terapi psiko-religious yang menggunakan media Zikir dan bertujuan mengingat Allah SWT untuk menenangkan pikiran dan hati. Dengan bacaan, Istighfar, bertasbih, tahmid, serta takbir. Maka seseorang akan menyerahkan segala permasalahan yang dialami hanya kepada Allah sehingga beban stress yang dirasakan mengalami penurunan (Djamaluddin, 2019). Adapun bacaan Zikir yaitu dengan membaca istighfar sebanyak tiga kali (Astagfirullahal'adzim), membaca tasbih tiga puluh tiga kali (Subhannallah), tahmid (Alhamdulillah) tiga puluh tiga kali, dan takbir tiga puluh tiga kali (Allahu Akbar), dikutip dari (Akbar, 2021).

2. Tujuan Terapi Zikir

Tujuan dari terapi Zikir adalah agar pasien mengetahui bacaan terapi Zikir yang akan dilakukan, pasien mampu memberi respon

terhadap terapi yang diberikan, dan agar pasien dapat mengungkapkan perasaannya setelah mendengarkan terapi. *Setting* (pengaturan) yaitu Perawat dan pasien duduk berhadapan atau perawat duduk disamping pasien namun menjaga jarak dan menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman. Sedangkan alat yang digunakan dalam terapi Zikir yaitu headset, handphone dan rekaman zikir.

3. Indikasi

Terapi Zikir mempunyai dampak positif pada segi fikiran, aktivitas sehari-hari dan juga pada segi spiritual pasien.

4. Kontraindikasi

Tidak terdapat kontraindikasi pada terapi Zikir, karena terapi Zikir merupakan terapi religius dan tidak mempunyai efek samping.

5. Prosedur Terapi Zikir

a. Pra Interaksi

Pra interaksi yaitu merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu komunikasi yang efektif dan membina hubungan saling percaya pada pasien

- 1) Memilih pasien gangguan jiwa
- 2) Bina hubungan saling percaya
- 3) Melakukan kontrak waktu dan tempat
- 4) Persiapan alat serta mempersiapkan tempat kegiatan

b. Orientasi

Fase orientasi yaitu fase dimana perawat melakukan perkenalan kepada pasien agar pasien tersebut lebih dekat serta lebih percaya kepada perawat.

1) Salam Terapeutik

- a) Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri
- b) Menanyakan nama lengkap pasien serta nama sehari-hari pasien
- c) Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan
- d) Menjelaskan langkah-langkah kegiatan
- e) Perawat menanyakan kesiapan pasien
- f) Kontrak waktu dan tempat pada pasien

2) Evaluasi dan Validasi

- a) Perawat melakukan evaluasi terhadap pasien dengan menanyakan apa yang dirasakan pasien setelah dilakukan terapi Zikir

- b) Menanyakan kembali pokok masalah yang dirasakan saat ini

3) Kontrak

- a) Perawat menjelaskan jenis kegiatan dan waktu yang digunakan

- b) Perawat memberitahukan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu dengan mendengarkan dan membaca Zikir

c) Memberitahukan peraturan kegiatan :

1. Pasien hadir ditempat kegiatan yang dilakukan
2. Kegiatannya yaitu berzikir
3. Apabila klien ada keluhan, harus mengangkat tangan terlebih dahulu
4. Klien tidak boleh membuat kegaduhan

c. Tahap Kerja

- 1) Bantu pasien memilih posisi nyaman
- 2) Dekatkan sumber suara dan peralatan dengan klien
- 3) Nyalakan rekaman zikir yang digunakan untuk terapi dan atur volume (jangan terlalu keras)
- 4) Anjurkan pasien untuk bernafas secara alami dan mulai mendengarkan dan meresapi kalimat Zikir yang didengarkan, jika pasien bisa membaca maka berikan kesempatan untuk melafadzkan kalimat Zikir tersebut
- 5) Pasien diberi waktu 10-15 menit
- 6) Arahkan pasien agar tetap fokus dan rileks
- 7) Jika sudah selesai, jangan biarkan pasien langsung berdiri

namun anjurkan untuk duduk sejenak, buka pikiran kembali jika sudah cukup baru persilahkan klien untuk berdiri.

d. Tahap Terminasi Akhir

- 1) Melakukan evaluasi kegiatan

2) Perawat memberikan pujian pada pasien setelah mengikuti kegiatan

e. Tahap Tindak Lanjut

Menganjurkan pasien untuk belajar mengontrol halusinasi dengan melakukan hal-hal positif, jika perlu ketika pasien ada waktu luang maka anjurkan pasien untuk melakukan kegiatan positif seperti sholat, Zikir, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya.

f. Kontrak Waktu Yang Akan Datang

- 1) Pasien menyetujui waktu dan tempat kegiatan
- 2) Pasien menyetujui kegiatan yang akan dilakukan

g. Evaluasi dan Dokumentasi

Tahap terakhir ialah melakukan evaluasi kembali saat proses dilakukannya terapi. Point penting yang dievaluasi saat dilakukannya kegiatan yaitu melihat kemampuan pasien sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan tujuan utama terapi. Dengan mendengarkan terapi Zikir diharapkan pasien mampu mendengarkan dan membaca Zikir, pasien mampu mengikuti terapi Zikir dari awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan, melihat respon pasien setelah dilakukannya terapi Zikir, memberi saran dan mendengarkan terapi Zikir, serta pendokumentasian dilembar evaluasi.

6. Artikel Dan Jurnal Pendukung

Tabel 2.2 Artikel dan Jurnal Pendukung Terapi Zikir

Nama Artikel/Jurnal	Tahun	Nama Penulis	Sumber	Metode	Hasil
Penerapan Terapi Zikir Dalam Penurunan Tingkat Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Skizofrenia RSJD Dr. Soedjarwadi Klaten Provinsi Jawa Tengah (Agung, 2023)	2023	Putro Muhchin Agung Prasetyo, Norman Wijaya Gati, Wahyu Rekno	Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia	Penerapan dilakukan dengan metode deskriptif studi kasus kepada 2 responden pada pasien skizofrenia selama 5 hari dengan frekuensi 2 kali sehari selama 15-30 menit	Berdasarkan hasil penerapan yang sudah dilakukan, terdapat perkembangan kontrol halusinasi sebelum dan sesudah dilakukan penerapan terapi Zikir.
Terapi Psikoreligius : Zikir Pada Pasien Halusinasi Pendengaran (Akbar, 2021)	2021	Akbar, Desi Ariyana Rahayu	Jurnal Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang	Metode deskriptif dengan pendekatan proses keperawatan	Didapatkan hasil yang efektif setelah diberikan terapi psikoreligius : Zikir pada pasien halusinasi pendengaran sebagai upaya pengontrolan halusinasi
Pengaruh Terapi Psikoreligious : Zikir Dalam Mengontrol Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Skizofrenia Yang Muslim Di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau (Pratiwi, 2020)	2020	Pratiwi Gasril, Sasmita, Suryani	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi	Metode kuantitatif dengan pendekatan <i>Quasy expriemental</i>	Terdapat pengaruh terapi psikoreligious : Zikir dalam mengontrol halusinasi pada pasien skizofrenia (p value = 0,000), hasil penelitian ini dapat dijadikan terapi tambahan dalam mengontrol halusinasi pada pasien dengan halusinasi pendengaran
Psikoreligius Terhadap Perubahan Persepsi Sensorik Pada Pasien	2022	R. Nur Abdurakhman, Muhammad Azka	Jurnal Education and Development	Metode kuantitatif dengan pendekatan <i>Quasy expriemental</i>	Hasil penelitian menggunakan uji-t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), artinya

Halusinasi Pendengaran Di Rsud Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Abdurakhman, 2022)		Maulana		dengan pendekatan one group pre and posttest.	terdapat pengaruh terapi psikoreligius : terapi Zikir terhadap perubahan persepsi sensori pada pasien halusinasi pendengaran.
<i>Implementation Of Psychoreligius Therapy : Dhikr To And Ability Overcoming Hallusination</i> (Julita, 2021)	2021	Julita Sari, Dewi Damayanti	Jurnal Keperawatan Poltekkes Palu	Metode pemberian tindakan keperawatan berupa terapi psikoreligius : Zikir	Didapatkan hasil terjadi penurunan tanda dan gejala halusinasi serta peningkatan kemampuan pasien mengatasi halusinasi.

7. Terapi Sugesti

Sugesti adalah cara seseorang dalam memberikan kalimat saran, *support*, serta cara mendorong seseorang untuk melakukan apa yang diarahkan dan diperintahkan. Dengan sugesti seseorang yang diberi sugesti tersebut mematuhi apa yang diperintahkan tanpa berfikir terlebih dahulu. Pemberian sugesti dapat dilakukan dengan cara manusia kepada manusia lain, manusia kepada kelompok manusia, kelompok manusia kepada kelompok manusia lainnya, dan kelompok manusia kepada satu manusia lainnya. Hidayat (2018) mengemukakan sugesti adalah suatu bentuk intervensi relaksasi dengan menggunakan kata-kata bijak yang mampu mempengaruhi orang yang di Sugesti.

Aditya, (2017) mengemukakan bahwa terapi sugesti berkaitan dengan relaksasi, yang dimana merupakan bentuk *hipnosis* dengan menggunakan pendekatan sebagai penanganan penyembuhan.

Kemudian pernyataan berikutnya yaitu 75% sumber emosi dan gangguan mental adalah penyebab dari penyakit fisik. Namun sebagian besar penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dengan terapi farmakologis saja, melainkan harus disertai dengan terapi nonfarmakologis yaitu dengan terapi sugesti yang dapat meringankan penyakit dengan melakukan sugesti pikiran positif dan pikiran alam bawah sadar seseorang.

Intervensi yang berada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan, khususnya pasal 21 ayat (1) huruf m, dimana perawat memiliki kewenangan untuk melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Selain itu, hipnoterapi merupakan intervensi keperawatan yang termasuk dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI PPNI, 2018). Dalam hipnoterapi, kekuatan sugesti dapat menghasilkan efek terapeutik. Sedikitnya terdapat 12 teknik yang bisa digunakan dalam hipnoterapi termasuk teknik direct sugestion.

8. Tujuan Terapi Sugesti

Tujuan dari terapi yang dilakukan adalah untuk menemukan masalah utama yang dapat menyebabkan pola pikir yang berbeda.

Setting (pengaturan) yaitu Perawat dan pasien duduk saling berhadapan atau perawat duduk di samping pasien namun tetap menjaga jarak dan menciptakan lingkungan yang tenang dan kondusif.

Sedangkan alat yang digunakan adalah headset, handphone, terapi sugesti.

9. Indikasi

Terapi sugesti dapat membuka pikiran kearah positif, dan terapi sugesti juga bisa merilekskan tubuh dan menenangkan pikiran.

10. Kontraindikasi

Tidak terdapat kontraindikasi pada terapi sugesti ini, karena terapi sugesti merupakan terapi *hipnoterapi* dan tidak mempunyai efek samping.

11. Prosedur Terapi Sugesti

a. Pra Interaksi

Pra interaksi yaitu merupakan langkah awal dalam melakukan suatu komunikasi yang efektif dan membina hubungan saling percaya pada pasien

- 1) Memilih pasien gangguan jiwa
- 2) Bina hubungan saling percaya
- 3) Melakukan kontrak waktu dan tempat
- 4) Persiapan alat serta mempersiapkan tempat kegiatan

b. Orientasi

Fase orientasi ialah fase dimana perawat melakukan perkenalan kepada pasien agar pasien tersebut lebih dekat serta lebih percaya kepada perawat.

- 1) Salam Terapeutik

- a) Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri
- b) Menanyakan nama lengkap pasien serta nama sehari-hari pasien
- c) Menjelaskan gambaran tindakan yang akan dilakukan kepada pasien
- d) Menjelaskan langkah-langkah kegiatan
- e) Perawat menanyakan kesiapan pasien
- f) Kontrak waktu dan tempat pada pasien

2) Evaluasi dan Validasi

- a) Perawat melakukan evaluasi terhadap pasien dengan menanyakan apa yang dirasakan pasien setelah dilakukan terapi sugesti
- b) Menanyakan kembali pokok masalah yang dirasakan saat ini

c. Kontrak

- 1) Perawat menjelaskan jenis kegiatan dan waktu yang digunakan
- 2) Perawat memberitahukan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu dengan mendengarkan terapi sugesti
- 3) Memberitahukan peraturan kegiatan :
 - a) Pasien hadir ditempat kegiatan yang dilakukan
 - b) Kegiatannya yaitu mendengarkan terapi sugesti
 - c) Apabila pasien ada keluhan, harus mengangkat tangan terlebih dahulu

d) Pasien tidak boleh membuat kegaduhan

d. Tahap Kerja

- 1) Bantu pasien untuk memilih posisi yang nyaman
- 2) Dekatkan sumber suara dan peralatan dengan pasien
- 3) Nyalakan rekaman terapi sugesti yang digunakan untuk terapi dan atur volume (jangan terlalu keras)
- 4) Anjurkan pasien untuk bernafas secara alami dan mulai mendengarkan kalimat **sugesti yang didengarkan dari youtube.**
- 5) Pasien diberi waktu selama 10-15 menit
- 6) Arahkan pasien agar tetap fokus dan rileks
- 7) Jika sudah selesai, jangan biarkan pasien langsung berdiri namun anjurkan pasien untuk duduk sejenak, buka fikiran kembali jika sudah cukup baru persilahkan pasien untuk berdiri

e. Tahap Terminasi Akhir

- 1) Melakukan evaluasi kegiatan
- 2) Perawat memberi pertanyaan tentang perasaan yang di rasakan pasien
- 3) Perawat memberikan pujian pada pasien setelah mengikuti kegiatan

f. Tahap Tindak Lanjut

Menganjurkan pasien untuk belajar mengontrol halusinasi dengan melakukan hal-hal positif, jika perlu ketika pasien ada waktu luang

maka anjurkan pasien untuk melakukan kegiatan positif seperti sholat, Zikir, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya.

g. Kontrak Waktu Yang Akan Datang

- 1) Pasien menyetujui waktu dan tempat kegiatan
- 2) Pasien menyetujui kegiatan yang akan dilakukan

h. Evaluasi dan Dokumentasi

Tahap terakhir ialah melakukan evaluasi kembali saat proses dilakukannya terapi. Point penting yang dievaluasi saat dilakukannya kegiatan yaitu melihat kemampuan pasien sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan tujuan utama terapi.

12. Arikel Dan Jurnal Pendukung

Tabel 2.3 Artikel dan Jurnal Pendukung Terapi Sugesti

Nama Artikel/Jurnal	Tahun	Nama Penulis	Sumber	Metode	Hasil
Pengaruh Terapi Normalitas atau Suportif-Sugestif Terhadap Kekambuhan Pasien Post Psikotik di Puskesmas Medan (Suhardono, 2023)	2023	Suhardono, Taryatmo, M. Nor Mudhofar, Tutik Setyowati	Jurnal Studi Keperawatan	Menerapkan metode <i>Quasy-eksperiment nonequivalent (pre-test and post test control group design</i>	Pengaruh terapi normalitas atau terapi suportif-sugestif terhadap kesembuhan klien dengan gangguan jiwanya diterima.
Hipnoterapi Sugesti Langsung Dan Anchoring Terhadap Penurunan Kecemasan Dan Tingkat Depresi Pada Pasien Odha (Sugiyono, 2021)	2021	Sugiyono, Wati Jumaiya, Dian Novianti, Rohman Azzam	Jurnal Keperawatan Silampari	Menerapkan metode <i>Quasy-eksperiment design</i>	Hasil uji menunjukkan bahwa setelah dilakukan intervensi diperoleh tingkat kecemasan dan depresi pada kelompok intervensi dan kontrol untuk variabel kecemasan p:1.000 (>0,05) dan depresi p: 0,621 (>0,05).

Analisis Penanaman Sugesti Pada Pengobatan Hipnoterapi Sebagai Metode Penyembuhan Gangguan Psikologis (Sehabudin, 2022)	2022	Sehabudin, M. Iqbal Qeis, Puji Anto	Jurnal Kreasi Seni dan Budaya	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif	Dari hasil penelitian ada empat faktor yang mendukung pengobatan hipnoterapi yaitu sugesti dan pembayangan bertujuan untuk memotivasi seseorang, didalamnya pasien akan membayangkan sesuatu yang disarankan oleh terapis hingga timbul visualisasi kreatif dalam pikirannya.
Metode Ruqyah Dan Hipnoterapi Dalam Penyembuhan Gangguan Jiwa di Lembaga El-Psika Al-Amien Prendua (Suhendi, 2020)	2020	Suhendi, Dimas Surya, Febrianto	<i>Indonesia n Journal Of Islamic Psychology</i>	Ruqyah dan hipnoterapi	Terapi penyembuhan sangat efektif karena selain menyentuh pikiran alam bawah sadar juga menyentuh aspek spiritual dengan pendekatan keagamaan.
Efektivitas Hipnoterapi Sebagai Intervensi Untuk Mengurangi Stress Pada Remaja (Azka, 2022)	2022	Azka Aflahatiufus, Aat Sriati, Iwan Shalahuddin	Jurnal Keperawatan Jiwa	Metode yang digunakan adalah narrative review	Efektivitas hipnoterapi untuk mengurangi stres pada remaja dan semua artikel membuktikan efektif. Hal tersebut signifikan berdasarkan hasil uji statistik ANOVA dan <i>t-test</i> yang dilakukan pada setiap artikel.

Gangguan mental sering terjadi karena suatu perilaku yang maladaptif terhadap respon yang diberikan. Untuk menghindari diri dari gangguan mental tersebut perlu di dengar ayat Al-Qur'an, sebagai peringatan kepada manusia untuk selalu berperilaku positif. firman Allah SWT dalam QS. AR-Rad ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Terjemahnya :

“...Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka, mengubah keadaan mereka sendiri...” (Tafsir As-Sa'di)

Adapun tafsir ayat menurut pakar tafsir al-Qur'an, Mengungkapkan bahwa *“Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah satu kaum”*. Berupa kehidupan yang makmur, kenikmatan yang luar biasa, serta curahan kebaikan, sampai mereka mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Dengan melakukan perilaku yang tidak baik atau beralih mengingkari nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya. Sebaliknya perubahan perilaku dari maksiat kepada ketaatan, insyaallah Allah akan mengubah kehidupan yang dialami sebelumnya sensara menuju kebahagiaan. Maka dari itu sejalan dengan surah ini terapi yang di berikan yaitu untuk mengetahui bagaimana keberhasilan dari terapi yang dilaksanakan tergantung dari kemauan untuk mengubah pola pikir dan keinginan untuk sembuh, serta perilaku positif pada orang yang menderita gangguan halusinasi tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Nursalam (2016) menyatakan studi kasus merupakan penelitian yang mencakup pengkajian yang bertujuan untuk melihat gambaran secara teliti, mengenai sifat, latar belakang, dan karakteristik yang ada pada suatu kasus. Dengan begitu studi kasus lebih mengutamakan secara detail dan terperinci. Penelitian secara mendalam untuk melihat kondisi yang dirasakan oleh pasien dengan cara yang sistematis.

B. Subjek Studi Kasus

Pengambilan responden pada penelitian karya tulis ilmiah ini ialah pasien yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.

Kriteria Inklusi pada penelitian ini ialah :

- a. Pasien yang mengalami gangguan persepsi sensori : Halusinasi Pendengaran
- b. Pasien yang telah bersedia jadi responden
- c. Pasien yang bisa di ajak komunikasi dengan kooperatif

Kriteria Eksklusi pada penelitian ini adalah :

- a. Pasien dengan tahapan *Controlling*
- b. Pasien yang mempunyai gangguan *skizofrenia* selain halusinasi

C. Fokus Studi Kasus

Penelitian ini berfokus pada kasus halusinasi dengan melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran menggunakan intervensi terapi Zikir dan terapi sugesti di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen pada karya tulis ini yaitu format proses asuhan keperawatan, rekaman terapi Zikir dan musik religi untuk terapi sugesti dan handphone.

E. Prosedur Pengambilan Data

Penelitian ini mempunyai beberapa langkah-langkah antara lain :

a. Persiapan

Langkah pertama yang dilakukan peneliti ialah melakukan pengajuan judul studi kasus yang berjudul Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan Intervensi Kombinasi Terapi Zikir dan Terapi Sugesti di RSKD Dadi .

b. Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data melalui metode observasi dan wawancara.

c. Penyusunan Laporan

Langkah terakhir yaitu menyusun laporan dengan melakukan penyusunan pengkajian dari data objektif dan data subjektif serta wawancara. Kemudian, penegakan Diagnosis, dan menyusun

perencanaan atau intervensi yang telah dilakukan, implementasi, evaluasi yang terakhir melakukan pendokumentasian dengan bentuk laporan karya tulis ilmiah.

F. Pengambilan Data Studi Kasus

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan di Ruang Sawit RSKD Dadi

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juli-5 Agustus 2023

G. Analisa data dan penyajian data

Analisis data dilakukan sejak peneliti sedang melakukan praktik klinik di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan, pada saat melakukan pengumpulan data sampai dengan data terkumpul semua. Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan fenomena atau fakta, kemudian membandingkan teori yang ada yang selanjutnya dituangkan dalam opini pembahasan. Teknik yang digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban dari penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil intervensi wawancara yang mendalam terhadap pasien. Teknik analisis digunakan dengan cara observasi oleh peneliti dan studi dokumentasi yang menghasilkan data untuk selanjutnya diinterpretasikan oleh peneliti dibandingkan teori yang ada untuk memberikan rekomendasi dalam intervensi tersebut.

Tahapan selanjutnya yaitu menyajikan data. Data yang disajikan dalam bentuk uraian naratif dan sintesis serta tidak kemungkinan ada bentuk pendapat yang dikemukakan dalam

memberikan interpretasi. Selanjutnya data dibahas dan dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya dan secara teoritis dengan perilaku kesehatan penarikan kesimpulan terkait data pengkajian, diagnosis, perencanaan, tindakan dan evaluasi.

H. Etika Studi Kasus

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan izin kepada institusi tempat melakukan penelitian dalam hal ini di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan Ruang Sawit. Peneliti juga menerapkan prinsip-prinsip etik dalam melakukan penelitian guna untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan dampak yang timbul selama kegiatan penelitian (Nursalam, 2014) yaitu:

1. Informed Consent (Persetujuan Responden)

Informed Consent dilakukan dengan persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. *Informed consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden.

2. Anonymity (Tanpa Nama)

Anonymity adalah tindakan untuk menjaga kerahasiaan. Peneliti tidak mencantumkan nama responden, sehingga pada kuesioner responden hanya ada kode/inisial yaitu Tn "S".

3. *Beneficience* (manfaat)

Dalam sebuah penelitian hal tersebut menyangkut tentang bagaimana intervensi latihan yang akan diberikan kepada pasien apakah hal tersebut memberi manfaat dan tidak merugikan pasien. Dalam penelitian ini tetap mengedepankan prinsip tindakan keperawatan yang sesuai dengan prosedur dan menjelaskan manfaat yang didapatkan oleh pasien saat mengikuti terapi yang akan diberikan.

4. *Confidentially* (Kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian, yang tidak termasuk data yang dibutuhkan peneliti tidak akan dipresentasikan pada saat hasil serta kuesioner yang sudah digunakan peneliti mengukur kecemasan melalui responden akan dihilangkan setelah selesai presentasi hasil.

BAB IV

LAPORAN KASUS

RUANG RAWAT : Sawit
TANGGAL DIRAWAT : 14 Juli 2023

A. PENGKAJIAN

I. IDENTITAS KLIEN

Inisial : Tn. S (L)
Tanggal pengkajian : 24 Juli 2023
Umur : 19 Tahun
RM No. : 20.42.60
Informan : Klien dan Ibu Klien

II. ALASAN MASUK :

Seorang laki-laki, usia 19 Tahun diantar ke IGD RSKD Dadi oleh ibunya untuk pertama kalinya dengan keluhan mengamuk, dialami sejak 2 minggu. Pasien menghancurkan perabotan dapur, berteriak-teriak di dalam rumah, berbicara sendiri, dan menganggap dirinya memiliki istri, anak dan memiliki uang banyak. Pasien juga sering memukul ibunya di rumah. Awal perubahan perilaku dialami sejak sekitar 3 tahun lalu, saat itu pasien selalu sembunyi, takut bertemu orang-orang dan merasa mau dicelakai oleh orang-orang. Ibu pasien mengatakan penyebab perubahan perilaku diduga akibat pacarnya saat itu menikah dengan pria lain. Sejak itu, pasien mulai sering melamun dan mulai tampak perubahan perilaku. Pasien pernah berobat jiwa satu kali di poli jiwa RSKD Dadi, namun keluarga tidak mengetahui nama obat yang diberikan. Setelah itu berobat di RS Gowa namun pasien tidak mau lagi minum obatnya.

III. FAKTOR PREDISPOSISI

1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu?

Ya Tidak

2. Pengobatan sebelumnya

Berhasil Kurang berhasil Tidak berhasil

3. Riwayat Kekerasan

	Pelaku/Usia	Korban/Usia	Saksi/Usia
Aniaya fisik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aniaya seksual	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Penolakan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	Pelaku/Usia	Korban/Usia	Saksi/Usia
Kekerasan dalam keluarga	<input checked="" type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tindakan Kriminal	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Jelaskan No. 1, 2, 3 :

1. Pasien pernah berobat jiwa satu kali di poli jiwa RSKD Dadi
2. Pasien mengatakan berhenti mengonsumsi obatnya karena merasa pasien sudah sembuh sehingga pasien diantar kembali ke IGD RSKD Dadi karena kekambuhan dari gangguan jiwa pasien
3. Pasien juga sering memukul ibunya dirumah

Masalah Keperawatan : Risiko Perilaku Kekerasan

4. Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa

Ya Tidak

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

5. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan

Jelaskan : Pasien mengatakan pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan yaitu pacarnya menikah dengan pria lain

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

IV. FISIK


1. Tanda vital : TD : 120/80 mmHg , N: 86x/m , S: 36,3°C , P: 20x/m
2. Ukur : TB: 165 Cm, BB: 50 Kg

3. Keluhan fisik : Ya Tidak
 Jelaskan : Tidak ada keluhan fisik

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

V. PSIKOSOSIAL

1. Genogram :



Jelaskan : Pola komunikasi, pola asuh, dan pengambilan keputusan.

Pasien mengatakan komunikasi sebelum terjadi gangguan jiwa yang dideritanya terjalin dengan baik dan saling terbuka dengan ibu dan adiknya, namun setelah pasien mengalami gangguan jiwa pasien sudah jarang berkomunikasi dengan ibu dan adiknya. Pola asuh pasien mengatakan yang merawat pasien selama ini adalah ibu dan adiknya. Dan pengambilan keputusan berasal dari ibunya.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

2. Konsep diri

- a. Gambaran diri : pasien mengatakan menyukai seluruh anggota tubuhnya.
- b. Identitas : pasien mengetahui dirinya sebagai anak dan dahulu pernah sekolah dan sekarang pasien merasa dirinya sudah sembuh dari penyakitnya, pasien bersyukur dan puas menjadi laki-laki.
- c. Peran : pasien mengatakan dalam keluarganya sebagai laki-laki dan merasa sering membantu keluarganya.
- d. Ideal diri : harapan pasien ingin cepat sembuh agar dapat berkumpul kembali bersama keluarganya di kampung.
- e. Harga diri : pasien mengatakan dirinya merasa berharga karena sering membantu keluarganya.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

3. Hubungan Sosial

- a. Orang yang berarti : pasien mengatakan orang yang berarti dalam hidupnya adalah keluarganya.
- b. Peran serta dalam kegiatan kelompok/masyarakat : pasien mengatakan sebelum sakit, pasien sering melakukan kerja bakti di masyarakat
- c. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain : pasien mengatakan tidak ada hambatan dalam bersosialisasi dengan orang lain karena pasien sering mengikuti kegiatan di masyarakat.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

4. Spritual :

- a. Nilai dan keyakinan : pasien beragama islam dan pasien mengatakan meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan kita kesembuhan.
- b. Kegiatan Ibadah : pasien mengatakan rajin sholat 5 waktu.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

VI. SATUS MENTAL

1. Penampilan

- Tidak rapih Penggunaan pakaian tidak sesuai cara berpakaian seperti biasanya

Jelaskan : penampilan pasien dari ujung kaki sampai ujung kepala terlihat rapi, dan penggunaan pakaian sesuai dengan semestinya.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

2. Pembicaraan

- Cepat Keras Gagap Inkoheren

- Apatis Lambat Membisu Tidak mampu memulai pembicaraan

Jelaskan : Pasien mampu berkomunikasi dan suara pasien jelas dan dapat dimengerti.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

3. Aktivitas Motorik :

- Lesu Tegang Gelisah Agitasi
 Tik Grimasen Tremor Kompulsif

Jelaskan : Pasien nampak agak gelisah

Masalah Keperawatan : Halusinasi Pendengaran

4. Alam Perasaan

- Sedih ketakutan Putus asa Khawatir Gembira berlebihan

Jelaskan : Pasien mengatakan khawatir tentang hidupnya karena harus terus meminum obat agar bisa beraktivitas seperti biasa.

Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah

5. Afek

- Datar Tumpul Labil Tidak sesuai

Jelaskan : Pasien memiliki emosi yang tidak stabil, pasien sering mengamuk di ruangan.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

6. Interaksi selama wawancara

- Bermusuhan Tidak kooperatif Masalah tersinggung
 Kontak mata (-) Defensif Curiga

Jelaskan : Selama berbicara pasien tampak kadang tidak menatap mata lawan bicara. Pasien tampak kadang bicara sendiri.

Masalah Keperawatan : Halusinasi Pendengaran

7. Persepsi

- Pendengaran Penglihatan Perabaan
 Pengecepan Penghidu

Jelaskan : Pasien mengatakan sering mendengar suara pacarnya dan kadang suara samar-samar, pasien mengatakan mendengar bisikan untuk menyuruh pasien membunuh oran kafir. Pasien mengatakan mendengar suara bisikan kadang 2-3 kali sehari.

Masalah Keperawatan : Halusinasi Pendengaran

8. Proses Pikir

- Sirkumtansial Tangensial Kehilangan asosiasi
 Flight of idea *Blocking* pengulangan pembicaraan/persevarasi

Jelaskan : Pasien tampak berbelit-belit saat berbicara, pasien tampak mengulang-ulang pembicaraan saat berinteraksi.

Masalah Keperawatan : Halusinasi Pendengaran

9. Isi Pikir

- Obsesi Fobia Hipokondria
 Depersonalisasi Ide yang terkait Pikiran Magis
Waham
 Agama Somatik Kebesaran Curiga
 Nihilistic Sisip pikir siar pikir Kontrol pikir

Jelaskan : Pasien tidak memiliki gangguan pada isi pikir dan waham

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

10. Tingkat Kesadaran

- Bingung Sedasi Stupor
Disorientasi
 Waktu Tempat Orang

Jelaskan : Pasien tidak memiliki gangguan pada tingkat kesadaran dan disorientasi waktu, tempat, orang.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

11. Memori

- Gangguan daya ingat jangka panjang Gangguan daya ingat jangka pendek
 Gangguan daya ingat saat ini Konfabulasi

Jelaskan : Pasien mengingat kejadian jangka panjang dan jangka pendek

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

12. Tingkat Konsentrasi dan berhitung

- Mudah beralih Tidak mampu konsentrasi Tidak mampu berhitung

Jelaskan : Konsentrasi pasien mudah teralihkan. Saat berinteraksi dengan pasien, pasien tiba-tiba menghentikan komunikasi kemudian meminta uang.

13. Kemampuan penilaian

- Gangguan ringan Gangguan ringan

Jelaskan : Pasien dapat menilai dan mengambil keputusan

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

14. Daya Tilik Diri

- Mengingkari penyakit yang diderita Menyalahkan hal-hal diluar dirinya

Jelaskan : Pasien mengetahui penyakitnya

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

VII. KEBUTUHAN PERSIAPAN PULANG

1. Makan

- Bantuan minimal Bantuan total

Jelaskan : Pasien mengatakan makan tanpa bantuan, pasien mampu menyiapkan makanannya sendiri, pasien makan 3x sehari dengan jenis sayur dan lauk yang bervariasi, pasien mengatakan suka makan bakso dan tidak ada pantangan makanan.

2. BAB/BAK

Bantuan minimal Bantuan total

Jelaskan : Pasien melakukan BAB/BAK di WC dan dapat melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain.

3. Mandi

Bantuan minimal Bantuan total

Jelaskan : Pasien mengatakan mandi 2 kali sehari saat pagi dan sore hari, pasien mengatakan sikat gigi ketika mandi, pasien mengatakan mencuci rambut setiap kali mandi, kuku pasien tampak bersih.

4. Berpakaian/berhias

Bantuan minimal Bantuan total

Jelaskan : Penampilan pasien tampak bersih dan pasien mengatakan sering mengganti pakaiannya dalam sehari 2 kali secara mandiri.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

5. Istirahat dan tidur

Tidur siang lama : 13.00 WITA s/d 14.00 WITA

Tidur malam lama : 21.00 WITA s/d 06.00 WITA

Kegiatan sebelum/sesudah tidur : Pasien mengatakan sebelum dan sesudah tidru selalu mencuci mukanya.

6. Punggunaan obat

Bantuan minimal Bantuan total

Jelaskan : Tampak perawat memberikan obat minum kepada pasien.

7. Pemeliharaan Kesehatan

Perawatan lanjutan Ya Tidak

Perawatan pendukung Ya Tidak

8. Kegiatan di dalam rumah

Mempersiapkan makanan Ya Tidak

Menjaga kerapian rumah Ya Tidak

Mencuci pakaian Ya Tidak

Pengaturan pakaian Ya Tidak

9. Kegiatan di luar rumah

- Belanja Ya Tidak
Transportasi Ya Tidak
Lain-lain Ya Tidak

Jelaskan : Pasien mengatakan mampu mengolah makanan, pasien mengatakan saat dirumah kadang menyapu dan mengepel, pasien mengatakan ketika pakaian sudah dilipat maka dimasukkan dan diatur dilemari. Pasien mengatakan sering belanja di warung dan bisa mengendarai motor.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

VIII. MEKANISME KOPING

Adaptif

- Bicara dengan orang lain
 Mampu menyelesaikan masalah
 Tehnik relaksasi
 Aktivitas konstruktif
 Olahraga
 Lainnya

Maladaptif

- Minum alkohol
 Reaksi lambat/belebi
 Bekerja berlebihan
 Menghindar
 Mencederai diri
 Lainnya

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

IX. MASALAH PSIKOSOSIAL DAN LINGKUNGAN

- Masalah dengan dukungan kelompok, spesifik : Tidak ada masalah
 Masalah berhubungan dengan lingkungan, spesifik : Takut tidak disukai
 Masalah dengan pendidikan, spesifik : Tidak ada masalah
 Masalah dengan pekerjaan, spesifik : Tidak ada masalah
 Masalah dengan perumahan, spesifik : Tidak ada masalah
 Masalah ekonomi, spesifik : Tidak ada masalah
 Masalah dengan pelayanan kesehatan, spesifik : Tidak ada masalah
 Masalah lainnya, spesifik : Tidak ada masalah

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

X. PENGETAHUAN KURANG TENTANG

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Penyakit jiwa | <input type="checkbox"/> Sistem pendukung |
| <input type="checkbox"/> Faktor predisposisi | <input type="checkbox"/> Penyakit fisik |
| <input type="checkbox"/> Koping | <input checked="" type="checkbox"/> Obat-obatan |
| <input type="checkbox"/> Lainnya | |

Jelaskan : Pasien mengatakan pernah putus obat karena sudah merasa sehat

XI. ASPEK MEDIK

Diagnosis Medik : Skizofrenia

Terapi Medik :


1. *Risperidone* 2 mg/12 jam/oral
2. *Clozapine* 25 mg/24 jam/oral

XII. ANALISA DATA

Tabel 4.1 Analisa Data

No	Data	Masalah
1	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu pasien mengatakan pasien sering berteriak-teriak didalam rumah, berbicara sendiri, menganggap dirinya memiliki istri, anak dan memiliki uang banyak 2. Pasien mengatakan sering mendengar suara pacarnya dan kadang suara samar-samar kadang di malam hari, subuh, dan siang hari waktunya tidak menentu. Pasien mengatakan mendengar bisikan untuk menyuruh pasien membunuh orang kafir, pasien mengatakan mendengar suara bisikan kadang 2-3 kali sehari. <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien nampak gelisah. 2. Selama berbicara pasien tampak kadang tidak menatap mata lawan bicara. Pasien tampak kadang bicara sendiri. 3. Pasien tampak berbelit-belit saat berbicara, pasien tampak mengulang-ulang pembicaraan saat berinteraksi. 4. Pasien tampak mondar-mandir 	Halusinasi Pendengaran
2	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan khawatir tentang hidupnya karena harus terus meminum obat agar bisa beraktivitas seperti biasa. 2. Ibu pasien mengatakan sebelum pasien di bawah ke RSKD Dadi pasien takut bertemu orang-orang dan merasa mau dicelakai oleh orang-orang. Ibu pasien mengatakan penyebab perubahan perilaku diduga akibat pacarnya saat itu menikah dengan pria lain 3. Pasien mengatakan takut tidak disukai <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien nampak khawatir 2. Pasien nampak sedih dan ketakutan 	Harga Diri Rendah
3	<p>Faktor Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan kadang mendengar suara untuk disuruh membunuh orang kafir 2. Pasien sering mengamuk di ruangan 3. Tampak luka dan kemerahan ditangan pasien 	Risiko Perilaku Kekerasan

XIII. POHON MASALAH



B. DIAGNOSIS KEPERAWATAN

1. Halusinasi Pendengaran
2. Risiko Perilaku Kekerasan
3. Harga Diri Rendah

C. INTERVENSI KEPERAWATAN

Inisial Pasien : Tn. S

Umur : 19 Tahun

Ruangan : Sawit

No. RM : 20.42.60

Tabel 4.2 Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis	Intervensi Keperawatan		Rasional
		Kriteria Evaluasi	Tindakan Keperawatan	
1	Halusinasi Pendengaran	Setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan persepsi sensori membaik dengan kriteria hasil : 1. Verbalisasi merasakan sesuatu dengan indera pendengaran menurun 2. Mendengar bisikan menurun 3. Mondar-mandir menurun	Tindakan 1. Identifikasi Jenis halusinasi 2. Identifikasi isi halusinasi 3. Mengidentifikasi waktu halusinasi pasien 4. Mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien 5. Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi 6. Mengidentifikasi respon pasien terhadap halusinasi 7. Mengajarkan pasien menghardik halusinasi 8. Mengajarkan pasien memasukkan cara menghardik dalam kegiatan harian	Tindakan 1. Untuk mengetahui halusinasi pada pasien 2. Untuk mengetahui isi halusinasi pada pasien 3. Untuk mengetahui kapan terjadi halusinasi pada pasien 4. Untuk mengetahui berapa sering terjadinya halusinasi pada pasien 5. Untuk mengetahui penyebab apa yang dapat menimbulkan halusinasi pada pasien 6. Untuk mengetahui respon pasien terhadap halusinasi yang dihadapinya 7. Untuk mengusir halusinasi pada pasien 8. Untuk membiasakan diri pasien mengusir halusinasi secara mandiri.

		<p>Tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur 3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian <p>Teknik Relaksasi: Terapi Zikir dan Terapi Sugesti</p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi masalah yang dialami <p>Terapeutik :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buat kontrak dengan pasien ▪ Ciptakan ruangan yang tenang dan nyaman <p>Edukasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anjurkan berzikir dan selalu berfikir positif 	<p>Tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui kegiatan harian pasien 2. Agar pasien dapat mengetahui pentingnya minum obat secara teratur 3. Agar pasien dapat minum obat secara teratur <p>Teknik Relaksasi: Terapi Zikir dan Terapi Sugesti</p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mengetahui masalah yang dialami oleh pasien <p>Terapeutik :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mengetahui waktu luang pasien ▪ Agar pasien lebih tenang dan nyaman saat di berikan terapi <p>Edukasi :</p> <p>Agar pasien lebih dekat dengan sang pencipta dan merasa lebih tenang dan rileks dan dapat berfikir positif.</p>
		<p>Tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan (kegiatan yang biasa dilakukan pasien di rumah) 3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian <p>Teknik Relaksasi: Terapi Zikir dan Terapi Sugesti</p> <p>Observasi:</p>	<p>Tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui kegiatan harian pasien 2. Agar gangguan halusinasi pada pasien dapat teralihkan dengan kegiatan positif klien 3. Agar pasien lebih terbiasa meakukan kegiatan ,, positif dan teralihkan dari halusinasinya <p>Teknik Relaksasi: Terapi Zikir dan Terapi Sugesti</p> <p>Observasi:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi masalah yang dialami <p>Terapeutik :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buat kontrak dengan pasien ▪ Ciptakan ruangan yang tenang dan nyaman <p>Edukasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anjurkan berzikir dan selalu berfikir positif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mengetahui masalah pasien <p>Terapeutik :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mengetahui jadwal waktu luang pasien ▪ Agar pasien lebih nyaman dan tenang <p>Edukasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agar pasien dapat dekat dengan Sang Pencipta dan merasa rileks.
		<p>Tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap- cakap dengan orang lain 3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian <p>Terapi Sugesti</p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi masalah yang dialami <p>Terapeutik :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buat kontrak dengan pasien ▪ Ciptakan ruangan yang tenang dan nyaman <p>Edukasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anjurkan berzikir dan selalu berfikir positif (membangkitkan kehendak, penalaran, percaya diri dan penguatan ide agar peduli terhadap kesembuhan diri pasien) 	<p>Tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui kegiatan harian pasien 2. Agar pasien dapat mengetahui penggunaan obat secara teratur 3. Agar pasien dapat terbiasa menjadwalkan minum obat. <p>Teknik Relaksasi: Terapi Zikir dan Terapi Sugesti</p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mengetahui masalah pasien <p>Terapeutik :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mengetahui jadwal waktu luang pasien ▪ Agar pasien lebih nyaman dan tenang <p>Edukasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agar pasien dapat dekat dengan Sang Pencipta dan merasa rileks

D. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPERAWATAN

Inisial Pasien : Tn. S

Ruangan : Sawit

Umur : 19 Tahun

No. RM : 20.42.60

Tabel 4.3 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

No	Diagnosis	Waktu	Implementasi	Evaluasi
1	Halusinasi Pendengaran	Senin, 24 Juli 2023 11.00 WITA	Tindakan <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi jenis halusinasi Hasil : Pasien mengatakan bahwa mendengar suara pacarnya dan kadang suara samar-samar. Mengidentifikasi isi halusinasi Hasil : Pasien mengatakan mendengar bisikan untuk menyuruh pasien membunuh orang kafir Mengidentifikasi waktu halusinasi pasien Hasil : Pasien mengatakan waktu halusinasinya muncul tidak menentu Mengidentifikasi frekuensi halusinasi Hasil : Pasien mengatakan mendengar suara bisikan kadang 2-3 kali sehari Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi Hasil : Pasien mengatakan jika sendiri dan ketika mengingat pengalaman yang tidak menyenangkan Mengidentifikasi respon pasien terhadap halusinasi Hasil : Pasien mengatakan sangat terganggu Mengajarkan pasien menghardik halusinasi 	24 Juli 2023 (Pukul 13.30 WITA) S : Pasien mengatakan mendengar suara pacarnya dan kadang suara samar-samar 2 kali sehari yaitu malam dan subuh O : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak gelisah - Pasien tampak berbicara sendiri - Pasien mampu mengidentifikasi, jenis, isi, waktu dan frekuensi halusinasinya - Pasien mampu mencontohkan cara menghardik yang diajarkan - Pasien memasukkan cara menghardik pada jadwal kegiatan harian A : Halusinasi pendengaran belum teratasi P : Lanjutkan intervensi <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien Ajarkan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur Anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal harian Ajarkan membaca terapi Zikir dan terapi

			<p>Hasil : Perawat mengajarkan cara menghardik halusinasi</p> <p>8. Menganjurkan pasien memasukkan cara menghardik dalam kegiatan harian</p> <p>Hasil : Terapi menghardik ditambahkan dalam kegiatan harian pasien</p>	sugesti
		<p>Selasa, 25 Juli 2023 09.30 WITA</p>	<p>Tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi jadwal harian pasien Hasil : Pasien mengatakan sudah mampu menghardik 2. Mengajarkan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur Hasil : Pasien mengatakan paham terhadap penjelasan yang disampaikan, dan pasien mengatakan mengonsumsi obat secara teratur yaitu 2 kali sehari pagi dan malam 3. Mengajarkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian Hasil : Pasien mengerti dan mengatakan akan memasukkan kejadwal kegiatan harian 	<p>25 Juli 2023 (Pukul 14.00 WITA)</p> <p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan mengerti tentang pentingnya minum obat secara teratur - Pasien mengatakan masih mendengar suara tetapi sudah berkurang yaitu sekali sehari yaitu pada malam hari - Pasien mengatakan mengonsumsi obat 2 kali sehari yaitu pagi dan malam <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak masih gelisah - Pasien mampu mencontohkan cara menghardik yang diajarkan - Pasien paham terkait manfaat minum obat secara teratur <p>A : Halusinasi pendengaran belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Latih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain 3. Anjurkan terapi Zikir dan terapi sugesti 4. Anjurkan pasien memasukkan kejadwal harian

	Rabu, 26 Juli 2023 09.30 WITA	<p>Tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi jadwal harian pasien Hasil : Pasien mengatakan sudah minum obat secara teratur 2. Melatih pasien mengendalikan halusinasinya dengan bercakap-cakap dengan orang lain Hasil : Pasien mengatakan sering bercakap-cakap dengan pasien lain diruangannya terlebih ketika halusinasinya muncul 3. Mengajarkan pasien membaca terapi Zikir dan terapi sugesti Hasil : Pasien diperdengarkan bacaan Zikir dan terapi sugesti 4. Mengajarkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian 5. Hasil : Perawat mengajarkan pasien untuk memasukkan kedalam jadwal kegiatan hariannya dan respon pasien mengatakan akan memasukkan kejadwal kegiatan harian 	<p>26 Juli 2023 (Pukul 14.00 WITA)</p> <p>S : Pasien mengatakan masih mendengar suara sekali pada malam hari</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mampu mencontohkan cara menghardik yang diajarkan - Pasien paham terkait manfaat minum obat secara teratur - Pasien tampak bercakap-cakap dengan pasien lain diruangannya <p>A : Halusinasi pendengaran belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Latih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan 3. Anjurkan terapi Zikir dan terapi sugesti 4. Anjurkan pasien memasukkan kejadwal harian.
	Jum'at, 28 Juli 2023 09.30 WITA	<p>Tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien Hasil : Pasien mengatakan belum mampu berZikir 2. Melatih pasien mengendalikan halusinasinya dengan melakukan kegiatan yang biasa pasien lakukan di rumah Hasil : Pasien melakukan kegiatan yaitu membersihkan tempat tidur, menyapu dan memungut sampah 3. Mengajarkan pasien membaca Zikir dan terapi 	<p>28 Juli 2023 (Pukul 13.00 WITA)</p> <p>S : Pasien mengatakan masih mendengar suara pacarnya 5 menit yang lalu</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak berbicara sendiri dan beberapa kali kata sayang diucapkan - Pasien mampu mencontohkan cara menghardik - Pasien paham terkait manfaat minum obat secara teratur

			<p>sugesti</p> <p>Hasil : Pasien melafadzkan Zikir yaitu Astaghfirullah 3x, Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahuakbar 33x</p> <p>4. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian</p> <p>Hasil : Pasien mengatakan akan memasukkan cara mengontrol halusinasi kejadwal harian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak bercakap-cakap dengan pasien lain diruangannya - Pasien mampu melakukan kegiatan harian yaitu membersihkan tempat tidur, menyapu dan memungut sampah - Pasien mampu berZikir <p>A : Halusinasi pendengaran belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Latih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan (terapi Zikir dan terapi sugesti) 3. Anjurkan pasien memasukkan kejadwal harian.
	Sabtu, 29 Juli 2023 09.30 WITA	<p>Tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Melatih pasien mengendalikan halusinasinya dengan melakukan kegiatan (terapi Zikir dan terapi sugesti) 3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian <p>Hasil : Pasien mengatakan sudah bisa berZikir</p> <p>Hasil : Pasien diajak untuk berZikir dan mendengarkan terapi sugesti dan pasien tampak melafadzkan Zikir yaitu Astaghfirullah 3x, Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahuakbar 33x</p> <p>Hasil : Perawat menjelaskan untuk kontrak kembali pada hari senin, tanggal 31 Juli 2023 untuk melakukan terapi Zikir dan terapi sugesti</p>	<p>29 Juli 2023 (Pukul 13.00 WITA)</p> <p>S : Pasien mengatakan masih mendengar suara bisikan yaitu tadi malam dan subuh</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mampu mencontohkan cara menghardik - Pasien paham terkait manfaat minum obat secara teratur - Pasien tampak bercakap-cakap dengan pasien lain diruangannya - Pasien mampu melakukan kegiatan harian yaitu membersihkan tempat tidur, menyapu dan memungut sampah - Pasien mampu berZikir <p>A : Halusinasi pendengaran belum teratasi</p>	

			guna mengendalikan halusinasi pasien. Dan pasien mengatakan bersedia untuk diberikan terapi Zikir dan terapi sugesti kembali dan akan memasukkan ke jadwal kegiatan harian	P : Lanjutkan intervensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Latih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan (terapi Zikir dan terapi sugesti) 3. Anjurkan pasien memasukkan kejadwal harian.
	Senin, 31 Juli 2023 09.30 WITA	Tindakan <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan kegiatan harian Hasil : Pasien mampu menghardik, minum obat secara teratur, bercakap-cakap, dan melakukan kegiatan harian 2. Melatih pasien mengendalikan halusinasinya dengan melakukan kegiatan (terapi Zikir dan terapi sugesti) Hasil : Pasien tampak melafadzkan Zikir dan menghayati terapi sugesti yang diperdengarkan 3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian Hasil : Pasien mengatakan ia akan memasukkan kejadwal kegiatan hariannya 	31 Juli 2023 (Pukul 13.00 WITA) S : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan senang dapat berZikir sendiri dan merasa bisa lebih tenang setelah mendengar terapi sugesti karena menganggap dirinya termotivasi ke hal-hal positif dan bisa lebih bersemangat lagi - Pasien mengatakan halusinasinya tidak muncul lagi. Pasien mengatakan telah menerapkan 4 cara yang telah diajarkan termasuk berZikir baik saat halusinasinya muncul maupun dalam kegiatan sehari-harinya O : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mampu mencontohkan cara menghardik - Pasien paham terakait manfaat minum obat secara teratur - Pasien tampak bercakap-cakap dengan pasien lain diruangannya - Pasien mampu melakukan kegiatan harian yaitu membersihkan tempat tidur, 	

				<p>menyapu dan memungut sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mampu berZikir - Pasien tampak lebih fokus dan bersemangat <p>A : Halusinasi pendengaran terkendali</p> <p>P : Optimalkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Latih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan (terapi Zikir dan terapi sugesti) 3. Anjurkan pasien memasukkan kejadwal harian.
		Rabu, 2 Agustus 2023 09.30 WITA	<p>Tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan kegiatan harian Hasil : Pasien mampu menghardik, meminum obat secara teratur, bercakap-cakap, dan melakukan kegiatan harian 2. Melatih pasien mengendalikan halusinasinya dengan melakukan kegiatan (terapi Zikir dan terapi sugesti) Hasil : Pasien tampak melafadzkan Zikir dan menghayati terapi sugesti yang diperdengarkan 3. Menilai apakah halusinasi terkontrol Hasil : Pasien mengatakan saat ini halusinasinya tidak muncul lagi 	<p>2 Agustus 2023 (Pukul 13.00 WITA)</p> <p>S : Pasien mengatakan halusinasinya sudah 3 hari tidak muncul lagi sejak hari senin, pasien mengatakan selalu menerapkan 4 cara yang telah diajarkan termasuk berZikir baik saat halusinasinya muncul maupun dalam kegiatan sehari-hari</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mampu mencontohkan cara menghardik - Pasien paham terakait manfaat minum obat secara teratur - Pasien tampak bercakap-cakap dengan pasien lain diruangannya - Pasien mampu melakukan kegiatan harian - Pasien mampu berZikir

				<p>- Pasien tampak lebih fokus dan bersemangat</p> <p>A : Halusinasi pendengaran terkendali</p> <p>P : Optimalkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Latih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan (terapi Zikir dan terapi sugesti) 3. Anjurkan pasien memasukkan kejadwal harian.
--	--	--	--	--

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

1. Analisis Pengkajian Keperawatan

Pengkajian yang dilakukan pada tanggal 14 Juli 2023, pada pasien Tn "S" berumur 19 tahun diruangan Sawit. Gangguan jiwa yang dialami oleh pasien yaitu terjadi persepsi sensori : Halusinasi Pendengaran, yang diakibatkan oleh ketidaktahuan akan obat yang seharusnya diminum pasien, namun pasien berhenti karena sudah menganggap dirinya sehat sehingga terjadi kekambuhan. Ketika kekambuhan atau tanda-tanda *relaps* itu muncul pasien dapat berperilaku menyimpang seperti mengamuk, bertindak anarkis atau bahkan lebih buruk lagi, pasien dapat merugikan dan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain yang berada di lingkungannya. Kekambuhan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dukungan keluarga, kepatuhan minum obat dan dukungan lingkungan sekitar (Mariani, 2019).

Berdasarkan hasil anamnesa, pasien diantar ke IGD RSKD Dadi oleh ibunya karena pasien menghancurkan perabotan dapur, berteriak-teriak didalam rumah dan berbicara sendiri, pasien juga sering memukul ibunya di rumah. Menurut Putri (2016) salah satu faktor terjadinya kekambuhan gangguan jiwa adalah ketidakpatuhan minum obat. Oleh karena itu perlu

dukungan keluarga dan juga lingkungan sekitarnya dalam mengawasi secara intensif pada penderita gangguan jiwa untuk selalu patuh minum obat secara teratur, sehingga pasien merasa memiliki semangat dari keluarga maupun dari orang di sekitarnya.

Hasil pengkajian fisik didapatkan tanda-tanda vital TD : 120/80 mmHg, Nadi : 86x/m, P : 20x/m, dan S : 36,3 °C. Untuk ukuran BB : 50 kg, serta TB: 165 cm. Dari hasil pengkajian status mental pada poin aktivitas motorik pasien terkadang masih sering terlihat gelisah. Pada poin interaksi selama wawancara pasien tampak kadang tidak menatap mata lawan bicara dan pasien tampak kadang bicara sendiri. Dan pasien juga mudah beralih yang dimana saat dilakukan wawancara, pasien tiba-tiba menghentikan komunikasi kemudian meminta uang. Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan di RSKD yaitu terdapat ± 200 orang yang menderita gangguan halusinasi berada di RSKD, dan di ruang sawit sendiri sendiri ± 20 orang

yang menderita gangguan halusinasi. Menurut Rohana (2019) gangguan perhatian atau komunikasi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang diderita pasien. Penderita dengan gejala ini mengalami kesulitan berkonsentrasi pada suatu objek.

Begitu pula saat berkomunikasi, pasien akan lebih mudah mengalihkan pembicaraan dan lebih mengungkapkan sesuai dengan apa yang ada di pikirannya.

Hasil pengkajian yang telah dilakukan menunjukkan kesamaan teori dengan perilaku maladaptif yang berhubungan dengan halusinasi. Yang dimana halusinasi yaitu suatu kondisi terjadinya respon yang tidak bagus pada seseorang yang berada pada rentan respon neurologis. Pemikiran respon pada halusinasi akan mengakibatkan maladaptif yang biasanya mengakibatkan penderita mendengar bunyi suara meminta tolong, menyuruh mereka melakukan sesuatu, suara-suara yang mengomentari perilaku mereka atau perintah untuk menyakiti tubuh mereka atau membunuh orang di sekitar mereka (Akbar, 2021).

Menurut Sutejo (2017) mengemukakan halusinasi adalah suatu kondisi dimana pasien merasakan perubahan sensori yang disebabkan oleh rangsangan yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan menurut Stuart dalam kutipan Azizah (2016) mengatakan bahwa persepsi pasien terhadap lingkungannya terjadi tanpa adanya rangsangan, sehingga pasien menginterpretasikan sesuatu yang tidak nyata atau distimulus atau rangsangan dari lingkungannya.

Jadi halusinasi adalah suatu khayalan atau ilusi yang tidak nyata pada seseorang dan menyebabkan orang tersebut terjebak dalam dunianya sendiri tanpa adanya rangsangan atau stimulus dari luar, dan mengungkapkan bahwa apa ilustrasikan itu benar adanya.

2. Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah pengambilan keputusan klinis untuk melakukan intervensi dengan faktor berhubungan dan batasan karakteristik sesuai dengan situasi masing-masing partisipan menurut NANDA (2015). Diagnosis utama dalam penelitian ini adalah halusinasi pendengaran, dimana pasien mengatakan kadang-kadang mendengar suara pacarnya dan suara samar-samar sehingga pasien tidak menyadari bahwa dirinya sedang berjalan dan mondar-mandir yang dibuktikan dengan buku rekam medis pasien yang dirawat di ruangan Sawit dengan diagnosis keperawatan halusinasi pendengaran.

Halusinasi merupakan seseorang mengalami perubahan akibat situasi dalam jumlah dan pola dari stimulus yang dihasilkan dari respon dari dalam diri sendiri maupun respon dari lingkungan disertai kerusakan repon pada rangsangan kutipan dari (Hendarsyah, 2015). Sedangkan menurut Pardede (2021), berpendapat bahwa halusinasi adalah distorsi persepsi palsu yang terjadi pada respon neorologis maladaptif, dimana mereka yang menderita distorsi sensori adalah hal yang nyata dan responsif.

3. Analisis Intervensi Keperawatan

Secara garis besar terdapat 4 Tindakan Keperawatan untuk gangguan jiwa pada penderita halusinasi yaitu dimulai dari cara menghardik, pendidikan kesehatan tentang pentingnya minum

obat, melakukan kegiatan harian, serta bercakap-cakap. Strategi pelaksanaan tindakan pertama adalah cara menghardik. Teknik menghardik merupakan upaya untuk mengontrol halusinasi yang terjadi pada pasien. Teknik menghardik untuk mengendalikan dan mengurangi tanda dan gejala halusinasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa teknik menghardik sangat efektif dalam mengontrol dan mengurangi tanda dan gejala halusinasi (Fenni, 2022).

Strategi pelaksanaan tindakan kedua yaitu mengajarkan pasien pendidikan kesehatan tentang pentingnya minum obat. Pada kasus di atas, kekambuhan terjadi karena kurangnya pengetahuan pasien terhadap aturan penggunaan obat pada penderita gangguan jiwa. Hasil penelitian ini didukung oleh teori Maharani dalam Rahmawati (2019) yang mengatakan bahwa dengan melakukan pengobatan secara efektif dapat mengurangi terjadinya kekambuhan.

Strategi pelaksanaan tindakan ketiga yaitu menganjurkan pasien untuk bercakap-cakap dengan orang-orang disekitarnya.

Selama implementasi, pasien tampak berbicara dengan pasien lain di ruangnya. Dengan bercakap-cakap memungkinkan pasien untuk mengontrol halusinasinya melalui interaksi dan komunikasi, dan pasien mendapatkan dukungan emosional dari orang lain sehingga dapat mengurangi halusinasi yang dideritanya (Donner, 2020).

Strategi pelaksanaan tindakan keempat yaitu menganjurkan pasien untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, dibuktikan pasien sudah mampu melakukan kegiatan bermanfaat yaitu menyapu, membersihkan tempat tidur dan memungut sampah. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk mengalihkan halusinasi pasien sehingga pasien bisa berfikir realita dengan cara melakukan kegiatan terstruktur maka pasien sangat berpotensi untuk sembuh (Suhermi, 2021).

4. Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan pelaksanaan intervensi yang telah dilakukan sebelumnya. Implementasi yang diberikan pada pasien halusinasi pendengaran yaitu dengan strategi tindakan halusinasi. Strategi pelaksanaan tindakan halusinasi dilakukan secara bertahap-tahap dimulai dari strategi tindakan 1 sampai 4. Isi dari strategi pelaksanaan tindakan halusinasi ialah mengajarkan cara menghardik, mengedukasi kesehatan tentang pentingnya pasien minum obat, mengajarkan bercakap-cakap dengan orang lain serta menganjurkan melakukan kegiatan.

Strategi tindakan halusinasi efektif meningkatkan kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasinya, sehingga dapat meningkatkan mekanisme koping adaptif pada pasien serta mampu menurunkan frekuensi halusinasi yang ada pada diri pasien (Livana, 2020).

Hasil observasi dari Tn “S” yang mengalami gangguan halusinasi pendengaran. Dalam pemberian strategi tindakan dan terapi Zikir serta terapi sugesti, didapatkan bahwa intervensi berupa menghardik, edukasi pendidikan kesehatan tentang pentingnya minum obat, bercakap-cakap dengan orang lain, dan melakukan kegiatan harian serta pemberian terapi Zikir dan terapi sugesti. Dari semua intervensi yang diberikan oleh pasien. Pasien lebih menyukai melakukan kegiatan harian yang tertuang dalam strategi tindakan ketiga. Dari pernyataan yang ucapkan oleh pasien, pasien mengatakan senang bercakap-cakap dengan temannya, bukti nyata dari kegiatan pasien dalam strategi tindakan tiga yaitu pasien sering bercakap-cakap dengan siapapun yang ada diruangannya, kemudian selain strategi tindakan ketiga pasien juga sudah mampu melakukan menghardik halusinasi. selain itu terapi yang di sukai pasien yaitu terapi zikir. Pasien mampu mengucapkan kalimat-kalimat Zikir tanpa bantuan dari perawat. Kegiatan yang kurang diminati oleh pasien saat melakukan implementasi ialah strategi tindakan keempat yaitu melakukan kegiatan harian, dan strategi tindakan ke dua yaitu edukasi kesehatan tentang pentingnya minum obat yaitu saat pemberian edukasi tampak pasien paham mengenai penjelasan yang disampaikan.

5. Analisis Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah proses hasil dari tindakan yang telah dilakukan dan melihat perbandingan respon pasien sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Halusinasi pendengaran dengan pasien sudah dapat mengontrol halusinasinya, tidak terjadi perilaku kekerasan, terjalinnya hubungan saling percaya, dan pasien dapat teratur dalam meminum obat (Hafizudin, 2021). Evaluasi keperawatan yang tertuang dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil pengkajian, Diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi, serta hasil intervensi (EBPN) asuhan keperawatan pada Tn “S” dengan Diagnosis halusinasi pendengaran menggunakan teknik kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti, dapat memberikan ketenangan jiwa serta rasa tenang kepada pasien setelah diberikannya terapi ini.

B. Analisis Intervensi EBPN

Selain dari 4 tindakan keperawatan pada pasien halusinasi yakni cara menghardik, pendidikan kesehatan tentang pentingnya minum obat, bercakap-cakap, serta melakukan kegiatan harian, juga didapatkan intervensi yang efektif pada gangguan halusinasi yaitu teknik terapi Zikir dan terapi sugesti. Yang dimana ketika pasien melakukan terapi Zikir dengan fokus maka memberikan dampak saat halusinasinya muncul, dan dengan menyimpulkan berZikir maka akan teralihkan dari halusinansi tersebut. Menurut Dermawan (2017)

dengan membaca Zikir maka pasien halusinasi pendengaran akan meningkatkan kemampuan mengontrol halusinasinya.

Sedangkan sugesti adalah salah satu aktivitas jiwa menurut Daki (1984), dalam bukunya berjudul *The spritual Power* yaitu membangkitkan kekuatan paling dahsyat dalam diri. Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dapat di rumuskan sebagai suatu proses dimana seorang individu menerima suatu cara pemikiran atau pedoman-pedoman tingkahlaku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Individu yang mudah terpengaruh oleh sugesti tersebut adalah *sugestibel*. Sebaliknya orang yang mudah memberikan pengaruh sugesti pada orang lain disebut dengan *sugestif* kutipan dari (Idham kholid, 2018).

Pada kasus diatas dengan di lakukannya intervensi teknik terapi Zikir maka pasien dapat mengingat Sang pencipta serta mengontrol dan mencegah terjadi keparahan halusinasi yang diderita pasien. Karena berZikir maka pikiran akan terasa rileks dan tenang. Seperti halnya dengan terapi sugesti yaitu bertujuan untuk mengontrol dan mencegah halusinasi pasien dengan menganjurkan pasien untuk selalu berfikir positif dan menganjurkan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya, sehingga dapat di simpulkan bahwa dari kedua terapi ini sangat efektif pada penderita gangguan halusinasi yang khususnya halusinasi pendengaran.

Seorang muslim memang diperintahkan untuk berZikir kepada Allah SWT setiap waktu dengan hati, lisan, dan anggota badannya,

karena Zikir adalah obat kegersangan hati yang dapat melandasi perilaku manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Ra'ad/13:28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahan :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram”.

Berdasarkan tafsir Quraisy Shihab bahwa orang-orang yang selalu kembali kepada Allah SWT dan menyambut kebenaran itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang ketika berzikir mengingat Allah dengan membaca Al-Qur'an dan sebagainya, hati mereka menjadi tenang. Hati memang tidak akan dapat tenang ketika tanpa mengingat dan merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah, dengan selalu mengharap keridhaannya. Orang-orang yang beriman dan hati kita menjadi tentram disebabkan karena Zikir, sungguh hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.

Saat Zikir telah menembus seluruh bagian tubuh bahkan ke setiap sel-sel dari tubuh, hal ini akan berpengaruh terhadap tubuh (fisik) dengan merasakan getaran rasa yang lemas dan menembus ke seluruh tubuh. Pada saat inilah tubuh manusia merasakan relaksasi atau pengendoran saraf sehingga ketegangan-keegangan jiwa akibat tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani

akan berkurang bahkan bisa saja hilang sama sekali (Misbakhuddin, 2015).

Saraf yang ditembus oleh Zikir adalah sistem saraf pusat karena pada penderita skizofrenia terjadinya perubahan sistem transmisi signal penghantar syaraf (*neurotransmitter*) dan reseptor di sel-sel saraf otak, sama halnya dengan penderita halusinasi dimana pasien merasakan suatu stimulus yang sebenarnya tidak ada. Zikir juga mampu melepaskan hormon serotonin yang berfungsi untuk mengatur suasana perasaan dan mencegah depresi. Kemudian hormon endorfin yang berfungsi untuk mengurangi kecemasan dan merasa lebih membaik .


Menurut penulis, terapi Zikir dan terapi sugesti mempengaruhi terhadap pengontrolan halusinasi pasien. Pasien setelah melakukan terapi Zikir dan terapi sugesti mampu menguasai bahkan menghilangkan halusinasi disaat halusinasi tersebut datang. Sehingga pasien merasa tenang dan tidak merasa gelisah lagi.

C. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan tak luput dari keterbatasan sehingga dapat menjadi rana saran dan kritikan untuk perbaikan penelitian ini. Namun pada hakikatnya keterbatasan bukanlah hal yang perlu ditutupi kehadirannya, akan tetapi dengan keterbatasan penelitian ini bisa menimbulkan banyak pertanyaan dan menjadikan penelitian selanjutnya yang meneliti tentang analisis asuhan keperawatan dengan halusinasi pendengaran menggunakan teknik

kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti serta memperkuat bahan referensi yang ada pada penelitian ini.

Hambatan peneliti dalam pemberian intervensi yaitu terkadang pasien ketika ditanya konsentrasi pasien mudah teralihkan dan kadang berbelit-belit ketika di ajak berinteraksi. Saat berinteraksi dengan pasien, pasien tiba-tiba menghentikan komunikasi kemudian meminta uang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh pasien halusinasi pendengaran sesuai dengan intervensi yang telah diberikan yaitu teknik terapi kombinasi Zikir dan terapi sugesti, maka dapat di tarik kesimpulan yaitu :

1. Hasil pengkajian analisis asuhan keperawatan dengan halusinasi pendengaran menggunakan teknik kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti, yaitu pasien mengatakan mendengar suara pacarnya dan kadang suara samar-samar sehingga pasien tidak sadar berjalan dan mondar mandir. Sebelumnya pasien pernah berobat jiwa satu kali di poli jiwa RSKD Dadi dan RSUD Syekh Yusuf namun gangguan halusinasi pasien datang ketika pasien sudah tidak mau lagi minum obatnya.
2. Diagnosis yang didapatkan setelah melakukan anamnesa tentang analisis asuhan keperawatan dengan halusinasi pendengaran menggunakan teknik kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti adalah Halusinasi pendengaran, Harga Diri Rendah dan resiko perilaku kekerasan.
3. Setelah di berikan intervensi mengenai asuhan keperawatan dengan halusinasi pendengaran menggunakan 4 tindakan keperawatan halusinasi dan kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti yaitu menghardik, memberikan edukasi kesehatan

tentang pentingnya minum obat, mengajarkan bercakap-cakap dan melakukan aktivitas sehari-hari, serta terapi Zikir dan terapi sugesti merupakan intervensi efektif sehingga memberikan pengaruh yang baik dan signifikan untuk mengontrol emosi dan merilekskan hati dan menentramkan jiwa serta mengurangi suara-suara yang di dengar oleh pasien.

4. Implementasi hasil analisis asuhan keperawatan dengan halusinasi menggunakan 4 tindakan keperawatan halusinasi yaitu menghardik, edukasi kesehatan tentang pentingnya minum obat, bercakap-cakap dan melakukan aktivitas harian, serta intervensi pendukung yaitu terapi Zikir dan terapi sugesti efektif untuk menurunkan dan mengontrol tingkat halusinasi pasien.
5. Evaluasi pada pasien halusinasi pendengaran yaitu terapi Zikir dan terapi sugesti dan intervensi keperawatan secara generalis efektif mengurangi dan mengontrol halusinasi pendengaran pada pasien.
6. Hasil analisis intervensi dari dua intervensi tersebut sangat efektif untuk mengontrol halusinasi dan mengurangi suara-suara yang di dengar oleh pasien.

B. Saran

Berdasarkan studi kasus pemberian intervensi teknik kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran, diharapkan saran dan kritikan sebagai

upaya membangun dan mengembangkan hasil penelitian penulis, yakni :

1. Bagi Penelitian Dan Institusi

Pada hasil penelitian studi kasus ini, diharapkan dapat menjadi pedoman/referensi bagi penelitian selanjutnya, terkhusus bagi penelitian yang ingin mengembangkan serta menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam pembuatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan teknik kombinasi terapi Zikir dan terapi sugesti terhadap orang dengan gangguan jiwa halusinasi pendengaran. Serta menjadi bahan intervensi *Evidence Based Nursing*. Kemudian bagi pihak institusi diharapkan penelitian ini menjadi bahan bacaan untuk memperluas wawasan, sehingga ilmu yang didapatkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.


2. Bagi Pelayanan Keperawatan

Pada hasil penelitian studi kasus ini diharapkan menjadi bahan intervensi *Evidence Based Nursing* di pelayanan masyarakat maupun di rumah sakit yang berkaitan dengan orang yang mengalami gangguan halusinasi pendengaran dengan teknik kombinasi terapi dzikir dan terapi sugesti yang bertujuan untuk mengontrol dan meminimalisir terjadinya halusinasi pada pasien.

3. Bagi Masyarakat

Pada hasil penelitian ini diharapkan pada pembaca agar dapat

memberikan tindakan terapi zikir dan terapi sugesti kepada orang yang menderita gangguan jiwa yang khususnya halusinasi pendengar yang ditemukan di masyarakat. Tindakan terapi Zikir dan terapi sugesti dapat menurunkan gejala serta mengontrol halusinasi tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurakhman, D. (2022). Psikoreligius Terhadap Perubahan Persepsi Sensorik Pada Pasien Halusinasi Pendengaran Di Rsud Arjawinangun Kabupaten Cirebon. *Jurnal Education and Development, Vol. 10 No.*
- Agung, P. (2023). Penerapan Terapi Zikir Dalam Penurunan Tingkat Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Skizofrenia RSJD Dr. Soedjarwadi Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia, 2 No 8 Agu.*
- Agustina, M. (2017). Tingkat Pengetahuan Pasien Dalam Melakukan Cara Mengontrol Dengan Perilaku Pasien Halusinasi Pendengaran. *Prodi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju.*
- Akbar. (2021). *Terapi Psikoreligius : Zikir Pada Pasien Halusinasi Pendengaran.* Program Studi Pendidikan Ners, Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan.
- Azka, D. (2022). Efektivitas Hipnoterapi Sebagai Intervensi Untuk Mengurangi Stress Pada Remaja. *Jurnal Keperawatan Jiwa, Volume 10, Hal 245-256.*
- Beck, J. (2011). *Cognitive Behavior Therapy : Basic and Beyond.* The Guilford Press.
- Dakir. (1984). *Dasar-dasar Psikologis Umum.* Fakultas Psikologi UGM.
- Damayanti, M. & I. (2014). *Asuhan Keperawatan Jiwa.* Revika.
- Dermawan, D. (2017). *Pengaruh Terapi Psikoreligius : Zikir Pada Pasien Halusinasi Pendengaran di RSJD dr. Arif Zainudin.* Media Publikasi Penelitian.
- Dinarti. (2017). *Dokumentasi Keperawatan.* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Djamaluddin. (2019). *Belajar Dan Pembelajaran.* CV. Kaaffah Learning Center.
- Donner, L. (2020). Navigating Between Compassion And Uncertainty- Psychiatric Nurses Lived Experiences Of Communication With Patients Who Rarely Speak. *Issues In Mental Health Nursing, 42 (4).*
- Fenni, D. (2022). Teknik Distraksi Menghardik Untuk Mengontrol

- Halusinasi Pendengaran. *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan, Vol. 1 No.*
- Hafizudiin. (2021). *Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Tn. A Dengan Masalah Halusinasi Pendengaran.*
- Hendarsyah, F. (2015). Diagnosis Dan Tatalaksana Skizofrenia Paranoid Dengan Gejala-Gejala Positif Dan Negatif. *Jurnal Medula Unila, 4(3), 57–62.*
- Hidayat, S. & dkk. (2018). Terapi Kombinasi Sugesti dan Zikir Dalam Peningkatan Kualitas Tidur. *Jurnal Ilmu Kesehatan, 219–228.*
- Idhamkholid. (2018). Metode Terapi Penyembuhan Dengan Sugesti. *Jawa Barat : Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Vol 1 No 1.*
- Julita, D. (2021). Implementation Of Psychoreligius Therapy : Dhikr To And Ability Overcoming Hallusination. *Jurnal Keperawatan Poltekkes Palu.*
- Livana, D. (2020). Peningkatan Kemampuan Mengontrol Halusinasi Melalui Terapi Generalis Halusinasi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa.*
- Mariani, D. (2019). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Penyakit Skizofrenia. *Penelitian Kesehatan.*
- Misbakhuddin, A. (2015). *Zikir sebagai Terapi Penderita Skizofrenia (Living Al-Qur'an di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Eks-Psikotik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.*
- Muhitht & Abdul. (2015). *Pendidikan Keperawatan Jiwa Teori Dan Aplikasi.* CV Andi Offset.
- NANDA. (2015). *Buku Diagnosis Definisi Dan Klasifikasi.* EGC.
- Nurhalimah. (2016). *Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan Jiwa Psikiatrik Teori & Praktik.* Buku Kedokteran EGC.
- Nursalam. (2014). *Metodologi Penelitian Keperawatan.* Salemba Medika.
- Nursalam. (2016). *Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis Edisi 4.* Salemba Medika.
- Pardede, J. (2021). *Asuhan Keperawatan Jiwa Dengan Masalah Halusinasi.*
- Pratiwi, D. (2020). Pengaruh Terapi Psikoreligious : Zikir Dalam

- Mengontrol Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Skizofrenia Yang Muslim Di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- Putri, A. (2016). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr V. Provinsi Sulawesi Utara. *E-Jurnal Keperawatan*, 6 (1).
- Rahayu, D. . (2016). Asuhan Keperawatan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Dengan Pasien Ny. S Di Ruang Bima Instalasi Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- Rahmawati, D. (2019). Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Tingkat Kekambuhan Pada Pasien Halusinasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Geger Kabupaten Madiun. *Skripsi*.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2018). *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI*.
- Rohana, L. (2019). Gambaran Karakteristik Klien Halusinasi Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan Tahun 2019. *Jurnal 55 Keperawatan*, 1–27.
- Sehabudin, D. (2022). Analisis Penanaman Sugesti Pada Pengobatan Hipnoterapi Sebagai Metode Penyembuhan Gangguan Psikologis. *Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya, Vol. 05 No*, 149–160.
- Sugiyono, D. (2021). Hipnoterapi Sugesti Langsung Dan Anchoring Terhadap Penurunan Kecemasan Dan Tingkat Depresi Pada Pasien Odha. *Jurnal Keperawatan Silampari*.
- Suhardono, D. (2023). Pengaruh Terapi Normalitas atau Suportif-Sugestif Terhadap Kekambuhan Pasien Post Psikotik di Puskesmas Medan. *Jurnal Studi Keperawatan*.
- Suhendi, D. (2020). Metode Ruqyah Dan Hipnoterapi Dalam Penyembuhan Gangguan Jiwa di Lembaga El-Psika Al-Amien Prendua. *Indonesian Journal Of Islamic Psychology*.
- Suhermi. (2021). Pengaruh Terapi Activity Daily Living Terhadap Pemulihan Pasien Halusinasi. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 54–57.

Sutejo. (2017). *Keperawatan Jiwa, Konsep Dan Praktik Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa : Gangguan Jiwa dan Psikososial*. Pustaka Baru Press.

Tafsir As-Sa'di. (n.d.). *Pakar Tafsir Abad 14 H, Surah Ar-Rad ayat 11*.


Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia* (Edisi 1 Ce). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Indonesia.

WHO. (2017). *Depression and Other Common Mental Disorders*.

Widiyawati, W. (2020). *Keperawatan Jiwa*. Linterasi Nusantara.

Yosep, I. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Refika Aditama.

Yunita, R. (2020). *Buku Ajar Psikoterapi Self Help Group Pada Keluarga Pasien Skizofrenia*. Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.



LAMPIRAN

EVALUASI TANDA DAN GEJALA PADA KLIEN HALUSINASI

NAMA PASIEN : Tn. S

RUANG : Sawit

PENILAI : Ayu Anandah

No	Tanda & Gejala	Tanggal					
		24/7/23	25/7/23	26/7/23	28/7/23	29/7/23	31/7/23
I	Kognitif						
1	Mendengar suara-suara	√	√	√	√	√	
2	Melihat bayangan, sinar						
3	Menghidu bau : darah, urine, feses						
4	Merasakan bau : darah, urine, feses						
5	Merasakan sensasi nyeri atau ketidaknyamanan						
6	Ambivalen						
7	Tidak dapat memfokuskan pikiran	√	√				
8	Tidak mampu memecahkan masalah	√	√				
9	Kurang mampu mengingat						
10	Tidak dapat berpikir logis						
11	Konsentrasi rendah						
12	Tidak mampu mengambil keputusan	√	√	√			
13	Disorientasi						
14	Gangguan berbicara						
II	Afektif						
1	Senang dengan halusinasinya						
2	Kesedihan yang berlarut						
3	Merasa terganggu	√	√	√			
4	Ketakutan						
5	Khawatir	√					
6	Curiga						
7	Merasa seperti terbelenggu / terikat dengan halusinasinya						
8	Afek datar / tumpul						
III	Fisiologis						
1	Kewaspadaan meningkat						
2	Tekanan darah meningkat						
3	Denyut nadi meningkat						
4	Gangguan tidur	√					
5	Muka tegang						
6	Frekuensi napas meningkat						
7	Keringat dingin						
8	Pusing						
9	Kelelahan / keletihan						
IV	Perilaku						
1	Berbicara dan tertawa sendiri	√	√	√			
2	Menyeringai						
3	Menggerakkan bibirnya / komat-kamit						
4	Diam sambil seperti menikmati yang mengasikan						
5	Cenderung mengikuti halusinasinya daripada menolak						
6	Perilaku menyerang seperti panik						
7	Menarik diri						
8	Daya tilik diri kurang						

9	Penampilan tidak sesuai						
10	Memalingkan muka kearah telinga seperti mendengar sesuatu	√	√				
11	Menutup telinga	√					
12	Gaya berjalan abnormal						
13	Menunjuk-nunjuk kearah tertentu						
14	Potensial melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain						
V	Sosial						
1	Ketidakmampuan berkomunikasi						
2	Acuh dengan lingkungan						
3	Kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain						
4	Tidak tertarik dengan kegiatan harian	√	√				
5	Curiga terhadap orang lain dan lingkungan						
6	Defisit perawatan diri						
7	Penyimpangan seksual						
8	Rentang perhatian hanya beberapa menit atau detik	√					
VI	Kemampuan						
1	Ketidakmampuan melakukan tindakan menghardik	√					
2	Ketidakmampuan melakukan tindakan minum obat secara teratur						
3	Ketidakmampuan melakukan tindakan bercakap-cakap dengan orang lain						
4	Ketidakmampuan melakukan tindakan dengan melakukan kegiatan (kegiatan yang biasa dilakukan pasien dirumah)						
5	Ketidakmampuan melakukan terapi dzikir dan terapi sugesti	√	√	√	√		
Total Jumlah Tanda dan Gejala		14	9	5	2	1	0



JIK-MC
Health Sciences Journal

Jurnal Ilmu Kesehatan
Mandira Cendikia

Terbit Online:
<https://journal-mandiracendikia.com/index.php/JIK-MC>

Mandira Cendikia
Vol. 2 No. 8 Agustus 2023

PENERAPAN TERAPI DZIKIR DALAM PENURUNAN TINGKAT HALUSINASI PENDENGARAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA RSJD DR. RM. SOEDJARWADI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Putro Muhchin Agung Prasetyo¹, Norman Wijaya Gati², Wahyu Rekno³
Universitas Aisyiyah Surakarta^{1,2}
*Email Korespondensi: putromuhchin25@gmail.com

ABSTRAK

Gangguan jiwa di Indonesia mencapai 15,3% dari 259,9 juta jiwa penduduk Indonesia terutama skizofrenia dengan gejala halusinasi yang biasanya disebabkan karena ketidakmampuan pasien dalam menghadapi stresor dan kurangnya kemampuan dalam mengenal dan mengontrol halusinasi, sehingga diperlukan penatalaksanaan non-farmakologis yang salah satunya adalah dengan terapi dzikir untuk mengontrol halusinasi yaitu memberikan coping kepada pasien halusinasi atau mengatasi masalah karena dengan berdzikir dapat membersihkan pikiran secara psikologis, menimbulkan ketenangan batin dan keteduhan jiwa sehingga pasien halusinasi dapat terkontrol. Mengetahui hasil penerapan terapi dzikir untuk mengontrol halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia. Penerapan dilakukan dengan metode deskriptif studi kasus kepada 2 responden pada pasien skizofrenia selama 5 hari dengan frekuensi 2 kali sehari selama 15-30 menit. Berdasarkan hasil penerapan yang sudah dilakukan, terdapat perkembangan kontrol halusinasi sebelum dan sesudah dilakukan penerapan terapi dzikir. Terapi dzikir dapat dijadikan sebagai salah satu teknik non-farmakologis atau intervensi mandiri pada skizofrenia dalam mengontrol halusinasi pendengaran.

Kata Kunci : Penurunan, Halusinasi, Terapi dzikir

ABSTRACT

Mental disorders in Indonesia reach 15.3% of the 259.9 million Indonesian population, especially schizophrenia with hallucinatory symptoms which are usually caused by the patient's inability to deal with stressors and the lack of ability to recognize and control hallucinations, so that non-pharmacological management is needed, one of which is with dhikr therapy to control hallucinations, namely providing coping to hallucinatory patients or overcoming problems because by dhikr it can cleanse the mind psychologically, create inner peace and shade of mind so that hallucinatory patients can be controlled. Objective; Knowing the results of applying dhikr therapy to control auditory hallucinations in schizophrenic patients. Method; The application was carried out using a case study descriptive method to 2 respondents in schizophrenia patients for 5 days with a frequency of 2 times a day for 15-30

ALAUDDIN
MAKASSAR

Pengaruh Terapi Normalitas atau Suportif-sugestif terhadap Kesembuhan Pasien Post Psikotik di Puskesmas Medang

Subardono^{1*}, Taryatmo², M. Nor Mudhofar³, Tutik Setyowati⁴
Department of Nursing, Poltekkes Kemenkes Semarang, Indonesia

*Corresponding author : Subardono
Email: spsubardono@gmail.com

Dikirim: 27 Februari 2023; Direvisi: 27 Februari 2023; Diterima: 29 Maret 2023

ABSTRACT

Latar belakang : kenyataan banyak pasien pos psikotik yang menganggap dirinya tidak sakit, menolak tindakan pengobatan, hal ini perlu intervensi untuk mencapai kesembuhan. Terapi normalitas merupakan salah satu alternatif dengan cara membiasakan dan mempertahankan sikap "normatif" dalam keseharian, antara lain mampu melaksanakan belajar, bekerja, bermain dan bercinta sebagaimana layak orang sehat jiwa seminimal mungkin bantuan orang lain.

Tujuan : menguji kesesuaian terapi normalitas terhadap populasi.

Metode : menerapkan metode "Quasi-eksperimen nonequivalent (pre-test and post test control group design)", Penentuan responden menggunakan: *Consecutive sampling*, sampai 36 sampel terpenuhi, randomisasi dengan pemetaan, skema rumah tinggal pasien, dengan menjatuhkan pensil ke dalam skema. Alat ukur penelitian kesembuhan pasien kuesioner yang dikembangkan peneliti. Peneliti memberikan 3 kali sesi terapi individu, selama 15 – 20 menit dan 1 kali sesi terapi keluarga selama 30 menit, selama penelitian.

Hasil : kemampuan keluarga melakukan pencegahan kekambuhan pada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, hasilnya menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,1 > 0,05. Kemampuan klien melakukan pencegahan kekambuhan atau masih ada gejala sisa skizofrenia tidak atau kurang penting meskipun masih membutuhkan kajian lagi.

Simpulan : Prinsip yang penting (utama) tampil selalu normal (normatif) agar seiring perjalanan waktu tampilan klien sehari-hari tidak aneh lagi, mejadi peduli mengurus dirinya sendiri dan perlunya memenuhi kebutuhan sosial serta pentingnya berhubungan dengan orang lain.

Kata Kunci : Terapi normalitas (kendali normatif), Kesembuhan pasien psikotik

Introduction (Pendahuluan)

Stress, gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa berat atau sakit jiwa cenderung meningkat seiring perkembangan ilmu dan teknologi serta krisis multidimensi secara global menimbulkan seperangkat dampak positif dan negatif terhadap totalitas kehidupan manusia beserta lingkungan. Menurut *World Health Organization (WHO)* gangguan jiwa berat tahun 2013 sebesar 1 perseribu penduduk dunia. Berdasarkan riset Kesehatan Dasar Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, dan data Riskekdas RI tahun 2018 meningkat juga. Kerugian ekonomi nasional akibat gangguan jiwa mencapai 20 triliun, angka tersebut masuk akal jika dihubungkan dengan keseluruhan kerugian termasuk beban atas pendapatan akibat gangguan

jiwa⁽¹⁾. Gambaran yang sangat menyedihkan jika dihubungkan dengan beban keluarga, masa depan anak-anak pasien, sosial masyarakat sekitarnya, oleh sebab itu jika dapat memulihkan satu pasien sakit jiwa berarti menyelesaikan sebagian besar masalah keluarga dan lingkungan.

Berdasar fakta akibat sakit jiwa pada kebanyakan pasien sepulang hospitalisasi masih memiliki gejala sisa skizofrenia yang belum terselesaikan, kecemasan keluarga serta berbagai penyebab gangguan jiwa yang tidak mereka kenali. Contoh kecemasan pada pasien halusinasi, hampir tidak pernah hilang, hanya menurun atau meningkat. Cemas dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ-III) – F41 kecemasan sebagai penyakit jiwa⁽²⁾, namun manifestasi cemas secara klinis sering dianggap

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yaitu Ayu Anandah lahir dari pasangan bapak Junardi dan ibu Dahariah yang merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Penulis dilahirkan di Ujung Pandang, 15 November 1999. Penulis beralamat di Barombong Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDI Bontoa, SMPN. 15 Makassar, SMAN 21 Makassar. Setelah menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan strata (S1) Program Studi Keperawatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama Menempuh pendidikan di kampus penulis juga aktif di lembaga internal kampus dan eksternal yaitu HMJ Keperawatan, UKK KSR PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar, Hamada Volunteer Foundation, dan Komunitas Peduli Anak Yatim Fakir Miskin. Dan pada tahun 2022 Dengan usaha dan do'a mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar sarjana Keperawatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Syukur Alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan Pendidikan Profesi Ners dikampus yang sama dengan berbagai pengalaman di Rumah Sakit maupun Puskesmas serta di masyarakat dan sampai saat ini masih diberi Kesehatan sehingga bisa melewati perjuangan keras dan disertai iringan doa dari kedua orang tua penulis, suami, keluarga serta rekan-rekan yang dapat membantu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun Karya Tugas Akhir Ners dengan judul "Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan Intervensi Kombinasi Terapi Zikir dan Terapi Sugesti di RSKD Dadi".