

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN
SKIZOFERNIA DENGAN HALUSINASI MENGGUNAKAN
TERAPI ZIKIR DI RSKD DADI PROVINSI
SULAWESI SELATAN**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ners Program
Studi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

TAUFIQ HIDAYAH SYAFAR

70900122047

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufiq Hidayah Syafar
NIM : 70900122047
Tempat/Tgl.Lahir : Bone, 20 November 2000
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Program Studi Profesi Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien
Skizofrenia Dengan Halusinasi Menggunakan
Terapi Zikir Di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi
Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 2023

Penyusun,



Taufiq Hidayah Syafar
NIM:70900122047

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan Tugas Akhir Ners Saudara Taufiq Hidayah Syafar, NIM: 70900122047, mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus Tugas Akhir Ners yang berjudul, “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Skizofrenia* Dengan Halusinasi Menggunakan Terapi Zikir Di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan”. Memandang bahwa Tugas Akhir Ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Gowa, 20 Desember 2023


Tim Pembimbing

Pembimbing I



Hj. Rasmawati, S.Kep.,Ns., Sp.Kep.J

Pembimbing II



Aidah Fitriani, S.Kep.,Ns.,M.Kep

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “*Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Halusinasi Menggunakan Terapi Zikir Di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan*” yang disusun oleh Taufiq Hidayah Syafar, NIM: 70900122047, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 03 Januari 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 03 Januari 2024

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.Og.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hasnah, S.Sit.,S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H.M Dahlan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	:Hj.Rasmawati,S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.I	(.....)
Pembimbing II	: Aidah Fitriani, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes
NIP: 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Skizofrenia* Dengan Halusinasi Menggunakan Terapi Zikir Di RSKD Dadi Sulawesi Selatan” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.Og.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Hasna, S.Sit .,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Hj. Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J dan Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini.
4. Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes dan Prof. Dr. H.M Dahlan, M.Ag selaku Penguji I dan II yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk penyusunan tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Kedua orang tua, Ayahanda Drs. M. Syafar, M.M, Ibunda Hj, St. Nurhaini, S.Pd., M.M dan Kakak saya Nurul Fajriani Syafar, S.Pd., M.Pd dan Muh. Ismail Syafar, S.T., M.T dan Adik saya Annisa Syafar dan Muh. Akram

Syafar serta keluarga tercinta terima kasih yang tak terhingga atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis sampai saat ini ini.

7. Sahabat dan teman seperjuangan Khaedir dan Muh. Alfian yang selalu kebersamai selama dalam suka dan duka menjalani program profesi Ners ini
8. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners Angkatan XXII, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat di rasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Makassar, Desember 2023

Penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Medis.....	8
2.2 Konsep Asuhan Keperawatan.....	26
2.3 Pendekatan Konsep Teori.....	34
2.4 <i>Evidence Based Practice In Nursing (EBPN)</i>	35
BAB III	41
METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.1 Rancangan Studi Kasus	41
3.2 Subjek Studi Kasus	41
3.3 Fokus Studi Kasus	41
3.4 Instrumen Studi Kasus	42
3.5 Prosedur Pengambilan Data.....	42
3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus	43
3.7 Analisis Data dan Penyajian Data	43
3.8 Etika Studi Kasus	44
BAB IV LAPORAN KASUS	46

4.1. Pengkajian	46
BAB V.....	76
PEMBAHASAN	76
5.1. Analisis Asuhan Keperawatan	76
5.2. Analisis Intervensi EBP	84
5.3. Keterbatasan Penelitian	86
BAB VI.....	86
PENUTUP.....	86
6.1. Kesimpulan	86
6.2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	31
Tabel 2.2	39
Tabel 4.1.....	56



ABSTRAK

Nama : Taufiq Hidayah Syafar
NIM : 70900122047
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Halusinasi Menggunakan Terapi Zikir Di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan

Latar Belakang: Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2022, angka penderita gangguan jiwa di berbagai belahan dunia yaitu 1 dari 300 juta jiwa (0.32%) dan 24 juta diantaranya menderita *skizofrenia*. Prevalensi *skizofrenia* atau gangguan jiwa berat di Indonesia menurut data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2018 sebanyak 6,7% per mil. Halusinasi yaitu gangguan atau perubahan persepsi dimana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Pasien yang mengalami halusinasi yang tidak mendapatkan pengobatan maupun perawatan lebih lanjut dapat menyebabkan perubahan perilaku seperti agresif, bunuh diri, menarik diri dari lingkungan dan dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Selain diberikan strategi pelaksanaan tindakan (SP), pasien halusinasi juga dapat diberikan terapi dzikir. **Tujuan:** Diketahui analisis asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien *skizofrenia* yang mengalami halusinasi dengan menggunakan terapi Zikir di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. **Hasil:** Setelah diberikan terapi zikir selama 10 hari, didapatkan hasil tanda dan gejala halusinasi pasien berkurang dibuktikan dengan pasien mengatakan sudah jarang mendengar suara yang biasa dia dengar, pasien sudah dapat membedakan suara yang nyata dan palsu, perilaku gelisah berkurang, pasien merasa lebih tenang dan rileks setelah melakukan terapi. **Kesimpulan:** Terapi dzikir dapat dikatakan efektif terhadap penurunan tanda dan gejala halusinasi dan berpengaruh terhadap kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasinya.

Kata Kunci: *Skizofrenia*, Halusinasi, Dzikir.

ABSTRACT

Name : Yusni Pratiwi
NIM : 70900122001
Title : *Analysis of Nursing Care in Schizophrenia Patients with Hallucinations Using Dhikr Therapy at RSKD Dadi South Sulawesi Province.*

Background: *Based on data from the World Health Organization (WHO) in 2022, the number of people with mental disorders in various parts of the world is 1 in 300 million people (0.32%) and 24 million of them suffer from schizophrenia. The prevalence of schizophrenia or severe mental disorders in Indonesia according to Basic Health Research (RISKESDAS) data in 2018 was 6.7% per mil. Hallucinations are disorders or changes in perception where patients perceive something that is not actually happening. Patients who experience hallucinations who do not receive further treatment or care can cause behavioral changes such as aggression, suicide, withdrawal from the environment and can harm themselves, others and the environment. In addition to being given an action implementation strategy (SP), hallucination patients can also be given dhikr therapy. Purpose:* *To determine the analysis of nursing care provided to schizophrenia patients who experience hallucinations using Zikir therapy at the Dadi Regional Public Hospital, South Sulawesi Province. Results:* *After being given dhikr therapy for 10 days, the results showed that the patient's signs and symptoms of hallucinations decreased, as evidenced by the patient saying that he rarely heard the voices he usually heard, the patient could distinguish between real and fake voices, restless behavior decreased, the patient felt calmer and more relaxed after undergoing therapy. Conclusion:* *Dhikr therapy can be said to be effective in reducing the signs and symptoms of hallucinations and has an effect on the patient's ability to control his hallucinations.*

Keywords: *Schizophrenia, Hallucinations, Dhikr.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 merupakan kondisi dimana individu dapat melakukan perkembangan baik perkembangan secara fisik, perkembangan mental, perkembangan spiritual, maupun perkembangan sosial, sehingga individu tersebut mampu menyadari kemampuan dirinya dan dapat mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan sebuah kontribusi kepada komunitasnya, kesehatan jiwa sangatlah penting, tanpa kesehatan jiwa yang baik, seseorang dapat terkena permasalahan pada jiwanya sehingga terjadilah gangguan jiwa.

World Health Organization (WHO) pada tahun 2022, mengemukakan angka penderita gangguan jiwa di berbagai belahan dunia yaitu 1 dari 300 juta jiwa (0.32%) dan 24 juta diantaranya menderita *skizofrenia*. Prevalensi *skizofrenia* atau gangguan jiwa berat di Indonesia menurut data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2018 sebanyak 6,7% per mil. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5% dibandingkan pada tahun 2013 yang hanya 1,7 juta per mil. Provinsi yang memiliki prevalensi *skizofrenia* paling tinggi adalah Bali sebesar 11,1%, sedangkan provinsi Sulawesi Selatan berada diperingkat ke-5 dengan prevalensi penderita *skizofrenia* sebesar 8,8 per mil atau sekitar 8.677 jiwa. (Nevid et al., 2018).

Gangguan jiwa menurut *American Psychiatric Association* (APA) didefinisikan sebagai suatu kumpulan gejala penyakit yang berhubungan dengan perubahan bentuk perilaku psikologis yang urgent secara klinis. Sindrom tersebut

dikaitkan adanya distress atau disabilitas yang disertai dengan peningkatan risiko secara signifikan untuk mati, sakit, ketidakmampuan maupun kehilangan kebebasan (Khosim et al., 2023). Beberapa contoh gangguan jiwa menurut WHO antara lain depresi, kecemasan, gangguan bipolar, *skizofrenia* dan psikosis (Kemenkes RI, 2022).

Halusinasi adalah gangguan persepsi sensorik tanpa rangsangan eksternal (pendengaran, visual, rasa, penciuman dan halusinasi taktil). Menurut penelitian Putri, (2018) mengatakan bahwa pasien halusinasi dengan diagnosa medis skizofrenia sebanyak 20% mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan secara bersamaan, 70% mengalami halusinasi pendengaran, 20% mengalami halusinasi penglihatan, dan 10% mengalami halusinasi lainnya

Dari tanda dan gejala tersebut dapat menimbulkan risiko untuk mencederai diri sendiri, orang lain bahkan lingkungan sekitar. Maka dari itu diperlukan peran aktif perawat untuk dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan. Penatalaksanaan halusinasi bisa diberikan baik secara farmakologis ataupun non-farmakologis. Terapi farmakologis lebih membantu ke pengobatan antipsikotik, sementara terapi non-farmakologis lebih membantu ke pendekatan terapi modalitas. (Raziansyah, 2023).

Tindakan keperawatan yang dapat diberikan pada pasien halusinasi adalah mengajarkan cara menghardik, meminum obat, bercakap cakap dan melakukan kegiatan harian. Selain diberikan tindakan keperawatan seperti biasanya, juga dapat diberikan terapi dzikir. Pernyataan ini didukung oleh riset Raziansyah

(2023) yang menyatakan ada pengaruh terapi dzikir terhadap tingkat halusinasi pada pasien halusinasi di wilayah kerja Puskesmas Martapura 2.

Sebenarnya sehat dan sakit itu dapat dianggap sama sebagaimana seperti susah dan sedih, gembira dan bahagia, kaya dan miskin semuanya merupakan pemberian atau ujian yang di berikan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang menerimanya sebagaimana Allah SWT berfirman pada QS. Al- Baqarah [2]:152

﴿ فَادْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۝۱ ﴾

Terjemahnya:

Maka ingatlah kepada- Ku, Akupun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada- Ku dan janganlah kamu ingkar kepada- Ku (Q.S Al- Baqarah 2:156)

Penjelasan dalam Tafsir Al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab tentang perintah mengingat Allah (zikir) dan janji Allah untuk mengingat hamba-Nya jika mereka mengingat-Nya sangat mendalam. Berikut adalah ringkasan dan penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut:

a. **Mengutamakan Pengingatan Terhadap Allah**

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengingat-Nya terlebih dahulu sebelum mengingat nikmat-nikmat-Nya. Mengingat Allah berarti menyadari dan menghargai kehadiran dan kebesaran-Nya yang mutlak.

b. **Cara Mengingat Allah:**

Lidah: Mengingat Allah dengan lidah berarti melakukan dzikir, seperti membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Ini adalah bentuk pengucapan pujian dan pengakuan terhadap Allah.

Pikiran dan Hati: Mengingat Allah dengan pikiran dan hati mencakup merenungkan kebesaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah, serta merasakan kehadiran-Nya dalam setiap aspek kehidupan. Ini juga mencakup rasa syukur dan keikhlasan.

Anggota Badan: Mengingat Allah melalui anggota badan berarti melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ini mencakup amal perbuatan yang sesuai dengan ajaran-Nya, seperti shalat, puasa, dan perbuatan baik lainnya.

- c. **Janji Allah dalam Redaksi “مكرئذا”:** Dalam redaksi ini, Allah berjanji bahwa jika hamba-Nya mengingat-Nya, Allah akan mengingat mereka pula. Ini menunjukkan hubungan timbal balik: jika seseorang konsisten dalam mengingat Allah, maka Allah akan senantiasa bersama mereka. Ini adalah bentuk penghiburan dan dukungan dari Allah bagi mereka yang setia kepada-Nya.
- d. **Hubungan dengan Penghiburan:** Janji Allah untuk mengingat hamba-Nya memberikan rasa nyaman dan ketenangan. Mengetahui bahwa Allah selalu bersama dalam setiap keadaan memberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Dengan demikian, Tafsir Al-Mishbah mengajarkan bahwa mengingat Allah adalah tindakan yang sangat penting dan memiliki dampak spiritual yang mendalam. Ini bukan hanya tentang pengucapan atau ritual, tetapi juga mencakup sikap dan perbuatan yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan.

Seseorang dengan gangguan jiwa juga perlu mendapatkan perawatan dan bimbingan untuk memulihkan jiwanya yang sakit, maka dari itu orang dengan gangguan jiwa biasanya dirawat di rumah sakit khusus yang di dalamnya berorientasi pada perawatan dan bimbingan agar seseorang tersebut dapat pulih

RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan berada di jalan Lanto Dg. Passewang No.34, Kota Makassar memiliki 7 ruang perawatan odgj peneliti berada pada fokus meneliti di ruangan kenari. Ruangan kenari merupakan ruang perawatan yang menampung ruangan kriminal jadi ruangan kenari bekerja sama dengan kepolisian sulawesi selatan. Pasien di ruang kenari yang berbagai macam diagnosa namun Halusinasi lah pasien terbanyak.

Berdasarkan permasalahan halusinasi yang ditemukan di ruang kenari, penulis melakukan intervensi berdasarkan *Evidence Based Practice in Nursing* (EBPN) yaitu analisis keperawatan pada pasien halusinasi dengan pendekatan terapi zikir di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan pada latar belakang, maka penulis merumuskan pertanyaan, “Bagaimana Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Skizofrenia* dengan Masalah Keperawatan Halusinasi Menggunakan Terapi Zikir Di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Diketahui analisis asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien *skizofrenia* yang mengalami halusinasi dengan menggunakan terapi Zikir di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pengkajian pada pasien *skizofrenia* yang mengalami halusinasi di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Untuk menganalisis diagnosis pada pasien *skizofrenia* yang mengalami halusinasi di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Untuk menganalisis intervensi pada pasien *skizofrenia* yang mengalami halusinasi di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Untuk menganalisis implementasi pada pasien *skizofrenia* yang mengalami halusinasi di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.
- e. Untuk menganalisis evaluasi pada pasien *skizofrenia* yang mengalami halusinasi di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.
- f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien *skizofrenia* yang mengalami halusinasi dengan menggunakan Terapi Zikir di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk pembuatan artikel atau jurnal kesehatan

yang membahas asuhan keperawatan pasien *skizofrenia* dengan halusinasi dengan terapi Zikir di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gagasan bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan intervensi.

1.4.2 Manfaat aplikatif

Terapi zikir ini dapat menjadi bahan acuan bagi tenaga perawatan yang ada di rumah sakit maupun di lingkungan masyarakat yang ingin melakukannya. Terapi ini dapat membantu pasien merasa tenang secara mental dan fisik. Ini berdampak pada sistem tubuh dan menyebabkan pasien merasa nyaman dan tenang.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Medis

2.1.1 Definisi *Skizofrenia*

Skizofrenia merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, perilaku yang aneh dan terganggu (Videbeck, 2018). *Skizofrenia* menurut (Stuart 2013 dalam Emilia, 2020) adalah penyakit yang berdampak pada pola pikir, emosi, sikap, dan kehidupan sosial seseorang. Penyimpangan realitas, penarikan diri dari interaksi sosial, persepsi dan pikiran, dan kognitif adalah beberapa tanda gangguan jiwa. Selain itu, *skizofrenia* juga dapat diartikan dengan terpecahnya pikiran, perasaan, dan perilaku, yang menyebabkan ketidaksesuaian pikiran dan perasaan pasien. (Emilia, 2020).

Skizofrenia ialah penyakit yang memengaruhi pola pikir, emosi, sikap, dan kehidupan sosial. Penyimpangan realitas, penarikan diri dari interaksi sosial, persepsi dan pikiran, dan gangguan kognitif adalah beberapa tanda yang dapat ditunjukkan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa (Stuart, 2013). Selain itu, *skizofrenia* juga dapat diartikan dengan terpecahnya pikiran, perasaan, dan perilaku yang menyebabkan ketidaksesuaian pikiran dan perasaan pasien. (Prabowo, 2014).

Menurut Hawari (2018), gejala-gejala *skizofrenia* dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif merupakan gejala yang mencolok, mudah dikenali, mengganggu keluarga dan masyarakat serta merupakan salah satu motivasi keluarga untuk

membawa pasien berobat. Gejala-gejala positif yang diperlihatkan pada pasien *skizofrenia* yaitu: delusi, halusinasi, kekacauan alam pikir, gaduh, gelisah, agresif, dan sebagainya. Gejala negatif *skizofrenia* merupakan gejala yang tersamar dan tidak mengganggu keluarga ataupun masyarakat, oleh karenanya pihak keluarga seringkali terlambat membawa pasien berobat. Gejala-gejala negatif yang diperlihatkan pada pasien *skizofrenia* yaitu: alam perasaan (afek) tumpul dan mendatar, isolasi sosial atau mengasingkan diri, pasif dan apatis serta menarik diri dari pergaulan social (Hawari, 2018).

2.1.2 Definisi Halusinasi

Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan persepsi sensori yang dialami oleh pasien gangguan jiwa, pasien merasakan sensasi berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghiduan tanpa stimulus nyata. Halusinasi adalah hilangnya kemampuan seseorang dalam membedakan rangsangan internal (pikiran) dan rangsangan eksternal (dunia luar). Pasien memberi persepsi atau pendapat tentang lingkungan tanpa objek atau rangsangan yang nyata (Rohman, 2020).

Persepsi yang salah (false perception) tanpa adanya objek luar disebut halusinasi. Persepsi yang dihasilkan berbeda dari persepsi normal karena ada objek luar yang membentuknya. Selain itu, halusinasi hanya ada pada individu tersebut, tidak ada pada orang lain. Halusinasi dapat dipengaruhi oleh imajinasi mental yang diproyeksikan keluar, yang

membuatnya terlihat seperti itu berasal dari luar dirinya sendiri. (Nurdiana, 2020).

Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa dimana pasien mengalami perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan atau penghidupan pasien merasakan stimulus yang sebetulnya tidak ada (Damayanti & Utami, 2014). Walaupun tampak sebagai sesuatu yang “khayal”, halusinasi sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan mental penderita yang “tersepsi” (Tagu, 2020). Pasien dengan diagnosis medis *skizofrenia* sebanyak 20% mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan secara bersamaan, 70% mengalami halusinasi pendengaran, 20% mengalami halusinasi penglihatan, dan 10% mengalami halusinasi lainnya (Suryanti, 2017).

2.1.3 Etiologi Halusinasi

Faktor penyebab halusinasi dibagi menjadi 2 yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi merupakan faktor resiko yang timbulnya stress yang akan mempengaruhi tipe dan sumber-sumber yang dimiliki pasien untuk menghadapi stress. Sedangkan faktor presipitasi merupakan stimulus internal atau eksternal yang dipresepsikan pasien sebagai suatu hal yang mengancam, seperti adanya ketegangan peran, konflik peran, peran yang tidak jelas, peran berlebihan, dan lain-lain (Aulia, 2021).

a. Faktor Predisposisi

1) Faktor Perkembangan

Tugas perkembangan pasien yang terganggu, seperti kontrol yang buruk dan kurangnya kehangatan dalam keluarga mengakibatkan pasien tidak dapat mandiri sejak kecil, mudah frustrasi, kehilangan kepercayaan diri, serta lebih mudah stres.

2) Faktor Sosiokultural

Jika seseorang merasa tidak diterima lingkungannya sejak bayi, dia akan merasa kesepian, tidak percaya pada lingkungannya, dan mungkin merasa tidak diterima.

3) Faktor Biologis

Faktor biologis memengaruhi risiko gangguan jiwa. Jika seseorang mengalami jumlah stres yang berlebihan, tubuh mereka akan menghasilkan zat neurokimia yang dapat menyebabkan gangguan pada neurotransmitter otak.

4) Faktor Psikologis

Jenis kepribadian yang lemah dan tidak bertanggung jawab mudah terjerumus dalam penyalahgunaan zat adiktif, yang mengakibatkan pasien tidak dapat membuat keputusan yang tepat tentang masa depan mereka. Pasien lebih suka kesenangan sementara dan berpindah dari dunia nyata ke dunia fantasi.

5) Faktor sosial budaya

Pasien meganggap bahwa hidup bersosialisasi di alam nyata sangat membahayakan dirinya sehingga dirinya lebih memilih asyik dengan halusinasinya, seolah-olah merupakan tempat untuk

memenuhi kebutuhan akan interaksi sosial, kontrol diri dan harga diri yang tidak didapatkan dalam dunia nyata.

6) Faktor genetik dan pola asuh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sehat yang diasuh oleh orang tua *skizofrenia* cenderung mengalami *skizofrenia*. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor keluarga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penyakit ini (Incau, 2021).

b. Faktor Presipitasi

Penyebab halusinasi dapat dilihat dari lima dimensi menurut Rawlins dan Heacock (1993), yaitu:

1) Dimensi fisik

Beberapa kondisi fisik, seperti kelelahan yang luar biasa, penggunaan obat-obatan, demam hingga delirium, intoksikasi alkohol, dan kesulitan untuk tidur dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan halusinasi.

2) Dimensi emosional

Halusinasi disebabkan oleh perasaan cemas yang berlebihan atas dasar masalah yang tidak dapat diselesaikan. Halusinasi dapat berupa perintah yang menakutkan atau memaksa. Pasien bertindak karena ketakutan karena dia tidak bisa menentang perintah tersebut lagi.

3) Dimensi intelektual

Dimensi intelektual ini menjelaskan bahwa orang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan penurunan fungsi ego. Meskipun halusinasi pada awalnya merupakan upaya ego sendiri untuk melawan impuls yang menekan, halusinasi berkembang menjadi kesadaran yang dapat mengambil seluruh perhatian pasien dan seringkali mengontrol semua perilakunya.

4) Dimensi sosial

Pasien senang dengan halusinasinya dan percaya bahwa bersosialisasi di dunia nyata sangat membahayakan. Mereka percaya bahwa ini adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan kontrol diri, harga diri, dan interaksi sosial yang tidak dapat dipenuhi dalam dunia nyata. Dengan menggunakan isi halusinasi sebagai sistem kontrol, individu tersebut cenderung mengikuti perintah halusinasi, baik dirinya maupun orang lain.

5) Dimensi spiritual

Secara spiritual, pasien mengalami halusinasi yang dimulai dengan kehidupan yang tidak teratur, tidak bermakna, tidak melakukan aktivitas ibadah, dan jarang berusaha untuk menyucikan diri. Selain itu, irama sirkardiannya terganggu karena ia sering tidur larut malam dan bangun sangat siang. Saat dia terbangun, dia merasa hampa dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya. Ia sering memaki takdirnya, tetapi gagal mendapatkan rezeki,

menyalahkan lingkungannya, dan orang lain yang membuat takdirnya buruk (Setyani, 2019).

2.1.4 Klasifikasi Halusinasi

Halusinasi diklasifikasikan menjadi 5 jenis menurut (Annisa, 2022), yaitu:

a. Halusinasi Pendengaran (*auditory*)

Pada halusinasi pendengaran individu akan mendengar suara-suara atau bisikan, paling sering berupa suara orang, suara berupa bisikan yang tidak jelas sampai kata-kata yang jelas berbicara dengan pasien. Pikiran yang didengar biasanya perintah terhadap pasien untuk melakukan sesuatu dan terkadang perintah yang membahayakan.

b. Halusinasi Penglihatan (*visual*)

Halusinasi penglihatan yaitu dimana individu akan merasakan stimulus visual dalam bentuk kelihatan cahaya, gambaran, bayangan yang kompleks.

c. Halusinasi Penciuman (*olfactory*)

Pada halusinasi penciuman individu akan merasakan sensasi pada hidungnya berupa bau-bauan yang muncul dari sumber tertentu tanpa stimulus yang nyata.

d. Halusinasi Pengecapan (*gustatory*)

Pada halusinasi pengecapan akan merasakan suatu sensasi yang tidak nyata, seperti merasa mengecap sesuatu seperti darah, urin atau feses.

e. Halusinasi Perabaan (*taktil*)


Pada halusinasi perabaan pasien biasanya merasakan sesuatu pada kulitnya tanpa ada stimulus yang nyata, contohnya seperti merasakan tersetrum listrik.

2.1.5 Rentang Respon Halusinasi

Seseorang yang mengalami halusinasi mengalami respon yang tidak sesuai yang dikenal sebagai rentan respon neurobiologis. Maladaptif akan terjadi karena pemikiran respons pada halusinasi. Apabila seseorang memiliki pemikiran yang sehat, mereka dapat mengenal dan merasakan stimulus yang diinformasikan oleh panca indra, seperti pendengaran, penglihatan, pengecapan, perabaan, dan penciuman. Sebaliknya, seseorang yang menderita halusinasi tidak dapat merasakan stimulus tersebut. (Pardede et al., 2021)

Menurut Stuart (2013) dalam Rohayati, (2021) Biasanya, orang yang mengalami halusinasi tidak mampu mempersepsikan rangsangan melalui pancaindra mereka, sehingga mereka percaya bahwa apa yang mereka lihat, dengar, cium, rasa, dan raba benar-benar terjadi, meskipun sebenarnya rangsangan tersebut tidak nyata. Stimulus halusinasi biasanya tidak langsung menguasai diri mereka sendiri, tergantung pada bagaimana mereka menangani masalah.

Respon Adaptif ←————→ Respon Maldaptif



d. Respon adaptif

Jika seseorang menghadapi masalah, mereka dapat menggunakan respons adaptif berdasarkan norma sosial dan budaya yang berlaku.

Respon adaptif dapat berupa :

- 1) Pikiran logis, pandangan yang mengarah pada kenyataan yang dapat diterima akal disebut pikiran logis.
- 2) Persepsi akurat adalah ketika seseorang melihat sesuatu dengan cermat dan tepat.
- 3) Emosi konsisten pengalaman yaitu perasaan yang timbul dari pengalaman yang pernah dialami sebelumnya.
- 4) Perilaku sosial adalah sikap dan tingkah laku yang masih dalam batas kewajaran
- 5) Hubungan sosial adalah proses suatu interaksi dengan orang lain dan lingkungan

e. Respon psikososial


- 1) Proses pikir terganggu adalah proses pikir yang menimbulkan gangguan.
- 2) Ilusi adalah interpretasi atau penilaian yang salah mengenai penerapan yang benar-benar terjadi (objek nyata) karena rangsangan panca indra.
- 3) Emosi tidak stabil yaitu emosi berlebihan dengan pengalaman kurang ditunjukkan oleh reaksi emosi yang tidak sesuai.
- 4) Perilaku tidak biasa adalah sikap dan tingkah laku yang melebihi batas kewajaran.
- 5) Menarik diri adalah percobaan untuk menghindari interaksi dengan orang lain.

f. Respon Maladaptif

Respon maladaptif adalah respon seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dengan berperilaku menyimpang dari norma dan keyakinan, sosial budaya dan lingkungan (Helidrawati, 2020).

- 1) Gangguan pikir/waham merupakan kepercayaan yang kuat meskipun tidak dianut oleh orang lain dan bertentangan dengan kepercayaan sosial.
- 2) Kerusakan proses emosi adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi, seperti kehilangan kemampuan untuk mengalami kesenangan, kebahagiaan, dan keakraban.

- 3) Perilaku tidak terorganisir didefinisikan sebagai ketidakselarasan antara perilaku dan gerakan yang dihasilkan.
- 4) Isolasi sosial adalah keadaan di mana seseorang merasa kesepian dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungan sekitarnya.
- 5) Halusinasi adalah gangguan yang disebabkan oleh persepsi yang salah terhadap suatu stimulus.



2.1.6 Tahapan Halusinasi

Tahapan halusinasi terbagi menjadi lima tahapan (Setyani, 2019), yaitu :

- a. Fase Pertama (*Sleep Disorder*), fase ini adalah tahap awal seseorang sebelum masuk pada halusinasi. Pasien mengalami banyak masalah. Dia ingin menghindari lingkungan dan takut diketahui orang lain tentang masalahnya. Sebagai akibat dari akumulasi berbagai faktor stres, masalah menjadi lebih sulit. Contohnya termasuk kekasih hamil, keterlibatan dengan narkoba, dikhianati oleh kekasih, masalah di kampus, putus sekolah, dan sebagainya. Besarnya stressor semakin membuat pasien tertekan. Sementara kurangnya dukungan sistem dan kurangnya persepsi masalah membuat pasien menjadi sulit tidur dan berlangung secara terus-menerus sehingga pasien terbiasa menghayal. Pasien kemudian menganggap hayalan tersebut sebagai pemecahan masalah.
- b. Fase Kedua (*Comforting*), pada fase ini galusinasi secara umum diterima oleh pasien sebagai sesuatu yang alami. Pasien mengalami emosi yang tidak stabil, seperti cemas, kesepian, perasaan berdosa, dan ketakutan. Pasien juga mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka dari kecemasan yang muncul. Menurutnya, saat ini ia cenderung merasa nyaman dengan halusinasinya jika keemasannya diatur. Perilaku yang biasanya muncul termasuk menyeringai atau tertawa yang tidak sesuai, gerakan mata yang cepat, respons verbal yang lamban, diam, dan dipenuhi dengan sesuatu yang mengasyikkan.

- c. Fase Ketiga (*Condemning*), pada tahap ini sebagian besar pasien mengalami halusinasi. Pengalaman sensori pasien sering muncul dan bias. Pasien mulai merasa tidak bisa mengendalikannya, dan dia mulai berusaha untuk menjaga jarak antara dirinya dan hal-hal yang dia lihat. Dengan intensitas waktu yang lama, pasien mungkin merasa malu dan menarik diri dari orang lain. Peningkatan sistem syaraf otonom yang menunjukkan ansietas atau kecemasan, seperti pernafasan yang meningkat, tekanan darah dan denyut nadi yang menurun, dan sulit berkonsentrasi, adalah beberapa contoh perilaku yang muncul pada pasien.
- d. Fase Keempat (*Controlling*), pada tahap ini fungsi sensori mulai kehilangan relevansinya dengan keadaan sebenarnya. Pasien mencoba menolak suara atau sensori yang tidak normal. Pasien mungkin merasa kesepian setelah halusinasinya berakhir. Ini adalah titik awal fase gangguan psikotik. Perilaku yang biasanya muncul termasuk kecenderungan untuk mengikuti petunjuk yang berasal dari isi halusinasi, kesulitan berhubungan dengan orang lain, dan rentang perhatian yang singkat.
- e. Fase Kelima (*Conquering*), pada fase ini pasien sudah mengalami gangguan dalam menilai lingkungan sekitarnya. Pengalaman sensori pasien terganggu. Pasien mulai terasa terancam dengan datangnya suara-suara terutama bila pasien tidak dapat menuruti ancaman atau perintah yang ia dengar dari halusinasinya. Halusinasi dapat

berlangsung selama minimal empat jam atau seharian bila pasien tidak mendapatkan komunikasi terapeutik. Terjadi gangguan psikotik berat. Perilaku yang muncul adalah perilaku menyerang, risiko bunuh diri atau membunuh, dan kegiatan fisik yang merefleksikan isi halusinasi (amuk, agitasi, menarik diri).

2.1.7 Manifestasi Klinis Halusinasi

Manifestasi klinis dari halusinasi ditemukan berdasarkan data objektif dan data subjektif dari pasien (Sutejo, 2017). Tanda dan gejala halusinasi antara lain:

a. Halusinasi pendengaran (auditory)

Data Subjektif :

- 1) Pasien menyatakan bahwa mereka merasa seperti mereka mendengar suara atau kegaduhan.
- 2) Pasien menyatakan bahwa dia mendengar suara yang mengajaknya berbicara.
- 3) Pasien menyatakan bahwa dia mendengar suara yang memintanya untuk melakukan tindakan yang berbahaya.
- 4) Pasien menyatakan bahwa dia mendengar suara yang menimbulkan ancaman bagi dirinya atau orang lain.

Data Objektif :

- 1) Pasien Nampak sedang bicara sendiri.
- 2) Pasien nampak tertawa sendiri.
- 3) Pasien nampak marah tanpa alasan yang jelas.

- 4) Pasien nampak memusatkan telinga ke arah tertentu.
- 5) Pasien nampak menutup telinga.
- 6) Pasien terlihat menunjuk ke arah tertentu.
- 7) Pasien terlihat komat kamin sendiri.

b. Halusinasi penglihatan (visual)

Data Subjektif

- 1) Pasien mengatakan bahwa ia melihat seseorang yang sudah meninggal, makhluk tertentu, bayangan hantu atau sesuatu yang menakutkan.

Data Objektif

- 1) Tatapan mata pasien tampak melihat ke tempat tertentu.
- 2) Pasien tampak menunjuk ke arah tertentu.
- 3) Pasien tampak ketakutan pada objek tertentu yang dilihat.

c. Halusinasi penciuman

Data Subjektif

- 1) Pasien mengatakan mencium sesuatu seperti : bau mayat, bau darah, bau bayi, bau feses, atau bau masakan, parfum yang menyenangkan.
- 2) Pasien mengatakan sering mencium bau sesuatu.

Data Objektif

- 1) Pasien nampak memusatkan hidung pada tempat tertentu.
- 2) Ekspresi wajah pasien tampak seperti mencium sesuatu dengan gerakan cuping hidung.

d. Halusinasi pengecapan

Data Subjektif

- 1) Pasien mengatakan bahwa dia merasakan makanan tertentu, merasakan rasa tertentu, atau mengunyah makanan tertentu meskipun tidak makan apa pun.
- 2) Pasien mengatakan bahwa mereka merasa seperti mereka minum darah, nanah, dan hal-hal lain.

Data Objektif

- 1) Pasien tampak seperti mengecap sesuatu.
- 2) Pasien tampak meludah dengan sering
- 3) Pasien menunjukkan gejala mual atau muntah

e. Halusinasi perabaan

Data Subjektif

- 1) Pasien mengatakan bahwa ada sesuatu yang meraba tubuhnya, seperti tangan, hewan kecil, atau makhluk halus.
- 2) Pasien menyatakan bahwa ia mengalami sensasi di permukaan kulitnya, seperti sensasi panas atau dingin, tersengat aliran listrik, dan lainnya.

Data Objektif

- 1) Pasien tampak mengusap, menggaruk garuk, meraba-raba permukaan kulitnya.

- 2) Pasien tampak menggerak-gerakkan tubuhnya seperti merasakan sesuatu merabanya (Helidrawati, 2020).

2.1.8 Penatalaksanaan

Menurut Rahayu, (2016) penatalaksanaan medis untuk pasien yang mengalami halusinasi terbagi menjadi dua, yaitu terapi farmakologi dan nonfarmakologi, diantaranya:

a. Terapi farmakologi

- 1) Clorpromazin adalah obat yang berfungsi sebagai antipsikotik dan antiemetic. Obat ini digunakan untuk gangguan psikotik seperti *skizofrenia*, serta untuk fase mania pada gangguan bipolar, gangguan ansietas, agitasi, anak yang terlalu aktif, dan gangguan *skizofrenia*. Efek samping yang disebabkan oleh obat ini seperti hipertensi, hipotensi, kejang, sakit kepala, mual, muntah, dan mulut kering.
- 2) Haloperidol adalah obat yang berfungsi sebagai antipsikotik, butirofenon, dan neuroleptic. Obat ini digunakan untuk mengobati psikosis akut atau kronik. Tujuan penggunaan obat ini adalah untuk mengontrol aktivitas yang berlebihan yang dilakukan oleh anak serta masalah perilaku yang menyipang. Obat ini dapat menyebabkan efek samping seperti pusing, mual-muntah, sakit kepala, kejang, anoreksia, mulut kering, dan insomnia.
- 3) Trihexypenidil adalah obat antiparkinson. Digunakan untuk penyakit parkinson untuk mengontrol kelebihan aseptilkolin dan

menyeimbangkan kadar defisiensi dopamine yang diikat oleh sinaps untuk mengurangi efek kolinergik yang berlebihan. Obat ini dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, mulut kering, dan hipotensi.

b. Terapi Nonfarmakologi

1) Terapi Aktivitas Kelompok

Aktivitas kelompok yang dirancang untuk meningkatkan persepsi individu adalah bagian dari terapi aktivitas kelompok untuk gangguan persepsi sensori halusinasi.

2) Elektro Convulsive Therapy

Penanganan fisik yang dikenal sebagai terapi listrik menggunakan arus listrik 75-100 volt. Terapi ini belum diketahui secara jelas, tetapi dapat meringankan gejala *skizofrenia*, memungkinkan penderita *skizofrenia* berhubungan dengan orang lain.

3) Psikoterapi Dzikir

Terapi dzikir adalah jenis terapi psikoreligius di mana media dzikir digunakan untuk mengingatkan kita kepada Allah SWT dengan tujuan menenangkan hati dan pikiran. Seseorang yang membaca dzikir akan merasa lebih tenang dan telah menyerahkan segala masalah mereka kepada Allah, sehingga beban stres yang membebani mereka berkurang (Pribadi & Djamaludin, 2019).

Beberapa ulama' menyampaikan tentang dzikir sebagai perbuatan mengingat Allah dan keagungan-Nya, baik dengan lisan maupun

dengan hati, yang meliputi hampir semua bentuk ibadah dan perbuatan baik, seperti: Tasbih, Tahmid, Shalat, membaca Al-Qur'an, berdo'a, melakukan perbuatan yang baik dan menghindarkan diri dari kejahatan yang di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tujuan dzikir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah bisa terwujud. Dalam arti khusus, dzikrullah adalah menyebut nama Allah sebanyak banyaknya dengan memenuhi tata tertib, metode, rukun dan syaratnya (Rofiq & Sutopo, 2023).

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan

2.2.1 Pengkajian

Pengkajian keperawatan jiwa adalah suatu proses sistematis pengumpulan data, baik subjektif maupun objektif, dengan tujuan menentukan tindakan keperawatan yang tepat untuk individu, keluarga, dan komunitas (Damayanti & Iskandar, 2014). Hal-hal yang perlu dalam pengkajian, yaitu:

a. Identitas Pasien

Identitas pasien terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, tanggal masuk dan nomor rekam medik, informan, tanggal pengkajian, nomor rumah dan alamat pasien.

b. Keluhan Utama

Keluhan utama biasanya terdiri dari senyum sendiri, bicara sendiri, tertawa sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, menarik diri dari

orang lain, ekspresi muka tegang, mudah tersinggung, tidak dapat membedakan antara yang nyata dan palsu, jengkel dan mudah marah, tidak dapat mengurus diri sendiri, dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari.

c. Faktor Predisposisi

Faktor-faktor ini berisiko dan dapat mempengaruhi seseorang untuk mengalami peningkatan stres. Ini termasuk stres yang dihasilkan oleh individu itu sendiri, orang-orang di sekitarnya, genetika, perkembangan sosial kultural, dan biokimia psikologis.

- 1) Faktor Perkembangan : Faktor ini bisa menjadi salah satu penyebab stress pada seseorang. Tidak dapat berinteraksi dengan orang lain karena kecacatan mental adalah salah satu contoh perkembangan yang dapat menyebabkan stres.
- 2) Faktor sosiokultural : Akibat dari berbagai faktor sosiokultural, berbagai faktor di masyarakat dapat menyebabkan seseorang merasa terasing dari lingkungannya.
- 3) Faktor biokimia : Jika seseorang mengalami stres yang berlebihan, tubuh mereka menghasilkan zat biokimia yang menyebabkan halusinogenik neurokimia.
- 4) Faktor psikologis : Seseorang akan mengalami stres dan kecemasan yang tinggi disebabkan oleh lingkungan sekitarnya yang tidak baik dan peran ganda yang tidak diterima dan

bertentangan. Hal ini akan berakhir dengan gangguan orientasi realitas seperti halusinasi.

- 5) Faktor genetik :Faktor keturunan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penyakit.
- d. Faktor Presipitasi, yaitu adanya rangsangan lingkungan yang sering, seperti adanya pencetus kelompok yang menyebabkan pasien stres, terlalu sering diajak berkomunikasi oleh orang-orang yang tidak nyata di lingkungannya, atau lingkungan yang sunyi atau isolasi sering menyebabkan halusinasi karena dapat meningkatkan stres dan kecemasan yang menyebabkan tubuh mengeluarkan zat.
- e. Pengkajian Fisik, yaitu hasil dari tanda vital pasien (TD, nadi, suhu, pernapasan, TB, dan BB) serta keluhan fisik pasien.
- f. Pengkajian Psikososial, yaitu genogram yang menggambarkan tiga generasi.
- g. Konsep diri
 - 1) Citra tubuh, seperti menolak dan tidak menerima perubahan tubuh yang terjadi, menolak untuk melihat dan menyentuh bagian tubuh yang berubah, menolak untuk menjelaskan perubahan tersebut, memiliki persepsi negatif tentang tubuh, memperhatikan bagian tubuh yang hilang, menunjukkan ketakutan terhadap perubahan tersebut, dan merasa putus asa.

- 2) Identitas diri yaitu kurangnya keyakinan diri, kesulitan menetapkan keinginan, dan ketidakmampuan untuk membuat keputusan.
- 3) Peran berubah atau berhenti fungsi peran yang disebabkan penyakit, proses menua putus sekolah dan PHK.
- 4) Identitas diri yaitu mengungkapkan keputusasaan karena penyakitnya dan mengungkapkan keinginan yang terlalu tinggi.
- 5) Harga diri yaitu perasaan malu, kurang percaya diri, gangguan hubungan sosial, rasa bersalah, mencederai diri, dan martabat yang rendah.
- 6) Status mental, dari pengkajian ini pada gangguan halusinasi kadang-kadang data dapat didapatkan seperti senyum sendiri, tertawa sendiri, bicara sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, menggerakkan mata dengan cepat, berbicara yang sangat pelan dan lambat, berusaha menghindari orang lain, menarik diri dari orang lain, dan tidak dapat membedakan antara yang nyata dan tidak nyata.

h. Mekanisme koping yaitu jika mendapatkan masalah, pasien tidak mau menceritakan masalah mereka kepada orang lain karena sangat takut. Pasien menggunakan mekanisme koping untuk mengatasi kecemasan, yang merupakan kesepian yang sebenarnya mengancam dirinya.

Mekanisme koping yang sering digunakan pada halusinasi adalah :

- 1) Regresi : tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu, bahkan selama sehari-hari.
- 2) Menarik diri : kurang percaya pada orang lain dan lebih nyaman dengan dunianya sendiri.
- 3) Proyeksi : Ketika persepsi berubah, memberikan tanggung jawab kepada orang lain

i. Aspek medik

Terapi farmakologi psikomotor, terapi okupasional, TAK, dan rehabilitasi adalah contoh aspek medik dari terapi yang diberikan kepada pasien dalam upaya penyembuhan mereka.

2.2.2 Diagnosis Keperawatan

Diagnosa keperawatan merupakan suatu pengambilan keputusan klinis keperawatan untuk melakukan intervensi disesuaikan dengan kondisi setiap peserta sesuai dengan diagnosis keperawatan menurut (NANDA, 2015-2017). Halusinasi persepsi sensoris yang dialami oleh pasien mempunyai tahapan dan biasanya tidak dapat mengontrol dirinya sehingga dapat ditegakkan diagnosa yaitu :



2.2.3 Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan data dari masalah yang ditemukan yang terdiri atas data, diagnosis, kriteria hasil dan intervensi keperawatan. Penerapan EBN (*Evidence Based Nursing*) adalah bagian dari intervensi keperawatan. Dalam menentukan intervensi keperawatan dapat menggunakan buku SIKI, SLKI, NIC, NOC dan Doenges atau referensi terkait lainnya.

Intervensi keperawatan menurut (Dinarti, 2017) adalah bagian dari proses keperawatan yang mencakup berbagai intervensi untuk menyelesaikan masalah utama dan meningkatkan kesehatan pasien. Perencanaan yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah dan menjadikannya prioritas, membuat tujuan, membuat rencana tindakan, dan menilai asuhan keperawatan pada pasien berdasarkan analisis data dan diagnosis keperawatan. Adapun intervensi yang dilakukan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi adalah :

Tabel 2.1 Tindakan Keperawatan Halusinasi

No	Diagnosis	Tindakan	Rasional
1	Halusinasi	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi halusinasi: isi, frekuensi, waktu terjadi, situasi pencetus, perasaan, respon2. Jelaskan cara mengontrol halusinasi: hardik, obat, bercakap-cakap, melakukan kegiatan3. Latih cara mengontrol halusinasi dengan menghardik. Masukan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik	<ol style="list-style-type: none">1. Dapat menjadi data perawat dalam merumuskan asuhan keperawatan pasien2. Menjadi acuan perawat dalam pemberian intervensi dan memberikan edukasi ke pasien3. Pasien dapat melawan halusinasinya secara mandiri.4. Melatih pasien disiplin dan menjadi pengingat pasien untuk latihan melawan halusinasinya.

No	Diagnosis	Tindakan	Rasional
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan menghardik. Beri pujian. 2. Latih cara mengontrol halusinasi dengan obat (jelaskan 6 benar: jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, kontinuitas minum obat) Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik dan minum obat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai kepatuhan pasien dalam menjalankan terapi 2. Mengetahui obat dapat mencegah pasien salah konsumsi obat dan pasien dapat mengetahui obat yang dikonsumsi. 3. Melatih pasien disiplin dan teratur mengikuti jadwal yang telah dibuatkan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik & obat. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap saat terjadi halusinasi 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat dan bercakap-cakap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang dibuat sebelumnya 2. Menjadi alternatif pengalihan pasien ketika halusinasinya muncul Melatih pasien disiplin dan menjadi acuan pasien dalam
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik & obat & bercakap-cakap. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol halusinasi dg melakukan kegiatan harian (mulai 2 kegiatan) 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang sudah dibuat sebelumnya 2. Dengan melakukan kegiatan fokus pasien akan membuat pasien sibuk sehingga dapat teralihkan dari halusinasinya 3. Melatih pasien disiplin dan menjadi acuan pasien dalam melaksanakan aktivitas terapinya
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik & obat & bercakap-cakap & kegiatan harian. Beri pujian 2. Latih kegiatan harian 3. Nilai kemampuan yang telah mandiri 4. Nilai apakah halusinasi terkontrol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang sudah dibuat sebelumnya 2. Dengan melakukan kegiatan fokus pasien akan membuat pasien sibuk sehingga dapat teralihkan dari halusinasinya 3. Mengetahui krmampuan yang telah mandiri 4. Mengetahui apakah halusinasi telah terkntrol dengan melihat tanda dan gejala yang muncul

2.2.4 Implementasi Keperawatan

Implementasi disesuaikan dengan rencana tindakan keperawatan. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan jiwa diberikan untuk masing-masing pokok masalah. Strategi ini dimulai dengan memberikan kontrak langsung kepada pasien untuk menumbuhkan kepercayaan, kemudian menjelaskan tindakan yang akan dilakukan dan melibatkan pasien. Semua

tindakan harus dicatat, kemudian tanyakan dan lihat reaksi pasien. (Hafizudin, 2021).

2.2.5 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan hasil dari langkah-langkah yang telah diambil dan melihat bagaimana reaksi pasien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dari pasien halusinasi seperti pasien sudah dapat mengontrol halusinasinya, menghindari perilaku kekerasan, membangun hubungan yang percaya, dan menjadi lebih teratur dalam mengonsumsi obat. (Hafizudin, 2021).

Evaluasi dapat dilakukan dengan pendekatan SOAP menjadi pola pikir

S : Respon subjektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan

O : Respon objektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan

A : Gangguan persepsi sensori : Halusinasi (+)

P : Rencana tindak lanjut berdasarkan hasil Analisa dari respon pasien

- a. Mengenal halusinasi
- b. Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik
- c. Mengontrol halusinasi dengan cara patuh minum obat
- d. Mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain
- e. Mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas terjadwal

2.3 Pendekatan Konsep Teori

2.3.1 Teori H.J. Eysenck, J.Wilper dan B.F.Skinner

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah model perilaku yang dikembangkan oleh H.J. Eysenck, J.Wilper, dan B.F.Skinner. Model ini merupakan model terapi modifikasi perilaku yang berasal dari teori belajar (*learning theory*). Terapi yang digunakan pada model ini dilakukan dengan cara:

- a. Teknik relaksasi dan desentisasi dapat digunakan bersama untuk menurunkan kecemasan pasien.
- b. *Asertif training* merupakan teknik belajar tanpa menyakiti orang lain.
- c. *Positive training* adalah teknik yang memberikan motivasi dan mendorong pasien untuk melakukan kegiatan positif. Dengan metode ini, pasien dapat mengenal dan melakukan secara individual dan mendorong diri mereka sendiri untuk menjadi lebih mampu dan mampu melakukan kegiatan positif.
- d. *Self regulasi* yaitu rangkaian standar perilaku yang harus dilakukan oleh pasien, di mana pasien diminta untuk melakukan aktivitas mengobservasi diri sendiri setelah melakukan sesuatu, kemudian dievaluasi lagi. Pada langkah terakhir, pasien diminta untuk berusaha untuk meningkatkan dan menguatkan dirinya dengan berperilaku positif.

Sejalan dengan teori perilaku dari H.J. Eysenck, J.Wilper dan B.F.Skinner dengan halusinasi adalah terapi belajar. Terapi desentisasi

dan relaksasi, misalnya, dapat menurunkan kecemasan dan menenangkan penderita halusinasi, seperti halnya terapi zikir dan membaca Al-Qur'an.

2.4 Evidence Based Practice In Nursing (EBPN)

2.4.1 Definisi Terapi Zikir

Menurut Bahasa kata “dzikir” berasal dari kata “*dzakar*” yang artinya ingat. Zikir juga di artikan “menjaga dalam ingatan”. Sehingga dapat disimpulkan berdzikir kepada Allah artinya menjaga ingatan agar selalu ingat kepada Allah swt. Dzikir menurut syara’ adalah mengingat Allah sesuai syariat yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an dan hadits yang bertujuan untuk menyucikan hati dan mengagungkan Allah swt. Menurut Ibnu Abbas R.A. Dzikir adalah konsep, wadah, sarana, agar manusia tetap terbiasa dzikir (ingat) kepadaNya ketika berada diluar sholat. Terapi dzikir bertujuan untuk mengagungkan Allah, mensucikan hati dan jiwa, serta dapat menyehatkan tubuh dan mengobati penyakit (Raziansyah, 2023).

Terapi zikir, apabila dilafalkan secara baik dan benar dapat membuat hati menjadi tenang dan rileks. Terapi dzikir juga dapat diterapkan pada pasien halusinasi, karena ketika pasien melakukan terapi dzikir dengan tekun dan memusatkan perhatian yang sempurna sehingga dapat memberikan dampak saat halusinasinya muncul pasien bisa menghilangkan suara- suara yang tidak nyata dan lebih dapat menyibukkan diri dengan melakukan terapi dzikir (Raziansyah, 2023).

2.4.2 Tujuan Terapi

Tujuan pemberian terapi Zikir ini adalah pasien mampu mengurangi dan mengontrol halusinasinya, pasien mampu menceritakan perasaannya setelah terapi dan mampu memberi respons terhadapnya *Setting*, atau pengaturan tempat yaitu perawat dan pasien duduk di depan satu sama lain, atau duduk bersampingan tetapi tetap menjaga jarak untuk menciptakan suasana yang tenang dan kondusif. adalah instrumen yang digunakan dalam terapi ini.

2.4.3 Indikasi

Terapi zikir ini dapat memberikan *ketenangan* hati, pikiran menjadi lebih terkendali, dan melapangkan jiwa sehingga dapat mengurangi kecemasan. Terapi dalam penelitian ini diberikan pada pasien dengan indikasi :

- a. Pasien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi
- b. Pasien yang mengalami kecemasan
- c. Pasien yang mengalami stress/depresi
- d. pasien dengan mood yang buruk

2.4.4 Kontraindikasi

Zikir adalah terapi psikoreligius sehingga tidak ada kontraindikasi untuk melakukannya.

2.4.5 Prosedur Terapi

Prosedur pelaksanaan terapi zikir merujuk pada (Devita, 2019) sebagai berikut:

a. Tahap pra interaksi

Pra interaksi adalah langkah awal untuk berkomunikasi dengan baik dan membangun kepercayaan dengan pasien.

- 1) Melakukan seleksi terhadap pasien sesuai dengan kriteria inklusi
- 2) Membina hubungan saling percaya
- 3) Melakukan kontrak waktu, dan tempat.
- 4) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan yang kondusif tenang dan nyaman

b. Tahap orientasi

- 1) Salam Terapeutik
 - a) Memperkenalkan nama dan nama panggilan terapis
 - b) menanyakan nama dan panggilan pasien
- 2) Evaluasi/validasi
 - a) Menanyakan bagaimana perasaan pasien saat ini
 - b) Menanyakan apa yang sudah dilakukan pasien untuk mengatasi perasaannya
- 3) Kontrak
 - a) Menjelaskan pengertian terapi dan tujuan terapi yaitu membantu pasien untuk mengontrol halusinasi
 - b) Menjelaskan tentang proses pelaksanaan

c) Menjelaskan peraturan dalam terapi yaitu pasien diharapkan berpartisipasi dan bekerjasama dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dan tidak boleh putus.

c. Tahap kerja

- 1) Pasien dianjurkan untuk duduk dengan posisi nyaman
- 2) Anjurkan pasien untuk menarik napas dalam sebanyak 3 kali
- 3) Meminta pasien untuk berdzikir dengan membaca tasbih (*subhanallah*), tahmid (*alhamdulillah*) dan takbir (*Allahu akbar*) sebanyak 33 kali menggunakan ruas-ruas jari.
- 4) Memberikan pujian atas keberhasilan dan semangat pasien

d. Tahap terminasi

- 1) Menanyakan perasaan pasien setelah mengikuti terapi
- 2) Memberikan *reinforcement* positif atas kemauan pasien
- 3) Menepakati waktu dan tempat pertemuan selanjutnya

2.4.6 Kriteria Evaluasi

Evaluasi adalah tahap terakhir dari proses terapi. Hal utama yang perlu dievaluasi selama proses ini adalah kemampuan pasien untuk memenuhi rencana sebelumnya dan kesesuaian dengan tujuan utama terapi. Dengan terapi zikir ini, pasien diharapkan dapat mengendalikan halusinasinya dan dapat melakukan sendiri terapi zikir, pasien dapat mengikuti terapi dzikir dari awal hingga akhir kegiatan, memeriksa respon pasien setelah diberikan terapi serta melakukan dokumentasi dilembar evaluasi.

2.4.7 Artikel Utama dan Pendukung

Tabel 2.2. Artikel Utama dan Pendukung Mengenai Terapi Dzikir Untuk Pasien Halusinasi

Judul Artikel/Jurnal	Tahun	Nama Peneliti	Sumber	Metode	Hasil
Penerapan Manajemen Halusinasi: Teknik Distraksi Membaca Al-Qur'an Terhadap Pasien Skizofrenia Dengan Gangguan Persepsi Sensori Di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Paku Kota Solok	2022	Yudistira Afeonneri, Novi Herawati, Abd. Gafar	Jurnal Kesehatan Lentera 'Aisyiyah	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus	Setelah melakukan aktivitas membaca Al-Qur'an terjadinya penurunan mendengar suara-suara bisikan atau suara palsu yang biasa terjadi 2 kali dalam sehari menjadi 1 kali sehari, dari frekuensi 5-30 menit menurun menjadi 1-2 menit.
Pengaruh Terapi Psikoreligius : Membaca Al Fatihah Terhadap Skor Halusinasi Pasien Skizofrenia	2017	Sri Mardiaty, Veny Elita, Febriana Sabrian	Jurnal Ners Indonesia	Penelitian ini menggunakan desain quasy eksperimen dengan pendekatan <i>pre-post test design with control group</i>	Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh psikoreligius membaca Al Fatiah terhadap skor halusinasi pasien skizofrenia dengan <i>p-value</i> (0.019) < (0.05)
Pengaruh Terapi Al-Qur'an Terhadap Penurunan Frekuensi Halusinasi Pendengaran Pasien Skizofrenia	2019	Yeni Devita, Hendriyani	Prosiding SainsTeKes	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain <i>quasy experimental</i> dengan rancangan <i>one group pretest-posttes.</i>	Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh terapi Al-Qur'an terhadap penurunan frekuensi halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia (<i>p-value</i> 0.00)
Cultural-based intervention for psychotic using spiritual therapy in Madura, Indonesia : a case report	2022	Rina Krismiati Gani, Brihastami Sawitri, Menina Vilanova Syamsuri	<i>International Journal of Research Publications</i>	Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus yang dilakukan di Bani Amrini, Bangkalan,	Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pendekatan spiritual dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan ketenangan, meningkatkan

Judul Artikel/Jurnal	Tahun	Nama Peneliti	Sumber	Metode	Hasil
				Madura, Indonesia	kesejahteraan, dan menstimulasi "hormon bahagia" atau endorfin, yang semuanya dapat membantu penderita skizofrenia memperbaiki gejala klinisnya.
Penerapan Terapi Psikoreligi Dzikir Untuk Menurunkan Halusinasi Pada Pasien Skizofrenia di Wilayah Binaan Puskesmas Ambarawa	2022	Anggarawati, Primanto Rico, Khosim A Nanang	Jurnal Keperawatan Sisthana	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus.	Hasil penelitian menunjukkan terapi psikoreligi dzikir dapat menurunkan tanda dan gejala halusinasi pada pasien skizofrenia
Penerapan Terapi Spiritual : Dzikir Terhadap Tingkat Halusinasi	2023	Tazkiah Raziansyah	Jurnal Penelitian Perawat Profesional	Penelitian ini menggunakan <i>two group, one-group pretest-posttest, one-group control design</i>	Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh spiritual: dzikir terhadap tingkat halusinasi pada pasien halusinasi di wilayah kerja Puskesmas Martapura 2
Penerapan Terapi Spiritual Dzikir Terhadap Tanda Dan Gejala Halusinasi Pendengaran	2022	Devi Liana Puspita Sari, Nury Luthfiyatil Fitri, Uswatun Hasanah	Jurnal Cendikia Muda	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus.	Hasil penelitian menunjukkan setelah diberikan penerapan terapi spiritual: dzikir terjadi penurunan tanda gejala halusinasi pendengaran
Pengaruh Terapi Zikir Terhadap Penurunan Tanda Dan Gejala Halusinasi Pada Pasien Halusinasi	2020	Emulyani, Herlambang	Healthcare : Jurnal Kesehatan	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain <i>quasi experiment</i> tanpa kontrol	Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara terapi dzikir terhadap penurunan tanda dan gejala halusinasi dengan nilai <i>p value</i> 0,000 ($p < 0,05$).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Nursalam (2017) Studi kasus adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari karakteristik, latar belakang, dan karakteristik unik dari suatu kasus. Oleh karena itu, studi kasus lebih berfokus pada detail dan terperinci. Jenis penelitian ini mempelajari kondisi pasien secara menyeluruh.

3.2 Subjek Studi Kasus

Kriteria inklusi dan eksklusi untuk penelitian ini digunakan untuk memilih responden. Kriteria inklusi untuk penelitian ini adalah :

- a. Pasien yang mengalami masalah keperawatan halusinasi
- b. Pasien yang telah bersedia jadi pasien kelolaan
- c. Pasien yang beragama Islam
- d. Pasien yang bisa diajak komunikasi dengan kooperatif

Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu :

- a. Pasien dengan kategori halusinasi pada fase IV (*controlling*)
- b. Pasien yang tidak dapat dikaji

3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi dalam penelitian ini *case study* dengan melakukan proses asuhan keperawatan terhadap pasien atau individu dengan masalah utama gangguan persepsi sensori : halusinasi menggunakan terapi zikir di RSKD DADI Provinsi Sulawesi Selatan. Pemberian terapi zikir pada pasien ini dilakukan selama 6

hari pada tanggal 25 Juli sampai 2 Agustus 2023 dimana setiap hari pasien dijadwalkan untuk melakukan terapi sebanyak 2 kali yaitu saat pagi dan sore.

3.4 Instrumen Studi Kasus

Instrumen yang digunakan pada penelitian yaitu format proses asuhan keperawatan sementara untuk terapi zikir tidak memerlukan alat apapun cuman membutuhkan ruas jari

3.5 Prosedur Pengambilan Data

Prosedur penelitian menggambarkan proses studi kasus yang terdiri dari beberapa tahapan. Penelitian ini telah melalui beberapa tahap, diantaranya

1. Persiapan

Tahap pertama, peneliti membuat judul studi kasus dan melakukan pencarian literatur.

2. Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data base melalui internet.

3. Penyusunan Laporan

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan dimulai dengan menyusun pengkajian dari data objektif dan subjektif, serta wawancara. Selanjutnya, merumuskan diagnosis, dan menyusun perencanaan atau intervensi, implementasi dan evaluasi serta terakhir melakukan pendokumentasian dengan bentuk laporan karya tulis ilmiah. Laporan ini ditulis dengan

mengikuti tahapan penulisan karya tulis ilmiah yang ditetapkan dalam panduan karya tulis akhir profesi ners di UIN Alauddin Makassar.

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Pengambilan data observasi dan wawancara pada pasien halusinasi dilakukan di tanggal 25 Juli 2023 di ruangan Kenari RSKD Dadi Sulawesi Selatan.

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dan penyajian data pada kasus ini didefinisikan sebagai kajian kasus yang didapatkan secara faktual, dituangkan dalam teks, dan sistematis. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan diagnosis, intervensi, tindakan/implementasi, dan evaluasi, serta semua jawaban dari wawancara dan observasi yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara menjabarkan seluruh jawaban-jawaban yang diperoleh dari wawancara dan observasi, format asuhan keperawatan, dan lembar evaluasi tanda dan gejala pasien halusinasi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian. Data disajikan ke dalam teks dan tabel. Identitas pasien akan menggunakan inisial untuk menjamin kerahasiaan pasien.

Analisis data pada penelitian ini dengan halusinasi yaitu pasien mengatakan pernah di rawat di RSKD di sebelumnya. Hal ini didukung dengan data yang diperoleh melalui buku Rekam Medik yang menyatakan bahwa pasien pernah dirawat di RSKD Dadi sebanyak 4 kali dan terakhir pasien dirawat satu tahun yang dengan diagnosis yang sama yaitu halusinasi. Pasien mengatakan jika halusinasinya muncul pasien sering mendengar suara yang menyuruhnya untuk mengikuti suarayang menyuruhnya menyakiti diri tersebut.

3.8 Etika Studi Kasus

Setiap penelitian kesehatan yang mengikut sertakan relawan manusia sebagai subjek penelitian wajib didasarkan pada tiga prinsip etik (kaidah dasar moral), yaitu

1. *Respect of persons (Others)*, bertujuan untuk menghormati hak otonomi pasien untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dalam penelitian ini peneliti menanyakan persetujuan pasien (*informed consent*), dimana pasien diberikan kebebasan untuk memilih apakah bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian atau tidak. Jika pasien bersedia maka peneliti akan melakukan kontrak waktu dan tempat dengan pasien untuk pelaksanaan terapi.
2. *Beneficence* prinsip berbuat baik, memberikan manfaat yang maksimal dan risiko minimal. Dalam penelitian ini pasien dijelaskan manfaat berzikir yang bertujuan untuk mengurangi gejala dan mengontrol halusinasi pasien. Penelitian ini juga memiliki risiko yang sangat rendah karena dalam penelitian ini tidak ada tindakan *invasive*.
3. Keadilan (*Justice*), prinsip ini menekankan setiap orang layak mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya menyangkut keadilan distributif dan pembagian seimbang (*equitable*). Penelitian ini menerapkan etika adil dengan cara peneliti tidak membedakan pasien berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, budaya, latar belakang pasien dan sebagainya serta tidak mengabaikan pasien yang lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV LAPORAN KASUS

RUANG RAWAT : Kenari
TANGGAL DIRAWAT : 24 November 2022

4.1. Pengkajian

I. IDENTITAS KLIEN

Inisial : Tn. N (L)
Tanggal pengkajian : 23 Juli 2023
Umur : 27 tahun
RM No. : 092184
Informan : Pasien

II. ALASAN MASUK

Pasien mengatakan ia dibawa ke RSKD Dadi diantar oleh orang tuanya karena pernah menikam ayahnya sebanyak dua kali namun ayahnya luka sedikit dan menyeret pasien ke RSKD Dadi. Dari data yang didapatkan di buku Rekam Medik, pasien masuk yang ke 6 kalinya di RSKD Dadi diantar oleh Dinas sosial Makassar. Riwayat rawat inap terakhir di RSKD Dadi satu tahun yang lalu dan pulang dalam keadaan membaik.

Kondisi Saat ini:

Pasien mengatakan sering mendengar suara suara orang yang dia kenal dan menyuruhnya untuk memukul diri. Saat halusinasinya muncul pasien menyakiti dirinya sendiri dan orang di sekitarnya, namun setelah masuk rumah sakit pasien mulai bisa menghardik halusinasinya.

III. FAKTOR PREDISPOSISI

1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu?

Ya Tidak

2. Pengobatan sebelumnya

Berhasil Kurang berhasil Tidak berhasil

Pelaku/Usia

Korban/Usia

Saksi/Usia

3. Aniaya Fisik

20

	Pelaku/Usia	Korban/Usia	Saksi/Usia
Aniaya seksual	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Pelaku/Usia	Korban/Usia	Saksi/Usia
Penolakan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Pelaku/Usia	Korban/Usia	Saksi/Usia
Kekerasan dalam keluarga	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Pelaku/Usia	Korban/Usia	Saksi/Usia
Tindakan Kriminal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Jelaskan No. 1, 2, 3 :

- Berdasarkan data dari buku RM pasien telah masuk ke RSKD Dadi sebanyak 6 kali
- Pasien mengatakan rutin minum obat saat dirawat di RSKD Dadi
- Pasien mengatakan pernah menikam ayahnya sebanyak dua kali namun ayahnya luka sedikit dan menyeret pasien ke ruamh sakit

Masalah Keperawatan : Resiko Perilaku Kekerasan dan ketidak patuhan minum obat diluar rumah sakit

4. Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa

Ya Tidak

Hubungan keluarga

Gejala

Riwayat Pengobatan

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

5. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan

Pasien mengatakan tidak pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan di masa lalu.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

IV. FISIK

1. Tanda vital : TD: 110/70 mmHg ; N: 80x/ menit ; S: 36,5 °C
P: 20x/ menit
2. Ukur : TB: 168 cm, BB: 54 kg

- b. Identitas : Pasien mengatakannya seorang laki-laki berusia 27 tahun, sebelum dirawat di RS pasien bekerja sebagai penjual ikan.
- c. Peran : Pasien mengatakan di rumah ia berperan sebagai anak, namun pasien mengatakan ia merasa sebagai beban di keluarganya karena kondisinya saat ini.
- d. Ideal diri : Pasien mengatakan ia berharap untuk cepat sembuh agar bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Pasien berharap semoga ia dapat melakukan aktivitasnya kembali jika sudah pulang.
- e. Harga diri : Pasien mengatakan terkadang ia malu dengan kondisinya saat ini karena teman-temannya di kampung sering mengejeknya.

Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah

- 3. Hubungan Sosial
 - a. Orang yang berarti : Pasien mengatakan orang yang berarti di hidupnya adalah keluarga dan teman-temannya.
 - b. Peran serta dalam kegiatan kelompok/masyarakat: Pasien mengatakan sebelum sakit ia biasa mengikuti kegiatan seperti gotong royong.
 - c. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain : pasien mengatakan tidak ada kendala dalam bersosialisasi dengan orang lain. Pasien mengatakan mempunyai teman sekampung selama dirawat di ruangan Kenari.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

- 4. Spritual :
 - a. Nilai dan keyakinan : Pasien mengatakan bahwa penyakitnya ini merupakan ujian dari Allah SWT
 - b. Kegiatan Ibadah : pasien mengatakan sebelum sakit ia rajin sholat 5 waktu di masjid namun terkadang bolong-bolong jika pasien sholat di rumah.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

VI. SATUS MENTAL

1. Penampilan

- Tidak rapih Penggunaan pakaian tidak sesuai cara berpakaian seperti biasanya

Jelaskan : Penampilan pasien tampak rapih dan bersih, kuku tampak pendek, kulit tampak bersih dan tidak ada luka di tubuh pasien.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

2. Pembicaraan

- Cepat Keras Gagap Inkoheren
 Apatis Lambat Membisu Tidak mampu memulai pembicaraan

Jelaskan : Pada saat berinteraksi pasien tampak koperatif dan mampu menjawab pertanyaan yang ditanyakan namun respon pasien agak lambat

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

3. Aktivitas Motorik :

- Lesu Tegang Gelisah Agitasi
 Tik Grimasen Tremor Kompulsif

Jelaskan : Pada saat berinteraksi pasien tampak gelisah, pasien tampak sering menunduk saat dikaji.

Masalah Keperawatan : Halusinasi

4. Alam Perasaan

- Sedih ketakutan Putus asa Khawatir Gembira berlebihan

Jelaskan : Pasien mengatakan saat ini ia merasa sedih karena rindu dengan keluarganya di kampung dan ingin segera pulang.

Masalah Keperawatan : Pasien merasa rindu dengan keluarganya

5. Afek

- Datar Tumpul Labil Tidak sesuai

Jelaskan : Pada saat berinteraksi pasien tampak berekspresi seperti orang pada umumnya dan dapat mengekspresikan sesuai apa yang dirasakan

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

6. Interaksi selama wawancara

- Bermusuhan Tidak kooperatif Masalah tersinggung
 Kontak mata (-) Defensif Curiga

Jelaskan : Saat interaksi pasien tampak kooperatif namun kontak mata dengan perawat kurang. Pasien tampak sering memandang ke arah lain

Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah

7. Persepsi

- Pendengaran Penglihatan Perabaan
 Pengecapan Penciuman

Jelaskan :

- Pasien mengatakan mendengar suara untuk memukul dirinya
- Pasien mengatakan menutup telinga atau bercerita sama teman temannya

Masalah Keperawatan : Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi

8. Proses Pikir

- Sirkumtansial Tangensial Kehilangan asosiasi
 Flight of idea *Blocking* pengulangan
pembicaraan/persevarasi

Jelaskan : Pasien mampu menjawab pertanyaan dengan sesuai dan tidak berbelit-belit

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

9. Isi Pikir

- Obsesi Fobia Hipokondria
 Depersonalisasi Ide yang terkait Pikiran Magis
Waham
 Agama Somatik Kebesaran Curiga
 Nihilistic Sisip pikir siar pikir Kontrol pikir

Jelaskan :

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

10. Tingkat Kesadaran

Bingung Sedasi Stupor

Disorientasi

Waktu Tempat Orang

Jelaskan : Tingkat kesadaran compos mentis, pasien mengetahui waktu dan tempat ia dirawat, pasien dapat mengenali nama perawat serta nama temannya

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

11. Memori

Gangguan daya ingat jangka panjang Gangguan daya ingat jangka pendek
 Gangguan daya ingat saat ini Konfabulasi

Jelaskan : Daya ingat pasien baik, pasien dapat mengingat kejadian di masa lalu maupun kejadian saat ini

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

12. Tingkat Konsentrasi dan berhitung

Mudah beralih Tidak mampu konsentrasi Tidak mampu berhitung sederhana

Jelaskan : Tingkat konsentrasi pasien baik, pasien dapat melakukan perhitungan sederhana.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

13. Kemampuan penilaian

Gangguan ringan Gangguan bermakna

Jelaskan : Pasien dapat mengambil keputusan

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

14. Daya Tilik Diri

Mengingkari penyakit yang diderita Menyalahkan hal-hal diluar dirinya

Jelaskan : Pasien mengetahui tentang penyakit yang dialaminya

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

VII.KEBUTUHAN PERSIAPAN PULANG

1. Makan

Bantuan minimal Bantuan total

2. BAB/BAK

Bantuan minimal Bantuan total

Jelaskan : Pasien mampu makan dan BAB/BAK secara mandiri, makanan pasien disediakan dengan bantuan petugas

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

3. Mandi

Bantuan minimal Bantuan total

4. Berpakaian/berhias

Bantuan minimal Bantuan total

5. Istirahat dan tidur

Tidur siang lama : 14.00 s/d 17.00

Tidur malam lama : 21.00 s/d 05.00

Kegiatan sebelum/sesudah tidur

6. Punggunaan obat

Bantuan minimal Bantuan total

7. Pemeliharaan Kesehatan

Perawatan lanjutan Ya Tidak

Perawatan pendukung Ya Tidak

8. Kegiatan di dalam rumah

Mempersiapkan makanan Ya Tidak

Menjaga kerapian rumah Ya Tidak

Mencuci pakaian Ya Tidak

Pengaturan pakaian Ya Tidak

9. Kegiatan di luar rumah

Belanja Ya Tidak

Transportasi Ya Tidak

Lain-lain Ya Tidak

Jelaskan : Pasien perlu diingatkan dan diawasi saat meminum obat

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

VIII. MEKANISME KOPING

Adaptif

- Bicara dengan orang lain
- Mampu menyelesaikan masalah
- Tehnik relaksasi
- Aktivitas konstruktif
- Olahraga
- Lainnya

Maladaptif

- Minum alkohol
- Reaksi lambat/belebi
- Bekerja berlebihan
- Menghindar
- Mencederai diri
- Lainnya

Jelaskan : Pasien mengatakan jika mempunyai masalah pasien hanya bersabar dan menyimpan masalahnya sendiri.

Masalah Keperawatan : Pasien beresiko kehilangan kesadaran akibat pengaruh minum alkohol

IX. MASALAH PSIKOSOSIAL DAN LINGKUNGAN

- Masalah dengan dukungan kelompok, spesifik -
- Masalah berhubungan dengan lingkungan, spesifik -
- Masalah dengan pendidikan, spesifik -
- Masalah dengan pekerjaan, spesifik -
- Masalah dengan perumahan, spesifik -
- Masalah ekonomi, spesifik -
- Masalah dengan pelayanan kesehatan, spesifik -
- Masalah lainnya, spesifik -

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

X. PENGETAHUAN KURANG TENTANG

- Penyakit jiwa
- Faktor predisposisi
- Koping
- Lainnya
- Sistem pendukung
- Penyakit fisik
- Obat-obatan


Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

XI. ASPEK MEDIK

Diagnosa Medis : Skizofrenia

Terapi Medik :

Resperidone 2 mg/12 jam via oral untuk meredakan gejala skizofrenia dan gangguan bipolar




XII. ANALISA DATA

Tabel 4.1. Analisa Masalah

Data	Masalah
<p>Data Subjektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan mendengar suara untuk memukul dirinya - Pasien mengatakan menutup telinga atau bercerita sama teman temannya <p>Data Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak gelisah - Pasien tampak sering mengusap usap tangan dan kakinya - Pasien terkadang tampak duduk menyendiri di tempat tidurnya 	<p>Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran</p>
<p>Data Subjektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan terkadang ia malu dengan kondisinya saat ini karena teman-temannya di kampung sering mengejeknya - Pasien merasa sebagai beban keluarga karena kondisinya saat ini <p>Data Objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontak mata dengan perawat kurang - Saat berinteraksi pasien tampak sering memandang ke arah lain 	<p>Harga Diri Rendah</p>
<p>Data Subjektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan mendengar suara untuk memukul dirinya - Pasien mengatakan telah menikam ayahnya <p>Data Objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajah pasien terkadang murung 	<p>Resiko Perilaku Kekerasan</p>

XIII. POHON MASALAH



DAFTAR DIAGNOSIS KEPERAWATAN

- 1) Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi
- 2) Harga Diri Rendah

INTERVENSI KEPERAWATAN

Inisial Klien : Tn. N

Ruangan : KENARI

RM : 092184

Diagnosis Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan	Rasional
Halusinasi	Setelah dilakukan 2x interaksi pasien dapat mengidentifikasi dan mengontrol halusinasinya dengan kriteria hasil : 1. Pasien dapat menyebutkan isi, frekuensi, waktu terjadi, situasi dan respon terhadap halusinasi 2. Pasien dapat mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik	1. Identifikasi halusinasi : isi, frekuensi, waktu terjadi, situasi pencetus, perasaan, respon 2. Jelaskan cara mengontrol halusinasi: hardik, obat, bercakap-cakap, melakukan kegiatan 3. Latih cara mengontrol halusinasi dengan menghardik 4. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik	1. Dapat menjadi data perawat dalam merumuskan asuhan keperawatan pasien 2. Menjadi acuan perawat dalam pemberian intervensi dan memberikan edukasi ke pasien 3. Pasien dapat mengontrol halusinasinya secara mandiri 4. Melatih pasien disiplin dan menjadi pengingat pasien untuk latihan mengontrol halusinasinya
	Setelah dilakukan 2x interaksi diharapkan pasien dapat mengontrol halusinasinya menggunakan obat dengan kriteria hasil: 1. Pasien dapat menjelaskan jenis obat, frekuensi dan tujuan minum obat secara rutin	1. Evaluasi kegiatan menghardik. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol halusinasi dengan obat (jelaskan 6 benar : jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, kontinuitas minum obat) 3. Masukkan ada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik dan minum obat	1. Menilai kepatuhan pasien dalam menjalankan terapi 2. Mengetahui obat yang dikonsumsi agar pasien terhindari dari salah konsumsi obat 3. Melatih pasien untuk disiplin dan teratur mengikuti jadwal yang telah dibuat

<p>2. Pasien dapat mengontrol halusinasinya dengan cara minum obat</p>		
<p>Setelah dilakukan 2x interaksi pasien dapat mengontrol halusinasinya dengan bercakap-cakap dengan orang lain dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dapat bercakap-cakap dengan pasien lain atau perawat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik & minum obat. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap saat terjadi halusinasi 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat dan bercakap-cakap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang dibuat sebelumnya 2. Sebagai alternatif pengalihan bagi pasien saat halusinasinya muncul 3. Melatih pasien disiplin dan menjadi acuan pasien dalam melakukan latihan menghardi, minum obat dan bercakap-cakap
<p>Setelah dilakukan 2x interaksi pasien dapat mengontrol halusinasinya dengan cara melakukan kegiatan, dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dapat melakukan kegiatan harian 2. Pasien dapat mempraktikkan semua cara mengontrol halusinasi yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik, obat & bercakap-cakap. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan harian (mulai 2 kegiatan) 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang telah dibuat sebelumnya 2. Melakukan kegiatan dapat mengalihkan pikiran pasien dari halusinasinya 3. Melatih pasien disiplin dan menjadi acuan pasien dalam melakukan kegiatan terapinya

	telah dipelajari		
	Setelah dilakukan 2x interaksi pasien dapat mengontrol halusinasinya dengan melakukan kegiatan, dengan kriteria hasil : 1. Pasien dapat melakukan kegiatan harian 2. Pasien dapat mempraktikkan semua cara mengontrol halusinasi yang telah dipelajari	1. Evaluasi kegiatan menghardik, obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian. Beri pujian 2. Latih kegiatan harian 3. Nilai kemampuan yang telah mandiri 4. Nilai apakah halusinasi terkontrol	1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang telah dibuat sebelumnya 2. Melakukan kegiatan dapat mengalihkan pikiran pasien dari halusinasinya 3. Mengetahui kemampuan mandiri pasien 4. Mengetahui apakah halusinasi telah terkontrol dengan melihat tanda dan gejala yang muncul

Harga Rendah	Diri	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan, pasien dapat mengetahui kemampuan dan aspek yang dimiliki dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dapat memilih kegiatan sesuai dengan kemampuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kemampuan melakukan kegiatan dan aspek positif pasien (buat daftar kegiatan) 2. Bantu pasien menilai kegiatan yang dapat dilakukan saat ini (pilih dari daftar kegiatan) : buat daftar kegiatan yang dapat dilakukan saat ini 3. Bantu pasien memilih salah satu kegiatan yang dapat dilakukan saat ini untuk dilatih 4. Latih kegiatan yang dipilih (alat dan cara melakukannya) 5. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan dua kali per hari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kemampuan pasien yang akan dilatih 2. Menentukan kemampuan yang akan dilatih 3. Menentukan kegiatan yang akan dilatih terlebih dahulu 4. Kegiatan aspek positif yang dimiliki pasien dapat meningkatkan harga diri pasien 5. Meningkatkan kedisiplinan pasien untuk memasukan jadwal latihan
		<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan, pasien dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melatih kemampuan kedua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan pertama yang telah dilatih dan berikan pujian 2. Bantu pasien memilih kegiatan kedua yang akan dilatih 3. Latih kegiatan kedua (alat dan cara) 4. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan : dua kegiatan masing-masing dua kali per hari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang dibuat sebelumnya 2. Menentukan kegiatan yang akan dilatih terlebih dahulu 3. Kegiatan aspek positif yang dimiliki pasien dapat meningkatkan harga diri pasien 4. Meningkatkan kedisiplinan pasien untuk memasukan jadwal kegiatan

	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan, pasien dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melatih kemampuan ketiga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan pertama dan kedua yang telah dilatih dan berikan pujian 2. Bantu pasien memilih kegiatan ketiga yang akan dilatih 3. Latih kegiatan ketiga (alat dan cara) 4. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan : tiga kegiatan masing-masing dua kali per hari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang dibuat sebelumnya 2. Menentukan kegiatan yang akan dilatih terlebih dahulu 3. Kegiatan aspek positif yang dimiliki pasien dapat meningkatkan harga diri pasien 4. Meningkatkan kedisiplinan pasien untuk memasukan jadwal kegiatan
	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan, pasien dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melatih kemampuan keempat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan pertama, kedua dan ketiga yang telah dilatih dan berikan pujian 2. Bantu pasien memilih kegiatan keempat yang akan dilatih 3. Latih kegiatan keempat (alat dan cara) 4. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan : keempat kegiatan masing-masing dua kali per hari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang dibuat sebelumnya 2. Menentukan kegiatan yang akan dilatih terlebih dahulu 3. Kegiatan aspek positif yang dimiliki pasien dapat meningkatkan harga diri pasien 4. Meningkatkan kedisiplinan pasien untuk memasukan jadwal kegiatan

	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan, pasien dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melatih kemampuan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan dan berikan pujian 2. Latih kegiatan dilanjutkan sampai tak terhingga 3. Nilai kemampuan yang telah mandiri 4. Nilai apakah harga diri pasien meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang dibuat sebelumnya 2. Kegiatan aspek positif yang dimiliki pasien dapat meningkatkan harga diri pasien 3. Melihat sejauh mana kemampuan yang telah mandiri 4. Mengetahui keberhasilan intervensi
--	--	---	---

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI TINDAKAN KEPERAWATAN

Waktu	Diagnosis	Implementasi Keperawatan	Evaluasi
25 Juli 2023	Halusinasi Pendengaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi halusinasi : isi, frekuensi, waktu terjadi, situasi pencetus, perasaan, respon Hasil : pasien mengatakan sering mendengar suara untuk memukul dirinya. Frekuensi munculnya suara tidak menentu, waktu terjadinya lebih sering pada malam hari, situasi pencetus saat pasien sendiri, respon saat halusinasinya muncul yang pasien lakukan menutup telinga atau berbicara sama temannya 2. Menjelaskan cara mengontrol halusinasi : hardik, obat bercakap-cakap, melakukan kegiatan Hasil : Pasien mengatakan ingin mengetahui dan belajar cara untuk mengontrol halusinasinya 3. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan menghardik Hasil : pasien diajarkan cara mengontrol halusinasi dengan menghardik dengan cara menutup mata & telinga kemudian mengatakan pergi-pergi, kamu tidak nyata kamu suara palsu dengan suara yang keras 4. Masukan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik 	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan saat ini tidak mendengar yang biasa muncul <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mampu melakukan cara menghardik <p>A : Masalah teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi SP 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan menghardik. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol halusinasi dengan obat (jelaskan 6 benar : jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, kontinuitas minum obat) 3. Masukan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik dan minum obat

		Hasil : kegiatan menghardik dimasukan ke jadwal kegiatan harian pasien	
--	--	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

26 Juli 2023	Halusinasi Pendengaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan menghardik. Beri pujian Hasil : Pasien dapat mempraktikkan cara menghardik 2. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan obat (jelaskan 6 benar : jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, kontinuitas minum obat) Hasil : pasien mengetahui jenis dan frekuensi minum obatnya dan mengatakan rutin minum obat selama dirawat di ruangan Kenari 3. Memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik dan minum obat Hasil : Latihan menghardik dan minum obat dimasukkan ke jadwal kegiatan harian 	<p>S ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan masih mendengar suara yang menyuruhnya memukul - Pasien mengatakan akan rutin minum obat saat sudah pulang nantinya <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mampu melakukan cara menghardik - Pasien mampu menyebutkan nama dan frekuensi minum obat <p>A : Masalah teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik & minum obat. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap saat terjadi halusinasi 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat dan bercakap-cakap
--------------	------------------------	---	--

27 Juli 2023	Halusinasi Pendengaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik & minum obat. Beri pujian Hasil : Pasien dapat melakukan cara menghardik dengan mandiri dan minum obat secara rutin 2. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap saat terjadi halusinasi Hasil : Pasien dapat melakukan cara bercakap-cakap dengan perawat dan mengatakan akan melakukan latihan bercakap cakap dengan teman sekamarnya jika suara itu muncul 3. Memasukan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat dan bercakap-cakap Hasil : Latihan menghardik, minum obat dan bercakap-cakap dimasukan ke jadwal kegiatan harian 	<p>S ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan masih mendengar suara namun hanya sesekali <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mampu melakukan cara menghardik secara mandiri - Pasien mampu menyebutkan nama dan frekuensi minum obat - Pasien tampak tidak terlalu gelisah <p>A : Masalah teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik, obat & bercakap-cakap. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan harian (mulai 2 kegiatan) 3. Masukan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian
--------------	------------------------	--	--

28 Juli 2023	Halusinasi Pendengaran	<p>1. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik, obat & bercakap-cakap. Beri pujian Hasil : Pasien sudah dapat melakukan cara menghardik secara mandiri, pasien mengatakan rutin minum obat 2 kali sehari, pasien mampu melakukan cara bercakap-cakap jika suara itu muncul lagi.</p> <p>2. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan harian (mulai 2 kegiatan) Hasil : Pasien diajarkan terapi dzikir</p> <p>3. Memasukan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian Hasil : Memasukan terapi berdzikir ke dalam jadwal harian dan menganjurkan pasien untuk melakukan terapi 2x sehari saat pagi dan petang.</p>	<p>S ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan masih mendengar suara namun hanya sesekali - Pasien mengatakan merasa lebih tenang dan rileks setelah diajarkan terapi berdzikir - Pasien mengatakan bingung membedakan suara karena kemarin mendengar suara teman kamarnya - Pasien mengatakan akan melakukan terapi dzikir jika mulai merasa gelisah <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak mampu melakukan cara menghardik secara mandiri - Pasien mampu menyebutkan nama dan frekuensi minum obat - Pasien tampak mampu melakukan terapi berdzikir - Pasien tampak lebih rileks <p>A : Masalah teratasi P : Lanjutkan Intervensi</p>
--------------	------------------------	--	--


29 Juli 2023	Halusinasi Pendengaran	<p>1. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik, obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian. Beri pujian Hasil : Pasien sudah mampu melakukan cara menghardik, minum obat dan bercakap-cakap serta melakukan kegiatan harian yaitu terapi berdzikir Pasien mengatakan sudah melakukan terapi berdzikir</p> <p>2. Melaatih kegiatan harian Hasil : Pasien tampak melakukan terapi berdzikir dan Pasien mengatakan merasa tenang setelah melakukan terapi berdzikir</p>	<p>S ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan sudah jarang melihat suara yang biasa muncul - Pasien mengatakan merasa lebih tenang dan rileks setelah melakukan terapi berdzikir - Pasien mengatakan sudah bisa membedakan suara yang asli dan palsu - Pasien mengatakan akan melakukan terapi dzikir jika perasaannya gelisah dan takut <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak mampu melakukan cara menghardik secara mandiri - Pasien mampu menyebutkan nama dan frekuensi minum obat - Pasien tampak mampu melakukan terapi berdzikir - Pasien tampak lebih rileks <p>A : Masalah teratasi P : Pertahankan Intervensi</p>
--------------	------------------------	---	--

		<p>Pasien sudah mampu melakukan cara menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian yaitu terapi dzikir</p> <p>Pasien mengatakan telah melakukan terapi dzikir tadi malam sebelum tidur dan tadi pagi setelah bangun tidur.</p> <p>7. Melatih kegiatan harian</p> <p>Hasil : Pasien tampak melakukan terapi dzikir secara mandiri</p>	<p>melakukan terapi berdzikir dan membaca Al-Qur'an</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak tenang <p>A : Masalah teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi HDR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan pertama yang telah dilatih dan berikan pujian 2. Bantu pasien memilih kegiatan kedua yang akan dilatih 3. Latih kegiatan kedua (alat dan cara) 4. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan : dua kegiatan masing-masing dua kali per hari <p>Pertahankan Intervensi Halusinasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian. Beri pujian 2. Latih kegiatan harian
1 Agustus 2023	Harga Diri Rendah (09.30 WITA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan pertama yang telah dilatih dan berikan pujian <p>Hasil : Pasien mengatakan telah membantu menyapu halaman tadi pagi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membantu pasien memilih kegiatan kedua yang akan dilatih <p>Hasil : Pasien mengatakan ingin melakukan kegiatan bernyanyi</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan telah membantu menyapu halaman tadi pagi - Pasien mengatakan senang saat bernyanyi meskipun suaranya tidak terlalu bagus

	<p>Halusinasi Penglihatan (10.15 WITA)</p>	<p>3. Melatih kegiatan kedua (alat dan cara) Hasil : Pasien tampak bernyanyi menggunakan instrument dari HP</p> <p>4. Memasukan pada jadwal kegiatan untuk latihan : dua kegiatan masing-masing dua kali per hari Hasil : Kegiatan bernyanyi dimasukan ke jadwal kegiatan harian</p> <p>5. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian. Beri pujian Hasil : Pasien sudah mampu melakukan cara menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian yaitu terapi dzikir Pasien mengatakan telah melakukan terapi dzikir tadi malam sebelum tidur dan tadi pagi setelah bangun tidur</p> <p>6. Melatih kegiatan harian Hasil : Pasien tampak melakukan terapi dzikir secara mandiri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan sudah jarang mendengar suara yang biasa muncul - Pasien mengatakan merasa lebih tenang dan rileks setelah melakukan terapi berdzikir - Pasien mengatakan sudah bisa membedakan suara yang asli dan palsu - Pasien mengatakan akan melakukan terapi dzikir jika perasaannya gelisah dan takut <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak senang saat bernyanyi - Pasien tampak malu-malu saat bernyanyi - Pasien tampak mampu melakukan cara menghardik secara mandiri - Pasien mampu menyebutkan nama dan frekuensi minum obat - Pasien tampak mampu melakukan terapi berdzikir - Pasien tampak tenang
--	--	---	--

			<p>A : Masalah teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi HDR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan pertama dan kedua yang telah dilatih dan berikan pujian 2. Bantu pasien memilih kegiatan ketiga yang akan dilatih 3. Latih kegiatan ketiga (alat dan cara) 4. Masukan pada jadwal kegiatan untuk latihan : tiga kegiatan masing-masing dua kali per hari <p>Pertahankan Intervensi Halusinasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian. Beri pujian 2. Latih kegiatan harian
2 Agustus 2023	Harga Diri Rendah (09.00 WITA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan pertama dan kedua yang telah dilatih dan berikan pujian <p>Hasil : Pasien mengatakan telah membantu menyapu halaman tadi pagi dan bernyanyi bersama teman temannya</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan telah membantu menyapu halaman tadi pagi dan bernyanyi bersama

	<p>Halusinasi Pendengaran (10.20 WITA)</p>	<p>2. Membantu pasien memilih kegiatan ketiga yang akan dilatih Hasil : Pasien mengatakan ingin melakukan kegiatan bersih bersih (mengepel lantai)</p> <p>3. Melatih kegiatan ketiga (alat dan cara) Hasil : Pasien tampak mengepel lantai di kamarnya menggunakan alat pel dan ember</p> <p>4. Memasukan pada jadwal kegiatan untuk latihan : dua kegiatan masing-masing dua kali per hari Hasil : Kegiatan mengepel lantai dimasukkan ke jadwal kegiatan harian</p> <p>5. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian. Beri pujian Hasil : Pasien sudah mampu melakukan cara menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian yaitu terapi dzikir Pasien mengatakan telah melakukan terapi dzikir tadi malam sebelum tidur dan tadi pagi setelah bangun tidur</p> <p>6. Melatih kegiatan harian Hasil : Pasien tampak melakukan terapi dzikir secara mandiri.</p>	<p>teman-temannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan senang setelah mengepel lantai dan melihat lantai tersebut bersih - Pasien mengatakan sudah jarang melihat suara yang biasa muncul - Pasien mengatakan merasa lebih tenang dan rileks setelah melakukan terapi berdzikir - Pasien mengatakan sudah bisa membedakan suara yang asli dan palsu - Pasien mengatakan akan melakukan terapi dzikir jika perasaannya gelisah dan takut <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak mampu mengepel lantai kamarnya dengan bersih - Pasien tampak telaten dalam mengepel lantai - Pasien tampak mampu melakukan cara menghardik secara mandiri - Pasien mampu menyebutkan nama dan frekuensi minum obat
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak mampu melakukan terapi berdzikir - Pasien tampak tenang <p>A : Masalah teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi HDR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan pertama, kedua dan ketiga yang telah dilatih dan berikan pujian 2. Bantu pasien memilih kegiatan keempat yang akan dilatih 3. Latih kegiatan keempat (alat dan cara) 4. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan : empat kegiatan masing-masing dua kali per hari <p>Pertahankan Intervensi Halusinasi Terapi Dzikir</p>
--	--	---	--

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Analisis Asuhan Keperawatan

5.1.1. Analisis Pengkajian Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2023 di ruang Kenari, pasien dengan inisial Tn. N yang berusia 27 tahun dibawa oleh ibunya ke RSKD Dadi karena sering keluyuran ke rumah tetangga saat malam hingga subuh. Pasien terakhir kali dirawat di RSKD pada tahun 2021 dengan masalah yang sama yaitu halusinasi. Ini merupakan kali ke-6 pasien masuk di RSKD Dadi. Pasien mengatakan ia dibawa ke RSKD Dadi diantar oleh orang tuanya karena pernah menikam kedua ayahnya namun ayahnya luka sedikit dan menyeret pasien ke RSKD Dadi. Dari data yang didapatkan di buku Rekam Medik, pasien masuk yang ke 6 kalinya di RSKD Dadi diantar oleh Dinas sosial Makassar. Riwayat rawat inap terakhir di RSKD Dadi satu tahun yang lalu dan pulang dalam keadaan membaik

Pasien *skizofrenia* yang tidak patuh dalam meminum obat cenderung berisiko untuk kambuh. Berdasarkan data yang diperoleh Faturrahman et al., (2021) menunjukkan hanya sekitar 25% pasien *skizofrenia* yang teratur minum obat dan sekitar 75% pasien *skizofrenia* lainnya mengalami kekambuhan dalam kurun waktu 1-1,5 tahun karena tidak mengkonsumsi terapi obat antipsikotik secara teratur. Kepatuhan minum obat merupakan hal yang penting untuk dilakukan demi mencegah kekambuhan pada pasien jiwa, oleh sebab itu perlu adanya dukungan keluarga yang mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Tanpa dukungan keluarga, pasien kesulitan dalam mengontrol pengobatan dan mempertahankan motivasi untuk sembuh. (Faturrahman et al., 2021).

Berdasarkan hasil pengkajian fisik didapatkan tanda-tanda vital TD: 110/70 mmHg, Nadi: 80x/menit, R : 20x/menit, Suhu : 36,5°C. Ukuran BB : 54 Kg, TB : 168 cm. Dari hasil pengkajian status mental pada poin pembicaraan saat berinteraksi didapatkan respon pasien tampak agak

lambat, pada poin aktivitas motorik didapatkan pasien tampak gelisah dan tampak sering mengusap-usap tangan dan kakinya, saat berinteraksi kontak mata pasien kurang, pasien tampak sering memandang ke arah lain, pada pengkajian alam perasaan di dapatkan pasien mengatakan merasa sedih karena rindu dengan keluarga dan ingin segera dipulangkan. Setelah dilakukan wawancara, pasien mengungkapkan bahwa saat halusinasinya muncul pasien merasa senang dan ingin mengikuti suara tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Rohman (2019) dimana salah satu faktor gejala dari pasien dengan gangguan jiwa yaitu sulit untuk memusatkan perhatian atau komunikasi. Saat berinteraksi pasien biasanya tidak akan fokus pada satu objek, begitupula saat berkomunikasi pasien biasanya akan mengalihkan pembicaraan dan hanya mengungkapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya.

Hasil pengkajian yang didapatkan menunjukkan kesamaan teori dengan perilaku maladaptif tentang halusinasi, dimana halusinasi merupakan gangguan yang timbul berupa persepsi yang salah terhadap rangsangan. Respon maladaptif pada pasien halusinasi mengakibatkan pasien akan berusaha untuk menghindari dari orang lain, berbicara sendiri, memandang suatu arah, pergerakan mata cepat dan respon verbal lambat, gelisah dan emosi tidak stabil, bersikap curiga dan mudah tersinggung (Yuanita, 2019).

Halusinasi menurut Sutejo, (2017) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana pasien mengalami gangguan dalam mempersepsikan stimulus yang sebenarnya stimulus itu tidak ada. Halusinasi menurut Stuart dalam Azizah et al., (2016) adalah persepsi pasien terhadap lingkungan tanpa stimulus yang nyata, sehingga pasien menginterpretasikan sesuatu yang tidak nyata tanpa stimulus atau rangsangan dari luar.

Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa halusinasi adalah suatu kondisi dimana seseorang/individu mengalami pemikiran/pandangan yang tidak nyata, tanpa adanya stimulus atau rangsangan baik dari internal maupun eksternal yang membuat individu

tersebut terjebak dalam dunianya dan beranggapan bahwa apa yang dipresepsikan tersebut adalah nyata.

5.1.2. Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan utama dalam penelitian ini adalah gangguan persepsi sensori : halusinasi, dibuktikan dengan pasien mengatakan sering mendengar suara yang menyuruhnya untuk mengikuti suara tersebut. Pasien mengatakan suara itu muncul tidak menentu, namun lebih sering muncul saat malam hari. Pasien mengatakan suara itu muncul saat ia sendiri. Pasien mengatakan saat suara itu muncul yang ia lakukan hanya bersabar. Pasien terkadang tampak duduk menyendiri di tempat tidurnya. Pernyataan pasien juga didukung dengan data di buku rekam medik pasien di ruangan Sawit dengan diagnosis keperawatan halusinasi pendengaran.

Menurut Yanti et al. (2020) halusinasi merupakan distorsi persepsi palsu yang terjadi pada respon neurobiologi maladaptif, penderita sebenarnya mengalami distorsi sensori sebagai hal yang nyata dan meresponnya. Diperkirakan $\geq 90\%$ penderita gangguan jiwa jenis halusinasi dengan bentuk yang bervariasi tetapi sebagian besarnya mengalami halusinasi pendengaran yang berasal dari dalam diri individu tersebut atau dari luar individu tersebut, suara yang didengar bisa dikenalnya, jenis suara tunggal atau multiple yang dianggapnya dapat memerintahkan tentang perilaku individu itu sendiri (Yosep & Sutini, 2016).

Diagnosis kedua yaitu Harga diri rendah yang dibuktikan dengan pasien mengatakan terkadang ia malu dengan kondisinya saat ini karena teman-temannya di kampung sering mengejeknya. Pasien mengatakan ia merasa sebagai beban keluarga karena kondisinya saat ini. Kontak mata dengan perawat kurang dan saat berinteraksi pasien tampak sering memandang ke arah lain.

Harga diri rendah melibatkan evaluasi diri yang negatif dan berhubungan dengan perasaan yang lemah, tidak berdaya, putus asa, ketakutan, rentan, rapuh, tidak lengkap, dan tidak berharga (Stuart, G, 2016). Tanda dan gejala harga diri rendah meliputi perasaan malu terhadap

diri sendiri akibat penyakit dan akibat tindakan terhadap penyakit. Rasa bersalah terhadap diri sendiri, merendahkan martabat, gangguan hubungan sosial, percaya diri yang kurang, dan mencederai diri sendiri (Munith, 2015). Adapun dampak yang terjadi jika harga diri rendah tidak dapat diatasi akan mengakibatkan seseorang mengalami isolasi sosial. Untuk itu perlu penanganan lebih lanjut yang harus dilakukan perawat terhadap pasien yang mengalami harga diri rendah (Yusuf et al., 2015). Harga diri rendah muncul saat lingkungan cenderung mengucilkan dan menuntut lebih dari kemampuannya. Ketika seseorang mengalami harga diri rendah maka akan berdampak pada orang tersebut mengisolasi dirinya dari kelompok dan cenderung lebih menyendiri dan menarik diri (Prabowo, 2014).

5.1.3. Analisis Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan pada pasien disusun berdasarkan tindakan keperawatan jiwa yang dilakukan selama 10 hari. Pada diagnosis keperawatan yang pertama yaitu gangguan persepsi sensori: halusinasi dilakukan tindakan keperawatan yang terdiri atas 4 yaitu pertama mengontrol halusinasi dengan menghardik, kedua mengontrol halusinasi dengan minum obat secara teratur, ketiga mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dan keempat mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan harian (Sasmita, 2021).

Pada diagnosis keperawatan kedua yaitu Harga diri rendah, dibuktikan dengan pasien mengatakan terkadang ia malu dengan kondisinya saat ini karena teman-temannya di kampung sering mengejeknya. Pasien mengatakan ia merasa sebagai beban keluarga karena kondisinya saat ini. Kontak mata dengan perawat kurang dan saat berinteraksi pasien tampak sering memandang ke arah lain. Intervensi yang diberikan ada diagnosis keperawatan Gangguan Konsep Diri : Harga diri rendah dilakukan strategi pertemuan yaitu mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, menilai kemampuan yang dapat digunakan menetapkan/memilih kegiatan sesuai kemampuan “melatih kegiatan sesuai kemampuan yang dipilih 1”, melatih kegiatan sesuai kemampuan yang dipilih 2, dan

melatih kegiatan sesuai kemampuan yang di pilih 3 dan seterusnya (Marwani, 2022).

5.1.4. Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan pelayanan intervensi yang telah dilakukan sebelumnya. Implementasi yang diberikan pada pasien halusinasi sesuai dengan tindakan keperawatan (Livana et al., 2020). tindakan perawatan yang dilakukan yaitu mengajarkan cara menghardik, mengedukakasi kesehatan tentang pentingnya pasien minum obat (6 benar obat), mengajarkan cara bercakap-cakap dengan orang lain, serta menganjurkan melakukan kegiatan. Ini adalah beberapa tindakan yang dapat meningkatkan mekanisme koping adaptif pada pasien serta mampu menurunkan frekuensi halusinasi yang dialami oleh pasien.

Implementasi dalam penelitian ini dilakukan selama 7 hari pada tanggal 25 Juli sampai 02 Agustus 2023 dengan mengacu pada intervensi yang telah dirancang pada masalah halusinasi dengan tindakan keperawatan 1-5, dan harga diri rendah diberikan 1-5 tindakan keperawatan. Pemberian asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah keperawatan yang dialami dimulai dengan membina hubungan saling percaya antara perawat dan pasien demi keberhasilan implementasi yang akan dilakukan. Proses awal tindakan perawatan harus dapat memfasilitasi pasien untuk memperoleh rasa aman dan nyaman untuk menceritakan pengalamannya sehingga informasi yang berkaitan tentang halusinasinya dapat komprehensif. Untuk itu perawat harus memulai memperkenalkan diri menjelaskan tujuan interaksi, membuat kontrak asuhan keperawatan, memperlihatkan sikap sabar, penerimaan yang tulus dan aktif mendengar (Aliffatunisa & Apriliyani, 2022).

Pada kasus Tn. N dengan diagnosis keperawatan halusinasi diberikan implementasi untuk mengontrol halusinasi dengan menghardik, minum obat, bercakap-cakap, melakukan kegiatan harian. Tindakan keperawatan yang pertama yaitu : melatih pasien untuk mampu mengidentifikasi isi, waktu terjadi, situasi pencetus, perasaan dan respon

halusinasi serta mampu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Menghardik halusinasi merupakan cara untuk mengendalikan diri pada pasien terkait halusinasinya yang muncul dengan cara menolak dimana tujuan dari tindakan ini yaitu untuk mengusir halusinasi yang muncul di diri pasien. Berdasarkan hasil penelitian Karina (2013) dalam Pratiwi & Setiawan (2018) saat melakukan terapi menghardik pasien menjadi lebih fokus dan berkonsentrasi pada halusinasinya. Sehingga memungkinkan beberapa zat kimia di otak seperti dopamine neurotransmitter tidak berlebihan. Pasien dilatih untuk mengatakan tidak terhadap halusinasi yang muncul atau tidak memperdulikan halusinasinya. Jika bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka pasien akan mampu mengendalikan diri dan tidak mengikuti halusinasi yang muncul. Teknik untuk menghardik halusinasi itu sendiri yaitu pasien dianjurkan untuk fokus pandangan lurus ke depan kemudian konsentrasi, menutup kedua telinga dengan tangan lalu menutup mata dan mengucapkan kata “Pergi kamu, pergi, kamu tidak nyata, kamu suara palsu” perawat mendemonstrasikan kemudian memberi pasien kesempatan untuk mendemonstrasi kembali apa yang telah diajarkan.

Tindakan keperawatan kedua adalah melatih pasien untuk mampu mengontrol halusinasi dengan minum obat, memberikan informasi tentang jenis, guna, dosis, frekuensi, cara dan kontinuitas minum obat. Perilaku patuh minum obat berpengaruh pada remisi waktu pasien satu tahun lebih lama dan gejala psikosis tidak akan terlalu parah. Penatalaksanaan pengobatan skizofrenia merupakan salah satu faktor utama keberhasilan penderita untuk sembuh. Pasien yang tidak patuh pada pengobatan akan memiliki resiko kekambuhan lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang patuh pada pengobatan (Mbaloto & Ntidi, 2022).

Tindakan keperawatan ketiga yaitu menganjurkan pasien untuk bercakap-cakap dengan orang yang ada di sekitarnya, Bercakap-cakap juga sebagai upaya distraksi pasien agar halusinasinya teralihkan, hal ini didapatkan bahwa keluhan halusinasi mulai menurun hingga tidak terdengar kembali. Hasil riset yang dilakukan oleh Kusumawaty et al., (2021)

menjelaskan bahwa adanya peningkatan kemampuan penderita dalam bercakap-cakap sebagai upaya untuk mendistraksi halusinasi. Halusinasi dapat dicegah dengan melakukan terapi bercakap-cakap (Donner & Wiklund Gustin, 2020). Pasien dengan halusinasi perhatiannya akan teralihkan dengan bercakap-cakap, dan dapat melatih kemampuan bersosialisasi karena bercakap-cakap bisa menambah rasa percaya diri saat berkomunikasi dengan orang lain (Ibrahim & Devesh, 2019).

Tindakan keperawatan keempat yaitu menganjurkan pasien untuk melakukan 2 kegiatan harian yang bermanfaat, dimana pasien dianjurkan untuk berzikir setiap pagi dan petang. Untuk mengurangi risiko muncul kembali halusinasi adalah dengan menyibukkan diri dengan aktivitas yang teratur, dengan aktivitas yang terjadwal pasien tidak akan mengalami waktu luang sendiri yang sering menjadi pencetus munculnya halusinasi. Tujuan intervensi ini adalah untuk mengalihkan pasien dari halusinasinya sehingga pasien bisa berfikir jernih dengan cara melakukan kegiatan positif yang terstruktur maka pasien sangat berpotensi untuk sembuh (Suhermi et al., 2021).

Untuk diagnosis kedua, yaitu harga diri rendah, perawat melakukan bina hubungan saling percaya (BHSP) dengan menggunakan prinsip komunikasi teraupetik, selanjutnya melakukan tindakan keperawatan jiwa yaitu menggali aspek positif yang dimiliki pasien, kemampuan positif pasien merupakan kemampuan atau aspek positif yang dimiliki individu untuk mengidentifikasi kemampuan yang ada pada diri individu itu sendiri, sehingga pasien dapat memilih kegiatan sesuai kemampuan yang dimilikinya (Farida & Yudi 2018 dalam Marwani, 2022). Kemudian membantu pasien dalam menilai kemampuan yang ia miliki, dan melatih pasien mengikuti kemampuan yang dipilih. Selain itu untuk pasien dengan diagnosis harga diri rendah maupun semua diagnosis keperawatan jiwa, perawat dianjurkan untuk memberi pujian yang wajar atas setiap keberhasilan yang dicapai oleh pasien, dan menganjurkan pasien untuk

memasukkan kegiatan tersebut kedalam jadwal harian yang akan dievaluasi setiap harinya oleh perawat (Marwani, 2022).

Menurut Safarina (2019) mengatakan bahwa latihan melakukan kegiatan sesuai kemampuan dapat mengelola atau mengontrol harga diri rendah, karena dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang sehingga membangkitkan pikiran positif pasien, penelitian lain yang dilakukan oleh Nela Laili Khadiqah (2020) menyebutkan bahwa setelah diberikan tindakan latihan melakukan aktivitas sesuai kemampuan menunjukkan hasil bahwa pasien dapat melakukan tindakan keperawatan kedua dan mampu untuk melanjutkan dengan melakukan tindakan keperawatan berikutnya.

5.1.5. Analisis Evaluasi Keperawatan

Implementasi keperawatan yang diberikan pada Tn. N selama 7 Hari dimulai sejak tanggal 25 Juli sampai 02 Agustus 2023 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun. Evaluasi dilakukan setiap hari. Pada proses pelaksanaan evaluasi, untuk diagnosis gangguan persepsi sensori : halusinasi pasien telah menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, dan telah mampu mengontrol halusinasinya dibuktikan dengan pasien mampu mengontrol halusinasinya dengan menghardik, dimana pasien telah melakukan cara menghardik dengan benar, pasien dapat mengontrol halusinasi dengan cara minum obat, pasien telah mampu menyebutkan nama ob at dan rutin minum obat, pasien juga terlihat mampu melakukan percakapan dengan temannya, serta pasien mampu mengontrol halusinasinya dengan melakukan kegiatan harian yang telah diajarkan yaitu terapi berzikir. Setelah diberikan terapi zikir didapatkan hasil tanda dan gejala halusinasi pasien berkurang dibuktikan dengan pasien mengatakan sudah jarang mendengar suara yang biasa ia lihat, pasien sudah dapat membedakan suara yang nyata dan palsu, perilaku gelisah berkurang, pasien merasa lebih tenang dan rileks setelah melakukan terapi. Dapat disimpulkan bahwa intervensi terapi zikir dapat dikatakan efektif terhadap penurunan tanda dan gejala halusinasi dan berpengaruh terhadap kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasinya.

Pada diagnosis harga diri rendah, setelah dilakukan tindakan keperawatan didapatkan evaluasi subjektif yaitu pasien mengatakan pasien sudah dapat melakukan kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat untuk dirinya serta lingkungan. Pasien telah ikut membantu menyapu halaman ruangan kenari dan mengepel lantai kamarnya, pasien telah menuliskan harapannya setelah keluar dari rumah sakit, pasien juga mengatakan telah bernyanyi bersama temannya setelah berolahraga. Pasien mengatakan mulai mempunyai semangat untuk sembuh dan tidak merasa dirinya tidak berguna karena masih mempunyai kemampuan yang bisa dilakukan. Evaluasi objektif ditemukan pasien tampak telaten dalam menyapu halaman dan mengepel lantai, pasien tampak senang saat bernyanyi, pasien tampak bersemangat dalam menuliskan harapannya pasien tampak senang dan tersenyum saat melakukan kegiatan hariannya.

5.2. Analisis Intervensi EBPN

Pada kasus Tn. N dengan diagnosis keperawatan halusinasi didapatkan data subjektif pasien mengatakan sering mendengar suarayang menyuruhnya menyakiti diri. Pasien mengatakan suara itu muncul tidak menentu, namun lebih sering muncul saat malam hari. Pasien mengatakan suara itu muncul saat ia sendiri. Pasien mengatakan saat suara itu muncul yang dia lakukan hanya bersabar. Hasil data objektif didapatkan pasien tampak gelisah, pasien tampak sering mengusap usap tangan dan kakinya, pasien terkadang tampak duduk menyendiri di tempat tidurnya.

Berdasarkan data diatas penulis memberikan intervensi terapi zikir sebagai intervensi utama dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengontrol halusinasi pasien. Spiritualitas dapat memberikan makna dan harapan serta pandangan positif yang menjadi kunci dari pemulihan psikologis penderita *skizofrenia*. Spiritualitas dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme koping aktif dan adaptif untuk mengendalikan halusinasi. Salah satu di antara *religious coping* adalah zikir.

Terapi zikir juga dapat digunakan sebagai salah satu terapi psikoreligius yang dapat mengontrol halusinasi pasien. Mekanisme terapi

zikir dapat mengontrol tanda dan gejala halusinasi yaitu fungsi sistem saraf yang mendeteksi, menganalisa, dan menghantarkan informasi. Informasi dikumpulkan oleh sistem sensorik, di integrasikan ke otak depan (frontal lobe) dalam perencanaan, pengaturan, pemecahan masalah, perhatian, kepribadian, serta tingkah laku maupun emosi maka bagian otak depan disebut *prefrontal cortex* sebagai fungsi kognitif untuk menentukan kepribadian dan sinyal akan di teruskan ke otak bagian belakang yang terdiri dari premotor dan motor sebagai sistem motorik dan jalur otonom untuk mengontrol gerakan, aktifitas viserial, dan fungsi-fungsi endokrin (Tuti et al., 2022).

Sebelum diberikan terapi zikir pada Tn. N didapatkan hasil frekuensi terjadinya halusinasi tidak menentu, waktu terjadinya lebih sering pada malam hari, situasi pencetus saat pasien sendiri, respon saat halusinasinya muncul yang pasien lakukan hanya bersabar. Setelah diberikan intervensi terapi zikir didapatkan hasil frekuensi munculnya halusinasi berkurang, pasien sudah dapat membedakan suara yang asli dan palsu, pasien merasa lebih tenang dan rileks setelah melakukan terapi zikir.

Pada penelitian Devita & Hendriyani (2020) hasil uji *paired sample t-test* menunjukkan bahwa ada pengaruh terapi zikir terhadap penurunan frekuensi halusinasi pendengaran pasien skizofrenia. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberikan terapi, dimana sebelum diberikan terapi frekuensi halusinasi responden terjadi terus menerus dan hanya berhenti beberapa menit saja namun setelah pemberian terapi zikir terdapat perubahan pada frekuensi halusinasi menjadi sekali seminggu bahkan tidak hadir dalam seminggu.

Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini yaitu riset yang dilakukan oleh Mardiaty et al., (2017) yang menunjukkan adanya penurunan nilai median *pretest* dan *posttest* setelah diberikan terapi psikoreligius: membaca Al fatihah yaitu dari 38,00 menjadi 17,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh terapi psikoreligius: membaca Al Fatihah

terhadap skor halusinasi pasien *skizofrenia* dengan $p\text{-value } (0,019) < \alpha (0,05)$.

Penelitian yang dilakukan oleh Raziansyah (2023) juga menunjukkan terdapat pengaruh terapi dzikir terhadap tingkat halusinasi pasien dengan nilai $p=0,000$ ($p<0,05$). Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan Emulyani & Herlambang (2020) dimana hasil risetnya menunjukkan nilai rata-rata keberhasilan kontrol halusinasi pasien sebelum diberikan terapi dzikir adalah 16,90 sedangkan setelah diberikan terapi dzikir adalah 5,48 dengan $p\text{-value } 0,000<0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terapi dzikir terhadap kontrol halusinasi pasien.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini bahwa pemberian terapi zikir yang dilakukan pada Tn.N dengan halusinasi berpengaruh dalam menurunkan gejala serta mengontrol halusinasinya serta penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Afconneri et al., 2022) yang membuktikan bahwa terdapat Pengaruh Teknik Distraksi Membaca Al-Qur'an Terhadap Penurunan Frekuensi Halusinasi Pada Pasien *Skizofrenia* Dengan Gangguan Persepsi Sensori di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Paku Kota Solok.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini keterbatasan waktu pertemuan dengan pasien sehingga peneliti tidak berada 24 jam disamping pasien untuk memastikan atau memperhatikan perkembangan pasien. Namun dengan keterbatasan waktu tersebut sudah dapat mengurangi tanda dan gejala halusinasi pasien serta dapat mengontrol halusinasi pasien.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada Tn. M dengan diagnosis halusinasi pendengaran dengan intervensi utama pemberian

teknik terapi membaca Al-Qur'an dan terapi dzikir, maka dapat disimpulkan :

1. Pengkajian yang dilakukan pada Tn. N diperoleh hasil yaitu pasien mengatakan mendengar suara yang berisi perintah untuk menyakiti dirinya dan pernah menikam ayahnya sebanyak dua kali. Pasien memiliki riwayat dirawat di RSKD sebanyak 6 kali dengan gangguan halusinasi.
2. Diagnosis keperawatan yang dirumuskan berdasarkan hasil pengkajian adalah gangguan persepsi sensori : Halusinasi pendengaran dan harga diri rendah.
3. Intervensi yang diberikan berdasarkan diagnosis yang telah dirumuskan yaitu dengan 4 tindakan keperawatan halusinasi yang terdiri dari menghardik, memberikan edukasi tentang pentingnya rutin meminum obat, mengajarkan bercakap-cakap dengan orang lain dan melakukan kegiatan harian dengan terapi zikir.
4. Implementasi asuhan keperawatan pada pasien *skizofrenia* dengan halusinasi dilakukan selama 10 hari berturut-turut, dengan pemberian tindakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus dalam penelitian ini adalah pemberian terapi zikir.

6.2.Saran

1. Bagi profesi keperawatan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologis pada pasien halusinasi pendengaran
2. Bagi institusi pendidikan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien Halusinasi pendengaran. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan kasus lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
DAFTAR PUSTAKA

Afconneri, Y., Herawati, N., & Gafar, A. (2022). PENERAPAN MANAJEMEN HALUSINASI: TEKNIK DISTRAKSI MEMBACA AL- QUR ' AN TERHADAP PASIEN SKIZOFRENIA DENGAN GANGGUAN PERSEPSI SENSORI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANJUNG PAKU KOTA SOLOK. *Jurnal Kesehatan Lentera 'Aisyiyah*, 5(1), 577–583.

- Aliffatunisa, F., & Apriliyani, I. (2022). STRATEGI PELAKSANAAN MENGENAL DAN MENGHARDIK HALUSINASI PASIEN SKIZOFRENIA DENGAN HALUSINASI PENDENGARAN. *Jurnal Keperawatan Merdeka (JKM)*, 2(2).
- Annisa, M. N. (2022). ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA TN.F HALUSINASI PENDENGARAN DENGAN INTERVENSI TERAPI MUSIK KLASIK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MARTAPURA TIMUR. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.
- Aulia, A. (2021). ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ISOLASI SOSIAL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PRINGSEWU TAHUN 2021. Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung.
- Azizah, L. M., Zainuri, I., & Akbar, A. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Indomedia Pustaka.
- Damayanti, J., & Utami. (2014). Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Halusinasi Pasien Skizofrenia di RSJ Tampan Provinsi Riau. *JOM PSIK*.
- Devita, Y. (2019). *Modul Terapi Al-Qur'an Untuk Mengontrol Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Skizofrenia*.
- Devita, Y., & Hendriyani. (2020). TERAPI AL-QURAN DALAM MENGONTROL HALUSINASI PENDENGAR PADA PASIEN SKIZOFRENIA. *Jurnal Kesehatan*, 11(2).
- Donner, L., & Wiklund Gustin, L. (2020). Navigating between Compassion and Uncertainty–Psychiatric Nurses’ Lived Experiences of Communication with Patients Who Rarely Speak. *Issues in Mental Health Nursing*, 42(4).
- Emilia, V. (2020). *Studi Kasus Penerapan Terapi Psikoneurotik Untuk Mencegah Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Gejala Perilaku Kekerasan Di Yayasan Al Hafizh Sidoarjo. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

- Faturrahman, W., Putri, T. H., & Fradianto, I. (2021). HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA : LITERATURE REVIEW. *Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education*, 3(2).
- Helidrawati, E. (2020). ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA Tn. H DENGAN GANGGUAN PERSEPSI SENSORI: HALUSINASI PENDENGARAN DI RUANG KAMPAR RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU.
- Ibrahim, O., & Devesh, S. (2019). Implication of public speaking anxiety on the employability of Omani Graduates. *Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability*, 10(2).
- Incau, P. (2021). ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn.I DENGAN MASALAH UTAMA GANGGUAN PERSEPSI SENSORI: HALUSINASI PENGLIHATAN (DI PUSKESMAS SEBENGGOK). Universitas Borneo Tarakan.
- Irawati, P., & Lestari, M. S. (2017). Pengaruh Membaca Alquran terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Klien dengan Hipertensi di RSK dr. Sitanala Tangerang. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia*.
- Istiqomah, H. (2020). ZIKIR DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI PENENANG HATI (Kajian Tematik Surah Al-Ra'd Ayat 28).
- Julianto, V. (2015). Membaca Al Fatimah Reflektif Intuitif untuk Menurunkan Depresi dan Meningkatkan Imunitas. *Jurnal Psikologi*, 42(1).
- Kemendes RI. (2022). *Definisi Mental Illness (Gangguan Mental)*. Kementerian Kesehatan RI.
- Khosim, N., Anggrawati, T., & Kandar. (2023). Gambaran Faktor Predisposisi Pada Klien Gangguan Jiwa di RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang. *Jurnal Keperawatan Sisthana*, 8(1), 8–13. <https://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id/index.php/SISTHANA/article/view/68/62>
- Kusumawaty, I., Yunike, Y., & Gani, A. (2021). Melatih Bercakap-Cakap Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa untuk Mengontrol Halusinasi. *Jurnal Salingka Abdimas*, 1(2).
- Livana, P. H., Rihadini, R., Kandar, K., Suerni, T., Sujarwo, S., Maya, A., & Nugroho, A. (2020). Peningkatan Kemampuan Mengontrol Halusinasi Melalui Terapi Generalis Halusinas. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa*, 2(1).
- Mardiati, S., Elita, V., & Sabrian, F. (2017). PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS: MEMBACA AL-FATIHAH TERHADAP SKOR HALUSINASI PASIEN SKIZOFRENIA. *Jurnal Ners Indonesia*, 9(1).
- Marwani. (2022). Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Halusinasi Menggunakan Teknik Chromoteraphy di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.


- Mbaloto, F. R., & Ntidi, A. (2022). HUBUNGAN KEPATUHAN MINUM OBAT DENGAN KEKAMBUHAN PASIEN GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA DI RUMAH SAKIT DAERAH MADANI PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Pustaka Katulistiwa*, 03(1), 21–26.
- Munith, A. (2015). *Pendidikan Keperawatan Jiwa : Teori dan Aplikasi*. CV Andi Offset.
- Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene, B. (2018). *Psikologi Abnormal di Dunia yang Terus Berubah (Kesembilan)*. Erlangga.
- Nurdiana. (2020). *Penerapan Terapi Spiritual: Dzikir Pada Tn A. Terhadap Kemampuan Mengontrol Halusinasi Pendengaran di Ruang Nuri RSJ Prof HB Sa'Anin Padang Tahun 2020*.
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan* (4th ed.). Salemba Medika.
- Pardede, J., Irwan, E., Manalu, L., Sitanggung, R., & Waruwu, J. F. A. (2021). *Asuhan Keperawatan Jiwa Dengan Masalah Halusinasi*.
- Prabowo, E. (2014). *Konsep & Aplikasi Asuhan Keperawatan Jiwa*. Nuha Medika.
- Pratiwi, M., & Setiawan, H. (2018). Tindakan Menghardik Untuk Mengatasi Halusinasi Pendengaran Pada Klien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa. *Jurnal Kesehatan*, 7(1).
- Pribadi, T., & Djamaludin, D. (2019). Terapi Psikoreligi Terhadap Penurunan Perilaku Kekerasan Pada Pasien Skizofrenia Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 13(4), 373–380.
- Rahayu, D. (2016). *Halusinasi, Asuhan Keperawatan Gangguan Persepsi Sensori: Umum, Dengan Pasien Ny. S di Ruang Bima Instalasi Jiwa Rumah Sakit Purwokerto, Daerah Banyumas. Universitas Muhammadiyah*.
- Raziansyah, T. (2023). PENERAPAN TERAPI SPIRITUAL: DZIKIR TERHADAP TINGKAT HALUSINASI. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(2).
- RISKESDAS. (2018). *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar*.
- Rofiq, A., & Sutopo. (2023). Tafakur dan Dzikir Dalam Mencapai Ketenangan Hidup. *Conseils : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1).
- Rohayati. (2021). *Penerapan Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Tn.K Dengan Masalah Halusinasi Pendengaran di Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam*.
- Rohman, R. F. (2019). *IDENTIFIKASI KEJADIAN PENYAKIT PENYERTA PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI LIPONSOS KEPUTIH SURABAYA*.
- Rohman, R. F. (2020). *Pelaksanaan Murotal Pada Pasien Halusinasi Pendengaran Pada Di Liponsos Keputih Surabaya*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

- Safarina, K. (2019). *PENGELOLAAN KEPERAWATAN JiWA GANGGUAN KONSEP DIRI: HARGA DIRI RENDAH DAN LATIHAN MELAKUKAN KEGIATAN SESUAI KEMAMPUAN PADA Nn. M DAN Ny. F DI RUANG ARIMBI RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH*.
- Sasmita. (2021). *Penerapan strategi pelaksanaan (SP) 1 - 4 dengan halusinasi pada penderita skizofrenia : studi kasus*.
- Setyani, S. D. (2019). *ASUHAN KEPERAWATAN JiWA PADA KliEN HALUSINASI PENDENGARAN TERINTEGRASI DENGAN KELUARGA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JUANDA SAMARINDA*. Poltekkes Kemenkes Kaltim.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qu'an*. Lentera Hati.
- Stuart, G. W. (2016). *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Elsevier Inc.
- Suhermi, Ramli, R., & Caing, H. (2021). Pengaruh Terapi Activity Daily Living terhadap Pemulihan Pasien Halusinasi. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 12(1).
- Suryanti. (2017). *Behavior therapy for depressed breast cancer patient: predictors of treatment outcome*. *journal of consulting and clinical psychology*.
- Sutejo. (2017). *Keperawatan Jiwa Konsep dan Praktik Asuhan Keperawatan Jiwa: Gangguan jiwa dan psikososial*. Pustaka Baru Press.
- Tuti, A., Rico, P., & Nanang, K. A. (2022). Penerapan Terapi Psikoreligi Dzikir Untuk Menurunkan Halusinasi Pada KliEN Skizofrenia Di Wilayah Binaan Puskesmas Ambarawa. *Jurnal Keperawatan Sishana*, 7(2), 64–71.
- Uyun, Q., Kurniawan, I. N., & Jaufalaily, N. (2019). Repentance and seeking forgiveness: the effects of spiritual therapy based on Islamic tenets to improve mental health. *Mental Health, Religion & Culture*.
- Videbeck, S. L. (2018). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. EGC.
- Wainberg, M. L., Scorza, P., Shultz, J. M., Helpman, L., Mootz, J. J., Johnson, K. A., Neria, Y., Bradford, J.-M. E., Oquendo, M. A., & Arbuckle, M. R. (2017). *Challenges and Opportunities in Global Mental Health: a Research-to-Practice Perspective*. National Center of Biotechnology Information.
- Wiradisuria, S. (2016). *Menggapai kesembuhan, sebuah harapan dan peluang menapaki jalan kebahagiaan*.
- World Health Organization. (2022). *Schizophrenia*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia#:~:text=Schizophrenia affects approximately 24 million,as many other mental disorders>.
- Yanti, D. A., Sitepu, A. L., Sitepu, K., Pitriani, & Purba, W. N. B. (2020). Efektivitas Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Prof Dr. M. Ildrem. *Jurnal Keperawatan Dan Fisioterapi (Jkf)*, 3(1).

Yosep, I., & Sutini, T. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Refika.

Yuanita, T. (2019). *Asuhan Keperawatan Klien Skizofrenia Dengan Gangguan Persepsi Halusinasi Pendengaran Di Rsjd Dr. Arif Zainudin Solo Surakarta*.

Yusuf, A., Fitryasari, R., & Endang, H. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa* (2nd ed.).



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1


LEMBAR EVALUASI TANDA & GEJALA PADA PASIEN DENGAN HALUSINASI

Nama pasien : Tn. N
Nama Perawat : Taufiq Hidayah Syafar
Ruangan : Kenari

No	Aspek penilaian	Tanggal evaluasi								
		25/08	26/08	27/08	28/08	29/08	30/08	31/08	01/09	02/09
Kognitif										
1	Mendengar suara-suara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×
2	Melihat bayangan atau sinar									
3	Menghidu bau-bauan									
4	Merasakan rasa pahit, asam, asin di lidah									
5	Merasakan sensasi tidak nyaman dikulit									
6	Ambivalen									
7	Tidak dapat memfokuskan pikiran									
8	Mudah lupa									
9	Tidak mampu mengambil keputusan									
10	Tidak mampu memecahkan masalah									
11	Tidak dapat berpikir logis									
12	Inkoheren									
13	Disorientasi									
14	Sirkumtansial									
15	Mendengar suara hati									
16	Blocking pikiran									
17	Daya tilik diri jelek									
Afektif										
18	Senang									
19	Sedih	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
20	Merasa terganggu	×	×	✓	×	×	×	×	×	×

21	Marah-marah									
22	Ketakutan	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×
23	Khawatir									
24	Curiga									
25	Afek datar/tumpul									
Fisiologis										
26	Sulit tidur	✓	×	×	×	×	×	×	×	×
27	Kewaspadaan meningkat									
29	Denyut nadi meningkat									
30	Frekuensi pernapasan meningkat									
31	Muka tegang									
32	Keringat dingin									
33	Pusing									
34	Keletihan/kelelahan									
Perilaku										
35	Bicara sendiri									
36	Tertawa sendiri									
37	Menyeringai									
38	Menggerakkan bibir/komat-kamit	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
39	Diam sambil menikmati halusinasinya									
40	Perilaku menyerang									
41	Kurang mampu merawat diri									
42	Perilaku mengikuti isi halusinasinya									
43	Memalingkan muka ke arah suara									
44	Menarik diri									
45	Penampilan tidak sesuai									
Sosial										
46	Tidak tertarik dengan									

	kegiatan sehari-hari									
47	Tidak mampu berkomunikasi secara spontan									
48	Acuh terhadap lingkungan									
49	Tidak dapat memulai pembicaraan	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
51	Tidak dapat mempertahankan kontak mata									



**PENERAPAN MANAJEMEN HALUSINASI: TEKNIK DISTRAKSI
MEMBACA AL-QUR'AN TERHADAP PASIEN SKIZOFRENIA DENGAN
GANGGUAN PERSEPSI SENSORI DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS TANJUNG PAKU KOTA SOLOK**

Yudistira Afconneri¹, Novi Herawati², Abd. Gafar³

Prodi D III Keperawatan Solok Poltekkes Kemenkes RI Padang^{1,2,3}
yudistiraafconneri@yahoo.co.id

Abstrak

Masalah yang muncul dari skizofrenia adalah halusinasi yang ditandai dengan mendengarkan suara palsu. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Solok (2020) ada 51% pasien halusinasi dari jumlah kasus pasien skizofrenia. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia menggunakan intervensi manajemen halusinasi melakukan aktivitas membaca Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan bentuk studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 27 Juli 2021 dengan 1 partisipan pasien skizofrenia dengan gangguan persepsi sensori pendengaran di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku Kota Solok. Fokus studi yaitu manajemen halusinasi melakukan aktivitas membaca Al-Qur'an dilakukan selama 6 kali pertemuan. Setelah melakukan aktivitas membaca Al-Qur'an terjadinya penurunan mendengar suara-suara bisikan atau suara palsu yang biasa terjadi 2 kali dalam sehari menjadi 1 kali sehari, dari frekuensi 5-30 menit menurun menjadi 1-2 menit. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan gangguan persepsi sensori pendengaran.

Kata kunci: Halusinasi, Manajemen Halusinasi, Skizofrenia, Membaca Al-Qur'an

Abstract

The problem that arises from schizophrenia are hallucinations characterized by listening to false sounds. Based on a report by the Solok City Health Office (2020) there are 51% of hallucinatory patients from the number of cases of schizophrenic patients. The purpose of this study is to describe the application of nursing care in schizophrenic patients using hallucination management interventions to carry out activities to read the Qur'an. The research method used is descriptive in the form of a case study. This study was conducted on 22 to 27 July 2021 with 1 participant of

