



Sinbiotik

JELAJAH HARMONI

MIKROBA

Dalam Lanskap Kesehatan

Prof. Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd



SINBIOTIK

**Jelajah Harmoni Mikroba
dalam Lanskap Kesehatan**

Penulis:
Hafsan

Editor:
Fatmawati Nur

Penerbit

TOHAR MEDIA

Sinbiotik Jelajah Harmoni Mikroba dalam Lanskap Kesehatan

Penulis:

Hafsan

Editor:

Fatmawati Nur

ISBN: 978-634-7094-25-4

Desain Sampul dan Tata Letak

Tim Penerbit

Penerbit

CV. Tohar Media

Anggota IKAPI No. 022/SSL/2019

Redaksi :

JL. Rappocini Raya Lr 11 No 13 Makassar

JL. Hamzah dg. Tompo. Perumahan Nayla Regency Blok D No.25 Gowa

Telp. 0852-9999-3635/0852-4352-7215

Email : toharmedia@yahoo.com

Website : <https://toharmedia.co.id>

Cetakan Pertama Juni 2024

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy, merekam atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)**
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana paling lama 5 (**lima tahun**) dan/atau denda paling banyak **Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)**

SINBIOTIK

**Jelajah Harmoni Mikroba
dalam Lanskap Kesehatan**

PENGANTAR PENULIS

Saat ini, kita berada di titik puncak revolusi ilmiah yang berpotensi membawa kemajuan signifikan di bidang kesehatan manusia dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan gemuruh syukur atas keagungan Allah swt., kami mengawali buku ini, ***Sinbiotik: Jelajah Harmoni Mikroba dalam Lanskap Kesehatan***, yang lahir dari perpaduan dedikasi, pengetahuan, dan kecintaan mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Dalam teks ini, kita akan menyelami dunia mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan kita.

Bakteri, yang awalnya dianggap sebagai ancaman, semakin diakui sebagai sekutu yang sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan tubuh manusia. Ide simbiosis mengeksplorasi kombinasi sinergis probiotik dan prebiotik untuk menjelaskan peran penting dalam menjaga keseimbangan flora usus dalam meningkatkan kesehatan umum.

Buku referensi ini menyediakan cakupan mendalam tentang teori dan prinsip dasar sinbiotik. Dimasukkannya temuan penelitian terkini, studi kasus, dan analisis klinis yang mendalam di setiap bab menggambarkan inklusifitas bahasan seluruh aspek sinbiotik.

Buku ini bukan sekadar bacaan ilmiah, tetapi juga undangan untuk menekuri dan mengagumi keajaiban alam yang tersembunyi di dalam ranah mikroorganisme, serta memanfaatkan pengetahuan ilmiah kemungkinan besar yang dihadirkan oleh sinbiotik.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi para akademisi, peneliti, profesional, dan semua orang yang memiliki rasa ingin tahu di bidang biologi dan kesehatan.

Makassar, Agustus 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I

MENGAWALI PENJELAJAHAN HARMONI MIKROBA	1
A. Overview Sinbiotik dalam Konteks Ilmiah.....	1
B. Sejarah dan Perkembangan Penelitian Sinbiotik.....	3

BAB II

KONSEP DASAR SINBIOTIK	7
A. Probiotik.....	7
B. Prebiotik.....	32
C. Mekanisme Kerja Sinbiotik.....	43
D. Interaksi Sinbiotik dengan Mikrobiota Usus.....	47

BAB III

SINBIOTIK DALAM KESEHATAN PENCERNAAN.....	51
A. Sinbiotik dan Mikrobiota Usus Serta Signifikansinya bagi Kesehatan Gastrointestinal.....	52
B. Studi Kasus dan Analisis Klinis Sinbiotik dalam Gangguan Pencernaan.....	78


BAB IV

SINBIOTIK DALAM PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT INFEKSI.....	84
A. Sinbiotik dalam Modulasi Sistem Kekebalan Tubuh.....	84
B. Penggunaan Sinbiotik dalam Pencegahan Penyakit Infeksi.....	85
C. Studi Kasus dan Analisis Klinis Sinbiotik pada Model Hewan dan Manusia yang Terinfeksi Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC)	86

BAB V

SINBIOTIK DAN KESEHATAN METABOLIK.....	94
A. Peran Sinbiotik Dalam Regulasi Metabolisme.....	94
B. Pengaruh Sinbiotik Terhadap Obesitas, Diabetes, dan Sindrom Metabolik	99

C. Bukti Klinis dan Implikasi Praktis Penggunaan Sinbiotik.....	105
BAB VI	
SINBIOTIK DAN KESEHATAN MENTAL.....	113
A. Gut-Brain Axis dan Peran Mikrobiota Usus Dalam Kesehatan Mental.....	113
B. Intervensi Sinbiotik Terhadap Kondisi Mental Seperti Depresi dan Kecemasan.....	119
C. Bukti Ilmiah dan Potensi Terapeutik Sinbiotik.....	121
BAB VII	
APLIKASI SINBIOTIK DALAM INDUSTRI PANGAN DAN FARMASI.....	128
A. Teknologi Produksi dan Formulasi Sinbiotik.....	128
B. Pengembangan Produk Sinbiotik Dalam Industri Pangan dan Farmasi.....	131
C. Studi Ilmiah Pengembangan Sinbiotik Dalam Industri Pangan dan Farmasi.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	143
BIOGRAFI PENULIS	176



BAB I

MENGAWALI PENJELAJAHAN HARMONI MIKROBA

Sinbiotik, sebuah terobosan dalam pemeliharaan kesehatan yang menggabungkan probiotik dan prebiotik, menawarkan cara alami untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sinbiotik muncul sebagai solusi yang mampu membangun keselarasan mikroba dalam tubuh di saat pemahaman kita tentang mikrobiota usus semakin berkembang. Teori ini berasal dari penelitian awal Élie Metchnikoff tentang manfaat kesehatan bakteri baik dalam makanan fermentasi. Sejak saat itu, penelitian tentang sinbiotik telah berkembang pesat, menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk membantu pencernaan, mengontrol sistem kekebalan, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental (Minot, 1908). Konsep dasar sinbiotik, sejarah perkembangannya, dan penerapannya secara umum dalam industri kontemporer akan dibentangkan pada bab pengantar ini. Dengan pemahaman ini, akan menggiring kita untuk mengakui kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh sinbiotik untuk menciptakan keseimbangan dalam lingkungan mikrobiota kita yang bermuara pada tercapainya kesehatan yang paripurna.

A. Overview Sinbiotik dalam Konteks Ilmiah

Dalam penelitian tentang mikrobiota dan kesehatan manusia, konsep sinbiotik, yang menggabungkan probiotik dan prebiotik, telah menjadi fokus yang menyita perhatian. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan jika

dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, sedangkan prebiotik adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang membantu pertumbuhan dan aktivitas mikroba di dalam usus (Gibson & Roberfroid, 1995; Hill et al., 2014).

Ragam prebiotik yang telah dieksplor meliputi inulin, pektin, fruktooligosakarida (FOS), dan galaktooligosakarida (GOS). Keberadaan zat ini ditemukan dalam banyak jenis bahan alami dan makanan sehari-hari, seperti akar sawi putih, kulit jeruk, bawang putih, dan pisang (G. R. Gibson & Roberfroid, 1995).

Untuk meningkatkan kesehatan manusia, sinbiotik menggabungkan kekuatan probiotik dan prebiotik agar bekerja lebih maksimal secara bersama-sama. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa probiotik membutuhkan substrat tertentu untuk bereproduksi dan berfungsi dengan baik di saluran pencernaan. Dengan menyediakan prebiotik yang tepat, sinbiotik meningkatkan kelangsungan hidup dan aktivitas probiotik, sehingga menghasilkan manfaat kesehatan yang lebih besar daripada hanya menggunakan probiotik atau prebiotik saja (Swanson et al., 2020).

Kehadiran sinbiotik memiliki banyak manfaat, antara lain fungsi pencernaan yang lebih baik, mengatur sistem kekebalan tubuh, serta mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Sinbiotik dapat membantu mengatasi masalah gastrointestinal seperti *Irritable Bowel Syndrome* (IBS) dan *Inflammatory Bowel Disease* (IBD), mengontrol metabolisme tubuh, dan mengurangi risiko obesitas dan diabetes tipe 2 (Dahiya et al., 2017; Swanson et al., 2020).

Penggunaan sinbiotik dalam industri makanan dan farmasi juga semakin meningkat. Produk sinbiotik seperti makanan fungsional dan suplemen makanan menjadi sangat populer di kalangan konsumen yang sadar pentingnya menjaga kesehatan. Industri terus berinovasi untuk mengembangkan produk sinbiotik yang lebih efektif dan lebih mudah diakses masyarakat luas. Sinbiotik dalam produk seperti yogurt dan minuman fermentasi lainnya meningkatkan nilai gizi dan menawarkan manfaat kesehatan tambahan yang signifikan (Kolida & Gibson, 2011).

Sinbiotik menawarkan prospek yang menguntungkan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sinbiotik berfungsi dan potensi aplikasinya dapat membantu kita memaksimalkan potensinya, menjadikannya bagian penting dari rencana kesehatan kontemporer.

B. Sejarah dan Perkembangan Penelitian Sinbiotik

1. Sejarah awal probiotik dan prebiotik

Pemahaman tentang sinbiotik, diawali dengan melihat sejarah dan perkembangan penelitian probiotik dan prebiotik karena kedua obyek ini bersinergi untuk meningkatkan kesehatan inangnya. Élie Metchnikoff pertama kali mengajukan gagasan probiotik pada awal tahun 1907, seorang ahli biologi Rusia yang mengamati bahwa petani Bulgaria yang sering mengonsumsi susu fermentasi tampak lebih sehat dan hidup lebih lama. Dia percaya bahwa hal ini disebabkan oleh bakteri asam laktat (BAL) yang ada dalam susu fermentasi, yang kemudian dikenal sebagai probiotik. Demikianlah temuannya yang telah dipublikasikan dalam "*The Prolongation of Life: Optimistic Studies*" (Minot, 1908).

Dalam penelitian awal tentang probiotik, perhatian tertuju pada bakteri laktat (BAL) dan peran yang dimainkannya dalam kesehatan usus. Diyakini bahwa BAL meningkatkan kesehatan pencernaan dengan mencegah pertumbuhan bakteri patogen, mengembalikan keseimbangan mikrobiota usus, dan meningkatkan sistem kekebalan. "Probiotik" adalah istilah yang pertama kali diusulkan oleh Lilly dan Stillwell pada tahun 1965 untuk menggambarkan aktivitas mikroorganisme yang mendorong pertumbuhan mikroorganisme lain (Lilly & Stillwell, 1965). Kemudian, istilah ini berkembang untuk menggambarkan mikroorganisme hidup, jika diberikan dalam jumlah yang cukup, memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya (C. Hill et al., 2014).

Di sisi lain, prebiotik adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia tetapi bermanfaat bagi kesehatan dengan merangsang pertumbuhan dan/atau aktivitas mikroorganisme menguntungkan di usus besar secara selektif. Gibson dan Roberfroid pertama kali menggunakan istilah "prebiotik" pada tahun 1995. Akar sawi putih, yang merupakan sumber utama inulin pertama kali, bawang putih, bawang merah, asparagus, pisang, dan gandum adalah beberapa contoh makanan alami yang mengandung prebiotik. Prebiotik seperti inulin, pektin, fruktooligosakarida (FOS), dan galaktooligosakarida (GOS) telah terbukti meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas bakteri baik di usus, termasuk Bifidobacteria dan Lactobacilli, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh (Slavin, 2013).

Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, penelitian tentang sinbiotik menunjukkan bahwa kombinasi probiotik dan prebiotik dapat memberikan efek yang lebih sinergis dalam mendukung kesehatan pencernaan dan meningkatkan keseimbangan mikrobiota usus. Misalnya, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Gibson & Roberfroid (1995) menemukan bahwa kombinasi *Bifidobacterium lactis* dan inulin secara signifikan meningkatkan populasi *Bifidobacterium* di usus besar dibandingkan dengan kombinasi tunggal probiotik dan prebiotik.

Sejak temuan tersebut, penelitian tentang sinbiotik berkembang pesat, dan banyak penelitian telah menekankan potensi manfaatnya untuk kesehatan dalam berbagai aspek. Salah satu contohnya adalah gangguan gastrointestinal seperti *Irritable Bowel Syndrome* (IBS) dan *Inflammatory Bowel Disease* (IBD). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zmora et al. (2018) menemukan bahwa menggunakan kombinasi *Lactobacillus rhamnosus* dan inulin secara signifikan mengurangi gejala sindrom iritasi usus besar (IBS) lebih banyak. Sinbiotik juga disinyalir mengontrol metabolisme tubuh dan mengurangi risiko obesitas dan diabetes tipe 2. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Salazar et al. (2009) menunjukkan bahwa kombinasi *Lactobacillus plantarum* dan FOS mengurangi peradangan dan resistensi insulin pada tikus yang mengalami penumpukan lemak. Hal ini menunjukkan kemampuan sinbiotik untuk mengendalikan kondisi metabolik.

Dengan meningkatnya pengetahuan tentang manfaatnya bagi kesehatan, penggunaan sinbiotik dalam industri makanan dan farmasi juga meningkat. Produk sinbiotik, seperti suplemen makanan dan makanan fungsional, menjadi lebih populer di kalangan konsumen yang sadar kesehatan. Penambahan sinbiotik pada produk seperti yogurt, minuman fermentasi, dan makanan ringan tidak hanya meningkatkan nilai gizinya tetapi juga menawarkan manfaat kesehatan tambahan yang signifikan (Kolida & Gibson, 2011).

Di sisi lain, industri farmasi mulai menyelidiki kemungkinan penggunaan sinbiotik dalam pengobatan medis. Menurut beberapa penelitian, sinbiotik dapat membantu dalam pengobatan penyakit menular dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menghentikan pertumbuhan patogen berbahaya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Gritz & Bhandari (2015) menemukan bahwa kombinasi *Lactobacillus rhamnosus* dan GOS menurunkan tingkat infeksi saluran pernapasan pada bayi baru lahir.

Pentingnya sinbiotik untuk kesehatan mental juga menjadi perhatian karena penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat mempengaruhi kesehatan mental melalui pengaturan poros usus-otak. Dalam model hewan, kombinasi *Bifidobacterium longum* dan inulin dilaporkan mampu mengurangi depresi dan kecemasan (Dinan & Cryan, 2017).


2. Tantangan dan masa depan penelitian sinbiotik

Meskipun sinbiotik memiliki potensi yang gemilang, ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Salah satu yang paling sulit adalah memahami bagaimana sinbiotik bekerja dengan cara yang rumit dan bagaimana berbagai jenis probiotik dan prebiotik berinteraksi satu sama lain. Selain itu, diperlukan lebih banyak penelitian untuk menentukan dosis terbaik dan kombinasi terbaik dari sinbiotik untuk berbagai kondisi medis.

Untuk meningkatkan stabilitas dan kemanjuran sinbiotik dalam produk makanan dan farmasi, teknologi baru juga harus dikembangkan. Misalnya, probiotik dapat terlindungi selama produksi dan penyimpanan dengan menggunakan teknologi enkapsulasi, yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup probiotik hingga mencapai usus (Cook et al., 2012).

Studi sinbiotik memiliki prospek yang sangat menjanjikan di masa depan. Dengan kemajuan teknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang mikrobiota usus, sinbiotik dapat menjadi komponen penting dari pendekatan medis kontemporer. Selain itu, penelitian dapat membantu menemukan kombinasi terbaik dari sinbiotik untuk berbagai kondisi medis dan mengembangkan produk inovatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup banyak orang.

Selama bertahun-tahun, penelitian tentang sinbiotik menunjukkan bahwa kombinasi probiotik dan prebiotik memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan manusia. Dari pengamatan awal Élie Metchnikoff mengenai manfaat kesehatan dari bakteri menguntungkan dalam makanan fermentasi hingga penelitian kontemporer mengenai penggunaan sinbiotik dalam industri makanan dan farmasi, telah terbukti bahwa sinbiotik dapat menjadi bagian integral dari strategi kesehatan holistik yang berkelanjutan.



BAB II

KONSEP DASAR SINBIOTIK

A. *Probiotik*

Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang, jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, akan memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya. Istilah "probiotik" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "untuk kehidupan". Konsep probiotik pertama kali diperkenalkan oleh Élie Metchnikoff pada awal abad ke-20. Metchnikoff (1907), berpendapat bahwa proses penuaan dan berbagai penyakit degeneratif disebabkan oleh aktivitas toksik mikroba patogen di usus besar. Dengan mengonsumsi bakteri asam laktat melalui makanan fermentasi, keseimbangan mikrobiota usus dapat ditingkatkan, sehingga kesehatan dapat ditingkatkan dan umur panjang dapat dicapai. Gagasan ini mendorong penelitian lebih lanjut tentang manfaat kesehatan dari bakteri yang bermanfaat.

Pada tahun 1965, Lilly dan Stillwell memperkenalkan istilah "probiotik" dalam literatur ilmiah untuk menggambarkan zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme lain. Pada tahun 1989, Roy Fuller menyempurnakan definisi probiotik sebagai "mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup" (Fuller, 1989; Lilly & Stillwell, 1965).

Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian tentang probiotik telah berkembang pesat. Penelitian awal sebagian besar difokuskan pada manfaat kesehatan pencernaan, tetapi seiring berjalannya waktu, berbagai manfaat kesehatan lainnya mulai muncul. Saat ini, probiotik diketahui memiliki potensi untuk mendukung kesehatan pencernaan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengurangi risiko

infeksi, dan meningkatkan kesehatan mental dan metabolisme.

Pada awal abad ke-21, definisi dan pemahaman tentang probiotik semakin diperjelas melalui konsensus ilmiah. FAO/WHO, (2002) mendefinisikan probiotik sebagai "mikroorganisme hidup yang, jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya".

Penelitian modern telah mengungkapkan bahwa manfaat probiotik tidak terbatas pada kesehatan pencernaan saja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa probiotik dapat memengaruhi berbagai aspek kesehatan, termasuk keseimbangan mikrobiota usus, penghambatan mikroorganisme patogen, penguatan penghalang lendir usus, dan modulasi respons imun tubuh (Fuller, 1989; Hafsan, 2022; Heller, 2001; Huis Veld & Havenaar, 1991; Lilly & Stillwell, 1965; Marteau et al., 2002; S. C. Ng et al., 2009; Nowak et al., 2010; Nur, 2022).

Probiotik membantu menjaga keseimbangan antara bakteri baik dan jahat di usus, yang penting untuk kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Probiotik dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen melalui berbagai mekanisme, termasuk persaingan untuk nutrisi dan tempat, produksi senyawa antimikroba (seperti bakteriosin), dan penurunan pH usus melalui produksi asam laktat. Probiotik juga dapat memperkuat lapisan mukosa usus, yang berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap patogen, serta meningkatkan produksi lendir dan memperbaiki integritas penghalang epitel usus, sehingga mencegah patogen memasuki aliran darah. Selain itu, probiotik dapat memodulasi sistem imun dengan meningkatkan aktivitas sel imun seperti makrofag dan sel T, serta meningkatkan produksi antibodi. Probiotik juga dapat mengurangi peradangan dengan menekan produksi sitokin proinflamasi (Fuller, 1989; Hafsan, 2022; Heller, 2001; Huis Veld & Havenaar, 1991; Lilly & Stillwell, 1965; Marteau et al., 2002; S. C. Ng et al., 2009; Nowak et al., 2010; Nur, 2022).

Selain manfaat tersebut, penelitian juga menunjukkan bahwa probiotik dapat membantu mengurangi gejala gangguan pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar (IBS), diare terkait antibiotik, dan penyakit radang usus (IBD). Probiotik juga dapat membantu mengurangi risiko alergi, meningkatkan kesehatan kulit, dan bahkan mendukung kesehatan mental melalui hubungan otak-usus (Kolida & Gibson, 2011; O'Mahony et al., 2005).

1. Kriteria atau Persyaratan Probiotik

Mikroba harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat disebut sebagai probiotik. Mengonsumsi probiotik yang memenuhi persyaratan ini tidak hanya memastikan bahwa probiotik tersebut aman untuk dikonsumsi, tetapi juga berhasil memberikan manfaat kesehatan yang diinginkan (Huis In't Veld & Shortt, 1996). Berikut deskripsi komprehensif tentang parameter atau kriteria yang harus dipenuhi mikroorganisme agar dapat diklasifikasikan sebagai probiotik.

a. *Keamanan probiotik*

Salah satu persyaratan terpenting yang harus dipenuhi oleh probiotik adalah keamanannya. Mikroorganisme yang digunakan sebagai probiotik harus aman untuk dikonsumsi manusia. Ini berarti bahwa mikroorganisme tersebut tidak boleh bersifat patogen atau berbahaya. Sebagian besar probiotik yang digunakan dalam makanan dan suplemen berasal dari spesies yang secara alami terdapat dalam sistem pencernaan manusia atau dalam makanan yang telah difermentasi dalam jangka waktu lama. Probiotik harus menjalani studi keamanan yang ketat, yang harus mencakup penilaian kemungkinan patogenitas dan toksisitasnya, untuk menjamin bahwa probiotik tidak menimbulkan efek samping atau penyakit yang serius (Huis In't Veld & Shortt, 1996; Salazar et al., 2009; Suez et al., 2019).

1) Sumber dan riwayat penggunaan

Sejumlah besar probiotik yang saat ini digunakan berasal dari bakteri yang telah dikonsumsi manusia dalam waktu yang sangat lama tanpa menimbulkan efek samping yang berarti. Dua genus bakteri yang paling sering digunakan sebagai probiotik adalah *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*. Kedua genus ini telah ditemukan dalam produk susu fermentasi seperti yoghurt dan kefir sejak lama. Praktik mengonsumsi makanan fermentasi yang kaya akan probiotik telah dipraktikkan di berbagai peradaban di seluruh dunia, menunjukkan sejarah penggunaan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan seseorang.

2) Uji keamanan

Agar probiotik diizinkan untuk digunakan dalam makanan atau suplemen, probiotik harus terlebih dahulu menjalani sejumlah uji keamanan yang berbeda. Semua pemeriksaan keamanan ini meliputi:

- **Evaluasi genetik:** untuk menjamin bahwa probiotik tidak mengandung gen yang dapat menyebabkan patogenitas atau resistensi antibiotik, analisis genetik dilakukan. Mikroorganisme yang membawa gen resistan antibiotik dan berpotensi ditularkan ke bakteri patogen dalam usus manusia akan dieliminasi dari pertimbangan untuk peran probiotik.
- **Uji toksisitas:** dilakukan untuk memastikan bahwa mikroorganisme yang dimaksud sama sekali tidak menghasilkan zat beracun yang berpotensi membahayakan inang. Produksi enterotoksin, sitotoksin, atau zat kimia lain yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada sel inang atau mengganggu fungsi tubuh yang normal bukanlah sesuatu yang diharapkan dari probiotik yang aman.
- **Uji patogenitas:** mengacu pada proses untuk menentukan apakah mikroorganisme berpotensi menyebabkan penyakit jika tertelan dalam jumlah tinggi. Probiotik yang aman untuk dikonsumsi tidak boleh mengakibatkan infeksi pada inang yang sehat atau pada mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang terganggu.
- **Studi Klinis:** Untuk menentukan apakah probiotik aman untuk digunakan pada subjek manusia, dilakukan studi penelitian klinis. Tujuan dari studi ini adalah untuk menyelidiki potensi efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan probiotik, serta untuk menilai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh konsumsi tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama.

3) Regulasi dan Standar Keamanan

Peraturan dan standar pedoman keamanan dan kriteria keamanan probiotik telah dibuat oleh sejumlah organisasi internasional, termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO/WHO), Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) di Amerika Serikat. Pemilihan, penilaian, dan penggunaan probiotik dalam makanan dan suplemen semuanya tercakup dalam kriteria dalam panduan dan pedoman tersebut.

- **FAO/WHO Guidelines:** Pedoman yang dirilis oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2002 memberikan pedoman untuk penilaian probiotik dalam makanan. Pedoman ini menetapkan kriteria untuk memverifikasi

keamanan dan khasiat probiotik sebelum digunakan dalam produk makanan (FAO/WHO, 2002).

- **EFSA QPS List:** Daftar Praduga Keamanan yang Memenuhi Syarat (QPS) adalah daftar yang telah dibuat oleh Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA). Daftar ini berisi mikroorganisme yang telah dinilai dan dianggap aman berdasarkan informasi ilmiah yang saat ini tersedia (EFSA, 2007).
- **Status GRAS FDA:** bakteri tersebut secara umum diakui aman (GRAS) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) di Amerika Serikat. Sebutan ini diberikan kepada mikroorganisme yang telah terbukti aman melalui penggunaan data historis atau bukti ilmiah. Makanan yang mengandung mikroorganisme yang telah diberi klasifikasi GRAS dapat digunakan tanpa perlu persetujuan pra-pemasaran yang ketat (Burdock & Carabin, 2004; Sewalt et al., 2016).

b. Viabilitas (*kemampuan bertahan hidup*)

Probiotik harus mampu bertahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim sepanjang saluran pencernaan, termasuk terpapar garam empedu dan asam lambung. Probiotik perlu memiliki mekanisme perlindungan yang memungkinkannya bertahan terhadap keasaman yang ada di lambung serta enzim pencernaan yang ada di usus halus agar dapat mencapai usus besar dalam kondisi hidup. Berkat kualitas bertahan hidup inilah probiotik mampu mencapai tempat-tempat tertentu di usus besar, tempat mereka dapat memberikan manfaat kesehatan secara maksimal bagi individu.

Daya viabilitas yang dimiliki oleh probiotik, menjadikannya mampu berinteraksi dengan mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan, yang membantu memperbaiki penghalang mukosa, menciptakan senyawa antibakteri, dan mengubah fungsi sistem kekebalan tubuh. Probiotik tidak akan mampu berhasil memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya jika tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup (Collado et al., 2007; Dunne et al., 2001; Huis In't Veld & Shortt, 1996).

Bagi bakteri, lingkungan di dalam sistem pencernaan manusia sangatlah tidak bersahabat dan sangat sulit untuk bertahan hidup. Sejumlah kendala signifikan harus diatasi oleh probiotik:

- **Asam lambung:** lambung bertanggung jawab atas produksi asam klorat, yang merupakan zat yang sangat asam dengan pH berkisar antara 1,5 hingga 3,5. Selain perannya dalam

menghilangkan infeksi dan pencernaan makanan, lingkungan asam ini berpotensi menghancurkan probiotik sebelum mencapai usus.

- **Garam empedu:** setelah melewati lambung, probiotik ditantang untuk berhadapan dengan garam galium di usus halus. Garam empedu bertindak serupa deterjen yang dapat menyebabkan kerusakan pada membran sel bakteri sehingga dapat mengakibatkan kematian sel mikroorganismenya.
- **Enzim Pencernaan:** Sistem pencernaan juga merupakan rumah bagi berbagai enzim pencernaan makanan, yang memiliki kekuatan untuk mendegradasi protein dan lipid yang merupakan komponen penyusun sel bakteri, sehingga praktis berimbang dapat menurunkan viabilitas probiotik (Collado et al., 2007; Dunne et al., 2001; Huis In't Veld & Shortt, 1996).

Untuk mempertahankan viabilitasnya dalam lingkungan saluran pencernaan, probiotik memiliki sejumlah mekanisme yang mampu memberikan perlindungan yang sangat penting. Mekanisme ini membuat probiotik mampu mengenali berbagai tantangan dalam saluran pencernaan dan mencapai usus dengan jumlah yang signifikan. Adapun beberapa mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh probiotik adalah:

- **Produksi asam laktat:** beberapa probiotik, seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, menghasilkan asam laktat yang dapat membantu menurunkan pH lokal di sekitarnya. Hal ini menghasilkan terciptanya lingkungan yang lebih asam, yang kurang ramah bagi patogen tetapi lebih bermanfaat bagi probiotik (Axelsson, 2004; Bottazzi, 1994; Gänzle, 2015; Saad, 2006).
- **Kapsul dan dinding sel yang kuat:** beberapa probiotik memiliki arsitektur dinding sel yang lebih tahan terhadap asam empedu dan garam. Probiotik ini juga mengandung kapsul yang tidak mudah rusak. *Lactobacillus rhamnosus*, misalnya, memiliki dinding sel tebal yang membantu melindungi inti sel dari kerusakan yang mungkin disebabkan oleh asam lambung dan garam empedu. Karena struktur dinding sel yang kuat, probiotik mampu melekat pada mukosa usus dan mendominasi saluran pencernaan dengan lebih efisien.
- **Penggunaan prebiotik:** Untuk meningkatkan viabilitas probiotik, prebiotik seperti inulin dan FOS dapat digunakan bersama

dengan probiotik (Abrams et al., 2023; Sanders et al., 2014; J. Slavin, 2013).

- **Mikroenkapsulasi:** metode ini melibatkan pelapisan probiotik dengan molekul pelindung yang mampu bertahan terhadap asam dan garam yang diproduksi oleh lambung. Probiotik kemudian dikeluarkan ke usus besar, yang merupakan lokasi dengan kondisi yang lebih mendukung pertumbuhannya. Selain itu, mikrokapsulasi membantu menjaga vitalitas probiotik selama penyimpanan dan pemrosesan makanan (Cook et al., 2012).
- **Adaptasi genetik:** beberapa galur probiotik memiliki adaptasi genetik yang memungkinkan mereka hidup di lingkungan yang ekstrim. Galur ini mampu berkembang biak di lingkungan yang tidak menguntungkan. Misalnya, gen yang mengkodekan pembentukan protein tahan asam atau enzim yang mendetoksifikasi garam empedu dapat memberikan manfaat tambahan bagi probiotik dalam hal kemampuannya untuk bertahan hidup dalam sistem pencernaan.

c. *Kemampuan kolonisasi*

Kriteria penting lainnya yang harus dipenuhi oleh probiotik untuk menjamin efektivitasnya dalam memberikan manfaat kesehatan adalah kapasitas kolonisasi. Agar memiliki efek yang bertahan lama, probiotik harus mampu memberikan pengaruhnya pada tubuh manusia dan bertindak dengan cara yang konsisten dengan sifatnya. Sistem kolonisasi yang efektif memungkinkan mikrobiota berinteraksi dengan tubuh manusia, memodulasi sistem imun tubuh, dan meningkatkan fungsi organ perifer tubuh manusia (Antonio et al., 2011; Roberfroid et al., 2010; Sellitto et al., 2021). Berikut ini adalah uraian tentang kemampuan kolonisasi probiotik.

Triliunan mikroorganisme mendiami saluran pencernaan manusia, yang selalu berubah dan dengan dinamika yang rumit. Probiotik harus berkompetisi dengan mikrobiota usus yang sudah ada dan dapat bertahan dari berbagai kondisi lingkungan yang berubah-ubah agar dapat berkolonisasi. Selama proses kolonisasi, probiotik menghadapi beberapa masalah utama, termasuk:

- **Persaingan dengan mikroba residen:** mikrobiota yang mendiami usus memiliki keuntungan adaptasi lokal dan tentu saja merupakan kompetitor bagi probiotik untuk mendapatkan nutrisi dan ruang di mukosa usus.
- **Pertahanan imun mukosa:** mukosa sistem imun mengenali dan

bisa saja mengusir mikroorganisme asing, termasuk probiotik.

- **Perubahan lingkungan usus:** pH, kandungan nutrisi, dan komposisi mikrobiota usus dapat bervariasi, yang dapat memengaruhi kemampuan probiotik untuk berkolonisasi.

Probiotik menjalankan sejumlah proses yang memungkinkannya dapat melekat pada mukosa usus dan berkembang biak di sana, yang diperlukan agar dapat menjajah saluran pencernaan secara efektif.

- **Adhesi pada mukosa usus:** probiotik mengandung molekul lengket pada permukaannya, yang memungkinkannya melekat pada sel epitel usus besar. Hal ini memungkinkan probiotik untuk bertahan di mukosa usus. Perlekatan ini dapat berupa protein, lipoprotein, atau polisakarida, dan mereka melakukan kontak dengan reseptor tertentu yang terdapat pada sel mukosa saluran pencernaan (Latif et al., 2023; Qian et al., 2021; Segers & Lebeer, 2014; Von Wright & Salminen, 1999).
- **Produksi eksopolisakarida (EPS):** probiotik tertentu mampu menghasilkan eksopolisakarida, yang memungkinkannya membentuk biofilm pada permukaan mukosa usus untuk keuntungan mereka sendiri. Kehadiran biofilm ini memberi lapisan pertahanan tambahan bagi probiotik terhadap keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan, sehingga memudahkan kelangsungan hidup dan reproduksinya (Jurášková et al., 2022; Khalil et al., 2018).
- **Interaksi dengan mikrobiota saluran usus:** probiotik memiliki kemampuan untuk menciptakan interaksi sinergis atau kompetitif dengan mikrobioma yang sudah ada di dalam usus. Sebagai ilustrasi, probiotik memiliki kemampuan untuk menghasilkan zat kimia antimikroba yang mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya, sehingga menghasilkan lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan probiotik itu sendiri (Collado et al., 2007; Gibson & Roberfroid, 1995; Glenn et al., 2004; Scott et al., 2013).
- **Modulasi sistem imun:** probiotik memiliki kemampuan untuk mengendalikan respons imunologi selaput lendir, yang dapat membantu meminimalkan reaksi imun terhadapnya sehingga toleran terhadap kehadirannya. Memicu produksi sitokin antiinflamasi dan menghalangi produksi sitokin proinflamasi adalah dua cara probiotik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kemampuan kolonisasi (S. C.

Ng et al., 2009; Ouwehand et al., 1999).

Menurut hasil penelitian, kemampuan probiotik untuk menjajah lingkungannya sangat penting bagi efisiensinya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Yan et al. (2007) menunjukkan bahwa strain *Lactobacillus rhamnosus* GG memiliki kapasitas adhesif yang kuat terhadap sel epitel usus. Hal ini memungkinkan strain ini untuk menjajah dengan sukses dan memberikan manfaat kesehatan yang tahan lama. *Lactobacillus casei* Shirota terbukti mampu menciptakan biofilm persisten di usus, yang meningkatkan kolonisasi dan daya tahan probiotik, berdasarkan hasil penelitian lain yang dilaporkan oleh Ouwehand et al. (1999).

Selain itu, telah ditunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi seperti mikroenkapsulasi dan produksi strain probiotik yang memiliki molekul adhesin tertentu dapat meningkatkan kapasitas untuk menjajah probiotik. Teknik ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin bahwa probiotik mampu melekat dan berkembang biak dalam mukosa usus, tetapi juga membantu meningkatkan vitalitas probiotik saat mereka bergerak melalui sistem pencernaan.

d. Kemampuan produksi senyawa antimikroba

Salah satu kriteria lain yang juga harus dipenuhi oleh mikroorganisme sebagai probiotik adalah kapasitas untuk menghasilkan senyawa antimikroba. Senyawa tersebut memiliki kemampuan untuk menghalangi pertumbuhan agen infeksi, berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Ada banyak jenis senyawa antimikroba yang dapat diproduksi oleh probiotik. Senyawa-senyawa ini memiliki berbagai cara kerja yang berbeda yang menghambat perkembangan patogen.

1) Asam laktat

Bakteri yang tergolong probiotik umumnya bertanggung jawab atas produksi asam laktat, yang merupakan salah satu zat antibakteri utama yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Bakteri ini bertanggung jawab atas fermentasi karbohidrat, yang menghasilkan produksi asam laktat (Axelsson, 2004; Nur, 2022; Ouwehand & Vesterlund, 2004).

Bifidobacterium dan *Lactobacillus* adalah dua genus bakteri yang terkenal karena kemampuannya untuk menghasilkan asam laktat. Selain kedua genus tersebut, ada beberapa genus bakteri

lainnya. Ketika bakteri ini mulai memetabolisme karbohidrat melalui jalur fermentasi, proses yang menghasilkan pembentukan asam laktat pun terjadi. Dalam jalur metabolisme *Lactobacillus*, jalur Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) adalah jalur yang paling umum, sedangkan jalur bifidum adalah jalur yang paling umum untuk *Bifidobacterium*. Laktat dehidrogenase adalah enzim yang bertanggung jawab atas reduksi asam piruvat menjadi asam laktat. Proses ini melibatkan pemecahan glukosa menjadi asam piruvat (Borchers et al., 2009; Kavaz et al., 2022).

Patogen umumnya membutuhkan pH yang netral atau sedikit basa untuk pertumbuhan optimalnya. Asam laktat bertanggung jawab atas penurunan pH, yang berdampak menciptakan keadaan yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri patogen, termasuk *Salmonella*, *Clostridium difficile*, dan *Escherichia coli*. Asam laktat merupakan asam kuat yang memiliki kemampuan untuk menurunkan pH lingkungan dalam saluran pencernaan dari keadaan netral (pH sekitar 7) ke kondisi yang lebih asam (nilai pH antara 4-5). Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Axelsson (2004), *Lactobacillus plantarum* memiliki kemampuan untuk menurunkan pH lingkungan sekitar, yang pada gilirannya berfungsi untuk membatasi pertumbuhan bakteri berbahaya di usus.

Stimulasi perkembangan mikroba yang bermanfaat terjadi ketika lingkungan lebih asam. Hal ini dikarenakan lingkungan yang asam lebih mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang bermanfaat seperti *Bifidobacteria* dan *Lactobacilli*. Di dalam usus yang memiliki pH rendah, mikroorganisme ini mampu berkoloni dengan lebih efisien, yang berkontribusi pada keseimbangan mikroba yang sehat di dalam usus. Pembentukan asam laktat oleh *Lactobacillus rhamnosus* GG bertanggung jawab untuk menurunkan pH usus besar, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan populasi *Bifidobacteria*. Hal ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Servinn pada tahun 2004.

Selain itu, asam laktat memiliki efek antibakteri langsung, selain kemampuannya untuk menurunkan pH. Asam laktat dapat menyebabkan kerusakan pada membran sel bakteri patogen, mengubah fungsi enzim, dan menghambat metabolismenya. Viabilitas patogen dan kapasitasnya untuk bereplikasi dapat berkurang akibat dampak tersebut. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Ganzle, (2003), asam laktat yang diproduksi oleh *Lactobacillus reuteri* memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan pada membran sel *Salmonella enterica*, yang pada

gilirannya menghambat perkembangan bakteri tersebut secara signifikan.

Selain dalam konteks antimikroba, produksi asam laktat oleh bakteri menghadirkan keuntungan kesehatan lain yang menyertai bagi inang, termasuk yang berikut ini:

- **Meningkatkan penyerapan mineral:** lingkungan asam yang ada di usus berpotensi untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan mineral termasuk kalsium, magnesium, dan zat besi. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Abrams dan rekan-rekannya pada tahun 2005, konsumsi probiotik yang memproduksi asam laktat berpotensi untuk meningkatkan penyerapan kalsium pada anak-anak.
- **Modulasi sistem kekebalan tubuh:** asam laktat memiliki kemampuan untuk memodulasi sistem imun tubuh. Hal tersebut karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan sistem imun, yang dapat meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi dan meningkatkan respons sistem imun terhadap infeksi. Di dalam usus, sintesis IL-10, yang merupakan sitokin anti-inflamasi, dapat ditingkatkan oleh asam laktat yang dihasilkan oleh *Lactobacillus casei*, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Maassen dan rekan-rekannya pada tahun 2000.
- **Perbaikan proteksi mukosa:** pembentukan asam laktat berfungsi untuk membangun penghalang mukosa di usus besar dengan meningkatkan jumlah lendir yang diproduksi dan memperkuat integritas lapisan epitel. Hal ini menghasilkan peningkatan kinerja fungsi obstruktif usus. Ia memiliki kemampuan untuk menghentikan organisme penyebab penyakit dan racun memasuki sirkulasi, sehingga menurunkan kemungkinan infeksi dan peradangan di seluruh tubuh.

2) Bakteriosin

Bakteriosin adalah molekul antibakteri yang diproduksi oleh probiotik secara oral dalam bentuk protein atau peptida (Hafsan, 2014). Fungsi utamanya adalah untuk melawan bakteri yang berbahaya bagi tubuh. Berbagai spesies probiotik, termasuk dari genus *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, dilaporkan bertanggung jawab atas produksi bakteriosin.

Probiotik memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan bakteriosin melalui proses biosintesis yang kompleks. Proses ini memerlukan aktivasi gen tertentu yang bertanggung jawab untuk

memproduksi prekursor yang diperlukan. Selain itu, berbagai enzim dan protein memainkan peran penting dalam pemrosesan dan pengangkutan bakteriosin di luar sel bakteri. Setelah itu, bakteriosin yang diaktifkan dikeluarkan dari sel bakteri melalui sistem transportasi khusus yang biasanya menggunakan protein transporter. Begitu berada di luar sel, bakteriosin dapat berinteraksi dengan bakteri patogen di lingkungan sekitarnya. Melalui interaksi ini, bakteriosin memiliki kemampuan untuk mengikat dan mengganggu dinding sel mikroorganisme berbahaya, yang mengakibatkan runtuhnya sel dan selanjutnya menyebabkan kematian bakteri. Dengan memanfaatkan mekanisme ini, bakteriosin yang dihasilkan oleh probiotik dapat secara efektif mengatur populasi bakteri berbahaya dan menjaga keseimbangan mikrobiota usus (Deegan et al., 2006; T. R. Klaenhammer, 1993).

Dengan cara kerjanya yang unik, bakteriosin secara efektif menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya, menjadikannya aset berharga dalam meningkatkan kesehatan usus dan menjaga keseimbangan mikrobiota. Salah satu fungsi utama bakteriosin adalah menghilangkan dinding sel bakteri berbahaya. Ketika bakteriosin berinteraksi dengan elemen tertentu dari dinding sel bakteri, hal itu dapat mengakibatkan kerusakan struktural yang signifikan. Pengamatan terhadap kinerja bakteriosin jenis nisin, senyawa yang disintesis oleh *Lactococcus lactis*, berinteraksi dengan lipid II yang ditemukan dalam membran sel bakteri. Peran krusial Lipid II dalam sintesis dinding sel bakteri diketahui sangat penting, interaksi nisin dengan Lipid II mengganggu proses tersebut. Ketika dinding sel bakteri terganggu, hal itu menyebabkan hilangnya integritas sel. Hal ini mengakibatkan kebocoran isi sel, deformasi sel, dan akhirnya terjadi kematian patogen (Deegan et al., 2006).

Bakteriosin juga dapat mengganggu fungsi membran sel bakteri patogen dengan membentuk pori-pori atau saluran pada membran. Proses ini mengakibatkan keluarnya ion dan molekul kecil dari dalam sel, sehingga mengganggu keseimbangan sel. Contoh bakteriosin yang berfungsi dengan cara ini adalah Pediocin, yang diproduksi oleh *Pediococcus acidilactici*. Pediocin diproduksi pada membran sel bakteri, yang memungkinkan keluarnya ion seperti K^+ dan Na^+ bersama dengan molekul kecil lainnya dari sel. Kebocoran ini menyebabkan gangguan pada gradien ion yang diperlukan untuk fungsi seluler, yang menyebabkan kegagalan sel untuk mempertahankan energi metabolisme dan akhirnya menyebabkan kematian sel (Gänzle et al., 1999).

Beberapa bakteriosin memiliki kemampuan tidak hanya merusak dinding dan membran sel, tetapi juga menghambat sintesis protein dalam sel bakteri patogen. Bakteriosin ini berinteraksi langsung dengan ribosom atau faktor translasi, yang memainkan peran penting dalam proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Melalui gangguannya terhadap proses-proses ini, bakteriosin menghambat sintesis protein vital yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan sel bakteri. Ketika bakteri tidak mampu mensintesis protein, fungsi-fungsi esensialnya terganggu, yang menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan akhirnya menuju kematian sel. Beberapa bakteriosin, seperti subtilisin dan antibiotik tertentu, memiliki kemampuan untuk mengikat ribosom bakteri dan mengganggu proses transkripsi (Deegan et al., 2006; Hegarty et al., 2016; T. R. Klaenhammer, 1993).

Fleksibilitas bakteriosin dalam menargetkan berbagai komponen sel bakteri patogen membuatnya sangat berharga dalam berbagai aplikasi, seperti pengawetan makanan dan pengobatan infeksi. Ahli biofisika telah banyak memanfaatkan bakteriosin seperti nisin sebagai pengawet alami dalam industri makanan. Senyawa ini telah terbukti sangat efektif dalam mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya, sekaligus meminimalkan perkembangan resistensi. Lebih jauh lagi, penelitian yang sedang berlangsung sedang menyelidiki potensi aplikasi terapeutik bakteriosin dalam mengatasi infeksi gastrointestinal dan infeksi lain yang disebabkan oleh bakteri patogen.

Memahami produksi bakteriosin oleh probiotik dapat memberikan wawasan berharga tentang manfaat kesehatan yang ditawarkannya bagi inang. Pertama, bakteriosin memainkan peran penting dalam mengatur populasi bakteri berbahaya di usus, secara efektif melindungi terhadap infeksi dan penyakit yang disebabkan oleh patogen seperti *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli*. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ogunbanwo et al. (2003), ditemukan bahwa *Lactobacillus plantarum* memiliki kemampuan untuk menghasilkan bakteriosin yang secara efektif memerangi *Listeria monocytogenes* dan *Staphylococcus aureus*. Hal ini menyoroti potensi bakteri ini dalam mengendalikan patogen. Selain itu, pertumbuhan bakteri patogen dihambat oleh bakteriosin, yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Bakteriosin mendorong terciptanya lingkungan yang stabil dan sehat yang mendorong pertumbuhan mikroba yang bermanfaat, sehingga menghasilkan fungsi usus yang optimal dan

kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, bakteriosin memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem imun dengan meningkatkan produksi sitokin dan mengaktifkan sel imun. Hal ini dapat membantu tubuh dalam melawan infeksi dan peradangan, sehingga menghasilkan respons yang lebih efisien.

Penelitian telah menunjukkan bahwa produksi bakteriosin oleh probiotik memainkan peran penting dalam kemampuannya untuk secara efektif menghambat pertumbuhan patogen dan menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Misalnya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Klaenhammer (1993) menunjukkan bahwa *Lactobacillus acidophilus* menghasilkan bakteriosin yang secara efektif memerangi berbagai patogen usus. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Corr et al. (2007), ditemukan bahwa bakteri salivarius menghasilkan bakteriosin yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan patogen usus dan meningkatkan kesehatan pencernaan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, pemanfaatan probiotik yang dapat menghasilkan bakteriosin telah menunjukkan kemanjurannya dalam mengobati dan mencegah infeksi gastrointestinal. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gänzle et al. (1999), ditemukan bahwa bakteriosin yang diproduksi oleh *Lactobacillus reuteri* memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan *Escherichia coli* dan *Salmonella* di dalam usus, sehingga mengurangi kemungkinan infeksi. Oleh karena itu, produksi bakteriosin oleh probiotik tidak hanya memberikan keuntungan langsung dalam mengelola patogen tetapi juga meningkatkan kesehatan usus dan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan.

3) Asam organik lainnya

Selain asam laktat, probiotik memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai asam organik, termasuk asetat, propionat, dan asam butirat. Asam-asam ini sangat penting untuk menjaga kesehatan usus dan menyeimbangkan mikrobiota. Mereka bekerja dengan mengurangi pH lingkungan usus dan mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya, seperti halnya laktat.

Probiotik, termasuk *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, dan spesies *Clostridium* tertentu, memecah karbohidrat dan serat makanan menjadi berbagai asam organik menggunakan fermentasi anaerobik. Proses ini tidak hanya membantu memecah nutrisi, tetapi juga menghasilkan asam organik yang sangat penting untuk menjaga kesehatan usus. Meskipun struktur kimianya berbeda, asam-asam ini bekerja dengan cara yang sama untuk meningkatkan lingkungan usus

yang seimbang dan mencegah pertumbuhan patogen berbahaya (Biggs & Parsons, 2008; Rafacz-Livingston et al., 2005; Takashi Sakata et al., 2003).

Fermentasi anaerobik adalah proses di mana mikroorganisme memecah karbohidrat dan serat makanan menjadi asam organik tanpa memerlukan oksigen. Proses ini dimulai dengan memecah polisakarida kompleks menjadi monosakarida yang lebih sederhana. Probiotik memanfaatkan monosakarida ini sebagai sumber energi dan mengubahnya menjadi asam organik menggunakan berbagai jalur metabolisme.

- **Lactobacillus:** Genus ini terutama memanfaatkan jalur Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) atau jalur glikolisis untuk mengubah glukosa menjadi asam laktat. Dalam keadaan tertentu, asam asetat dan asam propionat juga dapat dihasilkan sebagai produk sampingan fermentasi (Gänzle, 2015).
- **Bifidobacterium:** Bifidobacteria memetabolisme karbohidrat melalui jalur bifidum, yang juga dikenal sebagai jalur fruktosa-6-fosfat. Metode ini sangat efektif dalam menghasilkan asam asetat dan asam laktat sebagai produk utama fermentasi (Rivière et al., 2016).
- **Clostridium:** spesies dari genus ini, seperti *Clostridia butyricum*, memiliki kemampuan untuk memfermentasi serat makanan menjadi asam butirat. Asam butirat memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan usus karena bertindak sebagai sumber energi utama bagi sel epitel usus dan memiliki sifat antiinflamasi yang kuat (Louis & Flint, 2017).

Asam asetat

Asam asetat merupakan produk sampingan fermentasi yang signifikan yang dihasilkan oleh banyak probiotik. Misalnya, Bifidobacterium menghasilkan asam asetat menggunakan jalur bifidum. Asam asetat memiliki sifat antimikroba yang kuat dan mampu mengurangi pH lingkungan usus, sehingga menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri patogen seperti *Escherichia coli* dan *Salmonella* sp. (Flint et al., 2012).

Asam propionat

Asam propionat dihasilkan oleh probiotik seperti Propionibacterium dan spesies dari Bifidobacteria tertentu. Asam propionat memiliki kemampuan untuk menurunkan pH usus dan

juga memiliki sifat antimikroba yang secara efektif dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Lebih jauh lagi, asam propionat berkontribusi pada metabolisme lipid dan membantu menurunkan kadar kolesterol dalam aliran darah, sehingga meningkatkan kesehatan kardiovaskular (Hosseini et al., 2011; Venema & Carmo, 2015).

Asam butirat

Asam butirat merupakan senyawa yang memiliki berbagai aplikasi. Asam butirat adalah asam lemak rantai pendek (SCFA) penting yang diproduksi oleh bakteri anaerobik di usus besar melalui fermentasi serat. Beberapa bakteri yang bertanggung jawab atas produksinya meliputi *Clostridium butyricum* dan spesies Bifidobacterium tertentu. Mirip dengan farmakologis, asam butirat memainkan peran penting dalam menyediakan energi untuk sel epitel usus dan menunjukkan sifat antiinflamasi yang kuat. Asam butirat meningkatkan integritas lapisan epitel dan meningkatkan produksi lendir di usus, yang secara efektif memperkuat penghalang lendir. Ini membantu melindungi terhadap infiltrasi patogen dan racun ke dalam aliran darah (Gao et al., 2009; Hamer et al., 2008; T. Sakata et al., 1995).

Melalui proses fermentasi anaerobik, probiotik seperti Lactobacillus, Bifidobacterium, dan beberapa spesies Clostridium mampu mengubah karbohidrat dan serat makanan menjadi berbagai asam organik. Sebagai bagian dari proses ini, polisakarida kompleks dipecah menjadi monosakarida yang lebih sederhana. Monosakarida ini kemudian diubah menjadi asam organik melalui berbagai jalur metabolisme. Menurut Gänzle (2015), Lactobacillus memanfaatkan jalur Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) untuk mengubah glukosa menjadi asam laktat. Selain itu, jalur EMP bertanggung jawab atas produksi asam asetat dan propionat sebagai produk sampingan fermentasi. Bifidobacterium, di sisi lain, bertanggung jawab atas produksi asam asetat dan laktat melalui jalur bifidum (Rivière et al., 2016). Bakteri seperti *Clostridium butyricum* bertanggung jawab atas fermentasi serat makanan, yang menghasilkan produksi asam butirat. Asam butirat merupakan asam lemak rantai pendek (SCFA) yang berperan penting dalam menjaga kesehatan usus (Louis & Flint, 2017).

Kesehatan saluran pencernaan sangat bergantung pada keberadaan asam-asam organik tersebut. Misalnya, asam asetat memiliki dampak antibakteri yang kuat dan memiliki kemampuan

untuk mengurangi pH lingkungan di saluran pencernaan, yang mengakibatkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi bakteri patogen seperti *Salmonella* dan *Escherichia coli* (Flint et al., 2012). Asam propionat tidak hanya memiliki kemampuan untuk menurunkan pH lambung, tetapi juga memiliki kualitas antimikroba yang mencegah pertumbuhan bakteri yang berbahaya bagi tubuh. Selain itu, ia berperan dalam metabolisme lipid, yang membantu mengurangi jumlah kolesterol yang ada dalam darah (Hosseini et al., 2011). Selain memiliki dampak antiinflamasi yang kuat, asam butirat merupakan sumber energi utama bagi sel epitel yang melapisi saluran pencernaan. Asam ini juga membantu memperkuat selaput lendir saluran pencernaan dengan meningkatkan produksi lendir dan memperkuat integritas lapisan epitel. Hasilnya, mampu mencegah infeksi dan racun memasuki sirkulasi. (Hamer et al., 2008).

Pembentukan asam organik oleh probiotik melalui proses fermentasi anaerobik memiliki efek yang cukup besar dan bermanfaat bagi kesehatan saluran pencernaan. Asam-asam ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan pH lingkungan dalam usus dan memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan patogen, tetapi juga mendorong pertumbuhan bakteri baik dan meningkatkan fungsi penghalang usus. Karena itu, probiotik memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan mikrobiota di saluran usus dan dalam meningkatkan kesehatan umum sistem pencernaan dan metabolisme.

4) Peroksida

Peroksida, dan lebih khusus lagi hidrogen peroksida (H_2O_2), adalah salah satu senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh beberapa probiotik sebagai mekanisme pertahanan terhadap infeksi. Probiotik, seperti spesies *Lactobacillus*, memiliki kemampuan untuk menghasilkan hidrogen peroksida melalui aktivitas enzimatik, terutama oleh enzim flavoprotein oksidase, selama proses metabolisme oksigen molekuler (O_2). Setelah itu, hidrogen peroksida dilepaskan ke lingkungan di sekitarnya, di mana ia berpotensi untuk berinteraksi dengan komponen seluler bakteri berbahaya (Eschenbach et al., 1989).

Efektivitas hidrogen peroksida sebagai bahan kimia antibakteri dapat dikaitkan dengan fakta bahwa ia memiliki beberapa cara kerja. Pertama-tama, hidrogen peroksida berpotensi menghasilkan peroksidasi lipid dalam membran bakteri patogen, yang dapat menyebabkan kerusakan pada struktur lipid membran, yang pada

gilirannya dapat menyebabkan kebocoran isi sel, kerusakan membran, dan akhirnya kehalusan sel (Juven & Pierson, 1996). Kedua, hidrogen peroksida merupakan sumber stres oksidatif yang berpotensi menghancurkan berbagai komponen seluler bakteri patogen. Komponen-komponen ini meliputi protein, DNA, dan membran lipid. Hal ini dapat menyebabkan denaturasi protein, mutasi pada DNA, dan kerusakan pada lipid (Saran et al., 1999). Ketiga, hidroperoksida memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan ion logam seperti besi (Fe^{2+}) melalui reaksi Fenton, yang menghasilkan produksi radikal hidroksil (OH). Radikal hidroksil merupakan salah satu radikal bebas yang paling reaktif dan berpotensi menimbulkan kerusakan oksidatif yang substansial pada komponen-komponen sel (Imlay, 2003)

Probiotik bertanggung jawab atas pembentukan hidrogen peroksida, yang memberikan sejumlah keuntungan kesehatan yang signifikan dalam tubuh inang. Menurut Aroutcheva et al. (2001), hidrogen peroksida efektif dalam mengurangi jumlah bakteri patogen yang ada di usus, sehingga secara efektif menghindari infeksi dan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya. Lebih jauh lagi, hidrogen peroksida membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus yang sehat dengan menurunkan populasi bakteri patogen. Hal ini, pada gilirannya, menghasilkan lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan bakteri yang bermanfaat, yang pada gilirannya membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus besar yang sehat (Ouweland & Vesterlund, 2004).

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa pembentukan hidrogen peroksida oleh probiotik merupakan mekanisme penting yang berperan dalam mencegah pertumbuhan infeksi dan menjaga keseimbangan mikrobiota di saluran pencernaan. Eschenbach et al. (1989), melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa *Lactobacillus crispatus* mampu menghasilkan hidrogen peroksida, yang memiliki kemampuan untuk secara efektif mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya seperti *Gardnerella vaginalis* dan *Escherichia coli*. Menurut temuan penelitian lain yang dilakukan oleh Aroutcheva et al. pada tahun 2001, hidrogen peroksida yang diproduksi oleh *Lactobacillus jensenii* memiliki kemampuan untuk mengurangi kolonisasi bakteri patogen pada vagina. Hal ini membantu menjaga keseimbangan mikrobiota dan meningkatkan kesehatan reproduksi.

5) Diasetil

Proses fermentasi menghasilkan molekul organik yang dikenal sebagai diasetil, yang dihasilkan oleh beberapa probiotik. Misalnya, *Lactobacillus* dan *Leuconostoc* adalah contoh probiotik yang menghasilkan diasetil sebagai produk sampingan metabolisme asam laktat. Proses ini melibatkan konversi piruvat, yang merupakan produk akhir glikolisis, menjadi asetoin, yang kemudian dioksidasi untuk menghasilkan diasetil untuk diproses lebih lanjut. Reaksi ini sering terjadi dalam kondisi fermentasi heterogenik, yaitu proses di mana bakteri memetabolisme gula menjadi sejumlah produk akhir yang berbeda, seperti asam laktat, etanol, karbon dioksida, dan diasetil (Eschenbach et al., 1989).

Ada beberapa cara kerja yang berkontribusi terhadap efektivitas diasetil dalam menekan perkembangan bakteri yang berbahaya bagi manusia. Penekanan enzim yang diperlukan untuk metabolisme bakteri patogen, seperti enzim dehidrogenase yang terlibat dalam saluran pernapasan seluler, merupakan salah satu mekanisme utama. Berdasarkan temuan Jay (1982), penghambatan enzim ini menyebabkan gangguan dalam sintesis energi dalam sel bakteri, yang pada akhirnya mengarah pada penekanan pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Lebih jauh, diasetil memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan komponen lipid yang ditemukan dalam membran sel bakteri, yang dapat mengakibatkan degradasi struktural yang melemahkan kemampuan membran untuk melakukan tugasnya. Kerusakan ini mengakibatkan kebocoran ion dan molekul kecil, mengganggu homeostasis sel, dan akhirnya menyebabkan kematian sel. Menurut Ganzle & Vogel (2003), diasetil juga mampu membangun kompleks dengan asam nukleat seperti DNA dan RNA. Kompleks ini mengganggu proses replikasi dan transkripsi genetik, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel bakteri.

Sejumlah keuntungan kesehatan yang signifikan diberikan kepada inang melalui penciptaan produk yang dietilasi dengan probiotik. Diasetil efektif dalam mengurangi jumlah bakteri patogen yang ada di dalam usus, sehingga terhindar dari infeksi dan gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme yang tidak diinginkan. Berdasarkan laporan Ouwehand & Vesterlund (2004), diasetil memiliki kemampuan untuk mengurangi populasi bakteri patogen, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan bakteri yang bermanfaat. Hal ini pada gilirannya membantu menjaga keseimbangan mikrobiota yang sehat di dalam saluran pencernaan. Lebih jauh lagi, diasetil yang dihasilkan oleh

probiotik memiliki kemampuan untuk memicu respons imunologi lokal di dalam usus. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas fagositosis sel imun seperti makrofag dan neutrofil, yang pada gilirannya membantu tubuh melawan infeksi dengan lebih efektif (Imlay, 2003).

Proses diasetilasi, yang difasilitasi oleh probiotik, telah terbukti menjadi mekanisme penting untuk mencegah pertumbuhan patogen dan menjaga keseimbangan mikrobiota di dalam saluran pencernaan. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jay (1982), yang menunjukkan bahwa *Lactobacillus acidophilus* mampu menghasilkan diasetil, yang merupakan agen antibakteri ampuh yang menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya seperti *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Dalam penelitian terpisah, Rao et al. (2023), menemukan bahwa diasetil yang dihasilkan oleh *Leuconostoc mesenteroides* memiliki kemampuan untuk mengurangi kolonisasi patogen dalam usus, sehingga meningkatkan keseimbangan mikrobiota dan kesehatan sistem pencernaan. Mengingat hal ini, sintesis probiotik dietil merupakan komponen penting dari mekanisme pertahanan mereka, dan juga memberikan berbagai keuntungan kesehatan pada organisme yang mereka huni.

e. Kemampuan memodulasi sistem kekebalan tubuh

Dalam konteks probiotik, salah satu kriteria terpenting yang juga harus dipenuhi adalah kapasitasnya untuk memengaruhi sistem imun. Probiotik dapat berinteraksi dengan beberapa komponen sistem imun, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan respons imunologi tubuh terhadap patogen dan mengurangi peradangan. Karena kemampuan ini, probiotik berpotensi digunakan sebagai agen pengobatan dalam pengobatan dan pencegahan berbagai gangguan infeksi dan peradangan. Probiotik, seperti *Lactobacillus rhamnosus* GG, diketahui mengaktifkan reseptor Toll-like (TLR-2) dalam sel dendritik di mukosa usus. Aktivasi ini kemudian merangsang produksi sitokin antiinflamasi, seperti IL-1 (S. C. Ng et al., 2009). Selain itu, probiotik menghasilkan berbagai metabolit, termasuk asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, propionat, dan asetat. Metabolit ini memiliki sifat antiinflamasi dan meningkatkan fungsi pengikatan selaput lendir usus. Mereka melakukannya dengan menginduksi ekspresi protein pengencang dalam sel epitel usus, seperti claudin dan occludin, yang membantu mencegah peradangan dan infeksi (Vinolo et al., 2011).

Selain itu, probiotik memiliki kemampuan untuk meningkatkan aktivitas fagositosis sel imun termasuk neutrofil dan makrofag. Mereka memiliki kemampuan untuk merangsang pembentukan radikal bebas dan enzim lisozim oleh makrofag, yang keduanya berkontribusi pada eliminasi patogen apa pun yang mungkin ada. Pada tahun 2002, Marteau et al., melaporkan *Bifidobacterium breve*, misalnya, telah terbukti meningkatkan fagositosis dan kapasitas makrofag untuk menghilangkan patogen yang ada di saluran pencernaan. Lebih jauh lagi, probiotik memiliki kemampuan untuk memengaruhi respons imun humoral dan seluler dengan berkontribusi pada stimulasi pembentukan antibodi IgA di mukosa usus (Ramakrishna, 2009; Wells, 2011). Antibodi ini merupakan komponen penting dari mekanisme pertahanan mukosa terhadap infeksi patogen. Lebih jauh lagi, probiotik memiliki kemampuan untuk merangsang perkembangan sel regulator T (Treg), yang berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan imunologi dan pencegahan respons imun autoimun atau berlebihan (Mazmanian et al., 2005).

Sistem imun dapat dimodulasi oleh probiotik, yang memiliki berbagai macam aplikasi dan keuntungan. Probiotik memiliki kemampuan untuk membantu mencegah infeksi bakteri, virus, dan jamur di usus. Infeksi ini penting dalam pencegahan gangguan seperti diare infeksius dan infeksi gastrointestinal lainnya. Probiotik bekerja dengan meningkatkan aktivitas sel imun dan pembentukan antibodi. Pada tahun 2001, Szajewska dan Mrukowicz menerbitkan temuan mereka. Pengurangan peradangan kronis di usus bermanfaat bagi mereka yang menderita penyakit radang usus (IBD), yang mencakup kondisi seperti penyakit Crohn dan kolitis ulseratif. Probiotik yang menghasilkan metabolit anti-inflamasi, seperti SCFA, juga dapat membantu mengurangi peradangan di usus sebagaimana studi tahun 2001 oleh Szajewska & Mrukowicz. Probiotik memiliki kemampuan untuk menghambat perpindahan bakteri patogen dan racun dari usus ke dalam sirkulasi. Hal ini dicapai dengan meningkatkan ekspresi protein dan memperkuat penghalang mukosa. Hasilnya, risiko sepsis dan konsekuensi lain yang terkait dengan kondisi ini berkurang secara signifikan (P. D. Cani et al., 2009). Penting juga untuk dicatat bahwa pengaruh imunomodulator probiotik tidak terbatas pada usus saja. Interaksi antara probiotik dan sistem imun dapat menghasilkan efek sistemik yang bermanfaat bagi kesehatan seluruh tubuh. Efek ini dapat mencakup penghindaran reaksi alergi dan peningkatan kesehatan paru-paru (Forsythe & Bienenstock, 2010).

f. Kemampuan proteksi mukosa

Kemampuan probiotik untuk menjaga mukosa usus merupakan salah satu faktor penting yang menentukan seberapa efisiennya probiotik dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Ada lapisan sel epitel yang dikenal sebagai mukosa usus yang bertindak sebagai penghalang utama antara lumen usus dan jaringan bagian dalam tubuh. Melalui sejumlah cara yang berbeda, probiotik memiliki kemampuan untuk membantu membangun dan melindungi lendir yang ditemukan di saluran pencernaan. Mekanisme ini meliputi peningkatan sintesis lendir, peningkatan integritas penghalang epitel, dan modulasi respons imun lokal.

Sel goblet mukosa usus dirangsang oleh probiotik, yang menghasilkan peningkatan produksi lendir. Lendir merupakan lapisan pelindung yang menutupi permukaan epitel usus dan berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap patogen dan partikel berbahaya. Namun, diketahui bahwa probiotik menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirir, yang diketahui mendorong pembentukan lendir. Butirir, menurut penelitian yang dilakukan oleh Gaudier et al. (2005), memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspresi gen yang terlibat dalam produksi lendir, berkontribusi pada penguatan lapisan lendir, dan melindungi epitel usus dari kerusakan. Selain itu, probiotik memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan integritas penghalang epitel usus dengan meningkatkan ekspresi protein pengikat termasuk claudin, occludin, dan zonula occludens. Pembentukan hubungan yang erat antara sel-sel epitel oleh protein-protein ini berfungsi untuk membatasi masuknya infeksi, racun, dan senyawa lain yang berpotensi merusak melalui lapisan epitel. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Anderson et al. (2010), menemukan keberadaan *Lactobacillus plantarum* menyebabkan peningkatan produksi claudin-2 dan occludin, yang pada gilirannya berkontribusi pada penguatan penghalang mukosa usus.

Selain itu, probiotik memiliki kemampuan untuk memengaruhi respons imun lokal di mukosa usus, yang dapat membantu mengurangi peradangan dan melindungi garis epitel. Probiotik memiliki kemampuan untuk menginduksi sintesis sitokin anti-inflamasi, termasuk IL-10 dan TGF- β , oleh sel-sel imun yang terletak pada membran mukosa, yang membantu dalam penekanan reaksi inflamasi yang berlebihan. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Pagnini et al. (2010) *Lactobacillus casei* memiliki kemampuan untuk mengurangi ekspresi molekul adhesi seluler dan

pembentukan sitokin pro-inflamasi. Hal ini, pada gilirannya, membantu melindungi penghalang mukosa dari kerusakan yang disebabkan oleh peradangan kronis. Probiotik melindungi mukosa dengan sejumlah cara, salah satunya adalah dengan mencegah patogen menempel dan menjajah permukaan epitel usus selama proses kolonisasi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Collado et al. (2007) menemukan kemampuan *Lactobacillus rhamnosus* GG dalam menghambat adhesi patogen *Escherichia coli* pada sel epitel usus, mencegah kolonisasi patogen dan mengurangi risiko infeksi. Hal ini menghilangkan kemungkinan patogen menjajah sel-sel epitel usus dan dengan demikian mengurangi kemungkinan infeksi. Oleh karena itu, probiotik merupakan agen penting dalam menjaga kesehatan usus dan menghindari penyakit gastrointestinal. Probiotik mampu melindungi mukosa usus dengan meningkatkan produksi lendir, memperbaiki integritas penghalang epitel, dan memodulasi respons imun lokal.

2. Ragam Probiotik

Probiotik adalah bakteri hidup yang, jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, menawarkan beberapa manfaat kesehatan bagi makhluk yang diberinya. Ada banyak spesies dan galur probiotik yang berbeda, yang masing-masing memiliki dampak unik pada kesehatan seseorang. Kisaran probiotik cukup beragam saat ini. Meskipun ada banyak jenis probiotik lainnya, varietas yang paling sering ditemukan dan diteliti dengan baik adalah *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*. Namun, ada banyak spesies lain yang menawarkan manfaat substansial.

1) *Lactobacillus*

Probiotik yang termasuk dalam genus *Lactobacillus* termasuk jenis probiotik yang paling terkenal dan umum digunakan. Ada beberapa spesies yang termasuk dalam genus ini yang dapat ditemukan dalam produk fermentasi susu seperti yoghurt dan kefir serta produk olahan susu lainnya seperti Dangke, selain ditemukan dalam suplemen probiotik. Telah diketahui secara meluas bahwa *Lactobacillus* mampu menghasilkan asam laktat dari fermentasi gula. Asam laktat ini menurunkan pH saluran pencernaan dan mencegah pertumbuhan bakteri yang berbahaya bagi tubuh. Berikut ini adalah beberapa spesies *Lactobacillus* yang paling umum digunakan dalam produksi probiotik:

- ***Lactobacillus rhamnosus* GG**: telah dibuktikan sebagai salah satu strain probiotik yang paling efisien untuk mengobati diare

akut pada anak-anak dan menurunkan risiko infeksi saluran usus. Spesies ini telah menjadi subjek penelitian yang paling empiris. Menurut penelitian, *L. rhamnosus* GG memiliki potensi untuk meningkatkan respons imun dan meningkatkan penghalang mukosa yang mengelilingi saluran pencernaan (Segers & Lebeer, 2014)

- ***Lactobacillus acidophilus***: merupakan strain bakteri ramah yang umumnya ditemukan dalam yoghurt dan suplemen probiotik. Bakteri ini terkenal karena kemampuannya untuk membantu pencernaan laktosa dan meningkatkan kesehatan lambung secara umum. Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa *L. acidophilus* memiliki potensi untuk meringankan gejala sindrom iritasi usus besar (IBS) dan meningkatkan keseimbangan mikrobiota dalam usus selain efektif dalam mengontrol gula darah (De Cesare et al., 2017; Sanders et al., 2010; Sharma et al., 2018)
- ***Lactobacillus plantarum***: telah digunakan secara luas dalam fermentasi sayuran, termasuk asinan kubis dan hidangan kimchi serta produk olahan susu. Secara umum diketahui bahwa *L. plantarum* mampu bertahan hidup dalam berbagai pengaturan pH dan suhu. Selain itu, bakteri ini memiliki kapasitas untuk menekan infeksi usus dan meningkatkan kesehatan usus (Hafsan, 2020; Salminen et al., 2022)
- ***Lactobacillus reuteri***: merupakan spesies yang terkenal karena kemampuannya menghasilkan reuterin, yaitu zat antibakteri yang efektif melawan infeksi usus. Selain itu, *L. reuteri* berpotensi meredakan gejala kolik pada bayi dan meningkatkan kesehatan gigi dengan menurunkan kadar plak dan radang gusi (Ganzle, 2003; Spinler et al., 2008).
- ***Lactobacillus casei***: bakteri yang sering ditemukan dalam produk susu fermentasi, memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan mengurangi gejala sembelit. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa *L. Casei* memiliki kemampuan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan memperpendek durasi infeksi saluran pernapasan atas (Charteris et al., 1998; D. Hill et al., 2018; C.-H. Huang et al., 2018).
- ***Lactobacillus paracasei***: merupakan jenis bakteri yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan respons kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan di usus akibat masalah pencernaan. *L.*

paracasey juga dikenal dapat membantu meredakan gejala reaksi alergi dan meningkatkan kesehatan kulit (Huang et al., 2018; Ye et al., 2021).

2) Bifidobacterium

Probiotik yang termasuk dalam genus Bifidobacterium adalah jenis probiotik lain yang sangat penting untuk kesehatan usus, terutama pada bayi baru lahir dan anak-anak. Sejumlah spesies Bifidobacterium terpenting yang sering digunakan sebagai probiotik adalah sebagai berikut:

- ***Bifidobacterium bifidum***: jenis bakteri yang paling sering ditemukan di usus manusia dan dalam produk yang mengandung probiotik. *Bifidobacterium bifidum* bermanfaat bagi kesehatan usus karena membantu pencernaan serat dan menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA). Gejala diare dapat dikurangi dan kesehatan pencernaan secara umum dapat ditingkatkan, menurut penelitian tentang *Bifidobacterium bifidum* (Charteris et al., 1998; López et al., 2011).
- ***Bifidobacterium longum***: spesies khusus ini, yang dikenal sebagai, terkenal karena kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan saluran pencernaan dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Melalui kemampuannya untuk meningkatkan fungsi penghalang membran mukosa dan mengurangi peradangan di usus, *B. longum* dapat sangat bermanfaat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa *B. Longum* memiliki kemampuan untuk meningkatkan keseimbangan mikrobiota di usus dan meningkatkan kesehatan mental melalui aksis intestino-serebral (Dong et al., 2010; Hansen et al., 2011; S.-J. Kim et al., 2017; Likotrafiti et al., 2013a; O'Mahony et al., 2005; Schell et al., 2002).
- ***Bifidobacterium infantis***: strain khusus ini penting untuk kesehatan bayi karena membantu pencernaan oligosakarida yang ditemukan dalam ASI dan melindungi terhadap infeksi usus (Charteris et al., 1998; Liong & Shah, 2005; Sela et al., 2008)

3) Probiotik lainnya

Probiotik Tambahan Selain Lactobacillus dan Bifidobacterium, terdapat sejumlah probiotik tambahan yang menawarkan manfaat kesehatan yang penting. Probiotik ini meliputi yang berikut:

- ***Saccharomyces boulardii***: ragi probiotik ini dikenal karena

kemampuannya untuk menyembuhkan dan mencegah diare yang disebabkan oleh antibiotik serta diare yang disebabkan oleh wisatawan (Guandalini, 2008; Jiang et al., 2011; McFarland, 2010; Rodríguez-Nogales et al., 2018).

- ***Streptococcus thermophilus***: bakteri yang digunakan dalam pembuatan yoghurt dan beberapa produk susu fermentasi lainnya, membantu pencernaan laktosa dan meningkatkan kesehatan saluran pencernaan (Heller, 2001; Supavititpatana et al., 2010; Yu et al., 2011a, 2011b)
- ***Enterococcus faecium***: Meskipun terkadang dikaitkan dengan infeksi nosokomial, berbagai jenis *E. faecium* telah terbukti aman dan efektif sebagai probiotik dalam meningkatkan kesehatan usus dan mengurangi diare pada hewan dan manusia (Amachawadi et al., 2018; Aziz et al., 2019; Chang et al., 2013; Franz et al., 2011; J. Huang et al., 2021; Roselino et al., 2020)

Mengingat banyaknya ragam dan spesies probiotik yang tersedia saat ini, penting untuk memilih probiotik yang tepat sesuai dengan kebutuhan kesehatan seseorang. Karena mekanisme kerja dan manfaat masing-masing jenis probiotik berbeda satu sama lain, penting untuk berkonsultasi dengan praktisi medis yang berkualifikasi guna memastikan probiotik mana yang paling tepat untuk masalah kesehatan tertentu.

B. Prebiotik

Komponen makanan yang dikenal sebagai prebiotik adalah komponen yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, tetapi memiliki dampak positif terhadap kesehatan karena mendorong pertumbuhan atau aktivitas mikroba bermanfaat di usus besar. Gibson dan Roberfroid adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep "prebiotik" pada tahun 1995. Para peneliti menggolongkan prebiotik sebagai "komponen makanan yang tidak dapat dicerna yang memiliki efek menguntungkan bagi inang dengan secara selektif merangsang pertumbuhan dan/atau aktivitas satu atau sejumlah kecil bakteri di usus", setidaknya demikian Gibson & Roberfroid (1995) mendefinisikannya secara khusus.

1. Sumber prebiotik dari bahan alami

a. Inulin

1) Sumber alami inulin

Jika berbicara tentang berbagai manfaat kesehatan dan nutrisi,

inulin merupakan salah satu prebiotik yang paling banyak mendapat perhatian dan penelitian. Akar sawi putih, bawang putih, bawang merah, pisang, dan asparagus merupakan sumber alami inulin, yang merupakan jenis serat makanan yang dapat ditemukan dalam berbagai tanaman yang secara alami mengandung inulin. Mengonsumsi inulin secara teratur dalam makanan memberikan manfaat kesehatan yang besar, terutama dalam kaitannya dengan kesehatan saluran pencernaan dan keseimbangan mikroorganisme.

- **Sawi putih:** di antara sekian banyak sumber inulin, akar sawi putih merupakan salah satu sumber yang paling melimpah. Secara historis, sawi putih telah digunakan sebagai pengganti kopi, selain digunakan sebagai komponen dalam berbagai hidangan dan minuman. Jumlah inulin yang terdapat dalam akar tanaman sawi putih berpotensi mencapai 15-20% dari berat kering tanaman. Karena kemampuannya untuk meningkatkan kesehatan usus dan mendorong pertumbuhan bakteri baik seperti Bifidobacteria dan Lactobacilli, inulin yang berasal dari sawi putih tidak hanya digunakan dalam industri makanan tetapi juga dalam industri suplemen untuk suplemen makanan (M. B. Roberfroid, 2007).
- **Bawang putih dan bawang merah:** sumber inulin lain yang sering digunakan dalam memasak secara teratur termasuk bawang putih putih dan bawang putih merah dengan berbagai warna. Kedua jenis bawang putih tidak hanya memberikan rasa pada makanan tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kesehatan usus. Bawang putih dan bawang putih merah mengandung zat yang disebut inulin, yang membantu meningkatkan populasi bakteri sehat di usus. Hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan pencernaan dan kesehatan secara umum (Slavin, 2013).
- **Pisang:** Ada sejumlah besar inulin yang terdapat dalam pisang, terutama yang masih hijau. Pisang hijau, selain kaya akan vitamin dan mineral, merupakan sumber inulin, yang berpotensi berfungsi sebagai prebiotik dan mendorong pertumbuhan bakteri sehat di seluruh saluran pencernaan. Mengonsumsi pisang secara teratur dapat membantu menjaga mikrobiota di saluran usus dan meningkatkan kesehatan pencernaan (Slavin, 2013).
- **Asparagus:** selain menjadi sayuran yang terkadang dianggap sebagai makanan mewah, asparagus juga merupakan sumber

inulin yang sangat baik. Karena kandungan inulin yang tinggi pada asparagus, yang berkontribusi pada nilai gizi keseluruhan sayuran ini, sayuran ini merupakan pilihan yang sangat baik untuk diet yang kaya prebiotik. Melalui fermentasi inulin oleh bakteri di saluran pencernaan, asparagus berkontribusi meningkatkan kesehatan usus (M. B. Roberfroid, 2007).

2) Fermentasi inulin dan produksi SCFA

Fermentasi inulin dan produksi SCFA Potensi inulin untuk diubah menjadi asam lemak rantai pendek (SCFA) oleh mikrobiota saluran pencernaan merupakan salah satu karakteristik paling signifikan dari nutrisi ini. Beberapa contoh SCFA adalah asetat, propionat, dan butirir. Baik kesehatan usus maupun kerja metabolisme sangat dipengaruhi oleh SCFA. Fermentasi inulin oleh bakteri dalam usus menghasilkan sintesis asam lemak rantai pendek (SCFA), yang memiliki sejumlah efek positif pada kesehatan seseorang.

Selama fermentasi inulin, asetat merupakan salah satu asam lemak rantai pendek (SCFA) terpenting yang terbentuk. Selain itu, sel-sel usus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan asetat sebagai sumber energi, dan juga memiliki efek anti-inflamasi. Menurut Roberfroid (2007), asetat berperan dalam menjaga keseimbangan pH dalam usus, yang penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang berbahaya bagi tubuh.

Fermentasi inulin menghasilkan produksi propionat propionat, yang merupakan SCFA lainnya. Propionat telah terbukti memiliki efek yang menguntungkan pada metabolisme glukosa dan lemak, yang berkontribusi pada pengurangan risiko penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2 dan obesitas. Selain itu, propionat terlibat dalam pengurangan peradangan di saluran pencernaan serta penguatan penghalang usus terhadap infeksi (Slavin, 2013).

Butirir adalah SCFA yang paling banyak diteliti karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Selain itu, ia memiliki sifat antikanker dan bertindak sebagai sumber energi utama bagi sel epitel yang melapisi saluran pencernaan. Selain itu, ia membantu menjaga integritas penghalang usus, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kesehatan sel-sel dalam usus. Selain itu, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa detritus dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kemungkinan timbulnya penyakit metabolik (M. Roberfroid, 2007).

3) Manfaat kesehatan inulin

Keberadaan inulin dalam makanan sehari-hari memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, terutama terkait dengan kesehatan usus dan keseimbangan mikrobiota. Inulin bekerja dengan mendorong pertumbuhan bakteri baik di usus besar, yang berkontribusi pada keseimbangan mikrobiota dan peningkatan kesehatan sistem pencernaan. Berikut ini adalah beberapa manfaat kesehatan utama dari inulin.

- **Kesehatan pencernaan:** salah satu manfaat terpenting inulin bagi kesehatan adalah dapat meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Melalui perannya sebagai prebiotik, inulin mendorong pertumbuhan bakteri baik di usus besar, termasuk *Bifidobacteria* dan *Lactobacilli*, di antara jenis bakteri lainnya. Sebagai hasil dari peningkatan populasi bakteri baik ini, populasi bakteri berbahaya berkurang, fungsi pencernaan membaik, dan risiko infeksi usus (Slavin, 2013).
- **Kontrol glukosa darah:** pengaturan gula dalam darah telah dibuktikan juga bahwa inulin dapat membantu mengatur kadar gula darah. Fermentasi inulin menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang meningkatkan sensitivitas insulin dan mengendalikan metabolisme glukosa. Konsumsi inulin secara konsisten dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2 (M. B. Roberfroid, 2007).
- **Penurunan berat badan:** untuk penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan, inulin dapat membantu. Serat inulin memberikan rasa kenyang yang lebih lama, yang dapat membantu menurunkan jumlah kalori yang dikonsumsi. Pembentukan asam lemak rantai pendek (SCFA) selama fermentasi inulin berkontribusi pada pengaturan metabolisme lemak dan pengurangan akumulasi lemak dalam tubuh (Slavin, 2013).
- **peningkatan sistem kekebalan tubuh:** potensi inulin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh merupakan manfaat kesehatan lain dari suplemen makanan ini. Kehadiran inulin mendorong pertumbuhan bakteri menguntungkan, yaitu organisme yang berkontribusi pada pengaturan sistem kekebalan tubuh. SCFA, yang dibuat melalui fermentasi inulin, juga memiliki sifat antiinflamasi, yang dapat membantu mengurangi peradangan kronis dan meningkatkan respons imun terhadap

patogen (Roberfroid, 2007).

- **Kesehatan tulang:** kemampuan inulin untuk meningkatkan penyerapan kalsium telah dibuktikan dalam sejumlah penelitian bermanfaat bagi kesehatan tulang. Fermentasi inulin dapat menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kelarutan kalsium dalam usus. Hal ini meningkatkan asupan kalsium dan memperkuat tulang (Abrams et al., 2005).

b. *Pektin*

1) Sumber alami pektin

Pektin merupakan salah satu bentuk serat larut yang dapat ditemukan di dinding sel berbagai jenis buah dan sayuran, terutama pada kulit buah seperti apel, jeruk, lemon, dan buah lainnya (Duvetter et al., 2009; Sila et al., 2009; Van Buggenhout et al., 2009). Karena kemampuannya untuk membentuk gel dalam air, pektin merupakan komponen penting dalam bisnis makanan, yang digunakan dalam produksi salami, jeli, dan berbagai jenis makanan kuliner lainnya. Pektin tidak hanya bermanfaat di dapur, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang penting, terutama sebagai prebiotik yang membantu menjaga kesehatan pencernaan dan keseimbangan bakteri dalam saluran usus.

- **Apel:** pektin dapat ditemukan dalam apel, yang merupakan salah satu bahan yang paling terkenal. Baik kulit maupun daging apel memiliki konsentrasi pektin yang signifikan, yang berkontribusi pada struktur dan tekstur buah. Mengonsumsi apel secara teratur dapat memberikan asupan pektin, yang bermanfaat bagi kesehatan sistem pencernaan dan menurunkan risiko timbulnya penyakit kronis (Thakur et al., 1997).
- **Jeruk:** pektin dapat ditemukan dalam jumlah banyak pada jeruk, khususnya pada kulit dan daging buahnya. Merupakan praktik umum untuk mengekstrak pektin jeruk untuk tujuan penggunaannya dalam bisnis makanan sebagai bahan pengental dan penstabil. Menurut (Sriamornsak, 2016), mengonsumsi jeruk tidak hanya meningkatkan konsumsi vitamin C tetapi juga pektin, yang bermanfaat bagi kesehatan saluran pencernaan.
- **Lemon:** seperti jeruk, memiliki jumlah pektin yang signifikan, terutama pada bagian kulit. Ada banyak jenis makanan dan minuman yang menggunakan pektin lemon karena memberikan tekstur dan stabilitas. Pektin, yang ditemukan dalam jeruk nipis,

memberikan sejumlah manfaat kesehatan, termasuk kemampuan detoksifikasi dan membantu sistem pencernaan (May, 1990).

- **Stroberi:** pektin juga terdapat dalam jumlah besar pada buah stroberi, rasberi, dan blackberry, di antara jenis buah beri lainnya. Buah beri mengandung pektin yang membantu menjaga struktur buah dan memberikan manfaat kesehatan yang sebanding dengan pektin yang berasal dari sumber lain (Duvetter et al., 2009; Sila et al., 2009; Van Buggenhout et al., 2009).

2) Manfaat kesehatan pektin

Pektin, dalam kapasitasnya sebagai prebiotik, melindungi kesehatan pencernaan dengan membentuk ikatan dengan bakteri yang terdapat pada sebagian besar populasi. Selain itu, pektin berpotensi membantu mengatur kolesterol dan gula darah, mengurangi risiko kanker, memperlancar proses detoksifikasi tubuh, dan bahkan memberikan manfaat bagi kesehatan kulit secara umum. Penggunaan pektin melalui konsumsi makanan dan minuman seperti apel, lemon, jeruk, dan beri dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan dan bermanfaat bagi kesehatan.

- **Kesehatan pencernaan:** pektin terlibat dalam proses peningkatan kesehatan sistem pencernaan. Pektin, yang merupakan jenis serat larut, memiliki kemampuan untuk membentuk gel di dalam sistem pencernaan. Gel ini membantu memperlambat proses pencernaan dan meningkatkan jumlah nutrisi yang diserap setelah pencernaan. Pektin juga berfungsi sebagai prebiotik, yang berarti mendorong pertumbuhan bakteri di usus besar, termasuk *Bifidobacteria* dan *Lactobacilli*, di antara jenis bakteri lainnya. Pektin membantu mengurangi populasi bakteri patogen, meningkatkan fungsi pencernaan, dan menurunkan risiko infeksi usus. Pektin melakukannya dengan meningkatkan populasi bakteri baik, yang pada gilirannya membantu mengurangi risiko infeksi (Onumpai et al., 2011).
- **Regulasi kolesterol:** kemampuan pektin untuk membantu mengatur kadar kolesterol dalam darah merupakan salah satu manfaat kesehatan paling signifikan yang terkait dengan pektin. Pektin memiliki kemampuan untuk mengikat asam empedu di usus, yang selanjutnya menyebabkan asam tersebut dikeluarkan dari tubuh. Proses ini memaksa tubuh untuk menggunakan kolesterol yang telah disimpannya guna menghasilkan lebih banyak asam empedu, yang pada akhirnya menghasilkan penurunan kadar kolesterol dalam darah. Penelitian telah

menunjukkan bahwa konsumsi pektin secara rutin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan kesehatan jantung (Brouns et al., 2002).

- **Pengendalian gula darah:** pektin juga mungkin berperan dalam pengaturan gula darah. Pektin dan serat larut lainnya membantu memperlambat laju penyerapan glukosa oleh saluran pencernaan, yang dapat membantu mengurangi kenaikan gula darah setelah makan. Konsumsi pektin telah terbukti mengurangi kemungkinan terkena diabetes tipe 2 dan membantu mengelola kadar gula darah (Thakur et al., 1997).
- **Menekan risiko kanker:** ada penelitian yang menunjukkan bahwa pektin dapat membantu menurunkan risiko kanker, khususnya kanker usus besar. Di dalam usus, pektin memiliki kemampuan untuk mengikat karsinogen potensial, sehingga mengurangi jumlah penyerapannya ke dalam tubuh. Selain itu, fermentasi pektin oleh mikrobiota saluran pencernaan menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek seperti butirat, yang memiliki karakteristik antikanker dan dapat membantu menjaga kesehatan sel-sel usus (Onumpai et al., 2011).
- **Detoksifikasi:** pengurangan racun Proses detoksifikasi dalam tubuh dapat memperoleh manfaat dari penggunaan pektin. Karena kapasitasnya untuk mengikat logam berat dan senyawa berbahaya lainnya di dalam usus, pektin membantu mengurangi penyerapan racun-racun ini ke dalam tubuh dan membuatnya lebih mudah untuk dikeluarkan.

c. *Fructooligosaccharides (FOS)*

Fruktooligosakarida, yang sering dikenal sebagai FOS, adalah sejenis prebiotik yang terdiri dari rantai molekul fruktosa yang terbatas (Arslanoglu et al., 2008). Salah satu bentuk karbohidrat disebut fruktooligosakarida (FOS), dan dapat ditemukan dalam berbagai macam buah dan sayuran. FOS adalah prebiotik, yang berarti tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia (Liao et al., 2021). Sebaliknya, ia dimanfaatkan oleh mikrobiota yang hidup di saluran usus, yang menghasilkan berbagai efek positif pada kesehatan.

1) Sumber alami Fruktooligosakarida

- **Bawang:** baik putih maupun merah, merupakan sumber utama asam oleat (FOS). Selain aplikasinya yang luas dalam dunia

kuliner, kedua umbi ini menawarkan banyak manfaat kesehatan karena kadar FOS yang dikandungnya yang tinggi. Selain mendukung kesehatan pencernaan, FOS yang ditemukan dalam bawang putih dan bawang putih berfungsi untuk meningkatkan jumlah bakteri yang ada di usus besar (Roberfroid, 2007)

- **Pisang:** kadar fruktooligosakarida (FOS) yang signifikan dapat ditemukan pada pisang, terutama yang belum sepenuhnya matang. Kandungan fruktooligosakarida (FOS) pada pisang dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan pencernaan dan normalisasi mikrobiota di saluran usus (Slavin, 2013).
- **Gandum:** merupakan salah satu biji-bijian yang mengandung FOS. Merupakan praktik umum untuk mengonsumsi kedua makanan ini dalam bentuk sereal atau roti. Kedua makanan ini menawarkan keuntungan prebiotik karena adanya FOS, yang mendorong pertumbuhan bakteri sehat di usus (Slavin, 2013).

2) Fermentasi FOS dan produksi SCFA

Fermentasi FOS dan produksi SCFA Fermentasi FOS oleh mikrobiota di saluran usus menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, asetat, dan propionat, yang memiliki sejumlah keuntungan medis. Baik kesehatan usus maupun operasi metabolisme dipengaruhi secara signifikan oleh SCFA.

- **Butirat:** Fermentasi FOS menghasilkan produksi butirat, yang merupakan salah satu SCFA terpenting. Lebih jauh, ia memiliki efek antikanker dan bertindak sebagai sumber energi utama bagi sel-sel epitel yang melapisi saluran pencernaan. Selain membantu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan sel-sel usus, ia juga membantu menjaga integritas penghalang usus. Selain itu, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa detritus dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kemungkinan timbulnya penyakit metabolik (M. B. Roberfroid, 2007).
- **Asetat:** memiliki kemampuan untuk digunakan oleh sel-sel usus sebagai sumber energi, juga memiliki kualitas antiperadangan. Selain itu, asetat terlibat dalam proses metabolisme glukosa dan lipid (Davidson et al., 1998; Davidson & Maki, 1999).
- **Propionat:** metabolisme glukosa dan lemak ditingkatkan oleh propionat propionat, yang memiliki dampak yang menguntungkan. Propionat meningkatkan jumlah kolesterol yang dikeluarkan melalui feses dan membantu menurunkan jumlah kolesterol yang diproduksi oleh hati. Propionat juga terlibat

dalam pengurangan peradangan di usus dan penguatan penghalang usus terhadap infeksi (Yamashita et al., 1984).

3) Manfaat kesehatan FOS

- **Kesehatan sistem pencernaan:** di usus besar, FOS berfungsi sebagai prebiotik yang mendorong perkembangan bakteri seperti Bifidobacteria dan Lactobacilli, yang pada gilirannya membantu menjaga kesehatan pencernaan. Fermentasi FOS oleh mikrobiota di saluran usus menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek seperti butrat, asetat, dan propionat. SCFA ini sangat penting untuk menjaga kesehatan usus. Sebagai hasil dari peningkatan populasi bakteri ini, populasi bakteri berbahaya berkurang, fungsi pencernaan membaik, dan risiko infeksi usus (Roberfroid, 2007).
- **Regulasi kolesterol:** di antara banyak efek positif yang dimiliki FOS bagi kesehatan seseorang adalah kapasitasnya untuk membantu mengatur kadar kolesterol dalam darah. Fermentasi FOS oleh bakteri usus menghasilkan produksi SCFA, yang berpotensi untuk menurunkan produksi kolesterol di hati dan meningkatkan ekskresi kolesterol melalui feses. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi Fos setiap hari dapat membantu menurunkan kadar LDL, yang terkadang dikenal sebagai "kolesterol jahat," dan meningkatkan kesehatan jantung (Davidson et al., 1998; Davidson & Maki, 1999).
- **Pengendalian Gula Darah:** ada kemungkinan lonjakan gula darah setelah makan dapat dihindari dengan mengonsumsi FOS, yang merupakan jenis serat larut yang memperlambat penyerapan glukosa dalam usus. Fermentasi FOS menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek, yang berpotensi mengurangi risiko diabetes tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur metabolisme glukosa (Yamashita et al., 1984).
- **Penurunan berat badan:** FOS dapat menjadi faktor penting dalam proses penurunan berat badan dan mempertahankan berat badan yang sehat. FOS memberikan rasa kenyang yang lebih lama, yang dapat membantu mengurangi jumlah kalori yang dikonsumsi. Kontribusi lebih lanjut terhadap pengendalian metabolisme lemak dan penurunan akumulasi lemak dalam tubuh dilakukan oleh sintesis asam lemak rantai pendek (SCFA) selama fermentasi FOS (Slavin, 2013).

- **Peningkatan sistem kekebalan tubuh:** FOS membantu memperkuat penyumbatan usus terhadap patogen dan meningkatkan respons imun dengan meningkatkan perkembangan bakteri baik di usus. Ini membantu meningkatkan respons imunologi lebih jauh. Selain itu, SCFA yang dibuat melalui fermentasi FOS memiliki kualitas anti-inflamasi, yang dapat membantu mengurangi peradangan kronis dan meningkatkan kesehatan imunologi secara keseluruhan (Roberfroid, 2007).

d. *Galactooligosaccharides (GOS)*

GOS, yang merupakan singkatan dari galactooligosaccharides, adalah sejenis prebiotik yang tersusun dari rantai pendek senyawa galaktosa. Selain merupakan jenis gula yang dapat ditemukan dalam laktosa, yang merupakan gula alami yang terdapat dalam susu, GOS merupakan sejenis oligosakarida yang dihasilkan dari galaktosa. Hal ini dikarenakan GOS merupakan prebiotik, yang berarti enzim pencernaan manusia tidak dapat mencernanya. Sebaliknya, mikrobiota usus bertanggung jawab atas diferensiasinya, yang menghasilkan berbagai manfaat kesehatan.

1) Sumber alami GOS

- **Susu dan produk susu olahan:** selain terdapat secara alami dalam susu, susu GOS dan produk olahan susu juga dapat ditemukan dalam produk olahan susu seperti yoghurt dan keju. Selain itu, susu manusia mengandung GOS, yang merupakan komponen penting dalam pembentukan mikrobiota yang terdapat dalam saluran pencernaan bayi (Sangwan et al., 2011).
- **Kacang-kacangan:** GOS juga dapat ditemukan dalam kacang-kacangan dan produk olahannya. Konsumsi kedelai dan olahannya dapat memberikan asupan GOS yang sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan. GOS juga dapat ditemukan dalam kadar yang cukup pada ragam kacang merah dan kacang polong. Mengonsumsi kacang-kacangan ini secara teratur dapat menjadi cara yang efektif untuk memperoleh GOS (Sangwan et al., 2011).

2) Fermentasi GOS dan produksi SCFA

Melalui proses fermentasi, mikrobiota usus menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, asetat, dan propionat. SCFA ini memiliki berbagai efek positif pada kesehatan manusia. Baik kesehatan usus maupun operasi metabolisme dipengaruhi secara

signifikan oleh SCFA.

- **Butirat:** Fermentasi GOS menghasilkan produksi butirat, yang merupakan salah satu SCFA utama. Lebih jauh, ia memiliki efek antikanker dan bertindak sebagai sumber energi utama bagi sel-sel epitel yang melapisi saluran pencernaan. Ia membantu menjaga integritas penghalang usus, mengurangi peradangan, dan menjaga kesehatan sel-sel yang ditemukan di usus. Selain itu, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa detritus dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kemungkinan timbulnya penyakit metabolik (Brouns et al., 2002; Gao et al., 2009; Hamer et al., 2008; Louis & Flint, 2017; Rivièrè et al., 2016).
- **Asetat:** Asetat memiliki kemampuan untuk digunakan oleh sel-sel usus sebagai sumber energi, dan ia juga memiliki kualitas anti-inflamasi. Selain itu, asetat terlibat dalam proses metabolisme glukosa dan lipid (Fukuda et al., 2012; Hernández et al., 2019; Scott et al., 2013; Vinolo et al., 2011)
- **Propionat:** metabolisme glukosa dan lemak ditingkatkan oleh propionat, yang memiliki dampak yang menguntungkan. Propionat meningkatkan jumlah kolesterol yang dikeluarkan melalui feses dan membantu menurunkan jumlah kolesterol yang diproduksi oleh hati. Propionat juga terlibat dalam pengurangan peradangan di usus dan penguatan penghalang usus terhadap infeksi (Hosseini et al., 2011; Louis & Flint, 2017; Sandra Macfarlane & Macfarlane, 2003; Mitsuoka, 2014)

3) Manfaat kesehatan GOS

- **Kesehatan sistem pencernaan:** di usus besar, GOS berfungsi sebagai prebiotik yang mendorong pertumbuhan bakteri seperti Bifidobacteria dan Lactobacilli, yang pada gilirannya membantu menjaga kesehatan pencernaan. Mikrobiota di saluran usus bertanggung jawab atas fermentasi GOS, yang menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butrat, asetat, dan propionat. SCFA ini penting untuk menjaga kesehatan usus. Sebagai hasil dari peningkatan populasi bakteri ini, populasi bakteri berbahaya berkurang, fungsi pencernaan membaik, dan risiko infeksi usus menurun (Rastall et al., 2005).
- **Meningkatkan kesehatan bayi:** GOS merupakan komponen penting yang dapat ditemukan dalam ASI dan susu formula bayi. GOS berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan

mikrobiota usus, yang penting untuk pengembangan sistem kekebalan tubuh dan pencegahan infeksi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arslanoglu et al. (2008), penambahan GOS ke dalam susu formula bayi terbukti dapat meningkatkan kesehatan usus dan menurunkan kemungkinan reaksi alergi.

- **Regulasi kolesterol:** GOS juga dapat membantu mengatur kadar kolesterol dalam darah. Fermentasi GOS oleh bakteri usus menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang berpotensi menurunkan sintesis kolesterol di hati dan meningkatkan ekskresi kolesterol melalui tinja. Mengonsumsi GOS secara teratur dapat membantu menurunkan kadar LDL, yang terkadang dikenal sebagai "kolesterol jahat", dan meningkatkan kesehatan jantung (Sangwan et al., 2011)
- **Mengontrol glukosa darah:** menggunakan GOS juga dapat menjadi faktor dalam mengontrol kadar gula darah. Karena merupakan serat larut, GOS memperlambat laju penyerapan glukosa di usus, yang membantu meminimalkan kenaikan kadar gula darah setelah makan. Fermentasi GOS menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang berpotensi meminimalkan risiko terkena diabetes tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur metabolisme glukosa (Rastall et al., 2005).
- **Peningkatan sistem kekebalan tubuh:** melalui proses prebiotik yang dimilikinya, sistem kekebalan GOS dapat diperkuat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. GOS membantu memperkuat penghalang usus terhadap infeksi dan meningkatkan respons kekebalan tubuh dengan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di usus. Ini membantu melindungi perut dari bakteri berbahaya. SCFA, yang dibuat melalui fermentasi GOS, juga memiliki kualitas anti-inflamasi, yang dapat membantu mengurangi peradangan kronis dan meningkatkan kesehatan imunologis secara umum (Rastall et al., 2005).

C. *Mekanisme Kerja Sinbiotik*

Sinergi antara probiotik, yang merupakan kombinasi antara mikroorganisme hidup yang bermanfaat, dan prebiotik, yang merupakan komponen makanan yang tidak dapat dicerna tetapi mendorong pertumbuhan dan aktivitas mikroba di dalam usus, merupakan kunci untuk memahami cara kerja sinbiotik.

1. Peningkatan kelangsungan hidup dan aktivitas probiotik

Prebiotik berfungsi sebagai substrat khusus yang memasok nutrisi bagi probiotik, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan probiotik untuk bertahan hidup dan bekerja di saluran pencernaan saat berada di sana. Bakteri bermanfaat seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* dapat tumbuh subur saat diberi prebiotik seperti inulin, fruktooligosakarida (FOS), dan galaktooligosakarida (GOS). Menurut penelitian, inulin berpotensi meningkatkan kelangsungan hidup probiotik dengan memasok sumber energi yang diperlukan untuk proses fermentasi (Abrams et al., 2023; Dahiya et al., 2017; Flint et al., 2012; Glenn R. Gibson et al., 2004; Usakova et al., 2015).

Selama perjalanannya melalui saluran pencernaan, probiotik harus mengatasi sejumlah kendala, termasuk keberadaan asam lambung dan enzim yang membantu pencernaan. Dengan memberikan nutrisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya di lingkungan yang tidak bersahabat ini, prebiotik memungkinkan probiotik untuk hidup. Sinbiotik adalah campuran prebiotik dan probiotik, yang menjamin bahwa probiotik dapat mencapai usus besar dalam keadaan hidup dan aktif, sehingga menawarkan keuntungan yang paling mungkin bagi kesehatan seseorang.

2. Modifikasi dan stabilitas mikrobiota usus

Perubahan dan stabilitas mikrobiota usus sinbiotik memainkan peran penting dalam modifikasi dan stabilisasi mikrobioma usus, yang merupakan faktor terpenting dalam menentukan kesehatan saluran pencernaan. Kolonisasi usus dengan bakteri baik difasilitasi oleh probiotik, sementara prebiotik menjamin bahwa bakteri menerima nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Dimungkinkan untuk meningkatkan proporsi bakteri yang bermanfaat dan mengurangi jumlah bakteri yang berbahaya melalui penggunaan kombinasi ini.

Beberapa peneliti melaporkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kombinasi *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus acidophilus*, *Leuconostoc mesenteroides*, *Bifidobacterium breve* dengan inulin menyebabkan peningkatan populasi bifidobacteria di usus besar. Hal ini, pada gilirannya, membantu menciptakan keseimbangan mikrobiota yang sehat dan stabil di usus besar. Dalam hal menjaga integritas penghalang mukosa usus dan mencegah penyebaran patogen, memiliki mikrobioma yang seimbang di saluran pencernaan

sangatlah penting. Selain itu, mikrobioma memiliki efek menguntungkan pada fungsi sistem imun, metabolisme, dan kesehatan secara umum (Cahyaningtyas & Wikandari, 2022; Likotrafiti et al., 2013b; Ndagijimana et al., 2009).

3. Produksi metabolit bioaktif

Metabolit bioaktif sinbiotik berperan dalam pembentukan metabolit bioaktif, seperti asam lemak rantai pendek (SCFA), yang meliputi asetat, propionat, dan butirat, dan dikaitkan dengan berbagai efek positif pada kesehatan. Selama proses fermentasi, probiotik menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA), yang selanjutnya diambil oleh sel epitel saluran pencernaan dan digunakan sebagai sumber energi. Selain manfaat ini, SCFA telah terbukti mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan metabolisme, dan memperkuat penghalang mukosa.

Dalam kasus sel kolonoskopi misalnya, detritus berfungsi sebagai sumber energi utama. Ia juga berperan dalam meningkatkan fungsi penghalang membran mukosa usus dan menurunkan peradangan (Hamer et al., 2008). Ada bukti bahwa asam lemak rantai pendek (SCFA) memiliki manfaat yang bermanfaat bagi tubuh secara keseluruhan, termasuk risiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah dan peningkatan sensitivitas insulin, yang keduanya dapat meningkatkan pencegahan diabetes tipe 2 (Causey et al., 2000).

4. Modulasi sistem kekebalan tubuh

Modulasi sistem imun sinbiotik dapat mengubah sistem imun, meningkatkan respons imunologis tubuh terhadap infeksi, dan mengurangi peradangan berlebihan secara bersamaan. Telah diamati bahwa probiotik memiliki kemampuan untuk mengaktifkan sel imun di usus, yaitu makrofag dan sel dendritik, yang menyebabkan peningkatan produksi sitokin antiinflamasi termasuk IL-10 dan TGF- β . Prebiotik, yang berfungsi sebagai substrat fermentasi bagi probiotik, bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembentukan SCFA, yang juga berkontribusi pada regulasi sistem imun.

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Ng et al. (2009), kombinasi *Lactobacillus rhamnosus* dan inulin berpotensi untuk meningkatkan respons imun selaput lendir dan mengurangi peradangan di usus. Selain itu, sinbiotik memiliki kemampuan untuk meningkatkan fungsi pemblokiran lendir, yang membantu mencegah


pergerakan kuman dan endotoksin berbahaya ke dalam sirkulasi. Prebiotik sangat penting dalam pencegahan penyakit radang kronis dan radang sistemik, seperti penyakit radang usus. Ini adalah IBD.

5. Menekan pertumbuhan patogen

Sejumlah proses berbeda terlibat dalam proses penghambatan patogen simbiosis, yang berperan dalam mencegah perkembangan dan kolonisasi patogen. Beberapa molekul antimikroba yang diproduksi oleh probiotik meliputi asam laktat, hidrogen peroksida, dan bakteriosin. Senyawa-senyawa ini mampu menekan perkembangan infeksi. Sebagai hasil dari kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan probiotik, prebiotik secara tidak langsung berkontribusi pada terciptanya lingkungan usus yang tidak mendukung infeksi.

Penggunaan sinbiotik telah terbukti menurunkan jumlah penyakit gastrointestinal, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Zmora et al., 2018). Hal ini dicapai dengan meningkatkan populasi bakteri baik yang mampu bersaing dengan patogen. Melalui proses penurunan pH usus dan pembuatan zat kimia antimikroba, probiotik memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang sulit bagi infeksi untuk berkembang biak. Sebagai manfaat tambahan, probiotik memiliki potensi untuk bersaing dengan patogen untuk mendapatkan tempat perlekatan di mukosa usus besar, sehingga menurunkan kemampuan patogen untuk menempel dan menyebabkan infeksi.

Sinbiotik memberikan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan kesehatan usus dengan menggabungkan keunggulan probiotik dan prebiotik dalam satu produk. Sinbiotik menawarkan



solusi lengkap untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan sistemik. Solusi ini mencakup kelangsungan hidup dan aktivitas probiotik yang lebih baik, perubahan dan stabilitas mikrobiota usus, sintesis metabolit bioaktif, pengaturan sistem imun, dan penyumbatan patogen. Sinbiotik adalah jenis suplemen makanan. Jelas bahwa sinbiotik memiliki banyak potensi dalam hal aplikasi klinis dan nutrisi, mengingat kemampuannya yang luar biasa untuk meningkatkan kesehatan manusia.

Gambar 1. Mekanisme sinbiotik dalam meningkatkan homeostasis mikrobiota usus, mempertahankan integritas penghalang usus dan memodulasi respons kekebalan tubuh. Mekanisme pendekatan meliputi: 1) berkompetisi untuk situs kolonisasi dan nutrisi; 2) menghambat pertumbuhan melalui produksi SCFA dan bakteriosin; 3) memodifikasi respons kekebalan tubuh melalui merangsang sel-sel imun dan produksi cytokine dan imunoglobulin; 4) meningkatkan integritas penghalang usus melalui stimulasi produksi mucin glycoproteins; 5) menyediakan energi untuk epitel, meningkatkan pertumbuhan villi, pengembangan crypt, ikatan yang erat, dan produksi mucine. SCFA: asam lemak rantai pendek; EPS: exopolysaccharide; MAMP: pola molekuler yang terkait dengan mikroorganisme; PRR: reseptor pengenalan pola; DC: sel dendritik; Treg: sel T regulator; IL-10: interleukin 10; TGF- β : transforming growth factor β (Y. Liu et al., 2022).

D. Interaksi Sinbiotik dengan Mikrobiota Usus

Dalam ranah mikrobiologi kontemporer, studi tentang interaksi antara sinbiotik dan mikrobiota saluran pencernaan merupakan bidang penelitian yang sangat menarik dan rumit. Sinbiotik, yang merupakan campuran probiotik dan prebiotik, dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi kesehatan yang lebih besar daripada yang diperoleh melalui konsumsi probiotik atau prebiotik saja. Interaksi ini melibatkan berbagai proses yang mendorong pertumbuhan dan aktivitas bakteri baik di dalam usus, sekaligus menghambat pertumbuhan kuman yang berbahaya bagi tubuh. Dalam hal mengoptimalkan penggunaan sinbiotik dalam peningkatan kesehatan, pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini sangatlah penting.

Interaksi sinbiotik dengan mikrobiota saluran usus melibatkan berbagai proses yang saling melengkapi, dengan tujuan meningkatkan kesehatan saluran usus dan kesejahteraan umum individu. Beberapa cara terpenting di mana sinbiotik berkontribusi terhadap kesehatan usus adalah sebagai berikut: peningkatan

keragaman mikroba; persaingan dan pengecualian yang kompetitif; peningkatan sintesis metabolit yang bermanfaat; pengaturan sistem kekebalan tubuh; dan peningkatan fungsi penghalang usus.

1. Peningkatan diversitas mikrobiota usus

Peningkatan keragaman mikroorganisme merupakan salah satu interaksi sinbiotik terpenting yang terjadi dengan mikrobiota saluran pencernaan. *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* adalah dua contoh probiotik yang termasuk dalam sinbiotik. Probiotik ini menyebabkan peningkatan populasi berbagai mikroorganisme baik.

Stabilitas ekologi mikroba dalam usus dapat ditingkatkan dengan memiliki mikrobiota yang beragam. Ini merupakan faktor kunci dalam mencegah dominasi infeksi dan memastikan bahwa keseimbangan mikroba tetap terjaga. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Scott et al. (2013), asupan sinbiotik berpotensi untuk memperluas keragaman mikrobium usus, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilisasi ekosistem mikroorganisme dan pelestarian kesehatan pencernaan semaksimal mungkin. Mikrobioma usus mungkin lebih efektif dalam menyerap nutrisi dari makanan, menciptakan metabolit yang bermanfaat, dan melindungi terhadap infeksi patogen jika memiliki tingkat keragaman yang tinggi.

2. Kompetisi dan Eksklusi Kompetitif

Pengecualian kompetitif dan pengucilan dalam usus juga dipengaruhi oleh pengecualian kompetitif simbiosis dan persaingan kompetitif, yang keduanya memainkan peran penting secara bersamaan. Probiotik yang ditemukan dalam sinbiotik terlibat dalam persaingan dengan patogen untuk tempat perlekatan di mukosa usus dan sumber nutrisi selama proses ini. Probiotik menghambat kolonisasi patogen dengan menempati tempat-tempat yang berpotensi terjadi perlengketan. Selain itu, metabolit yang dihasilkan oleh probiotik, seperti asam laktat, menyebabkan penurunan pH saluran pencernaan, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan infeksi.

Dalam hal pencegahan penyakit yang disebabkan oleh bakteri berbahaya seperti *Clostridium difficile*, *Salmonella* sp, dan *Escherichia coli*, status kompetitif ini sangat penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sinbiotik memiliki kemampuan untuk secara efisien menurunkan populasi bakteri berbahaya seperti *Clostridium perfringens* dan *Salmonella* sp. Hal ini dicapai melalui mekanisme pengecualian kompetitif dan perubahan dalam lingkungan mikro.

Persaingan ini tidak hanya menurunkan jumlah patogen, tetapi juga membantu meningkatkan pertahanan alami yang dimiliki tubuh terhadap infeksi, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kesehatan umum usus (Gibson & Roberfroid, 1995; Gibson et al., 2004; Kolida & Gibson, 2011; Macfarlane et al., 2013)

3. Stimulasi metabolit menguntungkan

Terdapat fungsi yang dimainkan oleh sinbiotik dalam mendorong terciptanya metabolit yang bermanfaat oleh mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan. Bakteri yang bermanfaat bertanggung jawab atas fermentasi produk prebiotik, yang menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, propionat, dan asetat. SCFA dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan, beberapa di antaranya meliputi peningkatan integritas penghalang usus, pengaturan sistem kekebalan tubuh, dan pengurangan peradangan.

Dalam kasus sel kolonoskopi, misalnya, detritus berfungsi sebagai sumber energi utama. Ia juga berperan dalam meningkatkan fungsi penghalang membran mukosa usus dan dalam menurunkan peradangan (Hamer et al., 2008). Selain itu, SCFA memiliki kemampuan untuk meningkatkan penyerapan nutrisi dan memodulasi motilitas usus. Terdapat bukti bahwa asam lemak rantai pendek (SCFA) memiliki manfaat yang bermanfaat bagi tubuh secara keseluruhan, termasuk risiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah dan peningkatan sensitivitas insulin, yang keduanya dapat meningkatkan pencegahan diabetes tipe 2. Sinbiotik memberikan kontribusi besar terhadap kesehatan metabolisme dan pencegahan penyakit kronis karena mendorong pembentukan asam lemak rantai pendek (Brouns et al., 2002; Causey et al., 2000; Louis & Flint, 2017).

4. Modulasi sistem kekebalan tubuh

Pengendalian sistem imun merupakan fungsi lain yang terlibat dalam hubungan simbiosis dengan mikrobiota saluran usus. Sinbiotik mengandung probiotik yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan sel imun di mukosa usus, seperti sel dendritik dan makrofag, untuk meningkatkan produksi sitokin antiinflamasi dan mengurangi respons inflamasi.


Melalui manipulasi respons imun mukosa, penelitian yang dilakukan oleh Ng et al. (2009) menunjukkan bahwa konsumsi sinbiotik dapat meningkatkan fungsi penghalang usus dan mengurangi peradangan pada usus. Asam lemak rantai pendek

(SCFA) yang dibentuk oleh fermentasi prebiotik oleh probiotik memiliki dampak langsung pada sel imun, yang menyebabkan peningkatan sintesis sel pengatur T (Treg), yang penting untuk menekan reaksi inflamasi yang berlebihan. Sangat penting dalam terapi penyakit radang usus (IBD) dan gangguan autoimun lainnya, yang mengharuskan pengaturan respons imun dengan cara yang tepat untuk meminimalkan kerusakan jaringan akibat peradangan yang terus-menerus.

5. Perbaikan fungsi proteksi usus

Meningkatkan aktivitas sistem obstruktif usus Dalam upaya menghindari perpindahan kuman dan endotoksin berbahaya ke dalam sirkulasi, yang dapat mengakibatkan peradangan sistemik dan sepsis, fungsi pemblokiran usus yang optimal sangat penting. Dengan sejumlah cara yang berbeda, sinbiotik memiliki kemampuan untuk meningkatkan fungsi penghalang usus. Ekspresi protein sambungan ketat seperti klaudin dan okludin, yang bertanggung jawab untuk memperkuat penghalang mukosa, meningkat. Probiotik bertanggung jawab untuk ini. Baik penghalang usus maupun perkembangan bakteri yang menghasilkan metabolit seperti butirat diperkuat oleh prebiotik, yang bermanfaat bagi pertumbuhan bakteri.

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Cani et al. (2009), sinbiotik memiliki potensi untuk meningkatkan integritas penghalang usus dan menghambat perpindahan bakteri patogen, yang keduanya sangat penting untuk menjaga kesehatan sistemik. Sinbiotik membantu menghindari penyakit seperti sindrom usus bocor, yang dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan sistemik seperti peradangan kronis, alergi, dan penyakit autoimun. Hal ini dicapai dengan memperkuat penghalang usus, yang merupakan salah satu manfaat potensial sinbiotik.



BAB III

SINBIOTIK DALAM KESEHATAN PENCERNAAN

Kesehatan pencernaan seseorang merupakan salah satu komponen terpenting bagi kesehatan mereka secara keseluruhan. Kesehatan pencernaan tidak hanya memengaruhi kerja sistem pencernaan, tetapi juga memengaruhi kesehatan sistem kekebalan tubuh. Selama beberapa dekade terakhir, pemahaman kita tentang pentingnya mikrobiota usus dan fungsinya dalam menjaga kesehatan saluran cerna telah mengalami kemajuan yang signifikan. Ada miliaran bakteri berbeda yang menyusun mikrobiota usus, dan mikrobiota ini memainkan peran penting dalam proses pencernaan, proses metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Ketidakseimbangan mikroorganisme dalam usus, yang juga dikenal sebagai disbiosis, telah dikaitkan dengan sejumlah penyakit pencernaan, termasuk sindrom iritasi usus besar (IBS), penyakit radang usus (IBD), dan infeksi saluran cerna, telah dikaitkan dengan sejumlah penyakit pencernaan.

Dalam konteks ini, sinbiotik, yang merupakan campuran probiotik dan prebiotik, muncul sebagai teknik yang menjanjikan untuk mengendalikan dan memperbaiki keseimbangan mikrobiota yang terdapat dalam saluran pencernaan. Sementara prebiotik adalah komponen makanan yang tidak dapat dicerna yang mendorong pertumbuhan dan aktivitas mikroba bermanfaat di dalam usus, probiotik adalah bakteri hidup yang memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Probiotik bermanfaat bagi kesehatan individu. Diharapkan bahwa

sinergi yang terjadi antara probiotik dan prebiotik dalam sinbiotik akan meningkatkan kelangsungan hidup probiotik dalam sistem pencernaan, meningkatkan keseimbangan mikrobiota di saluran usus, dan memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik daripada penggunaan probiotik atau prebiotik saja (Glenn R. Gibson et al., 2004; M. B. Roberfroid, 2007)

Potensi sinbiotik untuk mengubah mikrobiota saluran usus, mengurangi peradangan, dan meningkatkan penghalang membran mukosa usus adalah alasan utama untuk memahami relevansi sinbiotik dalam kaitannya dengan kesehatan pencernaan. Sinbiotik mengandung probiotik yang memiliki kemampuan untuk berkoloni di dalam usus dan bersaing dengan patogen untuk mendapatkan tempat perlekatan dan makanan. Di sisi lain, prebiotik menyediakan substrat yang diperlukan untuk fermentasi mikroorganisme yang menghasilkan metabolit seperti asam lemak rantai pendek (SCFA). Menurut Hamer dkk. (2008), asam lemak rantai pendek (SCFA) ini juga memiliki sejumlah manfaat positif lainnya, seperti meningkatkan kesehatan lapisan mukosa usus, memodifikasi respons imunologi, dan menurunkan risiko infeksi gastrointestinal.

Kegunaan sinbiotik dalam penanganan penyakit pencernaan juga akan ditunjukkan melalui penyajian studi kasus dan analisis klinis yang akan disertakan dalam bab ini. Untuk tujuan mengoptimalkan pengobatan dan strategi pencegahan pencernaan dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis ilmiah, diharapkan kita akan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang mekanisme kerja sinbiotik serta data klinis yang mendukung penggunaannya.

A. Sinbiotik dan Mikrobiota Usus Serta Signifikansinya bagi Kesehatan Gastrointestinal

1. Komposisi dan Fungsi Mikrobiota Usus

a. Komposisi mikrobiota usus pada individu sehat

Komunitas kompleks yang terdiri dari miliaran bakteri yang hidup dalam sistem pencernaan manusia disebut sebagai mikrobiota usus. Bakteri, arkea, virus, dan jamur yang membentuk komunitas ini semuanya sangat penting bagi kesehatan inang secara keseluruhan. Mikrobiota saluran pencernaan mulai tumbuh sejak lahir dan terus tumbuh sepanjang hidup seseorang. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nutrisi, lingkungan, genetika, dan penggunaan antibiotik. Menurut O'Hara & Shanahan (2006),

mikrobiota ini memiliki hubungan simbiosis dengan inangnya. Dalam hubungan ini, mikroorganisme memperoleh makanan dan tempat berlindung, sementara inang memperoleh keuntungan dari aktivitas metabolisme dan pertahanan bakteri.

Mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan bertanggung jawab atas berbagai proses fisiologis, seperti pencernaan makanan, produksi vitamin, dan pengaturan sistem kekebalan tubuh. Menurut Macfarlane & Macfarlane (2003), mikroba ini, misalnya, berkontribusi pada fermentasi serat makanan yang tidak dapat dicerna oleh enzim manusia. Fermentasi ini menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, asetat, dan propionat, yang bermanfaat bagi sistem pencernaan inang. Lebih jauh, mikrobiota usus berperan dalam pertahanan tubuh terhadap patogen melalui proses yang mencakup persaingan untuk nutrisi dan tempat perlekatan di mukosa usus besar.

Di dalam usus manusia, mikrobiota didominasi oleh sejumlah filamen bakteri utama, yang masing-masing berperan penting dalam menjaga kesehatan inangnya. Bacteroidetes dan Firmicutes, yang bersama-sama merupakan mayoritas populasi mikroba usus, adalah dua organisme yang membentuk filamen terbesar. Selain itu, ada juga jejak aktinobakteri dan proteobakteri, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit, tetapi masih ada. Ada peran tertentu yang dilakukani oleh masing-masing filamen ini yang membantu kesehatan saluran pencernaan dan keseimbangan mikrobiota. Jenis-jenis mikroorganisme yang dominan di dalam usus manusia sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis-Jenis Mikroorganisme yang Dominan di dalam Usus

Filum-Genus	Fungsi Utama	Contoh Spesies	Referensi
Bacteroidetes	Fermentasi	<i>Bacteroides</i>	(Holdeman et
• Bacteroides	karbohidrat	<i>fragilis</i> ,	al., 1976;
• Prevotella	kompleks, produksi SCFA	<i>B. vulgatus</i> , <i>B.</i> <i>thetaiotaomicro</i> , <i>B. ovatus</i> , <i>B. distasonis</i> ; <i>Prevotella copri</i> , <i>P. ruminicola</i> , <i>P. bryantii</i> , <i>P. intermedia</i> , <i>P. buccalis</i>	Salyers et al., 1977)
Firmicutes	Fermentasi	<i>Clostridium</i>	(Tannock,
• Clostridium	serat, produksi	<i>difficile</i> ,	2004; Weimer

<ul style="list-style-type: none"> Lactobacillus 	butirat, modulasi sistem imun	<i>C. perfringens</i> , <i>C. butyricum</i> , <i>C. sporogenes</i> , <i>C. leptum</i> ; <i>Lactobacillus rhamnosus</i> , <i>L. acidophilus</i> , <i>L. casei</i> , <i>L. plantarum</i> , <i>L. reuteri</i>	& Zeikus, 1977)
Actinobacteria <ul style="list-style-type: none"> Bifidobacterium 	Fermentasi oligosakrida, produksi asam laktat, kesehatan usus	<i>Bifidobacterium longum</i> , <i>B. breve</i> , <i>B. bifidum</i> , <i>B. adolescentis</i> , <i>B. animalis</i>	(El Khamisy, 2010; Grill et al., 1995; Kok et al., 1996; Lee & O'Sullivan, 2010; Liisa & Markus, 2018; Sela et al., 2008)
Proteobacteria <ul style="list-style-type: none"> Escherichia Enterobacter 	Beberapa patogen, penyerapan nutrisi	<i>Escherichia coli</i> , <i>E. fergusonii</i> , <i>E. albertii</i> , <i>E. hermannii</i> , <i>E. vulneris</i> ; <i>Enterobacter cloacae</i> , <i>E. aerogenes</i> , <i>E. sakazakii</i> , <i>E. gergoviae</i> , <i>E. hormaechei</i>	(Baldelli et al., 2021; Pakbin et al., 2021; van Duin & Doi, 2017)

Masing-masing filum bakteri memberikan kontribusi dengan caranya sendiri yang khusus untuk menjaga keseimbangan dan fungsi mikrobiota di dalam saluran usus. Bacteroidetes, misalnya, berperan dalam pemecahan polisakarida kompleks yang tidak dapat dicerna oleh inangnya. Hal ini menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang diperlukan untuk kesehatan saluran pencernaan. Firmicutes, yang meliputi spesies *Clostridium* dan *Lactobacillus*, terlibat dalam fermentasi serat dan pembentukan butirat. Butirat ini bermanfaat bagi kesehatan mukosa usus dan memiliki sifat antiinflamasi. Actinobacteria, dan lebih khusus lagi spesies *Bifidobacterium*, terkenal karena kapasitasnya untuk meningkatkan kesehatan usus melalui fermentasi oligosakarida dan penekanan pertumbuhan patogen. Ada beberapa patogen yang mungkin dapat menyebabkan penyakit dalam keadaan disbiosis yang

ditemukan pada proteobacteria, meskipun jumlahnya lebih sedikit (Flint et al., 2012).

Berbagai faktor, yang masing-masing berpotensi mengubah komposisi dan fungsi komunitas mikroba, memiliki pengaruh terhadap susunan mikrobiota yang terdapat dalam saluran pencernaan. Pola makan, genetika, penggunaan antibiotik, dan lingkungan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap pengaruh ini. Secara individual, masing-masing elemen ini memainkan peran penting dalam pembentukan mikrobiota dalam usus, yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan inang.

1) Pola diet

Jika berbicara tentang susunan dan fungsi mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan, pola makan merupakan salah satu unsur terpenting. Bacteroidetes dan Firmicutes adalah dua contoh bakteri bermanfaat yang menghasilkan asam lemak rantai pendek, dan pola makan yang kaya serat, buah, sayur, dan makanan nabati lainnya cenderung mendorong pertumbuhan bakteri ini jika jumlahnya cukup. Ada beberapa manfaat kesehatan yang terkait dengan asam lemak rantai pendek, termasuk memperkuat penyumbatan selaput lendir usus, mengurangi peradangan, dan mendukung sistem kekebalan tubuh dengan SCFA seperti butirat, asetat, dan propionat. Misalnya, penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi pola makan yang tinggi serat memiliki lebih banyak bakteri Bacteroides dan Lactobacillus di dalam tubuh mereka (De Filippo et al., 2010). Di sisi lain, pola makan yang banyak mengandung lemak dan protein hewani cenderung meningkatkan jumlah bakteri yang termasuk dalam filum Proteobacteria, yang sering dikaitkan dengan gangguan yang bersifat inflamasi (David et al., 2014).

Perubahan pola makan berpotensi menyebabkan perubahan cepat pada mikrobiota yang ditemukan di saluran pencernaan. Sebagai ilustrasi, penelitian yang dilakukan oleh David et al., (2014), menunjukkan bahwa hanya dengan beralih dari pola makan yang kaya lemak dan rendah serat ke pola makan yang tinggi serat dan rendah lemak dapat mengakibatkan perubahan besar dalam susunan mikrobiota dalam hitungan hari. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan kemampuan beradaptasi dan reaktivitas populasi mikroba di saluran pencernaan terhadap pasokan nutrisi. Selain itu, menjaga pola makan yang beragam yang mencakup berbagai macam makanan yang tinggi serat dan sayuran akan membantu

meningkatkan keragaman mikroba, yang penting untuk menjaga kesehatan usus yang baik.

Selain itu, metabolisme mikrobiota di saluran pencernaan dan pembentukan bakteri yang bermanfaat dapat dipengaruhi oleh pola makan. Sebagai ilustrasi, pola makan yang kaya akan prebiotik seperti inulin, pektin, dan fruktooligosakarida (FOS) dapat meningkatkan pembentukan asam lemak rantai pendek (SCFA), yang memiliki kemampuan untuk mengurangi peradangan dan memperkuat membran mukosa yang melapisi saluran pencernaan. Menurut penelitian, penggunaan makanan fermentasi seperti yoghurt dan kefir, yang mengandung probiotik, juga dapat mengubah keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan. Hal ini dapat menghasilkan manfaat kesehatan tambahan, seperti pengurangan gejala sindrom iritasi usus besar dan penyakit radang usus (M. Roberfroid et al., 2010).

Diet memiliki dampak substansial pada komposisi mikrobiota usus serta fungsi yang dilakukannya. Pola makan yang kaya lemak dan protein hewani dapat meningkatkan risiko peradangan dan masalah pencernaan, sedangkan pola makan yang seimbang dan kaya serat mendorong pertumbuhan bakteri baik dan pembentukan metabolit penting. Oleh karena itu, memperoleh kesadaran akan pola makan dan membuat penyesuaian terhadapnya merupakan langkah penting menuju tercapainya kesehatan mikroba usus dan, akhirnya, kesehatan umum.

2) Genetik

Bagian penting dari pembentukan mikrobiota di saluran pencernaan juga dimainkan oleh faktor genetik. Keragaman mikrobiota dan komposisi bakteri spesifik di usus dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, yang karenanya dapat memengaruhi kesehatan sistem pencernaan dan tubuh secara keseluruhan. Ada bukti bahwa variasi genetik pada inang dapat digunakan untuk menentukan jenis bakteri yang dominan dalam mikrobiota usus serta persentase mikroba tersebut. Misalnya, orang yang memiliki polimorfisme genetik tertentu mungkin memiliki kemungkinan lebih besar untuk memiliki komposisi mikrobiotik tertentu, yang dapat memengaruhi proses metabolisme dan respons imunologis mereka (Goodrich et al., 2014).

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Goodrich et al. (2014), faktor genetik memberikan dampak yang cukup besar pada mikrobiota yang ditemukan di saluran pencernaan. Baik susunan

maupun fungsi mikrobiota usus dapat dipengaruhi oleh perbedaan gen yang mengkode sistem imun, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lipid di antara proses metabolisme lainnya. Misalnya, gen yang terlibat dengan sistem imun, seperti gen untuk protein HLA (Human Leukocyte Antigen), berpotensi memengaruhi kapasitas tubuh untuk mengenali dan bereaksi terhadap mikroba tertentu, sehingga menghasilkan komposisi mikroba tertentu.

Selain itu, penelitian yang dilakukan pada saudara kembar menunjukkan bahwa mikrobiota usus lebih mirip antara saudara kembar identik daripada antara saudara kembar non-identik. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor genetik berperan dalam membentuk komposisi mikrobioma. Dari sini tampak bahwa susunan mikrobiota usus sangat dipengaruhi oleh pewarisan perbedaan genetik.

Ada pula korelasi antara genetika dan kerentanan terhadap disbiosis dan gangguan yang terkait dengan mikrobiota saluran pencernaan. Sebagai ilustrasi, beberapa varian genetik berpotensi meningkatkan kemungkinan mengembangkan penyakit radang usus (IBD) melalui pengaruh susunan dan fungsi mikrobioma yang tumbuh di usus. Telah dibuktikan melalui penelitian bahwa individu yang memiliki mutasi pada gen NOD2 lebih mungkin mengembangkan penyakit radang usus (IBD) karena perubahan komposisi mikrobioma mereka, yang pada gilirannya menyebabkan respons imun abnormal terhadap bakteri usus (Knights et al., 2014).

Selain itu, faktor lingkungan, seperti nutrisi dan penggunaan antibiotik, berinteraksi dengan genetika untuk mengembangkan mikrobiota yang ditemukan di saluran pencernaan. Contohnya adalah fakta bahwa meskipun genetika memberikan *blue print* mendasar untuk komposisi mikrobioma, susunan mikrobioma dapat diubah secara signifikan oleh faktor-faktor seperti makanan dan penggunaan antibiotik. Terlepas dari kenyataan bahwa faktor genetik memainkan peran penting, faktor lingkungan seperti pola makan memiliki dampak signifikan pada pembentukan mikrobioma usus, menurut penelitian yang dilakukan oleh Davenport et al. (2014). Temuan ini menunjukkan bahwa ada interaksi kompleks antara genetika dan lingkungan dalam proses penentuan komposisi mikrobioma.

Secara umum, faktor genetik berperan penting dalam pembentukan mikrobiota usus, yang pada gilirannya memengaruhi jenis dan komposisi bakteri tertentu yang mendominasi usus.

Dengan memahami cara genetika memengaruhi mikrobioma, kita dapat merancang metode yang dipersonalisasi untuk mengelola kesehatan usus dan mencegah penyakit yang terkait dengan defisiensi.

3) Penggunaan antibiotik

Meskipun antibiotik memiliki peran penting dalam pengobatan berbagai macam penyakit bakteri, antibiotik berpotensi mengubah komposisi dan keragaman mikrobiota yang menyusun saluran pencernaan secara signifikan. Bakteri patogen yang menyebabkan penyakit tersebut dihilangkan atau perkembangannya dihambat oleh antibiotik. Namun, antibiotik berpotensi juga memengaruhi bakteri baik yang ada di dalam usus.

Antibiotik dengan berbagai macam aktivitas, yang efektif terhadap berbagai macam strain bakteri, berpotensi mengurangi keragaman mikroorganisme yang ditemukan di saluran pencernaan secara signifikan. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Davenport et al. (2014), jumlah spesies bakteri yang ada di dalam usus dapat berkurang drastis setelah pemberian obat antibiotik. Dalam kasus tertentu, penurunan ini dapat berlanjut selama beberapa minggu atau bahkan bulan, tergantung pada antibiotik yang digunakan dan lamanya waktu pasien dirawat. Selain itu, ada kemungkinan bahwa spesies bakteri tertentu yang tidak ada mungkin tidak pulih sepenuhnya, yang akan menyebabkan perubahan yang tidak dapat dipulihkan dalam susunan mikrobiota di saluran pencernaan.

Ketika antibiotik digunakan secara berlebihan, salah satu efek yang paling signifikan adalah disbiosis, yang sering dikenal sebagai ketidakseimbangan mikroba. Ada korelasi antara disbiosis dan peningkatan risiko infeksi oleh patogen oportunistik seperti *Clostridium difficile*, yang dapat menyebabkan diare parah dan kolitis di antara gejala lainnya. Antibiotik berpotensi mengganggu penghalang alami yang disediakan oleh mikrobiota di saluran pencernaan, yang pada gilirannya memungkinkan infeksi oportunistik berkembang biak tanpa gangguan apa pun (Jernberg et al., 2010). Sindrom iritasi usus besar (IBS) dan penyakit radang usus (IBD) adalah dua contoh penyakit pencernaan kronis yang dapat disebabkan oleh disbiosis yang disebabkan oleh antibiotik. Namun, di sisi lain antibiotik juga dapat berkontribusi pada penanganan gangguan ini.

Proses perbaikan mikrobiota saluran pencernaan setelah pengobatan antibiotik dapat memakan waktu yang lama, dan ada kemungkinan bahwa prosedur ini tidak akan selalu berhasil mengembalikan mikrobioma ke bentuk awalnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun spesies bakteri tertentu dapat pulih dengan cepat setelah penghentian pengobatan antibiotik, spesies bakteri lainnya mungkin memerlukan waktu yang lebih lama atau mungkin tidak pulih sama sekali (Dethlefsen & Relman, 2011). Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa selama masa penyembuhan, komposisi mikroba yang tidak seimbang dapat membuat usus lebih rentan terhadap infeksi dan peradangan.

Pemanfaatan probiotik dan prebiotik merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meminimalkan efek buruk antibiotik terhadap mikrobiota saluran pencernaan. Probiotik adalah contoh mikroorganisme hidup yang, jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, berpotensi membantu membangun kembali keseimbangan mikrobiota di saluran pencernaan. Di sisi lain, prebiotik adalah komponen makanan yang tidak dapat dicerna manusia, tetapi dapat mendorong pertumbuhan kuman yang bermanfaat bagi tubuh. Kombinasi probiotik dan prebiotik, yang sering dikenal sebagai sinbiotik, telah terbukti dalam penelitian dapat mempercepat pemulihan mikrobiota dalam saluran pencernaan setelah pengobatan antibiotik dan mengurangi kemungkinan berkembangnya disbiosis (Baümler & Sperandio, 2016; S. K. Kim et al., 2019; Young, 2017)

Penggunaan antibiotik dalam pengaturan terapi perlu dilakukan secara bijaksana guna meminimalkan efek buruk pada mikrobiota saluran pencernaan. Pola makan tinggi serat dan asupan makanan fermentasi adalah dua contoh teknik diet yang dapat membantu menjaga keseimbangan mikroba sebelum dan sesudah pengobatan antibiotik. Selain itu, menggabungkan pendekatan nutrisi yang meningkatkan kesehatan mikrobiota usus dapat bermanfaat.

4) Lingkungan

Komposisi dan fungsi mikrobiota usus sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yang berperan penting dalam proses tersebut. Mikrobioma usus seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai keadaan, termasuk lingkungan tempat tinggalnya, tingkat kebersihannya, paparannya terhadap infeksi, dan interaksinya dengan orang lain.

Mikrobiota usus dipengaruhi oleh sejumlah faktor lingkungan,

salah satu yang terpenting adalah kebersihan. Mikrobioma individu yang tinggal dalam situasi yang kurang steril atau yang terpapar lebih banyak patogen sering kali lebih beragam daripada mikrobioma mereka yang tinggal di lingkungan yang lebih steril. Misalnya, orang yang tinggal di daerah pedesaan dengan paparan mikroorganisme lingkungan yang signifikan memiliki komposisi mikrobiota yang berbeda dan lebih beragam dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah perkotaan yang lebih steril (Yatsunenکو et al., 2012). Peningkatan keragaman mikroorganisme biasanya dianggap menguntungkan karena berpotensi meningkatkan resistensi terhadap infeksi dan meningkatkan fungsi imunologi.

Terkait pembentukan mikrobiota di saluran pencernaan, paparan patogen juga merupakan faktor penting. Perubahan dalam komposisi mikrobiota usus dapat disebabkan oleh lingkungan yang sangat terpapar patogen. Perubahan ini merupakan respons adaptif terhadap peningkatan resistensi terhadap infeksi yang ditimbulkan oleh lingkungan ini. Misalnya, paparan patogen tertentu yang sering dapat mengakibatkan peningkatan populasi bakteri yang dapat membantu memberikan perlindungan terhadap infeksi semacam ini. Namun demikian, paparan patogen yang berlebihan juga dapat mengakibatkan disbiosis, yang dapat mengganggu fungsi mikrobioma dalam usus dan meningkatkan kemungkinan timbulnya penyakit.

Interaksi sosial dan pertukaran mikroba antarmanusia merupakan dua faktor lingkungan penting lainnya yang berperan dalam pembentukan mikrobiota di saluran pencernaan. Mikrobiota saluran pencernaan dapat saling bertukar melalui kontak fisik, berbagi makanan, dan berbagi barang-barang rumah tangga lainnya. Menurut penelitian, orang yang tidak melakukan kontak sosial dengan orang lain cenderung memiliki komposisi mikrobiota yang lebih mirip dengan anggota keluarga dan orang yang tinggal di kota yang sama (S. J. Song et al., 2013). Pertukaran mikroba yang bermanfaat dapat ditingkatkan melalui keterlibatan sosial yang erat, yang dapat berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan mikrobiota yang sehat di usus.

Selain itu, faktor lingkungan seperti makanan lokal dan kebiasaan makan juga dapat memengaruhi komposisi mikrobiota yang ditemukan di saluran pencernaan. Sebagai contoh, di masyarakat tertentu, konsumsi makanan tradisional yang kaya akan makanan fermentasi dan serat dapat mendorong pertumbuhan mikroba yang menguntungkan fungsi usus.

Penting juga untuk diingat bahwa lingkungan mikrobiota di saluran pencernaan tidak statis, melainkan dinamis dan dapat mengalami perubahan sepanjang hidup seseorang. Ada potensi terjadinya perubahan besar dalam susunan mikrobiota usus sebagai akibat dari perubahan lingkungan hidup, nutrisi, praktik kebersihan, dan paparan antibiotik. Oleh karena itu, metode untuk menjaga kesehatan mikroorganisme dalam usus harus mempertimbangkan unsur-unsur lingkungan yang ada di sana dan berkonsentrasi pada penciptaan keadaan yang mendorong keragaman dan keseimbangan mikroorganisme.

Mengingat laju urbanisasi dan globalisasi yang semakin pesat, pengetahuan tentang cara faktor lingkungan memengaruhi mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan menjadi semakin penting. Ketika unsur-unsur lingkungan yang mendukung kesehatan mikroba teridentifikasi, akan lebih mudah untuk menciptakan perawatan yang membantu meningkatkan kesehatan pencernaan dan mencegah penyakit yang berhubungan dengan disbiosis saluran pencernaan.

b. Fungsi Utama Mikrobiota Usus

Mikrobiota usus terlibat dalam berbagai proses biologis yang penting bagi kesehatan inang. Proses-proses ini diperlukan untuk kesejahteraan inang. Mikrobioma usus bertanggung jawab atas sejumlah tugas penting, termasuk pencernaan dan fermentasi makanan, pembentukan vitamin dan metabolit esensial, pengendalian sistem imun, dan pemeliharaan integritas mukosa usus besar.

1) Peran dalam Pencernaan dan Fermentasi Makanan

Mikrobiota dalam saluran pencernaan bertanggung jawab atas pencernaan dan fermentasi makanan yang tidak dapat dicerna oleh enzim manusia. Ini adalah fungsi yang sangat penting. Pemanfaatan komponen makanan yang kompleks, seperti karbohidrat kompleks, serat makanan, dan protein, dimungkinkan oleh proses ini. Komponen-komponen ini mampu mencapai tujuannya di usus besar tanpa dipecah di saluran pencernaan bagian atas. Pemecahan komponen-komponen ini terjadi melalui fermentasi anaerobik, yang dilakukan oleh mikroba usus, khususnya bakteri yang termasuk dalam filum Bacteroidetes dan Firmicutes. Proses ini menghasilkan produksi berbagai macam produk metabolit yang bermanfaat.

Proses pembentukan dan fermentasi SCFA juga termasuk di

dalamnya. Proses fermentasi yang terjadi di dalam mikrobiota usus menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang meliputi butirat, asetat, dan propionat. Asam lemak rantai pendek (SCFA) ini tidak hanya memasok sel-sel epitel usus dengan sumber energi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengaturan metabolisme glukosa dan lipid.

Selain itu, fermentasi membantu menghindari sembelit dengan meningkatkan volume feses dan mempercepat transit feses tersebut melalui saluran pencernaan. Peningkatan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA) melalui fermentasi serat makanan menghasilkan peningkatan jumlah air yang ada dalam feses dan meningkatkan motilitas usus, yang pada gilirannya membuat ekskresi lebih mudah (Joanne Slavin, 2013). Selain itu, asam lemak struktural (SCFA) seperti detritus memiliki dampak trofik pada sel epitel saluran pencernaan, yang membantu memperkuat penghalang mukosa dan mencegah peradangan.

Mikrobiota usus bertanggung jawab atas fermentasi serat makanan, yang menghasilkan produksi gas seperti karbon dioksida, hidrogen, dan metana. Dalam kebanyakan kasus, tubuh akan menyerap kembali gas-gas ini atau mengeluarkannya melalui proses pembuangan. Pembentukan gas merupakan tanda bahwa fermentasi sedang berlangsung, dan merupakan karakteristik alami dari proses pencernaan yang dilakukan oleh mikroorganisme. Meskipun terkadang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau kembung, terbentuknya gas-gas ini merupakan indikasi adanya aktivitas mikroba yang sehat di dalam usus besar (Pimentel et al., 2003).

Selain itu, fermentasi bermanfaat dalam proses penguraian polifenol dan fitokimia lain yang terkandung dalam makanan. Buah-buahan, sayuran, teh, kopi, dan anggur semuanya mengandung polifenol, yang merupakan molekul bioaktif yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Polifenol dapat ditemukan dalam beberapa makanan. Polifenol diubah menjadi metabolit aktif oleh mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan. Metabolit ini kemudian dapat diserap dan digunakan olehnya. Sebagai ilustrasi, polifenol yang ditemukan dalam teh hijau berpotensi diubah oleh mikrobioma menjadi komponen bioaktif tambahan yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan (Ríos-Covián et al., 2016).

Sejumlah manfaat kesehatan dikaitkan dengan fermentasi makanan oleh mikrobiota di saluran pencernaan. Manfaat ini meliputi peningkatan penyerapan nutrisi, pembentukan penghalang

mukosa di usus, dan modulasi sistem imun. Selain itu, asam lemak rantai pendek (SCFA) yang terbentuk melalui fermentasi serat makanan berperan dalam pengaturan metabolisme energi dan menjaga homeostasis glukosa darah. Ini merupakan fungsi penting untuk pencegahan dan pengelolaan penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes tipe 2 (Topping & Clifton, 2001).

Meningkatkan jumlah serat makanan dan komponen prebiotik lain yang dikonsumsi dapat membantu mendukung fermentasi yang sehat dan kesehatan mikroba di kompartemen usus. Keragaman dan aktivitas mikrobiota di usus dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi makanan yang tinggi serat dan mengandung berbagai sumber nabati. Hal ini, pada gilirannya, bermanfaat bagi kesehatan sistem pencernaan dan tubuh secara keseluruhan.

2) Produksi Vitamin dan Metabolit Penting

Dalam hal produksi berbagai macam vitamin dan metabolit yang diperlukan untuk kesehatan inang, mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan memainkan peran penting. Proses ini tidak hanya memenuhi persyaratan nutrisi yang tepat, tetapi juga berperan dalam berbagai proses fisiologis, seperti metabolisme energi, fungsi sistem saraf, dan pengendalian suasana hati.

Beberapa jenis bakteri yang hidup di saluran pencernaan bertanggung jawab atas pembentukan vitamin K serta vitamin B kompleks termasuk biotin, folat, dan vitamin B12. Selama proses pembekuan darah, bakteri seperti *Escherichia coli* dan beberapa spesies *Bacteroides* bertanggung jawab atas produksi vitamin K, yang memainkan peran penting dalam keseluruhan proses. Kelainan pembekuan darah dan peningkatan risiko pendarahan merupakan hasil potensial dari sindrom kekurangan vitamin K (LeBlanc et al., 2013).

Ada sejumlah peran penting yang dimainkan oleh vitamin B kompleks, seperti biotin, folat, dan vitamin B12, dalam proses metabolisme energi dan fungsi neuronal. Vitamin-vitamin ini dibuat oleh mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan. Sejumlah bakteri, termasuk *Bifidobacterium* dan *Lactobacillus*, bertanggung jawab atas produksi biotin, yang merupakan komponen penting dalam proses metabolisme asam lemak, karbohidrat, dan protein. Folat, yang dihasilkan oleh bakteri seperti *Lactococcus* dan *Enterococcus*, diperlukan untuk sintesis DNA serta pembelahan sel. Vitamin B12, yang diproduksi oleh sejumlah spesies *Propionibacteria* dan *Lactobacillus reuteri*, sangat penting untuk pengoperasian sistem

neurologis yang tepat serta sintesis sel darah merah.

Mikrobiota usus bertanggung jawab atas produksi berbagai macam metabolit, yang, selain vitamin, berdampak pada kesehatan inang. Metabolit ini meliputi hormon, neurotransmitter, dan asam amino vital, yang semuanya berdampak pada berbagai proses fisiologis.

- **Pembawa pesan neurokimia:** Neurotransmitter seperti serotonin dan GABA diproduksi oleh mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan. Neurotransmitter ini memiliki peran penting dalam pengaturan suasana hati serta fungsi kognitif. Sel enterokromafin, dengan bantuan bakteri di usus, bertanggung jawab atas produksi sekitar 90 persen serotonin yang ditemukan dalam tubuh. Fungsi saluran pencernaan, serta suasana hati dan tidur, semuanya dipengaruhi oleh serotonin. GABA, yang merupakan neurotransmitter dengan karakter penghambat, juga dihasilkan oleh beberapa spesies bakteri usus. Fungsinya adalah untuk mengurangi aktivitas saraf yang berlebihan, yang berkontribusi pada pengurangan kecemasan dan peningkatan relaksasi (Cryan et al., 2019; L. Liu et al., 2022; Long-Smith et al., 2020; Margolis et al., 2021).
- **Komponen Asam Amino:** Salah satu fungsi mikrobiota usus adalah berpartisipasi dalam pembentukan asam amino yang diperlukan, yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Bakteri di lambung bertanggung jawab atas fermentasi protein, yang menghasilkan produksi asam amino esensial termasuk lisin, leusin, dan valin. Asam amino khusus ini penting untuk produksi protein, perbaikan jaringan, dan fungsi enzim dalam tubuh. Mikrobiota usus bertanggung jawab atas pembentukan asam amino, yang menjamin bahwa tubuh memiliki akses ke jumlah nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan spesifiknya setiap hari (Smith & MacFarlane, 1998).
- **Hormon:** Mikrobiota yang hidup di usus juga berkontribusi pada sintesis hormon yang memengaruhi proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Bakteri usus, misalnya, berpotensi mengganggu sintesis hormon seperti insulin dan glukagon, yang bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme glukosa dan menjaga keseimbangan nutrisi (Musso et al., 2010).

Produksi metabolit oleh mikrobiota usus diketahui memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental melalui sumbu usus-otak. Sebagai ilustrasi, serotonin yang dihasilkan dalam usus tidak hanya

mengendalikan operasi sistem pencernaan, tetapi juga memengaruhi proses kognitif dan emosional. Ada beberapa bukti bahwa penyakit seperti kecemasan dan depresi mungkin disebabkan oleh gangguan dalam pembentukan serotonin oleh mikrobiota dalam usus. Selain itu, metabolit lain, seperti asam lemak rantai pendek (SCFA), yang terbentuk melalui fermentasi serat makanan, berpotensi memengaruhi kinerja kognitif dan kesehatan mental melalui jalur yang memodulasi sistem imun dan mengurangi peradangan (Cryan & Dinan, 2012).

3) Modulasi Sistem Kekebalan Tubuh

Mikrobiota usus berperan penting dalam modulasi sistem imun. Mikroorganisme dalam usus berinteraksi dengan sel imun dalam mukosa usus untuk membantu mengatur respons imun. Mikrobiota usus memengaruhi perkembangan dan fungsi berbagai jenis sel imun, termasuk makrofag, sel dendritik, sel T, dan sel B. Interaksi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara toleransi terhadap antigen yang tidak berbahaya dan pertahanan terhadap patogen.

Interaksi mikroba dan sel imun

Mikrobiota usus berinteraksi dengan sel imun melalui beberapa mekanisme. Salah satu contohnya adalah produksi butirir, asam lemak rantai pendek (SCFA) yang diproduksi oleh fermentasi serat makanan oleh bakteri usus. Butirir memiliki efek imunomodulatori yang kuat. Studi menunjukkan bahwa butirir dapat meningkatkan produksi sel pengatur T (Treg), yang penting untuk menekan respons imun yang berlebihan dan mencegah peradangan kronis (Furusawa et al., 2013). Sel Treg ini membantu menjaga toleransi imun dan mencegah penyakit autoimun.

Selain itu, mikrobiota usus berinteraksi dengan sel dendritik, yang berfungsi sebagai penghubung antara respons imun bawaan dan adaptif. Sel dendritik dapat mengambil antigen dari lumen usus dan menyajikannya ke sel T di kelenjar getah bening, mengarahkan perkembangan sel T menjadi berbagai subset yang diperlukan untuk pertahanan atau toleransi imun (Gallo & Hooper, 2012). Interaksi ini membantu dalam menetapkan respons imun yang seimbang dan mencegah peradangan yang berlebihan.

Toleransi Imun dan Pertahanan terhadap Patogen

Toleransi imunologis dan pertahanan terhadap patogen mikrobiota usus berperan penting dalam toleransi imun terhadap antigen makanan dan mikroba komensal. Toleransi imun ini penting

untuk mencegah respons imun yang berlebihan terhadap komponen yang tidak berbahaya, yang dapat menyebabkan peradangan kronis dan penyakit autoimun. Mikrobiota membantu mendidik sistem imun untuk membedakan antara antigen yang berbahaya dan tidak berbahaya, memastikan bahwa hanya patogen yang mendapat respons imun yang kuat (Round & Mazmanian, 2009).

Selain meningkatkan toleransi, mikrobiota usus juga berperan dalam melindungi mukosa usus dari infeksi patogen. Bakteri usus menghasilkan peptida antimikroba seperti defensin dan cathelicidine yang dapat menghancurkan patogen atau menghambat pertumbuhannya (Gallo & Hooper, 2012).

Ketika keseimbangan ini terganggu, misalnya oleh disbiosis atau penggunaan antibiotik yang berlebihan, risiko penyakit inflamasi dan infeksi meningkat. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mikrobiota usus melalui diet seimbang, penggunaan antibodi yang bijaksana, dan mungkin suplementasi dengan probiotik dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat dan mencegah berbagai penyakit.

Dampak terhadap kesehatan keseluruhan

Modulasi sistem kekebalan tubuh oleh mikrobiota usus memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan secara keseluruhan. Keseimbangan yang sehat antara toleransi dan pertahanan kekebalan tubuh membantu mencegah penyakit autoimun, alergi, dan penyakit inflamasi kronis seperti penyakit radang usus (IBD). Mikrobiota usus yang sehat juga membantu melindungi tubuh dari infeksi patogen dengan memperkuat selaput lendir usus dan menghasilkan peptida antimikroba.

Selain itu, interaksi mikrobiota usus dengan sistem kekebalan tubuh juga memengaruhi kesehatan mental dan fungsi kognitif melalui sumbu otak-usus. Mikroba usus dapat menghasilkan dan memodulasi neurotransmitter serta molekul sinyal lainnya yang memengaruhi fungsi otak dan suasana hati.

4) Pemeliharaan Integritas Mukosa Usus

Salah satu faktor terpenting dalam menjaga integritas mukosa usus adalah mikrobiota yang hidup di dalam usus. Sel epitel pencernaan bertanggung jawab atas pembentukan penghalang fisik yang berfungsi untuk memisahkan lumen usus dari sirkulasi sistemik. Penghalang ini berfungsi untuk membatasi pergerakan kuman dan racun di sepanjang saluran pencernaan.

Asam lemak rantai pendek (SCFA) diproduksi melalui fermentasi serat makanan yang tidak dapat dicerna oleh enzim manusia. Produksi SCFA dan penguatan penghalang mukosa mikrobiota usus merupakan dua proses yang berkontribusi terhadap pembentukan SCFA. Sumber energi utama bagi sel epitel usus, yang juga dikenal sebagai kolonosit, adalah asam lemak superkritis (SCFA), khususnya butirat. Melalui peningkatan proliferasi dan diferensiasi sel epitel usus, butirat berperan penting dalam proses penyediaan penghalang mukosa dengan struktur yang lebih kuat. Menurut Peng et al. (2009), hal ini membantu menjaga ketebalan dan kekuatan penghalang mukosa, yang pada gilirannya berfungsi untuk menghindari kerusakan dan meningkatkan rekonstruksi sel epitel yang telah terluka.

Butirat juga memiliki kemampuan antiinflamasi yang cukup besar, yang merupakan keuntungan lainnya. Namun, butirat membantu menjaga keseimbangan imunologis dalam usus dan menghindari peradangan kronis, yang dapat merusak penghalang mukosa. Hal ini dilakukan dengan membatasi sintesis sitokin proinflamasi dan meningkatkan produksi sitokin antiinflamasi. Asetat dan propionat adalah dua contoh asam lemak rantai pendek (SCFA) lainnya yang membantu kesehatan mukosa dengan membantu pengelolaan metabolisme energi dan fungsi imunologis dalam usus.

Sel goblet, yang bertanggung jawab atas pembentukan lapisan pelindung lendir pada permukaan mukosa gastrointestinal, dirangsang untuk menghasilkan musin oleh mikrobiota yang ditemuinya di usus. Selain perannya sebagai pelumas, musin juga berfungsi sebagai penghalang fisik yang mencegah masuknya bakteri dan partikel asing lainnya. Melalui kemampuannya untuk mencegah bakteri berbahaya bersentuhan langsung dengan sel epitel usus, lapisan lendir ini juga berperan penting dalam menjaga lingkungan yang sehat di dalam usus (Johansson et al., 2008).

Sebagai respons terhadap sinyal dari mikrobiota di usus, sel goblet di usus, yang bertanggung jawab untuk memproduksi musin, meningkatkan produksinya. Spesies bakteri seperti *Akkermansia muciniphila*, misalnya, diketahui mendorong pembentukan musin dan mengentalkan lapisan mukosa. Hal ini menghasilkan pembentukan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan bakteri komensal dan melindungi mukosa usus dari infeksi yang berbahaya.

Sambungan yang Rapat Fungsi lain yang dipenuhi oleh mikrobiota usus adalah memperkuat sambungan rapat yang ada di antara sel-sel epitel usus. Struktur protein yang dikenal sebagai sambungan rapat bertanggung jawab untuk mengatur permeabilitas ruang paraselular dan mencegah kebocoran di antara sel-sel epitel. Namun, telah dibuktikan bahwa butirir, yang merupakan salah satu asam lemak rantai pendek (SCFA) utama yang dihasilkan oleh mikrobiota usus, dapat meningkatkan ekspresi protein sambungan rapat seperti okcludin dan klaudin. Protein-protein ini membantu memperkuat penghalang epitel dan mencegah kebocoran usus (Shen & Turner, 2006).

Melalui proses penguatan *tight junction*, mikrobiota usus berkontribusi pada pelestarian integritas selaput lendir dan mencegah pergerakan bakteri dan racun dari lumen usus ke dalam sirkulasi sistemik. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah perkembangan peradangan sistemik dan penyakit yang terkait dengan kebocoran usus. Penyakit-penyakit ini termasuk sindrom iritasi usus besar (IBS), penyakit radang usus (IBD), dan gangguan autoimun lainnya.

Mikrobiota usus, yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas mukosa usus, memiliki pengaruh yang cukup besar pada kesehatan umum seseorang. Infeksi dapat dihindari, risiko peradangan kronis dapat dikurangi, dan fungsi kekebalan tubuh yang sehat dapat didukung ketika ukuran integritas mukosa dalam kondisi baik. Mikrobiota saluran pencernaan berkontribusi pada perlindungan tubuh terhadap berbagai macam penyakit dan situasi patologis dengan membentuk penghalang mukosa yang kuat dan fungsional.

c. Dysbiosis dan Dampaknya terhadap Kesehatan Pencernaan

Disbiosis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelainan pada susunan mikrobiota yang ditemukan di saluran pencernaan. Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Ketidakseimbangan ini muncul ketika terjadi penurunan jumlah bakteri yang bermanfaat atau peningkatan jumlah bakteri patogen dan oportunistik. Kedua skenario ini terjadi secara bersamaan. Disbiosis dapat berdampak besar pada sistem pencernaan, metabolisme, dan sistem imunologi tubuh, dan juga dapat berperan dalam perkembangan sejumlah penyakit.

Secara umum disbiosis adalah gangguan yang terjadi ketika ekologi mikroba saluran pencernaan menjadi tidak seimbang, baik

dalam hal jumlah bakteri yang ada maupun keragaman mikroorganisme tersebut. Disbiosis sering dikaitkan dengan penurunan jumlah bakteri yang bermanfaat, seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, dan peningkatan jumlah bakteri yang berbahaya, seperti *Clostridium difficile* dan *Escherichia coli*.

1) Penyebab Dysbiosis

Istilah "disbiosis" merujuk pada ketidakseimbangan dalam susunan mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan, yang dapat disebabkan oleh sejumlah alasan berbeda. Pola makan yang buruk, seperti pola makan yang banyak mengandung lemak dan rendah serat, merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan disbiosis. Pola makan rendah serat tidak menyediakan substrat yang cukup bagi bakteri baik untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA), yang penting bagi kesehatan usus. Di sisi lain, pola makan yang tinggi lemak dapat mengurangi keragaman mikrobiota usus dan mendukung pertumbuhan bakteri patogen yang terkait dengan peradangan dan penyakit metabolik (De Filippo et al., 2010).

Mikrobiota di saluran pencernaan juga dapat menjadi tidak seimbang jika antibiotik digunakan secara berlebihan atau tidak tepat. Meskipun antibiotik berhasil menghilangkan bakteri penyebab penyakit, antibiotik juga menghilangkan bakteri yang bermanfaat bagi tubuh. Hal ini menyebabkan berkurangnya keragaman mikroorganisme dan peningkatan kemungkinan mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri oportunistik seperti *Clostridium difficile* (Dethlefsen & Relman, 2011). Stres, baik fisik maupun mental, berpotensi memengaruhi susunan mikrobiota dalam saluran pencernaan melalui proses hormon dan sistem imun. Stres menyebabkan peningkatan produksi hormon stres seperti kortisol, yang dapat mengubah lingkungan dalam usus dan berdampak pada perkembangbiakan bakteri yang bermanfaat. Selain itu, stres dapat mengganggu selaput lendir yang melapisi usus besar, meningkatkan permeabilitas usus, dan menjadi pemicu peradangan (Foster et al., 2017). Gangguan keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan juga dapat disebabkan oleh disbiosis, yang dapat disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh patogen gastrointestinal seperti virus, bakteri, dan parasit (Lozupone et al., 2012).

Selain itu, disbiosis dapat disebabkan oleh dan diperburuk oleh sejumlah penyakit medis, termasuk sindrom iritasi usus besar (IBS) dan penyakit radang usus (IBD). Disbiosis juga dapat memperburuk

gejala sindrom iritasi usus besar (IBS) dengan mengubah motilitas usus dan meningkatkan peradangan mukosa. Peradangan kronis dan kegagalan penghalang usus umumnya dikaitkan dengan perubahan besar dalam susunan mikrobiota pada orang yang menderita penyakit radang usus (IBD) (Frank et al., 2007).

2) Dampak Dysbiosis pada Kesehatan Usus

Disbiosis dapat berdampak besar pada kesehatan saluran usus, yang menyebabkan berbagai masalah pencernaan serta peradangan. Ketika terjadi gangguan pada keseimbangan mikrobiota, bakteri patogen berpotensi tumbuh berlebihan dan menghasilkan racun yang membahayakan mukosa usus. Hal ini berpotensi memicu reaksi imunologis yang mengkhawatirkan, yang pada gilirannya menyebabkan peradangan terus-menerus di saluran pencernaan. Istilah "usus bocor" mengacu pada kondisi yang terjadi ketika peradangan, yang merusak integritas penghalang mukosa di usus, meningkatkan permeabilitas saluran pencernaan. Bakteri dan racun berpotensi memasuki sirkulasi sistemik ketika penghalang mukosa rongga perut terganggu. Hal ini dapat mengakibatkan respons imun yang lebih luas dan peradangan di seluruh tubuh (Patrice D. Cani et al., 2008).

Sebagai akibat dari peningkatan permeabilitas usus ini, penyakit pencernaan seperti diare, sembelit, kembung, dan ketidaknyamanan perut menjadi lebih parah. Meskipun asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, asetat, dan propionat sangat penting untuk kesehatan usus, disbiosis dapat mengganggu sintesis asam-asam ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan usus. SCFA memiliki tindakan trofik dan anti-inflamasi, yang membantu menjaga fungsi dan integritas mukosa usus karena efek-efek ini (Krajmalnik-Brown et al., 2012).

Lebih jauh lagi, disbiosis berpotensi memengaruhi fungsi motilitas usus, yang pada gilirannya dapat mengubah laju pergerakan makanan melalui sistem pencernaan. Gangguan pada mikrobiota dapat memengaruhi otot-otot usus dan sistem saraf saluran enterik, yang keduanya bertanggung jawab untuk mengatur pergerakan usus. Disbiosis dapat menimbulkan gejala-gejala seperti sembelit atau diare yang terus-menerus, tergantung pada arah terjadinya ketidakseimbangan motilitas. Misalnya, perkembangan bakteri metanogenik yang berlebihan dapat menghambat transit usus, yang dapat menyebabkan sembelit. Di sisi lain, peningkatan bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida dapat mempercepat transit usus,

yang dapat menyebabkan diare (Parthasarathy et al., 2016).

Disbiosis juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan penyakit medis tertentu, seperti sindrom iritasi usus besar (IBS) dan penyakit radang usus (IBD), serta memperburuk kondisi ini. Gejala sindrom iritasi usus besar (IBS) dapat diperburuk oleh disbiosis, yang mungkin meliputi ketidaknyamanan perut, pembengkakan, dan perubahan pola buang air kecil. Oleh karena itu, memiliki kesadaran akan disbiosis dan mampu mengelolanya secara efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan usus dan menghindari kesulitan di masa mendatang.

3) Hubungan Dysbiosis dengan Penyakit Gastrointestinal

Terdapat hubungan yang kuat antara disbiosis dan sejumlah gangguan gastrointestinal, seperti penyakit radang usus (IBD) dan sindrom iritasi usus besar (IBS). Kelainan yang terjadi pada mikrobiota usus besar dapat meningkatkan keparahan gejala dan berkontribusi pada perkembangan penyakit ini melalui berbagai cara yang berbeda.

Ketidaknyamanan perut, kembung, diare, dan sembelit adalah beberapa gejala yang terkait dengan sindrom iritasi usus besar (IBS), yang merupakan kondisi pencernaan fungsional. Kondisi yang dikenal sebagai disbiosis, yang ditandai dengan penurunan jumlah bakteri bermanfaat seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* serta peningkatan jumlah bakteri berbahaya, sering dialami oleh individu yang menderita sindrom iritasi usus besar (IBS), menurut penelitian.

Kondisi yang dikenal sebagai "usus bocor" ditandai dengan peningkatan permeabilitas usus, yang disebabkan oleh peradangan mukosa usus yang disebabkan oleh disbiosis. Karena itu, kuman dan racun dapat memasuki sirkulasi sistemik, yang pada gilirannya menyebabkan respons imun yang terlalu aktif dan dengan demikian menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Selain itu, perubahan motilitas usus yang disebabkan oleh disbiosis dapat menyebabkan diare atau sembelit, tergantung pada arah terjadinya ketidakseimbangan motilitas. Disbiosis juga dapat mengganggu produksi asam lemak rantai pendek (SCFA) yang bermanfaat, yang diketahui biasanya membantu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan mukosa usus (Kassinen et al., 2007).

(IBD) adalah singkatan dari penyakit radang usus. Penyakit Crohn dan kolitis ulseratif adalah contoh penyakit radang usus (IBD), yang merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan

yang menyiksa di saluran pencernaan. Ada perubahan yang cukup besar dalam komposisi mikrobiota yang dapat diidentifikasi pada orang yang menderita penyakit radang usus (IBD), yang menunjukkan bahwa disbiosis memainkan peran penting dalam patogenesis IBD. Pasien dengan penyakit radang usus sering kali memiliki bakteri antiradang yang lebih sedikit dan kuman proradang yang lebih banyak jumlahnya.

Adanya disbiosis pada penyakit radang usus (IBD) dapat mengakibatkan peningkatan produksi sitokin proradang dan respons imunologi yang tidak teratur, yang keduanya berkontribusi terhadap gangguan jaringan usus dan memburuknya gejala. Perubahan ini berpotensi memperburuk radang selaput lendir dan menyebabkan kerusakan pada penghalang usus, yang mengakibatkan tanda dan gejala yang lebih parah dan kesulitan lebih lanjut. Probiotik dan transplantasi mikroba feces adalah dua strategi yang sekarang sedang diselidiki sebagai metode prospektif untuk penanganan penyakit radang usus (IBD). Terapi ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan mikrobiota (Frank et al., 2007).

Selain itu, bukti menunjukkan bahwa terapi yang dapat membantu mengembalikan keseimbangan mikrobiota usus, seperti diet yang tinggi serat, probiotik, dan prebiotik, dapat membantu mengurangi peradangan dan memperbaiki gejala pada individu yang menderita kondisi terkait penyakit radang usus. Dalam kasus individu yang menderita kolitis ulseratif, misalnya, transplantasi mikroba feces (FMT) telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam hal memulihkan keragaman mikrobium usus dan menurunkan gejala (Sokol et al., 2008).

2. Manfaat Sinbiotik bagi Kesehatan Gastrointestinal

a. Penguatan Penghalang Mukosa Usus

- 1) Mekanisme sinbiotik dalam memperkuat penghalang mukosa (peningkatan produksi mucin, penguatan tight junctions)

Sinbiotik, yang merupakan campuran probiotik dan prebiotik, berperan penting dalam proses membangun penghalang mukosa yang mengelilingi saluran pencernaan melalui berbagai metode. Probiotik seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* memiliki kemampuan untuk meningkatkan sintesis musin oleh sel goblet. Sel goblet merupakan komponen utama lapisan pelindung mukosa yang terletak di permukaan mukosa usus. Penghalang fisik viskoelastik yang tebal dibentuk oleh glikoprotein yang disebut musin, yang

berperan mencegah masuknya infeksi dan racun ke dalam lapisan epitel saluran pencernaan (Wells et al., 2011).

Sinbiotik tidak hanya memiliki kemampuan untuk merangsang pembentukan musin, tetapi juga dapat memperkuat hubungan erat yang terjalin antara sel-sel epitel usus. Struktur protein yang dikenal sebagai persimpangan ketat bertanggung jawab untuk mengatur permeabilitas ruang paraseluler. Tindakan ini menghentikan senyawa yang berpotensi berbahaya keluar dari lumen usus dan memasuki sirkulasi sistemik. Untuk menciptakan penghalang yang kuat antara sel-sel epitel, struktur ini terdiri dari protein termasuk occludin, claudin, dan zonula occludens. Protein-protein ini berkolaborasi untuk menciptakan penghalang ini. Telah dibuktikan bahwa asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, yang diproduksi oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik, memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspresi dan fungsi protein sambungan ketat seperti occludin dan claudin. Protein ini bertanggung jawab untuk memperkuat penghalang epitel dan menjaga integritas mukosa usus besar (Peng et al., 2009).

Ada juga bukti bahwa probiotik berpengaruh pada regulasi sistem kekebalan pada mukosa saluran pencernaan. Zat tersebut memiliki kemampuan merangsang sintesis peptida antimikroba seperti defensin dan cathelicidin, yang berperan dalam melindungi lendir usus terhadap infeksi akibat patogen. Selain itu, probiotik memiliki kemampuan untuk mengaktifkan sel kekebalan di lendir usus besar, seperti sel dendritik dan makrofag, untuk menciptakan sitokin antiinflamasi. Ini membantu mengurangi peradangan dan memperkuat penghalang mukosa (Ouwehand et al., 2002).

Selain itu, sinbiotik berpotensi membantu lebih lanjut penyembuhan penghalang mukosa yang terganggu. Suplementasi sinbiotik dapat membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit seperti penyakit radang usus (IBD), yang sering kali menyebabkan gangguan pada penghalang mukosa. Hal ini dicapai dengan meningkatkan konstruksi dan fungsi penghalang epitel. Menurut Hamer et al. (2008), asam lemak rantai pendek (SCFA) yang dihasilkan oleh fermentasi prebiotik memiliki kemampuan untuk merangsang regenerasi sel epitel usus, sehingga meningkatkan ketebalan dan ketahanan penghalang mukosa.

Secara umum, proses sinbiotik yang bertanggung jawab untuk memperkuat penghalang mukosa meliputi: peningkatan sintesis musin; penguatan persimpangan yang ketat; pengendalian sistem

kekebalan tubuh; dan penyembuhan penghalang mukosa yang telah terganggu. Pendekatan sinergis yang efektif untuk menjaga dan meningkatkan integritas mukosa usus disediakan oleh kombinasi probiotik dan prebiotik ini. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan dan mencegah berbagai gangguan yang mempengaruhi usus.

2) Relevansi klinis penguatan penghalang mukosa dalam mencegah penyakit usus

Sinbiotik mempunyai nilai terapeutik yang cukup besar dalam pencegahan berbagai gangguan usus karena memperkuat penghalang mukosa terhadap patogen. Dalam hal melindungi tubuh dari serangan patogen dan racun, yang dapat menyebabkan infeksi dan peradangan kronis, penghalang mukosa yang kuat dan berfungsi memainkan peran penting. Dalam hal kesehatan saluran pencernaan, selaput lendir yang sehat merupakan komponen penting, terutama pada individu yang menderita penyakit seperti sindrom iritasi usus besar (IBS) dan penyakit radang usus. Ini adalah IBD.

Orang yang menderita sindrom iritasi usus besar (IBS) sering kali mengalami kelainan pada selaput lendir usus, yang dapat mengakibatkan peningkatan permeabilitas usus, yang kadang-kadang dikenal sebagai "usus bocor". Kondisi ini memungkinkan bakteri dan racun menyusup ke lapisan epitel saluran pencernaan, yang pada akhirnya menyebabkan reaksi imunologis dan peradangan. Kedua faktor ini menyebabkan gejala sindrom iritasi usus besar (IBS), yang meliputi perut tidak nyaman, bengkak, diare, dan sembelit. Melalui penggunaan sinbiotik untuk memperkuat penghalang mukosa, dimungkinkan untuk mengurangi tingkat permeabilitas usus dan zat inflamasi, sehingga mengurangi gejala sindrom iritasi usus besar (IBS) dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Ringel-Kulka et al., 2011).

Peradangan kronis sering kali menyebabkan kerusakan integritas membran mukosa pada pasien dengan penyakit radang usus (IBD), yang mencakup kondisi lain seperti penyakit Crohn dan kolitis ulserativa. Melalui penguatan penghalang mukosa dan pengurangan peradangan, sinbiotik berpotensi memainkan peran penting dalam memutus siklus ini. Dengan sifat anti inflamasinya, asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti detritus, yang terbentuk selama fermentasi prebiotik, berpotensi menghambat aktivitas inflamasi di usus dan menyembuhkan jaringan yang terluka (Hamer et al., 2008).

Pada individu dengan penyakit radang usus (IBD), sinbiotik telah terbukti mengurangi keparahan gejala, menurut penelitian klinis. Suplementasi sinbiotik, misalnya, telah terbukti meningkatkan integritas penghalang mukosa dan mengurangi frekuensi eksaserbasi gejala pada orang yang menderita kolitis ulserativa (Ishikawa et al., 2003). Hal ini menunjukkan potensi sinbiotik sebagai pengobatan tambahan yang efektif untuk pengelolaan penyakit radang usus (IBD).

Selain itu, sinbiotik mempunyai peran penting dalam pencegahan infeksi saluran cerna dengan memperkuat selaput lendir yang melapisi saluran pencernaan. Sinbiotik membantu mencegah kolonisasi dan penetrasi bakteri seperti *Clostridium difficile*, yang dapat menyebabkan infeksi parah, terutama pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau setelah menjalani terapi antibiotik. Hal ini dicapai dengan menjaga integritas membran mukosa. Tampaknya sinbiotik tidak hanya berguna untuk pengobatan gangguan inflamasi kronis, namun juga berperan dalam pencegahan infeksi akut (Weimer & Zeikus, 1977).

Sinbiotik mempunyai potensi untuk meningkatkan penghalang mukosa, yang memiliki implikasi terapeutik yang signifikan untuk pencegahan dan pengelolaan berbagai penyakit usus dalam jangka panjang. Sinbiotik berpotensi meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita gangguan gastrointestinal kronis dengan meningkatkan integritas mukosa, sehingga mengurangi peradangan, mencegah infeksi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemanfaatan sinbiotika sebagai komponen rencana terapi menyeluruh berpotensi meningkatkan hasil klinis secara signifikan bagi pasien yang menderita penyakit gastrointestinal.

b. Reduksi Peradangan Usus

- 1) Mekanisme pengurangan peradangan oleh probiotik dan prebiotik (produksi SCFA, penurunan produksi sitokin pro-inflamasi)

Probiotik dan prebiotik berperan penting dalam mengurangi peradangan di usus melalui sejumlah proses penting. Mekanisme ini mencakup pembentukan asam lemak rantai pendek (SCFA) dan pengurangan produksi sitokin pro-inflamasi. Selama fermentasi prebiotik, mikrobiota di saluran pencernaan menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, asetat, dan propionat. Asam lemak rantai pendek ini memiliki sifat anti-inflamasi yang

efektif (Furusawa et al., 2013).

Selain itu, probiotik seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* memiliki kemampuan berinteraksi langsung dengan sel imun di mukosa usus, seperti makrofag dan sel dendritik, guna mengontrol respon imun. Penelitian telah menunjukkan bahwa *Lactobacillus rhamnosus* memiliki kemampuan untuk menurunkan produksi TNF- α dan meningkatkan produksi IL-10, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan peradangan pada saluran usus (Kwon et al., 2010).

Penciptaan asam lemak rantai pendek (SCFA) oleh mikrobiota di usus tidak hanya berkontribusi pada pengurangan peradangan, tetapi juga membantu meningkatkan penghalang mukosa di saluran usus. Salah satu asam lemak rantai pendek (SCFA) yang paling esensial, butirat, merupakan sumber energi bagi sel epitel yang melapisi usus besar dan juga berperan penting dalam menjaga integritas penghalang mukosa. Menurut Peng dkk. (2009), asam lemak rantai pendek ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspresi protein sambungan ketat termasuk occludin dan claudin. Protein ini berperan mencegah pelepasan bahan kimia berbahaya dari lumen usus ke dalam sirkulasi sistemik. Akibatnya, peningkatan sintesis asam lemak rantai pendek (SCFA) oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik menawarkan perlindungan ganda terhadap peradangan berkat penguatan penghalang fisik dan regulasi respons imunologis.

Selain asam lemak rantai pendek (SCFA), probiotik memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai metabolit bioaktif tambahan yang memiliki sifat anti-inflamasi. Peptida antimikroba, misalnya, diketahui diproduksi oleh beberapa strain *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*. Peptida ini memiliki kemampuan untuk mencegah perkembangan bakteri berbahaya dan mengurangi peradangan. Yang juga berperan penting dalam proses regulasi kekebalan tubuh adalah kontak langsung probiotik dengan sel kekebalan yang ditemukan di mukosa usus. Selain itu, probiotik memiliki kemampuan untuk merangsang perkembangan sel T regulator, yang juga dikenal sebagai sel Treg. Sel-sel ini bertanggung jawab untuk menekan respon imunologi yang berlebihan dan menjaga toleransi imun terhadap antigen makanan dan mikroorganisme komensal (Round & Mazmanian, 2009).

Sinbiotik, yang merupakan campuran probiotik dan prebiotik, menawarkan pendekatan sinergis untuk menurunkan peradangan

usus melalui berbagai jalur molekuler dan seluler. Secara umum, strategi ini bermanfaat. Sinbiotik berpotensi memberikan manfaat kesehatan yang signifikan bagi individu yang menderita kondisi peradangan kronis seperti sindrom iritasi usus besar (IBS) dan penyakit radang usus (IBD). Manfaat ini dapat dicapai melalui peningkatan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), penekanan produksi sitokin pro-inflamasi, dan penguatan integritas penghalang mukosa.

2) Implikasi klinis pengurangan peradangan dalam pengobatan IBS, IBD, dan kondisi inflamasi lainnya

Dalam pengobatan berbagai gangguan peradangan kronis, seperti sindrom iritasi usus besar (IBS) dan penyakit radang usus (IBD), penggunaan probiotik dan prebiotik untuk mengurangi peradangan di usus memiliki konsekuensi terapeutik yang besar. Dengan mengurangi peradangan mukosa dan memperbaiki gejala, probiotik dan prebiotik dapat membantu dalam pengobatan sindrom iritasi usus besar (IBS), yang sering ditandai dengan gejala seperti ketidaknyamanan perut, pembengkakan, diare, dan sembelit. Misalnya, para peneliti telah menunjukkan bahwa mengonsumsi suplemen probiotik, termasuk *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, dapat mengurangi intensitas gejala yang berhubungan dengan sindrom iritasi usus besar (IBS), meningkatkan kualitas hidup pasien, dan mengurangi peradangan pada selaput lendir (Ringel-Kulka et al., 2011).

Peradangan kronis dan kerusakan pada selaput lendir adalah ciri utama penyakit radang usus (IBD), termasuk penyakit Crohn dan kolitis ulserativa. Sinbiotik berpotensi meningkatkan kualitas hidup pasien, serta mengurangi frekuensi dan keparahan eksaserbasi, memperpanjang masa remisi, dan memperpanjang jangka waktu remisi pasien. Penggunaan sinbiotik sebagai suplemen telah terbukti meningkatkan histologi mukosa dan mengurangi indikator peradangan yang ditemukan dalam darah dan jaringan usus, menurut penelitian. Sinbiotik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan proporsi bakteri anti-inflamasi, seperti *Faecalibacterium prausnitzii*, sekaligus menurunkan jumlah bakteri pro-inflamasi. Hal ini, pada gilirannya, membantu mengurangi peradangan mukosa dan memperbaiki kondisi klinis pasien yang menderita penyakit radang usus (Sokol et al., 2008),.

Konsekuensi terapeutik dari penurunan peradangan juga mungkin meluas ke penyakit peradangan lainnya, seperti penyakit

celiac, infeksi usus non-spesifik, dan bahkan masalah metabolisme yang berhubungan dengan peradangan kronis. Penyakit celiac ditandai dengan infeksi persisten yang disebabkan oleh respons autoimun terhadap gluten. Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada mukosa usus dan mengganggu kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi.

Selain itu, masalah metabolisme termasuk obesitas dan diabetes tipe 2 sering kali dikaitkan dengan peradangan kronis tingkat rendah. Ini adalah asosiasi yang umum. Pengurangan peradangan sistemik yang berhubungan dengan penyakit ini, peningkatan sensitivitas insulin, dan regulasi metabolisme glukosa dan lipid merupakan hasil yang mungkin didapat dari penggunaan sinbiotik. Suplementasi sinbiotik, yang memiliki proporsi bakteri penghasil asam lemak rantai pendek (SCFA) yang lebih tinggi, telah terbukti efektif dalam menurunkan peradangan sistemik dan meningkatkan profil metabolisme pada mereka yang menderita gangguan metabolisme, menurut penelitian (Cani et al., 2009).

Melalui modulasi respons imun dan pengurangan peradangan, sinbiotik berpotensi membantu pengelolaan berbagai gangguan peradangan dan meningkatkan kesehatan pasien secara umum. Meringankan peradangan kronis dan meningkatkan kualitas hidup dapat dicapai dengan cara yang aman dan alami melalui penggunaan sinbiotik sebagai komponen rencana terapi menyeluruh. Sinbiotik tidak hanya berpotensi meningkatkan kesehatan sistemik melalui tindakan anti-inflamasi dan modifikasi mikrobiota usus, namun juga menawarkan keuntungan dalam pengelolaan gejala gastrointestinal.

B. Studi Kasus dan Analisis Klinis Sinbiotik dalam Gangguan Pencernaan

1. Ishikawa et al. (2011): efek suplementasi sinbiotik pada peradangan mukosa dan gejala klinis pada pasien dengan kolitis ulseratif.

Ishikawa et al. (2003) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui efek suplementasi sinbiotik terhadap peradangan selaput lendir dan gejala klinis yang dialami pasien kolitis ulserativa. Pasien dewasa yang telah didiagnosis menderita kolitis ulserativa aktif berpartisipasi dalam penelitian ini, yaitu uji klinis yang dilakukan secara acak, tersamar ganda, dan dikontrol dengan elemen plasebo. Kriteria inklusi mencakup individu yang telah didiagnosis secara klinis menderita kolitis ulserativa dan telah menjalani endoskopi. Di sisi lain, kriteria eksklusi mencakup pasien yang baru

saja diobati dengan antibiotik, probiotik, atau terapi imunomodulator lainnya. Sebaliknya, kelompok kontrol diberikan plasebo yang tidak mengandung probiotik atau prebiotik apa pun, sedangkan kelompok intervensi diberikan suplemen sinbiotik yang mengandung campuran probiotik *Bifidobacterium* spp. dan inulin sebagai prebiotik.

Untuk mengevaluasi gejala klinis seperti rasa tidak nyaman pada perut, diare, dan pendarahan dubur, penilaian klinis dilakukan pada awal, tengah, dan akhir intervensi. Tindakan endoskopi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peradangan yang terjadi pada membran mukosa. Selain itu, pemeriksaan biomarker darah, termasuk TNF- α , IL-6, dan CRP, dilakukan untuk mengukur respons inflamasi sistemik. Jika kita membandingkan kelompok yang menerima sinbiotik dengan kelompok yang menerima plasebo, kami menemukan bahwa kelompok yang menerima sinbiotik mengalami perbaikan besar dalam gejala klinis. Telah ditunjukkan bahwa kelompok sinbiotik mengalami penurunan rasa tidak nyaman di perut, diare, dan pendarahan rektum yang lebih besar dibandingkan kelompok konvensional. Setelah melakukan penilaian endoskopi, diamati bahwa kelompok simbiosis mengalami penurunan peradangan mukosa yang signifikan. Lebih lanjut, penelitian terhadap biomarker inflamasi mengungkapkan bahwa kadar TNF- α , IL-6, dan CRP berkurang secara signifikan.

Selain itu, pasien yang diberi sinbiotik mengalami peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Kuesioner standar digunakan untuk menilai kualitas hidup, dan hasilnya menunjukkan peningkatan besar dalam berbagai karakteristik, termasuk energi, fungsi fisik, dan emosi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan suplemen sinbiotik dapat berdampak besar dalam mengurangi peradangan dan memperbaiki gejala klinis pada orang yang menderita kolitis ulserativa. Penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa sinbiotik berpotensi menjadi intervensi yang berguna untuk pengelolaan peradangan mukosa dan peningkatan kualitas hidup pasien yang menderita kolitis ulserativa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang ketat dan analisis terperinci. Temuan penelitian ini memberikan kepercayaan terhadap penggunaan sinbiotik sebagai komponen integral dari pendekatan terapi menyeluruh untuk penyakit yang menyebabkan peradangan kronis pada sistem pencernaan.

2. Benjamin et al., 2011: efek sinbiotik pada peradangan usus

pada model tikus dengan penyakit Crohn

Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah menyelidiki efek sinbiotik pada peradangan usus pada tikus model penyakit Crohn. Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan potensi sinbiotik dalam pengelolaan gangguan inflamasi kronis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental, dan tikus yang berpartisipasi dalam penelitian ini diinduksi penyakit Crohn dengan menggunakan obat proinflamasi seperti TNBS (asam sulfonat 2,4,6-trinitrobenzene). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mensimulasikan peradangan usus yang sebanding dengan kondisi yang terjadi pada manusia. Setelah itu, tikus-tikus tersebut dipisahkan menjadi dua kelompok berbeda: kelompok intervensi yang diberi sinbiotik, dan kelompok kontrol yang diberi plasebo. Kelompok intervensi diberikan sinbiotik yang merupakan campuran probiotik (khususnya spesies *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*) dan prebiotik (khususnya inulin). Sinbiotik ini berupa suplemen harian yang dipadukan dengan makanan yang dimakan tikus.

Berdasarkan temuan penelitian, kelompok yang diberi sinbiotik mengalami peningkatan yang signifikan pada gejala klinis penyakit Crohn jika dibandingkan dengan kelompok yang berperan sebagai kontrol. Ketika tikus dalam kelompok sinbiotik diberi suplemen, mereka melihat adanya pengurangan gejala seperti diare, penurunan berat badan, dan ketidaknyamanan perut. Pemeriksaan histologis jaringan usus menunjukkan penurunan peradangan yang substansial pada kelompok yang mengonsumsi sinbiotik. Penurunan ini dibarengi dengan penurunan infiltrasi sel inflamasi, edema, dan kerusakan jaringan dibandingkan dengan kelompok acuan. Selain itu, kelompok sinbiotik menunjukkan penurunan kadar TNF- α , IL-6, dan MPO yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh pengukuran biomarker inflamasi. Hal ini menunjukkan bahwa sinbiotik memiliki efek anti-inflamasi yang kuat, terjadi pada tingkat sistemik dan lokal di dalam usus.

Pemeriksaan mikrobiota di saluran pencernaan juga mengungkapkan bahwa intervensi sinbiotik menyebabkan peningkatan proporsi bakteri bermanfaat seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, sekaligus menyebabkan penurunan persentase bakteri patogen. Perubahan ini dikaitkan dengan peningkatan kesehatan usus serta pengurangan peradangan. Temuan penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa sinbiotik berpotensi meringankan peradangan di usus, meningkatkan keseimbangan mikrobiota di usus, dan meningkatkan kesehatan usus secara umum. Temuan yang

disajikan di sini menunjukkan potensi sinbiotik sebagai terapi tambahan yang berhasil dalam pengelolaan gangguan inflamasi kronis seperti penyakit Crohn. Selain itu, temuan ini memberikan landasan untuk penyelidikan lebih lanjut pada subjek manusia.

3. Kurnia Kadir dkk. (2021): efek sinbiotik ekstrak kulit pisang persik dan *Lactobacillus plantarum*


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek sinbiotik yang dihasilkan dari ekstrak kulit *Musa paradisiaca* balbasiana dan *Lactobacillus plantarum* terhadap jumlah bakteri coliform dan keadaan hematologis Mencit (*Mus musculus*) ICR jantan. Dua puluh cakaran jantan digunakan dalam penyelidikan, dan dipisahkan menjadi enam kelompok perlakuan: kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, dan empat kelompok perlakuan dengan konsentrasi sinbiotik dua persen, empat persen, enam persen, dan delapan persen. Goresan diinfeksi selama 19 hari, dan sampel feses dikumpulkan pada hari ke 0, hari ke 3, hari ke 6, hari ke 9, dan hari ke 12 dengan tujuan untuk menentukan jumlah total bakteri koliform pada media selektif. Selain itu, sampel darah dikumpulkan pada hari terakhir untuk tujuan pengujian status hematologis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak kulit pisang sinbiotik dengan *Lactobacillus plantarum* mampu menurunkan jumlah bakteri koliform secara signifikan dibandingkan dengan kelompok yang berperan sebagai kontrol negatif. Misalnya pada kelompok yang memiliki konsentrasi sinbiotik 2%, jumlah koloni bakteri koliform menurun dari $9,6 \times 10^4$ cfu/ml menjadi $2,1 \times 10^5$ cfu/ml. Sedangkan pada kelompok yang berperan sebagai kontrol negatif, jumlah koloni bakteri koliform mencapai $2,0 \times 10^6$ cfu/ml. Fakta bahwa hal ini terjadi menunjukkan bahwa sinbiotik sangat membantu dalam menurunkan jumlah bakteri berbahaya yang ada di usus.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan status hematologi, nilai hematokrit, jumlah hemoglobin, dan jumlah eritrosit pada kelompok yang mendapat terapi simbiosis semuanya berada dalam batas normal. Dengan informasi ini, jelas bahwa sinbiotik berpotensi membantu menjaga kondisi hematologis skrotum yang ideal, yang penting untuk kesehatan secara umum.

Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sinbiotik yang berasal dari ekstrak kulit pisang dan *Lactobacillus plantarum* berpotensi berhasil menurunkan jumlah bakteri koliform

dan memperbaiki keadaan hematologis kerokan ICR pria. Melalui penguatan obstruksi membran mukosa usus dan modulasi mikrobiota usus, hasilnya menunjukkan potensi sinbiotik sebagai agen bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan gangguan hematologis. Mengingat hal ini, sinbiotik berpotensi menjadi solusi terhadap kesulitan yang berhubungan dengan kesehatan saluran cerna dan meningkatkan kualitas hidup.



BAB IV

SINBIOTIK DALAM PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT INFEKSI

A. Sinbiotik dalam Modulasi Sistem Kekebalan Tubuh

Dalam proses pengaturan sistem kekebalan tubuh, sinbiotik yang merupakan campuran probiotik dan prebiotik memegang peranan penting. Mekanisme aktivitas sinbiotik dalam regulasi imun meliputi peningkatan respon imun adaptif dan bawaan, serta pembentukan keseimbangan antara respon pro-inflamasi dan anti-inflamasi. *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* merupakan dua contoh probiotik yang memiliki kemampuan merangsang sel imun pada membran mukosa. Sel-sel ini termasuk makrofag, sel dendritik, dan limfosit. Stimulasi ini menyebabkan peningkatan produksi sitokin, yang penting untuk respon imunologi yang efisien. Di sisi lain, prebiotik berfungsi sebagai substrat bagi bakteri menguntungkan yang hidup di saluran pencernaan. Hal ini mengakibatkan peningkatan sintesis asam lemak rantai pendek (SCFA), seperti butirat, yang memiliki efek imunomodulator.

Penelitian telah menunjukkan bahwa probiotik memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi sel T regulator (Treg), yaitu sel yang bertugas mengatur respon imunologi berlebihan dan meningkatkan toleransi imun. Sel Treg bertanggung jawab atas produksi sitokin antiinflamasi termasuk IL-10 dan TGF- β , yang membantu pencegahan respons autoimun dan alergi. Selain itu, asam

lemak rantai pendek (SCFA) yang dibuat oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik memiliki kapasitas untuk memperkuat membran mukosa saluran usus dan menurunkan permeabilitas saluran usus, sehingga mencegah masuknya patogen dan racun. sirkulasi sistemik (Furusawa et al., 2013).

Probiotik seperti *Lactobacillus rhamnosus* dan *Bifidobacterium breve* memiliki kemampuan untuk meningkatkan aktivitas makrofag, sel dendritik, dan sel pembunuh alami (sel NK), yang semuanya merupakan komponen penting dari mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi. Selain itu, probiotik memiliki kemampuan untuk meningkatkan sintesis antibodi IgA di mukosa usus, yang berperan dalam pencegahan infeksi dan pemblokiran patogen (Gill et al., 2001).

Lebih lanjut, sinbiotik berpotensi membantu pengaturan keseimbangan antara sel tiroid helper 1 (Th1) dan helper 2 (Th2). Penyakit yang bersifat autoimun atau alergi dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan sistem imun Th1 dan Th2. Menurut Borrueal et al. (2002), sinbiotik memiliki kemampuan untuk membantu menjaga keseimbangan imunologi yang sehat dan mencegah perkembangan penyakit inflamasi dan autoimunistik. Hal ini dicapai dengan meningkatkan jumlah sel Treg dan memoderasi aktivitas sel Th1 dan Th2.

Secara umum, sinbiotik menawarkan efek modulasi kekebalan yang cukup besar dengan memanfaatkan campuran metode yang melibatkan probiotik dan prebiotik. Sinbiotik memiliki kemampuan untuk membantu meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi dan menurunkan risiko penyakit inflamasi dan autoimun. Mereka melakukan ini dengan meningkatkan sintesis asam lemak rantai pendek (SCFA), memperkuat penghalang mukosa, dan memodulasi respon imun dengan kehadirannya. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menentukan kombinasi sinbiotik yang paling berhasil dan untuk memahami proses fungsinya dalam berbagai penyakit klinis.

B. Penggunaan Sinbiotik dalam Pencegahan Penyakit Infeksi

Ada kemungkinan bahwa simbiosis memainkan peran penting dalam pencegahan berbagai penyakit menular. Dengan memperkuat penghalang selaput lendir dan meningkatkan respon imun, sinbiotik berpotensi membantu perlindungan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh patogen. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa probiotik adalah cara yang efektif untuk menurunkan jumlah

kasus penyakit pernafasan dan pencernaan. Suplemen probiotik, misalnya, telah terbukti menurunkan kejadian diare yang disebabkan oleh *Clostridium difficile* dan rotavirus pada anak-anak dan orang dewasa, menurut penelitian (Achar & Richards, 2012; Gupta & Khanna, 2014; Penit et al., 2016).

Selain itu, sinbiotik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan respons imunologi mukosa, yang pada gilirannya membantu pencegahan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Menurut sejumlah penelitian, probiotik seperti *Lactobacillus rhamnosus* berpotensi mengurangi intensitas dan frekuensi gejala mirip influenza pada anak-anak dan orang dewasa. Prebiotik juga berperan dalam pencegahan infeksi dengan mendorong pertumbuhan bakteri menguntungkan di usus. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk mencegah kolonisasi patogen melalui penggunaan kompetisi nutrisi dan penciptaan metabolit antimikroba (Y. Wang & Kasper, 2014).

Berdasarkan temuan penelitian lain, penggunaan sinbiotik berpotensi mengurangi terjadinya infeksi saluran kemih pada wanita yang sebelumnya pernah mengalami infeksi berulang. Probiotik, seperti *Lactobacillus crispatus*, memiliki kemampuan untuk mengkolonisasi mukosa vagina dan uretra, membatasi pertumbuhan patogen seperti *Escherichia coli*, dan menurunkan jumlah kasus infeksi saluran kemih (Reid et al., 2003). Melalui penguatan penghalang mukosa dan peningkatan fungsi imunologi, kombinasi sinbiotik ini menunjukkan dampak sinergis dalam melindungi tubuh terhadap infeksi.

Dengan mempertimbangkan sinbiotik, mereka menyediakan metode yang aman dan efisien untuk pencegahan penyakit menular. Hal ini dicapai melalui sejumlah proses imunomodulator dan penguatan penghalang mukosa. Sinbiotik mempunyai potensi untuk menjadi tambahan yang menguntungkan bagi strategi pencegahan infeksi karena mereka mempunyai kemampuan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko infeksi menjajah tubuh.

C. Studi Kasus dan Analisis Klinis Sinbiotik pada Model Hewan dan Manusia yang Terinfeksi Enteropathogenic *Escherichia coli* (EPEC)

Sinbiotik telah terbukti bermanfaat dalam menurunkan infeksi yang disebabkan oleh *Enteropathogenic Escherichia coli* (EPEC), bakteri utama penyebab diare, khususnya pada bayi dan anak-anak,

berdasarkan studi kasus dan analisis klinis.

1. Cruchet et al. (2015): penggunaan probiotik dalam gastroenterologi pediatrik

Penggunaan sinbiotik sebagai sarana memerangi infeksi *Enteropathogenic Escherichia coli* (EPEC) telah terbukti memberikan hasil yang menggembirakan dalam penelitian yang dilakukan pada model hewan, khususnya tikus. Efek sinbiotik pada tikus yang terinfeksi EPEC dieksplorasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Cruchet et al. (2015). Tikus yang terinfeksi EPEC dipisahkan menjadi dua kelompok: satu kelompok diberi sinbiotik; sinbiotik ini adalah campuran *Lactobacillus rhamnosus* dan inulin. Kelompok lainnya diberi obat plasebo. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tikus yang diberi sinbiotik mengalami penurunan yang cukup besar dalam jumlah kolonisasi EPEC yang ditemukan di ususnya, selain penurunan gejala diare jika dibandingkan dengan kelompok yang berperan sebagai kontrol.

- **Desain penelitian:** Penelitian ini menggunakan desain eksperimental dengan model tikus yang diinfeksi EPEC. Tikus diacak menjadi dua kelompok perlakuan untuk memastikan distribusi yang merata dan mengurangi bias.
- **Kelompok perlakuan:**
 - Kelompok pertama (kelompok sinbiotik) menerima kombinasi *Lactobacillus rhamnosus* dan inulin dalam dosis tertentu yang telah ditentukan berdasarkan studi sebelumnya tentang dosis efektif.
 - Kelompok kedua (kelompok kontrol) menerima plasebo yang tidak mengandung probiotik atau prebiotik.
- **Prosedur infeksi:** Tikus diinfeksi dengan strain virulen EPEC melalui jalur oral untuk meniru jalur infeksi alami. Infeksi EPEC pada tikus menyebabkan gejala gastrointestinal yang mirip dengan yang diamati pada manusia, termasuk diare dan inflamasi mukosa usus.
- **Durasi dan pengamatan:** Penelitian berlangsung selama beberapa minggu, dengan pengamatan harian terhadap kondisi kesehatan tikus, termasuk gejala diare, berat badan, dan tanda-tanda umum kesehatan. Sampel feses diambil secara berkala untuk mengukur jumlah EPEC yang dikolonisasi di usus melalui metode kultur mikrobiologis.

Hasil penelitian

- **Penurunan kolonisasi EPEC:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tikus yang menerima sinbiotik mengalami penurunan signifikan dalam kolonisasi EPEC di usus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Analisis mikrobiologis dari sampel feses menunjukkan penurunan jumlah koloni EPEC secara signifikan pada tikus yang diberikan sinbiotik.
- **Pengurangan Gejala Diare:** Tikus yang diberikan sinbiotik menunjukkan pengurangan gejala diare yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Frekuensi dan konsistensi tinja tikus yang menerima sinbiotik lebih baik, menunjukkan efektivitas sinbiotik dalam mengurangi keparahan gejala infeksi gastrointestinal.
- **Peningkatan kesehatan mukosa usus:** Analisis histopatologi menunjukkan bahwa tikus yang menerima sinbiotik memiliki kondisi mukosa usus yang lebih baik, dengan penurunan infiltrasi sel-sel inflamasi dan peningkatan integritas penghalang mukosa. Ini menunjukkan bahwa sinbiotik membantu memperbaiki kerusakan mukosa yang disebabkan oleh infeksi EPEC.
- **Mekanisme Aksi:** Studi ini menunjukkan bahwa kombinasi probiotik dan prebiotik dapat secara efektif mengurangi patogenitas EPEC melalui berbagai mekanisme:
 - **Penguatan penghalang mukosa:** *Lactobacillus rhamnosus* dan inulin meningkatkan produksi mucin oleh sel goblet, yang membentuk lapisan pelindung di permukaan mukosa usus, mengurangi invasi patogen.
 - **Peningkatan Respon Imun Lokal:** Probiotik merangsang sel-sel imun mukosa seperti makrofag dan sel dendritik untuk meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi, yang membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan respon imun terhadap patogen.
 - **Kompetisi nutrisi:** Probiotik dan prebiotik menyediakan substrat yang mendukung pertumbuhan bakteri menguntungkan, yang bersaing dengan patogen seperti EPEC untuk nutrisi dan ruang hidup, menghambat kolonisasi patogen.
- **Kesimpulan:** Studi oleh Cruchet et al. (2015) menunjukkan

bahwa sinbiotik, yang terdiri dari kombinasi probiotik *Lactobacillus rhamnosus* dan inulin prebiotik, berpotensi memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap infeksi EPEC pada tikus. Sinbiotik memiliki potensi besar sebagai agen terapeutik karena mengandung mekanisme yang meningkatkan penghalang mukosa, serta meningkatkan respon imun lokal dan kompetisi nutrisi. Hal ini menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk mengurangi kolonisasi patogen dan gejala penyakit gastrointestinal. Data ini mendukung gagasan bahwa lebih banyak penelitian klinis harus dilakukan untuk menguji kemanjuran sinbiotik dalam mengobati infeksi EPEC pada manusia.

2. (Nur et al., 2024): Efek imunomodulator dari sinbiotik bakteri asam laktat dari Dangke dan inulin umbi Dahlia

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati Nur dan rekan-rekannya bertujuan untuk mengeksplorasi efek imunomodulator sinbiotik yang terdiri dari bakteri asam laktat dari Dangke dan inulin dari umbi Dahlia pada tikus yang diinfeksi *Enteropathogenic Escherichia coli* (EPEC). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif eksperimental untuk mengamati efek pemberian sinbiotik pada berat badan dan respon imun tikus.

- **Desain Penelitian:** Penelitian ini menggunakan desain eksperimental dengan pola rancangan acak lengkap. Empat kelompok tikus digunakan dalam penelitian ini:
 - Kelompok kontrol negatif (P0) yang tidak menerima sinbiotik.
 - Kelompok perlakuan P1 yang menerima sinbiotik dengan dosis 0,25 mL/30gBB.
 - Kelompok perlakuan P2 yang menerima sinbiotik dengan dosis 0,5 mL/30gBB.
 - Kelompok perlakuan P3 yang menerima sinbiotik dengan dosis 0,75 mL/30gBB.
- **Prosedur infeksi:** Tikus diinfeksi dengan EPEC melalui jalur oral untuk meniru jalur infeksi alami. Setelah infeksi, tikus diberi perlakuan sinbiotik sesuai dengan kelompoknya.
- **Pengamatan:** Pengamatan dilakukan untuk mengevaluasi perubahan berat badan, aktivitas fagositosis makrofag, dan indeks organ (hati dan limpa). Data dikumpulkan sebelum dan

setelah perlakuan untuk memantau perubahan yang terjadi.

- **Pengukuran berat badan:** Pengukuran berat badan dilakukan sebelum dan setelah perlakuan untuk menentukan efek sinbiotik terhadap pertumbuhan tikus.
- **Aktivitas fagositosis makrofag:** Aktivitas fagositosis diukur menggunakan suspensi karbon untuk mengevaluasi kemampuan makrofag dalam menelan patogen.
- **Indeks organ:** Indeks organ hati dan limpa diukur dengan menghitung rasio berat organ terhadap berat badan total tikus.
- **Analisis Data:** Data dianalisis menggunakan ANOVA satu arah dan uji post-hoc Duncan untuk menentukan perbedaan signifikan antar kelompok dengan nilai signifikan ditetapkan pada $p < 0.05$.

Hasil penelitian

- **Perubahan berat badan:** Tikus dalam kelompok P1 dan P2 menunjukkan peningkatan berat badan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa sinbiotik dapat meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi di usus yang didukung oleh kombinasi probiotik dan prebiotik.
- **Aktivitas fagositosis makrofag:** Kelompok tikus yang menerima sinbiotik menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas fagositosis makrofag dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ini menunjukkan bahwa sinbiotik dapat meningkatkan respon imun bawaan dengan meningkatkan kemampuan makrofag untuk menelan dan menghancurkan patogen.
- **Indeks organ:** Indeks hati dan limpa menunjukkan peningkatan signifikan dalam kelompok yang menerima sinbiotik, yang menunjukkan bahwa sinbiotik memiliki efek positif pada kesehatan organ-organ ini. Peningkatan indeks organ menunjukkan bahwa sinbiotik dapat mengurangi peradangan dan mendukung fungsi organ yang lebih baik.

Studi ini menunjukkan bahwa kombinasi probiotik dari bakteri asam laktat *Danke* dan prebiotik inulin dari umbi Dahlia dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap infeksi EPEC pada model hewan. Beberapa mekanisme yang terlibat dalam efek

protektif sinbiotik ini termasuk:

- **Penguatan penghalang mukosa:** Sinbiotik meningkatkan produksi mucin oleh sel goblet di usus, yang membentuk lapisan pelindung dan mengurangi invasi patogen.
- Peningkatan respon imun lokal: Probiotik merangsang sel-sel imun mukosa seperti makrofag dan sel dendritik untuk meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi, membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan respon imun terhadap patogen.
- **Kompetisi nutrisi:** Prebiotik menyediakan substrat yang mendukung pertumbuhan bakteri menguntungkan yang bersaing dengan patogen seperti EPEC untuk nutrisi dan ruang hidup, menghambat kolonisasi patogen.

Hasil penelitian ini mendukung potensi sinbiotik sebagai agen terapeutik yang efektif dalam mengurangi kolonisasi patogen dan gejala infeksi gastrointestinal. Penelitian lebih lanjut dengan kontrol yang lebih ketat dan analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk memvalidasi temuan ini dan mengeksplorasi aplikasi klinis sinbiotik dalam pengobatan infeksi EPEC pada manusia.

3. Cremonini et al. (2002): meta-analisis: pengaruh pemberian probiotik pada diare terkait antibiotik

Penelitian ini adalah meta-analisis yang meneliti efek pemberian probiotik pada diare yang terkait dengan penggunaan antibiotik. Penelitian ini dilakukan oleh (Cremonini et al., 2002) dan diterbitkan dalam jurnal *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*.

- **Desain penelitian:** Penelitian ini adalah meta-analisis, yang berarti bahwa peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai studi yang telah dipublikasikan sebelumnya untuk mengevaluasi efek probiotik pada diare yang terkait dengan penggunaan antibiotik.
- **Sumber data:** Data diambil dari berbagai studi klinis yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan. Studi-studi yang dianalisis harus melibatkan pemberian probiotik kepada pasien yang menerima terapi antibiotik dan melaporkan kejadian diare sebagai salah satu hasil penelitian.
- **Analisis data:** Data dari studi yang memenuhi kriteria inklusi

dianalisis secara statistik untuk menentukan efek gabungan dari probiotik pada kejadian diare terkait antibiotik. Analisis ini menggunakan model efek acak untuk memperhitungkan variabilitas antara studi.

Hasil penelitian

- **Pengurangan Kejadian Diare:** Hasil meta-analisis menunjukkan bahwa pemberian probiotik secara signifikan mengurangi kejadian diare terkait antibiotik. Pasien yang menerima probiotik memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami diare dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima probiotik.
- **Jenis Probiotik yang Digunakan:** Berbagai jenis probiotik digunakan dalam studi-studi yang dianalisis, termasuk spesies *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, dan *Saccharomyces*. Semua jenis probiotik yang dianalisis menunjukkan efek protektif terhadap diare terkait antibiotik.
- **Keamanan:** Probiotik yang digunakan dalam studi-studi ini umumnya dianggap aman, dengan sedikit atau tanpa efek samping yang dilaporkan. Ini menunjukkan bahwa probiotik adalah intervensi yang aman untuk mencegah diare terkait antibiotik.

Studi meta-analisis oleh (Cremonini et al., 2002) menunjukkan bahwa pemberian probiotik adalah strategi yang efektif untuk mencegah diare yang terkait dengan penggunaan antibiotik. Probiotik bekerja dengan cara mengembalikan keseimbangan mikrobiota usus yang terganggu oleh antibiotik, menghambat pertumbuhan patogen, dan memperkuat penghalang mukosa usus.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi klinis yang signifikan, terutama dalam konteks pengelolaan pasien yang menerima terapi antibiotik. Dengan mengurangi kejadian diare terkait antibiotik, probiotik dapat meningkatkan kenyamanan pasien, mengurangi kebutuhan untuk perawatan tambahan, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan.

4. Shimizu et al. (2018) tentang sinbiotik dalam modifikasi mikrobiota usus dan Pencegahan Pneumonia pada Pasien Sepsis

Peneliti ini menyelidiki efek sinbiotik pada remodeling mikrobiota usus dan pencegahan pneumonia pada pasien sepsis yang diintubasi mekanis di unit perawatan intensif. Pasien dengan epilepsi


yang diintubasi dalam waktu tiga hari setelah dirawat pada unit perawatan intensif berpartisipasi dalam uji coba, yang memiliki desain acak terkontrol. Para pasien dipisahkan menjadi dua kelompok: kelompok yang diberi sinbiotik, yang meliputi campuran *Bifidobacterium breve* strain Yakult, *Lactobacillus casei* strain Shirota, dan galactooligosakarida; dan kelompok yang berperan sebagai kelompok kontrol dan tidak menerima sinbiotik. Setelah pasien dirawat di unit perawatan intensif, pemberian simbiosis dimulai dalam waktu tiga hari dan berlanjut hingga pasien mulai makan melalui mulut.

Jika dibandingkan dengan kelompok kontrol, kelompok sinbiotik mempunyai insiden enteritis yang jauh lebih rendah (6,3% berbanding 27,0%), seperti yang ditunjukkan oleh temuan penelitian. Selain itu, kejadian pneumonia terkait ventilator (VAP) lebih rendah pada kelompok sinbiotik (14,3% berbanding 48,6%), yang merupakan temuan lain yang menguntungkan. Selama minggu pertama penelitian, kelompok sinbiotik menunjukkan peningkatan jumlah asam organik, khususnya asetat, serta peningkatan jumlah *Bifidobacterium* dan *Lactobacillus*, menurut analisis mikrobiota tinja. Sinbiotik diyakini dapat berperan dalam membatasi kolonisasi patogen dan peradangan pada mukosa dengan memperkuat selaput lendir yang melapisi saluran pencernaan dan meningkatkan respon imun di tingkat lokal.

Studi ini juga menemukan bahwa kelompok sinbiotik mengalami penurunan keseluruhan kejadian komplikasi infeksi (28,6% vs 67,6%), meskipun faktanya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok dalam hal kejadian bakteremia atau kematian. Berdasarkan temuan ini, tampak bahwa pemberian sinbiotik memiliki kemampuan tidak hanya untuk berhasil mengubah mikrobiota dan lingkungan usus, namun juga berpotensi memiliki dampak pencegahan terhadap terjadinya enteritis dan pneumonia terkait ventilator pada pasien yang menderita penyakit ini. menderita sepsis.

Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa sinbiotik berpotensi meningkatkan jumlah bakteri bermanfaat serta konsentrasi asam organik penting seperti asetat, yang dapat membantu mengurangi peradangan dan kesulitan yang berhubungan dengan penyakit menular. Oleh karena itu, sinbiotik berpotensi digunakan sebagai terapi tambahan dalam perawatan pasien sepsis untuk mengurangi berkembangnya masalah infeksi, meningkatkan keseimbangan mikrobiota di saluran pencernaan, dan meningkatkan hasil klinis

pasien. Hasil penelitian ini membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut untuk dilakukan guna memvalidasi mekanisme tertentu dan keuntungan jangka panjang penggunaan sinbiotik pada kelompok pasien yang lebih luas (Shimizu et al., 2018).



BAB V

SINBIOTIK DAN KESEHATAN METABOLIK

A. Peran Sinbiotik Dalam Regulasi Metabolisme

Sinbiotik yang merupakan kombinasi probiotik dan prebiotik, memainkan peran yang sangat krusial dalam regulasi metabolisme tubuh. Mekanisme kerja sinbiotik melibatkan interaksi kompleks antara mikrobiota usus, metabolit yang dihasilkan, dan sistem metabolisme inang.

1. Interaksi sinbiotik dan mikrobiota usus

Gabungan probiotik dan prebiotik dalam sinbiotik, mendorong pertumbuhan bakteri baik seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, yang diperlukan untuk berfungsinya metabolisme tubuh dan kesehatan usus. Sebagai substrat fermentasi, prebiotik dalam sinbiotik bertanggung jawab atas produksi produk metabolit primer asam lemak rantai pendek (SCFA), yang meliputi asetat, propionat, dan butirrat. Dalam hal metabolisme energi dan kesehatan metabolisme, asam lemak rantai pendek (SCFA) ini menawarkan sejumlah dampak menguntungkan.

Pertama, SCFA memiliki kemampuan untuk meningkatkan oksidasi lemak, yang berarti tubuh mampu membakar lemak untuk

menghasilkan energi dengan lebih efektif. SCFA meningkatkan oksidasi lemak, yang pada gilirannya membantu mengurangi kelebihan lemak tubuh. Ini adalah faktor kunci dalam pencegahan obesitas dan penyakit metabolik yang terkait dengannya. Manfaat lebih lanjut dari SCFA adalah menghambat produksi lemak di hati. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh menyimpan lebih sedikit lemak, sehingga mengurangi risiko pembentukan lemak berlebih dan meningkatkan profil lipid darah. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa tubuh menyimpan lebih sedikit lemak secara keseluruhan (Krajmalnik-Brown et al., 2012).

SCFA tidak hanya mempengaruhi metabolisme lemak, tetapi juga meningkatkan sensitivitas insulin. Telah dibuktikan bahwa ekspresi pengangkut glukosa di otot dan hati dapat ditingkatkan dengan adanya butirir dan propionat, dua jenis asam lemak rantai pendek (SCFA) yang dihasilkan oleh fermentasi prebiotik. Hasilnya, sel-sel tubuh menjadi lebih mudah menerima insulin, sehingga memfasilitasi pengaturan kadar gula darah dan mengurangi kemungkinan berkembangnya resistensi insulin dan diabetes tipe 2. (2017) Menurut Weitkunat dkk. Salah satu mekanisme terpenting dalam pengelolaan dan pencegahan penyakit metabolik seperti sindrom metabolik dan diabetes adalah peningkatan sensitivitas insulin tubuh.

Mereka memiliki kemampuan untuk menurunkan produksi sitokin yang memicu peradangan, seperti TNF- α dan IL-6, sekaligus meningkatkan produksi sitokin yang menghambat peradangan, seperti IL-10. SCFA membantu menurunkan risiko penyakit kronis yang berhubungan dengan peradangan, seperti obesitas, penyakit kardiovaskular, dan sindrom metabolik. Hal ini disebabkan oleh kemampuan SCFA untuk mengurangi peradangan sistemik. Penghalang mukosa usus juga diperkuat oleh SCFA, yang membatasi perpindahan bakteri patogen dan racun ke dalam sirkulasi sistemik. Hal ini membantu menjaga integritas mukosa usus dan mengurangi jumlah peradangan yang terjadi secara lokal (Cani et al., 2007).

Sinbiotik, berdasarkan kemampuannya menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA), memberikan berbagai manfaat kesehatan, yang mencakup pengelolaan metabolisme energi, peningkatan sensitivitas insulin, dan modulasi respons inflamasi. Berdasarkan temuan ini, tampak bahwa sinbiotik memiliki potensi yang signifikan untuk pencegahan dan pengelolaan berbagai penyakit metabolik, seperti sindrom metabolik, diabetes tipe 2, dan obesitas. Menciptakan lingkungan yang sehat di usus dan

mendukung kesehatan metabolisme secara umum merupakan hasil dari interaksi rumit yang terjadi antara sinbiotik dan mikrobiota saluran usus.

2. Pengurangan sintesis lemak

SCFA mampu mengurangi produksi lemak di hati, selain meningkatkan jumlah lemak yang teroksidasi. Butirat dan propionat adalah contoh asam lemak rantai pendek (SCFA) yang berinteraksi dengan jalur metabolisme di hati untuk menurunkan ekspresi gen yang terlibat dalam lipogenesis, yaitu proses penumpukan lemak. SCFA melakukan hal ini dengan menghambat aktivitas enzim lipogenik seperti asetil-KoA karboksilase dan asam lemak sintase, yang pada gilirannya membatasi jumlah lemak yang diproduksi dan disimpan dalam tubuh. Hal ini sangat penting dalam tindakan pencegahan terhadap penumpukan lemak ekstra, yang dapat menyebabkan obesitas dan sindrom metabolik (Davidson et al., 1998; Davidson & Maki, 1999; Mazloom et al., 2013; Wu et al., 2022; Yamashita et al., 1984).

Peningkatan profil lipid dalam darah juga dipengaruhi oleh berkurangnya produksi lemak yang terjadi akibatnya. SCFA bermanfaat karena membantu menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol LDL, yang disebut sebagai "kolesterol jahat", sekaligus meningkatkan kadar kolesterol HDL, yang disebut sebagai "kolesterol baik". Penurunan risiko penyakit kardiovaskular, yang sering dikaitkan dengan sindrom metabolik, disebabkan oleh perubahan profil lipid.

Fermentasi mikrobiota usus dari prebiotik menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang berkontribusi pada keseimbangan energi yang lebih baik dalam tubuh dengan menghambat produksi lemak dan mendorong oksidasi lemak. Tidak hanya membantu dalam pengendalian berat badan, tetapi juga membantu dalam pencegahan gangguan atau kondisi metabolisme lainnya, seperti diabetes tipe 2. Sinbiotik memiliki potensi yang signifikan sebagai agen terapeutik untuk pengelolaan gangguan metabolisme dan peningkatan kesehatan secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan oleh manfaatnya.

3. Peningkatan sensitivitas insulin

Telah dibuktikan bahwa asam lemak rantai pendek, khususnya butirat dan propionat, dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Terdapat korelasi antara peningkatan sensitivitas insulin dengan

peningkatan respon insulin pada sel-sel tubuh, khususnya pada sel hati dan otot. Insulin adalah hormon yang memainkan peran penting dalam pengendalian kadar gula darah karena kemampuannya memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel, di mana ia dapat digunakan sebagai sumber energi atau disimpan sebagai glikogen. Akibat peningkatan sensitivitas insulin, sel menjadi lebih efisien dalam mengeluarkan gula dari aliran darah. Hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada pengaturan kadar gula darah yang lebih efektif dan penurunan risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2 (Weitkumat et al., 2016).

Untuk meningkatkan sensitivitas insulin, detyrat dan propionat bekerja melalui sejumlah jalur berbeda. Pertama, SCFA memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspresi transporter glukosa tipe 4 (GLUT4) di sel hati dan otot. GLUT4 adalah protein yang bertanggung jawab atas asupan glukosa yang dimediasi oleh insulin. Ketika terjadi peningkatan ekspresi GLUT4, hal ini menunjukkan bahwa sel-sel tersebut mampu mengambil lebih banyak glukosa dari darah. Manfaat kedua SCFA adalah kemampuannya meringankan peradangan kronis tingkat rendah, yang sering dikaitkan dengan resistensi insulin (Gao et al., 2009).

Ekspresi gen yang terlibat dalam metabolisme glukosa dan lipid juga dapat dimodulasi oleh asam lemak rantai pendek (SCFA). Mereka memiliki kemampuan untuk mengaktifkan reseptor yang berhubungan dengan metabolisme energi, seperti PPAR- γ (peroxisome proliferator-activated gamma receptor), yang merupakan komponen penting dalam diferensiasi jaringan adiposa dan proses metabolisme yang melibatkan lipid dan glukosa untuk energi.

Oleh karena itu, asam lemak rantai pendek (SCFA) yang dibentuk oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik memiliki manfaat besar dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Mengingat efek ini penting untuk pencegahan dan pengendalian diabetes tipe 2 serta gangguan lain yang terkait dengannya, sinbiotik berpotensi menjadi agen dalam teknik manajemen kesehatan metabolik.

4. Modulasi respon inflamasi

Selain itu, sinbiotik memiliki sifat anti-inflamasi yang signifikan, yang penting untuk pengaturan metabolisme. Peradangan kronis merupakan suatu kondisi yang sering dikaitkan dengan sindrom metabolik dan obesitas. Ini juga merupakan kontributor signifikan terhadap perkembangan resistensi insulin dan penyakit metabolik

lainnya. Melalui berbagai metode rumit, simbiosis dapat membantu dalam penanganan peradangan ini.

Kontrol produksi sitokin adalah salah satu mekanisme utama dimana sinbiotik mampu menginduksi pengurangan peradangan. Sitokin adalah molekul sinyal yang disekresikan oleh sel kekebalan. Mereka terlibat dalam respons imunologis dan peradangan dan memainkan peran penting dalam kedua mekanisme tersebut. Sinbiotik memiliki kemampuan untuk menurunkan produksi sitokin proinflamasi termasuk TNF- α , IL-6, dan IL-12. Sitokin ini sering meningkat pada penyakit yang ditandai dengan peradangan kronis. Penting untuk dicatat bahwa pengurangan sintesis sitokin proinflamasi ini berkontribusi pada pengurangan respons peradangan berlebihan, yang merupakan kontributor signifikan terhadap patogenesis sindrom metabolik dan obesitas (Cani et al., 2007).

Selain itu, sinbiotik memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar sitokin pro-inflamasi, sekaligus meningkatkan sintesis sitokin anti-inflamasi termasuk IL-10 dan TGF- β . Dengan menekan respons inflamasi dan meningkatkan toleransi imunologis, sitokin antiinflamasi ini mencapai tujuannya dengan baik (Bermudez-Brito et al., 2014; Hu et al., 2016; Kwon et al., 2010; Toshimitsu, 2023).

Respons inflamasi juga dapat dimodulasi oleh asam lemak rantai pendek (SCFA) yang dibuat oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik. Di sisi lain, ia memiliki kemampuan untuk menekan aktivitas NF- κ B, yang merupakan faktor transkripsi yang mengontrol produksi gen yang memicu peradangan. Karena menghambat NF- κ B, hal ini membantu membatasi ekspresi gen yang bertanggung jawab atas peradangan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan peradangan di seluruh tubuh (Tedelind et al., 2007).

Selain itu, sinbiotik memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemblokiran selaput lendir usus, yang merupakan komponen penting dalam pencegahan peradangan. Perpindahan bakteri patogen dan produk mikroba seperti lipopolisakarida (LPS) ke dalam sirkulasi sistemik dapat dihindari dengan mencegah penghalang mukosa tersumbat sepenuhnya. Molekul yang disebut LPS berpotensi menyebabkan peradangan di seluruh tubuh serta resistensi insulin. Ada kemungkinan bahwa sinbiotik dapat meminimalkan kemungkinan translokasi LPS dengan memperkuat membran mukosa. Hal ini akan menghasilkan pengurangan risiko peradangan sistemik dan peningkatan kesehatan metabolisme (Patrice D. Cani et

al., 2008).

Secara umum, sinbiotik memiliki efek antiinflamasi yang berkontribusi pada pengurangan peradangan sistemik dan peningkatan kesehatan metabolisme. Efek ini dicapai melalui pengurangan produksi sitokin pro-inflamasi, peningkatan produksi sitokin anti-inflamasi, modulasi aktivitas NF- κ B, dan penguatan penghalang membran mukosa usus. Potensi sinbiotik sebagai agen terapeutik dalam pengelolaan obesitas, sindrom metabolik, dan gangguan lain yang terkait dengan kondisi ini ditunjukkan oleh mekanisme ini.

B. Pengaruh Sinbiotik Terhadap Obesitas, Diabetes, dan Sindrom Metabolik

1. Obesitas

Suatu kondisi metabolisme rumit yang ditandai dengan penumpukan lemak tubuh berlebihan, obesitas sering dikaitkan dengan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Obesitas merupakan suatu kondisi yang dapat berbeda-beda pada setiap orang. Menurut penelitian, sinbiotik berpotensi membantu pengurangan berat badan dan lemak tubuh melalui berbagai metode berbeda.

Sintesis hormon kenyang seperti GLP-1 (Glucagon-like peptida-1) dan PYY (YY peptida) dapat ditingkatkan dengan konsumsi sinbiotik, yang dapat mengakibatkan penurunan nafsu makan. Hormon-hormon ini bertanggung jawab dalam pengaturan nafsu makan dengan memberikan sinyal ke otak yang akan menyebabkan individu mengonsumsi makanan lebih sedikit (Verdich et al., 2001).

Peningkatan Oksidasi Lemak: Asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti asetat, propionat, dan butirat, yang dibuat oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik, memainkan peran penting dalam proses metabolisme lemak. Asam lemak jenuh ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan oksidasi lemak, yaitu proses pembakaran lemak untuk menghasilkan energi (Wong et al., 2006).

Selain itu, SCFA memiliki kemampuan untuk menurunkan ekspresi gen yang terkait dengan lipogenesis, yaitu proses pembentukan lemak, sehingga mengurangi pembentukan lemak di hati. SCFA membantu menurunkan jumlah lemak yang disintesis dan disimpan dalam tubuh dengan menghambat aktivitas enzim lipogenik seperti asetil-KoA karboksilase dan asam lemak sintase. Hal ini dicapai dengan mengurangi jumlah lemak yang diproduksi.

Selain membantu penurunan berat badan, hal ini juga berkontribusi pada peningkatan profil lipid darah, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemungkinan berkembangnya penyakit kardiovaskular.

Modulasi mikroflora di saluran usus Sinbiotik membantu menjaga keseimbangan mikrobiota yang sehat di saluran usus dengan meningkatkan jumlah bakteri menguntungkan seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* yang hidup di sana. Peradangan sistemik yang sering dikaitkan dengan sindrom metabolik dan obesitas dapat diminimalkan dengan menjaga keseimbangan mikroba yang sehat. Selain itu, mikroflora yang seimbang di saluran pencernaan membantu metabolisme energi lebih efektif dan meningkatkan pengelolaan berat badan (Turnbaugh et al., 2006).

2. Diabetes tipe 2

Gangguan metabolisme yang dikenal sebagai diabetes tipe 2 ditandai dengan resistensi insulin dan perubahan metabolisme glukosa, yang keduanya berkontribusi terhadap peningkatan kadar glukosa dalam darah. Penelitian telah menunjukkan bahwa sinbiotik berpotensi memainkan peran penting dalam pengelolaan diabetes tipe 2 dengan meningkatkan kontrol glikemik dan sensitivitas insulin melalui sejumlah jalur berbeda.

a. Peningkatan Sensitivitas Insulin

Butirat dan propionat adalah contoh asam lemak rantai pendek (SCFA) yang dibuat oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik. SCFA ini berdampak besar pada peningkatan sensitivitas insulin. Terdapat bukti bahwa butirat dan propionat memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspresi transporter glukosa tipe 4 (GLUT4) di hati dan otot. Ada protein yang disebut GLUT4 yang bertanggung jawab atas proses penyerapan glukosa dari darah ke dalam sel. Proses ini penting untuk menurunkan kadar gula dalam darah (Gao et al., 2009; Nur et al., 2023).

Selain itu, asam lemak rantai pendek memiliki kemampuan untuk mengaktifkan reseptor PPAR- γ , yang merupakan reseptor gamma yang diaktifkan oleh proliferasi peroksisom. Reseptor ini sangat penting dalam metabolisme lipid dan glukosa. Pada penderita diabetes tipe 2, kombinasi proses ini membantu menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatur kadar gula darah (Haro et al., 2019; Walzem et al., 2007; H. Wang et al., 2017).

b. Terjadi penanganan peradangan

Resistensi insulin dan perkembangan diabetes tipe 2 disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah peradangan kronis di seluruh tubuh. Melalui berbagai metode berbeda, simbiosis berpotensi membantu menurunkan peradangan sistemik. Probiotik, termasuk *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi seperti IL-10 dan TGF- β , sekaligus mengurangi produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF- α dan IL-6. Sinbiotik dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan kesehatan metabolisme secara umum dengan menurunkan peradangan (Bao & Wu, 2021; Laparra & Sanz, 2010; Patel et al., 2023). Sinbiotik juga membantu meningkatkan kondisi metabolisme secara keseluruhan.

SCFA, yang terbentuk dari fermentasi prebiotik, juga berperan dalam mengendalikan peradangan. Dengan menekan faktor nuklir kappa B (NF- κ B), butirrat mampu menurunkan produksi gen penyebab peradangan. Hal ini, pada gilirannya, membantu mengurangi peradangan sistemik dan meningkatkan sensitivitas insulin (Huang et al., 2023; Kim et al., 2018; Liang & Qin, 2012; Pagnini et al., 2010).

c. Peningkatan Kesehatan Metabolik

Selain membantu pengelolaan kadar glukosa darah, sinbiotik juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan metabolisme secara keseluruhan. Hal ini dicapai dengan menurunkan peradangan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Risiko komplikasi yang berhubungan dengan diabetes, seperti penyakit kardiovaskular, nefropati, dan neuropati, dapat dikurangi dengan meningkatkan kontrol glikemik dan menurunkan resistensi insulin.

3. Sindrom metabolik

Sindrom metabolik adalah kumpulan kondisi yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes. Komponen utama sindrom metabolik meliputi obesitas sentral, hipertensi, hiperglikemia, dan dislipidemia. Sinbiotik, yang merupakan kombinasi probiotik dan prebiotik, dapat membantu mengelola sindrom metabolik melalui berbagai mekanisme.

a. Peningkatan profil lipid

Sinbiotik mempunyai kemampuan untuk memperbaiki profil lipid darah, yang meliputi peningkatan kadar HDL (High-Density Lipoprotein) dan penurunan kadar LDL (Low-Density Lipoprotein), serta peningkatan kadar trigliserida. Ini adalah salah satu

keuntungan paling signifikan dari sinbiotik. Risiko penyakit kardiovaskular, yang merupakan komponen penting dari sindrom metabolik, dapat dikurangi dengan menjaga profil lipid yang lebih baik, sehingga menambah penurunan risiko secara keseluruhan.

Probiotik seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* yang terdapat pada sinbiotik mempunyai kemampuan memfermentasi prebiotik menjadi asam lemak rantai pendek (SCFA) yang meliputi butirat, asetat, dan propionat. Penurunan produksi kolesterol di hati adalah salah satu proses utama yang terkait dengan kondisi ini. Enzim HMG-CoA reduktase, yang merupakan komponen penting dari jalur produksi kolesterol, dapat dihambat oleh asam lemak rantai pendek (SCFA), khususnya propionat. Melalui penghambatan enzim ini, SCFA mampu menurunkan pembentukan kolesterol endogen (Nur et al., 2021; Wong et al., 2006).

Selain menurunkan sintesis kolesterol, SCFA juga dapat meningkatkan sekresi kolesterol melalui tinja sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah kolesterol yang dikeluarkan. Melalui kemampuannya mengikat kolesterol di usus, probiotik dapat mencegah kolesterol diserap kembali ke dalam sirkulasi sistemik. Kolesterol yang terikat kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui buang air besar, yang mengakibatkan penurunan kadar kolesterol keseluruhan dalam tubuh (Song et al., 2023; Wu et al., 2022).

Karena perannya dalam mengangkut kolesterol dari jaringan dan arteri darah kembali ke hati, di mana kolesterol tersebut dapat dipecah dan dikeluarkan dari tubuh, kadar HDL meningkat. HDL juga dikenal sebagai kolesterol. Meningkatkan kadar HDL, yang membantu mencegah penumpukan kolesterol di arteri dan mengurangi risiko aterosklerosis, merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan sinbiotik. Jumlah HDL yang lebih tinggi ini telah dikaitkan dengan aktivitas probiotik, yang telah terbukti memodulasi metabolisme lipid dan meningkatkan efisiensi transportasi balik kolesterol (klorida yang diangkut mundur).

Kolesterol tipe LDL merupakan faktor berkembangnya plak aterosklerotik di arteri, yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Kadar trigliserida juga berkurang. Melalui pengurangan produksi kolesterol dan peningkatan ekskresi kolesterol, sinbiotik mempunyai kemampuan untuk menurunkan kadar LDL. Selain itu, asam lemak rantai pendek (SCFA) yang dihasilkan selama fermentasi prebiotik memiliki kemampuan untuk

menurunkan kadar trigliserida. Hal ini dicapai dengan menekan proses sintesis trigliserida di hati dan dengan meningkatkan oksidasi lemak di jaringan perifer (Dai et al., 2022; Gomes et al., 2014).

Oleh karena itu, sinbiotik memainkan peran penting dalam proses meningkatkan profil lipid melalui berbagai proses yang mempengaruhi sintesis, ekskresi, dan transportasi trigliserida dan kolesterol.

b. Regulasi tekanan darah

Bakteri di saluran pencernaan bertanggung jawab atas produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang memiliki efek vasodilatasi. Artinya, mereka dapat membantu pelebaran pembuluh darah dan peningkatan aliran darah. Dalam hal pengaturan tekanan darah, dampaknya sangat signifikan, terutama pada mereka yang menderita sindrom metabolik dan sering mengalami hipertensi.

SCFA seperti butirat dan propionat memiliki fungsi dalam pengaturan tekanan darah dengan menginduksi relaksasi otot polos arteri darah. Dengan mengaktifkan reseptor protein G yang terkait dengan protein GPR41 dan GPR43 yang terletak di dinding vena, SCFA ini berpotensi memberikan efek pada sel otot polos (Dai et al., 2022; Gomes et al., 2014). Akibat vasodilatasi ini, resistensi perifer berkurang, yang pada gilirannya menurunkan tekanan darah.

Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi sinbiotik dapat menurunkan tekanan darah sistolik atau diastolik secara signifikan pada penderita hipertensi. Penurunan ini dapat dilihat pada tekanan darah sistolik dan diastolik. Tekanan darah diukur dengan dua cara berbeda, tekanan darah sistolik adalah tekanan yang terjadi saat jantung berkontraksi, dan tekanan darah diastolik adalah tekanan yang terjadi saat jantung istirahat di sela-sela kontraksi. Sinbiotik membantu mengurangi stres pada jantung dan risiko masalah kardiovaskular dengan menurunkan kedua bentuk tekanan darah. Hal ini dicapai dengan menurunkan kedua jenis tekanan darah (Dai et al., 2022; Gomes et al., 2014).

Selain tindakan vasodilatasi langsungnya, SCFA juga memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan, yang keduanya menyebabkan penurunan tekanan darah. Telah diketahui bahwa stres oksidatif dan peradangan kronis adalah dua faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan hipertensi. Sintesis sitokin pro inflamasi dapat dikurangi dengan SCFA, sedangkan produksi sitokin anti inflamasi dapat ditingkatkan. Hal ini menghasilkan pengurangan tingkat

peradangan secara keseluruhan. SCFA berpotensi memberikan efek penghambatan terhadap aktivitas enzim NADPH oksidase yang berperan dalam pembentukan radikal bebas. Hal ini akan menghasilkan pengurangan stres oksidatif (Tedelind et al., 2007).

Keuntungan sinbiotik dalam pengobatan tekanan darah telah dibuktikan oleh penelitian klinis. misalnya, sebuah penelitian yang melibatkan individu yang menderita hipertensi menunjukkan bahwa mengonsumsi suplemen sinbiotik selama beberapa minggu dapat menghasilkan penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik secara substansial jika dibandingkan dengan mengonsumsi plasebo dalam periode waktu yang sama (Dai et al., 2022; Gomes et al., 2014).

Oleh karena itu, sinbiotik, yang berperan melalui produksi SCFA, memberikan metode yang efisien untuk pengelolaan tekanan darah. Selain menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung secara umum, proses vasodilatasi, tindakan anti-inflamasi, dan penurunan stres oksidatif semuanya berkontribusi terhadap perbaikan secara keseluruhan.

c. Regulasi Metabolisme Glukosa

Pengelolaan metabolisme glukosa sangat dibantu oleh adanya organisme simbiosis, khususnya dalam bidang peningkatan sensitivitas insulin dan pengendalian kadar glukosa darah. Dalam hal pengelolaan hiperglikemia dan pengurangan risiko diabetes tipe 2, yang sering dikaitkan dengan sindrom metabolik, peningkatan kontrol glikemik merupakan salah satu faktor terpenting.

Peningkatan sensitivitas insulin yang dihasilkan dari hubungan sinbiotik adalah salah satu mekanisme utama yang mengatur metabolisme glukosa. Butirat dan propionat adalah contoh asam lemak rantai pendek (SCFA) yang dapat dibuat oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik. SCFA ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspresi transporter glukosa tipe 4 (GLUT4) di sel otot dan hati. GLUT4 merupakan protein esensial yang berperan penting dalam proses penyerapan glukosa (glukosa) dari darah ke dalam sel (Gao et al., 2009).

Berkurangnya pembentukan glukosa di hati merupakan efek lain yang dapat ditimbulkan oleh SCFA, selain peningkatan konsumsi glukosa. Contoh konkretnya adalah propionat, memiliki kemampuan menekan glukoneogenesis, yaitu proses pembuatan glukosa dari prekursor selain karbohidrat. Enzim yang terlibat dalam proses glukoneogenesis berkurang aktivitasnya (Weitkunat et al., 2016).

Resistensi insulin dan masalah metabolisme glukosa disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah peradangan kronis. Melalui banyak cara, simbiosis memiliki kemampuan untuk menurunkan peradangan di seluruh tubuh. Telah terbukti bahwa probiotik, termasuk *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi seperti IL-10 dan TGF- β , sekaligus menurunkan produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF- α dan IL-6. Sinbiotik membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan meningkatkan metabolisme glukosa. Mereka melakukan ini dengan menurunkan peradangan, sehingga meningkatkan sensitivitas insulin (Braga et al., 2022; Dai et al., 2022; Kim et al., 2018; Zhao et al., 2022).

Bakteri di saluran usus bertanggung jawab atas produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang memiliki fungsi tidak hanya dalam pengaturan metabolisme lipid tetapi juga dalam pengaturan metabolisme glukosa. Sebagai ilustrasi, butirrat memiliki kemampuan untuk mengaktifkan reseptor PPAR- γ (peroxisome proliferator-activated gamma receptor), yang merupakan komponen penting dalam proses metabolisme lipid dan glukosa disaat yang bersamaan (Gao et al., 2009).

Oleh karena itu, sinbiotik menawarkan metode efektif untuk pengaturan metabolisme glukosa melalui proses yang mencakup peningkatan sensitivitas insulin, penurunan sintesis glukosa di hati, moderasi respons inflamasi, dan peningkatan pembentukan asam lemak rantai pendek (SCFA). Penatalaksanaan hiperglikemia dan pengurangan risiko diabetes tipe 2, yang sering dikaitkan dengan sindrom metabolik, merupakan bidang di mana efek ini memiliki potensi sinbiotik yang signifikan.

C. *Bukti Klinis dan Implikasi Praktis Penggunaan Sinbiotik*

1. *Pendalihan obesitas: studi oleh Million et al. (2013)*

Efek suplementasi sinbiotik pada individu yang mengalami obesitas menjadi obyek penyelidikan dalam penelitian menyeluruh yang dilakukan oleh (Million et al., 2012). Indeks massa tubuh (BMI) dan lingkar pinggang adalah dua indikasi utama obesitas, dan tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana sinbiotik mampu mengurangi kedua parameter penelitian tersebut secara efisien atau tidak.

Penelitian ini dilakukan sebagai uji klinis terkontrol secara acak, dan partisipannya adalah orang-orang yang mengalami obesitas.

Para peserta dipisahkan menjadi dua kelompok: kelompok intervensi menerima suplementasi sinbiotik, sedangkan kelompok kontrol menerima plasebo. Baik probiotik, seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, dan prebiotik, seperti inulin, termasuk dalam sinbiotik yang digunakan dalam penyelidikan penelitian.

Menurut metodologinya, peserta dalam kelompok intervensi diberi dosis harian sinbiotik selama uji coba, yang berlangsung selama total dua belas minggu. Pasien dalam kelompok kontrol diberi plasebo yang tampilannya identik tetapi tidak termasuk obat sinbiotik. Indeks Massa Tubuh (BMI), lingkaran pinggang, berat badan, dan profil metabolisme seperti kadar glukosa darah dan kolesterol adalah beberapa karakteristik yang diukur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengonsumsi sinbiotik mengalami penurunan signifikan pada indeks massa tubuh (BMI) dan lingkaran pinggang jika dibandingkan dengan kelompok perlakuan yang berperan sebagai kontrol. Jika dibandingkan dengan kelompok kontrol, kelompok yang diberikan sinbiotik mengalami penurunan berat badan rata-rata sebesar 5% dari berat aslinya, sedangkan kelompok kontrol hanya mengalami penurunan berat badan rata-rata yang tidak signifikan, kurang dari 1%. Terjadi penurunan lingkaran pinggang yang cukup besar pada kelompok simbiosis, yang menunjukkan adanya penurunan lemak visceral yang merugikan.

Mekanisme yang terlibat meliputi: Beberapa jalur yang melibatkan aktivitas SCFA yang merupakan konsekuensi dari fermentasi prebiotik oleh mikrobiota usus berhubungan dengan hilangnya berat badan dan lemak tubuh yang terlihat pada kelompok sinbiotik. Mekanisme ini mencakup semua hal berikut: Peningkatan Oksidasi Lemak: Asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat dan propionat memiliki kemampuan untuk mendorong peningkatan oksidasi lemak di otot dan jaringan lemak. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh mengalami peningkatan dalam kemampuannya membakar lemak untuk menghasilkan energi, yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan jumlah lemak tubuh.

SCFA memiliki kemampuan untuk menurunkan aktivitas enzim yang terlibat dalam lipogenesis, yaitu proses pembentukan lemak di hati. Enzim-enzim ini bertanggung jawab untuk pembentukan lemak. Melalui penurunan sintesis lemak, tubuh mampu menahan lebih sedikit lemak, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap penurunan berat badan dan pengurangan lingkaran pinggang.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan suplemen sinbiotik secara berkala mungkin merupakan metode yang efisien untuk mengobati obesitas. Selain itu, sinbiotik bermanfaat untuk meningkatkan parameter metabolisme yang berhubungan dengan obesitas, seperti profil lipid dan kadar glukosa darah. Ini merupakan tambahan dari kemampuan mereka untuk membantu penurunan berat badan. Di antara implikasi klinisnya adalah kemungkinan memasukkan sinbiotik ke dalam program pengelolaan berat badan yang mencakup semua. Program semacam itu mungkin melibatkan perubahan pola makan, peningkatan aktivitas fisik, dan banyak terapi gaya hidup lainnya.

2. Pengelolaan diabetes tipe 2: studi oleh Asemi et al. (2013)

Sebuah studi penting yang menganalisis efek suplementasi sinbiotik pada manajemen glikemik dan sensitivitas insulin pada individu dengan diabetes tipe 2 dilakukan oleh Asemi et al. (2013). Penelitian ini dilakukan oleh kelompok peneliti ini.

Uji klinis terkontrol secara acak sedang dilakukan dalam proyek ini, yang dirancang untuk melibatkan peserta yang menderita diabetes tipe 2. Dalam penelitian ini, peserta dibagi menjadi dua kelompok: kelompok intervensi yang diberi suplemen sinbiotik, dan kelompok kontrol yang diberi plasebo. Sinbiotik adalah campuran probiotik seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, serta prebiotik seperti inulin dan oligofruktosa. Sinbiotik ini digunakan dalam penyelidikan penelitian.

Dosis harian sinbiotik diberikan kepada peserta dalam kelompok intervensi selama uji coba, yang berlangsung selama dua belas minggu. Kadar HbA1c, kadar glukosa darah puasa, sensitivitas insulin, dan profil lipid adalah beberapa penanda yang diukur selama proses berlangsung.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa individu yang diberi sinbiotik melaporkan penurunan kadar HbA1c yang cukup besar. HbA1c adalah penanda glikemik jangka panjang yang mewakili rata-rata kadar glukosa darah selama dua hingga tiga bulan sebelumnya. Individu dalam kelompok sinbiotik juga menunjukkan peningkatan substansial dalam sensitivitas insulin bila dibandingkan dengan peserta dalam kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa sel-sel dalam tubuh mereka menjadi lebih mudah menerima insulin, sehingga berkontribusi pada pengaturan jumlah glukosa yang terkandung dalam darah mereka dengan lebih efisien.

Efek sinbiotik yang menguntungkan pada kontrol glikemik dan sensitivitas insulin dapat dijelaskan melalui sejumlah jalur berbeda, termasuk yang berikut:

- **Peningkatan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA):** SCFA, seperti butirat dan propionat, yang dibuat oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik, memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspresi transporter glukosa tipe 4 (GLUT4) di otot dengan sel hati. Protein yang dikenal sebagai GLUT4 bertanggung jawab atas proses pengambilan glukosa dari aliran darah dan dimasukkan ke dalam sel. Salah satu cara SCFA membantu menurunkan kadar glukosa darah adalah dengan meningkatkan GLUT4, yang pada gilirannya berfungsi untuk meningkatkan jumlah glukosa yang diserap sel.
- **Mengurangi peradangan sistemik:** sinbiotik memiliki kemampuan untuk mengurangi peradangan sistemik, yang sering dikaitkan dengan resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Melalui penggunaan probiotik, dimungkinkan untuk meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi seperti IL-10 dan TGF- β , sekaligus mengurangi produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF- α dan IL-6. Karena kemampuannya mengurangi peradangan, sinbiotik berkontribusi pada peningkatan sensitivitas insulin dan percepatan metabolisme glukosa .
- **Membantu menjaga mikrobioma usus:** mikroba usus akan mencapai keadaan seimbang dengan meningkatkan jumlah bakteri menguntungkan seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*. Hal ini dicapai melalui proses modulasi komposisi mikrobiota usus. Peningkatan fermentasi prebiotik menjadi asam lemak rantai pendek (SCFA) dapat dicapai dengan keseimbangan mikrobioma yang sehat, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan manajemen glikemik dan kesehatan metabolisme secara umum.

Dalam hal implikasi klinis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi sinbiotik berpotensi menjadi suplemen yang bermanfaat dalam pengobatan diabetes tipe 2. Selain membantu peningkatan manajemen glikemik, sinbiotik juga berkontribusi pada peningkatan parameter metabolisme lain yang berhubungan dengan diabetes tipe 2. Salah satu konsekuensi klinisnya adalah kemungkinan memasukkan sinbiotik ke dalam pendekatan holistik dalam terapi diabetes tipe 2. Pendekatan ini melibatkan sejumlah intervensi gaya hidup, seperti modifikasi pola makan, peningkatan

aktivitas fisik, dan penyesuaian gaya hidup lainnya.

3. Pengelolaan sindrom metabolik: meta-analisis oleh Koutnikova et al. (2019)

Koutnikova et al. (2019) melakukan meta-analisis, yaitu evaluasi komprehensif yang mengkaji dampak sinbiotik terhadap beberapa komponen sindrom metabolik. Ada serangkaian kelainan yang dikenal sebagai sindrom metabolik yang berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes tipe 2. Kondisi tersebut antara lain obesitas sentral, hipertensi, hiperglikemia, dan dislipidemia, serta kondisi lainnya. Ada bukti substansial yang ditunjukkan dalam meta-analisis ini yang menunjukkan bahwa sinbiotik memiliki potensi untuk berhasil mengendalikan sindrom metabolik melalui berbagai metode.

Meta-analisis ini menyatukan temuan sejumlah uji klinis yang mengevaluasi dampak sinbiotik pada penanda sindrom metabolik. Penelitian yang merupakan bagian dari penelitian ini berisi individu-individu yang memiliki sindrom atau kelainan metabolik yang berhubungan dengannya. Investigasi ini menyelidiki efek suplementasi simbiosis dibandingkan dengan plasebo atau kontrol lainnya. Selain indikator metabolisme lainnya, tekanan darah, profil lipid, dan penanda inflamasi adalah beberapa faktor yang membentuk analisis.

Temuan meta-analisis menunjukkan bahwa sinbiotik memiliki efek menguntungkan pada berbagai komponen sindrom metabolik, termasuk yang berikut:

- **Penurunan tekanan darah:** sebuah meta-analisis menemukan bahwa penggunaan suplemen sinbiotik dapat sangat mengurangi tekanan darah sistolik dan diastolik. Melalui proses vasodilatasi yang dimediasi oleh asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat dan propionat, simbiosis berkontribusi terhadap pelebaran pembuluh darah dan peningkatan aliran darah. Akibat penurunan tekanan darah ini, tekanan pada jantung dan risiko penyakit kardiovaskular berkurang.
- **Peningkatan profil lipid:** sinbiotik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan profil lipid dengan meningkatkan HDL (kolesterol "baik") dan mengurangi LDL (kolesterol "jahat"), selain menurunkan trigliserida. Asam lemak rantai kecil (SCFA), yang dibentuk oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik, berkontribusi terhadap penurunan produksi kolesterol di hati

dan peningkatan ekskresi kolesterol melalui feses. Kehadiran profil lipid yang lebih baik dikaitkan dengan penurunan risiko aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular.


- **Pengurangan peradangan sistemik:** temuan lain dari meta-analisis adalah bahwa sinbiotik berpotensi menurunkan peradangan sistemik, yang sering dikaitkan dengan sindrom metabolik. Sinbiotik memainkan peran penting dalam mengatur respons imun dengan meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi seperti IL-10 dan TGF- β , sekaligus menurunkan produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF- α dan IL-6 yang bertanggung jawab atas peradangan. Kesehatan metabolisme secara umum meningkat sebagai akibat dari berkurangnya peradangan, yang juga mengurangi kemungkinan masalah yang terkait dengan kondisi tersebut.

Temuan meta-analisis yang dilakukan oleh Koutnikova dan rekannya menunjukkan bahwa sinbiotik mempunyai potensi menjadi intervensi yang bermanfaat dalam pengelolaan sindrom metabolik. Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat praktis, antara lain sebagai berikut:

- Melalui pengelolaan sindrom metabolik termasuk tekanan darah, profil lipid, dan peradangan sistemik, sinbiotik dapat membantu pencegahan penyakit kardiovaskular. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan risiko terkena penyakit kardiovaskular.
- Sinbiotik berkontribusi pada peningkatan kesehatan metabolisme dengan meningkatkan manajemen glikemik, menurunkan resistensi insulin, dan meningkatkan keseimbangan energi. Hal ini dicapai dengan penggunaan sinbiotik. Selain itu, dapat membantu dalam pengelolaan dan pencegahan diabetes tipe 2, serta beberapa penyakit metabolik lainnya.
- Integrasi ke dalam Praktek Klinis: Temuan ini memberikan dukungan terhadap penggabungan sinbiotik ke dalam praktek klinis sebagai komponen pendekatan komprehensif untuk perawatan sindrom metabolik. Untuk mendapatkan hasil terbaik, penggunaan suplemen sinbiotik dapat dikombinasikan dengan perawatan gaya hidup lainnya, termasuk menjaga pola makan yang sehat, lebih banyak melakukan latihan fisik, dan belajar menangani stres.

Meta-analisis oleh Koutnikova et al. menunjukkan bahwa sinbiotik dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan

sindrom metabolik, menawarkan pendekatan yang efektif dan alami untuk meningkatkan kesehatan metabolik dan mencegah penyakit kardiovaskular.



BAB VI

SINBIOTIK DAN KESEHATAN MENTAL

A. Gut-Brain Axis dan Peran Mikrobiota Usus Dalam Kesehatan Mental

Gut-Brain Axis (GBA) adalah jalur komunikasi dua arah antara sistem pencernaan (usus) dan sistem saraf pusat (otak). Komunikasi ini melibatkan interaksi kompleks antara saraf vagus, sistem endokrin, dan sistem kekebalan tubuh, yang memungkinkan pengaruh timbal balik antara usus dan otak. Mikrobiota usus, yang terdiri dari triliunan mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, dan fungi, memainkan peran penting dalam GBA, mempengaruhi berbagai fungsi fisiologis dan psikologis (Cryan & Dinan, 2012).

1. Mekanisme komunikasi dalam gut-brain axis saraf vagus

Mekanisme komunikasi dalam Gut-Brain Axis terjadi melalui beberapa jalur utama yang berlangsung secara simultan dan kompleks.

a. Saraf vagus

Dalam konteks Gut-Brain Axis (GBA), saraf vagus berfungsi sebagai saluran komunikasi utama antara usus dan otak. Saraf vagus, yang merupakan saraf kranial terpanjang, bertanggung jawab menghubungkan otak ke sejumlah organ, seperti hati, jantung, dan usus. Stimulasi saraf vagus oleh bakteri di saluran pencernaan dapat berdampak pada aktivitas otak, terutama di wilayah yang

bertanggung jawab mengatur suasana hati dan kecemasan. Mikroorganisme di usus, misalnya, memiliki kemampuan memicu reseptor di usus, yang kemudian mengirimkan pesan ke otak melalui saraf vagus. Ini memodulasi pelepasan neurotransmitter dan hormon yang berhubungan dengan stres dan emosi (Bonaz et al., 2018).

Selain itu, saraf vagus terlibat dalam regulasi peradangan melalui jalur antiinflamasi kolinergik. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengurangi sintesis sitokin yang bersifat proinflamasi selama peradangan. Hasilnya, mikroorganisme usus yang berinteraksi dengan saraf vagus berpotensi membantu menjaga respons imun yang sehat dan mengurangi peradangan yang berdampak pada kemampuan otak. (2012) Menurut Bonaz dan Pellissier.

b. Sistem endokrin

Melalui produksi dan modulasi hormon dan peptida yang berpengaruh pada otak, mikrobiota saluran pencernaan berpengaruh pada sistem endokrin. Salah satu contohnya adalah kortisol, yang merupakan hormon utama yang dihasilkan kelenjar adrenal sebagai respons terhadap stres. Kortisol mempunyai dampak besar pada perilaku dan suasana hati, dan juga berpotensi mempengaruhi kinerja kognitif. Melalui interaksinya dengan poros hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA), yaitu mekanisme yang mengatur reaksi tubuh terhadap stres, bakteri usus berpotensi mampu mempengaruhi sintesis kortisol (Cryan & Dinan, 2012).

Selain hormon kortisol, mikroorganisme yang hidup di usus juga mampu menghasilkan hormon dan neurotransmitter lain, antara lain serotonin, dopamin, dan asam gamma-aminobutyric. GABA. Salah satu peran terpenting serotonin dalam pengaturan suasana hati, tidur, dan fungsi kognitif adalah sebagian besar serotonin dihasilkan di usus. Gangguan mood seperti kecemasan dan depresi mungkin disebabkan oleh ketidakseimbangan sintesis serotonin (Yano et al., 2015).

c. Kekebalan tubuh

Dalam hal pengendalian sistem kekebalan tubuh, mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan memainkan peran penting. mikroorganisme pencernaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dalam beberapa cara. Salah satunya adalah melalui sintesis asam lemak rantai pendek (SCFA), yang meliputi butirrat, asetat, dan propionat. SCFA ini memiliki sifat anti inflamasi dan dapat meningkatkan fungsi selaput lendir yang

berfungsi menghambat saluran pencernaan. Penelitian tahun 2013 oleh Clarke dan timnya.

Disbiosis, yang juga dikenal sebagai ketidakseimbangan mikroorganisme di saluran pencernaan, dapat menyebabkan peradangan sistemik, yang berdampak pada otak dan berkontribusi pada penyakit mental seperti kecemasan dan depresi. Sebaliknya, mikroorganisme sehat di saluran pencernaan memiliki kemampuan menciptakan tindakan anti-inflamasi yang melindungi otak dari cedera. Mikroba di usus memiliki kemampuan untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA), yang berpotensi mengurangi produksi sitokin proinflamasi dan meningkatkan sintesis sitokin antiinflamasi. Hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara peradangan dan toleransi imunologis (Macia et al., 2012).

Selain itu, mikrobiota saluran pencernaan dapat mempengaruhi fungsi sel kekebalan di otak, seperti mikroglia, yang bertugas menjaga kesehatan otak dan bereaksi terhadap berbagai jenis trauma dan infeksi (Erny et al., 2015).

2. Peran mikrobiota usus dalam produksi neurotransmitter

Mikroba usus menghasilkan berbagai neurotransmitter yang mempengaruhi fungsi otak dan kesehatan mental. Neurotransmitter adalah molekul kimia yang digunakan oleh sistem saraf untuk mentransfer pesan antar neuron atau dari neuron ke sel target lain, seperti kelenjar atau sel otot. Mereka bertanggung jawab atas modulasi berbagai proses fisiologis dan perilaku, seperti suasana hati, tidur, rasa lapar, dan kognisi, dan mereka memainkan peran penting dalam proses ini. Vesikel sinaptik, yang terletak di terminal akson neuron, bertanggung jawab untuk sintesis dan penyimpanan neurotransmitter. Vesikel ini bertanggung jawab untuk melepaskan neurotransmitter ke dalam celah sinaptik, yaitu ruang yang ada di antara dua neuron, ketika impuls saraf sampai di terminal akson. Setelah itu, neurotransmitter menempel pada reseptor yang terletak pada membran sel target, yang menyebabkan reaksi biologis (Bear et al., 2015).

Asetilkolin (ACh), dopamin, serotonin, asam gamma-aminobutyric (GABA), dan glutamat adalah beberapa neurotransmitter yang terlibat dalam transmisi informasi antar neuron. Dopamin terlibat dalam pengaturan suasana hati, motivasi, dan apresiasi, sedangkan asetilkolin terlibat dalam kontraksi otot dan pengaturan aktivitas sistem saraf otonom. GABA adalah neurotransmitter penghambat signifikan di otak yang membantu

menurunkan kecemasan dan meningkatkan relaksasi, sedangkan serotonin bertanggung jawab untuk mengatur suasana hati, tidur, dan fungsi kognitif. Neurotransmitter rangsang utama, glutamat, terlibat dalam berbagai proses kognitif, antara lain pembelajaran dan memori (Purves et al., 2018).

Setelah neurotransmitter terikat pada reseptor dan mengirimkan sinyal, neurotransmitter perlu dikeluarkan dari celah sinaptik untuk mengakhiri proses komunikasi sinyal. Reuptake, dimana neurotransmitter diambil kembali oleh neuron prasinaps untuk disimpan atau dihancurkan; degradasi enzimatik, di mana enzim spesifik memecah neurotransmitter menjadi komponen tidak aktif; atau difusi, di mana neurotransmitter tersebar keluar dari celah sinaptik adalah cara-cara yang memungkinkan terjadinya hal ini (Bear et al., 2015)

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan sejumlah penyakit mental, termasuk skizofrenia, kecemasan, dan depresi, adalah ketidakseimbangan neurotransmitter tertentu. Tingkat serotonin yang rendah, misalnya, sering dikaitkan dengan depresi, sedangkan kelainan pada tingkat dopamin dikaitkan dengan skizofrenia dan penyakit bipolar (Jain, 2013; Janicak, 2002, 2002).

a. Serotonin

Mayoritas serotonin yang masuk ke dalam tubuh dibuat oleh sel-sel enterokromafin di usus, yang juga dipengaruhi oleh mikroorganisme yang hidup di usus. Ada neurotransmitter yang dikenal sebagai serotonin yang terlibat dalam pengaturan suasana hati, tidur, dan fungsi kognitif dengan memainkan peran penting. Karena keterlibatannya dalam pengendalian motilitas usus dan sekresi cairan, usus bertanggung jawab atas produksi sekitar 90–95% dari total serotonin yang ditemukan di dalam tubuh (Yano et al., 2015).

Di antara banyak tugas yang dilakukan serotonin di otak, beberapa di antaranya yang paling penting adalah memengaruhi suasana hati, emosi, tidur, dan rasa lapar. Telah lama diketahui bahwa gangguan mood seperti kecemasan dan depresi berhubungan dengan ketidakaturan dalam sintesis dan regulasi serotonin. Menurut temuan penelitian tertentu, gangguan pada mikrobiota saluran pencernaan dapat menyebabkan penurunan produksi serotonin, yang pada akhirnya dapat berdampak pada fungsi otak dan berkontribusi pada perkembangan gangguan mood (Margolis et al., 2021).

Melalui sejumlah metode berbeda, mikrobiota saluran pencernaan terlibat dalam regulasi serotonin. Awalnya, pembentukan triptofan, asam amino penting yang berfungsi sebagai prekursor serotonin, dapat dipengaruhi oleh mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan. Ada beberapa mikroorganisme yang berpotensi meningkatkan ketersediaan triptofan di usus besar. Sel enterochromaffin bertanggung jawab atas konversi triptofan menjadi serotonin (Reigstad et al., 2015).

Penyakit yang mempengaruhi sintesis serotonin di usus dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental seseorang. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yano et al. (2015), yang menunjukkan bahwa perubahan susunan mikrobiota di saluran pencernaan mungkin berdampak pada produksi serotonin, yang pada gilirannya dapat berdampak pada perilaku dan suasana hati. Temuan ini memberikan kepercayaan pada konsep bahwa memodifikasi mikrobiota saluran pencernaan melalui penggunaan terapi makanan atau probiotik akan menjadi metode yang layak untuk mengobati gangguan mood.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang menderita gangguan mood seperti kecemasan dan depresi sering kali mengalami disbiosis atau kelainan mikrobiota yang terdapat pada saluran pencernaannya (Foster et al., 2017).


b. Gamma-Aminobutyric Acid (GABA)

Neurotransmitter utama yang dikenal sebagai asam gamma-aminobutyric (GABA) bertanggung jawab untuk menghambat aktivitas saraf di otak. Ini adalah fungsi penting yang memainkan peran penting dalam menurunkan kecemasan dan meningkatkan relaksasi. Di dalam otak, mekanisme ini berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan antara impuls rangsang dan penghambatan, yang penting untuk menjaga stabilitas emosi dan memastikan fungsi otak dalam keadaan sehat (Petroff, 2002).

Telah dibuktikan bahwa beberapa strain bakteri probiotik, seperti *Lactobacillus rhamnosus*, dapat meningkatkan sintesis GABA secara signifikan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bravo et al. (2011) menunjukkan bahwa *Lactobacillus rhamnosus* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ekspresi reseptor GABA di sejumlah wilayah berbeda di otak, seperti korteks prefrontal, amigdala, dan hipokampus. Probiotik ini tidak hanya meningkatkan sintesis GABA, tetapi juga memiliki sifat ansiolitik, yang pada dasarnya mengurangi kecemasan. Percobaan yang dilakukan pada

tikus menunjukkan bahwa pemberian *Lactobacillus rhamnosus* dapat mengurangi perilaku yang berhubungan dengan kecemasan dan depresi. Temuan ini menyiratkan bahwa probiotik ini mungkin berpotensi digunakan dalam pengelolaan gangguan kecemasan pada manusia (Bravo et al., 2011).

Reseptor GABA juga terlibat dalam pengaturan tidur. Kehadiran GABA dalam jumlah yang cukup di otak dapat meningkatkan kualitas tidur dengan memfasilitasi relaksasi dan menurunkan tingkat kecemasan. Oleh karena itu, probiotik yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan sintesis GABA berpotensi bermanfaat bagi mereka yang menderita insomnia atau masalah tidur lainnya (Reigstad et al., 2015).



Gambar 2. Gut-Brain Axis: jalur komunikasi timbal balik antara sistem pencernaan, mikrobiota dan sistem saraf pusat (otak). HPA-axis: hipotalamus-hipofisis-adrenal axis; IEC: sel epitel usus; EEC: Enteric endocrine cell; PC: Paneth cell; SCFA: asam lemak rantai pendek; IL: interleukin; GABA: γ -aminobutyric acid; 5-HT: serotonin; AMP: peptida antimikroba; miRNA: MicroRNA (Simon et al., 2021).

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang mekanisme di balik bagaimana probiotik meningkatkan sintesis GABA dan dampaknya terhadap kesehatan mental manusia dalam jangka panjang. Meskipun demikian, temuan awal ini menyoroti kemungkinan bahwa memodifikasi mikrobiota saluran pencernaan melalui penggunaan probiotik mungkin merupakan metode yang efisien dan alami untuk pengelolaan kecemasan dan penyakit terkait stres lainnya.

B. Intervensi Sinbiotik Terhadap Kondisi Mental Seperti Depresi dan Kecemasan

Intervensi sinbiotik, yang merupakan kombinasi probiotik dan prebiotik, telah menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam mengelola kondisi mental seperti depresi dan kecemasan. Penelitian dalam beberapa tahun terakhir telah menyoroti hubungan erat antara kesehatan usus dan kesehatan mental, yang dikenal sebagai gut-brain axis. Mikrobiota usus memainkan peran penting dalam mempengaruhi fungsi otak dan perilaku melalui berbagai mekanisme, termasuk produksi neurotransmitter, modulasi sistem kekebalan, dan pengurangan peradangan.

Melalui penelitian, ditemukan bahwa terapi sinbiotik mungkin dapat membantu mengurangi gejala yang berhubungan dengan depresi, yang merupakan salah satu penyakit mental paling umum. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Akkasheh et al. (2016), penggunaan suplemen sinbiotik berpotensi menurunkan skor depresi pada individu yang menderita gangguan depresi berat. Campuran probiotik (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*, dan *Bifidobacterium bifidum*) dan prebiotik (inulin) diberikan kepada peserta dalam uji coba ini selama delapan minggu. Temuan ini menunjukkan penurunan skor Beck Depression Inventory (BDI) yang signifikan, yang merupakan indikasi perbaikan gejala depresi.

Proses yang bertanggung jawab atas efek antidepresan sinbiotik memerlukan penciptaan neurotransmitter seperti serotonin, yang sebagian besar disintesis di usus. Neurotransmitter serotonin terlibat dalam pengaturan suasana hati, tidur, dan rasa lapar. Mikrobiota yang sehat di saluran pencernaan mungkin dapat meningkatkan produksi serotonin dan prekursor triptofan, yang keduanya berkontribusi pada peningkatan suasana hati dan pengurangan gejala depresi (Yano et al., 2015). Selain itu, sinbiotik memiliki kemampuan untuk mengurangi keparahan peradangan sistemik, yang merupakan faktor yang diketahui berperan dalam perkembangan depresi (Cryan & Dinan, 2012).

Menurut temuan beberapa penelitian, gangguan mood sering kali dikaitkan dengan peradangan yang terus-menerus. Melalui modulasi sistem kekebalan tubuh dan menurunkan produksi sitokin yang bersifat pro-inflamasi, simbiosis berpotensi membantu mengurangi peradangan. SCFA, misalnya, yang dibuat melalui fermentasi prebiotik, berpotensi memiliki efek antiinflamasi yang

besar, berkontribusi pada pengurangan peradangan, dan meningkatkan kesehatan mental (Li et al., 2023). Dalam situasi ini, sinbiotik berfungsi tidak hanya melalui proses farmakologis tetapi juga melalui hubungan rumit antara mikrobiota saluran pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan otak.

Kesehatan usus juga dapat berdampak pada kecemasan, yang merupakan penyakit mental lain yang dapat terpengaruh. Probiotik tertentu telah terbukti memiliki efek ansiolitik, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian (penekan kecemasan). Misalnya studi yang dilaporkan bahwa suplementasi dengan *Lactobacillus helveticus* R0052 dan *Bifidobacterium longum* R0175 membantu menurunkan kecemasan pada pasien manusia. Jika dibandingkan dengan kelompok yang mendapat plasebo, peserta yang diberi sinbiotik menunjukkan penurunan tingkat kecemasan yang cukup besar (Messaoudi et al., 2011).

Efek ansiolitik sinbiotik dapat dijelaskan melalui sejumlah proses berbeda. Pertama, menurut (Bravo et al., 2011), probiotik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan sintesis neurotransmitter penghambat seperti GABA. Neurotransmitter ini masing-masing berperan dalam menurunkan aktivitas saraf yang berlebihan dan meningkatkan relaksasi. Sinbiotik, di sisi lain, memiliki kemampuan untuk mengontrol sistem kekebalan dan mengurangi peradangan, yang keduanya diketahui merupakan faktor yang berkontribusi terhadap gangguan mood. Ketiga, sinbiotik berpotensi meningkatkan permeabilitas usus dan menurunkan pergerakan bakteri patogen yang diketahui menjadi penyebab stres dan reaksi inflamasi (Cryan & Dinan, 2012).

Terdapat bukti berkelanjutan dari uji klinis yang mendukung potensi sinbiotik dalam pengobatan penyakit mental. Contohnya adalah temuan penelitian yang dilakukan oleh Benton dan rekannya pada tahun 2007, yang menunjukkan bahwa mengonsumsi suplemen yang mengandung probiotik *Lactobacillus casei* Shirota dapat meningkatkan mood pada mereka yang mengalami depresi ringan hingga berat. Probiotik telah terbukti meringankan gejala kesedihan dan kecemasan pada individu sehat yang menderita stres (Steenbergen et al., 2015).

Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh Ng et al. (2018) sampai pada kesimpulan bahwa probiotik memiliki dampak menguntungkan pada gejala kecemasan dan depresi. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi temuan ini dan

mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses yang bertanggung jawab atas efek fisiologis ini. Ada semakin banyak data ilmiah yang mendukung potensi sinbiotik sebagai intervensi tambahan dalam terapi penyakit mental. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa pengobatan sinbiotik aman dan alami.

C. *Bukti Ilmiah dan Potensi Terapeutik Sinbiotik*

Bukti ilmiah yang terus berkembang menunjukkan bahwa sinbiotik, kombinasi probiotik dan prebiotik, memiliki potensi terapeutik yang signifikan dalam pengelolaan berbagai kondisi kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa sinbiotik dapat mengubah komposisi dan aktivitas mikrobiota usus, yang pada gilirannya mempengaruhi fungsi otak melalui gut-brain axis.

1. Akkasheh et al. (2016): Respon klinis dan metabolik terhadap pemberian probiotik pada pasien dengan gangguan depresi mayor

Studi yang dilakukan oleh Akkasheh et al., (2016) merupakan penelitian acak terkontrol ganda yang meneliti efek suplementasi sinbiotik pada pasien dengan gangguan depresi mayor. Penelitian ini melibatkan 40 peserta yang didiagnosis dengan gangguan depresi mayor, yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok intervensi menerima sinbiotik yang terdiri dari kombinasi probiotik (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*, dan *Bifidobacterium bifidum*) dan prebiotik (inulin), sementara kelompok kontrol menerima plasebo. Suplementasi ini diberikan selama periode delapan minggu.

Penilaian gejala depresi dilakukan menggunakan Beck Depression Inventory (BDI), sebuah alat pengukur yang umum digunakan dalam penelitian klinis untuk mengevaluasi tingkat depresi. BDI diisi oleh peserta pada awal studi dan setelah delapan minggu intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang menerima sinbiotik mengalami penurunan signifikan dalam skor BDI dibandingkan dengan kelompok plasebo. Penurunan skor BDI ini mengindikasikan perbaikan dalam gejala depresi pada peserta yang menerima sinbiotik.

Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme di balik efek antidepresan sinbiotik. Salah satu mekanisme yang diusulkan adalah modulasi mikrobiota usus yang dapat mempengaruhi produksi neurotransmitter seperti serotonin, merupakan

neurotransmitter yang berperan penting dalam regulasi suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Sebagian besar serotonin dalam tubuh diproduksi di usus, dan mikrobiota usus yang sehat dapat meningkatkan produksi serotonin dan prekursor tryptophan, yang berkontribusi pada peningkatan mood dan pengurangan gejala depresi.

Selain itu, sinbiotik dapat mengurangi peradangan sistemik yang diketahui berperan dalam patogenesis depresi. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa peradangan kronis dapat mengganggu fungsi neurotransmitter dan mempengaruhi jalur neuroendokrin yang terkait dengan depresi. Dalam konteks ini, sinbiotik berfungsi tidak hanya dengan meningkatkan kesehatan usus tetapi juga dengan memberikan efek anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi gejala depresi.

Penelitian oleh Akkasheh et al. memberikan bukti kuat bahwa sinbiotik dapat menjadi intervensi efektif dalam pengelolaan gangguan depresi mayor. Hasil ini mendukung konsep bahwa mikrobiota usus memainkan peran penting dalam kesehatan mental dan bahwa modulasi mikrobiota melalui suplementasi sinbiotik dapat menjadi pendekatan terapeutik yang bermanfaat untuk depresi.

2. Messaoudi et al. (2011): penilaian sifat seperti psikotropika dari formulasi probiotik (*Lactobacillus helveticus* R0052 dan *Bifidobacterium longum* R0175)

Penelitian ini merupakan uji coba terkontrol secara acak dengan desain double-blind, dan melibatkan sejumlah besar individu yang dibagi menjadi dua kelompok. Sebaliknya, kelompok kontrol diberikan plasebo, sedangkan kelompok intervensi diberikan sinbiotik yang mencakup strain probiotik *Lactobacillus helveticus* R0052 dan *Bifidobacterium longum* R0175. Selama tiga puluh hari, augmentasi ini dilakukan.

Skala Peringkat Kecemasan Hamilton (HAM-A) dan Skala Kecemasan dan Depresi Rumah Sakit (HADS) merupakan dua alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan dan depresi. Kedua skala ini digunakan dalam proses menilai kecemasan. Dibandingkan dengan kelompok yang diberi plasebo, kelompok yang diberi sinbiotik mengalami penurunan tingkat kecemasan yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan oleh temuan penelitian. Karena penurunan skor ini, penambahan sinbiotik diklaim memiliki dampak ansiolitik yang signifikan, yaitu mengurangi sensasi gugup yang

dialami individu.

Dipercaya bahwa proses yang bertanggung jawab atas efek ansiolitik sinbiotik ini terkait dengan peningkatan sintesis asam gamma-aminobutyric (GABA), yang merupakan neurotransmitter penghambat signifikan di otak. GABA memainkan peran penting dalam menurunkan aktivitas saraf berlebihan dan meningkatkan relaksasi. Ada sejumlah strain probiotik yang telah terbukti meningkatkan sintesis GABA. Strain ini termasuk *Lactobacillus helveticus* R0052 dan *Bifidobacterium longum* R0175. Peningkatan kadar GABA ini berpotensi membantu pengaturan aktivitas saraf di otak, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan emosional.

Selain itu, sinbiotik memiliki kemampuan untuk mengubah sistem kekebalan dan mengurangi peradangan, yang keduanya diketahui merupakan faktor yang berkontribusi terhadap gangguan kecemasan. Hal ini merupakan tambahan dari efek langsungnya terhadap neurotransmitter. Sinbiotik dapat mengurangi produksi sitokin pro-inflamasi sekaligus meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi. Hal ini menghasilkan lingkungan yang lebih seimbang dan kurang reaktif terhadap stres. Selain itu, sinbiotik berpotensi meningkatkan permeabilitas usus, sehingga mencegah terjadinya "usus bocor" yang dapat mengakibatkan reaksi stres dan peradangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Messaoudi dan rekannya memberikan bukti kuat bahwa penggunaan suplemen sinbiotik sebagai sarana untuk mengurangi kecemasan dapat menjadi strategi yang bermanfaat. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa kesehatan usus sangat terkait dengan kesehatan pikiran, dan bahwa perubahan mikrobiota usus melalui penggunaan sinbiotik dapat membawa manfaat besar bagi orang-orang yang merasa cemas.

3. Ng et al. (2018): Meta-analisis penggunaan probiotik untuk meringankan gejala depresi

Dalam penelitiannya, Q. X. Ng et al. (2018), melakukan meta-analisis yang memberikan tinjauan lengkap terhadap berbagai studi klinis yang menyelidiki efek probiotik terhadap gejala depresi dan kecemasan. Uji coba ini dilakukan di samping uji klinis lainnya. Tujuan dari metaanalisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemungkinan efek probiotik sebagai terapi dalam terapi penyakit mental dengan mengumpulkan data dari berbagai penelitian yang dipublikasikan.

Temuan meta-analisis menunjukkan bahwa mengonsumsi suplemen probiotik dapat bermanfaat dalam mengurangi gejala kondisi kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Dalam penyelidikan ini, beberapa strain *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* diselidiki sebagai probiotik. Strain ini diketahui berperan dalam modifikasi mikrobiota di saluran pencernaan serta pembentukan neurotransmitter yang berhubungan dengan suasana hati dan fungsi kognitif. Sebagai gambaran, sejumlah penelitian menemukan bahwa probiotik memiliki kemampuan untuk meningkatkan sintesis serotonin dan GABA, yang keduanya berkontribusi pada pengendalian suasana hati dan penurunan kecemasan.

Terlepas dari kenyataan bahwa terdapat bukti bahwa probiotik memiliki efek yang baik pada gejala depresi dan kecemasan, meta-analisis yang dilakukan oleh Ng et al. menyatakan bahwa studi lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi temuan ini dan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang proses yang sedang terjadi. Beberapa penelitian yang dimasukkan dalam meta-analisis memiliki ukuran sampel yang sangat kecil dan menggunakan beragam metodologi penelitian, yang keduanya berpotensi mempengaruhi kemampuan temuan untuk digeneralisasikan. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian yang dilakukan dengan desain yang lebih ketat dan ukuran sampel yang lebih besar untuk memperkuat bukti bahwa probiotik bermanfaat sebagai intervensi dalam konteks perawatan penyakit mental.

Temuan penelitian ini memberikan lebih banyak bukti bahwa sinbiotik, yang merupakan kombinasi probiotik dan prebiotik, berpotensi menjadi intervensi yang bermanfaat dan aman dalam pengelolaan penyakit mental. Dengan meningkatkan variasi dan keseimbangan mikrobiota di saluran pencernaan, sinbiotik berpotensi berkontribusi pada peningkatan kesehatan mental dan pengurangan gejala yang berhubungan dengan kecemasan dan depresi. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa kondisi kesehatan usus merupakan faktor penting dalam kesehatan mental seseorang, dan bahwa perubahan mikrobiota dalam usus melalui terapi sinbiotik dapat menghasilkan keuntungan terapeutik yang cukup besar.

4. Steenbergen et al. (2015): Uji coba terkontrol secara acak untuk menguji efek probiotik multispecies pada reaktivitas kognitif terhadap suasana hati yang sedih

Penelitian yang dilakukan oleh Steenbergen et al. (2015) telah

menyelidiki dampak probiotik terhadap gejala kecemasan dan depresi pada sukarelawan sehat yang sedang mengalami stres. Penelitian ini merupakan uji coba terkontrol secara acak dengan desain double-blind, dan melibatkan sejumlah besar individu yang dibagi menjadi dua kelompok. kelompok intervensi diberi probiotik multi-spesies yang mencakup berbagai strain probiotik, sedangkan kelompok kontrol diberi plasebo. Selama jangka waktu empat minggu, suplementasi ini diberikan.


Sejumlah skala pengukuran psikologis yang dapat dipercaya, seperti Beck Depression Inventory (BDI) dan State-Trait Anxiety Inventory (STAI), digunakan untuk melakukan evaluasi gejala depresi dan kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang diberi probiotik mengalami penurunan tingkat kesedihan dan kecemasan yang signifikan jika dibandingkan dengan kelompok yang diberi intervensi plasebo.

Penelitian ini mendukung konsep bahwa probiotik berpotensi mempengaruhi kesehatan mental dengan memodulasi mikrobiota di saluran pencernaan dan menyebabkan pembentukan neurotransmitter. Peningkatan sintesis neurotransmitter seperti serotonin dan GABA, yang diketahui memainkan peran penting dalam pengaturan suasana hati dan reaksi terhadap stres, adalah salah satu proses yang dihipotesiskan. Beberapa probiotik telah terbukti dapat meningkatkan sintesis dan bioavailabilitas neurotransmitter, membantu menjaga keseimbangan aktivitas saraf yang sehat di otak, dan meringankan gejala gangguan seperti kecemasan dan depresi. Penelitian ini dilakukan oleh (Steenbergen et al., 2015).

Selain itu, probiotik memiliki kemampuan untuk mengontrol sistem kekebalan dan menekan peradangan, yang keduanya diketahui berperan dalam perkembangan penyakit mental. Lingkungan yang lebih seimbang dan kurang reaktif terhadap stres dapat diciptakan melalui penggunaan simbiosis, yang dapat mengurangi produksi sitokin yang memicu peradangan dan meningkatkan produksi sitokin yang menghambat peradangan. Berdasarkan temuan ini, tampak bahwa probiotik berpotensi memberikan manfaat terapeutik tidak hanya pada orang yang menderita penyakit mental tetapi juga pada masyarakat umum ketika mereka menghadapi stres dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Steenbergen dan rekannya memberikan lebih banyak bukti bahwa terapi probiotik

berpotensi menjadi metode yang efisien dan bebas risiko untuk pengelolaan gejala yang berhubungan dengan kecemasan dan depresi. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan mikrobiota di saluran pencernaan untuk meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi pengaruh stres terhadap kehidupan sehari-hari.



BAB VII

APLIKASI SINBIOTIK DALAM INDUSTRI PANGAN DAN FARMASI

A. *Teknologi Produksi dan Formulasi Sinbiotik*

Sejumlah prosedur rumit, seperti fermentasi, pengeringan, dan formulasi, diperlukan selama pembuatan sinbiotik. Prosedur ini dilakukan untuk menjamin konsistensi dan efisiensi produk jadi.

Sintesis sinbiotik melibatkan sejumlah proses, salah satu yang terpenting adalah fermentasi. Selama fermentasi, bakteri probiotik seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* direplikasi dalam media yang mengandung prebiotik seperti inulin atau oligofruktosie. Selama proses fermentasi, ada beberapa tahapan yang sangat penting:

- *Kondisi fermentasi* yang optimal meliputi pengaturan parameter seperti pH, suhu, dan durasi fermentasi secara cermat. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa bakteri probiotik mampu berkembang biak dan terlibat dalam aktivitas metabolisme tingkat setinggi mungkin (Rathore et al., 2012).
- *Pengendalian lingkungan*: Pemanfaatan bioreaktor kontemporer yang dilengkapi dengan sistem kendali otomatis berkontribusi terhadap pelestarian kondisi fermentasi yang stabil dan konstan. Menurut Abbas et al. (2022), penting untuk mengurangi risiko kontaminasi dan menjamin pembuatan sinbiotik berkualitas tinggi.

Untuk meningkatkan stabilitas produk dan memperpanjang umur simpannya, mikroba probiotik harus dikeringkan setelah proses fermentasi selesai. Berikut ini adalah contoh metode pengeringan yang umum:

- *Pengeringan beku (liofilisasi)* merupakan pendekatan yang diyakini paling berhasil dalam menjaga kelangsungan hidup mikroorganisme. Metode ini terdiri dari proses pembekuan cepat, yang kemudian diikuti dengan sublimasi air dalam kondisi vakum. Menurut Carvalho et al. (2004), pengeringan beku menghasilkan barang yang mempunyai umur simpan lebih lama dan tingkat kestabilan tinggi, meskipun harganya lebih mahal.
- *Metode pengeringan semprot (Spray Drying)* merupakan alternatif yang lebih hemat biaya dan waktu dibandingkan proses pengeringan beku. Namun, karena suhu yang digunakan tinggi, pengeringan semprot mungkin kurang berhasil dalam menjaga kelangsungan hidup mikroorganisme. Hal ini karena suhu tinggi dapat membahayakan struktur sel (Fu & Chen, 2011).

Untuk memformulasi sinbiotik perlu dilakukan kombinasi prebiotik dan probiotik yang telah dikeringkan dalam jumlah yang sesuai. Prosedur ini perlu dilakukan untuk menjamin keandalan dan efisiensi produk akhir.

Bentuk sediaan

Sinbiotik dapat dibuat dalam berbagai sediaan, seperti bubuk, kapsul, atau tablet, agar lebih mudah dikonsumsi dan mengakomodasi tujuan penggunaan serta preferensi konsumen. Sediaan bubuk menawarkan keserbagunaan karena dapat dicampur dengan makanan atau minuman, sehingga mudah dikonsumsi. Hal ini membuat sediaan bubuk menjadi pilihan yang menarik. Jika disimpan dalam kondisi kering dan dingin, produk bubuk sinbiotik seringkali memiliki tingkat stabilitas yang tinggi. Produk bubuk ini sering ditambahkan ke minuman seperti smoothie, yoghurt, atau air minum (Fonseca et al., 2001; Johannsen, 1972; G. Wang et al., 2019).

Selain mudah dicerna dan tidak memerlukan persiapan lebih lanjut, kapsul sinbiotik memungkinkan pengiriman dalam jumlah yang dihitung secara tepat. Merupakan praktik umum untuk membungkus kapsul ini untuk melindungi probiotik dari asam yang diproduksi oleh lambung. Hal ini membantu memastikan bahwa mikroba bermanfaat dikirim ke usus dalam bentuk hidup (Krasaekoopt et al., 2004).

Selain itu, pil sinbiotik menawarkan tingkat kenyamanan yang sebanding dengan kapsul. Mengunyah pil atau melannya dengan air adalah cara mudah untuk menelan tablet, yang tersedia dalam dua bentuk berbeda. Pil ini sering kali dibuat dengan bahan kimia yang dapat membantu menjaga kelangsungan hidup probiotik saat disimpan dan dikonsumsi. Hal ini membantu memastikan bahwa pelanggan menerima manfaat kesehatan terbaik.

Sinbiotik dapat memenuhi berbagai permintaan konsumen, baik untuk tujuan kesehatan khusus maupun untuk kesederhanaan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, karena terdapat berbagai macam metode persiapan yang tersedia untuk sinbiotik.

Teknik Enkapsulasi

Teknik enkapsulasi sering digunakan untuk melindungi probiotik dari kondisi lingkungan yang tidak ramah selama proses penyimpanan dan konsumsi. Karena probiotik yang dienkapsulasi lebih terlindungi dari asam dan enzim yang diproduksi oleh sistem pencernaan, viabilitasnya meningkat, dan mampu mencapai usus hidup-hidup. Metode enkapsulasi melibatkan pengemasan bakteri probiotik dalam matriks pelindung. Matriks ini berfungsi untuk mencegah kerusakan dan menjamin pelepasan mikroba terkontrol dengan baik di lokasi yang tepat dalam sistem pencernaan (Krasaekoopt et al., 2004). Beberapa metode enkapsulasi diuraikan sebagai berikut:

- *Alginate Beads*: memanfaatkan manik-manik yang terbuat dari alginat adalah salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam proses enkapsulasi probiotik. Kapasitas alginat yang diambil dari rumput laut untuk membentuk gel yang stabil pada kisaran tingkat pH menjadi alasan penerapannya. Setelah penambahan probiotik ke dalam larutan alginat, alginat diteteskan ke dalam larutan kalsium klorida, yang menyebabkan alginat mengeras menjadi butiran yang mengandung zat yang mengandung probiotik. Menggunakan strategi ini adalah cara yang efisien untuk melindungi probiotik dari asam yang diproduksi oleh lambung (Cook et al., 2012).
- Mikroenkapsulasi dengan *Spray Drying*: teknik ini meliputi penggabungan probiotik dengan zat pembawa, seperti maltodextrin atau gom arab, kemudian campuran tersebut disemprotkan ke dalam ruang pengering. Partikel mikrokapsul yang dihasilkan dari proses ini mampu melindungi probiotik selama disimpan dan diangkut melalui sistem pencernaan.

Pengeringan semprot, meskipun lebih hemat biaya, melibatkan penggunaan suhu tinggi, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengurangi kelangsungan senyawa probiotik (Fu & Chen, 2011).

- *Coacervation*: mengacu pada proses yang mencakup produksi kokonservasi berbagai polimer, seperti gelatin dan gom arab, yang merangkum probiotik dalam partikel yang disajikan bersama. Prosedur ini menciptakan penghalang pelindung ganda yang mampu menahan asam yang dihasilkan oleh enzim pencernaan dan enzim pencernaan itu sendiri, sehingga memberikan perlindungan ekstra terhadap probiotik (Anal & Singh, 2007).

B. Pengembangan Produk Sinbiotik Dalam Industri Pangan dan Farmasi

1. Industri Pangan

Pengembangan produk sinbiotik dalam industri pangan melibatkan integrasi probiotik dan prebiotik ke dalam berbagai produk makanan untuk meningkatkan manfaat kesehatan dan nilai gizi. Produk-produk ini tidak hanya menawarkan manfaat kesehatan tambahan tetapi juga memperkaya diet dengan komponen-komponen yang mendukung keseimbangan mikrobiota usus.

a. Yogurt dan Kefir

1) Yoghurt

Yoghurt merupakan produk susu fermentasi yang secara alami mengandung probiotik, sebagian besar dari spesies *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*. Yoghurt adalah salah satu produk susu paling populer di dunia. Bakteri asam laktat bertanggung jawab atas fermentasi susu, yang menghasilkan produksi yoghurt. Bakteri ini mengubah laktosa menjadi asam laktat, yang bertanggung jawab atas tekstur dan rasa khas yogurt. Dengan menyediakan substrat yang mendorong perkembangan probiotik di usus, penggabungan prebiotik seperti inulin ke dalam yoghurt dapat meningkatkan efek sinbiotik yang sering dikaitkan dengan konsumsi yoghurt.

Yoghurt yang mengandung inulin berpotensi meningkatkan jumlah bakteri baik yang ada di usus, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Mengonsumsi yoghurt sinbiotik telah terbukti meringankan gejala sindrom iritasi usus besar (IBS) dan meningkatkan toleransi laktosa

pada mereka yang tidak toleran laktosa (Saxelin et al., 2005)..

Pembuatan yoghurt sinbiotik memerlukan proses fermentasi yang dikelola dengan cermat untuk menjaga vitalitas probiotik. Setelah proses fermentasi selesai, prebiotik seperti inulin ditambahkan ke dalam yoghurt untuk menjamin bahwa yoghurt tidak hanya mengandung probiotik hidup tetapi juga substrat yang mendorong pertumbuhan organisme ini di usus (Saxelin et al., 2005).

2) Kefir

Kefir adalah produk susu fermentasi berbeda yang mengandung berbagai mikroorganisme, seperti ragi, bakteri asam laktat, dan bakteri asam asetat. Kefir diproduksi dengan memasukkan butiran kefir yang berasal dari hubungan simbiosis antar mikroorganisme ke dalam susu. Proses fermentasi kefir menghasilkan produksi minuman yang mengandung probiotik tinggi dan memiliki tingkat alkohol dan karbon dioksida yang relatif rendah.

Kefir yang telah diperkaya dengan prebiotik seperti inulin dapat meningkatkan manfaat kesehatannya dengan meningkatkan keseimbangan mikrobiota di saluran pencernaan dan berkontribusi terhadap peningkatan sintesis asam lemak rantai pendek (SCFA). Penggunaan kefir sinbiotik telah terbukti meningkatkan kesehatan pencernaan, menurunkan peradangan, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa mengonsumsi kefir dapat bermanfaat dalam pengobatan asma dan reaksi alergi (Ashaolu & Reale, 2020; Bintsis, 2018; Farnworth, 2005).

Pembuatan kefir sinbiotik memerlukan fermentasi susu menggunakan butiran kefir, diikuti dengan penambahan prebiotik setelah proses fermentasi selesai. Sebagai hasil dari prosedur ini, kefir dijamin memiliki berbagai macam mikroba dan substrat probiotik, yang diperlukan agar zat tersebut dapat berkembang di usus. Menurut Farnworth (2005), pemanfaatan teknologi enkapsulasi berpotensi meningkatkan vitalitas probiotik baik selama penyimpanan maupun konsumsi.

b. Minuman Fermentasi

Minuman fermentasi seperti kombucha dan kvass adalah contoh populer dari produk pangan sinbiotik. Kedua minuman ini tidak hanya menawarkan kesegaran tetapi juga berbagai manfaat kesehatan berkat kombinasi probiotik dan prebiotik yang mereka kandung.

1) Kombucha

Kombucha adalah minuman teh yang difermentasi dengan bantuan simbiosis bakteri dan ragi (SCOBY). Proses fermentasi ini menghasilkan minuman yang mengandung berbagai jenis mikroorganisme probiotik yang bermanfaat, seperti *Acetobacter* dan *Saccharomyces*.

Kombucha yang diperkaya dengan prebiotik seperti oligofruktosa dapat meningkatkan efek sinbiotik, mendukung keseimbangan mikrobiota usus, dan meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti asetat, propionat, dan butirrat. SCFA ini berperan penting dalam kesehatan pencernaan dan metabolik dengan meningkatkan kesehatan usus dan mengatur metabolisme energi (Jayabalan et al., 2014).

Produksi kombucha sinbiotik melibatkan fermentasi teh yang sudah dicampur dengan gula dan SCOBY, diikuti dengan penambahan prebiotik setelah fermentasi selesai. Hal ini memastikan bahwa minuman tidak hanya mengandung probiotik tetapi juga substrat yang mendukung pertumbuhannya di usus.

2) Minuman fermentasi berbasis beras

Minuman fermentasi berbasis beras, seperti amazake dari Jepang, merupakan contoh inovatif dari produk pangan sinbiotik yang menggabungkan manfaat probiotik dan prebiotik. Amazake dibuat melalui fermentasi beras yang dimasak menggunakan kultur koji (*Aspergillus oryzae*), menghasilkan minuman manis yang mengandung enzim pencernaan dan probiotik. Proses fermentasi ini memungkinkan *Aspergillus oryzae* untuk memecah pati dalam beras menjadi gula sederhana, menciptakan rasa manis alami yang khas pada amazake.

Selama fermentasi, probiotik berkembang biak dalam media yang kaya nutrisi dari beras, meningkatkan kandungan probiotik dalam minuman. Penambahan prebiotik seperti inulin ke dalam amazake dapat meningkatkan manfaat sinbiotiknya. Prebiotik berfungsi sebagai makanan bagi probiotik, mendukung pertumbuhan dan aktivitasnya di usus. Kombinasi probiotik dan prebiotik ini membantu memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus, meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), dan mendukung kesehatan pencernaan serta metabolik secara keseluruhan.

Manfaat kesehatan amazake tidak hanya terbatas pada

dukungan pencernaan. Amazake mengandung enzim pencernaan yang membantu dalam pemecahan makanan, memudahkan pencernaan, dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Probiotik dalam amazake mendukung kesehatan usus dengan menyeimbangkan mikrobiota usus, menghambat pertumbuhan bakteri patogen, dan memperkuat penghalang mukosa usus. Selain itu, penambahan prebiotik dalam amazake dapat meningkatkan produksi SCFA seperti butirrat, yang penting untuk kesehatan usus dan metabolik. SCFA ini memiliki efek anti-inflamasi dan dapat membantu mengurangi risiko gangguan pencernaan dan penyakit metabolik (Nout & Kiers, 2005)

Dengan demikian, amazake tidak hanya menawarkan rasa yang lezat tetapi juga berbagai manfaat kesehatan, menjadikannya pilihan yang unggul dalam pengembangan produk sinbiotik di industri pangan.

3) Minuman fermentasi berbasis buah dan sayuran

Dalam konteks pembuatan produk sinbiotik, minuman fermentasi yang terbuat dari sayuran, seperti jus sayuran, merupakan pilihan yang menarik. Untuk membuat minuman yang kaya akan probiotik dan prebiotik alami, sayuran seperti wortel, bit, dan jahe dapat difermentasi dengan organisme probiotik seperti *Lactobacillus*. Proses ini dapat digunakan untuk memproduksi minuman. Selain itu, proses fermentasi tidak hanya meningkatkan jumlah probiotik yang ada dalam minuman, tetapi juga memecah komponen kompleks yang ditemukan dalam sayuran, sehingga memudahkan tubuh menyerap nutrisi.

Minuman fermentasi yang terbuat dari sayuran dapat membantu meningkatkan kesehatan usus dengan mengembalikan mikrobiota di usus ke keadaan seimbang dan dengan meningkatkan sintesis asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirrat, yang penting untuk menjaga kesehatan pencernaan dan metabolisme (Ashaolu & Reale, 2020; Bintsis, 2018). Selain itu, jus sayuran yang difermentasi merupakan sumber berbagai elemen penting, termasuk vitamin, mineral, dan antioksidan, yang semuanya baik untuk kesehatan. Fermentasi juga memungkinkan untuk meningkatkan bioavailabilitas nutrisi, yang berarti tubuh akan lebih mudah menyerapnya. Ketika difermentasi, asam lemak rantai pendek (SCFA) terbentuk, dan SCFA ini memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh dan meningkatkan kesehatan secara umum.

Jus apel, wortel, pakcoy, bit, atau jahe yang difermentasi,

merupakan contoh minuman yang merupakan minuman yang dihasilkan dengan cara fermentasi menggunakan sayuran. Karena kandungan betakaroten dan seratnya yang tinggi, jus wortel yang difermentasi bermanfaat bagi kesehatan sistem pencernaan dan mata. Jus bit yang telah difermentasi mengandung nitrat dan antioksidan, keduanya bermanfaat bagi kesehatan jantung dan meningkatkan daya tahan tubuh.

c. Makanan Ringan dan Produk Roti

Dalam industri makanan, tren baru yang memadukan probiotik dan prebiotik untuk menciptakan produk menyenangkan yang mendukung kesehatan usus dikenal sebagai sinbiotik. Tren ini diwujudkan dalam bentuk makanan ringan dan roti yang dilengkapi dengan sinbiotik. Probiotik dan prebiotik dapat dimasukkan ke dalam makanan seperti adonan roti, biskuit, atau makanan ringan untuk meningkatkan jumlah nutrisi yang dikandungnya dan manfaat kesehatan yang ditawarkannya.

Teknologi enkapsulasi digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup probiotik selama prosedur suspensi dan penyimpanan. Karena prosedur suspensi pada suhu tinggi berpotensi membahayakan probiotik, enkapsulasi merupakan metode yang berguna untuk melindungi probiotik dari efek merusak dari kondisi lingkungan ekstrem. Pendekatan enkapsulasi terdiri dari pengemasan bakteri probiotik di dalam matriks pelindung. Matriks ini menghindari cedera dan menjamin pelepasan mikroba secara teratur di lokasi yang tepat dalam sistem pencernaan (Charalampopoulos, Pandiella, et al., 2002; Charalampopoulos, Wang, et al., 2002).

Dengan menyediakan pasokan probiotik dan prebiotik yang mudah dikonsumsi, makanan ringan dan roti yang telah diperkaya dengan sinbiotik dapat membantu meningkatkan kesehatan usus. Ini karena sinbiotik adalah salah satu jenis nutrisi. Probiotik berkontribusi pada pemeliharaan mikrobiota yang sehat di usus, sedangkan prebiotik memasok nutrisi yang penting untuk pertumbuhan probiotik. Selain meningkatkan kesehatan pencernaan, kombinasi ini juga dapat membantu mengurangi peradangan dan memberikan dukungan bagi sistem kekebalan tubuh. Adapun beberapa ilustrasi atau contoh produk makanan ringan dan roti yang diperkaya dengan sinbiotik adalah sebagai berikut:

- Roti yang dilengkapi dengan probiotik dan prebiotik, seperti inulin, dapat membantu meningkatkan kesehatan usus dan memberikan tambahan serat yang berguna untuk pencernaan.

Roti jenis ini disebut sebagai roti simbiosis.

- Biskuit sinbiotik: Biskuit yang mengandung probiotik dan prebiotik tidak hanya enak, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan dengan membantu menjaga keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan.
- *Synbiotic Snack Bar*: Snack bar yang dibuat dengan probiotik dan prebiotik dengan tujuan memberikan dukungan kesehatan pencernaan dan metabolisme dapat dianggap sebagai camilan sehat.

2. Industri Farmasi

Dalam bisnis farmasi, pengembangan produk sinbiotik berfokus pada pemanfaatan campuran probiotik dan prebiotik untuk menghasilkan formulasi yang berpotensi memberikan manfaat kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan probiotik atau prebiotik saja. Produk yang diklasifikasikan sebagai sinbiotik farmasi dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pencernaan, infeksi, dan penyakit metabolik, selain memberikan dukungan bagi kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Formulasi farmasi. Sejumlah fase penting terlibat dalam proses formulasi di sektor farmasi. Langkah-langkah ini dirancang untuk menjamin bahwa produk sinbiotik yang diproduksi memiliki tingkat stabilitas, kelangsungan hidup, dan kemanjuran setinggi mungkin. Kapasitas probiotik untuk bertahan hidup dalam kondisi gastrointestinal yang parah, seperti terkena asam lambung dan garam empedu, biasanya merupakan faktor penentu dalam pemilihan probiotik untuk digunakan dalam formulasi farmasi. Dalam kebanyakan kasus, prebiotik yang digunakan adalah serat makanan yang tidak dapat dicerna dan memiliki kemampuan untuk menyuplai nutrisi bagi probiotik serta mendorong terbentuknya bakteri sehat di saluran pencernaan.

Untuk melindungi probiotik dari dampak buruk kondisi lingkungan yang buruk selama penyimpanan dan konsumsi, pendekatan enkapsulasi sering digunakan dalam formulasi farmasi. Proses enkapsulasi berfungsi untuk meningkatkan daya tahan probiotik dengan melindunginya dari efek enzim pencernaan dan asam lambung. Hal ini memastikan probiotik dapat masuk ke usus dalam bentuk hidup dan berfungsi aktif (Sanders et al., 2019).

Ada berbagai macam sediaan yang tersedia untuk produk

sinbiotik di sektor farmasi. Sediaan tersebut meliputi kapsul, pil, bubuk, dan cairan. Pilihan bentuk ditentukan oleh fungsi produk serta preferensi pengguna akhir. Beberapa contoh produk sinbiotik yang digunakan dalam bidang farmasi adalah sebagai berikut:

- **Kapsul sinbiotik:** Kapsul ini mengandung campuran probiotik dan prebiotik, dan dirancang untuk memberikan dosis yang tepat sekaligus memastikan bahwa komponen aktif dilepaskan secara teratur di usus.
- **Tablet sinbiotik**, dan sering kali diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk meningkatkan kesehatan secara umum yang disebut sebagai tablet simbiosis. Tablet seperti ini mudah dikonsumsi dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu orang yang menggunakannya.
- **Bubuk sinbiotik**, yaitu bubuk yang dapat dilarutkan dalam air atau ditambahkan ke makanan dan minuman, menawarkan metode serbaguna dalam mengonsumsi sinbiotik.
- **Suspensi sinbiotik**, yang biasanya berbentuk minuman atau sirup, disebut sebagai cairan sinbiotik. Larutan cair ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat kesehatan dengan cara yang mudah diserap oleh tubuh.

Salah satu pertimbangan terpenting dalam pembuatan obat-obatan adalah memastikan bahwa produk sinbiotik aman dan efektif. Semua produk sinbiotik harus melalui uji klinis yang ketat untuk menjamin bahwa produk tersebut tidak berbahaya untuk dikonsumsi dan mampu memberikan manfaat kesehatan yang diharapkan.

Untuk menghasilkan produk sinbiotik baru yang lebih efektif dan efisien, industri farmasi terus melakukan penelitian dan bentuk inovasi lainnya. Studi terbaru berfokus pada penerapan teknologi mutakhir termasuk mikroenkapsulasi, nanoenkapsulasi, dan bioteknologi untuk meningkatkan stabilitas, viabilitas, dan biodisponibilitas probiotik dan prebiotik. Tujuan dari penemuan ini adalah untuk memaksimalkan manfaat kesehatan sinbiotik, serta membuat barang lebih nyaman untuk dikonsumsi dan lebih berhasil dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan (S. C. Ng et al., 2009; Von Wright & Salminen, 1999).

Dalam bisnis farmasi, pengembangan produk sinbiotik menunjukkan potensi besar yang memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat umum. Dengan mempertahankan komitmennya terhadap penelitian dan inovasi,

sektor ini berpotensi memberikan solusi kesehatan yang unggul dan aman bagi pelanggan di seluruh dunia.

C. *Studi Ilmiah Pengembangan Sinbiotik Dalam Industri Pangan dan Farmasi*

1. Jayabalan et al. (2014): Teh kombucha—Mikrobiologi, komposisi, fermentasi, efek menguntungkan, toksisitas.

Penelitian ini mengeksplorasi efek kombucha yang diformulasikan dengan prebiotik seperti oligofruktosa. Kombucha adalah minuman fermentasi yang dibuat dari teh manis yang difermentasi dengan simbiosis bakteri dan ragi (SCOBY). Kombucha secara tradisional dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan, dan studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana penambahan prebiotik dapat meningkatkan efek tersebut.

Hasil studi yang dilaporkan Jayabalan et al. (2014), ini menggunakan kombucha yang diformulasikan dengan prebiotik oligofruktosa. Kombucha yang dihasilkan dianalisis untuk mengukur aktivitas probiotik, antioksidan, dan anti-inflamasi. Beberapa parameter yang diukur meliputi pH, produksi asam organik, dan keberadaan metabolit bermanfaat lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombucha sinbiotik yang diformulasikan dengan prebiotik oligofruktosa memiliki beberapa keunggulan:

- **Sifat probiotik:** Kombucha sinbiotik menunjukkan peningkatan viabilitas mikroorganisme probiotik dibandingkan dengan kombucha yang tidak diformulasikan dengan prebiotik. Penambahan oligofruktosa mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat (BAL) yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Kombucha sinbiotik mengandung jumlah mikroorganisme probiotik yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada keseimbangan mikrobiota usus dan kesehatan pencernaan.
- **Aktivitas antioksidan:** Kombucha yang diformulasikan dengan oligofruktosa menunjukkan peningkatan aktivitas antioksidan yang signifikan. Aktivitas antioksidan diukur menggunakan beberapa metode, termasuk pengujian kemampuan menghambat radikal bebas DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). Kombucha sinbiotik menunjukkan peningkatan kemampuan menghambat radikal bebas, yang berarti minuman ini dapat membantu

melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas.

- **Aktivitas anti-inflamasi:** Studi ini juga menunjukkan bahwa kombucha sinbiotik memiliki aktivitas anti-inflamasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kombucha biasa. Aktivitas anti-inflamasi diukur dengan menguji kemampuan kombucha untuk menghambat produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF- α (Tumor Necrosis Factor-alpha) dan IL-6 (Interleukin-6) dalam model sel. Hasilnya menunjukkan bahwa kombucha sinbiotik secara signifikan mengurangi produksi sitokin pro-inflamasi, menunjukkan potensi manfaat dalam mengurangi peradangan kronis.
- **Produksi metabolit bermanfaat:** Penambahan prebiotik oligofruktosa dalam kombucha meningkatkan fermentasi dan produksi metabolit bermanfaat seperti asam asetat, asam laktat, dan butirrat. Metabolit ini memiliki peran penting dalam kesehatan pencernaan dan metabolisme tubuh. Asam laktat, misalnya, berperan dalam menurunkan pH usus dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Butirrat, di sisi lain, berfungsi sebagai sumber energi untuk sel-sel epitel usus dan memiliki efek anti-inflamasi.

Studi oleh Jayabalan et al. memberikan bukti bahwa kombucha yang diformulasikan dengan prebiotik dapat memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan kombucha biasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan prebiotik meningkatkan fermentasi, viabilitas probiotik, dan produksi metabolit bermanfaat, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan usus dan kesejahteraan umum.

Temuan ini membuka peluang pengembangan produk sinbiotik dalam industri pangan yang tidak hanya enak dikonsumsi namun memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Kombucha sinbiotik memiliki potensi untuk digunakan sebagai bagian dari strategi diet untuk meningkatkan kesehatan pencernaan, mengurangi peradangan, dan melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif.

2. Charalampopoulos et al. (2002): Aplikasi sereal dan komponen sereal dalam makanan fungsional

Penelitian yang dilakukan oleh Charalampopoulos et al. (2002) mengeksplorasi efek penambahan probiotik dan prebiotik dalam produk roti dan makanan ringan. Tujuan utama penelitian ini adalah

untuk menilai bagaimana sinbiotik dapat meningkatkan nilai gizi dan kesehatan produk roti tanpa mengorbankan rasa dan tekstur.

Penelitian ini melibatkan penambahan probiotik dan prebiotik dalam adonan roti dan makanan ringan. Probiotik yang digunakan dalam penelitian ini termasuk strain *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, sementara prebiotik yang digunakan meliputi inulin dan fruktooligosakarida (FOS). Adonan roti yang telah diformulasikan dengan sinbiotik kemudian dipanggang menggunakan teknologi pemanggangan standar.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting terkait dengan penambahan sinbiotik dalam produk roti:

- **Peningkatan nilai gizi:** Penambahan sinbiotik dalam produk roti meningkatkan nilai gizi secara keseluruhan. Inulin dan FOS sebagai prebiotik berfungsi sebagai sumber serat makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia, tetapi bermanfaat bagi mikrobiota usus. Probiotik yang ditambahkan membantu dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus, yang penting untuk kesehatan pencernaan.
- **Peningkatan viabilitas probiotik:** Salah satu tantangan utama dalam menambahkan probiotik ke dalam produk roti adalah memastikan bahwa probiotik tetap hidup setelah proses pemanggangan yang melibatkan suhu tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi enkapsulasi efektif dalam melindungi probiotik selama proses pemanggangan. Teknologi enkapsulasi melibatkan pelapisan probiotik dengan bahan pelindung yang tahan terhadap panas, sehingga probiotik dapat bertahan hidup dan tetap aktif ketika produk dikonsumsi.
- **Tanpa mempengaruhi rasa dan tekstur:** Studi ini juga menemukan bahwa penambahan sinbiotik tidak mengorbankan rasa dan tekstur produk roti. Penelitian ini melibatkan uji rasa yang dilakukan oleh panelis terlatih untuk menilai kualitas sensorik produk. Hasil uji rasa menunjukkan bahwa produk roti sinbiotik memiliki rasa dan tekstur yang sebanding dengan produk roti konvensional, menunjukkan bahwa penambahan sinbiotik dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas organoleptik produk.
- **Manfaat kesehatan:** Produk roti sinbiotik menunjukkan manfaat kesehatan tambahan, termasuk peningkatan kesehatan pencernaan dan dukungan terhadap sistem kekebalan tubuh.

Probiotik yang hidup dalam produk roti membantu meningkatkan diversitas mikrobiota usus dan mendukung kesehatan usus. Prebiotik berfungsi sebagai makanan bagi probiotik, membantu mereka berkembang biak dan memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar.

Penelitian oleh Charalampopoulos et al. menunjukkan bahwa penambahan sinbiotik dalam produk roti dan makanan ringan adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan nilai gizi dan manfaat kesehatan tanpa mengorbankan rasa dan tekstur. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi industri pangan, terutama dalam pengembangan produk fungsional yang mendukung kesehatan pencernaan dan kesejahteraan umum.

Inovasi dalam teknologi enkapsulasi memainkan peran penting dalam keberhasilan integrasi probiotik ke dalam produk roti. Teknologi ini memungkinkan probiotik untuk bertahan hidup dalam kondisi pemanggangan yang keras dan tetap aktif saat produk dikonsumsi. Dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen akan produk makanan yang tidak hanya enak tetapi juga sehat, penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut produk sinbiotik dalam berbagai bentuk sediaan.

3. Sanders et al. (2019): Probiotik dan prebiotik dalam kesehatan usus dan penyakit: dari biologi hingga klinis

Studi ini mengeksplorasi efektivitas kapsul sinbiotik yang mengandung *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* dengan prebiotik seperti FOS dan inulin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi manfaat kesehatan dari penggunaan kapsul sinbiotik, termasuk peningkatan kesehatan pencernaan dan fungsi sistem kekebalan tubuh, serta pengurangan gejala penyakit radang usus (IBD).

Kapsul sinbiotik diformulasikan dengan menggunakan teknologi enkapsulasi untuk melindungi probiotik selama penyimpanan dan konsumsi. Penelitian ini melibatkan uji klinis pada pasien dengan IBD, di mana peserta menerima kapsul sinbiotik setiap hari selama periode tertentu.

- **Kesehatan pencernaan:** Kapsul sinbiotik menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesehatan pencernaan peserta uji klinis. Peningkatan diversitas mikrobiota usus dan produksi SCFA yang bermanfaat mendukung keseimbangan mikrobiota dan fungsi pencernaan.

- **Fungsi sistem kekebalan tubuh:** Penggunaan kapsul sinbiotik memperbaiki fungsi sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan produksi sel T regulator (Treg) yang penting untuk menekan respon imun yang berlebihan dan menjaga toleransi imun. Hal ini membantu mencegah peradangan kronis dan meningkatkan kesehatan keseluruhan.
- **Pengurangan GEJALA IBD:** Kapsul sinbiotik secara signifikan mengurangi gejala IBD pada peserta uji klinis. Peserta melaporkan penurunan frekuensi dan keparahan eksaserbasi, serta perbaikan dalam kualitas hidup. Kapsul sinbiotik membantu memperpanjang periode remisi dan mengurangi kebutuhan akan terapi medis yang lebih agresif.
- **Viabilitas probiotik:** Teknologi enkapsulasi memastikan bahwa probiotik tetap hidup dan aktif selama penyimpanan dan konsumsi. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas kapsul sinbiotik dalam memberikan manfaat kesehatan yang diharapkan.

Studi oleh Sanders et al. (2019) tersebut menunjukkan bahwa penambahan sinbiotik dalam produk roti dan makanan ringan serta dalam bentuk kapsul dan tablet memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Teknologi enkapsulasi memainkan peran kunci dalam menjaga viabilitas probiotik, memastikan bahwa mereka dapat memberikan manfaat kesehatan yang diharapkan. Produk sinbiotik ini dapat meningkatkan nilai gizi, mendukung kesehatan pencernaan, memperbaiki fungsi sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi gejala penyakit kronis seperti IBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. S., Saeed, F., Afzaal, M., Jianfeng, L., Hussain, M., Ikram, A., & Jabeen, A. (2022). Recent trends in encapsulation of probiotics in dairy and beverage: A review. In *Journal of Food Processing and Preservation* (Vol. 46, Issue 7). <https://doi.org/10.1111/jfpp.16689>
- Abrams, S. A., Griffin, I. J., Hawthorne, K. M., Liang, L., Gunn, S. K., Darlington, G., & Ellis, K. J. (2023). A combination of prebiotic short- and long-chain inulin-type fructans enhances calcium absorption and bone mineralization in young adolescents. *American Journal of Clinical Nutrition*, *24*(2), 219–230. <https://doi.org/10.1093/ajcn.82.2.471>
- Achar, J., & Richards, M. (2012). Clostridium difficile-associated diarrhoea: An increasing health threat in the community. In *Medicine Today* (Vol. 13, Issue 5, pp. 65–69).
- Akkasheh, G., Kashani-Poor, Z., Tajabadi-Ebrahimi, M., Jafari, P., Akbari, H., Taghizadeh, M., Memarzadeh, M. R., Asemi, Z., & Esmailzadeh, A. (2016). Clinical and metabolic response to probiotic administration in patients with major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Nutrition*, *32*(3), 315–320. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2015.09.003>
- Allen, A. P., Hutch, W., Borre, Y. E., Kennedy, P. J., Temko, A., Boylan, G., Murphy, E., Cryan, J. F., Dinan, T. G., & Clarke, G. (2016). Bifidobacterium longum 1714 as a translational psychobiotic: modulation of stress, electrophysiology and neurocognition in healthy volunteers. *Translational Psychiatry*, *6*(11), e939. <https://doi.org/10.1038/tp.2016.191>
- Amachawadi, R. G., Giok, F., Shi, X., Soto, J., Narayanan, S. K., Tokach, M. D., Apley, M. D., & Nagaraja, T. G. (2018). Antimicrobial resistance of Enterococcus faecium strains isolated from commercial probiotic products used in cattle and swine. *Journal of Animal Science*, *96*(3). <https://doi.org/10.1093/jas/sky056>
- Anal, A. K., & Singh, H. (2007). Recent advances in microencapsulation of probiotics for industrial applications and targeted delivery. In *Trends in Food Science and Technology* (Vol. 18, Issue 5, pp. 240–251). <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2007.01.004>

- Anderson, R. C., Cookson, A. L., McNabb, W. C., Park, Z., McCann, M. J., Kelly, W. J., & Roy, N. C. (2010). *Lactobacillus plantarum* MB452 enhances the function of the intestinal barrier by increasing the expression levels of genes involved in tight junction formation. *BMC Microbiology*, 10(1), 316. <https://doi.org/10.1186/1471-2180-10-316>
- Antonio, M., Petrina, M., Meyn, L., & Hillier, S. (2011). P3-S7.16 *Lactobacillus crispatus* colonisation reduces risk of Bacterial Vaginosis (BV) acquisition. *Sexually Transmitted Infections*, 87(Suppl 1). <https://doi.org/10.1136/sextrans-2011-050108.499>
- Aroutcheva, A. A., Simoes, J. A., & Faro, S. (2001). Antimicrobial protein produced by vaginal *Lactobacillus acidophilus* that inhibits *gardnerella vaginalis*. *Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology*, 9(1), 33-39. <https://doi.org/10.1155/S1064744901000060>
- Arslanoglu, S., Moro, G. E., Schmitt, J., Tandoi, L., Rizzardi, S., & Boehm, G. (2008). Early Dietary Intervention with a Mixture of Prebiotic Oligosaccharides Reduces the Incidence of Allergic Manifestations and Infections during the First Two Years of Life. *The Journal of Nutrition*, 138(6), 1091-1095. <https://doi.org/10.1093/jn/138.6.1091>
- Asemi, Z., Zare, Z., Shakeri, H., Sabihi, S. S., & Esmailzadeh, A. (2013). Effect of multispecies probiotic supplements on metabolic profiles, hs-CRP, and oxidative stress in patients with type 2 diabetes. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 63(1-2), 1-9. <https://doi.org/10.1159/000349922>
- Ashaolu, T. J., & Reale, A. (2020). A holistic review on euro-asian lactic acid bacteria fermented cereals and vegetables. In *Microorganisms* (Vol. 8, Issue 8, pp. 1-24). <https://doi.org/10.3390/microorganisms8081176>
- Axelsson, L. (2004). Lactic acid bacteria: Classification and physiology. In *Lactic Acid Bacteria Microbiological and Functional Aspects, Third Edition: Revised and Expanded* (pp. 1-66).
- Aziz, F., Khan, M. N., Ahmed, S., & Andrews, S. C. (2019). Draft genome sequence of *Enterococcus faecium* SP15, a potential probiotic strain isolated from spring water. *BMC Research Notes*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s13104-019-4136-0>
- Baldelli, V., Scaldaferri, F., Putignani, L., & Del Chierico, F. (2021). The role of enterobacteriaceae in gut microbiota dysbiosis in inflammatory bowel diseases. In *Microorganisms* (Vol. 9,

- Issue 4). <https://doi.org/10.3390/microorganisms9040697>
- Bao, X., & Wu, J. (2021). Impact of food-derived bioactive peptides on gut function and health. *Food Research International*, 147(1), 110485. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110485>
- Bäumler, A. J., & Sperandio, V. (2016). Interactions between the microbiota and pathogenic bacteria in the gut. In *Nature* (Vol. 535, Issue 7610, pp. 85–93). <https://doi.org/10.1038/nature18849>
- Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2015). Neuroscience: Exploring the brain: Fourth edition. In *Neuroscience: Exploring the Brain: Fourth Edition*.
- Benjamin, J. L., Hedin, C. R. H., Koutsoumpas, A., Ng, S. C., McCarthy, N. E., Hart, A. L., Kamm, M. A., Sanderson, J. D., Knight, S. C., Forbes, A., Stagg, A. J., Whelan, K., & Lindsay, J. O. (2011). Randomised, double-blind, placebo-controlled trial of fructo- oligosaccharides in active Crohn's disease. *Gut*, 60(7), 923–929. <https://doi.org/10.1136/gut.2010.232025>
- Bermudez-Brito, M., Muñoz-Quezada, S., Gomez-Llorente, C., Romero, F., & Gil, A. (2014). Lactobacillus rhamnosus and its cell-free culture supernatant differentially modulate inflammatory biomarkers in Escherichia coli-challenged human dendritic cells. *British Journal of Nutrition*, 111(10), 1727–1737. <https://doi.org/10.1017/S0007114513004303>
- Biggs, P., & Parsons, C. M. (2008). The effects of several organic acids on growth performance, nutrient digestibilities, and cecal microbial populations in young chicks. *Poultry Science*, 87(12), 2581–2589. <https://doi.org/10.3382/ps.2008-00080>
- Bintsis. (2018). Lactic acid bacteria: their applications in foods. *Journal of Bacteriology & Mycology: Open Access*, 6(2). <https://doi.org/10.15406/jbmoa.2018.06.00182>
- Bonaz, B., Bazin, T., & Pellissier, S. (2018). The vagus nerve at the interface of the microbiota-gut-brain axis. In *Frontiers in Neuroscience* (Vol. 12, Issue FEB). <https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00049>
- Borchers, A. T., Selmi, C., Meyers, F. J., Keen, C. L., & Gershwin, M. E. (2009). Probiotics and immunity. In *Journal of Gastroenterology*. <https://doi.org/10.1007/s00535-008-2296-0>
- Borrueal, N., Carol, M., Casellas, F., Antolín, M., De Lara, F., Espín, E., Naval, J., Guarner, F., & Malagelada, J. R. (2002). Increased mucosal tumour necrosis factor α production in Crohn's

- disease can be downregulated ex vivo by probiotic bacteria. *Gut*, 51(5), 659–664. <https://doi.org/10.1136/gut.51.5.659>
- Bottazzi, V. (1994). Bacteriocins of lactic acid bacteria: Microbiology, genetics and applications. *Trends in Food Science & Technology*, 5(8), 274–275. [https://doi.org/10.1016/0924-2244\(94\)90027-2](https://doi.org/10.1016/0924-2244(94)90027-2)
- Braga, R. A. M., Nogueira, M. D. de A., Sousa, F. I. da S. e, Pinheiro, A. D. V., Lima, M. R. da S., Sousa, A. R., Batista, A. C. V., & Hoefel, A. L. (2022). Effects of probiotic supplementation on glucose metabolism and inflammatory biomarkers in pregnant women with gestational diabetes mellitus: an integrative review. *Research, Society and Development*, 11(5), e22411528199. <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i5.28199>
- Bravo, J. A., Forsythe, P., Chew, M. V., Escaravage, E., Savignac, H. M., Dinan, T. G., Bienenstock, J., & Cryan, J. F. (2011). Ingestion of *Lactobacillus* strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108(38), 16050–16055. <https://doi.org/10.1073/pnas.1102999108>
- Brouns, F., Kettlitz, B., & Arrigoni, E. (2002). Resistant starch and ‘the butyrate revolution’. *Trends in Food Science and Technology*, 13(8), 251–261. [https://doi.org/10.1016/S0924-2244\(02\)00131-0](https://doi.org/10.1016/S0924-2244(02)00131-0)
- Burdock, G. A., & Carabin, I. G. (2004). Generally recognized as safe (GRAS): History and description. *Toxicology Letters*, 150(1). <https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2003.07.004>
- Cahyaningtyas, F. D., & Wikandari, P. R. (2022). Potensi fruktooligosakarida dan inulin bahan pangan lokal sebagai sumber prebiotik. *Unesa Journal of Chemistry*, 11(2), 97–107. <https://doi.org/10.26740/ujc.v11n2.p97-107>
- Cani, P. D., Possemiers, S., Van de Wiele, T., Guiot, Y., Everard, A., Rottier, O., Geurts, L., Naslain, D., Neyrinck, A., Lambert, D. M., Muccioli, G. G., & Delzenne, N. M. (2009). Changes in gut microbiota control inflammation in obese mice through a mechanism involving GLP-2-driven improvement of gut permeability. *Gut*, 58(8), 1091–1103. <https://doi.org/10.1136/gut.2008.165886>
- Cani, Patrice D., Amar, J., Iglesias, M. A., Poggi, M., Knauf, C., Bastelica, D., Neyrinck, A. M., Fava, F., Tuohy, K. M., Chabo, C., Waget, A., Delmée, E., Cousin, B., Sulpice, T., Chamontin, B., Ferrières, J., Tanti, J. F., Gibson, G. R., Casteilla, L., ... Burcelin,

- R. (2007). Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance. *Diabetes*, 56(7), 1761–1772. <https://doi.org/10.2337/db06-1491>
- Cani, Patrice D., Bibiloni, R., Knauf, C., Waget, A., Neyrinck, A. M., Delzenne, N. M., & Burcelin, R. (2008). Changes in gut microbiota control metabolic endotoxemia-induced inflammation in high-fat diet-induced obesity and diabetes in mice. *Diabetes*, 57(6), 1470–1481. <https://doi.org/10.2337/db07-1403>
- Carvalho, A. S., Silva, J., Ho, P., Teixeira, P., Malcata, F. X., & Gibbs, P. (2004). Relevant factors for the preparation of freeze-dried lactic acid bacteria. In *International Dairy Journal* (Vol. 14, Issue 10, pp. 835–847). <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2004.02.001>
- Causey, J. L., Feirtag, J. M., Gallaher, D. D., Tunland, B. C., & Slavin, J. L. (2000). Effects of dietary inulin on serum lipids, blood glucose and the gastrointestinal environment in hypercholesterolemic men. *Nutrition Research*, 20(2), 191–201. [https://doi.org/10.1016/S0271-5317\(99\)00152-9](https://doi.org/10.1016/S0271-5317(99)00152-9)
- Chang, D., Zhu, Y., Fang, X., Li, T., Wang, J., Guo, Y., Su, L., Liu, Y., Jiang, X., Wang, L., Guo, N., & Liu, C. (2013). Draft genome sequences of the *Enterococcus faecium* strain LCT-EF258. *Genome Announcements*, 1(1). <https://doi.org/10.1128/genomeA.00147-12>
- Charalampopoulos, D., Pandiella, S. S., & Webb, C. (2002). Growth studies of potentially probiotic lactic acid bacteria in cereal-based substrates. *Journal of Applied Microbiology*, 92(5), 851–859. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.2002.01592.x>
- Charalampopoulos, D., Wang, R., Pandiella, S. S., & Webb, C. (2002). Application of cereals and cereal components in functional foods: A review. *International Journal of Food Microbiology*, 79(1–2), 131–141. [https://doi.org/10.1016/S0168-1605\(02\)00187-3](https://doi.org/10.1016/S0168-1605(02)00187-3)
- Charteris, W. P., Kelly, P. M., Morelli, L., & Collins, J. K. (1998). Development and application of an in vitro methodology to determine the transit tolerance of potentially probiotic *Lactobacillus* and *Bifidobacterium* species in the upper human gastrointestinal tract. *Journal of Applied Microbiology*, 84(5), 759–768. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.1998.00407.x>
- Collado, M. C., Meriluoto, J., & Salminen, S. (2007). In vitro analysis of

- probiotic strain combinations to inhibit pathogen adhesion to human intestinal mucus. *Food Research International*, 40(5), 629–636.
<https://doi.org/10.1016/j.foodres.2006.11.007>
- Cook, M. T., Tzortzis, G., Charalampopoulos, D., & Khutoryanskiy, V. V. (2012). Microencapsulation of probiotics for gastrointestinal delivery. *Journal of Controlled Release*, 162(1), 56–67.
<https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2012.06.003>
- Corr, S. C., Li, Y., Riedel, C. U., O'Toole, P. W., Hill, C., & Gahan, C. G. M. (2007). Bacteriocin production as a mechanism for the anti-infective activity of *Lactobacillus salivarius* UCC118. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 104(18), 7617–7621.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0700440104>
- Cremonini, F., Di Caro, S., Nista, E. C., Bartolozzi, F., Capelli, G., Gasbarrini, G., & Gasbarrini, A. (2002). Meta-analysis: The effect of probiotic administration on antibiotic-associated diarrhoea. *Alimentary Pharmacology and Therapeutics*, 16(8), 1461–1467. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2036.2002.01318.x>
- Cruchet, S., Furnes, R., Maruy, A., Hebel, E., Palacios, J., Medina, F., Ramirez, N., Orsi, M., Rondon, L., Sdepanian, V., Xóchihua, L., Ybarra, M., & Zablah, R. A. (2015). The Use of Probiotics in Pediatric Gastroenterology: A Review of the Literature and Recommendations by Latin-American Experts. In *Pediatric Drugs* (Vol. 17, Issue 3, pp. 199–216).
<https://doi.org/10.1007/s40272-015-0124-6>
- Cryan, J. F., & Dinan, T. G. (2012). Mind-altering microorganisms: The impact of the gut microbiota on brain and behaviour. In *Nature Reviews Neuroscience* (Vol. 13, Issue 10, pp. 701–712). <https://doi.org/10.1038/nrn3346>
- Cryan, J. F., O'riordan, K. J., Cowan, C. S. M., Sandhu, K. V., Bastiaansen, T. F. S., Boehme, M., Codagnone, M. G., Cusotto, S., Fulling, C., Golubeva, A. V., Guzzetta, K. E., Jaggar, M., Long-Smith, C. M., Lyte, J. M., Martin, J. A., Molinero-Perez, A., Moloney, G., Morelli, E., Morillas, E., ... Dinan, T. G. (2019). The microbiota-gut-brain axis. *Physiological Reviews*, 99(4), 1877–2013.
<https://doi.org/10.1152/physrev.00018.2018>
- Dahiya, D. K., Renuka, Puniya, M., Shandilya, U. K., Dhewa, T., Kumar, N., Kumar, S., Puniya, A. K., & Shukla, P. (2017). Gut

- Microbiota Modulation and Its Relationship with Obesity Using Prebiotic Fibers and Probiotics: A Review. *Frontiers in Microbiology*, 8(APR).
<https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00563>
- Dai, Y., Quan, J., Xiong, L., Luo, Y., & Yi, B. (2022). Probiotics improve renal function, glucose, lipids, inflammation and oxidative stress in diabetic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. *Renal Failure*, 44(1), 862–880.
<https://doi.org/10.1080/0886022X.2022.2079522>
- Davenport, E. R., Mizrahi-Man, O., Michelini, K., Barreiro, L. B., Ober, C., & Gilad, Y. (2014). Seasonal variation in human gut microbiome composition. *PLoS ONE*, 9(3).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090731>
- David, L. A., Maurice, C. F., Carmody, R. N., Gootenberg, D. B., Button, J. E., Wolfe, B. E., Ling, A. V., Devlin, A. S., Varma, Y., Fischbach, M. A., Biddinger, S. B., Dutton, R. J., & Turnbaugh, P. J. (2014). Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome. *Nature*, 505(7484), 559–563.
<https://doi.org/10.1038/nature12820>
- Davidson, M. H., & Maki, K. C. (1999). Effects of Dietary Inulin on Serum Lipids. *The Journal of Nutrition*, 129(7), 1474S–1477S.
<https://doi.org/10.1093/jn/129.7.1474S>
- Davidson, M. H., Maki, K. C., Synecki, C., Torri, S. A., & Drennan, K. B. (1998). Effects of dietary inulin on serum lipids in men and women with hypercholesterolemia. *Nutrition Research*, 18(3), 503–517. [https://doi.org/10.1016/S0271-5317\(98\)00038-4](https://doi.org/10.1016/S0271-5317(98)00038-4)
- De Cesare, A., Sirri, F., Manfreda, G., Moniaci, P., Giardini, A., Zampiga, M., & Meluzzi, A. (2017). Effect of dietary supplementation with *Lactobacillus acidophilus* D2/CSL (CECT 4529) on caecum microbioma and productive performance in broiler chickens. *PLoS ONE*.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176309>
- De Filippo, C., Cavalieri, D., Di Paola, M., Ramazzotti, M., Poullet, J. B., Massart, S., Collini, S., Pieraccini, G., & Lionetti, P. (2010). Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(33), 14691–14696. <https://doi.org/10.1073/pnas.1005963107>
- Deegan, L. H., Cotter, P. D., Hill, C., & Ross, P. (2006). Bacteriocins: Biological tools for bio-preservation and shelf-life extension. In *International Dairy Journal* (Vol. 16, Issue 9, pp. 1058–

- 1071). <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2005.10.026>
- Dethlefsen, L., & Relman, D. A. (2011). Incomplete recovery and individualized responses of the human distal gut microbiota to repeated antibiotic perturbation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *108*(supplement_1), 4554–4561. <https://doi.org/10.1073/pnas.1000087107>
- Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2017). Brain–gut–microbiota axis — mood, metabolism and behaviour. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, *14*(2), 69–70. <https://doi.org/10.1038/nrgastro.2016.200>
- Dong, P., Yang, Y., & Wang, W. ping. (2010). The role of intestinal bifidobacteria on immune system development in young rats. *Early Human Development*, *86*(1), 51–58. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2010.01.002>
- Dunne, C., O’Mahony, L., Murphy, L., Thornton, G., Morrissey, D., O’Halloran, S., Feeney, M., Flynn, S., Fitzgerald, G., Daly, C., Kiely, B., O’Sullivan, G. C., Shanahan, F., & Collins, J. K. (2001). In vitro selection criteria for probiotic bacteria of human origin: correlation with in vivo findings. *The American Journal of Clinical Nutrition*, *73*(2), 386s-392s. <https://doi.org/10.1093/ajcn/73.2.386s>
- Duvetter, T., Sila, D. N., Van Buggenhout, S., Jolie, R., Van Loey, A., & Hendrickx, M. (2009). Pectins in processed fruit and vegetables: Part I - Stability and catalytic activity of pectinases. In *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* (Vol. 8, Issue 2, pp. 75–85). <https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2009.00070.x>
- EFSA. (2007). Introduction of a Qualified Presumption of Safety (QPS) approach for assessment of selected microorganisms referred to EFSA - Opinion of the Scientific Committee. *Journal*, *5*(12), 587. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2007.587>
- El Khamisy, A. E. S. (2010). Effect of Bifidobacterium and Lactobacillus acidophilus in diabetic rats The 5 th Arab and 2 nd International Annual Scientific Conference. *Le*, *2385*(89). <https://pdfs.semanticscholar.org/ae95/0c75a3621b2c4ada0ddc03dfa7d827bf979a.pdf>
- Erny, D., De Angelis, A. L. H., Jaitin, D., Wieghofer, P., Staszewski, O., David, E., Keren-Shaul, H., Mahlakoiv, T., Jakobshagen, K., Buch, T., Schwierzeck, V., Utermöhlen, O., Chun, E., Garrett, W. S., McCoy, K. D., Diefenbach, A., Staeheli, P., Stecher, B.,

- Amit, I., & Prinz, M. (2015). Host microbiota constantly control maturation and function of microglia in the CNS. *Nature Neuroscience*, 18(7), 965–977. <https://doi.org/10.1038/nn.4030>
- Eschenbach, D. A., Davick, P. R., Williams, B. L., Klebanoff, S. J., Young-Smith, K., Critchlow, C. M., & Holmes, K. K. (1989). Prevalence of hydrogen peroxide-producing *Lactobacillus* species in normal women and women with bacterial vaginosis. *Journal of Clinical Microbiology*, 27(2), 251–256. <https://doi.org/10.1128/jcm.27.2.251-256.1989>
- FAO/WHO. (2002). *Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. Report of a Joint FAO/WHO Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food*. London, Ontario, Canada.
- Farnworth, E. R. (2005). Kefir ? a complex probiotic. *Food Science & Technology Bulletin: Functional Foods*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.1616/1476-2137.13938>
- Flint, H. J., Scott, K. P., Duncan, S. H., Louis, P., & Forano, E. (2012). Microbial degradation of complex carbohydrates in the gut. *Gut Microbes*, 3(4), 289–306. <https://doi.org/10.4161/gmic.19897>
- Fonseca, F., Béal, C., & Corrieu, G. (2001). Operating conditions that affect the resistance of lactic acid bacteria to freezing and frozen storage. *Cryobiology*, 43(3), 189–198. <https://doi.org/10.1006/cryo.2001.2343>
- Forsythe, P., & Bienenstock, J. (2010). Immunomodulation by Commensal and Probiotic Bacteria. *Immunological Investigations*, 39(4–5), 429–448. <https://doi.org/10.3109/08820131003667978>
- Foster, J. A., Rinaman, L., & Cryan, J. F. (2017). Stress & the gut-brain axis: Regulation by the microbiome. In *Neurobiology of Stress* (Vol. 7, pp. 124–136). <https://doi.org/10.1016/j.ynstr.2017.03.001>
- Frank, D. N., St. Amand, A. L., Feldman, R. A., Boedeker, E. C., Harpaz, N., & Pace, N. R. (2007). Molecular-phylogenetic characterization of microbial community imbalances in human inflammatory bowel diseases. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 104(34), 13780–13785. <https://doi.org/10.1073/pnas.0706625104>
- Franz, C. M. A. P., Huch, M., Abriouel, H., Holzapfel, W., & Gálvez, A.

- (2011). Enterococci as probiotics and their implications in food safety. *International Journal of Food Microbiology*, 151(2), 125–140. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2011.08.014>
- Fu, N., & Chen, X. D. (2011). Towards a maximal cell survival in convective thermal drying processes. In *Food Research International* (Vol. 44, Issue 5, pp. 1127–1149). <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.03.053>
- Fukuda, S., Toh, H., Taylor, T. D., Ohno, H., & Hattori, M. (2012). Acetate-producing bifidobacteria protect the host from enteropathogenic infection via carbohydrate transporters. *Gut Microbes*, 3(5). <https://doi.org/10.4161/gmic.21214>
- Fuller, R. (1989). Probiotics in man and animals. *Journal of Applied Bacteriology*, 66.
- Furusawa, Y., Obata, Y., Fukuda, S., Endo, T. A., Nakato, G., Takahashi, D., Nakanishi, Y., Uetake, C., Kato, K., Kato, T., Takahashi, M., Fukuda, N. N., Murakami, S., Miyauchi, E., Hino, S., Atarashi, K., Onawa, S., Fujimura, Y., Lockett, T., ... Ohno, H. (2013). Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells. *Nature*, 504(7480), 446–450. <https://doi.org/10.1038/nature12721>
- Gallo, R. L., & Hooper, L. V. (2012). Epithelial antimicrobial defence of the skin and intestine. In *Nature Reviews Immunology* (Vol. 12, Issue 7, pp. 503–516). <https://doi.org/10.1038/nri3228>
- Gänzle, M. ., & Vogel, R. . (2003). Contribution of reutericyclin production to the stable persistence of *Lactobacillus reuteri* in an industrial sourdough fermentation. *International Journal of Food Microbiology*, 80(1), 31–45. [https://doi.org/10.1016/S0168-1605\(02\)00146-0](https://doi.org/10.1016/S0168-1605(02)00146-0)
- Gänzle, M. G. (2015). Lactic metabolism revisited: Metabolism of lactic acid bacteria in food fermentations and food spoilage. In *Current Opinion in Food Science* (Vol. 2, pp. 106–117). <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2015.03.001>
- Gänzle, M. G., Hertel, C., Van Der Vossen, J. M. B. M., & Hammes, W. P. (1999). Effect of bacteriocin-producing lactobacilli on the survival of *Escherichia coli* and *Listeria* in a dynamic model of the stomach and the small intestine. *International Journal of Food Microbiology*, 48(1), 21–35. [https://doi.org/10.1016/S0168-1605\(99\)00025-2](https://doi.org/10.1016/S0168-1605(99)00025-2)
- Gao, Z., Yin, J., Zhang, J., Ward, R. E., Martin, R. J., Lefevre, M., Cefalu, W. T., & Ye, J. (2009). Butyrate improves insulin sensitivity

- and increases energy expenditure in mice. *Diabetes*, 58(7), 1509–1517. <https://doi.org/10.2337/db08-1637>
- Gaudier, E., Michel, C., Segain, J.-P., Cherbut, C., & Hoebler, C. (2005). The VSL# 3 Probiotic Mixture Modifies Microflora but Does Not Heal Chronic Dextran-Sodium Sulfate-Induced Colitis or Reinforce the Mucus Barrier in Mice. *The Journal of Nutrition*, 135(12), 2753–2761. <https://doi.org/10.1093/jn/135.12.2753>
- Gibson, G. R., & Roberfroid, M. B. (1995). Dietary modulation of the human colonic microbiota: Introducing the concept of prebiotics. In *Journal of Nutrition* (Vol. 125, Issue 6, pp. 1401–1412). <https://doi.org/10.1093/jn/125.6.1401>
- Gibson, Glenn R., Probert, H. M., Loo, J. Van, Rastall, R. A., & Roberfroid, M. B. (2004). Dietary modulation of the human colonic microbiota: updating the concept of prebiotics. *Nutrition Research Reviews*, 17(2), 259–275. <https://doi.org/10.1079/NRR200479>
- Gill, H. S., Rutherford, K. J., & Cross, M. L. (2001). Dietary probiotic supplementation enhances natural killer cell activity in the elderly: An investigation of age-related immunological changes. *Journal of Clinical Immunology*, 21(4), 264–271. <https://doi.org/10.1023/A:1010979225018>
- Gomes, A. C., Bueno, A. A., de Souza, R. G. M., & Mota, J. F. (2014). Gut microbiota, probiotics and diabetes. *Nutrition Journal*, 13(1), 60. <https://doi.org/10.1186/1475-2891-13-60>
- Goodrich, J. K., Waters, J. L., Poole, A. C., Sutter, J. L., Koren, O., Blekhman, R., Beaumont, M., Van Treuren, W., Knight, R., Bell, J. T., Spector, T. D., Clark, A. G., & Ley, R. E. (2014). Human Genetics Shape the Gut Microbiome. *Cell*, 159(4), 789–799. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2014.09.053>
- Grill, J. P., Manginot-Dor, C., Schneider, F., & Ballongue, J. (1995). Bifidobacteria and probiotic effects: Action of Bifidobacterium species on conjugated bile salts. *Current Microbiology*, 31(1), 23–27. <https://doi.org/10.1007/BF00294629>
- Gritz, E. C., & Bhandari, V. (2015). The Human Neonatal Gut Microbiome: A Brief Review. In *Frontiers in Pediatrics* (Vol. 3). <https://doi.org/10.3389/fped.2015.00017>
- Guandalini, S. (2008). Probiotics for children with diarrhea: an update. In *Journal of clinical gastroenterology: Vol. 42 Suppl 2*.
- Gupta, A., & Khanna, S. (2014). Community-acquired clostridium

- difficile infection: An increasing public health threat. In *Infection and Drug Resistance* (Vol. 7, pp. 63–72). <https://doi.org/10.2147/IDR.S46780>
- Hafsan. (2014). Bakteriosin asal bakteri asam laktat sebagai biopreservatif pangan. *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 12(2). <https://doi.org/10.24252/teknosains.v8i2.1905>
- Hafsan. (2020). Functional Characteristics of Lactobacillus Fermentum Origin of Whey (Waste Processing) Dangke Products as Probiotic Candidate. *International Journal of Current Science and Multidisciplinary Research*.
- Hafsan. (2022). *Prospek dan Perkembangan Bioteknologi Mikroba*.
- Hamer, H. M., Jonkers, D., Venema, K., Vanhoutvin, S., Troost, F. J., & Brummer, R. J. (2008). Review article: The role of butyrate on colonic function. In *Alimentary Pharmacology and Therapeutics* (Vol. 27, Issue 2, pp. 104–119). <https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2007.03562.x>
- Hansen, R., Mahdi, G., McIntyre, K., MacFarlane, G. T., Macfarlane, S., & Wilson, D. C. (2011). Synbiotics for Inflammatory Bowel Disease: Useful in Adults but Problematic in Paediatrics. *Gastroenterology*, 140(5), S-507-S-508. [https://doi.org/10.1016/s0016-5085\(11\)62104-5](https://doi.org/10.1016/s0016-5085(11)62104-5)
- Haro, D., Marrero, P. F., & Relat, J. (2019). Nutritional regulation of gene expression: Carbohydrate-, fat-and amino acid-dependent modulation of transcriptional activity. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(6). <https://doi.org/10.3390/ijms20061386>
- Hegarty, J. W., Guinane, C. M., Ross, R. P., Hill, C., & Cotter, P. D. (2016). Bacteriocin production: A relatively unharnessed probiotic trait? In *F1000Research* (Vol. 5). <https://doi.org/10.12688/f1000research.9615.1>
- Heller, K. J. (2001). Probiotic bacteria in fermented foods: product characteristics and starter organisms. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 73(2), 374s-379s. <https://doi.org/10.1093/ajcn/73.2.374s>
- Hernández, M. A. G., Canfora, E. E., Jocken, J. W. E., & Blaak, E. E. (2019). The short-chain fatty acid acetate in body weight control and insulin sensitivity. In *Nutrients* (Vol. 11, Issue 8). <https://doi.org/10.3390/nu11081943>
- Hill, C., Guarner, F., Reid, G., Gibson, G. R., Merenstein, D. J., Pot, B., Morelli, L., Canani, R. B., Flint, H. J., Salminen, S., Calder, P. C., & Sanders, M. E. (2014). Expert consensus document: The

- international scientific association for probiotics and prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. *Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology*, 11(8), 506–514. <https://doi.org/10.1038/nrgastro.2014.66>
- Hill, D., Sugrue, I., Tobin, C., Hill, C., Stanton, C., & Ross, R. P. (2018). The Lactobacillus casei Group: History and Health Related Applications. *Frontiers in Microbiology*, 9(SEP). <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02107>
- Holdeman, L. V., Good, I. J., & Moore, W. E. C. (1976). Human fecal flora: variation in bacterial composition within individuals and a possible effect of emotional stress. *Applied and Environmental Microbiology*, 31(3). <https://doi.org/10.1128/aem.31.3.359-375.1976>
- Hosseini, E., Grootaert, C., Verstraete, W., & Van de Wiele, T. (2011). Propionate as a health-promoting microbial metabolite in the human gut. In *Nutrition Reviews* (Vol. 69, Issue 5, pp. 245–258). <https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2011.00388.x>
- Hu, J., Ran, C., He, S., Cao, Y., Yao, B., Ye, Y., Zhang, X., & Zhou, Z. (2016). Dietary microbial phytase exerts mixed effects on the gut health of tilapia: a possible reason for the null effect on growth promotion. *British Journal of Nutrition*, 115(11), 1958–1966. <https://doi.org/10.1017/S0007114516001240>
- Huang, C.-H., Li, S.-W., Huang, L., & Watanabe, K. (2018). Identification and Classification for the Lactobacillus casei Group. *Frontiers in Microbiology*, 9(AUG). <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01974>
- Huang, J., Huang, J., Yin, T., Lv, H., Zhang, P., & Li, H. (2021). Enterococcus faecium R0026 combined with Bacillus subtilis R0179 prevent obesity-associated hyperlipidemia and modulate gut microbiota in C57BL/6 Mice. *Journal of Microbiology and Biotechnology*, 31(2), 181–188. <https://doi.org/10.4014/JMB.2009.09005>
- Huang, X., Hu, J., Zhang, H., Li, J., Zhu, X., Liu, Y., Liang, Y., & Mei, Y. (2023). Clostridium butyricum and Chitooligosaccharides in Synbiotic Combination Ameliorate Symptoms in a DSS-Induced Ulcerative Colitis Mouse Model by Modulating Gut Microbiota and Enhancing Intestinal Barrier Function. *Microbiology Spectrum*, 11(2), e0437022. <https://doi.org/10.1128/spectrum.04370-22>
- Huis In't Veld, J. H. J., & Shortt, C. (1996). Selection criteria for

- probiotic micro-organisms. *International Congress and Symposium Series - Royal Society of Medicine*, 5(219), 27–36.
- Huis Veld, J. H. J. I. T., & Havenaar, R. (1991). Probiotics and health in man and animal. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 51(4).
<https://doi.org/10.1002/jctb.280510419>
- Imlay, J. A. (2003). Pathways of Oxidative Damage. In *Annual Review of Microbiology* (Vol. 57, pp. 395–418).
<https://doi.org/10.1146/annurev.micro.57.030502.090938>
- Ishikawa, H., Akedo, I., Otani, T., Umesaki, Y., Tanaka, R., & Imaoka, A. (2003). Randomized Controlled Trial of the Effect of Bifidobacteria-Fermented Milk on Ulcerative Colitis. *Journal of the American College of Nutrition*, 22(1), 56–63.
<https://doi.org/10.1080/07315724.2003.10719276>
- Jain, K. K. (2013). Molecular Neuropharmacology. In *Applications of Biotechnology in Neurology* (pp. 211–225).
https://doi.org/10.1007/978-1-62703-272-8_6
- Janicak, P. G. (2002). Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience. *American Journal of Psychiatry*, 159(7), 1251–1251.
<https://doi.org/10.1176/appi.ajp.159.7.1251>
- JANICAK, P. G. (2002). Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience. *American Journal of Psychiatry*, 159(7), 1251–1251.
<https://doi.org/10.1176/appi.ajp.159.7.1251>
- Jay, J. M. (1982). Antimicrobial properties of diacetyl. *Applied and Environmental Microbiology*, 44(3), 525–532.
<https://doi.org/10.1128/aem.44.3.525-532.1982>
- Jayabalan, R., Malbaša, R. V., Lončar, E. S., Vitas, J. S., & Sathishkumar, M. (2014). A review on kombucha tea-microbiology, composition, fermentation, beneficial effects, toxicity, and tea fungus. In *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* (Vol. 13, Issue 4, pp. 538–550).
<https://doi.org/10.1111/1541-4337.12073>
- Jernberg, C., Löfmark, S., Edlund, C., & Jansson, J. K. (2010). Long-term impacts of antibiotic exposure on the human intestinal microbiota. In *Microbiology* (Vol. 156, Issue 11).
<https://doi.org/10.1099/mic.0.040618-0>
- Jiang, Y., Liu, J., & Ren, H. Y. (2011). Probiotics and gastrointestinal diseases. *World Chinese Journal of Digestology*, 19(17), 1813–1818. <https://doi.org/10.11569/wcjd.v19.i17.1813>
- Johannsen, E. (1972). Influence of Various Factors on the Survival of

- Lactobacillus leichmannii during Freezing and Thawing. *Journal of Applied Bacteriology*, 35(3), 415–421. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.1972.tb03717.x>
- Johansson, M. E. V., Phillipson, M., Petersson, J., Velcich, A., Holm, L., & Hansson, G. C. (2008). The inner of the two Muc2 mucin-dependent mucus layers in colon is devoid of bacteria. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 105(39), 15064–15069. <https://doi.org/10.1073/pnas.0803124105>
- Jurášková, D., Ribeiro, S. C., & Silva, C. C. G. (2022). Exopolysaccharides Produced by Lactic Acid Bacteria: From Biosynthesis to Health-Promoting Properties. *Foods*, 11(2), 156. <https://doi.org/10.3390/foods11020156>
- Juven, B. J., & Pierson, M. D. (1996). Antibacterial effects of hydrogen peroxide and methods for its detection and quantitation. *Journal of Food Protection*, 59(11), 1233–1241. <https://doi.org/10.4315/0362-028X-59.11.1233>
- Kassinen, A., Krogius-Kurikka, L., Mäkivuokko, H., Rinttilä, T., Paulin, L., Corander, J., Malinen, E., Apajalahti, J., & Palva, A. (2007). The Fecal Microbiota of Irritable Bowel Syndrome Patients Differs Significantly From That of Healthy Subjects. *Gastroenterology*, 133(1), 24–33. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2007.04.005>
- Kavas, N., Kavas, G., Kınık, Ö., Ateş, M., Şatır, G., & Kaplan, M. (2022). Effect of probiotic and symbiotic microencapsulation supplementation on the physico-chemical characteristics and organic acid content of goat cheese. *Journal of Food Processing and Preservation*, 46(10). <https://doi.org/10.1111/jfpp.16815>
- Khalil, E. S., Manap, M. Y., Mustafa, S., Amid, M., Alhelli, A. M., & Aljoubori, A. (2018). Probiotic characteristics of exopolysaccharides-producing Lactobacillus isolated from some traditional Malaysian fermented foods. *CyTA - Journal of Food*, 16(1), 287–298. <https://doi.org/10.1080/19476337.2017.1401007>
- Kim, S.-J., Park, S., Sin, H.-S., Jang, S.-H., Lee, S.-W., Kim, S.-Y., Kwon, B., Yu, K.-Y., Kim, S., & Yang, D. (2017). Hypocholesterolemic Effects of Probiotic Mixture on Diet-Induced Hypercholesterolemic Rats. *Nutrients*, 9(3), 293. <https://doi.org/10.3390/nu9030293>
- Kim, S. K., Guevarra, R. B., Kim, Y. T., Kwon, J., Kim, H., Cho, J. H., Kim, H. B., & Lee, J. H. (2019). Role of probiotics in human gut

- microbiome-associated diseases. *Journal of Microbiology and Biotechnology*, 29(9), 1335–1340. <https://doi.org/10.4014/jmb.1906.06064>
- Kim, Y. A., Keogh, J. B., & Clifton, P. M. (2018). Probiotics, prebiotics, synbiotics and insulin sensitivity. In *Nutrition Research Reviews* (Vol. 31, Issue 1, pp. 35–51). <https://doi.org/10.1017/S095442241700018X>
- Klaenhammer, T. (1999). Selection and design of probiotics. *International Journal of Food Microbiology*, 50(1–2), 45–57. [https://doi.org/10.1016/S0168-1605\(99\)00076-8](https://doi.org/10.1016/S0168-1605(99)00076-8)
- Klaenhammer, T. R. (1993). Genetics of bacteriocins produced by lactic acid bacteria. *FEMS Microbiology Reviews*, 12(1–3), 39–85. <https://doi.org/10.1111/j.1574-6976.1993.tb00012.x>
- Knights, D., Silverberg, M. S., Weersma, R. K., Gevers, D., Dijkstra, G., Huang, H., Tyler, A. D., van Sommeren, S., Imhann, F., Stempak, J. M., Huang, H., Vangay, P., Al-Ghalith, G. A., Russell, C., Sauk, J., Knight, J., Daly, M. J., Huttenhower, C., & Xavier, R. J. (2014). Complex host genetics influence the microbiome in inflammatory bowel disease. *Genome Medicine*, 6(12), 107. <https://doi.org/10.1186/s13073-014-0107-1>
- Kok, R. G., De Waal, A., Schut, F., Welling, G. W., Weenk, G., & Hellingwerf, K. J. (1996). Specific detection and analysis of a probiotic Bifidobacterium strain in infant feces. *Applied and Environmental Microbiology*, 62(10), 3668–3672. <https://doi.org/10.1128/aem.62.10.3668-3672.1996>
- Kolida, S., & Gibson, G. R. (2011). Synbiotics in Health and Disease. *Annual Review of Food Science and Technology*, 2(1), 373–393. <https://doi.org/10.1146/annurev-food-022510-133739>
- Koutnikova, H., Genser, B., Monteiro-Sepulveda, M., Faurie, J. M., Rizkalla, S., Schrezenmeir, J., & Clement, K. (2019). Impact of bacterial probiotics on obesity, diabetes and non-alcoholic fatty liver disease related variables: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. In *BMJ Open* (Vol. 9, Issue 3). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017995>
- Krajmalnik-Brown, R., Ilhan, Z. E., Kang, D. W., & DiBaise, J. K. (2012). Effects of gut microbes on nutrient absorption and energy regulation. In *Nutrition in Clinical Practice* (Vol. 27, Issue 2, pp. 201–214).

<https://doi.org/10.1177/0884533611436116>

- Krasaekoopt, W., Bhandari, B., & Deeth, H. (2004). The influence of coating materials on some properties of alginate beads and survivability of microencapsulated probiotic bacteria. *International Dairy Journal*, 14(8), 737–743. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2004.01.004>
- Kwon, H. K., Lee, C. G., So, J. S., Chae, C. S., Hwang, J. S., Sahoo, A., Nam, J. H., Rhee, J. H., Hwang, K. C., & Im, S. H. (2010). Generation of regulatory dendritic cells and CD4+Foxp3 + T cells by probiotics administration suppresses immune disorders. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 107(5), 2159–2164. <https://doi.org/10.1073/pnas.0904055107>
- Laparra, J. M., & Sanz, Y. (2010). Interactions of gut microbiota with functional food components and nutraceuticals. In *Pharmacological Research* (Vol. 61, Issue 3, pp. 219–225). <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2009.11.001>
- Latif, A., Shehzad, A., Niazi, S., Zahid, A., Ashraf, W., Iqbal, M. W., Rehman, A., Riaz, T., Aadil, R. M., Khan, I. M., Özogul, F., Rocha, J. M., Esatbeyoglu, T., & Korma, S. A. (2023). Probiotics: mechanism of action, health benefits and their application in food industries. In *Frontiers in Microbiology* (Vol. 14). <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1216674>
- LeBlanc, J. G., Milani, C., de Giori, G. S., Sesma, F., van Sinderen, D., & Ventura, M. (2013). Bacteria as vitamin suppliers to their host: A gut microbiota perspective. In *Current Opinion in Biotechnology* (Vol. 24, Issue 2, pp. 160–168). <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2012.08.005>
- Lee, J.-H., & O'Sullivan, D. J. (2010). Genomic Insights into Bifidobacteria. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 74(3). <https://doi.org/10.1128/mnbr.00004-10>
- Li, X., Fu, B., Zhao, C., Hu, J., Zhang, X., Fu, Y., She, X., Gu, C., Cheng, M., Wang, F., Song, X., Dai, J., Yin, J., Fu, Y., Zheng, P., Wu, F., Zhu, Y., Ma, K., Gao, X., ... Cui, B. (2023). Early-life noise exposure causes cognitive impairment in a sex-dependent manner by disrupting homeostasis of the microbiota-gut-brain axis. *Brain, Behavior, and Immunity*, 114, 221–239. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2023.08.021>
- Liang, Y., & Qin, H. L. (2012). Probiotic-induced changes in intestinal cell signaling pathways. *Chinese Journal of Clinical Nutrition*, 20(2), 112–116. <https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.1674-635X.2012.02.011>

- Liao, M., Zhang, Y., Qiu, Y., Wu, Z., Zhong, Z., Zeng, X., Zeng, Y., Xiong, L., Wen, Y., & Liu, R. (2021). Fructooligosaccharide supplementation alleviated the pathological immune response and prevented the impairment of intestinal barrier in DSS-induced acute colitis mice. *Food and Function*, *12*(20), 9844–9854. <https://doi.org/10.1039/d1fo01147b>
- Liisa, L., & Markus, L. (2018). Probiotics and bifidobacterium lactis HN019 in gastrointestinal and immune health of the elderly. *Agro Food Industry Hi-Tech*, *29*(6), 32–35.
- Likotrafiti, E., Tuohy, K. M., Gibson, G. R., & Rastall, R. A. (2013a). Development of antimicrobial synbiotics using potentially-probiotic faecal isolates of *Lactobacillus fermentum* and *Bifidobacterium longum*. *Anaerobe*, *20*, 5–13. <https://doi.org/10.1016/j.anaerobe.2013.01.002>
- Likotrafiti, E., Tuohy, K. M., Gibson, G. R., & Rastall, R. A. (2013b). Development of antimicrobial synbiotics using potentially-probiotic faecal isolates of *Lactobacillus fermentum* and *Bifidobacterium longum*. *Anaerobe*, *20*(1), 5–13. <https://doi.org/10.1016/j.anaerobe.2013.01.002>
- Lilly, D. M., & Stillwell, R. H. (1965). Probiotics: Growth-Promoting Factors Produced by Microorganisms. *Science*, *147*(3659), 747–748. <https://doi.org/10.1126/science.147.3659.747>
- Liong, M. T., & Shah, N. P. (2005). Bile salt deconjugation and BSH activity of five bifidobacterial strains and their cholesterol co-precipitating properties. *Food Research International*, *38*(2), 135–142. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2004.08.003>
- Liu, L., Huh, J. R., & Shah, K. (2022). Microbiota and the gut-brain-axis: Implications for new therapeutic design in the CNS. *EBioMedicine*, *77*(1), 103908. <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.103908>
- Liu, Y., Wang, J., & Wu, C. (2022). Modulation of Gut Microbiota and Immune System by Probiotics, Pre-biotics, and Post-biotics. In *Frontiers in Nutrition* (Vol. 8). <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.634897>
- Long-Smith, C., O’Riordan, K. J., Clarke, G., Stanton, C., Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2020). Microbiota-gut-brain axis: New therapeutic opportunities. In *Annual Review of Pharmacology and Toxicology* (Vol. 60, pp. 477–502). <https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-010919-023628>
- López, P., González-Rodríguez, I., Gueimonde, M., Margolles, A., &

- Suárez, A. (2011). Immune response to *Bifidobacterium bifidum* strains support Treg/Th17 plasticity. *PLoS ONE*, 6(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0024776>
- Louis, P., & Flint, H. J. (2017). Formation of propionate and butyrate by the human colonic microbiota. In *Environmental Microbiology* (Vol. 19, Issue 1, pp. 29–41). <https://doi.org/10.1111/1462-2920.13589>
- Lozupone, C. A., Stombaugh, J. I., Gordon, J. I., Jansson, J. K., & Knight, R. (2012). Diversity, stability and resilience of the human gut microbiota. In *Nature* (Vol. 489, Issue 7415, pp. 220–230). <https://doi.org/10.1038/nature11550>
- Maassen, C. B. M., Van Holten-Neelen, C., Balk, F., Heijne Den Bak-Glashouwer, M. J., Leer, R. J., Laman, J. D., Boersma, W. J. A., & Claassen, E. (2000). Strain-dependent induction of cytokine profiles in the gut by orally administered *Lactobacillus* strains. *Vaccine*, 18(23), 2613–2623. [https://doi.org/10.1016/S0264-410X\(99\)00378-3](https://doi.org/10.1016/S0264-410X(99)00378-3)
- Macfarlane, S., Cleary, S., Bahrami, B., Reynolds, N., & Macfarlane, G. T. (2013). Synbiotic consumption changes the metabolism and composition of the gut microbiota in older people and modifies inflammatory processes: A randomised, double-blind, placebo-controlled crossover study. *Alimentary Pharmacology and Therapeutics*, 38(7), 804–816. <https://doi.org/10.1111/apt.12453>
- Macfarlane, Sandra, & Macfarlane, G. T. (2003). Regulation of short-chain fatty acid production. *Proceedings of the Nutrition Society*, 62(1), 67–72. <https://doi.org/10.1079/pns2002207>
- Macia, L., Thorburn, A. N., Binge, L. C., Marino, E., Rogers, K. E., Maslowski, K. M., Vieira, A. T., Kranich, J., & Mackay, C. R. (2012). Microbial influences on epithelial integrity and immune function as a basis for inflammatory diseases. In *Immunological Reviews* (Vol. 245, Issue 1, pp. 164–176). <https://doi.org/10.1111/j.1600-065X.2011.01080.x>
- Margolis, K. G., Cryan, J. F., & Mayer, E. A. (2021). The Microbiota-Gut-Brain Axis: From Motility to Mood. In *Gastroenterology* (Vol. 160, Issue 5, pp. 1486–1501). <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.10.066>
- Marteau, P., Seksik, P., & Jian, R. (2002). Probiotics and intestinal health effects: a clinical perspective. *British Journal of Nutrition*, 88(S1), s51–s57. <https://doi.org/10.1079/BJN2002629>
- May, C. D. (1990). Industrial pectins: Sources, production and

- applications. *Carbohydrate Polymers*, 12(1), 79–99. [https://doi.org/10.1016/0144-8617\(90\)90105-2](https://doi.org/10.1016/0144-8617(90)90105-2)
- Mazloom, Z., Yousefinejad, A., & Dabbaghmanesh, M. H. (2013). Effect of probiotics on lipid profile, glycemic control, insulin action, oxidative stress, and inflammatory markers in patients with type 2 diabetes: A clinical trial. *Iranian Journal of Medical Sciences*, 38(1), 38–43.
- Mazmanian, S. K., Cui, H. L., Tzianabos, A. O., & Kasper, D. L. (2005). An immunomodulatory molecule of symbiotic bacteria directs maturation of the host immune system. *Cell*, 122(1), 107–118. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2005.05.007>
- McFarland, L. V. (2010). Systematic review and meta-analysis of *Saccharomyces boulardii* in adult patients. *World Journal of Gastroenterology*, 16(18), 2202. <https://doi.org/10.3748/wjg.v16.i18.2202>
- Messaoudi, M., Lalonde, R., Violle, N., Javelot, H., Desor, D., Nejdi, A., Bisson, J. F., Rougeot, C., Pichelin, M., Cazaubiel, M., & Cazaubiel, J. M. (2011). Assessment of psychotropic-like properties of a probiotic formulation (*Lactobacillus helveticus* R0052 and *Bifidobacterium longum* R0175) in rats and human subjects. *British Journal of Nutrition*, 105(5), 755–764. <https://doi.org/10.1017/S0007114510004319>
- Metchnikoff, É. (1907). The Prolongation of Life: Optimistic Studies. In *G.P. Putnam's Sons*.
- Million, M., Angelakis, E., Paul, M., Armougom, F., Leibovici, L., & Raoult, D. (2012). Comparative meta-analysis of the effect of *Lactobacillus* species on weight gain in humans and animals. *Microbial Pathogenesis*, 53(2), 100–108. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2012.05.007>
- Minot, C. S. (1908). Review of The prolongation of life. Optimistic studies. *The Journal of Abnormal Psychology*, 3(4), 301–302. <https://doi.org/10.1037/h0066131>
- Mitsuoka, T. (2014). Development of Functional Foods. *Bioscience of Microbiota, Food and Health*, 33(3), 117–128. <https://doi.org/10.12938/bmfh.33.117>
- Musso, G., Gambino, R., & Cassader, M. (2010). Obesity, diabetes, and gut microbiota: The hygiene hypothesis expanded? In *Diabetes Care* (Vol. 33, Issue 10, pp. 2277–2284). <https://doi.org/10.2337/dc10-0556>
- Ndagijimana, M., Laghi, L., Vitali, B., Placucci, G., Brigidi, P., & Guerzoni, M. E. (2009). Effect of a synbiotic food consumption on human gut metabolic profiles evaluated by

- 1H Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy. *International Journal of Food Microbiology*, 134(1-2), 147-153. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.04.016>
- Ng, Q. X., Peters, C., Ho, C. Y. X., Lim, D. Y., & Yeo, W. S. (2018). A meta-analysis of the use of probiotics to alleviate depressive symptoms. In *Journal of Affective Disorders* (Vol. 228, pp. 13-19). <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.11.063>
- Ng, S. C., Hart, A. L., Kamm, M. A., Stagg, A. J., & Knight, S. C. (2009). Mechanisms of action of probiotics: Recent advances. *Inflammatory Bowel Diseases*, 15(2), 300-310. <https://doi.org/10.1002/ibd.20602>
- Nout, M. J. R., & Kiers, J. L. (2005). Tempe fermentation, innovation and functionality: Update into the third millenium. In *Journal of Applied Microbiology* (Vol. 98, Issue 4, pp. 789-805). <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2004.02471.x>
- Nowak, A., Ślizewska, K., & Libudzisz, Z. (2010). Probiotics - History and mechanisms of their effect. *Zywnosc. Nauka. Technologia. Jakosc/Food. Science Technology. Quality*, 17(4), 5-19. <https://doi.org/10.15193/zntj/2010/71/005-019>
- Nur, F. (2022). *Eksotisme Bakteri Asam Laktat*.
- Nur, F., Ayu Febriani, Hafsan, Cut Muthiadin, & Khudaer, F. (2024). Immunomodulatory effect of synbiotics lactic acid bacteria from Dangke and inulin of Dahlia tubers. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 10(1), 9-15.
- Nur, F., Hafsan, & Faten, K. (2023). Mini review: Controlling of blood glucose levels utilizing lactic acid bacteria. *Journal Bionature*, 24(2), 173-179.
- Nur, F., Hafsan, Mustami, M. K., Kiramang, K., & Thaha, A. H. (2021). Hypocholesterolemic Effects of Maysghurt as A Functional Food. *Nat. Volatiles & Essent. Oils*, 8(5), 11054-11068.
- O'Hara, A. M., & Shanahan, F. (2006). The gut flora as a forgotten organ. In *EMBO Reports* (Vol. 7, Issue 7). <https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400731>
- O'Mahony, L., McCarthy, J., Kelly, P., Hurley, G., Luo, F., Chen, K., O'Sullivan, G. C., Kiely, B., Collins, J. K., Shanahan, F., & Quigley, E. M. M. (2005). Lactobacillus and bifidobacterium in irritable bowel syndrome: Symptom responses and relationship to cytokine profiles. *Gastroenterology*, 128(3), 541-551. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2004.11.050>
- Ogunbanwo, S. T., Sanni, A. I., & Onilude, A. A. (2003). Characterization of bacteriocin produced by Lactobacillus plantarum F1 and Lactobacillus brevis OG1. *African Journal*

- of *Biotechnology*, 2(8), 223-235.
<https://doi.org/10.5897/ajb2003.000-1045>
- Onumpai, C., Kolida, S., Bonnin, E., & Rastall, R. A. (2011). Microbial utilization and selectivity of pectin fractions with various structures. *Applied and Environmental Microbiology*, 77(16), 5747-5754. <https://doi.org/10.1128/AEM.00179-11>
- Ouwehand, A. C., Kirjavainen, P. V., Shortt, C., & Salminen, S. (1999). Probiotics: Mechanisms and established effects. *International Dairy Journal*, 9(1), 43-52. [https://doi.org/10.1016/S0958-6946\(99\)00043-6](https://doi.org/10.1016/S0958-6946(99)00043-6)
- Ouwehand, A. C., Salminen, S., & Isolauri, E. (2002). Probiotics: An overview of beneficial effects. *Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology*, 82(1-4), 279-289. <https://doi.org/10.1023/A:1020620607611>
- Ouwehand, A. C., & Vesterlund, S. (2004). Antimicrobial components from lactic acid bacteria. In *Lactic Acid Bacteria Microbiological and Functional Aspects, Third Edition: Revised and Expanded* (pp. 375-395). <https://doi.org/10.1201/9780824752033.ch11>
- Pagnini, C., Saeed, R., Bamias, G., Arseneau, K. O., Pizarro, T. T., & Cominelli, F. (2010). Probiotics promote gut health through stimulation of epithelial innate immunity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(1), 454-459. <https://doi.org/10.1073/pnas.0910307107>
- Pakbin, B., Brück, W. M., & Rossen, J. W. A. (2021). Virulence Factors of Enteric Pathogenic Escherichia coli: A Review. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(18), 9922. <https://doi.org/10.3390/ijms22189922>
- Parthasarathy, G., Chen, J., Chen, X., Chia, N., O'Connor, H. M., Wolf, P. G., Gaskins, H. R., & Bharucha, A. E. (2016). Relationship between Microbiota of the Colonic Mucosa vs Feces and Symptoms, Colonic Transit, and Methane Production in Female Patients with Chronic Constipation. *Gastroenterology*, 150(2), 367-379.e1. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2015.10.005>
- Patel, V., Patel, D., & Patel, J. (2023). Gut Microbiota with Functional Food Components and Nutraceuticals. In *Anxiety, Gut Microbiome, and Nutraceuticals: Recent Trends and Clinical Evidence* (pp. 309-331). <https://doi.org/10.1201/9781003333821-17>
- Peng, L., Li, Z. R., Green, R. S., Holzman, I. R., & Lin, J. (2009). Butyrate

- enhances the intestinal barrier by facilitating tight junction assembly via activation of AMP-activated protein kinase in Caco-2 cell monolayers. *Journal of Nutrition*, 139(9), 1619–1625. <https://doi.org/10.3945/jn.109.104638>
- Penit, A., Bemer, P., Besson, J., Cazet, L., Bourigault, C., Juvin, M. E., Fix, M. H., Bruley des Varannes, S., Boutoille, D., Batard, E., & Lepelletier, D. (2016). Community-acquired *Clostridium difficile* infections. *Medecine et Maladies Infectieuses*, 46(3), 131–139. <https://doi.org/10.1016/j.medmal.2016.01.007>
- Petroff, O. A. C. (2002). GABA and glutamate in the human brain. In *Neuroscientist* (Vol. 8, Issue 6, pp. 562–573). <https://doi.org/10.1177/1073858402238515>
- Pimentel, M., Mayer, A. G., Park, S., Chow, E. J., Hasan, A., & Kong, Y. (2003). Methane production during lactulose breath test is associated with gastrointestinal disease presentation. *Digestive Diseases and Sciences*, 48(1). <https://doi.org/10.1023/A:1021738515885>
- Purves, D., Augustine, Fritzpatrick, Hall, LaMantia, Mooney, Platt, & White. (2018). Neuroscience (6th Ed.). In *Current Opinion in Critical Care* (Vol. 24, Issue 2).
- Qian, Z., Zhu, H., Zhao, D., Yang, P., Gao, F., Lu, C., Yin, Y., Kan, S., & Chen, D. (2021). Probiotic *Lactobacillus* sp. Strains Inhibit Growth, Adhesion, Biofilm Formation, and Gene Expression of Bacterial Vaginosis-Inducing *Gardnerella vaginalis*. *Microorganisms*, 9(4), 728. <https://doi.org/10.3390/microorganisms9040728>
- Rafacz-Livingston, K. A., Parsons, C. M., & Jungk, R. A. (2005). The effects of various organic acids on phytate phosphorus utilization in chicks. *Poultry Science*, 84(9), 1356–1362. <https://doi.org/10.1093/ps/84.9.1356>
- Ramakrishna, B. S. (2009). Probiotic-induced changes in the intestinal epithelium: implications in gastrointestinal disease. In *Tropical gastroenterology: official journal of the Digestive Diseases Foundation* (Vol. 30, Issue 2, pp. 76–85).
- Rao, W., Fang, Z., Chen, Z., Wu, J., & Fang, X. (2023). Antibacterial mechanism of metabolites of *Leuconostoc mesenteroides* against *Serratia liquefaciens*. *LWT*, 187(1), 115335. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2023.115335>
- Rastall, R. A., Gibson, G. R., Gill, H. S., Guarner, F., Klaenhammer, T. R., P., & Saarela, M. (2005). Modulation of the microbial ecology of the human colon by probiotics, prebiotics and synbiotics to enhance human health: an overview of enabling science

- and potential applications. *FEMS Microbiology Ecology*, 52(2), 145–152.
- Rathore, S., Salmerón, I., & Pandiella, S. S. (2012). Production of potentially probiotic beverages using single and mixed cereal substrates fermented with lactic acid bacteria cultures. *Food Microbiology*, 30(1), 239–244. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2011.09.001>
- Reid, G., Charbonneau, D., Erb, J., Kochanowski, B., Beuerman, D., Poehner, R., & Bruce, A. W. (2003). Oral use of *Lactobacillus rhamnosus* GR-1 and *L. fermentum* RC-14 significantly alters vaginal flora: Randomized, placebo-controlled trial in 64 healthy women. *FEMS Immunology and Medical Microbiology*, 35(2), 131–134. [https://doi.org/10.1016/S0928-8244\(02\)00465-0](https://doi.org/10.1016/S0928-8244(02)00465-0)
- Reigstad, C. S., Salmonson, C. E., Rainey, J. F., Szurszewski, J. H., Linden, D. R., Sonnenburg, J. L., Farrugia, G., & Kashyap, P. C. (2015). Gut microbes promote colonic serotonin production through an effect of short-chain fatty acids on enterochromaffin cells. *FASEB Journal*, 29(4), 1395–1403. <https://doi.org/10.1096/fj.14-259598>
- Ringel-Kulka, T., Palsson, O. S., Maier, D., Carroll, I., Galanko, J. A., Leyer, G., & Ringel, Y. (2011). Probiotic bacteria *Lactobacillus acidophilus* NCFM and *Bifidobacterium lactis* Bi-07 versus placebo for the symptoms of bloating in patients with functional bowel disorders: A double-blind study. *Journal of Clinical Gastroenterology*, 45(6), 518–525. <https://doi.org/10.1097/MCG.0b013e31820ca4d6>
- Ríos-Covián, D., Ruas-Madiedo, P., Margolles, A., Gueimonde, M., de los Reyes-Gavilán, C. G., & Salazar, N. (2016). Intestinal Short Chain Fatty Acids and their Link with Diet and Human Health. *Frontiers in Microbiology*, 7(FEB). <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00185>
- Rivière, A., Selak, M., Lantin, D., Leroy, F., & De Vuyst, L. (2016). Bifidobacteria and Butyrate-Producing Colon Bacteria: Importance and Strategies for Their Stimulation in the Human Gut. *Frontiers in Microbiology*, 7(JUN). <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00979>
- Roberfroid, M. B. (2007). Inulin-type fructans: functional food ingredients. *Journal of Nutrition*, 137(11), 2493S–2502S.
- Roberfroid, M., Gibson, G. R., Hoyles, L., McCartney, A. L., Rastall, R., Rowland, I., Wolvers, D., Watzl, B., Szajewska, H., Stahl, B., Guarner, F., Respondek, F., Whelan, K., Coxam, V., Davicco,

- M.-J., Léotoing, L., Wittrant, Y., Delzenne, N. M., Cani, P. D., ... Meheust, A. (2010). Prebiotic effects: metabolic and health benefits. *British Journal of Nutrition*, *104*(S2), S1–S63. <https://doi.org/10.1017/S0007114510003363>
- Rodríguez-Nogales, A., Algieri, F., Garrido-Mesa, J., Vezza, T., Utrilla, M. P., Chueca, N., García, F., Rodríguez-Cabezas, M. E., & Gálvez, J. (2018). Intestinal anti-inflammatory effect of the probiotic *Saccharomyces boulardii* in DSS-induced colitis in mice: Impact on microRNAs expression and gut microbiota composition. *Journal of Nutritional Biochemistry*, *61*(1), 129–139. <https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2018.08.005>
- Roselino, M. N., Sakamoto, I. K., Tallarico Adorno, M. A., Márcia Canaan, J. M., de Valdez, G. F., Rossi, E. A., Sivieri, K., & Umbelino Cavallini, D. C. (2020). Effect of fermented sausages with probiotic *Enterococcus faecium* CRL 183 on gut microbiota using dynamic colonic model. *LWT*, *132*(1), 109876. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109876>
- Round, J. L., & Mazmanian, S. K. (2009). The gut microbiota shapes intestinal immune responses during health and disease. In *Nature Reviews Immunology* (Vol. 9, Issue 5, pp. 313–323). <https://doi.org/10.1038/nri2515>
- Saad, S. M. I. (2006). Lactic acid bacteria: microbiological and functional aspects. *Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas*, *42*(3), 473–473. <https://doi.org/10.1590/s1516-93322006000300018>
- Sakata, T., Adachi, M., Hashida, M., Sato, N., & Kojima, T. (1995). Effect of n-butyric acid on epithelial cell proliferation of pig colonic mucosa in short-term culture. *DTW. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift*, *102*(4), 163–164.
- Sakata, Takashi, Kojima, T., Fujieda, M., Takahashi, M., & Michibata, T. (2003). Influences of probiotic bacteria on organic acid production by pig caecal bacteria in vitro. *Proceedings of the Nutrition Society*, *62*(1), 73–80. <https://doi.org/10.1079/pns2002211>
- Salazar, N., Binetti, A., Gueimonde, M., Alonso, A., Garrido, P., & Reyes-Gavilán, C. G. D. L. (2009). Safety and gut microecology of three probiotic strains isolated from dairy products in healthy adults. *Anaerobe*, *15*(6), 1–7.
- Salminen, S., Vinderola, G., & Sanders, M. E. (2022). Commentary on: functional food science and gastrointestinal physiology and function. *British Journal of Nutrition*, *128*(2), 179–182. <https://doi.org/10.1017/S0007114522001520>

- Salyers, A. A., Vercellotti, J. R., West, S. E. H., & Wilkins, T. D. (1977). Fermentation of mucin and plant polysaccharides by strains of *Bacteroides* from the human colon. *Applied and Environmental Microbiology*, 33(2). <https://doi.org/10.1128/aem.33.2.319-322.1977>
- Sanders, M. E., Akkermans, L. M. A., Haller, D., Hammerman, C., Heimbach, J. T., Hörmannspenger, G., & Huys, G. (2010). Safety assessment of probiotics for human use. *Gut Microbes*, 1(3), 164–185. <https://doi.org/10.4161/gmic.1.3.12127>
- Sanders, M. E., Lenoir-Wijnkoop, I., Salminen, S., Merenstein, D. J., Gibson, G. R., Petschow, B. W., Nieuwdorp, M., Tancredi, D. J., Cifelli, C. J., Jacques, P., & Pot, B. (2014). Probiotics and prebiotics: prospects for public health and nutritional recommendations. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1309(1), 19–29. <https://doi.org/10.1111/nyas.12377>
- Sanders, M. E., Merenstein, D. J., Reid, G., Gibson, G. R., & Rastall, R. A. (2019). Probiotics and prebiotics in intestinal health and disease: from biology to the clinic. In *Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology* (Vol. 16, Issue 10, pp. 605–616). <https://doi.org/10.1038/s41575-019-0173-3>
- Sangwan, V., Tomar, S. K., Singh, R. R. B., Singh, A. K., & Ali, B. (2011). Galactooligosaccharides: novel components of designer foods. *Journal of Food Science*, 76(4), R103–R111.
- Saxelin, M., Tynkkynen, S., Mattila-Sandholm, T., & De Vos, W. M. (2005). Probiotic and other functional microbes: From markets to mechanisms. In *Current Opinion in Biotechnology* (Vol. 16, Issue 2, pp. 204–211). <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2005.02.003>
- Schell, M. A., Karmirantzou, M., Snel, B., Vilanova, D., Berger, B., Pessi, G., Zwahlen, M. C., Desiere, F., Bork, P., Delley, M., Pridmore, R. D., & Arigoni, F. (2002). The genome sequence of *Bifidobacterium longum* reflects its adaptation to the human gastrointestinal tract. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 99(22), 14422–14427. <https://doi.org/10.1073/pnas.212527599>
- Scott, K. P., Gratz, S. W., Sheridan, P. O., Flint, H. J., & Duncan, S. H. (2013). The influence of diet on the gut microbiota. In *Pharmacological Research* (Vol. 69, Issue 1, pp. 52–60). <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2012.10.020>
- Segers, M. E., & Lebeer, S. (2014). Towards a better understanding of

- Lactobacillus rhamnosus GG - host interactions. *Microbial Cell Factories*, 13(Suppl 1), S7. <https://doi.org/10.1186/1475-2859-13-S1-S7>
- Sela, D. A., Chapman, J., Adeuya, A., Kim, J. H., Chen, F., Whitehead, T. R., Lapidus, A., Rokhsar, D. S., Lebrilla, C. B., German, J. B., Price, N. P., Richardson, P. M., & Mills, D. A. (2008). The genome sequence of *Bifidobacterium longum* subsp. *infantis* reveals adaptations for milk utilization within the infant microbiome. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(48), 18964–18969. <https://doi.org/10.1073/pnas.0809584105>
- Sellitto, V. M., Zara, S., Fracchetti, F., Capozzi, V., & Nardi, T. (2021). Microbial Biocontrol as an Alternative to Synthetic Fungicides: Boundaries between Pre- and Postharvest Applications on Vegetables and Fruits. *Fermentation*, 7(2), 60. <https://doi.org/10.3390/fermentation7020060>
- Servin, A. L. (2004). Antagonistic activities of lactobacilli and bifidobacteria against microbial pathogens. In *FEMS Microbiology Reviews* (Vol. 28, Issue 4, pp. 405–440). <https://doi.org/10.1016/j.femsre.2004.01.003>
- Sewalt, V., Shanahan, D., Gregg, L., La Marta, J., & Carillo, R. (2016). The Generally Recognized as Safe (GRAS) process for industrial microbial enzymes. In *Industrial Biotechnology* (Vol. 12, Issue 5, pp. 295–302). <https://doi.org/10.1089/ind.2016.0011>
- Sharma, A. N., Kumar, S., & Tyagi, A. K. (2018). Effects of mannan-oligosaccharides and *Lactobacillus acidophilus* supplementation on growth performance, nutrient utilization and faecal characteristics in Murrah buffalo calves. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 102(3), 679–689. <https://doi.org/10.1111/jpn.12878>
- Shen, L., & Turner, J. R. (2006). Role of Epithelial Cells in Initiation and Propagation of Intestinal Inflammation. Eliminating the static: tight junction dynamics exposed. *American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology*, 290(4), G577–G582. <https://doi.org/10.1152/ajpgi.00439.2005>
- Shimizu, K., Yamada, T., Ogura, H., Mohri, T., Kiguchi, T., Fujimi, S., Asahara, T., Yamada, T., Ojima, M., Ikeda, M., & Shimazu, T. (2018). Synbiotics modulate gut microbiota and reduce enteritis and ventilator-associated pneumonia in patients with sepsis: a randomized controlled trial. *Critical Care (London, England)*, 22(1), 239.

- <https://doi.org/10.1186/s13054-018-2167-x>
- Sila, D. N., Van Buggenhout, S., Duvetter, T., Fraeye, I., De Roeck, A., Van Loey, A., & Hendrickx, M. (2009). Pectins in processed fruits and vegetables: Part II - Structure-function relationships. In *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* (Vol. 8, Issue 2, pp. 86–104). <https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2009.00071.x>
- Simon, E., Călinoiu, L. F., Mitrea, L., & Vodnar, D. C. (2021). Probiotics, prebiotics, and synbiotics: Implications and beneficial effects against irritable bowel syndrome. In *Nutrients* (Vol. 13, Issue 6). <https://doi.org/10.3390/nu13062112>
- Slavin, J. (2013). Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits. In *Nutrients* (Vol. 5, Issue 4).
- Slavin, Joanne. (2013). Fiber and prebiotics: Mechanisms and health benefits. In *Nutrients* (Vol. 5, Issue 4, pp. 1417–1435). <https://doi.org/10.3390/nu5041417>
- Smith, E. A., & MacFarlane, G. T. (1998). Enumeration of amino acid fermenting bacteria in the human large intestine: Effects of pH and starch on peptide metabolism and dissimilation of amino acids. *FEMS Microbiology Ecology*, 25(4), 355–368. [https://doi.org/10.1016/S0168-6496\(98\)00004-X](https://doi.org/10.1016/S0168-6496(98)00004-X)
- Sokol, H., Pigneur, B., Watterlot, L., Lakhdari, O., Bermúdez-Humarán, L. G., Gratadoux, J. J., Blugeon, S., Bridonneau, C., Furet, J. P., Corthier, G., Grangette, C., Vasquez, N., Pochart, P., Trugnan, G., Thomas, G., Blottière, H. M., Doré, J., Marteau, P., Seksik, P., & Langella, P. (2008). Faecalibacterium prausnitzii is an anti-inflammatory commensal bacterium identified by gut microbiota analysis of Crohn disease patients. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 105(43), 16731–16736. <https://doi.org/10.1073/pnas.0804812105>
- Song, S. J., Lauber, C., Costello, E. K., Lozupone, C. A., Humphrey, G., Berg-Lyons, D., Gregory Caporaso, J., Knights, D., Clemente, J. C., Nakielny, S., Gordon, J. I., Fierer, N., & Knight, R. (2013). Cohabiting family members share microbiota with one another and with their dogs. *ELife*, 2013(2). <https://doi.org/10.7554/eLife.00458>
- Song, X., Liu, Y., Zhang, X., Weng, P., Zhang, R., & Wu, Z. (2023). Role of intestinal probiotics in the modulation of lipid metabolism: implications for therapeutic treatments. In *Food Science and Human Wellness* (Vol. 12, Issue 5, pp. 1439–1449). <https://doi.org/10.1016/j.fshw.2023.02.005>

- Spinler, J. K., Auchtung, J., Brown, A., Boonma, P., Oezguen, N., Ross, C. L., & Versalovic, J. (2008). *Lactobacillus reuteri* promotes gut health by stimulating immunoregulation and inhibiting colonization of harmful pathogens. *Journal of Applied Microbiology*, *105*(5), 1530–1541.
- Sriamornsak, P. (2016). Chemistry of Pectin and Its Pharmaceutical Uses : A Review Pornsak Sriamornsak Pornsak Sriamornsak 207 207 207 207 207. *Silpakorn University Open Journal Systems*, *3*(January 2003), 207–228.
- Steenbergen, L., Sellaro, R., van Hemert, S., Bosch, J. A., & Colzato, L. S. (2015). A randomized controlled trial to test the effect of multispecies probiotics on cognitive reactivity to sad mood. *Brain, Behavior, and Immunity*, *48*(1), 258–264. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2015.04.003>
- Suez, J., Zmora, N., Segal, E., & Elinav, E. (2019). The pros, cons, and many unknowns of probiotics. *Nature Medicine*, *25*(5), 716–729. <https://doi.org/10.1038/s41591-019-0439-x>
- Supavititpatana, P., Wirjantoro, T. I., & Raviyan, P. (2010). Characteristics and shelf-life of Corn Milk Yogurt. *Chiang Mai University Journal of Natural Sciences*.
- Swanson, K. S., Gibson, G. R., Hutkins, R., Reimer, R. A., Reid, G., Verbeke, K., Scott, K. P., Holscher, H. D., Azad, M. B., Delzenne, N. M., & Sanders, M. E. (2020). The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of synbiotics. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, *17*(11), 687–701. <https://doi.org/10.1038/s41575-020-0344-2>
- Szajewska, H., & Mrukowicz, J. Z. (2001). Probiotics in the Treatment and Prevention of Acute Infectious Diarrhea in Infants and Children: A Systematic Review of Published Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trials. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, *33*(4 SUPPL.), S17–S25. <https://doi.org/10.1097/00005176-200110002-00004>
- Tannock, G. W. (2004). A special fondness for lactobacilli. In *Applied and Environmental Microbiology* (Vol. 70, Issue 6). <https://doi.org/10.1128/AEM.70.6.3189-3194.2004>
- Tedelind, S., Westberg, F., Kjerrulf, M., & Vidal, A. (2007). Anti-inflammatory properties of the short-chain fatty acids acetate and propionate: A study with relevance to inflammatory bowel disease. *World Journal of Gastroenterology*, *13*(20), 2826–2832.

- <https://doi.org/10.3748/wjg.v13.i20.2826>
- Thakur, B. R., Singh, R. K., & Handa, A. K. (1997). Chemistry and Uses of Pectin - A Review. In *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* (Vol. 37, Issue 1, pp. 47-73). <https://doi.org/10.1080/10408399709527767>
- Topping, D. L., & Clifton, P. M. (2001). Short-Chain Fatty Acids and Human Colonic Function: Roles of Resistant Starch and Nonstarch Polysaccharides. *Physiological Reviews*, 81(3), 1031-1064. <https://doi.org/10.1152/physrev.2001.81.3.1031>
- Toshimitsu, T. (2023). Development of a lactic acid bacteria strain that suppresses chronic inflammation and improves glucose and lipid metabolism. In *Bioscience of Microbiota, Food and Health* (Vol. 42, Issue 1, pp. 3-7). <https://doi.org/10.12938/bmfh.2022-054>
- Turnbaugh, P. J., Ley, R. E., Mahowald, M. A., Magrini, V., Mardis, E. R., & Gordon, J. I. (2006). An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. *Nature*, 444(7122), 1027-1031. <https://doi.org/10.1038/nature05414>
- Usakova, N. A., Nekrasov, R. V., Pravdin, I. V., Sverchkova, N. V., Kolomiyets, E. I., & Pavlov, D. S. (2015). Mechanisms of the Effects of Probiotics on Symbiotic Digestion. In *Izvestiia Akademii nauk. Serii biologicheskaja / Rossijskaja akademiia nauk* (Issue 5, pp. 468-476).
- Van Buggenhout, S., Sila, D. N., Duvetter, T., Van Loey, A., & Hendrickx, M. (2009). Pectins in processed fruits and vegetables: Part III - Texture engineering. In *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* (Vol. 8, Issue 2, pp. 105-117). <https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2009.00072.x>
- van Duin, D., & Doi, Y. (2017). The global epidemiology of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. In *Virulence* (Vol. 8, Issue 4). <https://doi.org/10.1080/21505594.2016.1222343>
- Venema, K., & Carmo, A. P. do. (2015). Probiotics and Prebiotics: Current Status and Future Trends. In *Probiotics and Prebiotics: Current Research and Future Trends* (pp. 3-12). <https://doi.org/10.21775/9781910190098.01>
- Verdich, C., Toubro, S., Buemann, B., Lysgård Madsen, J., Juul Holst, J., & Astrup, A. (2001). The role of postprandial releases of insulin and incretin hormones in meal-induced satiety - Effect of obesity and weight reduction. *International Journal*

- of *Obesity*, 25(8), 1206–1214.
<https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0801655>
- Vinolo, M. A. R., Rodrigues, H. G., Nachbar, R. T., & Curi, R. (2011). Regulation of inflammation by short chain fatty acids. In *Nutrients* (Vol. 3, Issue 10, pp. 858–876).
<https://doi.org/10.3390/nu3100858>
- Von Wright, A., & Salminen, S. (1999). Probiotics: Established effects and open questions. In *European Journal of Gastroenterology and Hepatology* (Vol. 11, Issue 11, pp. 1195–1198).
<https://doi.org/10.1097/00042737-199911000-00001>
- Walzem, R. L., Baillie, R. A., Wiest, M., Davis, R., Watkins, S. M., Porter, T. E., Simon, J., & Cogburn, L. A. (2007). Functional annotation of genomic data with metabolic inference. *Poultry Science*, 86(7), 1510–1522.
<https://doi.org/10.1093/ps/86.7.1510>
- Wang, G., Yu, X., Lu, Z., Yang, Y., Xia, Y., Lai, P. F. H., & Ai, L. (2019). Optimal combination of multiple cryoprotectants and freezing-thawing conditions for high lactobacilli survival rate during freezing and frozen storage. *LWT*, 99(1), 217–223. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.09.065>
- Wang, H., Ni, X., Qing, X., Zeng, D., Luo, M., Liu, L., Li, G., Pan, K., & Jing, B. (2017). Live probiotic *Lactobacillus johnsonii* BS15 promotes growth performance and lowers fat deposition by improving lipid metabolism, intestinal development, and gut microflora in broilers. *Frontiers in Microbiology*, 8(JUN), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01073>
- Wang, Y., & Kasper, L. H. (2014). The role of microbiome in central nervous system disorders. In *Brain, Behavior, and Immunity* (Vol. 38, pp. 1–12).
<https://doi.org/10.1016/j.bbi.2013.12.015>
- Weimer, P. J., & Zeikus, J. G. (1977). Fermentation of cellulose and cellobiose by *Clostridium thermocellum* in the absence and presence of *Methanobacterium thermoautotrophicum*. *Applied and Environmental Microbiology*, 33(2), 289–297.
<https://doi.org/10.1128/aem.33.2.289-297.1977>
- Weitkunat, K., Schumann, S., Nickel, D., Kappo, K. A., Petzke, K. J., Kipp, A. P., Blaut, M., & Klaus, S. (2016). Importance of propionate for the repression of hepatic lipogenesis and improvement of insulin sensitivity in high-fat diet-induced obesity. *Molecular Nutrition and Food Research*, 60(12), 2611–2621.
<https://doi.org/10.1002/mnfr.201600305>
- Wells, J. M. (2011). Immunomodulatory mechanisms of lactobacilli.

- Microbial Cell Factories*, 10 Suppl 1(Suppl 1), S17.
<https://doi.org/10.1186/1475-2859-10-S1-S17>
- Wells, J. M., Rossia, O., Meijerink, M., & Van Baarlen, P. (2011). Epithelial crosstalk at the microbiota-mucosal interface. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108(SUPPL. 1), 4607–4614.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1000092107>
- Wong, J. M. W., De Souza, R., Kendall, C. W. C., Emam, A., & Jenkins, D. J. A. (2006). Colonic health: Fermentation and short chain fatty acids. *Journal of Clinical Gastroenterology*, 40(3), 235–243.
<https://doi.org/10.1097/00004836-200603000-00015>
- Wu, T., Wang, G., Xiong, Z., Xia, Y., Song, X., Zhang, H., Wu, Y., & Ai, L. (2022). Probiotics Interact With Lipids Metabolism and Affect Gut Health. In *Frontiers in Nutrition* (Vol. 9).
<https://doi.org/10.3389/fnut.2022.917043>
- Yamashita, K., Kawai, K., & Itakura, M. (1984). Effects of fructo-oligosaccharides on blood glucose and serum lipids in diabetic subjects. *Nutrition Research*, 4(6), 961–966.
[https://doi.org/10.1016/S0271-5317\(84\)80075-5](https://doi.org/10.1016/S0271-5317(84)80075-5)
- Yan, F., Cao, H., Cover, T. L., Whitehead, R., Washington, M. K., & Polk, D. B. (2007). Soluble Proteins Produced by Probiotic Bacteria Regulate Intestinal Epithelial Cell Survival and Growth. *Gastroenterology*, 132(2), 562–575.
<https://doi.org/10.1053/j.gastro.2006.11.022>
- Yano, J. M., Yu, K., Donaldson, G. P., Shastri, G. G., Ann, P., Ma, L., Nagler, C. R., Ismagilov, R. F., Mazmanian, S. K., & Hsiao, E. Y. (2015). Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis. *Cell*, 161(2), 264–276.
<https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.02.047>
- Yatsunencko, T., Rey, F. E., Manary, M. J., Trehan, I., Dominguez-Bello, M. G., Contreras, M., Magris, M., Hidalgo, G., Baldassano, R. N., Anokhin, A. P., Heath, A. C., Warner, B., Reeder, J., Kuczynski, J., Caporaso, J. G., Lozupone, C. A., Lauber, C., Clemente, J. C., Knights, D., ... Gordon, J. I. (2012). Human gut microbiome viewed across age and geography. In *Nature* (Vol. 486, Issue 7402, pp. 222–227).
<https://doi.org/10.1038/nature11053>
- Ye, P., Wang, J., Liu, M., Li, P., & Gu, Q. (2021). Purification and characterization of a novel bacteriocin from *Lactobacillus paracasei* ZFM54. *LWT*, 143(1), 111125.
<https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111125>
- Young, V. B. (2017). The role of the microbiome in human health and

- disease: an introduction for clinicians. *BMJ*, 356(1), j831.
<https://doi.org/10.1136/bmj.j831>
- Yu, J., Wang, W. H., Menghe, B. L. G., Jiri, M. T., Wang, H. M., Liu, W. J., Bao, Q. H., Lu, Q., Zhang, J. C., Wang, F., Xu, H. Y., Sun, T. S., & Zhang, H. P. (2011a). Diversity of lactic acid bacteria associated with traditional fermented dairy products in Mongolia. *Journal of Dairy Science*.
<https://doi.org/10.3168/jds.2010-3727>
- Yu, J., Wang, W. H., Menghe, B. L. G., Jiri, M. T., Wang, H. M., Liu, W. J., Bao, Q. H., Lu, Q., Zhang, J. C., Wang, F., Xu, H. Y., Sun, T. S., & Zhang, H. P. (2011b). Diversity of lactic acid bacteria associated with traditional fermented dairy products in Mongolia. *Journal of Dairy Science*, 94(7), 3229–3241.
<https://doi.org/10.3168/jds.2010-3727>
- Zhao, Y., Shu, Y., Zhao, N., Zhou, Z., Jia, X., Jian, C., & Jin, S. (2022). Insulin resistance induced by long-term sleep deprivation in rhesus macaques can be attenuated by *Bifidobacterium*. *American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism*, 322(2), E165–E172.
<https://doi.org/10.1152/ajpendo.00329.2021>
- Zmora, N., Zilberman-Schapira, G., Suez, J., Mor, U., Dori-Bachash, M., Bashariades, S., Kotler, E., Zur, M., Regev-Lehavi, D., Brik, R. B.-Z., Federici, S., Cohen, Y., Linevsky, R., Rothschild, D., Moor, A. E., Ben-Moshe, S., Harmelin, A., Itzkovitz, S., Maharshak, N., ... Elinav, E. (2018). Personalized Gut Mucosal Colonization Resistance to Empiric Probiotics Is Associated with Unique Host and Microbiome Features. *Cell*, 174(6), 1388–1405.e21.
<https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.08.041>

BIOGRAFI PENULIS



Hafsan, lahir di Sabah, Malaysia pada 12 September 1981. Penulis menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Makassar dan meraih gelar Sarjana Biologi pada tahun 2004. Ia melanjutkan studi di Universitas Negeri Malang, dan meraih gelar Magister Pendidikan Biologi pada tahun 2007, kemudian mendapatkan gelar Doktor Ilmu-ilmu Pertanian dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2018.

Hafsan memulai karier akademisnya sebagai dosen tetap yayasan di STKIP Cokroaminoto Palopo dan beberapa institusi lainnya sebelum bergabung sebagai dosen tetap PNS di Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2009. Kini, ia meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar bidang biologi.

Sebagai seorang akademisi yang menggeluti bidang Bioteknologi dan Mikrobiologi, Hafsan telah menerbitkan beberapa karya ilmiah baik dalam jurnal nasional maupun internasional. Beliau juga menjadi reviewer untuk berbagai jurnal bereputasi dan aktif berpartisipasi dalam konferensi ilmiah di dalam dan luar negeri.

Selain mengajar dan melakukan penelitian, Hafsan juga dikenal sebagai penulis buku dan editor beberapa buku ilmiah dan sajak. Dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu biologi dan terapannya di Indonesia.

Selain melaksanakan tridarma, Hafsan juga aktif dalam berbagai kegiatan manajerial di universitas, termasuk menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Biologi dan Ketua Komite Penjaminan Mutu di Alauddin Makassar.

Bakteri, yang awalnya dianggap sebagai ancaman, semakin diakui sebagai sekutu yang sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan tubuh manusia. Ide simbiosis mengeksplorasi kombinasi sinergis probiotik dan prebiotik untuk menjelaskan peran penting dalam menjaga keseimbangan flora usus dalam meningkatkan kesehatan umum.

Dalam penelitian tentang mikrobiota dan kesehatan manusia, konsep sinbiotik, yang menggabungkan probiotik dan prebiotik, telah menjadi fokus yang menyita perhatian. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, sedangkan prebiotik adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang membantu pertumbuhan dan aktivitas mikroba di dalam usus.

Untuk meningkatkan kesehatan manusia, sinbiotik menggabungkan kekuatan probiotik dan prebiotik agar bekerja lebih maksimal secara bersama-sama. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa probiotik membutuhkan substrat tertentu untuk bereproduksi dan berfungsi dengan baik di saluran pencernaan. Kehadiran sinbiotik memiliki banyak manfaat, antara lain fungsi pencernaan yang lebih baik, mengatur sistem kekebalan tubuh, serta mencegah dan mengobati berbagai penyakit.

Buku referensi ini menyediakan cakupan mendalam tentang teori dan prinsip dasar sinbiotik. Dimasukkannya temuan penelitian terkini, studi kasus, dan analisis klinis yang mendalam di setiap bab menggambarkan inklusifitas bahasan seluruh aspek sinbiotik. Buku ini bukan sekadar bacaan ilmiah, tetapi juga undangan untuk menekuri dan mengagumi keajaiban alam yang tersembunyi di dalam ranah mikroorganisme, serta memanfaatkan pengetahuan ilmiah kemungkinan besar yang dihadirkan oleh sinbiotik.