

**KEANEKARAGAMAN MAKROZOOBENTOS EPIFAUNA PADA  
PERAIRAN PULAU LAE-LAE MAKASSAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana sains  
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**KUSNADI ALIMUDDIN**

NIM. 60300112016

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusnadi Alimuddin  
NIM : 60300112016  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 12 September 1993  
Jur/Prodi : Biologi  
Fakultas : Sains & Teknologi  
Judul : Keanekaragaman Makrozoobentos epifauna pada perairan pulau Lae-lae Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Oktober 2016  
Penyusun,

Kusnadi Alimuddin  
NIM: 60300112016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Kusnadi Alimuddin** NIM: 60300112016, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi berjudul, “Keanekaragaman makrozoobentos epifauna pada perairan pulau Lae-lae Makassar”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar November 2016



Ulfa Triyani A. Latif, S.Si, M.Pd.  
Pembimbing II



Fatmawati Nur S.Si., M.Si  
Pembimbing I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Keanekaragaman Makrozoobentos Epifauna pada Perairan Pulau Lae-lae Makassar”, yang disusun oleh Kusnadi Alimuddin, NIM: 60300112016, Mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari jum'at , tanggal 18 november 2016 M, bertepatan dengan 18 safar 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 November 2016  
18 Safar 1437 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi	(.....)
Sekretaris	: St. Aisyah S, S.Pd., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Ernawati S. Kaseng, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Hafsan, S.Si., M.Pd	(.....)
Munaqisy III	: Nur Kholis A Gaffar, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Fatmawati Nur, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.  
NIP. 196905 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullhahi Wabarhokatu**

Alhamdulillah Rabbil alamin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Keanekargaman Makrozoobentos Epifauna pada perairan pulau Lae-lae Makassar”**. Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si). Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah saw yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan yang di jadikan pedoman dalam kehidupan ini.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan ini. Maka dari itu, secara khusus iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Alimuddin dan Ibunda Idawati, Kakek dan Nenek yang telah mendidik yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan yang tak henti-hentinya melantunkan doa setiap sujudnya serta rela mengorbankan banyak hal demi tercapainya harapan dari sang anak yang tidak akan pernah mampu untuk di balas. Semoga berkah dan Hidayah Allah Selalu menaungi mereka.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Namun berkat keyakinan dan Usaha serta motivasi dari pihak langsung maupun tidak langsung yang meperlancar jalannya penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, secara mendalam saya menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya adalah:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) beserta seajarannya.
2. Prof. Dr. A. Qadir Gassing HT.,MS., selaku Rektor periode 2011-2015 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)



3. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
6. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing I dan Ulfa Triyani A Latif, S.Si., M.Pd selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi.
7. Dr. Ernawati S. Kaseng, S.Pi., M.Pi., Hafsan S.Pd., M.Si., dan Nur Kholis A. Gaffar., M.Ag., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penelitian dan penulisan skripsi penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang berlimpah selama kuliah di kampus ini serta seluruh Staf Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknolgi UIN Alauddin Makassar.
9. Kepada seluruh Laboran Laboratorium jurusan Biologi FST UIN Alauddin Makassar.
10. Kapala perpustakaan Uin Alauddin Makassar beserta jajarannya.
11. Buat seluruh keluarga besar Biologi tanpa terkecuali terima kasih atas dukungan, doa dan semangat dan seluruh moment yang telah kalian berikan.
12. Terkhusus buat teman seperjuangan angkatan 2012 (*Ranvier*) dan teman kelas (Banta's) yang tak henti-hentinya memberikan dukungan beserta doa.
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, saran, dan partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun ruang lingkup pembahasannya. Maka dengan kerendahan hati, segala bentuk koreksi, kritikan, dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sekaligus dapat menjadi bahan acuan mahasiswa biologi, serta bagi pemerintah, dan masyarakat.

Makassar, November 2016

Penulis

Kusnadi Alimuddin  
Nim: 60300112016



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv-vi
DAFTAR ISI .....	vii-viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1-6
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	7-33
A. Keanekaragaman .....	7
B. Makrozoobentos .....	7
C. Klasifikasi Makrozoobentos .....	8
D. Parameter Lingkungan .....	25
E. Indeks Ekologi .....	26
F. Ayat yang Relevan .....	29
G. Perairan Pulau Lae-lae Makassar .....	31
H. Kerangka Pikir .....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	34-38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Variabel Penelitian .....	34
C. Definisi Operasional Penelitian .....	34
D. Populasi dan Sampel .....	34
E. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan) .....	35
F. Prosedur Kerja .....	35
G. Metode Pengumpulan Data .....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	39-49



A. Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan .....	45
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Implikasi Penelitian (Saran).....	50
KEPUSTAKAAN .....	51-53
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	54-61



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 pengaruh pH Terhadap Komunitas Biologi Perairan.....	26
Tabel 2.2 Kategori indeks Keanekaragaman .....	27
Tabel 2.3 Kategori Indeks Keseragaman .....	28
Tabel 2.4 Kategori Indeks Dominansi .....	28
Tabel 4.1. Keanekaragaman makrozoobento efipauna pada stasiun I .....	39
Tabel 4.2. Keanekaragaman makrozoobentos efipauna pada stasiun II .....	40
Tabel 4.3. Keanekaragaman makrozoobentos efipauna pada stasiun III .....	41
Tabel 4.4 Indeks Ekologi .....	41
Tabel 4.5 Hasil data parameter .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Holothuroidea</i> .....	9
Gambar 2.2 <i>Asteroidea</i> .....	10
Gambar 2.3 <i>Ophiuridea</i> .....	10
Gambar 2.4 <i>Echinoidea</i> .....	11
Gambar 2.5 <i>Crinoidea</i> .....	12
Gambar 2.6 <i>Naticarius canrena</i> .....	13
Gambar 2.7 <i>Nudibranchia</i> .....	14
Gambar 2.8 <i>Loligo sp</i> .....	15
Gambar 2.9 <i>Dentalium vulgare</i> .....	16
Gambar 2.10 <i>Chilton sp</i> .....	16
Gambar 2.11 <i>Hydra sp</i> .....	18
Gambar 2.12 <i>Aurelia aurita</i> .....	18
Gambar 2.13 <i>Actiniaria sp</i> .....	19
Gambar 2.14 <i>Brachyura sp</i> .....	21
Gambar 2.15 <i>Lithobius forficatus</i> .....	22
Gambar 2.16 <i>Heteropoda Venatoria</i> .....	23
Gambar 2.17 <i>Gryllus asimilis</i> .....	24
Gambar 2.18 Peta Pulau lae-lae Makassar .....	31

## ABSTRAK

**Nama** : Kusnadi Alimuddin  
**NIM** : 60300112016  
**Judul Skripsi** : “Keanekaragaman Makrozoobentos Epifauna Pada Perairan Pulau Lae-lae Makassar”

---

Penelitian dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman makrozoobentos epifauna pada perairan pulau Lae-lae Makassar. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 3 stasiun yaitu stasiun I berada pada bagian barat pulau Lae-lae Makassar, stasiun II pada bagian selatan dan stasiun III pada bagian timur. Teknik pengambilan sampel makrozoobentos epifauna menggunakan metode *line transect*. Hasil penelitian menunjukkan keanekaragaman makrozoobentos epifauna pada perairan pulau Lae-lae Makassar diperoleh 2 kelas makrozoobentos yaitu Bivalvia dan Crustacea dengan jumlah spesies 8 dan jumlah individu sebanyak 38. Indeks keanekaragaman ( $H'$ ) pada stasiun I (1,08), stasiun II (1,56) dan stasiun III (1,41). Dari ketiga stasiun tersebut nilai indeks keanekaragaman di kategorikan rendah. Keseragaman ( $E$ ) makrozoobentos epifauna pada stasiun I yaitu 0,98, stasiun II 0,97 dan stasiun III 0,87. Dari ketiga stasiun tersebut nilai indeks keseragaman termasuk kategori komunitas stabil. Indeks dominansi ( $C$ ) makrozoobentos epifauna makrozoobentos pada stasiun I diperoleh nilai indeks dominansi yaitu 0,34, stasiun II 0,21 dan stasiun III 0,27. Dari ketiga stasiun tersebut di kategorikan dengan nilai indeks dominansi yang tergolong rendah  $0,00 < C < 0,50$ .

Kata Kunci: Makrozoobentos, Epifauna, Keanekaragaman.

## ABSTRACT

**Name** : Kusnadi Alimuddin  
**NIM** : 60300112016  
**Title of Thesis** : "Macrozoobenthos diversity of Epifauna in Lae-lae Island Waters of Makassar"

---

The study was conducted to find out the diversity of macrozoobenthos epifauna in Lae-lae island waters of Makassar. The method used in this study namely purposive sampling method to obtain 3 stations namely station I was in the western part of Lae-lae island waters of Makassar, station II was in the southern and station III was in the eastern part. The sample of macrozoobenthos epifauna were collected by using line transect technique. The results showed the diversity of macrozoobenthos epifauna in Lae-lae island waters of Makassar retrieved two classes of macrozoobenthos namely Bivalvia dan Crustacea with a total number of species was 8 and the total number of individuals was 38. The index of diversity (H') in the station I (1.08), II (1.56) and III (1.41). From the three station, the index of diversity categorized low. Uniformity (E) macrozoobenthos epifauna in station I namely 0.98, station II 0.97 and III 0.87. From the three stations, the index value of uniformity categorized on the stable community. Dominance index (C) macrozoobenthos epifauna in station I retrieved the dominance index value namely 0.34, station II 0.21 and III 0.27. The three stations categorized by dominance index value which belongs to low  $0.00 < C < 0.50$ .

Key Words: Macrozoobenthos, Epifauna, Diversity.





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pada setiap pulau terdapat tumbuhan, hewan dan jasad renik yang tinggi. Satu pulau dengan pulau yang lain memiliki keadaan alam yang berbeda. Perpaduan antara sumberdaya alam hayati dan tempat hidupnya yang berbeda, menumbuhkan berbagai ekosistem di dalamnya (Suhendang, 2002).

Indonesia mempunyai perairan laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,1 juta km<sup>2</sup> serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km<sup>2</sup> dengan potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6.11 juta ton per tahun (Boer, 2001). Ekosistem perairan pesisir di Indonesia merupakan kawasan yang mendapat perhatian cukup besar dalam berbagai kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan di Indonesia. Wilayah ini kaya dan memiliki beragam sumber daya alam yang telah dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani (Dahuri, 2002).

Dahuri (2002) menyatakan bahwa secara empiris wilayah pesisir merupakan tempat aktivitas ekonomi yang mencakup perikanan laut dan pesisir, transportasi dan pelabuhan, pertambangan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah. Kondisi suatu

perairan pantai maupun teluk dapat di ukur dengan berbagai metode dan berbagai sudut pandang. Pendugaan kondisi perairan dapat dilakukan berdasarkan sifat fisika, kimia air maupun berdasarkan data biotik dan abiotik penghuni perairan tersebut (Zonneveldet, 1991).

Makrozoobentos merupakan salah satu kelompok terpenting dalam ekosistem perairan, sehubungan dengan peranannya sebagai organisme kunci dalam jaring makanan. Selain itu tingkat keanekaragaman makrozoobentos di lingkungan perairan dapat digunakan sebagai indikator pencemaran karena hewan ini hidup menetap (sesile) dan daya adaptasinya bervariasi terhadap kondisi lingkungan (Rosenberg, 1993).

Makrozoobentos merupakan salah satu biota yang hidup di dasar perairan. Lind (1979) dalam Sinaga (2007), menyatakan bahwa organisme bentos memainkan peran penting dalam komunitas dasar, karena fungsinya dalam proses mineralisasi dan pendaur ulang bahan organik yang tertangkap di dalam lingkungan perairan. Sifat pergerakan makrozoobentos yang terbatas atau relatif menetap dan habitat hidupnya di dasar perairan yang merupakan tempat bahan pencemar maka perubahan kualitas air dan substrat hidupnya mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman makrozoobentos.

Komposisi dan struktur komunitas makrozoobentos ditentukan oleh lingkungannya. Oleh karena itu, makrozoobentos ini dapat digunakan untuk menduga status suatu perairan. Penggunaan makrozoobentos sebagai penduga kualitas air dapat digunakan untuk kepentingan adanya pencemaran baik yang

berasal dari limbah domestik dan industri mapun yang berasal dari limbah pertanian (pupuk dan pestisida), perikanan atau pakan ikan, dan peternakan (Handayani, 2001) Selain memiliki potensi yang besar, beragamnya aktifitas manusia di wilayah pesisir menyebabkan daerah ini merupakan wilayah yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Akibat lebih jauh adalah terjadinya penurunan kualitas perairan pesisir, karena adanya masukan limbah yang terus bertambah.

Ayat yang relevan dalam al-Qur'an surah Ar-rum ayat (41)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (Kementrian Agama RI tahun 2012)

Yakni telah tampak kerusakan di darat dan lautan, seperti rusaknya penghidupan mereka, turunnya musibah, dan turunnya penyakit yang menimpa diri mereka, dan lain-lain disebabkan perbuatan buruk (maksiat) yang mereka lakukan. Telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan dan ketertenggelaman yang disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah menghendaki untuk menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka bertobat dari kemaksiatan (Shihab, 2002).

Pulau Lae-lae merupakan pulau yang terdekat dengan Makassar dapat di tempuh dengan jarak waktu 10 menit. Keberadaan makrozoobentos pada pulau

Lae-lae sangat penting sebagai bioindikator perairannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penting dilakukan penelitian tentang keanekaragaman makrozoobentos epifauna pada perairan pulau Lae-lae Makassar.

### ***B. Rumusan Masalah***

Bagaimana keanekaragaman makrozoobentos epifauna pada perairan pulau Lae-lae Makassar?

### ***C. Ruang Lingkup Penelitian***

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengkaji tentang keanekaragaman makrozoobentos epifauna yang terdapat pada perairan pulau Lae-lae Makassar.

### ***D. Kajian Pustaka***

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Sitanggang (2013), Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman makrozoobentos pada perairan Danau Toba. Hasil penelitian yang dilakukan pada daerah perairan danau Toba dengan menggunakan beberapa titik di lokasi penelitian selama 3 kali pengambilan sampel ditemukan 18 genus makrozoobentos yang tersebar pada 3 lokasi pengambilan sampel. Jumlah makrozoobentos pada lokasi penelitian yaitu Filum Annelida yang terdiri dari 1 genus, Filum Arthropoda terdiri dari 5 genus, Filum Molluska terdiri dari 11 genus dan Filum Plathyhelminthes terdiri dari 1 genus.

2. Daeli dkk (2013), Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman makrozoobentos dan kelimpahannya di perairan Pulau Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Sampel makrozoobentos diambil dari 3 stasiun yang ditentukan dengan *Purposive Sampling*. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sebanyak 24 spesies terdiri dari 15 famili, 5 kelas dan 3 filum. Komposisi jenis dari tiap kelas yaitu Gastropoda (54,20 %), Bivalvia (20,80%), Malacostraca (16,20 %), Polychaeta dan Clitellata masing-masing 4,17 %. Kelimpahan individu tertinggi didapat pada Stasiun II (Pemukiman) sebesar 39,06 ind/m<sup>2</sup> dan terendah pada Stasiun III (*docking*) sebesar 16,76 ind/m<sup>2</sup>. Nilai Indeks Keanekaragaman ( $H'$ ) tertinggi terdapat pada Stasiun II sebesar 2,41 dan terendah pada Stasiun III sebesar 1,55. Nilai Indeks Keseragaman tertinggi terdapat pada Stasiun III yakni sebesar 0,86 dan terendah terdapat pada Stasiun I sebesar 0,79. Nilai Indeks Dominansi (C) tertinggi terdapat pada Stasiun III yakni sebesar 0,25 dan terendah terdapat pada Stasiun II sebesar 0,13.

Analisis uji t-Hutchinson menunjukkan tidak berbeda nyata antara Stasiun I dan III serta berbeda nyata antara Stasiun II dan I dan III. Hal ini diduga karena jenis substrat perairan berpasir yang merupakan tempat paling disenangi oleh kelas Gastropoda dan Bivalvia, persentasi pasir tertinggi pada Stasiun II sebesar 85,85 %. Hasil pengamatan parameter lingkungan perairan (Suhu, Kekeruhan, Kecepatan Arus, Salinitas, Jenis substrat, DO dan pH) menunjukkan masih dapat mendukung kehidupan organisme makrozoobentos.

3. Ankit Kumar and Vipin Vyas (2014). Penelitian ini dirancang untuk menilai keragaman makrozoobentos di salah satu Sungai Narmada yang merupakan sumber air yang paling signifikan untuk negara bagian Madhya Pradesh. Penelitian ini telah dilakukan di area pusat dari sungai dan cakupan jangkauan penelitian ini menyebar dari Shahganj hingga ke Barandur (Bandua). Pengamatan mengungkapkan bahwa filum arthropoda memperoleh posisi dominan dengan 55% dari total komposisi fauna sementara filum mollusca merupakan posisi kedua dengan 36% sedangkan, kelimpahan fauna ditemukan dari filum annelida yang memberikan kontribusi 9%.

#### ***E. Tujuan Penelitian***

Untuk mengetahui keanekaragaman makrozoobentos epifauna pada perairan pulau Lae-lae Makassar.

#### ***F. Kegunaan Penelitian***

Adapun manfaat pada penelitian ini yaitu:

1. Sebagai informasi pada masyarakat tentang keanekaragaman makrozoobentos yang terdapat pada perairan pulau Lae-lae Makassar.
2. Sebagai sumber informasi dan bahan relevansi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Keanekaragaman**

Keanekaragaman (*diversity*) merupakan ukuran integrasi komunitas biologik dengan menghitung dan mempertimbangkan jumlah populasi yang membentuknya dengan kelimpahan relatifnya. Keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup dapat terjadi akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan (Kristanto, 2002).

Keanekaragaman jenis merupakan karakteristik tingkatan dalam komunitas berdasarkan organisasi biologisnya, yang dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitasnya. Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman yang tinggi jika komunitas tersebut disusun oleh banyak spesies (jenis) dengan kelimpahan spesies sama dan hampir sama. Sebaliknya jika suatu komunitas disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya sedikit spesies yang dominan maka keanekaragaman jenisnya rendah (Umar, 2013).

#### **B. Makrozoobentos**

Makrozoobentos merupakan kelompok organisme yang hidup di dalam atau di permukaan sedimen dasar perairan serta memiliki ukuran panjang lebih dari 1 mm. Siklus hidup beberapa makrozoobentos hanya hidup sebagai bentos dalam separuh saja dari fase hidupnya, misalnya pada stadia muda saja atau sebaliknya.

Pada umumnya cacing dan bivalvia hidup sebagai bentos pada stadia dewasa, sedangkan ikan demersal hidup sebagai bentos pada stadia larva (Nybakken, 1992).

Bentos merupakan makanan alami bagi hewan-hewan dasar terutama ikan dan udang. Bentos terdiri dari berbagai jenis dan tipe, baik yang hidup tertancap (lamun, spongiae); merayap (bintang laut, kepiting) maupun yang membenamkan diri di pasir atau lumpur (kerang-kerangan, cacing) (Setyobudiandi, 1999).

Nybakken (1997) menyatakan bahwa berdasarkan keberadaannya di dasar perairan, maka makrozoobentos yang hidupnya merayap di permukaan dasar perairan disebut dengan epifauna, seperti Crustacea dan larva serangga. Sedangkan makrozoobentos yang hidup pada substrat lunak di dalam lumpur disebut dengan infauna, misalnya Bivalvia dan Polychaeta.

### **C. Klasifikasi Makrozoobentos**

#### **1. Filum Echinodermata**

Filum echinodermata merupakan golongan hewan invertebrata yang berkulit duri. Echinodermata berasal dari kata echinos yang berarti berduri dan derma berarti kulit. Hal ini disebabkan karena adanya rangka di dalam yang berhubungan dengan duriduri. Sehingga permukaan tubuhnya seperti berduri. Echinodermata merupakan satu-satunya filum dalam dunia binatang dimana anggotanya tidak ada yang hidup parasit (Soewignyo, 1989).

Adapun yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah teripang laut, bintang laut, bintang ular laut, bulu babi dan lili laut. Echinodermata memiliki ciri

khas sebagai berikut: Susunan tubuh radial, Skeleton terbentuk dari  $\text{CaCO}_3$  , Hidup tidak berkoloni, Alat gerak berupa sistem ambulakral, Semua hidup di laut (Kuncoro, 2004)

Filum echinodermata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu :

a. *Holothuroidea* (teripang laut)



**Gambar 2.1 *Holothuroidea* (Bengen, 2004)**

mempunyai bentuk tubuh yang bervariasi mulai dari bulat sampai memanjang dan pipih atau selinderis dengan panjang tubuhnya 10–30cm, dengan mulut pada salah satu ujung dan dubur pada ujung lainnya (Nontji, 2001).

Teripang memiliki tubuh yang berotot-otot, tipis, tebal, dan lembek atau licin kulitnya halus atau bintik-bintik. Pada bagian ini terdapat spikula-spikula yang terbentuk seperti meja (Soewgnyo, 1989).

b. *Asteroidea* (bintang laut),



**Gambar 2.2 *Asteroidea* (Bengen, 2004)**

Bintang laut (*Astroidea*) biasanya di jumpai pada dasar perairan terutama di daerah lamun dan trumbu karang banyak di jumpai pada daerah pantai atau daerah pasang surut dengan substrat berpasir hingga pasir berbatu yang hidup sampai kedalaman 500 m adapula yang terdapat di lereng terumbu karang pada kedalaman 26 m, ada yang di temukan dipaparan terumbu karang terbuka pada saat air surut (Romimohtarto dan Juana, 2001).

c. *Ophiuridea* (bintang ular laut)



**Gambar 2.3 *Ophiuridea* (Bengen, 2004)**

Bintang ular adalah hewan dari filum Echinodermata , yang memiliki hubungan dekat dengan bintang laut. Mereka berjalan di dasar laut dengan menggunakan lengan fleksibel mereka untuk bergerak. Bintang ular umumnya memiliki lima lengan berbentuk seperti cambuk yang panjangnya bisa mencapai 60 cm (2 kaki) pada spesimen terbesar. Ada sekitar 1.500 spesies bintang ular yang hidup sekarang, dan mereka kebanyakan ditemukan pada kedalaman lebih dari 500 meter (1.620 kaki).

d. *echinoidea* (bulu babi)



**Gambar 2.4 *Echinoidea* (Bengen, 2004)**

Umumnya hewan-hewan yang termasuk dalam filum echynodermata dapat dijumpai didaerah pantai terutama di daerah terumbu karang dan padang lamun. dapat ditemukan pula pada daerah berpasir atau berkarang sampai kedalaman 500 m (Soewignyo, 1989)



e. *Crinoidea* (lili laut)



**Gambar 2.5 *Crinoidea* (Bengen,2004)**

Crinoidae (lili laut) adalah suatu kelas binatang laut yang berbentuk seperti bunga lili. Nama ini diambil dari bahasa Yunani *krinon* yang berarti "lili" dan *eidos* yang berarti "berbentuk". Lili laut dapat hidup pada perairan dangkal atau di kedalaman sampai 6.000 meter. Lili laut dewasa akan menempel di dasar laut dengan menancapkan tangkainya. Crinoidae yang tidak bertangkai sering disebut bintang bulu atau comatulids (Romimohtarto dan Juana, 2001).

## 2. filum Mollusca

Menurut Wilhm (1975) dan Basmi (1999), Mollusca berasal dari bahasa latin yaitu molluscus yang artinya lunak. Jadi Filum Mollusca adalah kelompok hewan invretrata yang memiliki tubuh lunak. Tubuh lunaknya itu dilindungi oleh cangkang, meskipun ada juga yang tidak bercangkang. Tubuh Mollusca terdiri atas tiga bagian utama, yaitu kaki, massa viseral, dan mantel, dapat berupa cangkang atau cangkok. Anggota hewan ini mempunyai cangkang atau cangkok luar mengandung kapur (kalsium karbonat) yang dapat melindungi tubuhnya. Tetapi ada beberapa jenis



yang tidak memiliki cangkok. Cangkok tersebut merupakan mantel, yaitu lapisan jaringan organorgan viseral dan membentuk rongga mantel terletak pada insang atau paru-paru, lubang saluran pencernaan. Filum ini dibagi menjadi 5 kelas di antaranya adalah:

- a. Kelas Pelecypoda.



**Gambar 2.6 *Naticarius canrena* (Bengen, 2004)**

Kerang, tiram, termasuk dalam kelas ini. Hewan ini mempunyai dua buah cangkang yang melindungi tubuh (cangkang setangkup). Pelecypoda simetri billateral, tapi tidak dapat bergerak dengan cepat. Hewan ini bergerak dengan menjulur kan kaki otot yang besar melalui celah antara dua cangkang. Semua anggota kelas ini memperoleh makanan dengan menyaring makanan dari air yang masuk kedalam rongga mantel (Silalom, 1999).

b. Kelas Gastropoda



**Gambar 2.7 *Nudibranchia* (Bengen, 2004)**

Gastropoda merupakan kelas yang terbesar dari moluska. Siput bercangkang dan siput tak bercangkang termasuk dalam kelas ini. Siput bercangkang tunggal dan spiral. Siput dewasa tidak menunjukkan simetri bilateral tetapi larvanya simetri bilateral. Gastropoda mempunyai lidah yang panjang dan sempit yang ditutupi deretan gigi kecil. Lidahnya disebut radula. Hewan ini mempunyai kepala dan dua pasang tentakel. Pada ujung tentakel terdapat mata. Sebagian besar spesies gastropoda hidup di laut tetapi beberapa hidup di air tawar bahkan ada yang hidup di darat. Yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru. Siput tak bercangkang dapat ditemukan di laut dan di darat. Warna siput darat sederhana namun siput tak bercangkang yang hidup di laut kebanyakan berwarna menyolok dan indah (Pennak, 1978).

c. Kelas Cephalophoda



**Gambar 2.8 *Loligo sp* (Bengen, 2004)**

Gurita, cumi-cumi, dan nautilus termasuk dalam kelas cephalophoda. Hewan ini mempunyai kepala yang besar dan bermata sangat tajam. Pada kepala terdapat tangan-tangan (delapan pada gurita dan sepuluh pada cumi-cumi) yang berguna untuk pergerakan dan mencari mangsa. Mata cephalophoda dapat melihat dan berfungsi seperti vertebrata. Hanya Nautilus lah yang bercangkang. Cangkang cumi-cumi kecil berupa lempengan yang melekat pada mantel sedangkan gurita tidak bercangkang.

Cephalophoda merupakan anggota dari moluska. Cephalophoda juga termasuk hewan terbesar dari semua invertebrata. Pernah ditemukan gurita sepanjang 28 kaki dan cumi-cumi sepanjang 50 kaki. Cumi-cumi dapat bergerak sangat cepat dengan cara menyembrotkan air dari bawah mantelnya. Bila dalam bahaya cumi-cumi melarikan diri sambil menyembrotkan tinta berwarna hitam bersama-sama dengan air

yang digunakan untuk bergerak dan cairan ini akan menghambat lawan. Gurita dan cumi-cumi dapat dimakan (Mackie, 2001).

d. Kelas Scaphopoda



**Gambar 2.9 *Dentalium vulgare* (Bengen, 2004)**

Scaphopoda merupakan kelas terkecil dari moluska. Hewan ini mempunyai kebiasaan membenamkan diri di pasir pantai. Kelas ini merupakan filum dari mullusca, anggota kelas ini di jumpai di laut. Habitat scaphopoda hidup dan membenamkan diri pada substrat pasir atau lumpur yang bersih di laut dangkal. Beberapa spesies terdapat pada kedalaman 1.850 m (Pennak, 1978).

e. Kelas Amphineura



**Gambar 2.10 *Chilton* sp (Bengen, 2004)**

Contoh hewan yang termasuk kelas ini adalah *Chilton* dan *Neopilina*. *Chilton* mirip siput tak bercangkang hidup di daerah pantai cangkangnya terdiri dari beberapa (biasanya delapan lempengan yang tersusun secara tumpang tindih). Meskipun kelihatannya beruas-ruas tetapi organ dalamnya tidak. *Neopilina* disebut fosil hidup karena sebelum ditemukan pada tahun 1957 hewan ini dianggap sudah punah sejak jutaan tahun yang lalu. Moluska ini sangat menarik perhatian karena di samping memiliki sifat-sifat moluska bagian dalamnya beruas-ruas (Pennak, 1978)

### 3. Filum Cnidaria

Filum cnidaria merupakan makrozoobentos pada karang yang meliputi ubur-ubur, hydra, anemon laut, dan hewan karang. Filum ini disebut cnidaria karena memiliki knidosit atau sel-sel penyengat yang terdapat pada epidermisnya. Cnidaria termasuk ke dalam hewan yang memiliki simetri radial. Hewan radial hanya memiliki bagian dorsal (atas) dan bagian ventral (bawah) atau bagian oral (mulut) dan bagian

aboral, tapi tidak ada bagian anterior (kepala) dan posterior (ekor). Cnidaria juga disebut coelenterata karena mempunyai rongga besar di tengah-tengah tubuh. Coelenterata berasal dari kata coilos (berongga) dan enteron (usus). Jadi, semua hewan yang termasuk filum ini mempunyai rongga usus (gastrovaskuler) yang berfungsi untuk pencernaan. Menurut Roback (1974), Peranan Coelenterata dalam kehidupan:

- a. merupakan komponen utama pembentuk ekosistem terumbu karang
- b. sebagai barrier atau penghalang pantai terhadap ombak
- c. sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan dan bahan kosmetik

filum Cnidaria terbagi atas 3 kelas, yaitu:

1. Kelas Hydrozoa



**Gambar 2.11** *Hydra* sp (Bengen, 2004)



Ciri-ciri hydrozoa adalah berupa polip, hanya sebagian kecil saja yang berbentuk medusa dan selalu hidup berkoloni. Habitat asli Hydrozoa di air tawar, walaupun ada sebagian yang hidup di laut. Hydrozoa biasanya hidup dengan cara menempel pada benda yang hidup dalam air, contohnya tanaman air. Cara reproduksi Hydrozoa secara aseksual melalui tunas, sedangkan secara seksualnya dengan menghasilkan sperma dan ovum tetapi ada juga yang hermaprodit.

a. Kelas Schyphozoa



**Gambar 2.12 *Aurelia aurita* (Bengen, 2004)**

Ciri ciri kelas Scyphozoa adalah memiliki bentuk tubuh mirip mangkuk yang terbalik. mengalami fase medusa yang dominan dibandingkan dengan fase polip. Tempat tinggalnya di laut, reproduksinya seksual dan aseksual dan mengalami pergiliran keturunan. Contohnya Scyphozoa adalah *Aurelia aurita* (ubur-ubur). Proses pergiliran keturunan *Aurelia* dimana aurelia dewasa merupakan fase medusa. Prosesnya diawali dengan *Aurelia* jantan menghasilkan sperma sedangkan aurelia betina menghasilkan ovum. Saat sperma berhasil membuahi ovum maka terbentuklah zigot, zigot ini kemudian mengalami pembelahan diri beberapa kali hingga terbentuk sel yang

berbentuk bola disebut blastula. Blastula kemudian mengalami pertumbuhan menjadi larva yang bersilia. Larva ini akan mencari tempat yang tepat untuk tumbuh menjadi polip. Polip kemudian tumbuh secara menetap hingga membesar dan membentuk kuncup–kuncup yang baru disebut strobilasi. Lama kelamaan kuncup ini akan melepaskan diri satu persatu ke air menjadi efira, efira kemudian berubah menjadi medusa dan tumbuh menjadi medusa yang dewasa (Pennak, 1978).

b. Kelas anthozoa



**Gambar 2.13 *Actinaria* sp (Bengen, 2004)**

Kelas anthozoa memiliki ciri-ciri dimana ia berbentuk polip, merupakan hewan laut yang termasuk dalam golongan hewan karang dan anemon laut. Hewan ini tidak memiliki tangkai, tubuhnya dibungkus oleh skeleton eksternal biasa disebut karang. Anthozoa memiliki tentakel di sekitar mulutnya. Bentuk mulutnya memanjang dan bermuara di dalam tabung stomodeum (Nontji, 2002).

#### 4. Filum Arthropoda

Filum Arthropoda merupakan makrozoobentos pada karang. Anggota Filum Arthropoda yang paling terkenal adalah Crustacea yang hidup pada terumbu karang.

**Crustacea** adalah suatu kelompok besar dari arthropoda, terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan, dan biasanya dianggap sebagai suatu subfilum. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup dikenal seperti lobster, kepiting, udang dan karang. Mayoritas merupakan hewan akuatik, hidup di air tawar atau laut, walaupun beberapa kelompok telah beradaptasi dengan kehidupan darat, seperti kepiting darat. Mayoritas dapat bebas bergerak, walaupun beberapa takson bersifat parasit dan hidup dengan menumpang pada inangnya.

Arthropoda dibagi menjadi 4 kelas, yaitu:

- a. Kelas Crustacea



**Gambar 2.14** *Brachyura* sp (Bengen, 2004)

Ciri-ciri kelas ini adalah memiliki tubuh dimana bagian kepala dan dadanya bersatu (Sefalotorak) sedangkan bagian perutnya (abdomen) keras karena terbuat dari zat kitin yang berlendir. Di bagian sefalotorak terdapat 5 pasang kaki yang besar digunakan untuk bersajalan, sepasang kaki yang bertama ukurannya lebih besar disebut keliped. Sementara itu di abdomennya terdapat 5 pasang kaki yang kecil kegunaannya untuk alat renang. Di bagian depan sephalotoraks terdapat sepasang antena yang panjang sen sepasang antena pendek. Terdapat 2 jenis crustacea yaitu Entomostraca (microcrustacea) dan Malacostraca (macrocrustacea) Contoh entomostraca *Daphnia sp*, *cyclops* Contoh Malacostraca *Pinnaeus monodon* (udang windu), *cancer sp* (kepiting), Panulirus sp (lobster) (Nybakken, 1992).

b. Kelas Myriapoda



**Gambar 2.15** *Lithobius forficatus* (Bengen, 2004)

Ciri ciri kelas ini adalah terdapat banyak segmen di tubuhnya bahkan dapat mencapai 100 hingga 200 ruas. Bagian tubuhnya terdapat kepala yang

kecil pada ruas pertama, sedangkan perutnya pada terletak pada setiap ruas dan terdapat sepasang atau 2 pasang kaki. Kelas ini hidup di darat dan menggunakan paru – paru buku untuk bernafas. Di kepalanya terdapat sepasang mandibula, dan dua pasang maksila.

Menurut Wilhm (1975) Kelas ini terbagi 2 yaitu Chilopoda dan diplopoda.

a) Chilopoda

Ciri-ciri tubuhnya gepeng, dan terdapat kaki pada tiap ruas tubuhnya. Terdapat antena di kepalanya dan cakar yang memiliki bisa. Ia bersifat karnivora.

Contoh : *Scolopendra* sp (kelabang).

b)Diplopoda

Diplopoda memiliki tubuh bulat, dan memiliki sepasang kaki pada tiap ruas tubuhnya. Hewan ini selalu hidup pada tempat yang lembab. Cara melindungi tubuhnya dari musuh adalah dengan menggulung tubuhnya. Hewan ini juga termasuk herbivora.

c. Kelas Arachnida



**Gambar 2.16 *Heteropoda Venatoria* (Bengen, 2004)**

Ciri ciri kelas ini adalah memiliki bagian kepala dan dada yang menyatu (sefalotorak) dan bagian perut (abdomen) yang bulat. Bagian kepalanya kecil, tidak memiliki antena dan memiliki mata tunggal. Tempat hidupnya di darat, dan bernafas menggunakan paru-paru buku. Memiliki kaki 4 pasang yang terletak di sefalotorak. Pada bagian sefalotoraks terdapat sepasang kelisera yang beracun dan sepasang palpus. Di bagian ujung posterior abdomen dan sebelah ventral anus terdapat sutera ia bermuara pada alat yang mirip dengan pembuluh disebut spinneret. Ia hanya makan dari cairan hewan lain yang diisap menggunakan mulut dan esofagus. Jenis kelaminnya terpisah dan melakukan fertilisasi secara internal. setelah terbentuk telur ia akan diletakkan di dalam kokon sutera untuk dibawa kemana-mana oleh hewan betina (Setyobudiandi, 1999).

d. Insecta



**Gambar 2.17 *Gryllus assimilis* (Bengen, 2004)**

Di dalam filum arthropoda kelas insecta memiliki anggota terbesar dan bahkan ia menjadi bagian terbesar dari filum animalia. Di bumi ini terdapat lebih dari 1 juta spesies yang merupakan insecta.

Ciri-ciri insecta Menurut Wilhm (1975)

- Tubuhnya terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, dada dan perut.
- terdapat mata tunggal dan mata majemuk di kepalanya.
- Pada bagian dada terbagi menjadi 3 ruas yaitu protoraks, mesotorak, dan metatoraks.
- kaki dan sayap terletak di bagian dada
- kelas ini memiliki 3 pasang kaki.
- memiliki sayap sepasang atau 2 pasang, beberapa insecta ditemukan tidak bersayap
- Ada yang hidup di darat, air tawar dan di laut.
- Ukuran tubuhnya beragam mulai dari paling kecil beberapa mm dan sampai yang besar berukuran beberapa cm.



- tipe mulutnya beragam ada yang menghisap, menusuk mengisap serta ada yang mengunyah.
- Menggunakan trakea yang bercabang cabang sebagai alat pernafasan.
- mengalami metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna.
- Menggunakan sistem saraf tangga tali.
- Sistem peredaran darahnya terbuka dimana darah tidak memiliki pigmen sehingga fungsinya hanya untuk mengedarkan zat makanan saja.
- Peredaran dan mengangkut gas  $O_2$  dan  $CO_2$  menggunakan trakea.

#### ***D. Parameter Lingkungan***

##### **1. Suhu**

Suhu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan derajat panas benda. Suhu biasa digambarkan sebagai ukuran energi molekul. Suhu sangat berperan dalam mengendalikan kondisi ekosistem suatu perairan. Suhu juga mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme (Nybakken, 1992).

Peningkatan suhu yang disertai dengan penurunan kadar oksigen terlarut dapat membuat keberadaan oksigen sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen bagi organisme akuatik untuk melakukan metabolisme dan respirasi (Effendi, 2003).

##### **2. pH (Derajat Keasaman)**

pH merupakan faktor pembatas bagi organisme yang hidup disuatu perairan. Perairan dengan pH yang terlalu tinggi atau rendah akan mempengaruhi ketahanan hidup organisme yang hidup didalamnya (Odum, 1993)

Nilai yang ideal bagi kehidupan organisme air pada umumnya terdapat antara 7 sampai 8,5. Kondisi perairan yang bersifat sangat asam maupun sangat basa akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi (Barus, 2004).

Tabel 2.1 pengaruh pH Terhadap Komunitas Biologi Perairan

Nilai pH	Pengaruh Umum
6,0-6,5	Keanekaragaman bentos sedikit menurun
5,5-6,0	Penurunan nilai keanekaragaman bentos semakin menurun
5,0-5,5	Penurunan keanekaragaman dan komposisi bentos besar
4,5-5,0	Penurunan keanekaragaman dan komposisi bentos semakin besar yang diikuti dengan penurunan kelimpahan bentos.

### 3. Salinitas

Salinitas adalah kadar garam terlarut dalam air yang memiliki satuan salinitas yaitu per mil ( $^0/_{100}$ ) dengan jumlah berat total (gr) material padat seperti NaCl yang terkandung dalam 1000 gram air laut (Nybakken, 1993).

Salinitas dapat mempengaruhi penyebaran organisme bentos baik secara Horizontal, maupun vertikal. Secara tidak langsung mengakibatkan adanya perubahan komposisi organisme dalam suatu ekosistem (Odum, 1993).

## **E. Indeks Ekologi**

### 1. Indeks Keanekaragaman ( $H'$ )

Dalam suatu struktur komunitas terdapat lima karakteristik yang dapat diukur, yaitu keanekaragaman, keseragaman, dominansi, kelimpahan dan pertumbuhan. Menurut sifat komunitas, keanekaragaman ditentukan dengan banyaknya jenis serta pemerataan kelimpahan individu tiap jenis yang didapatkan. Semakin besar nilai suatu keanekaragaman berarti semakin banyak jenis yang didapatkan dan nilai ini sangat bergantung kepada nilai total dari individu masing-masing jenis atau genera. Keanekaragaman ( $H'$ ) mempunyai nilai terbesar jika semua individu berasal dari genus atau spesies yang berbeda-beda, sedangkan nilai terkecil jika semua individu berasal dari satu genus atau satu spesies saja (Odum, 1993).

Tabel 2.2 Kategori indeks Keanekaragaman

No	Keanekaragaman	Kategori
1	$H' < 2,0$	Rendah
2	$2,0 < H' < 3,0$	Sedang
3	$H' \geq 3,0$	Tinggi

Nilai indeks keanekaragaman dengan kriteria sebagai berikut :

Jika  $H' < 2$  : Keanekaragaman genera/spesies rendah, penyebaran jumlah individu tiap genera/spesies rendah, kestabilan komunitas rendah dan keadaan perairan telah tercemar.

Jika  $2 < H' < 3$  : Keanekaragaman sedang, penyebaran jumlah individu sedang dan kestabilan perairan telah tercemar sedang.

Jika  $H' > 3$  : Keanekaragaman tinggi, penyebaran jumlah individu tiap spesies atau genera tinggi, kestabilan komunitas tinggi dan perairannya masih belum tercemar.

## 2. Indeks Keseragaman (E)

Keseragaman hewan bentos dalam suatu perairan dapat diketahui dari indeks keseragamannya. Semakin kecil nilai indeks keseragaman organisme maka penyebaran individu tiap jenis tidak sama, ada kecenderungan didominasi oleh jenis tertentu (Odum, 1993).

Tabel 2.3 Kategori Indeks Keseragaman (E)

No	Keseragaman	Kategori
1	$0,00 < E < 0,50$	Komunitas Tertekan
2	$0,50 < E < 0,75$	Komunitas Labil
3	$0,75 < E < 1,00$	Komunitas Stabil

## 3. Indeks Dominansi

Dominansi dapat diketahui dengan menghitung indeks dominansinya. Nilai indeks dominansi yang tinggi menyatakan bahwa konsentrasi dominansi yang rendah, artinya tidak ada jenis yang mendominasi komunitas tersebut.

Tabel 2.4 Kategori Indeks Dominansi (C)

No	Dominansi	Kategori
----	-----------	----------

1	$0,00 < C < 0,50$	Rendah
2	$0,50 < C < 0,75$	Sedang
3	$0,75 < C < 1,00$	Tinggi

### F. Ayat yang Relevan

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 45 yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٥

Terjemahnya:


“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Kementrian Agama RI tahun 2012)

Allah adalah pencipta segala sesuatu dengan kehendak-nya. Dia menciptakan semua jenis hewan dari asal yang sama yaitu air. Maka tidak satupun hewan yang tidak memerlukan air. Kemudian jadikanlah hewan-hewan itu bervariasi dari segi jenis, potensi dan perbedaan-perbedaan lainnya.

Ayat di atas menegaskan bahwa: Dan, di samping bukti-bukti kekuasaan dan limpahan anugerah-Nya yang telah dikemukakan sebelum ini, Allah juga telah menciptakan semua jenis hewan dari air yang memancar sebagaimana Dia menciptakan tumbuhan dari air yang tercurah. Lalu, Allah menjadikan hewan-hewan itu beraneka jenis, potensi dan fungsi, maka sebagian dari mereka, yakni hewan itu,

ada yang berjalan diatas perutnya, seperti buaya, cacing dan hewan melata lainnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, seperti manusia dan burung sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki, seperti sapi, kambing, dan lain-lain, dan ada juga yang berjalan dengan menggunakan lebih dari empat kaki, seperti kalajengking, laba-laba, dan lain-lain. Memang, Allah Maha kuasa lagi Maha bijaksana karena itu Allah secara terus-menerus menciptakan apa dan dengan cara serta bahan yang dikehendaki-Nya, sebagai bukti kekuasaan-Nya sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Betapa penciptaan binatang menunjukkan kekuasaan Allah, sekaligus kehendak-Nya yang mutlak. Dari satu sisi, bahan penciptaannya sama yaitu air, tetapi air dijadikannya berbeda-beda, lalu dengan perbedaan itu Dia mencipta makhluk yang memiliki potensi dan fungsi berbeda-beda pula yang sungguh berbeda dengan substansi serta kadar air yang merupakan bahan kejadiannya (Shihab, 2002).

## G. Perairan Pulau Lae-lae



**Gambar 2.18 Peta Pulau lae-lae Makassar**


Pulau Lae-lae merupakan pulau kecil di barat makassar merupakan salah satu tempat kunjungan wisata di Makassar yang berjarak 1.5 Km dari Makassar dan kita dapat melihatnya jelas langsung dari Pantai Losari. Untuk melakukan perjalanan ke pulau kecil ini dapat di tempuh selama 10 menit dengan perahu motor nelayan.

Pulau Lae-lae adalah sebuah pulau di Kelurahan Lae-lae Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pulau dengan luas 0,04 km<sup>2</sup> ini dihuni oleh 420 keluarga atau sekitar 1780 jiwa. Jarak pulau ini dari Makassar sekitar 1,5 km, dengan jarak tempuh 5 menit dari penyeberangan kayu bangkoa Kota Makassar. Kelurahan Lae-lae Secara administratif masuk dalam



wilayah Kota Makassar kecamatan Ujung Pandang dengan wilayah Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan dan Gusung tangayya. Kantor Lurah Lae-lae terletak di Pulau Lae-lae dengan luas daratan 8,9 hektar yang terletak pada posisi  $199^{\circ}23'33,1''$  BT dan  $05^{\circ}08'16,0''$  LS atau di perairan Selat Makassar. Batas-batas administrasi meliputi sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Samalona, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Makassar, sebelah Selatan dengan Tanjung Bunga, dan Sebelah Utara dengan Gusung Tangayya. Warga Kelurahan Lae-lae sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 sebanyak 1780 Jiwa dengan jumlah 420 Kepala keluarga.

## H. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu penelitian untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis. Deskripsi atau gambaran yang akan dibuat dari penelitian ini yaitu keanekaragaman makrozoobentos epifauna pada perairan pulau Lae-lae Makassar.

#### ***B. Variable Penelitian***

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu keanekaragaman Makrozoobentos epifauna pada perairan pulau Lae-lae Makassar.

#### ***C. Defenisi Operasional Variabel***

Keanekaragaman (*diversity*) merupakan ukuran integrasi komunitas biologik dengan menghitung dan mempertimbangkan jumlah populasi yang membentuknya dengan kelimpahan relatif makrozoobentos epifauna yang merupakan hewan yang melekat atau beristirahat pada dasar atau hidup di dasar endapan pada perairan pulau Lae-lae.

#### ***D. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis makrozoobentos yang ada di perairan pulau Lae-lae Makassar.

## 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah makrozoobentos epifauna yang diperoleh saat penelitian di ekosistem perairan pulau Lae-lae Makassar.

### **E. Alat dan Bahan**

#### a. Alat

Adapun Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah plot ukuran 1 m x 1 m, kamera, pH meter, hand refraktometer, Seccidish untuk mengukur kecerahan air, Termometer skala 0°C-100°C untuk mengukur suhu air, Meteran dengan ketelitian 1 cm, Baki plastik untuk menampung sampel, Botol sampel untuk mengawetkan sampel, tali rafia, kertas label,

#### b. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah aqudest, formalin dan makrozoobentos epifauna

### **F. Prosedur Kerja**

#### 1. Penentuan stasiun penelitian

Penentuan stasiun dibagi atas 3 titik stasiun berdasarkan arah mata angin yaitu timur, selatan dan barat.

#### 2. Pengukuran suhu air

Dengan cara memasukkan ujung termometer pada permukaan air di titik pengamatan sampai air raksa atau alkohol tidak bergerak lagi. Selanjutnya suhu dapat dilihat pada skala.

### 3. Pengukuran kecerahan air

Piringan secchi yang konvensional adalah piringan yang di cat putih dan hitam secara bergantian pada permukaan yang menghadap pada pengamat, permukaan di bawahnya dicat hitam dan digantungkan pemberat dari pusatnya 24 serta dipasang kait untuk diikat dengan tali. Cara kerjanya adalah menurunkan piringan ke dalam air sampai piringan tepat hilang dari pandangan dan dinaikkan perlahan-lahan sampai batas dimana secchidisk masih terlihat mata dan jika diturunkan lagi tidak terlihat. Kemudian mencatat kedalamannya dengan cara, panjang tali secchidisk yang basah diukur dengan meteran.

### 4. Pengukuran pH air.

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. pH meter di celupkan kedalam air kemudian langsung dibaca sesuai dengan standar angka yang tertera pada layar pH meter, angka tersebut merupakan pH air yang diukur.

### 5. Penentuan stasiun penelitian

Stasiun pengamatan terdiri dari tiga titik stasiun 1 terdapat pada bagian Barat pulau Lae-lae Makassar, stasiun 2 terdapat pada bagian Selatan pulau Lae-lae Makassar, stasiun 3 terdapat pada bagian Timur pulau Lae-lae Makassar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2016 di pulau Lae-lae Makassar.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode *purposive sampling* sehingga di peroleh 3 stasiun. Teknik pengambilan sampel

Makrozoobentos epifauna, penelitian ini menggunakan metode *line transect* yang dibuat tegak lurus dari bibir pantai ke arah laut dengan tali rafia sepanjang 25 meter. Pada setiap interval 5 meter dari garis pantai dilakukan sampling biomassa pada bingkai (*plot*) berbentuk persegi (*bahan paralon*) dengan ukuran 1 x 1 meter.

#### 6. Identifikasi spesies makrozoobentos

Identifikasi spesies makrozoobentos didasarkan pada foto sampel yang didapatkan pada 3 stasiun kemudian dicocokkan dengan gambar yang ada pada buku identifikasi yang ditulis oleh Dharma (1988) dan media online *identification Bivalve, Merrine Shell identificatio* (<http://www.conchology.be>).

#### **G. Metode pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diharapkan dapat mewakili daerah penelitian maka pengambilan sampel dilakukan secara terpilih (*purposive sampling*) yaitu berdasarkan adanya tujuan-tujuan tertentu. Sampel diambil dari tiga stasiun pengamatan yang telah ditentukan.

**Indeks keanekaragaman** dihitung dengan rumus Shannon-Wiener (Odum,1993).

$$H' = -\sum \left( \frac{ni}{N} \right) \ln \left( \frac{ni}{N} \right)$$

Dimana: H' = Indeks Keanekaragaman Jenis

ni = Jumlah Individu Jenis

N = Jumlah Total Individu

### Indeks keseragaman

Indeks keseragaman dihitung dengan menggunakan rumus Evennes-Indeks (Odum, 1993).

$$E = \frac{H}{\ln S}$$

Dimana; E = Indeks Keseragaman Jenis

H' = Indeks Keanekaragaman Jenis

S = Jumlah jenis

### Indeks dominansi

Indeks domonansi dihitung dengan rumus Dominance of Simpson (Odum, 1993).

$$C = \sum \left[ \frac{ni}{N} \right]^2$$

Dimana: C = Indeks Dominansi

ni = Jumlah Dominansi

N = Jumlah Total Individu



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil penelitian

##### 1. Keanekaragaman Makrozoobentos

Berdasarkan hasil penelitian keanekaragaman makrozoobentos pada perairan pulau Lae-lae Makassar yang telah dilakukan, didapatkan jenis makrozoobentos yang termasuk kedalam 2 kelas yaitu kelas Bivalvia dan Crustacea dengan jumlah spesies yaitu 8 dan jumlah individu sebanyak 38 yang tersebar pada 3 stasiun penelitian. Stasiun 1 berada pada bagian barat pulau Lae-lae Makassar, stasiun 2 berada pada bagian selatan pulau Lae-lae Makassar dan stasiun 3 berada pada bagian timur pulau Lae-lae Makassar.

Adapun hasil penelitian makrozoobentos epifauna pada stasiun 1 (Barat) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1. Keanekaragaman makrozoobento epifauna pada stasiun 1 (Barat).

NO.	KELAS	SPESES	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH JENIS
1	Crustaceae	<i>Atergatis integerrimus</i>	2	3
2		<i>Scylla tranqueberica</i>	3	
3	Bivalvia	<i>Naticarius canrena</i>	3	
<b>JUMLAH</b>			8	3

Berdasarkan tabel 4.1. Dapat dilihat bahwa makrozoobentos epifauna yang terdapat pada stasiun 1 yaitu terdiri 2 kelas (Crustacea dan Bivalvia) dengan jumlah individu 10 dan jumlah spesies yaitu 3.

Hasil penelitian makrozoobentos epifauna pada stasiun 2 (selatan) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2. Keanekaragaman makrozoobentos epifauna pada stasiun 2 (selatan)

NO.	KELAS	SPESES	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH JENIS
1	Bivalvia	<i>Atrinata pectinata</i>	3	5
2		<i>Naticarius canrena</i>	4	
3		<i>Trichotropis borealis</i>	2	
4	Crustaceae	<i>Atergatis integerrimus</i>	5	
5		<i>Cypade cordimanus</i>	3	
<b>JUMLAH</b>			17	5

Berdasarkan tabel 4.2. Dapat dilihat bahwa makrozoobentos epifauna yang terdapat pada stasiun 2 yaitu terdiri 2 kelas (Crustacea dan Bivalvia) dengan jumlah individu yaitu 17 dan jumlah spesies 5.

Hasil penelitian makrozoobentos epifauna pada stasiun 3 (timur) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3. Keanekaragaman makrozoobentos epifauna pada stasiun 3 (timur)

NO	KELAS	SPESES	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH JENIS
1	Crustaceae	<i>Callinectes sapidus</i>	5	5
2		<i>Ocypade cordimonas</i>	2	
3		<i>Scylla tranquebarica</i>	4	
4	Bivalvia	<i>Montacuta substriata</i>	1	
5		<i>Atrina pectinata</i>	1	
<b>JUMLAH</b>			13	

Berdasarkan tabel 4.3. Dapat dilihat bahwa makrozoobentos epifauna yang terdapat pada stasiun 3 yaitu terdiri 2 kelas (Crustacea dan Bivalvia) dengan jumlah individu 13 dan jumlah jenis 5.

## 2. Indeks Ekologi

Indek Ekologi meliputi indeks Keanekaragaman, indeks Keseragaman dan indeks Dominansi dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4 Indeks Ekologi

STASIUN	INDEKS EKOLOGI					
	H'	Kategori	E	Kategori	C	Kategori
1	1,08	Rendah	0,98	Komunitas stabil	0,34	Rendah
2	1,56	Rendah	0,97	Komunitas stabil	0,21	Rendah


3	1,41	Rendah	0,87	Komunitas stabil	0,27	Rendah
---	------	--------	------	------------------	------	--------

Keterangan:

H' = Indeks Keanekaragaman

E = Indeks Keseragaman


D = Indeks Dominansi



Gambar 4.1 Diagram perbandingan nilai indeks keanekaragaman pada setiap stasiun

Dari diagram perbandingan nilai keanekaragaman diatas dapat diketahui bahwa keanekaragaman makrozoobentos pada stasiun (1) diperoleh nilai indeks keanekaragaman yaitu 1,08, stasiun (2) 1,56 dan stasiun (3) 1,41. Dari ketiga stasiun tersebut di kategorikan dengan nilai indeks keseragaman yang tergolong rendah. Hal ini dikarenakan nilai indeks keanekaragaman (H') yang diperoleh  $< 2,0$ .

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perairan pulau Lae-lae Makassar mengenai keanekaragaman makrozoobentos epifauna, diagram perbandingan dari nilai indeks keseragaman pada setiap stasiun penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 4.2 Diagram perbandingan nilai indeks keseragaman pada setiap stasiun

Dari diagram perbandingan nilai keseragaman diatas dapat diketahui bahwa keseragaman makrozoobentos pada stasiun (1) diperoleh nilai indeks keseragaman yaitu 0,98, stasiun (2) 0,97 dan stasiun (3) 0,87. Dari ketiga stasiun tersebut di kategorikan dengan nilai indeks keseragaman yang termasuk kategori komunitas stabil. Hal ini dikarenakan nilai indeks keseragaman  $0,75 < E < 1,00$ .

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perairan pulau Lae-lae Makassar mengenai keanekaragaman makrozoobentos epifauna, grafik

perbandingan dari nilai indeks dominansi pada setiap stasiun penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.3 Diagram perbandingan nilai indeks dominansi pada setiap stasiun

Dari diagram perbandingan nilai dominansi diatas dapat diketahui bahwa keanekaragaman makrozoobentos pada stasiun (1) diperoleh nilai indeks dominansi yaitu 0,34, stasiun (2) 0,21 dan stasiun (3) 0,27. Dari ketiga stasiun tersebut di kategorikan dengan nilai indeks dominansi yang tergolong rendah  $0,00 < C < 0,50$ .

Tabel 4.5 Hasil data parameter lingkungan fisika dan kimia pada stasiun I, II, dan III

STASIUN	SUHU ( $^{\circ}\text{C}$ )	SALINITAS $^{\circ}/_{\infty}$	pH	KECERAHAN
Stasiun I	34	19	5,4	154,75
Stasiun II	32	18	6,5	
Stasiun III	30	19	5	



## B. Pembahasan

Keanekaragaman hayati merupakan ukuran kestabilan suatu ekosistem, makin beranekaragam jenis kehidupan dalam suatu habitat atau makin banyak populasi penyusun suatu komunitas, maka semakin stabil suatu ekosistem.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 31 yang berbunyi:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣١

Terjemahnya:

Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkanlah kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!” (Kementrian Agama RI tahun 2012)

Ayat yang di atas menegaskan bahwa pemberian nama bagi makhluk hidup yang ada di alam raya ini adalah merupakan ungkapan kembali dari ilmu yang telah diberikan Allah SWT terhadap nenek moyang kita yaitu nabi Adam as. Ayat diatas juga menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda termasuk hewan dan tumbuhan (Shihab, 2002).

Dalam biologi tingkat pengelompokan disebut juga taksonomi. Tingkatan ini disusun oleh kelompok (takson) yang paling umum sampai yang paling khusus, dengan urutan sebagai berikut: *Kingdom, Phylum, Divisio, Class, Ordo Family, Genus, Species*.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat dari indeks keanekaragaman ( $H'$ ) makrozoobentos pada stasiun (1) yaitu 1,08. Pada stasiun (2) 1,56 dan stasiun (3) 1,41. Dari ketiga stasiun tersebut di kategorikan dengan nilai indeks keanekaragaman yang tergolong rendah. Hal ini dikarenakan nilai indeks keanekaragaman ( $H'$ ) yang diperoleh  $< 2,0$ . Keanekaragaman rendah apabila  $0 < H' < 2,0$ , keanekaragaman sedang bila  $2,0 < H' < 3,0$ , keanekaragaman tinggi bila  $H' > 3,0$ . Rendahnya nilai indeks keanekaragaman menunjukkan kekayaan jenis yang rendah dan cenderung hanya satu atau beberapa spesies yang mempunyai jumlah individu yg melimpah. Sebaliknya suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman jenis tinggi apabila komunitas tersebut disusun oleh banyaknya spesies dengan kelimpahan spesies yang sama atau hampir sama. Tingkat keanekaragaman makrozoobentos epifauna rendah di akibatkan karena kondisi perairan pulau lae-lae Makassar di jadikan sebagai tempat wisata sehingga kelangsungan hidup makrozoobentos terganggu. Ditambah lagi dengan limbah rumah tangga masyarakat seperti limbah organik maupun non organik bertebaran di sekitar pulau Lae-lae Makassar yang mengakibatkan pencemaran.

Berdasarkan hasil dari indeks keseragaman ( $E$ ) makrozoobentos epifauna pada stasiun (1) yaitu 0,98, stasiun (2) 0,97 dan stasiun (3) 0,87. Dari ketiga stasiun tersebut di kategorikan dengan nilai indeks keseragaman yang termasuk kategori komunitas stabil. Hal ini dikarenakan nilai indeks keseragaman  $0,75 < E < 1,00$ .

Menurut Odum (1993) bila nilai mendekati 1, maka keseragaman stabil dan menggambarkan tidak ada jenis yang mendominasi sehingga pembagian jumlah individu pada masing-masing jenis sangat seragam dan merata.

Berdasarkan hasil dari indeks dominansi (C) makrozoobentos epifauna makrozoobentos pada stasiun (1) diperoleh nilai indeks dominansi yaitu 0,34, stasiun (2) 0,21 dan stasiun (3) 0,27. Dari ketiga stasiun tersebut di kategorikan dengan nilai indeks dominansi yang tergolong rendah  $0,00 < C < 0,50$ . Menurut Sudarja (1987) bila indeks dominansi yang diperoleh mendekati satu, maka populasi tersebut didominasi oleh spesies tertentu. Jika nilai indeks yang diperoleh mendekati nol maka tidak ada spesies yang dominan. Berdasarkan hal tersebut maka populasi makrozoobentos pada perairan pulau Lae-lae Makassar tidak ada yang mendominasi, hal ini disebabkan karena jumlah yang diperoleh sedikit akibat semakin menurunnya kualitas lingkungan makrozoobentos pada perairan pulau Lae-lae Makassar yang tidak sesuai lagi bagi spesies.

Berdasarkan hasil penelitian pada 3 stasiun dapat di ketahui bahwa tingkat keanekaragaman makrozoobentos epifauna rendah di akibatkan karena kondisi perairan pulau lae-lae Makassar di jadikan sebagai tempat wisata sehingga kelangsungan hidup makrozoobentos terganggu di tambah lagi dengan limbah rumah tangga masyarakat seperti limbah organik maupun non organik bertebaran di sekitar pulau Lae-lae Makassar yang mengakibatkan pencemaran.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (Kementrian Agama RI tahun 2012)

Yakni telah tampak kerusakan di darat dan lautan, seperti rusaknya penghidupan mereka, turunnya musibah, dan turunnya penyakit yang menimpa diri mereka, dan lain-lain disebabkan perbuatan buruk (maksiat) yang mereka lakukan. Telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan dan ketertenggelaman yang disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang di perbuat manusia. Allah menghendaki untuk menghukum manusia didunia dengan perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka bertobat dari kemaksiatan (Shihab, 2002).

Kerusakan yang ada di laut maksudnya kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tidak memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitar sehingga menyebabkan organisme yang ada pada lingkungan tersebut terganggu.

## 2. Pengamatan Parameter lingkungan

Pengamatan parameter lingkungan meliputi pengamatan suhu, pH, salinitas dan kecerahan. Berdasarkan hasil penelitian suhu yang di peroleh pada stasiun (1) yaitu 34° C, stasiun (2) 32° C dan stasiun (3) 30° C. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap ekosistem makrozoobentos.

Suhu juga menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan dan distribusi makrozoobentos. Menurut Hawkes (1978), suhu untuk perkembangan makrozoobentos yaitu kisaran antara 28°C 31°C dan suhu yang kritis bagi makrozoobentos berkisar 35°C-40°C, karena dapat menyebabkan kematian.

Berdasarkan hasil penelitian salinitas yang di peroleh pada stasiun (1) yaitu 19, stasiun (2) 18 dan stasiun (3) 19. Penurunan salinitas akan menurunkan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan makrozoobentos. Perubahan salinitas sangat berpengaruh terhadap perkembangan beberapa jenis makrozoobentos sejak larva sampai dewasa (Effendi, 2003). Adapun tingkat kecerahan yang di peroleh pada perairan pulau Lae-lae makassar adalah 154,76.

Berdasarkan hasil penelitian pH yang di peroleh pada stasiun (1) yaitu 5,4, stasiun (2) 6,5 dan stasiun (3) 5. Nontji (2005) menyatakan bahwa derajat keasaman (pH) merupakan suatu parameter yang dapat menentukan produktivitas suatu perairan. Kisaran pH yang berada antara 7–9 cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan makrozoobentos. Hal ini sesuai dengan data yang di peroleh yaitu kurangnya keanekaragaman makrozoobentos epifauna yang di sebabkan oleh nilai pH air yang terlalu rendah sehingga perkembangan dan pertumbuhan makrozoobentos epifauna terhambat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 3 stasiun di pulau Lae-lae Makassar, total spesies yaitu 8 jenis makrozoobentos epifauna yang terdiri dari 2 kelas yaitu Bivalvia dan Crustacea, jumlah keseluruhan total individu adalah 38. Indeks keanekaragaman ( $H'$ ) pada stasiun 1 (1,08), stasiun 2 (1,56) dan stasiun 3 (1,41). Nilai indeks keanekaragaman di kategorikan rendah. Keseragaman ( $E$ ) makrozoobentos epifauna pada stasiun (1) yaitu 0,98, stasiun (2) 0,97 dan stasiun (3) 0,87. Nilai indeks keseragaman termasuk kategori komunitas stabil. Indeks dominansi ( $C$ ) makrozoobentos epifauna makrozoobentos pada stasiun (1) diperoleh nilai indeks dominansi yaitu 0,34, stasiun (2) 0,21 dan stasiun (3) 0,27. Nilai indeks dominansi yang tergolong rendah.

#### **B. Saran**

Perlu adanya kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, utamanya lingkungan perairan laut demi kelangsungan hidup biota laut yang ada di dalamnya.

Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui keanekaragaman makrozoobentos secara umum pada perairan pulau Lae-lae Makassar dengan metode penelitian yang berbeda untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya sebagai indikator pencemaran kualitas perairan.


## KEPUSTAKAAN

- Ankit Kumar, 2014. *Diversity of macrozoobenthos in the selected reach of River Narmada (Central Zone)*. Barkatullah University. India
- Barus, T. A. 2004. *Pengantar Limnologi Studi Tentang Ekosistem Air Daratan*. USU Press. Medan.
- Bengen, D.G. 2004. *Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), dalam Interaksi daratan dan Lautan : Pengaruhnya terhadap Sumber Daya dan Lingkungan, Prosiding Simposium Interaksi Daratan dan Lautan*. Diedit oleh W.B. Setyawan, dkk. Jakarta : Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumihan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Boer, M., K. A. Aziz, J. Widodo, A. Djamali, A. Ghofar dan R. Kurnia. 2001. *Potensi, Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia*. Direktorat Riset dan Eksplorasi Sumberdaya Hayati, Direktorat Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut, Departemen Kelautan dan Perikanan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Perikanan Laut - Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Daeli dkk, 2013. *Keanekaragaman Makrozoobentos di perairan Pulau Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau*. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Dahuri, R. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Edisi Revisi. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dharma, B. 1988. *Siput dan Kerang Indonesia jilid I dan jilid II (Indonesia Shell)*. PT. Sarana, Jakarta.
- Cummins. 1975. *Indikator Makrozoobenthos*. PT. TKCM. Tangerang.
- Effendi, H. 2003. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Fachrul, M. F. 2007. *Metode Sampling Bioekologi*. Bumi Aksara. Jakarta:



- Handayani, S.T., B. Suharto dan Marsoedi. 2001. *Penentuan Status Kualitas Perairan Sungai Brantas Hulu dengan Biomonitoring Makrozoobentos: Tinjauan dari Pencemaran Bahan Organik*. Biosain, 1 (1): 32.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Identification Bivalve, Merrine Shell identification (<http://www.conchology.be>).
- Irwan, Z. D. 2008. *Prinsip-prinsip Ekologi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Irwanto. 2006. *Keanekaragaman Fauna Pada Habitat Mangrove*. Yogyakarta.
- Nybakken, J. W. 1988. *Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis*. Gramedia. Jakarta.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an Terjemahan*. PT. syamil Cipta Media. Jakarta.
- Kuncoro & Mudrajat, 2004, *Biologi laut*, Erlangga, Jakarta.
- Kristanto, P. 2002. *Ekologi Industri*. Andi, Yogyakarta.
- Lind, L. T., 1979. *Hand Book of Common Method in Lymnology*. Second Edition. The C. V. Mosby Company St. Louis. Toronto. London.
- Mayasari, I. 2011. *Keanekaragaman Makrozoobentos di Ekosistem Mangrove Iboih Sabang Provinsi Aceh. Skripsi*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Nontji, A. 2002. *Laut Nusantara*. Djambatan. Jakarta
- Nybakken, J.W. 1992. *Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis*. Eidman, M., Koesoebiono, D.G. Begen, M. Hutomo, dan S. Sukardjo [Penerjemah]. Terjemahan dari: *Marine Biology: An Ecological Approach*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Odum, E.P. 1993. *Dasar-Dasar Ekologi*. Edisi ketiga . Gajah mada University Press. Jogjakarta. H. 134-162.
- Pennak, R.W. 1978. *Freshwater Invertebrates of United States*. 2nd. Ed. A. Willey Interscience Pbl. John Willey and Sons. New york.


- Wilhm, J. F. 1975. *Biological Indicators of Pollution*. Dalam : B.A Whitton (Ed). *RiverEcology*. Blackwell Scientific. London.
- Rosenberg, D. M. & V. H. Resh. 1993. *Freshwater Biomonitoring and Benthic Macroinvertebrates*. Chapman and Hall. New York. London.
- Romimohtarto, K. 2004. *Meroplankton Laut*. Jakarta: Djambatan.
- Romimohtarto, K. & S. Juwana. 2001. *Biologi Laut. Ilmu Pengetahuan Tentang Biota Laut*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an* Vol.8. Lentera Hati: Jakarta.
- Sitanggang, 2013. *Keanekaragaman Makrozobentos Pada Perairan Danau Toba*. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Suhendang, Endang. 2002, *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Fakultas Kehutanan, Bogor
- Suwignyo. 1989. *Avertebrata Air*. Lembaga Sumberdaya Informasi, IPB. 127 hal.
- Zonneveld N E A Huisman dan J. H. Boon. 1991. *Prinsip-Prinsip Budidaya Ikan*. Terjemahan PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

**Lampiran 1. Gambar Proses pemasangan plot dan pengambilan sampel****Lampiran 2. Gambar letak penentuan titik stasiun**


**STASIUN I (BARAT)**






**STASIUN II (SELATAN)**




**STASIUN III (TIMUR)**







## Lampiran 3. Gambar hasil penelitian

KELAS	SPESIES	GAMBAR	JUMLAH INDIVIDU
CRUSTACEA	<i>Atergatis integerrimus</i>		7
	<i>Callinectes sapidus</i>		5
	<i>Ocypode cordimanus</i>		5



	<i>Scylla tranqueberica</i>		7
--	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---

KELAS	SPESES	GAMBAR	JUMLAH INDIVIDU
BIVALVIA	<i>Atrinata pectinata</i>		4
	<i>Montacuta substriata</i>		1

	<i>Naticarius canrena</i>		7
	<i>Trichotropis borealis</i>		2



**Lampiran 4. Indeks keanekaragaman, keseragaman dan dominansi stasiun**

STASIUN 1

No	Spesies	ni	S	ln S	Pi [ni/N]	ln Pi	Pi ln Pi	(Ni/N) <sup>2</sup>	Indeks Ekologi		
									H'	E	C
1	<i>Atergatis integerrimus</i>	2	3	1,098612	0,25	-1,38629	-0,34657	0,0625	1,0822	0,98506	0,34375
2	<i>Scylla tranqueberica</i>	3			0,375	-0,98083	-0,36781	0,140625			
3	<i>Naticarius canrena</i>	3			0,375	-0,98083	-0,36781	0,140625			
Jumlah keseluruhan		8	3		1	-3,34795	-1,0822	0,34375			

**INDEKS KEANEKARAGAMAN, KESERAGAMAN DAN DOMINANSI STASIUN II**

No	Spesies	ni	S	ln S	Pi [ni/N]	ln Pi	Pi ln Pi	(Ni/N) <sup>2</sup>	Indeks Ekologi		
									H'	E	C
1	<i>Atrinata pectinata</i>	3	5	1,60944	0,17647	-1,7346	-0,3061	0,03114	1,56437	0,972	0,21799
2	<i>Naticarius canrena</i>	4			0,23529	-1,4469	-0,3405	0,05536			
3	<i>Trichotropis borealis</i>	2			0,11765	-2,1401	-0,2518	0,01384			
4	<i>Atergatis integerrimus</i>	5			0,29412	-1,2238	-0,3599	0,08651			
5	<i>Ocypode cordimanus</i>	3			0,17647	-1,7346	-0,30611	0,031142			
Jumlah keseluruhan		17	5	1	-	8,27996	-1,56437	0,217993			

**Indeks keanekaragaman, keseragaman dan dominansi stasiun III**

STASIUN 3

No	Spesies	ni	S	ln S	Pi = [ni/N]	ln Pi	Pi ln Pi	(Ni/N) <sup>2</sup>	Indeks Ekologi		
									H'	E	C
1	<i>Callinectus sapidus</i>	5	5	1,60944	0,38462	-0,9555	-0,3675	0,14793	1,41274	0,87778	0,27811
2	<i>Ocypode cordimanus</i>	2			0,15385	-1,8718	-0,288	0,02367			
3	<i>Scylla tranqueberica</i>	4			0,30769	-1,1787	-0,3627	0,09467			
4	<i>Montacuta substriata</i>	1			0,07692	-2,5649	-0,1973	0,00592			
5	<i>Atrinata pectinata</i>	1			0,07692	-2,5649	-0,1973	0,005917			
Jumlah keseluruhan		13	5		1	-9,13587	-1,41274	0,278107			

**Lampiran 5. Indeks keanekaragaman, keseragaman dan dominansi keseluruhan stasiun**

No	Spesies	ni	S	ln S	Pi = [ni/N]	ln Pi	Pi ln Pi	(Ni/N)2	Indeks Ekologi		
									H'	E	C
1	<i>Atergatis integerrimus</i>	7	8	2,07944	0,18421	-1,6917	-0,3116	0,03393	1,9563	0,94078	0,15097
2	<i>Scylla tranqueberica</i>	7			0,18421	-1,6917	-0,3116	0,03393			
3	<i>Naticarius canrena</i>	7			0,18421	-1,6917	-0,3116	0,03393			
4	<i>Atrinata pectinata</i>	4			0,10526	-2,2513	-0,237	0,01108			
5	<i>Trichotropis borealis</i>	2			0,05263	-2,9444	-0,155	0,00277			
6	<i>Ocypode cordimanus</i>	5			0,13158	-2,0281	-0,2669	0,01731			
7	<i>Callinectus sapidus</i>	5			0,13158	-2,0281	-0,2669	0,01731			
8	<i>Montacuta substriata</i>	1			0,02632	-3,6376	-0,0957	0,00069			
Jumlah keseluruhan		38	8	1	-17,965	-1,9563	0,15097				