

**IDENTIFIKASI KEANEKARAGAMAN MAKROZOOBENTOS
DI PERAIRAN KAWASAN MANGROVE DESA MANYAMPA
KECAMATAN UJUNGLOE KABUPATEN BULUKUMBA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI HERNI HERMAYANI

NIM: 60300117025

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Herni Hermayani
NIM : 60300117025
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 15 Maret 2000
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Perumahan Danau Alam Pendidikan Blok Z3 No.26
Judul : Identifikasi Keanekaragaman Jenis Makrozoobentos di Perairan Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Mei 2023

Andi Herni Hermayani

NIM: 60300117025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Identifikasi Keanekaragaman Jenis Makrozoobentos di Perairan Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba", yang disusun oleh Andi Herni Hermayani, NIM: 60300117025, Mahasiswi Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, bertepatan dengan Tanggal 10 Januari 2022 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Gowa, Mei 2023

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Syarif Hidayat Amrullah, S.Pd., M.Sc	(.....)
Munaqisy I	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Nurkhalis Ghaffar, S.Ag., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
NIP. 197104122000031001

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dan dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **“Identifikasi Keanekaragaman Makrozoobentos di Perairan Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan mendapatkan gelar sarjana pada prodi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Ungkapan terima kasih yang tak terhitung kepada kedua orang tua yaitu bapak Asmar dan Ibu A. Indriyani yang telah membesarkan saya dan selalu memberikan nasehat, dukungan, kasih sayang, moril, materi dan doa yang tidak pernah putus serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai kejenjang perguruan tinggi. Pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari masukan, bantuan, petunjuk serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A..Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. DR. Muhammad Khalifah Mustamin, M.Pd, Selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Masriany, S.Si., M.Si, selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar sekaligus penguji akademik atas

segala arahan, masukan dan sangat sabar dalam meluangkan banyak waktu membimbing penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.

5. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si sebagai penasehat akademik yang memberikan bantuan, bimbingan, masukan, arahan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes sebagai pembimbing I segala kesabaran dalam memberikan arahan, masukan dan telah meluangkan begitu banyak waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd sebagai pembimbing II segala kesabaran dalam memberikan arahan, masukan dan telah meluangkan begitu banyak waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Syarif Hidayat Amrullah, S.Pd., M.Sc sebagai pembimbing III atas segala kesabaran dalam memberikan arahan, masukan dan telah meluangkan begitu banyak waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Dr. Nurkhalis Ghaffar, S.Ag., M.Ag selaku penguji agama atas segala arahan, masukan serta saran yang sangat begitu bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Zulkarnain, S.Si., M.Kes selaku Kepala Laboratorium Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas bantuan dan ilmu serta arahan bagi penulis.
11. Bapak Ibu dosen prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, atas bimbingan, Bantuan dan ilmu pengetahuan yang sangat banyak selama penulis menjalani proses perkuliahan.

12. Ibu Sumiati, S.Pd selaku operator Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu dalam pembuatan dan pengurusan persuratan.
13. Kakak Rahmat Fajrin Alir, S.Si dan Kakak Nurman, S.Si yang telah membantu dan memberikan arahan, ilmu dan motivasi bagi penulis.
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi (HMJ BIOLOGI FST UINAM) kakak-kakak maupun adik-adik dan terkhusus kepada angkatan 2017 (In7erneuron) yang telah menemani proses panjang serta memberikan banyak dukungan doa dan semangat.
15. Teman Tim seperjuangan penulis, Jaya, Asrini, Yaya, Salsa, Rahma, Danu, Zul, Anfam, Afrida, Abdan, Widya dan Wahda yang telah memberikan bantuan tenaga, motivasi dan mendampingi mulai dari sebelum pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Arini, Dila, Sakinah, Ainun, Salma, Putri, Fina dan Tina yang selalu memberikan semangat dan bantuan mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan, terima kasih yang tak terhingga telah banyak memberikan motivasi, arahan, bantuan dan partisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Segala rasa yang tercurahkan, segalaketerbatasan, penulis hanya mampu berdoa kepada Sang Pencipta agar tercurahkan rahmat serta hidayahnya kepada mereka.

Pada akhirnya kepada Allah swt. penulis menyerahkan segalanya dan tak terhitung segala rasa terima kasih semoga pekerjaan ini bernilai ibadah dan

mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat serta ridho-Nya.

Penulis menyadari begitu banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik secara bahasa maupun pemaparan kepada dosen serta teman-teman. Untuk itu penulis sangat mengharapkan segala kritikan dan saran yang mampu memotivasi dan membangun.

Penulis sangat berharap semoga apa disusun bermanfaat baik secara pribadi, teman-teman, serta orang lain yang mengambil sebagai tambahan ilmu dan tambahan referensi yang telah ada.

Gowa, Mei 2023
Penulis

Andi Herni Hermayani
NIM: 60300117025




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v-viii
DAFTAR ISI.....	ix-x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ILUSTRASI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-8
A. Latar Belakang.....	1-4
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5-8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9-30
A. Tinjauan Ayat yang Relevan	10-11
B. Tinjauan Umum tentang Mangrove	11-13
B. Tinjauan Umum tentang Makrozoobentos	14-24
C. Tinjauan Umum tentang Faktor Lingkungan	24-26
D. Tinjauan Umum tentang Kawasan Mangrove Desa Manyampa ...	26-28
E. Kerangka Pikir	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30-38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	30-31
C. Variabel Penelitian.....	31

D. Definisi Operasional Variabel	32
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Instrumen Penelitian	32
G. Prosedur Kerja	33-37
H. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39-53
A. Hasil Penelitian	39-46
B. Pembahasan	46-53
BAB V PENUTUP.....	54-55
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
KEPUSTAKAAN.....	56-59
LAMPIRAN.....	60-72
RIWAYAT HIDUP.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pengaruh pH terhadap organisme perairan.	25
Tabel 3.1. Kategori Indeks Keanekaragaman Jenis (H')	36
Tabel 3.2. Kategori Indeks Keseragaman Jenis (E)	36
Tabel 3.3. Kategori Indeks Dominansi (D)	37
Tabel 3.4. Kriteria Pencemaran Indeks <i>Shannon & Wiener</i>	37
Tabel 4.1 Hasil Identifikasi Makrozoobentos Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.....	39-42
Tabel 4.2 Hasil Jumlah Individu Makrozoobentos pada 3 stasiun di Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba	42-43
Tabel 4.3 Indeks Keanekaragaman Makrozoobentos	45
Tabel 4.4. Indikator lingkungan pada setiap stasiun.	46



DAFTAR GAMBAR ILUSTRASI

Gambar 2.1 Contoh makrozoobentos kelompok Gastropoda	16
Gambar 2.2 Contoh makrozoobentos kelompok Oligpchaeta dan Gastopoda . .	16
Gambar 2.3 <i>Holothuroidea</i>	19
Gambar 2.4 <i>Asterodea</i>	19
Gambar 2.5 <i>Ophiuridea</i>	20
Gambar 2.6 <i>echinoidea</i>	21
Gambar 2.7 <i>Crinoidea</i>	21
Gambar 2.8 Peta Lokasi Penelitian	28
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian	31
Gambar 4.1 Diagram Kelimpahan Makrozoobentos	43
Gambar 4.2 Diagram Perbandingan Jenis Makrozoobentos disetiap Stasiun	44
Gambar 4.3 Diagram Perbandingan Jenis Spesies pada Famili Makrozoobentos yang didapatkan disetiap stasiun	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Foto Sampel Makrozoobentos di Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba..... 60-68
- Lampiran II Foto Pengambilan Sampel Makrozoobentos di Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba..... 69-70
- Lampiran Lampiran III Tabulasi Data Perhitungan Indeks Keanekaragaman (H'), indeks keseragaman (E) dan indeks dominansi (C)..... 71-72



ABSTRAK

Nama : Andi Herni Hermayani
NIM : 60300117025
Judul Skripsi : Identifikasi Keanekaragaman Makrozoobentos di Perairan Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Hutan mangrove adalah kawasan vegetasi pantai hutan tropis yang juga menjadi habitat bagi beberapa makhluk hidup perairan salah satunya makrozoobentos. Berdasarkan habitat dan cara hidupnya makrozoobentos dapat dijadikan sebagai bioindikator suatu perairan disebut Kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas perairan berdasarkan indeks keanekaragaman makrozoobentos yang terdapat di Kawasan mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021 dengan menggunakan metode transek kuadran yang terdiri dari 3 stasiun penelitian. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu ditemukan 228 individu makrozoobentos yang terdiri dari 12 ordo, 17 Famili dan terbagi dalam 3 kelas makrozoobentos yaitu Bivalvia, Gastropoda dan Malakostraka. Berdasarkan indeks keanekaragaman yang didapatkan yaitu $H' < 3$ maka tingkat kualitas pencemaran pada perairan Kawasan tersebut termasuk ke dalam perairan tercemar sedang.

Kata Kunci : Keanekaragaman, Kualitas Perairan Makrozoobentos, Mangrove.



ABSTRACT

Nama : Andi HERNI Hermayani
NIM : 60300117025
Judul Skripsi : Identification Diversity Makrozoobentos In The Region Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

The mangrove forest is the area in vegetation the coast of tropical forest who also as a habitat for some living being waters one of them makrozoobentos. Based on habitats and the way his life makrozoobentos can be used as bioindicator a waters in a region. This study attempt to know the quality of waters based on index diversity makrozoobentos who located in the area of mangrove village Manyampa Kecamatan Ujung Loe Bulukumba. The study was conducted in July 2021 using the method of quadrant transfusion consisting of 3 station research. As for the result of research or that is found 228 individual makrozoobentos consisting of 12 ordo, 17 family and divided into 3 class makrozoobentos namely of bivalves, gastropoda and malacostraca. Based on index diversity or namely $H' < 3$ so quality levels pollution in waters the area are in the waters tainted being.

Keyword : Diversity, Water Quality, Makrozoobenthos, Mangrove.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt. telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini dengan berbagai macam bentuk dan kegunaannya. Tumbuhan, hewan dan sebagainya di ciptakan agar manusia dapat mengambil pelajaran dan mendapatkan manfaatnya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. an-Nahl/ 16: 13 yang berbunyi:

وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

Terjemahnya:

(Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini agar kita senantiasa menyadari tentang nikmat dan berkah yang selalu dilimpahkan dan dikaruniakan kepada kita. Sehingga kita dapat mengembangkan dan berpikir tentang penciptaan segala apa yang ada di muka bumi ini dengan ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kita (Shihab, 2010).

Ekosistem estuaria merupakan ekosistem peralihan antara ekosistem perairan tawar dan perairan laut. Ekosistem estuaria khususnya pada daerah sekitar hutan bakau dengan mempunyai habitat tanah berlumpur dengan jenis-jenis fauna yang ada merupakan kondisi atau ciri khas yang tidak terdapat di darat maupun di laut (Irmawan, 2010).

Ekosistem *mangrove* merupakan kawasan yang khas karena terletak pada daerah muara sungai atau estuaria yang terdapat berbagai jenis hewan yang hidupnya sangat bergantung pada mangrove. Ekosistem mangrove juga memiliki fungsi penting dalam perikanan laut yaitu sebagai tempat pemijahan (*spawning ground*), asuhan (*nursery ground*) atau mencari makan (*feeding ground*) (Afif et al., 2014).

Hutan mangrove adalah kawasan vegetasi pantai hutan tropis, kawasan tersebut didominasi oleh beberapa spesies mangrove yang dapat tumbuh dan berkembang pada kawasan berlumpur (Kabul 2016). Ekosistem mangrove yang terdapat di Indonesia memiliki luas terbesar di dunia yang berkisar antara 4,2 juta ha dan tersebar di kawasan yang dipengaruhi pasang surut air laut (Tarigan, 2010). Hutan mangrove juga merupakan salah satu ekosistem alamiah yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi (Sabar, 2016).

Ekosistem mangrove mempunyai sifat yang khas baik dengan adanya pelumpuran yang dapat menyebabkan kurangnya aerasi tanah, kadar garam yang tinggi serta adanya pasang surut air laut. Pada ekosistem mangrove hanya beberapa jenis mangrove yang dapat tumbuh dan kebanyakan dari jenis bakau karena telah mengalami evolusi dan adaptasi. Substrat mangrove juga dapat dihuni oleh berbagai macam organisme akuatik salah satunya *mollusca* dari kelas gastropoda yang termasuk kedalam jenis makrozoobentos (Nento, 2013).

Makrozoobentos merupakan salah satu organisme yang hidup dan menetap serta mempunyai adaptasi yang khusus terhadap perubahan kondisi lingkungan. Struktur komunitas makrozoobentos (*mollusca*) khususnya gastropoda dan bivalvia

dapat memberikan gambaran penting dan mempunyai peran dalam ekosistem mangrove. Kelompok *mollusca* pada kawasan mangrove dianggap memiliki kemampuan untuk menyimpan karbon (*biosequestrasi*) yang cukup tinggi (Isnainingsih *et al*, 2018). Makrozoobentos mempunyai peranan penting terhadap proses dekomposisi sisa-sisa tanaman mangrove dan juga logam berat pencemaran lingkungan. Selain itu, makrozoobentos juga dapat digunakan sebagai bioindikator penentu kualitas perairan dengan melihat tingkat keanekaragamannya pada suatu kawasan (Setiawan, 2010).

Komunitas makrozoobentos, termasuk gastropoda dapat digunakan sebagai indikator pulihnya fungsi vegetasi di wilayah mangrove dengan mempelajari struktur komunitasnya (Sabar, 2016). Bioindikator sangat penting untuk memperlihatkan adanya keterkaitan faktor biotik dan abiotik suatu lingkungan. Bioindikator atau indikator ekologis merupakan suatu kelompok organisme yang hidup dan rentan terhadap perubahan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas manusia dan kerusakan secara alami (Sumenge, 2008).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ernawati (2013) di Hutan Mangrove alami dan rehabilitasi di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Izzah (2016) tentang keanekaragaman makrozoobentos, Zanuri *et al.*, (2012), Hartati *et al.*, (2012) yang menggunakan makrozoobentos sebagai bioindikator penentu kualitas perairan yang memiliki tujuan untuk mengetahui struktur komunitas makrozoobentos di kawasan tersebut. Penelitian yang telah dilakukan oleh Zanuri *et al.*, (2012) yang melakukan observasi terhadap *mollusca*, annelida dan krustacea pada daerah Sayung, Demak. Penelitian

tersebut dilakukan karena adanya perubahan daerah lahan pertambakan yang berubah fungsi menjadi daerah perairan dangkal. Penelitian Hartati *et al.*, (2012) yang melakukan penelitian tentang makrozoobentos pada kawasan mangrove yang mengalami kerusakan akibat penebangan liar, pertambakan dan perluasan lahan.

Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu desa yang memiliki kawasan hutan mangrove. Adanya kerusakan ekosistem mangrove, sebagai akibat dari adanya aktivitas pertambangan liar yang kerap terjadi di Kecamatan Ujung Loe. Maraknya pertambangan yang sering terjadi mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove karena bekas galian tambang yang dilakukan dibiarkan begitu saja. Oleh sebab itu, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian utama yang terkhusus pada ekosistem mangrove yang memiliki fungsi ekonomis dan ekologis yang berbagai biota perairan dapat hidup dan tumbuh di wilayah tersebut Rosmiati (2020). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kualitas perairan berdasarkan indeks keanekaragaman makrozoobentos di kawasan mangrove Desa Manyampa Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kualitas perairan di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba berdasarkan nilai indeks keanekaragaman makrozoobentos?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi identifikasi jenis makrozoobentos infauna dan epifauna, analisis data indeks ekologi (perhitungan indeks keanekaragaman, kelimpahan dan dominansi makrozoobentos) dan melakukan pengukuran parameter lingkungan (suhu, salinitas dan pH). Data tersebut kemudian akan dijadikan dasar dalam penentuan kualitas perairan dengan fungsi makrozoobentos yang dapat digunakan sebagai bioindikator perairan. Pada tiga stasiun penelitian dengan stasiun I merupakan daerah pertambakan yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS), stasiun II merupakan daerah yang memiliki aktivitas penduduk yang padat dan stasiun III merupakan daerah kawasan wisata mangrove.

D. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sinaga (2009), meneliti tentang Keanekaragaman Makrozoobentos di Perairan Danau Toba Balige Kabupaten Toba Samosir. Metode penelitian yang dilakukan yaitu pengambilan sampel makrozoobentos dilakukan menggunakan Metode *Purposive Random Sampling* dengan menentukan empat stasiun penelitian yang dibagi dalam tiga sub stasiun. Pengambilan sampel makrozoobentos dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap sub stasiun. Hasil penelitiannya menunjukkan komposisi dan jumlah makrozoobentos yang didapatkan seluruhnya terdapat 5 kelas yaitu: Crustaceae, Gastropoda, Hirudinae, Insecta dan Oligochaeta dengan kelimpahan 368 individu/m².

Komposisi jenis makrozoobentos tertinggi adalah Gastropoda kemudian diikuti oleh jenis Insecta, Oligochaeta, Hirudinea dan Crustacea. Adapun jenis-jenis yang ditemukan di perairan Danau Toba Balige berjumlah 21 jenis.

2. Afif (2014), melakukan penelitian tentang Keanekaragaman Makrozoobentos Di Ekosistem Mangrove Wilayah Tapak Tugurejo Kota Semarang. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan metode *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan terwakilinya gambaran keseluruhan ekosistem. Pengambilan sampel dibagi menjadi 9 stasiun yang berbeda dengan teknik pengambilan komposit. Hasilnya menunjukkan bahwa keanekaragaman makrozoobentos di wilayah ekosistem mangrove Tapak Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang tergolong rendah. Kualitas perairan di ekosistem mangrove wilayah Tapak Tugurejo Semarang berdasarkan keanekaragaman makrozoobentos termasuk criteria mutu air kelas II.
3. Nangin, Langoy, and Katili (2015), melakukan penelitian tentang Makrozoobentos di Sungai Suhuyon Sulawesi Utara. Metode yang dilakukan yaitu *purposive random sampling* yaitu metode pencuplikan yang dilakukan secara sengaja. Pengambilan dari contoh makrozoobentos dilakukan dengan menggunakan *surber sampler* di dasar perairan sungai dengan cara mengeruk bagian luasan petak. Hasilnya menunjukkan makrozoobentos yang ditemukan di Sungai Suhuyon terdiri dari 3 filum, 4 kelas, 10 ordo, 21 famili dan 22 genus. Berdasarkan indeks keanekaragaman makrozoobentos (H') kualitas air sungai Suhuyon termasuk kedalam kelompok perairan tercemar sedang. Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 air pada Sungai Suhuyon tidak dapat digunakan sebagai

air minum (Baku mutu Air Kelas 1). Air pada sungai Suhuyon hanya dapat digunakan dalam sistem pengairan, budidaya ikan air tawar dan sarana rekreasi air.

4. Sabar (2016), melakukan penelitian tentang Biodiversiti dan Adaptasi Makrozoobentos di Perairan Mangrove. Manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya informasi mengenai biodiversitas makrozoobentos pada ekosistem hutan mangrove di pesisir pantai Sulawesi Selatan, khususnya di Desa Madello Kabupaten Barru. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan pengambilan sampel makrozoobentos dilakukan menentukan stasiun-stasiun pengamatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pada masing-masing stasiun yang diambil sampel makrozoobentos memberikan hasil yang tinggi untuk setiap spesies yang ditemukan.
5. Ulfa et al. (2018), melakukan penelitian tentang Keterkaitan antara Komunitas Makrozoobentos dengan Kualitas Air dan Substrat di Ekosistem Mangrove TAHURA Ngurah Rai Bali. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan metode deskriptif kuantitatif. Untuk metode penentuan stasiun menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penentuan stasiun dengan pertimbangan tertentu. Terdapat 4 stasiun yang masing-masing diambil 3 titik sebagai pengulangan dengan jarak masing-masing titik sejauh 20 m. Hasilnya menunjukkan parameter perairan yang berpengaruh pada kelimpahan makrozoobentos adalah salinitas, suhu, kekeruhan. Tipe substrat yang berpengaruh terhadap kelimpahan makrozoobentos adalah tipe substrat yang

mengandung liat dan pasir dengan spesies yang paling banyak ditemukan adalah kelas Gastropoda dan Crustacea.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas perairan di Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba berdasarkan indeks keanekaragaman makrozoobentos.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai khasanah pengetahuan baru bagi masyarakat sekitar untuk menjaga kondisi perairan di kawasan mangrove.
2. Sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian ekologi hewan.
3. Sebagai sumber acuan atau rujukan yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
4. Sebagai dasar untuk melakukan konservasi baik pada habitat mangrove maupun pada jenis makrozoobentos.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Ayat yang Relevan dengan Makrozoobentos

Allah Swt. telah menciptakan semua yang ada di muka bumi tak hanya makhluk hidup hewan dan tumbuhan namun segala faktor yang membantu dalam pertumbuhannya. Salah satunya yaitu air, Allah Swt. telah menciptakan lautan dan membaginya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia dan Allah Swt. benar mengetahui segala yang kita butuhkan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Furqan/25: 53 yang berbunyi:

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا
وَجِجْرًا مَّخْجُورًا ﴾

Terjemahannya:

Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan); yang ini tawar serta segar dan yang lain sangat asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus (Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Swt. telah menciptakan kedua air itu yaitu air tawar dan air asin. karena, sesungguhnya di kehidupan ini tiada suatu laut pun yang airnya berasa tawar lagi menyegarkan. Sesungguhnya Allah Swt. telah menciptakan semuanya agar hamba-Nya mengetahui dan senantiasa mengingat atas nikmat yang telah diberikan dan bersyukur kepada-Nya (Shihab, 2010).

Adapun hubungan ayat tersebut dengan penelitian ini yaitu segala sesuatu yang di ciptakan-Nya memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Allah swt. telah menciptakan lautan yang memiliki banyak manfaat serta menjadi salah satu habitat makhluk hidup perairan. Allah swt. telah menciptakan berbagai jenis

mahluk hidup salah satunya mahluk hidup dalam perairan seperti halnya Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nuur/24: 45 yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan dua kaki, dan sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan Ayat tersebut dijelaskan bahwa: Dan, terdapat bukti-bukti kekuasaan dan limpahan anugerah-Nya yang telah diberikan, Allah swt. juga telah menciptakan semua jenis hewan dari air sebagaimana Dia telah menciptakan tumbuh-tumbuhan dari air. Lalu, Allah swt. menjadikan hewan tersebut beraneka ragam, dengan memiliki potensi dan fungsi, maka Sebagian dari mereka yaitu hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya seperti cacing dan hewan malata lainnya dan Sebagian berjalan dengan dua kaki seperti burung dan lainnya. Dan, Sebagian lain berjalan dengan empat kaki seperti sapi, kambing dan lainnya. Dan, berjalan menggunakan lebih dari empat kaki seperti kalajengking dan lain sebagainya. Salah satu contoh hewan yang terdapat di dalam perairan yaitu makrozoobentos yang ditemukan di kawasan mangrove dapat digunakan sebagai bioindikator suatu perairan (Shihab, 2010).

Kawasan pesisir laut Indonesia memiliki peranan penting dalam penyediaan sumber daya alam dan jasa dalam bidang lingkungan. Sumber daya alam sangat berpotensi bagi kelancaran pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu seharusnya sumber daya alam itu dapat dikelola dan dilestarikan untuk menghindari terjadinya krisislingkungan hidup.

Air laut merupakan komponen penting dalam komoditi lingkungan kawasan pesisir pantai. Adanya aktivitas manusia terhadap pertumbuhan dan perkembangan populasi yang tinggi sehingga menimbulkan permasalahan di kawasan tersebut. Kawasan pesisir pantai merupakan tempat bertemunya daratan dan air laut. Kawasan pesisir dan laut di Indonesia mempunyai peranan penting, kawasan pesisir memiliki nilai strategis berupa potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang disebut sumber daya pesisir. Sumber daya kawasan pesisir pantai merupakan lahan industri yang mampu memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Marpaung, 2013).

B. Teori-teori tentang Kawasan Mangrove

Kawasan mangrove merupakan daerah pertemuan antara muara sungai atau estuaria di wilayah pesisir. Indonesia termasuk Negara yang mempunyai luas wilayah mangrove sebesar 4,2 juta ha dan pasang surut air laut dapat memengaruhi kawasan tersebut. Ekosistem mangrove terdiri dari komponen abiotik dan biotik, komponen ini memiliki keterkaitan. Komponen biotik berupa flora dan fauna yang berada di kawasan tersebut (Ulfa et al, 2018).

Ekosistem mangrove merupakan tipe ekosistem yang terdapat di daerah sekitar pantai dan secara teratur tergenangi air laut. Ekosistem mangrove juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut, daerah pantai dengan kondisi tanah berlumpur, berpasir atau perpaduan keduanya (Indriyanto, 2010). Kawasan mangrove juga dihuni oleh beberapa organisme akuatik yang mendiami substrat

atau daerah sekitar ekosistem mangrove untuk dapat mempertahankan kelangsungan kehidupannya.

Tegakan mangrove melalui proses fotosintesis sehingga dapat menyerap CO₂ dari atmosfer dan mengubahnya menjadi karbon *organic* dalam bentuk biomassa. Pelestarian mangrove juga perlu dilakukan dalam mitigasi atau upaya pencegahan terjadinya perubahan iklim global (Kordi, 2012). Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang terletak di tepi pantai dengan dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga akan selalu secara teratur tergenangi air laut. Ekosistem mangrove berada di level antara pasang naik tertinggi sampai level disekitar atau di atas permukaan laut rata-rata pada daerah pantai yang terlindungi (Supriharyono, 2009). Serta menjadi pendukung untuk jasa ekosistem sepanjang garis pantai Kawasan tropis (Donato, 2012).

Hutan mangrove juga merupakan sumber daya alam yang memiliki peran ganda yaitu dari segi ekonomi ataupun dari segi ekologi. Hutan mangrove memiliki fungsi untuk menjaga garis pantai agar dapat terlihat stabil, meningkatkan peluasan lahan, menjaga atau melindungi pantai serta mengolah bahan limbah. Berdasarkan fungsi biologisnya hutan mangrove digunakan sebagai tempat pembenihan ikan, udang, karang dan berbagai jenis biota laut lainnya serta digunakan sebagai tempat bersarangnya burung dan habitat alami berbagai jenis biota laut. Sedangkan untuk fungsi ekonomis hutan mangrove yaitu dapat digunakan untuk sumber energi seperti kayu bakar, arang, bahan bangunan, pertanian, sumber perikanan, tekstil dan produksi ekonomi lainnya (Aulia et al., 2018)

Hutan mangrove juga berfungsi sebagai kawasan untuk penanganan abrasi atau pengikisan di wilayah pesisir serta dampak buruk terhadap bencana alam di kawasan pesisir. Bentos adalah salah satu organisme yang menghuni substrat pada daerah mangrove yang memiliki fungsi untuk mengurai bahan-bahan organik dan mendegradasi logam berat serta tanaman mangrove yang berada di sekitar kawasan mangrove. Makrozoobentos memiliki peran sebagai indikator suatu lingkungan atau menunjukkan tingkat kualitas lingkungan tersebut (Afif et al., 2014).

Mangrove juga memiliki fungsi penting sebagai daya Tarik wisata alam dan atraksi ekowisata dan sebagai sumber tanaman obat (Supriyanto. *et al.*, 2014). Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai habitat atau tempat tinggal bagi satwa yang juga mangrove berperan dalam pengembangan perikanan pantai (Heriyanto, 2012). Bagian-bagian mangrove seperti kayu pohon mangrove dapat digunakan sebagai kayu bakar, arang, bahan bangunan dan juga bahan baku untuk pembuatan kertas serta memiliki manfaat nilai guna langsung sebesar Rp. 11,61 juta/ha/th (Saprudin, 2012).

Kondisi mangrove yang terdapat di Sulawesi Selatan membutuhkan perhatian yang lebih, pada beberapa Kabupaten ditemukan bahwa beberapa kawasan mangrove telah mengalami degradasi yang sangat berat. Luas hutan mangrove kurang lebih berkisar 112.000 Ha, selama 4 dasawarsa (1950-1990) diperkirakan mengalami kerusakan sebesar 65% karena dikonversi untuk peruntukan atau fungsi yang lain seperti pertambakan, industri, pemukiman dan tersisa saat ini \pm 39.000 Ha (Nessa *et al.*, 2002).

C. Teori tentang Makrozoobentos

Bentos terbagi kedalam tiga kelompok besar yaitu makrobentos, mesobentos, dan mikrobentos. Pembagian tersebut dibedakan berdasarkan ukuran masing-masing bentos. Makrozoobentos memiliki ukuran lebih besar dari 1,0 mm, mesobentos memiliki ukuran 0,1 mm sampai 1 mm dan mikrobentos memiliki ukuran yang lebih kecil dari 0,1 mm (Harimurthy, 2002).

Makrozoobentos merupakan hewan yang habitatnya berada pada dasar perairan baik air laut maupun air tawar. Hewan yang termasuk jenis ini adalah hewan yang hanya dapat dilihat menggunakan mata telanjang dimana makrozoobentos merupakan hewan yang melata, menetap, menempel, memendam dan hidup di dasar perairan (Rafi'i, 2018).

Makrozoobentos merupakan hewan yang berhabitat pada substrat dan menempel di permukaan dasar perairan. Berdasarkan cara hidupnya bentos dibedakan menjadi dua kelompok yaitu infauna dan epifauna. Infauna yaitu makrozoobentos yang cara hidupnya berada didalam lumpur (berada didalam substrat), sedangkan epifauna adalah kelompok makrozoobentos yang hidup menempel dipermukaan dasar perairan. Epifauna lebih sensitif dari pada infauna. Kelompok infauna lebih sering mendominasi komunitas substrat yang lunak dan melimpah didaerah subtidal, sedangkan makrozoobentos epifauna dapat ditemukan pada semua jenis substrat akan tetapi berkembang pada substrat yang keras dan melimpah di daerah intertidal (Sinyo, 2013).


Makrozoobentos berperan dalam rantai makanan pada ekosistem akuatik, beberapa jenis makrozoobentos menjadi sumber pakan penting bagi kehidupan hewan air lain seperti ikan. Hal ini disebabkan karakteristik makrozoobentos

memiliki pergerakan terbatas, sensitif terhadap perubahan lingkungan dan siklus hidupnya yang relatif panjang (Rijaluddin, Wijayanti, and Joni 2017).


Berdasarkan cara makannya makrozoobentos dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. *Filter feeder* merupakan hewan bentos yang memperoleh makanannya dengan cara menyaring air. Pada umumnya kelompok bentos yang termasuk dalam jenis ini yaitu moluska dan Bivalvia serta beberapa jenis Echinodermata dan crustacea.
2. *Deposit feeder* merupakan hewan bentos yang mengambil makanan yang berada di dalam substrat. Pada umumnya untuk kelompok bentos dalam jenis ini yaitu jenis polychaeta.

Berdasarkan keberadaannya di dalam perairan makrozoobentos dapat digolongkan menjadi dua yaitu kelompok epifauna yaitu bentos yang hidupnya melekat pada permukaan dasar perairan dan infauna yang merupakan kelompok bentos yang hidup berada di dalam dasar perairan. Adapun jenis makrozoobentos yang dapat ditemukan di perairan air tawar yaitu:



Gambar 2.1 Contoh makrozoobentos kelompok Gastropoda (Pratiwi dkk, 2004).



Gambar 2.2 Contoh makrozoobentos kelompok Oligochaeta dan Gastopoda (Darojah, 2005).

Menurut Prakash (2020), Makrozoobentos mempunyai sifat yang beragam, bereaksi kuat dan dapat terpengaruh dengan aktivitas manusia pada ekosistem perairan. Makrozoobentos dapat digunakan untuk mengetahui kualitas perairan karena memiliki sifat yang peka terhadap perubahan kualitas pada air. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa *et al* (2018), menjelaskan bahwa makrozoobentos mempunyai cara hidup sesil atau menetap dalam substrat dan mobilitas yang di miliki rendah sehingga dapat digunakan sebagai indikator atau untuk mengetahui kualitas suatu wilayah perairan.

Makrozoobentos termasuk salah satu organisme akuatik yang habitatnya di dasar perairan, memiliki pergerakan yang relatif lambat serta dapat hidup lebih lama sehingga mempunyai kemampuan untuk merespon kondisi kualitas perairan sungai. Perubahan kualitas air akan diikuti dengan perubahan pada kondisi fisik, kimia dan biologis. Perubahan ini akan berdampak pada kerusakan habitat dan membuat penurunan keanekaragaman organisme yang hidup pada perairan termasuk makrozoobentos (Zulkifli dan Setiawan, 2017).

Makrozoobentos memanfaatkan serasah (daun-daun) dari mangrove yang banyak mengandung unsur hara dan nutrient untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu makrozoobentos juga berperan penting mempercepat proses dekomposisi serasah yang menghasilkan hara untuk pertumbuhan dan perkembangan mangrove. Makrozoobentos berperan dalam siklus nutrien yang ada di dasar perairan dan juga berperan sebagai salah satu mata rantai penghubung dalam aliran energi dan siklus alga planctonik sampai konsumen tingkat tinggi. Makrozoobentos dapat digunakan sebagai bioindikator untuk mendeteksi baik atau tidaknya kualitas lingkungan suatu perairan. Substrat pada kawasan mangrove dihuni oleh berbagai macam organisme salah satunya yaitu makrozoobentos. Makrozoobentos memiliki peran aktif dalam proses dekomposisi bahan-bahan organik terutama dalam biodegradasi sisa-sisa tanaman mangrove dan logam berat yang mencemari lingkungan (Afif et al., 2014).

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengukur kualitas sebuah perairan yaitu dengan melihat keberadaan makrozoobentos yang berada di kawasan atau tempat tersebut. Makrozoobentos memiliki sifat yang relatif menetap dan pergerakannya yang terbatas sehingga memungkinkan terkena dampak secara langsung dari perubahan kualitas perairan di sebuah kawasan (Rachman, 2017).

Makrozoobentos merupakan sumber nutrisi utama pada ekosistem perairan. Makrozoobentos memiliki peran dasar dalam mentransfer energi melalui rantai makanan dan membantu memecah berbagai material di dasar laut. Makrozoobentos memiliki perilaku yang menetap dan sangat peka terhadap kontaminan. Keanekaragaman makrozoobentos di lingkungan perairan ditentukan oleh beberapa faktor seperti sifat fisik substrat dan unsur hara pada perairan tersebut. Selain itu,

konsentrasi total nitrogen, fosfat, ammonium dan oksigen terlarut memiliki kaitan yang erat dengan struktur komunitas makrozoobentos di perairan (Yunita et al., n.d., 2018).

Adapun klasifikasi makrozoobentos berdasarkan ciri-ciri morfologi sebagai berikut:

1. Phylum Echinodermata

Echinodermata merupakan kelompok hewan yang mempunyai duri pada permukaan tubuhnya dan bergerak secara lambat dengan bantuan kaki tabung ditubuhnya. Habitat Echinodermata dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik itu biotik maupun abiotik yang saling berkaitan satu sama lain, serta peranan dari hewan atau spesies lain yang mempengaruhi habitat tersebut dan banyak ditemukan di dasar laut (Katili, 2011). Phylum Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu :

a. Holothuroidea (Teripang)



Gambar 2.3 *Holothuroidea* (Jalaluddin, 2017).

Teripang merupakan salah satu organisme dari filum Echinodermata kelas *Holothuroidea*. Hewan tersebut dapat dijumpai hampir diseluruh perairan pantai, namun teripang lebih menyukai perairan yang bersih dan tenang dan teripang juga memiliki berbagai jenis teripang lainnya yang lebih spesifik. Teripang mempunyai

tubuh yang berotot, tipis, tebal, dan lembek atau licin. Kulitnya halus atau bintik-bintik. pada bagian ini terdapat spikula-spikula yang terbentuk seperti meja, motom serta bentuk lainnya tergantung jenisnya (Martoyo, 2007).

b. Asteroidea (Bintang Laut)



Gambar 2.4 *Asteroidea* (Jalaluddin, 2017).

Bintang laut merupakan hewan yang memiliki rongga tubuh sebenarnya dan sistem pencernaan yang lengkap. Makanan yang masuk melalui mulutnya akan menuju esofagus dan lambung yang bercabang menuju setiap lengan. Sisa pencernaan akan dikeluarkan melalui anus yang terdapat pada aboral tubuh. Bintang laut juga termasuk hewan yang memiliki daya regenerasi yang tinggi. Mereka juga dapat hidup berkelompok kecil yang terdiri dari beberapa individu. Hewan ini membenamkan diri dalam timbunan pasir sehingga kadang tidak terlihat dari permukaan air atau dapat di katakan bintang laut sebagai makrozoobentos infauna atau bentos yang hidup didasar substrat perairan (Jalaluddin, 2017).

c. Ophiuridea (bintang ular laut)



Gambar 2.5 *Ophiuridea* (Jalaluddin, 2017).

Bintang laut ular termasuk kelompok biota laut yang tergolong filum Echinodermata. Hewan tersebut memiliki kemiripan dengan bintang laut dikarenakan memiliki bentuk tubuh simetri pentaradial. Tubuh berbentuk cakram, yang dilindungi oleh cangkang kapur berbentuk keping dan dilapisi dengan granula dan duri-duri. Didalam tubuhnya terdapat berbagai organ seperti gonad, saluran pencernaan dan system pembuluh air. Tangan-tangannya yang memanjang berbentuk silindris dan sangat fleksibel, yang dimana gerakan tanganya menyerupai ular (Hadi, 2012).

d. echinoidea (bulu babi)



Gambar 2.6 *echinoidea* (Jalaluddin, 2017).

Bulu babi merupakan biota laut yang pada umumnya memiliki bentuk seperti bola, dengan sisi tubuh segi lima, dengan cangkang keras berkapur dan dipenuhi dengan duri serta tidak memiliki lengan, tubuh dari biota ini memiliki tiga bagian, yaitu: oral, aboral, dan bagian antara oral dan aboral. Mulut bulu menghadap ke dasar laut, sedangkan duburnya menghadap ke atas puncak bulatan cangkang. Lempe-mleme (*ambulacral* (penjukuran kaki tabung) dan *interambulacral* (tidak terdapat kaki tabung) berada diantara system apical dan system peristomial (Hadi, 2017).

e. *Crinoidea* (lili laut)



Gambar 2.7 *Crinoidea* (Jalaluddin, 2017).

Lili laut merupakan hewan yang dikenal mempunyai lengan bercabang serta anus dan mulutnya berada di permukaan oral, kaki tabungnya tidak memiliki seluran penghisap, dan alur ambulakranya terbuka, tidak memiliki medreporit, duri ataupun pedicellaria. Hewan ini juga biasanya melekat pada dasar perairan. Jika lingkungan tidak memungkinkan (Nurfajriah, 2014).

2. Phylum Mollusca

Mollusca merupakan kelompok hewan yang memiliki ciri-ciri bertubuh lunak, bentuknya simetri bilateral, tidak beruas dan juga memiliki cangkang yang

terbuat dari kapur juga memiliki kaki yang ventral. Hewan yang Filum Mollusca adalah diantaranya: keong, kerrang, cumi-cumi, gurita dan sotong (Triwiyanto, 2015).

.Kelompok *Mollusca* merupakan hewan hermaprodit, dimana memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu (berumah satu), namun juga terdapat alat kelaminnya terpisah (berumah dua). Oleh sebab itu, jadi fertilisasi internal menjadi cara reproduksi hewan yang termasuk kelompok pilum ini (Triwiyanto, 2015). Phylum Mollusca terbagi menjadi 5 kelas, yaitu :

a. Kelas *Amphineura* (Kiton)

Kelompok hewan yang termasuk kelas *Amphineura* merupakan hewan yang simetris bilateral. Mempunyai mantel yang mengandung insang, kaki memanjang ventral, bersifat hermafrodit dan melakukan pembuahan secara eksternal, hidup dilaut dan pada bagian permukaan dorsal ditutupi oleh spikula berlendir. Hewan ini banyak ditemukan pada bebatuan dengan menempel pada batu. Contoh hewan pada kelas ini adalah *Cryptochiton* sp (Toby, 2017).

b. Kelas *Gastropoda* (Hewan Berkaki Perut)

Kelas *gastropoda* merupakan kelas yang mencakup semua keong dan kerabatnya yang tidak memiliki cangkang atau biasa disebut siput telanjang disebabkan cangkangnya yang tunggal. Hewan ini memiliki kepala dan mata yang mudah dilihat atau jelas yang terdapat diatas tangkai. Keong ada yang hidup dilaut dan ada juga yang hidup di air tawar bahkan ada yang di darat, kelas *gastropoda* ini merupakan kelas yang terbesar pada filum Mollusca (Toby, 2017).

c. Kelas *Scaphopoda* (Siput Gading Gajah)

Kelas *Scaphopoda* ini merupakan kelompok hewan yang memiliki ukuran kecil, dapat hidup dalam pasir maupun lumpur. Bentuk cangkang pada jenis ini seperti gigi ular yang tipis dan panjang, terkadang memiliki cangkang yang meruncing dari ujung depan ke ujung belakang, hewan ini juga biasanya memiliki cangkang yang melengkung dan berongga pada bagian dalamnya dan pada umumnya kelompok hewan ini biasa disebut keong gigi (Toby, 2017).

d. Kelas *Pelecypoda* (Hewan Berkaki Pipih)

Kelompok hewan ini memiliki ciri-ciri berupa cangkang setangkup yang memiliki bentuk simetris dengan variasi bentuk dan ukurannya. Kakinya berbentuk pipih yang terletak antara ventral seperti kapak, juga memiliki insang berlapis-lapis yang terletak didalam rongga mantel (Triwiyanto, 2015).

e. Kelas *Cephalopoda* (Hewan Berkaki Kepala)

Kelas hewan ini memiliki cangkang luar dan bagian kakinya terletak dibagian kepala, dimana berfungsi untuk memegang, sedangkan mantelnya berfungsi untuk berenang, dimana seluruh tubuhnya ditutupi oleh mantel. Insang hewan ini terletak didalam rongga mantelnya disebelah kanan dan kiri tubuh. Kelompok hewan ini memiliki ukuran tubuh yang besar dan contoh hewannya adalah *Octopus* atau gurita (Triwiyanto, 2015).

D. Tinjauan Umum tentang Faktor Lingkungan

Faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan organisme pada suatu habitat khususnya organisme perairan seperti makrozoobentos dapat diketahui dengan cara melakukan pengukuran parameter lingkungan:

1. Suhu

Suhu merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan derajat panas suatu benda. Suhu digambarkan sebagai ukuran energi gerakan molekul. Suhu berperan dalam mengendalikan kondisi suatu ekosistem perairan. Suhu juga memengaruhi segala proses yang terjadi pada perairan baik secara fisika, kimia dan biologi perairan (Effendi, 2003). Organisme akuatik mempunyai kisaran suhu tertentu yang disukai untuk pertumbuhannya. Semakin tinggi kenaikan suhu air, maka semakin sedikit oksigen yang terdapat di dalamnya. Makrozoobentos dapat berbahaya apabila suhu mencapai 35°C (Retnowati, 2003).

2. pH

Organisme perairan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menolerir pH suatu perairan. Batas toleransi organisme terhadap pH pun berbeda-beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu suhu, oksigen terlarut, alkalinitas, anion dan kation serta jenis dan stadia organisme. Sebagian besar organisme perairan dapat hidup pada pH berkisar antara 5,0-9,0. Hal ini dapat menunjukkan adanya kelimpahan dari makrozoobentos, dimana sebagian besar organisme dasar perairan seperti polychaeta, mollusca dan bivalvia yang memiliki tingkat asosiasi terhadap pH yang berbeda-beda (Hawkes, 1978). Pengaruh pH terhadap komunitas organisme perairan ditunjukkan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Pengaruh pH terhadap organisme perairan (Effendi, 2003)

Nilai pH	Pengaruh Umum
6,0 – 6,5	Keanekaragaman bentos sedikit menurun, kelimpahan total, biomassa dan produktifitas tidak mengalami perubahan
5,5 – 6,0	Penurunan nilai keanekaragaman bentos semakin tampak, kelimpahan total, biomassa dan produktifitas masih belum mengalami perubahan yang berarti

Nilai pH	Pengaruh Umum
5,0 – 5,5	Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis bentos semakin besar, terjadi penurunan kelimpahan total dan biomassa bentos
4,5 – 5,0	Penurun keanekaragaman dan komposisi jenis bentos semakin besar, penuruan kelimpahan total dan biomassa bentos

pH tanah di kawasan mangrove adalah salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberadaan makrozoobentos. Jika tingkat keasaman tanah berlebih, maka dapat mengakibatkan tanah sangat peka terhadap proses biologi, misal proses dekomposisi bahan organik oleh makrozoobentos. Proses penguraian bahan organik pada umumnya dapat mengurangi suasana asam, sehingga makrozoobentos akan tetap aktif melakukan aktivitasnya (Arief, 2003).

3. Salinitas

Perubahan salinitas atau kadar garam dapat berpengaruh terhadap keseimbangan di dalam tubuh organisme. Semakin besar tekanan osmosis maka, semakin tinggi salinitas yang ada. Sehingga organisme harus mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan salinitas sampai batas tertentu melalui mekanisme *osmoregulasi* yaitu kemampuan mengatur konsentrasi garam atau air di cairan internal. Organisme yang tinggal di daerah intertidal memiliki kemampuan beradaptasi untuk menoleri perubahan salinitas hingga 15⁰/₀₀. Salinitas yang dianggap layak untuk kehidupan makrozoobentos berkisar 15-45⁰/₀₀, karena perairan yang mempunyai salinitas yang rendah maupun tinggi dapat ditemukan makrozoobentos seperti siput, cacing (Annelida) dan kerang-kerangan (Nybakken, 1992)

4. Oksigen terlarut (DO)


Oksigen terlarut adalah kebutuhan dasar yang dapat menunjang kehidupan organisme di perairan. Oksigen terlarut dalam perairan merupakan hasil fotosintesis organisme laut atau tumbuhan air dan difusi dari udara. Konsentrasi O_2 terlarut yang terdapat di dalam air dapat dipengaruhi oleh koloidal di dalam air maupun jumlah larutan limbah yang terlarut di dalam air. Oksigen terlarut sangat penting bagi organisme atau hewan bentos dan organisme-organisme akuatik lainnya (Odum, 1993). Kadar O_2 terlarut pada perairan alami biasanya kurang dari 10 mg/L (Effendi, 2003).

E. Tinjauan Umum tentang Kawasan Mangrove Desa Manyampa

Kabupaten Bulukumba merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 153 km dari Makassar. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah sekitar 1.154,7 km² atau berkisar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba terletak antara 05°20' 05°40' LS dan 119°58' – 120°28' BT yang terdiri dari 10 kecamatan dengan batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai, sebelah Timur berbatasan Teluk Bone, sebelah Selatan berbatasan Laut Flores dan sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng (Aulia et al., 2018).


Kabupaten Bulukumba terdiri dari beberapa kecamatan salah satunya yaitu Kecamatan Ujung Loe. Kawasan pesisir Kecamatan Ujung Loe seluas 40,49 km². Desa yang memiliki luas wilayah paling besar yaitu Desa Manyampa dengan luas 24,05 km² sedangkan untuk desa yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Desa Manjalling dengan luas yaitu 7,02 km². Kecamatan Ujung Loe memiliki luas hutan

mangrove yaitu 170 Ha yang terletak pada 3 desa yaitu Desa Manyampa dengan luas 79,67 Ha atau sekitar 46,87% dari luas mangrove di Kecamatan Ujung Loe. Desa Manjalling yang memiliki luas 73,37 Ha atau 43,16% dari luas mangrove di Kecamatan Ujung Loe dan yang terakhir yaitu Desa Garanta dengan luas 16,94 Ha atau 9,97% dari luas mangrove di Kecamatan Ujung Loe (Aulia et al., 2018).



Gambar 2.8 Peta Adminitrasi Desa Manyampa (Arsip Kantor Desa Manyampa, 2020).

F. Kerangka Pikir



OUTPUT

Ditentukan kualitas perairan di Kawasan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi jenis makrozoobentos yang di Kawasan Wisata Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli - Agustus 2021 dan pengambilan sampel dilakukan di Kawasan Wisata Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Lokasi pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dari tiga titik pengambilan sampel berdasarkan karakteristik lokasi penelitian. Selanjutnya dilakukan identifikasi keanekaragaman makrozoobentos di Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menggunakan buku identifikasi populasi makrozoobentos.



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian

Keterangan:

Stasiun I : Daerah Pertambahan dan DAS

Stasiun II : Daerah padat aktivitas nelayan

Stasiun III : Kawasan wisata mangrove Luppung

C. Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian yang terdapat pada penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu keanekaragaman jenis makrozoobentos di Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

D. Definisi Operasional Variabel

Keanekaragaman jenis makrozoobentos merupakan hasil dari pengamatan atau identifikasi secara morfologi spesies yang ditemukan di lokasi penelitian dengan melihat indeks keanekaragaman, indeks keseragaman dan indeks dominansi dari *Shannon-Wiener*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada rencana penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang telah dimodifikasi dari Kusnaedi (2016) dengan menentukan titik penelitian. Penentuan stasiunnya berdasarkan pada karakteristik pada kawasan mangrove tersebut. Pengambilan sampel dilakukan pada saat air laut surut menggunakan metode *Transek Kuadran* dengan ukuran 10×10 m. Setiap transek memiliki jarak 10 m dari bibir pantai yang dilakukan pada 3 stasiun penelitian.

F. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alat

Adapun alat yang digunakan yaitu tali rafia, DO meter, kamera, alat tulis, baskom, botol sampel, lup atau kaca pembesar, plot 1×1 m, pH meter, ayakan 0,5 – 1 mm dan penggaris atau meteran dengan ketelitian 1 cm.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah aquades, label, alkohol 70% dan sampel makrozoobentos.

G. Prosedur Kerja

1. Penentuan stasiun penelitian

Penentuan stasiun penelitian dengan menggunakan *Purposive Sampling Method* (penempatan titik sampel dengan teknik survei). Metode ini merupakan penentuan lokasi yang diambil secara sengaja yang dianggap representatif untuk melakukan penelitian. Berdasarkan luas wilayah dan letak kawasan mangrove pada lokasi penelitian ini, maka diambil tiga titik penelitian berdasarkan karakteristik yang dianggap representatif yang dapat menggambarkan kondisi kawasan mangrove di lokasi penelitian tersebut.

2. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel makrozoobentos dilakukan dengan menggunakan metode transek kuadran dengan ukuran 10×10 m dalam satu stasiun penelitian. Pengambilan sampel menggunakan alat Ekman grab dan dibersihkan dengan alkohol 70% kemudian diberi label.

3. Parameter Pengamatan

Pengukuran parameter lingkungan dilakukan pada saat melakukan pengambilan sampel makrozoobentos. Adapun parameter lingkungannya yaitu:

a. Pengukuran Suhu Air

Pengukuran suhu air ditentukan dengan menggunakan alat DO meter dengan memasukkan alat tersebut pada permukaan air di setiap stasiun pengamatan pada saat sebelum melakukan pengambilan sampel.

b. Pengukuran Salinitas Air

Pengukuran salinitas air diukur menggunakan DO meter pada pengukuran salino. Sebelum melakukan pengukuran alat tersebut dibilas terlebih dahulu menggunakan aquades yang memiliki tujuan yaitu untuk membersihkan kaca objek dan sebagai kalibrasi.

c. Pengukuran pH Air

Pengukuran pH air menggunakan pH meter, alat tersebut dicelupkan ke dalam permukaan air.

d. Pengukuran DO Meter

Pengukuran DO atau *Dissolved Oxygen* merupakan pengukuran konsentrasi oksigen yang terdapat di dalam air menggunakan DO meter. Penggunaan alat ini dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam air lokasi sampel.

e. Identifikasi Makrozoobentos

Identifikasi makrozoobentos dilakukan dengan cara menyesuaikan/ menyamakan sampel yang telah ditemukan pada buku kerang-kerangan Indonesia dan buku *Invertebrates Third edition*, Brusca (2016).

f. Analisis Keanekaragaman

Data yang didapatkan pada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Kemudian jenis makrozoobentos yang didapatkan dihitung menggunakan indeks keanekaragaman dan indeks keseragaman serta indeks dominansi *Shannon-Wiener*. Jika indeks dominansi yang didapatkan semakin kecil maka menunjukkan tidak ada spesies yang mendominasi sedangkan jika nilai dominansi besar maka menandakan adanya spesies yang mendominasi (Odum 1993 dalam Sirait 2018). Analisis data yang dilakukan dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Indeks Keanekaragaman

Menurut (Odum, 1971), indeks keanekaragaman dapat dihitung menggunakan rumus yaitu:

$$H' = - \sum P_i \ln P_i ; P_i = n_i/N$$

Keterangan:

H' = Indeks Keanekaragaman

$P_i = n_i/N$

N_i = Jumlah individu jenis ke-1

N = Jumlah total individu

Adapun kategori rendah, sedang dan tinggi indeks keanekaragaman jenis (H') dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Kategori Indeks Keanekaragaman Jenis (H')

Indeks Keanekaragaman	Kategori
$H' \leq 2,0$	Rendah
$2,0 < H' \leq 3,0$	Sedang
$H' \geq 3,0$	Tinggi

2. Indeks Keseragaman

Menurut (Odum, 1993), Indeks keseragaman dihitung dengan menggunakan rumus *Evennes-Indeks*, sebagai berikut:

$$E = \frac{H'}{\ln S}$$

Keterangan :

E = Indeks Keseragaman Jenis

H' = Indeks Keanekaragaman Jenis

S = Jumlah jenis Organisme

Adapun kategori tertekan, tidak stabil dan stabil indeks keseragaman jenis (E) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Kategori Indeks Keseragaman Jenis (E)

Indeks Keseragaman	Kategori
$0,0 < E \leq 0,50$	Tertekan
$0,50 < E \leq 0,75$	Tidak stabil
$0,75 < E \leq 1,00$	Stabil

3. Indeks dominansi

Menurut (Odum, 1971), Indeks Dominansi dihitung dengan rumus *Dominance of Simpson*, sebagai berikut;

$$D = \sum (n_i/N)^2$$

Keterangan :

D = Indeks dominansi

n_i = Jumlah Individu setiap jenis

N = Jumlah total individu

Adapun tidak mendominasi dan mendominasi indeks dominansi (D) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Kategori Indeks Dominansi (D)

Indeks dominansi	Kategori
$0 < C \leq 0,5$	Tidak Mendominasi
$0,50 < C \leq 0,75$	Mendominasi

2. Kriteria Derajat Pencemaran Menggunakan Metode Indeks Keanekaragaman *Shannon & Wiener*

Tabel 3.4. Kriteria Pencemaran Indeks *Shannon & Wiener*

Derajat Pencemaran	Indeks Keanekaragaman
Komunitas Biota tidak stabil (kualitas air tercemar berat)	$H' < 1$
Komunitas Biota sedang (kualitas air tercemar sedang)	$1 < H' < 3$
Komunitas Biota stabil (kualitas air bersih)	$H' > 3$

Sumber: (Basmi, 1999 dalam Prasiwi dkk, 2018)

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah 1) Data Makrozoobentos yang didapatkan meliputi kelas, ordo, family, genus dan spesies. 2) Habitat, meliputi: Tanggal dan waktu pengambilan data, nama lokasi, suhu air laut, salinitas air laut, pH air laut dan DO air laut. Selanjutnya dilakukan analisis data yaitu a) perhitungan Indeks Keanekaragaman b) perhitungan Indeks Keseragaman c) Indeks Dominansi (Izzah, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan di Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil Identifikasi Makrozoobentos di Kawasan Mangrove Manyampa

Hasil identifikasi makrozoobentos di kawasan mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yang dilakukan pada tiga stasiun maka didapatkan 25 spesies dan 3 kelas yang termasuk kedalam makrozoobentos. Adapun hasil yang disajikan dalam bentuk tabel 4.1 dan gambar 4.1

Tabel 4.1 Hasil Identifikasi Makrozoobentos Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

No	Kelas	Ordo	Family	Spesies	Morfologi
1	Malakostraka	Dekapoda	Ocypodidae	<i>Ocypoda ceratophthalmus</i>	Memiliki panjang badan 3,5 cm, berwarna coklat dan lubus berukuran 0,8 mm
2				<i>Uca perplexa</i>	Memiliki panjang badan 2,5 cm, berwarna hitam dengan memiliki capit yang asimetris berwarna putih, dan lubus berukuran 1 cm
3			Secarmidae	<i>Episesarma versicolor</i>	Memiliki panjang badan 12,3 cm, karapaks berbentuk persegi dan sedikit datar, berwarna hitam kecokelatan dengan sedikit berwarna ungu pada bagian capit, dan lubus berukuran 2 mm
4	Bivalvia	Arcoida	Arcidae	<i>Anadara antiquata</i>	Memiliki panjang badan 4 cm, berwarna putih kecokelatan dan ditemukan bulu-bulu kecil pada bagian ujung atau mulut cangkang

No	Kelas	Ordo	Family	Spesies	Morfologi
					dan dengan bentuk keseluruhan hampir bulat
5		Veneroida	Carditidae	<i>Venericardia aculeata</i>	Memiliki panjang badan 5 cm, berwarna putih kecokelatan dengan garis pertumbuhan yang tampak jelas berbentuk vertikal
6			<i>Macridae</i>	<i>Lutraria maxima</i>	Memiliki panjang badan 2 cm, berwarna abu-abu dengan ukuran yang sedikit kecil.
7		Myoida	<i>Myidae</i>	<i>Arenaria oonogai</i>	Memiliki panjang badan 2 cm dan memiliki warna putih dan abu-abu dengan bintik hitam bagian cangkangnya
8		Mytilida	<i>Mytilidae</i>	<i>Mytilus trossulus</i>	Memiliki panjang badan 2,7 cm, memiliki warna cokelat kehitaman dan berbentuk agak lonjong
9		Ostreida		<i>Magallana gigas</i>	Memiliki panjang badan 3,6 cm, berwarna cokelat abu-abu atau putih pucat dengan permukaan cangkang yang menonjol
10			<i>Ostreidae</i>	<i>Crassostrea gigas</i>	Memiliki panjang badan 2,5 cm, berwarna abu-abu kecokelatan, memiliki lipatan radial yang jelas, kasar dan tajam
11				<i>Ostrea edulis</i>	Memiliki panjang badan 2,2 cm, berwarna putih kekuningan dengan permukaan yang kasar dengan bentuk pipih
12		Myoida	<i>Teredinidae</i>	<i>Teredo navalis</i>	Memiliki panjang 11,5 cm, dan berwarna putih kecokelatan, bentuknya menyerupai cacing
13		Venerida	<i>Tillinidae</i>	<i>Phacosoma japonicum</i>	Memiliki panjang badan 2,5 cm, periostrakum berwarna kecokelatan dengan permukaan yang sedikit halus

No	Kelas	Ordo	Family	Spesies	Morfologi	
14		Poecilosclerida	Unionidae	<i>Pygonodon grandis</i>	Memiliki panjang badan 6 cm, berwarna coklat kehitaman dengan garis pertumbuhan yang kecil mengelilingi permukaan cangkang	
15		Unionidae		<i>Pseudanodonta complanata</i>	Memiliki panjang badan 8,7 cm, dengan permukaan cangkang berwarna coklat keemasan dengan memiliki bentuk yang pipih	
16				<i>Unio pictorum</i>	Memiliki panjang badan 6 cm, dengan permukaan cangkang berwarna hitam kecokelatan	
17		Veneroida	Veneridae	<i>Meretrix meretrix</i>	Memiliki panjang badan 2,5 cm, dengan permukaan cangkang berwarna putih kekuningan dengan bentuk sedikit bulat	
18				<i>Katylsia japonica</i>	Memiliki panjang badan 4 cm, dengan permukaan cangkang berwarna kecokelatan dan garis pertumbuhan yang mengelilingi permukaan cangkang dengan bentuk horizontal	
19				<i>Ruditapes philippinarum</i>	Memiliki panjang badan 3,5 cm, berwarna coklat keemasan dengan pola cangkang yang jelas	
20		Gastropoda	Ellobiida	<i>Elobiidae</i>	<i>Cassidula sp.</i>	Memiliki panjang badan 1,4 cm, berwarna hitam dengan bagian bawah cangkang berwarna putih pucat dengan permukaan yang agak kasar
21			Littorinimorpha	<i>Littorinidae</i>	<i>Littoraria angulifera</i>	Memiliki panjang badan 2,5 cm, dengan permukaan berwarna coklat kekuningan memiliki lingkaran yang lebih kecil dan binti-bintik putih dan beberapa garis gelap pada permukaan cangkangnya
22			Cerithioidea	<i>Pachychilidae</i>	<i>Faunus ater</i>	Memiliki panjang badan 4,4 cm, periostrakum yang berwarna gelap atau hitam dengan permukaan yang licin

No	Kelas	Ordo	Family	Spesies	Morfologi
23		Cerithioidea	<i>Planaxidae</i>	<i>Planaxis sulcatus</i>	Memiliki panjang badan 3 cm, memiliki tubuh yang berwarna hitam kecokelatan dengan permukaan yang agak kasar dan ditemukan pada daerah bebatuan atau akar bakau
24			<i>Potamididae</i>	<i>Terebralia sulcata</i>	Memiliki panjang badan 2,1 cm, memiliki permukaan cangkang yang kasar dan berwarna hitam dengan lingkaran yang berwarna kecokelatan serta bentuk yang sedikit lonjong
25				<i>Teleospium telescopium</i>	Memiliki panjang badan 6 cm, cangkangnya tebal dan membentuk kerucut dengan sisi lurus, berwarna hitam kecokelatan dan memiliki garis cangkang yang jelas


Jumlah makrozoobentos didapatkan berdasarkan blok (stasiun) di kawasan mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yaitu terdapat 228 individu sampel dari 17 famili dan 12 ordo makrozoobentos yang diidentifikasi dan jumlah terbanyak diperoleh pada stasiun III yaitu 114 individu.

Tabel 4.2 Hasil Jumlah Individu Makrozoobentos pada 3 stasiun di Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

No	Class	Ordo	Family	Spesies	Stasiun I	Stasiun II	Stasiun III	Jumlah
1	Malakostraka	Dekapoda	Ocyrodidae	<i>Ocyroda ceratophthalmus</i>	3	2	6	11
2				<i>Uca perplexa</i>	4	0	7	11
3			Sesarmidae	<i>Episesarma versicolor</i>	2	1	5	8
4	Bivalvia	Arcoida	Arcidae	<i>Anadara antiquata</i>	3	2	8	13
5		Veneroida	Carditidae	<i>Venerida aculeata</i>	4	1	5	10
6			Mactridae	<i>Lutraria maxima</i>	3	4	0	7
7		Myoida	Myidae	<i>Arenaria oonogai</i>	5	0	0	5
8		Mytilida	Mytilidae	<i>Mytilus trossulus</i>	0	5	12	17
9		Ostreida	Ostreidae	<i>Magallana gigas</i>	2	9	7	18
10				<i>Crassostrea gigas</i>	2	6	4	12
11				<i>Ostrea edulis</i>	1	6	12	19
12		Myoida	Teredinidae	<i>Teredo navalis</i>	0	0	1	1
13		Venerida	Tilinidae	<i>Phacosoma japonicum</i>	3	1	2	6


No	Class	Ordo	Family	Spesies	Stasiun I	Stasiun II	Stasiun III	Jumlah
14	Gastropoda	Poecilosclerida	Unionidae	<i>Pyganodon grandis</i>	0	2	4	6
15		Unionidae		<i>Pseudanodonta complanata</i>	4	1	8	13
16				<i>Unio pictorum</i>	3	0	0	3
17		Veneroida	Veneridae	<i>Meretrix meretrix</i>	4	0	1	5
18				<i>Katelsia japonica</i>	2	5	10	17
19				<i>Ruditapes philipinarum</i>	0	1	3	4
20				Ellobiida	Elobiidae	<i>Cassidula sp.</i>	5	0
21		Littorinimorpha	Littorinidae	<i>Littoraria angulifera</i>	3	2	3	8
22		Cerithioidea	Pachychilidae	<i>Faunus ater</i>	2	0	2	4
23			Pianaxidae	<i>Planaxis sulcatus</i>	1	1	2	4
24	Potamididae		<i>Terebralia sulcata</i>	3	3	4	9	
25			<i>Telecospium telecospium</i>	3	1	7	11	
Total				25	62	53	114	228

Jumlah individu makrozoobentos yang didapatkan pada 3 stasiun yaitu sebanyak 228 individu dari 17 family dan 12 ordo dengan jumlah individu terbanyak ditemukan pada stasiun 3 dengan jumlah yaitu 114 individu.




Gambar 4.1 Diagram Kelimpahan Makrozoobentos

Persentase jumlah yang sditemukan disetiap stasiun di kawasan mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dan disajikan dalam bentuk diagram 4.2



Gambar 4.2 Diagram Perbandingan Jenis Makrozoobentos disetiap Stasiun

Presentase jumlah spesies disetiap family makrozoobentos yang ditemukan di kawasan mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dan disajikan dalam bentuk diagram 4.3



Gambar 4.3 Diagram Perbandingan Jenis Spesies pada Famili Makrozoobentos yang didapatkan disetiap stasiun

2. Indeks Ekologi Makrozoobentos di Kawasan Mangrove Manyampa

Berdasarkan hasil indeks ekologi yang telah dilakukan diperoleh hasil dimana pada indeks keanekaragaman, indeks kemeratan dan indeks dominansi memiliki hasil yang berbeda-beda pada setiap stasiun. Hasil indeks ekologi disajikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Indeks Keanekaragaman Makrozoobentos

Stasiun	H'	E	D
I	2,97	0,97	0,05
II	2,61	0,90	0,08
III	2,88	0,93	0,06
Total	2,82	0,93	0,06

Keterangan :

H' = Indeks Keanekaragaman

E = Indeks Kemerataan

D = Indeks Dominansi

Berdasarkan data indeks ekologi tersebut telah diperoleh hasil dimana nilai yang di dapatkan dari indeks keanekaragaman sedang pada tiga stasiun, hal ini dikarenakan nilai $H' < 3$, sedangkan pada nilai kemerataan diperoleh nilai yang menunjukkan keadaan komunitas yang stabil hal ini dikarenakan $0,75 < E < 1,00$ dan pada indeks dominansi diperoleh hasil yaitu tidak mendominasi hal ini dikarenakan nilai yang didapatkan $0 < D \leq 0,5$.

3. Faktor Lingkungan di Kawasan Mangrove Manyampa

Berdasarkan hasil pengukuran faktor lingkungan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil pengukuran suhu, salinitas air, pH air dan DO meter yang mempunyai hasil berbeda di setiap stasiun. Hasil pengukuran faktor lingkungan disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.4 Indikator Lingkungan pada Setiap Stasiun

STASIUN	PENGULANGAN	Faktor Lingkungan			
		Suhu Air (°C)	pH Air	Salinitas (ppt)	DO (mg/L)
I	i	26.6	9.7	0.47	11,9
	ii	27.5	9.6	0.50	86,8
	iii	17.6	9.1	0.48	14,06
II	i	17.8	7.90	0.50	16,13
	ii	18.5	7.80	0.50	16,46
	iii	18.6	7.90	0.49	15,84
III	i	18	7.67	4.8	19,70
	ii	18.8	8.11	0.50	20,56
	iii	18.8	7.82	0.49	21,05

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tiga stasiun di kawasan mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yaitu terdapat 228 individu dari 12 ordo dan 17 Famili makrozoobentos yang telah diidentifikasi.

1. Hasil Identifikasi Makrozoobentos di Kawasan Mangrove Manyampa

Penelitian ini dilakukan pada tiga stasiun dimana penentuan stasiunnya ditetapkan berdasarkan karakteristik lokasi penelitian. Stasiun I merupakan daerah pertambakan kawasan mangrove dan berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS), Stasiun II merupakan daerah yang memiliki aktivitas penduduk yang padat dan stasiun III merupakan daerah kawasan wisata mangrove. Berdasarkan tabel 4.2

jumlah individu terbanyak diperoleh pada stasiun III dengan jumlah 114 individu, lalu pada stasiun I sebanyak 62 individu, kemudian stasiun II hanya didapatkan sebanyak 53 jumlah individu dengan jumlah total individu yang didapatkan yaitu sebanyak 228 individu dan jumlah 25 spesies dengan 17 famili dan 12 ordo.

Faktor yang memengaruhi kurangnya individu yang didapatkan pada stasiun II yaitu karena pada daerah tersebut merupakan daerah yang padat akibat aktivitas penduduk (nelayan) dan juga terdapat area pertambakan sehingga membuat habitat makrozoobentos di daerah tersebut terganggu untuk pertumbuhannya dan kurang memadai untuk kehidupan makrozoobentos. Menurut Rahayu (2015), terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingginya tingkat kelimpahan makrozoobentos yaitu ketersediaan bahan makanan dan aktivitas manusia. Selain itu, tingkat kelimpahan makrozoobentos juga dapat dipengaruhi oleh tingkat adaptasi, kompetisi dan predatorisme. Sedangkan pada stasiun III memiliki jumlah individu terbanyak dikarenakan kawasan wisata tersebut jarang dilalui oleh nelayan dan aktivitas di daerah perairan sehingga memungkinkan untuk ditemukan makrozoobentos lebih banyak dibandingkan dengan kedua stasiun yang lain. Hamdani, dkk (2016) menjelaskan bahwa kualitas air sangat menentukan keberlangsungan hidup biota termasuk makrozoobentos yang memiliki sifat relatif menetap dengan pergerakan yang terbatas sehingga dapat terkena dampak akibat perubahan kualitas air atau tercemarnya suatu perairan. Pada penelitian ini jenis makrozoobentos yang paling banyak ditemukan pada daerah penelitian ini yaitu *Ostrea edulis* dengan jumlah 19 individu, *Magallanaa gigas* dengan jumlah 18 individu kemudian *Mytilus trossulus* dengan 17 jumlah individu yang didapatkan

dan rata-rata ditemukan paling banyak pada stasiun III dimana spesies tersebut menyukai substrat berlumpur dan ketersediaan makanan yang tersedia di kawasan mangrove serta kurangnya aktivitas di kawasan tersebut yang memungkinkan pertumbuhan dan kelangsungan kehidupan dari spesies ini. Isnaningsih *et al.*, (2018) mengatakan, bahwa banyaknya bivalvia dan gastropoda dikarenakan spesies yang termasuk kelas ini adalah jenis yang sering dijumpai pada ekosistem mangrove dan berperan sebagai dekomposer serasah mangrove.

Famili *Ostreidae* merupakan famili yang paling banyak ditemukan yaitu 49 jumlah individu dalam 3 jenis, famili ini hidup pada perairan dengan mempunyai ciri-ciri morfologi yang tajam pada bagian cangkangnya, berbentuk pipih dan memiliki ukuran tubuh 40 mm. Pada penelitian ini salah satu contoh spesies yang telah ditemukan yaitu *Magallana gigas* yang merupakan salah satu kerang laut golongan tiram yang menempel pada akar mangrove (*Roots*) hal ini disebabkan karena spesies ini membutuhkan inang untuk melekatkan *byssus*. *M. gigas* juga sering ditemukan menempel pada permukaan yang keras atau berbatu di perairan hingga kedalaman 40 m, juga dapat melekat pada daerah berpasir atau berlumpur.

Famili *Veneridae* merupakan bivalvia yang memiliki ligament posterior eksternal, biasanya area anterior berbatas tegas yang dikenal sebagai iunule dan tiga struktur yang sangat mengunci (disebut gigi cardinal) dibagian atas setiap katup; beberapa subfamily juga memiliki gigi lateral anterior, anterior gigi kardinal; satu di katup kiri, dan dua (kadang-kadang tidak jelas) di katup kanan. Bagian dalam bagian bawah bagian katup dapat bergigi halus atau halus. Salah satu contoh spesies yang ditemukan pada penelitian ini yaitu *Katylsia japonica* yang merupakan

anggota kelas bivalvia sebagian besar *gonochoric* beberapa hermaprodit *protandric*. Siklus hidup dari spesies ini yaitu embrio berkembang menjadi larva *trophore* yang berenang bebas digantikan oleh bivalve veliger, menyerupai kerang hidup. Famili *veneridae* memiliki jumlah individu sebanyak 26 dengan 3 jumlah spesies yang ditemukan.

Famili *Ocypodidae* merupakan famili yang memiliki jumlah individu sebanyak 22 dengan 2 jumlah spesies. Ciri-ciri salah satu spesies pada famili ini adalah *Uca perplexa* merupakan spesies yang biasa ditemukan di substrat berpasir pada muara sungai atau pantai terlindung seperti hutan bakau. Famili *Unionidae* mempunyai jumlah individu sebanyak 22 dengan 3 jumlah spesies. Salah satu spesies dari famili ini yaitu *Pyganodon grandis* yang memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai cangkang yang besar, cakram tidak berkerut dan bergelombang melintang, berwarna cokelat kekuningan gelap dan spesies ini tumbuh cepat dan besar serta spesies ini dapat ditemukan pada daerah berlumpur.

Famili *Sesarmidae* memiliki 8 jumlah individu dari 1 spesies, famili *Carditidae* mempunyai 10 jumlah individu dari 1 spesies, famili *Mytilidae* mempunyai 17 jumlah individu dari 1 spesies, famili *Arcidae* memiliki 13 jumlah individu dari 1 spesies, famili *Myidae* memiliki 5 jumlah individu dari 1 spesies, famili *Tilinidae* mempunyai 6 jumlah individu dari 1 spesies, famili *Mactridae* mempunyai 7 jumlah individu dari 1 spesies, famili *Teredinidae* memiliki jumlah individu sebanyak 1 dari 1 spesies, famili *Potanididae* mempunyai 20 jumlah individu dari 2 spesies, famili *Littorinidae* memiliki 8 jumlah individu dari 1 spesies, famili *Pachychilidae* mempunyai 4 jumlah individu dari 1 spesies, famili

Planaxidae memiliki 4 jumlah individu dari 1 spesies dan famili *Elobiidae* mempunyai 6 jumlah individu dari 1 spesies. *Ostrea edulis* dan *Magallana gigas* merupakan spesies yang paling mendominasi dan juga merupakan spesies dari famili *Ostreidae* yang paling banyak ditemukan pada penelitian ini kemudian, dari famili *Veneridae* dengan spesies yang banyak ditemukan yaitu *Katelysia japonica*. Hal ini disebabkan famili *Ostreidae* paling sering ditemukan pada daerah berkayu atau menempel pada permukaan yang agak keras seperti pada akar mangrove yang terdapat pada kawasan penelitian ini. Kelimpahan spesies ini di tiga stasiun dikarenakan makrozoobentos yang termasuk kelas ini menyukai substrat dasar perairan yang berlumpur dan berbatu seperti pada kawasan mangrove (Marmita, 2013).

Famili makrozoobentos yang paling sedikit ditemukan pada penelitian ini yaitu famili *Teredinidae* dengan 1 jumlah individu, kemudian dari famili *Unionidae* yaitu spesies *Unio pictorum* dengan jumlah individu 3 pada stasiun I serta famili *Myidae* yaitu spesies *Arenaria oonogai* dengan jumlah individu 5 hanya pada stasiun I. Menurut Nayli (2018), sedikitnya ditemukan spesies ini dari kelas Bivalvia dapat disebabkan oleh faktor suhu yang tinggi pada saat penelitian dapat menyebabkan kondisi air pun surut sehingga spesies ini sangat sedikit ditemukan.

Penurunan kualitas air juga dapat berpengaruh pada kondisi fisik, kimia dan biologisnya. Perubahan yang terjadi juga dapat berdampak terhadap kerusakan habitat sehingga dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman organisme yang hidup di suatu perairan termasuk makrozoobentos. Makrozoobentos adalah salah satu organisme akuatik yang dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas perairan.

Hal ini disebabkan karena organisme ini menetap di dasar perairan, memiliki pergerakan yang relatif lambat sehingga mempunyai kemampuan dalam merespon terjadinya perubahan kondisi perairan (Nangin, 2015).

2. Indeks Ekologi Makrozoobentos di Kawasan Mangrove Manyampa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan nilai indeks keanekaragaman makrozoobentos yang dihitung menggunakan indeks keanekaragaman *Shannon-wienner*. Perhitungan nilai indeks keanekaragaman memiliki tujuan agar dapat mengetahui tingkat keanekaragaman makrozoobentos di kawasan mangrove untuk mengetahui tingkat kualitas perairan di kawasan mangrove tersebut. Semakin banyak jumlah spesies yang ditemukan maka semakin tinggi tingkat keanekaragamannya. Semakin tinggi kelimpahan spesies yang didapatkan maka semakin baik pula kualitas perairan di Kawasan tersebut. Hasil penelitian pada Kawasan mangrove di Desa Manyampa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba (Tabel 4.3) didapatkan nilai indeks keanekaragaman pada stasiun I sebesar 2.97 dengan nilai indeks kemeratan 0.97 dan dominansi 0.05, kondisi perairan tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat keanekaragaman yang tergolong sedang disebabkan nilai H' yang didapatkan $< 3,0$ dan tidak terdapat spesies yang mendominasi.

Pada stasiun II mempunyai nilai indeks keanekaragaman sebesar 2.61, indeks kemerataan 0.90 dan dominansi 0.08 Pada stasiun III mempunyai nilai indeks keanekaragaman sebesar 2.88, indeks kemeratan 0.93 dan dominansi 0.06. kedua stasiun tersebut memiliki nilai indeks keanekaragaman sedang hal ini disebabkan karena nilai $H' < 3,0$ dengan tidak ada spesies yang mendominasi yaitu

dengan nilai $0 < C < 0,5$. Sedangkan nilai keseragaman ketiga stasiun yaitu stabil hal ini dikarenakan nilai $E < 1,0$. Berdasarkan rata-rata nilai indeks keanekaragaman dari ketiga stasiun tersebut maka kondisi perairan termasuk kedalam derajat pencemaran komunitas biota sedang (kualitas air tercemar sedang) dengan nilai indeks keanekaragaman yaitu $1 < H' < 3$. Menurut Simamora (2012), ketika tingkat pencemaran suatu perairan maka nilai indeks keanekaragaman semakin tinggi. Setiap stasiun mempunyai indeks keanekaragaman yang tinggi namun mempunyai indeks dominansi yang rendah, hal ini berarti bahwa pada setiap stasiun tidak ada spesies tertentu yang mendominasi sehingga masih dapat terkontrol dikarenakan nilai indeks kemerataan yang didapatkan masih stabil.

3. Faktor Lingkungan di Kawasan Mangrove Manyampa

Ada beberapa faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan dan kehidupan makrozoobentos (Tabel 4.4) seperti pengukuran DO (*Dissolved Oxygen*) yang merupakan pengukuran kadar oksigen pada perairan, dimana kadar oksigen dapat memengaruhi kehidupan organisme dan berperan dalam siklus kehidupan laut. Pada pengukuran DO dari penelitian ini berkisar antara 24,7 mg/L yang menandakan kadar konsentrasi oksigen di Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba mendukung kehidupan komunitas atau organisme hidup. Pengukuran kadar pH dalam air dan hasil yang didapatkan yaitu kisaran 7-8 dimana makrozoobentos menyukai pH netral atau 6 – 7 (Tabel 2.1), sedangkan untuk pengukuran suhu didapatkan hasil 18-26 °C. Menurut Simamora (2012), jika indeks keanekaragaman makrozoobentos tinggi, maka tingkat pencemarannya pun semakin rendah. Makrozoobentos merupakan

organisme yang menyukai tipe habitat yang berbatu, kecepatan arus tinggi, suhu (24°C - 26°C), penetrasi cahaya sampai ke dasar perairan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu didapatkan 12 ordo, 17 famili dan 3 kelas, yaitu Bivalvia, Gastropoda dan Malakostraka dari 25 spesies makrozoobentos yaitu *Episesarma versicolor*, *Ocypoda ceratophthalmus*, *Uca perplexa*, *Pyganodon grandis*, *Venericardia aculeata*, *Mytilus trossulus*, *Anadara antiquata*, *Meretrix meretrix*, *Katylisia japonica*, *Arenaria oonogai*, *Phacosoma japonicum*, *Magallana gigas*, *Lutraria maxima*, *Crassostrea sp.*, *Pseudanodonta complanate*, *Teredo navalis*, *Ruditapes philippinarum*, *Unio pictorum*, *Ostrea sp.*, *Telescopium telescopium*, *Littoraria angulifera*, *Terebralia sulcate*, *Faunus ater*, *Planaxis sulcatus*, dan *Cassidula sp.* dengan total individu sebanyak 228, indeks keanekaragaman (H') yang didapatkan nilai rata-rata yaitu 2,82 dan indeks kemerataan (E) dengan nilai rata-rata 0,93 yang berarti stabil dan nilai dominansi dengan rata-rata 0,06 yang menunjukkan bahwa spesies yang berada di Kawasan tersebut tidak mendominasi kawasan tersebut. Kriteria tingkat pencemaran pada Kawasan mangrove ini berdasarkan nilai indeks keanekaragaman yang didapatkan dengan nilai rata-rata 2,82 maka dapat disimpulkan bahwa komunitas biota sedang (kualitas air pada perairan ini tercemar sedang) dimana H' yang didapatkan yaitu $1 < H' < 3$.

B. Saran

Adapun saran yang dapat saya sampaikan adalah sumber referensi terkait keanekaragaman makrozoobentos khususnya pada kabupaten Bulukumba masih sangat kurang dan juga diharapkan adanya penelitian lanjutan terkait nilai *Biology Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) pada Kawasan perairan ini serta terhadap nutrient yang terdapat pada sedimen/substrat untuk dapat lebih mengetahui kondisi kualitas perairan dengan lebih baik dengan melihat keragaman makrozoobentos serta penelitian tentang hubungan kekerabatan masing-masing spesies makrozoobentos yang ditemukan dengan analisis keragaman genetik.

KEPUSTAKAAN

- Afif, Jamaluddin etc. 2014. "Keanekaragaman Makrozoobentos Sebagai Indikator Kualitas Perairan Di Ekosistem Mangrove Wilayah Tapak Kelurahan Tugurejo Kota Semarang." *Life Science* 3(1) hal: 47–52.
- Arief, A. M. P. Hutan Mangrove Fungsi dan Manfaatnya. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 2003.
- Aulia, Ikrimah. 2018. "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Mengelola dan Memelihara Ekosistem Mangrove di Kabupaten Bulukumba". *Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar*.
- Darojah, Yuyun. 2005. "Keanekaragaman Jenis Makrozoobentos di Ekosistem Perairan Rawapening Kabupaten Semarang". hal: 11-12.
- Dermawan BR.Sitorus. (2008). "Keanekaragaman dan Distribusi Bivalvia Serta Kaitannya dengan Faktor Fisik-Kimia di Perairan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang". *Tesis*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Donato, D.C, dkk. 2012. *Mangrove Salah Satu Hutan Terkaya Karbon di Daerah Tropis*. Brief CIFOR, 12:1 - 12.
- Ernawati SK, dkk. (2013). "Suksesi Makrozoobentos Di Hutan Mangrove Alami Dan Rehabilitasi Di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan". *Jurnal Bionature*. Vol 14 No.1 April. hal. 49-60.
- Hartati, R., Ulum, M., & Widiningsih., 2012. Komposisi Kelimpahan Makrozoobentos Krustasea di Kawasan Vegetasi Mangrove Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang. *Journal of Marine Research*, 1(2):243-251
- Indriyanto. (2010). *Ekologi Hutan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Irmawan, Rizky Nurul dkk. 2010. "Struktur Komunitas Makrozoobentos di Estuaria Kuala Sugihan Provinsi Sumatera Selatan". *Journal Maspari*. hal: 53-58.
- Isnainingsih, N.R. & Patria, M.P., 2018. Peran Komunitas Moluska Dalam Mendukung Fungsi Kawasan Mangrove di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. *Biotropika: Journal of Tropical Biology*, 6(2):35-44.
- Izzah, Nisrina Arifatul dkk. 2016. "Keanekaragaman Makrozoobentos Di Pesisir



- Pantai Desa Panggung Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara". *Bioeksperimen*. Vol 2 No.2. hal: 140-148.
- Jalaluddin. Identifikasi dan klasifikasi phylum Echinodermata di perairan laut desa Sembilan kecamatan simuelue barat Kabupaten simuelue. FKIP Pendidikan Biologi Universitas Serambi Mekkah. 2017.
- Kabul, M.A. Pengembangan Wilayah Teori Dan Aplikasi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kementerian Agama RI al-qur'an Dan Terjemahannya. Surabaya: Duta Ilmu, 2012.
- Kordi, M.G.H.K, 2012. *Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi dan pengelolaan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Marmita, R. 2013. Makrozoobentos Sebagai Indikator Biologis Dalam Menentukan Kualitas Air Sungai Ranoyapo Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. [Skripsi]. Universitas Samratulangi, Manado.
- Martoyo. J. 2007. Budidaya Teripang. Penebar Swadaya. Jakarta. 69 Hal.
- Nangin, Sernando Rizky, Marnix L Langoy, and Deidy Y Katili. 2015. "Makrozoobentos Sebagai Indikator Biologis Dalam." *Mipa Unsrat* 4(2): 165–68.
- Nayli, Zahratun *et al.*, 2018. "Jenis Bivalvia di Kawasan Ekosistem Mangrove Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh". *Prosiding Seminar Nasional Biotik*. hal:115-120.
- Nento, Riskawanti dkk. 2013. "Kelimpiahan, Keanekargaman dan Kemerataan Gastropoda di Ekosistem Mangrove Pulau Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara". *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*. Vol.1 No.1, Juni. hal; 41-47.
- Nybbaken, J. W.. *Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis*. Penerbit PTGramaedia : Jakarta. 1992.
- Prakash, Sadguru. 2020. "Population Dynamics of Macrozoobenthos of Guthia Taal , A Wetland of District Bahraich , Uttar Pradesh (India)." 8(4): 1760–64.
- Prasiwi, Ilma, Jurusan Teknik Lingkungan, and Fakultas Teknik. 2018. "Analisis Hubungan Kualitas Air Terhadap Indeks Keanekaragaman Plankton Dan Bentos Di Waduk Cirata." 2(3).




- Pratiwi, N, Krisanti, Nursiyamah, I. Maryanto, R. Ubaidillah, & W. A. Noerdjito. 2004. *Panduan Pengukuran Kualitas Air Sungai*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rachman, Hamdani. 2017. "(Macrozoobenthos as Bioindicator of River Water Quality in Ciliwung Hulu Sub Watershed)." 21(3): 261–69.
- Rafi'i, Muhammad dkk. 2018. "Jenis, Keanekaragaman Dan Kemelimpahan Makrozoobentos Di Sungai Wangi Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas". *Jurnal Pendidikan Hayati*. Vol. 4 No.2: 94-101.
- Rijaluddin, Alfian Farhan, Fahma Wijayanti, and D A N Joni. 2017. "Struktur Komunitas Makrozoobentos Di Situ Gintung , Situ Bungur Dan Situ Kuru , Ciputat Timur Community Structure of Macrozoobenthos at Situ Gintung , Situ Bungur and Situ Kuru , Ciputat Timur." 18(2): 139–47.
- Rosmiati, dkk. 2020. "Pola Pemanfaatan dan Pemeliharaan Mangrove Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan". *UNM Environmental Journals*. Vol.3 No.2 April. hal:47-54.
- Sabar, Mesrawaty. 2016. "Biodiversitas Dan Adaptasi Makrozoobentos Di Perairan Mangrove." *BIOeduKASI* 4(2): 529–39.
- Sinaga, Tiorinse. 2009. "Keanekaragaman Makrozoobentos Sebagai Indikator Kualitas Perairan Danau Toba Balige Kabupaten Toba Samosir." : 93.
- Supriharyono. 2009. *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Supriyanto, dkk. 2014. "Inventarisasi Jenis Tumbuhan Obat di Hutan Mangrove Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur". *Jurnal Sylva Lestari*. Vol 2 No.1 hal: 67-75.
- Sirait, Marienny dkk. 2018. "Komparasi Indeks Keanekaragaman dan Indeks Dominansi Fitoplankton Di Sungai Ciliwung Jakarta". *Jurnal Kelautan*. Vol. 11 (1): 75-79.
- Toby, Elisabeth. Identifikasi Keanekaragaman Jenis Gastropoda di Pantai Baobolak Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur. Yogyakarta: Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya. 2017.




- Triwiyanto, Komang, dkk. Keanekaragaman Molluska di Pantai Serangan Desa Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Bali. Vol.19. No. 2. 2017.
- Ulfa, Maria et al. 2018. "Keterkaitan Komunitas Makrozoobentos Dengan Kualitas Air Dan Substrat Di Ekosistem Mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali." 4: 179–90.
- Yunita, Fitry, Fredy Leiwakabessy, and Dominggus Rumahlatu. "Macrozoobenthos Community Structure in the Coastal Waters of Marsegu Island , Maluku , Indonesia." : 1–11.
- Zainuri, M., Yuniar, S.A. & Endrawati, H. 2012. Struktur Komunitas Makrozoobentos di Perairan Morosari, Kecamatan Sayung, Demak. *Journal of Marine Research*, 1(2):235-242.




LAMPIRAN




Lampiran I Foto Sampel Makrozoobentos di Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba




No	NAMA SPESIES	GAMBAR
1.	<i>Ocypoda ceratophthalmus</i>	
2.	<i>Uca perplexa</i>	




3.	<i>Episesarma versicolor</i>	
4.	<i>Anadara antiquata</i>	
5.	<i>Venerida aculeata</i>	




6.	<i>Lutraria maxima</i>	
7.	<i>Arenaria oonogai</i>	
8.	<i>Mytilus trossulus</i>	



9.	<i>Magallana gigas</i>	
10.	<i>Crassostrea gigas</i>	
11.	<i>Ostrea edulis.</i>	

12.	<i>Teredo navalis</i>	
13.	<i>Phacosoma japonicum</i>	
14.	<i>Pyganodon grandis</i>	

15.	<i>Pseudanodonta complanata</i>	
16.	<i>Unio pictorum</i>	
17.	<i>Meretrix meretrix</i>	

18.	<i>Katelsia japonica</i>	
19.	<i>Ruditapes philippinarum</i>	
20.	<i>Cassidula sp.</i>	

21.	<i>Littoraria angulifera</i>	
22.	<i>Faunus ater</i>	
23.	<i>Planaxis sulcatus</i>	

24.	<i>Terebralia sulcata</i>	
25.	<i>Telescopium telescopium</i>	

Lampiran II Foto Pengambilan Sampel Makrozoobentos di Kawasan Mangrove
Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba





Lampiran III Tabulasi Data Perhitungan Indeks Keanekaragaman (H'), indeks keseragaman (E) dan indeks dominansi (C)

Nama Spesies	ni	S	Ln.S	Pi = (ni/N)	Pi*Pi	Ln.Pi	Pi*Ln.Pi	Indeks Ekologi			Ln.N
								H'	E	D	
<i>Episarma vericolor</i>	2	21	3,044522438	0,032258065	0,001040583	-3,4339872	-0,110773781	2,972727036	0,976418173	0,054110302	4,127134385
<i>Orypoda ceratophthalmus</i>	3			0,048387097	0,002341311	-3,0285221	-0,146541392				
<i>Uca perplexa</i>	4			0,064516129	0,004162331	-2,74084002	-0,176828389				
<i>Pygospio grandis</i>	0			0	0	0	0				
<i>Venericardia aculeata</i>	4			0,064516129	0,004162331	-2,74084002	-0,176828389				
<i>Mytilus trossulus</i>	0			0	0	0	0				
<i>Anadara antiquata</i>	3			0,048387097	0,002341311	-3,0285221	-0,146541392				
<i>Meretrix meretrix</i>	4			0,064516129	0,004162331	-2,74084002	-0,176828389				
<i>Katejusa japonica</i>	2			0,032258065	0,001040583	-3,4339872	-0,110773781				
<i>Arenaria oonogai</i>	5			0,080645161	0,006503642	-2,51769647	-0,203040038				
<i>Phacosoma japonicum</i>	3			0,048387097	0,002341311	-3,0285221	-0,146541392				
<i>Magallana gigas</i>	2			0,032258065	0,001040583	-3,4339872	-0,110773781				
<i>Littoraria maxima</i>	3			0,048387097	0,002341311	-3,0285221	-0,146541392				
<i>Crassostrea sp.</i>	2			0,032258065	0,001040583	-3,4339872	-0,110773781				
<i>Pseudanodonta complanata</i>	4			0,064516129	0,004162331	-2,74084002	-0,176828389				
<i>Teredo navalis</i>	0			0	0	0	0				
<i>Ruditapes philippinarum</i>	0			0	0	0	0				
<i>Unio pictorum</i>	3			0,048387097	0,002341311	-3,0285221	-0,146541392				
<i>Ostrea sp.</i>	1			0,016129032	0,000260146	-4,12713439	-0,066566684				
<i>Telescopium telescopium</i>	3			0,048387097	0,002341311	-3,0285221	-0,146541392				
<i>Littoraria angulifera</i>	3			0,048387097	0,002341311	-3,0285221	-0,146541392				
<i>Terebralia sulcata</i>	3	0,048387097	0,002341311	-3,0285221	-0,146541392						
<i>Faunus ater</i>	2	0,032258065	0,001040583	-3,4339872	-0,110773781						
<i>Planaxis sulcatus</i>	1	0,016129032	0,000260146	-4,12713439	-0,066566684						
<i>Cassidula sp.</i>	5	0,080645161	0,006503642	-2,51769647	-0,203040038						
Jumlah	62	21		1	0,054110302	-65,6511346	-2,972727036				

Nama Spesies	ni	S	Ln.S	Pi = (ni/N)	Pi*Pi	Ln.Pi	Pi*Ln.Pi	Indeks Ekologi			Ln.N
								H'	E	D	
<i>Episarma vericolor</i>	1	18	2,890371758	0,018867925	0,000355999	-3,970291914	-0,074911168	2,616391806	0,90520944	0,089355643	3,970291914
<i>Orypoda ceratophthalmus</i>	2			0,037735849	0,001423994	-3,277144733	-0,123665839				
<i>Uca perplexa</i>	0			0	0	0	0				
<i>Pygospio grandis</i>	2			0,037735849	0,001423994	-3,277144733	-0,123665839				
<i>Venericardia aculeata</i>	1			0,018867925	0,000355999	-3,970291914	-0,074911168				
<i>Mytilus trossulus</i>	5			0,094339623	0,008899964	-2,360854001	-0,222722076				
<i>Anadara antiquata</i>	2			0,037735849	0,001423994	-3,277144733	-0,123665839				
<i>Meretrix meretrix</i>	0			0	0	0	0				
<i>Katejusa japonica</i>	5			0,094339623	0,008899964	-2,360854001	-0,222722076				
<i>Arenaria oonogai</i>	0			0	0	0	0				
<i>Phacosoma japonicum</i>	1			0,018867925	0,000355999	-3,970291914	-0,074911168				
<i>Magallana gigas</i>	9			0,169811321	0,028835885	-1,773067336	-0,301086906				
<i>Littoraria maxima</i>	4			0,075471698	0,005695977	-2,583997552	-0,195018683				
<i>Crassostrea sp.</i>	6			0,113207547	0,012815949	-2,178532444	-0,246626314				
<i>Pseudanodonta complanata</i>	1			0,018867925	0,000355999	-3,970291914	-0,074911168				
<i>Teredo navalis</i>	0			0	0	0	0				
<i>Ruditapes philippinarum</i>	1			0,018867925	0,000355999	-3,970291914	-0,074911168				
<i>Unio pictorum</i>	0			0	0	0	0				
<i>Ostrea sp.</i>	6			0,113207547	0,012815949	-2,178532444	-0,246626314				
<i>Telescopium telescopium</i>	1			0,018867925	0,000355999	-3,970291914	-0,074911168				
<i>Littoraria angulifera</i>	2			0,037735849	0,001423994	-3,277144733	-0,123665839				
<i>Terebralia sulcata</i>	3	0,056603774	0,003203987	-2,871679625	-0,162547903						
<i>Faunus ater</i>	0	0	0	0	0						
<i>Planaxis sulcatus</i>	1	0,018867925	0,000355999	-3,970291914	-0,074911168						
<i>Cassidula sp.</i>	0	0	0	0	0						
Jumlah	53	18		1	0,089355643	-57,20813973	-2,616391806				

Nama Spesies	ni	S	Ln.S	Pi = (ni/N)	Pi*Pi	Ln.Pi	Pi*Ln.Pi	Indeks Ekologi			Ln.N
								H'	E	D	
<i>Epizozoma variabilis</i>	5	22	3,091042453	0,043859649	0,001923669	-3,126760536	-0,13713862	2,885059734	0,933361407	0,063865805	4,736198448
<i>Cyrtopoda cerasophthalma</i>	6			0,052631579	0,002770083	-2,944438979	-0,154970473				
<i>Cica perpleta</i>	7			0,061403509	0,003770391	-2,790288299	-0,171333492				
<i>Pyganodes grandis</i>	4			0,035087719	0,001231148	-3,349904087	-0,117540494				
<i>Yanicordia oculata</i>	5			0,043859649	0,001923669	-3,126760536	-0,13713862				
<i>Myiura tessellata</i>	12			0,105263158	0,011080332	-2,251291799	-0,236978084				
<i>Anadara antiquata</i>	8			0,070175439	0,004924592	-2,656756907	-0,186439081				
<i>Mareca merula</i>	1			0,00877193	7,69468E-05	-4,736198448	-0,0415456				
<i>Kakylis japonica</i>	10			0,087719298	0,007694675	-2,433613355	-0,213474856				
<i>Arenaria canoga</i>	0			0	0	0	0				
<i>Phaeosoma japonicum</i>	2			0,01754386	0,000307787	-4,043051268	-0,070930724				
<i>Magallana gigas</i>	7			0,061403509	0,003770391	-2,790288299	-0,171333492				
<i>Littoraria maximo</i>	0			0	0	0	0				
<i>Craspedina sp.</i>	4			0,035087719	0,001231148	-3,349904087	-0,117540494				
<i>Pseudorodonia complanata</i>	8			0,070175439	0,004924592	-2,656756907	-0,186439081				
<i>Teredo navalis</i>	1			0,00877193	7,69468E-05	-4,736198448	-0,0415456				
<i>Ruditapes philippinarum</i>	3			0,026315789	0,000692521	-3,63758616	-0,095725952				
<i>Cista pistorum</i>	0			0	0	0	0				
<i>Cyrtopoda sp.</i>	12			0,105263158	0,011080332	-2,251291799	-0,236978084				
<i>Telescopium telescopium</i>	7			0,061403509	0,003770391	-2,790288299	-0,171333492				
<i>Littoraria angulifera</i>	3			0,026315789	0,000692521	-3,63758616	-0,095725952				
<i>Teredobolia sulcata</i>	4			0,035087719	0,001231148	-3,349904087	-0,117540494				
<i>Fucus ater</i>	2	0,01754386	0,000307787	-4,043051268	-0,070930724						
<i>Planaxis sulcata</i>	2	0,01754386	0,000307787	-4,043051268	-0,070930724						
<i>Cassidula sp.</i>	1	0,00877193	7,69468E-05	-4,736198448	-0,0415456						
Jumlah	114	22		1	0,063865805	-73,48116945	-2,885059734				



RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Andi Herni Hermayani lahir di Bulukumba, 15 Maret 2000 merupakan anak pertama dari pasangan suami istri A. Herman dan A. Indriyani. Mulai menepuh jenjang Pendidikan dasar pada tahun 2005 di MIN 4 Bulukumba Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba. Setelah berhasil menamatkan Pendidikan di bangku sekolah dasar, kemudian melanjutkan pendidikannya ditingkat sekolah menengah pertama di SMPN 40 Bulukumba Kab. Bulukumba pada tahun 2011. Setelah lulus tingkat sekolah menengah pertama, kemudian melanjutkan pendidikannya pada tingkat sekolah menengah atas di SMAN 10 Bulukumba Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba. Setelah berhasil menamatkan Pendidikan di Sekolah menengah atas , kemudian melanjutkan Pendidikan pada tingkat perguruan tinggi negeri melalui jalur UM-PTKIN di Universitas Islam Negeri Alauddin Makaasar dan berhasil masuk pada program studi Biologi Sains strata 1 (S1) Fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2017. Semasa kuliah penulis aktif dalam Lembaga kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi FST UIN Alauddin Makassar. Kemudian penulis berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2022.

Email : hernihermayani025@gmail.com