

**POTENSI CENDAWAN ENDOFIT TANAMAN
KRISAN (*Chrysanthemum morifolium*)
SEBAGAI ANTI PENYAKIT
KARAT PUTIH**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR AHYANI
NIM. 60300117041

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ahyani
NIM : 60300117041
Tempat/Tgl. Lahir : Takalar, 02 Juli 2000
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Bontopajja
Judul : Potensi Cendawan Endofit Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) Sebagai Anti Penyakit Karat Putih

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Takalar, 30 Januari 2024
Penyusun



Nur Ahyani
NIM: 60300117041

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, “Potensi Cendawan Endofit Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) Sebagai Anti Penyakit Karat Putih”, yang disusun oleh Nur Ahyani, NIM: 60300117041, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 M, bertepatan dengan 20 Rajab 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi

Takalar, 30 Januari 2024

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd (.....)	
Sekretaris	: Hajrah, S.Si., M.Sc	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dirhamzah, S.Pd.I., M.Pd.i	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
NIP. 197104122000031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya serta kesehatan dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Potensi Cendawan Endofit Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) Sebagai Anti Penyakit Karat Putih”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana sains. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad saw. yang menjadi suri tauladan kita sepanjang masa.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, motivasi, dan bantuan materiil maupun spiritual dari berbagai pihak. Adanya keterbatasan ruang, maka tidak mungkin bagi penulis menyebutkan satu per satu. Oleh sebab itu, penulis hanya mencantumkan beberapa pihak pada skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan terkhusus penulis persembahkan kepada kedua orang tua, almarhum ayahanda H. Sapihuddin yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang Maha Kuasa sebelum bisa melihat penulis menggunakan toga dan ibunda Hj. Rahmawati, S.Pd yang selalu mendidik, mendukung, menyemangati serta doa dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi beserta Wakil Dekan I, II dan III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas dan bantuan kepada kami selama pendidikan.
3. Ibu Dr. Masriany, S.Si., M.Si. selaku ketua jurusan Biologi sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa pendidikan serta Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si selaku sekretaris jurusan Biologi yang telah memberikan berbagai fasilitas dan bantuan kepada kami selama pendidikan.
4. Ibu Dr. Hafsan S.Si., M.Pd. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan ide, nasehat dan motivasi selama masa belajar hingga penelitian dan penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan tidak pernah bosan untuk membimbing, memberikan motivasi, saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes. selaku pembahas I dan Bapak Dirhamzah, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku pembahas II yang telah banyak memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen dalam jajaran jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini telah memberikan ilmu, mendidik dan membimbing penulis dengan baik selama perkuliahan. Semoga menjadi amal jariyah di sisi Allah swt.
8. Bapak Zulkarnain, S.Si., M.Kes selaku kepala laboratorium dan para Laboran Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membimbing dalam praktikum hingga menyediakan fasilitas selama masa belajar.
9. Kakak Sumiaty, S.Pd. selaku staf Jurusan Biologi yang telah banyak memberikan bantuan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan akademik selama masa pendidikan hingga dalam penyelesaian tugas akhir.
10. Saudara-saudari penulis kakak apt. Amriani Sapra, S. Farm., M.Si., Muh. Amran, S.Pd. apt. Astri Adriana Sapra, S. Farm., dan kakak ipar Vitria Widya Ayu A. Md., Kep yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada penulis.
11. Saudara seperjuangan penulis Suryalita, A. Nuratikah Cahyani, Suharpina, Ummi Kalsum, dan Nur Armiah Aris yang senantiasa selalu memberikan semangat, bantuan, dan saran selama proses penyusunan skripsi serta setia menemani dalam suka maupun duka.
12. Saudara seangkatan "1N7ERNEURON" yang telah kebersamai perjuangan penulis di bangku perkuliahan dan menghadirkan cerita warna-warni dalam bingkai persaudaraan.
13. Teman-teman KKN-DK angkatan 64 di Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang telah memberikan pengalaman bersosialisasi kepada masyarakat.
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan semoga Allah swt. memberikan imbalan yang setimpal, Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, 30 Januari 2024

Nur Ahyani

NIM. 60300117041



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Ayat dan Hadis yang Relevan	9
B. Tinjauan Umum Cendawan Endofit.....	11
C. Tinjauan Umum Tanaman Krisan (<i>Chrysanthemum morifolium</i>)	16
D. Tinjauan Umum Peranan Endofit Untuk Tanaman.....	19
E. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
C. Variabel Penelitian	27
D. Definisi Operasional Variabel.....	27
E. Alat dan Bahan	28

F. Prosedur Kerja.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
KEPUSTAKAAN	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Hasil pengamatan makroskopis dan mikroskopis cendawan endofit..... 33
Gambar 4.2 Hasil uji antagonis *Puccinia horiana* dengan isolat cendawan endofit.. 45
Gambar 4.3 Hasil uji patogen pada daun tembakau (*Nicotiana tabacum*).. 59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama :Nur Ahyani
NIM :60300117041
Judul Skripsi :Potensi Cendawan Endofit Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) Sebagai Anti Karat Putih

Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) merupakan tanaman florikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi serta memiliki potensi untuk dikembangkan. Penyakit karat putih yang disebabkan oleh *Puccinia horiana* ini ialah salah satu hambatan paling berpengaruh pada sistem budidaya tanaman krisan (*C. morifolium*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya antagonis cendawan endofit terhadap *P. horiana* pada seluruh organ tanaman krisan (*C. morifolium*) dan untuk mengetahui daya patogenitas cendawan endofit yang tidak bersifat antagonis pada seluruh organ tanaman krisan (*C. morifolium*). Tanaman krisan (*C. morifolium*) diinokulasikan dengan metode penanaman pada medium PDA dan dilakukan pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis, kemudian dilakukan uji antagonis dengan menggunakan *P. horiana* dan uji patogenitas menggunakan daun tembakau (*Nicotiana tabacum*). Adapun hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan hasil isolasi cendawan endofit pada tanaman krisan (*C. morifolium*) didapatkan 30 isolat dan terdapat 10 isolat yang bersifat antagonis terhadap *P. horiana* dan satu diantaranya tidak menunjukkan patogenitas pada daun tembakau yaitu isolat FC 41 dengan ciri morfologi koloni putih kuning, tekstur *velvety*, topografi *verrugose*. dan mikroskopik memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, bercabang dan memiliki *rhizoid* berdinding halus, sehingga isolat tersebut berpotensi digunakan sebagai biokontrol untuk mencegah penyakit karat putih (*P. horiana*).

Kata kunci : Isolasi, Antagonis, Patogen, *Puccinia horiana*, *Chrysanthemum morifolium*.

ABSTRACT

Nama :Nur Ahyani
NIM :60300117041
Judul Skripsi :Potensi Cendawan Endofit Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) Sebagai Anti Karat Putih

Chrysanthemum morifolium is a floriculture plant with high economic value and has the potential to be developed. White rust disease caused by *Puccinia horiana* is one of the most influential obstacles in the chrysanthemum (*C. morifolium*) cultivation system. This study aims to determine the antagonistic power of endophytic fungi and the pathogenicity of endophytic fungi that are not antagonistic against *P. horiana* on all organs of chrysanthemum (*C. morifolium*) plants. Chrysanthemum (*C. morifolium*) plants were inoculated with the planting method on PDA medium and macroscopic and microscopic observations were made, then antagonistic tests were carried out using *P. horiana* and pathogenicity tests using tobacco leaves (*Nicotiana tabacum*). The results obtained are based on the results of isolation of endophytic fungi in chrysanthemum plants (*C. morifolium*) obtained 30 isolates and there are 10 isolates that are antagonistic to *P. horiana* and one of them does not show pathogenicity on tobacco leaves, namely isolate FC 41 with morphological characteristics of yellow white colonies, velvety texture, verrugose topography. Microscopically, it has brown spores and is round, hyphae are not insulated, branched and have a smooth-walled rhizoid, so that the isolate has the potential to be used as a biocontrol to prevent white rust disease (*P. horiana*).

Keywords : Isolation, Antagonist, Pathogenic, *Puccinia horiana*, *Chrysanthemum morifolium*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) merupakan tanaman hias yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Di Indonesia tanaman krisan telah dikembangkan sejak tahun 1940 yang merupakan tanaman hias potensial (Hayati, 2018). Serangan patogen merupakan salah satu faktor penyebab dalam pembudidayaan tanaman krisan. Penyakit pada tanaman krisan disebut penyakit karat putih yang disebabkan oleh *Puccinia horiana* dan merupakan kendala yang sangat berpengaruh dalam pembudidayaan tanaman krisan dikarenakan infeksiya dapat mempengaruhi penurunan kualitas bunga dan mengakibatkan kerusakan pada jaringan tanaman. Salah satu mekanisme pertumbuhan tanaman terhadap serangan patogen terhadap krisan adalah keberagaman endofit, baik bakteri maupun cendawan endofit. Selain itu keuntungan dari cendawan endofit pada jaringan tanaman termasuk peningkatan perkembangan tanaman dan peningkatan ketahanan tanaman inang terhadap cekaman biotik dan abiotik (Sopialena, 2020).

Cendawan endofit biasanya masuk ke jaringan tanaman melalui akar. Namun, cendawan endofit juga dapat masuk melalui bagian tanaman yang langsung terpapar udara, seperti bunga, batang, dan kotiledon (Desriani, 2014). Untuk mengetahui potensi cendawan endofit sebagai agen biokontrol untuk mengurangi penggunaan pestisida dalam mengendalikan penyakit tanaman, khususnya krisan, maka

pemahaman yang lebih mendalam tentang keanekaragaman cendawan endofit dan kemampuan antagonisnya terhadap cendawan patogen perlu dikaji lebih dalam.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-An'am/6: 99 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ قَنَّوَاتٍ دَانِيَةً وَجَنَّاتٍ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Departemen Agama RI, 2012).

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah swt. adalah yang mendatangkan air hujan dari langit untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman. Buah-buahan segar dihasilkan oleh Allah swt. dari berbagai macam tumbuhan dan biji-bijian. Allah swt. mengeluarkan pelepah-pelepah kering dengan buah yang dapat dipetik dari pucuk pohon kurma. Allah swt. menggunakan air itu untuk menumbuhkan berbagai kebun, termasuk kebun anggur, zaitun, dan delima. Ada beberapa kebun yang bentuknya menyerupai buah, tetapi berbeda dalam hal rasa, aroma, dan kegunaannya. Amati buah yang dihasilkannya sambil menghargainya

sepenuhnya dan dengan penuh semangat mencari pelajaran. Amati proses pematangannya yang melalui beberapa tahap. Sungguh, setiap hal ini memberikan bukti yang kuat bagi mereka yang mencari, menerima, dan berpegang teguh pada kebenaran (Shihab, 2015).

Cendawan endofit merupakan cendawan yang hidup di dalam jaringan tanaman sehat tanpa adanya gejala ataupun kerusakan yang ditimbulkan pada inangnya. Banyak peneliti yang melaporkan bahwa cendawan endofit bersimbiosis secara mutualisme dengan inangnya. Adanya cendawan endofit pada jaringan tanaman juga memiliki keuntungan seperti meningkatkan pertumbuhan tanaman serta dapat meningkatkan ketahanan tanaman inang terhadap cekaman biotik dan abiotik. Banyak cendawan endofit yang menghasilkan metabolit sekunder dan beberapa senyawa tersebut bersifat antijamur dan antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain termasuk patogen tanaman. Satu atau lebih bentuk antibiotik, seperti terpenoid, alkaloid, senyawa aromatik, dan pelipeptida, yang telah terbukti peka terhadap infeksi tanaman, dapat dihasilkan oleh kumpulan strain biokontrol. Sebagai contoh, *Cladosporium cucumerinum* dapat melindungi tanaman dari endofit *Colletotrichum lagenarium* dan infeksi *C. lagenarium* pada tanaman mentimun dapat mengakibatkan ketahanan tanaman terhadap serangan layu *Fusarium oxysporum*. (Gessler & Kuc, 1982).

Salah satu hambatan yang paling signifikan terhadap produksi krisan (*Chrysanthemum morifolium*) adalah penyakit karat putih yang dihasilkan oleh *Puccinia horiana*, yang dapat merusak tanaman dan mengurangi kualitas bunga.

Hingga 100% nilai estetika dan nilai pasar bunga dapat hilang karena infeksi karat putih pada daun di dekatnya (Hanudin, 2016). Sebagian besar petani Indonesia memperlakukan krisan mereka dengan fungisida kimia sintetis untuk mencegah penyakit karat putih. Pestisida sintetis dapat mengakibatkan resistensi patogen dan meninggalkan residu yang berbahaya bagi kesehatan petani krisan. Bahan kimia sintetis dapat membahayakan lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari opsi pengendalian tambahan yang dapat diterima lingkungan, seperti mengaktifkan gen resistensi krisan untuk memerangi penyakit ini (Hanudin, 2016).

Beberapa kendala yang menyebabkan produksi kadang menurun disebabkan oleh patogen sehingga perlu dicarikan cara dalam mengatasi masalah tersebut salah satunya dengan menggunakan senyawa endofitnya sendiri. Perlu diketahui bahwa penyakit karat merupakan penyakit berbahaya yang terdapat pada tanaman krisan, dimana karat menyerang daun sejak pembibitan sampai panen. *Puccinia horiana* merupakan cendawan yang dapat memperlemah tanaman serta menghambat perkembangan bunga (Semangun, 2007). Apabila serangan dari cendawan tersebut *masiv* akan menyebabkan daun menjadi menggulung, mengkerut hingga mongering, dan jika serangan terjadi saat bunga belum mekar maka akan menyebabkan bunga gagal mekar ataupun mekar terlambat dan ukurannya akan terpengaruh sehingga menjadi kecil (Balithi, 2007). Untuk memaksimalkan peran cendawan endofit bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman krisan, keragaman perlu dieksplorasi sehingga dapat dilakukan pengujian potensinya secara *in vitro*, sebagai dasar untuk

dimanfaatkan oleh peneliti untuk mencegah serangan patogen terhadap tanaman krisan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana daya antagonis cendawan endofit terhadap *Puccinia horiana* pada seluruh organ tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*)?
2. Bagaimana daya patogenitas cendawan endofit yang tidak bersifat antagonis pada seluruh organ tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*). Pengambilan sampel tanaman Krisan dilakukan Malino Florist terletak pada Lintang: 50 31' 8" – 50 33' 42" LS dan Bujur: 1190 42' 57" – 1190 45' 00" BT. di Bulu Valles, Malino Kabupaten Gowa. Eksperimen dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

D. Kajian Pustaka

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Sopialena, dkk (2020). Dengan judul Efektivitas Cendawan Endofit Sebagai Pengendali Penyakit BLAST Pada Tanaman Padi (*Oryza sativa*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *Trichoderma* sp., *Rhizopus*

sp., *Gliocladium* sp., dan *Penicillium* sp. diidentifikasi sebagai cendawan endofit yang diisolasi dari tanaman padi (*Oryza sativa*). *Rhizopus* sp. memiliki mekanisme antagonis yang telah dibuktikan secara *in vitro*, sedangkan *Penicillium* sp. memiliki mekanisme antibiosis yang telah dibuktikan secara *in vitro*. Dua proses antagonis, parasitisme dan kompetisi, telah diidentifikasi antara *Trichoderma* sp. dan *Gliocladium* sp. Cendawan endofit yang berbeda memiliki kekuatan antagonis yang berbeda dibandingkan dengan cendawan *P. oryzae*; tingkat penghambatan tertinggi terlihat antara *P. oryzae* dan *Gliocladium* sp. (78,96%).

2. Trizelia & Winarto (2016). Dengan judul Keanekaragaman Jenis Cendawan Entomopatogen Pada Tanaman Kakao (*Theobroma cacao*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa isolat cendawan endofit dari tanaman kakao lebih banyak terdeteksi pada daun (45,61%) dibandingkan pada cabang (19,30%) atau buah kakao (35,09%). Hanya 20 isolat (35,09%) dari 57 isolat yang diperiksa menunjukkan mortalitas larva *Tenebrio molitor* lebih dari 20%. Tiga genus cendawan, yaitu *Beauveria*, *Aspergillus*, dan *Fusarium*, ditemukan sebagai hasil identifikasi jamur endofit yang diisolasi dari berbagai bagian tanaman kakao dan terbukti patogen bagi *T. molitor*.
3. Irawati A.F.C., Sri Hartati & Ratna D.H. Windriyati (2016). Dengan judul Pemanfaatan Cendawan Endofit Dalam Meningkatkan Kualitas Bibit Tanaman Padi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa

cendawan endofit yang berasal dari tanaman padi dan biji diketahui sangat beragam. Variasi dan kuantitas terbanyak diamati pada biji, dimana cendawan hifa steril mendominasi. Meskipun diketahui bahwa cendawan endofit yang diperoleh tidak memiliki aktivitas antibiosis terhadap *R. solani*, namun cendawan endofit tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas tanaman, misalnya menginduksi resistensi terhadap cekaman kekeringan (*Gliocladium* sp., ragi, dan salah satu isolat hifa steril) dan menstimulasi pertumbuhan tanaman.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui daya antagonis cendawan endofit terhadap *Puccinia horiana* pada seluruh organ tanaan krisan (*Chrysanthmeum morifolium*)
2. Untuk mengetahui daya patogenitas cendawan endofit yang tidak bersifat antagonis pada seluruh organ tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*)

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Agar mampu membuktikan secara ilmiah bahwa cendawan tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) memiliki potensi dalam menghambat pertumbuhan penyakit karat putih (*Puccinia horiana*).
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan rujukan terhadap

penelitian yang sudah ada dan untuk penelitian selanjutnya.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan pertanian serta kepada masyarakat dalam pembudidayaan tanaman krisan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat yang Relevan

Allah swt. menciptakan beragam jenis makhluk hidup di bumi, salah satunya pada tanaman, dimana sebagian tanaman dapat dijadikan obat dan juga sebagai tanaman hias yang mempunyai banyak manfaat bagi lingkungan sekitar salah satunya adalah tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) yang merupakan tanaman hias serta berfungsi sebagai pembersih udara di dalam ruangan. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. az-Zumar /39: 21 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ مَخَّرَ
بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ تَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَذِكْرَى لَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal” (Departemen Agama RI, 2012).

Dalam Tafsir al-Misbah mengatakan bahwa tidakkah kalian tahu, wahai para pengikut agama, bahwa Allah swt. mengirimkan air dari langit untuk mengalir dalam bentuk mata air jauh di bawah bumi?. Allah swt. kemudian menyebabkan tumbuhnya

berbagai macam tanaman pertanian, setelah itu berubah dari hijau menjadi kering dan kuning. Allah swt. kemudian menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan. Sesungguhnya Allah swt. telah memperingatkan orang-orang yang berakal ketika terjadi peralihan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya (Shihab, 2015).

Keanekaragaman spesies tumbuhan diikuti dengan berbagai macam manfaat bagi manusia, seperti bumbu masakan, bahan bangunan serta bahan makanan dan ada yang digunakan sebagai obat baik obat tradisional maupun obat modern. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penciptaan tumbuhan di muka bumi ini tidaklah sia-sia. Bahkan jauh sebelum teknologi modern berkembang seperti saat ini Allah swt. telah menggambarkan di dalam al-Qur'an sesungguhnya tumbuhan yang ada di bumi memiliki beragam jenis serta manfaat untuk kehidupan khususnya manusia hanya saja bagaimana manusia tersebut dapat memanfaatkan ataupun mengolah apa yang telah disediakan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. asy-Syu'ara'/26: 7-8 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ
الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

نَصِيرٍ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan

kebanyakan mereka tidak beriman” (Departemen Agama RI, 2012).

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa apakah mereka akan tetap mempertahankan pengingkaran mereka terhadap kebenaran dan penolakan mereka untuk meneliti dan mempelajari beberapa ciptaan Allah swt. di muka bumi ini?. Sebenarnya, manusia pasti akan menemukan petunjuk jika mereka mau memikirkan dan memperhatikannya. Kita adalah orang-orang yang mengambil dari bumi berbagai macam tumbuhan yang bermanfaat. Dan hanya Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang mampu mewujudkan semua ini. Faktanya, keberadaan berbagai spesies tumbuhan di bumi adalah bukti yang tak terbantahkan tentang keberadaan pencipta yang berkuasa. Namun tampaknya kebanyakan orang tidak mau percaya (Shihab, 2015).

B. Tinjauan Umum tentang Cendawan Endofit

Selama dua dekade terakhir, cendawan endofit yang diisolasi dari berbagai sumber tanaman telah membuktikan diri sebagai sumber produk alami yang tak ternilai untuk pertanian, industri, pengembangan biomedis, dll. Dan juga menghasilkan enzim hidrolase ekstraseluler; seperti pektinase, selulase, lipase, amilase, lakase, xilanase, dan protease sebagai salah satu mekanisme untuk melawan organisme patogen dan untuk mendapatkan nutrisi dari inang. Enzim adalah alternatif berkelanjutan untuk penggunaan bahan kimia keras. Enzim bekerja di bawah pH netral dan suhu sedang. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian enzim menggunakan mikroba sangat dinamis dan penuh harapan. Ada banyak laporan

tentang keragaman mikroba dari lingkungan yang ekstrim dan aplikasi bioteknologinya di bidang pertanian, kedokteran dan industri. Cendawan endofit yang menghasilkan enzim ekstraseluler telah dilaporkan dari beragam tanaman serealia, kayu dan obat. Enzim ekstraseluler menargetkan berbagai makromolekul misalnya lignin, protein, karbohidrat, polimer berbahan dasar gula untuk diuraikan menjadi lebih sederhana (Yadav, 2018).

Cendawan endofit merupakan kelompok mikroorganisme yang berhubungan dengan tumbuhan dan mempunyai daya tarik yang besar minat untuk ahli botani, ahli mikrobiologi dan ekologi. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menguntungkan tanaman inang pertumbuhan dan pertahanan dan dapat menghasilkan berbagai potensi metabolit sekunder bernilai komersial, sebuah peningkatan jumlah laporan memperhatikan skrining endofit, identifikasi dan produksi. Namun, sedikit yang diketahui tentang regulasi interaksi tanaman-jamur endofit dan cara kerja jamur endofit melindungi tanaman dari patogen. Ulasan ini merangkum penelitian terbaru tentang jamur endofit sebagai agen biokontrol terhadap patogen tumbuhan dan mengusulkan agar endofit dapat menghambat tumbuhan patogen terutama dengan menginduksi produksi phytoalexins dan pekerjaan ekologis (Gao et al, 2010).

Cendawan endofit merupakan cendawan yang dapat ditemukan dalam sistem jaringan tumbuhan. Cendawan endofit diperoleh dari pengisolasian akar, batang, dan daun tumbuhan. Cendawan endofit ialah sumber yang potensial dalam penemuan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologis sebagaimana sitotoksik dan antibiotik (Handayani, 2019). Peningkatan toleransi

kekeringan merupakan hasil dari cendawan endofit, yang juga mencegah pertumbuhan virus, nematoda, cendawan patogen, dan serangga herbivora yang menyerang akar. Cendawan endofit memiliki mekanisme parasitisme, antibiosis, kompetisi nutrisi, dan induksi resistensi yang dapat mereka gunakan sebagai agen biokontrol. Metabolit fungsional yang dihasilkan oleh cendawan endofit antara lain terpenoid, steroid, xanthone, chinones, fenol, isocoumarins, benzopyranones, tetralones, dan enniatines, yang memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan antijamur (Suryanarayanan et al. 2009).

Cendawan endofit adalah mikroorganisme yang ada dalam jaringan tanaman inang tanpa menunjukkan indikasi penyakit. Namun demikian, bagian tanaman yang terpapar udara langsung, seperti bunga, batang, dan kotiledon, juga dapat berfungsi sebagai titik masuk cendawan endofit. Cendawan endofit menembus jaringan tanaman sebagian besar melalui akar. Pembuluh pembuluh darah, ruang antar sel, akar, batang, daun, dan buah merupakan habitat yang memungkinkan bagi mikroorganisme ini. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti berapa banyak cendawan endofit yang ada pada tanaman, cendawan endofit ini dapat ditemukan dengan mengisolasi pada media agar. Cendawan endofit dapat mengkolonisasi inangnya baik secara obligat maupun fakultatif, dan mereka biasanya mencakup sejumlah genera dan spesies dalam satu tanaman inang. Meskipun bakteri ini dapat berinteraksi dengan berbagai inang, beberapa cendawan endofit hanya dapat melakukannya dengan kelompok inang tertentu. Tanaman dan cendawan endofit

hidup berdampingan dalam hubungan netral, mutualistik, atau komensal (Desriani, 2014).

Asosiasi antara bakteri dan jaringan tanaman dikenal sebagai mikroba endofit. Mikroorganisme ini terlibat dalam mutualisme, suatu jenis hubungan simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk penyelesaian siklus hidup tanaman inang, mikroorganisme endofit juga dapat menciptakan zat yang memberikan tanaman inang pertahanan terhadap penyakit tanaman (Ariyono, 2014).

Cendawan endofit menciptakan zat metabolit yang membantu melindungi tanaman inang dari kondisi lingkungan yang keras. Selain itu, cendawan endofit yang mendiami ranting dan jaringan daun tanaman juga berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan tanaman (Agusta, 2009).

Baru-baru ini, banyak sarjana fokus pada studi tentang endofit sebagai agen biokontrol patogen dan serangga dan berhasil menerapkan endofit untuk perlindungan tanaman. Berdasarkan laporan terbaru, kami mengusulkan potensi itu mekanisme penghambatan endofit dari patogen tumbuhan dengan beberapa cara, termasuk efek langsung, tidak langsung efek dan efek ekologi. Dapat diindikasikan bahwa file alasan utama endofit jamur dalam perlindungan tanaman melawan patogen mungkin dengan produksi phytoalexins diinduksi oleh jamur endofit dan ekologi endofit (Gao et al, 2010).

Endofit tumbuhan terdiri dari bakteri dan komunitas cendawan yang menguasai dan menghabiskan seluruh atau sebagian dari siklus hidup mereka di dalam jaringan

tanaman, tanpa memicu apapun gejala infeksi yang terlihat penyakit pada inangnya. Bukti terkait tanaman mikroorganisme yang ditemukan dalam fosil jaringan batang dan daun tanaman darat menunjukkan bahwa asosiasi tumbuhan endofit mungkin telah berkembang seiring dengan evolusi tanaman dataran tinggi. Hampir semua spesies tumbuhan vaskular dipelajari ditemukan mengandung bakteri endofit atau cendawan (Hardoim, 2015). Mereka ditemukan ada di hampir semua organ dari inang tanaman tertentu, dan beberapa di antaranya berbiji.

Cendawan endofit merupakan kelompok mikroorganisme dengan berbagai jenis serta mampu berkembang dalam jaringan tanaman yang ada di atas tanah serta di bawah tanah, termasuk batang, daun, dan akar tanpa menimbulkan gejala. Endofit sering memberikan manfaat yang cukup besar bagi tanaman inang yang mereka huni, karena dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman inang, meningkatkan ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, dan mengakumulasi bioaktif sekunder metabolit (Kusari et al., 2012).


Cendawan endofit dan tanaman memiliki hubungan simbiosis mutualistik di mana cendawan endofit menerima nutrisi dari produk metabolisme tanaman dan mempertahankan tanaman dari patogen sementara tanaman memperoleh turunan nutrisi dan bahan kimia aktif yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup (Desriani, 2014).

Distribusi cendawan endofit pada tumbuhan inang dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti asal usul endofit yang terkoloni dan adanya zat tertentu pada jaringan organ tumbuhan. Ini mungkin terkait dengan kemampuan masing-masing

spesies cendawan endofit untuk memanfaatkan substrat atau jaringan tanaman tertentu. Jia dkk (2016) menyatakan bahwa kolonisasi jamur endofit sangat ditentukan oleh jaringan tanaman yang menghasilkan berbagai zat. Selain itu, perbedaan komposisi jamur endofit pada organ inang yang berbeda dapat terjadi karena perbedaan histologis dan ketersediaan unsur hara pada organ tumbuhan tempat fungi endofit melakukan koloni.

C. Tinjauan Umum tentang Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*)

Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) adalah tanaman herba, semak, atau tanaman pemanjat dengan daun sporadis atau berlawanan, mekar tunggal, dan daun pelindung di sekitar kepala daun kecil (*phyllaries*). Bunga cakram (*disk flower*) berbentuk tabung dan bunga tepi (*ray flower*) berbentuk pita, keduanya terdapat dalam satu kepala bunga.



Gambar 1. Habitus dan bagian-bagian bunga *Chrysanthemum morifolium* (A) habitus tanaman. Skala 10 cm. (B) bunga, dk: diameter kuntum bunga; (C) bagian bunga, bp: bunga pita berwarna hijau, bt: bunga tabung, tb: tangkai bunga; (D) permukaan atas bunga pita, pp: panjang bunga pita, pt: putik, uj: ujung bunga pita meruncing, ga: guratan; (E) permukaan bawah bunga pita, te: tepi bunga pita yang rata, gb: guratan; (F) kumpulan bunga tabung, bt: bunga tabung, dp: daun pembalut; (G) daun pembalut dan cakram, dp: daun pembalut, ca: cakram berbentuk kerucut tinggi; (H) permukaan bawah daun pembalut, dp : daun pembalut, tb: tangkai bunga; (I) bunga tabung, pt: putik, dm: daun mahkota (Purnobasuki, 2014).

Adapun klasifikasi ilmiah tanaman krisan sebagai berikut:

Divisi	= Spermatophyta,
Subdivisi	= Angiospermae,
Kelas	= Dicotyledoneae,
Famili	= Asteraceae,
Genus	= <i>Chrysanthemum</i> ,
Spesies	= <i>Chrysanthemum morifolium</i> (Thalib et al, 2008).

Tanaman florikultura krisan (*Chrysanthemum morifolium*) memiliki nilai komersial dan potensi pengembangan yang tinggi. Tanaman krisan tersedia dalam berbagai ukuran, jenis, dan warna bunga. Krisan digunakan dalam pengobatan tradisional selain sebagai tanaman yang indah, namun sebagian orang meminum teh yang dibuat dari tanaman ini. Hal ini mengakibatkan permintaan pelanggan yang cukup kuat untuk barang ini (Chaoliq, 2020).

Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) termasuk tanaman bunga hias herba yang biasa disebut bunga emas atau seruni. Karena nilai estetikanya yang tinggi dalam warna dan bentuknya yang indah dari berbagai bunganya, tanaman ini adalah salah satu varietas tanaman hias yang paling banyak digunakan. Krisan juga dapat ditambahkan sebagai dekorasi untuk meningkatkan nilai estetika (Lydianthy, 2019).

Usia fisiologis tanaman dan cahaya dapat berdampak pada metabolisme metabolit primer dan sekunder pada tanaman. Untuk aktivitas metabolisme tanaman, cahaya merupakan elemen penting. Untuk beberapa rute metabolit primer dan sekunder pada tanaman, cahaya juga dapat menjadi faktor pembatas. Tanaman krisan

dengan intensitas cahaya tinggi seringkali memiliki tinggi tanaman yang lebih besar daripada tanaman krisan dengan intensitas cahaya rendah (Widiastuti et al, 2004).

D. Tinjauan Umum tentang Puccinia horiana

Penyakit karat putih yang disebabkan oleh *Puccinia horiana* Henn. merupakan salah satu penyebab masalah yang paling penting pada tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*). Serangan pada tanaman ini dapat menurunkan nilai komersial bunga krisan (Hanudin, 2016) dan dapat menurunkan kesegaran bunga krisan (*vase-life*) hingga kurang dari 5 hari. Padahal untuk bunga yang sehat tanpa cacat, kesegarannya dapat bertahan hingga 12 hari pada suhu ruangan (27–29°C) (Lala et al, 2019).

Patogen ini pertama kali dilaporkan di Asia Timur dan diidentifikasi pada tahun 1905 oleh P. Henning (Henning 1991 dalam Bonde et al. 1995). Sejak tahun 1963 dilaporkan bahwa penyakit karat putih pada krisan telah menginfeksi pertanaman krisan di beberapa negara, seperti England (Baker 1967), New Zealand, dan Afrika Selatan (Firman dan Martin 1968), Australia (Exley et al. 1993). Penyakit karat putih pada krisan diduga masuk ke Indonesia melalui benih krisan impor dengan gejala yang belum muncul (Djatnika et al. 1994). Gejala penyakit yang belum muncul seringkali menyulitkan proses identifikasi dan determinasi penyakit. Dari banyak cara penularan penyakit karat yang terjadi di lapangan, penularan penyakit yang paling sering ditemukan antarsentra produksi bahkan antarnegara, yaitu melalui benih (Hanudin, 2016).

Kerugian yang dapat ditimbulkan akibat infeksi penyakit ini dapat mencapai 100% terutama bila kondisi lingkungan optimal dan varietas yang digunakan bersifat rentan terhadap patogen. Seluruh negara produsen krisan di dunia telah menetapkan bahwa penyakit ini sangat menular dan penyebarannya dapat mengancam kelangsungan industri krisan, sehingga penyakit tersebut perlu ditangkal masuk ke suatu negara melalui karantina, karena itu berbagai negara pengimpor krisan menerapkan larangan masuk bagi materi tanaman dari negara lain yang diindikasikan tercemar berat penyakit karat. Pelarangan distribusi materi tanaman antar pulau di dalam suatu negara juga diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia untuk mencegah penyebaran penyakit karat dari daerah endemik ke daerah baru. Pemusnahan benih krisan dilakukan manakala materi tanaman impor terbukti membawa propagul penyakit karat putih. Tindakan pemusnahan tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko masuknya propagul penyakit karat yang mengancam keberlanjutan usaha budidaya krisan di negara produsen (Suhardi 2009).

Penyakit ini telah dicegah penyebarannya dengan menggunakan berbagai teknik; biasanya, fungisida digunakan untuk pencegahan, meskipun pendekatan ini belum efektif. Fungisida sintesis lebih mahal dan dapat menyebabkan gangguan lingkungan ketika digunakan untuk pengendalian. Benih juga dapat dipanaskan, jenis yang tahan dapat digunakan, dan pengendalian biologis merupakan perlindungan lebih lanjut. Karena memiliki keunggulan dibandingkan alternatif lainnya, seperti berbasis sumber daya hayati nasional dan ramah lingkungan, teknik pengendalian hayati akhir-akhir ini berkembang dengan cepat (Wilia, 2012).

E. Tinjauan Umum tentang Peranan Cendawan Endofit Untuk Tanaman

Endofit adalah mikroorganisme yang mengkolonisasi jaringan internal tanaman tanpa secara langsung merusak tanaman. Mengeksploitasi organisme endofit dapat menghasilkan penciptaan produk alami baru dengan aplikasi dalam industri, pertanian, dan obat-obatan.. Di sisi lain, karena resistensi bakteri, infeksi virus, prevalensi infeksi jamur, berbagai bentuk kanker, dan infeksi parasit dan protozoa dalam populasi global saat ini, ada kebutuhan konstan untuk pengobatan baru untuk membantu umat manusia dalam memerangi berbagai penyakit. karena kita tidak dapat memecahkan masalah selain yang berhubungan dengan kesehatan. Resistensi endofit di ekosistem tropis terhadap infeksi dan predator relatif signifikan, sumber daya yang langka, dan tekanan seleksi alam yang cukup tinggi. Di sisi lain, Indonesia sebagai wilayah tropis dengan keanekaragaman hayati yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa endofit dapat menjadi sumber struktur kimia baru dengan sifat biologis yang menarik yang dapat dikembangkan sebagai zat terapeutik baru di daerah tropis seperti negara kita (Posangi, 2014).

Endofit dapat berkontribusi pada pertahanan tanaman inangnya melawan organisme fitopatogen melalui tumbuhan kontrol fisiologi. Peningkatan Pertumbuhan tanaman akan mencegah berbagai jenis abiotik dan biotik stres, mencerminkan kekuatan atau ketekunan tanaman dan dianggap sebagai perlindungan potensial terhadap patogen tantangan. Banyak penelitian mendemonstrasikan bahwa memperoleh tanaman yang terinfeksi endofit promosi pertumbuhan, resistensi

terhadap stres kekeringan dan toleransi terhadap kondisi tanah yang tidak cocok. Peningkatan tanaman pertumbuhan mungkin dipengaruhi oleh senyawa seperti fitohormon diproduksi oleh endofit jamur. *Colletotrichum* sp., jamur endofit yang diproduksi *A. Annua* zat seperti indole acetic acid (IAA) untuk mengatur tanaman proses (Gao et al., 2010).

Cendawan endofit merupakan mikroorganisme yang hidup pada jaringan tumbuhan tanpa menimbulkan efek negatif bahkan bersimbiosis mutualisme. Cendawan endofit memiliki berbagai peran pada tanaman inang, seperti meningkatkan pertumbuhan tanaman serta meningkatkan ketahanan tanaman inang terhadap cekaman biotik dan abiotik. Pada tumbuhan obat, beberapa jenis jamur endofit berhubungan dengan senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh tumbuhan inang (Jia et al.2016).

Cendawan yang bertahan hidup di dalam jaringan tanaman tanpa menimbulkan gejala penyakit pada tanaman inangnya dikenal sebagai cendawan endofit. Cendawan endofit memiliki kapasitas untuk menghasilkan zat bioaktif, termasuk yang memiliki sifat antibakteri, antijamur, antivirus, antikanker, dan antimalaria (Prihatiningtias., et al, 2011). Cendawan endofit yang berkembang pada jaringan tanaman obat dapat menghasilkan bahan kimia yang berbeda atau identik dengan tanaman inang, tetapi mereka semua memiliki kualitas fisiologis yang sama. Bahkan, sering terlihat bahwa produk cendawan endofit lebih aktif daripada tanaman inangnya (Prihatiningtias, 2005).

Cendawan endofit adalah mikroorganisme netral atau menguntungkan yang ditemukan dalam jaringan tanaman yang sehat. Beberapa cendawan endofit yang dapat menghasilkan bahan kimia biologis atau metabolit sekunder terdapat di hampir setiap tanaman tingkat tinggi. Dipercaya bahwa zat aktif yang dihasilkan oleh cendawan endofit ini setara dengan yang dihasilkan oleh tanaman induk. Cendawan yang dikenal sebagai endofit adalah cendawan yang mendiami sistem jaringan tanaman, seperti daun, bunga, ranting, atau akar tanaman. Cendawan ini dapat menciptakan mikotoksin, enzim, dan antibiotik serta dapat menginfeksi tanaman sehat pada jaringan tertentu. Mikroorganisme endofit terkait dengan jaringan tanaman hidup. Dalam hal ini, cendawan endofit dan tanaman berinteraksi. Menurut teori di balik hubungan simbiosis ini, tanaman memberikan nutrisi bagi mikroorganisme, yang pada gilirannya mengalami transformasi dan menghasilkan zat bioaktif (Fitriana, 2016).

Cendawan endofit memiliki kapasitas untuk menciptakan bahan kimia bioaktif, yang mungkin identik atau tidak identik dengan yang dihasilkan oleh inangnya, tetapi sering menunjukkan aktivitas biologis yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa zat bioaktif tidak hanya terdapat pada komponen tanaman terapi. Bahkan Strober (2003) mengatakan bahwa bahan kimia yang dihasilkan cendawan endofit seringkali memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen pertumbuhan inangnya (Fitriana, 2016).

Melalui mekanisme kompetisi, induksi resistensi, antagonisme, dan mikoparasit, cendawan endofit mempertahankan tanaman dari serangan patogen.

Cendawan ini juga dapat mengubah metabolisme inang, membuatnya lebih tahan terhadap penyakit tanaman dan meningkatkan hasil. Ketahanan tanaman terhadap infeksi dapat diinduksi di bagian atas tanaman melalui interaksi cendawan endofit dengan akar. Beberapa cendawan ini menghasilkan obat anti tumor, dan mereka dapat berdampak pada fisiologi tanaman dengan cara-cara seperti ketahanan terhadap stres air (kekeringan) (Azevedo et al. 2000). Di dalam jaringan tanaman, cendawan endofit dapat menghasilkan senyawa sekunder yang dapat menghambat cendawan lain (Rayner 1991). Tanaman krisan dapat dibuat lebih tahan terhadap penyakit tanaman dan menghasilkan lebih banyak hasil panen berkat mekanisme yang ditemukan pada cendawan endofit yang disebut induksi resistensi. Cendawan endofit bekerja mengendalikan penyakit dengan cara mendorong pertumbuhan tanaman, yang membuat tanaman lebih kuat dan mampu menangkis serangan patogen (Wilia, 2012).

Banyak jenis cendawan endofit yang dapat digunakan sebagai agensia penginduksi resistensi tanaman. *Trichoderma* merupakan cendawan endofit yang menghambat pertumbuhan dan resistensi tanaman serta memiliki efek antagonis terhadap penyakit (Gazis et al., 2010).

Tampaknya kultur bersama dengan elisitor endofit adalah suatu cara alternatif untuk meningkatkan metabolit sekunder tanaman dan meningkatkan ketahanan tanaman. Mirip dengan bagaimana resistensi tanaman distimulasi, elisitor endofit menginduksi perkembangan metabolit sekunder pada tanaman. Kolonisasi cendawan endofit menyebabkan pelepasan hidrolase sel tanaman untuk menghambat pertumbuhan cendawan, yang menyebabkan hidrolisis fragmen endofit untuk

menghasilkan elisitor. Lipopolisakarida, polisakarida, dan glikoprotein merupakan elisitor yang akan mengaktifkan pertahanan tanaman dan metabolit sekunder yang secara efektif akan menggagalkan serangan patogen. Namun, penentuan bagaimana endofit dapat bertahan hidup tinggi konsentrasi metabolit sekunder pada tanaman inang masih belum diketahui (Gao et al, 2010).


Interaksi tumbuhan-patogen-endofit bergantung pada ceruk endofit. Persaingan ceruk ekologi dan nutrisi, hiperparasit, dan predasi ada di antaranya beragam mikro-organisme yang hidup di relung endofit, terutama antara endofit dan patogen. Pengenalan endofit dan kolonisasi dengan cepat menempati relung ekologis dan tidak meninggalkan ruang untuk patogen, yang akan menjadi alasan umum dan utama jamur itu endofit menghambat infeksi patogen pada tanaman (Gao et al., 2010).

Keanekaragaman zat kimia di dalam biosfer disebut sebagai keanekaragaman hayati. Endofit yang berada di dalam tanaman memiliki tujuan untuk menjaga kemampuan tanaman inang untuk bertahan dan melindungi diri mereka sendiri terhadap organisme patogen dan predator utama mereka. Organisme endofit dipaksa untuk terus beradaptasi untuk menghasilkan senyawa kimia baru untuk melindungi inangnya. Contoh yang bagus dari habitat semacam ini adalah daerah tropis. Habitat di wilayah ini memiliki tingkat toleransi endofit yang tinggi terhadap patogen dan predator, sumber daya yang langka, dan tekanan seleksi alam yang intens (Strobel et al. 2004). Hal ini menunjukkan bahwa endofit dapat menjadi sumber struktur

senyawa baru dengan fungsi biologis yang menarik di daerah tropis seperti negara kita (Posangi, 2014).

Meskipun secara alamiah terdapat dalam jaringan tanaman, cendawan endofit tidak memiliki efek merugikan pada tanaman tersebut. Baik bakteri maupun cendawan dapat menjadi mikroba endofit, namun cendawan lebih sering dijumpai (Simarmata et al., 2007). Cendawan endofit yang telah dipisahkan dari tanaman inangnya mampu membuat metabolit sekunder yang sebanding dengan metabolit sekunder yang dibuat oleh tanaman yang ditemelinya. Untuk memisahkan dan mengidentifikasi cendawan endofit ini dari inangnya karena diketahui sebagai sumber metabolit sekunder berupa enzim atau bahan kimia bioaktif lainnya (Suhartina, 2018).

F. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif eksploratif yang bertujuan untuk mengetahui potensi cendawan endofit tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) sebagai anti penyakit karat putih (*Puccinia horiana*).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai Agustus 2022 di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

C. Variabel Penelitian

Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun yang termasuk variabel bebas yaitu cendawan endofit sementara variabel terikat yaitu *Puccinia horiana*.

D. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu:

1. Cendawan endofit merupakan cendawan dalam jaringan tanaman krisan yang tidak memiliki gejala penyakit (sehat) diisolasi dari seluruh organ dengan menggunakan media PDA.

2. Hasil isolasi yang di dapatkan selanjutnya dilakukan uji antagonis pada *Puccinia horiana* dimana isolat yang berhasil menghambat pertumbuhan *P. horiana* kemudian digunakan untuk uji patogenitas dengan menggunakan daun tembakau (*Nicotiana tabacum*).

E. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu cawan petri, mikroskop, gelas ukur, tabung reaksi, *autoclave*, oven, ose, *Bio Safety Cabinet* (BSC), vortex, *magnetic stirrer*, pisau, *erlenmeyer*, bunsen, alat tulis, kamera, penggaris dan gunting.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanaman krisan, tanaman tembakau, air, etanol 70%, kloramfenikol 1%, natrium hipoklorit 3%, *Potato Dextrosa Agar* (PDA), *lactophenol*, air suling, alkohol 70%, spiritus, kapas, aluminium foil, *tissue*, dan label.

F. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja pada pada penelitian ini adalah:

1. Preparasi Media

Pengisolasian cendawan endofit menggunakan media PDA (*Potato Dextrose Agar*) yang mendukung pertumbuhan cendawan karena mempunyai pH 4.5 sampai 5.5 yang dapat menghambat pertumbuhan dari mikroorganismen lain (Cappucino & Sherman, 2014). Berdasarkan komposisinya PDA termasuk media semisintetik

karena tersusun dari bahan alami kentang dan bahan sintetik *dextrose* dan agar (Azzahra, 2020). Media PDA sebanyak 19,5 g dimasukkan ke dalam *Erlenmeyer* dan dilarutkan dengan 500 ml aquades, lalu ditutup menggunakan aluminium foil dan direkatkan menggunakan *sealt* selanjutnya dipanaskan hingga mendidih dan homogen pada *hot plate*. Kemudian dibungkus dengan plastik buah dan disterilkan di dalam *autoclave* pada suhu 121⁰C selama 15 menit dengan tekanan dua atm. Setelah media steril didinginkan sampai suhu 40-45⁰C lalu media ditambahkan *cloramfhenicol* 250 mg/500 ml aquades. Kemudian media dituang ke dalam cawan petri direkatkan dengan *ssealt* dan dibiarkan hingga memadat (Azzahra, 2020).

2. Isolasi Cendawan Endofit

Tiga individu tanaman Krisan yang sehat dan berumur 3 bulan yang diperoleh dari Malino florist di Bulu Valles, Malino Kabupaten Gowa dipilih sebagai obyek penelitian. Eksperimen dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri Makassar. Ketiga individu tanaman terpilih, diamati karakteristik morfologi meliputi tinggi, jumlah daun, dan parameter lainnya yang dapat memastikan sampel tanaman relative seragam dan sehat.

Masing-masing tanaman yang terpilih Tanaman Krisan yang sehat dicabut dan dibersihkan. Sebanyak 12 potongan sampel dari seluruh organ tanaman (tiga ulangan dari masing-masing organ akar, batang, daun, dan bunga) diambil dari masing-masing individu tanaman sehingga terdapat 36 potongan sampel organ. Tiap potongan tersebut kemudian dipotong menjadi 4 ruas dengan ukuran 5 cm sehingga menjadi 144 ruas (Susilowati, 2019).

Ruas-ruas sampel masing-masing organ dicuci dengan air mengalir selama 10 menit, disterilkan permukaannya dengan cara dicelupkan pada larutan etanol 70% selama 1 menit. Sampel kemudian direndam dalam natrium hipoklorit 3% selama 2 menit dan dalam etanol 70% selama 20 detik, dibilas tiga kali dalam air suling steril dan dikeringkan di atas tissu steril selama minimal 4 jam. Air suling bilasan akhir (100 µl) dituang ke media agar sebagai kontrol kualitas proses sterilisasi sampel, jika tidak ada cendawan yang tumbuh pada media tersebut, berarti proses sterilisasi permukaan berhasil (Susilowati, 2019).


Setiap ruas sampel tanaman steril dipotong lebih kecil kira-kira secara aseptis menjadi ukuran 1 cm × 0,5 cm dan dibiakkan di *Potato Dextrosa Agar* (PDA) (Difco, USA). Kultur diinkubasi pada suhu kamar selama 7 hari. Cendawan endofit yang tumbuh pada media PDA diamati setiap hari hingga 7 hari setelah inkubasi (Susilowati, 2019).

Karakter morfologi isolat cendawan endofit diklasifikasikan berdasarkan warna, bentuk dan diameter pertumbuhannya. Koloni yang mempunyai karakteristik serupa dikelompokkan ke dalam morfotipe yang sama (Putra et al., 2015; Radiastuti, 2015). Setelah karakterisasi morfologi awal, isolat cendawan endofit diperiksa secara makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan secara makroskopis meliputi bentuk morfologi, warna koloni sisi atas dan bawah, diameter koloni, elevasi koloni, tekstur permukaan koloni, jenis miselium, tepi koloni, dan zonasi koloni. Mikroskop pada perbesaran 400x dan 1000x meliputi hifa, bentuk dan ukuran spora/konidia, konidiofor, dan keberadaan rhizoid (Radiastuti, 2015).

3. Uji Antagonis Cendawan Endofit terhadap *Puccinia horiana*

Setiap isolat cendawan dari medium agar miring diinokulasikan ke medium PDA dan dikultur selama tujuh hari pada suhu 25°C. Dalam cawan petri berdiameter 9 cm yang diisi medium PDA, isolat yang telah diregenerasi digunakan untuk uji antagonis secara in-vitro menggunakan metode oposisi langsung. Inokulum *Puccinia horiana* dan cendawan endofit secara bersamaan ditanam secara berdampingan pada media dalam cawan petri, masing-masing berjarak 3 cm dari tepi cawan. Sebagai kontrol, berbagai isolat patogen dibiakkan dalam cawan petri yang berbeda. Kultur kemudian disimpan pada suhu kamar selama satu minggu. Setiap hari setelah inokulum diinokulasikan, dilakukan pengukuran pertumbuhan koloni untuk menghitung persentase cendawan endofit yang terhambat. Persentase hambatan dihitung berdasarkan rumus yang diadaptasi dari rumus yang dikemukakan oleh Alfizar et al. (2013), yaitu:

$$P = \frac{r_1 - r_2}{r_2} \times 100\%$$



4. Uji Patogenitas

Isolat yang terindikasi bukan antagonis dilanjutkan pada uji patogen. Masing-masing isolat cendawan endofit dikulturkan pada media PDA. Sebanyak 1 µL spora cendawan diinfiltrasikan ke tulang sekunder daun tembakau (*Nicotiana tabacum*). Gejala yang ditimbulkan patogen dapat dilihat jika pada bagian yang diinfiltrasi oleh

suspensi bakteri terjadi nekrosis dalam waktu 1-4 hari. Isolat yang digunakan pada uji selanjutnya yaitu isolat yang tidak memperlihatkan gejala nekrosis.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

1. Isolasi Cendawan Endofit


Berdasarkan isolasi yang telah dilakukan pada tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) dengan menggunakan media PDA, didapatkan sebanyak 30 isolat cendawan endofit yang terdiri pada empat bagian tanaman diantaranya lima isolat dari akar, 10 isolat dari batang, tiga isolat dari daun, dan 12 isolat dari bunga. Adapun pengamatan makroskopis dan mikroskopik yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:




Gambar 4.1 : a) Morfologi isolat AC 1 : koloni berwarna army, tekstur *granular*, topografi *umbonate*. b) Pengamatan mikroskopik isolat AC 1 : memiliki konidia berbentuk bulat dan berwarna hijau kekuningan.




Gambar 4.2 : a) Morfologi isolat AC 4 : koloni putih abu, tekstur *downy*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik isolat AC 4 : memiliki spora bentuk bulat atau semi dan membentuk rantai panjang, dengan hifa bersekat.




Gambar 4.3 : a) Morfologi isolat AC 5 : koloni putih, tekstur *downy*, topografi *rugose* dan terdapat garis konsentris. b) Pengamatan mikroskopik isolat AC 5 : memiliki spora berbentuk bulat dan berwarna kehitaman.




Gambar 4.4 : a) Morfologi isolat AC 6 : koloni kuning, tekstur *velvety*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik isolat AC 6 : memiliki spora yang berwarna kehitaman dan berbentuk bulat.




Gambar 4.5 : a) Morfologi isolat AC 7 : koloni *orange*, tekstur *wrinkled*, topografi *umbonate* dan terdapat tetesan eksudat. b) Pengamatan mikroskopik isolat AC 7 : konidia berbentuk bulat, hifa bersekat dan tegak.




Gambar 4.6 : a) Morfologi isolat BC 8 : koloni putih abu, tekstur *wolly*, topografi *umbonate*. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 8 : memiliki konidia berwarna hitam berbentuk bulat dan bergerombol.




Gambar 4.7 : a) Morfologi isolat BC 9 : koloni hijau *army*, tekstur *granular*, topografi *umbonate*. b) Pengamatan mikroskopik BC 9 : memiliki spora berwarna hitam dan berbentuk bulat.




Gambar 4.8 : a) Morfologi isolat BC 11 : koloni putih, tekstur *velvety*, topografi *umbonate*. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 11 : memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, bercabang dan memiliki *rhizoid* berdinding halus.




Gambar 4.9 : a) Morfologi isolat BC 12 : koloni coklat, tekstur *downy*, topografi *rugose* dan terdapat garis konsentris. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 12 : memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, bercabang dan memiliki *rhizoid* berdinding halus.




Gambar 4.10 : a) Morfologi isolat BC 14 : koloni hitam abu, tekstur *downy*, topografi *umbonate*, terdapat garis konsentris dan garis radial. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 14 : memiliki spora berbentuk glanula berwarna kehijauan dan memiliki hifa yang bersekat.




Gambar 4.11 : a) Morfologi isolat BC 15 : koloni abu-abu, tekstur *wolly*, topografi *umbonate* dan terdapat garis konsentris. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 15 : memiliki spora berwarna coklat, bergerombol diujung, berdinding halus dan hifa bersekat.




Gambar 4.12 : a) Morfologi isolat BC 16 : koloni putih, tekstur *velvety*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 16 : memiliki konidia berbentuk bulat, berwarna coklat dan hifa bersekat.




Gambar 4.13 : a) Morfologi isolat BC 21 : koloni putih, tekstur *wolly*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 21 : memiliki konidia berbentuk bulat, berwarna coklat dan hifa bersekat.




Gambar 4.14 : a) Morfologi isolat BC 22 : koloni pink, tekstur *wolly*, topografi *umbonate*. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 22 : memiliki konidia berbentuk bulat, hifa bersekat, dan bercabang.




Gambar 4.15 : a) Morfologi isolat BC 24 : koloni putih, tekstur *glabrous*, topografi *umbonate*. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 24 : memiliki konidia berbentuk bulat dan berwarna coklat.




Gambar 4.16 : a) Morfologi isolat DC 26 : koloni abu--abu, tekstur *cottony*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik DC 26 : memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa bersekat, bercabang dan memiliki *rhizoid* berdinding halus.



Gambar 4.17 : a) Morfologi isolat DC 27 : koloni putih *orange*, tekstur *granular*, topografi *verrugose*. b) Pengamatan mikroskopik isolat DC 27 : memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa bersekat, bercabang dan memiliki *rhizoid* berdinding halus.



Gambar 4.18 : a) Morfologi isolat DC 28 : koloni abu-abu, tekstur *wolly*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik isolat DC 28 : memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa bersekat, bercabang dan memiliki *rhizoid* berdinding halus.



Gambar 4.19 : a) Morfologi isolat FC 29 : koloni putih abu, tekstur *absent*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik FC 29 : memiliki konidia berbentuk bulat dan berwarna coklat.



a)

b)


Gambar 4.20 : a) Morfologi isolat FC 30 : koloni putih abu, tekstur *absent*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik issolat FC 30 : memiliki konidia berwarna coklat, bergerombol dan hifa tidak bersekat.




a)

b)


Gambar 4.21 : a) Morfologi isolat FC 31 : koloni coklat, tekstur *velvety*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik FC 31 : memiliki konidia berbentuk bulat dan berwarna coklat.




Gambar 4.22 : a) Morfologi isolat FC 32 : koloni putih, tekstur *wolly*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik FC 32 : memiliki konidia berbentuk bulat, konidiofor hilalin, hifa tidak bersekat dan berbentuk tegak.




Gambar 4.23 : a) Morfologi isolat FC 33 : koloni putih, tekstur *cottony*, topografi *umbonate* dan terdapat garis konsentris. b) Pengamatan mikroskopik FC 33 : memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, bercabang dan memiliki *rhizoid* berdinding halus.




Gambar 4.24 : a) Morfologi isolat FC 35 : koloni coklat, tekstur *absent*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik FC 35 : memiliki konidia berbentuk bulat, hifa bersekat, dan tidak bercabang.




Gambar 4.25 : a) Morfologi isolat FC 36 : koloni hijau, tekstur *granular*, topografi *umbonate*. b) Pengamatan mikroskopik isolat FC 36 : memiliki konidia berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, dan tidak bercabang.




Gambar 4.26 : a) Morfologi isolat FC 37 : koloni putih, tekstur *wolly*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik isolat FC 37 : memiliki konidia berwarna coklat, bentuk konidia bulat dan bergerombol.




Gambar 4.27 : a) Morfologi isolat FC 38 : koloni *orange*, tekstur *downy*, topografi *rugose*. b) Pengamatan mikroskopik isolat FC 38 : memiliki konidia berwarna transparan.



Gambar 4.28 : a) Morfologi isolat FC 39 : koloni abu, tekstur *granular*, topografi *rugose* dan terdapat garis konsentris. b) Pengamatan mikroskopik FC 39 : memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, bercabang dan memiliki *rhizoid* berdinding halus.



Gambar 4.29 : a) Morfologi isolat FC 40 : koloni putih coklat, tekstur *absent*, topografi *rugose* dan terdapat garis konsentris. b) Pengamatan mikroskopik isolat FC 40 : memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, dan tidak bercabang.




Gambar 4.30 : a) Morfologi isolat FC 41 : koloni putih kuning, tekstur *velvety*, topografi *verrugose*. b) Pengamatan mikroskopik FC 41 : memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, bercabang dan memiliki *rhizoid* berdinding halus.

Gambar 4.1 Hasil pengamatan makroskopis dan mikroskopis cendawan endofit tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*).

2. Uji Antagonis


Uji kemampuan menghambat *Puccinia horiana* bertujuan untuk mendapatkan isolat yang memiliki aktivitas antagonis terhadap isolat target. Pertumbuhan *Puccinia horiana* dikatakan terhambat apabila pertumbuhan cendawan endofit lebih besar. Adapun hasil yang didapatkan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.2.1. Pada gambar 4.2.1 isolat AC 1 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat AC 1 mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 3,5 cm sedangkan *Puccinia horiana* 2,6 cm.



Gambar 4.2.2. Pada gambar 4.2.2 isolat AC 4 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat AC 4 mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 3,5 cm sedangkan *Puccinia horiana* 1,8 cm.




Gambar 4.2.3. Pada gambar 4.2.3 isolat AC 5 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat AC 5 tidak mampu


menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,9 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,1 cm.




Gambar 4.2.4. Pada gambar 4.2.4 isolat AC 6 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat AC 6 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 3,5 cm sedangkan *Puccinia horiana* 2,2 cm.




Gambar 4.2.5. Pada gambar 4.2.5 isolat AC 7 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat AC 7 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 1,8 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,1 cm.



Gambar 4.2.6. Pada gambar 4.2.6 isolat BC 8 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 8 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,5 sedangkan *Puccinia horiana* 3,8 cm.




Gambar 4.2.7. Pada gambar 4.2.7 isolat BC 9 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat AC 1 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,2 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3 cm.




Gambar 4.2.8. Pada gambar 4.2.8 isolat BC 11 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 11 tidak mampu


menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,5 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,7 cm.




Gambar 4.2.9. Pada gambar 4.2.9 isolat BC 12 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 12 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,8 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,5 cm.



Gambar 4.2.10. Pada gambar 4.2.10 isolat BC 14 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 14 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 3 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,6 cm.



Gambar 4.2.11. Pada gambar 4.2.11 isolat BC 15 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 15 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,3 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,5 cm.



Gambar 4.2.12. Pada gambar 4.2.12 isolat BC 16 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 16 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 1,8 cm sedangkan *Puccinia horiana* 2,8 cm.



Gambar 4.2.13. Pada gambar 4.2.13 isolat BC 21 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 21 tidak


mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 3,1 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,9 cm.




Gambar 4.2.14. Pada gambar 4.2.14 isolat BC 22 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 22 mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 3,3 cm sedangkan *Puccinia horiana* 2,6 cm.



Gambar 4.2.15. Pada gambar 4.2.15 isolat BC 24 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 24 mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 3,8 cm sedangkan *Puccinia horiana* 2,1 cm.



Gambar 4.2.16. Pada gambar 4.2.16 isolat DC 26 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat DC 26 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,5 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,4 cm.



Gambar 4.2.17. Pada gambar 4.2.17 isolat DC 27 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat DC 27 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,5 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,5 cm.



Gambar 4.2.18. Pada gambar 4.2.18 isolat DC 28 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat DC 28 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,5 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,6 cm.



Gambar 4.2.19. Pada gambar 4.2.19 isolat FC 29 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 29 mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 4,1 cm sedangkan *Puccinia horiana* 1,8 cm.



Gambar 4.2.20. Pada gambar 4.2.20 isolat FC 30 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 30 mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 3,9 cm sedangkan *Puccinia horiana* 2,4 cm.



Gambar 4.2.21. Pada gambar 4.2.21 isolat FC 31 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 31 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,8 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,3 cm.



Gambar 4.2.22. Pada gambar 4.2.22 isolat FC 32 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 32 mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 3,3 cm sedangkan *Puccinia horiana* 1,8 cm.



Gambar 4.2.23. Pada gambar 4.2.23 isolat FC 33 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat C 33 tidak mampu

menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,5 cm sedangkan *Puccinia horiana* 2 cm.



Gambar 4.2.24. Pada gambar 4.2.24 isolat FC 35 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 35 mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 3,6 cm sedangkan *Puccinia horiana* 2,2 cm.




Gambar 4.2.25. Pada gambar 4.2.25 isolat FC 36 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 36 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,8 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,3 cm.



Gambar 4.2.26. Pada gambar 4.2.26 isolat FC 37 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 37 mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 3,9 cm sedangkan *Puccinia horiana* 2,6 cm.



Gambar 4.2.27. Pada gambar 4.2.27 isolat FC 38 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 38 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,3 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,4 cm.



Gambar 4.2.28. Pada gambar 4.2.28 isolat FC 39 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 39 tidak mampu

menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,8 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,1 cm.



Gambar 4.2.29. Pada gambar 4.2.29 isolat FC 40 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 40 tidak mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 2,5 cm sedangkan *Puccinia horiana* 3,4 cm.



Gambar 4.2.30. Pada gambar 4.2.30 isolat FC 41 dan *Puccinia horiana* menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 41 mampu menghambat *Puccinia horiana* dengan diameter pertumbuhan 3,5 cm sedangkan *Puccinia horiana* 2,5 cm.

3. Uji Patogen

Uji antagonis yang dilakukan menunjukkan 10 isolat terpilih yang tidak bersifat antagonis dan digunakan untuk uji patogen pada daun tembakau (*Nicotiana*

tabacum) yang kemudian diamati selama 7 hari. Adapun hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut:



Gambar 4.3 Hasil Uji patogen 10 cendawan endofit dari tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) pada daun tembakau (*Nicotiana tabacum*).

B. Pembahasan

Isolasi adalah teknik memisahkan mikroba tertentu dari lingkungannya. Isolasi merupakan langkah awal dalam penelitian ini sebelum cendawan pada tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) dikarakterisasi. Media Potato Dextrose Agar (PDA) digunakan untuk tahap isolasi, dan *lactophenol* digunakan untuk pewarnaan cendawan endofit di bawah mikroskop pembesaran 400x untuk mengkarakterisasi morfologinya.

Hasil isolasi cendawan endofit dari tanaman krisan diperoleh sebanyak 30 isolat cendawan endofit dengan metode penanaman. Pengamatan karakteristik morfologi cendawan endofit meliputi pengamatan koloni dilakukan dengan 2 cara

yakni secara makroskopis dan mikroskopis. Koloni yang tumbuh selama 7 hari masa inkubasi pada suhu 27°C. Tiga puluh isolat diperoleh dari empat sampel terpisah. Untuk memastikan bahwa hanya cendawan murni dari tanaman krisan yang diperoleh, koloni yang diperoleh melalui proses isolasi selanjutnya dimurnikan dengan menggunakan metode duplo atau kultur ganda.

Tiga puluh cendawan endofit diisolasi dari sampel tanaman krisan. Cendawan endofit terdiri dari lima isolat dari akar, 10 isolat dari batang, tiga isolat dari daun, dan 12 isolat dari bunga. Distribusi cendawan endofit yang terdapat pada batang lebih tinggi dari pada akar, daun, dan bunga. Peredaran cendawan endofit pada tumbuhan inang dapat diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya asal usul endofit yang terkolonisasi, adanya zat tertentu pada jaringan organ tanaman dan lingkungan tumbuhan. Kondisi lingkungan juga merupakan faktor penting dalam menentukan jenis dan jumlah metabolit sekunder tanaman inang serta mempengaruhi struktur populasi cendawan endofit pada tanaman inang. Hal ini terkait dengan kemampuan masing-masing spesies cendawan endofit untuk memanfaatkan substrat atau jaringan tanaman tertentu. Peranan cendawan endofit pada tanaman krisan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman serta meningkatkan ketahanan tanaman inang terhadap cekaman biotik dan abiotik (Sopialena, 2020).

Uji antagonis bertujuan untuk melihat kemampuan cendawan antagonis dalam menekan pertumbuhan dan perkembangan cendawan patogen, uji tersebut juga menunjukkan bahwa mikroorganisme dengan sifat antagonis mampu menghambat aktivitas mikroorganisme yang lain yang terdapat ditempat yang sama atau

berdekatan. Mekanisme penyebab cendawan antagonis dikarenakan cendawan antagonis memiliki satu atau lebih mekanisme penghambatan, yaitu kompetisi, antibiosis, dan parasitisme.

Trigiano (2008) menegaskan bahwa mikroorganisme antagonis menekan patogen dapat menggunakan satu atau lebih metode, dan kemanjurannya dapat bervariasi tergantung pada jenis patogen. Lebih lanjut, disebutkan bahwa apa yang terjadi ketika dua atau lebih mikroba bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber makanan, sumber mineral, inang, atau habitat yang mengandung karbon dan nitrogen yang sama. Satu mikroorganisme dapat mengungguli mikroorganisme lainnya karena tumbuh lebih cepat dan memanfaatkan sumber makanannya secara lebih efektif. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Porter (1942), Skidmore & Dickinson (1976), dan Trigiano, & Windham (2008), maka mekanisme interaksi antara cendawan patogen dan cendawan antagonis adalah sebagai berikut: 1) Kompetisi, jika koloni patogen tertutupi oleh koloni cendawan antagonis dan cendawan antagonis tumbuh lebih cepat hingga memenuhi cawan petri berdiameter 9 cm. Pada daerah kontak, hifa patogen mengalami lisis. 2) Antibiosis, dimana morfologi hifa patogen berubah dan pigmen diproduksi pada bagian bawah koloni cendawan antagonis, terjadi ketika zona kosong antara cendawan patogen dan antagonis terbentuk. 3) Parasitisme terjadi ketika hifa cendawan antagonis tumbuh di atas hifa cendawan yang patogen. Di daerah kontak, hifa cendawan antagonis ditemukan melilit hifa cendawan patogen dan lisis.

Pengujian selanjutnya adalah pemeriksaan patogen pada daun tanaman tembakau karena daun ini dapat membedakan antara cendawan patogen yang menyerang daerah spesifik daun dan tanaman tembakau yang tahan penyakit (Schaad et al, 2001). Pada penelitian ini daun tanaman tembakau mengalami nekrosis yang diakibatkan oleh cendawan endofit yang menunjukkan bahwa cendawan endofit tersebut bersifat patogen. Reaksi ini merupakan teknik analisis yang baik untuk memisahkan cendawan endofit yang mempunyai sifat patogen dan non patogen. Adanya reaksi hipersensitif mengakibatkan terjadinya nekrosis pada daun tanaman, hal ini adalah bentuk pertahanan dalam menghambat serangan dari mikroorganisme (Amrulloh, 2021). Hal yang sama juga ditemukan oleh Zhu dkk. (2000), yang menyatakan bahwa reaksi hipersensitif dapat dikarakteristikkan sebagai program kematian sel yang cepat dan terbatas, suatu respon yang berlangsung pada tanaman untuk mencegah penyebaran penyakit. Sel yang terinfeksi mengalami peningkatan permeabilitas, kehilangan sel inang, dan kematian sel inang. Uji patogenisitas menunjukkan bahwa isolat cendawan endofit FC 41 merupakan cendawan non-patogenik pada tanaman akibat nekrosis daun tanaman tembakau.

Sutarman (2017) berpendapat bahwa suatu tanaman dianggap sakit jika terjadi pergeseran yang nyata dalam proses fisiologis di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang mengarah pada penyakit. Timbulnya gejala dan indikator menentukan etiologi primer penyakit. Agrios (1997) menyebutkan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap penyakit. 1) Faktor biotik, termasuk nematoda,

tumbuhan tingkat tinggi, virus, bakteri, jamur, dan bakteri. 2) Pengaruh abiotik, seperti lingkungan (cuaca, suhu, mineral, zat berbahaya, dll.).

Karena cendawan patogen yang berdiam di dalam jaringan tanaman dapat menginduksi perubahan morfologi dan mengganggu fungsi jaringan tanaman, maka cendawan patogen dapat menyebabkan berbagai penyakit pada tanaman inang (Afifah et al., 2017). Cendawan patogen tanaman sering tumbuh melalui perkembangbiakan di celah-celah antar sel tanaman daripada dengan langsung masuk ke dalam sel tanaman. Cendawan patogen dapat masuk melalui stomata, lentisel, hidatoda, dan luka jaringan tanaman. Racun, fitohormon, enzim ekstraseluler, dan polisakarida ekstraseluler semuanya dapat diekskresikan oleh cendawan patogen (Shivas et al., 2005).

Patogen adalah organisme yang menyebabkan penyakit. Kemampuan mikroba untuk menyebabkan penyakit dikenal sebagai patogenisitas. Patogen menyebabkan penyakit dalam tubuh dengan cara-cara berikut ini: 1) mengkonsumsi isi sel tanaman, 2) menghancurkan atau mengganggu metabolisme sel tanaman dengan menggunakan racun, enzim, atau zat pertumbuhan, 3) melemahkan tanaman dengan cara menghisap isi sel untuk digunakan sendiri, dan 4) menyumbat arteri darah. Patogenisitas adalah kapasitas patogen untuk menghasilkan penyakit, dan patogenesis adalah suksesi peristiwa penyebab penyakit (Sutarman, 2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil isolasi cendawan endofit pada tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) didapatkan 30 isolat dan terdapat 10 isolat yang bersifat antagonis terhadap *Puccinia horiana* dan satu diantaranya tidak menunjukkan patogenitas pada daun tembakau sehingga isolat tersebut berpotensi digunakan sebagai biokontrol untuk mencegah penyakit karat putih (*Puccinia horiana*).

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang identifikasi cendawan endofit yang terdapat pada tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*).

DAFTAR PUSTAKA


- Afifah Z, 2017. *Uji Antagonis Mikroba Endofit Trichoderma Sp. dan Bacillus cereus terhadap Patogen Colletotrichum Capsici Penyebab Penyakit Antraknosa pada Cabai Rawit (Capsicum frutescens)*. Doctoral Dissertation. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Agrios, G.N. 1997. Ilmu Penyakit Tumbuhan. (Terjemahan) Edisi Ketiga. Yogyakarta: UGM-Press.
- Agusta A. 2009. Biologi dan kimia jamur endofit. Bandung (ID): ITB.
- Amrulloh, M. K., Addy H. S & Wahyuni, W, S. “Karakterisasi fisiologis dan biokimia penyebab penyakit bakteri pembuluh kayu pada tanaman cengkeh (*Syzygium aromaticum* L.) di PT Tirta Harappan”. *Jurnal Proteksi Tanaman Tropis*. 2 no. 1 (2021): h. 1-7.
- Ariyono, R.Q., Djauhari, S., dan Sulistyowati, L. 2014. Keanekaragaman Jamur Endofit Daun Kangkung Darat (*Ipomoea Reptans Poir*) pada Lahan Pertanian Organik dan Konvensional. *Jurnal HPT*. 2(1): 19-28.
- Azzahra N., Jamilatun, M., Aminah A. “Perbandingan Pertumbuhan *Aspergillus fumigatus* pada Media Instan Modifikasi *Carrot Sucrose Agar* dan *Potato Dextrose Agar*”. *Jurnal Mikologi Indonesia*. 4 no. 1 (2020): h. 1668-174.
- [Balithi] Balai Penelitian Tanaman Hias. 2007. Pengelolaan hama dan penyakit tanaman hias di rumah plastik. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. 29(6):16-17.
- Cappucino, J. G., & Sherman, N. (2014). *Manual Laboratorium Mikrobiologi, Edisi 8*. EGC, Jakarta.
- Fitriana, dkk. “Penelusuran Fungi Endofit Sebagai Penghasil Senyawa Antibiotika dari Daun Nanas (*Ananas comosus* (L) Meer)”. *As-Syifaa*. 8 no. 1 (2016): h. 01-08.
- Gazis R, Chaverris P. 2010. Diversity of fungal endhophyte in leaves and stem of wild rubber tress (*Hevea brasiliensis*) in Peru [CD-ROM]. *Fungal Ecology*. 3:240- 254.
- Hanudin, W., dkk. “Perbandingan Teknik Inokulasi *Puccinia horiana* dan Seleksi Bakteri Antagonis untuk Mengendalikan Penyakit Karat Putih pada Krisan”. *J. Hort*. 21 no. 2 (2011): h. 173-184
- Hanudin, W., Nuryani, E., & Marwoto B. “Induksi Resistensi Tanaman Krisan Terhadap *Puccinia horiana* P. Henn. dengan Menggunakan Ekstrak Tanaman Elisitor”. *J. Hort*. 26 no. 2 (2016): h. 245-256.

- Hayati, N.Q., Nurmalinda, & Budi Marwoto. "Inovasi Teknologi Tanaman Krisan yang Dibutuhkan Pelaku Usaha (Technology Innovation of Chrysanthemum Needed by Stakeholders)". *J. Hort.* 28 no. 1 (2018): h. 147-162.
- Irawati A.F.C, Sri Hartati & Ratna D.H. Windriyati. "Pemanfaatan Cendawan Endofit Dalam Meningkatkan Kualitas Bibit Tanaman Padi". *Buletin Pertanian Perkotaan.* 4 no. 2 (2014): h. 30-40.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahnya.* Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2012.
- Kusari S, Verma VC, Lamshoeft M, Spitteller M. 2012. An endophytic fungus from *Azadirachta indica* juss that produces azadirachtin. *World J Microbiol Biotechnol.* 28:1287-1294.
- Lala, Karel F., dan Max Tulung. "Pengendalian Penyakit Karat Putih (*Puccinia horiana*) dengan Menggunakan Bakteri Antagonis Pada Tanaan Krisan". *Jurnal ENFiT.* 1 no. 1 (2019): h. 36-45.
- Lydianthy, H & Nihayati, E. "Pengaruh Penggunaan Zat Pengatur Tumbuh BAP dan NAA Terhadap Presentase Tumbuh Bahan Tanam Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) secara *in vitro*". *Jurnal Produksi Tanaman.* 7 no. 10 (2019): h. 1878-1884.
- Petrini, O. & Fisher, P.J. (1988) A Comparative Study of Fungal Endophytes in Xylem and Whole Stem of *Pinus sylvestris* and *Fagus sylvatica*. *Transactions of the British Mycological Society.* 91 (2), 233–238.
- Posangi J & Bara RA. "Analisis Aktivitas dari Jamur Endofit yang Terdapat dalam Tumbuhan Bakau *Avicennia marina* di Tasik Ria Minahasa". *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis.* 1 no. 1 (2014): h. 30-38.
- Prihatiningtias WM dan Sri W. Aktivitas Antibakteri Fungi Endofit dari *Thievalia polygonoperda*, Isolat dari Tumbuhan Akar Kuning (*Fibraurea chloroleuca* Miers). *Majalah Obat Tradisional* 2011;16.
- Radiastuti, N. (2015). *Diversity of Culturable Endophytic Fungi in Cinchona calisaya Wedd: Molecular Phylogeny and Alkaloid Profile.* Thesis. IPB: Bogor.
- Rayner ADM, 1991. *The challenge of the individualistic mycelium.* *Mycologia* 83: 48-71.
- Schaad NW, Jones JB dan Chun W, 2001. *Laboratory guide for the identification of plant pathogenic bacteria* (No. Ed.3). *American Phytopathological Society* (APS Press).
- Semangun H. 2007. *Penyakit-penyakit Tanaman Hortikultura di Indonesia.* Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University press.
- Shihab, Q. *Tafsir Al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati, 2015.


- Shivas R dan Beasley D, 2005. Pengelolaan Koleksi Patogen Tanaman. Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemerintah Australia (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, DAFF).
- Sopialena, dkk. “Efektivitas Cendawan Endofit Sebagai Pengendali Penyakit BLAST Pada Tanaman Padi (*Oryza sativa*)”. *Jurnal AGRIFOR*. XIX no. 2 (2020): h. 355-366.
- Strobel, G. et al. (2004) ‘Natural Products from Endophytic Microorganisms’. *Journal of Natural Products*. 67(2), pp. 257–268.
- Suhardi 2009. Sumber inokulum, respons varietas, dan efektivitas fungisida terhadap penyakit karat putih pada tanaman krisan. *J. Hort*. 19 no 2 h: 207–209.
- Suhartina, dkk. “Isolasi dan Identifikasi Jamur Endofit Pada Tumbuhan Paku *Asplenium nidus*. *Jurnal MIPA UNSRAT Online*. 7 no 2 (2018): h. 24-28.
- Suryanarayanan TS, Thirunavukkarasu N, Govindarajulu MB, Sasse F, Jansen R, Murali TS. 2009. “Fungal Endophytes and Bioprospecting”. *Fungal Biol Rev*. 23(1- 2):9-19.
- Susilowati, D.N., dkk. “Keragaman Cendawan Endofit pada Akar, Daun, Stolon, dan Tangkai Daun Pegagan (*Centella asiatica*)”. *Bulletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat*. 30 no. 1 (2019): h. 47-58.
- Sutarman. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Tanaman*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Tao, G., Liu, Z., Sun, B., Zhu, Y., Cai, L. & Liu, X. (2012) Occurance and Diversity of Endophytic Fungi in *Btettilla ochraceae* (Orchidaceae). *African Journal of Microbiology Research*. 6 (12), 2859–2868.
- Thalib, F. dan S. Lim. 2008. *Pengembangan Sistem Pengairan Otomatis pada Tanaman Krisan di Rumah Kaca Berbasis Mikrokontroler*. *Prosiding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2008)*. Universitas Gunadarma. Depok. Hal.8-15.
- Trizelia & Winarto. “Keanekaragaman Jenis Cendawan Entomopatogen Endofit Pada Tanaman Kakao (*Theobroma cacao*). *PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON*. 2 no. 2 (2016): h. 277-281.
- Widiastuti, L., Tohari, dan E. Sulistyaningsih. 2004. Pengaruh intensitas cahaya dan kadar darminosida terhadap iklim mikro dan pertumbuhan dan pembungaan tanaman krisan dalam pot. *Jurnal Ilmu Pertanian* 11: 35-42.
- Wilia, W., dkk. “Eksplorasi Cendawan Endofit dari Tanaman Padi Sebagai Agens Pemacu Pertumbuhan Tanaman”. *Program Studi Agroekoteknologi*. 1 no. 4 (2012): h. 299-304.

LAMPIRAN


- **Isolasi Cendawan Endofit pada Tanaman Krisan**









- Hasil Peremajaan Cendawan Endofit







RIWAYAT HIDUP



Nur Ahyani dengan nama panggilan Yaya, lahir di Takalar pada tanggal 02 Juli 2000 dari pasangan suami istri Bapak H. Sapihuddin dan Ibu Hj. Rahmawati. Penulis merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Penulis sekarang bertempat di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Penulis mengawali jenjang pendidikan di SDN 197 Inpres Bontopajja tahun 2005-2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Galesong Utara tahun 2011-2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Takalar pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Biologi. Dengan ketekunan dan motivasi untuk terus belajar dan berusaha, pada tahun 2023 penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Potensi Cendawan Endofit Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) sebagai Anti Penyakit Karat Putih**”.