

Editor :
Ahmad Efendi

BIOINFORMATIKA DNA DAN PROTEIN

Maswati Baharuddin



BIOINFORMATIKA DNA DAN PROTEIN

MASWATI BAHARUDDIN

PENERBIT



2025

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BIOINFORMATIKA DNA DAN PROTEIN

Ukuran unesco : (15,5 x 23 cm)

Halaman : vi + 152

Isbn : 978-634-7107-14-5

Penulis : Maswati Baharuddin

Editor : Ahmad Efendi

Layout &

Desain Cover : Tim Creative Rizmedia

RIZMEDIA PUSTAKA INDONESIA

Redaksi :

Jl. Affandi/Griya Astra Blok C. No.18

(Yogyakarta/Makassar)

IKAPI : 035/SSL/2022

Telp/Wa:085242065812

Email:rizmediapustaka@gmail.com

Website : www.rizmediapustakaindonesia.com

Cetakan Pertama, Maret 2025

Hak Cipta 2025 @Rizmedia Pustaka Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku **"BIOINFORMATIKA DNA DAN PROTEIN"** ini dapat tersusun dan hadir di tengah pembaca. Buku ini ditulis sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bioinformatika, sebuah disiplin ilmu yang menggabungkan biologi, ilmu komputer, matematika, dan statistika dalam menganalisis serta menginterpretasi data biologis, khususnya yang berkaitan dengan DNA dan protein.

Perkembangan teknologi di bidang genomik dan proteomik telah menghasilkan data dalam jumlah besar yang memerlukan metode analisis yang efisien dan terstruktur. Bioinformatika hadir sebagai solusi untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data biomolekul yang kompleks, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap informasi genetik dalam suatu organisme. Dengan pendekatan komputasional, sekuens DNA dapat dianalisis untuk memahami pola genetik, fungsi gen, serta mutasi yang berpotensi memengaruhi kesehatan manusia.

Selain DNA, protein juga menjadi fokus utama dalam bioinformatika karena perannya yang krusial dalam hampir semua proses biologis. Melalui analisis bioinformatika, struktur dan fungsi protein dapat dikaji untuk memahami interaksi seluler

dan mendukung pengembangan obat serta terapi berbasis molekuler. Dengan demikian, bioinformatika memiliki kontribusi besar dalam penelitian biomedis, bioteknologi, dan ilmu hayati secara luas.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, serta siapa saja yang tertarik untuk mendalami bidang bioinformatika. Semoga buku ini dapat membuka wawasan dan memberikan inspirasi bagi pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di era digital yang semakin berkembang pesat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Saran dan masukan dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi mendatang.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 STRUKTUR ASAM NUKLEAT.....	4
BAB 3 STRUKTUR PROTEIN	8
BAB 4 Hubungan DNA dan Protein.....	12
BAB 5 NCBI.....	15
BAB 6 APLIKASI MEGA 11	25
BAB 7 EXPASY	34
BAB 8. KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes)	48
BAB 9 MEME SUITE.....	68
BAB 10. SWISS MODEL	87
BAB 11. PyMOL.....	108
BAB 12. ANTISMASH.....	121
BAB 13 APLIKASI DALAM RISET ENZIM.....	130
BAB 14 DOCKING	136
DAFTAR PUSTAKA	150
PROFIL PENULIS	152




BAB 1

PENDAHULUAN

Bioinformatika adalah disiplin ilmu yang menggabungkan biologi, ilmu komputer, matematika, dan statistika untuk menganalisis serta menginterpretasi data biologis, khususnya yang terkait dengan DNA dan protein. Perkembangan teknologi telah memungkinkan pengumpulan data genomik dan proteomik dalam jumlah besar, yang memerlukan metode analisis yang efisien dan terstruktur. Bioinformatika memegang peranan penting dalam mengatasi tantangan ini, terutama dalam penguraian, penyimpanan, dan analisis data biomolekul kompleks seperti DNA dan protein. Studi DNA melalui pendekatan bioinformatika memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang informasi genetik yang terkandung dalam suatu organisme. DNA (Deoxyribonucleic Acid) berfungsi sebagai penyimpan instruksi biologis yang menentukan karakteristik organisme.

Melalui bioinformatika, sekuens DNA dapat diidentifikasi, dianalisis, dan disandingkan dengan data genetik lainnya untuk memahami pola genetik, fungsi gen, mutasi yang mungkin terjadi, serta dampaknya terhadap kesehatan. Protein, sebagai hasil ekspresi gen, juga merupakan fokus penting dalam bioinformatika. Protein terlibat dalam hampir semua proses biologis dan menentukan banyak fungsi seluler. Dengan bantuan bioinformatika, struktur dan fungsi protein dapat dianalisis melalui pendekatan komputasional.

Hal ini penting untuk memahami mekanisme protein dalam interaksi seluler dan dalam pengembangan obat, di mana protein sering kali menjadi target utama.



BAB 2
STRUKTUR ASAM NUKLEAT

DNA (Deoxyribonucleic Acid) adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dan merupakan cetak biru biologis yang mengarahkan fungsi serta karakteristik organisme hidup. Dalam bioinformatika, studi DNA memfokuskan pada analisis struktur dan fungsinya untuk memahami bagaimana informasi genetik dikodekan, diwariskan, dan diinterpretasikan oleh sel.

1. Struktur DNA: Perspektif Bioinformatika

Secara struktural, DNA berbentuk double helix yang terdiri dari dua rantai nukleotida yang saling berpilin. Setiap nukleotida terdiri dari:

- Gula deoksiribosa
- Fosfat
- Basa nitrogen: yang bisa berupa Adenin (A), Timin (T), Sitosin (C), atau Guanin (G)

Ikatan antara basa nitrogen yang komplementer (A-T dan C-G) membentuk jembatan yang menyatukan kedua untai DNA. Dalam bioinformatika, struktur ini dianalisis untuk memahami pola sekuens yang menjadi dasar ekspresi gen, mutasi, serta variasi genetik pada populasi.

2. Fungsi DNA dalam Penyimpanan dan Transfer Informasi Genetik

DNA berfungsi sebagai "manual instruksi" yang mengarahkan sintesis protein dan aktivitas seluler. Bioinformatika memanfaatkan sekuens DNA untuk mengidentifikasi gen, memahami pola ekspresi, dan menentukan fungsionalitasnya.

Beberapa fungsi utama DNA, ditinjau dari perspektif bioinformatika, meliputi:

Replikasi DNA: Proses penggandaan DNA yang terjadi saat sel membelah. Analisis bioinformatika membantu mengidentifikasi elemen-elemen yang penting dalam replikasi, seperti *oriC* pada prokariota yang merupakan titik awal replikasi.

Transkripsi dan Translasi: Proses pembentukan RNA dari DNA yang pada akhirnya menghasilkan protein. Bioinformatika memungkinkan analisis daerah promoter, enhancers, dan elemen regulasi lainnya yang mengontrol transkripsi.

Variasi Genetik dan Mutasi: Perubahan dalam sekuens DNA, seperti mutasi, dapat memengaruhi fungsi gen. Bioinformatika memungkinkan deteksi variasi genetik, seperti SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms), yang dapat berdampak pada kesehatan dan variasi sifat individu dalam populasi.

3. Bioinformatika dalam Analisis Struktur DNA

Bioinformatika memiliki peran krusial dalam menganalisis struktur DNA untuk berbagai tujuan, antara lain:

Sequence Alignment: Penyelarasan sekuens DNA membantu mengidentifikasi kesamaan antar spesies atau antara pasien dan referensi genom untuk mengidentifikasi varian genetik.

Genomic Mapping: Mengidentifikasi lokasi gen atau marker genetik tertentu dalam genom. Alat bioinformatika, seperti BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), digunakan untuk mencari sekuens DNA yang mirip dalam database, membantu dalam anotasi gen.

Pengurutan (Sequencing): Dengan teknologi pengurutan seperti NGS (Next-Generation Sequencing), bioinformatika mengolah data sekuens dalam jumlah besar, membantu mengidentifikasi mutasi yang mungkin terkait dengan penyakit atau karakteristik genetik spesifik.

4. Aplikasi Bioinformatika dalam Analisis Fungsional DNA

Bioinformatika juga membantu dalam memahami fungsi DNA melalui teknik berikut:

Anotasi Genomik: Proses identifikasi elemen fungsional dalam sekuens DNA, seperti gen pengkode protein dan elemen regulasi. Anotasi ini membantu menentukan fungsi dari sekuens yang ditemukan dalam penelitian genomik.

Prediksi Struktur dan Regulasi Genetik: Bioinformatika memungkinkan prediksi struktur gen, serta memahami bagaimana regulasi gen terjadi. Misalnya, melalui analisis motif pada sekuens DNA untuk menemukan elemen pengikat yang mengatur ekspresi gen.

Studi Ekspresi Gen: Teknik seperti RNA-Seq memungkinkan bioinformatika memetakan pola ekspresi gen untuk memahami bagaimana gen dinyatakan dalam kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi penyakit atau respons terhadap lingkungan.



BAB 3

STRUKTUR PROTEIN

Protein adalah molekul esensial yang melakukan berbagai fungsi biologis dalam sel, mulai dari katalisis reaksi biokimia hingga peran struktural dan regulasi. Bioinformatika menyediakan berbagai metode dan alat untuk memahami struktur, fungsi, dan interaksi protein secara mendalam, yang penting untuk riset dalam bidang kesehatan, bioteknologi, dan sains dasar.

1. Struktur Protein

Struktur protein dapat dibagi menjadi empat tingkatan:

Struktur Primer: Urutan linear asam amino yang membentuk protein. Bioinformatika memainkan peran penting dalam menganalisis sekuens ini untuk memahami komposisi protein dan memprediksi sifat-sifatnya.

Struktur Sekunder: Penggulungan lokal pada rantai protein yang membentuk heliks alfa atau lembar beta. Alat bioinformatika, seperti PredictProtein, membantu dalam memprediksi elemen struktur sekunder berdasarkan urutan asam amino.

Struktur Tersier: Susunan tiga dimensi keseluruhan dari satu rantai polipeptida. Struktur ini penting untuk fungsi protein dan biasanya diprediksi menggunakan alat seperti AlphaFold atau MODELLER.

Struktur Kuartener: Susunan dari beberapa rantai polipeptida dalam kompleks protein. Bioinformatika memungkinkan pemodelan kompleks multi-subunit, yang membantu memahami interaksi antar subunit.

2. Fungsi Protein

Fungsi protein ditentukan oleh urutan asam aminonya dan struktur tiga dimensinya. Bioinformatika menganalisis struktur dan urutan untuk menentukan fungsi protein, terutama dengan teknik berikut:

Prediksi Fungsi Berbasis Homologi: Protein yang memiliki urutan atau struktur serupa sering kali memiliki fungsi serupa. Dengan menggunakan perangkat lunak seperti BLAST, peneliti dapat menyelaraskan urutan protein baru dengan protein yang sudah diketahui untuk memprediksi fungsinya.

Anotasi Fungsional: Alat seperti InterPro dan GO (Gene Ontology) memberikan anotasi yang mengelompokkan protein ke dalam fungsi biologis, proses seluler, dan komponen seluler.

Analisis Motif dan Domain: Beberapa bagian dari protein mengandung motif atau domain yang sangat spesifik dan terkait dengan fungsi tertentu, seperti domain katalitik pada enzim. Bioinformatika mengidentifikasi elemen-elemen ini menggunakan alat seperti Pfam atau SMART.

3. Pemodelan Struktur Protein

Memahami struktur protein sangat penting untuk aplikasi dalam biomedis dan bioteknologi. Beberapa pendekatan bioinformatika untuk pemodelan struktur protein meliputi:

Homology Modeling: Menggunakan struktur protein homolog sebagai template untuk memodelkan protein target. Alat seperti Swiss-Model memungkinkan prediksi struktur dengan menggunakan sekuens protein yang homolog.

Protein Docking: Analisis interaksi protein-protein atau protein-ligand sangat penting dalam desain obat. Docking memprediksi posisi relatif dua molekul yang berinteraksi, menggunakan alat seperti AutoDock atau ClusPro.

Prediksi Struktur dari Urutan: Algoritma machine learning seperti yang digunakan dalam AlphaFold memungkinkan prediksi struktur protein yang akurat langsung dari urutan asam amino tanpa template.

4. Interaksi Protein dan Jaringan Protein

Protein berfungsi tidak hanya secara individu tetapi juga sebagai bagian dari jaringan yang kompleks dalam sel. Bioinformatika memungkinkan analisis interaksi dan jaringan protein, yang penting untuk memahami fungsi seluler yang kompleks:

Protein-Protein Interaction (PPI): Data PPI mengidentifikasi bagaimana protein berinteraksi untuk membentuk kompleks fungsional. Alat seperti STRING atau Cytoscape digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan ini.

Pathway Analysis: Analisis jalur metabolik dan signal transduction pathway membantu memahami bagaimana protein bekerja bersama dalam proses biologis tertentu. Alat seperti KEGG dan Reactome membantu memetakan protein ke dalam jalur biologis yang relevan.

Network Analysis: Analisis jaringan menggunakan pendekatan topologi untuk mengidentifikasi protein yang berperan sebagai pengatur atau pusat dalam jaringan seluler.



BAB 4

Hubungan DNA dan Protein



Informasi yang terkandung dalam DNA direpresentasikan dalam urutan basa nitrogen (adenin [A], sitosin [C], guanin [G], dan timin [T]). Rangkaian nukleotida ini menyimpan "instruksi" untuk membangun protein. Prosesnya dimulai dengan transkripsi, DNA digunakan sebagai cetakan untuk menghasilkan molekul mRNA. Selanjutnya, dalam proses translasi, mRNA diterjemahkan menjadi protein oleh ribosom yang membaca urutan kodon (triplet basa) pada mRNA dan menambahkan asam amino sesuai.

Proses Translasi: Kode Genetik menjadi Protein

Selama translasi, setiap kodon mRNA cocok dengan satu asam amino tertentu atau sinyal untuk memulai atau menghentikan proses sintesis protein. Kode genetik bersifat universal dan degeneratif, artinya banyak organisme menggunakan sistem kodon yang sama. Beberapa asam amino dikodekan oleh lebih dari satu kodon (misalnya, kodon UUU dan UUC sama-sama menyandikan asam amino fenilalanin).

DNA dengan urutan basa TACGGTCAATAG akan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Transkripsi DNA ke mRNA: Rantai DNA tersebut ditranskripsi menjadi mRNA dengan urutan komplementer: AUGCCAGUUAUC.
2. Translasi mRNA ke Protein: Ribosom membaca kodon mRNA tersebut sebagai:

AUG – Menandakan asam amino metionin (Met) dan sebagai sinyal awal.

CCA – Menyandakan asam amino prolin (Pro).

GUU – Menyandakan asam amino valin (Val).

AUC – Menyandakan asam amino isoleusin (Ile).

Hasilnya adalah polipeptida yang dimulai dengan Met-Pro-Val-Ile. Perubahan kecil dalam urutan DNA (mutasi) dapat mengubah asam amino tertentu dalam protein, yang kemudian dapat mengubah fungsi protein secara keseluruhan. Sebagai contoh, mutasi pada gen CFTR yang menyebabkan cystic fibrosis terjadi karena perubahan kecil pada urutan DNA, yang menyebabkan perubahan dalam protein CFTR sehingga tidak berfungsi dengan benar untuk mengatur keseimbangan ion di sel. Misalnya:

Mutasi del508 pada gen CFTR menyebabkan hilangnya tiga nukleotida sehingga menyebabkan hilangnya asam amino fenilalanin pada posisi 508. Akibatnya, protein CFTR tidak bisa melipat dengan benar, menyebabkan disfungsi dalam transport ion klorida, yang pada akhirnya menyebabkan gejala cystic fibrosis.

Prediksi struktur protein adalah proses penting untuk memahami fungsi protein berdasarkan urutan asam amino.



BAB 5

NCBI

NCBI menyediakan berbagai macam database yang sangat berguna bagi para peneliti di bidang biologi dan kesehatan. Database-database ini berisi informasi lengkap tentang sekuen DNA, protein, struktur molekul, hingga literatur ilmiah yang relevan.

Semua sumber daya, menyediakan akses ke berbagai database dan alat penelitian di bidang bioteknologi, genetika dan kesehatan. Fungsinya adalah memudahkan peneliti untuk menemukan informasi yang relevan.

1. Bahan kimia dan bioassay, menyediakan informasi tentang bahan kimia yang digunakan dalam penelitian dan metode pengujian biologis. Fungsinya adalah membantu peneliti dalam merancang eksperimen dan memahami efek bahan kimia.
2. Data dan perangkat lunak, menawarkan akses ke berbagai jenis data biologi dan perangkat lunak analisis. Fungsinya adalah untuk membantu pengguna dalam analisis data genetik dan bioinformatika.
3. DNA dan RNA, menyediakan informasi tentang struktur, fungsi, dan analisis DNA dan RNA. Fungsinya adalah memberikan sumber daya untuk penelitian genetika dan biologi molekuler.
4. Domain dan struktur, menawarkan informasi tentang domain protein dan struktur molekul. Fungsinya adalah untuk memahami interaksi protein dan fungsi biologisnya.

5. Gen dan ekspresi, menyediakan data tentang gen dan bagaimana ekspresi gen dikendalikan. Fungsinya adalah untuk mendalami mekanisme regulasi gen dan dampaknya terhadap fenotipe.
6. Genetika dan obat, menyediakan informasi tentang hubungan antara genetika dan pengembangan obat. Fungsinya adalah untuk membantu dalam penelitian obat berbasis genetika dan terapi gen.
7. Genom dan peta, menawarkan data tentang genom berbagai organisme dan peta genetiknya. Fungsinya adalah untuk memudahkan penelitian genomik dan perbandingan antar spesies.
8. Homologi, menyediakan informasi tentang kesamaan genetik antar spesies. Fungsinya adalah untuk membantu dalam studi evolusi dan fungsionalitas gen.
9. Sastra, mungkin merujuk pada publikasi dan artikel ilmiah yang relevan dengan bioteknologi dan genetika. Fungsinya adalah untuk memberikan konteks dan pengetahuan dari sudut pandang sains.
10. Protein, menyediakan informasi tentang struktur, fungsi, dan interaksi protein. Fungsinya adalah untuk mendalami peran protein dalam berbagai proses biologis.
11. Analisis sekuensi, menawarkan alat untuk menganalisis urutan DNA, RNA, dan protein. Fungsinya adalah untuk membantu peneliti dalam penelitian genomik dan proteomik.

12. Taksonomi, menyediakan klasifikasi organisme berdasarkan karakteristik genetik dan morfologis. Fungsinya adalah untuk membantu dalam identifikasi spesies dan studi biodiversitas.

Fitur umum yang sering digunakan dalam web NCBI sebagai berikut:

PubMed. Menyimpan database yang berisi jutaan referensi publikasi ilmiah di bidang biomedis dan digunakan untuk mencari artikel ilmiah berdasarkan judul, penulis, jurnal atau kata kunci tertentu.

Bookshelf. Tempat koleksi buku teks dan referensi online gratis yang berhubungan dengan biomedis dan digunakan sebagai sumber informasi yang komprehensif dan mudah diakses untuk berbagai topik dalam biologi.

PubMed Central (PMC) berfungsi menyimpan arsip akses terbuka (*open access*) untuk artikel ilmiah di bidang biomedis dan digunakan untuk menyediakan akses gratis ke artikel-artikel ilmiah yang telah diterbitkan.

BLAST berfungsi sebagai alat untuk membandingkan sekuen biologis DNA, RNA atau protein dengan database yang sangat besar dan digunakan untuk mengidentifikasi gen baru, mempelajari evolusi dan merancang primer PCR.

Nucleotide berfungsi menyimpan database yang berisi koleksi sekuen nukleotida DNA dan RNA dari berbagai organisme dan

digunakan untuk mencari informasi tentang gen tertentu, mempelajari variasi genetik dan merancang probe molekuler.

Genome berfungsi menyimpan database yang berisi genom lengkap dari berbagai organisme dan digunakan untuk mempelajari struktur dan fungsi genom, mengidentifikasi gen baru dan mempelajari evolusi genom.


SNP berfungsi menyimpan database yang berisi informasi tentang variasi genetik tunggal (*single nucleotide polymorphism*) dan digunakan untuk mempelajari hubungan antara variasi genetik dengan penyakit, sifat fenotip dan respon terhadap obat.

Gene berfungsi menyimpan database yang berisi informasi tentang gen termasuk lokasi, fungsi dan variasi genetik dan digunakan untuk mempelajari fungsi gen, mengidentifikasi gen yang terkait dengan penyakit dan merancang terapi gen.

Protein berfungsi menyimpan database yang berisi informasi tentang struktur dan fungsi protein dan digunakan untuk mempelajari struktur protein, memprediksi fungsi protein dan merancang obat.

PubChem berfungsi menyimpan database yang berisi informasi tentang senyawa kimia, termasuk struktur kimia, sifat fisikokimia dan aktivitas biologis dan digunakan untuk

menemukan senyawa kimia baru, mempelajari mekanisme aksi obat dan merancang obat baru.



Prosedur Kerja NCBI (Nukleotida)

Pertama-tama klik "all database", kemudian klik "nukleotida". Masukkan kata kunci spesies yang ingin diidentifikasi (misalnya, *Pseudomonas guguensis*), kemudian klik "search". Pilih salah satu diantara beberapa data yang muncul (misalnya, kita pilih data yang teratas atau yang sering digunakan dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti). Pilih "send to" sebelah kanan atas, kemudian klik "completed record", klik "file", lalu klik "gank bank", klik "fasta" dan pilih "create file" untuk menyimpan data dari spesies yang kita cari

Prosedur kerja NCBI (Gen dan Expression)

The screenshot shows the NCBI homepage with a dark blue header containing the NIH logo and 'National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information'. A search bar is located below the header. The main content area is divided into several sections: a left sidebar with navigation links, a central 'Welcome to NCBI' section with icons for Submit, Download, Learn, Develop, Analyze, and Research, and a right sidebar with 'Popular Resources' and 'NCBI News & Blog'.

Pertama-tama buka web NCBI melalui google, kemudian klik fitur “Genes dan Expression” sebelah kiri

Kemudian klik “All database” dan pilih “Gene”, setelah itu masukkan kode spesies yang ingin diidentifikasi (Misalnya, enzim protease), lalu scroll kebawah dan klik “Gene”. Setelah itu, akan muncul beberapa data dari spesies yang ingin kita identifikasi,

i Some portions of our website are experiencing intermittent outages, and E-utilities requests may take longer than normal to complete. We apologize for the inconvenience and thank you for your patience as we resolve the issue.

Gene [Create RSS](#) [Save search](#) [Advanced](#) [Help](#)

- Gene sources
- Genomic
- Mitochondria
- Organelles
- Plasmids
- Plastids

- Categories
- Alternatively spliced
- Annotated genes
- Non-coding
- Protein-coding
- Pseudogene

- Sequence content
- CCDS
- Ensembl
- RefSeq
- RefSeqGene

Tabular 20 per page Sort by Relevance Send to

Hide sidebar >>

See [protease:protease](#) in the Gene database
[protease in Pigeon adenovirus.1](#) [Surgeon ichtadenovirus A](#) [Jaagsiekte sheep retrovirus](#) [All 28 Gene records](#)

Search results

Items: 1 to 20 of 439727 Selected: 1

<< First < Prev Page 1 of 21987 Next > Last >>

i See also [118689 discontinued or replaced items](#).

Name/Gene ID	Description	Location	Aliases	MIM
<input checked="" type="checkbox"/> protease ID: 1490019	neutral protease large subunit [Jaagsiekte sheep retrovirus]	NC_001494.1 (1993.2862)	Opavgp2	
<input type="checkbox"/> protease ID: 6291429	protease [Pigeon adenovirus.1]	NC_024474.1 (23977.24604)	IJ17_gp18	

Filters: [Manage Filters](#)

Results by taxon

- Top Organisms [\[Tree\]](#)
- [Triticum aestivum \(1865\)](#)
- [Homo sapiens \(1453\)](#)
- [Triticum dicoccoides \(1261\)](#)
- [Hibiscus sylvaticus \(1065\)](#)
- [Mus musculus \(1005\)](#)
- [All other taxa \(433078\)](#)

More...

Find related data

Database:

kemudian pilih salah satu dari beberapa data yang muncul (Misalnya, data pertama) setelah muncul data

i Some portions of our website are experiencing intermittent outages, and E-utilities requests may take longer than normal to complete. We apologize for the inconvenience and thank you for your patience as we resolve the issue.

Gene

- NCBI Home
- Resource List (A-Z)
- All Resources
- Chemicals & Bioassays
- Data & Software
- DNA & RNA
- Domains & Structures
- Genes & Expression**
- Genetics & Medicine
- Genomes & Maps
- Homology
- Literature
- Proteins
- Sequence Analysis
- Taxonomy

Genes & Expression

- All
- Databases
- Downloads
- Submissions
- Tools
- How To

Databases

[BioProject \(formerly Genome Project\)](#)

A collection of genomics, functional genomics, and genetics studies and links to their resulting datasets. This resource describes project scope, material, and objectives and provides a mechanism to retrieve datasets that are often difficult to find due to inconsistent annotation, multiple independent submissions, and the varied nature of diverse data types which are often stored in different databases.

[ClinVar](#)

A resource to provide a public, tracked record of reported relationships between human variation and observed health status with supporting evidence. Related information in the [NIH Genetic Testing Registry \(GTR\)](#), [MedGen](#), [Gene](#), [OMIM](#), [PubMed](#) and other sources is accessible through hyperlinks on the records.

[Consensus CDS \(CCDS\)](#)

A collaborative effort to identify a core set of human and mouse protein coding regions that are consistently annotated and of high quality.

Quick Links

- [BioProject \(formerly Genome Project\)](#)
- [Database of Genotypes and Phenotypes \(dbGaP\)](#)
- [Gene](#)
- [Gene Expression Omnibus \(GEO\) Database](#)
- [Gene Expression Omnibus \(GEO\) Datasets](#)
- [Gene Expression Omnibus \(GEO\) Profiles](#)
- [Online Mendelian Inheritance in Man \(OMIM\)](#)
- [RefSeqGene](#)
- [E-Utilities](#)

Reference assembly

Genomic

1. [NC_001494.1 Reference assembly](#)

Range [GenBank](#), [FASTA](#), [Sequence Viewer \(Graphics\)](#)

Download

mRNA and Protein(s)

1. [NP_041185.1 neutral protease large subunit \[Jaagsiekte sheep retrovirus\]](#)

[See identical proteins and their annotated locations for NP_041185.1](#)

Status: PROVISIONAL

UniProtKB/TrEMBL [Q09PK9](#)

Conserved Domains (3) [summary](#)

smart00443 Location:243 → 288	G_patch; glycine rich nucleic binding domain
pfam00077 Location:144 → 242	RVP; Retroviral aspartyl protease
pfam00692 Location:11 → 133	dUTPase; dUTPase

identifikasi scroll kebawah lalu klik "See Identical Proteins....."

Setelah itu, klik data pertama didalam kolom untuk memperoleh hasil identifikasi gen spesies yang kita cari

INSDC	M80216.1 1993-2862 (+)	AAA89181.1	neutral protease large subunit	Jaagsiekte sheep retrovirus	GCA_000850005.1
-------	---	----------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------

Hasil akhir spesies data berupa urutan pasangan asam amino

/translation="MGHTHSRQLFVHMLSVMLKHRGITVSKTKLINFLSFIIEVCPWF
 PREGTVNLETWKKVGEQIRTHYTLHGPEKVPVETLSFWTLIRDCDFDNDDELKRLGNL
 LKQEEDPLHTPDSVSPYDPPPPPPPSLKMHPSDNDDSLSSSTDEAE LDEEAAKYHQEDW
 GFLAQEKGALTSKDELVECFKNLTIALQNAGIQLPSNNNTFPSAPPPPAYTPTVMAG
 LDPPPGFPPPSKHMSP LQKALRQAQRLGEVVSDFSLAFPVFENNNQRYYESLPFKQLK
 ELKIACSQYGPTAPFTIAMIESLGTQALPPNDWKQTARACL SGGDYLLWKS EFFEQCA
 RIADVNRQQGIQTSYEMLIGEGPYQATDTQLNFLPGAYAQISMAARQAWKKLPSSSTK
 TEDLSKVRQGPDEPYQDFVARLLDTIGKIMSDEKAGMVLAKQLAFENANSACQAALRP
 YRKKGDLSDFIRICADIGPSYMQGIAMAAALQGKSIKEVLFQQQARNKKGLQKSGNSG
 CFVCGQPGHRAAVCPQKHQTSVNTPNLCPRCKKGGKHWARDCRSKTDVQGNPLPPVSGN
 WVRGQPLAPKQCYGATLQVPKEPLQTSVEPQEAARDWTSVPPPIQY"

ORIGIN

```

1 atgttatggg gcaacactgc aggttccaaa agaaccattg cagacctctg tcgagccaca
61 agaggcagcg cgggattgga cctctgtgcc acctcctata cagtattaac ccctgagatg
121 ggagttcaaa ctcttgccac aggagtgttt gggcctttac ctccaggagc agttggatta
181 ctcttgggac gcagcagtgc gtctttaaag ggaatactta ttcaccctgg tgttattgac
241 tccgattata caggagagat aaaaatatta gcctccgctc ctaacaaaat tattgtaatt
301 aatgcgggac agcgaatagc tcaacttctt ttagttccat tagtcataca gggaaaaaca
361 attaacagag accgtcaaga taaaggtttc ggatcctctg acgcctattg ggtgcaaaa
421 gttactgagg cacggccaga actcgagcta cgcattaatg caaacttttt ccgcgggta
481 ctagatacag gggccgatat tagtgtcatt tctgataaat attggcctac cacatggcca
541 aaacagatgg ctatttcac tctccagggt attggcctac ctaccaatcc agaacagagt
601 tcatcccttc ttacttggaa ggataaaagt ggacatacag gccaatttaa accttatatt
661 ctgccctatc ttccagttaa tctatggggg cgtgatata taagcaaaat ggggttttt
721 ttatatagtc cttcaccac tgtgacagat ttgatgttag atcagggtctt acttccaaat
781 caaggtttag gtaaacaca tcaaggcatc attttcccc ttgatttaaa acctaatcaa
841 gatcgaaaag gcttgggggtg ttttcctag

```

//

Jaagsiekte sheep retrovirus, complete genome

NCBI Reference Sequence: NC_001494.1

[FASTA](#) [Graphics](#)

Go to:

LOCUS NC_001494 870 bp ss-RNA linear VRL 13-AUG-2018
 DEFINITION Jaagsiekte sheep retrovirus, complete genome.
 ACCESSION [NC_001494](#) REGION: 1993..2862
 VERSION NC_001494.1
 DBLINK BioProject: [PRJNA485481](#)
 KEYWORDS RefSeq.



BAB 6

APLIKASI MEGA 11

Mega 11 merupakan sebuah perangkat lunak yang sangat populer dan kuat dalam bidang bioinformatika, khususnya untuk analisis filogenetik. Selain itu berfungsi untuk :

Membangun pohon filogenetik, pohon ini seperti silsilah keluarga untuk organisme, menunjukkan bagaimana berbagai spesies berevolusi dari nenek moyang yang sama.

Menganalisis data sekuen, dan lainnya.

A. Fitur-fitur yang terdapat pada MEGA 11:



Penjajaran Sejajar (*Align*): Fitur ini digunakan untuk menyusun urutan genetik sehingga bagian-bagian yang serupa dapat dibandingkan. Bayangkan seperti menyusun puzzle, hanya saja puzzle ini terbuat dari huruf-huruf genetik.

Data : Fitur ini dapat membaca berbagai jenis data genetik dan mengorganisasikannya dengan baik.

Models untuk menjelaskan bagaimana perubahan genetik terjadi seiring waktu. Jarak Genetik (*Distance*)

Fitur ini untuk menghitung seberapa jauh perbedaan genetik antara dua organisme. Semakin jauh jaraknya, semakin jauh pula hubungan kekerabatannya.

Keragaman Genetik (*Diversity*) :Fitur ini untuk dapat mengukur tingkat keragaman genetik dalam suatu populasi.

Pohon Filogenetik (*Phylogeny*). Fitur ini digunakan untuk membuat diagram yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai organisme. Pohon filogenetik ini seperti silsilah keluarga, tetapi untuk makhluk hidup.

User Tree. Fitur ini untuk membuat dan memodifikasi pohon filogenetik sesuai dengan hipotesis atau informasi yang sudah ada.

Ancestors. Fitur ini memungkinkan rekonstruksi urutan nenek moyang pada titik-titik tertentu dalam pohon filogenetik, dan membantu memahami evolusi karakter tertentu.

Analisis Seleksi (*Selection*). Fitur ini digunakan untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan cepat.

Rates. Fitur ini digunakan untuk memperhitungkan variasi laju evolusi yang berbeda pada sekuen, serta di antara garis keturunan sekuen yang berbeda.


Jam Molekuler (*Clocks*). Fitur ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa evolusi berdasarkan laju perubahan genetik.

Analisis Penyakit (*Disease*)


. Fitur ini digunakan untuk mempelajari hubungan antara variasi genetik dan penyakit tertentu.

Penggunaan MEGA 11 membuat pohon filogenetik


Hasil yang telah di download sekuennya dengan menggunakan fasta format akan dilakukan untuk membuat pohon filogenetik. Klik align kemudian pilih *edit/build alignment* Kemudian pilih *create new alignmen*




Kemudian akan muncul seperti pada gambar dibawah, pilih file yang telah didownload apakah yang ingin dibuat pohon filogenetiknya sekuen dari DNA atau Protein




1. Kemudian pilih *edit* dan pilih *insert sequence from file*



Masukkan file yang telah didownload tadi untuk membuat pohon filogenetik



Kemudian di blok (ctrl+A) dan pilih *align by Clustal W*, tujuannya untuk menyelaraskan beberapa sekuen biologis (seperti DNA, RNA atau protein) untuk mengidentifikasi daerah yang serupa dan berbeda di antara sekuen dan → klik OK.





Jika terdapat Gap atau kosong setelah dilakukan *align* berarti terdapat beberapa faktor, yaitu:


Perubahan pada urutan genetik yang menyebabkan penambahan atau penghapusan nukleotida atau asam amino. Kesalahan saat melakukan sequencing atau kesalahan dalam memasukkan data. Region yang tidak homolog berarti daerah pada sekuen yang tidak memiliki kesamaan evolusioner, sehingga tidak dapat di-align dengan baik.

Hasil dari gap kosong ini akan memberikan pengaruh terhadap: Pengaruh pada analisis filogenetik, Gap dapat mempengaruhi perhitungan jarak genetik dan konstruksi pohon filogenetik. Pengaruh pada prediksi struktur protein, Gap dapat mengganggu prediksi struktur sekunder dan tersier protein. Pengaruh pada

Setelah itu pilih data dan save session kemudian buka mega 11 dan pilih *phylogene* untuk membuat pohon filogenetik dan pilih *construct by UPGMA*




Gambar pohon filogenetik yang dihasilkan bisa dalam beberapa bentuk. Salah satu contohnya seperti diatas.



BAB 7
EXPASY

Web Expasy adalah portal bioinformatika yang dikelola oleh Institut Bioinformatika Swiss (SIB). Tujuan utama dari Expasy adalah menyediakan akses yang mudah dan terintegrasi ke berbagai sumber daya dan alat yang berhubungan dengan bioinformatika dan biologi molekuler.



ExpASY (Expert Protein Analysis System) didirikan pada tahun 1993 oleh Swiss Institute of Bioinformatics (SIB). Tujuannya adalah untuk menyediakan alat dan sumber daya online untuk analisis protein dan bioinformatika. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengelola dan menganalisis data protein yang semakin banyak akibat kemajuan dalam teknik biologi molekuler, seperti sequencing genom.

Sejak awal, ExPASy telah berkembang pesat, menambahkan berbagai alat dan basis data yang mendukung penelitian dalam proteomik, analisis struktur protein, dan interaksi protein. Platform ini menjadi salah satu sumber daya terkemuka dalam bidang bioinformatika, digunakan oleh peneliti di seluruh dunia untuk memahami fungsi dan karakteristik protein. ExPASy juga berkontribusi pada kolaborasi internasional dalam penelitian biologi, menyediakan akses terbuka kepada ilmuwan untuk data dan alat yang penting dalam studi protein.

Adapun tujuan dari penggunaan website ini adalah sebagai sumber informasi protein, mengetahui analisis enzim dan jalur metabolisme enzim, Sebagai sumber informasi bioinformatika dan analisis data. Selain itu juga sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran untuk mahasiswa dan peneliti serta sebagai sarana pengembangan terapi dan obat.

A. Fitur-Fitur Expasy

Beberapa fitur utama yang di sediakan dalam website ExPASy ini

- Gen & Genom**
 - Genomik
 - Metagenomik
 - Transkriptomik
- Protein & Proteom**
- Evolusi & Filogeni**
 - Evolusi biologi
 - Kekenyaanan populasi
- Biologi Struktural**
 - Desain obat
 - Kimia obat
 - Analisis struktural
- Sistem Biologi**
 - Glycomics
 - Lipidodotik
 - Metabolomics
- Penambangan teks & Pembelajaran mesin**

adalah sebagai berikut: *Gen & Genom*.

Fitur ini bertujuan untuk mengeksplorasi struktur, fungsi, dan ekspresi gen dalam genom maupun dalam komunitas mikroba.

Genomik

Alat-alat ini membantu dalam analisis dan anotasi genom, mengidentifikasi gen, dan memahami susunan DNA organisme.

Metagenomik

Fitur ini memungkinkan analisis DNA langsung dari lingkungan tanpa perlu

kultur, sehingga berguna untuk studi mikrobioma dan biodiversitas.

Transkriptomik. Analisis data RNA untuk memetakan ekspresi gen dalam kondisi tertentu, mempelajari regulasi gen, dan memahami respon seluler.

Protein & Proteom. Fitur ini bertujuan untuk mempelajari struktur, fungsi, dan interaksi protein dalam sistem biologis.

Proteomik. Expasy menyediakan alat untuk analisis protein, termasuk identifikasi, kuantifikasi, dan karakterisasi protein.

Evolusi & Filogeni. Fitur ini bertujuan untuk memahami asal-usul dan hubungan evolusi antara organisme.

a. Evolusi Biologi

Alat-alat yang memfasilitasi analisis evolusi gen dan protein untuk membuat pohon filogeni.

b. Kekenyalan Populasi

Alat ini berguna untuk studi struktur populasi, genetik populasi, dan variasi genetik.

1. *Biologi Struktural*

Fitur ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi molekul obat potensial berdasarkan struktur target biologis.

a. Desain Obat & Kimia Obat

Menyediakan alat untuk analisis interaksi molekul kecil dengan target protein dan membantu desain obat.

b. Analisis Struktural

Memungkinkan analisis bentuk dan interaksi molekul protein.

2. *Sistem Biologi*

Fitur ini bertujuan untuk memahami jaringan molekuler dalam sel dan sistem biologis.

a. Glycomics, Lipidomics, Metabolomics

Mengkaji jenis dan peran karbohidrat, lipid, dan metabolit dalam organisme.

3. *Penambangan Teks & Pembelajaran Mesin*

Fitur ini bertujuan untuk mempermudah eksplorasi literatur dan mendapatkan informasi dari data besar serta menyediakan alat untuk analisis teks ilmiah dan pembelajaran mesin, mendukung klasifikasi data dan analisis literatur ilmiah.


B. Prosedur Penggunaan Website Expasy (Translate)

Fitur Translate pada portal Expasy adalah alat untuk menerjemahkan sekuens DNA atau RNA menjadi sekuens asam amino (protein) berdasarkan kode genetik. Fitur ini sangat berguna dalam menganalisis sekuens gen untuk memahami protein yang mungkin dihasilkan. Untuk menggunakan salah satu fitur di situs ExpASy secara umum dapat diakses melalui langkah-langkah berikut:


Akses Situs Expsy:

- Buka situs Expsy di [Expasy.org](https://www.expasy.org).

Di halaman utama, pilih bagian "Tools" untuk melihat berbagai alat bioinformatika yang tersedia. Pilih Fitur Translate: Cari dan



1. Masukkan Sekuens DNA atau RNA:



- Di halaman Translate, Anda akan melihat kolom input.

- Tempelkan atau ketik sekuens DNA atau RNA yang ingin diterjemahkan ke dalam kotak tersebut. Pastikan sekuens hanya terdiri dari huruf A, T (atau U untuk RNA), C, dan G.

Translate tool

Translate is a tool which allows the translation of a nucleotide (DNA/RNA) sequence to a protein sequence.

DNA or RNA sequence

```
GACGCTTTATGCTAIAAIAITGTTCTGTTTACTGTTTIAIAAA
GGGGTTTGAGATATGCAGCAGAATAGTTT
AAAACTTTTAGCACAGCCCGTTGGCGTATTATTGATCA
ATCCAGTCTAGGTCCTCATTTTGATGCCCGT
CATTCTTTTGCCATCGATGACACGCTTTGTACAACCGTT
GGAAAAGGTGAATCTCCAGCTGTCATCGCT
CATGGGTTATCACGATACGATTGTATTAGGCATTCAAG
ATACAAAGCTCCCTCACCTAGCTGAAGGTGC
AGCTTATTTACATGAAGAAGGGTATAAAACAATCGTCC
GCAATTCAGGGCGCCTCGCTGTCGTACTTGAT
CACCATGCTTTAAACATTTCTTTAATTTTCCAGATCCG
```

Output format

- Verbose: Met, Stop, spaces between residues
- Compact: M, -, no spaces
- Includes nucleotide sequence
- Includes nucleotide sequence, no spaces

DNA strands

- forward
- reverse

Genetic codes - See NCBI's genetic codes

Standard

reset TRANSLATE!

Pada fitur Translate di Expsy, ada beberapa pilihan untuk menampilkan hasil terjemahan sekuens nukleotida ke asam amino. Berikut penjelasan dari setiap opsi tersebut:

1) Verbose: Met, Stop, spaces between residues

a) *Verbose* adalah mode tampilan di mana setiap kodon asam amino ditampilkan dengan nama lengkap tiga huruf (contoh: Met untuk Methionine) dan menyertakan kata *Stop* di akhir jika terdapat kodon stop.

b) Residues atau asam amino akan dipisahkan dengan spasi.

c) Contoh output: Met Ala Ser Stop

```
5'3' Frame 1
I S K N P Y E Stop Q I N S I N I I Stop T L P S V S I I K F L R K I K K L R E N I I
Stop F Y N I A Y K L N V Y V T L C D K I L L V A D E Q Q Q N K K Q N L A N K L K K F F
E E K C Stop Q S S K Met V L N Stop R S R L R A T K K W S L K I K Q K I L T Stop T S N
S F I S N Met S I D Stop T F K L R V Stop S W L R
```

2) Compact: M, -, no spaces

a) *Compact* adalah mode yang lebih ringkas. Hasil terjemahan ditampilkan dengan satu huruf untuk setiap asam amino tanpa ada spasi di antara mereka.

b) Simbol - akan menunjukkan kodon stop.

c) Contoh output: MAS-

```
5'3' Frame 1
I S K N P Y E - Q I N S I N I I - T L P S V S I I K F L R K I K K L R E N I I - F Y N I A Y K L N V Y V T L C D K I L L V A D E Q Q Q N K K Q N L A N K L K K F F E E K C - Q
S S K M V L N - R S R L R A T K K W S L K I K Q K I L T - T S N S F I S N M S I D - T F K L R V - S W L R
```

3) Includes nucleotide sequence

a) Pilihan ini menampilkan baik sekuens nukleotida (DNA/RNA) asli maupun hasil terjemahan asam amino.

b) Nukleotida dan asam amino akan ditampilkan secara berurutan sehingga pengguna dapat melihat hubungan antara

```

5'3' Frame 1
ata tct aaa aat cct tac gaa tag caa ata aat agt ata aat ata ata taa act tta cca
I S K N P Y E - Q I N S I N I I - T L P
agt gta tca ata att aaa ttt ttg aga aaa ata aag aaa tta aga gaa aat ata ata taa
S V S I I K F L R K I K K L R E N I I -
ttt tat aat ata gca tat aaa cta aat gtt tat gta acc tta tgt gat aag ata tta ctt
F Y N I A Y K L N V Y V T L C D K I L L
gtc gct gac gaa cag caa aac aaa aaa caa aac tta gca aat aag tta aaa aag ttt
V A D E Q Q Q N K K Q N L A N K L K K F
ttt gaa gaa aaa tgt tga caa agt tcg aaa atg gtg tta aac taa aga agt cgc ttg agg
F E E K C - Q S S K M V L N - R S R L R
gcg aca aag aaa tgg tct ttg aaa att aaa cag aag ata tta aca taa acc agc aat tct
A T K K W S L K I K Q K I L T - T S N S
ttt ata agt aat atg agt ata gat taa act ttt aaa ttg aga gtt tga tcc tgg ctc agg
F I S N M S I D - T F K L R V - S W L R

```

keduanya.

4) Includes nucleotide sequence, no spaces

a) Opsi ini mirip dengan opsi sebelumnya tetapi tanpa spasi antar sekuens nukleotida dan asam amino.

b) Opsi ini cocok jika Anda membutuhkan hasil yang lebih padat atau kompak.

Fitur-fitur ini memungkinkan penyesuaian tampilan hasil terjemahan agar sesuai dengan kebutuhan analisis dan format pelaporan yang diinginkan.

Pilih Reading Frame:

```
5'3' Frame 1
atctctaaaaatccttacgaatgcaaaataaatagtataataataataaaactttacca
I S K N P Y E - Q I N S I N I I - T L P
agtgtatcaataataaattttgagaaaaataaagaattaaagagaaaataataataa
S V S I I K F L R K I K K L R E N I I -
ttttataatatagcatataaaactaaatgtttatgtaaccttatgtgataagatattact
F Y N I A Y K L N V Y V T L C D K I L L
gtcgctgacgcaaacgcaacaaaaacaaaaacaaacttagcaataagttaaaaaaagttt
V A D E Q Q Q N K K Q N L A N K L K K F
tttgaagaaaaatgttgacaaagttcgaaaaatggtgtaactaaagaagtcgcttgagg
F E E K C - Q S S K M V L N - R S R L R
gcgcaaaagaaatggtctttgaaaattaacagaagatattaacataaacagcaattct
A T K K W S L K I K Q K I L T - T S N S
tttataagtaatatgagtatagattaaccttttaaattgagagtttgatcctggctcagg
F I S N M S I D - T F K L R V - S W L R
```

- Pilih reading frame (1, 2, atau 3) atau biarkan default jika tidak yakin. Anda juga dapat memilih semua frame untuk melihat semua kemungkinan terjemahan.
- Pilihan reading frame ini menentukan dari posisi mana terjemahan asam amino dimulai.

```
5'3' Frame 1
I S K N P Y E - Q I N S I N I I - T L P S V S I I K F L R K I K K L R E N I I - F Y N I A Y K L N V Y V T L C D K I L L V A D E Q Q Q N K K Q N L A N K L K K F F E E K C - Q
S S K M V L N - R S R L R A T K K W S L K I K Q K I L T - T S N S F I S N M S I D - T F K L R V - S W L R


5'3' Frame 2
Y L K I L T N S K - I V - I - Y K L Y Q V Y Q - L N F - E K - R N - E K I - Y N F I I - H I N - M E M - P Y V I R Y V L S L T N S N K T K N K T - Q I S - K S F L K K N V D K
V R K W C - T K E V A - G R Q R N G L - K L N R R Y - H K P A I L L - V I - V - I K L L N - E F D P G S

5'3' Frame 3
I - K S L R I A N K - Y K Y N I N F T K C I N N - I F E K N E I K R K Y N I I L - Y S I - T K C L C N L M - - D I T C R - R T A T K Q K T K L S K - V K K V F - R K M L T K
F E N G V K L K K S L E G D K E M V F E N - T E D I N I N Q Q F F Y K - Y E Y R L N F - I E S L I L A Q
```


2. Pilih Opsi Kode Genetik (Opsional):

Secara default, alat akan menggunakan kode genetik standar. Namun, Anda bisa memilih kode genetik lain jika bekerja dengan

organisme yang memiliki kode genetik khusus (misalnya, mitokondria atau organisme tertentu).



3. Klik Translate:



Tekan tombol "Translate" untuk memulai proses penerjemahan. Hasilnya akan menampilkan sekuens asam amino (protein) yang diterjemahkan dari sekuens DNA/RNA yang dimasukkan. Jika memilih lebih dari satu frame, Anda akan melihat hasil untuk setiap frame yang memungkinkan.

Untuk mengunduh hasil translate data tersebut klik download pada fitur kanan atas pilih format file FASTA secara otomatis file tersebut akan terunduh.

Berikut adalah kepanjangan dari kode satu huruf standar yang biasa digunakan untuk merepresentasikan asam amino dalam hasil translasi sekuens protein:


Kode	Asam Amino	Kode	Asam Amino	Kode	Asam Amino
A	Alanine	H	Histidine	T	Threonine
R	Arginine	I	Isoleucine	W	Tryptophan
N	Asparagine	L	Leucine	Y	Tyrosine
D	Aspartic Acid	K	Lysine	V	Valine
C	Cysteine	M	Methionine		
E	Glutamic Acid	F	Phenylalanine		
Q	Glutamine	P	Proline		
G	Glycine	S	Serine		

Tambahan:

- X : sering digunakan untuk residu tidak diketahui atau ambigu.
- B : bisa berarti Aspartic Acid (D) atau Asparagine (N).
- Z : bisa berarti Glutamic Acid (E) atau Glutamine (Q).
- J : kadang dipakai untuk Leucine (L) atau Isoleucine (I), tetapi tidak selalu diterima secara universal.
- U : untuk Selenocysteine.

- O : untuk Pyrrolysine.

Dengan mengetahui kepanjangan kode satu huruf ini, analisis sekuens protein dapat menjadi lebih mudah dalam memahami struktur dan fungsi protein yang sedang dikaji.



BAB 8.

KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes)

KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) adalah salah satu sumber daya bioinformatika yang penting untuk analisis fungsi biologis gen dan protein. Aplikasi KEGG sangat luas, terutama dalam penelitian biologi molekuler, bioteknologi, dan ilmu medis. Berikut adalah beberapa aplikasi utama KEGG:

Analisis Jalur Metabolik dan Jalur Sinyal

KEGG menyediakan jalur metabolik dan jalur sinyal untuk berbagai organisme, yang memungkinkan peneliti memahami peran enzim atau protein dalam proses biokimia tertentu. Ini penting untuk mempelajari metabolisme seluler dan interaksi antar molekul.

Analisis Genomik

KEGG Genome memungkinkan pengguna mengakses informasi genom berbagai organisme. Peneliti dapat memanfaatkan data ini untuk mengidentifikasi gen atau kelompok gen yang terkait dengan fungsi tertentu atau kondisi penyakit tertentu.

Identifikasi Target Obat

Basis data KEGG Drug dan KEGG Pathway dapat digunakan untuk memahami interaksi molekul obat dengan target di dalam tubuh. Ini berguna dalam penemuan obat baru dan identifikasi jalur biokimia yang menjadi target terapi potensial.

Analisis Fungsional untuk Data Omics

KEGG banyak digunakan dalam analisis data *omics* (genomics, proteomics, metabolomics) untuk menganalisis fungsionalitas gen dan protein dalam konteks jalur biokimia. Misalnya, dalam analisis RNA-seq, KEGG membantu mengidentifikasi jalur di mana gen yang diekspresikan secara diferensial terlibat.

Klasifikasi dan Anotasi Gen dan Protein

KEGG Orthology (KO) memungkinkan klasifikasi gen atau protein berdasarkan fungsinya. Dengan alat ini, peneliti dapat mengidentifikasi homologi fungsional gen atau protein antara berbagai spesies.

Analisis Interaksi Protein-Protein

KEGG juga menyediakan data mengenai interaksi protein-protein dalam jalur sinyal dan proses biokimia, yang membantu peneliti dalam memetakan jaringan interaksi yang relevan dengan kondisi fisiologis atau penyakit tertentu.

Prediksi Fungsi Gen dan Protein Baru

Dengan mengaitkan gen atau protein yang baru ditemukan dengan jalur KEGG yang ada, peneliti dapat memperkirakan fungsi molekul baru tersebut berdasarkan jalur fungsional yang sama di mana molekul tersebut mungkin terlibat.

Studi Evolusi Jalur Biokimia

KEGG menawarkan jalur dan data evolusioner yang membantu mempelajari perubahan dalam jalur biokimia antar spesies dan mengidentifikasi konvergensi fungsional pada jalur tertentu di berbagai organisme.

KEGG adalah alat yang sangat penting untuk analisis bioinformatika terkait genom, protein, dan metabolisme, serta sangat berguna dalam penelitian biomedis, termasuk penemuan obat dan diagnosa molekuler.

[KEGG - Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes](https://www.kegg.jp/)



The screenshot shows the KEGG website homepage. At the top left is the KEGG logo. To its right is a search bar with a dropdown menu set to 'KEGG', a search button, and a 'Help' link. Below the search bar is a link to '» Japanese'. The main content area is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains links for 'KEGG Home', 'KEGG Database', 'KEGG Objects', 'KEGG Software', and 'KEGG FTP'. The main content area features the title 'KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes' and a descriptive paragraph. Below this are several sections: 'Main entry point to the KEGG web service' with links for 'KEGG2' and 'KEGG Table of Contents'; 'Data-oriented entry points' with links for 'KEGG PATHWAY', 'KEGG BRITE', 'KEGG MODULE', 'KEGG ORTHOLOGY', 'KEGG GENES', 'KEGG GENOME', and 'KEGG COMPOUND'. A small box on the right side of the main content area lists 'Pathway', 'Brite', 'Brite table', 'Module', 'Network', 'KO (Function)', 'Organism', and 'Virus'.

KEGG Home
Release notes
Current statistics

KEGG Database
KEGG overview
KEGG mapping
Color codes

KEGG Objects
KEGG Weblinks
Entry format

KEGG Software
KEGG API
KGML

KEGG FTP
Subscription
Background info
GenomeNet

KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes

KEGG is a database resource for understanding high-level functions and utilities of the biological system, such as the cell, the organism and the ecosystem, from molecular-level information, especially large-scale molecular datasets generated by genome sequencing and other high-throughput experimental technologies. See [Release notes](#) (October 1, 2024) for new and updated features.

New article: [KEGG: biological systems database as a model of the real world](#)

New feature: [Gene order alignment](#) can now be done either by KOs or VOGs

Main entry point to the KEGG web service
[KEGG2](#) [KEGG Table of Contents](#) [[Update notes](#) | [Release history](#)]

Data-oriented entry points

KEGG PATHWAY	KEGG pathway maps [Web Apps]	Pathway Brite Brite table Module Network KO (Function) Organism Virus
KEGG BRITE	BRITE hierarchies and tables	
KEGG MODULE	KEGG modules	
KEGG ORTHOLOGY	KO functional orthologs [Annotation]	
KEGG GENES	Genes and proteins [KEGG Virus]	
KEGG GENOME	Genomes [Syntax]	
KEGG COMPOUND	Small molecules	

Beberapa portal utama di dalam situs KEGG meliputi:

KEGG PATHWAY. Untuk eksplorasi jalur metabolik, jalur sinyal, dan proses seluler lainnya.

URL: <https://www.kegg.jp/kegg/pathway.html>

KEGG GENOME

Untuk akses informasi genom berbagai organisme.

URL: <https://www.kegg.jp/kegg/genome.html>

KEGG DRUG

Untuk informasi tentang molekul obat dan interaksinya dengan target biokimia.

URL: <https://www.kegg.jp/kegg/drug/>

KEGG ORTHOLOGY (KO)

Untuk klasifikasi dan anotasi fungsi gen dan protein.

URL: <https://www.kegg.jp/kegg/ko.html>

KEGG MODULE

Untuk analisis modul gen fungsional dan kompleks protein.


URL: <https://www.kegg.jp/kegg/module.html>

Setiap bagian ini memiliki antarmuka web yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, menganalisis, dan mendownload data yang relevan dengan keperluan penelitian mereka.

Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG)

adalah sumber daya database untuk memahami fungsi tingkat tinggi dan utilitas dari sistem biologis,

seperti sel, organisme dan biosfer, dari informasi genomik dan tingkat molekuler. Ini adalah model komputer dari sistem biologis, yang terdiri dari blok bangunan molekuler gen dan protein (informasi genom) dan zat kimia (informasi kimia) yang terintegrasi dengan diagram kabel molekuler interaksi dan jaringan reaksi (informasi sistem). Model KEGG juga berisi informasi penyakit dan obat (informasi kesehatan) dalam hal jaringan molekuler yang terganggu. Situs ini banyak digunakan untuk integrasi dan interpretasi set data molekuler skala besar yang dihasilkan oleh sekuensing genom dan teknologi eksperimental throughput tinggi lainnya.



A. Database *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG)

dibedakan oleh pengkodean warna halaman web. Database ini berisi berbagai objek data untuk representasi komputer dari sistem biologis. Dengan demikian, entri database dari setiap database disebut objek KEGG, yang diidentifikasi oleh pengidentifikasi objek KEGG yang terdiri dari awalan yang bergantung pada database dan nomor lima digit.

Release	Database	Object Identifier	Remark
1995	KEGG PATHWAY	map number	
	KEGG GENES	locus_tag / GeneID	
	KEGG ENZYME	EC number	
	KEGG COMPOUND	C number	
1998	KEGG REACTION	R number	
2000	KEGG GENOME	organism code / T number	
2002	KEGG ORTHOLOGY	K number	Ortholog IDs in 2000
2003	KEGG GLYCAN	G number	
2004	KEGG RPAIR	RP number	Discontinued in 2016
2005	KEGG BRITE	br number	
	KEGG DRUG	D number	
2006	KEGG MODULE	M number	
2008	KEGG DISEASE	H number	
2010	KEGG RCLASS	RC number	
	KEGG EDRUG	E number	Renamed to ENVIRON
2011	KEGG ENVIRON	E number	Discontinued in 2021
2014	KEGG DGROUP	DG number	
2017	KEGG NETWORK	N number / nt number	
	KEGG VARIANT	GeneID+variant number	

Category	Database	Content	Color
Systems information	KEGG PATHWAY	KEGG pathway maps	
	KEGG BRITE	BRITE hierarchies and tables	
	KEGG MODULE	KEGG modules and reaction modules	
Genomic information	KEGG ORTHOLOGY (KO)	Functional orthologs	
	KEGG GENES	Genes and proteins	
	KEGG GENOME	KEGG organisms and viruses	
Chemical information	KEGG COMPOUND	Metabolites and other chemical substances	
	KEGG GLYCAN	Glycans	
	KEGG REACTION	Biochemical reactions	
	KEGG RCLASS	Reaction class	
	KEGG ENZYME	Enzyme nomenclature	
Health information	KEGG NETWORK	Disease-related network variations	
	KEGG VARIANT	Human gene variants	
	KEGG DISEASE	Human diseases	
	KEGG DRUG	Drugs	
	KEGG DGROUP	Drug groups	

B. Jaringan Molekuler KEGG

Period	Identifier	Reference knowledge	Assignment
1995-1999	EC number	Metabolic pathways	Domain based
2000-2002	Ortholog ID	Metabolic and regulatory pathways	Domain based
2003-	KO	Pathways and BRITE hierarchies	Gene based

Objek data yang paling unik di KEGG adalah jaringan molekuler - interaksi molekuler, reaksi dan jaringan hubungan yang mewakili fungsi sistemik sel dan organisme. Pengetahuan eksperimental tentang fungsi sistemik tersebut ditangkap dari literatur dan terorganisir. Pada tahun 1995 konsep pemetaan pertama kali diperkenalkan di KEGG untuk menghubungkan genom dengan jalur metabolisme (rekonstruksi metabolik) menggunakan nomor EC. Setelah angka EC ditugaskan untuk

gen enzim dalam genom, jalur spesifik organisme dapat dihasilkan secara otomatis dengan mencocokkan terhadap jaringan enzim (nomor EC) dari jalur metabolisme referensi KEGG. Nomor EC tidak lagi digunakan sebagai pengenal di KEGG. Sistem KEGG Orthology (KO) adalah dasar untuk anotasi genom dan pemetaan KEGG.

Dari perspektif yang berbeda, contoh individu gen dikelompokkan ke dalam entri KO yang mewakili ortolog fungsional dalam jaringan molekuler. Ada dua jenis generalisasi dalam KEGG seperti yang ditunjukkan di bawah ini.


C. Varian Jaringan

Network type	Class	Instance
All types	KO (gene ortholog)	Genes in KEGG GENES
Biochemical reaction	RC (reaction class)	Reactions in KEGG REACTION
Drug interaction	DG (drug group)	Drugs in KEGG DRUG

Database KEGG telah dikembangkan dengan berfokus pada konservasi dan variasi gen dan genom di antara organisme yang berbeda. Dataset referensi dari peta jalur KEGG, hierarki BRITe dan modul KEGG telah dikembangkan dengan konsep ortologi fungsional (KO), sehingga pemetaan jalur KEGG dan prosedur lainnya dapat diterapkan pada organisme seluler apa

pun.

Namun, pendekatan generik ini tidak memadai untuk memahami



fitur yang lebih rinci yang disebabkan oleh variasi gen dan genom dalam suatu spesies, terutama untuk memahami variasi terkait penyakit gen dan genom manusia.

<https://www.genome.jp/kegg/network.html> merupakan upaya baru oleh KEGG untuk menangkap pengetahuan tentang penyakit dan obat-obatan dalam hal varian jaringan yang disebabkan oleh tidak hanya varian gen, tetapi juga virus dan faktor lainnya.

D. Prosedur Penggunaan Situs KEGG

Penggunaan analisis jalur metabolisme dari organisme dapat di ketahui melalui situs KEGG berikut adalah langkah langkah dari penggunaan situs KEGG

<https://www.genome.jp/kegg/>

Kemudian klik KEGG Pathway yang digunakan untuk mempelajari interaksi molekuler dan jalur biologis yang terlibat dalam berbagai proses kehidupan. Fitur ini berisi peta jalur metabolik dan jalur molekul seluler lainnya, seperti sinyal transduksi, jalur penyakit, dan jalur obat.



KEGG Help
+ Japanese

- KEGG Home
 - Release notes
 - Current statistics
- KEGG Database
 - KEGG overview
 - KEGG mapping
 - Color codes
- KEGG Objects
 - KEGG Weblinks
 - Entry format
- KEGG Software
 - KEGG API
 - KGML
- KEGG FTP
 - Subscription
 - Background info
 - GenomeNet
- DBGET/LinkDB
- Feedback
- Copyright request
- Kanehisa Labs

KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes

KEGG is a database resource for understanding high-level functions and utilities of the biological system, such as the cell, the organism and the ecosystem, from molecular-level information, especially large-scale molecular datasets generated by genome sequencing and other high-throughput experimental technologies. See Release notes (December, 2024) for new and updated features.
New article: KEGG: biological systems database as a model of the real world

- Main entry point to the KEGG web service
 - KEGG2
 - KEGG Table of Contents
 - Update notes
 - Release history
- Data-oriented entry points
 - KEGG PATHWAY
 - KEGG pathway maps
 - [Web Apps]
 - Pathway
 - Site
 - KEGG BRITE
 - BRITE hierarchies and tables
 - Site table
 - Module
 - KEGG MODULE
 - KEGG modules
 - Network
 - KO (Function)
 - Organism
 - Virus
 - Compound
 - Disease (ICD)
 - Drug (ATC)
 - Drug (Target)
 - Antimicrobials
 - KEGG ORTHOLOGY
 - KO functional orthologs
 - [Annotation]
 - Network
 - KEGG GENES
 - Genes and proteins
 - [KEGG Virus]
 - Organism
 - KEGG GENOME
 - Genomes
 - [Syntax]
 - Virus
 - KEGG COMPOUND
 - Small molecules
 - Compound
 - KEGG GLYCAN
 - Glycans
 - Compound
 - KEGG REACTION
 - Biochemical reactions
 - [RModule]
 - Enzyme nomenclature
 - Enzyme
 - KEGG ENZYME
 - Enzyme nomenclature
 - Enzyme
 - KEGG NETWORK
 - Disease-related network variations
 - Network
 - KEGG DISEASE
 - Human diseases
 - Disease
 - KEGG DRUG
 - Drugs
 - [New drug approval]
 - Drug
 - KEGG MEDICUS
 - Health information resource
 - [Drug labels search]
 - Health
 - Organism-specific entry points
 - KEGG Organisms
 - Enter org code(s)
 - Go
 - hsa
 - hsa eco
 - Analysis tools
 - KEGG Mapper
 - PATHWAY/BRITE/MODULE mapping tools
 - KEGG Web Apps
 - Pathway viewer with coloring features, etc.
 - KEGG Syntax
 - Conserved gene, gene set and gene order analysis
 - BlastKOALA
 - BLAST-based KO annotation and KEGG mapping
 - GhostKOALA
 - GHOGV-based KO annotation and KEGG mapping
 - BLAST/FASTA
 - Sequence similarity search
 - SIMCOMP
 - Chemical structure similarity search



KEGG PATHWAY Database

Wiring diagrams of molecular interactions, reactions and relations

KEGG2 PATHWAY BRITE MODULE KO GENES COMPOUND NETWORK DISEASE DRUG

Select prefix Enter keywords Help

[[New pathway maps](#) | [Update history](#)]

Pathway Maps

KEGG PATHWAY is a collection of manually drawn pathway maps representing our knowledge of the molecular interaction, reaction and relation networks for:

1. Metabolism

Global/overview Carbohydrate Energy Lipid Nucleotide Amino acid Other amino Glycan

Cofactor/vitamin Terpenoid/PK Other secondary metabolite Xenobiotics Chemical structure

2. Genetic Information Processing

3. Environmental Information Processing

4. Cellular Processes

5. Organismal Systems

6. Human Diseases

7. Drug Development

Pada halaman ini anda akan diberikan pilihan dari fitur-fitur yang terdapat pada KEGG Pathway, fungsi dari fitur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Metabolism yang berisi jalur metabolik utama yang melibatkan reaksi biokimia dalam organisme, termasuk:
 - 1) Global/overview untuk Jalur umum seperti metabolisme pusat (central metabolism) dan peta interaksi metabolik.
 - 2) Carbohydrate untuk Jalur metabolisme karbohidrat seperti glikolisis, siklus asam sitrat, dan metabolisme glikogen.
 - 3) Energy untuk Jalur yang menghasilkan energi, seperti fosforilasi oksidatif dan fotosintesis.
 - 4) Lipid untuk Jalur metabolisme lipid, seperti biosintesis asam lemak dan degradasi lipid. Nucleotide untuk Biosintesis dan degradasi nukleotida (DNA, RNA).
 - 5) Amino acid untuk Jalur biosintesis dan degradasi asam amino.
 - 6) Other amino untuk Metabolisme asam amino turunan seperti poliamin.
 - 7) Glycan untuk Jalur metabolisme glikan, termasuk biosintesis dan modifikasi karbohidrat.

- 8) Cofactor/vitamin untuk Jalur metabolisme koenzim dan vitamin.
 - 9) Terpenoid/PK untuk Jalur biosintesis terpenoid dan poliketida, senyawa bioaktif alami.
 - 10) Other secondary metabolite untuk Jalur metabolisme senyawa sekunder lainnya.
 - 11) Xenobiotics untuk Jalur degradasi senyawa xenobiotik (zat asing seperti polutan).
 - 12) Chemical structure untuk Jalur terkait struktur kimia spesifik.
- b. Genetic Information Processing fitur ini mengacu pada proses yang terkait dengan informasi genetik, seperti:
- 1) Transkripsi (sintesis RNA dari DNA).
 - 2) Translasi (penerjemahan RNA menjadi protein).
 - 3) Replikasi dan perbaikan DNA.
 - 4) Pemrosesan RNA dan modifikasi protein pasca-translasi.
- c. Environmental Information Processing fitur ini mencakup jalur molekul yang memungkinkan organisme merespons lingkungan:
- 1) Jalur signal transduksi.
 - 2) Sistem transportasi membran.


- 3) Interaksi dengan ligan, seperti reseptor hormon atau sensor lingkungan.
- d. Cellular Processes fitur ini berfokus pada jalur yang berhubungan dengan fungsi selular, seperti:
- 1) Siklus sel dan pembelahan.
 - 2) Transportasi vesikuler (contoh: eksositosis, endositosis).
 - 3) Proses degradasi protein seperti autofagi.
- e. Organismal Systems fitur ini mencakup jalur yang berfungsi pada tingkat organisme, seperti:
- 1) Sistem imun (respons imun bawaan dan adaptif).
 - 2) Sistem endokrin.
 - 3) Sistem saraf dan sinyal neuron.
 - 4) Sistem pencernaan dan metabolisme sistemik.
- f. Human Diseases fitur ini berisi jalur yang terkait dengan penyakit manusia, mencakup:
- 1) Penyakit genetik (contoh: kanker).
 - 2) Penyakit infeksi (virus, bakteri, parasit).
 - 3) Gangguan metabolisme (diabetes, obesitas).
 - 4) Penyakit autoimun atau neurodegeneratif.
- e. Drug Development fitur ini berfokus pada jalur yang mendukung penelitian dan pengembangan obat, termasuk:

- 1) Jalur target molekuler untuk obat-obatan.
- 2) Mekanisme kerja obat.
- 3) Interaksi obat dan biomolekul.

Selanjutnya klik fitur metabolisme kemudian klik tombol CTRL+F untuk mencari analisis jalur metabolisme dari suatu organisme (*Bacillus amyloliquefaciens* IROD2). Pada organisme ini jalur metabolisme terdapat pada menu Amino Acid Metabolism

Selanjutnya klik menu Glycine, serine and threonine metabolisme

Halaman ini akan menyediakan pathway modul pada kolom kiri halaman. Untuk mengetahui jalur metabolisme yang terjadi kita dapat mencentang pathway modul yang secara otomatis akan memberikan petunjuk atau jalur tautan metabolisme satu dengan yang lainnya.



1.5 Amino acid metabolism

- 00250 M Alanine, aspartate and glutamate metabolism
- 00260 M N Glycine, serine and threonine metabolism
- 00270 M N Cysteine and methionine metabolism
- 00280 M N Valine, leucine and isoleucine degradation
- 00290 M Valine, leucine and isoleucine biosynthesis
- 00300 M T Lysine biosynthesis
- 00310 M N Lysine degradation
- 00220 M N Arginine biosynthesis
- 00330 M N Arginine and proline metabolism
- 00340 M N Histidine metabolism
- 00350 M N Tyrosine metabolism
- 00360 M Phenylalanine metabolism
- 00380 M N Tryptophan metabolism
- 00400 M N Phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis



1.6 Metabolism of other amino acids


- 00410 M beta-Alanine metabolism
- 00430 M Taurine and hypotaurine metabolism



Untuk melihat spesifikasi dari modul tersebut kita dapat mengklik kode enzim berupa angka pada peta jalur metabolisme tersebut. Halaman ini akan memuat informasi data organisme terkait dari kode tersebut. Untuk melihat spesifikasi dari menu pathway network, kita dapat mengklik atau mencentang kode pada bagian network, maka secara otomatis akan muncul jalur tautan terkait.

Entry	K00130 KO
Symbol	betB, gbsA
Name	betaine-aldehyde dehydrogenase [EC:1.2.1.8]
Pathway	map00260 Glycine, serine and threonine metabolism map00670 One carbon pool by folate map01100 Metabolic pathways
Module	M00555 Betaine biosynthesis, choline => betaine
Reaction	R02565 p-cumic alcohol:NAD+ oxidoreductase R02566 p-cumic alcohol:NADP+ oxidoreductase
Brite	KEGG Orthology (KO) [BR:ko00001] 09100 Metabolism 09105 Amino acid metabolism 00260 Glycine, serine and threonine metabolism K00130 betB, gbsA; betaine-aldehyde dehydrogenase 09108 Metabolism of cofactors and vitamins 00670 One carbon pool by folate K00130 betB, gbsA; betaine-aldehyde dehydrogenase Enzymes [BR:ko01000] 1. Oxidoreductases 1.2 Acting on the aldehyde or oxo group of donors 1.2.1 With NAD+ or NADP+ as acceptor 1.2.1.8 betaine-aldehyde dehydrogenase K00130 betB, gbsA; betaine-aldehyde dehydrogenase BRITE hierarchy
Other DBs	COG: COG1012 GO: 0008802
Genes	AJM: 119041281 ATH: AT1G74920(ALDH10A8) AT3G48170(ALDH10A9) ALY: 9311950 9325063 CRB: 17886657 17894604



Entry	C00037	Compound
Name	Glycine; Aminoacetic acid; Gly	
Formula	C2H5NO2	
Exact mass	75.0320	
Mol weight	75.07	
Structure	 <p>C00037</p> <p>Mol file KCF file DB search</p>	
Remark	Same as: D00011	
Reaction	R00364 R00365 R00366 R00367 R00368 R00369 R00371 R00372 R00373 R00374 R00395 R00478 R00497 R00565 R00588 R00610 R00611 R00652 R00751 R00775 R00830 R00899 R00945 R01221 R01424 R01723 R01766 R01957 R02452 R02551 R02729 R03121 R03284 R03425 R03579 R03654 R03718 R03956 R03975 R04144 R04486 R04777 R04951 R05055 R05704 R05835 R05841 R06171 R07226 R07463 R08195 R08196 R08252 R08701 R08744 R09099 R09717 R09718 R10060 R10062 R10179 R10685 R10722 R10908 R10994 R11664 R12026 R12514 R12692 R12693 R12694 R12721 R12723 R12941 R12967 R13029 R13038	
Pathway	map00120 Primary bile acid biosynthesis map00230 Purine metabolism map00260 Glycine, serine and threonine metabolism map00310 Lysine degradation map00440 Phosphonate and phosphinate metabolism	



BAB 9
MEME SUITE

MEME Suite adalah sebuah kumpulan alat (tools) yang sangat berguna dalam bidang bioinformatika, khususnya untuk menganalisis sekuen (urutan) DNA, RNA, atau protein. Alat-alat ini dirancang untuk membantu para peneliti menemukan dan menganalisis motif-motif yang terdapat dalam sekuen tersebut. Motif adalah pola sekuen yang berulang dan memiliki fungsi biologis tertentu. Misalnya, dalam DNA, motif tertentu mungkin merupakan tempat di mana protein pengatur (seperti faktor transkripsi) menempel untuk mengontrol ekspresi gen.

A. Tujuan atau fungsi dari MEME SUITE?


Mendeteksi Motif: MEME Suite digunakan untuk menemukan motif-motif dalam kumpulan data sekuen yang besar. Prediksi fungsi protein: Motif tertentu pada protein dapat mengindikasikan fungsi spesifik protein tersebut. Identifikasi elemen regulasi: Pada DNA, motif dapat menandai lokasi di mana protein pengatur (seperti faktor transkripsi) berikatan untuk mengontrol ekspresi gen. Membandingkan dengan motif yang sudah diketahui: MEME Suite dapat membandingkan motif yang ditemukan dengan database motif yang sudah ada untuk mencari kemiripan dan perbedaan.

B. Fitur-fitur yang terdapat pada MEME SUITE:

Alat utama untuk menemukan pola-pola berulang dalam data genetik. Ini seperti mencari kata-kata kunci dalam sebuah buku. Pola-pola ini disebut motif dan seringkali memiliki fungsi biologis yang penting.

1. STREME (Sensitive, Thorough, Rapid, Enriched Motif Elicitation)

STREME dirancang untuk menemukan motif yang tersembunyi dalam dataset yang besar. Algoritma yang digunakan sangat sensitif, memungkinkan penemuan motif yang mungkin terlewatkan oleh alat lain. Penggunaan: Sangat cocok untuk menganalisis dataset besar seperti hasil eksperimen ChIP-seq atau RNA-seq.



2. GLAM2 (Gapped Local Alignment of Motifs)

GLAM2 khusus dirancang untuk menemukan motif yang mengandung gap atau celah. Motif dengan gap ini mewakili domain protein yang fleksibel atau DNA yang bervariasi. Penggunaan: Sangat berguna untuk menganalisis protein atau DNA yang memiliki struktur sekunder atau tersier yang kompleks.

3. DREME (Discriminative Regular Expression Motif Elicitation)

DREME digunakan untuk menemukan motif pendek yang membedakan antara dua set sekuen. Misalnya, untuk menemukan motif yang spesifik untuk gen yang diekspresikan dalam kondisi tertentu.

4. Tomtom (Motif Comparison Tool)

Alat ini digunakan untuk membandingkan motif yang baru ditemukan dengan motif-motif yang sudah ada dalam database.

5. AME (Analyzing Motif Enrichment)

Alat ini digunakan untuk membandingkan seberapa sering suatu motif muncul dalam dua kelompok data yang berbeda. Misalnya, untuk mengetahui apakah suatu motif

lebih sering muncul pada sel kanker dibandingkan sel normal.

6. CentriMo (Local Motif Enrichment Analysis): Alat ini digunakan untuk menganalisis posisi motif dalam suatu sekuen.
7. SpaMo (Spaced Motif Analysis Tools): Alat ini digunakan untuk menganalisis jarak antara dua motif.
8. GOMo (Gene Ontology for Motifs): Alat ini digunakan untuk menghubungkan motif dengan fungsi biologis tertentu.
9. FIMO (Find Individual Motif Occurrences)

FIMO digunakan untuk mencari kemunculan tunggal dari sebuah motif dalam sekumpulan sekuen. Bayangkan Anda memiliki sebuah kata kunci (motif) dan ingin mencari di mana saja kata kunci itu muncul dalam sebuah buku (sekuen). FIMO akan menunjukkan halaman-halaman (posisi dalam sekuen) di mana kata kunci itu ditemukan.

10. MAST (Multiple Alignment Search Tool)

MAST mirip dengan FIMO, tetapi MAST dirancang untuk mencari kemunculan motif dalam sekumpulan sekuen yang telah di-align (diurutkan). MAST mampu mencari

kemunculan beberapa motif sekaligus. MAST sangat berguna ketika kita memiliki sekumpulan sekuen yang sudah di-align, misalnya hasil dari perbandingan sekuen multiple (MSA), kita bisa mencari motif-motif yang umum ditemukan dalam sekumpulan sekuen yang telah di-align tersebut.

11. GLAM2Scan (Scanning with Gapped Motifs)

GLAM2Scan dirancang untuk mencari kemunculan motif yang memiliki insersi dan delesi. Motif dengan insersi dan delesi ini sering ditemukan dalam data biologis nyata. GLAM2Scan sangat berguna ketika kita ingin mencari motif yang lebih fleksibel, yaitu motif yang tidak harus persis sama dengan motif yang dijadikan sebagai query.

12. MCAST (Motif Clustering and Scanning Tool)

MCAST digunakan untuk mencari kelompok motif yang sering muncul bersama dalam sekumpulan sekuen. MCAST juga dapat digunakan untuk mencari motif yang muncul dalam urutan tertentu. MCAST sangat berguna untuk mengidentifikasi motif yang mungkin bekerja secara sinergis atau membentuk suatu modul regulasi.

13. MEME-ChIP (Motif Analysis of Large Nucleotide Dataset)

Alat ini dirancang khusus untuk menganalisis data

ChIP-seq. Data ChIP-seq digunakan untuk mengidentifikasi lokasi di genom tempat protein tertentu berikatan dengan DNA. MEME-ChIP kemudian mencari motif (pola sekuen pendek) yang kaya di wilayah-wilayah tersebut. Motif-motif ini seringkali merupakan situs pengikatan protein transkripsi.

14. T-Gene (Predicting Target Genes)

Alat ini digunakan untuk memprediksi gen target dari data chip-seq. seperti membayangkan "Gen apa yang diatur oleh protein yang mengikat di lokasi ini?"

15. BED2FASTA

Mengubah format file dari BED (*Browser Extensible Data*) menjadi FASTA. Format BED sering digunakan untuk menyimpan informasi tentang lokasi genomik, sedangkan FASTA digunakan untuk menyimpan sekuen DNA atau protein.

16. SEA (Simple Enrichment Analysis)

Melakukan analisis pengayaan sederhana untuk menemukan motif yang lebih sering muncul dalam satu set sekuen dibandingkan set lainnya.

17. XSTREME (Extremely Sensitive Motif Retrieval Algorithm)

Alat ini dirancang khusus untuk menemukan motif (pola sekuen pendek) yang sulit ditemukan atau tersembunyi dalam data sekuen biologis.

18. MoMo (Modification Motifs)

Menganalisis motif modifikasi. Alat ini mencari pola modifikasi pada protein, seperti fosforilasi atau metilasi.

19. GT-Scan (Identifying Unique Genomic Targets)

Alat ini sangat berguna dalam bidang rekayasa genetika. GT-Scan membantu merancang sekuen DNA yang dapat menjadi target untuk teknik editing genom seperti CRISPR-Cas.

Prosedur MEME SUITE dalam menemukan Motif

Sampel yang telah didapat diblast terlebih dahulu, untuk mengetahui jenis sekuen berasal

Query Length: 1222

Other reports: [Distance tree of results](#) [MSA viewer](#)

Descriptions | Graphic Summary | Alignments | Taxonomy

Sequences producing significant alignments

Download | Select columns | Show 100

select all 100 sequences selected

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per Ident	Acc Len	Accession
Ectopseudomonas gujuanensis strain A52.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Ectopseudomonas gujuanensis	2143	2143	99%	0.0	98.44%	1409	MN252088.1
Ectopseudomonas gujuanensis strain 4-B2.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Ectopseudomonas gujuanensis	2143	2143	99%	0.0	98.44%	1394	MW052576.1
Pseudomonas gujuanensis strain Irapi ZC K.M.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Ectopseudomonas gujuanensis	2143	2143	99%	0.0	98.44%	1404	OM349622.1
Pseudomonas gujuanensis strain HY-64.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Ectopseudomonas gujuanensis	2143	2143	99%	0.0	98.44%	1441	MZ895423.1
Ectopseudomonas gujuanensis 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Ectopseudomonas gujuanensis	2143	2143	99%	0.0	98.44%	1385	KJ302611.1
Ectopseudomonas gujuanensis strain 4-B1.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Ectopseudomonas gujuanensis	2143	2143	99%	0.0	98.44%	1417	MW052575.1
Uncultured bacterium clone S25_1380.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	uncultured bacterium	2143	2143	99%	0.0	98.44%	1500	EF575036.1
Uncultured bacterium clone 6C233327.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	uncultured bacterium	2143	2143	99%	0.0	98.44%	1500	EU805324.1
Ectopseudomonas gujuanensis strain 4-B3.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Ectopseudomonas gujuanensis	2143	2143	99%	0.0	98.44%	1396	MW052577.1
Ectopseudomonas gujuanensis strain CC-GSA.16S ribosomal RNA, partial sequence	Ectopseudomonas gujuanensis	2143	2143	99%	0.0	98.44%	1483	NR_135725.1
Uncultured bacterium clone CMD41.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	uncultured bacterium	2143	2143	99%	0.0	98.44%	1391	GU183596.1
Ectopseudomonas gujuanensis strain HMFL31.chromosome, complete genome	Ectopseudomonas gujuanensis	2143	8566	99%	0.0	98.44%	5742753	CP040489.1
Pseudomonas sp. ZJY-484.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	Pseudomonas sp. ZJY-484	2137	2137	99%	0.0	98.36%	1391	KP282814.1
Uncultured bacterium clone CMG10.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	uncultured bacterium	2137	2137	99%	0.0	98.36%	1391	GU183573.1
Uncultured bacterium clone NMA12.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	uncultured bacterium	2117	2117	94%	0.0	98.36%	1104	GU183598.1

Database: core_nt [See details](#)

Query ID: lcl|Query_8185465

Description: None

Molecule type: dna

Query Length: 1222

Other reports: [Distance tree of results](#) [MSA viewer](#)

Descriptions | Graphic Summary | **Alignments** | Taxonomy

Alignment view: Pairwise | CDS feature | Restore defaults | Download

100 sequences selected

Download | GenBank | Graphics

FASTA (complete sequence)

FASTA (aligned sequences)

GenBank (complete sequence)

Text (aligned sequences)

Continue | Cancel


strain A52.16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Number of Matches: 1


Next Match | Previous Match

Pos	Gaps	Strand
1/1218 (98%)	4/1218 (0%)	Plus/Plus
TTATGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCTAGGAATCTGCCT		63
TTATGCGGCGGCGGCTGAGTAATGCTAGGAATCTGCCT		80
Query_8185465		123


Kemudian buka web meme suite yaitu <https://meme-suite.org>, dan akan memunculkan beberapa fitur pada web meme suite, kemudian klik MEME



3. Kemudian akan menampilkan beberapa parameters untuk menjalankan aplikasi meme suite seperti mengisi form.



Kemudian tampilan akan seperti ini setelah mengisi sekuen yang telah dimasukkan dalam bentuk file fasta format



Pemilihan *select the motif discovery mode*, untuk memilih bagaimana motif akan muncul. Kemudian *select the sequence alphabet*, untuk memilih dari sekuen apakah yang dimasukkan. Kemudian *input the primary sequences*, untuk memilih sekuen yang akan dicari motifnya dimasukkan dalam bentuk apa, pilihannya ada 3, yaitu ketik sekuen, masukkan melalui fasta format dan masukkan melalui bed file. *Select the distribution*, untuk memilih bagaimana hasil motif keluar apakah dalam 1 per barisan, atau 2, atau kah lebih yang terakhir, *select the number of motifs* untuk memilih berapa motif yang akan muncul pada sekuen. Setelah itu pilih *start search* dan akan muncul beberapa output untuk menampilkan motif dari sekuens tadi

The screenshot shows the MEME Suite web interface. The main content area displays the following job details:

Job Details	
Submitted	11/24/2024, 7:49:23 PM
Expires	11/28/2024, 7:49:23 PM
(Primary) Sequences	One DNA sequence, with a length of 1409 from the file [seqdump_10.txt] which was renamed to [seqdump_10.txt]
Background	A 0-order background model generated from the supplied sequences.
Discovery Mode	Classic: optimizes the E-value of the most informative context
Site Distribution	Any number of repetitions (of a contributing motif site per sequence)
Motif Count	Searching for 3 motifs.
Motif Width	Between 6 wide and 50 wide (inclusive).

Below the job details, there are sections for Results and Status Messages. The Results section lists various output files such as MEME_HTML_output, MEME_XML_output, MEME_text_output, MAST_HTML_output, MAST_XML_output, and MAST_text_output. The Status Messages section shows parsing arguments.

Output HTML: Ini adalah format yang paling mudah dibaca oleh manusia. Hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk:

Logo motif: Gambar visual dari motif yang ditemukan, menunjukkan posisi yang paling terkonservasi.

E-value: Nilai yang menunjukkan seberapa signifikan secara statistik motif tersebut ditemukan. Semakin kecil E-value, semakin signifikan motifnya.

Urutan sekuen: Daftar sekuen yang mengandung motif tersebut.

Output XML: Format ini adalah versi yang lebih terstruktur dari output HTML. Informasi dalam format XML dapat dibaca oleh komputer dan digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Output Teks: Format ini adalah format paling sederhana, menampilkan hasil dalam bentuk teks biasa. Meskipun tidak

semantik HTML, format ini berguna untuk pemrosesan data lebih lanjut menggunakan skrip.


(Primary) Sequences Menampilkan sekuen asli yang dimasukkan dalam bentuk file sebelumnya.

Perbedaan output MEME dan MAST

MEME: Berfokus pada penemuan motif baru dalam sekumpulan sekuen. MEME akan mencari pola berulang yang signifikan secara statistik dalam data Anda, dan kemudian menampilkan motif-motif tersebut dalam bentuk logo motif.

MAST : Digunakan untuk mencari kemunculan motif yang sudah diketahui dalam sekumpulan sekuen. Anda memberikan motif sebagai input, dan MAST akan mencari seberapa sering motif tersebut muncul dalam data Anda.


Tampilan output dari MEME HTML Output



DISCOVERED MOTIFS

Logo	E-value	Sites	Width	More	Submit/Download
1.	1.6e+004	5	28	More	Submit/Download
2.	2.9e+004	5	15	More	Submit/Download
3.	3.4e+004	2	7	More	Submit/Download

Stopped because requested number of motifs (3) found.



Output pada MEME dan MAST HTML akan menampilkan

discovered motif yang terdiri dari :

Logo motifs, adalah gambar grafis yang menunjukkan sekuen dari motif yang ditemukan. Setiap baris pada logo mewakili satu posisi dalam motif, dan tinggi setiap huruf menunjukkan tingkat konservasi di posisi tersebut. Huruf yang lebih tinggi menunjukkan posisi yang lebih terkonservasi di antara semua sekuen yang mengandung motif. Yang berarti, seberapa sering suatu posisi tertentu dalam motif ditempati oleh nukleotida atau asam amino yang sama di seluruh sekuen yang mengandung motif tersebut.

E-value, adalah nilai yang menunjukkan seberapa signifikan secara statistik motif yang ditemukan.

Sites, Menunjukkan berapa kali motif ditemukan dalam sekumpulan sekuen input.

Motif locations, menampilkan lokasi motif yang ditunjukkan dengan angka yang menunjukkan posisi awal dan akhir motif dalam sekuen.

Input & Settings,

MOTIF LOCATIONS

Only Motif Sites Motif Sites+Scanned Sites All Sequences

Name	p-value	Motif Locations
1. MN252088.1	4.56e-13	

Motif CCTTC:CCC:TCGT
Motif MCTAHGGGAGVAAGC
 p-value 2.27e-7
 Start 28
 End 42

GATGATGGGA CCTTC:CCC:TCGT TAGCGGGGA
 GATGATGGGA CCTTC:CCC:TCGT TAGCGGGGA
Motif MCTAHGGGAGVAAGC
 p-value 2.27e-7
 Start 28
 End 42

Role	Source	Alphabet	Sequence Count	Total

Name	p-value	Motif Locations
MN252088.1	4.56e-13	

Motif	Symbol	Motif Consensus
1.		WRGTBGGATTHGCTAGTTVKNKGDKGAAM
2.		MCTAHGGGAGVAAGC
3.		TTRACTT

menampilkan sekuens, background models dan other settings.

- Sequences adalah data utama yang akan dianalisis untuk menemukan motif.
- Background model adalah model statistik yang digunakan untuk membandingkan motif yang ditemukan dengan pola acak.

MEME XML OUTPUT

```

<!-- Document definition -->
<!-- Training set elements -->
<!-- Model elements -->
<!-- Motif elements -->
<!-- Contributing site elements -->
<!-- Contributing sites are motif occurrences found during the motif discovery phase -->
<!-- The left_flank contains the sequence for 10 bases to the left of the motif start -->
<!-- The site contains the sequence for the motif instance -->
<!-- The right_flank contains the sequence for 10 bases to the right of the motif end -->
<!-- Scanned site elements -->
<!-- Utility elements -->
<!-- A reference to a letter in the alphabet -->
<!-- An alphabet_array contains one floating point value for each letter in an alphabet -->
<!-- An alphabet_matrix contains one alphabet_array for each position in a motif -->
<!-- Begin document body -->
MEME version="5.5.0" (release date: Wed Jun 19 13:59:04 2024 -0700)
w<training_set primary_sequences="seqdump_10.txt" primary_positions="1409" control_sequences="" none="" control_count="0" control_positions="0">
  w<alphabet name="DNA" lines="dna">
    <letter id="A" symbol="A" complement="T" name="Adenine" colour="CC0000"/>
    <letter id="C" symbol="C" complement="G" name="Cytosine" colour="0000CC"/>
    <letter id="G" symbol="G" complement="C" name="Guanine" colour="FF0000"/>
    <letter id="T" symbol="T" aliases="U" complement="A" name="Thymine" colour="000000"/>
    <letter id="M" symbol="M" aliases="AC" equals="ACG" name="Any base"/>
    <letter id="W" symbol="W" equals="ACG" name="Not T"/>
    <letter id="D" symbol="D" equals="AGT" name="Not C"/>
    <letter id="B" symbol="B" equals="CGT" name="Not A"/>
    <letter id="H" symbol="H" equals="AC" name="Amino"/>
    <letter id="M" symbol="M" equals="AG" name="Purine"/>
    <letter id="S" symbol="S" equals="AT" name="Weak"/>
    <letter id="T" symbol="T" equals="CG" name="Strong"/>
    <letter id="K" symbol="K" equals="CT" name="Pyrimidine"/>
    <letter id="K" symbol="K" equals="GT" name="Xeto"/>
  </alphabet>
  <sequence id="sequence_0" name="TGTGTGTGTGT" length="1409" weight="1.000000"/>
  w<letter_frequencies>
    w<alphabet_array>
      <value letter_id="A">0.23/</value>
    </alphabet_array>
  </letter_frequencies>
</training_set>
seqdump (10).txt
  
```

MEME TEXT OUTPUT

```

MEME - Motif discovery tool
MEME version 5.5.0 (release date: Wed Jun 19 13:59:04 2024 -0700)
For further information on how to interpret these results please access https://meme-suite.org/meme.
To get a copy of the MEME Suite software please access https://meme-suite.org.

REFERENCE
If you use this program in your research, please cite:
Timothy L. Bailey and Charles Elkan,
"Finding a structure model by expectation maximization to
discover motifs in biopolymers",
Proceedings of the Second International Conference on Intelligent Systems
for Molecular Biology, pp. 28-36, AAAI Press, Menlo Park, California, 1994.

TRAINING SET
PRIMARY SEQUENCES= seqdump_10.txt
CONTROL SEQUENCES= --none--
ALPHABET= ACCT
Sequence name      Weight Length  Sequence name      Weight Length
TGTGTGTGTGT       1.0000  1409
TGTGTGTGTGT
COPYRIGHT LINE SUPPLY
This information can also be useful in the event you wish to report a
problem with the MEME software.
command: meme seqdump_10.txt -dna -oc . -nostatus -lsize 14400 -mod amr -motifis 3 -minu 6 -maxu 50 -obifun classic -revcomp -markov order 0
seqdump (10).txt
  
```

HASIL OUTPUT PADA MAST HTML OUTPUT

MAST
Motif Alignment & Search Tool

For further information on how to interpret these results <http://meme-suite.org/meme/doc/mast.html>.
To get a copy of the MEME software please access <https://meme-suite.org>.

If you use MAST in your research, please cite the following paper:
Timothy L. Bailey and Michael Gribskov, "Combining evidence using p-values: application to sequence homology searcher", *Bioinformatics* 14(1):48-54, 1998. [\[Full text\]](#)

[Home](#) | [Search Results](#) | [Inputs & Settings](#) | [Program Information](#) | [Results in Text Format](#) | [Results in XML Format](#)

MOTIFS

Logo	Name	Alt. Name	Width	Motif Similarity Matrix		
				1.	2.	3.
	WRRTGGATHGCTAGTAVKNGDKGAAM	MEME-1	28	--	0.25	0.47
	MCTAHGGGAGVAAGC	MEME-2	15	0.25	--	0.19
	TTAAGTT	MEME-3	7	0.47	0.19	--

SEARCH RESULTS

Top Scoring Sequences

Each of the following 1 sequences has an E-value less than 10.
The motif matches shown have a position p-value less than 0.0001.
Hover the cursor over the sequence name to view more information about a sequence.
Hover the cursor over a motif for more information about the match.

seqdump (10).txt

SEARCH RESULTS

Top Scoring Sequences

Each of the following 1 sequences has an E-value less than 10.
The motif matches shown have a position p-value less than 0.0001.
Hover the cursor over the sequence name to view more information about a sequence.
Hover the cursor over a motif for more information about the match.
Click on the arrow (1) next to the E-value to see the sequence surrounding each match.

Sequence E-value

MN252088.1 1.5e-12

Block Diagram

WRRTGGATHGCTAGTAVKNGDKGAAM MCTAHGGGAGVAAGC TTAAGTT

INPUTS & SETTINGS

Alphabet

Background Source: an old version of the NCBI non-redundant database

Name	Bq.	~	T	Bq.	Name
Adenine	0.274262	A	~	0.274262	Thymine
Cytosine	0.22521	C	~	0.22521	Guanine


Sequences

The following sequence database was supplied to MAST.

Database	Sequence Count	Residue Count	Last Modified
ncbi.nlm.nih.gov	1	1490	6 Jun 2004 03:48:33 3034

seqdump (10).txt

TAMPILAN UNTUK Output PRIMARY (SEQUENCES)



```
>MN252888.1 Ectopseudomonas guguanensis strain A52 165 ribosomal RNA gene, partial sequence
ACACATGCAGTCGAGCGGATGATGGGAGCTTGCCTCCCTGATTAGCGCGCGGACGGGTGAGTAAATGCCTAGGAATCTGCCTGGTAGTGGGGGATAACGTTT
CGAAAGGAAAGCCTAATACCGCATAGCTCCCTACGGGAGAAAGCAGGGGACCTTCGGGCTTTCGCGTATCAGATGAGCCTAAGTGCATAGTGGTGGT
AGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGATCCGTACTGGTCTGAGAGGATGATCACTCACTGGAAGTGGAACTGGAACTGGCAAGCTCTACGGGAGGACGAG
TGGGGAATATGGCAATGGGCAAGGCTGATCCAGCCATGCGCGCTGTGTGAAGAGGCTTTCGGATTTGTAAGGACTTTAAGTGGGAGGAAAGGCT
GCTGGTAAATACCTGCAAGTTTTGACGTTACCAACAGAATAAGCACCCGCTAAGTTCGTCGACGACGCGGTAATACGAAGGTTGCAAGGCTTAATCG
GAATTAAGTGGGCTAAGGCGCGCTAGTGGTTTTGTAAGTTGGAGGTGAAATCCCGGGCTCAACTGGGAACTGCCTCCAAAAGTGCATGACTAGAGT
ACGGTAGAGGGTGGTGAATTTCTGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATAGGAAGGAAACACCAAGTGGGCAAGGCGACACCTGACTGACTGACTGACT
GAGGTGCGAAAGGCTGGGAGCAAAAGGATTAGATACCTGGTGTAGTCCAGCGGTAAGCAATGTCACACTAGCCGTTGGAATCCTTGAGATTTAGTGGC
CGAGTCAACGCAATTAAGTTGACGCTGGGGAGTACGGCGCAAGGTTAAAACTCAATGAAATGACGGGGCCCGACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTT
AATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGCTTGGATGCTGAGAACCTTCCAGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAAGTCAAGACAGGCTGCTGATG
GCTGTGTCAGCTGCTGCTGAGATGTTGGGTTAAGTCCGTAACGAGCGCAACCTTGTCTTATGTTACAGCACCTCGGGTGGGCACTTAAGGAGA
CTGCCCCTGACAAACCGGAGGAAAGTGGGGATGACGTCGAAGTCAATGCGCCCTTACGGCCAGGGCTACACAGTGCTACAATGGTGGTACAAAAGGTT
GCCAAGCGCGAGGTGAGCTAATCCATAAAACCGATGATGCGGATCGAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGTGGAAATCGCTAGTAACTCGG666
TCAGAATGTCACGGTGAATACCTTCCGG66CTTGTACACACGCCCCTCACACCATGGGAGTGG66TGTCCAGAAGTACTGCTAACTTCGG666
GACGGTACC
```


Hasil dari meme suite ini dapat dijadikan sebagai promotor dan ekspresi gen lebih lanjut setelah dianalisis melalui aplikasi Transfac atau Jasper, untuk mencari faktor transkripsi yang memiliki motif pengikatan yang mirip dengan motif yang ditemukan. Kemudian dilanjutkan dengan web Chip-seq untuk mengkonfirmasi apakah faktor transkripsi yang diprediksi benar-benar mengikat pada motif yang ditemukan melalui web meme suite ini.



BAB 10
SWISS MODEL

Swiss-Model adalah sebuah alat atau server berbasis web yang sangat populer, digunakan secara luas dalam bidang bioinformatika untuk memprediksi struktur tiga dimensi (3D) protein. Dengan menggunakan informasi dari urutan asam amino suatu protein (sekuens protein) dan membandingkannya dengan struktur protein yang sudah diketahui (template), Swiss-Model dapat menghasilkan model struktur 3D protein yang baru dimana proses ini dikenal sebagai pemodelan homologi.

Adapun fitur utama dalam aplikasi bioinformatika Swiss



Model antara lain:

Pemodelan Homologi Otomatis: Ini adalah fitur inti dari Swiss-Model. Dengan memasukkan urutan asam amino suatu protein, Swiss-Model secara otomatis akan mencari template yang paling

cocok dalam database-nya, kemudian membangun model struktur 3D protein target.

Database Template yang Komprehensif: Swiss-Model memiliki akses ke database struktur protein yang sangat besar, termasuk Protein Data Bank (PDB) dan AlphaFoldDB. Ini memungkinkan pemilihan template yang sangat beragam dan akurat.

Evaluasi Kualitas Model: Swiss-Model menyediakan berbagai metrik untuk mengevaluasi kualitas model yang dihasilkan, seperti QMEAN, GDT-HA, dan Verify3D. Metrik-metrik ini membantu peneliti dalam menilai keandalan model.

Visualisasi Struktur: Hasil pemodelan dapat langsung divisualisasikan dalam format 3D menggunakan program visualisasi molekul seperti PyMOL atau Jmol. Ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis struktur protein secara visual.

Prosedur Penggunaan Situs Web Swiss Model

Adapun urutan aplikasi atau web yang digunakan dalam pemodelan struktur terdapat 4 yaitu Expasy, NCBI (Blast),



Uniprot dn Pymol

Pemodelan struktur 3D dari sekuen protein dapat

dilakukan dengan menggunakan situs web Swiss model, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

Buka web Expsy kemudian salin sampel (PCR) lalu klik translate

Translate tool

Translate is a tool which allows the translation of a nucleotide (DNA/RNA) sequence to a protein sequence.

DNA or RNA sequence

```
TGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCACAAG
AGCGCAACCCCTTTCTTACTTGCCAGCATTTC
GGATGGGAACCTTTAAGGATACTGCCAGTGACA
ACTGGAGAAAGCGGGGACGACCTCAGTCAT
CATGGCCCTACGGCCAGGGCTACCACGTGCT
ACATGGTCGTTACAAGGGTTGCTACCAGCGAT
NGNTGCTATCTCAAAGCCGATCAATCCGGAT
GGNGTTGCACTCGACTCCTGANATCGGAATCC
TNTAATCCGGATCAAAGC
```

Output format

- Verbose: Met, Stop, spaces between residues
- Compact: M, -, no spaces
- Includes nucleotide sequence
- Includes nucleotide sequence, no spaces

DNA strands

- forward reverse

Genetic codes - See NCBI's genetic codes

Standard

reset TRANSLATE!

Setelah itu, klik salah satu huruf M yang berwarna merah dari hasil translate

Results of translation

- Open reading frames are highlighted in red
- Select your initiator on one of the following frames to retrieve your amino acid sequence

Download all the translated frames

5'3' Frame 1

```
XSACTLS-RRTGE-CLGICLLVDNIPKGMLIPHTSYGRKQGIFGPCANR-A-VGLASWWGKGLPRRRSVAGLRG-SATLGLRHGPD
SYGRQCGWILDNGNPDPAMPRV-RRPYGCKAL-ARRLLRLILLDSGRYSQNKHRLTLCCQPR-YRGGER-SDLLGVKRA-AAF-V
GCEIPELNLGIAFDTKLEYGRGW-NSRCSGEMRRDLEEYRWRROPSGLILLTLRVESMGSKOD-IPW-SMP-TMSTSWGL-GFSGA
ANAISRPPPEYGRKTKOMN-RGPQAQVEHVV-FDTRRTLPGLDILETFQWIGAFGNLDTGAAWLSSARVRCVVKSRNERNPFPP
YLPAPFRMGTLRILPVTTGRRGRQSSWPLRPLRPRATWSVQGLLPAXXATSKADLIRMXLHSTPXIGIX-SGSK
```

5'3' Frame 2

```
XVLAPYLSGGRVSN-ESAY-WCTTFRKEC-YRIRPTGESRGSDDLIDEPKSD-LVGGVKAYQGDDL-RV-EDDPHWD-DTAQT
FTGGSSGEYWTMGETLIQPCRVCEEGLMVVKHFKRGGY-D-YSWIVDVTRRISTG-LCASSRNGTEGASVNRUYWA-SVRRRLFKS
DVKSPSLTWELHSILGS-SMGEDGRIPGVAVKQVEIWRNTDGEGSHA-Y-R-GTKAWGANRIRYPGSPCRKRCLLAVGAFEALVAQ
LTR-VDRLGSTVARLKLK-IDGGPHKRNSMWFNSMOREEPYLALTY-KLSRDGLVPSGI-IQVLHGCRQLVS-DVGLSPATSATLFL
TCQHGWEL-GYCC-QLEEGDDVSHHGPYGGYHVHLHGRYKGYQRXXLSQKPI-SGWXCTRLLXSEXPNDOS
```

5'3' Frame 3

```
XCLHLLAADG-VMLRNLPISSGGOHSERNANTAYVLRKAGDLRLR--MSLSRIS-LVG-RPTKATICSGERMIRHTGTETRPRI
LREAAVGNIGWGKP-SSHAACVKALWL-STLSEEEATENTLG-WTLLEAE-APANSVFAAAVIQRVVALIGFTGRKACVGGFLSR
M-NPRALGNICIRYWEARVWERVEFOV-R-NA-RSGGIPMAKAAIWPNTDAEVRKHGEQTGLDTLVVHAVNDVY-PLGPLRL-WRS
```

Kemudian salin urutan pasangan asam amino dalam bentuk Fasta format

Your selected amino-acid sequence

Pseudo-entry

```
ID VIRT-2993475 Unreviewed; 21 AA.  
AC VIRT-2993475;  
DE Translation of nucleotide sequence generated on Expasy  
DE 5'3' Frame 1, start_pos=29  
DE on Mon Dec 16 10:55:14 CET 2024 by 192.33.215.78  
CC -!- This virtual protein sequence will automatically be deleted  
CC from the server after a few days.  
SQ SEQUENCE 21 AA; 7077D29D8E4C725F CRC64.  
MLIPHTSYGR KQGIFGPCAN R  
//
```

Fasta format

```
> VIRT-2993475:5'3' Frame 1, start_pos=29  
MLIPHTSYGRKQGIFGPCANR
```



Selanjutnya, buka web NCBI lalu pilih Protein blast kemudian paste ke dalam Blastp lalu klik Blast

Basic Local Alignment Search Tool

BLAST finds regions of similarity between biological sequences. The program compares nucleotide or protein sequences to sequence databases and calculates the statistical significance. [Learn more](#)

Non-interactive searches of nt switch to core_nt
Starting late September 2024 all non-interactive WebBLAST and PrimerBLAST searches of "nt" will
Tue, 24 Sep 2024 [More BLAST news...](#)

Web BLAST



BLASTP programs search protein databases using a protein query. [more...](#) [Reset page](#) [Bookmark](#)

Enter Query Sequence

Enter accession number(s), gi(s), or FASTA sequence(s) [Clear](#) **Query subrange**

MLIPHTSYGRKGGFGPCANR From To

Or, upload file No file chosen

Job Title

Enter a descriptive title for your BLAST search

Align two or more sequences

Choose Search Set

Databases Standard databases (nr etc.) Experimental databases

Compare Select to compare standard and experimental database

Standard

Database [?](#)

Organism exclude [Add organism](#)

Optional [?](#)

Exclude Models (XM/XP) Non-redundant RefSeq proteins (WP) Uncultured/environmental sample sequences

Optional

Pilih salah satu spesies untuk diidentifikasi lebih lanjut, lalu klik 2 kali untuk mengetahui nama spesiesnya kemudian salin

Descriptions		Graphic Summary	Alignments	Taxonomy				
Download ▾ Select columns ▾ Show 100 ▾ ?								
Sequences producing significant alignments								
<input type="checkbox"/> select all 1 sequences selected GenPept Graphics Distance tree of results Multiple alignment MSA Viewer								
Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
<input type="checkbox"/> MFS transporter [Straptacidiphilus melanogenes]	Straptacidiphilus m...	35.0	35.0	71%	14	73.33%	430	WP_160311682.1
<input type="checkbox"/> MFS transporter [Amycolatopsis sp. WAC 04169]	Amycolatopsis sp. ...	33.7	33.7	71%	38	73.33%	432	WP_158634100.1
<input type="checkbox"/> hypothetical protein DMG61_17495 [Amycolatopsis sp. WAC 04169]	Amycolatopsis sp. ...	33.7	33.7	71%	38	73.33%	440	RSN30035.1
<input type="checkbox"/> chaperonin 10-like protein [Talaromyces proteolyticus]	Talaromyces proteol...	33.3	33.3	71%	54	66.67%	365	XP_046066458.1
<input type="checkbox"/> hypothetical protein [Aeromonas caviae]	Aeromonas caviae	32.9	32.9	66%	71	78.57%	62	WP_223936943.1
<input type="checkbox"/> PHD-finger [Desophagostomum dentatum]	Desophagostomum...	32.5	32.5	42%	107	100.00%	372	KH180327.1
<input type="checkbox"/> PHD-finger [Desophagostomum dentatum]	Desophagostomum...	32.5	32.5	42%	107	100.00%	392	KH193728.1
<input type="checkbox"/> TPA_hypothetical protein [Streptococcus suis]	Streptococcus suis	32.0	32.0	52%	149	81.82%	190	HEM3497646.1
<input type="checkbox"/> FtsW/RodA/SpoVE family cell cycle protein [candidate division WOR-3 bacterium]	candidate division ...	32.0	32.0	47%	151	90.00%	413	MRN2537414.1
<input type="checkbox"/> MFS transporter [Straptacidiphilus sp. PB12-B1b]	Straptacidiphilus sp. ...	32.0	32.0	71%	151	66.67%	434	WP_182441042.1
<input type="checkbox"/> cytochrome c biogenesis protein CcsA [Spirosomataceae bacterium]	Spirosomataceae b...	32.0	32.0	57%	152	83.33%	720	MCU0326892.1
<input type="checkbox"/> TPA_CoA-binding protein [Actinomycesetota bacterium]	Actinomycesetota bac...	31.6	31.6	71%	209	48.00%	140	HEX6400263.1
<input checked="" type="checkbox"/> hypothetical protein DMG64_03530 [Acidobacteriota bacterium]	Acidobacteriota bac...	31.6	31.6	66%	212	78.57%	254	PYY05131.1
<input type="checkbox"/> thiolase family protein [Nonlabens ponticola]	Nonlabens ponticola	31.6	31.6	80%	213	73.68%	391	WP_126448265.1
<input type="checkbox"/> Visk1 family protein [Desulfobacteriota bacterium]	Desulfobacteriota b...	31.6	31.6	62%	213	81.82%	474	MP10511740.1

Download ▾ GenPept Graphics Next Previous ◀ Descriptions

MAG: hypothetical protein DMG64_03530 [Acidobacteriota bacterium]

Sequence ID: [PYY05131.1](#) Length: 254 Number of Matches: 1

Range 1: 235 to 246 Next Match Previous Match

Score	Expect	Identities	Positives	Gaps
31.6 bits(67)	212	11/14(79%)	11/14(78%)	2/14(14%)

Query 1 MLIPHTSYGRKQGI 14
 MLIP T GRKQGI
 Sbjct 235 MLIPFT--GRKQGI 246

Selanjutnya buka web Uniprot lalu paste nama spesies yang telah di salin dan klik search Kemudian ceklis salah satu spesies yang akan di identifikasi dan klik kode Entrynya

UniProtKB 1,912,472 results

Tools • Download (1) • Add View: Cards Table • Customize columns • Share • 1 row selected out of 25

Entry	Entry Name	Protein Names	Gene Names	Organism	Length
<input checked="" type="checkbox"/> A0A2V9L7K8	A0A2V9L7K8_UNCAI	Bifunctional protein GimU[...]	gimU, DMG27_08840	Acidobacteriota bacterium	638 AA
<input type="checkbox"/> A0A3E0NLS9	A0A3E0NLS9_UNCAI	Bifunctional NAD(P)H-hydrate repair enzyme[...]	nnrD, nnrE, DWQ36_21415	Acidobacteriota bacterium	574 AA
<input type="checkbox"/> A0A949M116	A0A949M116_UNCAI	Multifunctional fusion protein[...]	acpS, nnrD, nnrE, KGR18_08135	Acidobacteriota bacterium	620 AA
<input type="checkbox"/> A0A2V7YY52	A0A2V7YY52_UNCAI	Multifunctional fusion protein[...]	aroK, thiE, DMF54_14015	Acidobacteriota bacterium	408 AA
<input type="checkbox"/> A0A2V9FND6	A0A2V9FND6_UNCAI	Multifunctional fusion protein[...]	plsY, gpsA, DMG55_16550	Acidobacteriota bacterium	532 AA

Find your protein

UniProtKB • Acidobacteriota bacterium X Advanced | List Search

Examples: Insulin, APP, Human, P05067, organism_id:9606

UniProt is the world's leading high-quality, comprehensive and freely accessible resource of protein sequence and functional information. Cite UniProt[®]

Kemudian akan muncul beberapa data seperti catalytic activity, cofactor, pathway, features (Active site dan Binding site) dll. Selanjutnya pada halaman pertama salin ID lalu masukkan kedalam Swiss model

UniProt BLAST Align Peptide search ID mapping SPARQL UniProtKB Advanced | List Search Help

A0A2V9L7K8 · A0A2V9L7K8_UNCAI

Function

Names & Taxonomy Protein¹ Bifunctional protein GImU Amino acids 638 (go to sequence)

Subcellular Location Gene² glmU Protein existence¹ Inferred from homology

Phenotypes & Variants Status¹ UniProtKB unreviewed (TrEMBL) Annotation score¹ 95

PTM/Processing Organism¹ Acidobacteriota bacterium

Expression

Interaction

Structure

Family & Domains

Sequence

Similar Proteins

Entry Variant viewer **Feature viewer** Genomic coordinates Publications External links History

Tools · Download Add Add a publication Entry feedback


Function¹

Catalyzes the last two sequential reactions in the de novo biosynthetic pathway for UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc). The C-terminal domain catalyzes the transfer of acetyl group from acetyl coenzyme A to glucosamine-1-phosphate (GlcN-1-P) to produce N-acetylglucosamine-1-phosphate (GlcNAc-1-P), which is converted into UDP-GlcNAc by the transfer of uridine 5-monophosphate (from

Features

Showing features for binding site¹, active site¹.

Download



TYPE	ID	POSITION(S)	DESCRIPTION
------	----	-------------	-------------

Catalytic activity

Rhea 13509 [↗](#) N-acetyl-alpha-D-glucosamine 1-phosphate + UTP + H⁺ = UDP-N-acetyl-alpha-D-glucosamine + diphosphate

[Automatic Annotation](#)

EC:2.7.7.23 ([UniProtKB](#) | [ENZYME](#) [↗](#) | [Rhea](#) [↗](#))

Hide Rhea reaction [^](#)


N-acetyl-α-D-glucosamine 1-phosphate
CHEBI:57776

UTP
CHEBI:46398

H⁺
CHEBI:15378

UDP-N-acetyl-α-D-glucosamine
CHEBI:57705

diphosphate
CHEBI:33019



Cofactor

Mg²⁺ ([UniProtKB](#) | [Rhea](#) [↗](#) | [CHEBI:18420](#) [↗](#)) [Automatic Annotation](#)

Note: Binds 1 Mg²⁺ ion per subunit. [Automatic Annotation](#)

Pathway

Bacterial outer membrane biogenesis; LPS lipid A biosynthesis. [Automatic Annotation](#)

Nucleotide-sugar biosynthesis; UDP-N-acetyl-alpha-D-glucosamine biosynthesis; N-acetyl-alpha-D-glucosamine 1-phosphate from alpha-D-glucosamine 6-phosphate (route II): step 2/2. [Automatic Annotation](#)

Nucleotide-sugar biosynthesis; UDP-N-acetyl-alpha-D-glucosamine biosynthesis; UDP-N-acetyl-alpha-D-glucosamine from N-acetyl-alpha-D-glucosamine 1-phosphate: step 1/1. [Automatic Annotation](#)

TYPE	ID	POSITION(S)	DESCRIPTION	
<input type="text" value="-- Select --"/>				
▶ Binding site	19-22		UDP-N-acetyl-alpha-D-glucosamine (UniProtKB ChEBI ↗) Automatic Annotation	Tools Add
▶ Binding site	33		UDP-N-acetyl-alpha-D-glucosamine (UniProtKB ChEBI ↗) Automatic Annotation	
▶ Binding site	84		UDP-N-acetyl-alpha-D-glucosamine (UniProtKB ChEBI ↗) Automatic Annotation	
▶ Binding site	89-90		UDP-N-acetyl-alpha-D-glucosamine (UniProtKB ChEBI ↗) Automatic Annotation	
▶ Binding site	115		Mg ²⁺ (UniProtKB ChEBI ↗) Automatic Annotation	
▶ Binding site	152		UDP-N-acetyl-alpha-D-glucosamine (UniProtKB ChEBI ↗) Automatic Annotation	

[Expand table](#)

Buka situs web Swiss-Model melalui link: <https://swissmodel.expasy.org/interactive> lalu klik "Star Modelling"



Optional

Search For Templates

Build Model

By using the SWISS-MODEL server, you agree to comply with the following [terms of use](#) and to cite the corresponding [articles](#).

The image shows a section of the website with a white background and a thin border. At the top, the word "Optional" is written in a small font. Below it are two blue buttons: "Search For Templates" on the left and "Build Model" on the right. At the bottom of this section, there is a line of small text that reads: "By using the SWISS-MODEL server, you agree to comply with the following terms of use and to cite the corresponding articles."

Paste "ID Protein" yang telah di dapat dari web Uniprot kedalam kotak yang telah disediakan, kemudian akan muncul beberapa urutan pasangan asam amino seperti pada gambar kedua

Selanjutnya klik Search for templates untuk identifikasi lebih lanjut, tunggu beberapa saat untuk roses lebih lanjut seperti gambar yang tertera

A0A2V9L7K8_UNCAI A0A2V9L7K8 Bifunctional protein GlmU Created: today at 11:53

Summary Templates Models Project Data

Template Results

The search for templates matching your target sequence is currently running. Please wait.

...running HMMits against SHTL
 ...obtaining multiple sequence alignment for target sequence with HMMits
 ...predicting residue burial status with ACpro
 ...searching PDB profile database with previously built query profile
 ...running BLAST against SHTL

If you want to come back later, bookmark this link:


<https://swissmodel.expasy.org/interactive/K088fC/>

MAKRVGERPADGFSVLLAAKATREKSEHSKVLHRLAGRPLGEYALRTALAAGPERAYHVVGHEAEVVRTFARPLTFIEQEQLGTGHALVWARPE
 LEECPSPITLVALVGDAPILRAETLRGLVDAHRKARAATVLTLYLDDPRGYGRIIRAGRAGRPPGGRTRSKQESGYVRAIVEERVSTPAQKTIHEVSG
 ILCFSRAKLERLELDELNRNAQQEYLLDLIEIFNRHREKVTAFPVADSRVGVGNDRVELAQVEKILRRRKAESLRDGDVTVVNHPEVYIDEDVEAGSG
 TVIEPGVSLLGSTRVGRACLRPYSYIVDSALGDRVTVRHYSLITGSEVASGAVIGPFAHLRDGAVIDEAEARIGNFVEVKKSRVGRRTKALHLTYLGDAT
 LEENVVAGTVTCNVYDGEKHPTLEKGVFVSGSMLVAPVRIGKDSYVVGAGSTITTEDVPPESLALGRAPOINKEGWVRRKHKRKEGGGOGRPSPAVPA

Kemudian ceklis salah satu spesies lalu klik Build Models

Template Results

Templates	Quaternary Structure	Sequence Similarity	Alignment	More
<input checked="" type="checkbox"/> A0A2V9L7K8.1A Bifunctional protein GlmU AlphaFold DB model of A0A2V9L7K8_UNCAI (gene; organism: <i>Acetobacter diaetium</i>)	0.87	100.00	AlphaFold v2	monomer ✓
<input type="checkbox"/> 1hm2.2 C UDP-N-ACETYLGLUCOSAMINE-1-PHOSPHATE URIDYLTRANSFERASE CRYSTAL STRUCTURE OF S-PNEUMONIAE N-ACETYLGLUCOSAMINE-1-PHOSPHATE URIDYLTRANSFERASE GLMU, BOUND TO ACETYL COENZYME A AND UDP-N-ACETYLGLUCOSAMINE	0.63	0.75	44.71	X-ray, 1.8Å homo-trimer ✓
<input type="checkbox"/> 1q97.1 C N-ACETYLGLUCOSAMINE-1-PHOSPHATE URIDYLTRANSFERASE S-PNEUMONIAE GLMU COMPLEXED WITH UDP-N-ACETYLGLUCOSAMINE AND MG2+	0.63	0.74	45.03	X-ray, 2.6Å homo-trimer ✓
<input type="checkbox"/> 1q95.1 C N-ACETYLGLUCOSAMINE-1-PHOSPHATE URIDYLTRANSFERASE CRYSTAL STRUCTURE OF S-PNEUMONIAE GLMU, APO FORM	0.61	0.74	45.03	X-ray, 2.3Å homo-trimer ✓
<input type="checkbox"/> 1hm5.1 C UDP-N-ACETYLGLUCOSAMINE-1-PHOSPHATE URIDYLTRANSFERASE CRYSTAL STRUCTURE OF S-PNEUMONIAE N-ACETYLGLUCOSAMINE-1-PHOSPHATE URIDYLTRANSFERASE GLMU, BOUND TO ACETYL COENZYME A				



Selanjutnya akan muncul seperti gambar yang tertera, klik download dalam bentuk PDB Format untuk visualisasi pemodelan struktur di aplikasi pymol

Dalam pemodelan struktur 3D ada beberapa pilihan

A0A2V9L7K8_UNCAI A0A2V9L7K8 Bifunctional protein GImU Created: today at 11:53

Summary Templates 50 Models 1 Project Data ▾

Model Results ▾ Order by: GMQE ▾

1 638

Model 01



Structure Assessment

Compare

Download files  Display files 

Oligo-State Monomer GMQE 0.87


Template A0A2V9L7K8.1 A Bifunctional protein GImU Seq Identity 100.00%
AlphaFold DB model of A0A2V9L7K8_UNCAI (gene: gImU, organism: Acidobacteriota bacterium) Coverage

Model-Template Alignment



  Tube ▾    

model struktur yang disiapkan misalnya: (Tube, Cartoon, Trace, Lines, Ball+Stick, Licorice, Hyperball, Rope, Surface, Spacefill) secara berurut pada gambar dibawah.





Cartoon ▾ ▸ ▶ ◂ ◃

BallAndStick ▾ ▸ ▶ ◂ ◃

Trace ▾ ▸ ▶ ◂ ◃

Lines ▾ ▸ ▶ ◂ ◃




Licence ▾

Hyperball ▾ ▸ ▶ ◂ ◃

Rope ▾ ▸ ▶ ◂ ◃



Untuk mengganti model struktur dengan mengklik salah satu pilihan yang tertera di bawah struktur seperti pada



gambar. Selanjutnya dilakukan identifikasi menggunakan aplikasi

PyMOL

Swiss-Model berfungsi seperti seorang pemodel yang ahli dalam membuat struktur protein. Jika Anda memiliki urutan asam amino (sekuen) protein, Swiss-Model dapat menghasilkan model tiga dimensi protein yang sesuai





dengan urutan tersebut.

membuka web *ExPasy Tool* kemudian mentranslate urutan nukleotida menjadi urutan asam amino. Disini sampel yang gunakan sampel EA2. Kemudian akan muncul hasil translate dan dipilih salah satu frame.



Selanjutnya akan muncul hasil dan block urutan asam amino kemudian di BLASTP





Kemudian akan muncul jenis bakteri yang mirip dengan sekuen protein tadi dan klik salah satu

kemudian blok nama bakterinya dan masuk ke web *UniProt*

The image shows a detailed view of a UniProt protein entry. At the top, there's a sequence viewer with a protein bar and a label 'Pse_aerugin_2' and 'Alpha-amylase'. A callout box points to the 'Pse_aerugin_2' label with the text '(UniProt accession via-REST)'. Below the sequence, there's a 3D ribbon diagram of the protein structure. A callout box points to it with the text '3D page visualization (using ASTEX plugin)'. Below the structure, there's a sequence alignment section with two sequences and their alignment. A callout box points to the alignment section with the text 'Facile integration with SWISS-MODEL Workspace'. At the bottom, there's a 'Model quality assessment' plot. A callout box points to it with the text 'Model Quality Estimate'.

UniProt adalah basis data protein yang sangat

The image shows the UniProt website homepage. The main heading is 'Find your protein'. Below it, there's a search bar with 'Pseudomonas aeruginosa' entered. There are navigation links for 'BLAST', 'Align', 'Peptide search', 'ID mapping', and 'SPARQL'. The page also includes a 'Feedback' button and a footer with a privacy notice: 'We'd like to inform you that we have updated our Privacy Notice to comply with Europe's new General Data Protection Regulation (GDPR) that applies since 25 May 2018.' There is an 'Accept' button next to the notice.

UniProtKB BLAST Align Peptide search ID mapping SPARQL UniProtKB Pseudomonas atacamensis

Status

- Unreviewed (TrEMBL) (5,463)

Taxonomy

Filter by taxonomy

Group by

- Taxonomy
- Keywords
- Gene Ontology
- Enzyme Class

Proteins with

- Active site (240)
- Activity regulation (9)
- Binding site (386)
- Catalytic activity (924)

UniProtKB 5,463 results

Entry	Entry Name	Protein Names	Gene Names	Organism	Length
A0AAQ2I1U0	A0AAQ2I1U0_9PSED	Bifunctional NAD(P)H-hydrate repair enzyme[...]	nnrE, nnrD, E5170_06060	Pseudomonas atacamensis	469 AA
A0AAQ2DE55	A0AAQ2DE55_9PSED	Multifunctional fusion protein[...]	cysN, cysC, E5170_00940	Pseudomonas atacamensis	632 AA
A0AAQ2D8F0	A0AAQ2D8F0_9PSED	Siroheme synthase[...]	cobA, cysG, E5170_21950	Pseudomonas atacamensis	464 AA
A0AAQ2D9N2	A0AAQ2D9N2_9PSED	Fatty acid oxidation complex subunit alpha[...]	fadB, E5170_23585	Pseudomonas atacamensis	715 AA
A0AAQ2D728	A0AAQ2D728_9PSED	Pantothenate synthetase[...]	panC, E5170_25305	Pseudomonas atacamensis	266 AA
A0AAQ2D7V7	A0AAQ2D7V7_9PSED	Aspartate-semialdehyde dehydrogenase[...]	asd, E5170_24450	Pseudomonas atacamensis	370 AA

We'd like to inform you that we have updated our [Privacy Notice](#) to comply with Europe's new General Data Protection Regulation (GDPR) that applies since 25 May 2018. [Accept](#)

Klik salah satu kode yang muncul pada basis data *UniProt* kemudian salin ID untuk dimasukkan kedalam *Swiss-model*

UniProtKB BLAST Align Peptide search ID mapping SPARQL UniProtKB nnrE - Bifunctional NAD(P)H-hydrate repair enzyme

A0AAQ2I1U0 · A0AAQ2I1U0_9PSED

Protein: Bifunctional NAD(P)H-hydrate repair enzyme

Gene: nnrE

Status: UniProtKB unreviewed (TrEMBL)

Organism: Pseudomonas atacamensis

Amino acids: 499 (to sequence)

Protein existence: Inferred from homology

Annotation score: 1.00


Function

Bifunctional enzyme that catalyzes the epimerization of the S- and R-forms of NAD(P)HX and the dehydration of the S-form of NAD(P)HX at the expense of ADP, which is converted to AMP. This allows the repair of both epimers of NAD(P)HX, a damaged form of NAD(P)H that is a result of enzymatic or heat-dependent hydration. [Automatic Annotation](#)

Catalyzes the dehydration of the S-form of NAD(P)HX at the expense of ADP, which is converted to AMP. Together with NAD(P)HX epimerase, which catalyzes the epimerization of the S- and R-forms, the enzyme allows the repair of both epimers of NAD(P)HX.

We'd like to inform you that we have updated our [Privacy Notice](#) to comply with Europe's new General Data Protection Regulation (GDPR) that applies since 25 May 2018. [Accept](#)

Buka web *Swiss-Model*, kemudian klik *Start Modelling* selanjutnya masukkan ID yang telah disalin tadi



Target Sequence(s): Kotak berwarna kuning ini adalah tempat Anda memasukkan urutan asam amino dari protein yang ingin Anda modelkan. Urutan asam amino ini biasanya dalam format FASTA.



Add Hetero Target: Tombol ini digunakan jika Anda ingin menambahkan rantai protein lain ke dalam model Anda.

Reset: Tombol ini digunakan untuk mereset semua input dan kembali ke keadaan awal.

Search For Templates: Tombol ini digunakan untuk mencari template struktur protein yang sudah diketahui yang paling mirip dengan protein target Anda. Template ini akan digunakan sebagai acuan untuk membangun model 3D protein target.

- **Build Model:** Tombol ini digunakan untuk memulai proses pembuatan model 3D protein.

Kemudian klik salah satu bisa *Build Model* atau *Search for Templates* kemudian *download files* model dan pilih PDB Format





BAB 11

PyMOL

PyMOL adalah perangkat lunak molekuler yang digunakan untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan memanipulasi struktur biomolekul seperti protein, DNA, RNA, serta kompleks ligan. PyMOL sangat populer di bidang bioinformatika, kimia komputasi, dan biologi struktural karena kemampuannya menampilkan data struktur tiga dimensi secara interaktif.

Adapun fitur-fitur utama dalam PyMOL ialah sebagai berikut:

Visualisasi molekul 3D dengan menampilkan struktur biomolekul dalam format 3D. Tujuannya untuk memahami struktur dan elemen sekunder protein dan analisis interaksi molekul di situs aktif enzim. Dalam fitur ini ada beberapa gaya visualisasi yang tersedia seperti:

- a. Lines, garis sederhana untuk menunjukkan koneksi antar atom
- b. Sticks, ikatan ditampilkan sebagai batang untuk fokus pada atom dan koneksi
- c. Cartoon, representasi pita untuk elemen sekunder protein (heliks alfa, lembar beta, dan loop)
- d. Surface, menampilkan permukaan molekul untuk analisis area aktif
- e. Spheres, atom ditampilkan sebagai bola sesuai ukuran van der Waals


Pewarnaan molekul, digunakan untuk membantu membedakan rantai residu dan memudahkan dalam analisis. Pewarnaan

molekul dapat dilakukan secara otomatis atau manual dengan didasarkan pada elemen (karbon, oksigen dan nitrogen) serta rantai dan residu.

Seleksi dan manipulasi, dengan memilih elemen tertentu seperti atom, residu atau rantai dan mengklik mouse. Sedangkan manipulasi dengan memutar, memindahkan, atau menghapus bagian tertentu dari molekul dan juga berguna untuk memfokuskan analisis pada wilayah spesifik (misalnya, situs aktif).


A. Prosedur Kerja PyMOL

Pertama-tama download aplikasi PyMOL melalui Chrome




Selanjutnya buka aplikasi PyMOL kemudian pilih File pojok kiri atas lalu klik open kemudian pilih file yang telah di download sebelumnya dari web Swiss model sehingga akan muncul struktur secara otomatis

Kemudian klik secara acak pada struktur untuk diketahui jumlah atom, residu, dll sehingga diperoleh deskripsi seperti pada gambar yang berwarna kuning



Selanjutnya untuk mengubah bentuk atau model struktur silahkan klik beberapa huruf yang tertera pada gambar



Selain identifikasi jumlah atom, aplikasi PyMOL juga digunakan untuk mengetahui jumlah residu, sisi aktif enzim dll.

PENGOPERASIAN PYMOL


Buka PyMOL: Cari ikon PyMOL di komputer Anda dan jalankan programnya. Muat Struktur: Klik menu File -> Open atau seret dan lepas file PDB (Protein Data Bank) ke jendela PyMOL.



Melihat Struktur dari Berbagai Sudut

Rotasi: Klik dan tahan tombol kiri mouse, lalu gerakkan mouse untuk memutar struktur. Zoom: Gunakan roda mouse untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Translasi: Tekan tombol tengah mouse dan gerakkan mouse untuk menggeser struktur.



Mengubah Tampilan (Representasi)


Cartoon: Menampilkan struktur protein sebagai pita. Ideal untuk melihat struktur sekunder seperti *alpha helix* dan *beta sheet*.

Surface: Menampilkan permukaan molekul. Berguna untuk melihat bentuk keseluruhan molekul dan interaksi permukaan.

Stick: Menampilkan ikatan kimia sebagai batang dan atom sebagai bola. Cocok untuk melihat detail ikatan kimia.

Ball and Stick: Kombinasi antara *stick* dan *ball*.


Cpk: Menampilkan semua atom sebagai bola dengan ukuran yang sesuai dengan jari-jari van der Waals.



Memilih Atom atau Residu


Klik Kiri: Klik pada atom atau residu untuk memilihnya. Atom yang dipilih akan berubah warna.

Seleksi Berganda: Gunakan alat seleksi (biasanya berbentuk lasso) untuk memilih beberapa atom atau residu sekaligus.




Mengukur Jarak dan Sudut

- Distance: Untuk mengukur jarak antara dua atom.
- Angle: Untuk mengukur sudut antara tiga atom.
- Measure: Untuk melakukan pengukuran lainnya, seperti area permukaan.




Membuat Animasi

- Create Movie: Buat sebuah movie baru.
- Add Frame: Tambahkan frame untuk setiap pose yang ingin Anda tampilkan dalam animasi.
- Play: Mainkan animasi.




Mengubah Warna

Berdasarkan Atom: Misalnya, karbon berwarna abu-abu, oksigen berwarna merah, dan nitrogen berwarna biru. Berdasarkan Struktur Sekunder: Misalnya, alpha helix berwarna merah dan beta sheet berwarna kuning. Berdasarkan Potensi Elektrostatik: Misalnya, daerah bermuatan positif berwarna biru dan daerah bermuatan negatif berwarna merah.



Membuat Gambar Berkualitas Tinggi

Ray: Gunakan mode ray untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi. Save Image: Simpan gambar dalam berbagai format (PNG, JPG, PDF, dll).





PENGOPERASIAN DALAM MENENTUKAN *ACTIVE-SIDE*

Masukkan file yang telah didownload tadi dalam bentuk PDB Format





Kemudian file tadi klik *display* dan pilih *background* kemudian pilih warna *white*








Pilih huruf H pada bagian sebelah kanan kemudian pilih *cartoon*



Selanjutnya klik beberapa warna yang akan menunjukkan jumlah atom dari warna yang diklik tadi. Itu juga dilakukan untuk mengetahui *active-side* nya, kemudian ketik *active*, apakah yang ingin diketahui sisi aktif (*active-side*) dari ikatan hidrogen, interaksi dengan ligan atau yang lainnya.



Salah satu contoh jika yang ingin diketahui *active side* ikatan hidrogen. Jenis interaksi yang terjadi antara ligan dan sisi aktif, seperti ikatan hidrogen, interaksi van der Waals, dan ikatan ionik.



sumber: interaksi dengan ikatan hidrogen (chatgpt)



BAB 12

ANTISMASH

AntiSMASH (*Antibiotics and Secondary Metabolite Analysis Shell*) adalah sebuah perangkat lunak bioinformatika yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menganalisis kluster gen biosintetik (biosynthetic gene clusters, BGCs) dalam genom mikroorganisme. Kluster gen ini sering kali bertanggung jawab untuk produksi senyawa bioaktif, termasuk antibiotik, antikanker, atau metabolit sekunder lainnya yang memiliki potensi farmasi. AntiSMASH menyediakan identifikasi genom yang luas secara cepat, keterangan dan analisis biosintesis metabolit sekunder kluster gen pada genom bakteri dan fungi. Aplikasi ini menganalisis biosintesis metabolit sekunder kluster gen pada genom bakteri dan fungi. Aplikasi ini berintegrasi dengan sejumlah tool analisis metabolisme sekunder. berintegrasi dengan sejumlah tool analisis metabolisme sekunder.

Fungsi utama anti smah diantaranya : Identifikasi BGC AntiSMASH menggunakan data genom yang diberikan untuk memprediksi keberadaan kluster gen biosintetik. Klasifikasi BGC sistem ini dapat menentukan jenis metabolit sekunder yang diproduksi oleh BGC, seperti poliketida, terpen, atau nonribosomal peptide synthetase (NRPS).

Prediksi Struktur Senyawa dalam beberapa kasus, AntiSMASH dapat memprediksi struktur kimia dari metabolit yang dihasilkan oleh kluster gen tersebut.

Perbandingan dengan BGC Lain AntiSMASH dapat membandingkan kluster gen yang ditemukan dengan kluster gen serupa dari database untuk mengidentifikasi senyawa yang

mungkin diproduksi. Integrasi dengan Alat Lain AntiSMASH sering digunakan bersama alat bioinformatika lain untuk analisis yang lebih mendalam.

1. Fitur-Fitur AntiSMASH

Identifikasi Kluster Gen Biosintetik

AntiSMASH mampu mengenali berbagai jenis BGC berdasarkan pola genetik tertentu. Jenis BGC yang dapat dideteksi meliputi: Poliketida sintetase (PKS) misalnya poliketida tipe I, tipe II, dan tipe III. Nonribosomal peptide synthetase (NRPS). *Terpen, alkaloid, ribosomally synthesized and post-translationally modified peptides* (RiPPs). Berbagai tipe kluster gen lainnya.

Analisis Domain dan Gen

Mendeteksi domain-domain enzim spesifik yang terdapat dalam kluster. Memberikan informasi tentang gen-gen yang menyusun kluster biosintetik.

Prediksi Struktur Kimia

AntiSMASH mampu memprediksi struktur molekul dari metabolit sekunder berdasarkan informasi genetik kluster. Fitur ini berguna untuk memahami potensi bioaktivitas senyawa tersebut.

Perbandingan dengan Database

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan BGC yang ditemukan dengan kluster yang telah dikenal dalam database publik. Database referensi mencakup BGC yang telah dianotasi secara eksperimental, seperti yang terdapat dalam

MIBiG (Minimum Information about a Biosynthetic Gene Cluster).
ClusterBlast dan SubClusterBlast

ClusterBlast: Mencocokkan BGC yang ditemukan dengan kluster serupa dalam database genom lain. SubClusterBlast: Menganalisis segmen kecil dari kluster untuk membandingkannya dengan subkluster lain yang dikenal.

AntiSMASH-DB Integration

Dapat terhubung dengan AntiSMASH-DB, yang merupakan database online untuk penyimpanan dan analisis hasil AntiSMASH secara publik. Pengguna dapat melihat data BGC dari berbagai mikroorganisme di seluruh dunia.

Visualisasi

Menyediakan tampilan visual interaktif untuk BGC yang ditemukan, sehingga mempermudah interpretasi hasil analisis. Grafik ini menampilkan lokasi gen dalam kluster, hubungan antara gen, dan domain yang terkait.

Prediksi Regulasi Kluster

AntiSMASH dapat memprediksi elemen pengatur (regulatory elements) seperti promotor atau faktor transkripsi yang mungkin mengendalikan ekspresi kluster.

Ekspor dan Dokumentasi

Hasil analisis dapat diekspor dalam berbagai format seperti JSON, GBK, atau EMBL untuk analisis lanjutan dengan perangkat lunak lain

Modularitas dan Kemudahan Integrasi

AntiSMASH dirancang untuk mudah diintegrasikan dengan alat bioinformatika lainnya, misalnya Alat untuk analisis evolusi (phylogenetic tools). Pipeline yang dikustomisasi untuk penemuan senyawa baru.

Parameter input ANTISMASH

Input yang ideal bagi ANTISMASH adalah file nukleotida yang telah dianotasi dalam format genbank atau EMBL. dapat meng-upload file ganbank/EMBL secara manual atau secara sederhana memasukan nomor pencapaian sekuens (accession number) di unggah di antismash. jika ada notasi yang tersedia, antismash merekomendasikan me-running sekuens melalui anotasi Pipeline seperti rapid annitation using subsystem technology (RAST) untuk mendapatkan data-data GBK/EMBL dengan anotasi berkualitas tinggi. cara lainnya, dapat menggunakan data FASTA yang mengandung sekuens tunggal. antismash akan menghasilkan anotasi terdahulu menggunakan glimmere dan menggunakannya untuk menjalankan sisa analisis. data multi sekuens FASTA harus dibagi menjadi data FASTA tinggal sebelum di running. ketika data FASTA prokariot tersedia, Daka dapat memasukan pengaturan untuk prediksi gen glimmer tabel translasi genbank (kode genetik), panjang gen minimal (gen terkecil yang dibolehkan) dan konfigurasi genom (kromosom sirkular/linear atau plasmid).

Prosedur ANTISMASH

Persiapan data genom memerlukan urutan genom lengkap dari mikroorganisme target dalam format FASTA yang diambil di NCBI.

GenBank: MN695920.1

[FASTA](#) [Graphics](#)

Go to:

LOCUS MN695920 2682 bp DNA linear BCT 02-SEP-2020
DEFINITION Bacillus thuringiensis strain neolonensis LBIT-107
metalloproteinase gene, complete cds.

ACCESSION MN695920

VERSION MN695920.1

KEYWORDS .

SOURCE Bacillus thuringiensis

ORGANISM [Bacillus thuringiensis](#)

Bacteria; Bacillati; Bacillota; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae;
Bacillus; Bacillus cereus group.

REFERENCE 1 (bases 1 to 2682)

AUTHORS Garcia Montelongo,M., Gonzalez Villarreal,S.E. and Ibarra
Rendon,J.E.

TITLE Direct Submission

JOURNAL Submitted (12-NOV-2019) Biotecnologia y Bioquímica, Cinvestav-IPN,
Km. 9.6 Libramiento Norte Carretera Irapuato-Leon, Irapuato,
Guanajuato 36824, Mexico

COMMENT ##Assembly-Data-START##

Assembly Method :: BioEdit v. v. 7.2

Assembly Name :: Bacillus thuringiensis LBIT-107
metalloproteinase

Sequencing Technology :: Pyrosequence

##Assembly-Data-END##

FEATURES

Buka dengan menggunakan website antiSMASH (<https://antismash.secondarymetabolites.org/>).

antiSMASH bacterial version

Submit Bacterial Sequence Submit Fungal Sequence Submit Plant Sequence Download About Help Contact

Server status: **working**

Running jobs: 7

Queued jobs: 0

Jobs processed: 2058977

Nucleotide input **Results for existing job**

Search a genome sequence for secondary metabolite biosynthetic gene clusters

Load sample input Open example output

Notification settings

andummulwafiqah@gmail.com Email address (optional)

Data input

Upload file Get from NCBI Browse Sequence file (GenBank / EMBL / FASTA format)

Upload extra annotations

Setelah itu, upload genom dalam bentuk fasta

Sequence file (GenBank / EMBL / FASTA format)

Feature annotations (optional, GFF3 format)

Upload extra annotations

Detection strictness: relaxed

strict relaxed loose

- Detects well-defined clusters containing all required parts.
- Detects partial clusters missing one or more functional parts.

Extra features All off All on

<input checked="" type="checkbox"/> KnownClusterBlast	<input checked="" type="checkbox"/> ClusterBlast	<input checked="" type="checkbox"/> SubClusterBlast
<input checked="" type="checkbox"/> MIBiG cluster comparison	<input checked="" type="checkbox"/> ActiveSiteFinder	<input checked="" type="checkbox"/> RREFinder
<input checked="" type="checkbox"/> Cluster Pfam analysis	<input checked="" type="checkbox"/> Pfam-based GO term annotation	<input checked="" type="checkbox"/> TIGRFam analysis

> enter text. analysis

Kemudian pilih detection strictness yang relaxed

Detection strictness: relaxed

strict relaxed loose

- Detects well-defined clusters containing all required parts.
- Detects partial clusters missing one or more functional parts.

a. Selanjutnya pilih extra features yang All on

Extra features All off All on

<input checked="" type="checkbox"/> KnownClusterBlast	<input checked="" type="checkbox"/> ClusterBlast	<input checked="" type="checkbox"/> SubClusterBlast
<input checked="" type="checkbox"/> MIBiG cluster comparison	<input checked="" type="checkbox"/> ActiveSiteFinder	<input checked="" type="checkbox"/> RREFinder
<input checked="" type="checkbox"/> Cluster Pfam analysis	<input checked="" type="checkbox"/> Pfam-based GO term annotation	<input checked="" type="checkbox"/> TIGRFam analysis

> enter text. analysis

Setelah di submit, hasilnya akan dikirim pada email yang telah dimasukkan

Hasil dari analisis Antismash disusun dalam intraktif HTML dengan grafik SVG (scalable vector graphics) dan bagian yang

berbeda dari analisis ditampilkan dalam panel yang berbeda untuk setiap kluster gen.

Cluster types dari current types

Region	Type	From	To	Most similar known cluster	Similarity
Region 1	NRPS-like	304,814	347,731		
Region 2	LAP	1,127,556	1,151,062		
Region 3	siderophore	1,757,227	1,770,934	petrobactin	100%
Region 4	NRPS	2,096,020	2,144,414	bacitracin	86%
Region 5	NRPS	2,209,055	2,275,278	terfenadine	49%
Region 6	RPP-like	2,327,169	2,336,634		
Region 7	RPP-like	2,387,685	2,435,476		
Region 8	terpene	3,108,082	3,129,535	molybdemum cofactor	17%
Region 9	lariatpeptide	5,779,930	5,835,419	S-layer glycan	26%
Region 10	NRPS	6,057,501	6,115,346	thalianstatin A	10%
Region 11	RPP-like	6,159,337	6,169,558		
Region 12	NRPS	6,273,439	6,322,243	exopolysaccharide	11%
Region 13	ladderane	6,357,677	6,413,016		
Region 14	lariatpeptide-class-II	6,445,567	6,468,170		
Region 15	RRE-containing	6,488,924	6,510,039		

Cluster Types

antiSMASH uses some abbreviations internally to refer to the different types of secondary metabolite clusters, a short explanation of the different types can be found below:

Current Types

Label	Description	Add
acyl_amino_acids	N-acyl amino acid cluster	+
aminocoumarin	Aminocoumarin cluster	++
amglycycl	Aminoglycoside/aminocyclitol cluster	++
arylpolylene	Aryl polylene cluster	++
betaactone	beta-lactone containing protease inhibitor	S
blactam	beta-lactam cluster	++
bothromycin	Bothromycin cluster	++
butyrolactone	Butyrolactone cluster	++

Legend: core biosynthetic genes, additional biosynthetic genes, transport-related genes, regulatory genes, other genes, resistance, binding site.

Gene overview | NRPS/PKS domains | MIBIG comparison | ClusterBlast | KnownClusterBlast | SubClusterBlast | NRPS/PKS modules | NRPS/PKS products | NRPS/PKS substrates

Phen domains | HIGRFAM domains

Gene/CDs overview

Filter: Automatically zoom to filtered/selected features

Identifier	Product	Length		Function	Sequence		NCBI Blast
		NT	AA		NT	AA	
ctg1_315		585	194	other	Copy	Copy	BlastP
ctg1_316		597	196	other	Copy	Copy	BlastP
ctg1_317		879	292	other	Copy	Copy	BlastP
ctg1_318		699	232	other	Copy	Copy	BlastP
ctg1_319		1431	476	other	Copy	Copy	BlastP
ctg1_320		294	97	other	Copy	Copy	BlastP
ctg1_321		1314	437	other	Copy	Copy	BlastP
ctg1_322		1284	427	transport	Copy	Copy	BlastP
ctg1_323		252	83	other	Copy	Copy	BlastP
ctg1_324		1239	412	transport	Copy	Copy	BlastP
ctg1_325		582	193	regulatory	Copy	Copy	BlastP

For candidate cluster 1, location 304383 - 347965.
Link to NCORINE database query form

Server status: **working**

Running jobs: **1**

Queued jobs: **0**

Jobs processed: **2028942**

Status of job sequence.fasta analysis

Submitted: Nov 25, 2024 08:26:43
Status: **done**
Last status change: Nov 25, 2024 08:26:47

See the **results**.

Important: If you did not provide an email address, please bookmark this page so you can access your antiSMASH results later.

If you specified an email address on the job submission page, you will be notified by email once the job is complete.

Running antiSMASH on a complete genome will take a couple of hours, and depending on the server load it will take a while for your job to start.



If you have found antiSMASH useful, please [cite us](#).





BAB 13

APLIKASI DALAM RISET

ENZIM

Data sekuensing dari mikroba penghasil enzim amilase dan selulase, ada beberapa jenis referensi riset bioinformatika yang dapat dilakukan untuk mendalami potensi enzim tersebut:

1. Identifikasi Gen Pengkode Enzim

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool): Untuk membandingkan sekuens gen

Basis data genetik dan menemukan gen yang mirip. **NCBI ORF Finder:** Untuk mencari kerangka baca terbuka (open reading frames) pada sekuens DNA dan mengidentifikasi gen. **Prokka:** Alat anotasi genom otomatis yang membantu mengidentifikasi gen-gen pengkode enzim. Buka BLAST di situs NCBI, pilih opsi BLASTn atau BLASTp (untuk DNA atau protein). Masukkan sekuens DNA atau protein dan bandingkan dengan basis data publik (misalnya, RefSeq atau GenBank) untuk mengidentifikasi gen yang memiliki kemiripan. Gunakan NCBI ORF Finder untuk menemukan open reading frames (ORFs) dan mengonfirmasi apakah hasilnya menunjukkan gen amilase atau selulase. Gunakan Prokka jika Anda ingin menganotasi seluruh genom dan menandai gen pengkode enzim secara otomatis.

2. Analisis Filogenetik

MEGA (Molecular Evolutionary Genetics Analysis): Untuk membangun pohon filogenetik berdasarkan sekuens DNA atau protein yang diidentifikasi. **Clustal Omega:** Untuk membuat

multiple sequence alignment yang dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis filogenetik. IQ-TREE: Program untuk rekonstruksi filogenetik yang cepat dan akurat, mendukung berbagai model evolusi. Gunakan Clustal Omega untuk membuat multiple sequence alignment dari sekuens gen atau protein target. Ekspor hasil alignment dan buka di MEGA untuk membangun pohon filogenetik. Pilih algoritma (misalnya, Neighbor-Joining atau Maximum Likelihood) yang sesuai. Gunakan pohon filogenetik ini untuk menganalisis hubungan evolusi antara mikroba Anda dengan mikroba lain.

3. Analisis Promotor dan Ekspresi Gen

MEME Suite: Untuk analisis motif DNA dalam promotor dan elemen regulasi lainnya. GENEIOUS: Menyediakan alat untuk anotasi dan prediksi promotor, memungkinkan analisis ekspresi gen lebih lanjut. TRANSFAC: Database dan alat bioinformatika untuk mengidentifikasi elemen pengaturan gen pada sekuens DNA. Pilih wilayah upstream dari gen (biasanya beberapa ratus hingga ribuan basa sebelum start codon) untuk analisis promotor. Masukkan sekuens ini ke MEME Suite untuk mencari motif regulasi yang umum. Jika memungkinkan, gunakan GENEIOUS untuk menganotasi gen dan memprediksi elemen regulasi di sekitar gen amilase atau selulase Anda.

4. Pemodelan Struktur dan Fungsional Protein

SWISS-MODEL: Untuk prediksi struktur tiga dimensi protein berdasarkan model homolog. PyMOL: Untuk visualisasi dan analisis struktur protein 3D, berguna untuk memahami interaksi aktif enzim. AlphaFold: Sistem prediksi struktur protein yang sangat akurat berdasarkan sekuen asam amino. Masukkan sekuens protein amilase atau selulase ke SWISS-MODEL untuk memprediksi struktur 3D berdasarkan protein homolog. Ekspor struktur yang dihasilkan ke PyMOL untuk analisis visual, misalnya, mengeksplorasi situs aktif atau melihat interaksi dengan substrat. Jika ingin prediksi lebih akurat, gunakan AlphaFold untuk menghasilkan model yang lebih mendetail.

5. Analisis Jalur Metabolik

KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes): Untuk analisis jalur metabolik dan pemetaan interaksi biokimia dalam mikroba. Pathway Tools: Untuk pemetaan dan analisis jalur metabolik dalam suatu genom. BioCyc: Basis data yang menyediakan informasi mengenai jalur metabolik mikroorganisme dan alat untuk analisis jalur. Gunakan KEGG Mapper dengan ID gen atau protein dari mikroba Anda untuk menemukan jalur metabolik terkait. Gunakan Pathway Tools atau BioCyc untuk menggali jalur yang lebih mendalam, menganalisis produk enzim dalam jalur tersebut, dan mengidentifikasi peran enzim dalam metabolisme.

6. Pencarian Potensi Gen Baru (Gene Mining)

AnTSMASH: Untuk menemukan gen pengkode metabolit sekunder yang mungkin baru atau unik. OrthoFinder: Untuk menganalisis homologi antar genom dan mendeteksi kemungkinan gen baru atau unik. HMMER: Digunakan untuk mencari domain protein yang konservatif dan memprediksi keberadaan gen baru berdasarkan motif. Gunakan AntiSMASH untuk memeriksa genom dan menemukan kemungkinan gen baru yang terkait dengan biosintesis metabolit sekunder. Jika Anda memiliki beberapa genom, gunakan OrthoFinder untuk menemukan gen unik atau spesifik yang mungkin memiliki fungsi baru atau berbeda. Jalankan HMMER untuk mencari domain atau motif yang belum dikenali dalam basis data, yang dapat menunjukkan gen atau fungsi baru.

7. Analisis Resistensi Terhadap Kondisi Lingkungan

COG (Cluster of Orthologous Groups): Untuk menganalisis dan mengelompokkan gen-gen berdasarkan fungsi dan adaptasi lingkungan. InterPro: Untuk menemukan domain protein dan analisis adaptasi yang memungkinkan enzim bekerja pada kondisi ekstrem. SDSC Workbench: Alat yang dapat membantu memprediksi stabilitas protein pada kondisi lingkungan yang berbeda dengan mempelajari fitur struktural. Identifikasi domain protein yang dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan ekstrem menggunakan InterPro. Gunakan COG untuk mengelompokkan gen berdasarkan kategori fungsional yang

menunjukkan adaptasi, misalnya, protein tahan panas atau pH ekstrem.

Untuk memprediksi stabilitas protein dalam kondisi lingkungan yang berbeda, Anda dapat menggunakan SDSC Workbench untuk simulasi lebih lanjut. Persiapan Data: Pastikan data sekuensing sudah dalam format FASTA atau format yang sesuai untuk masing-masing aplikasi.

Validasi Hasil: Gunakan lebih dari satu metode atau basis data untuk memvalidasi hasil jika memungkinkan.

dengan data sekuensing mikroba penghasil enzim amilase dan selulase:



BAB 14
DOCKING

Penentuan protein docking antara enzim dan substrat adalah proses komputasi yang dilakukan untuk memprediksi interaksi antara molekul enzim (biasanya protein) dengan substrat atau molekul lain. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana molekul tersebut akan berinteraksi, mengidentifikasi situs pengikatan (binding site), dan memperkirakan kekuatan atau afinitas ikatan. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam melakukan protein docking antara enzim dan substrat:

1. Persiapan Struktur Enzim dan Substra

Pengambilan Struktur: Struktur 3D enzim dan substrat biasanya diperoleh dari database, seperti Protein Data Bank (PDB), atau dari hasil pemodelan jika struktur asli belum diketahui. **Pembersihan Struktur:** Menghilangkan molekul air, ion, atau ligan yang tidak diperlukan. Pastikan struktur enzim dan substrat sudah siap digunakan tanpa atom atau ikatan yang tidak relevan.

Penambahan Hidrogen: Tambahkan atom hidrogen ke struktur, terutama jika model berasal dari PDB yang mungkin tidak lengkap. Atom hidrogen penting untuk interaksi polar dalam proses docking.

Minimisasi Energi: Lakukan minimisasi energi untuk memastikan bahwa struktur berada pada konformasi yang paling stabil dan siap untuk docking.

2. Pemilihan Situs Pengikatan (Binding Site)

Identifikasi Situs Aktif: Jika situs pengikatan sudah diketahui, proses docking dapat difokuskan pada area tersebut. Situs aktif dapat diidentifikasi berdasarkan penelitian sebelumnya, data eksperimental, atau prediksi menggunakan perangkat lunak khusus. Prediksi Situs Pengikatan (Jika Belum Diketahui): Jika situs pengikatan belum diketahui, perangkat lunak bioinformatika dapat memprediksi daerah yang mungkin menjadi tempat pengikatan substrat berdasarkan analisis permukaan, sifat kimia, dan fisika molekul.

3. Pemilihan Perangkat Lunak Docking

Beberapa perangkat lunak populer untuk *protein docking* antara lain AutoDock, AutoDock Vina, HADDOCK, dan Glide. Setiap perangkat lunak memiliki algoritma yang berbeda, sehingga hasilnya mungkin bervariasi.

Pastikan perangkat lunak yang dipilih kompatibel dengan format file yang digunakan dan mendukung tipe interaksi yang diinginkan.

4. Menjalankan Simulasi Docking

Penentuan Parameter Docking: Set parameter docking seperti ukuran kotak pencarian (grid box) di sekitar situs aktif atau seluruh protein jika lokasi pengikatan belum diketahui. Pengaturan ini memastikan area docking yang lebih fokus dan efisien.

Jenis Docking: Tentukan apakah Anda akan menggunakan *rigid-body docking* (tidak memperbolehkan perubahan konformasi protein) atau *flexible docking* (memperbolehkan perubahan konformasi untuk meningkatkan akurasi).

Proses Docking: Jalankan simulasi dengan menggunakan perangkat lunak docking yang telah disiapkan. Simulasi akan menghasilkan berbagai pose (konformasi ikatan) dari substrat terhadap enzim.

5. Evaluasi dan Pemilihan Pose Terbaik

Skoring Energi Binding: Setiap pose hasil docking akan memiliki nilai energi binding. Pose dengan nilai energi binding terendah biasanya dipilih sebagai pose terbaik, karena nilai ini menunjukkan stabilitas ikatan yang lebih tinggi. Analisis Visual dan Fungsional: Analisis visual dilakukan untuk memeriksa bagaimana substrat menempel pada enzim, dan apakah sesuai dengan harapan. Posisi interaksi, ikatan hidrogen, dan ikatan hidrofobik yang terbentuk harus diperiksa untuk memastikan bahwa interaksi relevan secara biologis. Perhitungan Energi Interaksi Lainnya (Opsional): Beberapa metode juga menghitung energi van der Waals dan ikatan hidrogen untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang afinitas ikatan.

6. Verifikasi Hasil dengan Studi Eksperimen atau Simulasi Dinamika Molekuler

Setelah pose terbaik dipilih, penting untuk memverifikasi hasil

menggunakan metode tambahan, seperti simulasi dinamika molekuler, untuk menguji stabilitas interaksi dalam jangka waktu tertentu. Verifikasi eksperimental, jika memungkinkan, seperti melalui teknik biokimia atau biofisika (misalnya, uji pengikatan atau mutasi di situs aktif) juga dapat memberikan konfirmasi tambahan terhadap hasil *docking*.

Data nukleotida yang mengkodekan enzim, maka proses Protein docking dapat dilakukan dengan beberapa langkah tambahan. Anda perlu mengonversi data nukleotida menjadi urutan protein dan selanjutnya melakukan pemodelan struktur protein sebelum melakukan docking.

Berikut langkah-langkah teknisnya:

1. Translasi Urutan Nukleotida Menjadi Urutan Protein

Ambil Urutan DNA/RNA: Pastikan data nukleotida yang Anda miliki lengkap dan berada dalam bentuk DNA atau RNA yang mengkode enzim.

Translasi: Lakukan translasi urutan nukleotida menjadi urutan asam amino menggunakan perangkat lunak bioinformatika atau alat daring seperti ExpASy Translate Tool atau tools di NCBI. Periksa Mutasi atau Polimorfisme (Jika Ada):Periksa apakah ada mutasi atau polimorfisme pada urutan nukleotida yang mungkin mempengaruhi fungsi enzim.

2. Pemodelan Struktur Tersier Protein

Setelah memperoleh urutan asam amino, langkah selanjutnya adalah membangun model struktur 3D dari protein tersebut,

karena data urutan asam amino saja tidak cukup untuk *docking*. Pemilihan Template dengan Homologi: Gunakan alat seperti BLASTp untuk mencari protein homolog yang memiliki struktur yang sudah diketahui dalam Protein Data Bank (PDB). Template ini akan memandu pemodelan struktur. Pemodelan Homologi:Gunakan perangkat lunak pemodelan seperti SWISS-MODEL, Modeller, atau I-TASSER. Program-program ini akan menggunakan template struktur protein homolog untuk memprediksi struktur 3D dari enzim Anda berdasarkan urutan asam amino. Minimisasi Energi: Setelah mendapatkan model 3D, lakukan minimisasi energi untuk mendapatkan struktur yang lebih stabil.

3. Validasi Struktur Protein

Evaluasi Kualitas Model: Gunakan alat validasi struktur seperti Ramachandran Plot (melalui PROCHECK atau tools di SWISS-MODEL) untuk memeriksa apakah struktur memiliki konformasi yang sesuai. Perbaiki Struktur (Jika Diperlukan): Jika model menunjukkan kualitas yang rendah atau ada perbaikan yang diperlukan, lakukan revisi menggunakan perangkat lunak pemodelan hingga model stabil dan layak untuk digunakan.

4. Identifikasi Situs Pengikatan

Prediksi Situs Pengikatan (Binding Site Prediction): Dengan model protein yang sudah divalidasi, gunakan perangkat lunak seperti CASTp, MetaPocket, atau FTSite untuk memprediksi situs pengikatan potensial pada enzim tersebut. Penentuan Situs Aktif Berdasarkan Data Eksperimental (Jika Ada): Jika

Anda memiliki informasi tambahan mengenai situs aktif enzim, ini bisa digunakan sebagai acuan dalam proses *docking* untuk meningkatkan akurasi.

5. Persiapan Molekul Substrat


Pengambilan Struktur Substrat: Jika struktur 3D substrat sudah diketahui, ambil dari database (misalnya, PubChem atau PDB). Jika substrat belum tersedia, Anda bisa membuat modelnya menggunakan perangkat lunak seperti ChemDraw atau Avogadro. **Minimisasi Energi Substrat:** Pastikan struktur substrat berada dalam konformasi yang paling stabil dengan melakukan minimisasi energi.

6. Proses Docking Antara Enzim dan Substrat

Pemilihan Perangkat Lunak Docking: Pilih perangkat lunak docking, seperti AutoDock, AutoDock Vina, atau HADDOCK, yang dapat menangani model 3D protein dan substrat. **Menentukan Parameter Docking:** Tetapkan area *grid box* di sekitar situs aktif yang sudah diprediksi atau diketahui. Jika situs pengikatan belum pasti, gunakan mode *blind docking* untuk mengamati interaksi di seluruh permukaan enzim. **Menjalankan Simulasi Docking:** Lakukan simulasi docking menggunakan perangkat lunak yang telah dipilih, yang akan menghasilkan berbagai pose pengikatan antara enzim dan substrat.

7. Evaluasi Hasil Docking

Skoring dan Pemilihan Pose Terbaik: Setiap pose hasil docking akan memiliki skor energi binding yang dapat



dievaluasi. Pilih pose dengan energi binding terendah, yang menandakan stabilitas interaksi yang tinggi. Analisis Visual: Lakukan analisis visual untuk memverifikasi interaksi ikatan, seperti ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, atau interaksi elektrostatik, yang relevan antara enzim dan substrat.

8. Validasi dan Simulasi Lanjutan (Opsional)

Simulasi Dinamika Molekuler: Lakukan simulasi dinamika molekuler untuk melihat bagaimana enzim dan substrat berinteraksi dalam kondisi lingkungan seluler secara dinamis. Ini akan memverifikasi stabilitas dan kekuatan interaksi dari waktu ke waktu. Eksperimen Tambahan: Jika memungkinkan, eksperimen laboratorium (seperti uji enzimatik atau mutasi di situs aktif) dapat digunakan untuk mendukung atau memverifikasi hasil dari simulasi docking. Data yang dapat diperoleh dapat membantu dalam pemahaman fungsionalitas enzim dan potensi interaksi substrat. Berikut adalah data utama yang dapat diperoleh:

1. Struktur 3D Enzim

Model Struktur Tersier Enzim: Hasil pemodelan struktur 3D enzim dari data nukleotida memberikan model yang dapat digunakan untuk analisis fungsional dan interaksi molekuler.

Prediksi Situs Aktif dan Situs Pengikatan Lainnya: Struktur enzim akan menunjukkan situs-situs potensial tempat interaksi dengan molekul substrat terjadi. Lokasi, ukuran, dan sifat kimiawi situs ini memberikan informasi penting untuk memahami mekanisme pengikatan.

Keterangan Gambar : visualisasi model 3D enzim selulase yang menunjukkan interaksi dengan molekul substrat. Struktur ini menggambarkan situs aktif enzim dan interaksi molekuler substrat di dalam kantong katalitiknya. Struktur sekunder seperti heliks alfa dan lembaran beta juga terlihat, dengan interaksi hidrogen dan hidrofobik yang ditandai antara enzim dan substrat.

2. Informasi Interaksi Enzim-Substrat

Orientasi dan Pose Pengikatan Substrat: Proses docking menghasilkan pose optimal dari substrat ketika terikat pada enzim. Pose ini mengidentifikasi bagaimana substrat mengorientasikan diri dan menempel pada situs aktif enzim, yang bisa menjadi dasar untuk memahami bagaimana reaksi kimia mungkin terjadi.

Interaksi Kunci (Ikatan Hidrogen, Ikatan Hidrofobik, dan Ikatan Ion): informasi mengenai interaksi spesifik yang stabil antara substrat dan residu-residu penting pada enzim, seperti ikatan

hidrogen, ikatan hidrofobik, atau interaksi elektrostatik. Interaksi ini membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi afinitas ikatan. Jalankan proses docking enzim selulase dengan substrat (misalnya selulosa atau senyawa serupa) menggunakan perangkat lunak seperti AutoDock atau HADDOCK.

Data yang Diperoleh: Setiap pose hasil docking akan menunjukkan orientasi substrat terhadap situs aktif selulase. Anda akan memperoleh beberapa posisi (pose) substrat di dalam kantong katalitik enzim dengan orientasi berbeda.

Manfaat: Pose ini menunjukkan bagaimana substrat berinteraksi secara fisik dengan enzim, memberikan gambaran awal tentang interaksi enzim-substrat.

3. Energi Binding

Skor Energi Binding: Hasil docking memberikan skor atau nilai energi binding dari interaksi enzim-substrat. Energi ini mengindikasikan seberapa kuat ikatan antara enzim dan substrat, di mana nilai energi binding yang rendah menunjukkan afinitas yang lebih tinggi.

Estimasi Stabilitas Interaksi: Dengan mengetahui energi binding, Anda dapat memperkirakan kestabilan kompleks enzim-substrat yang terbentuk dan memutuskan apakah interaksi tersebut cukup kuat untuk mendukung aktivitas enzimatik. Setelah docking selesai, perangkat lunak docking akan memberikan skor energi binding untuk setiap pose.

Data yang Diperoleh: Nilai energi binding yang lebih rendah

menunjukkan stabilitas ikatan yang lebih kuat. Ini merupakan indikator seberapa kuat substrat berikatan dengan enzim.

Manfaat: Energi binding dapat digunakan untuk memilih pose terbaik dan memperkirakan kekuatan ikatan antara selulase dan substrat.

4. Perubahan Konformasi Enzim (Jika Dilakukan Flexible Docking)

Analisis Perubahan Konformasi Enzim: Dalam *flexible docking*, enzim mungkin mengalami perubahan konformasi untuk menyesuaikan diri dengan substrat. Informasi ini dapat memberi wawasan mengenai fleksibilitas situs aktif enzim dan mekanisme "induced fit" (penyesuaian bentuk) yang mungkin terjadi saat enzim mengikat substratnya. Gunakan alat visualisasi molekuler, seperti PyMOL atau Chimera, untuk menganalisis interaksi spesifik pada pose terbaik.

Data yang Diperoleh: Interaksi spesifik seperti ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, atau interaksi elektrostatik antara residu aktif selulase dan substrat akan terlihat.

Manfaat: Interaksi ini adalah faktor penting dalam stabilitas kompleks enzim-substrat. Data ini membantu memahami mekanisme pengikatan pada level molekuler.

5. Prediksi Aktivitas Enzimatik

Berdasarkan interaksi enzim-substrat, dapat diperoleh gambaran awal mengenai bagaimana substrat diposisikan dalam situs aktif, yang sering kali menjadi dasar untuk memprediksi apakah reaksi katalitik dapat terjadi. Data ini bisa menunjukkan apakah substrat sesuai dengan posisi untuk mengalami reaksi enzimatik,

seperti pemutusan ikatan atau transfer gugus molekul. Jika menggunakan *flexible docking*, konformasi enzim akan menyesuaikan dengan substrat yang masuk ke situs aktif.

Data yang Diperoleh: Informasi mengenai perubahan konformasi di situs aktif selulase, seperti perubahan posisi residu asam amino, untuk mengakomodasi substrat.

Manfaat: Memberikan pemahaman apakah enzim mengalami *induced fit*, yaitu penyesuaian bentuk untuk meningkatkan afinitas pengikatan terhadap substrat.

6. Data untuk Pengembangan Inhibitor atau Modifikasi Substrat

Situs yang Potensial untuk Inhibitor: Berdasarkan lokasi pengikatan substrat dan interaksi spesifik yang teridentifikasi, data docking juga bermanfaat untuk mengidentifikasi area target potensial untuk inhibitor yang dapat menghalangi aktivitas enzim, yang penting dalam pengembangan obat.

Modifikasi Substrat untuk Meningkatkan Afinitas atau Stabilitas: Hasil docking dapat menunjukkan area pada substrat yang berinteraksi dengan baik atau kurang optimal dengan enzim, sehingga memungkinkan perencanaan modifikasi substrat untuk meningkatkan ikatan atau afinitas. Dengan mengamati posisi substrat di situs aktif, dapat dilakukan evaluasi apakah substrat berada dalam posisi yang optimal untuk mengalami reaksi enzimatik (misalnya, posisi yang dekat dengan residu katalitik).

Data yang Diperoleh: Prediksi tentang seberapa baik substrat ditempatkan untuk terjadi reaksi katalitik. Pose optimal biasanya menunjukkan substrat yang diposisikan dekat dengan residu

yang berperan dalam katalisis.

Manfaat: Data ini membantu memprediksi apakah selulase dapat secara efisien mengkatalis reaksi pemutusan substrat, yang penting dalam memahami aktivitas enzimatik selulase.

7. Simulasi Lanjutan dan Prediksi Efek Mutasi (Opsional)

Dinamika Interaksi (Jika Dilakukan Simulasi Molekuler): Jika dilanjutkan dengan simulasi dinamika molekul, Anda dapat memperoleh data tambahan tentang stabilitas kompleks enzim-substrat dalam lingkungan seluler yang dinamis.

Prediksi Dampak Mutasi: Dengan data interaksi enzim-substrat, Anda juga bisa melakukan prediksi efek mutasi pada residu penting di situs aktif untuk melihat bagaimana perubahan ini memengaruhi afinitas atau aktivitas enzimatik. Gunakan perangkat lunak analisis seperti SiteMap atau FTSite untuk mengidentifikasi situs potensial lain pada enzim yang bisa menjadi target inhibitor atau modifikasi substrat.

Data yang Diperoleh: Informasi lokasi pada selulase yang bisa menjadi titik pengikatan untuk inhibitor atau untuk melakukan modifikasi substrat guna meningkatkan afinitas.

Manfaat: Data ini sangat berharga dalam penelitian pengembangan obat atau rekayasa enzim untuk mengontrol atau meningkatkan aktivitas selulase.

Ringkasan Data yang Diperoleh

Secara keseluruhan, data yang diperoleh dari proses ini mencakup:

1. Struktur 3D dan situs aktif enzim,
2. Pose pengikatan substrat pada enzim,
3. Skor energi binding,
4. Interaksi spesifik yang relevan secara biologis,
5. Prediksi stabilitas dan aktivitas enzimatik,
6. Potensi situs untuk pengembangan inhibitor,
7. Wawasan untuk modifikasi substrat atau enzim.

DAFTAR PUSTAKA

Blin, K., Shaw, S., Steinke, K., Villebro, R., Ziemert, N., Lee, S. Y., & Weber, T. (2019). "antiSMASH 5.0: updates to the secondary metabolite genome mining pipeline." *Nucleic Acids Research*, **47**(W1), W81-W87.

DeLano, W. L. (2002). "The PyMOL Molecular Graphics System." *DeLano Scientific*, **San Carlos**, CA.

Gupta, A., Gupta, V. K., Modi, D. R., & Yadava, L. P. (2008). "Production and characterization of α -amylase from *Aspergillus niger*." *Biotechnology*, **7**(3), 551-559.

Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., & Ronneberger, O. (2021). "Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold." *Nature*, **596**(7873), 583-589.

Li, X., Wang, Z., & Zhang, B. (2014). "Isolation and characterization of high temperature-resistant cellulase-producing bacteria from composting materials." *Journal of Bioscience and Bioengineering*, **118**(6), 673-677.


Min, B., Hwang, H., Kim, J., & Kim, Y. (2021). "Genome-wide identification and analysis of cis-regulatory elements in cellulase genes of filamentous fungi." *Frontiers in Microbiology*, **12**, 1123.

Sivaramakrishnan, S., Gangadharan, D., Nampoothiri, K. M., Soccol, C. R., & Pandey, A. (2006). "α-Amylases from microbial sources – An overview on recent developments." *Food Technology and Biotechnology*, **44**(2), 173-184.

PROFIL PENULIS

Maswati Baharuddin

Penulis lahir di Batu-batu Soppeng , 8 januari 1978. Penulis adalah anak ke-5 dari tujuh bersaudara. Pendidikan sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah umum (SMU) diselesaikan di Soppeng. Penulis menyelesaikan pendidikan S1(2000), S2 (2003) dan S3 (2017) di Jurusan Kimia Universitas Hasanuddin.



Penulis merupakan Dosen tetap pada jurusan kimia fakultas sains dan teknologi Jurusan Kimia Universitas Islam negeri makassar sejak Tahun 2006 sampai sekarang.

Email Penulis : bmaswati@gmail.com

BIOINFORMATIKA DNA DAN PROTEIN

Bagaimana bioinformatika mengungkap misteri DNA dan protein dalam tubuh makhluk hidup?

Di era digital ini, kemajuan teknologi telah menghasilkan data biologis dalam jumlah besar yang membutuhkan analisis yang cepat dan akurat. Bioinformatika hadir sebagai jembatan antara biologi, ilmu komputer, matematika, dan statistika untuk mengolah informasi genetik serta memahami fungsi molekul biologis dengan pendekatan komputasional.

Buku ini membahas bagaimana bioinformatika memainkan peran penting dalam mengurai sekuens DNA, mengidentifikasi pola genetik, serta menganalisis struktur dan fungsi protein. Dari eksplorasi data genom hingga aplikasi dalam pengembangan obat, buku ini akan membawa Anda memahami bagaimana bioinformatika mengubah wajah ilmu hayati modern.

Cocok bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan siapa saja yang ingin memperdalam wawasan tentang bioinformatika serta implikasinya dalam berbagai bidang, termasuk biomedis dan bioteknologi.

Jelajahi dunia bioinformatika dan temukan bagaimana ilmu ini membuka cakrawala baru dalam memahami kehidupan di tingkat molekuler!



PENERBIT

CV RIZMEDIA PUSTAKA INDONESIA
Jl. Afandi/Griya Astra Blok C. No.18
(Yogyakarta/Makassar)

Telp/Wa:085242065812

Email: rizmediapustaka@gmail.com

Website: rizmediapustakaindonesia.com



IKAPI
035/SSL/2022