



Editor : apt. Primanitha Ria Utami, S. Farm., M. Farm.

MIKROBIOLOGI FARMASI

apt. Andi Ifriany Harun, S.Si., M.Si.

Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.

Etha Marista, S.Si., M.Si.

Mahyarudin, S.Si., M.Si.

apt. Imanda Dyah Rahmadani, S.Farm., M.Farm.

apt. Reni Yustiati Saksono, S.Si., M.Sc.

apt. Mahdalena Sy Pakaya, S.Farm., M.Si.

apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS.

Dr. apt. Muntasir. S.Si., M.Si.

MIKROBIOLOGI FARMASI

apt. Andi Ifriany Harun, S.Si., M.Si.

Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.

Etha Marista, S.Si., M.Si.

Mahyarudin, S.Si., M.Si.

apt. Imanda Dyah Rahmadani, S.Farm., M.Farm.

apt. Reni Yustiati Saksono, S.Si., M.Sc.

apt. Mahdalena Sy Pakaya, S.Farm., M.Si.

apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS.

Dr. apt. Muntasir. S.Si., M.Si.

PENERBIT



2025



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- 1.** Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2.** Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MIKROBIOLOGI FARMASI

Ukuran unesco (15,5 x 23 cm)

Halaman : viii + 173

Isbn : 978-634-7107-01-5

Penulis : apt. Andi Ifriany Harun, S.Si., M.Si.
Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.
Etha Marista, S.Si., M.Si.
Mahyarudin, S.Si., M.Si.
apt. Imanda Dyah Rahmadani, S.Farm., M.Farm.
apt. Reni Yustiati Saksono, S.Si., M.Sc.
apt. Mahdalena Sy Pakaya, S.Farm., M.Si.
apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS.
Dr. apt. Muntasir. S.Si., M.Si.

Editor : apt. Primanitha Ria Utami, S. Farm., M. Farm.

Layout &

Desain Cover :Tim Creative Rizmedia

RIZMEDIA PUSTAKA INDONESIA

Redaksi :

Jl. Afandi /Griya Astra
(Yogyakarta/Makassar)

Telp/Wa:085242065812

Email:rizmediapustaka@gmail.com

Website : rizmediapustakaindonesia.com

Cetakan Pertama, Januari 2025

Hak Cipta 2025@Rizmedia Pustaka Indonesia

*Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau
Penulis.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-nya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku yang berjudul "**MIKROBIOLOGI FARMASI**"

Mikrobiologi farmasi merupakan cabang terapan dari ilmu mikrobiologi yang mempelajari keterkaitan mikroorganisme dalam dunia kefarmasian. Cabang ini melibatkan studi mikroorganisme yang terkait dengan pembuatan obat-obatan , misalnya meminimalkan jumlah mikroorganisme dalam lingkungan proses, mengeluarkan mikroorganisme dan produk sampingan mikroba seperti eksotoksin dan endotoksin dari air dan bahan awal lainnya, dan memastikan produk farmasi akhir steril. Aspek lain meliputi penelitian dan pengembangan agen anti-infeksi serta penggunaan mikroorganisme dengan untuk mendeteksi aktivitas mutagenik dan karsinogenik pada suatu obat-obatan prospektif , dan penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan produk farmasi seperti insulin dan hormon pertumbuhan manusia.

Buku ini terdiri dari :

BAB 1 RUANG LINGKUP MIKROBIOLOGI FARMASI DAN KLASIFIKASI MIKROBA BERDASARKAN BENTUK DAN SUSUNAN SEL

BAB 2 SEL PROKARIOTA DAN EUKARIOTA DAN MIKROBA UNISEL DAN MULTISELULER

BAB 3 PERTUMBUHAN MIKROBA, KURVA PERTUMBUHAN, PERHITUNGAN JUMLAH SEL, PERSYARATAN PERTUMBUHAN

BAB 4 PENGENDALIAN PERTUMBUHAN MIKROBA, STERILISASI, DESINFEKTAN, KONDISI ASEPTIS

BAB 5 FAKTOR YANG MPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN MEDIA PERTUMBUHAN

BAB 6 JALUR METABOLISME MIKROBA , MODIFIKASI JALUR METABOLISME DAN AKTIVITAS ANTIMIKROBA

BAB 7 VIRUS, KAPANG, KHAMIR SERTA KLASIFIKASI, SIFAT, CARA HIDUP, PERTUMBUHAN DAN PENGENDALIANNYA

BAB 8 MIKROBA PATOGEN (BAKTERI, VIRUS DAN CANDIDA) DAN RESISTENSI MIKROBA SERTA INFEKSI NOSOKOMIAL

BAB 9 JENIS MIKROBA DI ALAM DAN YANG BERMANFAAT DI DUNIA FARMASI

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada semua yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini terutama pihak penerbit yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini, Semoga Allah Swt senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

TIM PENULIS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 RUANG LINGKUP MIKROBIOLOGI FARMASI DAN KLASIFIKASI MIKROBA BERDASARKAN BENTUK DAN SUSUNAN SEL (apt. Andi Ifriany Harun, M.Si).....	2
BAB 2 SEL PRIKARIOTA DAN EUKARIOTA DAN MIKROBA UNISEL DAN MULTISELULER (Dr. Maswati Baharuddin, M.Si)	22
BAB 3 PERTUMBUHAN MIKROBA, KURVA PERTUMBUHAN, DAN PERHITUNGAN JUMLAH SEL (Etha Marista, S.Si., M.Si)	43
BAB 4 PENGENDALIAN PERTUMBUHAN MIKROBA, STERILISASI, DESINFEKSI, DAN KODISI ASEPTIS (Mahyarudin, S.Si. ,M.Si.)	55

BAB 5 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN MEDIA PERTUMBUHAN	
(apt. Imanda Dyah Rahmadani, S.Farm, M.Farm.)	71
BAB 6 JALUR METABOLISME MIKROBA, MODIFIKASI JALUR METABOLISME DAN AKTIVITAS ANTIMIKROBA	
(apt. Reni Yustiati Saksono, S.Si., M.Sc.)	84
BAB 7 VIRUS, KAPANG, KHAMIR SERTA KLASIFIKASI, SIFAT, CARA HIDUP, PERTUMBUHAN DAN PENGENDALIANNYA	
(apt. Mahdalena Sy. Pakaya, S.Farm., M.Si)	110
BAB 8 MIKROBA PATOGEN (BAKTERI, VIRUS, DAN CANDIDA) DAN RESISTENSI MIKROBA SERTA INFEKSI NOSOKOMIAL	
(apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS)	134
BAB 9 JENIS MIKROBA DI ALAM DAN BERMANFAAT DI DUNIA FARMASI	
(Dr. apt. Muntasir. S.Si., M.Si.)	151
PENUTUP	173





BAB 1

RUANG LINGKUP MIKROBIOLOGI FARMASI DAN KLASIFIKASI MIKROBA BERDASARKAN BENTUK DAN SUSUNAN SEL

(apt. Andi Ifriany Harun, M.Si.)

Universitas Tanjungpura;

jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi Pontianak, (0561)739630

Email : andi.ifriani@fkip.untan.ac.id



A. RUANG LINGKUP MIKROBIOLOGI

Kejadian yang terjadi sehari hari, seperti makanan yang busuk, adanya penyakit yang diderita baik oleh manusia, hewan, maupun tumbuhan, pembuatan kompos, sampah yang membusuk, dan lain sebagainya, umumnya disebabkan oleh makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata tanpa bantuan alat, yang sering disebut dengan mikroorganisme.

Mikroorganisme atau yang sering disebut mikroba adalah organisme hidup yang sangat kecil, biasanya memiliki diameter kurang dari 0,1 mm dan dapat diamati dengan bantuan mikroskop. Karena ukuran selnya yang sangat kecil, maka mikroorganisme mudah terhembus oleh udara dan mikroorganisme dapat ditemui di mana saja, seperti di udara, tanah, debu, air, bahkan dalam tubuh organisme lainnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Keberadaan mikroorganisme ini dapat menguntungkan atau merugikan organisme lain, terutama manusia. Salah satu hal yang menguntungkan dari keberadaan mikroorganisme adalah dalam proses pengolahan makanan, baik dari bakteri maupun fungi. Bakteri yang digunakan berasal dari kelompok Actinobacteriaceae seperti *Bifidobacterium thermophilum* (Xiao et al. 2010), Firmicutes seperti *Bacillus* (Schwan dan Wheals 2004; Kubo et al. 2011), dan



Proteobacteriaceae seperti *Acetobacter* dan *Gluconacetobacter* (Sengun dan Karabiyikli 2011). Sedangkan dari fungi bisa berasal dari yeast maupun filamentous fungi (Bourdichon et al. 2002). Selain di dunia pangan, mikroorganisme juga dimanfaatkan di bidang lain, seperti pertanian, Kesehatan, dan lain sebagainya.

Kerugian yang disebabkan oleh mikroorganisme pada manusia, adalah karena mikroorganisme menghasilkan toksin yang menyerang sel imun dan menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme adalah tipes, diare, tuberculosis, pneumonia, disentri, dan berbagai penyakit infeksi lainnya. Selain itu, bakteri juga merugikan manusia karena menyebabkan kebusukan pada makanan (Adriani, 2014).

Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, mikroorganisme terdiri dari uniseluler dan multiseluler. Mikroorganisme uniseluler strukturnya lebih sederhana dan semua fungsi kehidupan terjadi dalam satu sel. Contohnya bakteri (misalnya *Escherichia coli*), protozoa (misalnya *Amoeba*, *Paramecium*), alga mikroskopis (misalnya *Chlorella*), dan Jamur uniseluler (misalnya *Saccharomyces cerevisiae* atau ragi). Sedangkan mikroorganisme multiseluler terdiri dari lebih dari satu sel yang bekerja sama dan terorganisir dalam jaringan atau struktur tertentu untuk menjalankan fungsi kehidupan, contohnya Jamur multiseluler (misalnya *Penicillium*, kapang), alga multiseluler (misalnya *Spirogyra*, *Ulva*), dan beberapa protozoa dapat membentuk struktur multiseluler dalam fase tertentu, meskipun banyak protozoa tetap uniseluler.

Ruang lingkup mikrobiologi sangat luas, beberapa diantaranya adalah :

1. Mikrobiologi dalam Kehidupan Sehari-hari
2. Mikroba dan Sistem Klasifikasinya
3. Mikrobiologi Medis
4. Mikrobiologi Lingkungan
5. Mikrobiologi Industri

6. Mikrobiologi Molekuler

Peran mikroba dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menguntungkan maupun merugikan, dipelajari dalam mikrobiologi dalam kehidupan sehari-hari. Mikroba dan system klasifikasi mempelajari tentang berbagai jenis mikroba, seperti bakteri, virus, protozoa, alga mikroskopis, dan jamur dan dilaksifikasikan untuk mengelompokkannya berdasarkan persamaan karakteristiknya. Di bidang mikrobiologi medis, lingkungan, dan industri, mikrobiologi mempelajari tentang mikroba penyebab penyakit dan cara penanggulangannya, peranan mikroba dalam ekosistem, dan aplikasi mikroba dalam industri. Sedangkan mikrobiologi molekuler mempelajari tentang aspek teknik dan biologi molekuler mikroba, termasuk teknik rekayasa genetika dan bioteknologi.

B. RUANG LINGKUP MIKROBIOLOGI FARMASI

Mikrobiologi farmasi berkaitan dengan bagaimana peranan mikrobiologi dalam bidang farmasi, baik yang menguntungkan misalnya dengan ditemukannya probiotik mikrobiologi, maupun yang merugikan, seperti mikroba patogen penyebab penyakit. Mikrobiologi farmasi juga sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan produk farmasi, serta pengembangan obat dan terapi mikrobiologi.

Ruang lingkup mikrobiologi farmasi sangat berkaitan dengan produk-produk farmasi, meliputi :

1. Mikroorganisme dalam Obat dan Formulasi Farmasi

Mikroorganaimse dalam obat dan formulasi farmasi meliputi pengendalian kontaminasi mikroba, terutama pada bahan baku, bahan tambahan, dan produk jadi. Setelah itu dilakukan pengujian sterilisasi untuk memastikan produk farmsi tidak terkontaminasi mikroba. Pengujian ini juga dilakukan pada antibiotic dan vaksin. Selanjutnya pengetahuan tentang mikrobiologi diperlukan juga untuk menjaga stabilitas dan keamanan produk farmasi, terutama obat yang berbasis biologik.



2. Mikrobiologi Klinis dalam Farmasi

Mikrobiologi klinis meliputi informasi tentang mikroba penyebab infeksi di rumah sakit dan cara mengobatinya, serta pemahaman tentang mekanisme resistensi antibiotik dan pengembangan strategi pengobatan yang efektif.

3. Mikrobiologi dalam Pengembangan Obat

Peranan mikrobiologi dalam pengembangan obat sangat diperlukan untuk mempelajari mikroba patogen sehingga dapat ditemukan obat baru yang lebih efektif dari sebelumnya. Pengembangan dan formulasi untuk penemuan probiotik yang mengandung mikroba “baik” sangat bermanfaat untuk Kesehatan, terutama pada saluran cerna.

4. Bioteknologi dalam Farmasi

Saat ini perkembangan bioteknologi dalam bidang farmasi sangat besar peranannya, dimana beberapa obat diproduksi dengan organisme genetik rekombinan, misalnya penggunaan bakteri *E. coli* atau jamur *Saccharomyces cerevisiae* yang digunakan untuk memproduksi hormon, vaksin, dan enzim terapeutik. Selain itu, fermentasi juga memiliki peran yang cukup besar terhadap bioteknologi dalam farmasi. Beberapa vitamin dan antibiotik seperti penisilin, menggunakan fermentasi dalam proses pembuatannya.

5. Mikrobiologi Farmasi dan Keamanan Produk

Peranan mikrobiologi farmasi terhadap keamanan produk melalui penentuan dan pengawasan mikroba untuk memastikan produk tersebut aman dan tidak terkontaminasi mikroba patogen. Selain terhadap produk, mikrobiologi farmasi juga berperan dalam pengawasan mikroba di sekitar fasilitas produksi dan penyimpanan produk farmasi.

6. Vaksin dan Imunologi

Vaksin adalah produk biologis yang berasal dari antigen atau mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan dan bila diberikan kepada individu sehat dapat memicu terbentuknya kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu



(Khariri, 2022). Peranan mikrobiologi farmasi terhadap pengembangan vaksin melalui studi mikroorganisme patogen untuk menghasilkan vaksin. Mikrobiologi farmasi juga dapat menggunakan komponen mikroba patogen dalam terapi genetik dan imunoterapi pada penyakit tertentu.

7. Mikrobiologi dalam Pengelolaan Limbah Farmasi

Dalam hal pengelolaan limbah farmasi, mikrobiologi berperan pada limbah farmasi yang dapat mengandung mikroba berbahaya dan pengelolaan kontaminasi mikroba.

C. KLASIFIKASI MIKROORGANISME BERDASARKAN BENTUK

Karena ukurannya yang sangat kecil, mikroba hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Mikroba terdiri dari bakteri, virus, alga mikroskopik, dan jamur(fungi).

1. Bakteri

a. Bentuk Sel bakteri

Bentuk sel bakteri, tidak akan berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, selama struktur dinding selnya tidak rusak atau hilang. Dinding sel bakteri dapat rusak oleh berbagai faktor antara lain karena pengaruh senyawa kimia antimikroba atau antibiotik.

Berdasarkan morfologinya, bentuk bakteri diklasifikasikan menjadi bentuk kokus (bulat), basilus (batang/panjang), dan spirillum (helikal).

1). Kokus (Bulat)


Bakteri berbentuk kokus ini dikelompokkan lagi menjadi monokokus contohnya *Monococcus gonorrhoeae*, diplokokus (pasangan sel bulat) contohnya *Neisseria gonorrhoeae*, bentuk streptokokus seperti rantai sel bulat, contohnya *Streptococcus pyogenes*, tetrakokus terdiri dari 4 kokus, misalnya *Pediococcus cereviceae*, sarcina, bentuknya berkelompok empat-empat dan dapat membentuk



kubus dengan 8 sel, dan bentuk stafilocokus, bentuknya seperti buah anggur, contohnya *Staphylococcus aureus*. Bentuk kokus dari bakteri dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1.1

Bentuk-Bentuk Sel Bakteri Kokus




Sumber : <https://www.biologiik.com/2017/08/klasifikasi-bakteri-berdasarkan-bentuk-sel.html>, diakses tanggal 24 November 2024

2). Basilus (Batang/Panjang)

Sel bakteri basil berbentuk silindris seperti batang dimana ujung selnya bisa berbentuk persegi, bundar, meruncing dan sebagainya. Bakteri bentuk basillus dikelompokkan menjadi monobasilus, diplobasilus, streptobasilus, palisade, dan kokobasilus.

Gambar 1.2.

Bentuk Bakteri Basillus



Sumber : <https://www.biologiik.com/2017/08/klasifikasi-bakteri-berdasarkan-bentuk-sel.html>, diakses tanggal 24 November 2024

Monobasilus terdiri atas satu bakteri bentuk basil yang hidup soliter (sendiri-sendiri). *Escherichia coli* dan *Salmonella thyposa* adalah contoh dari bakteri monobasilus. Diplobasilus terdiri dari bakteri basil yang berpasangan dua-dua, contohnya *Renibacterium salmoninarum*, *Coxiella burnetii*, *Moraxella bovis* dan *Klebsiella rhinoscleromatis*. Streptobasilus adalah bakteri basil yang hidup berkoloni, memanjang membentuk rantai, contohnya Contoh bakteri streptobasil adalah *Acetobacter xylinum* yang digunakan dalam pembuatan *nata de coco* dan *Bacillus anthracis* (bakteri penyebab penyakit antraks) dan *Streptobacillus moniliformis*.

Basilus bentuk palisade adalah bakteri basil yang melengkung pada titik-titik pembelahan mengikuti pembelahan sel, sehingga berbentuk menyerupai batang berjajar seperti pagar dan pola sudut yang terlihat seperti huruf Cina. Contohnya adalah *Corynebacterium diphtheriae*. Bakteri bentuk kokobasilus adalah bakteri yang sangat pendek dan kekar berbentuk bulat telur atau oval. Bakteri kokobasilus tampak seperti kokus dan basil (sesuai dengan namanya). Contohnya *Haemophilus influenzae*, *Gardnerella vaginalis* dan *Chlamydia trachomatis*.

3). Spirilium (Helikal)

Biasa disebut juga bakteri spirilium, yaitu jenis bakteri yang bentuknya panjang dan lengkung seperti spiral. Bakteri ini hidup sendiri-sendiri dan tidak berkoloni. Berdasarkan perbedaan panjangnya, jumlah lekukan, panjang dan kerapatan lekukan, bakteri spirilium dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu vibrio (koma), spiral dan spiroseta.



Bakteri vibrio(koma) berbentuk lengkungan kurang dari setengah lingkaran, pendek dan tidak lengkap, contohnya *Vibrio cholerae*. **Bakteri spiral** bentuknya melengkung lebih dari setengah lingkaran. Bentuk spiral ini di sebut juga heliks, contohnya *Helicobacter pylori* dan *Spirillum minor*, *Campylobacter jejuni* dan *Spirillum winogradskyi*. Sedangkan bakteri Spiroseta hidup berkelompok, berbentuk spiral dengan tekstur halus dan lentur, sehingga ketika bergerak, tubuhnya dapat memanjang atau memendek. Contohnya *Treponema pallidum*, *Leptospira interrogans* dan *Borrelia recurrentis*. Gambar dibawah ini memperlihatkan 3 bentuk bakteri spirillum sebagai berikut :

Gambar 1. 3.
Bentuk-Bentuk Bakteri Spirillum



Sumber : <https://www.biologijk.com/2017/08/klasifikasi-bakteri-berdasarkan-bentuk-sel.html>, diakses tanggal 24 November 2024

b. Susunan Sel Bakteri

Meskipun bentuk selnya bervariasi, semua bakteri memiliki struktur dasar yang umum. Dengan struktur ini, bakteri mampu bertahan, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, serta menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia dan organisme



lainnya. Berikut ringkasan susunan utama sel bakteri :

- 1) **Membran sel:** Lapisan pelindung dan pengatur transportasi.
- 2) **Dinding sel:** Menyediakan bentuk dan perlindungan (peptidoglikan)
- 3) **Sitoplasma:** Cairan yang mengandung enzim, ribosom, dan bahan genetik.
- 4) **Kromosom:** DNA utama yang berfungsi dalam replikasi dan sintesis protein.
- 5) **Plasmid:** DNA tambahan yang membawa gen tertentu, seperti resistansi antibiotik.
- 6) **Ribosom:** Tempat sintesis protein.
- 7) **Flagela:** Struktur untuk pergerakan.
- 8) **Fimbriae/Pilus:** Struktur untuk perlekatan dan transfer gen.
- 9) **Kapsul:** Lapisan pelindung yang meningkatkan virulensi.
- 10) **Inklusi:** Penyimpanan cadangan makanan.

2. Virus

Berbeda dengan bakteri, virus termasuk juga dalam kelompok mikroorganisme karena ukurannya yang sangat kecil (100 – 300 amstrong) (Rahmadina, 2024) tetapi virus murni organisme obligat parasit yang hanya dapat tumbuh dan berkembang biak di dalam sel hidup (inang). Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, virus tidak bisa mereplikasi diri. Beberapa spesies organisme ini bahkan dapat membunuh sel inangnya untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inang, virus tidak bisa hidup dalam waktu yang lama.

Ukuran virus sangat kecil bahkan sulit dilihat dengan bantuan mikroskop cahaya. Virus bukan sel dan tidak memiliki inti sel dan organel-organel sel lainnya. Pada waktu virus menginfeksi makhluk lainnya, virus memperlihatkan beberapa



sifat mikroorganisme hidup, sehingga beberapa ahli mengelompokkan virus berada pada wilayah perbatasan antara organisme hidup dan tidak hidup. Virus terdiri dari materi genetik yang dilapisi oleh protein, dan kadang-kadang memiliki lapisan lipid tambahan.

Virus adalah partikel kecil (antara 100 dan 300 angstrom) yang dapat menginfeksi sel prokariotik dan eukariotik. Virus terbuat dari protein dan asam nukleat (DNA atau RNA). Pada dasarnya, virus hanya terdiri dari dua bagian: selubung protein (kapsid) dan asam nukleat (DNA atau RNA), yang terdapat di dalamnya. Satu jenis molekul protein sederhana serta partikel yang lebih kompleks membentuk struktur cangkang atau selubung virus. Lebih dari lima belas jenis protein berbeda membentuk virus kulit (penyelubung).

a. Bentuk Virus


Bentuk virus yang paling umum adalah sebagai berikut:

1) Virus Helikal:

Virus ini memiliki bentuk silindris atau batang yang berputar (heliks). Dalam virus helikal, DNA atau RNA dililitkan di sekitar protein yang membentuk kapsid. Contoh: Virus *Tobacco Mosaic Virus* (TMV), virus rabies.

Gambar 1.4.

Bentuk Virus Helikal



Sumber : <https://depositphotos.com/id/vector/structure-helical-virus-610370414.html>, diakses tanggal



26 November 2024

Virus Helikal memiliki ciri-ciri yang khas, dimana memiliki struktur helikal yang menyerupai batang atau silinder yang berpilin, DNA atau RNA tersusun dalam bentuk yang berpilin, mengikuti struktur helikal kapsid. Kapsid virus helikal tersusun dari protein-protein yang disebut **capsomeres** yang mengikat diri pada materi genetik dan membentuk struktur berpilin. Dalam virus helikal, kapsid biasanya lebih panjang daripada lebar, sehingga membentuk struktur yang memanjang seperti batang atau silindris. Virus helikal bisa terdapat selubung lipid (envelope) atau tidak. Jika ada, selubung ini terbentuk dari membran sel inang yang terinfeksi dan memberikan lapisan tambahan di sekitar kapsid. Virus helikal tanpa selubung disebut **non-enveloped** dan yang memiliki selubung disebut **enveloped**.

Beberapa keunikan virus helikal adalah simetri dan replikasi cepat. Virus helikal memiliki simetri yang lebih sederhana dan lebih stabil, karena struktur helikal memungkinkan pengemasan materi genetik dalam bentuk yang sangat teratur dan rapat. Dalam hal replikasi, virus helikal cenderung memiliki mekanisme replikasi yang efisien, yang memungkinkan mereka berkembang biak dengan cepat di dalam sel inang. Virus helikal dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan, antara lain: Rabies (virus rabies). Influenza (virus influenza). Ebola dan Marburg (virus Ebola, virus Marburg). Mosaik Tembakau (Tobacco Mosaic Virus pada tanaman).


2). Virus Icosahedral:

Virus dengan bentuk simetris yang terdiri dari 20 sisi segitiga, membentuk suatu polyhedron yang disebut ikosahedron.



Kapsid virus ikosahedral dibentuk oleh beberapa subunit protein yang disebut *capsomeres*. Contoh: Virus *Adenovirus*, virus herpes, dan beberapa jenis virus *picornavirus* (seperti *Poliovirus*).

Gambar 1. 5.
Virus Ikosahedral



Sumber : <https://depositphotos.com/id/photo/virus-cells-of-the-adenovirus-family-in-icosahedral-shape-330194490.html>, diakses tanggal 26 November 2024


3). Virus Bercangkang (Enveloped Virus):

Beberapa virus memiliki lapisan tambahan berupa membran lipid, yang disebut **selubung** (envelope). Selubung ini terbentuk dari membran sel inang yang terinfeksi, dan berfungsi untuk membantu virus masuk ke dalam sel inang. Virus dengan selubung seringkali memiliki bentuk bulat atau oval dan lebih mudah terdegradasi oleh faktor luar, seperti panas atau deterjen. Contoh: Virus influenza, HIV, dan virus hepatitis B.



Gambar 1. 6.

Envelope Virus




Sumber <https://stablediffusionweb.com/image/19499345-virus-with-an-envelope-and-glycoproteins>, diakses tanggal 26 November 2024

4). Virus Kompleks:

Virus ini memiliki struktur yang lebih kompleks dan tidak masuk dalam kategori helikal atau ikosahedral. Struktur virus kompleks biasanya ditemukan pada virus yang menginfeksi bakteri (bakteriofag), yang memiliki bentuk seperti roket atau pesawat ruang angkasa dengan kepala dan ekor. Contoh: Bakteriofag *T4*.



Gambar 1. 7.
Virus Kompleks



Sumber: <https://kumpulanstudi-aspirasi.com/mengenal-sepintas-anti-corona-virus-covid-19/>, diakses tanggal 26 November 2024

b. Susunan Virus

Struktur dasar virus terdiri dari dua komponen utama: materi genetik dan kapsid. Beberapa virus juga memiliki selubung lipid. Materi genetik (DNA atau RNA), kapsid (protein kapsid), selubung (envelope) (pada beberapa virus), enzim Virus (pada beberapa virus)

3. Alga Mikroskopik

Alga mikroskopik (atau mikroalga) adalah jenis alga yang ukurannya sangat kecil dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Meskipun ukurannya kecil, alga mikroskopik memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem, terutama dalam produksi oksigen dan sebagai bagian dari rantai makanan akuatik. Alga mikroskopik dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk laut, perairan tawar, dan tanah yang lembap.

a. Bentuk Mikroalga

Berdasarkan morfologinya, mikroalga memiliki bentuk sebagai berikut :

1). Uniseluler

Mikroalga uniseluler dapat melakukan fotosintesis secara mandiri dan sering ditemukan sebagai plankton di perairan laut atau tawar. Contoh



Chlorella (Alga hijau uniseluler), diatom (Alga berbentuk silika)

2). Multiseluler

Mikroalga multiseluler dapat berbentuk koloni atau benang. Koloni ini sering kali tampak sebagai satu kesatuan, meskipun terdiri dari banyak sel yang saling terhubung. Contoh Volvox: (koloni alga hijau multiseluler), Spirogyra (Alga hijau berbentuk benang (filamen) yang memiliki kloroplas berbentuk spiral).

3). Filamen (Benang):

Beberapa mikroalga membentuk filamen panjang yang terdiri dari sel-sel yang terhubung satu sama lain. Filamen ini dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan perairan. Contoh Oscillatoria (alga biru-hijau berbentuk filamen yang sering ditemukan di perairan tawar) dan Spirogyra

4). Sferoid atau Bola:

Bentuk sferoid sering ditemukan pada alga yang hidup dalam koloni. Contoh Sphaerocystis dan Chlamydomonas (Alga hijau uniseluler dengan bentuk agak bulat)

5). Bentuk Berkepadatan Tinggi:

Beberapa mikroalga dapat membentuk struktur padat atau bergerombol dalam kondisi tertentu, seperti dalam kondisi pencahayaan yang optimal. Contoh Alga yang membentuk blooming atau mekar di laut dan menyebabkan fenomena seperti **red tide**.

b. Susunan Sel Mikroalga

Meskipun bervariasi antar spesies, susunan sel mikroalga memiliki komponen dasar yang umumnya ditemukan pada alga lainnya. Susunan dasar sel mikroalga terdiri dari dinding sel, membran plasma, kloroplas, vakuola,



nukleus, plastida, stigma, dan flagella. Stigma dan flagella hanya terdapat pada beberapa mikroalga.

4. Jamur

Jamur terdiri dari organisme multiseluler atau uniseluler yang dapat hidup sebagai parasit, saprofit, atau simbiotik. Jamur tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis.

a. Bentuk Jamur

Jamur dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat uniseluler maupun multiseluler. Jamur uniseluler, contohnya adalah **Saccharomyces cerevisiae**, sedangkan jamur multiseluler (filamentous fungi) meliputi contoh seperti **Penicillium** dan **Aspergillus**. Selain itu, ada juga jamur yang membentuk tubuh buah, seperti jamur tiram (**Pleurotus**) atau jamur kancing (**Agaricus**). Jamur multiseluler terdiri dari struktur yang disebut hifa, yang merupakan benang-benang halus, dan miselium, yang merupakan jaringan hifa yang tumbuh dan berkembang di dalam substrat.

b. Susunan Sel jamur

Secara umum, jamur terdiri dari sel-sel eukariotik yang lebih kompleks daripada bakteri, tetapi berbeda dari tanaman dan hewan. Struktur sel jamur terdiri dari dinding sel, membran plasma, hifa dan miselium (pada jamur multiseluler), vakuola, plasmodesmata (pada beberapa jenis jamur), dan spora.



REFERENCE

- Adriani, A. (2014). Identifikasi Keberadaan *Staphylococcus* Sp Pada Santan Kelapa Kemasan Yang Di Perdagangan Di Kota Makassar. *Jurnal Biotek*, 1(1), 31-34, <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/Setawar/article/view/4678/2980>
- Adriani Adriani, Esti Rizkiana Pratiwi, Andi Nur Samsi, MuthmainnahMuthmainnah, Ube, (2023), Edukasi Kesehatan : Pemanfaatan Bakteri Dalam Berbagai Aspek Kehidupan, *Jurnal Setawar Abdimas*, 02(01), 28-33, ISSN: 2809-5626e-ISSN: 2809-5618, <https://doi.org/10.36085/sa.v2i1.4678>
<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/Setawar/indexp>
- Bourdichon F, Casaregola S, Farrokh C, Frisvad JC, Gerds ML, Hammes WP, Harnett J, Huys G, Laulund S, Ouwehand A, Powell IB, Prajapati JB, Seto Y, Schure ET, Boven AV, Vankerckhoven V, Zgoda A., Tuijtelaars S, Hansen EB. 2012. Food fermentations: Microorganisms with technological beneficial use. *International Journal of Food Microbiology*. 154: 87–97.
- Didimus Tanah Boleng, (2015), *Bakteriologi, konsep-Konsep Dasar*, UMM Press, Universitas Muhammadiyah Malang, ISBN : 978-979-796-329-3
- Etiek Nurhayati, Maulidiyah Salim, Jajar Pramata Syari, Reinisya Irine (2022), Cemaran Mikroba pada Suhu Dingin Dalam Kulkas Rumah Tangga, *Jurnal Vokasi Kesehatan*, Vol 8, Nomor 1, 59-63, <http://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/JVK>

Hayyun Durrotul Faridah, Silvia Kurnia Sari, (2019), Pemanfaatan Mikroorganisme Dalam Pengembangan Makanan Halal Berbasis Bioteknologi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 1, 33-43, E-ISSN: 2654-9778; P-ISSN: 2654-9409

Khariri, Ariyani Noviantari, (2022), Perjalanan Panjang Dalam Pengembangan Vaksin Baru, *Prosiding Seminar Nasional Riset Kedokteran (Sensorik)*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/sensorik/article/download/1947/1514>

Rahmadina, Yulis Aulia, Muhammad Agung Saputra, Dilla Wardhani, Fitriani, (2024), Perbedaan Teori Organisme Sel Prokariotik, Eukariotik Dan Virus, *Algoritma: Jurnal Matematika, Ilmu pengetahuan Alam, Kebumihan dan Angkasa 2 (5)*, 75-84, e-ISSN: 3046-5427; dan p-ISSN: 3032-6230, DOI: <https://doi.org/10.62383/algoritma.v2i5.128>

Schwan RF, Wheals AE. 2004. The Microbiology of Cocoa Fermentation and its Role in Chocolate Quality. *Food Science and Nutrition*. 44 (4): 205-221.

Sengun IY, Karabiyikli S. 2011. Importance of Acetic Acid Bacteria in Food Industry. *Food Control*. 22: 647–656.

Xiao JZ, Takahashi S, Nishimoto M, Odamaki T, Yaeshima T, Iwatsuki K, Kitaoka M. 2010. Distribution of in Vitro Fermentation Ability of Lacto-N-Biose I, A Major Building Block of Human Milk Oligosaccharides, in Bifidobacterial Strains. *Applied and Environmental Microbiology*. 76: 54-59.



PROFIL PENULIS

apt. Andi Ifriany Harun, M.Si.

Penulis Lahir di Makassar pada hari minggu, tanggal 27 desember 1970. Menyelesaikan pendidikan TK di Makassar, Tahun 1980 – 1986 pindah ke kota Palu Sulawesi-Tengah mengikuti orang tua, lalu kembali lagi ke Makassar. Tahun 1988-1989 pindah ke kota depok mengikuti orang tua dan kembali ke Makassar tahun 1989 sampai menyelesaikan kuliah S1 di FMIPA Jurusan




Farmasi Universitas Hasanuddin pada tahun 1996. Tahun 1998 menyelesaikan pendidikan profesi apoteker dan tahun 2001 menyelesaikan S2 Jurusan Kimia (biokimia) di Universitas Hasanuddin.

Tahun 1998 mengikuti program karya siswa yang dilaksanakan oleh Dikti dan diterima sebagai dosen pada Universitas Tanjungpura dari tahun 2000 sampai sekarang. Mengampu mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul, Metabolisme dan Rekayasa genetika, Ikatan Kimia, Kimia Koordinasi, Mikrobiologi, kimia Bahan Pangan, kimia kuantum, dan Bioteknologi.

Tahun 2001-2010 menjadi apoteker pengelola apotek (APA) pada apotek Vega di Pontianak.

Bookchapter yang sudah ditulis sudah 3, yaitu Antibiotik dan Resistensi Antibiotik. (desember 2021) dan Ilmu Biomedik Dasar (desember 2022), dan Biokimia Farmasi (Januari 2024). Bookchapter ini adalah bookchapter keempat yang Insyaa Allah akan terbit di tahun 2024

Email Penulis: andi.ifriani@fkip.untan.ac.id



BAB 2

SEL PRIKARIOTA DAN EUKARIOTA DAN MIKROBA UNISEL DAN MULTISELULER

(Dr. Maswati Baharuddin, M.Si.)

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar/Jl.H. Yasin Limpo

No.36 Samata Gowa/Tlp 841879/Fax.8221400

Email: [\(bmaswati@gmail.com\)](mailto:bmaswati@gmail.com)

A. PENDAHULUAN

Setiap sel bekerja sebagai unit dasar yang menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Sel berfungsi sebagai blok pembangun kehidupan. Setiap sel memiliki kemampuan untuk melakukan fungsi biologis yang diperlukan seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya dan menunjukkan bahwa sel berkembang biak melalui proses pembelahan sel.

Teori sel mengukuhkan peran sel sebagai dasar dari segala kehidupan, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, dan memberikan dasar ilmiah untuk memahami berbagai proses biologis di tingkat molekuler hingga organisme secara keseluruhan. Konsep-konsep prokariotik, eukariotik, uniseluler, dan multiseluler adalah fundamental dalam biologi dan membantu memahami perbedaan struktural, fungsional, dan metabolik antara berbagai bentuk kehidupan.

B. PEMBAHASAN

1. Sel Prokariota

Organisme prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki nukleus sejati dan organel terikat membran. Materi genetik berada dalam bentuk DNA sirkular yang berada langsung di dalam sitoplasma. Selnya tidak memiliki organel terikat

membran dan tidak terdapat mitokondria atau kloroplas. Semua proses metabolisme terjadi di sitoplasma atau membran sel. Dinding sel prokariota biasanya memiliki dinding sel yang memberikan bentuk dan perlindungan. Pada bakteri, dinding ini terbuat dari peptidoglikan. Ukuran kecil sekitar antara 1 hingga 10 mikrometer. Prokariota bereproduksi secara asexual melalui pembelahan biner.

Membran sel terdiri atas 2 lapisan yang tersusun atas fosfolipid. Fosfolipid bersifat bilayer dan terdiri atas bagian yang hidrofil dan hidrofob. Membran sitoplasma merupakan tempat enzim sitokrom, dehidrogenase asam suksinat, dehidrogenase asam laktat, enzim malat dehidrogenase, asam format dan fosfatase. Fungsinya hampir sama dengan mitokondria.

Dinding sel tersusun atas makromolekul mukopeptida atau peptidoglikan. Peptidoglikan tersusun dari monomer tetrapeptidaglikan (N-asetil glukosamin dan asam N muramat dan beberapa asam amino seperti L-alanin, D-glutamat, L-lisin, dan D-alanin yang terikat dengan ikatan β 1,4 glikosida. Berdasarkan pewarnaan gram, bakteri dibedakan atas gram positif dan negatif. Dinding sel gram positif tersusun atas lapisan peptidoglikan yang tebal, sedangkan gram negatif mempunyai 2 lapisan yaitu lipopolisakarida dan protein dan peptidoglikan yang lebih sedikit.

Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel. Kapsul tersusun atas polisakarida ekstraseluler. Polisakarida yang menyusun kapsul terdiri atas homopolisakarida dan heteropolisakarida. Monosakarida yang menyusun kapsul dan lendir bakteri antara lain D-Glukosa, D-Galaktosa, D-mannosa (heksosa). Sedangkan asam amino pada kapsul dan lendir N-Asetil glukosamin dan N-Asetil Galaktosamin, asam uronat dan galakturonat.



Fibrie dan pili adalah benang halus yang menonjol keluar yang berperan dalam proses kolonisasi bakteri. Pili mengandung protein yang terdiri dari 8 asam amino dan bersifat antigenik.

a. Arachea

Archae hidup di lingkungan ekstrem, yang tidak biasa. Ada yangn hidup pada suhu yang tinggi, pH asam. Termoasidofil hidup di sumber air panas belerang dengan suhu tinggi 80°C dan nilai pH rendah 2. Eubacteria mencakup bentuk umum bakteri yang hidup di berbagai lingkungan, termasuk tanah, air, dan organisme lain (patogen manusia). Sebagian besar sel berbentuk bulat, berbentuk batang, atau spiral, dengan diameter 1 hingga 10 μm . Kandungan DNA berkisar antara sekitar 0,6 juta hingga 5 juta pasangan basa, jumlah yang cukup untuk mengkodekan sekitar 5000 protein yang berbeda.

b. Bakteri

Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler yang dapat ditemukan hampir di semua lingkungan di bumi. memainkan peran penting dalam siklus biogeokimia dan banyak proses biologis lainnya. Meskipun ukurannya sangat kecil, bakteri memiliki keragaman besar dalam hal habitat, bentuk, ukuran, dan metabolisme.

Bakteri dapat hidup di berbagai macam lingkungan, dari kondisi yang ekstrem hingga tempat yang lebih umum. Banyak bakteri hidup di tanah yang berperan dalam dekomposisi bahan organik dan siklus nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan karbon. Bakteri juga dapat ditemukan di air tawar, air asin, hingga air tanah. Contoh spesifiknya adalah bakteri di lingkungan laut yang membantu dalam dekomposisi organisme laut mati dan siklus nutrisi.



Bakteri ekstremofil, seperti thermophiles dan psychrophiles, dapat hidup di lingkungan dengan suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah. Acidophiles dapat hidup di lingkungan yang sangat asam, seperti di kawah gunung berapi atau tambang asam. Alkaliphiles, sebaliknya, dapat hidup di kondisi basa, seperti di danau soda. Halophiles adalah bakteri yang dapat bertahan hidup di lingkungan dengan kadar garam yang sangat tinggi, misalnya di Laut Mati atau danau garam. Bakteri hidup sebagai bagian dari flora normal pada tubuh manusia dan hewan dapat ditemukan di kulit, mulut, usus, dan saluran pernapasan.

2. Bentuk Bakteri

Bakteri dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dasar yang berbeda. Bentuk bulat (coccus) atau hampir bulat. Contoh bakteri ini adalah *Staphylococcus* dan *Streptococcus*. Bacillus berbentuk batang atau silinder. Contohnya adalah *Escherichia coli* dan *Bacillus subtilis*. Berbentuk spiral atau bergelombang, seperti *Spirillum minus*. Berbentuk koma atau seperti setengah lingkaran, seperti *Vibrio cholerae*. Bakteri dengan bentuk spiral panjang dan lentur, contohnya adalah *Treponema pallidum* yang menyebabkan sifilis.

Ukuran Bakteri

Ukuran bakteri sangat bervariasi, tetapi umumnya berada dalam rentang mikroskopis. Sebagian besar bakteri memiliki ukuran panjang sekitar 0,5 hingga 5 mikrometer (μm). Misalnya, *Escherichia coli* biasanya memiliki panjang sekitar 2 μm . Lebar bakteri seringkali berada di kisaran 0,2 hingga 2,0 μm .

Metabolisme Bakteri

Metabolisme bakteri bervariasi tergantung pada sumber energi dan bahan kimia yang digunakan untuk pertumbuhan dan perbaikan diri. Berdasarkan Sumber Energi bakteri terdiri bakteri



fototrof yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk mensintesis senyawa organik. Bakteri fotosintetik seperti *Cyanobacteria* menghasilkan energi melalui fotosintesis. Bakteri kemotrof memperoleh energi dari oksidasi senyawa kimia. Bakteri ini terbagi lagi menjadi Kemoautotrof yang menggunakan senyawa anorganik (seperti amonia atau hidrogen sulfida) sebagai donor elektron untuk menghasilkan energi. Kemoheterotrof menggunakan senyawa organik (seperti gula atau lemak) untuk memperoleh energi, seperti *Escherichia coli*.

Berdasarkan Sumber Karbon Bakteri autotrof yang dapat menggunakan karbon dioksida (CO_2) sebagai sumber karbon untuk membentuk senyawa organik. Contohnya adalah bakteri nitrifikasi yang terlibat dalam siklus nitrogen. Sedangkan bakteri heterotrof bergantung pada senyawa organik yang diproduksi oleh organisme lain sebagai sumber karbon. Banyak bakteri patogen termasuk dalam kelompok ini.

Bakteri juga dapat berbeda berdasarkan kebutuhan oksigen. Bakteri yang membutuhkan oksigen terdiri dari Aerob Obligate yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup, seperti *Mycobacterium tuberculosis*. Anaerob Obligate merupakan bakteri yang tidak dapat bertahan hidup di lingkungan yang mengandung oksigen, seperti *Clostridium botulinum*. Anaerob Fakultatif adalah bakteri yang dapat hidup baik dengan atau tanpa oksigen, seperti *Escherichia coli*.

Berdasarkan Respirasi bakteri menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir dalam rantai transport elektron. Sedangkan respirasi Anaerobik menggunakan senyawa anorganik lain (seperti nitrat atau sulfat) sebagai akseptor elektron terakhir.



3. Sel Eukariota

Organisme eukariotia adalah makhluk hidup yang memiliki nukleus sejati dan berbagai organel yang terikat oleh membran. DNA berada dalam inti sel yang terpisah dari sitoplasma. Memiliki nukleus, DNA berbentuk linear dan terbungkus di dalam nukleus. Memiliki organel terikat membran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, kloroplas (pada tumbuhan), dan badan Golgi, yang memungkinkan pembagian fungsi dalam sel. Ukuran lebih besar antara 10 hingga 100 mikrometer. Eukariota dapat bereproduksi secara seksual melalui meiosis, yang menghasilkan variasi genetik, atau secara aseksual melalui mitosis. Sel eukariotik ditemukan pada organisme multiseluler seperti tumbuhan, hewan, fungi, serta organisme uniseluler tertentu seperti protozoa. Keberadaan nukleus dan organela yang terbungkus membran membuat sel eukariotik berbeda dari sel prokariotik, yang tidak memiliki struktur ini.

a. Protozoa

Protozoa adalah organisme eukariotik uniseluler yang umumnya hidup di lingkungan berair atau lembab dan memiliki berbagai bentuk gerakan dan kemampuan untuk hidup sebagai parasit atau secara bebas. Protozoa sering dianggap sebagai organisme hewan karena gerak aktif dan kebanyakan adalah heterotrof, memakan bakteri, ganggang, atau organisme mikro lainnya.

Sebagian besar protozoa hidup di lingkungan berair, baik di air tawar seperti danau, sungai, dan kolam, maupun di laut. Berperan dalam rantai makanan sebagai pemangsa bakteri dan alga. Protozoa juga ditemukan di tanah, terutama di daerah yang lembab, di mana membantu menguraikan bahan organik dan menjaga keseimbangan mikroba. Beberapa protozoa hidup sebagai parasit di dalam tubuh inangnya, termasuk manusia dan hewan, misalnya



Plasmodium (penyebab malaria) atau *Trypanosoma* (penyebab penyakit tidur Afrika). *Haloflagellates*, hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, seperti danau garam.

Struktur Sel Protozoa

Protozoa adalah organisme uniseluler eukariotik memiliki organel bermembran dan nukleus yang berbeda. Protozoa memiliki membran sel yang fleksibel yang mengelilingi seluruh sel. Beberapa protozoa juga memiliki pelikel, lapisan pelindung tebal di luar membran yang membantu menjaga bentuknya. Nukleus yang dikelilingi oleh membran inti dan mengandung materi genetik dalam bentuk DNA. *Amoeba* bergerak dengan cara mengeluarkan pseudopodia (kaki semu), yaitu ekstensi dari sitoplasma yang membantu bergerak dan menangkap mangsa.

Reproduksi Protozoa

Protozoa dapat bereproduksi secara asexual dan seksual, tergantung pada jenis spesiesnya: Pembelahan Biner merupakan cara protozoa mereproduksi diri dengan membagi satu sel induk menjadi dua sel anak yang identik. Contohnya, *Amoeba* bereproduksi melalui pembelahan biner. Pembelahan Berganda terjadi ketika inti sel membelah beberapa. *Trypanosoma* berkembang biak dengan cara tunas, sel anak terbentuk sebagai tunas di permukaan sel induk. *Paramecium* mengalami konjugasi, dengan cara dua sel bersatu dan bertukar materi genetik sebelum berpisah dan membentuk sel-sel baru. *Plasmodium*, gamet diproduksi dalam inang yang kemudian bersatu untuk membentuk zigot dan memulai siklus reproduksi baru.



Klasifikasi Protozoa

Protozoa diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya, cara makan, dan cara reproduksi. Terdapat empat kelompok utama protozoa berdasarkan pergerakannya. Protozoa yang bergerak menggunakan flagela. Sebagian besar adalah parasit atau hidup bebas. Contoh: *Trypanosoma* (penyebab penyakit tidur), *Giardia lamblia* (penyebab giardiasis). Protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia (kaki semu) dan seringkali berukuran besar. memakan bakteri dan partikel organik lainnya. Contoh: *Amoeba proteus*, *Entamoeba histolytica* (penyebab disentri amuba). Protozoa yang bergerak menggunakan silia dan memiliki dua jenis nukleus (mikronukleus dan makronukleus). biasanya hidup bebas di air tawar. Contoh: *Paramecium*, *Balantidium coli* (penyebab balantidiasis).

b. Fungi

Fungi merupakan organisme yang tersebar luas di berbagai habitat. dapat ditemukan di lingkungan darat, air, bahkan udara. Habitat utama fungi adalah lingkungan yang lembab dan kaya akan bahan organik. Fungi sering ditemukan di tanah, serasah daun, batang pohon yang membusuk, serta makanan yang telah terkontaminasi. Selain itu, beberapa fungi bersifat simbiotik dan hidup di dalam jaringan tumbuhan, serangga, atau hewan. Fungi yang hidup di lingkungan akuatik seperti spesies chytridiomycota biasanya ditemukan di perairan tawar.

Reproduksi Fungi

Fungi dapat bereproduksi secara aseksual maupun seksual, tergantung pada kondisi lingkungan dan spesiesnya. Pada reproduksi aseksual, fungi menghasilkan spora aseksual seperti konidia, sporangiospora, atau blastospora yang



berkembang tanpa fusi gamet. Spora ini tersebar melalui udara, air, atau perantara lainnya dan tumbuh menjadi individu baru ketika kondisi lingkungan mendukung.

Pada reproduksi seksual, terjadi fusi antara dua sel induk yang berbeda (plasmogami) yang kemudian diikuti oleh penggabungan inti (karyogami). Proses ini menghasilkan zigot yang berkembang menjadi spora seksual seperti askospora pada Ascomycota dan basidiospora pada Basidiomycota. Reproduksi seksual biasanya terjadi ketika kondisi lingkungan kurang mendukung, memungkinkan fungi untuk menghasilkan variasi genetik.

Klasifikasi Fungi

Fungi diklasifikasikan ke dalam beberapa filum berdasarkan struktur reproduksi dan siklus hidupnya. Chytridiomycota merupakan fungi akuatik yang menghasilkan spora dengan flagela. adalah satu-satunya fungi yang memiliki fase motil. Fungi zygomycota dapat menghasilkan zigospor pada reproduksi seksual. Contoh anggota kelompok ini adalah Rhizopus yang biasa ditemukan pada roti berjamur. Ascomycota merupakan fungi kantung, Ascomycota menghasilkan spora seksual yang disebut askospora dalam struktur mirip kantung yang disebut askus. Contohnya adalah ragi dan jamur truffle. Basidiomycota adalah fungi ini menghasilkan basidiospora pada struktur seperti tongkat yang disebut basidium. Contohnya adalah jamur payung dan puffball. Fungi yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza arbuskular, membantu tumbuhan menyerap nutrisi dari tanah.

Metabolisme Fungi

Fungi adalah organisme heterotrof, yang berarti mendapatkan nutrisi dengan menguraikan bahan organik



dari lingkungan sekitarnya. mencerna makanan secara eksternal dengan melepaskan enzim hidrolitik ke lingkungannya yang kemudian memecah bahan organik kompleks menjadi molekul yang lebih kecil, seperti gula dan asam amino, yang dapat diserap oleh hifa.

Ada tiga jenis utama metabolisme fungi berdasarkan sumber nutrisi yaitu fungi saprofit hidup dengan menguraikan bahan organik yang mati, seperti kayu yang membusuk, dedaunan, atau bangkai hewan. Fungi parasit mengambil nutrisi dari organisme hidup, menyebabkan penyakit pada inang . Contohnya adalah jamur penyebab penyakit pada tumbuhan seperti karat daun atau cendawan tepung. Fungi simbiotik hidup berdampingan dengan organisme lain secara saling menguntungkan. Misalnya, mikoriza membantu tumbuhan menyerap air dan nutrisi, sementara fungi mendapatkan karbohidrat dari tumbuhan.

c. Alga

Alga adalah kelompok organisme autotrof yang dapat ditemukan di berbagai habitat, terutama di lingkungan perairan. hidup di air tawar (danau, sungai, kolam), air laut (laut, samudra), hingga habitat darat yang lembab. Beberapa alga bahkan bisa hidup di permukaan batu, tanah basah, atau di salju dan es.

Alga mikroskopis dapat melayang di permukaan air sebagai fitoplankton, sedangkan alga makroskopis seperti rumput laut tumbuh melekat pada substrat di dasar laut. umumnya membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, sehingga banyak ditemukan di daerah permukaan air (zona fotik).



Reproduksi Alga

Alga bereproduksi melalui cara aseksual maupun seksual, tergantung pada jenis dan kondisi lingkungan. Alga umumnya melakukan pembelahan biner, fragmentasi, atau pembentukan spora. Pada pembelahan biner, sel alga membelah menjadi dua sel anak. Fragmentasi terjadi ketika bagian dari thallus (tubuh alga) terpecah dan tumbuh menjadi individu baru. Sementara itu, spora aseksual seperti zoospora yang dilengkapi dengan flagela dapat berenang dan berkembang menjadi individu baru.

Pada reproduksi seksual, ada penggabungan gamet dari dua individu yang berbeda. Beberapa alga melakukan isogami (fusi gamet yang sama ukurannya), anisogami (fusi gamet yang berbeda ukurannya), atau oogami (fusi antara gamet besar yang non-motil dan gamet kecil yang motil). Setelah fertilisasi, zigot terbentuk dan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi seksual biasanya dipicu oleh perubahan kondisi lingkungan seperti suhu atau ketersediaan nutrisi.

Klasifikasi Alga

Alga diklasifikasikan berdasarkan pigmen, struktur sel, serta habitatnya. Chlorophyta (Alga Hijau) mengandung klorofil a dan b, serta pigmen karotenoid, yang membuatnya berwarna hijau. sebagian besar hidup di air tawar, meskipun beberapa spesies ditemukan di laut. Contohnya adalah Chlorella dan Spirogyra. Phaeophyta (Alga Coklat) mengandung pigmen fukosantin yang memberi warna coklat. Alga coklat sebagian besar hidup di perairan laut dingin. Contoh spesiesnya adalah Laminaria dan Fucus. Rhodophyta (Alga Merah) mengandung pigmen fikobilin yang memberi warna merah. Alga merah banyak ditemukan



di perairan laut dalam karena dapat menangkap cahaya yang minim. Contohnya adalah Gracilaria dan Gelidium.

Diatom (Bacillariophyta) merupakan alga bersel satu dengan dinding sel yang kaya akan silika. Berperan penting sebagai fitoplankton di lautan dan sumber utama oksigen dunia. Diatom memiliki bentuk yang unik, seperti kapal, dan contoh umumnya adalah Navicula. Dinoflagellata adalah alga uniseluler dengan dua flagela. Beberapa spesies dapat menyebabkan fenomena "red tide" di laut, di mana populasi alga meningkat secara drastis dan menghasilkan racun. Contohnya adalah Noctiluca.

Metabolisme Alga

Alga adalah organisme autotrof yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. mengandung klorofil serta berbagai pigmen lainnya yang memungkinkan menangkap energi cahaya matahari dan mengonversinya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan, menjadikan alga kontributor utama dalam siklus oksigen di planet ini.

Pada umumnya, alga memanfaatkan karbon dioksida dan air sebagai bahan baku untuk fotosintesis. Namun, beberapa alga bersifat mixotrof, artinya dapat memperoleh nutrisi dari bahan organik ketika kondisi tidak memungkinkan untuk fotosintesis, seperti pada alga Euglena yang dapat memakan partikel organik.

Metabolisme alga juga bervariasi tergantung pada habitatnya. Alga yang hidup di laut dalam atau di tempat yang kekurangan cahaya menggunakan pigmen tambahan seperti fikobilin untuk menyerap spektrum cahaya yang lebih rendah, memungkinkan berfotosintesis di kedalaman yang lebih besar.



4. Unisel dan Multiselular

a. Unisel

Mikroba uniseluler adalah mikroorganisme yang hanya terdiri dari satu sel. Meskipun ukurannya sangat kecil, mikroba ini memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis dan ekosistem global. Mikroba uniseluler mencakup berbagai kelompok organisme, termasuk bakteri, archaea, protozoa, ragi, dan beberapa jenis alga. Sebagai bentuk kehidupan paling sederhana, mikroba uniseluler mampu melakukan semua fungsi kehidupan dasar, seperti metabolisme, reproduksi, dan respons terhadap rangsangan lingkungan dalam satu sel tunggal.

Karakteristik Mikroba Uniseluler yaitu ukuran kecil dalam rentang mikrometer (1-10 mikrometer). Karena ukurannya, hanya dapat diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroba uniseluler seringkali memiliki struktur sederhana, dengan semua fungsi vital berlangsung di dalam satu sel. Meskipun sederhana, dapat menjalankan semua proses kehidupan, seperti pertumbuhan, pembelahan, dan respons terhadap lingkungan.

Mikroba uniseluler berkembang biak dengan cepat, sering kali melalui reproduksi asexual seperti pembelahan biner (seperti pada bakteri) atau pembentukan spora (seperti pada beberapa fungi). Beberapa mikroba juga dapat bereproduksi secara seksual melalui proses seperti konjugasi, yang memungkinkan pertukaran materi genetik.

Mikroba uniseluler memiliki berbagai jenis metabolisme, memungkinkan hidup di lingkungan



yang sangat beragam. Ada yang bersifat autotrofik, yaitu mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis (seperti cyanobacteria), sementara yang lain heterotrofik dan memperoleh energi dengan memecah bahan organik (seperti protozoa).

Mikroba uniseluler memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Misalnya, beberapa bakteri dapat hidup di lingkungan ekstrem seperti sumber air panas (thermophiles) atau lingkungan dengan kadar garam yang sangat tinggi (halophiles).

Mikroba uniseluler memainkan peran kunci dalam siklus biogeokimia, seperti siklus karbon dan nitrogen. membantu mendaur ulang nutrisi, menguraikan bahan organik, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Mikroba uniseluler banyak digunakan dalam industri, terutama dalam produksi makanan dan minuman fermentasi, biofuel, serta pengolahan limbah. Misalnya, bakteri digunakan dalam pengolahan air limbah untuk memecah bahan organik, sementara ragi digunakan dalam produksi etanol.

Mikroba uniseluler yang ada dalam tubuh manusia, seperti bakteri dalam usus, penting untuk pencernaan dan menjaga kesehatan sistem imun. Namun, beberapa mikroba uniseluler juga dapat bersifat patogenik, menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Mikroba uniseluler telah menjadi subjek penting dalam penelitian bioteknologi. digunakan sebagai model organisme untuk studi genetik, serta dalam pengembangan obat-obatan dan enzim industri.



b. Multiseluler

Mikroba multiseluler adalah mikroorganisme yang terdiri dari lebih dari satu sel dan memiliki tingkat kompleksitas struktural yang lebih tinggi dibandingkan mikroba uniseluler. Meskipun masih dikategorikan sebagai mikroba karena ukurannya yang kecil dan sering kali hanya bisa dilihat melalui mikroskop, mikroba multiseluler sudah menunjukkan beberapa karakteristik yang mendekati organisme makroskopis. Contoh umum mikroba multiseluler termasuk fungi (seperti jamur), alga tertentu, dan beberapa jenis protista.

Mikroba multiseluler terdiri dari beberapa sel yang bekerja sama. Sel-sel ini sering kali membentuk jaringan sederhana yang memungkinkan organisme untuk menjalankan fungsi lebih kompleks. Pada beberapa mikroba multiseluler, sel-sel dapat mengalami diferensiasi, di mana sel-sel tersebut mengambil peran yang lebih khusus. Misalnya, dalam jamur, beberapa sel bertanggung jawab untuk reproduksi, sementara yang lain berfungsi untuk penyerapan nutrisi.

Meskipun terdiri dari banyak sel, mikroba multiseluler umumnya memiliki organisasi seluler yang lebih sederhana dibandingkan dengan organisme multiseluler yang lebih besar, seperti tumbuhan dan hewan. tidak memiliki organ yang kompleks, tetapi sel-sel tetap terstruktur untuk mendukung fungsi kehidupan dasar.

Mikroba multiseluler dapat bereproduksi baik secara asexual maupun seksual. Contohnya, fungi dapat



membentuk spora melalui reproduksi aseksual, tetapi juga dapat menghasilkan struktur reproduksi seksual seperti basidium atau askus dalam siklus hidupnya. Mikroba multiseluler, seperti fungi, tumbuh dalam bentuk filamen atau hifa, yang memungkinkan untuk menutupi area permukaan yang lebih luas dan menyerap nutrisi dari lingkungan dengan lebih efisien. Hifa ini kemudian dapat berkumpul membentuk struktur yang lebih besar seperti miselium.

Mikroba multiseluler sering kali terlibat dalam hubungan simbiotik dengan organisme lain, misalnya fungi yang berasosiasi dengan akar tanaman (mikorrhiza) untuk membantu penyerapan nutrisi, atau lichen yang merupakan asosiasi antara alga atau cyanobacteria dan fungi. Mikroba multiseluler juga memainkan peran penting dalam dekomposisi materi organik dan siklus nutrisi di ekosistem.

Fungi adalah salah satu kelompok mikroba multiseluler yang paling dikenal, mencakup organisme seperti jamur, kapang, dan ragi (beberapa ragi juga uniseluler). Fungi memiliki struktur filamen yang disebut hifa, yang dapat bergabung untuk membentuk jaringan yang lebih besar, yaitu miselium. memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai dekomposer, mengurai bahan organik yang mati dan mengembalikan nutrisi ke lingkungan.

Alga multiseluler seperti beberapa spesies ganggang hijau (Chlorophyta) dan ganggang coklat (Phaeophyceae), adalah mikroba fotosintetik yang hidup di lingkungan perairan. berkontribusi besar terhadap produksi oksigen global dan merupakan bagian penting dari rantai makanan di ekosistem



akuatik. Contoh mikroba multiseluler dalam kelompok ini termasuk ganggang laut seperti *Laminaria* dan *Sargassum*.

Slime molds adalah jenis mikroba multiseluler yang unik karena dapat mengubah fase hidupnya dari uniseluler menjadi multiseluler. Ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan, sel-sel slime mold berkumpul membentuk struktur multiseluler yang disebut plasmodium, yang berfungsi untuk menemukan makanan dan bertahan hidup.

Fungi multiseluler memainkan peran vital sebagai dekomposer, yang mengurai bahan organik seperti daun mati, kayu, dan sisa-sisa makhluk hidup lainnya. Proses ini membantu daur ulang nutrisi di ekosistem, memfasilitasi pertumbuhan tanaman dan organisme lain. Beberapa mikroba multiseluler membentuk hubungan simbiotik yang penting dalam ekosistem. Misalnya, mikorhiza, yang merupakan asosiasi antara jamur dan akar tanaman, membantu tanaman dalam penyerapan air dan nutrisi, terutama fosfor. Lichen, kombinasi antara alga dan fungi, hidup di berbagai habitat ekstrem dan memainkan peran penting dalam pembentukan tanah dari batuan. Khususnya fungi, memiliki banyak aplikasi dalam industri. digunakan dalam produksi antibiotik (seperti *Penicillium* yang menghasilkan penisilin), fermentasi makanan (misalnya, *Aspergillus* dalam pembuatan kecap), dan pengolahan makanan (seperti dalam pembuatan keju). Selain itu, fungi digunakan dalam bioteknologi untuk produksi enzim dan biofuel.



C. SIMPULAN

- Prokariota adalah organisme yang tidak memiliki membran inti dalam selnya. Materi genetik mereka berupa DNA yang tersusun dalam nukleoid (area pusat) tanpa dibatasi membran inti.
- Eukariota adalah organisme yang memiliki inti sel sejati yang dibatasi oleh membran. Sel eukariota lebih kompleks dibandingkan sel prokariota, dengan banyak organel bermembran, seperti mitokondria, kloroplas (pada tumbuhan), dan retikulum endoplasma
- Organisme uniseluler hanya memiliki satu sel yang menjalankan seluruh fungsi kehidupannya. Organisme ini relatif sederhana dan biasanya memiliki mekanisme adaptasi yang tinggi untuk bertahan di lingkungan yang berbeda. Kehidupan uniseluler dianggap sebagai bentuk kehidupan paling awal di bumi.
- Organisme multiseluler terdiri dari banyak sel yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Setiap jenis sel dalam organisme multiseluler sering kali memiliki peran khusus, memungkinkan spesialisasi dan pembentukan jaringan serta organ.
- prokariota dan eukariota mewakili dua jenis dasar organisasi seluler, sedangkan organisme uniseluler dan multiseluler menunjukkan tingkat kompleksitas dan spesialisasi dalam kehidupan, mencerminkan evolusi organisme dari struktur sederhana ke struktur yang lebih komple



REFERENCE

- Smith, J. (2024). Prokaryotes: Characteristics and Types. *Microbial Life Journal*, 12(3), 45-58.
- Johnson, P., & Lee, M. (2023). The Diversity of Prokaryotic Life: Bacteria and Archaea. *Advances in Microbiology*, 10(2), 112-129.
- Williams, R., & Carter, T. (2022). Prokaryotic Organisms: Bacteria and Archaea in Extreme Environments. *Environmental Microbiology Reviews*, 18(4), 78-94.
- Thompson, K. (2023). Cyanobacteria and the Role of Prokaryotes in Oxygen Production. *Journal of Photosynthetic Organisms*, 15(1), 34-48.
- Madigan, M. T., Bender, K. S., Buckley, D. H., Sattley, W. M., & Stahl, D. A. (2019). *Brock biology of microorganisms* (15th ed.). Pearson.
- Prescott, L. M., Harley, J. P., & Klein, D. A. (2020). *Microbiology* (12th ed.). McGraw-Hill.
- Alcamo, I. E., & Warner, L. M. (2019). *Fundamentals of microbiology* (11th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Willey, J. M., Sherwood, L., & Woolverton, C. J. (2022). *Prescott's microbiology* (11th ed.). McGraw-Hill.
- Talaro, K. P., & Chess, B. (2018). *Foundations in microbiology* (10th ed.). McGraw-Hill Education.




PROFIL PENULIS

Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.

Penulis lahir pada tanggal 8 Januari 1978 dikabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Merupakan dosen tetap pada Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Penulis menyelesaikan pendidikan S1 tahun 2000, S2 tahun 2003 dan S3 tahun 2017 pada universitas Hasanuddin. bidang biokimia sejak Tahun 2006. Keilmuan penulis di bidang yang berkaitan dengan Biokimia, enzim, Mikrobiologi, Bioenergi dan Bioteknologi.

Telah menghasilkan produk berupa jurnal dan buku. Di antara buku yang berhasil diselesaikan diantaranya biokimia, metabolisme biomolekul, Mikrobiologi industri, biokimia farmasi , Bioteknologi, enzim dan produksi enzim serangga.



Email Penulis: bmaswati@gmail.com





BAB 3

PERTUMBUHAN MIKROBA, KURVA PERTUMBUHAN, DAN PERHITUNGAN JUMLAH SEL

(Etha Marista, S.Si., M.Si.)

Universitas OSO; Jl. Untung Suropati No. 99 Pontianak,
Email: ethamarista@oso.ac.id

A. PENDAHULUAN

Mendapatkan kultur murni mikroba yang berkembang dengan baik sangatlah vital untuk proses identifikasi mikroba yang tepat. Pertumbuhan mikroba tidak hanya terkait dengan peningkatan ukuran dan perluasan seluruh komponen sel secara teratur, melainkan juga mencakup pembelahan sel menjadi dua sel anak yang berbeda, atau dengan kata lain, peningkatan jumlah individu sel.

Pembelahan sel pada mikroba biasanya berlangsung dengan cara biner atau dalam situasi tertentu dapat terjadi pertunasan (*budding*) seperti pada ragi dan beberapa bakteri. Sel anakan berkembang dari bagian permukaan induknya dan membentuk sel baru selama proses ini.

Sangat penting untuk memahami pertumbuhan mikroba karena dapat digunakan untuk mengontrol pengaruh mikroba. Dalam bidang mikrobiologi, pertumbuhan merujuk pada situasi di mana terjadinya penambahan biomassa dan pembelahan pada tingkat sel (reproduksi). Dalam buku ini, kita akan fokus pada pertumbuhan bakteri karena informasinya lengkap dan aplikasinya banyak mengenai itu.

B. PEMBAHASAN


1. Pertumbuhan Mikroba

Studi pertumbuhan bakteri secara kultur tertutup "batch culture" dengan tiada penambahan nutrisi dalam



kultur setelah dilakukan inokulasi pada suhu optimal dan keadaan yang terkontrol. Keadaan ini akan membuat sel bereproduksi secara cepat. Kondisi tersebut dipetakan menggunakan kurva pertumbuhan populasi, yang dibangun dengan merencanakan peningkatan jumlah sel dengan waktu inkubasi. Tahapan siklus pertumbuhan memiliki pengukuran nomor sel serta laju pertumbuhan mikroba dalam keadaan standar seperti yang ditentukan oleh waktu generasi yakni lamanya populasi mikroba untuk berlipat ganda.

Gambar 3.1
Waktu Generasi



Sumber: Cappucino & Sherman, 2014

Waktu generasi yakni lamanya populasi bakteri untuk tumbuh berlipat ganda secara singkat sehingga selalu terjadi ketika bakteri tumbuh dengan kecepatan tinggi, yang berarti semakin cepat bakteri tumbuh, semakin singkat waktu generasi yang dihasilkan. Waktu generasi ditandai dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri pada fase pertumbuhan tertentu (Sari *et al.*, 2021).



Pertumbuhan mikroba dimulai dari awal pertumbuhan hingga berakhirnya aktivitas yang dilihat sebagai kurva pertumbuhan.

2. Kurva Pertumbuhan

Kurva pertumbuhan dapat dimanfaatkan untuk melihat tahapan dari daur pertumbuhan. Tahapan tersebut terbagi menjadi fase adaptasi (bakteri beradaptasi terhadap media "batch culture"), fase eksponensial (mikroba aktif tumbuh), fase stasioner (mikroba aktif tumbuh), dan fase kematian (konsumsi nutrisi pada media berkurang sehingga menyebabkan pH media menurun dan kematian pada mikroba).

a. Fase Lag atau Adaptasi

Selama fase ini sel mulai mencocokkan diri dengan keadaan lingkungan yang baru. Aktivitas penambahan nutrisi dipercepat, guna menghasilkan biosintesis makromolekul sel terutama enzim dalam persiapan menuju fase selanjutnya. Walaupun sel-sel bertambah besar, tetapi tidak terdapat pembelahan sel dan oleh karena itu tidak ada peningkatan jumlah.

b. Fase Eksponensial

Fase yang dicirikan oleh pertumbuhan eksponensial di bawah kondisi gizi serta fisik yang optimal. Sel yang kuat secara biologis akan bereproduksi pada tingkat yang seragam dan cepat melalui "binary fission". Jadi, ada laju kenaikan eksponensial dalam populasi secara berlipat ganda yang teratur sampai dengan maksimum jumlah sel yang dicapai. Fase ini memiliki panjang yang bervariasi, tergantung pada mikroba dan komposisi medianya sehingga dapat bertahan enam hingga dua belas jam.




c. Fase Stasioner

Pada fase ini, jumlah sel yang membelah dan mati sama. Oleh karena itu, tidak ada peningkatan jumlah sel, sehingga populasi tetap pada tingkat tertingginya untuk suatu waktu. Penurunan beberapa metabolit penting dan akumulasi produk akhir asam atau basa beracun di media adalah komponen utama fase ini.

Gambar 3.2

Kurva Pertumbuhan Bakteri pada "Batch Culture"



Sumber: Madigan *et al.*, 2015

d. Fase Kematian

Fase ini terbentuk karena kekurangan nutrisi secara terus menerus serta penumpukan limbah metabolisme sehingga mikroba mati pada tingkat yang laju dan seragam. Degradasi populasi sangat sejajar dengan kenaikannya selama fase lag. Keseluruhan populasi diharuskan mati dalam keadaan selang waktu yang sama dengan itu dari fase lag. Namun, keadaan tersebut tidak berlaku karena sejumlah kecil mikroba yang mampu bertahan dan tidak terbatas.

3. Perhitungan Jumlah Sel


Perhitungan jumlah mikrobia dalam suatu kultur diperlukan untuk mengetahui perkembangan populasi mikrobia. Banyak metode yang dirancang untuk perhitungan mikrobia: perhitungan langsung (*direct counts*) dan perhitungan tidak langsung (*indirect counts*). Metode mana yang akan dipilih tergantung pada sejumlah faktor, termasuk jumlah informasi yang diperlukan, jenis dan jumlah mikrobia yang akan dihitung, serta kondisi fisik sampel.

a. Perhitungan Langsung Mikroskopik (*Direct Counts*)

Hitungan langsung mikroskopis Metode ini menggunakan cara langsung tidak harus melakukan inokulasi dan inkubasi mikroba terlebih dahulu. Metode ini memerlukan penggunaan slide khusus yang disebut ruang penghitungan Petroff-Hausser, yang mana hitungan dan jumlah total sel ditentukan secara matematis. Perlakuan awal di ruang hitung Petroff-Hausser digunakan untuk meratakan volume sampel yang mengandung bakteri pada suatu gelas objek dengan luas tertentu. Selanjutnya sampel ditempatkan di atas meja objek dan diamati, lalu dihitung rata-rata jumlah sel bakteri pada setiap bidang pandang mikroskop. Oleh karena itu, hasil perhitungan diperoleh dengan menghitung jumlah bakteri per ml sampel atau cairan yang diteliti.



Gambar 3.3
Ruang Hitung Petroff-Hausser



Sumber: Pommerville, 2010

b. Perhitungan Tidak Langsung (*indirect counts*)

Perhitungan mikroba secara tidak langsung dengan melakukan inokulasi dan inkubasi terlebih dahulu. Beberapa metode yang digunakan seperti analisis kimia (*Chemical Methods*), pengenceran (*Serial Dilution*), perhitungan jumlah koloni (*Plate Count*), analisis spektrofotometer (*Spectrophotometric Analysis*), dan MPN (*Most Probable Number*).

Analisis kimia (*Chemical Methods*) merupakan salah satu metode yang meskipun tidak dianggap sebagai metode hitung langsung, tetapi metode kimia sel ini mungkin digunakan untuk secara tidak langsung mengukur peningkatan konsentrasi protein dan produksi DNA. Pengukuran parameter metabolisme tertentu juga dapat digunakan untuk mengukur bakteri populasi kuantitatif. Jumlah oksigen yang dikonsumsi (penyerapan oksigen)



berbanding lurus hingga meningkatnya jumlah sel aerob yang tumbuh dengan kuat, dan peningkatan pertumbuhan organisme anaerob terkait dengan laju produksi karbon dioksida.


Teknik pengenceran (*Serial Dilution*) digunakan dengan melibatkan pengenceran seri dari suspensi bakteri dalam akuades yang berfungsi sebagai pengencer volume yang diketahui. Setelah diencerkan, suspensi ditempatkan pada nutrisi yang sesuai. Metode pengenceran hanya digunakan untuk mengetahui jumlah mikroorganisme hidup. Dalam pengenceran serial, volume tertentu dari suspensi bahan atau kultur mikroba diencerkan secara bertahap, diinokulasi ke dalam media, diinkubasi, dan diamati pertumbuhan mikroba. Pengenceran seri umumnya dilakukan dalam kelipatan 10. Sebagai contoh, pengenceran 1:10 dibuat dengan menambahkan 1 ml ke dalam 9 ml akuades. Misalnya untuk menghitung jumlah sel, pengenceran 1: 100 akan menunjukkan pertumbuhan, tetapi pengenceran 1:1.000 tidak akan menunjukkan pertumbuhan, jadi secara teoritis Jumlah mikroorganisme dihitung antara 100 dan 1.000 per ml.

Prinsip yang biasanya digunakan pada perhitungan jumlah koloni (*Plate Count*) yakni menumbuhkan hasil seri pengenceran dalam cawan petri yang telah diberi media agar. Beberapa teknik yang dilakukan untuk menumbuhkan media diantaranya "*pour plate*" dan "*spread plate*". Setelah koloni tumbuh, kemudian dihitung dengan mengalikan jumlah koloni dengan kebalikan pengenceran. Apabila, ada pengenceran 1:1.000 didapatkan 85 koloni, sehingga terkandung 850.000 bakteri tiap ml atau gram.



Gambar 3.4

Teknik "*Spread-plate*" dan "*Pour-plate*"



Sumber: Khan, 2021

Terdapat beberapa standar dalam perhitungan koloni menggunakan metode *Plate Count* diantaranya jumlah koloni untuk perhitungan mengandung 30-300 koloni. Tidak ada cakupan koloni di lebih dari separuh area cawan petri, perbandingan jumlah bakteri dari hasil pengenceran serial antara pengenceran sebelumnya apabila kurang dari atau sama dengan 2 maka hasilnya dirata-rata tetapi jika lebih besar dari 2 maka digunakan jumlah mikroorganisme hasil pengenceran sebelumnya, apabila dengan dilakukan pengulangan sudah memungkinkan maka hasilnya dapat dirata-rata. Pemakaian *Colony Counter* pada metode ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya koloni dalam cawan petri.

Analisis spektrofotometer digunakan untuk mengamati jumlah sel mikroba dalam sampel berdasarkan kekeruhan (turbiditas). Peningkatan

kekeruhan dalam suatu kultur adalah indeks lain pertumbuhan. Dengan metode turbidimetri, jumlah cahaya yang ditransmisikan berkurang seiring dengan sel populasi meningkat, dan penurunan radiasi energi diubah menjadi energi listrik dan ditunjukkan pada galvanometer. Metode ini cepat tapi terbatas karena sensitivitas terbatas pada suspensi mikroba 10 juta sel atau lebih besar.

Tidak semua mikroba dapat tumbuh dalam satu medium dalam kondisi tertentu, metode pengenceran biasanya kurang tepat. Untuk mengetahui kemungkinan adanya mikroba dalam suspensi bahan, pengenceran harus diulang beberapa kali. Metode ini dikenal sebagai MPN (*Most Probable Number*) yakni jumlah mikroba yang paling mungkin, tetapi untuk menghitung jumlah mikroba yang paling mungkin, digunakan daftar MPN seperti daftar HOSFIKS atau MC. CRADY.

C. SIMPULAN

Mengukur dan membuat kurva pertumbuhan berdasarkan hasil pembelahan biner pada kultur tertutup "batch culture". Ini dilakukan untuk mengetahui kapan mikroba ini tumbuh dengan baik dan kapan terjadi penghambatan pertumbuhan. Jika terjadi penghambatan pertumbuhan, penyebabnya akan diketahui.

Perhitungan jumlah mikrobial dalam suatu kultur dapat dengan perhitungan langsung mikroskopik (*Direct Counts*) yakni menggunakan ruang hitung Petroff-Hausser. Perhitungan mikroba secara tidak langsung dengan analisis kimia (*Chemical Methods*), pengenceran (*Serial Dilution*), perhitungan jumlah koloni (*Plate Count*), analisis spektrofotometer (*Spectrophotometric Analysis*), dan MPN (*Most Probable Number*).



REFERENCE

- Cappuccino, J. G., & Sherman, N. (2014). *Microbiology: A Laboratory Manual* (Tenth ed.). USA: Pearson Education, Inc.
- Khan, A. K. (2021). *A Book on Experiments of Microbiology*. India : Women University Press.
- Madigan, M.T., Martinko, J.M., Bender, K.S., Buckley, D.H., & Stahl, D.A. (2015). *Brock Biology of Microorganisms* (Fourth ed.). USA: Pearson Education.
- Pommerville, J. C., (2010). *Alcamo's Fundamentals of Microbiology: Body System Edition*. USA: Jones & Bartlett Learning.
- Sari, M . S., Ningsih, A. W., Anwari, F., & Nurrosyidah, I. H. (2021). Modifikasi Media Pertumbuhan *Lactobacillus casei* Strain Shirota dengan Susu Skim yang Diperkaya Air Kelapa Hijau dan Tepung Jagung. *Berkala Ilmiah Kimia Farmasi*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 14-19.



PROFIL PENULIS

Etha Marista, S.Si., M.Si.


Penulis dilahirkan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 06 Maret 1988. Penulis menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah 2 Pontianak (1994-2000), SLTP Negeri 3 Pontianak (2000-2003), dan SMA Negeri 5 Bandung (2003-2006). Penulis melanjutkan studinya di Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas



Tanjungpura di tanah kelahiran hingga mendapatkan gelar Sarjana Sains dari Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2013.

Penulis berkesempatan melanjutkan studi *Master of Science* pada program studi Biologi Tumbuhan, IPB University dan lulus pada tahun 2018. Penulis kemudian mengabdikan diri pada Universitas OSO mulai tahun 2020 dan diterima menjadi dosen tetap Program Studi Biologi, Fakultas IPA dan Kelautan, Universitas OSO Pontianak. Penulis aktif menjadi anggota PERMI (Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia) dan AMI (Asosiasi Mikoriza Indonesia), serta menulis beberapa tulisan DI HARIAN diantaranya Pembangunan Kalimantan Barat dan Eksistensi Budaya Dayak (2015), Petunjuk Praktikum Mikrobiologi Laut dan Petunjuk Praktikum Bioteknologi Laut. Selain mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dan karyanya dipublikasikan pada jurnal terakreditasi. Penulis juga pernah mendapatkan hak paten sederhana dengan judul invensi Komposisi Media Selektif untuk Skrining Bakteri Pendegradasi Plastik pada tahun 2023.

Email Penulis: ethamarista@oso.ac.id



BAB 4

**PENGENDALIAN PERTUMBUHAN MIKROBA,
STERILISASI, DESINFEKSI, DAN KODISI ASEPTIS
(Mahyarudin, S.Si. ,M.Si.)**

Departemen Mikrobiologi, Program Studi Kedokteran,
Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr.
H. Hadari Nawawi, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124
Email: mahyarudin@medical.untan.ac.id

Pertumbuhan mikroba yang tidak terkendali memiliki sifat yang tangguh dan dapat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Untuk dapat hidup berdampingan dengan bakteri, organisme yang lebih kompleks harus memiliki kemampuan untuk mengontrol pertumbuhan bakteri. Pada manusia, hal ini dilakukan melalui mekanisme biologis seperti sistem kekebalan tubuh dan pembatasan ketersediaan nutrisi. Selain itu, kita juga memanfaatkan metode fisik untuk mengurangi risiko paparan terhadap mikroorganisme. Pemahaman yang tepat mengenai istilah-istilah seperti sterilisasi, desinfeksi, pasteurisasi, dan aseptik sangat penting agar dapat digunakan secara akurat (Carroll et al., 2016).

A. STERILISASI DAN DESINFEKSI

Sterilisasi adalah proses membunuh atau menghilangkan semua mikroorganisme, termasuk spora bakteri yang sangat resistan. Proses ini umumnya dilakukan menggunakan autoklaf, yang bekerja dengan cara memaparkan uap pada suhu 121°C di bawah tekanan 15 lb/in² selama 15 menit. Instrumen bedah yang rentan terhadap kerusakan akibat panas lembap biasanya disterilkan



menggunakan gas etilen oksida, sedangkan sebagian besar larutan intravena disterilkan melalui penyaringan(Murray et al., 2016).

Disinfeksi, di sisi lain, adalah proses membunuh sebagian besar, tetapi tidak semua, mikroorganisme. Agar disinfeksi dianggap memadai, patogen harus dapat dieliminasi, meskipun beberapa mikroorganisme dan spora bakteri mungkin masih bertahan. Disinfektan memiliki karakteristik yang bervariasi, mulai dari senyawa yang bersifat korosif seperti fenol yang hanya aman digunakan pada benda mati, hingga bahan dengan toksisitas lebih rendah seperti etanol dan Iodine yang dapat diaplikasikan pada permukaan. Penggunaan klinis berbagai jenis disinfektan umum dan metode sterilisasi dijelaskan lebih lanjut dalam Tabel 1(Murray et al., 2016).

Bahan Kimia

Bahan kimia memiliki kemampuan yang sangat beragam dalam membunuh mikroorganisme. Variasi ini diukur secara kuantitatif menggunakan koefisien fenol, yaitu rasio antara konsentrasi fenol dan konsentrasi bahan kimia yang diperlukan untuk mencapai tingkat pembunuhan yang setara dalam kondisi standar pengujian.

Secara umum, bahan kimia membunuh mikroorganisme melalui salah satu dari tiga mekanisme utama: (1) mengganggu membran sel yang mengandung lipid, (2) memodifikasi protein, atau (3) memodifikasi DNA. Setiap bahan kimia diklasifikasikan berdasarkan salah satu dari tiga mekanisme ini, meskipun beberapa bahan kimia dapat bekerja melalui lebih dari satu mekanisme(Murray et al., 2016).



1. Disrupsi Membran Sel (Murray et al., 2016)

Alkohol

Etanol sering digunakan sebagai pembersih kulit sebelum prosedur imunisasi atau prosedur injeksi intravena. Mekanisme kerjanya terutama melibatkan perusakan struktur lipid dalam membran sel, sekaligus mendenaturasi protein. Efektivitas etanol mencapai puncaknya ketika dicampur dengan air, sehingga larutan etanol 70% lebih efektif dibandingkan 100%. Oleh karena itu, etanol 70% sering digunakan sebagai antiseptik untuk membersihkan kulit sebelum prosedur injeksi intravena. Namun, untuk prosedur yang membutuhkan sterilitas lebih tinggi, seperti pengambilan kultur darah atau pemasangan kateter intravena, senyawa berbasis Iodine lebih disarankan karena memiliki efektivitas yang lebih baik.

Deterjen

Deterjen merupakan agen "aktif permukaan" yang memiliki bagian hidrofobik berupa rantai panjang yang larut dalam lipid serta gugus hidrofilik polar yang dapat berupa kation, anion, atau nonionik. Surfaktan ini bekerja dengan berinteraksi pada lipid membran sel melalui rantai hidrofobiknya, sementara gugus polar berinteraksi dengan air di sekitarnya, sehingga menyebabkan gangguan pada membran. Salah satu contoh deterjen kationik adalah benzalkonium klorida, yang sering digunakan sebagai antiseptik kulit. Benzalkonium klorida juga merupakan bahan aktif dalam Lysol, disinfektan yang umum digunakan untuk membersihkan lantai dan permukaan lainnya.



Fenol

Fenol adalah disinfektan pertama yang digunakan di ruang operasi oleh Joseph Lister pada tahun 1860-an, namun jarang digunakan saat ini karena sifatnya yang terlalu korosif. Salah satu turunan fenol, klorheksidin, banyak digunakan sebagai disinfektan tangan sebelum operasi ("surgical scrub") dan untuk membersihkan luka. Hexaklorofen, senyawa bifhenol dengan enam atom klorin, digunakan dalam sabun germisida, meskipun penggunaannya kini dibatasi karena potensi neurotoksisitas. Senyawa fenol bekerja dengan merusak membran sel dan mendenaturasi protein.

2. Modifikasi Protein (Murray et al., 2016)

Klorin

Klorin sering digunakan sebagai disinfektan untuk memurnikan air minum dan perawatan kolam renang. Selain itu, klorin merupakan komponen aktif dalam hipoklorit (seperti pemutih Clorox) yang digunakan sebagai disinfektan baik di rumah tangga maupun rumah sakit. Klorin bekerja sebagai oksidator kuat yang membunuh mikroorganisme dengan cara membentuk ikatan silang pada gugus sulfhidril esensial dalam enzim, mengubahnya menjadi disulfida yang tidak aktif.

Iodine

Iodine adalah salah satu antiseptik kulit paling efektif yang digunakan dalam praktik medis, terutama sebelum pengambilan kultur darah dan pemasangan kateter intravena. Hal ini penting untuk mencegah kontaminasi flora kulit, seperti *Staphylococcus epidermidis*. Seperti klorin, Iodine bekerja sebagai oksidator yang menonaktifkan enzim yang mengandung



sulfhidril dan secara spesifik mengikat residu tirosin dalam protein.

Logam Berat

Merkuri dan perak adalah logam berat yang memiliki aktivitas antibakteri tertinggi dan paling sering digunakan dalam pengobatan. Kedua logam ini bekerja dengan mengikat gugus sulfhidril, sehingga menghambat aktivitas enzimatis. Thimerosal (Merthiolate) dan merbromin (Mercurochrome), yang mengandung merkuri, digunakan sebagai antiseptik kulit. Selain itu, tetes perak nitrat bermanfaat untuk mencegah oftalmia neonatorum gonokokal, sedangkan perak sulfadiazin digunakan untuk mencegah infeksi pada luka bakar.

Hidrogen Peroksida

Hidrogen peroksida digunakan sebagai antiseptik untuk membersihkan luka dan mendisinfeksi lensa kontak. Efektivitasnya terbatas karena beberapa mikroorganisme dapat menghasilkan katalase, enzim yang memecah H_2O_2 . Gelembung yang muncul saat peroksida diaplikasikan pada luka merupakan oksigen yang dihasilkan dari pemecahan H_2O_2 oleh katalase jaringan. Hidrogen peroksida bekerja sebagai oksidator yang menyerang gugus sulfhidril, sehingga menghambat aktivitas enzimatis.

Formaldehida & Glutaraldehida

Formaldehida, yang tersedia dalam larutan 37% air (formalin), bekerja dengan mendenaturasi protein dan asam nukleat. Formaldehida mengalkilasi gugus $-NH_2$ dan $-OH$ esensial dalam protein dan asam nukleat melalui gugus hidroksimetilnya. Glutaraldehida, dengan dua gugus aldehida reaktif, sepuluh kali lebih efektif



dibanding formaldehida dan memiliki tingkat toksisitas yang lebih rendah. Di rumah sakit, glutaraldehida digunakan untuk mensterilkan peralatan terapi pernapasan, endoskopi, dan perangkat hemodialisis.

Etilen Oksida

Gas etilen oksida digunakan secara luas di rumah sakit untuk mensterilkan bahan yang sensitif terhadap panas, seperti instrumen bedah dan plastik. Gas ini membunuh mikroorganisme dengan mengalkilasi protein dan asam nukleat, di mana gugus hidroksi etil menyerang atom hidrogen reaktif pada gugus amino dan hidroksil esensial.

Asam & Alkali

Asam dan alkali kuat membunuh mikroorganisme dengan mendenaturasi protein. Sebagian besar bakteri rentan terhadap senyawa ini, meskipun *Mycobacterium tuberculosis* dan mikobakteri lainnya relatif resisten terhadap NaOH 2%, yang digunakan di laboratorium klinis untuk mencairkan dahak sebelum kultur. Asam lemah seperti asam benzoat, propionat, dan sitrat sering digunakan sebagai pengawet makanan karena sifatnya yang bakteriostatik. Efek asam ini sebagian dipengaruhi oleh komponen organiknya (misalnya, benzoat) serta pH rendah.

3. Modifikasi Asam Nukleat (Murray et al., 2016)

Beberapa jenis pewarna tidak hanya digunakan untuk mewarnai mikroorganisme tetapi juga dapat menghambat pertumbuhannya. Salah satu contohnya adalah kristal violet (gentian violet), yang berfungsi sebagai antiseptik kulit. Mekanisme kerjanya melibatkan pengikatan molekul pewarna bermuatan positif pada gugus fosfat bermuatan negatif dalam asam nukleat. Pewarna lain, seperti malachite green, yang memiliki struktur serupa dengan kristal violet,



merupakan komponen dalam media Löwenstein-Jensen. Media ini digunakan untuk menumbuhkan *Mycobacterium tuberculosis* dan mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan dalam dahak selama inkubasi selama 6 minggu.

Agen Fisik

Agen fisik membunuh atau menghilangkan mikroorganisme dengan memberikan energi berupa panas atau radiasi, atau melalui proses penyaringan (Murray et al., 2016).

Panas

Energi panas dapat diterapkan melalui tiga cara utama: panas lembap (rebusan atau autoklaf), panas kering, atau pasteurisasi. Secara umum, panas membunuh mikroorganisme dengan mendenaturasi protein, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan membran dan fragmentasi DNA secara enzimatik. Panas lembap bekerja pada suhu yang lebih rendah dibandingkan panas kering karena air membantu memutuskan ikatan nonkovalen (seperti ikatan hidrogen) yang menyatukan struktur sekunder dan tersier protein.

Sterilisasi dengan Panas Lembap

Metode ini, biasanya dilakukan dengan autoklaf, adalah teknik sterilisasi yang paling sering digunakan. Karena spora bakteri tahan terhadap perebusan (100°C pada tekanan atmosfer), diperlukan suhu yang lebih tinggi, yang hanya dapat dicapai dengan peningkatan tekanan. Autoklaf bekerja dengan memberikan uap bertekanan 15 lb/in² yang mencapai suhu 121°C dan dipertahankan selama 15-20 menit. Proses ini mampu membunuh spora *Clostridium botulinum* yang sangat tahan panas, penyebab botulisme,



dengan margin keamanan tinggi. Efektivitas autoklaf biasanya diuji menggunakan spora mikroorganisme, seperti dari genus *Clostridium*.

Sterilisasi dengan Panas Kering

Panas kering membutuhkan suhu yang lebih tinggi, sekitar 180°C selama 2 jam, dan umumnya digunakan untuk peralatan gelas. Metode ini jarang digunakan dibandingkan dengan autoklaf.

Pasteurisasi

Pasteurisasi, yang umumnya diterapkan pada susu, melibatkan pemanasan susu hingga 62°C selama 30 menit diikuti dengan pendinginan cepat. Alternatif lainnya adalah metode pasteurisasi cepat, yaitu pemanasan pada 72°C selama 15 detik. Metode ini cukup efektif untuk membunuh sel vegetatif patogen yang mungkin terdapat dalam susu, seperti *Mycobacterium bovis*, *Salmonella*, *Streptococcus*, *Listeria*, dan *Brucella*. Namun, pasteurisasi tidak membuat susu sepenuhnya steril.

Radiasi

Dua jenis radiasi yang umum digunakan untuk membunuh mikroorganisme adalah sinar ultraviolet (UV) dan sinar-X. Efek antimikroba sinar UV paling efektif pada panjang gelombang 250–260 nm, yaitu wilayah di mana basa purin dan pirimidin dalam DNA menyerap energi secara maksimal. Kerusakan utama yang disebabkan oleh radiasi UV adalah pembentukan dimer timin, meskipun penambahan gugus hidroksil pada basa DNA juga dapat terjadi. Akibat kerusakan ini, replikasi DNA terhambat, sehingga mikroorganisme tidak dapat berkembang.

Sel memiliki mekanisme perbaikan untuk menangani kerusakan akibat UV. Mekanisme tersebut meliputi



photoreactivation, yang memanfaatkan cahaya tampak untuk membelah dimer timin, dan perbaikan eksisi yang tidak bergantung pada cahaya tampak (*dark repair*). Namun, karena radiasi UV dapat merusak kornea dan kulit, penggunaannya dalam pengobatan dibatasi. Meski begitu, UV sering digunakan di rumah sakit untuk membunuh mikroorganisme yang terbawa udara, terutama di ruang operasi saat tidak digunakan. Bakteri dalam bentuk spora memiliki ketahanan yang tinggi terhadap UV dan memerlukan dosis hingga 10 kali lipat lebih besar dibandingkan bakteri vegetatif.

Sinar-X memiliki energi dan daya tembus yang lebih tinggi daripada UV dan bekerja terutama dengan menghasilkan radikal bebas, seperti radikal hidroksil yang terbentuk melalui hidrolisis air. Radikal bebas yang sangat reaktif ini dapat merusak ikatan kovalen dalam DNA, sehingga membunuh mikroorganisme. Senyawa yang mengandung gugus sulfhidril, seperti sistein, dapat melindungi DNA dari serangan radikal bebas. Selain itu, sinar-X juga dapat memutus langsung ikatan kovalen dalam DNA, meskipun mekanisme ini dianggap kurang dominan dibandingkan efek radikal bebas.

Sinar-X efektif membunuh sel vegetatif, tetapi spora bakteri lebih tahan, kemungkinan karena kandungan airnya yang lebih rendah. Dalam pengobatan, sinar-X digunakan untuk mensterilkan barang-barang yang sensitif terhadap panas, seperti benang jahit, sarung tangan bedah, dan alat-alat plastik seperti jarum suntik.

Penyaringan

Filtrasi mikropori secara efektif menjaga kesterilan dan mencegah kontaminasi. Filtrasi melalui membran dengan ukuran pori 0,2 mikron atau lebih kecil mampu menghilangkan kontaminan biologis, termasuk bakteri,



jamur, dan ragi. Biasanya, membran yang digunakan untuk sterilisasi filtrasi cairan terbuat dari ester selulosa atau polimer lain dengan diameter pori antara 0,2 dan 0,45 μm . Ketika media melewati filter, bakteri dan partikel lain dengan dimensi lebih besar dari ukuran pori akan tersaring dan terkumpul di permukaan membran.

Ukuran pori kecil yang digunakan dalam filtrasi cairan menyebabkan membran mudah tersumbat kecuali media terlebih dahulu difiltrasi untuk menghilangkan partikel besar. Untuk mencapai laju aliran filtrasi yang tinggi, diperlukan luas permukaan membran yang besar. Membran tersebut harus disterilisasi menggunakan uap atau radiasi sebelum digunakan; alternatifnya, filter sekali pakai dan kartrid filter digunakan (Doran, 2013).

Filtrasi dengan ukuran pori 0,2 hingga 0,45 μm mungkin tidak seefektif atau seandal sterilisasi panas karena virus dan mikoplasma dapat melewati membran. Namun, ketersediaan membran filter steril grade dengan ukuran pori 0,1 μm untuk penghilangan mikoplasma telah mendorong adopsi luas sterilisasi filtrasi dalam banyak proses kultur sel mamalia, terutama ketika media kompleks yang mengandung protein secara rutin digunakan (Doran, 2013).

B. ANTISEPTIK

Agen antiseptik digunakan untuk menekan jumlah mikroorganisme pada permukaan kulit. Pemilihan senyawa-senyawa ini didasarkan pada aspek keamanan dan efektivitasnya. Karakteristik aktivitas antimikroba dari masing-masing senyawa dirangkum dalam Tabel 2. Alkohol menunjukkan aktivitas yang sangat efektif terhadap hampir semua jenis mikroorganisme kecuali spora, serta relatif aman digunakan. Namun, penggunaannya dapat menyebabkan kulit menjadi kering akibat penghilangan lipid dari permukaan kulit. Alkohol tidak memiliki efek residu dan dapat dinonaktifkan oleh



keberadaan bahan organik, sehingga permukaan kulit perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum alkohol diaplikasikan. Iodofor, yang juga merupakan agen antiseptik kulit yang efektif, memiliki spektrum aktivitas yang mirip dengan alkohol. Namun, iodofor sedikit lebih toksik terhadap kulit, memiliki aktivitas residu yang terbatas, dan juga rentan dinonaktifkan oleh bahan organik. Iodofor dan iodine sering dikombinasikan dengan alkohol untuk mendisinfeksi permukaan kulit. Klorheksidin memiliki aktivitas antimikroba yang luas, meskipun membunuh mikroorganisme lebih lambat dibandingkan alkohol. Efektivitasnya tetap ada meski dipengaruhi oleh bahan organik dan pH tinggi yang dapat mengurangnya. Paraklorometaksilinol (PCMX) menunjukkan aktivitas terbatas, terutama terhadap bakteri gram positif. Karena sifatnya yang tidak beracun dan adanya efek residu, senyawa ini sering digunakan dalam produk pencuci tangan. Triklosan memiliki aktivitas terhadap bakteri, tetapi kurang efektif terhadap jenis organisme lain. Senyawa ini banyak digunakan sebagai agen antiseptik dalam sabun penghilang bau dan beberapa produk pasta gigi. (Levinson, 2016)

Tabel 4.1 Karakteristik antimikroba dari disinfektan dan agen antiseptic (Levinson, 2016)

Agens	Bakteri	Mikobateria	Spora Bakteri	Fungi	Virus
Disinfektan					
Alkohol	+	+	-	+	+/-
Hidrogen Peroksida	+	+	+/-	+	+
Fenol	+	+	-	+	+/-
Klorin	+	+	+/-	+	+
Iodofor	+	+/-	-	+	+



Agens	Bakteri	Mikobateria	Spora Bakteri	Fungi	Virus
Glutaraldehid	+	+	+	+	+
Senyawa Amonium Kuartener	+/-	-	-	+/-	+/-
Agens Antiseptik					
Alkohol	+	+	-	+	+
Iodofor	+	+	-	+	+
Kloreheksidin	+	+	-	+	+
Paraklorometaksilinol	+/-	+/-	-	+	+/-
Triklosan	+	+/-	-	+/-	+

C. SIMPULAN

Sterilisasi dan disinfeksi merupakan langkah fundamental dalam menjaga kebersihan dan keamanan, khususnya di sektor kesehatan. Sterilisasi bertujuan untuk menghilangkan seluruh mikroorganisme, termasuk spora yang resistan, melalui metode seperti autoklaf atau penggunaan gas etilen oksida. Sebaliknya, disinfeksi hanya mampu membunuh sebagian besar mikroorganisme dan tidak efektif terhadap spora tertentu. Pemilihan antara sterilisasi dan disinfeksi ditentukan oleh jenis material serta tingkat kebersihan yang dibutuhkan. Efektivitas agen antimikroba, baik fisik maupun kimia, bergantung pada mekanisme kerjanya, seperti disrupsi membran sel, modifikasi protein, atau perubahan asam nukleat. Sebagai contoh, alkohol efektif untuk antisepsis kulit, sedangkan klorin



digunakan dalam disinfeksi air. Karena perbedaan toksisitas dan efektivitas agen kimia seperti fenol, iodofor, dan hidrogen peroksida, penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Agen fisik, seperti panas, radiasi, dan penyaringan, juga memiliki peran yang signifikan. Autoklaf, yang menggunakan panas lembap, sangat efektif untuk membunuh spora, sementara radiasi ultraviolet digunakan untuk mengendalikan mikroorganisme di udara. Penyaringan, di sisi lain, diterapkan pada larutan yang sensitif terhadap panas, menjaga keamanan bahan biologis tanpa merusak komponen aktifnya. Antiseptik seperti alkohol, iodofor, dan klorheksidin dirancang untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada kulit, dengan mempertimbangkan keamanan dan efektivitasnya. Kombinasi antiseptik, seperti iodofor dengan alkohol, sering diterapkan untuk meningkatkan efikasi. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, karakteristik, dan aplikasi metode sterilisasi, disinfeksi, serta antiseptik sangatlah penting untuk memastikan implementasi yang optimal, khususnya dalam lingkungan medis dan laboratorium.



REFERENCE

- Carroll, K. C. ., Mietzner, T. A. ., Hobden, J. A. ., Miller, Steve., Morse, S. A. ., Mitchell, T. G. ., Sakanari, J. A. ., McKerrow, J. H. ., & Detrick, Barbara. (2016). *Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology*. McGraw-Hill Education.
- Doran, P. M. (2013). Chapter 14 - Reactor Engineering. In P. M. Doran (Ed.), *Bioprocess Engineering Principles (Second Edition)* (Second Edition, pp. 761–852). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-220851-5.00014-9>
- Levinson, Warren. (2016). *Review of Medical Microbiology and Immunology*. McGraw-Hill Education.
- Murray, P. R., Rosenthal, K. S., & Pfaller, M. A. (2016). *Medical Microbiology Eight Edition* (8th ed.). Elsevier.



PROFIL PENULIS

Mahyarudin, S.Si., M.Si.


Penulis lahir di Pontianak pada 12 Agustus 1989, menyelesaikan pendidikan S-1 di Program Studi Biologi, Universitas Tanjungpura, dan melanjutkan studi S-2 di Program Studi Mikrobiologi, Institut Pertanian Bogor, melalui Beasiswa Unggulan Kemendikbud Dikti tahun 2012. Sejak 2015, ia aktif sebagai dosen di Departemen Mikrobiologi, Program Studi Kedokteran, Universitas Tanjungpura.



Selain itu, sejak 2020, ia berperan di Laboratorium Pemeriksa COVID-19 dan Surveilans Genom Virus SARS-CoV-2 RS Universitas Tanjungpura, yang berperan sebagai Laboratorium Rujukan Provinsi Kalimantan Barat dan bagian dari Jejaring Nasional. Pada tahun 2021 tim penelitian penulis masuk sebagai finalis Anugrah Karya Cipta Dokter Indonesia (AKCDI) Tahun 2021. Pada tahun 2022 sebagai pemenang hibah penelitian "Hair and Skin Research Grant 2022" yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia, Universitas Indonesia dan Loreal Research Inovation. Penulis juga merupakan Founder dan Pengembang Aplikasi Hai AIMI Kalimantan Barat yang merupakan aplikasi konsultasi menyusui dan pemberian makan pada bayi dan anak berbasis android dan web. Fokus keahliannya meliputi mikrobiologi kesehatan dan mikrobiologi molekuler. Mahyarudin telah menerbitkan beberapa buku, termasuk *Mikrobiologi Dasar* (2022), *Pedoman Antibiotik Empiris untuk Rumah Sakit* (2023), dan *Bioteknologi Senyawa Antimikroba* (2024).

Email Penulis: mahyarudin@medical.untan.ac.id





BAB 5

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN MEDIA PERTUMBUHAN

(apt. Imanda Dyah Rahmadani, S.Farm, M.Farm.)

Universitas Muhammadiyah Lamongan; Lamongan

Email: imandadyahr@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Dalam bidang mikrobiologi farmasi, dengan mengetahui faktor-faktor tersebut dapat dilakukan pemilihan dan pendekatan media pertumbuhan yang optimum untuk pertumbuhan mikroorganisme guna penelitian secara in-vitro.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan

Pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik dan faktor kimia. Faktor fisik diantaranya suhu, pH, tekanan osmotik, serta cahaya atau radiasi. Faktor kimia termasuk karbon, oksigen, *trace elements*, dan faktor-faktor pertumbuhan organik seperti nutrisi yang terkandung dalam media pertumbuhan.

a. Suhu

Suhu menentukan aktivitas enzim yang terlibat dalam proses kimia. Suhu yang sangat tinggi dapat mengakibatkan denaturasi protein yang tidak dapat kembali (*irreversible*), sedangkan pada suhu yang sangat rendah aktivitas enzim akan terhenti.

Umumnya, mikroorganisme patogen pada tubuh manusia akan tumbuh optimal pada suhu 37°C, dan batas suhu maksimal sekitar 42 – 44°C.

Berdasarkan suhu lingkungan tempat tumbuh, mikroorganisme dibagi menjadi tiga kategori yaitu psikrofil (suhu optimal dibawah 20°C), mesofil (suhu optimal 20 – 45° C), dan termofil (suhu optimal di atas 45° C).

b. pH

Ketidaksesuaian pH lingkungan dapat mengakibatkan denaturasi protein dalam mikroorganisme. Umumnya, mikroorganisme patogen pada tubuh manusia dapat berkembang secara optimal pada pH mendekati netral sekitar 6,7 – 7,0. Akan tetapi, terdapat beberapa jenis mikroorganisme patogen memiliki kemampuan bertahan pada pH tertentu, diantaranya adalah *Helicobacter pylori* dapat bertahan pada kondisi asam selama beberapa waktu dengan mekanisme khusus (produksi urease), dan *Vibrio cholera* dapat hidup pada lingkungan pH 8-9. Umumnya fungi lebih mentoleransi kondisi pH rendah dibandingkan dengan bakteri.

Berdasarkan perbedaan kondisi pH lingkungan, mikroorganisme dibagi menjadi empat kategori yaitu:

- Asidofil, tumbuh pada kisaran pH 1,0 – 5,5
- Neutrofil, tumbuh pada kisaran pH 5,5 – 8,0
- Alkalofil, tumbuh pada kisaran pH 8,5 – 11,5
- Alkalofil ekstrem, tumbuh pada kisaran pH ≥ 10

c. Air dan Tekanan Osmosis

Seluruh organisme memerlukan air untuk proses pertumbuhan, namun jumlah yang diperlukan untuk bertahan hidup dapat berbeda bergantung pada




ketahanan masing-masing organisme.

Pertumbuhan mikroorganisme juga dipengaruhi oleh tekanan osmotik di lingkungan sekitarnya. Tekanan osmotik suatu larutan akan meningkat seiring dengan banyaknya zat terlarut. Pada kondisi hipertonik, air dalam sel mikroorganisme akan keluar sehingga membran plasma akan mengkerut, dan lepas dari dinding sel (plasmolisis). Meskipun demikian terdapat beberapa jenis mikroorganisme yang dapat mentoleransi kandungan garam yang tinggi di sekitarnya, sebagai contoh *Staphylococcus aureus* memiliki toleransi terhadap garam yang lebih baik dibanding *Eschericia coli*. Sifat tersebut menjadi salah satu penyebab staphylococci dapat bertahan pada permukaan kulit manusia yang terpapar kandungan garam dari keringat.



Gambar 5.1

Perbandingan toleransi mikroba *Staphylococcus aureus* (sebelah kiri petri dish) dan *E. coli* (sebelah kanan petri dish) pada media dengan konsentrasi NaCl yang berbeda (A 0,5%; B 2,5%; C 5,0%; D 7,5%)



sumber: *Essential microbiology for pharmacy and pharmaceutical science* (hal 18)

d. Oksigen

Berdasarkan kebutuhan mikroorganisme terhadap oksigen, terdapat dua kategori utama yaitu aerob dan anaerob. Mikroorganisme aerob memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya, sedangkan mikroorganisme anaerob tidak memerlukan oksigen dan menghasilkan energi melalui proses fermentasi. Secara rinci, kategori tersebut diklasifikasikan lagi menjadi empat:


- Aerob mutlak: memerlukan oksigen, bila tidak terdapat oksigen dapat menimbulkan kematian mikroorganisme. Contoh: *Bacillus subtilis*.



- Anaerob mutlak: tidak memerlukan oksigen, dengan adanya oksigen dapat mengakibatkan kematian mikroorganisme. Contoh: *Clostridium sporogenes*.
- Anaerob fakultatif: dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Contoh: *E. coli*.
- Mikroaerofil: memerlukan oksigen dalam jumlah terbatas, dan bila jumlah oksigen berlebih akan mengakibatkan kematian mikroorganisme. Contoh: *Helicobacter*, *Campylobacter*, *Streptococcus*.

Gambar 5.2

Perbandingan pertumbuhan beberapa mikroba pada kondisi aerob dan anaerob



sumber: *Essential microbiology for pharmacy and pharmaceutical science* (hal. 19)

e. Cahaya dan Radiasi

DNA dalam mikroorganisme akan rusak setelah terkena paparan sinar ultraviolet dalam jangka waktu tertentu, dan akan tumbuh optimal apabila dijauhkan dari cahaya matahari. Hal tersebut juga berlaku pada paparan radiasi sinar gamma, sinar X, dan radiasi pengionisasi lainnya.

f. Nutrisi

Berdasarkan jumlah kebutuhannya, nutrisi dibagi menjadi dua kategori yaitu makroelemen dan mikroelemen.

Makroelemen merupakan nutrisi yang diperlukan dalam jumlah besar, meliputi karbon (C), oksigen (O), hydrogen (H), Nitrogen (N), sulfur (S), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), kalsium (Ca), dan besi (Fe). CHONSP diperlukan untuk pembentukan karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan P, K, Ca, dan Mg berperan sebagai kation dalam sel.

Mikroelemen (*trace element*) merupakan elemen nutrisi yang diperlukan mikroorganisme dalam jumlah sedikit (takaran mg hingga ppm), diantaranya adalah mangan (Mn), zinc (Zn), kobalt (Co), molibdenum (Mo), nikel (Ni), dan tembaga (Cu). Mikroelemen tersebut berperan dalam komponen enzim atau kofaktor yang membantu katalisis dan membentuk protein.

Selain makroelemen dan mikroelemen, terdapat istilah *accessory nutrient* yang merupakan faktor pertumbuhan (*growth factor*) mikroorganisme, diantaranya vitamin, asam amino, purin, dan pirimidin.

Berdasarkan sumber karbon untuk kebutuhan mikroorganisme, dikenal organisme autotroph yang memperoleh karbon dari CO₂, dan organisme heterotrof yang menggunakan bahan lebih kompleks (senyawa organik) sebagai sumber karbon dan penghasil energi.



2. Media Pertumbuhan

Mikroorganisme memerlukan media yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Secara in-vitro, media pertumbuhan juga dikenal sebagai media kultur. Setiap mikroorganisme memerlukan kondisi dan nutrisi yang mungkin berbeda, sehingga dikembangkan berbagai macam media agar mikroorganisme tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Karakteristik media kultur yang ideal diantaranya dapat menumbuhkan mikroorganisme untuk inokulasi kecil, dapat menumbuhkan dengan cepat, mudah disiapkan, murah, dan media harus steril sehingga mikroorganisme yang dikembangkan dapat membentuk kultur murni.

Secara umum, bahan-bahan media kultur terdiri dari bahan dasar berupa air dan pematat bila bentuk media solid/ semisolid (dapat berupa agar, gelatin, silica gel); nutrisi yang mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, dan vitamin; serta bahan tambahan lain seperti zat pewarna, antibiotik, dan bahan lainnya untuk menghambat pertumbuhan mikroba non-target/ kontaminan.

Berdasarkan konsistensinya, media kultur dibagi menjadi tiga, yaitu padat, semi padat, dan cair.

- Media padat/ solid
menggunakan bahan pematat (*solidifying agent*) seperti agar, yang merupakan kompleks polisakarida dari alga merah, dengan kandungan agar sekitar 15%. Terdapat tiga jenis media padat, yaitu media tegak dan media miring yang menggunakan tabung reaksi, serta media lempeng yang menggunakan petridish sebagai wadahnya.
- Media semi padat/ semi solid
mengandung agar dengan konsentrasi 0,3 – 0,4 %



sehingga konsistensinya agak kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Konsistensi tersebut bertujuan agar pertumbuhan mikroba dapat menyebar ke seluruh media namun tidak mengalami pencampuran sempurna apabila media tergoyang. Contoh media semisolid ini adalah media NfB (*Nitrogen free Bromthymol Blue*), yang akan terlihat cincin hijau di bawah permukaan media, jika media ini berbentuk cair maka cincin akan mudah hancur.

- Media cair
merupakan ekstrak kompleks material biologis yang tidak ditambahi bahan pematat, disebut juga *broth* atau *rich media*. Beberapa kegunaan dari media cair diantaranya untuk mengetahui laju pertumbuhan dan sedimentasi sel mikroba, menyiapkan kultur untuk antigen atau vaksin, serta untuk memperoleh pertumbuhan bakteri darah atau air bila pengujian dilakukan dalam volume sampel yang besar.

Berdasarkan susunan atau komposisi kimia, media kultur dibagi menjadi tiga, yaitu media alami/ non sintesis, media semi sintesis, dan media sintesis.

- Media alami/ non sintesis
disusun dari bahan-bahan alami yang komposisinya tidak diketahui secara pasti dan umumnya langsung diekstrak dari bahan dasar. Contoh: brain heart infusion agar (BHIB).
- Media semi sintesis
disusun dari kombinasi bahan-bahan alami dan sintesis. Contoh: potato dextrose agar (PDA).
- Media sintesis
Disusun dari bahan-bahan sintesis, yang senyawa kimia dan takarannya diketahui secara pasti. Contoh: Mac Conkey agar.



Berdasarkan fungsinya, media kultur dibagi menjadi kategori berikut:

a) Media basal (media dasar)

Merupakan media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks, contoh: *nutrient broth*, kaldu pepton.

b) Media non selektif

Digunakan untuk berbagai jenis mikroorganisme dengan tingkat kecepatan pertumbuhan yang relatif tinggi. Contoh: *nutrient agar*, *brain heart infusion broth* (BHIB).

c) Media selektif

Merupakan media yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme tertentu (seleksi) dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Pada media ini ditambahkan bahan penghambat pertumbuhan, dapat berupa antibiotik, zat pewarna, garam, atau inhibitor spesifik. Contoh media selektif pada media bakteri Gram negatif ditambahkan *bile salt* dan *dye* (fuchsin, crystal violet, brilliant green) yang akan menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Contoh lainnya adalah Thayer mayer agar untuk identifikasi *N. gonorrhoea* dan Lowenstein Jensen agar untuk identifikasi *M. tuberculosis*.

d) Media diferensial

Digunakan untuk membedakan kelompok mikroorganisme yang terkait erat dan dapat digunakan untuk identifikasi jenis mikroorganisme. Adanya zat pewarna atau bahan kimia tertentu dalam media dapat menghasilkan perubahan karakteristik. Contohnya adalah media Agar Darah, mampu membedakan antara bakteri hemolitik (*Streptococcus*, *Staphylococcus*) dan bakteri non-hemolitik dengan mengetahui sifat lisis eritrosit.



Contoh media lainnya adalah MacConkey, mampu membedakan antara bakteri yang memfermentasi laktosa dan yang bukan (menunjukkan adanya daerah merah muda - merah di sekitar koloni).

e) Media diperkaya (*enrichment*)

Merupakan media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme tertentu, digunakan untuk menumbuhkan salah satu mikroorganisme dari kultur campuran. Media ini memiliki elemen nutrisi tertentu yang mendorong pertumbuhan suatu mikroba. Contoh: *chocolate* media, yeast-extract-potassium nitrat agar, alkali pepton water (APW).

C. SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba adalah suhu, pH, air, tekanan osmosis, oksigen, cahaya/ radiasi, dan nutrisi. faktor-faktor tersebut saling berkaitan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mikroba secara optimal. Terdapat berbagai macam media kultur yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi yang sesuai bagi mikroba. Umumnya terdiri dari bahan dasar air, pematat (pada media solid atau semisolid), nutrisi (sumber karbon, sumber nitrogen, vitamin), dan zat tambahan lain dengan tujuan tertentu. Dalam bidang mikrobiologi farmasi, media kultur dipergunakan untuk isolasi, pengujian sifat fisiologis, perhitungan jumlah mikroorganisme, dan tujuan lainnya.



REFERENCE


- Atmanto, Y.K.A.A, Asri, L.A., Kadir, N.A. (2022). Media Pertumbuhan Kuman. *Jurnal Medika Hutama*, Vol 04 No 01 Oktober 2022, 3069-3075. Retrieved from <https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/565>
- Hanlon, G., Hodges, N. (2013). *Essential microbiology for pharmacy and pharmaceutical science*. United Kingdom: Wiley-Blackwell.
- Hogg, S. (2013). *Essential Microbiology 2nd edition*. United Kingdom: Wiley-Blackwell.
- Kayser, F.H., Bienz, K.A., Eckert, J., Zinkernagel, R.M. (2005). *Medical Microbiology*. New York: Thieme.
- Pratiwi, S.T. (2008). *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Erlangga.



PROFIL PENULIS

apt. Imanda Dyah Rahmadani, S. Farm., M. Farm.

Penulis lahir di Gresik, Mei 1987. Saat ini aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan, dan juga bekerja sebagai apoteker farmasi klinis di RS Muhammadiyah Lamongan. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi dan Profesi Apoteker di Universitas Airlangga Surabaya (lulus Tahun 2010), serta Magister Farmasi di Universitas Surabaya (lulus Tahun 2023).



Penulis telah menghasilkan sejumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan dan diikuti dalam pekan ilmiah farmasi. Jurnal yang dipublikasikan diantaranya berjudul "*Potential drug-drug interactions and their associated factors in hospitalized COVID-19 patients with comorbidities*" pada jurnal internasional PeerJ terindeks Scopus Q1. Pada Tahun 2023, penulis mendapatkan salah satu penghargaan poster terbaik pada PIT IAI 2023, dengan judul "Analisis interaksi antar obat pada pasien tuberkulosis resisten obat". Buku yang pernah disusun penulis diantaranya "Panduan Tata Laksana Interaksi Antar Obat pada Pasien COVID-19 Rawat Inap" pada Tahun 2023.

Email Penulis: imandadyahr@gmail.com





BAB 6

JALUR METABOLISME MIKROBA, MODIFIKASI JALUR METABOLISME DAN AKTIVITAS ANTIMIKROBA

(apt. Reni Yustiati Saksono, S.Si., M.Sc.)

KPRA-RSUD Ulin; Jl. A. Yani No. 3 Banjarmasin,

Telp. 085348011150

Email: reniyustiati@gmail.com

A. KONSEP METABOLISME

Metabolisme merujuk pada semua reaksi biokimia yang terjadi pada sel atau organisme. Sel-sel mikroba, seperti halnya sel organisme hidup pada umumnya melakukan aktifitas kehidupan. Untuk kelangsungan hidupnya semua sel membutuhkan suatu sumber energi (Hossain, et al., 2016).

Walaupun sangat beraneka ragam jenis dan substansi yang berperan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme, namun terdapat pola dasar metabolisme yang sederhana yaitu: perubahan dari satu bentuk energi yang kompleks menjadi bentuk energi yang sederhana sehingga dapat masuk ke dalam rangkaian metabolik.

Sistem ini secara mendasar mirip dengan yang terdapat pada sel-sel mamalia dan tumbuhan, akan tetapi pengutamaan pada mekanisme-mekanisme dasar yang merupakan contoh diferensiasi unik pada mikroba, khususnya bakteri (Wardani, T. Siska. 2021).

Konsep dasar metabolisme dapat terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. **Metabolisme energi:**

Mikroba memperoleh energi melalui respirasi (aerob

atau anaerob) atau fermentasi. Pada respirasi aerob, digunakan oksigen untuk mengubah glukosa menjadi energi dan pada fermentasi terjadi tanpa oksigen.

2. **Metabolisme karbon:**

Mikroba dapat memanfaatkan berbagai sumber karbon, seperti gula, asam organik, atau bahan organik lainnya untuk pertumbuhan dan reproduksi.

3. **Sintesis dan degradasi:**

Mikroba bertanggung jawab untuk proses sintesis biomolekul penting seperti protein, asam nukleat, dan lemak. Mereka juga berperan dalam proses dekomposisi bahan organik, mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain, termasuk dalam siklus karbon dan nitrogen.

4. **Fermentasi:**

Dalam kondisi tanpa oksigen, mikroba seperti bakteri asam laktat dan ragi melakukan fermentasi untuk memperoleh energi, yang menghasilkan produk seperti alkohol, asam laktat, atau gas seperti karbon dioksida.

5. **Nitrogen-fiksasi:**

Beberapa mikroba, terutama bakteri yang hidup di dalam akar tanaman, dapat mengikat nitrogen dari atmosfer dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman (ammonia). Proses ini penting untuk siklus nitrogen (Cani, P. D. 2019).

Konsep dari proses metabolisme terpenting adalah pembebasan dan penggunaan energi. Pembebasan energi terjadi pada proses disimilasi dan sebaliknya pada proses pembentukan senyawa kompleks dikenal dengan istilah asimilasi, berkaitan dengan konsumsi energi. Suatu kehidupan hanya mungkin terjadi jika terdapat interkoneksi antara fenomena disimilasi dan asimilasi (Nielsen, J., & Keasling, J. D. 2016).



B. JALUR METABOLISME MIKROBA

Menurut Suryani, Y dalam bukunya Fisiologi Mikroorganisme (2022) dalam jalur metabolisme mikroba, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Cara mikroorganisme atau mikroba dalam memperoleh atau menghasilkan energi

Semua reaksi kimia di dalam sel makhluk hidup menghasilkan dan menggunakan energi untuk sintesis komponen-komponen sel dan untuk kegiatan-kegiatan seluler. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu: katabolisme dan anabolisme.

Katabolisme disebut juga katabolik sel, yang merupakan reaksi disimilasi atau peruraian dimana terjadi pembebasan energi. Pada proses katabolisme protein, bakteri heterotrof dapat menghancurkan protein di luar tubuhnya dan menggunakan produk hasil proses tersebut sebagai sumber tenaga karbon dan nitrogen. Dalam proses tersebut bakteri menghidrolisis protein menjadi peptida, kemudian menghasilkan peptidase untuk menguraikan peptida menjadi asam amino individu.

Sedangkan anabolisme disebut juga anabolik sel. Anabolisme merupakan reaksi asimilasi dimana terjadi penggunaan energi untuk sintesis dan fungsi-fungsi sel lainnya. Reaksi asimilasi pada penggunaan energi adalah proses non biosintetik yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Proses produksi panas

Mikroorganisme menghasilkan panas dari aktivitas metabolik normalnya, sehingga suhu biakan naik. Yang berperan pada pembentukan panas adalah enzim ATP-ase, meskipun peranan enzim ini belum jelas akan tetapi kemungkinannya adalah membuang kelebihan ATP sehingga



- mengatur metabolisme energi sel.
- b. Proses pergerakan (motilitas)
Sekitar 10% dari energi yang digunakan mikroorganisme dipakai untuk pergerakan flagella atau silia. Hasil penelitian sitokimiawi bahwasannya ATP-ase bergabung dengan Magnesium (Mg) pada situs-situs membran tempat munculnya flagella.
- c. Proses pengangkutan
Pengangkutan nutrisi dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme, diantaranya:
- 1) Difusi sederhana, dimana zat terlarut melintasi membran semipermeabel sebagai akibat pergerakan molekuler acak, tidak berinteraksi dengan zat apapun pada membran.
 - 2) Difusi dipermudah, zat terlarut bergabung dengan molekul penghantar protein khusus pada membran, sehingga kompleks yang terbentuk bergerak diantara permukaan membran sebelah luar dan dalam yang akhirnya melepaskan satu molekul solut yang baru. Pada proses difusi ini, yang terjadi adalah: pemindahan zat terlarut dari konsentrasi yang lebih tinggi ke rendah, tidak memerlukan energi metabolik dan tidak menyebabkan gradien elektro-kimiawi atau osmotik.
 - 3) Translokasi kelompok, suatu pengangkutan senyawa-senyawa (glukosa, fruktosa, mannanosa) ke dalam sel-sel bakteri.
 - 4) Transportasi aktif, hampir semua zat terlarut seperti gula, asam amino, peptida, nukleotida dan ion-ion diambil sel melalui transpor aktif. Langkah-langkah dalam transpor aktif:
 - ✓ pengikatan zat terlarut ke penerima pada

- ✓ protein penghantar yang terikat membran
- ✓ translokasi kompleks zat terlarut-penghantar melintasi membran
- ✓ penggandengan translokasi pada suatu reaksi penghasil energi yang bertujuan untuk mengurangi afinitas penghantar protein terhadap zat terlarut pada permukaan dalam membran sehingga protein penghantar akan melepaskan zat terlarut ke dalam sel.

2. Perubahan energi bebas

Jumlah energi yang dilepaskan atau digunakan selama berlangsungnya suatu reaksi disebut perubahan energi bebas yang dilambangkan dengan ΔG (kalori). ΔG merupakan panas dan energi kimiawi, bila ΔG bernilai negatif, maka reaksi tersebut membebaskan energi dan sebaliknya bila bernilai positif maka reaksi tersebut menggunakan energi.

3. Oksidasi dan produksi energi (Libretexts, ed. 2023)

Sel mendapat energi dari nutrisi melalui serangkaian reaksi kimiawi, yaitu reaksi oksidasi. Pada proses oksidasi energi dilepaskan dan terbentuk ikatan yang kaya energi seperti ATP sebagai penyimpan energi. Oksidasi adalah hilangnya elektron dari suatu molekul, kemudian elektron tersebut ditangkap oleh molekul lain melalui proses reduksi.

Sistem Oksidasi-Reduksi (O-R) adalah suatu sistem dimana terjadi reaksi oksidasi dan reduksi dari sepasang substansi. Sebuah sistem O-R mempunyai kecenderungan untuk menerima elektron dari sistem O-R lainnya yang disebut potensi elektromotif (E_0 dari suatu sistem O-R) dalam satuan volt. Makin tinggi nilai E_0 suatu sistem O-R maka makin besar kecenderungan sistem tersebut untuk menerima elektron atau makin

besar kemampuan untuk mengoksidasi. Bila sebuah sistem O-R mengoksidasi sistem O-R lainnya, maka terjadi pembebasan energi yang jumlahnya berbanding lurus dengan selisih antara nilai-nilai E_0 nya. Bila selisih voltasinya besar, maka nilai ΔG cukup besar untuk mendorong sintesis ATP. Bila tidak cukup besar elektron akan hilang dalam bentuk panas.

Pemindahan elektron sangat erat kaitannya dengan produksi energi. Produksi energi pada mikroorganisme dikelompokkan dalam tiga cara, yaitu:

- a) Secara anaerobik, melalui:
 - ✓ proses glikolisis, adalah respirasi seluler merujuk pada pemecahan glukose dan substrat lain untuk membuat molekul pembawa energi yang disebut ATP (adenosin trifosfat). Proses glikolisis ada dua, yang tidak memerlukan oksigen (anaerobik) dan sebaliknya yang tidak memerlukan oksigen (aerobik).
 - ✓ proses fermentasi, ada dua tipe fermentasi, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi laktat. Fermentasi menghasilkan jumlah produksi ATP yang lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerobik.
- b) Secara aerobik, melalui:
 - ✓ rantai angkutan elektron
 - ✓ siklus asam trikarboksilat
 - ✓ hasil energi dalam respirasi aerobik
 - ✓ katabolisme lipid
 - ✓ katabolisme protein
 - ✓ respirasi anaerob
- c) Produksi energi melalui:
 - ✓ fotosintesis
 - ✓ fotofosforilasi siklik dan non siklik
 - ✓ mekanisme sintesis ATP.

4. Sistem Enzim, Konformer dan Regulator (Libretexts, ed. 2023)

Enzim adalah senyawa organik berupa protein atau gabungan antara protein dengan senyawa gugus kimia lain. Enzim berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat berlangsungnya proses kimiawi, tanpa adanya perubahan pada enzim itu sendiri. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu, pH, dan konsentrasi substrat.

Semua lintasan metabolik utama, mempunyai kapasitas pengendalian. Pengendalian metabolik seluler merupakan pengendalian kegiatan enzim. Pada mikroorganisme atau mikroba pengendalian seluler menjadi sangat penting, karena untuk organisme tingkat tinggi terdapat pengendalian supraseluler yaitu oleh syaraf dan hormonal.

Sedangkan menggunakan konformer cenderung memiliki biaya metabolisme yang rendah dan sistem ekologi yang sempit sampai konformer tersebut bisa bertahan terhadap lingkungan eksternal. Untuk bahan regulator akan mampu bertahan terhadap perbedaan lingkungan eksternal disebabkan mereka mampu mengontrol lingkungan internal. Pengaturan lingkungan internal juga disebut homeostatis. Prosesnya memerlukan banyak energi dan hal ini penting sebab menjamin ketersediaan enzim dan temperatur yang optimal untuk bekerja. Fenomena utama dari suatu sistem kehidupan tidak dapat terpisahkan dari aktivitas sejumlah besar dari berbagai enzim, konformer dan regulator.

C. MODIFIKASI JALUR METABOLISME

Makhluk hidup telah berevolusi lebih dari jutaan tahun dan telah menyempurnakan proses metabolisme



dengan membuat jalur yang efisien untuk memproduksi metabolit yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Kemajuan di bidang biologi sintetik telah memungkinkan eksploitasi jalur metabolisme untuk memproduksi senyawa yang dibutuhkan dengan mengubah faktor mikrobiologi sel melalui rekayasa metabolisme (Libretexts, ed. 2023).

Metabolisme merujuk pada semua reaksi kimia yang terjadi dalam sel yang hidup. Organisme uniseluler dan multiseluler harus mengontrol metabolisme mereka untuk mempertahankan kehidupan. Jalur metabolisme dapat dijelaskan sebagai rangkaian reaksi kimia yang dimulai dari suatu substrat dan menghasilkan suatu produk di akhir. Terdapat ribuan jalur metabolik dan sebagian besar melibatkan banyak tahapan hingga ratusan. Semua jalur metabolik bersama-sama membentuk jaringan kompleks yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan.

Beberapa hal penting yang berkaitan dengan proses metabolisme, diantaranya: energi, substrat dan enzim; katabolisme karbohidrat; respirasi seluler; fermentasi; katabolisme lemak dan protein; fotosintesis dan kebutuhan cahaya; siklus biogeokimia (Yang, P., & Yu, T. 2020).

Banyak kondisi lingkungan, seperti temperatur melampaui kemampuan organisme untuk bertahan dan dapat menghentikan aktivitas normal metabolisme. Organisme mempunyai kemampuan untuk menghindari atau bertahan dari kondisi yang merugikan. Cara yang umum mikroorganisme dapat bertahan selama kondisi yang merugikan adalah dengan mengurangi aktivitas metabolisme melalui masa tidak aktif. Pada beberapa organisme, masa ini adalah saat dimana biaya untuk bertahan adalah normal akan tetapi aktivitas metabolisme dapat sangat tinggi sehingga dapat kita manfaatkan.

Jalur metabolisme yang umum pada organisme



terhubung dan terisolasi dari satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya. Dengan mengisi kesenjangan pada jalur metabolisme dengan enzim yang heterogen, dapat dibuat atau dimodifikasi jalur metabolisme yang baru dengan menggunakan rute biosintesa melalui metabolit yang dibutuhkan (Hossain, et al. 2016).

Dari Libretexts, 2023 disebutkan jalur metabolisme dapat dimodifikasi melalui beberapa cara, diantaranya:

1. Mengontrol melalui anabolik dan katabolik

Salah satu faktor yang dapat mengontrol jalur metabolisme adalah enzim. Enzim dapat mengubah substrat pada salah satu tahap dalam jalur metabolisme untuk mendapatkan suatu produk di tahap akhir.

Terdapat dua tipe jalur metabolik, diantaranya anabolik dan katabolik. Anabolik adalah jalur yang memerlukan energi dan digunakan untuk membangun molekul besar dari molekul yang kecil (biosintesis). Katabolik adalah tipe jalur yang melepaskan energi yang digunakan untuk memecah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil (degradasi).

Modifikasi jalur metabolisme mikroba merupakan pendekatan yang sangat penting dalam bioteknologi, terutama di bidang farmasi. Dengan memodifikasi jalur metabolisme mikroba, kita dapat meningkatkan produksi senyawa bioaktif, seperti antibiotik, vaksin, hormon, atau senyawa terapeutik lainnya (Lee, S Y., et al. 2009).

2. Mengontrol menggunakan enzim

Semua jalur metabolisme dapat diatur dan dikontrol untuk menghentikan pembuatan produk akhir yang tidak kita perlukan. Sel dapat mengontrol suatu jalur metabolisme dengan ketersediaan atau ketidaktersediaan suatu partikel enzim. Sel dapat juga



mengatur kecepatan reaksi dengan adanya enzim. Suatu enzim mampu mengikat substrat sebab mereka mempunyai sisi aktif yang mempunyai afinitas yang tinggi dan spesifik terhadap substrat.

3. Mengontrol menggunakan konsentrasi substrat

Beberapa perubahan situasi dapat mempengaruhi enzim diantaranya konsentrasi dan pH substrat. Bila konsentrasi substrat meningkat, reaksi enzim akan meningkat hingga semua sisi aktif enzim diduduki oleh substrat (enzim dalam keadaan jenuh).

4. Mengontrol menggunakan inhibitor

Gen dalam beberapa enzim yang terdapat pada suatu sel ditekan atau dihambat sehingga enzim akan selalu tersedia untuk mempengaruhi aktivitas yang dapat mengontrol kecepatan reaksinya. Beberapa bahan kimia juga dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Inhibitor dapat digunakan untuk menghentikan suatu enzim dari ikatan dengan substrat dan sebagai hasilnya inhibitor dapat secara langsung mengontrol perkembangan jalur metabolisme. Terdapat tiga tipe inhibitor, yaitu: inhibitor kompetitif, non kompetitif dan umpan balik.

Penggunaan mikroorganisme juga dapat menimbulkan problem yang serius. Terdapat beberapa pertimbangan dan dampak serius ketika kita berencana untuk memanipulasi material genetik mikroorganisme, diantaranya:

- a. Risiko penyebaran yang tidak terkontrol ke lingkungan sekitar
- b. Mikroorganisme mempunyai kemampuan yang tinggi untuk beradaptasi dengan ekologi yang berbeda dan dapat mengganggu lingkungan
- c. Efek samping dari transfer material genetik pada spesies yang berbeda dapat terjadi



- d. Modifikasi proses metabolisme tak terduga dapat sulit untuk dikendalikan
- e. Terciptanya mikroorganisme patogen baru mungkin terjadi.

D. AKTIVITAS MIKROBA DAN ANTIMIKROBA

Aktivitas mikroba adalah berbagai proses biokimia yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk mendukung kelangsungan hidup mereka. Aktivitas mikroba khususnya di bidang farmasi sangat penting, terutama dalam produksi obat, pengembangan vaksin, dan penelitian mikrobiologi (Lee, S Y., et al. 2009). Sedangkan aktivitas antimikroba adalah kemampuan suatu agen untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Kajian ilmiah dalam bidang ini mencakup berbagai aspek, termasuk sumber senyawa antimikroba dan mekanisme kerjanya.

1. Sumber senyawa antimikroba diantaranya adalah dari alami , sintetik dan semi-sintetik:
 - a. Alami, banyak senyawa antimikroba berasal dari mikroorganisme (misalnya, antibiotik seperti penisilin yang dihasilkan oleh jamur *penisilin*)
 - b. Sintetik dan semi-sintetik, modifikasi kimia dari senyawa alami atau sintesis in vitro menghasilkan agen antimikroba yang lebih stabil dan efektif, seperti fluorokuinolon dan sulfonamida (Davies, J., & Davies, D. 2010).
2. Mekanisme kerja dari antimikroba
 - a. Mengganggu dinding sel, contoh, β -laktam (penisilin, sefalosporin) yang menghambat sintesis peptidoglikan
 - b. Mengganggu membran sel, polimiksin bekerja dengan merusak membran bakteri gram-negatif



- c. Mengganggu sintesis protein, antibiotik seperti tetrasiklin, makrolida dan aminoglikosida menghambat proses translasi
- d. Mengganggu sintesis asam nukleat, adalah kuinolon
- e. Mengganggu metabolisme esensial: sulfonamida dapat menghambat sintesis asam folat, penting untuk pertumbuhan mikroorganisme.

3. Spektrum aktivitas

- a. **Spektrum sempit**, efektif terhadap kelompok mikroorganisme tertentu (contoh: isoniazid untuk *Mycobacterium tuberculosis*)
- b. Spektrum luas, efektif terhadap berbagai bakteri gram-positif dan gram-negatif (contoh: tetrasiklin).

Aktivitas antimikroba terus menjadi topik penelitian yang penting dalam rangka melawan resistensi mikroba yang berkembang dan menjaga kesehatan masyarakat global (Fair, R.J., & Tor, Y. 2014).

Berikut adalah beberapa aktivitas mikroba yang terkait dengan dunia medis dan kefarmasian:

1. Produksi antibiotik:

Mikroba, terutama jenis jamur (seperti *Penicillium* yang menghasilkan penisilin) dan bakteri (*Streptomyces*), merupakan sumber utama produksi antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri dengan menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen (van der Meijden, A., & Betts, J. W. 2020).

2. Fermentasi dalam produksi obat:

Banyak obat farmasi, terutama obat-obatan yang bersifat biologis (seperti insulin, hormon pertumbuhan, dan enzim terapeutik) diproduksi melalui fermentasi mikroba. Misalnya, insulin manusia diproduksi oleh *Escherichia coli* yang telah dimodifikasi secara genetik (Lee, S. Y., Kim, H. U., & Chae, T. U. 2019).



3. Produksi vaksin:

Mikroba digunakan dalam pembuatan vaksin untuk melindungi tubuh terhadap penyakit infeksi. Proses ini melibatkan kultur bakteri atau virus yang dilemahkan atau diinaktifkan untuk merangsang respons imun tanpa menyebabkan penyakit.

4. Probiotik:

Mikroba, terutama bakteri asam laktat (*Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*), digunakan dalam produksi probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya, terutama untuk kesehatan pencernaan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Li, C. X., & Liang, X. Y. 2022).

5. Untuk pengujian kualitas obat:

Aktivitas mikroba juga digunakan dalam pengujian kualitas obat, terutama untuk memastikan tidak ada kontaminasi mikroba yang berbahaya dalam produk farmasi. Uji sterilisasi dan uji mikrobiologi dilakukan untuk menjaga keamanan obat.

6. Pada biosintesis senyawa aktif:

Beberapa mikroba menghasilkan senyawa bioaktif yang memiliki sifat terapeutik, contohnya adalah *Streptomyces* yang menghasilkan senyawa antikanker dan antibiotik, serta beberapa jamur yang menghasilkan alkaloid atau steroid yang digunakan dalam pengobatan.

7. Pengolahan dan pemurnian bahan aktif:

Mikroba juga digunakan dalam proses pengolahan dan pemurnian bahan aktif yang digunakan dalam obat-obatan. Beberapa mikroorganisme dapat mengubah senyawa kimia menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh atau lebih efektif untuk digunakan dalam pengobatan.



8. Penggunaan dalam terapi gen:

Mikroba banyak dimanfaatkan dalam penelitian dan pengembangan terapi gen. Beberapa virus atau bakteri digunakan sebagai vektor untuk menyampaikan gen terapeutik ke dalam sel target (Li, C. X., & Liang, X. Y. 2022).

E. PERKEMBANGAN STUDY REKAYASA DAN KONSEP METABOLISME MIKROBA

Perkembangan terkini dalam studi dan rekayasa metabolisme mikroba mencakup kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, dari bioteknologi hingga farmasi dan pengolahan limbah.

Berikut adalah beberapa perkembangan terkini dalam penelitian metabolisme mikroba, diantaranya:

1. Rekayasa metabolik dan sintesis senyawa bioaktif

Dengan berkembangnya teknologi rekayasa genetika dan genomik, para ilmuwan kini mampu mengubah jalur metabolik mikroba untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang lebih kompleks dan lebih efisien. Ini termasuk produksi obat-obatan, antibiotik, dan enzim terapeutik. Modifikasi mikroba seperti *Escherichia coli* dan *Saccharomyces cerevisiae* untuk produksi senyawa seperti insulin rekombinan, hormon pertumbuhan manusia, dan antibiotik baru (misalnya, menggunakan *Streptomyces* atau *Penicillium*).

2. Pengembangan metabolisme mikroba untuk bioproduksi dan biokonversi

Ada peningkatan fokus pada penggunaan bahan baku terbarukan (misalnya, limbah organik, CO₂, dan biomassa) untuk produksi senyawa metabolit yang bernilai tinggi. Mikroba dimodifikasi untuk mengubah bahan mentah yang murah dan melimpah menjadi produk farmasi atau kimia lainnya.



Contohnya adalah *Escherichia coli* atau *Bacillus subtilis* dimodifikasi untuk memproduksi senyawa seperti biofuel, bioplastik, dan metabolit sekunder lainnya dengan efisiensi tinggi dari limbah industri atau bahkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida.

Metabolisme berbasis karbon yang juga berkembang pesat adalah pengolahan dan konversi CO₂ menjadi senyawa bernilai tinggi melalui jalur metabolik yang dimodifikasi.

Mikroba seperti *Rhodobacter* atau *Synechocystis* digunakan dalam teknologi bioreaktor CO₂ untuk mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik seperti asam organik atau alkohol (Yang, P., & Yu, T. 2020).

3. Mikroba dan pengaruhnya terhadap metabolisme manusia

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikroba yang hidup dalam tubuh manusia (terutama di saluran pencernaan) berperan besar dalam metabolisme tubuh kita, termasuk pengolahan obat dan makanan. Penelitian kini lebih fokus pada bagaimana mikroba dalam tubuh mengubah metabolisme obat-obatan dan senyawa kimia lainnya (termasuk polutan dan toksin).

Contohnya adalah pada penelitian tentang bagaimana mikrobioma dapat mempengaruhi efektivitas obat, seperti pengaruh mikroba usus terhadap metabolisme obat kanker dan penggunaan probiotik untuk memodulasi respons metabolik dalam tubuh.

4. Pengembangan metabolisme mikroba untuk pengobatan dan vaksin

Rekayasa metabolik digunakan untuk meningkatkan produksi antigen vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah berbagai penyakit.



Misalnya, rekayasa jalur metabolik dalam *Escherichia coli*, *Saccharomyces cerevisiae*, atau bahkan virus yang dimodifikasi untuk menghasilkan protein antigen yang diperlukan dalam vaksin. Contohnya adalah vaksin rekombinan seperti vaksin hepatitis B yang diproduksi oleh *Saccharomyces cerevisiae*, serta vaksin COVID-19 berbasis mRNA yang memanfaatkan mikroba untuk produksi antigen.

5. Penggunaan mikroba dalam bioremediasi

Salah satu aplikasi utama mikroba adalah dalam bioremediasi untuk mengatasi pencemaran. Mikroba dimodifikasi untuk menguraikan bahan kimia berbahaya, polutan, atau limbah farmasi yang ada di lingkungan. Penggunaan mikroba untuk menguraikan polutan obat-obatan atau limbah industri farmasi yang mengandung senyawa beracun. Beberapa bakteri seperti *Pseudomonas* dan *Bacillus* dimodifikasi untuk memecah senyawa kompleks yang terkandung dalam limbah kimia.

6. Metabolisme mikroba untuk produksi bahan kimia dan energi

Pada produksi bahan kimia terbarukan, penelitian berfokus pada pengembangan mikroba yang dapat mengubah bahan baku terbarukan menjadi bahan kimia bernilai tinggi semakin berkembang. Ini mencakup penggunaan mikroba untuk produksi bahan kimia seperti bioethanol, biogas, dan plastik biodegradable. Seperti pada contoh *Clostridium acetobutylicum* dan *Saccharomyces cerevisiae* dimodifikasi untuk memproduksi butanol atau alkohol industri lainnya dari biomassa.

7. Metabolisme mikroba dalam terapi dan keamanan obat

Mikroba digunakan untuk menyampaikan bahan genetik ke sel inang dalam terapi gen. Mikroba rekayasa



genetik digunakan sebagai vektor untuk membawa gen terapeutik ke dalam sel, baik untuk pengobatan penyakit genetik atau kanker. Contohnya adalah penggunaan virus yang dimodifikasi secara genetik untuk mengantarkan gen yang diperlukan untuk terapi kanker atau pengobatan penyakit metabolik seperti cystic fibrosis.

8. Penggunaan teknologi CRISPR untuk modifikasi jalur metabolik

Teknologi CRISPR/Cas9 telah mengubah cara kita memodifikasi jalur metabolisme mikroba. Ini memungkinkan perubahan yang lebih presisi dan terarah pada mikroba untuk meningkatkan produksi senyawa farmasi atau bahan kimia lainnya. Penggunaan CRISPR/Cas9 lainnya adalah untuk mengedit *Escherichia coli* dalam produksi senyawa farmasi atau antibiotik baru.

9. Aplikasi dalam produksi probiotik dan mikrobiota usus

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa modifikasi jalur metabolik dalam probiotik dapat mempengaruhi kesehatan manusia, termasuk pengaturan metabolisme energi dan respons imun.

Produksi senyawa bioaktif seperti butirat, yang bermanfaat untuk kesehatan usus, dapat dimaksimalkan melalui rekayasa metabolik. Contohnya rekayasa *Lactobacillus* atau *Bifidobacterium* untuk memproduksi metabolit yang bermanfaat bagi keseimbangan mikrobiota usus dan pengaturan metabolisme tubuh.

Sedangkan seiring dengan kemajuan teknologi, pemahaman genomik, dan bioteknologi beberapa konsep terbaru dalam metabolisme, baik pada mikroba, sel manusia, maupun dalam konteks aplikasi bioteknologi, diantaranya adalah:

a. Metabolisme dinamis dan jaringan metabolik

Penelitian terkini menekankan bahwa metabolisme bukanlah proses linear, melainkan jaringan yang dinamis di mana metabolit saling berinteraksi dalam berbagai jalur biosintesis dan katabolisme. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan nutrisi, tekanan lingkungan, dan kondisi fisiologis.

Hal ini mendasari pentingnya memodelkan metabolisme sebagai jaringan yang saling terkait, bukan hanya serangkaian reaksi kimia.

Teknologi metabolomik, yang melibatkan analisis semua metabolit dalam sel atau organisme, memungkinkan pemetaan jalur metabolik dengan cara yang lebih menyeluruh.

b. Metabolisme mikroba untuk bioteknologi dan industri

Kemajuan dalam rekayasa genetika dan sistem CRISPR/Cas9 memungkinkan penyesuaian jalur metabolik mikroba dengan presisi yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi senyawa bioaktif seperti antibiotik, biofuel, enzim, dan produk farmasi lainnya.

c. Metabolisme energi dan efisiensi energi dalam sel

Metabolisme energi tidak hanya mencakup produksi ATP, tapi juga regulasi yang lebih canggih antara jalur anaerobik dan aerobik, serta konversi energi dalam bentuk proton gradien dan potensial membran. Mitokondria, kloroplas, dan organel lain menjadi fokus penelitian dalam memahami bagaimana sel mengoptimalkan penggunaan energi untuk mempertahankan homeostasis dan mendukung fungsi biologis lainnya.



d. Autofagi dan metabolisme

Proses autofagi (pemusnahan dan pembersihan sel dari komponen yang rusak) telah diidentifikasi sebagai bagian penting dalam pengaturan metabolisme seluler. Ini berhubungan dengan bagaimana sel merespons stres, kekurangan nutrisi, dan proses penuaan.

e. Metabolisme interorgan (metabolisme antara organ)

Penelitian terkini semakin berfokus pada cara metabolisme berlangsung antara organ tubuh yang berbeda, seperti antara otak, hati, otot, dan jaringan adiposa. Ini termasuk studi tentang komunikasi metabolik antarorgan melalui hormon, peptida, dan metabolit sekunder.

f. Mikrobiota usus dan metabolisme:

Penelitian tentang mikrobiota usus menunjukkan bahwa mikroba di dalam tubuh kita dapat memengaruhi metabolisme energi, pengolahan makanan, serta produksi metabolit bioaktif. Ini mengarah pada konsep metabolisme berbasis mikrobioma yang mempengaruhi kesehatan metabolik manusia, termasuk regulasi berat badan, metabolisme glukosa, dan risiko penyakit (Sharma, V., & Garg, A. 2021).

g. Metabolisme dalam penyakit dan gangguan metabolik

Penelitian terbaru tentang metabolisme kanker mengungkapkan bahwa sel kanker memiliki jalur metabolik yang sangat spesifik untuk mendukung pertumbuhannya yang cepat, termasuk glycolysis anaerobik, di mana sel kanker tetap menghasilkan energi dari glukosa meskipun oksigen cukup tersedia. Ini membuka peluang

terapi berbasis penghambatan jalur metabolik yang terkait dengan proliferasi sel kanker. Metabolisme dalam diabetes dan obesitas adalah bagaimana memahami metabolisme lemak dan glukosa yang terganggu dalam kondisi diabetes tipe 2, obesitas, dan sindrom metabolik. Penelitian hormon dan terkait bagaimana mereka mengatur keseimbangan energi menjadi kunci dalam memerangi gangguan metabolik.

- h. Metabolisme sumber terbarukan untuk energi dan produk kimia

Pemanfaatan mikroba dan tanaman untuk memproduksi energi terbarukan, seperti bioetanol, biodiesel, dan biogas, telah menjadi fokus utama dalam riset metabolisme untuk menggantikan bahan bakar fosil. Proses rekayasa metabolik pada mikroba seperti *E. coli* dan *Saccharomyces cerevisiae* telah dimodifikasi untuk meningkatkan efisiensi konversi biomassa menjadi biofuel.

Konsep biorafineria, yang memanfaatkan mikroba untuk mengubah biomassa menjadi bahan kimia bernilai tinggi (seperti asam organik dan alkohol), berfokus pada pengoptimalkan jalur metabolik untuk menghasilkan senyawa dari bahan baku terbarukan.

- i. Metabolisme berkelanjutan dan ekonomi sirkular

Pendekatan baru dalam metabolisme juga mencakup konsep ekonomi sirkular, di mana limbah dan produk sampingan dari satu proses metabolik dapat digunakan kembali sebagai bahan baku untuk proses lainnya. Ini mengarah pada pengembangan mikroba yang mampu mengubah limbah organik menjadi produk yang bermanfaat seperti bioplastik, kompos, atau bahan kimia



lainnya. Mikroba yang dimodifikasi untuk menguraikan polutan dan limbah berbahaya menjadi produk yang ramah lingkungan, seperti dalam pengolahan limbah farmasi, logam berat, dan polutan organik.

j. Metabolisme dan epigenetika

Terdapat peningkatan pemahaman tentang bagaimana metabolisme dapat mempengaruhi ekspresi gen melalui mekanisme epigenetik, seperti metilasi DNA, modifikasi histon, dan pengaruh metabolit pada aktivitas transkripsi. Ini membuka peluang baru dalam pengembangan terapi yang menggabungkan hasil modulasi metabolisme dengan pengaturan genetik.

Studi lebih lanjut tentang bagaimana perubahan dalam jalur metabolik dapat mempengaruhi proses penuaan. Penelitian ini mengarah pada pemahaman tentang bagaimana diet, metabolisme energi, dan stres oksidatif berperan dalam penuaan dan kesehatan usia lanjut (Yang, P., & Yu, T. 2020).

k. Bioteknologi dan metabolisme untuk obat

Kemajuan dalam teknologi rekayasa genetika memungkinkan mikroba untuk digunakan dalam produksi obat-obatan dan vaksin. Metabolisme sel mikroba dimodifikasi untuk menghasilkan senyawa bioaktif, termasuk antibiotik, imunoterapi, dan antibodi monoklonal.

i. Penggunaan metabolisme dalam pengembangan terapi personal

Dengan kemajuan dalam analisis metabolomik, semakin banyak pendekatan

terapeutik yang berbasis pada pemahaman tentang profil metabolik individu.

Hal ini memungkinkan pengembangan pengobatan yang disesuaikan dengan kebutuhan metabolik pasien, termasuk dalam penyakit metabolik dan gangguan genetik (van der Meijden, A., & Betts, J. W. 2020).

Konsep metabolisme terkini menekankan pentingnya interaksi kompleks antarjalur metabolik, penerapan teknologi rekayasa genetika dalam rekayasa metabolik, serta penggunaan metabolomik untuk memahami pola metabolik secara menyeluruh.

Fokus utama saat ini adalah pengembangan bioteknologi terbaru, peningkatan efisiensi energi, dan pemahaman lebih dalam tentang pengaruh mikrobiota dan epigenetik terhadap metabolisme tubuh.

Di bidang medis dan farmasi, penekanan pada metabolisme kanker, diabetes, dan terapi personal membuka peluang baru dalam pengobatan berbasis metabolik yang lebih tepat sasaran (Sharma, V., & Garg, A. 2021).



REFERENCE

- Cani, P. D. (2019). Microbiota and therapeutic applications in metabolic diseases. *Nature Reviews Endocrinology*, 15(10),<https://doi.org/10.1038/s-019-0279--1>
- Davies, J., & Davies, D. (2010). Origins and evolution of antibiotic resistance. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 74.(3), 417–433. <https://doi.org/10.1128/MMBR.00016-10> - Article on the origins and mechanisms of antibiotic resistance evolution.
- Fair, R.J., & Tor, Y. (2014). Antibiotics and bacterial resistance in the 21st century. *Perspectives in Medicinal Chemistry*, 6,25–64. <https://doi.org/10.4137/PMC.S14459> - A review of antibiotic development and resistance challenges in the 21st century.
- Hossain, G. Sakir., et al. (2018). Rewriting the Metabolic Blueprint: Advances in Pathway Diversification in Microorganisms. *Front Microbiol.* 2018 Feb 12;9:155.<https://doi:10.3389/fmicb.2018.00155>. eCollection 2018
- Lee, S Y., et al. (2009). Metabolic engineering of microorganism: general strategies and drug production, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18775509/>
- Lee, S. Y., Kim, H. U., & Chae, T. U. (2019). Metabolic engineering of microorganisms for bio-based production of chemicals. *Biotechnology Journal*,<https://doi.org/10.1002/biot.201>
- Li, C. X., & Liang, X. Y. (2022). Microbiome-based therapeutics: Opportunities and challenges. *Nature Reviews Drug Discovery*,<https://doi.org/10.10/s41573-022-0015-5>



Libretexts, ed. (2023). Mycrobiology. California State University: The Libretexts Libraries. Available at: [https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Microbiology_\(OpenStax\)/08%3A_Microbial_Metabolism](https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Microbiology_(OpenStax)/08%3A_Microbial_Metabolism).

Nielsen, J., & Keasling, J. D. (2016). Engineering cellular metabolism. *Cell*, 164(<https://doi.org/10/j.cell.201>)

Sharma, V., & Garg, A. (2021). Gut microbiota and drug metabolism: Towards personalized medicine. *Trends in Pharmacological Sciences*, 4(<https://doi.o/10.1016/j.tips.2020.11.008>)

Suryani, Y., (2022). Fisiologi Mikroorganisme, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

van der Meijden, A., & Betts, J. W. (2020). Antibiotic production and microbial secondary metabolism. *Biochemical Pharmacology*, 180, 1141(<https://doi.o/10.1/j.bcp.2020.114113>)

Wardani, T. Siska. (2021). Mikrobiologi Farmasi Yogyakarta. Pustaka Baru Press

Yang, P., & Yu, T. (2020). Advances in metabolic pathway engineering for microbial natural product biosynthesis. *Biotechnology Advances*, 4(<https://doi.org/10.10/j.bio.2020>)

PROFIL PENULIS

apt. Reni Yustiati Saksono, S.Si., M.Sc.

penulis Lahir di Nganjuk 23 Februari 1972, Lulusan S1-Apoteker dari Universitas Hasanuddin Makassar dan S2-Magister Farmasi Klinik UGM Yogyakarta. Anak ke-2 dari 8 bersaudara dan telah menikah dengan 2 orang anak. Domisili di Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan.



Pekerjaan saat ini ASN di Instalasi Farmasi RSUD Ulin Banjarmasin. Kegiatan sehari-hari sebagai apoteker klinis di ruang Hem-Onk Anak, koordinator sub bagian Mutu Instalasi Farmasi, sekretaris KPRA, anggota KFT, koordinator KMKB JKN, PIC PRB, dosen dan preceptor klinis.

Buku ini adalah buku kolaborasi ke-2 penulis dan saat ini juga sedang berusaha menyelesaikan buku (Diary Apoteker Klinis di RS; Asuhan Kefarmasian) secara mandiri. Penulis juga telah menyelesaikan sebanyak enam penelitian yang terpublikasi baik mandiri maupun bersama dengan dosen dan peneliti lain sebagai salah satu bentuk kegiatan pengembangan profesi.

Prestasi lain, selama tahun 2021-2022 tercatat sebagai Nakes (Apoteker) teladan tingkat RS, Provinsi Kalsel dan Nasional; juara I Inovasi tingkat RSUD Ulin dan tahun 2023 sebagai Finalis Kalsel Inovasi Award melalui Inovasi APOTEKER PIAN.

Email Penulis: reniyustiati@gmail.com



BAB 7

VIRUS, KAPANG, KHAMIR SERTA KLASIFIKASI, SIFAT, CARA HIDUP, PERTUMBUHAN DAN PENGENDALIANNYA

(apt. Mahdalena Sy. Pakaya, S.Farm., M.Si.)

Universitas Negeri Gorontalo ; Gorontalo

Email: mahdalena@ung.ac.id

A. PENDAHULUAN

Mikroorganisme adalah organisme yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil, dan memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka mencakup berbagai jenis, termasuk virus, kapang, dan khamir. Meskipun ketiganya termasuk dalam kategori mikroorganisme, mereka memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan berfungsi dalam cara yang beragam dalam ekosistem serta kehidupan manusia.

Virus, kapang, dan khamir adalah tiga kelompok mikroorganisme dengan peran dan karakteristik yang sangat berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Virus sering didefinisikan sebagai entitas mikroskopis yang hanya bisa berkembang biak dengan menginfeksi sel hidup. Virus tidak memiliki struktur seluler dan tidak dapat melakukan metabolisme atau replikasi tanpa bantuan dari sel inang. Meskipun demikian, virus memiliki dampak besar dalam kesehatan manusia, seringkali menyebabkan berbagai penyakit, seperti flu, HIV, dan COVID-19, namun juga dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi, seperti pengembangan vaksin dan terapi gen. Kapang, atau jamur, adalah organisme eukariotik yang dapat bersifat uniseluler atau multiseluler. Dalam proses dekomposisi di alam, kapang memiliki peran yang sangat penting. dan digunakan dalam produksi obat-obatan, seperti antibiotik penisilin, serta sebagai bahan pangan

dan minuman, seperti keju dan kecap. Namun, beberapa jenis kapang juga diketahui sebagai salah satu penyebab infeksi pada manusia, seperti kandidiasis dan aspergillosis. Sementara itu, khamir adalah jenis kapang uniseluler yang dikenal karena kemampuannya melakukan fermentasi, mengubah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Khamir memiliki aplikasi luas dalam industri pangan dan minuman, terutama dalam pembuatan roti, bir, dan anggur, serta digunakan dalam produksi bioetanol dan bahan bakar terbarukan.

Penting untuk memahami peran virus, kapang, dan khamir dalam kehidupan kita karena selain berdampak pada kesehatan, mikroorganisme tersebut juga berdampak pada ekonomi dan teknologi. Penyakit yang disebabkan oleh virus atau jamur bisa mengancam kesehatan masyarakat dan dunia pertanian. Sebaliknya, banyak aplikasi teknologi yang bergantung pada mikroorganisme ini untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia, mulai dari obat-obatan hingga bahan bakar alternatif.

B. PEMBAHASAN

1. Virus

Virus adalah entitas mikrobiologi yang sangat kecil dan sederhana, terdiri dari materi genetik (DNA/RNA) dengan lapisan protein yang mengelilinginya. Virus tidak dapat dianggap sebagai organisme hidup sepenuhnya dikarenakan virus tidak dapat melakukan aktivitas biologis sendiri, seperti metabolisme atau replikasi. Mereka hanya bisa berkembang biak dengan cara menginfeksi sel hidup (disebut sel inang) dan memaksa sel tersebut untuk menghasilkan lebih banyak salinan virus.

Virus adalah mikroorganisme sangat kecil yang cenderung bersifat parasit, menginfeksi sel-sel tubuh manusia, dan menyebabkan berbagai penyakit. Gejala yang muncul dapat bervariasi, tergantung pada jenis sel yang terinfeksi serta tipe virus yang menyerang (Ridwansyah *et al.*, 2021).

Virus dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, seperti berdasarkan ukuran *virion*, struktur kapsid, jenis asam nukleat, sifat fisik, spesies inang, atau penyakit yang ditimbulkannya. Karena kompleksitas dalam pengklasifikasian ini, dibentuklah *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) yang sejak tahun 1966 bertanggung jawab penuh dalam mengklasifikasikan virus. ICTV mengelompokkan virus berdasarkan karakteristik yang saling terkait untuk mengidentifikasi virus yang paling mirip. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam klasifikasi termasuk sifat kimiawi dan fisik virus, seperti jenis asam nukleat dan jumlah protein yang dikodekan oleh virus tersebut. Dengan kemajuan teknologi DNA, kita kini dapat mengurutkan genom virus dengan cepat dan mudah, memungkinkan para ilmuwan untuk membandingkan urutan asam nukleat dari dua virus dan menentukan tingkat kedekatan hubungan keduanya. Selain itu, faktor-faktor lain seperti ukuran *virion*, bentuk kapsid, dan keberadaan selubung juga turut dipertimbangkan. Saat ini, ICTV telah mengategorikan tujuh ordo virus yang mencakup 103 keluarga, meskipun 77 keluarga virus belum diberi ordo, termasuk beberapa virus terkenal seperti *retrovirus*, *papillomavirus*, dan *poxvirus*. Ordo baru sedang diajukan, dan kemungkinan akan ada lebih banyak ordo yang dibuat seiring dengan perkembangan proses taksonomi (Louten, 2016) .

Tabel 7.1

Klasifikasi Virus Berdasarkan Ordo oleh International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)

Ordo	Keterangan
Caudovirales	Virus dsDNA bermantel ekor yang menginfeksi anggota domain Bakteri dan Arkea; nama ini berasal dari bahasa Latin <i>cauda</i> , yang berarti "ekor".
Herpesvirales	Virus dsDNA yang menginfeksi vertebrata dan invertebrata; berasal dari bahasa Yunani <i>herpes</i> , yang berarti "merayap" atau "menyebar" (menggambarkan ruam yang ditimbulkan oleh virus-virus ini).
Ligamenvirales	irus dsDNA yang menginfeksi domain Arkea; berasal dari bahasa Latin <i>ligamen</i> , yang berarti "benang" atau "rantai" (menggambarkan struktur linier dari virus-virus ini). Ordo ini adalah ordo terbaru, yang dibentuk pada tahun 2012.
Mononegavirales	Virus ssRNA beruntai negatif yang menginfeksi vertebrata, invertebrata, dan tumbuhan; nama ini berasal dari bahasa Latin <i>unus</i> (satu) dan <i>negativus</i> (negatif), merujuk pada genom RNA beruntai negatif tunggal. Ordo ini adalah ordo pertama yang dibentuk, pada tahun 1990.
Nidovirales	Virus ssRNA beruntai positif yang menginfeksi vertebrata dan invertebrata; berasal dari bahasa Latin <i>nidus</i> , yang berarti "sarang", karena mereka mengkode beberapa protein yang terletak dalam satu potongan mRNA
Picornavirales	Virus ssRNA beruntai positif yang

	menginfeksi vertebrata, invertebrata, dan tumbuhan; nama ini berasal dari <i>pico</i> (kecil) + <i>RNA</i> + <i>virales</i> (virus).
Tymovirales	Virus ssRNA beruntai positif yang menginfeksi tumbuhan dan invertebrata; <i>Tymo</i> adalah akronim untuk <i>Turnip Yellow Mosaic virus</i> , yang ditemukan dalam ordo ini.


a. Ciri-ciri Virus

Menurut Kesumah (2020), adapun ciri-ciri yang dimiliki viru antara lain:

- 1) Ukurannya sangat kecil, berkisar antara 0,02 hingga 0,3 μm (1 μm = 1/1.000 mm), dengan ukuran terbesar mencapai 200 μm , sehingga hanya bisa diamati menggunakan mikroskop elektron.
- 2) Selubung protein (kapsid) dan bahan inti merupakan struktur penyusun tubuh virus. Bahan inti ini bisa berupa RNA (asam ribonukleat) atau DNA (asam deoksiribonukleat).
- 3) Virus tidak memiliki membran atau organel sel yang diperlukan untuk proses pertumbuhan.
- 4) Virus hanya bisa berkembang biak apabila berada dalam sel atau jaringan yang masih hidup.
- 5) Virus umumnya stabil pada rentang pH antara 5,0 hingga 9,0.
- 6) Virus dapat membentuk kristal, mirip dengan benda mati.
- 7) Virus memiliki berbagai bentuk, seperti batang, bola, bulat, peluru, atau berbentuk T.
- 8) Paparan dari sinar ultraviolet atau sinar-X dapat menghentikan aktivitas dari virus, namun antibiotik dan zat antibakteri lainnya tidak mempengaruhi virus.

Gambar 7.1

Perbandingan ukuran sel virus dan organisme lain



Sumber : Louten J. (2016). Virus Structure and Classification. *Essential Human Virology*, 19–29.

b. Struktur Virus

1) Kapsid Virus

Setiap virus memiliki kapsid protein yang berfungsi melindungi genom asam nukleatnya dari kondisi lingkungan yang ekstrem. Kapsid virus umumnya terdiri dari dua bentuk: heliks dan ikosahedral. Bentuk heliks (jamak: helices) adalah struktur spiral yang melingkari sumbu secara silindris. Ini juga merupakan struktur biologis yang umum, di mana banyak protein memiliki bagian yang berbentuk heliks, dan DNA terbentuk sebagai double helix dari nukleotida.

Pada virus berbentuk heliks, asam nukleat melilit membentuk heliks, sementara protein kapsid melilit di sekitar asam nukleat, membentuk struktur panjang seperti tabung atau batang. Asam nukleat dan kapsid bersama-sama membentuk nukleokapsid. Protein yang melilit di sekitar asam nukleat sering disebut sebagai protein nukleokapsid. Setelah masuk ke dalam sel, nukleokapsid heliks membuka lilitannya,



sehingga asam nukleat menjadi dapat diakses (Louten, 2016)

2) Genom Virus

Di sisi lain, virus mempunyai genom atau materi genetik berupa DNA atau RNA, namun tidak dapat memiliki keduanya. Materi genetik atau genom ini tidak selalu berjenis *double-stranded*; berbagai jenis virus juga dapat memiliki genom DNA yang berbentuk untai tunggal atau *single-stranded* (ssDNA), sementara untai tunggal atau ganda dapat dimiliki oleh virus dengan genom RNA. Namun, setiap virus hanya akan memiliki satu jenis genom asam nukleat, sehingga tidak ada virus yang memiliki genom ssDNA dan ssRNA secara bersamaan.

Seperti halnya ukuran partikel virus yang bervariasi secara signifikan, ukuran genom juga dapat sangat berbeda antara virus. Genom virus yang umum berkisar antara 7.000–20.000 pasangan basa (pb) (7–20 kilobase pasang (kb)). Virus dengan ukuran lebih kecil secara alami akan mampu menyimpan lebih sedikit asam nukleat dibandingkan virus yang lebih besar, tetapi virus besar tidak selalu memiliki genom yang besar. Meskipun sebagian besar virus tidak mengandung banyak asam nukleat, beberapa virus dsDNA memiliki genom yang sangat besar, seperti *herpesvirus* (Louten, 2016).

3) Envelope/Selubung


Virus dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan keberadaan atau ketiadaan selubung yang melapisi kapsidnya. Mayoritas virus memiliki selubung yang mengelilingi kapsid, yang berupa lapisan membran lipid. Membran ini berasal dari salah satu membran sel, umumnya membran plasma, meskipun dalam beberapa kasus, selubung tersebut



bisa berasal dari retikulum endoplasma, kompleks Golgi, atau bahkan membran nukleus, tergantung pada jenis virus tersebut.

Gambar 7.2

Perbandingan Virus Telanjang dan Virus Terbungkus




Sumber : Louten J. (2016). Virus Structure and Classification. *Essential Human Virology*, 19–29.

Virus-virus ini seringkali mengandung protein yang disebut protein matriks, yang berfungsi untuk menghubungkan selubung virus dengan kapsid di bagian dalamnya. Virus yang tidak memiliki selubung disebut virus tanpa selubung atau virus telanjang. Setiap virus juga memiliki protein penempel yang berintegrasi dalam lapisan luar virus. Pada virus tanpa selubung, protein ini berada dalam kapsid, sedangkan pada virus berselubung, protein ini ada pada selubungnya. Protein penempel virus adalah protein yang membantu proses penempelan virus pada membran plasma sel inang, yang merupakan tahapan awal masuknya virus ke dalam sel. (Louten, 2016).

c. Macam-macam Bentuk Virus

Gambar 7.3

Bentuk Virus



Sumber : Direktorat Sma, Direktorat Jenderal Paud,
Dikdas Dan Dikmen. (2020).


Ada berbagai macam bentuk dari virus, yakni bentuk bulat, oval (peluru), bulat, polyhedral filamen (benang), dan ada yang berbentuk seperti huruf T (Kesumah, 2020).

- 1) Virus dengan bentuk batang, contohnya *Tobacco Mosaic Virus* (TMV).
- 2) Virus yang mempunyai bentuk batang dengan ujung yang oval menyerupai peluru, contohnya *Rhabdovirus*.
- 3) Virus dengan bentuk yang bulat, contohnya *Orthomyxovirus* dan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
- 4) Virus dengan bentuk benang (filamen), seperti virus Ebola.
- 5) Virus berbentuk polihedral, contohnya *Adenovirus*.
- 6) Virus dengan bentuk menyerupai huruf T, contohnya bakteriofag, yakni virus yang menginfeksi bakteri *Escherichia coli*.

d. Cara Hidup

Gambar 7.4
Siklus Hidup Virus

(Kapsid biru diilustrasikan gambar berwarna biru, dan warna cokelat untuk genom)



Sumber : Elsevier. Virus Life Cycle. Molecular Virology of Human Pathogenic Viruses.

Dalam proses infeksi virus, terdapat beberapa langkah Saraswati (2021), yaitu :

1) Perlekatan virus dengan membran sel

Virus yang menginfeksi hewan membutuhkan interaksi dengan protein pada permukaan sel inang, yang disebut reseptor virus, untuk melekat. Setiap virus memiliki reseptor spesifik, sehingga hanya dapat menginfeksi jenis sel tertentu, fenomena ini dikenal sebagai tropisme virus. Virus dapat memiliki tropisme terhadap sel, jaringan, atau inang yang berbeda. Virus yang menginfeksi fungi atau yeast tidak memerlukan perlekatan pada membran sel, karena mereka tidak memiliki fase ekstraseluler. Sementara itu, infeksi virus pada tanaman lebih sulit terjadi karena adanya dinding sel, yang harus rusak agar virus dapat menginfeksi.

2) Pembukaan protein kapsid/uncoating

Tahap pembukaan kapsid (untuk virus tanpa selubung) atau kapsid terselubung (untuk virus berselubung) setelah virus menempel pada reseptor sel biasa dikenal dengan istilah proses *uncoating*. Terdapat perbedaan virus telanjang dan virus berselubung pada tahap ini. Proses *uncoating* terjadi melalui proses endositosis pada virus telanjang, di mana partikel virus dimasukkan ke dalam vesikel (kantong) yang kemudian masuk ke dalam sitoplasma sel.

3) pelepasan genom virus ke sitoplasma sel inang

Beberapa virus dapat mengintegrasikan genomnya ke dalam nukleus sel inang, dan kemudian membelah bersama dengan sel inang. Proses integrasi ini dibantu oleh enzim tertentu. Sebagai contoh, virus HIV mengandung gen integrase yang memfasilitasi proses tersebut. Genom virus dapat masuk ke dalam nukleus sel inang melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah dengan memasukkan segmen kecil dari genom virus ke dalam inti sel. Selain itu, beberapa virus menggunakan cara di mana kapsid virus menempel pada membran inti, kemudian terbuka sehingga genom dapat dilepaskan ke dalam inti. Ada juga virus yang sangat kecil yang dapat memasuki inti sel dan kemudian menghancurkan kapsid dalam inti untuk melepaskan genomnya.

4) Modifikasi

Setelah genom virus berintegrasi ke dalam genom sel inang, proses transkripsi dan translasi pun dimulai. Selama transkripsi, beberapa modifikasi terjadi pada genom virus, seperti penambahan m⁷GpppN di ujung 5' (*capping*), penambahan urutan A yang berulang di ujung 3' (poliadenilasi), dan pemotongan urutan RNA tertentu (*splicing*). Modifikasi-modifikasi ini dikenal sebagai RNA

processing. Proses ini sangat penting karena menghasilkan mRNA yang siap untuk diterjemahkan dalam proses translasi. Modifikasi pasca-transkripsi terjadi secara berurutan, dimulai dari *capping*, dilanjutkan dengan poliadenilasi, dan akhirnya *splicing*. Setiap tahap menghasilkan molekul yang siap digunakan untuk tahap berikutnya. Modifikasi pasca-transkripsi ini berlangsung di nukleus, dan hasilnya kemudian dipindahkan ke sitoplasma untuk diterjemahkan menjadi protein. Beberapa mRNA virus yang tidak melalui *splicing*, tetapi tetap mengalami capping dan poliadenilasi, juga akan diangkut ke sitoplasma.

5) Perakitan (*Assembly*)

Setelah menggandakan genom dan menyintesis protein-proteinya, virus akan menjalani proses perakitan untuk membentuk partikel virus utuh sebelum akhirnya dikeluarkan dari sel. Selama tahap ini, proses pertunasan virus (*budding*) akan terlihat.

6) Perilisan virus baru

Setelah proses perakitan virus, langkah selanjutnya adalah pelepasan virus dari sel inang. Pada tahap ini, selubung virus terbentuk, yang dapat diambil dari membran sel inang, sehingga menyebabkan kerusakan pada sel inang. Namun, ada juga kasus di mana pembentukan selubung virus tidak menyebabkan kerusakan pada membran sel inang. Setelah virus keluar dari sel, ia akan mengalami proses maturasi dan siap untuk menginfeksi sel lainnya sebagai *virion*.

e. Pengendalian Virus

Salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh virus adalah vaksinasi. Meskipun strategi dan vaksin baru terus dikembangkan untuk pencegahan dan pengendalian, selalu ada tantangan dan keterbatasan dalam penerapan strategi-

strategi tersebut secara sempurna. Karena upaya pencegahan dan pengendalian penyakit virus belum memberikan hasil yang memadai dalam mengurangi penyebaran penyakit, penggunaan vaksin sebagai solusi yang efektif biaya dan memiliki potensi untuk mengatasi resistansi menjadi prioritas utama dalam memulihkan kesehatan masyarakat. Namun, kompleksitas imunopatologi pada berbagai penyakit seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan vaksin. Vaksin-vaksin ini juga menghadapi tantangan lain, seperti kurangnya model yang sesuai untuk berbagai penyakit dan kebutuhan akan penanda kekebalan yang dapat diandalkan untuk memastikan perlindungan (Rather et al., 2017).

2. Kapang

Kapang adalah organisme eukariotik multiseluler yang bersifat nonmotil, berfilamen, dan bercabang. Dinding sel kapang terbuat dari selulosa dan kitin. Talus kapang terdiri dari banyak filamen yang disebut hifa, dan kumpulan hifa membentuk miselium. Hifa dapat bersifat tidak bersepta, bersepta uninukleat, atau bersepta multinukleat. Hifa juga bisa berfungsi secara vegetatif atau reproduktif. Ukuran, bentuk, dan warna spora digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi taksonomi.


Kapang termasuk mikroorganisme multiseluler yang berfilamen dan membentuk miselium. Kapang diketahui tidak membentuk badan buah dan berasal dari kingdom fungi, bersifat heterotroph karena memperoleh nutrisi dengan cara menyerap bahan organik dari inang yang diasosiasikannya. Selain itu kapang juga berukuran mikroskopis (Larasati *et al.*, 2021).

a. Siklus Hidup

Kapang berkembang biak secara alami secara seksual dan aseksual. Secara seksual, kapang berkembang biak

melalui pembelahan sel, penguncupan, atau pembentukan spora. Spora ini kecil, ringan, dan tahan kering, sehingga mudah tersebar di udara dan dapat tumbuh menjadi miselium baru jika menemukan substrat yang sesuai. Secara seksual, kapang berkembang biak dengan penyatuan nukleus dari dua induk.

Gambar 7.5
Reproduksi Kapang



Sumber : Suryati (2016). Karya Tulis Ilmiah. Insan Cendekia Merdeka. Jombang.

Perkembangbiakan secara generatif atau seksual pada kapang dapat dilakukan melalui isogamet atau heterogamet. Pada beberapa spesies, keduanya disebut isogamet karena belum terlihatnya perbedaan morfologi antara jenis kelamin. Namun, pada beberapa spesies lainnya, terdapat perbedaan ukuran gamet, di mana gamet yang lebih kecil disebut mikrogamet (sel kelamin jantan) dan yang lebih besar disebut makrogamet (sel kelamin betina) (Suryati, 2016).

Spora seksual yaitu:

- 1) Askospora adalah spora sel tunggal yang dibentuk dalam kantung (askus), dalam setiap askus biasanya

terdapat 8 askospora.

- 2) Basidiospora adalah spora sel tunggal yang terbentuk dalam basidium yakni struktur berbentuk ganda.
- 3) Zigospora adalah spora besar dengan dinding tebal yang terbentuk ketika gametangia bertemu yakni ujung-ujung dua hifa yang saling serasi secara seksual.
- 4) Oospora adalah spora yang dibentuk pada oogonium, yakni struktur betina khusus. Pembuahan sel telur atau oosfer oleh gamet jantan di anteridium menghasilkan oospora, dan terdapat satu atau lebih oosfer dalam setiap oogonium.

Spora aseksual yaitu:

- 1) Konidiospora atau konidia adalah sporanya terbentuk di ujung atau sisi hifa. Mikrokonidia merupakan konidia yang kecil dan bersel tunggal, sedangkan yang lebih besar dan banyak disebut makrokonidia.
- 2) Oidium atau arthrospora adalah spora bersel tunggal yang terbentuk melalui pemisahan pada ujung hifa. Segmen-segmen hifa tersebut kemudian membulat dan terlepas sebagai spora.
- 3) Sporangiospora merupakan spora dengan sel tunggal yang terbentuk dalam kantung spora (sporangium) yang terletak di ujung hifa khusus yang disebut sporangiofora.
- 4) Blastospora adalah spora yang terbentuk melalui tunas pada miselium, yang kemudian berkembang menjadi spora. Proses serupa juga terjadi pada pembentukan tunas pada sel-sel khamir.
- 5) Klamidospora adalah spora dengan dinding tebal yang sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk, dan terbentuk pada sel-sel hifa vegetatif.



b. Jenis Kapang

Beberapa jenis kapang yang banyak ditemukan:

1) *Aspergillus Spp*

Kapang *Aspergillus spp.* dapat ditemukan pada berbagai jenis substrat, seperti daun, tanah, buah, dan juga pada biji-bijian, yang menjadi komponen utama produksi pakan ternak yang berasal dari komoditas pertanian (Sukmawati *et al.*, 2018)

2) *Penicillium*

Penicillium sp. diklasifikasikan dalam dalam Kingdom Fungi, Filum Ascomycota, Kelas Eurotiomycetes, Ordo Eurotiales, Famili Trichocomaceae, Genus *Penicillium*, dan Spesies *Penicillium sp.* Jenis ini sering ditemukan pada berbagai lingkungan alam (Haryati *et al.*, 2019).

c. Pertumbuhan Kapang

Kapang merupakan mikroorganisme multiseluler yang sering dijumpai di berbagai kondisi lingkungan. Faktor-faktor lingkungan, seperti suhu, tingkat keasaman (pH), kelembaban, dan jenis substrat sebagai sumber nutrisi, memiliki pengaruh besar terhadap keberadaannya. (Stanaszek-Tomal, 2020).

Sebagian besar kapang tumbuh dengan baik pada suhu kamar atau bersifat mesofilik. Banyak kapang tumbuh dengan optimal pada suhu yang berkisar antara 25-30°C atau lebih tinggi, meskipun beberapa jenis mampu berkembang biak pada suhu yang lebih tinggi yakni 35-37°C, seperti *Aspergillus*. Beberapa kapang bersifat psikrotrofik, yang memungkinkan mereka tumbuh pada suhu lemari es, dan ada yang dapat tumbuh perlahan pada suhu di bawah titik beku, sekitar -5 hingga 10°C.

Kapang membutuhkan oksigen untuk tumbuh atau bersifat aerobik. Sebagian besar kapang tumbuh pada

lingkungan dengan kisaran pH yang cukup luas, yaitu antara pH 2-8,5, meskipun pertumbuhannya cenderung lebih optimal pada kondisi pH yang asam atau rendah.


3. Khamir

Khamir adalah fungi uniseluler yang tidak berfilamen. Ketika tumbuh di media buatan di laboratorium, biakan khamir tampak mirip dengan bakteri, namun khamir memiliki ukuran 5 hingga 10 kali lebih besar daripada bakteri. Secara mikroskopis, sel-sel khamir dapat berbentuk elipsoid, bulat, atau terkadang silindris. Berbeda dengan kapang, khamir tidak memiliki hifa aerial atau sporangia penyokong. *Saccharomyces cerevisiae*, yang dikenal sebagai ragi roti, bersifat menguntungkan. Selain itu, kandungan vitamin yang tinggi pada khamir menjadikannya berharga sebagai suplemen makanan. Di sisi lain, jenis khamir seperti *Candida albicans* adalah patogen yang mampu menyebabkan infeksi saluran kemih dan infeksi vagina. (Capuccino & Sherman, 2009)

a. Morfologi

Ukuran sel khamir sangat bervariasi dengan panjang antara 1-5 mikrometer hingga 20 mikrometer, dan lebar 1-10 mikrometer. Selain ukuran, bentuk sel khamir juga beragam, seperti oval, bulat, ogival (kedua sisi berbentuk bulat dan runcing), silinder atau batang, ada juga bentuk segitiga melengkung (triangular), bentuk botol, bentuk seperti lemon (apikulat), serta dapat membentuk pseudomiselium dan bentuk lainnya (Kanti, 2005).

Gambar 7.6
Bentuk sel Khamir



Sumber : Rini (2017). Universitas Jember. Jember

Karakteristik khamir yang ditemukan pada fermentasi awal bahan dengan kandungan gula seperti buah, yakni *Kloeckera* dan *Hanseniaspora*, dapat dilihat dari sel vegetatif dengan bentuk seperti lemon (apikulat). Khamir berbentuk bulat seperti *Debaryomyces*, oval seperti *Saccharomyces*, dan segitiga seperti jamur *Trygonopsis*. Bentuk ogival, yaitu bentuk memanjang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan lainnya berbentuk bulat, merupakan ciri khas dari *Brettanomyces* (Pramudita, 2017).

b. Taksonomi Khamir

Khamir ditemukan di seluruh dunia, terutama di tanah, permukaan tanaman, dan media yang mengandung gula seperti pada berbagai jenis buah dan nektar bunga. Terdapat ratusan varietas khamir *Ascomycetes*, dengan 34 genera ditemukan di lingkungan, lebih banyak dibandingkan dengan hanya 19 genera yang ada pada bahan makanan. Beberapa genera khamir tersebut yakni *Aureobasidium*, *Bullera*, *Cryptococcus*, *Candida*, *Clavispora*, *Cystofilobasidium*, *Debaromyces*, *Dipodascus*, *Exophiala*, *Erythrobasidium*, *Filobasidium*, *Geotrichum*, *Galactomyces*,

Hyalondendron, Issatchenkia, Kodamaca, Kluyveromyces, Myxozyma, Metschnikowia, Pichia, Pseudozyma, Rhodotorula, Rhodosporidium, Spathaspora, Sporisorium, Sporobolomyces, Sporidiobolus, Saccharomycete, Tetrapisispora, Tilletiopsis, Trichosporon, Ustilago, dan Williopsis. (Pramudita, 2017)

c. Cara Hidup

Perkembangbiakan khamir dapat terjadi secara seksual atau aseksual. Khamir dikelompokkan sebagai khamir yang berkembang biak secara aseksual jika cara reproduksi seksualnya belum diketahui, seperti yang ditemukan pada genus, *Kloeckera, Sporobolomyces, Bullera, Rhodotorula, Schizoblastosporium Trigonopsis*, dan juga pada jamur *Brettanomyces*.

Pada perkembangbiakan aseksual, sel baru terbentuk melalui perpanjangan hifa dan pseudohifa. Hifa adalah rangkaian atau perpanjangan sel yang membentuk filamen miselium, yang umumnya memiliki sekat yang membentuk struktur berbentuk lingkaran. Sementara itu, hifa sendiri memiliki perbedaan dengan pseudohifa dikarenakan pseudohifa terdiri dari sel yang biasanya tidak memiliki sekat. (Pramudita, 2017)

d. Pengendalian Kapang dan Khamir

Pengendalian kontaminasi dimulai dengan menghilangkan kapang dan khamir dari pakan, kemudian mencegah perkembangbiakannya dalam pakan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pengurangan kontaminan dalam pakan untuk mencegah pencemaran ulang, dan terakhir, desinfeksi dilakukan pada area yang terkontaminasi kapang. Semua peralatan yang tercemar dibersihkan menggunakan desinfektan seperti sodium hipoklorit. (WHC, 2005).

Cemaran kapang pada bangunan penyimpanan bahan pakan, lingkungan, serta pakan dan bahan-bahannya, dapat dihilangkan dengan menggunakan fungisida. Namun, pemakaian fungisida perlu dilakukan dengan hati-hati dan tepat agar efektif dan dapat meminimalkan risiko resistensi kapang terhadap fungisida tersebut. (Ahmad, 2009)

C. SIMPULAN

Virus, kapang, dan khamir merupakan mikroorganisme yang berperan penting dalam kehidupan manusia dan alam, mereka sangat berbeda dalam hal struktur, cara hidup, dan cara berkembang biak. Dengan memahami sifat biologis dan cara hidupnya kita dapat memilih tindakan yang akan digunakan sebagai upaya pencegahan dan penanganannya dapat lebih efektif dan tepat sasaran.



REFERENCE

- Ahmad, R. Z. (2009). Cemaran Kapang Pada Pakan Dan Pengendaliannya. *Jurnal Litbang Pertanian*, 281.
- Capuccino, J. G., & Sherman, N. (2009). *Manual Laboratorium Mikrobiologi. 8th edn. Edited by J. Manurung.* (8th ed.). Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Haryati, L. D., Sari, R., & Apridamayanti, P. (2019). Isolasi dan Identifikasi Jamur *Penicillium* sp, yang Berasal Dari Swab Pasien Ulkus Diabetikum. *Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN*.
- Kanti, A. (2005). *Keragaman khamir tanah asal Taman Nasional Kalimutu dan Taman Wisata Alam Ruteng Nusa Tenggara Timur.* (Zoology Research Report) [Zoology Research Report].
- Kesumah, D. (2020). *Modul Biologi Kelas X KD 3.4.* Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN.
- Larasati, S. J. H., Sabdono, A., & Sibero, M. T. (2021). Identifikasi Molekuler Kapang Asosiasi Spons menggunakan Metode DNA Barcoding. *Journal of Marine Research*, 10(1), 48–54. <https://doi.org/10.14710/jmr.v10i1.28334>
- Louten, J. (2016). Virus Structure and Classification. In *Essential Human Virology* (pp. 19–29). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800947-5.00002-8>
- Pramudita, O. (2017). *Eksplorasi Dan Uji Efikasi Khamir Termotoleran Sebagai Agens Pengendali Hayati Patogen Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. Pada Buah Jeruk Keprok (Citrus nobilis L.) Secara In Vitro Dan In Vivo.* Univesitas Brawijaya.
- Rather, I. A., Parray, H. A., Lone, J. B., Paek, W. K., Lim, J., Bajpai, V. K., & Park, Y.-H. (2017). Prevention and Control Strategies to Counter Dengue Virus Infection. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 7, 336. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2017.00336>

- Ridwansyah, R., Faizah, S., & Achyani, Y. E. (2021). Mengidentifikasi Jenis Virus Menggunakan Sistem Pakar Berbasis Metode Forward Chaining. *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, 23(1). <https://doi.org/10.31294/p.v23i1.10048>
- Saraswati, H. (2021). Siklus Hidup Dan Reproduksi Virus. In *Modul Virologi*. Universitas Esa Unggul.
- Stanaszek-Tomal, E. (2020). Environmental Factors Causing the Development of Microorganisms on the Surfaces of National Cultural Monuments Made of Mineral Building Materials—Review. *Coatings*, 10(12), 1203. <https://doi.org/10.3390/coatings10121203>
- Sukmawati, D., Wahyudi, P., Rahayu, S., Moersilah, M., Handayani, T., Rustam, K. Y., & Puspitasari, S. I. (2018). Skrining Kapang *Aspergillus spp.* Penghasil Aflatoksin Pada Jagung Pipilan Di Daerah Bekasi, Jawa Barat. *Al-Kauniah: Jurnal Biologi*, 11(2), 151–162. <https://doi.org/10.15408/kauniah.v11i2.6961>
- Suryati. (2016). Pertumbuhan Jumlah Kapang Pada Suhu Kamar 25°C Dan Suhu Refrigerator 10°C Pada Roti Tawar (Studi di industri rumah tangga di Candimulyo Jombang). *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika*.
- WHC. (2005). *Fungi*. Workers Health Centre (WHC). Workers Health Centre (WHC). 2005. *Fungi*. <http://www.workershealth.com.au/facts028.html>:1- 6. [19 January 2008]. p. 1- 6

PROFIL PENULIS

apt. Mahdalena Sy. Pakaya, S.Farm., M.Si.


Penulis lahir di Gorontalo, pada 16 Juni 1986. Pendidikan terakhir Magister Farmasi di Universitas Hasanuddin. Sejak 2018, terangkat menjadi ASN Dosen di Jurusan Farmasi Universitas Negeri Gorontalo. Sejak menempuh kuliah di S1 dan S2, telah menggeluti bidang Fitokimia dan Mikrobiologi. Sehingga dari awal berprofesi sebagai dosen hingga saat ini tergabung dalam Tim Dosen bidang keilmuan Biologi Farmasi. Dan berpartisipasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan keilmuan tersebut.



Mikrobiologi Farmasi merupakan cabang mikrobiologi yang mempelajari mikroorganisme yang berkaitan dengan industri farmasi. Selain itu, mikroorganisme juga dapat dimanfaatkan untuk produksi bahan aktif seperti enzim, antiparasit, dan antioksidan. Pigmen dari mikroba juga dapat dimanfaatkan untuk obat dan makanan.

Email Penulis: mahdalena@ung.ac.id





BAB 8

MIKROBA PATOGEN (BAKTERI, VIRUS, DAN CANDIDA) DAN RESISTENSI MIKROBA SERTA INFEKSI NOSOKOMIAL

(apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS.)

Universitas Muhammadiyah Lamongan;
Jl. Plalangan No. KM, Plosowahyu, Lamongan, Jawa Timur), 0857-0638-0365
Email: arumaisyah81@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Patogen adalah organisme (umumnya adalah mikroorganisme) yang menyebabkan penyakit pada organisme lain (Pratiwi, 2008; Effendi, 2023).Sebenarnya mikroba yang menyebabkan patogen atau potensial patogen jumlahnya tidak banyak dibandingkan seluruh mikroorganisme yang ada di alam.

Mikroorganisme yang menjadi cakupan pembahasan dalam bab ini adalah bakteri, virus, dan candida. Kelompok bakteri terdiri atas semua organisme prokariotik yang terdapat di daratan dan perairan, serta organisme prokariotik yang bersifat fotoautotrof. Virus merupakan kesatuan yang mengandung asam nukleat, DNA atau RNA, mengandung protein selubung. Kadangkadang virus tertutup oleh envelop dari lipid, protein, dan karbohidrat yang mengelilingi asam nukleat. Virus bermultiplikasi di dalam sel hidup dengan menggunakan mesin penyintesis dari sel inang (Pratiwi, 2008).

Candida adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya (sumber karbon dan energi). Candida memerlukan kondisi kelembapan yang tinggi, persediaan bahan organik, dan oksigen untuk pertumbuhannya (Pratiwi, 2008).

Untuk dapat menyebabkan penyakit, mikroorganisme patogen harus dapat masuk ke tubuh inang. Tidak semua mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang dalam tubuh inang dapat menimbulkan penyakit. Penyakit timbul jika infeksi menghasilkan perubahan pada fisiologi normal tubuh. Selain itu, timbulnya penyakit juga merupakan hasil terbentuknya toksin oleh mikroorganisme yang memasuki tubuh.

B. PEMBAHASAN

1. Mikroba Patogen

a. Bakteri Patogen

Patogenesis dari suatu infeksi bakteri meliputi proses infeksi dan mekanisme-mekanisme yang menyebabkan timbulnya gejala penyakit. Bakteri dikatakan bersifat patogen bila memiliki kemampuan melakukan transmisi, melekat pada sel-sel inang dan melakukan multiplikasi, menggunakan nutrisi dari sel inang, invasi dan timbulnya kerusakan pada sel-sel dan jaringan, serta toksigenisitas dan kemampuan membangkitkan sistem imun inang. Hal ini dipengaruhi oleh struktur serta produk-produk yang dihasilkan oleh bakteri dan sifat bakteri itu sendiri.

Eksotoksin dan endotoksin bakteri sangat penting di dalam patogenesis penyakit tertentu. Eksotoksin merupakan faktor virulen pada infeksi bakteri toksigenik dan imunitas terhadap toksin ini dapat mencegah terjadinya penyakit. Toksin yang dikeluarkan dari bakteri menyebabkan pengaruh negatif terhadap sel inang dengan cara mengubah metabolisme normal inang tersebut (Pratiwi, 2017)

Toksin yang dihasilkan dibedakan menjadi 3 jenis yaitu endotoksin, eksotoksin, dan enterotoksin. Setelah proses adhesi-kolonisasi, bakteri mengalami proses invasi. Invasi merupakan proses bakteri masuk ke dalam sel inang dan menyebar ke seluruh tubuh.

Setelah invasi, mikroba mampu bertahan hidup dan berkembang biak dalam sel inang. Dalam mempertahankan hidupnya, bakteri harus dapat bersaing untuk mendapatkan nutrisi, setelah itu dapat mengakibatkan rusaknya jaringan dan organ-organ tubuh (Pratiwi, 2017).

Penyakit infeksi terjadi saat mikroba memasuki tubuh inang, selanjutnya mikroba akan berreproduksi atau berreplikasi.

Timbulnya penyakit infeksi bisa melalui beberapa cara:

(1) Beberapa bakteri beradaptasi sebagai patogen pada manusia. Bakteri tersebut bukan bagian dari flora normal tetapi menyebabkan infeksi subklinis (infeksi yang tidak menunjukkan gejala apapun). Misalnya *Mycobacterium tuberculosis*.

(2) Beberapa bakteri yang merupakan flora normal memiliki faktor virulensi ekstra yang membuatnya bersifat patogenik. Misalnya *Escherichia coli*.

(3) Beberapa bakteri dari flora normal dapat menyebabkan penyakit bila mencapai organ-dalam melalui trauma ataupun melalui peralatan bedah pada prosedur operasi. Misalnya *Staphylococcus epidermidis*.

(4) Pada penderita dengan penekana sistem imun, banyak bakteri yang merupakan flora normal dapat menyebabkan penyakit, terutama bila terpapar pada organ-dalam. Misalnya *Acinetobacter* (Pratiwi, 2008).

b. Virus Patogen

Virus dapat merusak atau menyebabkan kematian pada sel inang. Kematian sel inang terjadi akibat akumulasi virus yang mengganggu permeabilitas membran plasma inang, atau karena penghambatan sintesis DNA, RNA, atau protein sel inang. Efek yang terlihat akibat infeksi virus disebut sebagai efek sitopatik (*cytopathic effect*, CPE). Efek CPE yang menyebabkan

kematian sel disebut efek sitosidal, sedangkan yang menyebabkan kerusakan sel disebut efek nositosidal. CPE digunakan sebagai salah satu cara diagnosis infeksi virus.

Berikut ini adalah beberapa diagnosis infeksi virus: (1) Penghentian sintesis makromolekul dalam sel inang. Beberapa virus, seperti virus herpes simplex, dapat menghentikan mitosis secara permanen (*irreversible*).

(2) Pelepasan enzim lisosom ketika virus sitosidal menginfeksi sel inang, yang menyebabkan kerusakan organel intraseluler dan kematian sel. (3) Terbentuknya badan inklusi, yaitu granul-granul dalam sitoplasma atau nukleus sel yang terinfeksi. Granul ini kadang merupakan bagian dari protein atau asam nukleat virus yang sedang disintesis menjadi virion. Badan inklusi penting untuk identifikasi virus penyebab infeksi. Misalnya, virus rabies memproduksi badan inklusi dalam sitoplasma sel-sel saraf, dan keberadaannya dalam jaringan otak hewan menjadikannya sebagai diagnosis untuk infeksi rabies. Fenomena serupa juga terjadi pada virus cacar, virus cacar air, virus herpes, vaccinia virus, dan *Adenovirus*.

(4) Terbentuknya syncytium, yaitu sel multinukleat yang berukuran sangat besar, yang terbentuk akibat penggabungan beberapa sel yang terinfeksi. Virus campak, virus cacar, beberapa virus herpes, dan *Paramyxovirus* dapat menghasilkan syncytium selama proses infeksi. Beberapa diagnosis lainnya, tidak dibahas dalam bab ini.

c. Candida Patogen

Beberapa *Candida* menghasilkan sitotoksin. Mikotoksin adalah toksin yang dihasilkan oleh beberapa *Candida*, dan bertanggung jawab untuk berbagai kasus keracunan makanan. Sitotoksin phalloidin dan amanitin yang dihasilkan oleh *Amanita phalloides*, dan beberapa spesies *Amanita* lainnya menyebabkan gejala keracunan

makanan 8-24 jam setelah dikonsumsi. Toksin alfa amanitin yang dihasilkan menghambat transkripsi DNA dengan cara mengganggu aksi enzim RNA polymerase. Gejala awal meliputi muntah dan diare, selanjutnya terjadi perubahan pada sel hati dan ginjal, hingga menyebabkan kematian pada beberapa hari setelah mengonsumsi 5-10 mg toksin.

Pasien dengan gangguan kekebalan tubuh sangat rentan terhadap infeksi nosokomial yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur, yang sebelumnya dianggap memiliki virulensi rendah atau "nonpatogenik". Infeksi jamur pada pasien ini seringkali bersifat parah, berkembang biak dengan cepat, dan sulit untuk didiagnosis maupun diobati. Patogen jamur yang paling menyebabkan infeksi nosokomial antara lain *Candida spp.*, *Aspergillus spp.*, dan beberapa jenis jamur dari kelas Zygomycetes.

Berikut ini adalah tabel jenis mikroba patogen penyebab penyakit infeksi (Kayser, 2005)

Mikroba Patogen	Penyakit Infeksi yang ditimbulkan
<i>Rhinoviruses</i>	Rhinitis (<i>common cold</i>)
<i>Coronaviruses</i>	
<i>Influenzaviruses</i>	
<i>Adenoviruses</i>	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Sinusitis
<i>Haemophilus influenzae</i>	
<i>Staphylococcus aureus</i>	
<i>Moraxella catarrhalis</i>	
<i>Streptococcus pyogen</i>	
<i>Influenzaviruses</i>	

Mikroba Patogen	Penyakit Infeksi yang ditimbulkan
<i>Adenoviruses</i> <i>Rhinoviruses</i> <i>Coronaviruses</i>	
<i>Adenoviruses</i> <i>Influenzaviruses</i> <i>Rhinoviruses</i> <i>Coronaviruses</i>	Pharyngitis/tonsillitis/ gingivitis/stomatitis Viruses
<i>Coxsackie viruses, group</i> <i>Herpes simplex virus</i>	Herpangina Gingivitis/stomatitis
<i>Cytomegalovirus (CMV)</i>	Infectious mononucleosis Epstein-Barr virus (EBV)
<i>Treponema vincentii +</i> <i>mixed anaerobic flora</i> <i>Corynebacterium</i> <i>diphtheriae</i>	Acute necrotic ulcerous gingivostomatitis Diphtheria
<i>Haemophilus influenzae</i> (usually serovar "b") Jarang: <i>Streptococcus</i> <i>pneumoniae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i>	Epiglottitis
<i>Adenoviruses</i> <i>Rhinoviruses</i> <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i>	Acute bronchitis. Acute bronchiolitis (small children)
<i>Bordetella pertussis</i>	Pertussis



Mikroba Patogen	Penyakit Infeksi yang ditimbulkan
<i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Moraxella catarrhalis</i>	Acute exacerbation of "chronic obstructive pulmonary disease" (COPD)
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> <i>other mycobacteria</i>	Tuberculosis
<i>Parainfluenza viruses</i> (anak-anak) <i>Respiratory syncytial virus</i> (children) <i>Influenza viruses</i> <i>Adenoviruses</i> <i>Epstein-Barr virus (EBV)</i> <i>Cytomegalovirus (CMV)</i> <i>Measles virus</i>	Pneumonia Viruses (15–20 %) (biasanya community acquired pneumonia)
<i>Escherichia coli</i> <i>Other Enterobacteriaceae</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococci</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Chlamydia trachomatis</i>	Prostatitis
<i>Herpes simplex virus</i> <i>Candida spp.</i> <i>Trichomonas vaginalis</i>	Vulvovaginitis

2. Resistensi Antimikroba

Penggunaan antimikroba untuk mengatasi penyakit infeksi telah dikenal secara luas oleh tenaga kesehatan di seluruh dunia sejak pertama kali diterapkannya penggunaan antimikroba pada sekitar tahun 1940-an. Penggunaan antimikroba telah terbukti menyelamatkan banyak nyawa. Era ini disebut sebagai zaman keemasan penggunaan antimikroba. Namun, saat ini zaman keemasan tersebut kini telah berlalu akibat meluasnya masalah resistensi terhadap antimikroba.

Resistensi antimikroba, yaitu berkurangnya efektivitas antimikroba dalam membunuh mikroba, mulai muncul tidak lama setelah penemuan antimikroba pertama kali. Berdasarkan penelitian dan laporan dari berbagai belahan dunia, kini telah terbukti bahwa beberapa antimikroba sudah tidak efektif lagi dalam mengatasi beberapa penyakit infeksi yang sebelumnya dapat ditangani dengan cepat dan mudah. Sementara masalah resistensi antimikroba semakin besar, upaya menemukan antimikroba baru justru semakin menurun. Meskipun sifat resisten terhadap antimikroba merupakan dari proses evolusi, terdapat dua faktor yang turut berkontribusi terhadap munculnya infeksi yang sulit disembuhkan. Pertama, hilangnya minat industri farmasi untuk mengembangkan antimikroba baru, terutama karena alasan ekonomi, sehingga tidak banyak ditemukan kelas baru antimikroba. Faktor kedua adalah penggunaan antimikroba yang berlebihan (*overuse*) dan pemanfaatannya yang salah (*misuse*) oleh para profesional kesehatan, industri pertanian, peternakan, dan perikanan (Menteri Kesehatan RI, 2021)

- a. Penyebab resistensi antimikroba ditinjau dari sudut pandang mikrobiologi

1) Fenomena alami (*natural phenomenon*) bakteri

Dari berbagai penelitian mikrobiologi dibuktikan bahwa walaupun tidak pernah mengalami paparan langsung dengan antimikroba, bakteri dapat menjadi resisten terhadap antibiotik, dengan mekanisme:

- a) mutasi genetik secara spontan,
- b) perpindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya, meskipun berbeda genus, dengan beberapa cara yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi, yang menyebabkan perubahan sifat dari peka menjadi resisten atau kebal terhadap antibiotik.

2) Tekanan selektif (*selective pressure*)

Secara alami dalam suatu komunitas mikroba terdapat sejumlah kecil (minoritas) mikroba yang telah bermutasi atau berubah menjadi resisten terhadap antimikroba tertentu (misalnya disebut sebagai mikroba X_m) dan sejumlah besar (mayoritas) mikroba lain yang masih sensitif (misalnya disebut sebagai mikroba X).

Jika diberi antimikroba tertentu (antimikroba A), maka kelompok mikroba X akan dapat dibunuh atau dihambat pertumbuhannya oleh antimikroba A , sedangkan mikroba X_m akan tetap bertahan hidup. Selanjutnya, mikroba X_m akan berkembang biak dengan cepat sehingga mencapai jumlah yang besar dan membentuk koloni, atau yang dapat menyebabkan penyakit, yang tidak dapat diatasi lagi dengan antimikroba A , karena mikroba penyebabnya adalah mikroba yang telah resisten terhadap antimikroba A . Individu yang menjadi inang untuk koloni mikroba resisten dapat menjadi sumber infeksi akibat mikroba resisten bagi orang atau pasien di lingkungannya.



3) Penyebaran (*spread*)

Penyebaran mikroba penyebab infeksi dapat terjadi melalui beberapa medium misalnya kontak fisik baik langsung maupun tidak langsung, udara (*airborne/droplet*), makanan, darah, dan hewan pembawa (*vector*). Penyebaran mikroba patogen tersebut dapat terjadi di mana saja termasuk di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu di rumah sakit, rumah perawatan untuk pasien usia lanjut, dan lain-lain.

Infeksi yang didapat ketika pasien dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan disebut sebagai *health care-associated infections* (HAIs). HAIs dapat terjadi dengan berbagai sebab. HAIs yang sering terjadi adalah infeksi aliran darah (*blood stream infection*, BSI), infeksi saluran kemih karena penggunaan kateter (*catheter-associated urinary tract infection*, CAUTI), pneumonia rumah sakit (*hospital-acquired pneumonia*, HAP), pneumonia akibat penggunaan ventilator (*ventilator-associated pneumonia*, VAP), diare, dan infeksi daerah operasi/IDO (*surgical site infection*, SSI), dan lain-lain (Menteri Kesehatan RI, 2021)

3. Infeksi Nosokomial

Nosokomial atau infeksi terkait perawatan kesehatan (*Healthcare Associated Infections* - HCAI) adalah infeksi yang muncul pada pasien dalam perawatan medis di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan lain yang tidak ada pada saat pasien masuk rumah sakit (Sikora, et al, 2020). Karena sulitnya menilai keberadaan infeksi yang diinkubasi, pendekatan praktis adalah dengan mendefinisikan setiap infeksi bakteri sebagai nosokomial jika terlihat jelas >48-72 jam setelah masuk. Infeksi virus dengan periode inkubasi

yang jelas dapat lebih mudah dianggap berasal dari komunitas atau onset nosokomial (Jenkis, 2017).

Infeksi nosokomial atau infeksi terkait perawatan kesehatan terjadi pada pasien dalam perawatan medis. Dari setiap 100 pasien yang dirawat di rumah sakit, tujuh di negara maju dan sepuluh di negara berkembang dapat tertular infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah masalah keamanan utama bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien.

Dengan meningkatnya infeksi, terjadi peningkatan masa tinggal pasien di rumah sakit. Hal ini menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam biaya pengobatan untuk pasien. Penanganan infeksi ini seringkali membutuhkan rawat inap yang lama, pemeriksaan tambahan, intervensi bedah dan pengobatan antimikroba, yang semuanya menambah biaya perawatan kesehatan. Empat jenis infeksi nosokomial yang paling umum meliputi: infeksi aliran darah primer (IADP), infeksi saluran kemih (ISK) terkait kateter, infeksi (Sardi, 2021).

a. Jenis Infeksi Nosokomial

Perawatan kesehatan modern menggunakan berbagai jenis perangkat serta prosedur untuk merawat pasien dan membantu mereka pulih. Infeksi dapat dikaitkan dengan prosedur (seperti operasi) dan perangkat yang digunakan dalam prosedur medis, seperti kateter atau ventilator.

Empat jenis infeksi nosokomial yang paling umum terkait dengan perangkat atau prosedur pembedahan meliputi: (i) infeksi aliran darah primer (IADP), (ii) infeksi saluran kemih (ISK) terkait kateter. (iii) infeksi daerah operasi (IDO) dan (iv) Pneumonia terkait ventilator (VAP) (Sardi, 2021)

1) Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)

Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) atau Infeksi aliran darah terkait jalur sentral (Central line-

associated bloodstream infections - CLABSI) adalah infeksi nosokomial yang mematikan dengan tingkat kejadian kematian 12%- 25% [9]. Sebuah studi yang dilakukan di Taiwan melaporkan terjadinya IADP sebesar 3,93 per 1.000 untuk tiap hari pemasangan kateter. Dalam penelitian ini, pasien mengembangkan IADP 8 hari sejak pemasangan kateter aliran darah primer (Sardi, 2021).

Berdasarkan data *National Healthcare Safety Network* (NHSN) dari Januari 2006 hingga Oktober 2007, urutan patogen terpilih yang terkait dengan penyebab CLABSI adalah sebagai berikut: organisme gram positif (stafilokokus koagulase-negatif, 34.1%; enterokokus, 16%; dan *Staphylococcus aureus*, 9.9% adalah yang paling umum, diikuti oleh gram negatif (*Klebsiella*, 5.8%; *Enterobakter*, 3.9%; *Pseudomonas*, 3.1%; *E. coli*, 2.7%; *Acinetobacter*, 2.2%), spesies *Candida* (11,8%), dan lain-lain (10,5%) [13]. Infeksi aliran darah primer yang dikonfirmasi laboratorium. Harus memenuhi salah satu definisi berikut:

- ✓ Ditemukan patogen dalam satu atau lebih spesimen darah.
- ✓ Organisme komensal (misalnya, stafilokokus koagulase negatif, difteroid, basilus, streptokokus viridans, aerococcus, micrococcus, propionibacterium), diidentifikasi dari dua atau lebih spesimen darah yang diperoleh pada kasus terpisah (metode mikrobiologi berbasis kultur atau nonkultur), Di samping itu juga terdapat setidaknya salah satu dari tanda-tanda berikut; demam (suhu > 38.0° C), hipotermia (suhu < 36.0° C), ataupun apnea atau bradikardia.

- ✓ Kateter jalur sentral atau umbilikalis dipasang selama lebih dari 2 hari.
- ✓ Kateter jalur sentral masih terpasang pada hari diagnosis atau sehari sebelum diagnosis IADP (Sardi, 2021).

2) Infeksi Saluran Kemih (ISK) Terkait Kateter

Infeksi saluran kemih terkait kateter atau *Catheter associated urinary tract infections* (CAUTI) adalah infeksi yang melibatkan bagian mana pun dari sistem kemih, termasuk kandung kemih, uretra, ureter dan ginjal. Di antara ISK yang didapat di rumah sakit, sekitar 75% terkait dengan kateter urin, merupakan tabung yang dimasukkan ke dalam kandung kemih melalui uretra untuk mengalirkan urin (Sardi, 2021)

3) Infeksi Daerah Operasi (IDO)

Infeksi daerah operasi atau *Surgical site infections* (SSI) didefinisikan sebagai infeksi yang terjadi dalam 30 hari setelah operasi (atau dalam satu tahun jika implan terlepas/tidak terpasang setelah operasi) dan mempengaruhi sayatan atau jaringan dalam di daerah operasi. Infeksi daerah operasi terkadang bisa berupa infeksi superfisial yang hanya melibatkan kulit. Akan tetapi infeksi ini juga bisa menimbulkan efek yang lebih serius dan dapat melibatkan jaringan di bawah kulit, organ, atau bahan yang ditanam (implan) (Sardi, 2021).

4) Pneumonia terkait ventilator (VAP)

Pasien di unit perawatan intensif (ICU) berisiko meninggal tidak hanya karena penyakit kritis mereka tetapi juga dari proses sekunder seperti infeksi nosokomial. Pneumonia adalah infeksi nosokomial kedua paling umum pada pasien sakit kritis, mempengaruhi 27% dari semua pasien sakit kritis. 86% pneumonia

nosokomial dikaitkan dengan ventilasi mekanis dan disebut pneumonia terkait ventilator (*Ventilator associated pneumonia* - VAP).

Pneumonia terkait ventilator (VAP) didefinisikan sebagai pneumonia yang terjadi lebih dari 48 jam setelah pasien diintubasi dan menerima ventilasi mekanis melalui selang endotrakeal atau trakeostomi. VAP terjadi akibat invasi mikroorganisme ke saluran pernapasan bagian bawah dan parenkim paru (Sardi, 2021).

C. SIMPULAN

Penyakit infeksi timbul jika mikroorganisme patogen menghasilkan perubahan pada fisiologi normal tubuh, dan atau terbentuknya toksin oleh mikroorganisme yang memasuki tubuh. Resistensi antimikroba dan Infeksi Nosokomial merupakan ancaman bagi kesehatan. Sebelum terlambat, keduanya harus dicegah.



REFERENCE

Effendi, Wibowo RH, Hidayah T, Wahyuni R, Alhidayatullah, Arsyadi, Rahmawati D, et al. (2023). *Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Karsa Cendekia.

Jenkins DR. (2017). *Nosocomial infections and infection control*. Medicine, Volume 45, Issue 10, Pages 629-633.

Kayser FH, BIenz KA, Eckert J, Zinkernagel RM. *Medical Microbiology*. (2005). New York: Thieme Stuttgart, pages 1-25.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Penatagunaan Antimikroba di Rumah Sakit*. Edisi I. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kesehatan RI, hlm 1-6.

Pratiwi RH. (2017). Mekanisme Pertahanan Bakteri Patogen Terhadap Antibiotika. Dalam *Jurnal Pro-Life*, Volume 4, Nomor 3, November 2017. ISSN e-jurnal 2579-7557, hlm 419-422.

Pratiwi ST. (2008). *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sardi A. (2021). *Infeksi Nosokomial: Jenis Infeksi dan Patogen Penyebabnya*. Seminar Nasional Riset Kedokteran 2 (SENSORIK), hlm 117-123.

Sikora A, Zahra F. Nosocomial Infections. [Updated 2020 Jul 6]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559312/>

PROFIL PENULIS

apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS


Penulis merupakan tenaga pendidik di Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur.

Penulis menyelesaikan Pendidikan S1, profesi, dan pascasarjana di Universitas Airlangga. Buku Mikrobiologi Farmasi adalah buku kedua yang diterbitkan oleh Rizna Media. Baginya, menjadi pendidik dan mengajar ibarat mengalirkan kebaikan yang tiada habisnya.



Email Penulis: arumaisyah81@gmail.com





BAB 9

JENIS MIKROBA DI ALAM DAN BERMANFAAT DI DUNIA FARMASI

(Dr. apt. Muntasir. S.Si., M.Si.)

Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucipto Penfui Kupang NTT 85001 Telp. 0380

821410

Email: muntasir@staf.undana.ac.id,
munbasrypps@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Mikroba, sebagai makhluk hidup bersel satu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, memiliki peran penting dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Di alam, mikroba terdiri dari berbagai jenis, termasuk bakteri, jamur, alga, dan virus. Keberadaan mereka tidak hanya berkontribusi pada siklus biogeokimia, tetapi juga memberikan manfaat signifikan di bidang farmasi. Dalam konteks ini, pemahaman tentang jenis mikroba yang ada di alam dan manfaatnya dalam dunia farmasi menjadi sangat penting. Mikroba dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti morfologi, fisiologi, dan peran ekologis. Beberapa jenis mikroba yang umum ditemukan di alam:

Bakteri: Mikroba prokariotik ini berperan sebagai pengurai dalam ekosistem. Mereka dapat ditemukan di hampir setiap lingkungan, mulai dari tanah hingga air, dan beberapa spesies memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibiotik yang digunakan dalam pengobatan. Spesies itu adalah Jamur, Alga, dan Virus.

Jamur adalah mikroba eukariotik yang juga berfungsi sebagai pengurai. Beberapa jenis jamur menghasilkan senyawa bioaktif yang memiliki potensi sebagai obat, seperti penisilin yang dihasilkan oleh *Penicillium chrysogenum*.

Alga: Mikroba fotosintetik ini berkontribusi pada produksi oksigen dan menjadi sumber makanan dalam rantai makanan akuatik. Beberapa alga juga digunakan dalam industri farmasi untuk menghasilkan senyawa bioaktif.

Virus: Meskipun sering dianggap patogen, beberapa virus memiliki aplikasi terapeutik, seperti dalam terapi gen dan vaksin.

Mikroba memiliki berbagai aplikasi dalam industri farmasi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Beberapa contoh pemanfaatan mikroba dalam bidang farmasi:

Produksi Antibiotik: Bakteri seperti *Streptomyces* spp. dikenal sebagai produsen antibiotik alami. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada manusia dan hewan.

Senyawa Bioaktif: Banyak jamur menghasilkan senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai obat antikanker, antiinflamasi, dan antivirus. Contohnya adalah paclitaxel yang diperoleh dari bakteri endofit pada tanaman *Taxus* spp., yang digunakan dalam pengobatan kanker.

Vaksin: Mikroba digunakan dalam produksi vaksin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin berbasis mikroba telah terbukti efektif dalam mencegah berbagai infeksi.

Enzim Terapeutik: Enzim yang dihasilkan oleh mikroba digunakan dalam terapi enzim untuk mengobati penyakit metabolik tertentu.

Probiotik: Bakteri baik seperti *Lactobacillus* spp. dan *Bifidobacterium* spp. digunakan sebagai probiotik untuk mendukung kesehatan pencernaan dan sistem imun.

Fermentasi Produk Kesehatan: Mikroba juga digunakan dalam proses fermentasi untuk memproduksi makanan dan

minuman kesehatan, seperti yogurt dan kefir, yang memiliki manfaat probiotik.

Keberagaman jenis mikroba di alam memberikan banyak peluang untuk pengembangan produk farmasi yang inovatif dan efektif. Dengan memanfaatkan potensi mikroba secara optimal, kita dapat mengatasi berbagai tantangan kesehatan global saat ini, termasuk resistensi antibiotik dan pencarian obat baru untuk penyakit yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai mikroba dan aplikasinya di bidang farmasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta memberikan solusi bagi masalah kesehatan yang ada.

Mikroba juga berperan dalam proses fermentasi yang menghasilkan berbagai produk kesehatan, termasuk probiotik bermanfaat bagi sistem pencernaan manusia. Probiotik, terutama dari genus *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, telah terbukti meningkatkan kesehatan usus serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan multistrain probiotik dapat memberikan manfaat imunomodulator signifikan yang membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit.

Mikrobiologi farmasi telah membuka jalan bagi inovasi dalam pengembangan obat baru. Dengan eksplorasi lebih lanjut terhadap mikroba yang ada di alam, peneliti dapat menemukan senyawa baru dengan aktivitas antimikroba, antikanker, atau antiinflamasi. Contohnya adalah penelitian tentang metabolit sekunder dari jamur dan alga yang menunjukkan potensi sebagai bahan aktif dalam produk farmasi. Penemuan ini tidak hanya memperkaya daftar obat tetapi juga memberikan alternatif baru untuk mengatasi masalah resistensi antibiotik yang semakin meningkat.

Selain itu, teknik rekayasa genetika memungkinkan para ilmuwan memodifikasi mikroba agar dapat memproduksi senyawa terapeutik dengan lebih efisien. Misalnya, mikroba dapat direkayasa untuk menghasilkan hormon atau antibodi

manusia yang diperlukan untuk terapi tertentu. Ini merupakan langkah maju signifikan dalam menciptakan obat-obatan lebih aman dan efektif.

Meskipun potensi mikroba di bidang farmasi sangat besar, terdapat tantangan perlu diatasi. Salah satunya adalah kebutuhan memastikan keamanan dan efektivitas produk berbasis mikroba sebelum dipasarkan. Pengujian kualitas mikrobiologi menjadi penting untuk menjamin bahwa sediaan farmasi tidak mengandung kontaminan berbahaya serta memenuhi standar mutu. Oleh karena itu, kolaborasi antara ilmuwan, industri farmasi, serta lembaga regulasi sangat diperlukan untuk mengembangkan pedoman tepat penggunaan mikroba di bidang kesehatan.

Peluang eksplorasi lebih lanjut juga sangat luas. Dengan kekayaan alam Indonesia melimpah, terdapat banyak spesies mikroba lokal belum sepenuhnya dieksplorasi. Penelitian lebih lanjut terhadap mikroba endemik dapat membuka jalan bagi penemuan obat baru sesuai kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia.

Mikroba, sebagai bagian integral dari ekosistem, memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang farmasi. Dengan kemampuannya untuk menghasilkan senyawa bioaktif dan berkontribusi pada proses biokimia, mikroba sering dianggap sebagai harta karun alam yang menyimpan potensi besar untuk terobosan dalam pengembangan obat dan terapi kesehatan. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang mikroba dan aplikasinya di bidang farmasi menjadi semakin relevan.

Mikroba sebagai harta karun alam menawarkan banyak potensi terobosan di bidang farmasi. Dari produksi antibiotik hingga pengembangan probiotik serta terapi genetik, keberadaan mikroba memberikan kontribusi signifikan terhadap inovasi kesehatan. Dengan penelitian terus berkembang serta pemanfaatan teknologi modern, masa depan mikrobiologi

farmasi menjanjikan harapan besar peningkatan kualitas hidup manusia melalui solusi kesehatan lebih efektif dan aman.

Penjelasan selanjutnya akan memberikan uraian tentang berbagai mikroba yang digunakan di bidang farmasi.

B. BAKTERI : KLASIFIKASI DAN PERANNYA DALAM FARMASI

Bakteri memiliki peran yang sangat penting dalam bidang farmasi, terutama dalam produksi obat-obatan, vaksin, dan berbagai bahan aktif lainnya. Berikut adalah sepuluh bakteri yang berkontribusi signifikan di bidang ini:

1. *Streptomyces*

Genus ini terkenal sebagai penghasil antibiotik, termasuk streptomisin dan tetrasiklin. *Streptomyces* juga digunakan untuk menghasilkan senyawa bioaktif lainnya yang memiliki potensi terapeutik (Damayanti et al., 2022).

2. *Bacillus subtilis*

Dikenal sebagai bakteri probiotik, *Bacillus subtilis* berperan dalam kesehatan pencernaan dan juga digunakan dalam produksi antibiotik seperti bacitracin. Selain itu, ia dapat meningkatkan kualitas makanan melalui fermentasi (Fariz Fadillah et al., 2023)

3. *Bacillus thuringiensis*

Bakteri ini terkenal sebagai insektisida alami yang digunakan dalam pertanian. Dalam konteks farmasi, *Bacillus thuringiensis* dapat berkontribusi pada pengembangan pestisida biologis yang lebih aman (Agustine et al., 2024)

4. *Escherichia coli*

Beberapa strain *E. coli* digunakan dalam bioteknologi untuk memproduksi protein terapeutik dan vaksin. Misalnya, strain rekombinan dapat menghasilkan insulin manusia (Damayanti et al., 2022)

5. *Lactobacillus*

Sebagai bakteri probiotik, spesies *Lactobacillus* seperti *Lactobacillus acidophilus* dan *Lactobacillus rhamnosus* berperan dalam kesehatan usus dan pembuatan produk fermentasi seperti yogurt (Sulastri et al., 2022)

6. *Bacillus cereus*

Walaupun dikenal sebagai patogen, beberapa strain dari *Bacillus cereus* dapat menghasilkan enzim yang digunakan dalam industri farmasi untuk proses bioteknologi (Habib et al., 2017)

7. *Corynebacterium glutamicum*

Bakteri ini digunakan dalam produksi asam amino, terutama asam glutamat, yang merupakan bahan penting dalam industri farmasi dan makanan (Unggul, 2020)

8. *Pseudomonas aeruginosa*

Meskipun sering menjadi patogen, *Pseudomonas aeruginosa* juga digunakan dalam penelitian untuk pengembangan antibiotik baru dan terapi gen.

<https://itb.ac.id/berita/orasi-ilmiah-prof-marlia-singgih-ungkap-peran-mikrobiologi-farmasi-terhadap-produk-farmasi-di-indonesia/58008>

9. *Nocardia*

Beberapa spesies dari genus ini memiliki kemampuan menghasilkan antibiotik seperti nocardicin, yang efektif terhadap infeksi tertentu (Damayanti et al., 2022)

10. *Rhodococcus*

Bakteri ini dikenal karena kemampuannya dalam bioremediasi dan produksi senyawa bioaktif, termasuk antibiotik dan enzim yang dapat digunakan dalam pengobatan.

Peran bakteri ini di bidang farmasi sangat penting untuk pengembangan obat-obatan baru, vaksin, dan terapi yang lebih efektif serta aman bagi pasien

C. JAMUR: APLIKASI DAN POTENSI DALAM PENGEMBANGAN OBAT

Jamur memiliki peran penting dalam bidang farmasi, terutama dalam pengembangan obat-obatan dan terapi kesehatan. Berikut adalah sepuluh golongan jamur yang memiliki kontribusi signifikan di bidang ini:

1. *Lentinus edodes* (Shiitake)

Jamur shiitake dikenal karena kandungan lentinan, yang berfungsi sebagai imunomodulator dan memiliki sifat antitumor. Penelitian menunjukkan bahwa shiitake dapat membantu menurunkan kolesterol dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh (<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis>)

2. *Agaricus bisporus* (Jamur Kancing)

Jamur ini sering digunakan dalam makanan dan juga memiliki potensi sebagai sumber senyawa bioaktif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jamur kancing dapat berkontribusi pada kesehatan jantung dan memiliki sifat antikanker (Rahmawati, 2015)

3. *Pleurotus ostreatus* (Jamur Tiram)

Jamur tiram kaya akan nutrisi dan mengandung beta-glucan yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Jamur ini juga memiliki efek hipoglikemik, sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes (Wibowo et al., 2023).

4. *Grifola frondosa* (Maitake)

Maitake dikenal karena kemampuannya dalam meningkatkan respons imun dan menurunkan kadar gula darah. Jamur ini juga berpotensi sebagai agen antikanker. (<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis>)

5. *Ganoderma lucidum* (Reishi)

Reishi telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional

untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Jamur ini dikenal sebagai adaptogen yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Rahmawati, 2015).

6. *Cordyceps sinensis*

Jamur ini terkenal karena kemampuannya meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Cordyceps juga menunjukkan potensi dalam terapi kanker dan pengobatan penyakit pernapasan <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis>

7. *Coriolus versicolor* (Turkey Tail)

Dikenal karena kandungan polisakarida krestin (PSK), jamur ini digunakan sebagai imunomodulator dalam pengobatan kanker. PSK telah terbukti meningkatkan keberlangsungan hidup pasien kanker <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis>

8. *Fomes fomentarius* (Jamur Tanduk Rusa)

Jamur ini mengandung senyawa bioaktif yang memiliki sifat antimikroba dan anti-inflamasi, sehingga berpotensi digunakan dalam pengembangan obat-obatan baru (Rahmawati, 2015).

9. *Hericium erinaceus* (Lion's Mane)

Lion's Mane dikenal karena kemampuannya merangsang pertumbuhan saraf dan meningkatkan fungsi kognitif. Jamur ini juga menunjukkan potensi dalam pengobatan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer (Wibowo et al., 2023).

10. Enoki (*Flammulina velutipes*)

Jamur enoki memiliki efek anti-kanker dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jamur ini juga kaya akan antioksidan yang bermanfaat untuk melawan radikal bebas(<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis>)

Dengan berbagai khasiat terapeutik yang dimiliki, jamur-jamur ini terus diteliti untuk pengembangan obat-obatan baru serta suplemen kesehatan yang lebih efektif dan aman bagi manusia.

D. VIRUS: PEMANFAATAN TEKNOLOGI VIROLOGI UNTUK FARMASI

Virus memiliki peran penting dalam bidang farmasi, terutama dalam pengembangan vaksin, terapi gen, dan pengobatan berbagai penyakit. Berikut adalah sepuluh golongan virus yang berkontribusi signifikan di bidang ini:

1. Virus Influenza

Virus ini menyebabkan flu dan menjadi target utama dalam pengembangan vaksin musiman. Vaksin influenza membantu melindungi populasi dari infeksi yang dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada kelompok rentan (<https://gudangilmu.farmasetika.com/farmakologi-obat-anti-virus/>); (Irawan & Ramadhania, 2018)

2. Virus Hepatitis B (HBV)

Virus ini bertanggung jawab atas infeksi hati yang kronis dan dapat menyebabkan sirosis serta kanker hati. Vaksin hepatitis B telah dikembangkan dan terbukti efektif dalam mencegah infeksi. (<https://gudangilmu.farmasetika.com/farmakologi-obat-anti-virus/>); (<https://www.alodokter.com/obat-antivirus>)

3. Virus Human Immunodeficiency Virus (HIV)

HIV menyebabkan AIDS dan menjadi fokus utama dalam penelitian untuk terapi antiretroviral. Terapi ini membantu mengendalikan virus dan meningkatkan kualitas hidup penderita <https://gudangilmu.farmasetika.com/farmakologi-obat-anti-virus/>
<https://www.alodokter.com/obat-antivirus>

4. Virus Papilloma Manusia (HPV)
HPV terkait dengan kanker serviks dan beberapa jenis kanker lainnya. Vaksin HPV telah dikembangkan untuk mencegah infeksi dan mengurangi risiko kanker
<https://www.alodokter.com/obat-antivirus>
5. Virus Varicella-Zoster (VZV)
Penyebab cacar air dan herpes zoster, virus ini memiliki vaksin yang efektif untuk mencegah cacar air serta mengurangi keparahan herpes zoster pada orang dewasa.
6. Virus Measles (Campak)
Virus campak sangat menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius. Vaksin campak merupakan bagian dari vaksin kombinasi MMR (Measles, Mumps, Rubella) yang telah berhasil menurunkan angka kejadian penyakit ini secara signifikan.
7. Virus Rabies
Rabies adalah penyakit fatal yang disebabkan oleh virus rabies. Vaksin rabies digunakan sebagai profilaksis pasca-paparan untuk mencegah perkembangan penyakit setelah gigitan hewan terinfeksi (Irawan & Ramadhania, 2018)
8. Virus Dengue
Virus dengue menyebabkan demam berdarah dengue (DBD). Meskipun belum ada perawatan spesifik, vaksin dengue telah dikembangkan untuk mengurangi risiko infeksi pada individu yang tinggal di daerah endemik
<https://www.alodokter.com/obat-antivirus>
9. Adenovirus
Adenovirus digunakan dalam penelitian untuk pengembangan vaksin dan terapi gen karena kemampuannya menginfeksi sel manusia tanpa menyebabkan penyakit yang parah.
<https://www.alodokter.com/obat-antivirus>

10. Virus Ebola

Meskipun jarang, virus Ebola memiliki tingkat kematian yang tinggi. Vaksin Ebola telah dikembangkan dan digunakan dalam outbreak untuk melindungi individu yang berisiko tinggi terpapar virus.

<https://www.alodokter.com/obat-antivirus>

Peran virus dalam bidang farmasi sangat beragam, mulai dari pengembangan vaksin hingga terapi inovatif untuk berbagai penyakit, menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut di bidang virologi dan farmakologi.

E. PROTOZOA: KONTRIBUSI DALAM PENEMUAN OBAT BARU

Protozoa adalah mikroorganisme bersel tunggal yang memiliki peran penting dalam bidang farmasi, terutama dalam pengembangan obat dan terapi. Berikut adalah sepuluh golongan protozoa yang memiliki kontribusi signifikan di bidang ini:

1. Plasmodium

Genus ini terdiri dari beberapa spesies yang menyebabkan malaria, seperti *Plasmodium falciparum* dan *Plasmodium vivax*. Penelitian tentang siklus hidup dan mekanisme infeksi protozoa ini telah menghasilkan obat antimalaria, seperti klorokuin dan artemisinin (Arviani., 2023).

2. Leishmania

Protozoa ini menyebabkan penyakit leishmaniasis. Obat-obatan seperti antimonat dan miltefosin dikembangkan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh *Leishmania spp.*, memberikan alternatif bagi pasien di daerah endemic (Arviani., 2023)

3. *Trypanosoma*
Genus ini mencakup spesies penyebab penyakit tidur (trypanosomiasis) dan Chagas. Obat seperti pentamidin dan benznidazol digunakan untuk mengobati infeksi ini, yang sangat penting di daerah tropis (Arviani., 2023)
4. *Entamoeba histolytica*
Penyebab amebiasis, protozoa ini dapat menyebabkan diare berat dan abses hati. Metronidazol dan tinidazol adalah obat yang sering digunakan untuk mengobati infeksi ini (Arviani., 2023)
5. *Giardia lamblia*
Penyebab giardiasis, infeksi ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Obat seperti metronidazol dan nitazoxanide efektif dalam pengobatan infeksi yang disebabkan oleh protozoa ini (Depkes, 2020)
6. *Toxoplasma gondii*
Protozoa ini dapat menyebabkan toksoplasmosis, terutama pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Pyrimethamine dan sulfadiazine adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi ini.(Arviani., 2023)
7. *Cryptosporidium parvum*
Penyebab cryptosporidiosis, protozoa ini dapat menyebabkan diare berat, terutama pada orang dengan HIV/AIDS. Nitazoxanide adalah salah satu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi ini (Arviani., 2023), (Depkes, 2020)
8. *Acanthamoeba*
Beberapa spesies *Acanthamoeba* dapat menyebabkan keratitis dan infeksi otak pada individu dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Obat seperti propamidin isethionate digunakan dalam pengobatan keratitis akibat infeksi ini (Arviani., 2023)
9. *Naegleria fowleri*
Meskipun sangat jarang, protozoa ini dapat menyebabkan meningitis amuba primer (PAM) yang fatal. Penelitian terus

dilakukan untuk menemukan terapi efektif, meskipun saat ini tidak ada pengobatan yang terbukti efektif secara konsisten (Arviani., 2023)

10. *Balantidium coli*

Protozoa penyebab balantidiasis, infeksi ini umumnya terjadi pada manusia yang terpapar dengan kotoran babi. Tetracycline dan metronidazol adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi ini (Depkes, 2020)

Protozoa memiliki dampak besar dalam pengembangan terapi medis, baik sebagai patogen penyebab penyakit maupun sebagai subjek penelitian untuk pengembangan obat baru di bidang farmasi.

F. ALGA: SENYAWA BIOAKTIF DARI MIKROALGA UNTUK FARMASI

Alga, baik makroalga maupun mikroalga, memiliki potensi besar dalam bidang farmasi. Mereka mengandung berbagai senyawa bioaktif yang dapat digunakan untuk pengembangan obat-obatan, suplemen kesehatan, dan produk kosmetik. Berikut adalah sepuluh golongan alga yang memiliki peran penting dalam pembuatan obat di bidang farmasi:

1. Alga Merah (Rhodophyta)

Alga merah, seperti *Gracilaria* dan *Gelidium*, dikenal sebagai sumber agar dan karagenan. Senyawa ini digunakan sebagai bahan pengental dan stabilizer dalam berbagai sediaan farmasi. Selain itu, alga merah juga mengandung senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas antibakteri dan antikanker (Amaranggana & Wathoni, 2017).

2. Alga Coklat (Phaeophyta)

Contoh alga coklat seperti *Laminaria* dan *Fucus* mengandung fucoidan, yang memiliki sifat antikoagulan dan dapat digunakan dalam pengobatan penyakit kardiovaskular. Fucoidan juga menunjukkan aktivitas antiinflamasi dan

antitumor (Amaranggana & Wathoni, 2017).

3. *Spirulina (Arthrospira platensis)*

Mikroalga ini kaya akan protein, vitamin, dan mineral. *Spirulina* memiliki potensi sebagai suplemen nutrisi dan juga menunjukkan aktivitas antioksidan yang bermanfaat dalam pencegahan penyakit degenerative (Panjaitan & Purwati, 2022)

4. *Dunaliella salina*

Mikroalga ini terkenal karena kandungan beta-karoten yang tinggi, yang berfungsi sebagai antioksidan dan dapat digunakan dalam pengobatan untuk berbagai kondisi kulit serta sebagai suplemen kesehatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Panjaitan & Purwati, 2022).

5. *Chlorella*

Mikroalga ini kaya akan klorofil dan nutrisi lainnya, serta memiliki potensi dalam detoksifikasi tubuh. *Chlorella* juga digunakan dalam suplemen untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan sistem imun (Panjaitan & Purwati, 2022)

6. *Caulerpa racemosa*

Alga hijau ini telah diteliti karena aktivitas antibakterinya terhadap berbagai patogen. Senyawa aktif yang diekstrak dari *Caulerpa racemosa* menunjukkan potensi untuk dikembangkan sebagai agen antibakteri dalam sediaan farmasi (Singkoh, 2011)

7. *Nannochloropsis*

Mikroalga ini kaya akan asam lemak omega-3, yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. *Nannochloropsis* juga digunakan dalam produk suplemen untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

8. *Agarophyton*

Alga ini merupakan sumber agar yang banyak digunakan dalam industri farmasi sebagai media kultur mikroba serta bahan dasar untuk sediaan gel dan kapsul (Amaranggana & Wathoni, 2017).

9. Ecklonia cava

Alga coklat ini mengandung senyawa polifenol dengan aktivitas antioksidan yang kuat, serta menunjukkan potensi dalam pengobatan penyakit inflamasi dan kanker. Lilis wahyu ariani. 2017.

(<https://kanalpengetahuan.farmasi.ugm.ac.id/2023/03/17/alga-berbau-tetapi-kaya-manfaat/>)

10. Sargassum

Alga coklat ini telah diteliti karena kandungan senyawa bioaktifnya yang memiliki efek antimikroba dan antiinflamasi, sehingga berpotensi digunakan dalam pengembangan obat-obatan herbal (Amaranggana & Wathoni, 2017)

Dengan berbagai khasiat terapeutik yang dimiliki alga-alga ini, penelitian lebih lanjut terus dilakukan untuk mengeksplorasi potensi mereka sebagai sumber bahan baku obat-obatan di bidang farmasi.

Beberapa mikroba yang menghasilkan Senyawa Antibiotik dengan aktivitas spektrum dapat dilihat pada tabel 9.1 di bawah ini

Tabel 9.1
Senyawa Antibiotik dengan aktivitas spektrum

Senyawa Antibiotik	Mikroorganisme Penghasil	Aktivitas Spektrum
Actinomycin D	Streptomyces sp	Anti-tumor
Asparaginase	Erwinia sp	Anti-leukimia
Bacitracin	Bacillus sp	Anti-bakterial
Bleomycin	Streptomyces sp	Anti-cancer
Cephalosporin	Acremonium sp	Anti-bacterial
Chloramphenicol	Chepalosporium sp	Anti-bacterial
Daunorobicin	Streptomyces sp	Anti-protozoal

Fumagilin	Aspergillus sp	Amobicidal
Griseofulvin	Penicillium sp	Anti-fungal
Mitomycin C	Streptomyces sp	Anti-tumor
Natamycin	Streptomyces sp	Food preservative
Nicin	Streptococcus sp	Food preservative
Penicillin G	Penicillium sp	Anti-bakterial
Rifamycin	Nocardia sp	Anti-tuberculosis
Streptomycin	Streptomyces sp	Anti-bakterial

(Unggul, 2020)

G. PROSPEK MASA DEPAN MIKROBA DI FARMASI

Mikrobiologi memiliki peranan yang sangat penting dalam industri farmasi, terutama dalam pengembangan obat-obatan dan terapi kesehatan. Dengan kemajuan teknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang mikroorganisme, prospek masa depan mikrobiologi di bidang farmasi menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan.

1. Pengembangan Obat Berbasis Mikroba

Mikroba, seperti bakteri dan jamur, merupakan sumber utama untuk pengembangan obat baru. Banyak antibiotik dan agen terapeutik lainnya berasal dari metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Misalnya, penemuan senyawa bioaktif dari mikroba simbiosis dalam spons laut menunjukkan potensi besar untuk pengembangan obat antikanker dan antibakteri. Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dapat menghasilkan obat-obatan baru yang lebih efektif melawan patogen yang resisten terhadap antibiotik saat ini.

2. Inovasi dalam Probiotik dan Terapi Mikroba

Probiotik telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa tahun terakhir, dengan penelitian yang menunjukkan manfaat kesehatan yang signifikan. Probiotik tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesehatan pencernaan tetapi juga berpotensi dalam mengatasi berbagai penyakit,

termasuk gangguan autoimun dan infeksi⁴. Dengan meningkatnya pemahaman tentang mikrobioma manusia, terapi berbasis probiotik dapat menjadi pilihan alternatif yang lebih aman dibandingkan dengan penggunaan antibiotik konvensional.

3. Bioteknologi dan Produksi Vaksin

Kemajuan dalam bioteknologi memungkinkan pengembangan vaksin berbasis mikroba yang lebih efisien. Vaksin rekombinan dan vaksin berbasis virus hidup attenuated adalah contoh bagaimana mikrobiologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan respons imun tubuh terhadap penyakit infeksi. Selain itu, penelitian tentang vaksin berbasis probiotik juga menunjukkan potensi untuk meningkatkan efektivitas vaksinasi.

4. Penelitian dan Pengembangan Berkelanjutan

Lulusan jurusan mikrobiologi memiliki peluang besar untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan di industri farmasi. Mereka dapat bekerja sebagai peneliti mikrobiologi, ahli bioteknologi, atau spesialis diagnostik, berkontribusi pada penemuan obat baru dan peningkatan metode pengujian keamanan produk. Dengan dukungan fasilitas laboratorium modern dan kolaborasi dengan industri, lulusan dapat mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

5. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun prospek terlihat cerah, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Persaingan di pasar kerja semakin ketat, dan lulusan harus memiliki keterampilan tambahan serta pengalaman praktis untuk menonjol di antara kandidat lainnya. Selain itu, masalah etika dan regulasi terkait penggunaan mikroorganisme dalam penelitian dan produksi obat juga harus diperhatikan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, prospek masa depan mikrobiologi di bidang farmasi sangat menjanjikan dengan banyaknya peluang untuk inovasi dan penelitian. Dengan terus berkembangnya teknologi dan pemahaman tentang mikroorganisme, industri farmasi akan semakin bergantung pada kontribusi ilmu mikrobiologi untuk menciptakan solusi kesehatan yang efektif dan berkelanjutan.

REFERENCE

- Agustine, D., Sani, M. D., Massora, M., Astuti, W. W., & Ruimassa, R. M. R. (2024). *Mikrobiologi* (Tri Putri Wahyuni (ed.)). CV Lauk Puyu Press.
- Amaranggana, L., & Wathoni, N. (2017). Manfaat Alga Merah(Rhodopyta) sebagai Sumber Obat dari Bah. *Majalah Farmasetika*, 2(1), 16–19. https://doi.org/10.1007/978-3-642-91046-3_33
- Arviani., dkk. (2023). *Farmakognosi: Menelusuri Rahasia Obat Dari Alam*.
- Damayanti, E., Hamid, F., & Sjahril, R. (2022). Isolasi Antimikroba Baru dari Bakteri Tanah. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 2(2), 176. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v7i2.11266>
- Depkes. (2020). *Obat-obatan Antiprotozoa Oral*.
- Fariz Fadillah, M., Rezaldi, F., Kolo, Y., Hidayanto, F., Mubarak, S., Studi, P., Pangan, T., Program, S., Agroteknologi, F., Pertanian, M., Pasuruan, J., Timur, I., Program,), & Tanaman, S. B. (2023). Antibakteri Pada Produk Bioteknologi Farmasi Berupa Formulasi Dan Sediaan Sabun Mandi Gel Kombucha Buah Nanas Madu Subang. *Pharmacy Medical Journal*, 6(2), 84.
- Habib, I. M. Al, Sukamto, D. S., & ... (2017). Potensi Mikroba Tanah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.). *Folium Jurnal Ilmu ...*, 1(1), 28–36. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/faperta/article/view/1011>

- Irawan, A. R., & Ramadhania, Z. M. (2018). Review: simulasi molecular docking dan molecular dynamics senyawa aktif terhadap neuraminidase dari influenza. *Farmaka*, 17(2), 180–186. <https://doi.org/10.24198/jf.v17i2.21993.g11633>
- Panjaitan, R. S., & Purwati, P. (2022). Penyuluhan Tentang Pemanfaatan Alga (Makroalga & Mikroalga) Pada Farmasi (Drugs and Cosmetics). *Pharmacy Action Journal*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.52447/paj.v2i1.6438>
- Rahmawati, S. (2015). Jamur Sebagai Obat. *Jurnal Agroindustri Halal*, 1(1), 014–024.
- Singkoh, M. F. O. (2011). AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ALGA LAUT *Caulerpa racemosa* DARI PERAIRAN PULAU NAIN Marina Flora Oktavine Singkoh 1. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis*, 7(3), 123–127.
- Sulastri, E., Andriani, C., Zainudin, M., Wardhani, S., Astriani, M., & Ariyanto, E. (2022). Review: Peran Mikrobiologi Pada Industri Makanan. *Indobiosains*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31851/indobiosains.v4i1.6444>
- Unggul, U. E. (2020). 0 / 16. *Identifying and Selection System Development*, Nsa 637, 0–15.
- Wibowo, D. P., Faturochman, A., Sari, I. P., Ma'la, A., & Saonah, N. (2023). 9. *Potensi Jamur Tiram_ Full.pdf* (Pertama). Deepulish Publisher.

PROFIL PENULIS

Dr. apt. Muntasir. S.Si., M.Si.

Staf dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana mulai Agustus 2023 yang sebelumnya berada pada program studi Kesehatan Masyarakat dari tahun 2003. mengajarkan mata kuliah : Biokimia, Kimia Analisis Kualitatif, Kimia Analisis Kuantitatif, Metode Pemisahan, Analisis Instrumen, Kimia Kesehatan, Biokimia Gizi, Biomedik I dan II, dan Kewirausahaan Kesehatan dengan sertifikat dosen bidang keahlian Biomedik. Mengajar pada prodi Magister S2 sejak 2016 pada mata kuliah Biokimia Gizi, Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan, Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Menyelesaikan Doktorat di Program Studi Ilmu Kimia pada kajian Pencemaran Sianida di lingkungan tahun 2016 di Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini juga sebagai staf pengajar program studi S2 IKM Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.



Email : muntasir@staf.undana.ac.id

Alamat : Perumahan RSS Baumata Blok C No. 2 Baumata Barat.
Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur,
85361

Buku Referensi dan book Chapter yang sudah dituliskan dan terbit, yaitu :

1. **Muntasir.** 2018. **Kewirausahaan Bidang Kesehatan** ISBN 978-602-5668-68-5. Penerbit Litera Nusa Inspirasi. Bandung;
2. **Muntasir.** 2019. **Kimia Kesehatan** ISBN 978-602-6478-47-4 Penerbit LP2M Universitas Nusa Cendana. Kupang;
3. **Muntasir.** 2019. **Manajemen Logistik Kesehatan** ISBN 978-623-7276-47-0. Penerbit Litera Nusa Inspirasi. Bandung;

4. Herniwati, **Muntasir.**, dkk. 2020. Buku Chapter **Etika Hukum Kesehatan**. ISBN: 978-623-92777-8-9
5. **Wahyuddin, E.** dkk. 2021. **Dari lontara pabbura ke pharmaceutical care : refleksi akademisi dan alumni Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin dalam penanganan Covid-19** ISBN 978-979-5303-35-0
6. Zulkarnain Hamson, **Muntasir**, dkk. 2021. **Informasi Teknologi di Dunia Ilmu Kesehatan** ISBN 978-623-6290-38-5. Penerbit Media Sains Indonesia
7. **Muntasir dkk**, 2021. **Antibiotik dan Resistensi Antibiotik.**; ISBN 978-623-98733-6-3
8. **Muntasir**, 2021. **Biomedik**. ISBN 978-623-285-700-1.
9. **Muntasir**, 2022. **Inovasi Alat Musik Sasando Elektrik**, ISBN 978-623-99679-2-5
10. **Muntasir dkk**, **Imu Biomedik Dasar**, 2022. ISBN 978-623-8050-10-9
11. **Dr. Sri Syatriani, SKM., M.Kes., Dr. Apt. Muntasir, S.Si, M.Si dkk.** 2023. **Surveilans Kesehatan Masyarakat**. ISBN 978-623-8050-35-2
12. **Muntasir, dkk.** 2024. **Biokimia Farmasi, ISBN 978-623-8050-46-8**
13. Marthen Robinson Pellokila, Intje Picauly, **Muntasir.** Dkk. 2024. **Determinan Gizi dan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Lahan Kering Kepulauan.** ISBN.

PENUTUP

Kami Tim Penulis Buku

MIKROBIOLOGI FARMASI

apt. Andi Ifriany Harun, S.Si., M.Si.

Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.

Etha Marista, S.Si., M.Si.

Mahyarudin, S.Si., M.Si.

apt. Imanda Dyah Rahmadani, S.Farm., M.Farm.

apt. Reni Yustiati Saksono, S.Si., M.Sc.

apt. Mahdalena Sy Pakaya, S.Farm., M.Si.

apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS.

Dr. apt. Muntasir. S.Si., M.Si.

Mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam pembuatan buku ini dan semoga suatu saat kami bisa melanjutkan tulisan kami di edisi selanjutnya dengan tema buku yang sama ataupun berbeda.



MIKROBIOLOGI FARMASI

Mikrobiologi farmasi adalah cabang mikrobiologi yang mempelajari keterkaitan mikroorganisme dalam dunia kefarmasian. Cabang ini melibatkan studi tentang mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan obat-obatan, dengan fokus pada upaya untuk meminimalkan jumlah mikroorganisme dalam lingkungan proses produksi, menghilangkan mikroorganisme serta produk sampingan mikroba seperti eksotoksin dan endotoksin dari air dan bahan baku lainnya, serta memastikan bahwa produk farmasi yang dihasilkan dalam keadaan steril.

Buku ini terdiri dari :

BAB 1 RUANG LINGKUP MIKROBIOLOGI FARMASI DAN KLASIFIKASI MIKROBA BERDASARKAN BENTUK DAN SUSUNAN SEL

BAB 2 SEL PROKARIOTA DAN EUKARIOTA DAN MIKROBA UNISEL DAN MULTISELULER

BAB 3 PERTUMBUHAN MIKROBA, KURVA PERTUMBUHAN, PERHITUNGAN JUMLAH SEL, PERSYARATAN PERTUMBUHAN

BAB 4 PENGENDALIAN PERTUMBUHAN MIKROBA, STERILISASI, DESINFEKTAN, KONDISIASEPTIS

BAB 5 FAKTOR YANG MPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN MEDIA PERTUMBUHAN

BAB 6 JALUR METABOLISME MIKROBA , MODIFIKASI JALUR METABOLISME DAN AKTIVITAS ANTIMIKROBA

BAB 7 VIRUS, KAPANG, KHAMIR SERTA KLASIFIKASI, SIFAT, CARA HIDUP, PERTUMBUHAN DAN PENGENDALIANNYA

BAB 8 MIKROBA PATOGEN (BAKTERI, VIRUS DAN CANDIDA) DAN RESISTENSI MIKROBA SERTA INFEKSI NOSOKOMIAL

BAB 9 JENIS MIKROBA DI ALAM DAN YANG BERMANFAAT DI DUNIA FARMASI

PENERBIT

CV RIZMEDIA PUSTAKA INDONESIA

Jl. Batara Ugi/Griya Astra Blok C. No.18

(Yogyakarta/Makassar)

Telp/Wa:085242065812

Email: rizmediapustaka@gmail.com

Website: rizmediapustakaindonesia.com



035/SSL/2022