BAHAN PAKAN DAN FORMULASI RANSUM

KHAERANI KIRAMANG

Alauddin University Press

Scanned by CamScanner

KHAERANI KIRAMANG

BAHAN PAKAN DAN FORMULASI RANSUM

ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

Scanned by CamScanner

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

BAHAN PAKAN DAN FORMULASI RANSUM

Penulis:
KHAERANI KIRAMANG

Editor:
AMRIANA HIFIZAH

Cetakan: I 2011
viii - 166 halaman, 14 cm x 21 cm

Alauddin University Press
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

Scanned by CamScanner

SAMBUTAN REKTOR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadiran Allah swt, karena atas kasih dan sayang-Nya, semua proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN Alauddin dapat berjalan dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw.

Dalam bingkai kesadaran kolektif, UIN Alauddin telah menetapkan tiga misi utama, yaitu; pencerdasan, pencerahan dan prestasi. Misi ini menjadi sebuah ikhtiar untuk menuju kampus berperadaban, yaitu sebuah kampus yang mampu menghadirkan astmosfer akademik, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai spiritual, serta mempertajam *skill* di kalangan civitas akademika agar mampu menjawab tuntutan masyarakat dan dinamika perkembangan global.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan misi di atas, maka menghidupkan tradisi akademik melalui publikasi ilmiah merupakan sebuah alternatif yang perlu dikembangkan. Lahirnya publikasi ilmiah dalam bentuk buku yang telah dihasilkan oleh sivitas akademika tentu menjadi sebuah media yang tidak saja dapat dinikmati secara internal di lingkungan UIN Alauddin, tetapi juga dapat menjangkau ke segmen yang lebih luas.

Atas dasar itu, UIN Alauddin telah merancang program "Gerakan Seribu Buku" yang bertujuan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh civitas akademika untuk mengeksplorasi potensi *akademica-intelektiva* dan potensi praktis aktual yang dimiliki. Gagasan/program ini dapat dikatakan sebagai sebuah "*jihad akbar*" yang memerlukan keberanian dan komitmen bersama dalam rangka ikhtiar menghadirkan kampus peradaban yang diinginkan. Buku yang ada di tangan

Scanned by CamScanner

pembaca ini merupakan salah satu dari bentuk komitmen tersebut.

Selaku Rektor, saya sangat menyadari bahwa potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh sivitas Akademika UIN Alauddin merupakan aset dan modal dasar yang harus terus digali, diapresiasi dan dihargai. Penghargaan terhadap potensi dan karya akademik akan melahirkan kreasi, ide dan prestasi.

Perubahan IAIN menjadi UIN harus disertasi dengan perubahan kultur akademik ke arah yang lebih baik dan berkualitas. Perubahan yang terjadi tidak boleh berjalan tanpa desain yang pasti. Perubahan yang baik adalah perubahan yang terukur dan terstruktur sehingga hasilnya dapat dibaca dan dilihat. Urgensi perubahan sebagai sebuah keniscayaan biasanya menghasilkan perbedaan dari setiap perspektif. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa memang terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, tidak stagnan apalagi mundur ke belakang diperlukan parameter dan indikator sebagai panduan. Karena itu, program "Gerakan Seribu Buku" ini menjadi sangat penting untuk mengukur gerak perubahan tersebut.

Akhirnya, Rektor mengucapkan terimakasih kepada seluruh civitas akademika UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga serta meluangkan waktunya untuk menghasilkan karya akademik ini. Semoga karya ini dapat dinikmati, bukan saja oleh kalangan UIN Alauddin Makassar, juga oleh masyarakat pada umumnya.

Samata, 29 Desember 2011
Rektor,

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, MS

Scanned by CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta Ala atas segala kesempatan, hidayah dan inayahNya dariNya sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan jua. Shalawat dan taslim kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa petunjuk bagi manusia ke jalan yang di ridhai oleh Allah SWT. Ucapan terimahkasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini. Terkhusus kepada keluarga tercinta penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga atas dukungannnya dalam proses penyelesaian buku ini dari awal hingga rampungnya penulisan buku. Tak lupa pula ucapan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., MS dan Panitia Gerakan Seribu Buku atas kesempatan yang diberikan untuk menulis buku Bahan Pakan dan Formulasi Ransum. Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan mahasiswa dalam matakuliah yang sama. Buku ini disusun sesuai dengan kurikulum dan kompetensi yang diharapkan dimiliki mahasiswa dalam matakuliah Bahan Pakan dan Formulasi Ransum. Buku ini membahas mengenai bahan pakan dan seputarnya, pengklassifikasian bahan pakan, evaluasi terhadap bahan pakan, jenis-jenis bahan pakan, Energi dalam bahan pakan, pengolahan dan penyimpanan bahan pakan, kebutuhan ternak akan pakan berdasarkan fungsi-fungsi hidupnya serta metodologi penyusunan ransum ternak. Akhir kata penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca buku ini. Sekian dan terimakasih

Tertanda
Penulis

Scanned by CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

SAMBUTAN REKTOR iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Pengenalan Umum Bahan Pakan 1
1.2. Klasifikasi Bahan Pakan 4

BAB II EVALUASI BAHAN PAKAN 17
2.1. Evaluasi Fisik 19
2.2. Evaluasi Kimia 21
2.3. Evaluasi Biologi 48
2.4. Evaluasi Ekonomi 58

BAB III KADAR ENERGI BAHAN PAKAN 63
3.1. Defenisi dan Terminologi Energi 63
3.2. Disposisi Energi Dalam Tubuh Ternak 64

BAB IV JENIS-JENIS BAHAN PAKAN 73
4.1. Bahan Pakan Hijauan 74
4.2. Bahan Pakan Biji-Bijian..... 100

BAB V PENGELOLAAN DAN
PENYIMPANAN BAHAN PAKAN DAN
HUBUNGANNYA DENGAN KUALITAS 119

BAB VI KEBUTUHAN TERNAK ATAS JENIS,
UMUR DAN FUNGSI-FUNGSI HIDUP 127
6.1. Pertumbuhan 127

Scanned by CamScanner

6.2. Reproduksi 134
6.3. Laktasi 139

BAB VII METODE PENYUSUNAN DAN FORMULASI RANSUM 151

DAFTAR PUSTAKA 163

Scanned by CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta Ala atas segala kesempatan, hidayah dan inayahNya dariNya sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan jua. Shalawat dan taslim kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah membawa petunjuk bagi manusia ke jalan yang di ridhai oleh Allah SWT. Ucapan terimahkasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini. Terkhusus kepada keluarga tercinta penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga atas dukungannnya dalam proses penyelesaian buku ini dari awal hingga rampungnya penulisan buku. Tak lupa pula ucapan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., MS dan Panitia Gerakan Seribu Buku atas kesempatan yang diberikan untuk menulis buku Bahan Pakan dan Formulasi Ransum.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan mahasiswa dalam matakuliah yang sama. Buku ini disusun sesuai dengan kurikulum dan kompetensi yang diharapkan dimiliki mahasiswa dalam matakuliah Bahan Pakan dan Formulasi Ransum. Buku ini membahas mengenai bahan pakan dan seputarnya, pengklassifikasian bahan pakan, evaluasi terhadap bahan pakan, jenis-jenis bahan pakan, Energi dalam bahan pakan, pengolahan dan penyimpanan bahan pakan, kebutuhan ternak akan pakan berdasarkan fungsi-fungsi hidupnya serta metodologi penyusunan ransum ternak. Akhir kata penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca buku ini. Sekian dan terimakasih

Tertanda

Penulis

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Pengenalan Umum Bahan Pakan

Makanan merupakan kebutuhan yang paling vital bagi kelangsungan hidup semua mahluk hidup di muka bumi ini. Makanan merupakan 1 (satu) dari 3 (tiga) hal yang merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu usaha ternak. Makanan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimakan dan dicerna oleh mahluk hidup serta memberi kemanfaatan bagi kehidupan dan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, makanan harus mengandung bahan-bahan yang bermanfaat bagi mahluk hidup yang mengkonsumsinya.

Makanan dalam dunia peternakan dikenal dengan istilah pakan. Pakan ternak adalah semua jenis makanan yang dapat dimakan dan dicerna oleh ternak serta memberikan kemanfaatan bagi kehidupan dan kelangsungan hidup ternak. Sedangkan bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan oleh ternak yang tidak menimbulkan bahaya bagi ternak. Oleh karena itu, bahan pakan harus mengandung bahan-bahan yang bermanfaat bagi kehidupan ternak. Bahan-bahan yang bermanfaat tersebut dikenal dengan istilah zat makanan. Zat makanan ini terdiri atas karbohidrat sebagai sumber energi, protein sebagai zat pembangun, vitamin dan mineral sebagai zat pengatur.

Pakan ternak yang sudah tersusun dari beberapa jenis bahan pakan biasanya disebut ransum. Pengertian ransum sendiri adalah campuran 2 (dua) atau lebih bahan pakan yang telah dikalkulasi kandungan nutrisinya cukup untuk kebutuhan ternak dalam 24 jam. Sumber bahan pakan dapat berasal dari golongan tumbuhan maupun dari golongan hewan. Tumbuhan dalam rantai makanan menempati posisi sebagai produsen dengan kemampuannya untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam tubuhnya dalam bentuk buah, umbi, daun dan batang. Hewan dan manusia digolongkan sebagai konsumen karena menggunakan tumbuhan sebagai sumber makanan yang dipergunakan untuk tumbuh kembang, produksi dan reproduksi.

Bahan pakan dari tumbuhan utamanya rumput, lebih banyak dikonsumsi oleh ternak/hewan ruminansia. Hal ini berkaitan erat dengan anatomi sistem pencernaan yang ada pada setiap ternak. Sedangkan yang berupa biji-bijian lebih banyak dikonsumsi oleh hewan/ternak monogastrik. Sebagaimana menurut Flanders (2011), bahwa kebutuhan makanan dan jenis makanan yang dibutuhkan setiap spesies hewan itu beragam. Kebutuhan makanan ditentukan oleh bentuk lambung atau perut dan jenis makanan yag dapat mereka cerna. Tipe lambung hewan ternak terdiri atas lambung ruminansia dan non-ruminansia. Selanjutnya dikatakan bahwa hewan/ternak sangat beragam dalam macam dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Kebutuhan nutrisi ternak sangat tergantung pada umur, tingkat aktifitas,

keturunan, jenis kelamin, kondisi lingkungan, kondisi tubuh dan tingkat reproduksi. Sebagai contoh sapi pada masa laktasi membutuhkan level nutrisi yang lebih tinggi dibanding yang tidak sedang laktasi. Tingkat kebutuhan nutrisi berubah-ubah sepanjang hidup ternak. Bila satu atau lebih zat-zat nutisi tersebut hilang maka akan mempengaruhi kesehatan ternak, pertumbuhan terhambat, menyebabkan penyakit, menambah biaya pakan dan dalam kasus yang lebih ekstrim menyebabkan kematian.

Oleh karena keberagaman kebutuhan ternak terhadap nutrisi, maka pengetahuan terhadap bahan pakan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menyusun ransum bagi ternak. Hal ini sangat berkaitan 3 (tiga) hal penting yaitu 1) kualitas; 2) kuantitas; dan 3) kontinuitas bahan pakan. Kualitas bahan pakan meliputi aspek yang cukup luas cakupannya berkaitan dengan kualitas bahan pakan dalam hal ini adalah kandungan nutrisi. Misalnya pada bahan pakan hijauan, mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, prosessing, pengolahan dan penyimpanan bahan pakan akan berpengaruh terhadap kualitas nutrisi bahan pakan. Kuantitas bahan pakan meliputi jumlah bahan pakan yang menyusun suatu ransum. Adapun kontinuitas adalah ketersediaan bahan pakan tersebut untuk mensuplai bahan baku pakan ternak yang akan disusun.

Selain 3 tiga hal diatas, hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam menyusun ransum adalah jumlah jenis bahan pakan yang akan dipakai, imbangan nutrisi dari semua bahan pakan yang dipakai dalam ransum serta perbandingan yang tepat agar ransum dapat bernilai ekonomi. Namun yang paling penting untuk diperhatikan adalah imbangan nutrisi yang terdapat dalam ransum dapat memenuhi kebutuhan ternak yang bersangkutan.

Flanders (2011) lebih lanjut menyatakan bahwa zat-zat nutrisi adalah senyawa dan elemen yang terdapat dalam makanan yang mensuplai kebutuhan nutrisi ternak untuk menunjang kesehatan dan produksi ternak. Ada 6(enam) zat nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak yaitu protein, karbohidrat, lemak (lipid), vitamin, mineral dan air. Air, karbohidrat dan lemak tersusun dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen dalam beragam konfigurasi. Sedangkan protein mengandung nitrogen selain ketiga unsur tersebut. Komposisi zat nutrisi yang ada dalam masing-masing bahan pakan sangat beragam. Untuk mengetahui komposisi dari semua jenis bahan pakan biasanya dilakukan analisa proksimat. Melalui analisa proksimat dapat diketahui protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kadar abu, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen. Pembahasan mengenai analisa proksimat akan dibahas lebih lanjut pada Bab evaluasi bahan pakan.

1.2. Klassifikasi Bahan Pakan

Bahan pakan ternak tersedia bermacam-macam di alam baik dari golongan tumbuhan maupun hewan. Demi kemudahan dalam mengenal dan mempelajari semua bahan pakan tersebut, maka bahan pakan tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para ahli. Dryden (2008) menyatakan bahwa klassifikasi makanan adalah mengelompokkan makanan tersebut dalam beberapa kelas, sehingga makanan yang terdapat dalam satu kelas yang sama memiliki nilai nutrisi yang kurang lebih sama serta dapat digunakan dengan cara yang sama. Makanan yang memiliki bentuk atau tampilan yang sama juga memiliki nilai nutrisi yang sama. Ini melampaui pertimbangan sederhana dari kandungan gizi bahan pakan terhadap fungsinya dalam mempengaruhi produksi hewan dan jenis penggunaan bahan pakan tersebut. Sebagai contoh, bungkil kedelai, bungkil biji kapas dan bungkil bunga matahari yang merupakan produk hasil olahan ekstraksi minyak dari minyak biji-bijian dan digunakan untuk meningkatkan kandungan protein makanan, sedangkan gandum, jagung, dan padi-padian adalah biji-bijian sereal dan kaya akan sumber energi yang tercerna. Tidak hanya makanan yang berasal dari sumber yang sama memiliki kandungan nutrisi yang sama, tetapi mereka juga memiliki efek yang serupa pada kesehatan hewan dan kualitas produk hewani, dan digunakan dengan cara yang sama ketika kita menyusun pakan hewan. Klasifikasi makanan akan membantu memprediksi kualitas dan potensi penggunaan makanan baru (jika kita tahu kelas pakan tersebut), atau untuk memilih bahan pakan alternative yang tidak lagi tersedia.

Banyak jenis bahan pakan yang tersedia untuk memasok kebutuhan gizi ternak. Semua bahan pakan ini merupakan bahan baku yang diubah menjadi sel-sel hewan, jaringan, organ, dan produk daripada ternak. Pengetahuan terhadap komposisi kimia dan nutrisi dari berbagai kelas bahan pakan sangat penting untuk dapat menyusun ransum paling ekonomis dan menguntungkan. Selain itu pengenalan terhadap berbagai jenis bahan pakan juga merupakan hal yang sangat penting untuk merencanakan penanaman, pemanenan, dan penyimpanan bahan pakan. Penanganan terhadap penyimpanan persediaan bahan pakan adalah faktor penting yang mempengaruhi keuntungan usaha peternakan.

Bahan pakan dikombinasikan untuk menghasilkan ransum. Dua faktor utama yang mempengaruhi pemilihan bahan pakan dan proporsi relatif dari bahan pakan dalam ransum adalah kandungan gizi dan biaya bahan pakan tersebut. Profil nutrisi dari ransum yang dihasilkan harus sedapat mungkin mendekati profil nutrisi kebutuhan ternak. Biaya bahan pakan dapat dianalisa berdasarkan biaya per unit nutrisi yang terdapat dalam bahan pakan tersebut. Perlu dicatat bahwa, secara teknis, istilah ransum dan makanan/pakan adalah dua

istilah yang berbeda. Ransum adalah kombinasi dari bahan pakan yang diberikan dalam sehari. Pakan adalah kombinasi dari bahan pakan yang diberikan selama jangka waktu yang lebih luas.

Satu bahan pakan adalah satu komponen dari suatu ransum atau makanan yang mempunyai satu atau lebih fungsi. Fungsi bahan pakan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori. Kategori pertama adalah bahan pakan menyediakan satu atau lebih dari 6 (enam) nutrisi esensial. Kategori kedua adalah bahan pakan memodifikasi karakteristik dari pakan seperti meningkatkan palatabilitas atau meningkatkan fermentasi rumen. Sebuah contoh bahan pakan yang memiliki setidaknya satu fungsi di masing-masing 2 (dua) kategori tadi adalah hay alfalfa. Pada ruminansia, hay alfalfa menyediakan nutrisi seperti protein, CHO, mineral, dan vitamin dan juga meransang fermentasi rumen.

Ada beberapa cara untuk mengelompokkan bahan pakan sebagaimana yang akan dibahas selanjutnya.

1.2.1. Klasifikasi Bahan Pakan secara Internasional

Satu jenis bahan pakan didefinisikan sebagai komponen dari suatu ransum yang mempunyai beberapa fungsi yang bermanfaat. Secara umum bahan pakan yang terdapat dalam ransum diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi. Disamping itu, bahan pakan yang terdapat dalam ransum juga diharapkan dapat menyediakan kebutuhan akan serat, mengurangi oksidasi, emulsi lemak, memberikan rasa, meningkatkan kesehatan hewan, atau meningkatkan karakteristik dari produk yang dihasilkan oleh hewan ternak. Karena ada ribuan bahan pakan yang digunakan dalam menyusun ransum ternak, maka pembahasan mengenai bahan pakan harus dibuat berdasarkan kelompok atau jenis bahan pakan dengan karakteristik umum. Secara International telah ada kesepakatan dalam mengelompokkan bahan pakan kedalam 8 kelas, yaitu (Haris *et al.*,1968, 1980 dalam Dryden 2008) :

1. Dry Forage and roughage
2. Pasture, range plants and forages
3. Silages
4. Energy Foods
5. Protein Supplements
6. Mineral Supplements
7. Vitamin Supplements
8. Additives

Ad.1. Dry forage and roughage;

Hijauan kering dan serat; terbagi atas hay (hijauan yang dikeringkan) legume dan non legume, jerami dan tanaman hijauan lainnya dengan atau tanpa biji dan bahan lainnya yang mengandung lebih dari 18 % serat kasar dari bahan kering/DM (Setara dengan 20-25% serat ADF). Kelas ini mencakup semua hijauan yang dikeringkan atau dianginkan hingga kadar airnya turun sampai $\pm$ 14 % dan roughages potongan seperti ampas tebu tongkol jagung, serbuk gergaji. Forages atau roughages yang rendah dalam energi bersih per unit berat, biasanya karena kandungan serat yang tinggi. Serat yang tinggi mengakibatkan produk gas tinggi dalam perut. Produk-produk seperti kulit biji-bijian, polong, kulit padi, sekam dan lain-lain termasuk dalam kelompok ini. Straw atau jerami termasuk dalam kelas ini yaitu sisa pertanian yang telah diambil hasil utamanya.

Gambar 1. Persediaan Hay

Sumber: dmv5.blogspot.com

Gambar 2. Pengeringan Hay

Sumber : disnakprov.jabar.go.id

Ad.2. Pasture, range plants and forage;

Hijauan pakan dari ladang ternak, rumput lapangan dan hijauan makanan ternak yang dipotong dan dipelihara sebagaimana tanaman pertanian lainnya, merupakan hijauan segar baik dari pasture atau ladang ternak, rumput padangan serta pohon hijauan pakan lainnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah semua hijauan yang segar, baik yang langsung dimakan dilapangan maupun rumput potongan. Fodder yaitu hijauan yang ditanam seperti jagung dipanen pada saat karbohidratnya tinggi, proteinnya tidak menurun dan serat kasarnya tidak begitu tinggi. Termasuk dalam kelompok ini adalah stover.

Gambar 3. Pasture dan Hijauan ternak

Sumber: ramayamakmur.wordpress.com

Ad.3. Silages ;

Silase adalah hijauan segar yang diawetkan dengan teknologi fermentasi sehingga tetap mengandung kadar air yang tinggi dengan warna relative tidak berubah. Kelas ini mencakup hijauan ensiled (jagung, alfalfa, rumput, dan lain-lain)

Gambar 4. Silase hijauan

Sumber: foragri.blogsome.com

Ad.4. Energy Foods;

Pakan sumber energy; bahan pakan yang termasuk golongan ini adalah yang mengandung kurang dari 18% serat kasar dan protein kurang dari 20% dibagi atas golongan sereal, hasil olahan golongan padi-padian, buah-buahan, dan umbi-umbian. Termasuk dalam kelompok ini adalah produk dengan kurang dari 20 persen protein (bahan kering) dan kurang dari 18 persen serat kasar (bahan kering) misalnya, biji-bijian, by-produk industry penggilingan seperti dedak padi, molasses.

Ad.5. Protein supplements;

Bahan pakan sumber protein; semua bahan pakan yang mengandung serat kasar kurang dari 18% serat kasar dan lebih dari 20 % protein; terbagi atas bahan pakan sumber protein asal hewan seperti, by product unggas, hasil perikanan, susu dan hasil sisanya, tumbuhan seperti biji-bijian yang berasal dari leguminosa, NPN misalnya Urea dan single cell protein (SCP) misalnya jenis Algae. Kelas ini termasuk produk yang mengandung 20 persen atau lebih protein (bahan kering) asal hewan (termasuk produk ensiled) gluten, dan lain-lain.

Ad.6. Mineral Supplement;

Bahan pakan sumber mineral; semua bahan pakan sumber mineral seperti kulit kerang, batu kapur, dan garam-garam mineral lainnya.

Ad. 7. Vitamin Supplement;

Bahan pakan sumber vitamin; umumnya dikenal dalam bentuk komersial; vitamin premix

Ad. 8. Additives;

dibagi ke dalam kelompok subtansi non-nutritif digunakan dalam makanan, termasuk antibiotik, zat pewarna, agen anabolik, pengubah rumen, pengikat pelet, hormon, penambah rasa dan obat-obatan.

Sistem tersebut diatas adalah pengelompokan bahan pakan yang telah disepakati secara internasional. Setiap sistem tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Klasifikasi bahan pakan tersebut diatas cukup luas karena suatu bahan pakan dapat dianggap sebagai pakan sumber energi juga sebagai sumber protein, misalnya hijauan tertentu dapat dianggap sebagai sumber energi sekaligus juga sebagai sumber protein.

Jenis bahan pakan ternak sangat beragam dan secara lokal terdapat perbedaan masing-masing pakan. Ada kurang lebih 2000 jenis bahan pakan ternak, dari jumlah pakan

sedemikian dapat pula dikelompokkan ke dalam bahan pakan konvensional dan non konvensional atau inkonvensional.

1.2.2. Bahan Pakan konvensional

Bahan pakan konvensional adalah bahan pakan yang sudah dikenal dan disepakati sebagai bahan pakan ternak. Bahan pakan ini sudah dikenal secara umum sebagai bahan pakan ternak, baik yang lokal maupun yang merupakan bahan pakan impor. Pembahasan mengenai jenis bahan pakan ini akan dibahas pada bab III selanjutnya.



Gambar 5. Klassifikasi Bahan Pakan

1.2.3. Bahan Pakan Inkonvensional

Bahan pakan inkonvensional adalah bahan pakan yang tidak umum dikenal sebagai bahan pakan bagi ternak, contohnya adalah daun pisang, batang pisang, kulit pisang, daun nangka, daun waru, hasil sisa limbah pasar dan sebagainya. Bahan pakan inkonvensional adalah bahan pakan yang dapat diberikan dan dimakan oleh ternak. Bahan pakan inkonvensional biasanya lebih bersifat lokal karena berdasarkan kebiasaan dan potensi daerah. Bahan pakan ini umumnya merupakan limbah yang tidak digunakan lagi tetapi masih memiliki potensi nutrisi yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dapat berupa limbah hasil pertanian ataupun limbah agroindustri. Akan tetapi karena merupakan hasil sisa atau produk samping pertanian atau agroindustri, maka kualitas nutrisinya sangat rendah meskipun masih dapat dimakan oleh ternak. Faktor pembatas pada bahan pakan ini adalah :

1) Tingginya kandungan serat pakan

2) Kemungkinan adanya antinutrisi, misalnya HCN pada onggok

3) Kandungan protein yang rendah

4) Kadar garam atau mineral bahan pakan.

Negara maju biasanya membagi lagi kelas bahan pakan kedalam kategori tertentu / grade berdasarkan bobot, kadar air dan keutuhan bahan. Misalnya jagung terbagi ke dalam jagung grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, dan grade 5. Ketentuan grade tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Standar kategori grade bahan pakan (biji-bijian)

Grade	Bobot (pound)	Kadar Air (%)	Rusak/pecah (%)
1	56	14	> 2
2	54	15,5	3
3	52	17,5	4
4	49	20	5
5	46	23	7

Hijauan

Dalam sistem NRC, kategori 1 sampai 3 meliputi hijauan. Kategori-kategori hijauan berbeda, apakah tanaman tersebut diawetkan atau makan segar, dan jika diawetkan, bagaimana. Istilah roughage atau serat sinonim dengan istilah hijauan, tetapi karena istilah serat memiliki konotasi yang agak negatif ("kasar"), kurang disenangi banyak ahli gizi. Sebagian besar bahan pakan yang digolongkan hijauan ternak adalah “bulky”, seratnya tinggi memiliki berat dan kandungan gizi yang rendah per satuan unit volume.

Kandungan Protein, mineral, dan vitamin dari hijauan sangat bervariasi. Legum dapat mengandung 25 persen protein. Hijauan lainnya seperti jerami mungkin hanya 5 persen protein kasar. Kandungan mineral juga sangat bervariasi. Sebagian besar hijauan, khususnya kacang-kacangan, merupakan sumber kalsium yang relatif baik. Kandungan Fosfor sedang hingga rendah dan kalium adalah relatif tinggi untuk kebutuhan kebanyakan hewan. Kandungan magnesium dari hijauan biasanya baik tetapi dalam keadaan tertentu, binatang mengkonsumsi lebih banyak hijauan dapat mengalami defisiensi magnesium. Mineral mikro sangat bervariasi tergantung pada spesies tanaman, tanah, dan cara pemupukan.

Sejumlah faktor dapat mempengaruhi komposisi hijauan dan nilai gizi.

6. Kematangan memiliki salah satu efek yang paling menonjol. Sebagai tanaman hijauan dewasa, protein dan karbohidrat larut konten penurunan sedangkan serat dan meningkatkan kandungan lignin. Lignin tidak hanya dicerna sendiri, tetapi juga memiliki efek kulit keras yang mengurangi kecernaan komponen sel tanaman. Keberadaan lignin sangat membatasi kecernaan hijauan.

7. Kesuburan tanah, pemupukan, dan cuaca diketahui memiliki efek pada kuantitas pakan yang diproduksi. Kualitas hijauan juga dapat dipengaruhi oleh semua faktor-faktor tersebut.

3. Metode Pemanenan dan penyimpanan dapat memiliki efek yang signifikan terhadap nilai gizi pakan. Sebagai contoh, teknik pemanenan secara signifikan menyebabkan hilangnya daun yang akan mengurangi kandungan gizi bahan pakan tersebut. Rumput mencakup semua spesies liar dan dibudidayakan digunakan untuk penggembalaan, serta spesies sereal gandum yang dibudidayakan. Dibandingkan dengan legume pada kematangan yang sama, kandungan protein dan kalsium dari rumput hampir selalu lebih rendah.

Legum

Melalui asosiasi dengan bakteri di nodul akar, legume dapat mengikat nitrogen dari atmosfer. Ini berarti bahwa legum dapat membuat protein dalam jaringan dari nitrogen di udara lebih baik dari nitrogen dalam tanah. Pada legum, nitrogen atmosfer diubah menjadi amonia, yang digunakan untuk memproduksi asam amino. Asam-asam amino yang digunakan dalam sintesis protein nabati.

Beberapa legum, rentan menyebabkan kembung pada sapi. Kembung disebabkan oleh busa-memproduksi senyawa seperti sitoplasma protein dan pectins. Busa di dasar kerongkongan menghambat mekanisme eructation yang mengarah ke akumulasi gas rumen yang normal. Selama rumen membengkak dan tekanan meningkat, perluasan rongga dada saat bernafas menjadi sulit. Tanpa pertolongan, sesak napas dan / atau jantung akan terjadi.

Hijauan kering

Pembuatan Hay telah dilakukan selama berabad-abad sebagai metode yang efektif untuk menjamin persediaan hijauan. Dengan pengembangan metode baru penyimpanan hijauan, pebuatan hay telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, bentuk hay adalah unik di antara bahan pakan. Namun ukuran panjang dan sifat bulkiness berguna dalam menunjang kesehatan pencernaan herbivora, terutama pakan yang tinggi biji-bijian. Tujuan dari pembuatan hay adalah untuk menjamin persediaan hijauan dengan mengeringkan tanaman melalui proses curing sehingga jamur tidak dapat tumbuh dan enzim bakteri pembusuk tidak dapat berfungsi.

Kualitas dan kuantitas hay tergantung pada kematangan tanaman ketika dipotong, kondisi metode penanganan, kadar air, dan cuaca saat panen. Hijauan yang akan dibuat hay harus dipanen pada saat dewasa agar memberikan hasil nutrisi maksimum per unit tanah tanpa menyebabkan kerusakan pada tanaman berikutnya. Tingkat

kematangan untuk legume adalah saat tumbuh, kuncup, mekar, dan tahap dewasa atau benih. Tingkat kematangan dari rumput adalah saat tumbuh, boot, kepala (berisi mekar), dan tahap dewasa atau benih. Untuk mendapatkan nutrisi yang optimum, tingkat kematangan yang direkomendasikan memotong legum dan rumput adalah ketika bunga mekar pertama kali. Baik legum dan rumput, penundaan waktu panen menghasilkan kualitas nutrisi yang tidak optimal. Memotong hasil sebelumnya dalam menghasilkan lebih sedikit tetapi kualitas yang lebih tinggi, dan menjalankan risiko merusak tanaman, terutama kacang-kacangan. Selama proses pengawetan, kelembaban berkurang, sehingga meningkatkan kandungan bahan kering. Kelembaban dedaunan segar akan berkisar dari 75 sampai 90 persen (materi konten kering 10-25 persen). Kelembaban hay harus tidak lebih dari 20 persen (bahan kering tidak kurang dari 80 persen) untuk dapat disimpan tanpa perubahan nutrisi.

Bahan kering hay yang hilang mulai dari pemotongan sampai saat pemberian pakan adalah 20 sampai 30 persen (Undersander et al., 1994). Kerugian dalam pembuatan hay umumnya terkait dengan kegiatan panen dan termasuk penghancuran dan pemutihan/penjemuran. Daun kering lebih cepat dari batang, dan akan cenderung menjadi rapuh dan bisa jatuh. Ini disebut pecah. Karena sebagian besar nutrisi dalam jerami terdapat pada daun, proses pemanenan yang merusak sebagian hijauan akan mengurangi nilai gizi hay. Shattering adalah istilah yang menggambarkan jerami yang terlalu terang dengan matahari. Shattering atau pengeringan mengakibatkan hilangnya nilai vitamin.

Ada berbagai prinsip dan teknik yang dapat digunakan untuk meminimalkan kerugian saat panen dalam pembuatan hay. Pengeringan Cepat pada hay dapat meminimalkan penurunan nilai gizi. Pengeringan yang lambat sering disertai oleh pertumbuhan jamur, yang mengurangi palatabilitas dan nilai gizi. Pengeringan yang lambat juga dapat menyebabkan penurunan nilai gizi akibat aktivitas enzim tanaman dan mikroorganisme atau oksidasi. Crimping, untuk menghancurkan batang tanaman, mempercepat proses pengeringan. Untuk kacang-kacangan, zat pengering tersedia untuk menghilangkan lapisan cutin yang dilapisi lilin, mempercepat hilangnya air. Menambahkan pengawet seperti asam propionat pada tanaman dipotong memungkinkan untuk mengepak hay pada kadar air yang lebih tinggi (25 sampai 30 persen). Hal ini dapat membantu dengan panen di cuaca yang sulit dan akan meminimalkan“shattering”.

Dalam pengawetan hay, kehilangan daun harus diperkirakan selama pengeringan. Dehidrasi adalah sebuah alternatif untuk pembuatan hay yang meminimalkan kerugian akibat pengeringan. Tanaman dipanen dan dipindahkan ke sebuah fasilitas dehidrasi. Hay disimpan dalam bentuk kubus, bal, atau tumpukan. Setelah dibentuk kubus, bale, atau tumpukan, jerami

disimpan dengan baik akan mempertahankan nilai gizi selama bertahun-tahun. Namun, jerami yang disimpan terlalu basah mungkin kehilangan nilai gizi akibat aktivitas mikroorganisme. Aktivitas mikroorganisme pada hay kurang kering/lembab dalam mengurangi nilai gizi dalam tiga cara:

1. Mikroorganisme menghabiskan nutrisi .
2. Mikroorganisme dapat menghasilkan racun.
3. Mikroorganisme menghasilkan panas, yang dapat mengurangi ketersediaan hara.

DAFTAR PUSTAKA

Anggorodi, R., 1994. Ilmu Makanan Ternak Umum. Penerbit Gramedia Pustaka utama Jakarta.

Arthur E. Cullison., 1979. Feeds and Feeding. Reston Publishing Company, Inc, Virginia.

Dryden, Gordon McL, 2008. Animal Nutrition Science. Cambridge University Press, Cambridge.

Flanders, Frank B., 2011. Exploring Animal Science; chapter 6. Animal Nutrition and Feeding. www.books.google.co.id.

Mc Donald, R.A. Edwards., J.F.D. Greenhalgh., and C.A. Morgan., 2002. Animal Nutrition. 6th edition. Pearson Prentice-Hall.

Reksohadiprodjo, S. 1985. Produksi Tanaman Hijauan Makanan Ternak Tropik. BPFE, Yogyakarta.

Tillman, A.D., Hari Hartadi, Soedomo R., Soeharto P., dan Soekanto L., 1989. Ilmu Makanan Ternak Dasar. UGM Press, Yogyakarta.

BAB II EVALUASI BAHAN PAKAN

Metode evaluasi bahan pakan telah berkembang kurang lebih 150 tahun lamanya, dan telah melambungkan beberapa nama dalam bidang kimia. Awal perkembangan analisa kimia telah diuraikan oleh Tyler (1975) dan Midkiff (1984). Pada tahun 1805, Einhof telah mengekstrak serat makanan (ini berbeda dengan defenisi modern serat makanan sekarang) dengan mencuci dan menggosok makanan untuk mendapatkan sisa yang bertahan/endapan yang tertinggal. Beliau menganggap ini bukan bagian dari makanan. Penelitian lebih lanjut termasuk Thaer, Davy, Boussingault dan Wolf, secara khusus telah mengumumkan bahwa material serat ini tidak tercerna meskipun mereka tidak melakukan penelitian khusus untuk itu.

Secara bertahap, metode analisa kimia yang lebih spesifik telah dikembangkan untuk mengisolasi dan mengukur semua fraksi kimia yang berhubungan dengan nilai nutrisi makanan termasuk protein, lemak dan serat. Metode Liebig/Dumas untuk total N telah dikembangkan di tahuan 1830an dan 1840an dan metode kjeldahl telah dipublikasikan pada tahun 1883. Henneberg dan Stohmann mengembangkan analisa serat kasar pada tahun 1859.

Evaluasi terhadap bahan pakan sebelum memutuskan untuk memilih bahan pakan yang akan digunakan dalam menyusun ransum sangat penting dilakukan demi efisiensi dalam proses produksi usaha peternakan. Kualitas bahan pakan yang sangat bervariasi, menurut suparjo (2008) bahwa bervariasinya kualitas bahan pakan dapat dipengaruhi oleh :

1. Variasi alami (natural variation).

   Variasi alam pada kandungan nutrisi bahan makanan rata-rata sekitar 10 persen. Variasi komposisi kimia pada produk pertanian mungkin disebabkan oleh kesuburan tanah akibat pemupukan.

2. Pengolahan (prosessing).

   Perbedaan pengolahan produk agroindustri akan menghasilkanproduk atau limbah dengan kualitas yang berbeda. Contohnya: dedak padi yang diolah oleh jenis alat yang berbeda standarnya.

3. Pencampuran (Adulteration).

   Bahan pakan yang baik cenderung untuk dipalsukan dan atau dicampur dengan stu atau lebih bahan berkualitas rendah baik yang mengandung zat makanan maupun tidak. Secara umum pencampuran tidak hanya mengubah komposisi kimia tetapi juga cenderung menurunkan nilai gizi, contoh tepung ikan dapat dicampur dengan cangkang tiram giling yang akibatnya selain menurunkan kandungan protein juga menurunkan daya cerna bahan pakan tersebut.

4. Penurunan kualitas (damaging and deterioration).

   Penurunan kualitas dapat terjadi karena kerusakan bahan makanan tersebut jika tidak dilakukan penanganan, penyimpanan dan pengolahan dengan baik. Contoh : jagung dengan kadar air tinggi bila tidak dilakukan penanganan dengan baik akan mengalami kerusakan dengan tumbuhnya jamur.

Faktor pakan sangat menentukan produktifitas ternak selain faktor genetik dan manajemen pengelolaan. Evaluasi bahan pakan yang akan dibeli atau dipakai dalam susunan ransum meliputi aspek yang cukup kompleks tidak hanya sekedar melihat kualitas nutrisinya saja, tetapi juga melihat segi efisiensi bahan pakan itu sendiri ketika digunakan. Oleh karena pengenalan terhadap jenis-jenis bahan pakan serta cara pengujian bahan tersebut sangat penting untuk diketahui. Ada beberapa metode evaluasi terhadap bahan pakan, yaitu evaluasi fisik, evaluasi kimia, evaluasi biologi dan evaluasi ekonomi. Masing –masing jenis evaluasi bahan pakan tersebut akan diuraikan selanjutnya.

2.1. Evaluasi Fisik

Evaluasi bahan pakan secara fisik adalah penilaian terhadap kualitas dan sifat fisik bahan pakan secara inderawi manusia. Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap bahan pakan ternak atau dengan menggunakan alat bantu. Oleh karena itu, evaluasi terhadap bahan pakan secara fisik pada prinsipnya adalah melakukan suatu kegiatan pengamatan yang melibatkan pengumpulan data-data atau keterangan-keterangan dengan alat indera sebagai penerima. Melalui pengamatan secara fisik, pendugaan terhadap kualitas pakan dapat diperoleh. Keuntungan evaluasi fisik adalah: biaya relatif murah, cepat, sangat berguna pada kondisi lapangan dimana harus mengambil keputusan dengan segera. Kekurangan : berupa data kualitatif (kurang akurat), penetapan bersifat subjektif. Walaupun ada data yang kuantitatif, tetapi variasinya sangat lebar. Evaluasi bahan pakan secara fisik meliputi:

2.1.1. Evaluasi Secara Makroskopis

Evaluasi secara makroskopis mencakup penilaian tampilan fisik dengan panca indera, volume dan bobot pakan:

1. Mata/penglihatan untuk menilai tampilan warna, bentuk, berjamur, berbulu; penilaian terhadap tampilan warna bisa memberikan gambaran apakah bahan pakan tersebut masih fresh atau sudah disimpan lama dan kualitas pengeringannya.

2. Perabaan secara langsung menggunakan tangan untuk penilaian tekstur bahan pakan, halus atau kasarnya bahan pakan, menggenggam bahan pakan untuk melihat kompak tidaknya misalnya pada dedak bila masih kompak maka dedaknya masih bagus.
3. Penciuman yaitu dengan mencium aroma bahan pakan tersebut; apakah baunya masih harum khas bahan pakan yang bersangkutan ataukah sudah beraroma tengik, asam, busuk dan sebagainya. Apabila sudah terjadi perubahan aroma menjadi tengik atau busuk, maka kualitas bahan pakan tersebut sudah rusak atau terkontaminasi dengan bahan lain atau mikroorganisme patogen.
4. Digigit; biasanya untuk mengetahui kadar air bahan pakan bersangkutan.
5. Berat jenis (BD); pengujian terhadap berat jenis bahan pakan, yaitu dengan melarutkan bahan pakan tertentu misalnya dedak untuk melihat kualitas dedak, bila lebih banyak yang mengendap berarti lebih banyak putik beras yang terkandung dalam dedak tersebut, karena dedak terkadang dipalsukan dengan menggiling sekam padi sehingga tampilannya sangat bagus untuk meningkatkan harganya.

Contoh pengujian makroskopis :

Bahan pakan bentuk butiran dilakukan pengujian terhadap:

- Warna biji yang dominan
- Biji yang rusak
- Jumlah kotoran (%)
- Berat

Bahan pakan hijauan dilakukan pengujian terhadap :

1. Warna daun
2. lebar daun
3. Panjang daun
4. Perbandingan daun dan batang

Bahan pakan yang berbentuk mash/tepung, bentuk pengujian :

3. Warna
4. Bau
5. Ada tidaknya jamur

2.1.2. Evaluasi Secara Mikroskopis

Dengan tetap melalui panca indera dan menggunakan alat bantu berupa mikroskopis atau kaca pembesar atau NIRS. Melalui mikroskop dapat dilihat bentuk dan warna masing-masing bahan pakan. Meskipun dicampur tetap dapat dikenali masing-masing melalui bentuk tampilan masing-masing bahan dibawah mikroskop. Setiap bahan punya ciri-ciri struktur masing-masing. Selain itu dikenal juga pengujian fisik kuantitatif yang terdiri dari :

1. Faktor bahan (feed factor)
2. Teknik pemisahan (separation technique)

Evaluasi secara mikroskopis bertujuan untuk memeriksa ada tidaknya pemalsuan dalam bahan pakan komersial. Misalnya : dedak sering dipalsukan dengan sekam.

Cara pengujian pemalsuan :

- berdasarkan besar kecilnya ukuran partikel
- berdasarkan berat ringannya partikel

2.2. Evaluasi Kimia

Evaluasi bahan pakan dengan cara kimiawi untuk mendapatkan nilai kandungan zat makanan dalam suatu bahan pakan. Evaluasi ini menggunakan peralatan dan prosedur kerja analisis di laboratorium untuk mendapatkan nilai kandungan zat makanan. Keuntungan : menghasilkan data kuantitatif. Kekurangan: biaya relatif lebih mahal.

Metode kimia memberikan informasi tentang komposisi kimia yang terdapat dalam bahan pakan yang jumlahnya kecil. Namun informasi ini telah digunakan untuk memprediksi nilai gizi dan untuk tujuan ini sebagian besar metode kimia masih digunakan dalam nutrisi hewan. Ada beberapa parameter nilai zat pakan yang memiliki dampak atau refleks pada pencernaan, yang membenarkan pemanfaatannya untuk memprediksi nutrisi nilai. Diantaranya harus disebutkan nitrogen (protein kasar), serat kasar dan konstituen dinding sel.

Metode evaluasi bahan pakan telah berkembang kurang lebih 150 tahun lamanya, dan telah melambungkan beberapa nama dalam bidang kimia. Awal perkembangan analisa kimia telah diuraikan oleh Tyler (1975) dan Midkiff (1984). Pada tahun 1805, Einhof telah mengekstrak serat makanan (ini berbeda dengan defenisi modern serat makanan sekarang) dengan mencuci dan menggosok makanan untuk mendapatkan sisa yang bertahan/endapan yang tertinggal. Beliau menganggap ini bukan bagian dari makanan. Penelitian lebih lanjut termasuk Thaer, Davy, Boussingault dan Wolf, secara khusus telah mengumumkan bahwa material serat ini tidak tercerna meskipun mereka tidak melakukan penelitian khusus untuk itu.

Secara bertahap, metode analisa kimia yang lebih spesifik telah dikembangkan untuk mengisolasi dan mengukur semua fraksi kimia yang berhubungan dengan nilai nutrisi makanan termasuk protein, lemak dan serat. Metode Liebig/Dumas untuk total N telah dikembangkan di tahuan 1830an dan 1840an dan metode kjeldahl telah dipublikasikan pada tahun 1883. Henneberg dan Stohmann mengembangkan analisa serat kasar pada tahun 1859. Pada pertengahan abad, sudah ada konsep yang kuat dan lebih maju. Kemudian pada awal abad ke 20, sudah ada dasar kimia pangan yang betul-betul ditetapkan dan sudah ada data mengenai respon ternak terhadap beberapa jenis makanan yang berbeda.

2.2.1. Analisis Proximat

Proksimat berarti kira-kira atau kurang lebih. Analisa proksimat secara harfiah berarti analisa perkiraan atau pendekatan angka yang sebenarnya. Analisis proksimat adalah suatu sistem analisa makanan yang telah dikembangkan oleh 2 (dua) orang ilmuwan Jerman. Analisis proksimat dikembangkan di Weende Experiment Station Jerman oleh Hennerberg dan Stohmann. Oleh karena itu analisis ini sering juga dikenal dengan analisis Wendee . Analisis proksimat menggolongkan komponen yang ada pada bahan pakan berdasarkan komposisi kimia dan fungsinya, yaitu: air (moisture), abu (ash), protein kasar (crude protein), lemak kasar (ether extract), serat kasar (crude fiber) dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (nitrogen free extract). Analisis proksimat menggolongkan vitamin berdasarkan kelarutannya. Vitamin yang larut dalam air dimasukkan ke dalam fraksi air sedang yang larut dalam lemak dimasukkan ke dalam lemak kasar.



Gambar 6. Urutan komponen hasil analisa proksimat.

1. Kadar air/Bahan Kering

Meskipun air adalah zat makanan yang paling sederhana namun penentuannya dalam anlisa proksimat adalah yang paling sukar. Penentuan Kadar air ditentukan sebagai berat yang hilang dari makanan setelah diovenkan pada suhu 105^0C. Sampel makanan ditimbang dan diletakkan dalam cawan khusus dan dipanaskan dalam oven hingga berat sampel menjadi konstan. Setelah berat sampel tidak berubah lagi maka sampel tadi disebut bahan kering sedang selisih berat awal dengan berat akhir merupakan kadar air bahan.

Beberapa produk makanan bila dipanaskan lebih dari temperature 70^OC akan kehilangan zat-zat volatile (zat yang mudah menguap). Oleh karena itu, untuk penentuan kadar yang tepat , pemanasan denga temperature lebih rendah serta menggunakan desikator sangat dianjurkan.

$KA = \frac{x + y - z}{y} \times 100$ BK = 100 % - KA

dimana: x, adalah berat cawan y, adalah berat bahan

z, adalah berat setelah dioven.

Mengetahui kadar air suatu bahan pakan yang akan dibeli dapat membantu dalam membandingkan nilai makanan tersebut atas dasar bahan kering, untuk mendapatkan nilai makanan sebenarnya.

Bahan kering terbagi atas 2 yaitu bahan an organik untuk penentuan mineral (abu) seperti Ca, P dan bahan organik untuk penentuan protein kasar, meskipun dalam tubuh mahluk hidup tidak ada perbedaan yang jelas. Beberapa senyawa organik mengandung elemen mineral sebagai komponen struktural. Protein, contohnya, mengandung sulphur, dan beberapa lemak dan karbohidrat mengandung fosfor. Komponen utama bahan kering rumput hijauan ternak adalah karbohidrat, demikian pula hijauan lainnya serta beberapa biji-bijian. Secara kontras, kandungan karbohidrat dalam tubuh hewan sangat kecil. Salah satu alasan utama perbedaan tersebut adalah dinding sel tanaman terdiri atas karbohidrat utamanya selulosa sedang dinding sel hewan seratus persen tersusun atas lipid dan protein. Selanjutnya, tanaman menyimpan energi sebagian besar dalam bentuk karbohidrat seperti pati dan fruktan, sementara seekor hewan energi utamanya tersimpan dalam bentuk lipid.

Kandungan lipid tubuh hewan bervariasi, tergantung umur, hewan yang lebih tua mengandung lebih banyak proporsi lipid dibanding yang lebih muda. Kandungan lipid tanaman secara relative rendah, rumput pasture, contohnya ada 40-50 gr/kg bahan kering.

Pada tanaman dan hewan, protein mengandung senyawa utama nitrogen. Pada tanaman, dimana sebagian besar protein hadir sebagai enzim, konsentrasinya tinggi pada tanaman yang sedang tumbuh dan berkurang ketika dewasa. Pada hewan, otot, kulit, rambut, wool dan kuku sebagian besar mengandung protein.

Sebagaimana protein, asam nukleat juga mengandung senyawa nitrogen dan memiliki peran penting dalam sintesis protein pada semua mahluk hidup. Mereka juga membawa informasi genetik dari sel hidup.

Asam organik yang terdapat dalam tanaman dan hewan termasuk sitrat, malat, fumarat, suksinat dan asam piruvat. Meskipun secara normal keberadaannya dalam jumlahnya kecil, namun mereka memiliki peran penting pada metabolisme umum dari sel. Asam organik lainnya berasal dari produk fermentasi dalam rumen, atau pada silase, dan termasuk asetat, propionate, butirat dan asam laktat.

Vitamin ada pada tanaman dan hewan dalam jumlah kecil, dan beberapa dari vitamin tersebut merupakan komponen penting dari system enzim. Perbedaan penting antara tanaman dan hewan adalah tanaman dapat mensintesa semua vitamin yang mereka butuhkan untuk metabolisme, hewan tidak mampu, atau memiliki kemampuan sintesis yang sangat terbatas dan tergantung pada suplai dari luar/makanan.

Bahan an organik mengandung semua unsur yang ada pada tanaman dan hewan selain dari Karbon, hydrogen, oksigen dan nitrogen. Kalsium dan Fosfor adalah komponen utama pada hewan, sementara kalium dan silicon adalah unsur an organik utama pada tanaman.

2. Ekstrak Eter

Ekstrak eter ditentukan melalui pemeriksaan bahan pakan melalui ekstraksi yang berkesinambungan dengan ether selama periode tertentu. Residu atau bahan yang tertinggal setelah menguapkan pelarut, disebut ekstrak ether. Sebagaimana halnya lemak, residu tersebut mengandung asam-asam organik, alkohol dan pigment. Pada metode mutakhir resmi, pemisahan dengan ether ditetapkan melalui hidrolisa sampel dengan asam sulphat dan hasil residunya adalah asam ekstrak eter. Atau secara sederhana untuk dipahami bahan kering yang telah didapatkan pada saat mengukur persentase bahan kering, kemudian diekstraksi dengan dietil ether selama beberapa jam, setelah ether menguap, maka residunya adalah ekstrak ether.

Ekstrak eter digunakan untuk memisahkan lemak yang kemudian digunakan untuk pemecahan lebih detail lagi menjadi asam lemak dan lilin, meskipun demikian Ekstrak eter masih dianggap sebagai lipid total. Itulah sebabnya lemak yang diperoleh dari ekstrak ether disebut lemak kasar. Perhitungan lemak kasar harus dikali dengan 2,25, karena adanya komponen lain dalam lemak seperti vitamin. Dengan asumsi bahwa 1 gr bahan makanan DD (dapat dicerna) nilainya sama dengan 4 kkal, sedang 1 gr lemak DD nilainya sama dengan 9 kkal, maka 9/4 = 2,25.

Ekstrak eter dalam bahan makanan ternak yang berasal dari hewan biasanya terdiri dari gliserol dan tiga asam lemak. Namun bahan yang berasal dari tanaman, sterol, lilin dan berbagai produk seperti vitamin A, vitamin D, karoten seringkali seringkali jumlahnya lebih dari 50% lemak makanan. Dalam senyawa non-gliserida hanya mengandung sedikit energi, kandungan energi sebesar 9 kkal per gram tidak memenuhi kebutuhan, sehingga bahan yang mengandung non-gliserida nilai kalorinya lebih rendah dari itu. Nilai kalori yang rendah dapat dipakai untuk menetapkan nilai energi lemak hewan serta beberapa lemak tanaman terutama lemak hasil ekstraksi industry seperti biji kapas, kedelai,dan sebagainya. Terdapat

data yang cukup mengenai kandungan energi setiap jenis bahan pakan yang berguna untuk perhitungan kalori setiap bahan pakan dalam suatu ransum yang akan disusun.

3. Protein kasar

Kandungan protein dihitung dari kandungan nitrogen bahan pakan, ditentukan melalui tehnik modifikasi yang ditemukan oleh Kjeldahl lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada metode ini bahan pakan dicerna oleh asam sulfat, dimana semua nitrogen yang ada dikonversi ke ammonia kecuali yang ada dalam bentuk nitrat atau nitrit. Amonia ini dibebaskan melalui penambahan sodium hidroksida untuk dicerna, disaring dan dikumpulkan dalam standar asam, kemudian ditentukan melalui titrasi atau metode kalorimeter otomatis. Diasumsikan bahwa nitrogen dari protein mengandung 16 % nitrogen, dan dengan mengalikan perkiraan nitrogen dengan 6,25 (yaitu 100/16) perkiraan nilai protein diperoleh. Ini bukanlah protein yang sebenarnya karena metode ini juga mengukur nitrogen dari sumber lain selain protein seperti, asam amino bebas, amina dan asam nukleat, dan karena itu disebut protein kasar.

Setiap asam amino dari protein memiliki fungsi khusus dalam metabolisme. Setiap protein tanaman dan hewan mengandung asam amino yang digunakan untuk menyusun protein tubuh. Dengan alasan inilah maka kebutuhan tubuh adalah asam amino bukan dan bukan protein. Bila asam amino dikonsumsi berlebihan, maka kelebihannya akan dideaminasi dan sisa non-nitrogennya dapat dijadikan cadangan energi. Grup amino yang ada dibentuk oleh hati menjadi urea, NH_2-CO- NH_2, yang dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal bersama kemih. Urea adalah suatu produk yang teroksidasi tak sempurna yang masih mengandung energi kimia yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Dalam keadaan ini, protein mengandung energi kira-kira 5,50 kkal/gr bahan kering. Bila digunakan sebagai sumber energi, maka kira-kira 1,25 kkal dari energi yang dikeluarkan sebagai urea dari tiap unit protein, meninggalkan 4,25 kkal per gram bahan kering dalam tubuh. Dari angka 4,25 ini selanjutnya berkurang menjadi 4,0 kkal/gr karena tidak sempurnya digesti protein dalam saluran pencernaan. Sehingga bila 1 gr BETN memberikan 95% energi potensialnya kepada tubuh, maka sebagai perbandingan, protein menyediakan 70% dari energi potensialnya kepada tubuh. Kenyataannya, protein kasar dalam analisis yang mendekati angka nyata proksimat hanya dicantumkan energi fraksi yang tidak dapat menggambarkan komposisi asam amino dalam protein. Untuk itu diperlukan analisis khusus lebih lanjut. Kadar nitrogen bahan makanan ditentukan dengan metode Kjeldahl, yang hasilnya dikalikan dengan factor protein 6,25 untuk mendapatkan kadar proteinnya. Faktor protein 6,25 % diperoleh dari

perkiraan kadar nitrogen bahan makanan sebesar 16 % dari kadar proteinnya. Umumnya kadar protein dalam bahan makanan mengandung sekitar 16 % kadar nitrogen. Namun demikian, terdapat pengecualian yakni : protein bungkil mengandung 18,5 % nitrogen, sehingga faktor proteinnya adalah 5,40. Demikian pla biji-bijian yang mengandung protein sebesar 17 %.

4. Serat Kasar

Sampel yang sudah bebas lemak dan telah disaring dipakai untuk mendapatkan serat kasar. Sampel bila ditambah 1,25% larutan asam sulfat dan dipanaskan 30 menit, kemudian residu disaring. Endapan yang didapat ditambah 1,25 % larutan NaOH dan dipanaskan 30 menit kemudian disaring dan kemudian endapan yang didapat dicuci, dikeringkan dan ditimbang, lalu dibakar dan abunya ditimbang. Perbedaan antara berat endapan sebelum dibakar dan berat abu disebut serat kasar.

5. Kadar Abu

Bagian ketiga dari sampel bahan kering ditimbang dan dibakar dalam suatu krusibel dengan panas 600^{o}C selama beberapa jam. Komponen abu pada analisis proksimat tidak memberikan nilai makanan yang penting. Jumlah abu dalam bahan makanan hanya penting untuk menentukan BETN. Kenyataannya, kombinasi unsur-unsur mineral dalam bahan makanan berasal dari tanaman sangat bervariasi sehingga nilai abu tidak dapat dipakai sebagai indeks untuk menentukan jumlah unsur mineral tertentu atau kombinasi unsur-unsur penting. Pada bahan makanan yang berasal dari hewan, kadar abu berguna sebagai indeks untuk kadar kalsium dan fosfor.

6. BETN

Komponen ini didapat dengan mengurangi sampel bahan kering dengan semua komponen-komponen seperti air, serat kasar, lemak, protein dan abu. BETN berisi zat-zat mono, di, tri dan polisakarida terutama pati dan semuanya mudah larut dalam larutan asam dan basa dalam analisis serat kasar dan mempunyai daya cerna yang tinggi. Zat tersebut karena mempunyai kandungan energi yang tinggi maka digolongkan ke dalam makanan sumber energi yang tidak berfungsi spesifik.

Bila gros energi dari gula dalam BETN dihitung, maka akan didapat bahwa energinya hanya bervariasi diantara 3,75-4,75 kkal/gr bahan kering. Semua komponen-komponen tersebut juga cepat dan hampir tercerna secara sempurna. Serat kasar juga mempunyai energi

total yang besar tetapi akan dicerna sangat lambat dan sedikit dibandingkan dengan BETN. BETN pada dasarnya merupakan karbohidrat mudah terlarut dan diperkirakan sangat mudah terurai. Sayangnya, larutan yang digunakan untuk mengukur serat kasardapat menghilangkan hingga 60% serat kasar sekitar 80 % hemisellulosa, proporsi yang bervariasi dari lignin yaitu 10 %– 95 %. BETN mengandung beberapa unsur dinding sel tanaman dan lebih bisa terurai dibanding serat kasar. Selain itu, BETN mengandung semua ikatan kimia yang tidak terukur oleh metode lain (khususnya beberapa senyawa nitrogen dan vitamin), sebagaimana kekeliruan pengukuran pada pengukuran komponen bahan pakan lainnya.



Gambar 7. Analisis Proksimat (Tillman, dkk,1989)

2.2.2. Analisis Serat

Serat adalah bagian dari bahan makanan ternak yang sebagian besar ada pada hijauan. Suatu cara alternatif yang telah dikembangkan oleh van soest. Analisis Van Soest menggolongkan zat pakan menjadi isi sel dan dinding sel. Van soest dan moore telah menemukan bahwa terdapat korelasi yang baik antara daya cerna *in vivo* terhadap isi sel (isi sel = neutral detergent soluble), terhadap dinding sel (dinding sel= neutral detergent insoluble fiber NDF) dan terhadap lignin dengan data daya cerna *in vitro*. Metode analisa serat van soest dipakai dalam sistem analisa makanan untuk ruminan telah dikembangkan di Cornell University. Rumus untuk menghitung daya cerna hijauan potongan segar (dasar bahan kering) adalah :

1. 0,98 NDS + 147,3 NDF – 78,9 (log lignin)

Dimana NDS, NDF dan lignin dalam angka persentase.

Suatu rumus yang umum untuk menghitung daya cerna semu (apparent) in vivo dari makanan ternak sapi (dasar bahan kering) adalah :

= (2) 0,98 NDS + NDF (147,3 – 78,9 log lignin) + 12,9%

Angka 12 % adalah persentase constant berat bahan makanan karena pengaruh bahan kering metabolik feses dan faktor lain.

Neutral Detergent Fiber (NDF) mewakili kandungan dinding sel yang terdiri dari lignin, selulosa, hemiselulosa dan protein yang berikatan dengan dinding sel. Bagian yang tidak terdapat sebagai residu dikenal sebagai neutral detergen soluble (NDS) yang mewakili isi sel dan mengandung lipid, gula, asam organik, non protein nitrogen, pektin, protein terlarut dan bahan terlarut dalam air lainnya. Serat kasar terutama mengandung sellulosa dan hanya sebagian lignin saja, sehingga nilai ADF lebih kurang 30 persen lebih tinggi dari serat kasar pada bahan yang sama.

Sel dinding tidak tercerna terutama disebabkan oleh kandungan lignin. Namun kandungan serat Weende (CF) meningkat pada hijauan sesuai dengan isi dinding sel dan perkembangan tanaman. Oleh karena itu pertumbuhan serat kasar (CF) umumnya merupakan bagian tak tercerna dari dinding sel untuk tanaman tertentu, tetapi untuk kandungan CF tanaman yang sama dapat menunjukkan mudah dicernakan berbeda sesuai dengan spesies tanaman.

Neutral detergent fiber (NDF), merupakan residu setelah pemisahan dengan larutan netral mendidih dari sodium laurat sulfat dan etilenadiamina tetraasetic acid (EDTA), kandungan utamanya adalah lignin, sellulosa dan hemisellulosa dan dianggap sebagai ukuran unsur dinding sel tanaman. Metode analisis untuk menentukan NDF benar-benar telah

ditemukan untuk hijauan, juga digunakan untuk kandungan pati pakan yang disediakan suatu perlakuan amilase termasuk dalam prosedur tersebut. Melalui analogi dengan pemisahan nitrogen bebas, istilah karbohidrat non struktural (NSC) kadang-kadang digunakan bagi hasil yang didapatkan melalui pengurangan jumlah (g/kg) dari protein kasar, Ekstrak eter, abu dan NDF dari 1000.

Acid detergent Fiber adalah residu setelah refluks dengan 0,5 dengan asam sulfat dan setiltrimetil ammonium bromide dan mewakili kehadiran fraksi sellulosa dari tanaman juga termasuk silica.

Penentuan ADF sangat berguna untuk hijauan karena ada korelasi statistik yang baik antara itu dan sejauh mana makanan yang dicerna. Di Inggris metode ADF telah dimodifikasi sedikit, durasi mendidih dan kekuatan asam ditingkatkan. yang dimodifikasi istilah serat deterjen (MADF) digunakan untuk menggambarkan penentuan ini.

Penentuan acid- detergent lignin (ADL) melibatkan persiapan serat deterjen asam sebagai langkah persiapan. ADF diperlakukan dengan 72 persen asam sulfat, yang melarutkan selulosa. Pengabuan residu lignin menentukan lignin kasar, termasuk cutin.

Pada monogastrik, terutama manusia, istilah serat makanan sering digunakan. Ini didefenisikan sebagai lignin dan semua polisakarida tetapi tidak dapat dicerna oleh enzim endogenous monogastrik. Berdasarkan defenisinya, serat kasar sulit ditentukan di dalam laboratorium dan istilah alternatif Non- Starch polysaccharides (NSP) telah diadopsi. NSP pada sebagian besar makanan, bersama lignin, dipertimbangkan untuk mewakili komponen utama dinding sel. Metode pengukuran NSP dibagi dalam 2 (dua) kategori :

1. Metode enzim-gravimeter, yang mengukur satu jenis komponen dan tidak memberikan detail dari tipe polisakarida. Pada metode AOAC (association of Official Analytical Chemists) untuk total serat makanan, sampel digelatinasi oleh pemanasan dan perlakuan enzim untuk menghilangkan pati dan protein. Total serat makanan diendapkan dengan etanol dan residunya dikeringkan dan ditimbang.
2. Metode enzim-kromatografi, yang mengidentifikasi karbohidrat tersendiri dalam makanan. Metode Englyst dapat digunakan untuk menentukan jumlah, serat diet larut dan tidak larut. Pengukuran NSP dengan cara ini melibatkan pembersihan pati dengan **enzim pullulanase dan a-amylase.** Setelah pengendapan dengan etanol, sisa NSP kemudian dihidrolisis dengan 12 M asam sulfur. Monomer gula individu konstituen netral ditentukan oleh kromatografi gas-cair dengan penentuan yang terpisah dari asam uronic. Sebagai kemungkinan lain, jumlah gula ditentukan oleh **colorimetrically after reaction with dinitrosalicylate solution.** Jumlah NSP dan

NSP tak larut ditentukan secara langsung oleh analisa dari sampel terpisah dan NSP larut dihitung dengan perbedaan. Unsur mayoritas NSP adalah rhamnose, arabinose, xylose, glucose, galactose, mannose dan glucuronic dan asam galacturonic. Selulosa merupakan unsur terbanyak dari glukosa, dan hemiselulosa menyediakan xilosa, mannans dan galaktosa. Degradasi pectins melepaskan arabinosa, galaktosa dan asam uronic.

Beberapa tahun terakhir perhatian terpusat pada pentingnya dua bentuk dari unsur serat pada diet manusia. NSP larut-air dikenal pada serum kolesterol yang lebih rendah, dan NSP tak larut meningkatkan jumlah feses dan mempercepat transit kolonis. Efek yang terakhir dianggap bermanfaat untuk mencegah sejumlah penyakit termasuk kanker usus.



Gambar 8. Bagan urutan pemisahan serat kasar (Tillman, 1989)

NSP dari makanan dapat terdegradasi dalam usus babi oleh fermentasi microbial, menghasilkan asam lemak volatil, yang diserap dan menghasilkan energi. Manfaat lain yang berhubungan dengan asam lemak volatile, asam butirat, yang dilaporkan menjadi sumber energi penting untuk pertumbuhan sel didalam epitel dari usus besar. Dengan demikian kehadiran asam ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan sel dan meningkatkan penyerapan. Tingkat degradasi bergantung pada konformasi dari polimer dan asosiasi

struktural mereka dengan komponen non-karbohidrat, seperti lignin. Tambahan lagi sifat-sifat fisik NSP, seperti kemampuan menampung air, dan sifat mengganti ion, dapat mempengaruhi tingkat fermentasi. Pembentuk gel NSP, seperti β-glucan , mengurangi penyerapan nutrisi lain dari usus kecil dan menekan kemampuan mencerna serta berdampak negatif terhadap konsistensi mengeluarkan feses pada babi dan unggas. Dalam catatan positif, sifat menampung air memiliki keuntungan dalam hal perilaku induk babi bunting dengan meningkatnya waktu makan dan istirahat karena meningkatnya isi perut dan mengurangi perilaku buruk seperti mengunyah tiang/balok.

2.2.3. Near Infrared Reflectance Spectroscopy

NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy) atau Spektroskopi reflektansi Inframerah Dekat, memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Kemampuan untuk menganalisa sampel dengan cepat dan hanya sedikit persiapan (grinding); dan hanya menggunakan satu sampel
- Dapat diselesaikan dalam <3 min.
- Menganalisis beberapa komponen dalam satu kali operasi
- Pengukuran dilakukan dengan penyerapan / pantulan cahaya
- Tidak akurat untuk mineral
- Peralatan mahal, harus dikalibrasi dengan benar
- Basah-kimia analisis lebih akurat
- Murah

NIRS (near-infrared spectroscopy) adalah teknik yang menggunakan karakteristik absorbansi NIR (gelombang infra merah dekat/tampak) dari sampel untuk memprediksi parameter yang diinginkan. NIR merupakan wilayah dari spektrum elektromagnetik. Spektroskopi (Gelombang) Inframerah-Dekat (Inggris: *Near-infrared Spectroscopy*, biasa dikenal dengan singkatannya: NIRS) merupakan satu teknik spektroskopi yang menggunakan wilayah panjang gelombang inframerah pada spektrum elektromagnetik (sekitar 800 sampai 2500 nm). Dikatakan "inframerah dekat" (IMD) karena wilayah ini berada di dekat wilayah gelombang merah yang tampak. Penggunaan teknik (dan alat) ini umum di bidang farmasetika, diagnostik medis, ilmu pangan dan agrokimia (terutama yang terkait dengan pengujian kualitas), riset mesin bakar, serta spektroskopi dalam astronomi.

NIRS memanfaatkan fakta bahwa banyak produk alami menyerap radiasi NIR di daerah-daerah khusus atau panjang gelombang. Khususnya, N-H, O-H dan ikatan C-H sangat

diserap oleh radiasi NIR, sementara ikatan molekul lainnya kurang begitu terserap sehingga alat ini tidak tepat untuk pengukuran mineral.

Jadi, sampel tinggi protein (banyak ikatan N-H) akan menyerap lebih dalam (N-H) daerah ikatan amina daripada sampel rendah protein. Sampel tinggi kadar airnya dan atau gula akan memiliki adsorptions lebih tinggi di wilayah yang terkait dengan ikatan hidroksil (OH). Sebuah sampel spektrum NIR akan menjadi gabungan dari semua absorbansi dari seluruh ikatan molekul dalam sampel.



Gambar 9. Wilayah spectrum elektromagnetik pada alat spektroskopi

Beberapa poin penting tentang NIRS:

1. Ini adalah teknik sekunder yang dikalibrasi terhadap metode referensi utama. Biasanya ini adalah tes laboratorium basah.
2. Sangat baik untuk memprediksi sampel yang mirip dengan yang digunakan dalam kalibrasi. Sebaliknya, sampel yang sangat berbeda dari sampel kalibrasi kali banyak yang tidak akurat.
3. Penggunaan identifikasi pencilan adalah penting untuk memastikan bahwa sampel tidak diketahui milik kalibrasi yang Anda gunakan untuk menganalisis.

Spektroskopi dengan menggunakan NIRS dalam bidang pertanian disukai karena tidak memerlukan persiapan sampel yang rumit. Selain itu, seringkali sampel bisa digunakan lagi untuk keperluan lain; misalnya, benih bisa langsung ditanam setelah diukur kandungan asam lemaknya. Instrumentasi NIRS yang berkembang pesat dengan penggunaan komputer membuat alat ini populer. Walaupun demikian, kalibrasi NIRS sangat kritis dalam bidang pertanianmengingat bahan sampel mengandung campuran berbagai macam zat. Proses *adjustment* dalam analisis untuk menghasilkan informasi dapat memberikan nilai-nilai yang kurang akurat.

2.2.4. Bomb Calorimeter

Bomb kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor (nilai kalori) yang dibebaskan pada pembakaran sempurna (dalam O_2 berlebih) suatu senyawa, bahan makanan, bahan bakar. Sejumlah sampel ditempatkan pada tabung beroksigen yang tercelup dalam medium penyerap kalor (kalorimeter), dan sampel akan terbakar oleh api listrik dari kawat logam terpasang dalam tabung.

Bom kalorimeter pada dasarnya adalah wadah tertutup mampu menahan tekanan gas beberapa atmosfer. Sampel ditimbang kemudian ditempatkan dalam kontak dengan pengapian kawat di dalam bom. Bom diisi dengan sekitar 20 atm tekanan dengan O2, disegel, dan ditempatkan dalam sejumlah air. Arus listrik dilewatkan melalui kawat untuk menyalakan campuran. Selama pembakaran berlangsung, panas berevolusi meningkatkan suhu kalorimeter dan air sekitarnya,yang diukur dengan termometer. Dalam rangka untuk mencegah hilangnya panas dari sistem kalorimeter, beberapa kalorimeter dikelilingi water bath kedua, dimana suhu terus menerus disesuaikan (Oleh eksperimen) untuk cocok dengan kalorimeter tersebut. Jadi, transfer panas antara sistem (kalorimeter dan isi) dan sekitarnya (jaket air, terutama) adalah nol, membuat proses adiabatik: $q = 0$. Kalorimeter ini menggunakan insulasi termal yang baik melalui water bath kedua untuk mencegah hilangnya panas ke lingkungan. Karena pembakaran berlangsung dalam wadah tertutup dengan volume konstan, pekerjaan dilakukan pada atau dengan sistem ini juga nol, sehingga $\Delta U = q + w = 0$ untuk proses secara keseluruhan yang ditunjukkan di bawah ini.

kalorimeter (dari bahasa Latin kalor, yang berarti panas) adalah perangkat yang digunakan untuk kalorimetri, ilmu pengukuran panas dari reaksi kimia atau perubahan fisik maupun kapasitas panas. Kalorimeter pemindaian diferensial, microcalorimeters isotermal, kalorimeter titrasi dan kalorimeter tingkat dipercepat adalah salah satu jenis yang paling umum. Sebuah kalorimeter sederhana hanya terdiri dari termometer melekat pada sebuah wadah logam penuh air digantung di atas sebuah ruang pembakaran.

Untuk menemukan perubahan entalpi per mol zat A dalam suatu reaksi antara dua zat A dan B, zat yang ditambahkan ke sebuah kalorimeter dan temperatur awal dan akhir (sebelum reaksi dimulai dan setelah selesai) dicatat. Mengalikan perubahan suhu oleh massa dan kapasitas panas spesifik zat memberikan nilai energi yang dilepaskan atau diserap selama reaksi. Membagi perubahan energi dengan berapa banyak mol dari A yang hadir memberikan perubahan entalpi reaksi nya. Metode ini digunakan terutama dalam pengajaran akademis karena menggambarkan teori kalorimetri. Ini tidak memperhitungkan hilangnya panas melalui wadah atau kapasitas panas dari termometer dan wadah itu sendiri. Selain itu, objek

ditempatkan di dalam kalorimeter menunjukkan bahwa benda panas mereka ditransfer ke kalorimeter dan ke dalam cairan, dan panas yang diserap oleh kalorimeter dan cairan adalah sama dengan panas yang dilepaskan oleh logam.



Gambar 9. Kalorimeter makanan (Wikipedia.com)

Kalorimeter makanan adalah alat untuk menentukan nilai kalor atau energi zat makanan karbohidrat, protein, atau lemak. Alat ini terdiri dari sebuah tabung kaca yang tingginya kurang lebih 19 cm dan garis menengahnya kurang lebih 7,5 cm. Bagian dasarnya melengkung ke atas membentuk sebuah penyungkup. Penyungkup ini disumbat dengan sebuah sumbat karet yang berlubang di bagian tengah. Bagian atas tabung kaca ini ditutup dengan lempeng ebonit yang bundar. Di dalam tabung kaca itu terdapat sebuah pengaduk, yang tangkainya menembus tutup ebonit, juga terdapat sebuah pipa spiral dari tembaga. Ujung bawah pipa spiral itu menembus lubang sumbat karet pada penyungkup dan ujung atasnya menembus tutup ebonit bagian tengah. Pada tutup ebonit itu masih terdapat lagi sebuah lubang, tempat untuk memasukkan sebuah termometer ke dalam tabung kaca. Tabung kaca itu diletakkan di atas sebuah keping asbes dan ditahan oleh 3 buah keping. Keping itu berbentuk bujur sangkar yang sisinya kurang lebih 9,5 cm. Di bawah keping asbes itu terdapat kabel listrik yang akan dihubungkan dengan sumber listrik bila digunakan. Di atas keping asbes itu terdapat sebuah cawan aluminium. Di atas cawan itu tergantung sebuah kawat nikelin yang berhubungan dengan kabel listrik di bawah keping asbes. Kawat nikelin itulah yang akan menyalakan makanan dalam cawan bila berpijar oleh arus listrik. Dekat cawan terdapat pipa logam untuk mengalirkan oksigen.

2.2.5. Chromatoghraphy

Beberapa metode analisis kimia spesifik untuk sampel/analit tertentu. Sering ditemukan bahwa bahan/sampel harus dipisahkan dari berbagai senyawa individu yang mungkin ada dalam sampel. Serta adanya tenaga ahli/terlatih dengan metode pemisahan, teknik kromatografi.

Kromatografi melibatkan sampel (atau ekstrak sampel) yang dilarutkan dalam fase gerak (yang mungkin menjadi gas, cairan atau cairan superkritis). Fase mobile kemudian dipaksa melalui fase, bergerak stasioner larut. Fase dipilih sedemikian sehingga komponen-komponen sampel memiliki perbedaan kelarutan dalam setiap fase. Sebuah komponen yang cukup larut dalam fase diam akan memakan waktu lebih lama untuk melakukan perjalanan melalui itu dari komponen yang tidak terlalu larut dalam fase diam tetapi sangat larut dalam fase gerak. Sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan dalam mobilitas, komponen sampel akan menjadi terpisah dari satu sama lain saat mereka melakukan perjalanan melalui fase diam.

Teknik seperti H.P.L.C. (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) dan G.C. (Kromatografi Gas) menggunakan kolom - dikemas dengan tabung sempit fase stasioner, di mana fase mobile paksa. Sampel diangkut melalui kolom dengan penambahan terus menerus fase gerak. Proses ini disebut elusi. Tingkat rata-rata di mana suatu analit bergerak melalui kolom ditentukan oleh waktu yang menghabiskan dalam fase gerak.

Ada tiga jenis kromatografi secara rutin digunakan mengajar di laboratorium kimia organik :

1. Kolom Kromatografi (ColumnChromatoghraphy)
2. Kromatografi Lapis Tipis (Thin Layer Chromatoghraphy)
3. Kromatografi gas (Gas Chromatoghraphy)

Dalam (dan semua jenis) chromatographies, campuran dipisahkan dengan mendistribusikan komponen antara fase diam dan fase gerak. Campuran pertama ditempatkan pada fase diam (berupa padatan atau cairan) dan kemudian fase gerak (gas atau cair) diperbolehkan untuk melewati sistem.

Kolom kromatografi: Fase diam adalah adsorben bubuk yang ditempatkan dalam sebuah kolom gelas vertikal. Campuran yang akan dianalisis dimuat di atas kolom ini. Fase gerak merupakan pelarut dituangkan di atas kolom dimuat. Pelarut mengalir ke bawah kolom, menyebabkan komponen campuran untuk mendistribusikan antara bubuk adsorben dan pelarut, sehingga (mudah-mudahan) memisahkan komponen campuran sehingga sebagai

pelarut mengalir keluar dari bagian bawah kolom, beberapa komponen mengelusi dengan koleksi awal dan komponen lainnya mengelusi dengan pecahan terlambat.

Lapisan Tipis Chromatorgraphy: Fase stasioner adalah adorbent bubuk yang tetap untuk aluminium, kaca, atau plastik. Campuran yang akan dianalisis dimuat di dekat bagian bawah piring. Piring ditempatkan dalam reservoir pelarut sehingga hanya bagian bawah piring terendam. Pelarut ini adalah fase gerak, itu bergerak naik piring menyebabkan komponen campuran untuk mendistribusikan antara adsorben pada pelat dan pelarut bergerak, sehingga memisahkan komponen campuran sehingga komponen dipisahkan menjadi terpisah "titik" yang muncul dari bawah ke atas piring.

Kromatografi Gas: Fase diam adalah cairan yang tinggi-mendidih. (Anggap saja sebagai minyak kental, atau zat lilin.) Cairan yang tinggi ini-boiliing dikemas ke dalam gelas, panjang dan sempit atau kolom logam. Campuran yang akan dianalisis dimuat oleh jarum suntik ke awal kolom ini. Fase gerak adalah gas inert yang terus menerus mengalir melalui kolom. Komponen campuran mendistribusikan antara cairan mendidih tinggi stasioner (komponen ini baik kental atau terserap pada cairan yang tinggi-mendidih) dan fase gas (uap) ponsel bergerak melalui kolom. Campuran gas mengalir melalui detektor di ujung kolom dan jika telah berhasil dipisahkan, komponen-komponen yang berbeda menunjukkan sebagai 'blip' atau puncak pada sebuah alat perekam.

Dalam ketiga chromatographi tersebut, pemisahan komponen kimia dari campuran dicapai karena interaksi selektif dari bahan kimia baik fase diam (fase stasioner) dan fase gerak:

- Dalam Kromatografi Gas, faktor yang menentukan dalam seberapa cepat komponen perjalanan biasanya (tetapi tidak selalu) titik didih senyawa. (Jika adsorben tinggi didih cairan polar digunakan dalam kolom GC, polaritas komponen menentukan urutan elusi.)
- Dalam Kolom dan Lapisan Tipis chromatographies, fase stasioner (adsorben: silika gel atau alumina) adalah polar, dan polaritas dari kedua komponen campuran dan pelarut yang digunakan sebagai fase gerak adalah faktor-faktor penentu dalam seberapa cepat senyawa perjalanan .

Kromatografi kolom digunakan untuk memisahkan dan memurnikan komponen campuran. TLC dan GC biasanya (tetapi tidak selalu!) Digunakan hanya untuk menganalisis campuran: untuk menentukan jumlah komponen dan untuk melihat apakah komponen yang

diinginkan hadir. TLC sering digunakan untuk menentukan "sistem yang ideal" untuk prosedur kromatografi kolom (seperti yang dijelaskan dalam paragraf berikut).

2.2.6. Calorimeter dan Spektrofotometer

Metode ini sebetulnya adalah dengan menggabungkan metode analisa bahan makanan antara calorimeter dan spektrofotometer. Sampel makanan dihitung dengan modifikasi kedua metode tersebut.

2.2.7. Analisis asam Amino

Analisis asam amino ini sangat diperlukan untuk menganalisa kadar asam amino bahan pakan. Cara analisis asam amino yang masih lazim digunakan sampai saat ini adalah kromratografi dengan berbagai macam teknik seperti kromatografi kertas, lapisan tipis dan kolom. Kromatografi kolom lebih banyak dikembangkan karena selain dapat digunakan untuk keperluan kualitatif juga dapat digunakan untuk keperluan kuantitatif dan preparatif. Akan tetapi pada kromatografi biasa, diperlukan waktu yang lebih lama untuk memisahkan asam amino secara sempurna. Karena itu perlu dipertimbangkan menggunakan metode lain, seperti HPLC (high performance Liquid Chromatoghraphy). Waktu yang dibutuhkan sangat singkat namun alat ini tentu saja mahal meskipun cukup praktis dan efisien dalam penggunaannya.

2.2.8. Analisis vitamin

Analisa vitamin dapat dilakukan dengan cara kimia maupun biologis. Analisa vitamin secara kimiawi, atau fisiko kimia didasrkan pada sifat vitamin baik sifat fisis maupun kimiawi. Cara ini lebih cepat dan murah dibandingkan cara biologis. Analisa biologi memiliki kelebihan yaitu dapat langsung diketahui peranan vitamin tersebut dalam zat hidup serta kuantitatif dapat diketahui jumlahnya. Sedang secara kimiawi hanya sekedar menentukan jumlah atau kuantitats saja. Oleh karena itu kedua cara ini sering dilakukan secara bersamaan agar diperoleh data yang lebih lengkap.

Analisa vitamin mikrobiologis menggunakan bakteri atau jamur. Cara mikrobiologis biayanya lebih mura dan lebih cepat dibandingkan dengan cara bioassay. Akan tetapi harus diketemukan jenis mikroba yang spesifik untuk pengujian satu jenisbahan makanan tertentu. Bahan makanan yang dianalisa harus dimurnikan dahulu dari bahan yang lain yang besar kemungkinannya mempengaruhi aktifitas biologis mikrobia yang digunakan untuk percobaan.

Analisa vitamin secara bioassay adalah penentuan kadar komponen bahan makanan misalnya vitamin secara relative dengan membandingkan pengaruhnya terhadap hewan percobaab yang dipakai sebagai standar. Cara bioassay ini memerlukan waktu yang lama dan keterampilan yang tinggi.

2.2.9. Analisis Mineral

Penentuan mineral melalui selain melalui analisa proksimat dengan sebelumnya mengabukan sampel, ada metode tersendiri untuk penentuan mineral namun pada prinsipnya tetap dengan mengabukan sampel untuk selanjutnya diukur dengan menggunakan beberapa metode yaitu :

- metode Gravimetrik
- metode kalorimetrik
- metode titrasi
- metode elektroda ion-selektif
- metode spektroskopi atom

Pada metode gravimetrik yang dianalisis adalah endapan larutan yang merupakan hasil reaksi mineral dengan larutan reagen. Endapan dipisahkan dari larutan dengan cara filtrasi, pembilasan,pengeringan dan penimbangan. Selanjutnya endapan yang telah ditimbang tadi ditentukan mineralnya sesuai dengan rumus yang ada.

Metode Kalorimetrik prinsipnya adalah reaksi perubahan warna reagen ketika bereaksi dengan mineral tertentu dalam larutan yang dapat diukur berdasarkan absorbansi larutan pada panjang gelombang tertentu menggunakan spektrofotometer. Vandat sering digunakan sebagai reagen dalam metode ini karena dapat berubah warna saat bereaksi dengan mineral.

Metode titrasi terbagi atas 3 (tiga) cara, yaitu 1) titrasi EDTA (kompleksimeter), 2) titrasi redoks, dan 3) titrasi pengendapan. Titrasi EDTA menggunakan reagen EDTA yang merupakan reagen kimia kuat yang membentuk kompleks dengan ion logam multivalent. reagen ini digunakan karena tingkat kemurniannya tinggi. Titrasi redoks pada prinsipnya adalah menggunakan reaksi reduksi dan oksidasi dalam penentuan kadar mineral yang diinginkan. Reaksi reduksi adalah penambahan elektron oleh atom atau molekul sedang reaksi oksidasi adalah pengurangan elektron oleh atom atau molekul. setiap molekul yang mendapat atom selama reaksi dikatakan tereduksi sedang setiap molekul yang kehilangan elektron disebut teroksidasi, dngan atau tanpa oksigen. elektron tidak dapat dimusnahkan

dalam reaksi kimia biasa, oleh karena itu setiap ada reaksi oksidasi akan diikuti oleh reaksi reduksi. Inilah yang disebut reaksi redoks.

Metode elektroda ion-selektif, prinsip kerja perangkat ini seperti pH-meter, tapi elektroda kacanya berbeda dimana elektroda pada perangkat ini sensisitive terhadap ion tertentu (non H^+). Elektroda kaca khusus tersedia secara komersil untuk menentukan konsentrasi K^+ ,Na^+, NH_4^+, Li^+, Ca^+ dan Rb^+ dalam larutan. Cara kerjanya: dua elektroda dicelupkan kedalam larutan sampel yang mengandung mineral yang larut, yaitu : elektroda referensi dan elektroda selektif ion. Besarnya voltase yang diberikan pada elektroda tergantung pada konsentrasi mineral dan pengukuran dilakukan pada suhu rendah untuk mencegah perubahan konsentrasi ion. konsentrasi mineral tertentu ditentukan dari kurva kalibrasi, tegangan vs konsentrasi mineral (logaritma). Keuntungan metode ini adalah sederhana, cepat dan mudah penggunaannya.

Metode Spektroskopi atom lebih sensitive, spesifik, dan lebih cepat daripada metode kimia basah konvensional dalam menentukan jenis dan kadar mineral tertentu. Metode spektroskopi atom ini menggunakan alat : 1) AAS, Atomic Absorption spectroscopy dan 2) AES, Atomic Emition Spectroscopy.

2.3. Evaluasi Biologi

Pengujian nilai nutrisi bahan pakan dengan menggunakan ternak (atau hewan percobaan) sebagai alat penguji, dan respon yang yang diinginkan diukur langsung dari ternak tersebut. Selain itu uji kimia bisa juga menjadi bagian dari prosedur uji ini.

Keuntungan : Menghasilkan data yang lebih akurat atas respon ternak dari pakan yang dicobakan kepadanya. Kekurangan: biaya mahal dan pelaksanaannya lama. Namun demikian uji biologis tidak dapat menguji satu jenis bahan pakan, tetapi harus berupa ransum, karena harus memperhatikan kebutuhan ternak akan zat makanan, kecuali satu bahan bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

2.3.1. Metode *In Vitro*

In vitro: Secara harfiah artinya dalam gelas, seperti dalam sebuah tabung uji. Sehingga dapat diartikan sebagai sebuah tes yang dilakukan secara in vitro adalah dalam Tabung kaca atau plastik di laboratorium. *In vitro* adalah kebalikan dari *in vivo* (dalam organisme hidup). Atau dapat pula berarti suatu proses biologis yang dibuat terjadi di laboratorium atau lingkungan percobaan yang terkontrol lebih baik dibanding organisme

hidup atau pengaturan alam. Oleh karena itu prinsip kerjanya adalah meniru metabolism yang terjadi dalam tubuh ternak

Definisi *in vitro* dan *in vivo* penelitian tergantung pada model percobaan yang digunakan. Dalam penelitian *in vitro* umumnya disebut sebagai manipulasi organ, jaringan, sel, dan biomolekul dalam sebuah lingkungan terkendali buatan. Karakterisasi dan analisis biomolekul dan sistem biologis dalam konteks organisme utuh dikenal seperti dalam penelitian *in vivo*.

Unit dasar dari organisme hidup sel, yang dalam hal skala dan dimensi adalah pada antarmuka antara molekul dan tingkat mikroskopis. Sel hidup pada gilirannya dibagi ke dalam domain fungsional dan struktural seperti inti, sitoplasma, dan jalur sekresi, yang terdiri dari array yang luas dari biomolekul. Molekul-molekul kehidupan melaksanakan reaksi kimia yang memungkinkan sel untuk berinteraksi dengan lingkungannya, menggunakan dan menyimpan energi, mereproduksi, dan tumbuh. Struktur dari tiap biomolekul dan lokalisasi subselular yang menentukan di mana reaksi kimia yang mampu berpartisipasi dan karenanya apa perannya dalam proses kehidupan sel. Setiap manipulasi yang memecah unit kehidupan, yaitu sel menjadi non-hidup nya komponen, dianggap sebagai pendekatan in vitro. Jadi, in vitro, yang secara harfiah berarti "di kaca," mengacu pada manipulasi eksperimental yang dilakukan menggunakan ekstrak sel-bebas dan dimurnikan atau sebagian dimurnikan biomolekul dalam tabung uji. Sebagian besar pendekatan biologi molekuler dan biokimia dan teknik penelitian dianggap manipulasi genetik. Kloning molekuler gen dengan tujuan untuk mengekspresikan produk protein yang meliputi beberapa langkah yang dianggap dalam percobaan in vitro seperti amplifikasi PCR gen dan gen yang ligasi ke vektor ekspresi. Ekspresi gen dalam sel inang dianggap prosedur vivo pada. Yang mengkarakterisasi dalam percobaan in vitro yang pada prinsipnya kenyataan kondisi buatan dan rekonstruksi apa yang mungkin terjadi secara in vivo. Banyak uji in vitro adalah perkiraan reconstitutions proses biologis dengan mencampur komponen yang diperlukan dan reagen dalam kondisi yang terkendali. Contoh proses biologis yang dapat dilarutkan secara in vitro adalah reaksi enzimatik, melipat dan melipat protein dan DNA, dan replikasi DNA dalam reaksi PCR.

2.3.2. Metode *In Sacco*

Evaluasi pakan dengan metode *in Sacco* umumnya dilakukan untuk melihat daya cerna suatu bahan pakan. Prinsip metode *In Sacco* adalah dengan memanfaatkan rumen hewan ruminansia dengan memasukkan bahan pakan yang akan diuji dalam tas khusus

selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu metode ini hanya menggunakan hewan ruminansia dengan cara melubangi bagian tubuh ternak yang biasa disebut dengan kanula rumen atau fistula. Hewan dengan kanula rumen telah terbukti menjadi salah satu alat yang paling berguna untuk evaluasi sumber daya pakan dan terutama untuk menentukan efek pakan pada lingkungan rumen, yang memiliki pengaruh besar pada proses pencernaan. Teknik ini bisa dikritik atas dasar bahwa itu adalah gangguan pada fungsi normal dari hewan dan bahwa jika tidak hati-hati dipelihara fistula dan cannula dapat menjadi sumber stres. Dalam metode in vitro produksi gas menjadi alternatif yang tepat untuk pengukuran potensi pakan fermentasi dan efek relatif anti-gizi senyawa hadir dalam banyak sumber daya pakan tropis. Untuk saat ini, hewan dengan kanula rumen akan terus diperlukan karena mereka mewakili salah satu alat yang paling berguna tersedia untuk para peneliti di negara berkembang. Namun, mereka tidak diperlukan, dan alternatif pendekatan yang harus dikembangkan dan digunakan sedapat mungkin.

Prinsip Kerja Metode *In Sacco*

Sebuah penjepit logam diterapkan untuk kali lipat dari dinding rumen terpapar oleh sayatan ke dalam rongga tubuh. Klem memegang lipatan rumen dinding luar tubuh, menyumbat suplai darah dan menyebabkan daerah yang rusak di bawah lipatan untuk mematuhi dinding tubuh. Dalam sepuluh sampai empat belas hari, potongan dijepit rumen 'sloughs off' meninggalkan fistula melalui kanula dapat dengan mudah diperkenalkan dan aman.

Fasilitas dan Peralatan

Hanya fasilitas minimum yang diperlukan; beberapa metode menahan hewan dalam posisi berdiri (sapi saja), minimal peralatan bedah (bedah, tang, dll), obat penenang dan bius lokal. Klem terdiri dari dua batang kuningan 11 cm dan 0,6 cm dengan diameter (untuk domba) dan sekitar dua kali lipat ukuran untuk ternak (Gambar 9.3). Setiap batang kuningan memiliki dua lubang 2,5 cm dari kedua ujung batang. Lubang-lubang di salah satu batang yang berulir untuk mengambil sekrup kuningan yang dipasang melalui lubang di batang lain sehingga, ketika sekrup berbalik, dua batang menggambar bersama-sama membentuk penjepit.

Inkubasi Rumen dengan kantong nilon

Metode ini merupakan prioritas utama bagi para peneliti di negara berkembang, sebagai alat yang paling tepat untuk memberikan informasi mengenai:

1. Nilai gizi dari pakan untuk ruminansia;
2. Efisiensi dari ekosistem rumen.

Ini menghasilkan informasi yang berguna dari sudut pandang terhadap karbohidrat dan status protein bahan pakan, dan sejauh mana kedua nutrient ini akan dicerna dalam rumen atau by pass dari kantong langsung menuju ke usus. Metode ini telah menjelaskan secara rinci untuk alasan ini.

Karakteristik Kantong

Bahan serat nilon atau sintetis lainnya dengan ukuran pori antara 20 dan 40 mikron. Ukuran pori-pori adalah compromise antara kehilangan minimal partikel kecil dan memastikan bahwa mikroba, termasuk protozoa, bisa masuk ke kantong tanpa hambatan, dan juga gas yang bisa lepas dari kantong. Bila gas tidak lepas dari kantong dapat mengapung di atas fase padat rumen dan memberikan hasil yang sangat bervariasi.

Kantong nylon harus dijahit dengan polyester atau benang jahitan ganda dengan jahitan dekat. Dimensi keseluruhan untuk memotong harus 17 × 10 cm untuk memberikan panjang efektif sekitar 12-14 cm. Kantong yang lebih kecil dapat digunakan jika sampel yang lebih kecil. Hal ini tidak diperlukan untuk memperkenalkan imbang-string dalam leher kantong, karena mereka dapat ditutup dengan panjang terpisah dari benang nilon (misalnya, pancing), dan / atau melekat pada benang nilon panjang (misalnya, benang Baler) atau batang plastik. Kantong-kantong dapat digunakan kembali asalkan tidak ada lubang di dalamnya, setiap kali mereka harus diperiksa untuk pecah.

Teknik kantong-nilon menyediakan sarana untuk feed peringkat menurut tingkat dan luasnya degradasi materi kering, bahan organik, nitrogen atau parameter nutrisi lainnya. Ini melibatkan sampel mengerami feed dalam rumens hewan fistulated untuk periode 6-120 jam dan penentuan berikutnya dari hilangnya komponen pakan yang berbeda. Teknik kantong-nilon yang tepat untuk digunakan oleh NARS karena tidak melibatkan jumlah besar input impor. Teknik kantong-nilon menggunakan tas (6,5 x 14 cm) terbuat dari nilon mesh (30-50 mm). Sebuah sampel yang dikenal berat badan adalah tertutup rapat dalam kantong nilon dan ditempatkan dalam rumen hewan fistulated. Setelah diperlukan periode waktu, sampel dihapus, dicuci, dikeringkan dan ditimbang. Degradasi (atau hilangnya) dari substrat ditentukan oleh penurunan berat badan selama periode inkubasi. Residu dikeringkan juga

dapat digunakan untuk analisis kimia. Ukuran pori dari kantong harus memungkinkan masuknya mikroba rumen dan melarikan diri dari akumulasi gas, dan partikel padat menjaga kerugian seminimal mungkin. Partikel pakan penghabisan dari kantong tanpa rincian mikroba rumen dikoreksi dengan menggunakan zero-watch kantong. Kantong ini diisi dengan substrat tetapi tidak diinkubasi dalam rumen, mereka dicuci dan dikeringkan dengan cara yang sama seperti kantong yang diinkubasi. Selain itu, zero-watch kantong yang digunakan untuk mengoreksi bagian materi dari tekanan diterapkan ke kantong nilon selama mencuci. Faktor utama yang mempengaruhi degradasi kantong nilon termasuk bagaimana kantong ditempatkan dalam rumen, ukuran partikel sampel vis-à-vis ukuran pori dari kantong nilon , hilangnya partikel pakan melalui kantong kain (yang fungsi dari kehalusan penggilingan, ukuran pori kain dan bahan pakan), metode cuci, lamanya waktu bahwa sampel yang diinkubasi dalam rumen dan lingkungan rumen di mana penguraian ditentukan. Jika maksudnya adalah untuk peringkat bahan pakan berkaitan dengan nilai gizi mereka tanpa memaksakan pengobatan pada hewan yang difistula, maka makanan hewan harus memadai dalam rumen-degradable nitrogen (N). Apabila hilangnya N dari pakan N rendah adalah parameter maka teknik kantong nilon tidak cukup tepat sebagai kontaminasi mikroba akan bias hasilnya. Dalam kasus seperti ada kebutuhan untuk memungkinkan untuk koreksi, misalnya dengan menganalisis untuk N. Mikroba Teknik kantong-nilon adalah alat biologis sangat sederhana dan berguna untuk *in vivo* (dalam Sacco) animal nutrition studi. Jika penentuan hilangnya benda kering-satunya adalah analisis penting, maka peralatan analitis utama yang diperlukan akan saldo akurat dan oven pengeringan. Secara umum, berikut ini bahan-bahan yang diperlukan untuk menentukan penguraian bahan pakan menggunakan metode kantong nilon :

· Kantong- Nylon
· Benang Nylon / kabel
· Analitis keseimbangan
· Pengeringan oven atau pengeringan perangkat
· Mesin cuci keran atau air mengalir
· Desikator.

Prosedur rinci metode-kantong nilon dapat dimodifikasi tergantung pada ketersediaan bahan yang dibutuhkan. Namun, prosedur dasar harus tetap sama. Ukuran tas relatif terhadap sampel ukuran sangat penting dan diatur oleh jumlah residu diperlukan untuk analisis. Bahan diinkubasi harus mampu bergerak secara bebas dalam tas untuk menghindari pembentukan mikro-lingkungan dalam kantong yang akan menghasilkan replikasi yang kecil.



Gambar 10. Ilustrasi tabung plastik dan kantong nilon yang diikat pada tabung untuk suspensi dalam rumen

2.3.3. Metode In Vivo

Evaluasi biologis dengan metode *in vivo* adalah tes yang dilakukan dengan cara mencobakan langsung ke bagian tubuh ternak. Evaluasi biologis bahan pakan dengan metode *in vivo* adalah tes yang dilakukan dengan cara mencobakan langsung ke bagian tubuh. Evaluasi bahan pakan dengan cara biologis pada prinsipnya adalah uji metabolik dalam tubuh organism. Cara ini akan lebih akurat dalam melihat respon metabolisme tubuh ternak terhadap bahan pakan tersebut termasuk respon performa ternak, sehingga kualitas bahan pakan dapat dievaluasi dengan melihat respon ternak sesuai dengan respon yang menjadi parameter yang diinginkan.

Evaluasi biologis dengan metode *in vivo* terhadap bahan pakan agak sulit dilakukan bila hanya satu jenis bahan pakan saja karena berkaitan dengan kebutuhan ternak terhadap zat-zat gizi untuk tubuhnya. Evaluasi dengan metode ini biasanya dilakukan untuk melihat respon ternak terhadap suatu jenis pakan/ransum tertentu. Sebagai contoh, percobaan makanan yang dilakukan terhadap sekelompok sapi untuk melihat daya cerna pakan tersebut.

Pada percobaan untuk melihat daya cerna pakan yang diberikan tersebut dianggap bahwa bahan pakan yang tak dikeluarkan melalui feses adalah bagian yang tercerna. Daya cerna (digestibility) adalah bagian zat makanan dari makanan yang tidak dieksresikan dalam feses. Biasanya ini dinyatakan dalam dasar bahan kering dan apabila dinyatakan dalam persentase disebut **koefisien cerna**. Isalnya, seekor sapi makan 8 kg bahan kering per hari dan mengekskresikan 2 kg bahan kering dalam feses, maka koefisien cerna bahan kering tersebut adalah 8-2/8 x 100 = 75 %, atau bila dituliskan rumusnya adalah sebagai berikut :

Rumus Koefisien Cerna Semu= ADC (Apparent Digestible coefisient)

$$ADC = \frac{I - F}{I} \times 100\%$$

Dimana : I = Intake pakan

F = Feses

Percobaan kecernaan bahan pakan dilakukan dengan mencatat makanan yang dimakan dan feses yang dikeluarkan dalam satuan hari. Sebaiknya dilakukan pada sekelompok ternak dengan pertimbangan adanya variabilitas antar seekor hewan. Untuk mamalia, hewan jantan lebih disukai dalam percobaan karena lebih mudah memisahkan feses dari urinenya. Hewan percobaan dipilih yang sehat dan jinak, dan dimasukkan dalam kandang khusus dan/atau dipasangi tas untuk mengumpulkan feses. Kelas unggas biasanya agak sulit untuk mengumpulkan fesesnya karena feses dan urinenya dikeluarkan bersama dari kloaka. Namun, dapat diusahakan dengan cara :

- Secara kimiawi, nitrogen dipisahkan dari urine dimana nitrogen dalam urine berbentuk asam urat dengan nitrogen dari feses.
- Melalui pembedahan, dengan maksud memisahkan saluran urine dari kloaka.

Pengukuran daya cerna konvenional terdiri dari 2 (dua) periode, yaitu periode pembiasaan atau disebut juga periode pendahuluan dan yang kedua adalah periode koleksi atau pengumpulan data.

1. Periode pendahuluan

   Periode ini biasanya berlangsung selama 7 sampai 10 hari. Ransum percobaan diberikan dengan jumlah yang sudah ditentukan dengan frekuensi paling sedikit 2 (dua) kali sehari. Tujuan dari periode pembiasaan ini adalah:

   a. Membiasakan hewan percobaan dengan ransum percobaan
   b. Membiasakan keadaan lingkungan percobaan
   c. Menghilangkan sisa makanan sebelum percobaan

2. Periode Koleksi atau pengumpulan data

   Periode ini berlangsung selama 5 sampai 15 hari. Selama periode ini feses dikumpulkan, ditimbang dan dicatat setiap harinya. Pada hewan berlambung tunggal dapat ditambahkan suatu indikator atau “marker” kedalam ransum, sehingga semua feses yang mengandung marker tersebut dapat dkumpulkan selam priode koleksi ini. Pakan percobaan diberikan dalam jumlah yang sama setiap harinya sebagaimana halnya pada periode awal (periode pembiasaan).

Perlu diingat bahwa, semua perlakuan dalam kedua periode tersebut adalah sama setiap harinya, kecuali pada pengumpulan data yang sudah dilakukan pada periode koleksi atau pengumpulan data. Perbedaan jumlah konsumsi pakan dapat menyebabkan perbedaan jumlah feses sehingga akan menyebabkan kesalahan dalam percobaan ini.

Sebagai contoh, percobaan kecernaan protein dalam suatu jenis rumput pada 5 ekor sapi. Hasil yang diperoleh adalah konsumsi protein hijauan sebesar 0,61 kg dan protein feses yang dikeluarkan sebanyak 0,28 kg. Sehingga dapat dihitung :

Koefisien cerna protein dari rumput tersebut adalah:

$$\text{ADC} = \frac{0{,}61 - 0{,}28}{0{,}61} \times 100\% = 54{,}1\ \%$$

Jadi kecernaan protein hijauan tersebut adalah 54,1 %. Nilai koefisien cerna dapat dipengaruhi ada tidaknya bahan yang sulit tercerna seperti kandungan lignin utamanya pada hijauan.

Namun demikian tetap harus dilakukan analisa kimia yaitu analisa proksimat terhadap hijauan yang dicobakan tadi, untuk mengetahui bahan kering, bahan organik, protein kasar Ekstrak eter, serat kasar dan BETN, demikian pula terhadap fesesnya. Dengan menggunakan analisa kimia dan jumlah bahan kering baik dalam hijauan maupun feses, jumlah bahan kering dan komponen-komponen yang dimakan dan yang diekskresikan dapat dihitung dan bedanya adalah jumlah yang dapat dicerna. Koefisien cerna sebenarnya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{TDC (total digestible Coefisient)} = \frac{\text{N Makanan} - (\text{Nfeses-Nmetabolik})}{\text{N makanan}} \times 100\%$$

Dimana N adalah kandungan Nitrogen komponen.

Percobaan pencernaan memerlukan waktu, materi, tenaga dan biaya,sehingga perlu dicari jalan untuk mengembangkan metode laboratorium yang meniru percobaan pencernaan. Pencernaan pada non ruminansia sukar ditiru secara keseluruhan sehingga pengembangannya sangat lambat, kecuali untuk protein yang menggunakan pepsin dan HCl. Daya cerna bahan makanan untuk ruminansia dapat ditentukan secara teliti dengan mengggunakan metode *in vitro* 2 tingkat. Pada tingkat 1 cuplikan bahan makanan yang telah digiling diinkubasi selama 48 jam dalam cairan rumen yang mengandung buffer dan dalam kondisi an aerobik. Pada tingkat ke 2 sampel tersebut diasamkan dengan HCl sampai pH 2 dan kemudian dicerna dengan pepsin selama 48 jam. Sisa yang tidak larut selama proses ini, disaring, dikeringkan dan dibakar untuk mendapatkan berat abunya, dan berat yang hilang dalam pembakaran ini adalah berat bahan organik. Bahan organik dalam sisa tersebut dikurangkan dari bahan

organik dalam bahan makanan didapat suatu perkiraan dari daya cerna bahan organik. Koefisien cerna yang ditentukan secara *in vivo* biasanya 1 – 2 % lebih rendah dari nilai pengukuran in vitro, teknik ini dipergunakan secara luas untuk menganalisa makanan kasar. Data ini berharga untuk menyusun ransum ternak perah yang berproduksi tinggi dan ternak potong yang diharapkan pertambahan berat yang maksimum. Teknik ini juga penting bagi pemuliaan hijauan yang tujuannya untuk menyeleksi hijauan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi.

Total Digestible Nutrient atau disingkat dengan TDN adalah suatu system yang berdasarkan atas energi dapat dicerna, energi tersedia, atau energi termetabolismekan. Dalam sistem TDN ini nilai makanan dihitung untuk setiap bahan makanan sebagai berikut :

TDN % = % protein kasar dapat dicerna + % serat kasar dapat dicerna + % BETN dapat dicerna + 2,25 x (% ekstrak eter dapat dicerna).

Ektrak eter mengandung 2,25 kali energi karbohidrat dengan unit berat yang sama, sehingga untuk ekstrak eter ini nilainya dikalikan dengan 2,25. Jika dibandingkan dengan sistem nilai energi yang lain, sistem ini mempunyai keuntungan yaitu : perhitungannya sederhana. Alasan lain penggunaan sistem ini secara luas di Amerika adalah berhubungan dengan begitu banyaknya diadakan percobaan pencernaan disana. Kerugian sistem ini adalah tidak dimasukkannya faktor efisiensi dari TDN yang dimetabolisasi dan yang berguna bagi hewan, dan faktor ini sangat berlainan antara bahan satu dengan bahan lain.

2.4. Evaluasi Ekonomi

Analisa pertumbuhan ternak sebagai respon terhadap pemberian pakan memiliki sejarah panjang antara ilmu peternakan dan ekonomi pertanian. Tidak ada buku tentang tinjauan ekonomi atas respon ternak yang bisa lengkap tanpa meminta perhatian para penulis pionir yang tetap eksis dibidangnya. Pendekatan yang lebih modern atas respon pertumbuhan masih tergantung pada perkiraan suatu koefisien pertumbuhan, intake pakan, dan harga pakan. Tanpa semua data-data ini, analisa secar umum adalah mustahil.

Pendekatan ekonomi yang lebih umum terhadap respon ternak dikenali melalui tingkat tekanan atas intesitas tenaga kerja dan modal yang digunakan berhubungan dengan proses pemberian pakan. Dengan demikian, tidak peduli bagaimana kompleks dan umum analisis ekonomi, bukan masalah seberapa rumit dan umum analisa ekonomi yang sesuai, titik awal harus menggunakan setidaknya - biaya pakan yang memberikan pertumbuhan yang

efisien secara teknis. Pentingnya adalah ditekankan oleh fakta bahwa pertanyaan biaya termurah, pakan yang efisien telah menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan-perusahaan konsultan yang beroperasi di pasar di seluruh dunia.

Pencampuran pakan ternak telah dikembangkan dalam 60 tahun yang lalu dari pengolahan yang sangat sederhana hingga cara yang sangat rumit. Pada tahun 1930an, pencampuran pakan masih dilakukan secara manual diatas lantai, sedang pada tahun1990an, komputerisasi pada pabrik pakan untuk ternak besar dan unggas terbatas untuk menciptakan rutinitas pencampuran ribuan ton pakan setiap minggunya. Pada masa lalu, para peternak yang menghasilkan daging, susu telur, atau wool mendapati terbatasnya jumlah bahan pakan lokal, sekarang, para peternak dihadapkan pada pemilihan bahan pakan atau bahan penyusun lainnya yang sangat luas yang dihasilkan ratusan bahkan ribuan mil dari tempat dimana ia bertumbuh. Perubahan konstan dalam harga bahan pakan mempersulit pilihan prioritas dari bahan yang akan dimasukkan dalam bahan pakan.

Biaya pakan terdiri dari komponen yang paling mahal dalam memproduksi unggas atau hewan jenis lain. Akibatnya, upaya untuk mengurangi variabilitas nutrisi dalam pakan akan menghasilkan hasil yang signifikan pada operasi komersial. Bahan pengolahan dan penyimpanan, pemeliharaan peralatan yang memadai pabrik dan pengujian rutin pakan akhir sangat penting untuk memastikan respon optimal untuk nutrisi pakan ternak, sekaligus mengontrol biaya pakan. Ahli gizi dan operator Feedmill harus bekerja sama untuk memantau persiapan pakan, pakan dan spesifikasi akhir. Hasil bottom-line akan pengurangan biaya untuk menghasilkan unit daging atau telur.

Biaya produksi ternak untuk pakan mencapai 70% dari seluruh total biaya. Oleh karena itu dalam memilih bahan baku pakan hendaklah memenuhi persyaratan bahan pakan yang baik :

- Tidak bersaing dengan kebutuhan manusia
- Murah
- Mudah diperoleh
- Kandungan nutrisinya bersaing dengan bahan lain

Sebelum memilih untuk membeli suatu bahan pakan harus dipertimbangkan lebih dahulu harga dengan imbangan zat gizi per unitnya. Misalnya : untuk memutuskan membeli tepung ikan A yang memiliki kandungan protein 60% dengan harga Rp. 6000/kg atau membeli tepung ikan B yang memiliki kadar protein 45 % dengan harga Rp. 5000/kg, yang

manakah yang harus dipilih? Sebelum memilih tepung ikan tersebut terlebih dahulu kita hitung dahulu harga protein per unit dari kedua tepung ikan tersebut :

Tepung ikan A

Kandungan protein = 60%

Harga / kg bahan = Rp. 6000

Harga protein/unit = Rp. $\frac{6000}{\frac{60}{100}}$ = 6000 x $\frac{100}{60}$

=600000/360000

= Rp.1,67/kg protein

Tepung ikan B

Kandungan protein = 45%

Harga / kg bahan = 5000

Harga protein/unit = Rp. $\frac{5000}{\frac{45}{100}}$

=Rp.2,47/kg protein

Dengan hasil yang diperoleh maka akan lebih ekonomis dan efisien jika kita membeli bahan pakan tepung ikan A dibanding tepung ikan B karena harga protein per unitnya lebih murah dibanding tepung ikan B.

DAFTAR PUSTAKA

Anggorodi, R., 1994. Ilmu Makanan Ternak Umum. Penerbit Gramedia Pustaka utama Jakarta.

Arthur E. Cullison., 1979. Feeds and Feeding. Reston Publishing Company, Inc, Virginia.

Dryden, Gordon McL, 2008. Animal Nutrition Science. Cambridge University Press, Cambridge.

Flanders, Frank B., 2011. Exploring Animal Science; chapter 6. Animal Nutrition and Feeding. www.books.google.co.id.

Mc Donald, R.A. Edwards., J.F.D. Greenhalgh., and C.A. Morgan., 2002. Animal Nutrition. 6th edition. Pearson Prentice-Hall.

Pond, W.G., D.C.Chruch, and K.R.Pond, 1995. *Basic Animal Nutrition and Feeding*, 4 Ed. John Wiley & Sons. New York.

Scott, ML., MC. Nesheim and R.J. Young, 1976. *Nutrition of the Chicken*. M.L. Scott and Association, New York.

Sudarmadji, S., Bambang Haryono, dan Suhardi, 1996. Analisa Bahan Makanan dan Pertanian. Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Tillman, A.D., Hari Hartadi, Soedomo R., Soeharto P., dan Soekanto L., 1989. Ilmu Makanan Ternak Dasar. UGM Press, Yogyakarta.

BAB III. KADAR ENERGI BAHAN PAKAN

3.1. Defenisi dan terminologi energi

Semua mahluk hidup membutuhkan makanan untuk dapat menunjang aktifitas hidupnya. Mahluk hidup membutuhkan zat makanan yang terdapat dalam makanan yang dikonsumsinya untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk kerja. Makanan dioksidasi menjadi energi kimia yang dapat diubah menjadi energi mekanik atau panas. Energi kimia dalam zat-zat makanan dapat diubah dalam bentuk lain misalnya makanan yang merupakan sumber karbohidrat dioksidasi dalam tubuh untuk mensintesa lemak tubuh. Oleh karena itu kemampuan pakan atau makanan dalam menyediakan energi akan menentukan kualitas makanan tersebut.

Energi berdasarkan terminologinya berasal dari bahasa Yunani Istilah energi merupakan kombinasi dari dua suku kata Yunani (Greek), yaitu: en, artinya in (bahasa Inggris) atau di dalam (bahasa Indonesia) dan ergon, artinya work (bahasa Inggris) atau kerja (bahasa Indonesia). Dari kombinasi kata tersebut, Scott et al.(1982) mendefinisikan bahwa energi adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kerja. Yang dimaksud kerja disini cakupannya sangat luas, dari mulai melakukan kegiatan yang sangat ringan (misalnya hanya menulis sesuatu atau bahkan hanya istirahat tanpa melakukan sesuatu kecuali bernapas dan berkedip) sampai kepada kegiatan yang memeras banyak keringat. Terdapat berbagai macam definisi dan deskripsi tentang energi, tergantung dari sudut pandang ilmu yang menggunakannya, misalnya apakah konsep energi dalam ilmu fisika dan kimia Di dalam ilmu fisika, energi adalah segala sesuatu yang bisa dikonversi menjadi kerja. Dalam ilmu biologi, kerja (work), biasanya mendefinisikan hanya satu atau beberapa penggunaan dari energi, terutama pada hewan hidup.

3.2.Disposisi energi dalam tubuh ternak

Telah disebutkan sebelumnya bahwa zat makanan berupa karbohidrat, lemak dan protein digunakan oleh hewan untuk membangun jaringan tubuh, mensintesa hasil produk seperti susu, telur serta yang paling penting menyediakan energi untuk aktifitas. Energi sangat dibutuhkan oleh mahluk hidup untuk aktifitas sehari-hari seperti : berjalan, duduk, berlari dan sebagainya. Jumlah energi yang dibutuhkan tergantung aktifitas. Bila volume besar maka jumlah energi yang diperlukan besar, karena semakin banyak aktifitas yang dilakukan makan semakin banyak energi yang dibutuhkan. Sumber energi adalah zat makanan seperti lemak, karbohidrat dan protein. Nilai energi ketiga zat makanan ini berbeda-

beda namun karbohidrat dan protein hampir sama kandungan energinya. Kandungan energi lemak jauh lebih tinggi (±4 ¼ x) dari protein dan karbohidrat. Namun demikian lemak tidak boleh terlalu banyak dalam ransum karena dapat mengganggu pencernaan. Makanan dari karbohidrat lebih mudah dicerna daripada lemak. Energi memproduksi panas menjadi kalori. Kalori secara garis besar terbagi 2 (dua):

1. Kalori kecil

   Yaitu jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gr air 1^oC
2. Kalori besar : (kkal)

   Yaitu jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 1^oC

Kebutuhan energi ternak ini bergantung pada aktifitas dan fase hidupnya, Misalnya hewan yang sedang tumbuh membutuhkan energi untuk tubuhnya atau hidup pokok atau pemeliharaan tubuhnya serta energi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. Oleh karena itu ternak tersebut membutuhkan energi kimia makanan untuk bergerak, dan mensintesa jaringan-jaringan tubuh yang baru. Selain itu ternak juga memerlukan energi untuk menjaga suhu tubuhnya tetap konstan. Apabila ternak mengalami kekurangan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok,tumbuh kembang, produksi dan sebagainya, maka tubuhnya akan merombak cadangan energi yang tersimpan dalam tubuhnya. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhitungkan kebutuhan energi ternak sesuai dengan fase perkembangan hidup ternak.

Energi Total makanan

Ternak mendapatkan energi melalui makanan yang dikonsumsi. Energi total atau Gross Energy makanan adalah jumlah energi kimia yang ada dalam makanan. Jumlah energi kimia dalam makanan diukur dengan mengubahnya menjadi energi panas dan menentukan panas yang dihasilkan. Konversi ini dilakukan dengan mengoksidasi makanan dengan membakar makanan terebut; kuantitas panas yang dihasilkan dari oksidasi lengkap satuan berat makanan dikenal sebagai panas total pembakaran makanan tersebut. Panas ini diketahui sebagai energi total.

Pengukuran energi dapat dilakukan dengan menggunakan “bomb calorimeter”. Metode ini dapat dipakai untuk mengukur energi makanan dan produk ekskretori. Lemak mengandung kalori kira-kira (2 ½) kali kalori karbohidrat, dan ini mencerminkan lebih tingginya ratio karbon dan hydrogen dibanding dengan oksigen. Protein mengandung konsentrasi energi total lebih tinggi dibanding karbohidrat, tetapi karena oksidasinya tidak sempurna, dengan terbentuknya urea, menyebabkan protein mempunyai energi yang tersedia

hampir sama dengan karbohidrat. Makanan ternak mengandung karbohidrat yang rata-rata energi totalnya bernilai 4,4 kkal/gr bahan kering makanan.

Energi yang didapatkan dari makanan tadi diubah untuk memenuhi kebutuhan tubuh untuk berbagai proses tubuh. Namun demikian, tidak semua energi dalam makanan tersebut dapat dicerna dan diserap untuk ternak. Beberapa bagian energi makanan yang dikonsumsi tersebut hilang dalam bentuk padat, cair maupun gas yang diekskresikan, sebagian lainnya hilang dalam bentuk panas. Untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan deposisi energi berikut :



Gambar 11. Skema deposisi energi (Tillman, dkk 1989)

Energi Tercernakan (DE)

Pencernaan makanan merupakan rangkaian proses kimiawi dan fisik dimana komponen zat makanan dipecah menjadi molekul molekul yang dapat diserap melalui dinding sel-sel epithel usus halus. Kecernaan makanan meliputi makanan dan komponen makanan yang dicerna. Koefisien cerna menunjukkan jumlah komponen makanan yang dicerna dan diserap dari saluran pencernaan. Kecernaan makanan sangat dipengaruhi oleh

komposisi fisik dan kimiawi makanan. Misalnya, lignin membatasi kecernaan komponen makanan pada dinding sel hijauan. Struktur endospermae membatasi pencernaan pati pada biji-bijian sereal. Kecernaan protein dan karbohidrat tanaman juga dibatasi oleh zat tannin. Ada perbedaan antara herbivora dan non-herbivora dalam kemampuan mencerna serat hijauan, karena herbivora bersimbiosa dengan mikroorganisme dalam mencerna serat tanaman. Laju makanan melalui saluran pencernaan juga mempengaruhi pencernaan makanan.

Energi tercerna (DE) adalah energi bruto pakan dikurangi energi kotor feses. Oleh karena itu, sistem energi memperhitungkan kecernaan pakan dan memberikan ukuran yang berguna dari energi binatang mungkin dapat digunakan. Keuntungan energi dicerna adalah bahwa hal itu mudah untuk menentukan. Kerugiannya adalah bahwa hal itu tidak memperhitungkan kerugian rekening energi dalam urin dan sebagai gas mudah terbakar dan selama metabolisme feed. Kerugian ini bervariasi di antara bahan pakan.

Energi tercernakan biasa disingkat dengan DC atau disebut daya cerna semu adalah energi makanan yang diperoleh dari selisih antara energi total makanan dengan energi feses. Energi lain yang hilang lewat pernafasan dan keringat serta bagian makanan yang tidak dapat dicerna ditentukan dalam energi tercernakan sehingga disebut juga daya cerna semu.

Rumus Koefisien Cerna Semu= ADC (Apparent Digestible coefisient)

$$ADC = \frac{I - F}{I} \times 100\%$$

Dimana : I = Intake pakan

F = Feses

Energi Termetabolismekan (ME)

Kandungan energi makanan yang dikonsumsi oleh ternak melalui proses pencernaan sebagian akan hilang dalam bentuk zat-zat yang terdapat dalam urine dan gas (pada hewan ruminansia). Energi termetabolismekan adalah energi yang diperoleh setelah energi makanan hilang dalam bentuk urine dan gas hasil metabolisme. Energi ini didapatkan dari selisih antara energi total makanan dan energi yang hilang dalam bentuk gas, urine dan feses. Energi dalam urine berupa nitrogen yang terdapat dalam zat-zat seperti urea, asam hippurat, keratin dan alantoin serta senyawa non-nitrogen seperti glucoranat dan asam sitrat.

Faktor utama yang mempengaruhi nilai energi metabolisme pakan adalah kecernaan pakan itu sendiri. Nilai energi metabolisme makanan sangat bervariasi tergantung jenis ternak/hewan yang mengkonsumsi makanan tersebut. Perbedaan ini disebabkan oleh bentuk atau tipe pencernaan hewan bersangkutan. Pencernaan fermentative dalam rumen atau sepanjang perut, mengalami kehilangan energi dalam bentuk methan. Keberadaan mikroba

rumen berpengaruh terhadap jumlah kehilangan energi dalam urine (penguraian asam nukleat bakteri yang ikut tercerna dan diserap) dan feses (mikroba yang ikut hanyut ke dalam usus dan terbuang ke feces). Secara umum, hewan ruminansia mengalami kehilangan energi dalam bentuk urine dan feses yang lebih besar dibandingkan dengan hewan non-ruminansia.

Sebagian besar gas-gas yang dihasilkan oleh pencernaan ruminansia dalam hal ini rumen adalah methan. Produksi methane sangat erat hubungannya dengan makanan yang dimakan. Pada ternak yang diberi pakan untuk hidup pokok saja, sekitar 7 – 9 % dari gross energi dari makanan hilang dalam bentuk methane. Pada tingkat pemberian pakan yang lebih lengkap (tujuan produksi,reproduksi, dan lain-lain) kehilangan energi dalam bentuk methan sekitar 6 - 7 % dari energi total, penurunan semakin terlihat pada pakan yang kecernaannya tinggi seperti biji-bijian.

Apabila produksi methan sulit ditentukan secara langsung maka dapat diperkirakan sekitar 8% dari energi total pakan yang dikonsumsi. Pendekatan lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan energi metabolisme pada ruminansia adalah dengan perhitungan dari energi tercerna dikalikan 0,8. Ini berarti bahwa sekitar 20% energi tercerna terbuang dalam bentuk urine dan methan.

Energi metabolisme pada unggas lebih mudah ditentukan daripada energi tercerna karena feses dan urinenya dikeluarkan bersama-sama. Pengukuran energi metabolisme suatu jenis pakan dapat dilakukan melalui determinasi secara langsung, yaitu dengan mengurangkan energi total makanan yang dikonsumsi unggas dan energi excreta yang dikeluarkan (urine dan feses) yang didapat dari pembakaran pada “Bomb Calorimeter”.

Nilai Energi termetabolismekan (ME) juga dipengaruhi oleh penggunaan asam-asam amino dalam tubuh, misalnya sintesa protein sebagai sumber energi, deaminasi dan nitrogen yang diekskresikan dalam bentuk urea. Nilai ME biasanya dikoreksi dengan keseimbangan nitrogen dengan menggunakan beberapa faktor koreksi, yaitu: untuk setiap g nitrogen yang disimpan dalam tubuh, ada pengurangan 6,77 kkal untuk babi, 7,45 kkal untuk ruminansia dan 8,22 untuk unggas, sehingga ternak/hewan dalam keadaan keseimbangan negatif, maka nilai ME harus ditambah pada koreksinya.

Bentuk fisik pakan yang diberikan juga berpengaruh terhadap energi metabolisme makanan. Sebagai contoh, pada ruminansia, hijauan kering yang digiling atau dibentuk pellet ataupun hijauan yang dicacah dapat meningkatkan energi yang hilang dalam bentuk feses namun diimbangi dengan berkurangnya produksi methane. Peningkatan pemberian bentuk pakan demikian dapat mengurangi kecernaan pakan dan berdampak terhadap nilai energi metabolisme. Meningkatnya energi yang hilang dalam feses diimbangi dengan berkurangnya

energi yang hilang dalam bentuk methane dan urine. Demikian pula dengan hijauan kering yang dicampur dengan konsentrat akan mengurangi nilai energi metabolisme pakan. Namun bagi unggas, penggilingan terhadap biji-bijian tidak berpengaruh terhadap nilai energi metabolisme.

Heat Increment

Makanan yang dicerna oleh ternak disertai dengan hilangnya energi tidak hanya sebagai energi kimia dalam bentuk padat, cair dan gas yang diekskresikan tetapi juga dalam bentuk panas. Hewan/ternak secara berkesinambungan memproduksi panas dan mengeluarkannya kesekeliling, secara langsung melalui radiasi, konduksi dan konveksi atau secara tidak langsung melalui penguapan. Bila hewan diberi makanan maka panas tubuhnya akan meningkat dalam beberapa jam dibanding dengan panas tubuh normal sebelum diberi makan. Peningkatan panas inilah yang disebut heat increment. Panas reaksi dari makanan atau heat increment dapat dinyatakan dalam (MJ/Kg pakan DM), atau secara relative merupakan bagian dari energi total atau energi metabolisme makanan. Panas dari Energi Excreta tidak termasuk dalam heat increment makanan.

Peningkatan panas atau Heat increment disebabkan oleh proses pencernaan pakan dan metabolisme penguraian zat-zat makanan. Aktifitas makan meliputi mengunyah, menelan dan sekresi saliva membutuhkan kerja otot dimana suplai energi dibutuhkan untuk kerja otot tersebut. Energi tersebut diperoleh dengan mengoksidasi zat-zat makanan. Pada ruminansia, energi yang dibutuhkan dalam mengunyah serat makanan adalah sekitar 3 – 6 % dari energi metabolisme pakan, sedang untuk proses ruminasi dibutuhkan sekitar 0,3 % dari energy metabolisme pakan. Ruminansi juga menghasilkan panas dari metabolisme mikroba dalam pencernaannya, sekitar 7 – 8 % dari energi pakan.

Net Energi dan Retensi Energi

Net energi pakan atau energi bersih pakan diperoleh dari pengurangan heat increment pakan dari energi metabolisme pakan. Net energi biasa juga disebut energi netto adalah energi yang tersedia untuk hidup pokok ternak dan untuk produksi. Energi netto digunakan utamanya untuk menunjang metabolisme dalam tubuh dan akan dikeluarkan dalam bentuk panas. Energi netto yang digunakan untuk pertumbuhan, penggemukan, produksi susu, telur, atau produksi wool disimpan atau dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk energi kimia. Jumlah energi tersebut dianggap sebagai retensi energi pada ternak.

DAFTAR PUSTAKA

Anggorodi, R., 1994. Ilmu Makanan Ternak Umum. Penerbit Gramedia Pustaka utama Jakarta.

Arthur E. Cullison., 1979. Feeds and Feeding. Reston Publishing Company, Inc, Virginia.

Dryden, Gordon McL, 2008. Animal Nutrition Science. Cambridge University Press, Cambridge.

Flanders, Frank B., 2011. Exploring Animal Science; chapter 6. Animal Nutrition and Feeding. www.books.google.co.id.

Mc Donald, R.A. Edwards., J.F.D. Greenhalgh., and C.A. Morgan., 2002. Animal Nutrition. 6th edition. Pearson Prentice-Hall.

Pond, W.G., D.C.Chruch, and K.R.Pond, 1995. *Basic Animal Nutrition and Feeding*, 4 Ed. John Wiley & Sons. New York.

Scott, ML., MC. Nesheim and R.J. Young, 1976. *Nutrition of the Chicken*. M.L. Scott and Association, New York.

Sudarmadji, S., Bambang Haryono, dan Suhardi, 1996. Analisa Bahan Makanan dan Pertanian. Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Tillman, A.D., Hari Hartadi, Soedomo R., Soeharto P., dan Soekanto L., 1989. Ilmu Makanan Ternak Dasar. UGM Press, Yogyakarta.

BAB IV JENIS-JENIS BAHAN PAKAN

Kebutuhan ternak terhadap pakan dicerminkan oleh kebutuhannya terhadap nutrisi. Jumlah kebutuhan nutrisi setiap harinya sangat bergantung pada jenis ternak, umur, fase (pertumbuhan, dewasa, bunting, menyusui), kondisi tubuh (normal, sakit) dan lingkungan tempat hidupnya (temperatur, kelembaban nisbi udara) serta bobot badannya. Maka, setiap ekor ternak yang berbeda kondisinya membutuhkan pakan yang berbeda pula. Rekomendasi yang diberikan oleh Badan Penelitian Internasional (National Research Council) mengenai standardisasi kebutuhan ternak terhadap pakan dinyatakan dengan angka-angka kebutuhan nutrisi ternak ruminansia. Rekomendasi tersebut dapat digunakan sebagai patokan untuk menentukan kebutuhan nutrisi ternak ruminansia, yang akan dipenuhi oleh bahan-bahan pakan yang sesuai/bahan-bahan pakan yang mudah diperoleh di lapangan.

Setiap bahan pakan atau pakan ternak, baik yang sengaja kita berikan kepada ternak maupun yang diperolehnya sendiri, mengandung unsur-unsur nutrisi yang konsentrasinya sangat bervariasi, tergantung pada jenis, macam dan keadaan bahan pakan tersebut yang secara kompak akan mempengaruhi tekstur dan strukturnya. Unsur nutrisi yang terkandung di dalam bahan pakan secara umum terdiri atas air, mineral, protein, lemak, karbohidrat dan vitamin. Semua unsur nutrisi tersebut sangat berguna bagi ternak baik untuk pertumbuhan, perkembangan, produksi dan reproduksi. Setiap bahan pakan memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pengenalan terhadap jenis-jenis bahan pakan sangat penting utamanya untuk mengetahui potensi masing-masing bahan pakan tersebut. Dengan mengenal dan mengetahui potensi yang dimiliki oleh bahan pakan, maka keunggulan dan kekurangan bahan pakan tersebut dapat diketahui. Keunggulan dan kekurangan bahan-bahan pakan merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam putusan pemilihan bahan pakan penyusun suatu ransum atau pakan ternak. Analisa secara ekonomis dapat dimulai ketika mengenal potensi bahan pakan ternak. Keputusan untuk membeli bahan pakan dalam jumlah besar atau kecil harus mempertimbangkan potensi bahan pakan yang bersangkutan.

Penggunaan dan nilai produksi dari bahan-bahan makanan dalam arti kata nilai ekonomi dan kebutuhan nutrisional dari hewan ternak, harus dengan tepat diketahui sebelum makanan ternak dan unggas secara optimum dapat diformulasikan. Masalah utama yang timbul dalam mengevaluasi bahan makanan pada saat ini adalah langkanya informasi (Hartadi,dkk 2005). Oleh karena itu, pengenalan terhadap bahan pakan sangat penting artinya bagi para pelaku peternakan.

4.1. Bahan pakan hijauan

Bahan pakan hijauan adalah semua jenis hijauan makanan ternak yang dapat bermanfaat bagi tubuh ternak serta tidak membahayakan ternak yang mengkonsumsinya. Hijauan makanan ternak dapat digolongkan atas 1) Golongan rumput, 2) golongan leguminosa dan 3) Tanaman Pakan ternak golongan perdu-perduan.

Hijauan ternak adalah semua jenis tanaman yang bisa memberikan manfaat kepada ternak secara metabolis. Hijauan ternak yang dimaksud adalah ; rumput alam, rumput unggul, leguminosa, dan sebagainya. Semua jenis hijauan tadi dapat diberikan kepada ternak secara langsung kepada ternak. Faktor pembatasnya adalah serat kasar yang tinggi ataupun ada tidaknya zat anti nutrisi. Bagi hewan ruminansia, pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya dapat disuplai cukup dengan hijauan tanpa makanan tambahan, berbeda dengan hewan non ruminansia tanpa penambahan makanan/konsentrat akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Hewan ruminansia dapat mencerna serat kasar dengan baik, oleh karena itu :

- Pemberian konsentrat secara berkepanjangan pada sapi perah atau laktasi akan menurunkan kualitas susu, karena asam folat yang terbentuk lebih kecil.
- Sebaliknya pemberian hijauan pada sapi perah/laktasi akan dapat meningkatkan produksi susu karena serat kasar dapat membentuk asam folat yang tinggi atau banyak yang digunakan untuk mencerna lemak sehingga lemak dapat diserap.

Ditinjau dari segi kualitas pakan, kualitas legume lebih tinggi dibanding rumput karena legume proteinnya lebih tinggi serta kaya akan Ca dan P sedang rumput kaya akan mineral. Kecernaan rumput juga lebih tinggi dibanding rumput. Bila rumput dan legume ditanam secara bersama maka akan memberikan keuntungan pada rumput karena legume memiliki kemampuan untuk mengikat Nitrogen dari udara dengan bantuan bakteri pengikat nitrogen yang hidup dalam bintil akar legume sehingga dapat mensuplai kebutuhan nitrogen rumput untuk membentuk tunas-tunas baru sehingga rumput memiliki banyak daun-daun muda. Pada daun muda, kandungan proteinnya lebih banyak dibanding dengan daun tua. Oleh karena penanaman bersama rumput dan legume akan memberikan hasil kualitas hijauan yang lebih baik.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai nutrisi hijauan, yaitu(Mc Donald, dkk, 2002):

1. Tingkat pertumbuhan; tingkat pertumbuhan merupakan faktor yang paling mempengaruhi komposisi dan nilai nutrisi hijauan pasture. Selama pertumbuhan, hijauan membutuhkan lebih banyak jaringan serat untuk memenuhi kebutuhan struktur tubuhnya, dan

karena itu struktur utama yaitu struktur karbohidrat (sellulose dan hemiselulosa) dan lignin meningkat, sedang konsentrasi protein menurun. Ada perbandingan terbalik antara kandungan protein dan serat pada setiap spesies, meskipun dapat diatasi dengan pemupukan nitrogen. Oleh karena itu ada perbedaan pada susunan anatomi tumbuhan yang erat hubungannya dengan kecernaan hijauan. Dinding sel tanaman yang terdiri atas karbohidrat dan protein dapat dicerna dengan baik, sedang dinding sel tanaman dengan kadar lignin yang lebih banyak kecernaannya lebih rendah dibanding. Kandungan lignin pada tanaman akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur tanaman.

2. Spesies; Spesies tanaman sangat luas, namun dalam hal ini adalah penggolongan hijauan kedalam jenis tanaman C3 atau C4. Pembagian species tanaman C3 dan C4 didasarkan pada cara dalam melakukan reaksi fotosintesa. Tanaman C3 yang umumnya berasal dari daerah beriklim dingin yang memiliki 3 atom carbon dari senyawa phosphogliserat yang berperan penting dalam reaksi fotosintesa yaitu dengan menfiksasi CO_2. Sedang tanaman C4 umumnya merupakan tanaman asal daerah beriklim tropis, dimana CO_2 difiksasi pertama dalam suatu reaksi yang menghasilkan 4 karbon senyawa oksaloasetat. Tanaman C4 mampu bertahan hidup pada kondisi tanah yang kesuburannya rendah.

3. Kondisi tanah dan Perlakuan Pemupukan; Jenis tanah dapat mempengaruhi komposisi hijauan pasture, khususnya kandungan mineral. Secara normal tanaman bereaksi terhadap kekurangan mineral dengan membatasi pertumbuhan atau mengurangi elemen/unsur dalam jaringan mereka. Defesiensi elemen mineral pada rumput dapat mengurangi kegunaan rumput. Keasaman tanah juga dapat mengurangi penyerapan mineral oleh tanaman. Perlakuan pemupukan dapat memperbaiki kandungan mineral tanaman serta meningkatkan luas daun untuk laju fotosintesa. Akibatnya, kandungan protein kasar meningkat, seiring dengan kandungan amida dan nitrat.

4. Sistem Penggembalaan; Pada beberapa sistem penggembalaan tradisional, ternak ditempatkan pada lokasi yang sama setiap tahunnya. Pada kondisi seperti ini, diterapkan stocking rate (ternak ditempat per unit luasan) untuk menjamin keseimbangan pertumbuhan rumput baru dengan perenggutan oleh ternak. Pada sistem penggembalaan rotasi, pasture digembalai pada tingkat stocking rate dan penggembalaan yang tinggi, ternak akan memakan semua rumput yang ada dan kemudian diisterahatkan dalam waktu yang lama untuk memperbaiki kondisi padang rumput.

5. Faktor lain yang mempengaruhi nilai nutrisi rumput; Faktor-faktor seperti iklim dan musim dapat mempengaruhi nilai nutrisi. Sebagai contoh, konsentrasi gula (sugar) dan fruktans dapat dipengaruhi secara nyata oleh jumlah cahaya yang diterima oleh tanaman.

Umumnya kandungan karbohidrat terlarut lebih rendah pada saat cuaca berawan dibanding dengan saat matahari bersinar penuh.

Produksi rumput dan legume sangat dipengaruhi oleh cuaca. Pada musim hujan produksi pakan tersedia dengan melimpah, namun pada musim hujan kesediaan rumput dan legume menjadi terbatas atau kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawetan hijauan pakan ketika produksinya melimpah seperti dimusim hujan. Jenis pengawetan hijauan pakan yang dapat dilakukan adalah : a) Hay dan b) Silase.

4.1.1. Golongan Rumput

Rumput merupakan tumbuhan monokotil, mempunyai sifat tumbuh, yaitu membentuk rumpun, tanaman dengan batang merayap pada permukaan, tanaman horisontal dengan merayap tetapi tetap tumbuh ke atas dan rumpun membeli (Sarwono,1987). Pada saat ini, menurut Rismunandar (2007) bahwa, diseluruh dunia telah ada sekitar 9000 jenis rerumputan yang berada antara garis khatulistiwa hingga kutub utara. Graminae adalah tanaman kosmopolitis. Mereka dapat berada didataran rendah hingga tinggi, didaerah basah hingga yang kering, dirawa-rawa yang berair sepanjang tahun maupun musiman, dan dihutan-hutan.

4.1.1.1.Rumput Gajah (*Pennisetum purpureum Schumach.)*

Nama daerah: Elephant grass, napier grass (Inggris), Herbe d'éléphant, fausse canne à sucre (Prancis), Rumput Gajah (Indonesia, Malaysia), Buntot-pusa (Tagalog, Filipina), Handalawi (Bokil), Lagoli (Bagobo), Ya-nepia (Thailand), Co' duôi voi (Vietnam), pasto elefante (Spanyol).

Rumput gajah banyak di jumpai di persawahan. Tingginya bisa mencapai 5 m, berbatang tebal dan keras, daun panjang, dan dapat berbunga seperti es lilin. Kandungan rumput gajah terdiri atas; 19,9% bahan kering (BK), 10,2% protein kasar (PK), 1,6% lemak, 34,2% serat kasar, 11,7% abu, dan 42,3% bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN).

Rumput gajah mempunyai beberapa varietas, antara lain varietas afrika dan varietas hawai.

1. varietas afrika, ditandai dengan batang dan daun yang kecil, tumbuh tegak, berbunga dan produksi lebih rendah jika dibandingkan dengan rumput varietas hawai.
2. varietas hawai, ditandai dengan batang dan daun yang lebar, pertumbuhan rumpun sedikit menyebar, produksi cukup tinggi, dan berbunga.

Panen pertama pada rumput gajah dapat di lakukan pada umur 90 hari setelah tanam. Panen selanjutnya setiap 40 hari sekali pada musim hujan dan 60 hari sekali pada musim kemarau. Tinggi potongan dari permukaan tanah antara 10-15 cm. Produksi hijauan rumput

Gambar 11. Tanaman rumput gajah

gajah antara 100-200 ton rumput segar/hektar/tahun. Alangkah lebih baik kalau sehabis pemanenan rumput gajah diberi pupuk, pupuk dapat berupa pupuk kimia (urea, npk, tsp/kcl) ataupun pupuk alami (kotoran kambing). Sehingga pertumbuhan rumput itu akan semakin bagus dikemudian hari.

Nilai pakan rumput gajah dipengaruhi oleh perbandingan (rasio) jumlah daun terhadap batang dan umurnya. Kandungan nitrogen dari hasil panen yang diadakan secara teratur berkisar antara 2-4% Protein Kasar (CP; Crude Protein) selalu diatas 7% untuk varietas Taiwan, semakin tua CP semakin menurun). Pada daun muda nilai ketercernaan (TDN) diperkirakan mencapai 70%, tetapi angka ini menurun cukup drastis pada usia tua hingga 55%. Batang-batangnya kurang begitu disukai ternak (karena keras) kecuali yang masih muda dan mengandung cukup banyak air.

4.1.1.2.Rumput Raja atau King Grass

Rumput Raja (*Pennisetum purpureophoides*) atau "King Grass" merupakan jenis rumput unggul, mudah ditanam dan dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi dengan potensi produksi yang tinggi. Tidak semua bahan hijauan dapat dimakan oleh ternak kecil.

Umur hijauan pada saat dipangkas mempengaruhi kadar protein, daya cerna dan jumlah yang dikonsumsi oleh ternak. Komposisi zat hara rumput raja tidak banyak berbeda dibandingkan

Gambar 12. Rumput Gajah (Sumber : Deptan.go.id)

dengan rumput gajah. Tetapi karena produksi bahan hijauan maupun bahan keringnya tinggi, maka produksi zat-zat makanan per satuan luas menjadi lebih tinggi. Pada lahan kritis, usaha ternak dengan tanaman industri dan atau buah-buahan tampaknya lebih menjanjikan keberhasilan. Tanaman pangan hanya ditanam pada masa awal saja, atau dengan porsi kecil bila petani merasa perlu untuk menjamin keamanan pangannya. Dengan penataan tanaman paka n dan tanaman tahunan yang serasi, laju erosi dapat dikendalikan.

Rumput raja mempunyai karakteristik tumbuh tegak berumpun-rumpun, ketinggian dapat mencapai kurang lebih 4 m, batang tebal dan keras, daun lebar agak tegak, dan ada bulu agak panjang pada daun helaian dekat liguna. Permukaan daun luas dan tidak berbunga kecuali jika di tanam di daerah yang dingin. Rumput raja dapat di tanam di daeah yang subur di dataran rendah sampai dataran tinggi, dengan curah hujan tahunan lebih dari 1.000 mm. Produksi hijauan rumput raja dua kali lipat dari produksi rumput gajah, yaitu dapat mencapai 40 ton rumput segar/hektar sekali panen atau setara 200-250 ton rumput segar/hektar/tahun. Mutu hijauan rumput raja lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumput gajah Hawai ataupun rumput Afrika.

4.1.1.3.Rumput Setaria *(Setaria sphacelata)*

Rumput setaria sering juga disebut sebagai rumput setaria lampung. Rumput setaria tumbuh tegak, berumpun lebat, tinggi dapat mencapai 2 m, berdaun halus dan lebar berwarna

hijau gelap, berbatang lunak dengan warna merah keungu-unguan, pangkal batang pipih, dan pelepah daun pada pangkal batang tersusun seperti kipas.

Gambar 13. Rumput Setaria

Rumput setaria sangat cocok di tanam di tanah yang mempunyai ketinggian 1200 m dpl, dengan curah hujan tahunan 750 mm atau lebih, dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, dan tahan terhadap genangan air. Pembiakan dapat di lakukan dengan memisahkan rumpun dan menanamnya dengan jarak 60 x 60 cm. Pemupukan di lakukan pada tanaman berumur kurang lebih dua minggu, dengan pupuk urea 100 kg/hektar lahan, dan sebulan sekali di tambah dengan 100 kg urea/hektar.

Hijauan rumput setaria dapat mencapai 100 ton rumput segar/hektar/tahun. Komposisi rumput setaria (dasar bahan kering) terdiri atas; abu 11,5%, ekstrak eter (EE) 2,8%, serat kasar (SK) 32,5%, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 44,8%, protein ksar (PK) 8,3% dan total digestible nutrients (TDN) 52,88%.

4.1.1.4. Rumput Benggala (*Panicum maximum)*

Rumput Benggala atau Guinea Grass dalam bahasa Inggeris, berasal dari Afrika utara. Rumput ini terdiri dari beberapa varietas dan dapat tumbuh didaerah tropik. Rumput ini berdaun lebat, tingginya bervariasi menurut varietasnya, perennial, berkembang dengan potongan-potongan bungkul akar dan tunas atau rhizome. Oleh karena itu rumput ini dapat mempunyai banyak anakan sehingga dapat dikembangkan untuk penggembalaan. Tahan naungan, tetapi kurang tahan terhadap injakan, tidak dapat tumbuh pada tanah dengan

drainase yang buruk. Rumput ini dapat dipotong untuk diberikan pada ternak, dapat dibuat hay atau silase. Palatabilitasnya cukup tinggi meskipun tanaman telah tua.

Pannicum Maximum termasuk tanaman rumput berumur panjang (tahunan). Produksi rata-rata pertahun bias mencapai 150 ton/Ha. Komposisi nutrisi rumput benggala dewasa adalah : Protein kasar (4,2%), BETN (36,4%), SK (34,7%), Ekstrak eter (0,9%), kadar abu (9,8%) dan bahan kering (86%). Rumput ini terdiri atas beberapa varietas yaitu ; Gatton Hamil, Trichoglume.

Gambar 14. Rumput benggala(deptan.go.id)

4.1.1.5. Rumput Kalanjono (*Panicum muticum*)

v

Gambar 15. Rumput Kalanjono(deptan.go.id)

4.1.1.6. Rumput Brachiaria (*Brachiaria decumben*)

Rumput ini juga sering disebut rumput BD atau rumput palisade atau signal grass. Rumput ini berasal dari Afrika. Rumput ini berfungsi sebagai penutup tanah, dapat dijadikan sebagai rumput potongan. Rumput ini juga dapat ditanam di padang penggembalaan. Produksi hijauan dapat mencapat 37 ton BK/ Ha/ thn.

Gambar 16. Rumput BD (deptan.go.id)

Gambar 17. Rumput BR (deptan.go.id)

Gambar 18. Rumput Stargrass (deptan.go.id)

4.1.2. Golongan Leguminosa

Legum termasuk dalam kelas tumbuhan dikotil dimana bijinya mengandung 2 (dua) keping lembaga. Bahan pakan hijauan golongan legume memiliki ciri sebagai : 1) Daunnya adalah daun majemuk 2) bunganya seperti kupu-kupu 3) terdapat polong dimana biji tersimpan. Leguminosa ini dapat dibagi berdasarkan tipe tumbuhnya, yaitu leguminosa yang merambat dan leguminosa pohon. Leguminosa pohon akan dibahas bersama golongan perdu atau pohon hijauan makanan ternak lainnya. Golongan legume kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding dengan rumput, kandungan seratnya rendah serta Ca dan P yang. Kandungan protein yang tinggi ini dikarenakan adanya nodul-nodul akar hijauan legume. Nodul atau bintil akar tersebut mengandung bakteri yang memiliki kemampuan untuk menfiksasi nitrogen. Selanjutnya nitrogen akan dimanfaatkan oleh legume untuk menyusun protein tubuhnya. Meskipun tingkat protein kasar di dedaunan relatif tinggi, kecernaan protein mungkin dibatasi oleh tingginya tingkat tannin.

4.1.2.1. Desmodium Intortum

Legume ini termasuk family papilionaceae, yang tumbuh merambat atau memanjat. Desmodium tidak tahan penggembalaan serta kekeringan. Tumbuh merambat atau memanjat. Tidak begitu disukai ternak. Seperti pada umumnya legume meskipun kandungan proteinnya tinggi namun kandungan tanninnya juga tinggi. Berdaun trifoliate, dengan ujung daun yang agak runcing. Kelas desmodium cukup luas, salah satu yang sering dikenal adalah Desmodium uncinatum. Bila desmodium Intortum disebut Greenleaf, maka D. uncinatum disebut silverleaf.



Gambar 19. Rumput Desmodium intortum serta polong dan bunganya (pasteurpicker.com)

4.1.2.2. Glycine wightii

Legume ini termasuk dalam subfamilia papilionaceae. Tumbuh merambat dan atau memanjat, hidup perennial. Daunnya trifoliate, batangnya kecil-kecil dan bercabang banyak. Lebih tahan terhadap penggembalaan dan kekeringan dibanding desmodium. Ada tiga kultivar dari leguminosa ini yaitu :1) GW cv tinaro, 2) GW cv. Cooper dan 3) GW cv clarence.

Gambar 20. Glycine wightii

4.1.2.3. Macroptilium atropurpureum

Lebih familiar dengan nama siratro merupakan legume perennial yang termasuk sub famili papilionaceae. Daun maupun batangnya berbulu, terutama bagian bawah daun. Siratro tidak tahan terhadap penggembalaan atau injakan. Siratro ini sangat disukai oleh ternak. Terutama digunakan sebagai padang gembala jangka pendek dan permanen. Paling baik dan

cocok untuk penggembalaan, tanaman ini juga dapat digunakan untuk potong angkut dan membuat hay (biasanya bersama rumput), sifatnya yang saling membelit mungkin akan menyulitkan panen. Juga digunakan sebagai konservasi tanah dan sebagai penutup tanah, tanaman sela (termasuk setelah padi), atau sebagai tanaman pakan hijauan ditanam bersama padi gogo. Nilainya sebagai sumber protein pada musim kering berkurang karena kecendrungannya untuk menggugurkan daun pada kondisi yang sangat kering.

Gambar 21. Legume Siratro dan bunganya

4.1.2.4. Genus Stylosanthes

Genus stylosanthes termasuk sub-familia papilionaceae terdapat dua spesies yaitu; Stylosanthes guyanensis dan stylosanthes humilis dengan beberapa cultivarnya.

- *S. Guyanensis*
- *S. humilis*

Stylosanthes umumnya tumbuh tegak bersifat perennial

Gambar 22. Tanaman Stylosanthes

4.1.2.5. Centrocema pubescens

Legume Centrosema pubescens termasuk sub-familia Papilionaceae dari family leguminoceae. Legume ini tahan keadaan kering dan dapat hidup dibawah naungan. Sifat tumbuh centrosema adalah perennial, sangat agresif, batang-batangnya menjalar dan membentuk tanaman penutup tanah.

Gambar 23. Centrosema pubescens

4.1.2.6. Pueraria

Pueraria atau kudzu, Genus pueraria adalah termasuk legume dari sub familia papilionaceae berasal dari Asia timur dan kepulauan Fasifik. Mempunyai sifat membelit, merambat. Hijauan ternak ini digunakan sebagai penutup tanah, untuk mencegah erosi, makanan ternak. Kudzu tropik tidak tahan terhadap penggembalaan berat. Ada beberapa spesies dari genus pueraria ini, antara lain Pueraria triloba, Puerariathum bergiana Panchyrrhizus trilobus Pueraria hirsuta dan Dolichos japonicas.

Gambar 24. Pueraria phaseoloides

4.1.2.6. Calopogonium mucunoides

Biasa disebut calopo atau kacang asu, tumbuh merambat, membelit dan hidup didaerah-daerah yang tinggi kelembaban udaranya. Calopo ditanam sebagai penutup tanah. Calopo digunakan untuk memberantas gulma atau tanaman liar lainnya.

Gambar 24. Calopo

4.1.2.7. Crotalaria usaramoenisis

Legum ini berasal dari pulau jawa termasuk sub familia Papilionaceae dan tidak toksik untuk ternak. Legum ini juga terdiri atas beberapa spesies. Tumbuhnya tegak diatas tanah, legume ini tidak cepat tumbuhnya. Kadang-kadang dipakai sebagai penutup tanah perkebunan.

Gambar 25. Crotalaria mucronata

4.1.3. Dolichos Lablab

Dolichos lablab termasuk famili papilionaceae, legume ini hidupnya perennial pendek atau annual, membentuk tanaman yang merambat dengan daun-daun lebar. Legum ini juga terdiri atas beberapa varietas

Gambar 26. Dolichos Lablab

4.1.4. Golongan Perdu

Hijauan tanaman makanan ternak yang berupa pohon hijauan ternak, dimana daunnya merupakan produksi hijauan ternak utama. Termasuk leguminosa pohon

4.1.3.1. Turi (*Sesbania grandiflora L*)

Turi termasuk golongan leguminosa yang mempunyai nutrien cukup baik untuk bahan makanan ternak karena kadar proteinnya tinggi dan kualitas proteinnya baik. Disamping itu kaya akan vitamin A dan juga sebagai sumber Ca (Calsium) dan P (Fosfor). Dari dua macam daun turi yang kita kenal untuk ternak salah satunya adalah daun turi berbunga putih, dimana kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding daun turi berbunga ungu, dengan masing – masing kandungan protein sebesar 40,62 persen dan 31,68 persen.

Berasal dari daerah srilangka. Tumbuh pada dataran rendah sampai dataran tinggi (1.200m), dengan curah hujan 2.000 mm/tahun.Termasuk sejenis tanaman semak.Di Indonesia banyak ditanam di pematang sawah. Sifat khusus dari tanaman turi adalah pertumbuhannya yang begitu cepat, tinggi tanaman bisa mencapai 10 meter, dan bunga besar berbentuk seperti kupu-kupu berwarna merah muda,putih atau ungu. Berdaun keci-kecil dan bulat,buahnya berbentuk polong yng panjang.Turi dapat beradaptasi pada tanah asam yang

tidak subur,tanah kapur, kadang-kadang juga tumbuh subur pada tanah yang tergenang air. Digunakan sebagai makanan ternak karena :

- Merupakan sumber vitamin,terutama pro vitamin A,Vitamin B,C,
- Sumber mineral,terutama Ca,dan P.

Gambar 11. Turi bunga putih (Sesbania grandiflora L)

Seluruh masyarakat Timor pasti mengenal Turi/kane/gala-gala. Turi merupakan pohon serbaguna sebagai makanan hewan, sayuran konsumsi manusia, untuk kayu bakar dan batangnya sebagai material konstruksi ringan serta sangat baik untuk meningkat kesuburan lahan. Turi bisa diandalkan sebagai makanan pokok Sapi. Sayangnya tumbuhan ini walau tahan terhadap kekeringan, tapi tidak tahan terhadap api dan gulma/tanaman pengganggu.

4.1.3.2. Gamal (*Gliricidia sepium*)

Gamal berasal dari Amerika Tengah dan Brazilia yang beriklim kering. Ditemukan mulai dari permukaan laut hingga ketinggian 1200 meter. Akan tetapi, tumbuhan ini telah lama dibudidayakan dan bernaturalisasi di wilayah tropika Meksiko, Amerika Tengah, dan bagian utara Amerika Selatan, sampai pada ketinggian 1.500 m. Jenis ini juga telah diangkut ke wilayah Karibia dan kemudian ke Afrika Barat. Ia di introduksikan ke Filipina oleh orang Spanyol pada awal tahun 1600-an, dan ke Sri Lanka dalam abad ke-18l dari sana tumbuhan ini mencapai negara Asia lain, termasuk Indonesia (kira-kira tahun 1900), Malaysia, Thailand

dan India. Gamal diperkirakan masuk ke Indonesia untuk digunakan sebagai tanaman pelindung pada areal perkebunan di daerah Medan. Gamal berbentuk pohon,semak, daun majemuk bersirip ganjil,bunga berbentuk malai, lukar dari ketiak daun,bunga berwarna merah jambu, buah polongan,akar cukup dalam.

Gambar 12. Gamal muda

Gamal atau Gliricidia sepium adalah tanaman leguminosa pohon yang dapat tumbuh dengan cepat didaerah tropis. Dapat tumbuh pada berbagai macam tipe tanah dan pH rendah sampai tinggi (4,5-6,9)m serta tahan terhadap curah hujan yang rendah sampai tinggi (50-100mm/bln).

Fungsi tanaman: tanaman pelindung,pagar,makanan ternak,dan penahan erosi.Dapat diperbayak dengan menggunakan stek ataupun biji. Gamal ditanam sebagai penahan angin, bank protein, pakan ternak dan pagar hidup. Tanaman yang diperbanyak dengan setek sudah dapat dipanen perdana pada usia di bawah 1 tahun. Biasanya 8-10 bulan. Sedangkan pada tanaman biji, hasil biomasa baru dapat diperoleh pada usia sekira 2 tahun.Penanaman setek lebih baik berasal dari batang bawah tanaman yang cukup usia (diatas 2 tahun), diameter batang cukup besar (diatas 4cm) dengan panjang setek bervariasi mulai dari 40cm sampai 1.5m. Jarak tanam juga bervariasi, antara 40 -50cm sampai dengan 1.5 – 5m tergantung kebutuhan. Gamal mengandung nilai gizi yang tinggi. Protein kasar berada diantara 18-30% dan nilai ketercernaan 50-65% (lihat tabel).

Walaupun sangat bermanfaat bagi ternak, tingkat racun dalam Gamal juga sudah dikenal sejak lama. Sekurang-kurangnya ada beberapa jenis komponen racun dalam Gamal,diantaranya dicoumerol, suatu senyawa yang mengikat vitamin K dan dapat mengganggu serta menggumpalkan darah. Dicoumerol diperkirakan merupakan hasil konversi dari coumarin yang disebabkan oleh bakteri ketika terjadi fermentasi. Zat lain yang

Tabel 1. Komposisi Bahan Pakan yang Ada Dalam Tubuh Ternak

Hijauan Gamal	Persentase
Bahan Kering	29,1
Protein Kasar	23
Serat Kasar	20,7
A b u	20,7
Ca	76,00
P	76,00
CP	55,3

perlu diperhatikan adalah Nitrat (NO3). Sebetulnya nitrat itu sendiri tidak beracun terhadap ternak, tapi pada jumlah yang banyak dapat menyebabkan penyakit yang disebut keracunan nitrat (nitrate poisoning). Nitrate yang secara alamiah terdapat pada tanaman di rubah menjadi nitrit oleh proses pencernaan, pada gilirannya nitrit dikonversi menjadi amonia. Amonia kemudian di konversi lagi menjadi protein oleh bakteri dalam rumen. Apabila ternak sapi mengkonsumsi banyak hijauan yang mengandung nitrat dalam jumlah besar, nitrit akan terakumulasi di dalam rumen. Nitrit sekurangnya 10 kali lebih beracun terhadap ternak sapi dibandingkan nitrat. Nitrit diserap kedalam sel darah merah dan bersaru dengan molekul pengangkut oksigen, hemoglobin sehingga membentuk methemoglobin. Sayangnya, methemoglobin tidak dapat membawa oksigen dengan efisien seperti hemoglobin, akibatnya detak jantung dan pernafasan ternak meningkat, darah dan lapisan kulit berubah warna menjadi biru kecoklat coklatan, otot gemetar, sempoyongan dan bila tidak segera ditangani dapat mati lemas. Selain itu, dalam Gamal juga terdapat molekul alkaloid yang belum dapat diidentifikasi dan senyawa pengikat protein yang juga tergolong zat anti nutrisi, tannin walaupun dalam konsentrasi yang cukup rendah dibandingkan Kaliandra (*Calliandra calothrysus*).

4.1.3.3. Kaliandra (*Calliandra calothrysus*)

Tinggi tanaman (pohon) kaliandra dapat mencapai 8 m. tanaman kaliandra dapat tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 1500 m dpl, toleran terhadap tanah yang kurang

subur, dapat tumbuh cepat dan berbintil akar sehingga mampu menahan erosi tanah dan air. Manfaat kaliandra pada makanan ternak adalah sebagai bank protein. Penanaman kaliandra pada tanah-tanah yang kurang produktif dapat menekan pertumbuhan gulma. Selain itu tanaman ini dapat digunakan sebagai tanaman penahan erosi dan penyubur tanah. Daun kaliandra mudah dikeringkan dan dapat dibuat sebagai tepung makanan ternak kambing.

Ada baiknya sewaktu pemberian makanan kepada ternak di berikan secara campur. Hal ini bertujuan agar kandungan yang berada di dalam masing-masing tanaman dapat saling melengkapi, sehingga kambing akan merasa tercukupi kandungan gizi maupun proteinnya. Selain itu juga akan meminimalkan kambing merasa bosan makan apabila di sajikan dalam satu jenis tanaman saja secara berulang-ulang.

Gambar 13. Kaliandra dan bunganya

Tabel 2. Komposisi Kandungan Kaliandra

Hijauan Kaliandra	Persentase
Protein Kasar	22,4
EK (kkal/kg)	46,30
SDN	24,0
Lignin	19,95
A b u	7,5
Ca	1,6
Protein	0,2

4.1.3.4. Lamtoro Gung (*Leucaena leucocephala*)

Lamtoro (leucaena leucocephala) merupakan salah satu jenis leguminosa pohon yang mengandung protein tinggi dan karotenoid yang sangat potensial sebagai pakan ternak non ruminansia seperti unggas di daerah tropis. Tanaman lamtoro menghasilkan bahan kering sebesar 6–8 ton per hektar per tahun atau sekitar 20-80 ton bahan segar dan kandungan protein kasar hijauan lamtoro cukup tinggi berkisar 25%–30% (NAS, 1984). Komposisi asam amino daun lamtoro hampir seimbang dengan tepung ikan, kecuali lisina dan metionina yang lebih rendah, karena daun lamtoro mengandung mimosin sebagai asam amino beracun. Apabila dibandingkan dengan bungkil kacang kedelai, kecuali asam glutamat, kandungan asam amino lainnya cukup seimbang. Daun lamtoro merupakan sumber vitamin A dengan kandungan β-karoten tinggi dan mempunyai kandungan xantofil lebih tinggi dibandingkan jagung kuning sebagai sumber pigmentasi pada kulit dan kuning telur unggas. Dedaunan leguminosa pohon banyak mengandung senyawa fenolik dalam konsentrasi yang tinggi, khususnya tanin dan mimosin seperti halnya daun lamtoro (Jayanegara & Sofyan, 2008). Mimosin merupakan golongan asam amino aromatic dengan rumus kimia (β-N-(3-hydroxy-4-pyridone)-α–a.

Lamtoro berasal dari Amerika Tengah dan selatan. Tumbuh pada ketinggian 0-1200 m dpl,dengan struktur tanah sedang sampai berat,dan dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur.Curah hujan 700-1.650 mm/tahun,temperature 20-30^{o}c. Tanaman ini berbentuk pohon yang bisa mencapai ketinggian 10 m dan memiliki akar yang cukup dalam. Daunnya kecil-kecil,bentuknya lonjong,bunganya bertangkai.Tanaman ini toleran terhadap hujan,angin,kekeringan,serta tanah-tanah yang kurang subur. Lamtoro lebih sesuai pada tanah yang tidak masam (pH 5,5-7,5) dan kurang baik tumbuhnya apabila tanah masam (pH 4-5,5). Gliricidia mempunyai daya toleransi yang lebih tinggi terhadap kemasaman tanah, tahan pangkasan dan cepat kembali bertunas sesudah pemangkasan. Kaliandra mempunyai daya adaptasi yang cukup luas tetapi kalah populer dibandingkan dengan gliricidia. Lamtoro dapat digunakan sebagai tanaman makanan ternak, tanaman pelindung, mempertahankan kesuburan tanah dan mencegah erosi.Jarak tanam:180-240 cm.pemotongan pertama dapat dilakukan pada waktu tanam berumur 6 – 9 bulan kemudian pemotongan dapat diulangi 4 bulan sekali.

Gambar 14. Lamtoro beserta buahnya

4.2. Bahan Pakan biji-bijian

1. Biji-bijian dan hasil ikutan penggilingan

1.1. Padi (Oryza sativa) gabah

- beras = *polished rice* 50-60%
- menir = *broken rice* 1-17%
- sekam = *hulls* 20-25%
- dedak = *bran* 10-15%
- bekatul = *rice polishing* 3%

Gabah merupakan:

- sumber energi
- sumber vitamin - untuk kuda, unggas, burung
- untuk ternak lain jarang digunakan, karena mahal dan ditinjau dan manfaatnya yang tidak sepadan.

Dedak halus merupakan hasil ikutan penggilingan padi atau hasil sisa penumbukan padi. Dedak halus cukup disukai ternak, merupakan sumber vitamin.

Penggunaan dedak halus untuk sapi maksimal 40 % dan total ransum. Kandungan minyaknya mencapai 14 sampai 18 %, sehingga merupakan problem dalam penyimpanan karena dapat terjadi ketengikan (rancidity). Keadaan ini disebabkan oleh adanya enzim lipolitik yang menjadi aktif setelah kulit padi dipisahkan dan beras, sehingga kandungan asam lemak bebas naik dengan pesat. Pemanasan menggunakan uap sampai 100 ^{0}C selama 4 sampai 5 menit cukup menghambat terbentuknya asam lemak bebas, atau menggunakan

hembusan udara panas 2000 C selama 10 menit, atau pengurangan air sampai dibawah 4 persen.

Kandungan nutrien dedak halus sangat bervariasi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kandungan sekam. Hal ini tergantung pada saat penggilingan.

Kandungan nutrien dedak halus :

PK:13,8% EE :14,1% TDN : 84,2% BK : 87,1% SK : 6,56%

ETN : 68,7% Abu : 4,5%

2.1 Gandum (Triticum aestivum)

Wheat pollard merupakan hasil sampingan penggilingan gandum.

Komposisi kimia wheat pollard

PK:16,5% EE : 3,6% TDN : 84,2% BK: 87,1%

SK: 6,6% ETN: 68,7% Abu : 4,5%

1.2 Jagung (Zea mays)

Jagung disebut juga the king of the cereals > nilai pakan tinggi

- jagung kuning > pro vitamin A tinggi
- SK dan mineral rendah
- PK dan nilai biologis rendah
- Protein jagung : zein, defisien lysin
- Cystine tinggi, tetapi lysin dan Tryptophan rendah

  bioteknologi

  (kloning gen)
- varietas opaque-2: kandungan Lysin dan Tryptophan tinggi
- Jagung merupakan bahan pakan sumber energi, baik untuk semua ternak, palatable
- penggunaan jagung sebaiknya digiling sebelum diberikan karena dapat meningkatkan kecernaan dan palatibilitas
- penggunaan untuk sapi perah sebaiknya direbus, baik sebagai sumber energi, pada awal laktasi, meningkatkan padatan susu (protein dan lemak)
- untuk babi penggunaannya sebaiknya dihentikan atau dikurangi sekitar 1 bulan sebelum dipotong untuk menghindar terbentuknya lemak yang lembek/lunak 4 karena asam lemak unsaturated (tidak jenuh) dalam jagung tinggi.

- warna kuning jagung Cryptozanthin dapat mempengaruhi warna lemak babi.
- jagung kuning baik untuk unggas, karena pigment kuning dapat memberi warna pada daging dan yolk kuning telur).

  Pigmen sebagian diubah menjadi vitamin A dalam tubuh ternak.
- komposisi kimia jagung

PK: 8-10%	EE : 3,5-5%	Ca: 0,02%
SK: 2-4%	ETN : 68-80%	P : 0,25%
BK: 84-86%	Abu:1,2-2%	

Hasil ikutan (by product) dan jagung antara lain:
bekatul jagung dan dedak jagung, seperti halnya jagung defisiensi:

- lysine.
- Methionine
- tryptophan

1.4 Sorghum (cantel), Sorghum bicolor, Sorghum vulgare

- Sorghum dapat dipakai sebagai pengganti jagung karena kadar nutrien hampir sama. Kandungan PK 11,1% sehingga lebih tinggi daripada jagung, tetapi nilai cerna & FE lebih rendah

SK:2,3%	FIN :80%
EE:3,4%	Abu :2,2%

- bila disuplementasi dengan bahan pakan lain, sorghum baik untuk semua ternak.
- harus diproses, diolah, atau digiling sebelum diberikan ternak, karena sebagian besar tidak dikunyah tertelan sebelum dikunyah.
- mudah timbul problema pencernaan karena biji dilapisi oleh lilin (wax).
- kandungan Carotene sangat rendah, sehingga pada ruminansia perlu disuplementasi/pakan hijauan.

Biji kapas (Gossypium sp.)

- 1 ton biji 200 kg minyak

  500 kg bungkil

  300 kg sekam
- mengandung gossypol:
- pigment

- 0,4-1,4% berat biji
- punya efek penghambat enzim digesti
- sebagai anti oksidant bioiogis mengurangi nafsu makan
- dapat menyebabkan kontipasi
- toksik untuk monogastrik bila diberikan banyak babi dan kelinci paling sensitif
  unggas lebih toleran
  ruminansia dewasa dapat mencerna gossypol
  ruminansia muda lebih mudah terpengaruh
- biji dipres tinggal 0,05-0,2% gossypol
- biji kapas dapat diberikan pada sapi dewasa, tetapi direndam dulu
- efek gossypol dapat dicegah dengan menambahkan ferrous sulfate penggunaan untuk pakan sapi dan ternak lain: + □_□ 5 %
- komposisi kimia biji kapas

  BK:93% SK:21% Abu :4,9%

  PK:20% EF:22% ETN:26%

1.6 Biji bunga matahari *(Helianthus annuus)*

- untuk unggas
- SK tinggi
- sumber energi
- pembuatan minyak
- komposisi kimia biji bunga matahari

  BK :91% SK:19% Abu :9%

  PK:12% EE:13% BETN:40%

1.7 Biji karet *(Hevea brasiliensis)*

- pohon karet akan menghasilkan biji setelah berumur 4 tahun
- tiap buah berisi 4 biji □ jatuh ke tanah bila masak/tua
- tiap pohon: 800 buah (1,3 kg), panen 2x setahun, sehingga sangat potensial untuk penghasil pakan
- mengandung minyak, bila diekstraksi minyaknya akan dihasilkan bungkil
- biji karet mengandung HCN
- Komposisi kimia biji karet

  BK:70% FE :52%

PK:18% Abu:2,6%

SK:1,9% ETN:25%

1. Kacang-kacangan

1.1. Kacang kedele (Glycine max)

- tertinggi nilainya sebagai bahan pakan kanena kadar PK tinggi, tinggi kadar asam amino essensial
- protein kedele disebut glycinine susunannya mendekati protein susu > caseine dan tanaman
- glycinine, kandungan Lycine dan trypthopan tinggi
- untuk unggas, sapi perah, babi pada babi> lemak lunak
- penyimpanan kacang kedele, kadar air < 15%
- bila diberikan: dipecah/digiling
- untuk sapi : tidak perlu dipanaskan dulu
- untuk unggas, babi: harus dipanaskan untuk menghilangkan faktor penurunan nilai pakan
- bila diberikan pada sapi dalam jumlah banyak perlu ditambah vitamin
- kedele yang telah ditumbuk tak dapat disimpan dalam iklim panas
- kedele mengandung:

a. trypsin inhibitor:

Untuk mencegah aktivitas enzim pencernaan trypsin. Biji kedele mentah dipanaskan tetapi jangan terlalu panas dan Iama karena akan merusak asam amino essensial

b. urease : enzim yang dapat melepaskan amonia dan urea □□ kedele mentah sebaiknya tidak dibenikan ternak bersama urea

- hasil analisis:

BK:88% FE :16%

PK: 38% Abu : 5,8%

SK:8% FIN :32%

1.2. Kacang tanah (Arachis hypogaea)

- diantara kekacxangan kacang tanah tertinggi kadar lemaknya
- harga mahal □□ jarang diberikan lemak □□ konsumsi manusia
- kacang tanah berjamur: toksik (beracun)

Aflatoxin, dihasilkan oleh jamur Aspergilus flavus 4 ditandai kacang akan hilang warna 4 pucat/putih.

Jamur tumbuh pada temperatur 30-35 0C dan bila kedap air: kacang : > 9% bungkil: >15%

Pencegahan:

Saat panen jangan pecah/rusak dan segera dikeringkan □□ disimpan dalam kelembaban rendah

BK:92% EE :48%

PK: 33% Abu : 2,6%

SK:1,8% ETN:15%

2. Umbi/akar

- Pada kondisi segar kadar air: 80-90%
- Kandungan pati dan gula tinggi □ sumber energi
- Kandungan serat kasar rendah,
- Kecernaan tinggi,
- Kandungan protein kasar rendah, berupa NPN□ terutama yang masih muda/belum masak
- Kandungan Ca, P rendah
- Kandungan vitamin pada umumnya rendah, kecuali wortel yang tinggi kandungan vitamin A

2.1 Ketela rambat *(Ipomoea batatas)*

- Bahan pakan ini mudah tercerna
- Merupakan sumber energi
- Pemberian segar pada babi 30-50% pengganti bebijian
- Pemberian kering pada babi 60%
- kering bisa untuk unggas asal disuplementasi dengan bahan pakan lain
- BK :40% EE: 1%

  PK: 5% Abu: 3%

  SK: 2% ETN:88%

2.2. Cassava *(Manihot utilissima)*

- penggunaan cassava sebaiknya diproses dulu misal dikeringkan gaplek, meskipun ada yang memberikan dalam keadaan segar.
- mengandung glukosida linamarin HCN, kulit mengandung HCN yang tinggi
- ada 2 varietas:

- pahit: 0,02-0,03% HCN harus diproses
- manis < 0,01% HCN dapat diberikan mentah untuk komersial

- kadar HCN tak hanya tergantung dan vanietas, tetapi juga tanah
- HCN dapat dikurangi atau dihilangkan dengan:
- dikeringkan, diiris, direndam
- dapat digunakan untuk pakan babi, sapi, kambing, domba, dan unggas.

unggas 20% dalam ransum babi 20-30%.

Onggok : merupakan hasil sisa pembuatan pati.

Komposisi kimia onggok tergantung pada proses pengeringannya: pada musim hujan atau kemarau, penjemuran pakai alas atau tidak.

Komposisi kimia cassava segar:

BK: 30% EE : 0,5%

PK: 2% Abu :4% SK: 2% ETN:85%

2.3. Kentang (Solanum tuberosum)

- untuk hampir semua ternak
- mentah direbus

  tidak palatable

  laksatif (pencahar) terjadi laksan (laxant)
- mengandung solanine : alkaloida dibagian lembaga dibuang dulu

  sapi perah: 15 kg/han mentah

  beef : 20 kg/han mentah

  babi : 5-6 kg/han rebus

  unggas 40% ransum rebus
- Komposisi kimia kentang dalam keadaan segar

  BK:24% EE :0,6%

  PK:12% Abu :5%

  SK:3% ETN :80%

2.4. Molases = tetes

Berasal dan hasil ikutan pembuatan gula tebu.

Tanaman tebu = *Saccharum oificinarum*

- analisis: BK 78-86%

gula 77%

abu 10,5%

PK 3,5%

Kandungan mineral tinggi, tetapi Ca dan P

4.3. Bahan pakan asal hewan

Semua jenis bahan pakan ternak yang berasal dari golongan hewan. Adapun bahan-bahan pakan tersebut adalah

1.2. Tepung hewan

- bahan bakunya berasal dan sisa-sisa pemotongan ternak di rumah potong.
- sumber protein dan mineral.
- terutama untuk ternak unggas & babi.
- susunan nutrien bervariasi tergantung bahan bakunya.

1.3. Tepung daging

- bahan bakunya seperti tepung hewan, sisa-sisa daging
- belum banyak diusahakan
- sumber protein dan vitamin B12,
- BK: 91,8% EE :12,3%

  PK: 87,3% Abu : 0,4%

  SK: - BETN: -

1.4. Tepung darah

- bahan baku diperoleh dirumah potong
- sumber protein
- defisiensi isoleusine, arginine, methionine
- Ca dan P rendah
- volume darah ternak 7-9% BB
- pemakaian 2-3% dalam ransum
- BK : 90% EE :1,8

  PK : 93,5% Abu : 4,7%

  SK: - BETN: -

1.5. Tepung daging tulang

Dibuat dan ternak afkir dan suatu peternakan besar (Australia misalnya). Disamping itu ada tepung tulang kandungan gizi tergantung pada cara pengolahan:

hanya direbus atau dibakar. Apabila direbus kandungan PKnya masih,sedangkan bila dibakar hanya tinggal mineralnya.

2. Asal ikan

2.1 Tepung ikan

- bahan baku ikan laut/tawar atau sisa-sisanya.
- kualitas tergantung macam ikan dan pengolahan
- kebanyakan untuk ransum unggas, tidak lebih dan 10%
- AA: arginine-glycine-leucine-valine
- komposisisi kimia tepung ikan
- BK: 84,6% EE : 10,2%

PK : 74,8% Abu : 14,2%

SK : 0,6% ETN: 0,2%

Kualitas tepung ikan ditentukan cara pengolahan, diekstraksi atau tidak. Hal ini disebabkan kandungan EE bahan bakunya bervariasi.

Tipe ikan

a. Low oil â?? low protein

< 5% < 15%

b. Low oil â?? high protein

<5% 15-20%

c. Low oil â?? very high protein

< 5% > 20%

d. Medium oil â?? high protein

5-15% < 15%

e. High oil â?? low protein

> 15% < 15%

Sebagai contoh kandungan gizi ikan paus setelah diambil minyaknya

Macam bahan	PK (%)	EE (%)	Abu (%)
Daging	80-65	3-5	2-3
Daging & tukang	45-65	10-16	20-30
Tulang	18-25	>	55-65

2.2. 1. Fish meal (ikan rucah)

Umumnya merupakan ikan rucah (ikan kecil-kecil yang ikut tertangkap oleh nelayan) yang kemudian dikeringkan

Ikan mengandung lemak /asam lemak ikatan rangkap yang cukup tinggi sehingga mudah teroksidasi dan mudah tengik

Lemak dalam pakan berfungsi sebagai sumber energi bagi ikan dan sumber asam lemak esensial.

Asam lemak esensial bagi ikan laut adalah kelompok n-3 HUFA.

Sumber: dmv5.blogspot.com/2010

Tepung udang

Tepung udang kebanyakan bahan baku berasal dan kepala dan kulit udang, udang laut atau tawar

- tepung udang jarang tersedia
- kepala udang Â± 44 % seekor udang
- kandungan mineral tinggi
- Komposisi kimia tepung udang
- BK : 85,6% EE : 3,2%

  PK : 54,20/o Abu : 29,3%

  SK : 13,3% ETN: -

Protein kasar kepala udang mengandung Chitin □□ yang oleh enzim Pencernaan.

Tercerna oleh enzim chitinase (diduga diproduksi oleh mikrobia numen) udang keseluruhan (whole) mengandung Â± 10% chitin. Kepala dan cangkang mengandung Â± 50% chitin

tepung ikan

Sumber: dmv5.blogspot.com/2010

2. Bahan pakan sisal hasil pertanian

3. Bahan pakan sisa hasil industry

Bungkil

Bungkil adalah hasil ikutan prosesing biji-bijian khususnya kacang-kacangan setelah diambil minyaknya.

□□ yang tertinggal: protein kasar (PK)

serat kasar

beberapa pati

mineral

□□ kandungan protein kasar (PK) bungkil lebih tinggi daripada bahan asalnya.

Protein kasar bungkil asal kacang-kacangan lebih baik daripada asal biji-bijian (cerealia).

Kualitas bungkil tergantung prosessing (banyak sedikitnya minyak yang tertinggal), serta kemurnian bahan asal.

□□ tergantung pada pengolahan

- pengepresan (mekanik) □□ hidrolik atau manual atau
- pakai pelarut lemak (solvent)

2.1. Bungkil kacang tanah (Arachis hypogaea)

- bungkil kacang tanah merupakan hasil ikutan pabnik minyak kacang tanah hanya daerah-daerah tertentu penghasil minyak/bungkil kacang tanah
- media yang baik untuk tumbuhnya Aspergilus flavus □□ aflatoxin B & G (Blue dan Green) yang paling hebat: B □□ bersifat karsinogenik
- pada babi disebut mikotoksin □□
    - kulit pucat
    - nafsu makan turun
    - enzim alkali fosfatase dalam serum naik □□ dapat mereduksi konsentrasi vitamin A dalam hati □□ hati pucat (diskolorisasi) defisiensi lysine , selain untuk bahan pakan babi juga untuk sapi dan unggas
- komposisi kimia bungkil kedele

BK:84,3% EE :12,5%

PK:40,1% Abu :6,2%

SK: 8,3% BETN: 32,9%

2.2. Bungkil kedele (Glysine soya, Glycine max)

- hasil ikutan pabrik minyak kedelai
- terbaik kualitasnya diantara macam bungkil karena kandungan asam amino glycine
- daerah-daerah tertentu penghasil bungkil
- untuk ternak babi lebih baik dimasak lebih dahulu

□□ dapat menyebabkan lemak lembek bila diberikan > 10% dalam ransum

□□ anti trypsin

□□ hemoglutinin □□ aglutinasi (penggumpal) sel darah merah (in vitro)

komposisi kimia bungkil kedele

BK: 84,8% EE :5,2%

PK: 46,7% Abu : 7,4%

SK: 7% BETN:33,7%

2.3. Bungkil kelapa (Cocos nucifera)

- hasil ikutan ekstraksi daging kelapa kering (kopra)
- lebih mudah didapat
- defisiensi lysin
- minyak Â± 1-22%
- 1000 kelapa □□ 180 kg kopra

110 kg minyak

55 kg bungkil

- terlalu lama disimpan dan >> minyak □□ dapat terjadi ketengikan (ransiditas) □□ diarhe
- lemak susu tinggi
- untuk sapi 1,5-2 kg/hari
- untuk ransum babi tidak lebih dari 20%

Bila lebih perlu perhitungan yang lebih teliti dalam menyusun ransum □□ lemak tubuh lembek

- komposisi kimia bungkil kelapa

BK: 89,2% EE :13,9%

PK:20,8% Abu :5,1%

SK: 17,3% BETN :43,9%

2.4. Bungkil kelapa sawit atau palm kernel cake (Elaeis guineensis) merupakan hasil ikutan pabrik minyak sawit

- banyak terdapat di Sumatra
- ada 2 macam bungkil kelapa sawit:
    1. bungkil kelapa sawit berikut kernelnya
    2. bungkil inti sawit
- untuk sapi perah dan babi susu lemak tubuh keras
- komposisi kimia bungkil kelapa sawit

BK: 89,6% EE :10,6%

PK:19,7% Abu :4,8%

SK: 25,8% BETN: 39,1%

2.5. Bungkil biji kapok (Ceiba pentandra)

- 1 pohon Â± 500 buah (umur Â± 7 tahun)
- tak mengandung gossypol tetapi mengandung cyclopropenoid
- ayam □□ 2 % dalam campuran ransum bila> 2 % □□ laju pertumbuhan turun, daya tetas telur turun
- Komposisi kimia bungkil biji kapok

BK:83,9% FE :6,7%

PK: 32,6% Abu : 8,3%

SK: 30,2% BETN: 22,2%

2.6. Bungkil wijen

- Kandungan PK tinggi
- Jarang diberikan ternak, tetapi untuk manusia
- Baik untuk ternak sapi dan babi, tetapi untuk babi dapat menyebabkan lemak tubuh menjadi lunak.
- Komposisi kimia:

BK 93,5% SK 6,5% EE 13,5%

PK 42,4% Abu 12,8% ETN 24,8

2.7. Konsentrat protein daun (Leaf concentrate protein)

Diperoleh dengan jalan menggiling daun dan mengepres hasil gilingan daun sampai keluar airnya. Diamkan dan akan terjadi penjendalan, keringkan dan giling.

Kandungan PK sampai 40% dapat sebagai subsitusi tepung ikan.

1. Bulu

Hasil bulu ± 6% dan poultry dapat digunakan sebagai sumber protein. Protein bulu disebut: keratin mengandung 14-15% cystine, sangat sukar larut dan dicerna

 dihidrolisis dulu, dimasak dengan menggunakan Autoclav dengan tekanan uap 15-20 lb selama 1 jam (345kPa)

 dikeringkan dan digiling kecernaan mencapai 70-80 %

Autoclaving menurunkan cystyne sampai 5-6 %

defisien: lysine, methionine, tryptophan

Komposisi kimia bulu yang telah dihidrolisis

BK:93% FE :3,9% EIN:0,5%

PK:91,4% Abu:3,8% SK:0,4%

2. Limbah pemotongan ternak,

2.1 lsi rumen

Limbah pemotongan ternak ruminansia lsi rumen sapi berat 350 kg sekitar 30 kg.

 dikurangi kadar air untuk dibuat silage atau dikeringkan , dapat diprec, filtrat dikeringkan untuk pakan unggas, residu (ampas untuk pakan ruminansia.)

2.2. Hasil sisa peternakan ayam hasil dan peternakan ayam ada dua:

a. Kotoran ayam, dikenal dengan istilah poultry manure, dikeringkan dapat untuk campuran makanan ternak, dikenal dengan istilah dried poultry manure (DPM)

b. Kotoran ayam bercampur bulu dll, dikenal dengan istilah poultyry waste, dikeningkan untuk campuran makan ternak, dikenal dengan istilah dried poultry waste (DPW).

3. Single Cell Protein

Merupakan protein (biomass) yang diproduksi cepat per satuan waktu.

Jenis	Waktu Produksi (2 X biomass)
Yeast/bacteri	1/3 - 2 jam
Algae (gangang)	1 - 24 jam
Rumput	I - 2 minggu
Ayam pedaging	2 - 4 minggu
Babi growing	4 - 6 minggu

Sapi growing 4 - 8 minggu

N anorganik (NPN) + Sumber energi (KH non struktural)□ protein (N organik)

4. Bahan pakan konvensional

5. Bahan imbuhan pakan (feed additive)

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, Ibnu Katsir. 2003. Nutrisi Ayam Petelur. Penerbit : Satu Gunungbudi, Bogor.

Anggorodi, R., 1994. Ilmu Makanan Ternak Umum. Penerbit Gramedia Pustaka utama Jakarta.

Arthur E. Cullison., 1979. Feeds and Feeding. Reston Publishing Company, Inc, Virginia.

Dryden, Gordon McL, 2008. Animal Nutrition Science. Cambridge University Press, Cambridge.

Flanders, Frank B., 2011. Exploring Animal Science; chapter 6. Animal Nutrition and Feeding. www.books.google.co.id.

Kiramang, Khaerani. 2011. Makalah Optimalisasi Penggunaan Daun Turi sebagai Pakan Ternak. Makalah Seminar Ilmiah Dosen, disampaikan didepan Forum Ilmiah Dosen Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Alauddin Makassar. Tidak dipublikasi.

_____. 2011. Makalah Potensi dan Pemanfaatan Onggok sebagai Pakan Ternak. Makalah Seminar Ilmiah Dosen, disampaikan didepan Forum Ilmiah Dosen Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Alauddin Makassar. Tidak dipublikasi.

Mc Donald, R.A. Edwards., J.F.D. Greenhalgh., and C.A. Morgan., 2002. Animal Nutrition. 6th edition. Pearson Prentice-Hall.

Pond, W.G., D.C.Chruch, and K.R.Pond, 1995. *Basic Animal Nutrition and Feeding*, 4 Ed. John Wiley & Sons. New York.

Reksohadiprodjo, S. 1985. Produksi Hijauan Rumput dan Legum Pakan Tropik. Cetakan I. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sarwono, B. 1987. Macam-Macam Rumput Potong. Trubus, Jakarta.

Scott, ML., MC. Nesheim and R.J. Young, 1976. *Nutrition of the Chicken*. M.L. Scott and Association, New York.

Tillman, A.D., Hari Hartadi, Soedomo R., Soeharto P., dan Soekanto L., 1989. Ilmu Makanan Ternak Dasar. UGM Press, Yogyakarta.

BAB V. PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN BAHAN PAKAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN KUALITAS

Selama berabad-abad, kaum laki-laki dan perempuan telah menggiling, memecah, merebus, memasak, membuat pellet dan mengukus biji-bijian mentah dan mereka telah melakukan ini untuk 2 alasan :

- Meningkatkan kecernaan dan
- Mengurangi resiko kolik, diare dan laminitis.

Jika butir yang tidak tercerna memasuki usus besar, mereka cepat difermentasi untuk menghasilkan asam laktat dan propionat yang menekan nafsu makan dan merangsang untuk mengunyah kayu. Kuda lebih suka untuk mengunyah kayu, fitting stabil dan tidur jika kadar asam tubuh meningkat. Hal ini mungkin sebagian karena fakta bahwa mengunyah merangsang produksi air liur. Air liur kaya akan bikarbonat dan karena itu memiliki efek menetralkan pada saat asam meningkat tingkat. Mengunyah kayu dan tidur merupakan jenis 'antasida' atau kuda 'quickeze' – mengurangi ketidaknyamanan perut asam - karena dengan mengunyah jadi ringan. Propionat dan laktat adalah asam kuat dan menghasilkan perubahan dalam ekosistem dari sekum dan usus besar akan berubah menjadi kolam renang yang menghijau jika pH tidak berada dalam kisaran yang sempit. Perlakuan tertentu untuk melindungi pencernaan dalam hal ini usus kecil menawarkan keuntungan besar untuk kesehatan dan performa. Gandum, bunga matahari dan tanaman lain yang tumbuh di kotoran kuda adalah bukti bahwa biji-bijian mentah yang cukup resisten terhadap pencernaan. Ada variasi yang sangat luas sejauh mana butiran dapat dicerna misalnya, oat yang lebih mudah dicerna daripada jagung, jagung yang lebih mudah dicerna daripada barley. Sejauh mana butir yang dicerna bervariasi dengan jenis biji-bijian, metode pengolahan, ukuran makan, dan waktu transit melalui usus kecil dan efisiensi enzim pencernaan. Tingkat dimana pengolahan meningkatkan kecernaan tergantung pada metode yang digunakan. Lamanya perlakuan fisik seperti menggiling, mendidih dan pelleting hanya memiliki efek marjinal pada pencernaan.

Kemajuan terbaru dari teknologi pakan telah menghasilkan metode yang lebih maju dalam proses pengolahan padi-padian yaitu; mikronisasi dan penguapan ekstrusi. Mikronisasi adalah proses memasak infra merah.Pemanasan internal yang cepat dari padi-padian menyebabkan granul pati membengkak, retak dan membentuk gelatin.

Micronization adalah perlakuan pilihan untuk barley - memperbaiki pencernaan dari sekitar 20% selama digiling dan 48% selama dikukus atau direbus - lebih dari 90% selama

mikronisasi. Biji-bijian seharusnya hanya dimasak dengan adanya air untuk meminimalkan risiko kerusakan panas untuk protein dan minyak. Uap-ekstrusi mencapai tujuan ini dan sangat bermanfaat untuk bahan pakan energi tinggi, meningkatkan pencernaan jagung dari sekitar 30% sampai lebih dari 90%. Sulit untuk menghitung beberapa keuntungan tidak langsung dari uap-ekstrusi dan micronization, seperti penyimpanan berkurang ruang stabilitas, peningkatan pakan, penghancuran racun, hama serangga dan bakteri patogen dan menghindari tingkat pati tinggi di sekum dan usus besar.

Formulasi pakan adalah proses mengukur jumlah bahan pakan yang perlu disatukan, untuk membentuk campuran pakan yang seragam yang memasok semua kebutuhan gizi mereka. Jumlah biaya pakan kurang lebih 70% dari total biaya produksi untuk sebagian besar unggas dan ternak lainnya, maka pengembaliannya dimaksimalkan melalui penggunaan diet yang memadai.

Formulasi pakan adalah operasi sentral dalam produksi unggas, memastikan bahwa bahan pakan secara ekonomis digunakan untuk pertumbuhan optimum ayam. Hal ini membutuhkan pengetahuan yang baik pada unggas dan bahan pakan. Sebagian besar petani skala unggas tergantung pada pabrik pakan komersial untuk feed mereka, untuk meniadakan kebutuhan untuk melakukan formulasi sendiri atau persiapan pakan. Oleh karena itu penting bahwa formulasi yang akurat, untuk memastikan sejumlah besar ternak yang tidak terpengaruh.

Formulasi pakan adalah membutuhkan ilmu dan seni, membutuhkan pengetahuan terhadap jenis pakan dan ternak, dan dibutuhkan kesabaran dalam menyusun suatu formula ransum. Formulasi khas menunjukkan jumlah masing-masing bahan yang harus dimasukkan dalam diet, dan kemudian memberikan konsentrasi nutrisi (komposisi) dalam makanan. Komposisi nutrisi dari diet akan menunjukkan kecukupan diet untuk kelas tertentu dari unggas untuk yang dipersiapkan (misalnya lapisan telur, daging atau ayam peternak). Hal ini umum untuk menampilkan isi energi dan protein diet tetapi informasi yang komprehensif pada konsentrasi unsur-unsur mineral dan asam amino juga dapat diberikan. Karena lisin merupakan asam amino kunci untuk unggas, konsentrasi asam-asam amino lainnya mungkin terkait dengan itu. Karena beberapa nutrisi mengganggu pemanfaatan nutrisi lainnya, hubungan antara nutrisi, terutama asam amino, juga menunjukkan jika masing-masing nutrisi akan digunakan secara efisien.

5.1.Proses mekanik

5.1.1. Penggilingan

5.1.2. Rolling

5.1.3. Crimping

5.2. Pembuatan pellet/cubs

Proses pelleting dari pakan yaitu dengan mendorong lembut melalui lubang di pelat logam untuk membentuk pelet padat yang kemudian dipotong dengan ukuran yang telah ditentukan. Mesin yang telah dikembangkan untuk tujuan tersebut sekarang sangat beragam dalam desain dan ada banyak kontroversi antara produsen peralatan yang berbeda untuk jenis yang paling efektif. Pelleting adalah kunci untuk produksi pakan bernutrisi kualitas tinggi karena mereka memastikan bahwa formulasi pakan dalam jumlah yang benar untuk semua yang memakannya. Setiap gigitan pelet akan memiliki formulasi yang dirancang sama memastikan semua saham adalah pakan sebagaimana dimaksud.

Kebanyakan pabrik pelet sekarang memiliki unit pendingin satu atau lebih dipasang di atas mereka di mana cairan seperti air dan molase dapat ditambahkan untuk meningkatkan pelletability. Air kadang-kadang ditambahkan dalam bentuk uap yang melembutkan pakan dan gelatinasi sebagian kandungan pati bahan, sehingga pellet lebih kuat (dan untuk aquafeed lebih stabil dalam air).

5.3. Pemasakan

5.4. Fermentasi

Sebuah pabrik pakan adalah investasi yang sangat besar dan pembeli baru sering dapat kewalahan oleh berbagai jenis mesin yang dibutuhkan, proses dan menggunakan masing-masing ini. Mesin / peralatan, dan komponen dan bagian dari mesin / peralatan Dalam istilah kami, kami mencoba memberikan informasi ini untuk pengguna baru untuk bisa mendapatkan pengenalan cepat dan sederhana untuk proses penggilingan pakan. Diagram di bawah menunjukkan panduan kasar untuk tata letak pabrik pakan. Ini pabrik pakan bisa berkisar dari mana saja dari 2t / jam hingga 10 t / h. Pegang mouse Anda ke bagian untuk melihat nama itu, dan klik pada bagian untuk pergi ke bagian yang sesuai dari pabrik pakan kami peralatan glossary.



BAB VI KEBUTUHAN TERNAK ATAS JENIS, UMUR DAN FUNGSI-FUNGSI HIDUP

6.1. PERTUMBUHAN

Pertumbuhan murni mencakup pertambahan dalam bentuk dan berat jaringan-jaringan pembangun seperti urat daging, tulang, jantung, otak, dan semua jaringan tubuh lainnya (kecuali jaringan lemak), dan alat-alat tubuh. dari sudut kimiawi perumbuhan murninadalah suatu penambahan jumlah protein dan zat-zat mineral yang tertimbun dalam tubuh.penambahan berat akibat penimbunan lemak atau penimbunan air bukanlah pertumbuhan murni.

Semua bagian dari tubuh hewan tumbuh dengan cara yang teratur. Kaki dan tangan (pada manusia) tumbuh sebanding dengan tinggi dan panjang tubuh. Akan tetapi kepal tumbuh lebih lambat daripada anggota badan. Meskipun demikian terdapat suatu variasi yang luas dalam ukuran dan perbandingan tubuh di dalam spesies. Misalnya saja kuda Australia jauh lebih besar dari pada kuda local. Juga di dalam berbagai bangsa, terdapat variasi yang besar sekali mengenai ukuran dan berat di antara individu masing-masing.

Meskipun berbagai bagian tubuh tubuh secara teratur, tubuh tidak tunbuh sebagai suatu kesatuan, karena berbagai jaringan tumbuh dengan laju yang berbeda dari lahir sampai dewasa. Misalnya saja urat daging, jantung, dan jaringan tubuh, berturut-turut memperlihatkan kenaikan sebesar 45 sampai 50 kali, 12 sampai 15 kali, dan 20 sampai 22 kali; masing-masing dalam bentuk dan berat jika dibandingkan dengan otak yang memperlihatkan pembesaran sapi 3 sampai 4 kali. Pada hewan vertebrata, kepala dan otak tumbuh cepat pada waktu umur muda. Lagi pula kakinya dapat tumbuh memanjang lebih cepat dari pada keseimbangan tubuhnya. Misalnya saja, anak kuda mempunyai kaki yang panjang dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya.

1. Sel Merupakan Satuan Pertumbuhan

Pertumbuhan dapat terjadi dengan penambahan jumlah sel, disebut *hyperplasi* dan dapat pula terjadi dengan penambahan ukurannya, disebut *hypertrophy.* Pada kehidupan embrio, kedua proses tersebut terjadi pada semua sel. Pada individu dewasa dapat ditemui tiga macam sel, yaitu:

1. sel permanen yang terdapat di urat syaraf. Sel tersebut tidak membagi lagi jauh sebelum individu dilahirkan dan jumlahnya tidak bertambah sesudah individu dilahirkan;
2. Sel stabil, yang terus membagi dan bertambah jumlahnya selama pertumbuhan akan tetapi pembagiannya berhenti dan jumlah menjadi tetap bila invidu menjadi dewasa. Sel tersebut merupakan sel pada sebagian besar alat-alat tubuh.
3. Sel labil, terdiri dari jaringan-jaringan epitel dan epidermis, yang terus membagi dan bertambah dalam bentuk sepanjang kehidupan. Pada individu dewasa, prosesnya hanya terbatas pada pergantian sel-sel yang telah using. Ketiga macam sel tersebut mengalami *hypertrophy* selama pertumbuhan dan beberapa daripadanya dapat membesar sesuai dengan kebutuhan faal tertentu. Misalnya saja pembesaran urat daging dapat ditingkatkan dengan cara latihan. Sel ginjal individu dewasa dapat mengalami pembesaran bila ginjal tersebut bekerja berat. Kesanggupan sel individu dewasa untuk mengalami *hypertrophy* berkurang dengan bertambahnya umur.

2. Periode Pertumbuhan

Pertumbuhan pada ternak mamalia dapat dibagi dalam dua periode utama:

1. *prenatal* dan
2. *postnatal.*

Pertumbuhan prenatal

Periode pertumbuhan tersebut berlangsung antara waktu ovum dibuahi dan si anak lahir. Hanya 21 hari diperlukan bagi telur ayam umtuk berkembang menjadi anak ayam yang sempurna. Bagi ternak mamalia dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi perkembangan prenatal ini.

Individu baru tersebut adalah hasil dari gabungan sprema dan ovum yang membentuk satu sel dengan jumlah kromosom-kromosom yang diploid. Setengah dari pasangan kromosom berasal dari si ayah dan setengahnya lagi dari si ibu. Sel tunggal yang telah dibuahi membagi membentuk 2 sel, kemudian 4 sel, kemudian 8 sel, dan seterusnya, mengikuti suatu pola yang tiap sel induk menghasilkan sel anak dan keduanya masing-masing sanggup membelah membentuk dua sel baru. Ova dan sperma tidak mempunyai kekuatan untuk bergabung, hdup, dan bertambah jumlah selnya.

Sel-sel somatik yang dibentuk dari pembelahan telur yang dibuahi mempunyai kekuatan yang bergabung untuk tumbuh dengan cara *hyperplasia*. Kekuatannya untuk berkembang biak berhenti bila sel-sel tersebut menghasikan sel-sel yang ebih tinggi diferensiasinya. Sebagai misal, sel darah merah yang dewasa kehilangan nukleusnya bila tersebut masuk peredaran darah, akan tetapi sitoplasmanya dipengaruhi dengan hemoglobin yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke berbagai bagian dari tubuh. Sel darah merah mati setelah kurang lebih 120 hari dalam peredaran darah akan tetapi sumsum tulang meneruskan membuat penggantinya. Sel-sel kulit timbul dari apisan kembaga kulit. Keratin bertimbun dalam sitoplasmanya. Sel-sel tersebut kehilangan nukleusnya dan kehilangan kekuatan untuk tumbuh. Hasil akhir deferensiasi tersebut adalah kematian sel. Jadi di dalam tubuh bila berbagai sel menunaikan fungsinya yang mengakibatkan kesanggupannya untuk membelah hilang, maka sel-sel lain harus membelah dan bertambah jumlahnya untuk menggantikan sel-sel yang telah rusak.

Laju pembagian sel pada ovum yang baru dibuahi bervariasi pada berbagai spesies. Jumlah sel dalam ovum kelinci yang telah dibuahi lebih kurang 32 buah dalam waktu 40 sampai 50 jam setelah perkawinan. Pada babi, ovum yang telah dibuahi ada dalam keadaan 2 sampai 4 sel pada waktu setelah kawin.

Ovum yang telah dibuahi dan berkembang, segera mengalami proses diferensiasi (pertumbuhan dan organisasi dari sel, membentuk struktur khusus). Disini sel induk menghasilkan berbagai sel anak, seperti misalnya sel otak dan jantung. Proses tersebut tidak dapat kembali, dengan arti kata bahwa sel otak tidak dapat diubah kembali menjadi sel telur. Lebih banyak alat-alat tubuh akan terbentuk bila perkembangan ovum berjalan terus sampai semuanya menjadi lengkap. Sesudah itu diferensiasi selanjutnya berhenti. Organisasi dari berbagai sel yang membelah kedalam alat-alat-khusus disebut morfogenesis atau organogenesis. Hal ini berarti bahwa sel yang telah mengalami diferensiasi harus membuat struktur proten dan enzim-enzim baru. Bagaimana caranya sel memperoleh instruksi untuk mengadakan diferensiasi menjadi sel-sel tubuh, belumlah diketahui, akan tetapi proses tersebut telh diulang berkali-kali. Alat tubuh dibentuk dalam urutan yang teratur. Bagian kepala dari embrio berkembang sebelum ekornya. *Cephalochordial* berkembang sebelum alat-alat lainnya.

Pertumbuhan prenatal pada ternak mamalia berlangsung dalam kecepatan yang berbeda di antara spesies yang berbeda. Babi misalnya membutuhkan hanya 110 sampai

115 hari di dalam uterus induknya dibandingkan dengan 335 sampai 345 hari bagi anak kuda. Sedangkan bayi manusia ada didalam uterus ibunya selama kurang lebih sembilan bulan.

Pertumbuhan Postnatal (Pertumbuhan setelah lahir)

Pertumbuhan biasanya mulai perlahan-lahan kemudian berlangsung lebih cepat dan akhirnya perlahan-lahan lagi atau sama sekali berhenti. Pola tersebut menghasilkan kurva pertumbuhan yang berbentuk sigmoid (S). Jalannya pertumbuhan setelah lahir pada semua spesies ternak mamalia pada umumnya hampir sama.

Laju pertumbuhan dari lahir sampai disapih sebagian besar dapat dipengaruhi oleh jumlah susu yang dihasilkan si induk dan dipengaruhi pula oleh kesehatan si individu.

Kekurangan zat makanan memperlambat puncak pertumbuhan urat daging dan memperlambat laju penimbunan lemak; sedangkan makanan yang sempurna mempercepat terjadinya puncak dari keduanya. Bangsa di dalam spesies bervariasi dalam laju kedewasaannya, seperti halnya individu ini dalam bangsa.

3. Makanan dan Pertumbuhan

Meskipun hewan tingkatan tinggi, termasuk hewan ternak, mempunyai susunan faali yang sangat kompleks, seperti susunan kelenjar endokrin dan susunan syaraf pusat, ia tidak sanggup membuat berbagai zat yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Zat-zat tersebut harus diperoleh dari sumber-sumber di luar tubuhnya.

Pada waktu fetus mulai tumbuh di dalam uterus, ia memperoleh zat-zat makanan dari induknya. Bila zat-zat makanan dari si induk sangat tidak mencukupi selama kebuntingan, maka berat badan si anak pada waktu dilahirkan akan subnormal dan kekuatannya akan berkurang. Kekurangan vitamin dan mineral dalam ransum induk selama kebuntingan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kekuatan si anak tapi tidak memperlihatkan pengaruh yang besar terhadap berat lahir. Kekurangan kekuatan pada umumnya diikuti oleh kematian si anak pada waktu dilahirkan atau saat sesudah dilahirkan. Berat lahir yang ringan tidak berpengaruh terhadap bentuk dewasa bila zat-zat makanan diberikan serba cukup setelah dilahirkan.

Pengaruh kekurangan makanan setelah dilahirkan terhadap bentuk dewasa tergantung pada:

1. umur pada waktu kekurangan makanan tersebut terjadi;
2. lamanya kekurangan makanan tersebut berlangsung;
3. macamnya kekurangan makanan (energi, vitamin, atau defisiensi lainnya) yang dialami. Suatu ransum yang cukup jumlah energinya tapi tidak cukup vitamin dan mineralnya, dapat mengakibatkan kekurangan makanan.

4. Determinasi Nilai Biologis

Nilai gizi suatu protein dapat ditentukan dengan member ransum hewan percobaan di laboratorium. Yang dimaksud dengan nilai biologis protein adalah persentase protein dalam makanan yang dicerna oleh hewan percobaan dan jumlah yang digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Dalam percobaan semacam itu, feses dan urin yang dikeluarkan tubuh hewan dikumpulkan secara teliti dan dianalisis untuk mendapatkan jumlah protein yang ditimbun dalam tubuh. Suatu bahan makanan yang mempunyai nilai biologis 100% adalah suatu bahan makanan yang protein-dapat-dicerna yang dikandungnya, digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Bahan makanan jarang yang mempunyai nilai biologis 100%. Beberapa bahan makanan mempunyai nilai biologis 80 sampai 90 persen dan bahan makanan tersebut digolongkan sebagai sumber bahan makanan yang mengandung protein yang berkualitas tinggi. Nilai biologis yang rendah menunjukkan kualitas protein yang rendah dalam bahan makanan atau hanya sejumlah kecil protein yang dapat digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Perhitungan nilai biologis secara sederhana dapar diperlihatkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengambilan N} - (\text{N feses} + \text{N urin})}{\text{Jumlah pengambilan N} - \text{N feses}} \times 100 = \text{nilai biologis}$$

Jelas bahwa data unutk perhitungan semacam itu dapat diperoleh dari percobaan keseimbangan nitrogen. Kadar protein yang diberikan dalam ransum harus cukup banyak sehingga pertumbuhan yang diperoleh adalah hasil dari keseimbangan positif. Kadar potein tersebut tidak boleh melampaui jumlah yang diperlukan untuk menyebabkan pertumbuhan maksimum, karena pengambilan yang berlebihan akan dirombak dan dikeluarkan dari tubuh dan karenanya memberikan nilai biologis yang lebih rendah daripada yang sebenarnya. Disamping itu perlu pula adanya bahan makanan bukan nitrogen yang cukup sehingga zat protein tidak akan digunakan sebagai sumber energi. Zat-zat lainnya perlu pula tersedia dalam jumlah yang cukup.

6.2.REPRODUKSI

Reproduksi adalah suatu proses yang rumit pada semua spesies hewan. Rumit karena reproduksi tergantung dari fungsi yang sempurna bagi proses-proses biokimia pada sebagian besar alat tubuh. Ovulasi, estrus, kebuntingan, kelahiran, dan laktasi, semuanya tergantung pada fungsi yang sempurna dari berbagai hormon dan alat tubuh. Setiap abnormalitas dalam anatomi atau fisiologi alat reproduksi mengakibatkan menurunnya fertilitas atau dapat menyebabkan sterilitas.

1. Pentingnya Kadar Makanan

Faktor makanan memainkan peranan penting dalam berbagai peristiwa faali yang terjadi dalam mencapai dewasa kelamin dan proses-proses reproduksi.

Kekurangan makanan memperlambat kedewasaan pada hewan jantan maupun betina dan dapat pula menyebabkan perubahan degenerasi dalam alat-alat kelamin setelah alat-alat tersebut berkembang. Bila hewan yang kekurangan zat makanan bunting, maka pengambilan zat makanan oleh embrio yang sedang tumbuh akan merusak badannya. Kematian fetus di dalam uterus atau kelahiran anak yang lemah dapat terjadi. Pada hewan jantan, kekurangan makanan menurunkan jumlah dan kekuatan spermatozoa dan dapat menghentikan spermatogenesis.

2. Kebutuhan Zat-zat Makanan Bagi Hewan Betina untuk Reproduksi

Penting agar ransum untuk hewan bunting mengandung cukup protein, mineral, dan zat-zat makanan tersebut terutama diperlukan untuk perkembangan anak yang belum dilahirkan. Defisiensi zat-zat makanan akan menimbulkan pengaruh-pengaruh yang serius.

Kebutuhan selama kebuntingan adalah lebih sedikit dari kebutuhan untuk produksi susu. Kebutuhan protein terbesar terdapat pada sepertiga bagian terakhir dari kebuntingan. Pada waktu ini pertumbuhan fetus paling cepat. Sampai pada saat tersebut tidak perlu memberikan labih banyak makanan daripada yang diperlukan pada hewan bunting itu.

Penyediaan protein untuk hewan bunting tidak hanya perlu cukup dalam jumlah akan tetapi protein tersebut harus pula berkualitas baik. Sapi susu, sapi daging, ataupun kuda, pada umunya tidak perlu diperhatikan kualitas proteinnya. Sebaliknya pada babi yang bunting, kualitas protein sama pentingnya seperti halnya jumlah protein.

Penelitian-penelitian dengan hewan-hewan percobaan memperlihatkan bahwa kekurangan protein atau kekurangan salah satu asam amino dapat menimbulkan berhentinya estrus atau masa birahi. Jumlah kalsium dan fosfor yang cukup diperlukan pula untuk berhasilnya reproduksi, di samping zat-zat mineral jarang seperti iodium, ferum, kuprum, dan kobalt.

Pemberian vitamin A yang cukup, yang biasanya diperoleh dari karoten, sangat dibutuhkan untuk hewan bunting. Kekurangan vitamin Atidak hanya merugikan anak yang belum dilahirkan, akan tetapi juga akan mengakibatkan susu induk bahkan kolostrumnya defisien tehadap vitamin A.

3. Zat-zat Makanan yang Ditimbun dalam Fetus

Jumlah zat-zat makanan yang tepat yang terdapatdalam fetus pada waktu dilahirkan tidak begitu besar. Anak hewan pada waktu dilahirkan tinggi kandungan airnya. Anak sapi yang baru dilahirkan mengandung 71 sampai 75 persen air. Hal ini memperlihatkan mengapa hewan yang bunting tidak memerlukan zat-zat makanan dalam jumlah yang begitu besar, juga selama bagian terakhir dari kebuntingan, seperti yang diperlukan untuk menghasilkan susu yang baik.

4. Kebutuhan Makanan untuk Produksi Telur

Berbeda dengan mamalia yang memberi makanan embrionya di dalam tubuhnya, melahirkan anaknya, dan memeliharanya, maka unggas menghasilkan telur yang mengandung cukup zat-zat makanan untuk perkembangan embrionya di luar tubuh dan tidak membutuhkan makanan khusus setelah menetas. Telur mempunyai komposisi zat-zat makanan khusus setelah menetas. Telur mempunyai komposisi zat-zat makanan sebagai berikut: air 66 persen; protein 13 persen; lemak 10,5 persen; abu 10,5 persen. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan protein dan terutama zat-zat mineral adalah besar. Juga dibutuhkan berbagai vitamin. Telur mengandung kurang lebih 2 gram kalsium dan 0,12 gram fosfor. Hampir semua kalsium terdapat dalam kulit telur, sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat. Fosfor terdapat dalam kuning telur, bergabung dengan protein.

5. Pengaruh Ransum terhadap Nilai Gizi Telur

Meskipun kadar mineral telur, kecuali untuk iodium dan mangan tidak dipengaruhi oleh macamnya ransum, ada pengaruh yang nyata dalam berbagai zat vitamin, terutama untuk

vitamin A, D, dan riboflavin. Macam ransum yang akan menghasilkan produksi telur dan daya tetas telur yang baik adalah juga ransum yang menghasilkan telur denga nilai gizi tinggi untuk konsumsi manusia.

6. Fisiologi dan Reproduksi

Alat-alat kelamin mencapai perkembangan yang maksimal dan mulai bekerja pada umur yang berbeda pada berbagai spesies, bangsa, dan makanan individu. Perkembangan alat-alat kelamin tersebut adalah suatu proses bertahap yang diawali oleh sekresi kelenjar *pituitary* suatu kelenjar yang juga menghasilkan suatu zat yang mengawasi pertumbuhan badan. Nyatanya kelenjar tersebut tidak dapat menghasilkan kedua sekresi secara maksimal pada waktu yang sama. Jadi perkembangan alat kelamin berjalan lebih cepat, bila laju dari pertumbuhan menurun. Alat-alat tersebut mulai berfungsi sebelum pertumbuhan badan menjadi sempurna. Bila kesanggupannya untuk berfungsi langsung digunakan maka terjadi pengaruh yang buruk terhadap perkembangan tubuh karena adanya pergeseran yang tidak seimbang pada sekresi kelenjar pituitarari dari pertumbuhan tubuh ke aktivitas kelamin.

7. Produksi Spermatozoa

Kedewasaan kelamin pada hewan jantan ditandai oleh perkembangan testis yang sempurna dari testis dan produksi sperma hidup yang dapat bergerak bila dicampur dengan sekresi dai berbagai alat tubuh.

Kekurangan makanan dapat menyebabkan produksi sperma berhenti sama sekali. Yang sering terjadi ialah berkurangnya volume sperma yang diproduksi dan berkurangnya kekuatan dan pergerakannya dengan akibat gagalnya konsepsi meskipun si betina sangat subur.

8. Ovulasi dan Fertilisasi

Ovulasi dapat dirangsangpada hewan betina yang belum dewasa-kelamin dengan cara memberikan suntikan gonadotropin.

Dapatlah dikatakan bahwa ovulasi adalah suatu proses pada waktu ovum (telur) dilepaskan dari ovarium. Diantara ternak mamalia, sapi dan kuda biasanya yang mengadakan ovulasi dengan hanya satu ovumper periode estrus meskipun kelahiran ganda kadang kala terjadi; hal ini terjadi karena adanya ovulasi dari satu atau lebih ova.

Fertilisasi adalah penggabungan gamet jantan dan betina (sel-sel kelamin) membentuk invidu baru. Telur yang tidak dibuahi mempunyai jumlah kromosom haploid

seperti halnya spermatozoa dan penggabungannya dalam fertilisasi memperbaiki jumlah kromosom diploid pada telur yang dibuahi.

9. Pengawasan Endokrin terhadap Ovarium

Follicle stimulator (FSH) dari glandula *pituitary* anterior, bila dilepaskan ke dalam peredaran darah merangsang pertumbuhan folikel ovarium. Bila folikel mulai tumbuh dan menjadi dewasa maka folikel tersebut memprodusir estrogen, suatu hormon betina.

Estrogen berfungsi:

1. menginduksi estrus (birahi) pada hewan betina,
2. merangasng pertumbuhan sel-sel dalam uterus dalam mempersiapkan kebuntingan,
3. mempercepat pergerakan uterus, tuba Fallopi, dan infundibulum selama estrus, yang dengan demikian membantu menyatukan sperma dan telur dalam proses fertilisasi,
4. merangsang pertumbuhan saluran kelenjar susu, dan
5. perkembangan sifat-sifat kelamin sekunder pada hewan betina.

Bila foligel Graaf matang, pelepasan *luteinizer* (LH) dari *glandula pituitary anterior* menyebabkan robeknya folikel tersebut dan melepaskan ovum (ovulasi). Suatu korpus luteum akan timbul pada setiap folikel yang pecah dan mengeluarkan hormone kelamin betina lainnya yaitu progesteron.

Progesteron berfungsi:

1. bergabung dengan estrogen untuk menimbulkan estrus pada beberapa spesies;
2. menyempurnakan pertumbuhan uterus yang didahului oleh estrogen, mempersiapkan uterus member makanan pada embrio yang sedang berkembang bila terjadi kebuntingan;
3. memelihara kebuntingan dengan cara menghambat kontraksi uterus;
4. mencegah ovulasi;
5. bergabung dengan estrogen untuk merangsang pertumbuhan susunan labul-alveolar kelenjar susu.

10. Estrus dan Siklus Estrus

Estrus adalah waktu hewan betina dapat menerima hewan jantan untuk kawin. Siklus estrus dimulai pada waktu dewasa kelamin dan merupakan interval antara dua periode estrus bila hewan betina tidak bunting.

Siklus estrus pada ternak mamalia terdiri dari empat fase yang berlainan, yaitu: *proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus*.

6.3.LAKTASI

Kelenjar susu sapi betina mulai berkembang pada waktu kehidupan fetal. Puting-puting susunya terlihat pada waktu dilahirkan. Bila hewan betina tumbuh, susunya membesar sebanding dengan besarnya tubuh. Sebelum hewan mencapai dewasa-kelamin, maka hanya terjadi sedikit pertumbuhan jaringan kelenjar. Bila sapi betina mencapai dewasa-kelamin, maka estrogen (dihasilkan oleh folikel pada ovarium) merangsang perkembangan sistema duktus yang besar. Pada setiap siklus estrus yang berulang, jaringan kelenjar susu dirangsang untuk berkembang lebih cepat. Setelah sapi dara mengalami beberapa kali siklus estrus, maka duktusnya memperlihatkan banyak cabang dalam susu. Penelitian terbaru memperlihatkan bahwa ada perkembangan sistema lobul-alveolar pada hewan betina yang tidak bunting karena sapi dara dapat dirangsang untuk menghasilkan susu dengan menggunakan estradiol benzoate (0,66 mg per 100 kg berat badan tiap hari selama 14 hari). Bila ovulasi terjadi, maka folikel berkembang menjadi korpus luteum dan memproduksi progesteron, yang menyebabkan perkembangan sistema lobul-alveolar. Pada sapi yang bunting, hormon estrogen dan progesteron yang dikeluarkan plasenta merangsang pertumbuhan sistem lobul-alveolar kelenjar susu.

1. Susu tanpa Keibuan

Dengan menggunakan hormon estrogen dan progesterone, kelenjar susu hewan betina dara dapat ditumbuhkan dan diperkembangkan sedemikian rupa sehingga dapat dibuat berlaktasi. Oleh karena itu dimungkinkan secara buatan, merangsang pertumbuhan kelenjar susu dan menyuruh kelenjar tersebut mengeluarkan susu. dengan merangsang laktasi pada sapi-sapi dara dan sapi-sapi betina yang mandul, para peternak dapat memperoleh produksi yang tinggi dari hewan-hewan yang tadinya disediakan untuk dipotong.

2. Pengaturan Hormon Laktasi

Fisiologi kelenjar susu erat hubungannya dengan mekanisme hormonal dan neurohormonal. Kelenjar susu merupakan sifat kelamin sekunder perkembangannya, permulaannya dan pemeliharaan, aktivitasnya, dan akhirnya involusinya, tergantung daripada keseimbangan hormonal. Sejumlah hormon mempengaruhi intesitas laktasi. Hormon merupakan perangsang laktasi satu-satunya. Laju sekresi hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kelenjar susu dan laktasi adalah lebih tinggi sapi perah daripada sapi daging.

Rangsangan esensial bagi pertumbuhan dan berfungsinya kelenjar susu hormonal dan bukan oleh urat syaraf dan bukti menunjukkan bahwa sekrang-kurangnya ada tiga hormon yang terlibat, yaitu Estradiol, suatu hormondari folikel Graaf, mula-mula menyebabkan perkembangan duktus, kemudian progesterondari korpus luteum bertanggung jawab terhadap pertumbuhan alveoli. Akhirnya laktogen (prolaktin) dari kelenjar pituitaria menimbulkan aktivitas sekresi.

3. Prolaktin

Merupakan suatu proteohormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitaria anterior. Kelenjar tersebut merangsang permulaan laktasi (laktogenesis) pada kelenjar susu dan proliferasi epithelium yang melapisi kelenjar tembolok pada burung merpati betina dan jantan. Prolaktin disebut juga laktogen, luteotropin, galaktin, dan mammotropin.

4. Jalannya Sekresi Susu

Kenaikan dalam sekresi akibat kelahiran tidak berjalan sejajar dengan kenaikan makanan yang dikonsumsi. Sesudah mencapai puncak, produksi susu menurun. Hasil produksi setiap bulannya merupakan suatu persentase yang konstan terhadap hasil bulan sebelumnya. Persistensi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan ukuran laju penurunan yang bervariasi pada individu dan dalam berbagai laktasi, yang dipercepat pada minggu kedua puluh dua setelah terjadinya pembuahan baru. Sapi-sapi yang tetap tidak dikawinkan akan meneruskan mengeluarkan susunya dengan laju yang menurun selama dua atau tiga tahun atau malahan lebih lama lagi.

Pada wanita, puncak laktasi yang dicapainya lebih lama, atau malahan terjadi suatu *plateau.* Kenaikan sekresi setelah melahirkan dapat berlangsung sampai minggu kedua puluh delapan dan sekresinya dapat bertahan pada tingkatan maksimum sampai minggu keempat puluh.

Pada sapi, semakin lama masa kering yang didapat semakin besar persistensi pada laktasi berikutnya. Memperpendek masa kering sebelum laktasi kedua akan memperendah produksi susunya sampai batas tertentu daripada memperpendek masa kering tersebut sebelum laktasi yang akan datang. Hal ini dapat diterangkan dengan pertumbuhan tubuh dan kelenjar susu yang lebih besar yang terjadi sebelum laktasi kedua daripada yang berikutnya. Dengan demikian dapatlah dipahami pentingnya masa kering yang cukup untuk membangun persediaan zat-zat makanan cadangan.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laktasi

1. **Kebakaan,** kesanggupan untuk menghasilkan susu tergantung daripada kondisi genetik hewan.
2. **Jaringan Sekresi,** faktor dasar yang membatasi laktasi adalah jumlah jaringan kelenjar. Kelenjar susu yang kecil tidak menguntungkan dalam laktasi, karena ketidaksanggupannya untuk menghasilkan cukup banyak susu dan maupun menyimpannya.
3. **Keadaan dan Persistensi Laktasi**, beberapa sapi sangat persisten dan laju penurunan sekresi susunya lambat (2 sampai 4 persen dari produksi bulanan sebelumnya). Sapi dengan persistensi tinggi menghasilkan lebih banyak susu daripada sapi yang persistensinya rendah, bila produksi maksimum susunya sama. Sapi-sapi yang diperah cepat, biasanya lebih persisten.
4. **Penyakit,** dapat mempengaruhi denyut jantung dan dengan demikian mempengaruhi peredaran darah melalui kelenjar susu.
5. **Makanan,** laju sintesis dan difusi berbagai komposisi susu tergantung pada konsentrasi *precursor* susu dalam darah. Penyediaan zat makanan yang tidak cukup akan membatasi sekresi susu pada sapi perah.
6. **Faktor-faktor lain,** seperti frekuensi memerah, kebuntingan, umur, besar tubuh, estrus, masa kering dan lain-lain.

6. Susu dari Berbagai Spesies

Susu babi dan susu domba mengandung lebih banyak bahan kering daripada susu spesies hewan ternak lainnya dan bahwa hal tersebut terlihat dalam nilai energi dan kadar abu yang tinggi. Yang menarik perbedaan komposisi untuk semua spesies terdapat pada kadar laktosanya.

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komposisi Susu

a. Faktor-faktor kebakaan
b. Keadaan laktasi
c. Makanan

8. Kolostrum

Hasil permulaan dari kelenjar susu setelah hewan beranak adalah kolostrum. Kolostrum tersebut mempunyai kadar protein, abu, dan *total solids* yang lebih tinggi daripada susu dan mempunyai kadar laktosa yang lebih rendah. Per unit *total solids*, kolostrum kurang lebih mempunyai protein dua kali lebih banyak, jumlah lemak dan abu yang sama, tetapi hanya sepertiga daripada jumlah laktosa. Protein yang merupakan lebih kurang 15 persen dari produksi terdiri terutama dari globulin dan albumin.

Anak sapi atau anak domba yang baru dilahirkan harus mendapat zat-zat anti lewat kolostrum untuk memperoleh ketahanan terhadap penyakit. Kolostrum mempunyai nilai gizi yang sangat penting bagi anak yang baru dilahirkan karena kaya akan zat-zat vitamin dan zat besi dibandingkan susu biasa.

9. Pigmen

Susu mengandung pigmen yang larut dalam lemak dan pigmen yang larut dalam air. Dari pigmen yang larut dalam lemak, maka karotenlah merupakan pigmen utama dalam susu sapi. Sedangkan klorofil mengalami kehancuran dalam *tractus digestivus* dan hal tersebut berlaku pula untuk xantofil sehingga hanya sedikit saja yang sampai dalam susu. Pigmen utama yang larut dalam air adalah riboflavin.

Peranan zat-zat vitamin dalam laktasi

Zat-zat vitamin penting dalam laktasi. Zat-zat tersebut merupakan zat makanan esensial untuk proses-proses faali dan merupakan komponen dari sekresi itu sendiri.

10. Nilai vitamin A dari Susu

Sapi memperoleh vitamin A dalam ransumnya dalam bentuk karoten. Sebagian dari karoten yang ditelan dikeluarkan dalam susu sebagai karoten dan sebagian lagi diubah menjadi vitamin A. Spesies yang menghasilkan susu tidak berwarna melaksanakan konversi yang sempurna, jadi nilai vtamin dari lemaknya dapat sangat tinggi meskipun tidak terdapat warna.

11. Kebutuhan Vitamin A

Hewan yang sedang menyusui anaknya perlu mendapat cukup vitamin A dalam ransumnya. Dengan demikian susu yang dihasilkannya akan cukup mengandung vitamin tersebut yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan si anak.

Pada umunya bila sapi dilepas di padang rumput yang baik, susu mempunyai nilai vitamin A yang maksimum. Selama sapi di dalam kandang, dapt diberikan jerami dan rumput keirng yang baik.

12. Vitamin D

Susu sapi yang diberi ransum sempurna mengandung cukup vitamin D. Kadar vitamin D dalam susu normal berkisar antara 3 sampai 56 *International Units* per liter. Apabila sapi diberi ransum yang kadar vitamin D-nya rendah dan sapi tersebut tidak mendapat sinar matahari, maka susunya akan mengandung kadar vitamin D yang lebih rendah daripada normal.

Cara mempertinggi kadar vitamin D dalam susu ialah dengan menambah konsntrat Vitamin D. Cara lain ialah dengan memberi sinar ultraviolet pada susu atau dengan memberikan ragi yang telah disinari sapinya.

13. Vitamin E

Susu sapi biasanya mengandung 20 sampai 35 mg vitamin E per gram lemak. Kadar tersebut dapat dipertinggi dengan memberikan tokoferol ke dalam ransumnya.

Vitamin E tersebar luas dalam bahan makanan ternak. Banyak terdapat pula pada hijau-hijauan dan rumput kering yang baik.

14. Vitamin B

Kadar vitamin B-kompleks dalam susu hewan non-ruminansia secara nyata dipengaruhi oleh jumlah vitamin tersebut dalam ransumnya. Vitamin B-kompleks disintesis pada fermentasi bakteri dalam rumen hewan ruminansia. Oleh karena itu hewan ruminansia tidak membutuhkan vitamin tersebut dalam ransumnya dan kadarnya dalam susu terutama tidak tergantung pada jumlah vitamin dalam ransum.

Hijau-hijauan merupakan sumber vitamin B-kompleks yang baik, kecuali vitamin $B_{12.}$

15. Asam Askorbat

Kadar vitamin C dalam susu sapi dipengaruhi oleh bangsa sapi itu sendiri dan dipengaruhi pula oleh musim dan tidak dipengaruhi oleh ransum. Susu yang baru diperah mengandung 2,0 sampai 2,5 mg per 100 ml, sedangkan susu yang dipasarkan mengandung 0,58 mg per 100 ml. Jadi lebih kurang tigaperempat nya hilang dalam pasteurisasi dan proses-proses pemasaran lainnya. Asam askorbat dibandingkan riboflavin lebih mudah dirusak oleh cahaya.

KEBUTUHAN ZAT-ZAT MINERAL

Zat-zat mineral, kecuali garam dapur, yang perlu mendapat perhatian dalam ransum untuk mempertinggi sekresi susu adalah kalsium dan fosfor. Zat-zat mineral lainnya yang terdapat dalam susu pada umumnya cukup tersedia dalam bahan makanan.

1. Kalsium dan Fosfor

Ransum yang kekurangan salah satunya akan menurunkan produksi susu dan dapat merusak hewan itu sendiri. Tapi susu yang dihasilkannya mempunyai kadar yang normal dari zat-zat mineral tersebut. Kalsium dan Fosfor merupakan 50 persen dari zat mineral susu. Seekor sapi yang menghasikan 4.540 kg susu selama laktasinya akan mengeluarkan lebih kurang 5,45 kg kalsium dan 4,54 kg fosfor dan pada waktu mencapai puncak produksinya, kalsium yang dikeluarkan setiap harinya dapat melebihi 30 gram.

2. Zat-zat Mineral lainnya

Kadar ferum dalam susu rendah. Kadar tersebut tidak dapat dinaikkan dengan cara memperbesar jumlah ferum dalam makanan.

Jumlah iodium dan jumlah kobalt dalam susu sapi dapat ditingkatkan dengan menambahkan suatu makanan pelengkap yang mengandung zat-zat mineral tersebut kedalam ransumnya.

Meskipun kalium merupakan zar mineral yang besar jumlahnya dalam susu, zat mineral tersebut banyak terdapat dalam bahan makanan asal tumbuh-tumbuhan yang biasa dimakan.

6.4. TENAGA KERJA

Semua zat makanan organik seperti karbohidrat , lemak, dan protein dapat berfungsi sebagai sumber energi untuk tenaga kerja otot. Karena sebagian besar makanan hewan terdiri dari karbohidrat, maka sebagian besar energi otot berasal dari sumber tersebut. Karbohidrat juga merupakan sumber energi yang paling efisien untuk produksi tenaga kerja.

1. Produksi Tenaga Kerja Otot

Pada waktu otot bekerja, glikogen atau zat pati hewan yang disimpan dalam otot selama tubuh istirahat digunakan. Jumlah oksigen yang meningkat diperoleh dari darah dan jumlah karbondioksida yang timbul dalam tubuh, meningkat sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang dihasilkan. Sebagian dari energi dalam zat-zat makanan yang digunakan dalam kontraksi otot diubah menjadi tenaga mekanis, sebagian lainnya diubah menjadi panas. Bagian terakhir tersebut adalah energi terbuang.

Teori yang dapat diterima mengenai proses kimiawi yang timbul dalam kontraksi otot ialah bahwa kontraksi otot tidak disebabkan oleh energi yang diperoleh langsung dari oksidasi glikogen atau zat-zat lainnya. Energi yang diperlukan untuk kontraksi rupanya berasal dari perombakan sekonyong-konyong dari fosfor organik di dalam otot. Didalam proses tersebut tidak ada oksigen yang digunakan. Suatu senyawa fosfor organik lainnya rupanya terlihat pula dalam proses tersebut.

2. Proses Kimiawi Pergerakan Otot

Perubahan glikogen menjadi asam laktat telah lama diketahui sebagai rekasi kimiawi yang paling menonjol yang terjadi dalam kontraksi otot secara anaerobik (tanpa adanya oksigen). Sumber utama energi otot diperoleh dari adenosin trifosfat (ATP).

Kontraksi serat-serat otot nampaknya ditimbulkan oleh reaksi langsung antara ATP dan protein otot.

1. ATP + protein otot → kontraksi otot + ADP
2. Kreatin fosfat + ADP ⇄ ATP + keratin

Jadi proses kimiawi kontraksi otot urut-urutannya adalah sebagai berikut:

1. ATP dirombak menjadi ADP untuk menyediakan energi.
2. Kreatin fosfat membagi dan menyediakan energi untuk sintesis dan pengendalian ATP. Kemudian glikogen otot terurai dan energi otot tersedia sebagai ATP. Tanpa oksigen, asam laktat terbentuk dan seterusnya diubah menjadi glikogen hati. Biasanya dengan adanya oksigen, asam piruvat yang diperoleh dari perubahan glikogen teroksidasi menjadi CO_2 dan H_2O dalam serangkaian kerja-kerja enzim. Salah satu yang terpenting ialah kebutuhan akan tiamin pirofosfat sebagai koenzimnya. Energi dari proses tersebut timbul sebagai panas dan dalam suatu bentuk (ATP) yang dapat digunakan untuk tenaga kerja pada sel-sel hidup. Di dalam otot kelebihan energi selain dibutuhkan langsung untuk kontraksi, digunakan pula untuk memfosfolisasi kreatin menjadi kreatin fosfat.

3. Kebutuhan Zat-zat Makanan bagi Ternak Kerja

Kebutuhan utama dalam ransum ternak kerja adalah penyediaan bahan makanan yang cukup yang kaya akan *total digestible nutrients* atau energi netto. Hewan dewasa selama bekerja membutuhkan sedikit lebih banyak protein, mineral dan vitamin dibandingkan dengan yang dibutuhkan pada waktu hewan tersebut beristirahat. Oleh sebab itu kebutuhannya untuk bekerja sangat berbeda daripada untuk pertumbuhan, produksi susu, atau produksi wol.

Hewan dewasa, bila sedang bekerja, tidak membutuhkan jumlah vitamin dan mineral yang lebih banyak dibandingkan pada waktu istirahat. Pada kuda yang sedang bekerja, terdapat suatu kenaikan kebutuhan untuk garam. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan memberikan garam secara *ad libitium* dan tidak memerlukan perhatian yang khusus.

- Standar kualitas Pakan Kualitas pakan dinyatakan dengan nilai nutrisi yang dikandungnya terutama kandungan energi dan potein. Sebagai pedoman, setiap Kg pakan penguat harus mengandung minimal 2500 Kcal energi dan 17% protein, serat kasar 12%.
- Metode dan Teknik Pembuatan. Metode formulasi untuk pakan penguat adalah metode simultan, metode segiempat bertingkat, metode aljabar, metode konstan kontrol, metode ekuasi atau metode grafik.

b. Prosedur Memformulasi

- Buat daftar bahan pakan yang akan digunakan, kandungan nutrisinya (energi, potein), harga per unit berat, harga per unit energi dan harga per unit protein.
- Tentukan standar kualitas nutrisi pakan penguat yang akan dibuat.
- Cari buku penuntun/acuan
- Kutip tabel kebutuhan ternak yang akan ditetapkan
- Tentukan bahan pakan yang akan digunakan
- Kutip tabel komposisi pakan yang akan digunakan
- Menyeimbangkan/menyerasikan ransum sesuai kebutuhan ternak

Untuk menyusun ransum serasi dibutuhkan dua data :

1. label kebutuhan ternak yang dipublikasi oleh:
   - NRC., NAS., USA.,
   - ARC., British,
   - INRA, Perancis,
   - Morrison's Feeding Standards,
   - Lembaga Penelitian dan Ekstensi,

2. label analisis bahan pakan yang dipubiikasi atau dihasiikan oleh:
   - United Stated & Canadian Feed
   - Hasil analisis Lab. di Indonesia
   - Latin American tabel komposisi pakan

- Peneliti (hasil analisis pakan yang akan digunakan)

- Lembaga Penelitian Ternak (Balitnak), dsb.

Prosedur

- Cari buku penuntun/acuan
- Kutip tabel kebutuhan ternak yang akan ditetapkan
- Tentukan bahan pakan yang akan digunakan
- Kutip tabel komposisi pakan yang akan digunakan
- Menyeimbangkan/menyerasikan ransum sesuai kebutuhan ternak ransum
- Periksa seluruh hitungan, betul atau tidak dan pertimbangkan kandungan micronutriennya bila ragu-ragu tambahkan trace mineral dan vitamin.
- Bila susunan ransum sudah serasi cek sekali lagi!
  - apakah ada nutrien yang berlebihan
  - apakah ekonomis
  - apakah akan tambah garam, garam-phospor kombinasi

 Metode Menyusun Ransum

1. Trial and Error Method
2. Pearson's Square Method
3. Exact Method
4. Simultaneous Equation Method
5. Linear Programing Method

Metode Bujur sangkar latin (Pearson's Square)

Cara ini hanya dapat untuk membuat ransum seimbang dan dua bahan pakan. Letakkan kandungan nutrien yang diinginkan di tengah-tengah segi empat (diagonal).

contoh: ingin membuat ransum yang mengandung Pk 14% dan campuran jagung dan bungkil kelapa. Kandungan PK jagung 10% sedangkan bungkil kelapa 20%

Jagung : 10%

6

6/10 x 100% = 60% 20 - 14 = 6

14

B. Kelapa: 20% 4 14 -10 = 4

10 4/l0 x l00 % = 40 %

Cek kandungan PK

Jagung 60 % □ 0,1 x 60 = 6 %

B. Kelapa 40 % □ 0,2 x 40 = 8 % + Jumlah14 %

Exact method

Setelah mengetahui berat badan sapi misalnya 200 kg,

kenaikan berat badan harapan per ekor per hari 0,5 kg.

Kebutuhan : ransum 5 kg BK/hari,

protein 10% = 500 gr/hari

TDN 60% = 3000 gr/hari

Pakan yang akan digunakan:

Macam	BK %	Prot%	TDN%
Rumput gajah	15	8	55
Dedakhalus	86	13	70

Bila kebutuhan protein dipenuhi dari rumput

Jumlah rumput (kg) x % prot = 500 gr

6,25 kg rumput mengandung prot = 500 gr TDN = 3437 gram

Berdasarkan kebutuhan (kg)

	BK	Prot	TDN
Kebutuhan	5,00	0,500	3,000
Tersedia	6,25	0,500	3,437
posisi	+1,25	0	+0,437

Kelebihan BK mungkin tak habis

Bendasarkan kandungan protein maka:

1 kg rumput menyediakan : 8/100 kg protein

1 kg dedak halus menyediakan :13/100 kg protein

Jadi untuk memperoleh yang sama diperlukan rumput

Sehingga setiap penggantian 1,62 kg rumput dengan dedak halus akan kekurangan BK = (1,62-1) kg = 0,62 kg

Kelebihan BK sebanyak 1,25 kg yang berasal dan rumput diganti dedak halus agar tidak kelebihan diperlukan dedak halus sebanyak:

2,01 kg dedak halus setara rumput sebanyak:

Sehingga rumput tinggal 41,66 - 21,7 = 19,96 kg

Ransum menjadi:

rumput :19,96 kg = 3kg BK

dedak halus : 2 kg BK

Uji kandungan gizi

Protein :

rumput = 0,08 x 3000 = 240 gram

d. halus = 0,13 x 2000 = 260 gram

500 gram

TDN

rumput = 0,55 x 3000 = 1650 gram

dedak halus halus = 0,70 x 2000 = 1400 gram 3050 gram

Protein cocok dengan kebutuhan, tetapi TDN lebih sedikit, atau mungkin TDN nya cocok proteinnya lebih sedikit (tidak dapat/sukar untuk cocok keduanya). Sebagai catatan asal memenuhi keduanya jangan sampai ada yang kurang. cara lain?

a. Persamaan aljabar

 Simultaneous Equation Method

Methode ini disebut juga: - persamaan aljabar atau

- persamaan xy

Pada metode ini dapat diselesaikan 2 hal yang akan dicari sekaligus yaitu PK dan energi (ME)

contoh: ingin membuat ransum yang mengandung PK 20%, dan ME 2,80 Mcal/kg

Komposisi kimia bahan yang akan digunakan

Bahan	PK (%)	ME (Mcal/kg)
Bungkil kedelai	45	2,59
Jagung	8,5	3,37
Dedak halus	12,5	2,35

Penyelesaian menggunakan 3 persamaan

I. x + y + z =100 …….(jumlah)

II. 0,45x + 0,085y + 0,125z = 20..... (PK)

Ill. 2,59x + 3,37y + 2,35z = 280……... (ME)

* Selesaikan salah satu

□l dan II

II. 0,45x + 0,085y + 0,125z = 20 ... (PK)

I. 0,45x + 0,45y + 0,45z = 45 ...(jumlah) x 0,45

- 0,365y - 0,325z = -25 ……. IV

* III dan I

III. 2,59x + 3,37y + 2,35z = 280 …. (ME)

I. 2,59x + 2,59y + 2,59z = 259 …. (jumlah) x 2,59

0,78y - 0,24z = 21 …… V

IV. - 0,365y - 0,325z = -25

V. 0,365y-0,112z = 9,83 x 0,365/0,78 +

-0,437z = - 15,17

z = 34,7

IV. - 0,365y - 0,325z = - 25

-0,365y -11,28 = -25

y = 37,6

S I. x +y + z = 100 ..... (jumlah)

x + 37,6 + 34,7 = 100

x = 27,7

Susunan ransum menjadi:

x = Bungkil kedele = 27,7 %

y = jagung = 37,6 %

z = bekatul = 34,7 %

Jumlah 100 %

□ Formulasi Premix Mineral

Element yang diinginkan (mg/kg): Mn = 30 Fe = 30

Cu = 5 Zn = 50

Co= 0,1

Kandungan

Sumber	BA	BM	% elemen
MnSO4	54,93	150,99	36,4 (Mn)
CuSO4	63,54	159,63	39,8 (Cu)
CoSO4H2O	58,94	173,02	34,1 (Co)
FeSO47H2O	55,85	278,02	20,1 (Fe)
ZnSO4H2O	63,38	179,46	35,3 (Zn)

Fe

Perhitungan

Elemen	level mg/kg	kandungan per 1000 kg (g)	kebutuhan bahan (g)
Mn	30	30	82,4*)
Cu	5	5	12,6
Co	0,1	0,1	0,3
Fe	30	30	30
Zn	50	50	141,6

Final premix : 386,2 g

Carrier : 9.613,8 gh +

10.000 gram = 10kg

- Formulasi Premix Vitamin

Kandungan prermix dan vitamin yang diinginkan: Vitamin A : 5000IU/kg

Vitamin B1 : 4,0 mg/kg

Riboflavin : 2,0 mg/kg

Vitamin B12 : 0,001 mg/kg

Antibiotik : 10,0 mg/kg

Sumber (bahan yang tersedia)

Vitamin A dapat menyediakan 2.000.000 IU/gram

Vitamin B12 dapat menyediakan 10 mg/kg

Vitamin yang lain murni

Perhitungan

Nutrien	Konsentrasi Sumber	Level Per kg	Level bahan Per 1000 kg
1. Vit A	2.000.000 IU/g	5.000 IU	2,5 g
2. Vit B1	Murni	4 mg	4 g
3. Riboflavin	Murni	2 mg	2 g
4. Vit B12	10 mg/kg	0,001 mg	100 g
5. Antibiotik	Murni	10 mg	10 g
		Total :	118,5 g

1. 5.000 IU x 1.000 = 5.000.000 IU
   5.000.000
   Sumber vitamin A : 2.000.000. IU/g □ = 2,5 g
2. Sumber murni : 4 mg x 1000 = 4.000 mg = 4 g
3. dan 5 ditto butir 2
4. 0,0001 mg x 1.000 = 1 mg
   Sumber 10 mg/kg □ 1/10 x 1.000 = 100 g

Final premix : 118,5 g

Carrier : 9881,5 g

1.000 g = 10 kg

b. Trial and Error

Metode ini juga dapat disebut sistem coba-coba.

Sesuai dengan namanya metode ini sulit terutama bagi yang tidak berkecimpung dalam ilmu nutrisi (nutrisionist).

Untuk memudahkan sistem atau methode mi, kelompokkan dulu bahan pakan berdasankan klasnya, kemudian baru dihitung-hitung. Misalnya untuk ternak potong diberi hijauan sebanyak 80% sisanya dedak halus. Bila belum mencukupi, perbandingan diubah lagi sampai memenuhi kebutuhan atau ditambahkan bahan pakan lain.

c. Linear Programming

Linear programming atau pemrograman linear adalah alat dasar yang diciptakan untuk membantu para ahli gizi untuk memilih antara bahan pakan ketika menyusun ransum. Untuk menggunakan program linear programming dalam formulasi ransum, pertanyaan "bahan pakan apa yang harus diberikan" adalah pengurangan menjadi istilah murni matematis yang sesuai prinsip zat gizi dan ekonomi. Jumlah setiap nutrisi penting dan zat makanan lainnya kemuadian diperlihatkan secara matematis.

Linear programming dapat digunakan untuk memperoleh kombinai bahan pakan yang mencapai target spesifikasi (utamanya kebutuhan zat makanan) pada harga paling murah. Ini disebut formulasi pakan harga termurah (least - cost), dan metode harga termurah hanya untuk spesifikasi yang diberikan. Hal penting untuk dicatat bahwa metode tersebut tidak secara otomatis ikut kepada spesifikasi yang mengarah ke yang terbaik atau produksi yang paling ekonomis.

d. Metode Least-Cost

Least-cost formulasi ransum harga termurah adalah bagian masalah penting dari permasalahan yang umum dari peningkatan keuntungan. Keuntungan dalam pemberian pakan harus membandingkan harga produk dan semua input untuk produksi dan pemasaran, bukan hanya bahan pakan saja. Produksi ternak membutuhkan perubahan zat gizi untuk pertumbuhan ternak yang telah menempati lebih banyak ruang dan waktu karena itu input modal, tenaga kerja, bahan pakan dan manajemen dibutuhkan dalam proses dan harus digunakan pada harga minimum untuk tingkat output khusus yang diproduksi dalam beberapa bagian dari ruang dan waktu.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam pembuatan pakan penguat, yaitu:

1. ketersediaan harga satuan bahan pakan

   Beberapa bahan pakan mudah diperoleh disuatu daerah dengan harga bervariasi, sedang dibeberapa daerah lain sulit didapat. Harga perunit bahan pakan sangat

berbeda antara satu daerah dan daerah lain, sehingga keseragaman harga perunit nutrisi (bukan harga per unit berat) perlu dihitung terlebih dahulu.

2. Standar kualitas Pakan Penguat

   Kualitas pakan penguat dinyatakan dengan nilai nutrisi yang dikandungnya terutama nilai energi dan protein. Sebagai pedoman, setiap kg pakab penguat harus mengandung minimal 2500 kkal/kg energi metabolisme, 17% protein dan 12 % serat kasar.

3. Metode dan Teknik Pembuatan

   Metode formulasi untuk pakan adalah metode simultan, metode segiempat bertingkat, metode aljabar, metode konstan control, metode ekuasi atau metode grafik.

Hal-hal yang perlu diketahui dalam memilih bahan pakan :

1. Mudah diperoleh dan terdapat disekitar tempat usaha
2. Terjamin ketersediannya secara kontinyu dalam jumlah yang cukup
3. Harga layak dan tidak berfluktuasi terlalu besar
4. Tidak bersaing dengan kebutuhan manusia
5. Harus dapat diganti dengan bahan yang kandungan yang nilai nutrisinya hampir sama
6. Tidak mengandung racun

Hal-Hal yang perlu diketahui dalam menyusun ransum :

1. Komposisi zat-zat makan dari bahan yang akan digunakan
2. Mengetahui kelas, umur, produksi, dan kondisi fisiologis ternak sehingga diketahui berapa kebutuhanya untuk hidup pokok, pertumbuhan dan produksi
3. Mengetahui kebutuhan tiap zat makanan untuk ternak tersebut
4. Tetapkan dasr penyusunan ransum yang akan dilakukan apakah berdasarkan kandungan energi, protein atau TDN
5. Mengetahui batas penggunaan suatu bahan pakan sehingga tidak membahayakan ternak
6. Usahakan menggunakan sumber bahan pakan nabati dan hewani untuk bias saling melengkapi (complementary)