

UJI AKTIVITAS ANTIMIKROBA EKSTRAK DAUN SIRSAK (*Annona muricata L.*) TERHADAP BEBERAPA MIKROBA PATOGEN



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makssar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

Oleh

M A K A S S A R

ISMI FADHILAH

NIM. 70100107106

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Tumbuhan merupakan faktor yang senantiasa dipersoalkan oleh manusia karena sangat berkaitan dengan kehidupan. Untuk itu diperlukan pengamatan yang serius atas berbagai macam tumbuhan, baik dilihat dari kegunaan yang dimiliki, sifat-sifatnya, kandungan kimia, maupun kemampuan tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut memiliki fungsi atau kegunaan yang sangat bermanfaat bagi manusia sehingga mendorong para ahli untuk meneliti kandungan serta cara ekstraksi dan isolasi senyawa aktifnya.

Salah satu tumbuhan yang biasa digunakan sebagai obat tradisional adalah daun sirsak (*Annona muricata*L.). Daun sirsak (*Annona muricata* L.) mengandung senyawa acetogenin, minyak esensial, reticuline, loreximine, coclaurine, annomurine, higenamine. Kandungan zat-zat lainnya pada daun sirsak (*Annona muricata* L.) antara lain annocatacin, annocatalin, annohexocin, annonacin, annomuricin, anomurine, anonol, caclourine, gentisic acid, gigantetronin, linoleic acid, dan muricapentocin. Adapun pada batang dan daun sirsak kaya akan tannin, fitosterol, kalsium oksalat, serta alkaloid muricine. (Hariana, A., 2006)

Adapun kandungan gizi yang terkandung dari sirsak (*Annona muricata*L.) antara lain protein 1,00 gr, lemak 0,30 gr, karbohidrat 16,30 gr,

kalsium 14 mg, serat 2,00 gr, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C. (Bahari Hamid, 2011)

Secara tradisional, daun sirsak (*Annona muricata* L.) biasa dimanfaatkan untuk mengobati asma, bronchitis, batuk, diabetes, bisul, borok, disentri, demam, hipertensi, kurap, kejang dan tumor. (Putri, M., 2011)

Masyarakatminahasa (Sulawesi utara) pada umumnya memanfaatkan daunsirsak (*Annona muricata* L.) yang masih muda untuk mengobati bisul batu agar cepat pecah. Penggunaannya dilakukan dengan mengambil 5-10 lembar daun sirsak. Kemudian ditumbuk hingga halus. Tambahkan air secukupnya dan aduk hingga merata. Balurkan ramuan tersebut pada bagian tubuh yang terkena bisul. Gunakan sebanyak tiga kali dalam sehari. (Bahari Hamid, 2011).

Setelah dilakukan beberapa kali penelitian, terbukti bahwa daun sirsak biasa digunakan sebagai obat untuk mengatasi penyakit kanker.Selain menyembuhkan kanker, juga berfungsi sebagai antibakteri, antijamur (fungi), efektif melawan berbagai jenis parasit/cacing, menurunkan tekanan darah tinggi, depresi, stress, dan menormalkan sistem saraf yang kurang baik.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak sebagai antibakteri patogen secara invitro. Penelitian yang dilakukan oleh Asolkar et al., tahun 1992 dan Khan et al., tahun 1997 menyatakan bahwa beberapa senyawa alkaloid murisolin, cauxine, caclamine, stepharine, dan reticulin didalam daun sirsak mampu bertindak sebagai antibakteri. Yang

dimana khasiat daun sirsak mampu mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri yakni diare, bisul, dan infeksi saluran kemih. (AM Ervival, 2011)

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai aktivitas antimikroba dari ekstrak daun sirsak (*Annona muricata* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* serta beberapa jenis bakteri patogen lainnya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan dalam penelitian adalah:

1. Apakah ekstrak metanoldaun sirsak (*Annona muricata* L.) memberikan aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri uji?
2. Komponen kimia apa yang memberikan aktivitas antibakteri ekstrak daun sirsak (*annona muricata* L.) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya aktivitas antibakteri ekstrak metanol pada daun sirsak (*Annona muricata* L.) terhadap beberapa bakteri uji dengan metode KLT-Bioautografi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber data ilmiah bagi peneliti selanjutnya, mengenai aktivitas antimikroba dari ekstrak daun sirsak (*Annona muricata* L.) sehingga dalam penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi Tanaman (Herliana Ersi, 2011)

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Subdivisio	: Angiospermae
Class	: Dicotyledonae
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona muricata</i> L.

2. Penamaan daun Sirsak (Bahari Hamid, 2011)

Daun sirsak adalah daun dari tanaman *Annona muricata* (L.). Nama daerah: nangka sebrang dan nangka londo (Jawa), nangka walanda dan sirsak (Sunda), nangka buris (Madura), srikaya jawa (Bali), deureuyan Belanda (Aceh), durio ulondro (Nias), serekaja (Bugis), jambu landa (Lampung), durian betawi (Minangkabau).

3. Morfologi daun Sirsak (Hidayat, S., 2011)

Secara morfologi Sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tanaman dengan tinggi pohon sekitar 3-10 meter. Dimana merupakan tumbuhan tropis yang bersifat tahunan. Batang coklat berkayu, bulat, bercabang. Mempunyai daun berbentuk telur atau lanset, ujung runcing, tepi rata,

pangkal meruncing, pertulangan menyirip, panjang tangkai 5 mm, hijau kekuningan. Ukuran daun sekitar 8-16 cm x 3-7 cm. Tangkai daun panjangnya 3-7 mm. Bunga terletak pada batang atau ranting, daun kelopak kecil, kuning keputi-putihan, benang sari banyak berambut. Buahnya bukanlah buah sejati, yang dinamakan "buah" sebenarnya adalah kumpulan buah-buah (buah agregat) dengan biji tunggal yang saling berimpitan dan kehilangan batas antar buah. Daging buah sirsak berwarna putih dan bentuk bijinya bulat dengan warna coklat kehitaman dan permukaan yang mengkilap. Akar berwarna coklat muda, bulat dengan perakaran tunggang.

4. Kandungan Kimia daun Sirsak (Bahari Hamid, 2011)

Daun sirsak (*Annona muricata* L.) mengandung senyawa acetogenin, minyak esensial, reticuline, loreximine, coclaurine, annomurine, higenamine. Kandungan zat-zat lainnya pada daun sirsak (*Annona muricata* L.) antara lain annocatacin, annocatalin, annohexocin, annonacin, annomuricin, anomurine, anonol, caclourine, gentisic acid, gigantetronin, linoleic acid, dan muricapentocin.

Adapun kandungan gizi yang terkandung dari sirsak (*Annona muricata* L.) antara lain protein 1,00 gr, lemak 0,30 gr, karbohidrat 16,30 gr, kalsium 14 mg, serat 2,00 gr, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C.

5. Efek farmakologis(Putri, M., 2011)

Pada umumnya secara tradisional daun sirsak (*Annona muricata* L.) biasa dimanfaatkan untuk mengobati kanker, asma, bronchitis, batuk, diabetes, bisul, borok, disentri, demam, hipertensi, kurap, kejang dan tumor.

B. Uraian Mikroba Uji

1. *Pseudomonas aeruginosa*

a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 : 24-95)

Domain : Bacteria
 Phylum : Proteobacteria
 Class : Gammaproteobacteria
 Ordo : Pseudomonadales
 Familia : Pseudomonadaceae
 Genus : *Pseudomonas*
 Spesies : *Pseudomonas aeruginosa*

b. Sifat dan morfologi (Jawetz, 2000)

Bakteri berbentuk batang, aerob, Gram negatif dapat bergerak, pada perbenihan padat koloninya tampak berwarna hijau kebiru-biruan karena menghasilkan pigmen pyocyanin.

Pseudomonas aeruginosa bergerak dan berbentuk batang, berukuran kurang lebih 0,6 x 2 µm. Terlihat sebagai bakteri tunggal, berpasangan dan kadang-kadang membentuk rantai yang pendek.

Pseudomonas aeruginosa adalah aerob obligat yang tumbuh dengan mudah pada banyak jenis pembenihan biakan. Beberapa strain menghemolisis darah.

Pseudomonas aeruginosa membentuk koloni halus bulat dengan warna fluoresensi kehijauan. Bakteri ini sering menghasilkan piocyanin, pigmen kebiru-biruan yang tidak berfluoresensi yang berdifusi ke dalam agar.


Pseudomonas aeruginosa tumbuh dengan baik pada suhu 37⁰ C-42⁰ C. Pertumbuhan pada suhu 42⁰ C membantu membedakan spesies ini dari spesies *pseudomonas* yang lainnya. Bakteri ini oksidase positif dan tidak meragikan karbohidrat. Tetapi banyak strain yang mengoksidasi glukosa. Pengenalan biasanya berdasarkan morfologi dan pertumbuhan pada suhu 42⁰ C, untuk membedakan *Pseudomonas aeruginosa* lainnya. Berdasarkan aktivitas biokimia dibutuhkan pengujian dengan berbagai substrak.

Pseudomonas aeruginosa menimbulkan infeksi pada luka dan luka bakar, menimbulkan nanah hijau kebiruan, meningitis, dan infeksi saluran kemih bila masuk bersama kateter dan instrument lain atau dalam oksigen untuk irigasi keterlibatan saluran napas terutama dari respirator yang terkontaminasi, mengakibatkan pneumonia yang disertai nekrosis. Bakteri ini sering dijumpai pada otitis eksterna ringan pada perenang. Bakteri ini menyebabkan otitis eksterna invasi (maligna) pada penderita diabetes. Infeksi mata yang dapat dengan cepat

menyebabkan kerusakan mata sering terjadi setelah cedera atau pembedahan menyerang aliran darah dan mengakibatkan sepsis yang vital.

2. *Escherichia coli*

a. **Klasifikasi** (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 : 24-172)



Domain : Bacteria
 Phylum : Firmicutes
 Class : Bacilli
 Ordo : Bacillales
 Familia : Escherichiaceae
 Genus : Escherichiae
 Spesies : *Escherichia coli*

b. **Sifat dan Morfologi**

Escherichia coli adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang pendek dan lurus dengan ukuran 0,4-0,7 μm x 1,4 μm dan kadang-kadang lebih pendek membentuk rantai. Bergerak dengan flagel peritrik atau tidak bergerak. Mudah tumbuh pada pembenihan sederhana, tidak mempunyai spora dan kapsul. Umumnya memfermentasikan laktosa membentuk asam dan gas, ada pula yang tidak memfermentasikan glukosa dan maltosa. Dapat ditemukan dalam usus mamalia, tumbuh optimal pada suhu 37⁰ C.

3. *Salmonella typhosa*

a. **Klasifikasi** (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 :24-122).

Domain : Bacteria
Class : Gammaproteobacteria
Ordo : Enterobacteriales
Familia : Enterobacteriaceae
Genus : Salmonella
Spesies : *Salmonella typhosa*

b. **Sifat dan Morfologi**

Salmonella typhosa adalah bakteri Gram negative berbentuk batang lurus, dengan ukuran 0,5-0,8 μm x 1-3 μm , biasanya tunggal dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, jenis yang bergerak berflagella peritrik, hidup secara aerobik atau anaerobik fakultatif, meragikan glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas. Tumbuh optimal pada suhu 37⁰ C dan berkembang biak pada suhu kamar, bakteri ini dapat ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini merupakan penyebab demam tifoid karena adanya infeksi akut pada usus halus manusia dan hewan.

4. *Streptococcus mutans*

a. **Klasifikasi** (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 : 24-203))

Domain : Bacteria
Phylum : Firmicutes

Class : Bacilli
Ordo : Lactobacillales
Familia : Streptococcaceae
Genus : Streptococcus
Spesies : *Streptococcus mutans*

b. Sifat dan morfologi

Bentuk bulat tersusun seperti rantai, termasuk bakteri Gram positif dan biasanya tidak berpigmen. Berdiameter 0,5-1,5 mm koloni bulat cembung dengan permukaan licin atau sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau sebagian tidak beraturan. Koloni buram berwarna biru terang, bersifat fakultatif anaerob, dapat tumbuh pada suhu 45⁰ C dan suhu optimumnya 30⁰C-37⁰C, terdapat dalam bentuk hingga membentuk kelompok yang tidak beraturan. Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, polisakarida, protein dan asam lipotekoat.

Streptococcus mutans menghasilkan gabungan antara glukosiltransferase dan fruktosiltransferase baik intraseluler maupun ekstraseluler. Enzim ini spesifik untuk substansinya, sukrosa yang digunakan untuk mensintesis glukukan dan fruktan bermolekul tinggi.

Dengan enzim tersebut *Streptococcus mutans* mengubah semua makanan (terutama gula dan karbohidrat) menjadi asam, sisa makanan dan ludah bergabung membentuk bahan lengket yang disebut plak yang merupakan awal terjadinya karies gigi.

Streptococcus mutans merupakan spesies yang mendominasi komposisi bakteri dalam plak gigi. Bakteri ini merupakan mikroflora normal dalam rongga mulut yang harus mendapatkan perhatian khusus karena kemampuannya membentuk plak dari sukrosa melebihi jenis bakteri yang lainnya. Morfologi koloni *Streptococcus mutans* divergen, bergantung media yang digunakan. Walaupun pada media padat paling sering ditemukan koloni kasar, koloni halus dan mukoid.

Streptococcus mutans berbentuk lonjong dengan garis tengah kurang dari 2 mikrometer, merupakan bakteri Gram positif dan bereaksi dengan katalase. Koloninya berpasangan atau berantai, tidak bergerak dan tidak berspora. Dalam pembedahan cair membentuk rantai pendek sampai panjang. Metabolismenya anaerob, namun dapat hidup secara fakultatif anaerob.

5. *Bacillus subtilis* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

a. **Klasifikasi** (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 :24-172)

Domain : Bacteria

Phylum : Firmicutes

Class : Bacilli

Ordo : Bacillales

Familia : Bacillaceae

Genus : *Bacillus*

Spesies : *Bacillus subtilis*

b. Sifat dan morfologi

Bacillus subtilis merupakan bakteri Gram positif memiliki sel batang 0,3 – 2,2 μm x 1,27-7,0 μm . Sebagian besar motil; flagelum khas lateral. Membentuk endospora tidak lebih dari satu dalam sel spongarium. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi sejati, fermentasi sejati, atau kedua-duanya, yaitu respirasi dan fermentasi (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008 : 947)

6. *Staphylococcus aureus*

a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 :24-187)

Domain : Bacteria
 Phylum : Firmicutes
 Class : Bacilli
 Ordo : Bacillales
 Familia : Staphylococcaceae
 Genus : Staphylococcus
 Spesies : *Staphylococcus aureus*

b. Sifat dan morfologi

Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 – 1,5 μm , terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Non motil. Tidak diketahui adanya stadium istirahat. Dinding sel mengandung

dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam teikoat. Berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas. Kisaran inangnya luas, dan banyak galur merupakan patogen potensial (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008 : 954-955).

7. *Vibrio sp*

a. **Klasifikasi** (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 :24-109)

Domain : Bacteria
 Phylum : Proteobacteria
 Class : Gammaproteobacteria
 Ordo : Vibrionales
 Familia : Vibrionaceae
 Genus : *Vibrio*
 Spesies : *Vibrio sp*

b. **Sifat dan morfologi**

Vibrio sp adalah bakteri Gram negatif. Batang pendek, tidak membentuk spora, sumbuhnya melengkung atau lurus, 0,5 μm x 1,5-3,0 μm , terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagelum polar, atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagelum dalam satu berkas polar; hanya sesekali non motil. Seringkali mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Tidak tahan asam. Tidak membentuk kapsul. Tumbuh baik dan cepat pada medium

nutrien baku. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi (menggunakan oksigen) dan fermentatif. Anaerobik fakultatif. Suhu optimum berkisar dari 18-37 °C. (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008 : 956).

8. *Staphylococcus epidermis*

a. **Klasifikasi** (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 :24-187)

Domain : Bacteria

Phylum : Firmicutes

Class : Bacilli

Ordo : Bacillales

Familia : Staphylococcaceae

Genus : Staphylococcus

Spesies : *Staphylococcus epidermis*

b. **Sifat dan morfologi**

Staphylococcus epidermis adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 – 1,5 µm, terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35 – 40°C. Terutama berosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008 : 954).

Koloninya berwarna putih atau kuning dan bersifat anaerob fakultatif. Kuman ini tidak mempunyai protein A pada dinding selnya. Bersifat koagulasi negatif meragi glukosa, dalam keadaan anaerob tidak meragi manitol. (Syahracham, Agus, dkk 1994 :177).

C. Metode Ekstraksi Bahan Alam

1. Defenisi Ekstraksi (Tobo. F, 2001)

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat aktif dari bagian tanaman, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif tersebut terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda. Demikian pula ketebalannya sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya.

2. Mekanisme Ekstraksi

Umumnya zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah sebagai berikut, pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel tanaman atau hewan yang mengandung zat-zat aktif. Zat-zat aktif tersebut akan terlarut sehingga akan terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik diluar sel. Maka larutan terpekat akan terdifusi keluar sel, dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi kesetimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel.

3. Jenis Ekstraksi

Cara penyarian atau ekstraksi dibedakan menjadi infundasi, maserasi, perkolasi, dan penyarian berkesinambungan. Dari keempat caratersebut sering dilakukan modifikasi untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

a. Ekstraksi Secara Perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi

Prinsip perkolasi adalah sebagai berikut : serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian awalnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan gaya kapiler yang tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler dan daya geseran (friksi)

Alat yang digunakan untuk perkolasi disebut perkolator, cairan yang digunakan untuk menyari disebut cairan penyari atau menstrum, larutan zat aktif yang keluar dari perkolator disebut sari atau perkolat, sedang sisa setelah dilakukannya penyarian disebut ampas atau sisa perkolasi.

Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain : gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler dan daya gesekan.

b. Ekstraksi Secara Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan akan masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel.

Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara: 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang sesuai di masukkan ke dalam bejana, kemudian dituang dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari sari diserkai, ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya diaduk dan diserkai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya, selama 2 hari. Kemudian endapan dipisahkan.

c. Ekstraksi Secara Refluks

Prinsip kerja dari ekstraksi dengan cara refluks adalah cairan penyari dipanaskan hingga mendidih, penyari akan naik ke atas melalui

serbuk simplisia, uap penyari mengembun karena didinginkan oleh pendingin balik. Embun turun melalui serbuk simplisia sambil melarutkan zat aktifnya dan kembali ke labu, cairan akan menguap kembali berulang proses seperti di atas.

Keuntungan dari ekstraksi secara refluks yaitu cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit, dan secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang murni, sehingga dapat menyari zat aktif lebih banyak; penyari dapat diteruskan sesuai dengan keperluan, tanpa menambah volume cairan penyari.

D. Metode sterilisasi

1. Sterilisasi secara fisik (Waluyo, 2004 ; Djide, 2005)

a. Pemanasan basah

i. Otoklaf

Alat ini serupa tangki minyak yang dapat diisi dengan uap air. Otoklaf memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atm. Biasanya otoklaf sudah diatur sedemikian rupa, sehingga pada suhu tersebut, tekanan yang ada 1 atmosfer per 1 cm². Perhitungan waktu 15 atau 20 menit dimulai semenjak termometer pada otoklaf menunjuk 121⁰ C.

ii. Tyndalisasi

Proses sterilisasi dengan cara menggunakan pemanasan dengan suhu 100°C selama 30 menit dan dilakukan setiap hari berturut-turut selama tiga hari.

iii. Pasteurisasi

Proses pemanasan pada suhu rendah yaitu $63 - 70^{\circ}\text{C}$ selama 30 menit dan dilakukan setiap hari selama tiga hari berturut-turut.

b. Pemanasan kering

i. Oven

Sterilisasi ini dengan menggunakan udara panas. Alat-alat yang disterilkan ditempatkan dalam oven dimana suhunya dapat mencapai $160-180^{\circ}\text{C}$. Oleh karena daya penetrasi panas kering tidak sebaik panas basah, maka waktu yang diperlukan pada sterilisasi cara ini lebih lama yakni selama 1-2 jam.

ii. Pembakaran

Pembakaran juga merupakan salah satu metode sterilisasi, tetapi cara ini terbatas penggunaannya. Cara ini biasa dipergunakan untuk mensterilkan alat penanam kuman (jarum ose/sengkelit). Yakni dengan membakarnya sampai pijar. Dengan cara ini semua bentuk hidup akan dimatikan.

c. **Penyinaran dengan sinar gelombang pendek**

Mikroorganisme di udara dapat dibunuh dengan penyinaran memakai sinar ultra violet. Panjang gelombang yang dapat membunuh mikroorganisme adalah di antara 220-290 nm; radiasi yang paling efektif adalah 253,7 nm.

2. Sterilisasi secara kimia

Antiseptik kimia biasanya dipergunakan dan dibiarkan menguap seperti halnya alkohol. Umumnya isopropil alkohol 70-90 % merupakan antiseptik yang sangat efektif dan efisien.

3. Sterilisasi secara mekanik

Untuk beberapa bahan yang akibat pemanasan ataupun tekanan tinggi akan mengalami perubahan ataupun penguraian, sterilisasinya harus dilakukan secara mekanik. Misalnya dengan saringan.

E. Antimikroba

1. Defenisi Antimikroba

Antimikroba (AM) adalah obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang merugikan manusia. Berdasarkan sifat toksisitas selektif, ada antimikroba yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba dan dikenal sebagai aktivitas bakteriostatik, dan ada yang bersifat membunuh mikroba, dikenal sebagai aktivitas bakterisid. Kadar minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau membunuhnya, masing-masing dikenal sebagai kadar hambat minimal (KHM) dan kadar

bunuh minimal (KMB). Antimikroba tertentu aktivitasnya dapat meningkat dari bakteriostatik menjadi bakterisid bila kadar antimikrobanya ditingkatkan melebihi KHM.

2. Mekanisme Kerja Antimikroba

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antimikroba dibagi menjadi 5 kelompok :

a. Penginaktifan enzim tertentu

Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptik dan desinfektan, seperti turunan aldehyd, amida, karbanilida, etilen oksida, halogen, senyawa merkuri dan senyawa ammonium kuartener.

Aldehyd dan etilen oksidabekerja dengan mengalkilasi secara langsung gugus nukleofil seperti gugus-gugus amino, karboksil, hidroksil, fenol dan tiol dari protein sel bakteri. Reaksi alkilasi tersebut menyebabkan pemblokiran sisi aktif dan perubahan konformasi enzim sehingga terjadi hambatan pertumbuhan bakteri.

Iodin secara langsung dapat mengadakan iodinasi rantai polipeptida protein sel bakteri, mengoksidasi gugus tirosin dan sulhidril protein, dan menyebabkan penginaktifan protein enzim tertentu sehingga bakteri mengalami kematian.

Akibat protein dan enzim tidak dapat berfungsi secara normal dan bakteri mengalami kematian.

b. Denaturasi protein

Turunan alkohol, halogen dan halogenofor, senyawa merkuri, peroksida dan turunan fenol dan senyawa ammonium kuartener bekerja sebagai antiseptic dan desinfektan.

Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah polimiksin, golongan polien serta berbagai antimikroba kemoterapeutik, umpamanya antiseptik *surface active agents*. Polimiksin sebagai senyawa ammonium-kuarten turunan fenol dan senyawa ammonium kuartener bekerja sebagai dapat merusak dinding sel setelah bereaksi dengan fosfat pada fosfolipid membran sel mikroba. Polimiksin tidak efektif terhadap kuman gram-positif karena jumlah fosfor bakteri ini rendah. Kuman gram-negatif yang menjadi resisten terhadap polimiksin, ternyata jumlah fosfornya menurun. Antibiotik polien bereaksi dengan struktur sterol yang terdapat pada membra sel fungus sehingga mempengaruhi permeabilitas selektif membrat tersebut. Bakteri tidak sensitif terhadap antibiotik polien, karena tidak memiliki struktur sterol pada membran selnya. Antiseptik yang mengubah tegangan permukaan (*surface-active agents*), dapat merusak permeabilitas selektif dari membran sel mikroba. Kerusakan membran sel menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel mikroba yaitu protein, asam nukleat, nukleotida dan lain – lain.

c. Antimikroba yang menghambat sintesis protein sel mikroba.

Hidupnya suatu sel tergantung pada pemeliharanya molekul-molekul dalam keadaan alamiah.

Suatu kondisi atau substansi mengubah keadaan ini yaitu mendenaturasi protein dengan merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi atau konsentrasi beberapa zat dapat mengakibatkan koagulasi irreversible komponen-komponen seluler yang vital ini.

Antimikroba mempunyai fungsi ribosom pada mikroorganisme yang menyebabkan sintesis protein terlambat. Dimana dapat berkaitan dengan ribosom 30S yang dapat menyebabkan akumulasi sintesis protein awal yang kompleks sehingga salah dalam menerjemahkan tanda m-RNA dan menghasilkan polipeptida yang abnormal. Selain itu juga dapat berkaitan dengan ribosom 50S yang dapat menghambat ikatan asam amino baru pada rantai peptida yang memanjang. Contohnya obat yang termasuk dalam kelompok ini yaitu aminoglikosida, kloranfenikol, tetrasiklin, eritromisin, dan linkomisin. (Ganiswara, 1995)

d. Antimikroba yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba.

Antimikroba yang termasuk dalam golongan ini adalah rifampisin, golongan kuinolon, pyritamin, dan trimetrexat. Asam nukleat merupakan bagian yang sangat vital bagi perkembangbiakan sel. Untuk pertumbuhannya sel tergantung pada sintesis DNA, sedangkan RNA diperlukan untuk transkripsi dan menentukan informasi sintesis protein dan enzim. Ada beberapa jenis RNA yaitu t-RNA, m-RNA, masing-masing mempunyai peranan pada sintesis protein.

Begitu pentingnya DNA dan RNA dalam proses kehidupan sel. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan atau

pada fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan vital pada sel. Dalam hal ini mempengaruhi metabolisme asam nukleat, seperti berikatan dengan enzim DNA dependen RNA-polymerase bakteri, memblokir helix DNA. (Pelczar, 2008)

F. Uraian Umum Uji Mikrobiologis (Djide, 2005, 258-259)

Uji atau penetapan antimikroba dapat dilakukan dengan cara (1) kimia, fisikokimia dan (2) secara mikrobiologik atau biologik. Pada uji atau penetapan secara mikrobiologik lebih menggambarkan tentang khasiat antimikroba tersebut.

Uji potensi antimikroba secara mikrobiologik adalah suatu teknik untuk menetapkan potensi suatu antimikroba dengan mengukur efek senyawa tersebut terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji yang peka dan sesuai. Efek yang ditimbulkan pada senyawa uji dapat berupa hambatan dan rangsangan pertumbuhan. Terdapat dua cara yang umum dalam uji potensi secara mikrobiologik yaitu:

1. Metode Lempeng atau Difusi Agar

Pada pengujian potensi suatu antimikroba dengan difusi agar, berarti sebagai dasar kuantitatif untuk membandingkan potensi antibiotik baku. metode ini menggunakan media padat, yang pada permukaannya telah diinokulasikan mikroorganisme yang sensitif terhadap antimikroba yang secara merata. Pencadang atau reservoir diletakkan pada permukaan media

tersebut dan selanjutnya dipipet senyawa antimikroba yang akan diuji ke dalam pencadangan dengan volume tertentu. Selanjutnya diinkubasikan pada suhu dan waktu tertentu. Selama masa inkubasi akan terjadi proses difusi antimikroba ke dalam gel agar dan membentuk daerah hambatan (zone). Zone yang terbentuk inilah yang digunakan sebagai dasar kuantitatif untuk membandingkan potensi antibiotika baku.

2. Metode Tabung atau Turbidimetri

Pada pengujian atau penetapan secara tabung atau turbidimetri, media yang digunakan adalah media cair yang diinokulasikan dengan mikroorganisme uji yang sensitif dalam tabung-tabung reaksi steril. Selanjutnya dipipet senyawa antimikroba steril yang diuji kemudian diinkubasikan. Pertumbuhan mikroorganisme ditandai dengan terjadinya kekeruhan dalam tabung sesuai dengan tingkat pengenceran dari senyawa yang diuji dan antimikroba baku. Kekeruhan media setelah masa inkubasi tadi dinyatakan sebagai kerapatan optik media tersebut, tergantung pada kadar larutan senyawa yang diuji di dalam tabung, berbanding terbalik apabila senyawa tersebut adalah antimikroba, sedangkan pada vitamin akan berbanding lurus.

3. KLT-Bioautografi (Djide, 2005)

Menurut Betina (1972) KLT-Bioautografi adalah metode pendeteksian untuk menemukan senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan melokalisasi aktivitas antimikroba pada kromatogram. Metode ini didasarkan

atas efek biologi (antibakteri, antiprotozoa, antitumor, antiviral) dari substansi yang diteliti.

Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah didasarkan atas tehnik difusi agar, dimana senyawa antibakteri dipindahkan dari lapisan kromatografi ke medium agar yang telah diinokulasi dengan bakteri yang sesuai. Dua lapisan media agar dianjurkan untuk bioautografi yaitu lapisan dasar (*based layer*) dan lapisan atas (*seed layer*). Zona inhibisi ditampakan oleh aktivitas dehidrogenasi dari pereaksi pendeteksi.

Bioautografi dapat dipertimbangkan paling efisien untuk mendeteksi komponen antimikroba sebab dapat melokalisir aktivitas meskipun dalam senyawa kompleks dan dapat langsung diisolasi dari komponen aktif. Selain itu, metode sederhana yang telah dikembangkan ini, dapat mencegah adanya perluasan bakteri dari peralatan yang digunakan serta masalah-masalah yang berhubungan dengan perbedaan difusi senyawa-senyawa dari kromatogram ke media agar.

Bioautografi dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu :

- a. **Bioautografi langsung**, dimana mikroorganismenya tumbuh secara langsung di atas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Prinsip kerja dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji yang peka dalam medium cair disemprotkan pada permukaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang telah dihilangkan sisa-sisa eluen yang menempel pada lempeng kromatogram. Setelah itu dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Pengeringan kromatogram dilakukan secara hati-

hati dengan menggunakan “*hair dryer*” untuk menghilangkan sisa eluen. Besarnya lempeng KLT yang sering digunakan adalah 20x20 cm dan untuk meratakan suspensi bakteri yang telah disemprotkan dapat menggunakan alat putar atau “*roller*” yang dilapisi dengan kertas kromatogram (Whatman, Clijton). Lempeng KLT diinkubasi semalam (1 x 24 jam) dalam kotak plastik dan dilapisi dengan kertas, kemudian disemprot dengan 5 ml larutan cair TTC (20 mg/ml) atau INT (5 mg/ml), INTB (5 mg/ml) serta MTT (2,5 mg/ml) dan selanjutnya diinkubasi kembali selama 4 jam pada suhu 37⁰ C.

- b. **Bioautografi kontak**, dimana senyawa antimikroba dipindahkan dari lempeng KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan bakteri uji yang peka secara merata dan melakukan kontak langsung. Prinsip kerja dari metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis (KLT). Lempeng kromatografi ini ditempatkan di atas permukaan medium nutrient agar yang telah diinokulasikan dengan mikroorganisme yang sensitif terhadap senyawa antimikroba yang dianalisa. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi kemudian dipindahkan dari permukaan medium. Senyawa antibakteri yang telah berdifusi dari kromatogram ke dalam medium agar akan menghambat pertumbuhan bakteri setelah diinkubasi pada waktu dan tempat temperatur yang tepat, hingga noda yang menghambat tampak pada permukaan.

c. **Bioautografi pencelupan**, di mana medium agar telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri dituang di atas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Prinsip kerja dari metode ini adalah lempeng kromatografi yang telah dielusi diletakkan dalam cawan petri sehingga permukaan tertutupi oleh medium agar yang berfungsi sebagai *based layer*. Setelah medium agar memadat. Selanjutnya dituang medium agar yang telah diinokulasi dengan mikroorganisme yang berfungsi sebagai *seed layer* dan diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai.

Beberapa modifikasi metode KLT-bioautografi telah dilakukan oleh Nicolas dkk, dengan menuangkan medium agar berisi 2,3,5 trifeniltetrazoliumklorida (TTC) dan ditanami dengan organisme yang diuji di atas kromatogram.

Beberapa prosedur yang dikemukakan di atas masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut Horman dan Fuchs, bioautografi kontak merupakan tipe yang paling sering digunakan, masalah perbedaan difusi dari senyawa-senyawa dari kromatogram ke plat agar dipermudah dengan deteksi bioautografi secara langsung, tetapi metode ini membutuhkan peralatan mikrobiologi yang cukup rumit. Sedangkan Land dan Lyon, menyatakan bioautografi secara langsung, untuk aktivitas antibakteri sangat sensitif dan melokalisasi senyawa-senyawa yang aktif, tetapi mempunyai kekurangan karena keterbatasan mikroorganisme yang dapat tumbuh secara langsung di atas lapisan kromatografi. Sedangkan metode bioautografi pencelupan

merupakan metode yang paling tepat sebab tidak dipengaruhi oleh kemungkinan adanya kontaminasi.

E. Tinjauan Islam Mengenai Mikroba Penghasil Antibiotika

Segala yang ada di dunia ini adalah ciptaan dan milik Allah swt. Tanpa terkecuali, termasuk mikroorganisme-mikroorganisme yang ada di bawah tanah sekalipun. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt.

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الْأَرْضِ ﴿١﴾

(Q. S Thaahaa : 6)

Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah

Di dalam Al Quran, Allah SWT menyiratkan akan penciptaan makhluk hidup termasuk penciptaan mikroorganisme yang merupakan bagian dari makhluk hidup ciptaan Allah SWT, serta proses penciptaan dan komponen penyusun makhluk hidup termasuk mikroorganisme seperti dalam ayat yaitu :

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya :

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S.An Nur : 45).

Dari beberapa ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup termasuk mikroorganisme secara sempurna atau secara mendetail tanpa ada hal yang tertinggal atau kurang pada diri makhluk hidup tersebut termasuk mikroorganisme. Sehingga kita sebagai makhluk hidup harus bersyukur dengan pemberian Allah SWT, termasuk penciptaan mikroorganisme yang banyak memberi manfaat kepada manusia, salah satunya digunakan sebagai sumber penghasil antibiotika.

Para ahli pengobatan tradisional telah melakukan eksperimen terhadap obat-obat tersebut. Mereka merujuk pada berbagai buku medis yang disusun oleh pakar pengobatan. Ini termasuk satu cabang ilmu diantara berbagai cabang ilmu yang sangat banyak. Sekelompok orang memang ada yang menjadi tenaga ahli dalam pengobatan semenjak masa kenabian, juga sebelum itu dan sesudahnya. Mereka mengetahui formula obat-obatan, karakteristik, dan cara penggunaannya. Diiringi dengan keyakinan mereka bahwa obat itu hanya penyebab perantara kesembuhan saja dan Allah lah yang menjadikan penyebab itu semua. Oleh karena itu hukumnya boleh mempelajari ilmu pengobatan ini dan berobat dengannya.

Kebutuhan akan obat-obat di era modern seperti ini sangat besar seiring dengan munculnya berbagai macam penyakit dikalangan masyarakat. Oleh karna itu penelitian yang bertujuan untuk menemukan senyawa obat

baru akan terus dilakukan. Hal ini didasari oleh sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. a bahwa Rasulullah bersabda :

... لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (رواه مسلم)

Artinya :

“... Setiap penyakit ada obatnya. Dan jika suatu obat mengenai tepat pada penyakitnya, ia akan sembuh dengan izin Allah Ta’ala.” (HR. Muslim).

Setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt ada obatnya dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Setiap penyakit terjadi akibat dari berbagai macam faktor, salah satunya adalah infeksi yang diakibatkan oleh mikroorganisme.

Infeksi yang tidak dilayani dengan benar dapat berakibat fatal pada kesehatan manusia. Infeksi dapat disembukan dengan menggunakan zat-zat antibiotika.

Akan tetapi penggunaan antibiotika yang telah begitu luas, dapat memicu terjadi resistensi. Untuk itu pemberian antibiotika harus sesuai dengan aturan pakai yang telah ditetapkan oleh para ahli farmasi.

Dimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah r. a bahwa Rasulullah bersabda :

... أَنْزَلَ اللَّهُ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ (رواه البخاري)

Artinya :

“...Allah yang menurunkan penyakit, dan dia juga yang menurunkan obatnya.” (HR. Bukhari)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jenis dan klasifikasi penyakit akan semakin banyak ditemukan dan penemuan obat baru juga akan

semakin bertambah. Allah swt yang menurunkan penyakit dan Allah swt pula yang menurunkan obatnya.

Oleh karena itu banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama sebagai obat, maka rasulullah memerintahkan kita untuk berobat bila terkena penyakit.

Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah SWT yang menyembuhkan, akan tetapi Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya. Karena semua penyakit memiliki obatnya, dan manusialah yang perlu untuk mencari dan menggunakan obat-obatnya bagi penyembuhan penyakitnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat-alat yang digunakan

Autoklaf (Hirayama), Inkubator (Mettler), Laminar Air Flow, Lampu UV 254 nm (UVP Upland, CA 91786) dan 366 nm (UVP Upland, CA 91786), Lemari pendingin (Sanyo), Mikropipet, oven (Mettler), Penangas air, Rotavapor, Timbangan analitik (Precisa).

2. Bahan-bahan yang digunakan

Agar, air suling, biakan murni (*Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, dan *Vibrio sp*), dimetil sulfoksida (DMSO), metanol, medium Nutrien Agar (NA), n-heksan, dan daun Sirsak (*Annona muricata* L.).

B. Prosedur Kerja

1. Penyiapan sampel

a. Pengambilan Sampel

Sampel daun Sirsak (*Annona muricata* L.) yang digunakan adalah daun yang sehat dan tidak berjamur.

b. Pengolahan Sampel

Sampel yang telah diperoleh, disortasi basah kemudian dipotong-potong dan diserbukkan.

c. Ekstraksi Sampel Penelitian.

Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) yang sudah diserbukkan sebanyak 300 gram dimasukkan ke dalam bejana maserasi lalu ditambahkan metanol sebanyak 1 L hingga simplisia tersebut terendam, biarkan selama 1 hari dalam bejana tertutup dan terlindung dari cahaya sambil diaduk sesering mungkin. Setelah 1 hari, kemudian disaring ke dalam wadah penampung dan ampasnya diekstraksi kembali dengan cairan penyari metanol yang baru, maserasi dilakukan sebanyak 3 kali penyarian. Hasil penyarian yang diperoleh kemudian diuapkan dengan menggunakan rotavapor. Hingga diperoleh ekstrak metanol kental.

d. Partisi sampel penelitian.

Ekstrak metanol daun sirsak (*Annona muricata* L.) yang telah didapat kemudian dipartisi padat-cair dengan menggunakan pelarut n-heksan. Dipisahkan antara ekstrak yang larut n-heksan dan yang tidak larut heksan. Bagian yang tidak larut heksan ditambahkan kembali n-heksan, hal ini dilakukan berulang-ulang hingga bagian yang tidak larut n-heksan ketika ditambahkan pelarut n-heksan menjadi bening. Bagian ekstrak metanol larut heksan dan tidak larut heksan diidentifikasi komponen kimianya dengan KLT.

2. Sterilisasi alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas erlemeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180⁰C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam otoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

3. Pembuatan medium

Medium Nutrien Agar (NA) dengan komposisi :

Ekstrak Beef 5 g

Pepton 10 g

Agar 15 g

Air suling sampai 1000ml

Cara pembuatan :

Bahan-bahan diatas dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer dilarutkan dalam air suling sampai 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling kemudian diatur pH 7,0.

Selanjutnya disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C dengan tekanan 2 atm selama 15 menit.

4. Penyiapan mikroba uji.

a. Peremajaan Mikroba Uji.

Masing-masing mikroba uji yaitu *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Escherichia coli*, dan *Vibrio sp.* Diambil satu ose dari biakan murni kemudian diinokulasikan pada medium NA, lalu diinkubasi pada suhu 37⁰ C selama 24 jam.

b. Pembuatan Suspensi Mikroba Uji

Hasil peremajaan mikroba, masing-masing disuspensikan dengan larutan NaCl 0,9% steril kemudian diukur transmittannya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 580 nm pada 25%, sebagai blanko digunakan larutan NaCl 0,9% steril.

5. Pengujian Skrining Antimikroba.

Ekstrak metanol ditimbang 10 mg lalu dilarutkan dengan DMSO sebanyak 0,2 ml. Setelah larut ekstrak ditambahkan medium NA 9,8 ml sehingga diperoleh konsentrasi 1 mg/ml. Campuran tersebut dituang ke dalam cawan petri lalu dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Semua mikroba yang telah disuspensikan, masing-masing diambil 5 µl dan diratakan di atas medium yang memadat. Lalu diinkubasi pada suhu 37⁰ C selama 24 jam.

Perlakuan yang sama juga dilakukan pada ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-heksan. Kemudian diamati ekstrak yang memberikan aktivitas penghambatan terhadap mikroba uji, yang ditandai dengan tidak adanya atau sedikitnya pertumbuhan mikroba uji.

6. Pemisahan Senyawa Secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Ekstrak aktif antimikroba dipisahkan secara KLT dengan menggunakan eluen polar etil asetat : etanol : H₂O (8 : 2 : 1) dan eluen non polar n-heksan : etil asetat (1 : 2). Kemudian kromatogram yang dihasilkan diamati bercaknya di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm serta penampak bercak H₂SO₄10%.

7. Pengujian Secara KLT bioautografi

Ke dalam cawan petri dituang medium NA sebanyak 10 ml dan ditambahkan suspensi bakteri uji yang dihambat pertumbuhannya pada saat skrining sebanyak 0,02 ml lalu dihomogenkan. Kromatogram hasil pemisahan senyawa secara KLT kemudian diletakkan di atas permukaan medium yang memadat. Setelah 60 menit, lempeng (kromatogram) diangkat dan dikeluarkan. Selanjutnya diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37⁰ C. Diamati daerah hambatan yang terbentuk.

8. Identifikasi bercak aktif beberapa penampakan bercak

Kromatogram disemprot dengan menggunakan pereaksi semprot sebagai berikut :

) Alkaloid

Pereaksi yang digunakan Dragendorff atau pereaksi Mayer atau pereaksi Buchardat. Dengan pereaksi Dragendorff akan menghasilkan warna jingga dengan latar belakang kuning untuk senyawa golongan Alkaloid. Untuk pereaksi Mayer akan menghasilkan endapan putih.

) Steroid

Pereaksi yang digunakan Liebermann-Burchard atau pereaksi Salkowski. Kromatogram terlebih dahulu dipanaskan, kemudian diamati di lampu UV 366 nm, munculnya noda yang berfluoresensi coklat atau biru menunjukkan adanya Triterpen, sedangkan munculnya warna hijau kebiruan menunjukkan adanya Steroid.

) Flavanoid

Pereaksi yang digunakan Aluminium klorida atau pereaksi Natrium hidroksida atau pereaksi Asam sulfat pekat. Diamati di lampu UV 366 nm, akan dihasilkan noda berfluoresensi kuning untuk senyawa golongan Flavanoid.

) Fenol

Pereaksi yang digunakan Besi (III) klorida atau dalam alkohol yang kadang dimodifikasi dengan penambahan larutan Besi (III) sianida 1 % akan dihasilkan warna biru atau hitam untuk senyawa golongan Fenol.

) Penampakan bercak H_2SO_4

Kromatogram dipanaskan pada $105^{\circ}C$ selama 5 menit dan diamati kebanyakan senyawa organik memberikan warna kuning, coklat, dan hitam.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Daun Sirsak

Setelah dilakukan ekstraksi daun sirsak (*Annona muricata*L.) sebanyak 300 gram dengan metode maserasi menggunakan cairan penyari metanol diperoleh ekstrak metanol kental. Ekstrak metanol kental yang dipartisi padat-cair dengan menggunakan pelarut n-heksan diperoleh ekstrak larut heksan dan ekstrak tidak larut heksan.

Tabel 1. Hasil ekstraksi daun sirsak (*Annona muricata*L.)

No	Sampel	Bobot (gram)
1.	Ekstrak Metanol	36, 59
2.	Ekstrak larut Heksan	4, 3
3.	Ekstrak tidak Larut Heksan	1, 1

2. Pengujian Skrining Antimikroba

Berdasarkan hasil uji pendahuluan skrining antimikroba pada masing-masing ekstrak daun sirsak (*Annona muricata*L.) (metanol, larut heksan dan tidak larut heksan) terhadap beberapa mikroba uji yaitu *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Escherichia coli*, dan *Vibrio sp* maka diperoleh hasil bahwa ekstrak metanol memberikan aktivitas yang baik dibandingkan dengan ekstrak metanol yang larut heksan dan ekstrak tidak larut heksan terhadap mikroba uji

Pseudomonas aeruginosa, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Salmonella thyposa*. Hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil pengujian Skrining aktivitas antimikroba ekstrak daun sirsak (*Annona muricata*L.) terhadap beberapa mikroba uji.

No	Sampel	Mikroba Uji							
		SA	SM	PA	ST	EC	Vsp	SE	BS
1.	Ekstrak								
	Metanol	-	-	+	+	-	-	+	-
2.	Ekstrak larut								
	heksan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ekstrak tidak								
	larut heksan	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

SA : *Staphylococcus aureus*

EC : *Escherichia coli*

SM : *Streptococcus mutans*

Vsp : *Vibrio sp*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

SE : *Staphylococcus epidermidis*

ST : *Salmonella typhosa*

BS : *Bacillus subtilis*

+ : menghambat pertumbuhan mikroba

- : tidak menghambat pertumbuhan mikroba

3. Hasil pengujian potensi antimikroba

a. Hasil pemisahan dan pengujian senyawa secara KLT

Pemisahan senyawa ekstrak metanol daun Sirsak (*Annona muricata* L.) secara KLT menggunakan 2 eluen dimana eluen polar yakni etil asetat : etanol : H₂O (8 : 2 : 1) dan eluen non polar yakni n-heksan: etil asetat (1 : 2) dengan penampakan bercak lampu UV 254 nm, UV 366 nm, dan H₂SO₄ 10 %. Setelah diuji secara KLT bioautografi diperoleh bahwa ekstrak metanol daun Sirsak dengan eluen non polar yang menghambat pertumbuhan mikroba dengan nilai Rf dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil pemisahan dan pengujian senyawa secara KLT ekstrak metanol daun sirsak (*Annona muricata* L.) menggunakan eluen non polar n-heksan : etil asetat (1 : 2)

Bercak	Rf	Penampakan Bercak			Bakteri uji yang dihambat
		UV 254 nm	UV 366 nm	H ₂ SO ₄	
1	1,0	Tidak nampak	Coklat Kemerahan	Coklat Tua	
2	0,5	Tidak nampak Kemerahan	Coklat Coklat	Kekuningan	PA
3	0,4	Tidak nampak Kemerahan	Coklat Coklat	Kekuningan	SE, ST
4	0,2	Tidak nampak	Coklat kemerahan	Coklat	PA, SE
5	0,1	Coklat kehitaman	Coklat kemerahan	Pink kecoklatan	

Pada pengujian identifikasi komponen kimia aktif ekstrak metanol daun sirsak (*Annona muricata L.*) dengan pereaksi Aluminium klorida, Besi (III) klorida, Dragendorf, Liebermann Burchard, dan penampak bercak H₂SO₄10%. Dari kelima penampak bercak tersebut diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 : Hasil Pengujian Identifikasi Komponen Kimia Aktif dari Kromatogram ekstrak methanol Daun Sirsak (*Annona muricata L.*)

Pereaksi	Warna bercak (+)	Warna hasil penyemprotan	keterangan
Aluminium klorida	Hijau berfloresensi		-
Besi III klorida	Biru atau hijau		-
Dragendorf	Jingga latar kuning		+ Alkaloid
Lieberman buchard	Berfloresensi hijau		-

Keterangan :

+ : Mengandung

- : tidak mengandung

B. Pembahasan

Daun sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan salah satu tumbuhan obat tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat. Hampir seluruh bagian tanaman dari sirsak memiliki potensi pengobatan. Seperti daunnya dimana mampu mengatasi infeksi yang disebabkan dari bakteri yaitu diare, bisul, dan infeksi saluran kemih.

Adanya aktivitas sebagai obat bisul dan antidiare maka dilakukanlah penelitian untuk membuktikan kebenaran khasiat sebagai antimikroba alamiah dengan metode KLT-Bioautografi agar penggunaannya dalam masyarakat dapat dipertanggung jawabkan.

Metode ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode maserasi karena alatnya sederhana, mudah dilakukan, dan untuk menghindari adanya komponen kimia yang rusak akibat pemanasan.

Cairan penyari yang digunakan untuk ekstraksi adalah metanol yang bersifat semi polar mampu menyari senyawa yang bersifat polar dan non polar. Sehingga sulit ditumbuhi oleh bakteri maupun jamur, mudah diuapkan serta harganya terjangkau.

Ekstrak metanol, ekstrak metanol larut heksan dan ekstrak metanol tidak larut heksan daun sirsak (*Annona muricata* L.) yang diperoleh dilakukan uji skrining antimikroba. Metode yang digunakan adalah metode dilusi padat pada media agar dengan kadar 1 mg/ml berdasarkan pertimbangan bahwa ekstrak yang menunjukkan hambatan pertumbuhan mikroba pada kadar tersebut potensial untuk diteliti lebih lanjut daya mikrobanya. Pada metode dilusi padat

ekstrak harus terdispersi merata diseluruh bagian media untuk mendapatkan hasil yang homogen.

Pada skrining antimikroba ekstrak daun sirsak(*Annona muricata* L.) yaitu ekstrak metanol, ekstrak metanol larut heksan dan ekstrak metanol tidak larut heksan dilakukan pada beberapa mikroba uji, yaitu *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, dan *Vibrio sp.*

Pemilihan mikroba - mikroba ini didasarkan pada sifat patogenik. *Staphylococcus epidermidis* merupakan penyebab infeksi alat kateter yang menyebabkan endokarditis serta infeksi kulit. *Streptococcus mutans* merupakan bakteri anaerob Gram positif yang dapat menyebabkan karies pada gigi. *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri kokus Gram positif yang bersifat patogenik penyebab infeksi kulit dan makanan. *Salmonella thypi* dan *Escherichia coli* merupakan bakteri anaerob fakultatif, Gram negatif yang bersifat patogenik penyebab utama diare kronik, tifoid dan infeksi saluran kemih. *Vibrio sp* merupakan bakteri bentuk koma, aerob dan menghasilkan endotoksin, penyebab kolera. *Bacillus subtilis* bakteri batang besar, Gram positif, aerob yang tumbuh pada makanan dan menyebabkan keracunan pada makanan.

Berdasarkan hasil skrining aktivitas antimikroba tersebut diperoleh bahwa ekstrak metanol dengan konsentrasi 1 mg/ml menunjukkan aktivitas penghambatan pertumbuhan mikroba yang lebih baik dibandingkan dengan ekstrak metanol larut heksan dan ekstrak metanol tidak larut heksan pada

bakteri uji *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Salmonella typhosa*. Hasil dari skrining ini mendasari pemilihan ekstrak metanol untuk lebih lanjut diuji aktivitasnya sebagai antimikroba.

Pengujian aktivitas antibakteri selanjutnya dilakukan dengan metode KLT Bioautografi. Bioautografi dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa dalam ekstrak metanol daun sirsak (*Annona muricata* L.) yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Sebelum pengujian ini dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji pendahuluan untuk mengetahui KLT yang baik. Sistem KLT yang dipilih adalah sistem yang dapat memisahkan komponen kimia yang ditunjukkan dengan pemisahan bercak yang baik terutama bercak dari senyawa yang aktif sebagai antimikroba. Dimana uji pendahuluan disini menggunakan 2 eluen, eluen polar etil asetat : etanol : H₂O (8 : 2 : 1) dan eluen non polar n-heksan : etil asetat (1 : 2). Dari hasil uji pendahuluan yang diperoleh eluen yang baik digunakan adalah eluen non polar n-heksan : etil asetat (1 : 2).

Metode yang digunakan dalam KLT Bioautografi ialah metode kontak yaitu dengan cara menempelkan lempeng KLT diatas permukaan medium Nutrien Agar (NA) yang telah diinokulasikan dengan mikroba uji. Setelah 15 – 30 menit, lempeng kromatografi tersebut diangkat dari permukaan medium. Senyawa antimikroba yang telah berdifusi dari lempeng kromatogram ke dalam media agar akan menghambat pertumbuhan bakteri setelah diinkubasi pada waktu dan suhu yang tepat sampai noda yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji tampak pada permukaan medium membentuk zona yang jernih.

Hasil uji dengan metode KLT-Bioautografi diperoleh bahwa noda dengan nilai Rf 0,2 menghambat pertumbuhan *Pseudomonas aeruginosa*, nilai Rf 0,4 menghambat pertumbuhan *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Salmonella thyposa*, dan nilai Rf 0,5 menghambat pertumbuhan *Staphylococcus epidermidis*.

Setelah dilakukan pengujian KLT bioautografi, dilakukan identifikasi komponen kimia untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam ekstrak dengan menggunakan pereaksi Aluminium klorida, besi III klorida, Dragendorf, dan Lieberman burchard. Dimana pada pengujian dengan menggunakan pereaksi Aluminium klorida bila diamati pada lampu UV akan dihasilkan noda berfluorosensi kuning untuk senyawa golongan flavanoid. Pengujian dengan menggunakan pereaksi besi III klorida akan dihasilkan warna biru kehitaman untuk senyawa golongan fenol. Pengujian dengan pereaksi Dragendrof akan dihasilkan warna jingga dengan latar belakang kuning untuk senyawa golongan alkaloid. Dan pengujian dengan peraksi Lieberman-buchard dengan munculnya noda berfluoresensi coklat atau biru menunjukkan adanya triterpen, sedangkan munculnya warna hijau kebiruan menunjukkan adanya senyawa steroid. Hasil yang diperoleh yaitu pereaksi Dragendrof nampak noda berwarna jingga berlatar belakang kuning yang menunjukkan positif mengandung senyawa Alkaloid.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak metanol daun sirsak (*Annona muricata* L.) dapat memberikan aktivitas antimikroba terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Salmonella thyposa*.
2. Senyawa yang memberikan aktivitas antimikroba berdasarkan uji identifikasi komponen kimia diduga golongan senyawa alkaloid.
3. Ditinjau dari ayat-ayat Allah swt yang dimana menyebutkan bahwa tumbuhan yang diciptakan terdapat kebaikan dimana daun Sirsak (*Annona muricata* L.) dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk orang-orang sakit serta hadis Rasulullah yang menyebutkan setiap penyakit ada obatnya.

2. Saran


Perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut untuk mengisolasi senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak methanol daun sirsak (*Annona muricata* L.) sehingga dapat diperoleh senyawa tunggal yang berefek antimikroba.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurán dan Terjemahan, 2005, Departemen Agama RI, CV.Penerbit J-ART, Bandung.
- AM Ervival, 2011., *Bukti Kedasyatan Sirsak*, Agro Media Putaka, Jakarta.
- At-tirmidzi, Muh. Bin Abu Isa. Al-jami' Ash-Shahib sunan turmudzi.
Jus 5. Beirut : Dar ihya' at-turast al-Arabi.
- Bahari Hamid, 2011, *Segudang Keampuhan Sirsak Untuk Kesehatan Dan Kecantikan*, Laksana Trans Media, Yogyakarta.
- Djide, M. N., Sartini dan Syahrudin, K., 2005. *Mikrobiologi Farmasi Terapan*, Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Djide, M. N., Sartini dan Syahrudin, K., 2008. *Dasar-dasar Mikrobiologi Farmasi*, Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Djide, M. N., Sartini dan Syahrudin, K., 2000. *Analisis Mikrobiologi Farmasi*, Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Garrity.G. M, Bell. J. A. and Lilburn. T.G. 2004. *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of Systematic Bacteriologi*. 2th Edition. United States of America: Springer New York Berlin Hendelberg.
- Ganiswara, Sulistia G. 1995. *Farmakologi dan terapi*. Edisi 4. Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Hariana arief, H, 2005, *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya seri 3*, Penerbit Penebar Swadaya
- Harborne,. 1987, *Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan (terbitan kedua)*, Institut Tekhnologi Bandung, Bandung
- Herliana Ersi dan Nila Rifai, 2011, *Khasiat Dan Manfaat Daun sirsak*, Mata Elang Medika, Jakarta.
- Hidayat Silvy. 2011, *Dasyatnya Khasiat Sirsak*, Chivita books, Yogyakarta.

- Jawetz, E., Melnick, J. L., and Adelberg, E. A., 2000, *Mikrobiologi Kedokteran*, Buku 1 & Buku 2, Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga, Penerbit Salemba Medika, Jakarta.
- Pelezar, Michael J, Chan, E. C. S. 2008. *Dasar-dasar Mikrobiologi*, Jilid 2 Terjemahan Ratna Sri Hadioetomo, dkk. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Putri Maharani, 2011, *Tanaman Obat Yang Harus Ada Di pekarangan Rumah Kita*, Sinar Ilmu, Yogyakarta.
- Sutrisno, 1993, *Pereaksi KLT*, fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Jakarta.
- Syahracham, Agus, *et al.* 1994. *Mikrobiologi Kedokteran*. Edisi Revisi. Jakarta: Binampa Aksara.
- Tobo, F., 2001, *Buku Pegangan Laboratorium Fitokimia 1*, Laboratorium Fitokimia, Jurusan Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Waluyo, I., 2004, *Mikrobiologi umum*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

GAMBAR



Gambar 1. Foto Hasil Pengujian Skrining Antimikroba Ekstrak Metanol Daun Sirsak (*Annona muricata* L.)

Keterangan :

A : *Staphylococcus epidermidis*

B : *Streptococcus mutans*

C : *Bacillus subtilis*


D : *Pseudomonas aeruginosa*

E : *Staphylococcus aureus*

F : *Salmonella typhosa*

G : *Escherichia coli*

H : *Vibrio sp*



**Gambar 2. Foto Profil Kromatogram ekstrak metanol
Daun Sirsak (*Annona muricata* L.)**


Keterangan :

A : Bercak yang nampak pada penampak bercak lampu UV 254nm

B : Bercak yang nampak pada penampak bercak lampu UV 366nm

C : Bercak yang nampak pada penampak bercak H_2SO_4 10%


Eluen = n-Heksan : Etilasetat (1 : 2)



Gambar 3. Foto Hasil Pengujian Secara KLT-Bioautografi Ekstrak Metanol Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) Terhadap Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

Keterangan :


- A : Pengujian terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*
- B : Bercak yang nampak pada penampak bercak lampu UV 366nm
- C : Bercak yang nampak pada penampak bercak lampu UV 254nm
- D : Bercak yang nampak pada penampak bercak H₂SO₄ 10%
- E : Bercak aktif



Gambar 4. Foto Hasil Pengujian Secara KLT-Bioautografi Ekstrak Metanol Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermidis*

Keterangan :


- A** : Pengujian terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*
- B** : Bercak yang nampak pada penampak bercak lampu UV 366nm
- C** : Bercak yang nampak pada penampak bercak lampu UV 254nm
- D** : Bercak yang nampak pada penampak bercak H_2SO_4 10%
- E** : Bercak aktif



Gambar 5. Foto Hasil Pengujian Secara KLT-Bioautografi Ekstrak Metanol Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) Terhadap Bakteri *Salmonella thyposa*

Keterangan :

- A** : Pengujian terhadap bakteri *Salmonella thyposa*
- B** : Bercak yang nampak pada penampak bercak lampu UV 366nm
- C** : Bercak yang nampak pada penampak bercak lampu UV 254nm
- D** : Bercak yang nampak pada penampak bercak H₂SO₄ 10%
- E** : Bercak aktif



Gambar 6. Foto Hasil Pengujian Identifikasi komponen kimia Ekstrak Metanol Daun Sirsak (*Annona muricata* L.)p

Keterangan :

A : Pereaksi AlCl_3 + UV 366 nm

E : UV 254 nm

B : Pereaksi FeCl_3

F : UV 366 nm

C : Pereaksi Dragendorff

G : H_2SO_4

D : Pereaksi LB + UV 366 nm



Gambar 7 Foto Tanaman Daun Sirsak (*Annonap muricata* L.)

BIOGRAFI PENULIS



Ismi Fadhilah atau biasa dikenal dengan panggilan nama **ismi** atau **mee** lahir di Sorong 2 maret 1990, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan **H. Sennang BA** dan **Hj. Budiati H. S. An.** Dia memperoleh pendidikan pertama sejak usia 4 tahun di TK Pembina Sorong, kemudian melanjutkan pendidikannya di SD Inpres 103 Sorong dan menyelesaikannya ditahun 2001. Pada usia 11 tahun perempuan kelahiran sorong – papua ini melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertamanya di MTs. Negeri Model Sorong dan menyelesaikannya di tahun 2004. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Maros – Sulawesi Selatan. Dan berakhir pada tahun 2007.

Setelah menyelesaikan sekolah menengah atasnya, di usia 17 tahun ia melanjutkan pendidikannya dibangku kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ilmu Kesehatan (2007). Dan kemudian Alhamdulillah ia lulus pada Jurusan Farmasi ini di tahun 2012.