

**GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG TANDA-TANDA
BAHAYA KEHAMILAN DI PUSKESMAS
PLUS BARA-BARAYA
TAHUN 2012**



Karya Tulis Ilmiah

(KTI)

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

OLEH

LUSIA WAHYU BERIBE

70400009017

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2012
Penyusun

LUSIA WAHYU BERIBE
70400009017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Lusya Wahyu Beribe
Nim : 70400009017
Judul : Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tanda-tanda Bahaya
Kehamilan di Puskesmas Plus Bara-baraya tahun 2012

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan pada Ujian Karya
Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar.

Makassar, Agustus 2012

Pembimbing
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

dr.Dewi Setiawati, S. Ked

NIP. 19810621 200604 2 005

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tanda-tanda Bahaya Kehamilan di Puskesmas Plus Bara-baraya tahun 2012**” yang disusun oleh **Lusia Wahyu Beribe, NIM: 70400009017**, mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, Agustus 2012

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Dr.dr.H.Rasjidin Abdullah, MPH., MH.Kes(.....)

Sekretaris : Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb (.....)

Pembimbing : dr.Dewi Setiawati, S.Ked (.....)

Penguji I : dr. Rini Fitriani, M.Kes (.....)

Penguji II : Dra. Sohrah, M.Ag (.....)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes
NIP.19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, dengan judul “Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tanda-tanda Bahaya Kehamilan di Puskesmas Plus Bara-baraya tahun 2012”

Penulis menyadari dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Untuk itu, melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, almarhum ayahanda Kardi Beribe dan ibunda tercinta Syafitri yang senantiasa mengiringi langkahku dengan doanya dan selalu rela berkorban lahir dan batin demi terwujudnya cita-cita dan harapanku serta kepada saudara-saudara dan seluruh keluarga yang setia memberikan semangat dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S, selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Bapak Dr. dr. Rasyidin Abdullah MPh., MH. Kes selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
4. Ibu Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M. Keb, selaku ketua jurusan kebidanan dan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md.Keb.
5. Ibu dr.Dewi Setiawati, S.ked, selaku pembimbing yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md. Keb.
6. Ibu dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku penguji I Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Dra. Sohrah, M.Ag selaku penguji II Karya Tulis Ilmiah ini yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para dosen Program Studi Kebidanan yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Program Studi Kebidanan.

9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
10. Kepada kepala Puskesmas plus Bara-Baraya beserta seluruh pegawai dan staf Rumah Sakit yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
11. Sahabat seperjuanganku Novalina, Nur Amalia, yusniar, dan seluruh mahasiswi kebidanan angkatan 2009 Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang tak bisa disebut satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya dalam rangka penyelesaian studi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang ada di dalamnya, olehnya itu penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak AMIN.

Makassar, Agustus 2012

Penulis

LUSIA WAHYU BERIBE

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
1. Tujuan Umum.....	6
2. Tujuan Khusus	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	8
1. Pengertian Kehamilan.....	8
2. Tanda Kehamilan.....	9
3. Perubahan fisiologi yang terjadi dalam kehamilan.....	12


4. Perubahan dan Adaptasi Psikologis Dalam Masa Kehamilan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tanda Bahaya Kehamilan.....	16
1. Pengertian Tanda Bahaya Kehamilan	16
2. Sepuluh Tanda Bahaya Kehamilan	16
3. Pencegahan Tanda Bahaya Kehamilan	28
C. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan	28
1. Pengertian Pengetahuan	28
2. Tingkat Pengetahuan	29
D. Tinjauan Islam Tentang Tanda Bahaya Kehamilan	31
E. Kerangka Konsep	36
1. Dasar Pemikiran Variabel	36
2. Skema Kerangka Konsep	37
3. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel	43
D. Teknik Pengambilan Sampel	44
E. Besar Sampel	44
F. Pengumpulan Data	45
G. Pengolahan Data	46
H. Analisis Data	46
I. Penyajian Data	46
J. Etika Penelitian	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Karakteristik Responden	49
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	50
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	52
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Perdarahan pervaginam	53
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Sakit kepala yang hebat	53
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Kejang pada masa kehamilan	54
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Gerakan janin berkurang	54
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Nyeri perut yang hebat	55
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Bengkak pada muka dan tangan	55
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Demam Pada masa kehamilan	56
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Muntah yang berlebihan	56
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Perubahan penglihatan	57

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang

Ketuban Pecah Dini

57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar persetujuan Menjadi Responden dan Kuesioner

Lampiran 2. Master tabel penelitian

Lampiran 3. Surat permohonan izin pengambilan data awal

Lampiran 4. Surat permohonan izin penelitian

Lampiran 5. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Puskesmas Plus

Bara-baraya tahun 2012

Lampiran 6. Biodata Penulis



ABSTRAK

**JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2012**

Lusia wahyu Beribe, 70400009017

Pembimbing : dr. Dewi Setiawati, S.Ked

“Gambaran Pengetahuan ibu hamil tentang Tanda-tanda Bahaya Kehamilan di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar tahun 2012”

Komplikasi kehamilan dan persalinan yang terjadi di berbagai negara berkembang menjadi penyebab utama kematian wanita pada usia reproduksi. Ini berarti Lebih dari satu wanita meninggal setiap menit dari penyebab komplikasi, atau ini berarti 585.000 wanita meninggal setiap tahun. Kurang dari satu persen kematian ini terjadi di negara maju, ini memperlihatkan bahwa wanita dapat menghindari kematian tersebut jika sumber daya dan jasa tersedia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tanda-tanda Bahaya Kehamilan di Puskesmas Plus bara-baraya Makassar Tahun 2012. Dilaksanakan sejak tanggal 17 Juli-31 Juli 2012. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, populasi sebanyak 89 dan diperoleh sampel sebanyak 73 responden yang dipilih secara *purposive sampling* menggunakan data primer.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 67,12% ibu hamil tahu tentang perdarahan pervaginam, 72,60% tahu tentang sakit kepala yang hebat, 60,27% tahu tentang kejang pada masa kehamilan, 56,16% tahu tentang gerakan janin berkurang, 61,64% tahu tentang nyeri perut yang hebat, 57,53% tahu tentang bengkak pada muka dan tangan, 56,16% tahu tentang demam pada masa kehamilan, 63,01% tahu tentang muntah yang berlebihan, 53,42% tahu tentang perubahan penglihatan dan 68,49% tahu tentang Ketuban Pecah Dini.

Disarankan kepada petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan Antenatal yang maksimal agar ibu hamil dapat menjalani kehamilannya tanpa komplikasi yang dapat membahayakan kehamilannya.

Daftar Pustaka : Literatur 24 (2000-2011)

Kata Kunci : Pengetahuan, Kehamilan, Tanda Bahaya Kehamilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan dan melahirkan menimbulkan resiko kesehatan yang besar, termasuk bagi perempuan yang tidak mempunyai masalah kesehatan sebelumnya. Kira-kira 40 % ibu hamil mengalami masalah kesehatan berkaitan dengan kehamilan dan 15 % dari semua ibu hamil menderita komplikasi jangka panjang yang mengancam jiwa bahkan sampai menimbulkan kematian.

Pengawasan sebelum lahir (antenatal) terbukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesehatan mental dan fisik, untuk menghadapi persalinan. Dengan pengawasan hamil dapat diketahui berbagai komplikasi ibu yang dapat mempengaruhi kehamilan atau komplikasi hamil sehingga dapat segera diatasi. Yang tidak mungkin dapat diatasi segera dirujuk ke tempat yang lebih lengkap peralatannya sehingga mendapat perawatan yang optimal.

Pengawasan pada saat hamil dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) maupun Angka Kematian Bayi (AKB). Sebagai cermin kemampuan setiap bangsa untuk memberikan pelayanan dan pengayoman medis terhadap masyarakatnya (Siti Bandiyah, 2009).

AKI sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan yang paling utama. Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin adalah masalah besar di Negara berkembang. Di Negara miskin sekitar 25 % - 50 %

kematian WUS (Wanita Usia Subur) disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan. Kematian saat melahirkan biasanya menjadi faktor utama mortalitas wanita muda pada masa puncak produktifitasnya (Saifudin, 2002)

Kondisi diatas dipengaruhi pula oleh kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai komplikasi / penyulit pada masa kehamilan. WHO memperkirakan lebih dari 585.000 ibu pertahunnya meninggal saat hamil atau bersalin. Di Asia selatan, wanita berkemungkinan 1:18 meninggal akibat kehamilan atau persalinan selama kehidupannya. Lebih dari 50 % kematian di Negara berkembang sebenarnya dapat dicegah dengan teknologi yang ada serta biaya relatif rendah (Saifudin et al ,2002 ; 3).

Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT)³ di Indonesia menjumpai kematian ibu 450 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2010 Angka Kematian Ibu (AKI) sekitar 421 per 100.000 kelahiran hidup. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Departemen Kesehatan (SDKI Depkes)⁴ menetapkan AKI di Indonesia secara nasional sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup dan merupakan angka tertinggi dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sumber data yang lain pada tahun 2011 dari hasil penelitian di rumah sakit umum di Indonesia terdapat angka kematian ibu sebesar 550 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami penurunan sebesar 373 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini tiga sampai enam kali lebih besar dari negara di wilayah ASEAN dan lebih besar 50 kali dibanding dengan negara maju.

Komplikasi kehamilan dan persalinan yang terjadi di berbagai negara berkembang menjadi penyebab utama kematian wanita pada usia reproduksi. Ini berarti Lebih dari satu wanita meninggal setiap menit dari penyebab komplikasi, atau ini berarti 585.000 wanita meninggal setiap tahun. Kurang dari satu persen kematian ini terjadi di negara maju, ini memperlihatkan bahwa wanita dapat menghindari kematian tersebut jika sumber daya dan jasa tersedia.

Jumlah kematian ibu di Kota Makassar selama tahun 2008 adalah 65 orang dari 43.434 lahir hidup. Kematian ibu akibat perdarahan 16 orang, eklamsi 13 orang, infeksi 3 orang, lain- lain 33 orang (Dinkes, 2008).

Pemerintah Indonesia sangat serius dalam menekan AKI dan AKB yang mempunyai target tahun 2010 menurunkan AKI menjadi 150/100.000 kelahiran hidup dan AKB menjadi 15/ 1000 kelahiran hidup dengan menggunakan program MPS (*Making Pregnancy Safe*) melalui tiga pesan kunci yaitu setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat dan setiap Wanita Usia Subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran (Dirjen Binmas Depkes 2001).

Dalam pandangan Islam, kehamilan merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT, sehingga ibu hamil diwajibkan untuk menjaga kehamilannya agar janin yang ada dalam kandungannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Abdurrahman, 2005).

Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa kehamilan mengalami perkembangan dan perubahan mulai dari yang masih ringan dan terus bertambah berat. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al a'raf (7):189. Ayat ini menjelaskan bahwa tanda-tanda kehamilan adalah adanya perubahan beban yang dialami oleh seorang perempuan karena adanya gangguan janin di dalam perutnya. Kandungan yang setiap saat bertambah besar yang menyebabkan bertambahnya beban yang ditanggung oleh ibu hamil di mana ayat ini juga menandung nilai tanggung jawab yang berat bagi ibu yang hamil dan nilai kepasrahan terhadap takdir Allah Swt. Sehingga menyadarkan untuk senantiasa berdoa kepadaNya agar kelak melahirkan anak yang sempurna (Quraish Shihab,2002).

Pengetahuan tentang tanda bahaya pada kehamilan sangat membantu menurunkan AKI, karena dengan mengetahui tanda bahaya pada kehamilan seorang ibu hamil akan lebih cepat mencari tempat pelayanan kesehatan sehingga risiko pada kehamilan akan dapat terdeteksi dan tertangani lebih dini. Di Puskesmas Plus Bara-baraya sendiri pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya pada kehamilan masih kurang, sehingga risiko pada kehamilan tidak dapat terdeteksi dan tertangani lebih dini.

Berdasarkan studi pendahuluan, walaupun ibu hamil sudah mendapatkan buku KIA yang salah satu halamannya berisi pengetahuan tentang tanda bahaya pada kehamilan, namun pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya pada kehamilan masih kurang karena faktor pendidikan juga dianggap berpengaruh pada kemampuan ibu hamil untuk membaca dan

memahami isi dari buku KIA. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan di Puskesmas plus bara-baraya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas , maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang Perdarahan pervaginam?
2. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang Sakit kepala yang hebat?
3. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang kejang pada masa kehamilan?
4. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang gerakan janin berkurang?
5. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang nyeri perut yang hebat?
6. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang bengkak pada muka dan tangan?
7. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang demam pada masa kehamilan?
8. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang muntah yang berlebihan?

9. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perubahan penglihatan?
10. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang Ketuban Pecah Dini?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang-tanda bahaya kehamilan.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perdarahan pervaginam.
- b. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang sakit kepala yang hebat.
- c. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang kejang pada masa kehamilan.
- d. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang gerakan janin berkurang.
- e. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang nyeri perut yang hebat.
- f. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang bengkak pada muka dan tangan.
- g. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang demam pada masa kehamilan.

- h. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang muntah yang berlebihan.
- i. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perubahan penglihatan.
- j. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang ketuban Pecah Dini.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi tempat meneliti

Sebagai bahan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas Plus Bara-baraya untuk membantu program KIA dalam menurunkan AKI dengan mengenalkan tanda bahaya pada kehamilan sehingga resiko pada kehamilan dapat terdeteksi dan tertangani sedini mungkin.

2. Bagi Institusi pendidikan

Sebagai bahan dokumentasi dan tambahan pustaka bagi Institusi pendidikan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Bagi peneliti

Merupakan pengalaman berharga bagi peneliti dalam perluasan wawasan pengetahuan serta pengembangan diri melalui penelitian pemula.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

- a. Kehamilan adalah masa pertumbuhan dan perkembangan janin mulai dari konsepsi sampai permulaan persalinan (Mochtar, 2002).
- b. Masa kehamilan mulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, dimana lamanya lahir normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir (saifuddin, 2002).
- c. Proses pada kehamilan merupakan suatu mata rantai yang berkesinambungan yang dimulai dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, terjadi konsepsi (Sastrawinata S, 2005).
- d. Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari (40 minggu), dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Kehamilan 40 minggu ini disebut kehamilan matur (cukup bulan). Bila kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur. Kehamilan antara 28 dan 36 minggu disebut kehamilan prematur.

Ditinjau dari tuanya kehamilan di bagi dalam 3 bagian :

- 1) Kehamilan triwulan pertama (antara 0 sampai 12 minggu).
- 2) Kehamilan triwulan kedua (antara 12 sampai 28 minggu).
- 3) Kehamilan triwulan terakhir (antara 28 sampai 40 minggu)

(Wiknjosastro 2007).

Berdasarkan pengertian diatas maka ditarik kesimpulan, kehamilan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan mulai dari konsepsi sampai lahirnya janin.

2. Tanda kehamilan

a. Tanda Dugaan Hamil

- 1) *Amenorea* (tidak dapat haid). Gejala ini sangat penting karena umumnya wanita hamil tidak dapat haid lagi. Penting diketahui tanggal hari pertama haid terakhir, supaya dapat ditentukan tuanya kehamilan dan bila persalinan diperkirakan akan terjadi.
- 2) *Nausea* (*enek*) dan emesis (muntah). Terjadi umumnya pada bulan-bulan pertama kehamilan, disertai kadang-kadang oleh emesis. Sering terjadi pada pagi hari, tetapi tidak selalu. Keadaan ini lazim disebut *morning sickness*. Dalam batas-batas tertentu keadaan ini masih fisiologik. Bila terlampau sering, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan disebut hiperemesis gravidarum.
- 3) *Mengidam* (ingin makanan atau minuman tertentu). Mengidam sering terjadi pada bulan-bulan pertama akan tetapi menghilang dengan makin tuanya kehamilan.
- 4) Pingsan. Sering dijumpai bila berada pada tempat-tempat ramai. Dianjurkan untuk tidak pergi ke tempat-tempat ramai pada bulan-bulan pertama kehamilan. Hilang sesudah kehamilan 16 minggu.

- 5) Mamma menjadi tegang dan membesar. Keadaan ini disebabkan oleh pengaruh estrogen dan progesteron yang merangsang duktuli dan alveoli di mamma.
- 6) *Anoreksia* (tidak ada nafsu makan). Pada bulan-bulan pertama terjadi anoreksia, tetapi setelah itu nafsu makan timbul lagi. Hendaknya dijaga jangan sampai salah pengertian makan untuk dua orang, sehingga kenaikan berat badan tidak sesuai dengan tuanya kehamilan.
- 7) Sering kencing terjadi karena kandung kencing pada bulan-bulan pertama kehamilan tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Pada triwulan kedua umumnya keluhan ini hilang oleh karena uterus yang membesar keluar dari rongga panggul. Pada akhir triwulan gejala bisa timbul karena janin mulai masuk ke ruang panggul dan menekan kembali kandung kencing.
- 8) *Obstipasi* terjadi karena tonus otot menurun yang disebabkan oleh pengaruh hormone steroid.
- 9) Pigmentasi kulit terjadi pada kehamilan 12 minggu ke atas. Pada pipi, hidung dan kadang-kadang tampak deposit pigmen yang berlebihan, dikenal sebagai kloasma gravidarum. Areolae mammae juga menjadi lebih hitam karena didapatkan deposit pigmen yang berlebih. Daerah leher lebih hitam. Demikian pula linea alba di garis tengah abdomen menjadi lebih hitam (*linea gresia*).

Pigmentasi ini terjadi karena pengaruh dari hormon kortiko-steroid plasenta yang merangsang kulit.

10) *Epulis* adalah suatu hipertrofi papilla gingivae. Sering terjadi pada triwulan pertama.

11) *Varises*. Sering dijumpai pada triwulan terakhir. Di dapat pada daerah genetalia eksterna, kaki dan betis. Pada multigravida kadang-kadang varises ditemukan pada kehamilan yang terdahulu, timbul kembali pada triwulan pertama. Kadang-kadang timbulnya varises merupakan gejala pertama kehamilan (Wiknjosastro, 2007).

b. Tanda Kemungkinan Hamil

Pada pemeriksaan kehamilan dapat diduga hamil bila dijumpai pembesaran rahim dan perut, pemeriksaan memberi petunjuk adanya kehamilan ,terdapat kontraksi rahim saat diraba, ada tanda hegar, *Chadwick*, *piscaseck*, *ballottement*, dan reaksi pemeriksaan kehamilan positif (Liz, 2007).

c. Tanda Pasti Hamil

Kehamilan pasti sudah dapat ditetapkan pada umur yang relative muda. Oleh karena itu kehamilan pasti dapat ditegakkan melalui pemeriksaan USG dapat diketahui terdapat "*fetal plate*", kantung gestasi, rahim membesar.

Dengan metode konvensional kepastian hamil diketahui teraba bagian janin, terdengar denyut jantung janin dan teraba gerakan janin (Manuaba. 2009).

3. Perubahan Fisiologi yang Terjadi Dalam Kehamilan

a. Uterus

Berat uterus normal lebih kurang 30 gram, pada akhir kehamilan (40 minggu) berat uterus ini menjadi 1000 gram, dengan panjang lebih kurang 2,5 cm. pada bulan – bulan pertama kehamilan bentuk uterus seperti buah advokat, agak gepeng.

b. Vagina

Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah, agak kebiru – biruan (livide). Tanda ini disebut tanda *Chadwick*.

c. Ovarium

Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum graviditas berdiameter kira – kira 3 cm. kemudian, ia mengecil setelah plasenta terbentuk. Korpus luteum ini mengeluarkan hormone estrogen dan progesterone. Lambat laun fungsi ini diambil alih oleh plasenta.

d. Mammae

Mammae akan membesar dan tegang akibat hormone sommatomatotropin, estrogen dan progesterone, akan tetapi belum mengeluarkan air susu.

Estrogen menimbulkan hipertrofi saluran, sedangkan progesterone menambah sel – sel asinus pada mammae.

Sommatomatotropin mempengaruhi pertumbuhan sel – sel asinus pula dan menimbulkan perubahan dalam sel – sel, sehingga terjadi

pembuatan kasein, laktalbumin, dan laktoglobulin. Dengan demikian mammae dipersiapkan untuk laktasi.

e. Sirkulasi darah

Sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi oleh adanya sirkulasi ke plasenta, uterus yang membesar dengan pembuluh – pembuluh darah yang membesar pula, mammae dan alat – alat yang memang berfungsi berlebihan dalam kehamilan, volume darah ibu dalam kehamilan bertambah secara fisiologik dengan adanya pencairan darah yang disebut hidremia.

f. Sistem respirasi

Wanita hamil dalam kelanjutan kehamilannya tidak jarang mengeluh tentang rasa sesak dan pendek napas. Hal ini ditemukan pada kehamilan 32 minggu keatas oleh karena usus – usus tertekan oleh uterus yang membesar, sehingga diafragma kurang leluasa bergerak.

g. Sistem pencernaan

Pada bulan – bulan pertama kehamilan terdapat perasaan enek (*nausea*). Mungkin ini akibat hormone estrogen yang meningkat. Tonus otot – otot traktus digestivus menurun, sehingga motilitas seluruh traktus digestivus juga berkurang.

h. Sistem perkemihan

Pada bulan – bulan pertama kehamilan kandung kencing tertekan oleh uterus yang mulai membesar, sehingga timbul sering

kencing. Keadaan ini hilang dengan makin tuanya kehamilan, bila kepala janin mulai turun ke bawah pintu atas panggul, keluhan sering kencing akan timbul lagi karena kandung kencing mulai tertekan lagi.

i. Kulit

Pada kulit terdapat deposit pigmen dan hiperpigmentasi alat – alat tertentu. Pigmentasi ini disebabkan oleh pengaruh *melanophore stimulating hormone (MSH)* yang meningkat. MSH ini adalah salah satu hormon yang juga dikeluarkan oleh lobus anterior hipifisis. Kadang – kadang terdapat deposit pigmen pada dahi, pipi dan hidung, dikenal dengan kloasma gravidarum.

j. Metabolisme dalam kehamilan

Pada wanita hamil *Basal Metabolic Rate (BMR)* meninggi, system endokrin juga meninggi, dan tampak lebih jelas kelenjar gondoknya (glandula tiroidea). BMR meningkat hingga 15-20% yang umumnya ditemukan pada triwulan terakhir.

Kalori yang dibutuhkan untuk itu diperoleh terutama dari pembakaran hidrat arang, khususnya sesudah kehamilan 20 minggu ke atas.

Akan tetapi apabila dibutuhkan, dipakailah lemak ibu untuk mendapatkan tambahan kalori dalam pekerjaan sehari – hari. Dalam keadaan biasa wanita hamil cukup hemat dalam hal pemakaian tenaganya (Wiknjosastro, 2007).

4. Perubahan dan adaptasi psikologis dalam masa kehamilan

a. Pada kehamilan trimester I

Dengan adanya peningkatan estrogen dan progesterone dalam tubuh, akan menimbulkan mual, muntah pada pagi hari, lelah, lemah dan pembesaran payudara.

Ibu merasa tidak sehat dan sering membenci kehamilannya. Banyak ibu yang merasa kecewa, menolak, cemas dan sedih. Sering kali, biasanya pada awal kehamilannya, ibu berharap untuk tidak hamil.

Pada trimester pertama, ibu akan selalu mencari tanda untuk menyakinkan bahwa dirinya benar-benar hamil. Ada ibu yang cenderung merahasiakan, ada juga yang sengaja untuk memamerkan.

Hasrat untuk melakukan hubungan seks berbeda, beberapa wanita mengalami gairah seks yang lebih tinggi, kebanyakan mengalami penurunan libido. Keadaan ini membutuhkan komunikasi secara terbuka dan jujur dengan suami.

b. Pada kehamilan trimester II

Ibu akan merasa lebih sehat karena sudah beradaptasi dan terbiasa dengan peningkatan hormone. Perut mulai besar, ibu sudah menerima kehamilannya, sudah dapat merasakan pergerakan janinnya, libido kembali meningkat.

c. Pada kehamilan trimester III

Sering disebut periode menunggu dan waspada sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, kadang-kadang

ibu hamil merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Hal ini menyebabkan ibu meningkatkan kewaspadaannya. Ibu mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya yang akan timbul pada waktu melahirkan. Trimester III adalah saat persiapan aktif untuk kelahiran bayi menjadi orang tua (Damopoli, 2006).

B. Tinjauan Umum tentang Tanda Bahaya Kehamilan

1. Pengertian tanda bahaya kehamilan
 - a. Tanda Bahaya kehamilan adalah suatu gejala yang muncul dalam kehamilan sehingga terjadi komplikasi (WHO, 2001).
 - b. Bahaya kehamilan merupakan gejala yang muncul dalam kehamilan pada trimester I sampai trimester III (Yuli P,2005).

Berdasarkan pengertian diatas tentang tanda bahaya kehamilan yaitu gangguan yang terjadi dalam kehamilan yang bisa mengakibatkan komplikasi.

2. Sepuluh tanda bahaya kehamilan
 - a. Perdarahan Pervaginam

Pada masa awal kehamilan, ibu mungkin akan mengalami perdarahan yang sedikit atau spotting disekitar waktu pertama haidnya. Perdarahan ini adalah perdarahan implantasi, dan ini normal terjadi. Perdarahan yang terjadi pada umur kehamilan yang lebih tua terutama setelah melewati trimester III disebut perdarahan antepartum.

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sebagai batasan ialah kehamilan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Adapun macam-macam abortus, yaitu :

1). Abortus iminens

Merupakan abortus tingkat permulaan ditandai perdarahan pervaginam, ostium uteri tertutup dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan. Diagnosis abortus imines biasanya diawali dengan keluhan perdarahan pervaginam pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu. Penderita mengeluh mulas sedikit atau tidak ada keluhan sama sekali kecuali perdarahan pervaginam. Pengelelolaan penderita ini sangat bergantung pada *informed consent* yang diberikan. Penderita diminta untuk melakukan tirah baring sampai perdarahan berhenti. Biasa diberi spasmolitik agar uterus tidak berkontraksi atau diberi tambahan hormone progesterone atau derivatnya untuk mencegah terjadinya abortus.

2). Abortus insipiens

Merupakan abortus yang sedang mengancam yang ditandai dengan serviks telah maendatar dan ostium telah membuka, akan tetapi hasil konsepsi masih dalam kavum uteri dan dalam proses pengeluaran. Penderita akan merasa mulas karena kontraksi yang sering dan kuat, perdarahannya bertambah sesuai

dengan pembukaan serviks uterus dan umur kehamilan. Pengelolaan penderita ini harus memperhatikan keadaan umum dan perubahan keadaan hemodinamik yang terjadi segera lakukan tindakan evakuasi/pengeluaran hasil konsepsi disusul dengan kuretase bila perdarahan banyak.

3). Abortus kompletus

Seluruh hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri pada kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Semua hasil konsepsi telah dikeluarkan, ostium uteri telah menutup, uterus sudah mengecil sehingga perdarahan sedikit. Pengelolaan penderita tidak memerlukan tindakan khusus ataupun pengobatan. Biasanya hanya diberi roboransia atau hematenik bila keadaan pasien memerlukan. Uterotonika tidak perlu diberikan.

4). Abortus inkompletus

Sebagian hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri dan masih ada yang tertinggal. Batasan ini juga masih terpancang pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Perdarahan biasanya masih terjadi jumlahnya pun banyak atau sedikit bergantung pada jaringan yang tersisa, yang menyebabkan sebagian *placental site* masih terbuka sehingga perdarahan berjalan terus. Bila terjadi perdarahan yang hebat, dianjurkan segera melakukan pengeluaran sisa hasil

konsepsi secara manual agar jaringan yang mengganjal terjadinya kontraksi uterus segera dikeluarkan, kontraksi uterus dapat berlangsung baik dan perdarahan bias berhenti. Selanjutnya dilakukan kuretase. Tindakan kuretase harus dilakukan secara hati-hati sesuai dengan keadaan umum ibu dan besarnya uterus. Tindakan yang dianjurkan ialah dengan karet vakum menggunakan kanula dari palstik. Pascatindakan perlu diberikan uterotonika parenteral ataupun per oral dan antibiotika.

5). Missed abortion

Abortus yang ditandai dengan embrio atau fetus telah meninggal dalam kandungan sebelum kehamilan 20 minggu dan hasil konsepsi seluruhnya masih tertahan dalam kandungan. Pengelolaan *missed abortion* perlu diutarakan kepada pasien dan keluarganya secara baik karena resiko tindakan operasi dan kuretase ini dapat menimbulkan komplikasi perdarahan atau tidak bersihnya evakuasi/kuretase dalam sekali tindakan. Salah satu cara yaitu dengan pemberian *misoprostol* secara sublingal sebanyak 400 mg yang dapat diulangi 2 kali dengan jarak 6 jam. (Sarwono, 2008)

6). Abortus habitualis

Seorang wanita menderita abortus habitualis, apabila ia mengalami abortus berturut- turut 3 kali atau lebih. Wanita yang

mengalami peristiwa tersebut, umumnya tidak mendapat kesulitan untuk menjadi hamil, akan tetapi kehamilannya tidak dapat berlangsung terus dan terhenti sebelum waktunya., biasanya pada trimester pertama tetapi kadang-kadang pada kehamilan yang lebih tua.

Sebab-sebab abortus habitualis, yaitu :

- (a) Kelainan pada zygote
- (b) Gangguan fungsi endometrium, yang menyebabkan gangguan implantasi ovum yang dibuahi dan/atau gangguan dalam pertumbuhan mudigah
- (c) Kelainan anatomic pada uterus yang dapat menghalangi berkembangnya janin di dalamnya dengan sempurna.

Pada hamil muda, sebaiknya jangan bersenggama dulu. Makanannya harus adekuat mengenai protein, hidrat arang, mineral, dan vitamin. khususnya dalam masa organogenesis pemberian obat—obat harus dibatasi dan obat-obat yang diketahui dapat mempunyai pengaruh jelek terhadap janin dilarang. khususnya di mana factor emosional memegang peranan penting, pengaruh dokter sangat besar untuk mengatasi ketakutan dan keresahan. Terapi hormonal umumnya tidak perlu, kecuali jika ada gangguan fungsi tiroid, atau gangguan fase luteal. (Sarwono, 2008).

Pada waktu yang lain dalam kehamilan, perdarahan ringan mungkin pertanda dari serviks yang rapuh atau erosi. Perdarahan semacam ini mungkin normal atau mungkin suatu tanda adanya infeksi. Pada kehamilan lanjut, perdarahan yang tidak normal adalah merah, banyak, kadang-kadang, tetapi tidak selalu disertai dengan nyeri. Perdarahan semacam ini biasa berarti plasenta previa.

Penanganan:

Penanganan perdarahan pervaginam pada hamil muda yang lebih banyak dari perdarahan biasanya terjadi pada permulaan kehamilan adalah segera bawa ke Rumah Sakit terdekat, dan jangan sekali-kali melakukan pemeriksaan dalam saat terjadi perdarahan (Sarwono, 2002).

b. Sakit kepala yang hebat

Sakit kepala biasa terjadi selama kehamilan dan seringkali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala hebat yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Kadang-kadang dengan sakit kepala yang hebat tersebut, ibu mungkin menemukan bahwa penglihatannya menjadi kabur atau berbayang. Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala pre-eklampsia.

Penanganan:

Sakit kepala yang hebat pada ibu hamil biasanya dicurigai gejala dari preeklampsia, penanganannya dengan istirahat yang cukup apabila tidak terjadi perubahan dilakukan pengobatan secara sistematis karena etiologi preeklampsia, dan faktor apa dalam kehamilan yang menyebabkannya (Widyastuti, 2010).

c. Kejang

Pada umumnya kejang didahului oleh makin memburuknya keadaan dan terjadinya gejala-gejala sakit kepala, mual, nyeri ulu hati sehingga muntah. Bila semakin berat, penglihatan semakin kabur, kesadaran menurun kemudian kejang.

Kejang dalam kehamilan dapat merupakan gejala dari eklampsia (saifuddin, 2002).

Kemungkinan penyebab terjadinya kejang pada ibu hamil adalah eklampsia. Gejala terjadinya eklampsia sama dengan gejala pada saat ibu mengalami kejang.

Penanganan:

Penanganan bagi ibu hamil yang kejang dengan melakukan perawatan yang intensive, segera bawa ke rumah sakit untuk perawatan yang lebih baik (Sarwono, 2002).

d. Gerakan janin berkurang

Ibu mulai merasakan gerakan bayi selama bulan ke-5 atau ke-6. Beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih awal.

Jika bayi tidur gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam 1 jam jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik.

Kurangnya gerakan janin biasanya pengaruh dari kondisi ibu, nutrisi, dan tidak pernah terjadi kecelakaan yang dapat mengakibatkan benturan . Atau pengaruh dari janin sendiri.

Penanganan:

Istirahat yang cukup, perbaiki nutrisi dan melakukan pemeriksaan yang rutin (Sastrawinata S, 2005).

e. Nyeri perut yang hebat

Nyeri abdomen yang tidak berhubungan dengan persalinan normal adalah tidak normal. Nyeri abdomen yang mungkin menunjukkan masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah hebat, menetap dan tidak hilang setelah istirahat. Hal ini bisa berarti appendiksitis, kehamilan ektopik, aborsi, penyakit kantong empedu, iritasi uterus, infeksi saluran kemih atau infeksi lainnya.

Penanganan:

Istirahat yang cukup apabila tidak terjadi perubahan, segera ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, karena kemungkinan terjadi kehamilan ektopik, aborsi sangat besar (Wiknjosastro, 2007).

f. Bengkak pada muka dan tangan

Hampir separuh dari ibu akan mengalami bengkak yang normal pada kehamilan utamanya pada kaki yang biasanya muncul pada sore hari dan hilang setelah beristirahat dengan kaki ditinggikan. Bengkak dapat menyebabkan masalah yang serius jika muncul pada muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat

Penyebab bengkak pada muka dan tangan biasanya terjadi anemia, gangguan fungsi ginjal, gagal jantung atau paling sering adalah eklampsia.

Penanganan:

Gejala diatas sangat sering di hubungkan dengan eklampsia, apabila terjadi segera lakukan pemeriksaan laboratorium dan pemberian obat (Widyastuti, 2010).

g. Demam

Ibu menderita demam dengan suhu > 38 c dalam kehamilan merupakan suatu masalah. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Penanganan demam antara lain dengan istirahat baring, minum banyak, dan mengompres untuk menurunkan suhu

Demam dapat disebabkan oleh infeksi dalam kehamilan yaitu masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh wanita hamil yang kemudian menyebabkan timbulnya tanda atau gejala-gejala penyakit. Pada infeksi berat dapat terjadi demam dan

gangguan fungsi organ vital. Infeksi dapat terjadi selama kehamilan, persalinan dan masa nifas (Saifuddin,2002).

Penanganan:

Ibu yang menderita demam dapat dicurigai terjadinya infeksi, anjurkan istirahat yang cukup dan pemberian obat.

h. Muntah yang terus menerus (*Hiperemesis gravidarum*)

Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berlebihan selama masa hamil. Muntah yang membahayakan ini dibedakan dari *morning sickness* normal yang umum dialami wanita hamil karena intensitasnya melebihi muntah normal dan berlangsung selama trimester pertama kehamilan. Sehubungan dengan adanya ketonemia, penurunan berat badan dan dehidrasi, hiperemesis gravidarum dapat terjadi disetiap trimester (Varney, 2007).

Perasaan mual ini disebabkan oleh karena meningkatnya kadar hormon estrogen dan hCG (*human chorionic gonadotrophin*) dalam serum. Pengaruh fisiologi kehamilan hormon ini belum jelas, mungkin karena sistem saraf pusat atau pengosongan lambung yang berkurang. Pada umumnya wanita dapat menyesuaikan dengan keadaan ini, meskipun demikian gejala mual dan muntah dapat berlangsung sampai 4 bulan. Pekerjaan sehari-hari menjadi terganggu dan keadaan umum menjadi buruk. Keadaan inilah yang disebut hiperemesis gravidarum, keluhan

gejala dan perubahan fisiologis menentukan berat ringannya penyakit (Prawirohardjo, 2002).

Penanganan:

Pencegahan terhadap hiperemesis gravidarum perlu dilaksanakan dengan penerapan tentang kehamilan misalnya:

1. Makan sedikit tapi sering.
2. Hindari makanan yang sulit dicerna dan berlemak.
3. Jaga masukan cairan, karena cairan lebih mudah ditolelir daripada makanan padat.
4. Selingi makanan berkuah dengan makanan kering. Makan hanya makanan kering pada satu waktu makan, kemudian makanan berkuah pada waktu berikutnya.
5. Jahe merupakan obat alami untuk mual. Cincang dan makan bersama sayuran serta makanan lain.
6. Isap sepotong jeruk yang segar ketika merasa mual.
7. Hindari hal-hal yang memicu mual, seperti bau, gerakan atau bunyi.
8. Istirahat cukup.
9. Hindari hal-hal yang membuat Anda berkeringat atau kepanasan, yang dapat memicu rasa mual (Muchtar R, 2002).

Tapi apabila muntah terus terjadi, lakukan pemberian obat seperti pemberian antihistamin, vitamin dan segera lakukan perawatan medis.

i. Perubahan penglihatan

Karena pengaruh hormonal, ketajaman penglihatan ibu dapat berubah selama kehamilan. Perubahan ringan adalah normal. Masalah visual yang mengindikasikan keadaan yang mengancam jiwa adalah perubahan mendadak, misalnya pandangan kabur atau terbayang. Perubahan penglihatan ini mungkin disertai dengan sakit kepala yang hebat dan mungkin merupakan suatu tanda preeklampsia.

Penanganan:

Perubahan penglihatan pada ibu hamil biasanya dicurigai gejala dari preeklampsia, penanganannya dengan istirahat yang cukup apabila tidak terjadi perubahan dilakukan pengobatan secara sistematis karena etiologi preeklampsia dan faktor apa yang ada dalam kehamilan yang menyebabkannya (Sarwono, 2002).

j. Ketuban Pecah Dini

Harus dibedakan antara urine dengan air ketuban. Jika keluaranya cairan ibu tidak terasa, berbau amis dan warna putih keruh, berarti yang keluar adalah air ketuban. Jika kehamilan belum cukup bulan, hati – hati akan adanya persalinan preterm dan komplikasi infeksi intrapartum.

Penanganan:

Bila KPD > 6 jam, diberikan antibiotika (golongan penisilin seperti ampisilin atau amoksilin). Pada usia kehamilan <32-34

minggu, pasien dirawat selama air ketuban masih keluar atau sampai air ketuban tidak keluar lagi. Pada usia kehamilan 32-34 minggu dimana air ketuban masih tetap keluar maka dapat dipertimbangkan untuk mengakhiri kehamilan pada usia 35 minggu (sangat tergantung dari kemampuan melakukan perawatan terhadap bayi premature). Sedangkan pada usia kehamilan >36 minggu dilakukan induksi persalinan (Chrisdiono, 2004).

3. Pencegahan Tanda Bahaya kehamilan
 - a. Melakukan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan
 - b. Istirahat yang cukup
 - c. Menonsumsi makanan yang sehat utamanya makanan yang tinggi protein dan mengurangi konsumsi makanan yang dapat menimbulkan preeklampsia atau eklampsia.
 - d. Meningkatkan balai kesehatan dan mengusahakan agar semua ibu hamil memeriksakan kehamilannya.
 - e. Mencari pada tiap pemeriksaan kemungkinan tanda-tanda preeklampsia dan eklampsia serta melakukan pengobatan apabila ditemukan (Suririnah, 2011).

C. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek tertentu melalui indera yang dimilikinya. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui

indera pendengaran (telinga) dan indra pengelihatan (mata) (Notoatmodjo, 2005) .

2. Tingkat pengetahuan

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yaitu :

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Hal ini dapat digambarkan apabila seseorang hanya mampu menjelaskan secara garis besar apa yang telah dipelajarinya.

b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. Seseorang dikatakan faham jika seseorang berada pada tingkat pengetahuan dasar dan dapat menerangkan kembali secara mendasar ilmu pengetahuan yang dipelajarinya.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi

rill (sebenarnya). Pada tingkatan ini seseorang telah mampu untuk menggunakan apa yang telah dipelajarinya dari suatu situasi untuk diterapkan pada situasi yang lain.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen. Tetapi masih didalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Pada tingkatan ini, kemampuan seseorang lebih meningkat sehingga ia dapat menerangkan bagian-bagian yang menyusun suatu bentuk pengetahuan tertentu dan menganalisa hubungan suatu dengan lain.

e. Sintetis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Sintesis dapat dinilai jika seseorang disamping mempunyai kemampuan untuk menganalisa, ia pun mampu menyusun kembali kebentuk semula atau kebentuk lain.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Pada tingkatan ini seseorang telah mampu mengetahui secara

menyeluruh dari semua bahan yang dipelajarinya (Notoadmodjo, 2005).

D. Tinjauan Islam tentang Tanda Bahaya Kehamilan

Tanggung jawab yang diemban oleh ibu hamil untuk menjaga dan merawat kandungannya memang cukup berat karena dibutuhkan kesabaran untuk menunggu selama sembilan bulan. Perawatan kandungan cukup berpengaruh terhadap perkembangan janin, seorang ibu hamil tentunya harus menghindari beberapa hal diantaranya makanan dan minuman serta hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan janinnya. Selain perlunya perawatan dan penjagaan secara fisik, seorang ibu hamil juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kestabilan mental ibu hamil, karena ibu hamil yang mengalami stres dapat berpengaruh terhadap perkembangan janin yang dikandungnya.

Adanya janin dalam rahim seorang ibu, turut mempengaruhi kondisi fisik sang ibu, seorang ibu yang sedang hamil mengalami banyak perubahan baik perubahan fisik maupun psikologi. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu yang sedang hamil.

Salah satunya yaitu keadaan lemah, merujuk dari firman Allah SWT dalam QS. Lukman / 31: 14, yaitu :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Ayat ini menegaskan betapa besar jasa ibu terhadap anak, yaitu mulai dari beban mengandung dalam keadaan lemah dan bahkan beban tersebut senantiasa bertambah dari saat ke saat lalu dia melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyukainya setiap saat (Damopoli, dkk, 2006).

Ayat diatas dinilai oleh banyak ulama bukan bagian dari pengajaran Lukman kepada anaknya. Ia disisipkan Al-Quran untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua sehingga menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah SWT. Memang, Al-Qur'an seringkali menggandengkan perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua.

Tetapi, kendati nasihat ini bukan nasihat lukman, itu tidak berarti bahwa beliau tidak menasihati anaknya dengan nasihat serupa. Al-Biqa'i menilainya sebagai lanjutan dari nasihat lukman. Ayat ini Menyatakan hal itu kepada anaknya sebagai nasihat kepadanya, padahal kami telah mewasiatkan anaknya dengan wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya menyangkut hak kami.

Ayat diatas menyatakan, *Dan Kami Wasiatkan*, yakni berpesan dengan amat kukuh, kepada semua manusia menyangkut kedua orang ibu bapaknya; pesan kami disebabkan karena *ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan diatas kelemahan*, yakni kelemahan berganda dan dari saat kesaat bertambah-tambah. Keluhan yang bertambah-tambah ini bukan hanya karena beban kehamilan, tetapi juga karena sering kurang istirahat, makan. Dan terkadang banyak penyakit dan penyulit selama mengandung. Kemudian, dia melahirkannya dengan susah payah.

Kata *Wahnan* berarti *Kelemahan* atau *kerapuhan*. Yang dimaksud disini kurangnya kemampuan beban kehamilan, penyusuan, dan pemeliharaan anak. Patron kata yang digunakan ayat inilah mengisyatkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya (Shihab,2002).

Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ahqaaf / 46 :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
15, berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِيَّيَ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

Ayat diatas menyatakan : Sesungguhnya Kami telah memerintahkan kepada manusia, siapapun manusia itu, selama dia benar-benar manusia asgar taat kepada kami sepanjang hidup mereka *Dan Kami telah mewasiatkan*, yakni telah memerintahkan dan berpesan kepada manusia itu, juga dengan wasiat yang baik, yaitu agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tuanya. Ini antara lain karena ayahnya terlibat dalam kejadiannya dan setelah sang ayah mencampurkan sperma kedalam rahim ibunya, sang ibu mengandungnya dengan susah payah, sambil mengalami aneka kesulitan bermula dari mengidam dengan aneka gangguan fisik dan psikis, dan melahirkannya dengan susah payah setelah berlalu masa kehamilan.

Setelah terjadi pembuahan zat, yang merupakan calon manusia, bergerak menuju dinding rahim untuk berdempet. Zat itu merobek rahim dimana ia berdempet dan memakannya sehingga darah itu mengalir

menuju zat itu dan ia pun senantiasa bagaikan berenang didalam kolam darah ibu yang kaya dengan saripati makanan. Ia mengisapnya agar dapat hidup dan tumbuh berkembang, sedang sang ibu yang sungguh wajar dikasihani itu makan, minum, mengunyah, dan mengisap yang kesemuanya menghasilkan darah yang bersih untuk anak yang dikandungnya yang dengan amat lahap memakannya.

Selanjutnya, pada periode pembentukan tulang-tulang, semakin banyak kebutuhan janin itu kepada kalsium dan karena itu pula sang ibu memberikan kepadanya dari saripati tulang-tulangnya pada darah agar kerangka sang anak dapat terbentuk dengan sempurna. Itu sedikit dari banyak sekali yang dianugerahkan ibu saat kehamilan janinnya (Shihab, 2002).

E. Kerangka Konsep


1. Dasar Pemikiran Variabel

Kehamilan merupakan suatu hal yang fisiologis. Namun, kehamilan itu bisa saja berubah menjadi kehamilan yang patologi. Kebanyakan dari ibu terlambat mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan sehingga sangat sulit untuk bisa tertolong lagi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki tentang tanda – tanda bahaya yang dapat terjadi pada kehamilan. Terkadang Ibu hamil yang mengalami tanda – tanda atau gejala – gejala kehamilan tersebut menganggap itu sebagai hal yang wajar terjadi dalam kehamilan. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana pengetahuan ibu tentang tanda bahaya kehamilan .Sehingga ibu hamil yang mengalami tanda – tanda

bahaya kehamilan tersebut, dapat segera meminta pertolongan pada tenaga kesehatan agar mereka dapat segera mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengurangi angka kematian ibu maternal.

2. Skema Kerangka Konsep

Berdasarkan dasar pemikiran variabel tersebut diatas, maka skema kerangka konsep penelitian ini adalah :



Keterangan :

————— : Variable yang diteliti

□ : Variable independen

○ : Variable dependen

3. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

a. Pengetahuan ibu hamil tentang perdarahan pervaginam

Pengetahuan ibu hamil tentang perdarahan pervaginam adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil mengenai perdarahan pervaginam berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Kriteria Objektif :

Tahu : Jika ibu menjawab dengan benar 50% dari seluruh pertanyaan tentang perdarahan pervaginam.

Tidak tahu : Jika ibu menjawab pertanyaan dengan benar < 50% dari seluruh pertanyaan tentang perdarahan pervaginam

b. Pengetahuan ibu hamil tentang sakit kepala yang hebat

Segala sesuatu yang diketahui ibu hamil tentang sakit kepala yang hebat yang terdapat dalam kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif :

Tahu : Jika ibu menjawab dengan benar 50% dari seluruh pertanyaan tentang sakit kepala yang hebat

Tidak tahu : Jika ibu menjawab pertanyaan dengan benar < 50% dari seluruh pertanyaan tentang sakit kepala yang hebat.

c. Pengetahuan ibu hamil tentang kejang pada masa kehamilan

Gambaran klinis dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil mengenai kejang pada masa kehamilan berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif :

Tahu : Jika ibu menjawab benar 50% dari seluruh pertanyaan tentang kejang pada masa kehamilan

Tidak tahu : Jika ibu menjawab pertanyaan dengan benar < 50% dari seluruh pertanyaan tentang kejang pada masa kehamilan

d. Pengetahuan ibu hamil tentang gerakan janin berkurang

Gambaran klinis dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil mengenai gerakan janin berkurang berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif :

Tahu : Jika ibu menjawab benar 50% dari seluruh pertanyaan tentang gerakan janin berkurang

Tidak tahu : Jika ibu menjawab pertanyaan dengan benar < 50% dari seluruh pertanyaan tentang gerakan janin berkurang

e. Pengetahuan ibu hamil tentang nyeri perut yang hebat

Gambaran klinis dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil mengenai nyeri perut yang hebat berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif :

Tahu : Jika ibu menjawab benar 50% dari seluruh pertanyaan tentang nyeri perut yang hebat

Tidak tahu : Jika ibu menjawab pertanyaan dengan benar < 50% dari seluruh pertanyaan tentang nyeri perut yang hebat

f. Pengetahuan ibu hamil tentang bengkak pada muka dan tangan

Pengetahuan ibu hamil tentang bengkak pada muka dan tangan berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Kriteria Objektif :

Tahu : Jika ibu menjawab dengan benar 50% dari seluruh pertanyaan tentang bengkak pada muka dan tangan

Tidak tahu : Jika ibu menjawab pertanyaan dengan benar < 50% dari seluruh pertanyaan tentang bengkak pada muka dan tangan

g. Pengetahuan ibu hamil tentang demam pada masa kehamilan

Segala sesuatu yang diketahui ibu hamil tentang demam pada masa kehamilan yang terdapat dalam kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif :

Tahu : Jika ibu menjawab dengan benar 50% dari seluruh pertanyaan tentang demam pada masa kehamilan

Tidak tahu : Jika ibu menjawab pertanyaan dengan benar < 50% dari seluruh pertanyaan tentang demam pada masa kehamilan.

h. Pengetahuan ibu hamil tentang muntah yang berlebihan

Gambaran klinis dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil mengenai muntah yang berlebihan berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif :

Tahu : Jika ibu menjawab benar 50% dari seluruh pertanyaan tentang muntah yang berlebihan

Tidak tahu : Jika ibu menjawab pertanyaan dengan benar < 50% dari seluruh pertanyaan tentang muntah yang berlebihan

i. Pengetahuan ibu hamil tentang perubahan penglihatan

Gambaran klinis dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil mengenai perubahan penglihatan berdasarkan kuesioner yang dibagikan

Kriteria Objektif :

Tahu : Jika ibu menjawab benar 50% dari seluruh pertanyaan tentang perubahan penglihatan

Tidak tahu : Jika ibu menjawab pertanyaan dengan benar < 50% dari seluruh pertanyaan tentang perubahan penglihatan

j. Pengetahuan ibu hamil tentang Ketuban pecah dini

Gambaran klinis dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil mengenai ketuban pecah dini berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif :

Tahu : Jika ibu menjawab benar 50% dari seluruh pertanyaan tentang ketuban pecah dini

Tidak tahu : Jika ibu menjawab pertanyaan dengan benar < 50% dari seluruh pertanyaan tentang ketuban pecah dini



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Jenis penelitian yang dimaksud yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan (Aziz, 2007).

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian adalah Puskesmas Plus Bara-baraya, dengan alasan puskesmas tersebut memenuhi jumlah sampel untuk dijadikan tempat penelitian bagi peneliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2012.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di Puskesmas Plus Bara-Baraya.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang datang memeriksakan kehamilannya pada saat penelitian dan bersedia menjadi responden.

D. Teknik Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu peneliti memilih dari populasi secara tidak acak yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditetapkan peneliti.

Kriteria Inklusi:

- a. Ibu hamil dengan keadaan fisik dan psikologis yang normal
- b. Ibu hamil yang hadir pada saat penelitian
- c. Ibu hamil yang bersedia menjadi responden

Kriteria eksklusi:

- a. Ibu hamil yang mengalami gangguan mental
- b. Ibu hamil yang tidak hadir pada saat penelitian
- c. Ibu hamil yang tidak bersedia menjadi responden

E. Besar Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi Ibu yang datang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Plus Bara-Baraya pada 3 tahun terakhir dengan rata-rata sebanyak 89 orang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan:

N : besar populasi

d : tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan

n : besar sampel (Notoatmodjo, 2005)

N : 89

d : 0,05 \longrightarrow $d^2 = 0.0025$

$$n = \frac{89}{1 + 89 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{89}{1 + 89 (0,0025)}$$

$$n = \frac{89}{1 + 0,2225}$$

$$n = \frac{89}{1,2225}$$

$$n = 72,80$$

Jadi, besar sampel sebanyak 73 orang

F. Pengumpulan Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan lembar kuesioner yang berisi beberapa item pertanyaan yang dibuat oleh peneliti. Kuesioner ini dibagikan secara langsung kepada responden dimana kuesioner yang dibagikan berupa pertanyaan yang menggali pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan.

G. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator, dengan rumus sebagai berikut:

$$S = R$$

Keterangan:

S : Skor Responden

R : Jawaban yang benar

(Notoadmodjo,2005)

H. Analisis Data

Data di analisa dengan menggunakan presentase dengan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Di mana :

P : Presentase yang di cari

f : Frekuensi

N : Jumlah sampel

I. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Editing

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

2. Coding

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0). Untuk pilihan jawaban yang salah. Untuk pilihan jawaban yang ragu – ragu tetap dimasukkan dalam kategori jawaban yang salah.

3. Tabulating

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

J. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi :

1. Lembar persetujuan (informed consent)

Informed consent adalah merupakan lembar persetujuan yang diberikan pada setiap calon responden yang akan diteliti yang memenuhi kriteria inklusi, terlebih dahulu peneliti memberikan penjelasan maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan serta dampak yang mungkin terjadi selam dan sesudah pengumpulan data.

Jika responden bersedia diteliti maka diberi lembar penjelasan responden (lembar satu) dan lembar persetujuan menjadi responden

(lembar dua) yang harus ditanda tangani, tetapi jika responden menolak untuk diteliti maka peneliti tidak dapat memaksa dan harus menghormati hak pasien.

2. Tanpa Nama (Anonymity)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

3. Kerahasiaan (Confidentiality)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian.

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden adalah jawaban yang diberikan oleh responden yang terdiri atas umur, pendidikan terakhir dan pekerjaan pada saat dilakukan penelitian yang dilaksanakan di Puskesmas Plus bara-baraya Makassar mulai tanggal 17 Juli sampai 31 Juli 2012. Hasil karakteristik responden tersebut akan diuraikan pada tabel berikut.

1. Umur

Tabel.4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Di Puskesmas plus Bara-baraya Makassar
17 Juli-31 Juli 2012




Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 73 ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya, sebanyak 4 orang atau 5,48 % ibu hamil

yang berumur 20 tahun, sebanyak 42 orang atau 57,53% ibu hamil yang berumur 21-30 tahun, sebanyak 27 orang atau 36,99 % ibu hamil yang berumur 31-40 tahun.

2. Pendidikan

Tabel.4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Di Puskesmas plus bara-baraya Makassar
17 Juli-31 juli 2012




Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebanyak 4 orang atau 5,48% ibu hamil yang tidak memiliki pendidikan, sebanyak 10 orang atau 13,70% ibu hamil yang berpendidikan SD, sebanyak 26 orang atau 35,61% ibu hamil yang berpendidikan SMP, sebanyak 31 orang atau 42,47% ibu hamil yang berpendidikan SMA dan sebanyak 2 orang atau 2,74% ibu hamil yang tamatan Perguruan Tinggi.

3. Pekerjaan

Tabel.4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Di Puskesmas plus bara-barayaMakassar
17 Juli-31 Juli 2012



Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebanyak dari 73 ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya, sebanyak 60 orang atau 82,19% ibu rumah tangga, sebanyak 7 orang atau 9,59% ibu hamil yang wiraswasta, sebanyak 6 orang atau 8,22% ibu hamil yang Pegawai Negeri Sipil.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tanda-tanda Bahaya Kehamilan di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar tahun 2012, disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

1. Perdarahan pervaginam

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang
Perdarahan pervaginam
di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar
17 Juli-31 juli 2012

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu	49	67,12
Tidak Tahu	24	32,88
Jumlah	73	100,00

Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.4 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang perdarahan pervaginam yaitu sebanyak 49 orang (67,12%) dan yang tidak tahu sebanyak 24 orang (32,88%).

2. Sakit Kepala yang Hebat

Tabel 4.5
Distribusi frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang
Sakit kepala yang hebat
di Puskesmas Plus Bara-barayaMakassar
17 juli-31 Juli 20112

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu	53	72,60
Tidak Tahu	20	27,40
Jumlah	73	100,00

Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.5 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang sakit kepala yang hebat yaitu sebanyak 53 orang (72,60%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 20 orang (27,40%).

3. Kejang pada masa kehamilan

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang
Kejang pada masa kehamilan
di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar
17 Juli-31 Juli 2012

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu	44	60,27
Tidak Tahu	29	39,73
Jumlah	73	100,00

Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.6 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang kejang pada masa kehamilan yaitu sebanyak 44 orang (60,27%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 29 orang (39,73%).

4. Gerakan janin berkurang

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil
tentang Gerakan janin berkurang
di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar
17 Juli-31 Juli 2012

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu	41	56,16
Tidak Tahu	32	43,84
Jumlah	73	100,00

Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.7 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang gerakan janin berkurang yaitu sebanyak 41 orang (56,16%) dan yang tidak tahu sebanyak 32 orang (43,84%).

5. Nyeri perut yang hebat

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil
tentang Nyeri perut yang hebat
di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar
17 Juli-31 Juli 2012

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu	45	61,64
Tidak Tahu	28	38,36
Jumlah	73	100,00

Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.8 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang nyeri perut yang hebat yaitu sebanyak 45 orang (61,64%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 28 orang (38,36%).

6. Bengkak pada muka dan tangan

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil
tentang Bengkak pada muka dan tangan
di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar
17 Juli-31 Juli 2012

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu	42	57,53
Tidak Tahu	31	42,47
Jumlah	73	100,00

Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.9 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang bengkak pada muka dan tangan yaitu sebanyak 42 orang (57,53%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 31 orang (42,47%).

7. Demam pada masa kehamilan

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil
tentang Demam Pada masa kehamilan
di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar
17 Juli-31 Juli 2012

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu	41	56,16
Tidak Tahu	32	43,84
Jumlah	73	100,00

Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.10 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang demam pada masa kehamilan yaitu sebanyak 41 orang (56,16%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 32 orang (43,84%).

8. Muntah yang berlebihan

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil
tentang Muntah yang berlebihan
di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar
17 Juli-31 Juli 2012

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu	46	63,01
Tidak Tahu	27	36,99
Jumlah	73	100,00

Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.11 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang muntah yang berlebihan yaitu sebanyak 46 orang (63,01%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 27 orang (36,99%).

9. Perubahan Penglihatan

Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil
tentang Perubahan penglihatans
di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar
17 Juli-31 Juli 2012

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu	39	53,42
Tidak Tahu	34	46,58
Jumlah	73	100,00

Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.12 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang perubahan penglihatan yaitu sebanyak 39 orang (53,42%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 34 orang (46,58%).

10. Ketuban Pecah Dini

Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil
tentang Ketuban Pecah Dini
di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar
17 Juli-31 Juli 2012

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu	50	68,49
Tidak Tahu	23	31,51
Jumlah	73	100,00

Sumber : Wawancara/kuesioner, 2012.

Tabel 4.13 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang ketuban pecah dini yaitu sebanyak 50 orang (68,49%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 23 orang (31,51%).

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba membahas gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dari berbagai komponen dengan berbagai referensi yang ada :

1. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perdarahan pervaginam

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan lebih banyak responden yang tahu tentang perdarahan pervaginam pada kehamilan yaitu sebanyak 49 orang (67,12%), sedangkan yang tidak tahu sebanyak 24 orang (32,88%).

Pengetahuan yang dimiliki oleh ibu hamil tentang perdarahan pervaginam diperoleh melalui berbagai proses. Bukan hanya dari pendidikan formal saja tapi juga pendidikan yang non-formal, salah satunya yaitu melalui penyuluhan. Penyuluhan merupakan salah satu sarana bagi ibu hamil untuk mendapatkan informasi mengenai kehamilan. Penyuluhan-penyuluhan ini biasanya dilakukan di lingkungan tempat tinggal ibu hamil, di rumah sakit atau puskesmas tempat mereka memeriksakan kehamilannya. Hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan oleh para tenaga kesehatan, terutama bidan agar ibu hamil dapat mengenali tanda bahaya perdarahan pervaginam dalam kehamilan. Ibu hamil juga dapat mengetahui penyebab terjadinya perdarahan pervaginam, klasifikasinya penanganan serta pencegahan perdarahan pervaginam.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, ibu hamil juga dapat menambah wawasan mereka tentang perdarahan pervaginam itu sendiri

melalui internet agar ibu hamil tahu dan apabila sewaktu-waktu mengalami perdarahan pervaginam dapat segera meminta pertolongan medis sehingga dapat tertangani sedini mungkin. Pengetahuan tentang perdarahan pervaginam itu sendiri apabila diaplikasikan maka dapat menekan angka kematian ibu dan anak. Dengan pengetahuan yang dimiliki, ibu hamil dapat mengetahui jenis perdarahan itu sendiri dan dengan segera dapat meminta pertolongan medis.

Tinggi rendahnya pengetahuan ibu hamil dapat mempengaruhi sikap serta tindakan ibu itu sendiri untuk melakukan penanganan ataupun pencegahan perdarahan pervaginam. Namun demikian, apabila pengetahuan yang dimiliki ibu hamil tidak diaplikasikan dengan sikap dan tindakan yang tepat dari ibu itu sendiri, maka pertolongan pada ibu hamil yang mengalami perdarahan pervaginam akan lambat bahkan mungkin ibu terlambat mendapat pertolongan medis akibat kurangnya kesadaran dari ibu itu sendiri.

2. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang sakit kepala yang hebat

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan lebih banyak responden yang tahu tentang sakit kepala yang hebat sebanyak 53 orang (72,60%), sedangkan yang tidak tahu sebanyak 20 orang (27,40%).

Dari hasil penelitian ini, sebagian ibu hamil telah mengetahui tentang sakit kepala yang hebat. Pengetahuan ini diperoleh ibu hamil dari hasil pemeriksaan *Antenatal Care* di Puskesmas dan juga dari berbagai sumber informasi, ada yang melalui penyuluhan langsung yang diberikan

oleh tenaga kesehatan dan ada juga yang aktif mencari informasi di media cetak maupun media elektronik. Hal ini mereka lakukan agar mereka dapat lebih waspada terhadap bahaya-bahaya kehamilan yang mungkin terjadi. Misalnya dengan mengetahui bahwa sakit kepala yang hebat merupakan gejala awal pre eklampsia. Dengan demikian, Minimal mereka bisa mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan apabila mereka mengalami salah satu tanda bahaya tersebut.

Inisiatif ibu-ibu hamil ini patut menjadi contoh untuk ibu-ibu hamil di sarana kesehatan yang lain. Apabila semua ibu hamil sadar akan hal tersebut, maka angka kematian maternal akibat pre eklampsia dapat ditekan seminimal mungkin.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa pengetahuan (knowledge) adalah merupakan hasil dari tahu dan inti terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2005).

Dengan demikian terdapat kesesuaian antara teori dan hasil yang diperoleh dari penelitian. Dengan pengetahuan yang dimiliki, dapat membantu ibu hamil untuk mengenali dan mencegah komplikasi yang dapat terjadi selama kehamilan. Sehingga ibu hamil lebih waspada lagi dalam menjaga kehamilannya.

3. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang kejang pada masa kehamilan

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan lebih banyak responden yang tahu tentang kejang pada masa kehamilan yaitu sebanyak 44 orang (60,27%), sedangkan yang tidak tahu sebanyak 29 orang (39,73%).

Dalam penelitian ini, ibu hamil tahu bahwa Kejang pada masa kehamilan merupakan salah satu tanda bahaya. Namun mereka tidak tahu bahwa kejang pada masa kehamilan merupakan salah satu gejala pre-eklampsia. Pengetahuan ibu hamil tentang kejang itu sendiri mereka dapatkan dari petugas kesehatan yang memberikan penyuluhan. Peran aktif ibu hamil dalam mencari informasi seputar kehamilannya merupakan sikap positif dalam upaya menjaga kesehatan dirinya maupun janin dalam kandungannya.

Seorang ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan harus pula diikuti dengan sikap dan tindakan. Hal ini karena terdapat tanda-tanda bahaya yang sewaktu-waktu menimpa kehamilannya. Bahaya tersebut bisa terjadi apabila ibu memiliki beban pikiran yang berat dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat dan memiliki sedikit waktu untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu hamil seharusnya rutin memeriksakan kehamilannya agar kehamilannya terkontrol dengan baik.

Rata-rata ibu hamil yang ada di tempat penelitian aktif dalam mengikuti penyuluhan, karena penyuluhan merupakan bekal bagi mereka selama menjalani masa kehamilan. Dengan adanya penyuluhan tersebut

mereka memiliki pengetahuan yang cukup, dalam menanggapi bahaya-bahaya yang mungkin terjadi selama kehamilan. Sehingga mereka juga dapat menerapkan hasil penyuluhan tersebut dengan cara menghindari hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan komplikasi bagi kehamilannya.

4. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang gerakan janin berkurang

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan lebih banyak responden yang tahu tentang gerakan janin berkurang yaitu sebanyak 41 orang (56,16%), sedangkan yang tidak tahu sebanyak 32 orang (43,84%).

Pengetahuan tentang gerakan janin berkurang, mereka dapatkan dari berbagai sumber informasi, ada yang melalui penyuluhan langsung yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan ada juga yang aktif mencari informasi di media cetak maupun media elektronik. Hal ini mereka lakukan agar mereka dapat lebih waspada terhadap bahaya-bahaya kehamilan yang mungkin terjadi. Minimal mereka bisa mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan apabila mereka mengalami salah satu tanda bahaya tersebut.

Pengetahuan ibu hamil tentang gerakan janin berkurang minimal bisa mencegah kematian janin dalam rahim. Ibu hamil dapat merasakan gerakan janinnya. Apabila ibu merasakan gerakan janinnya kurang, maka ibu hamil dapat lebih waspada karena itu mungkin pertanda dari gawat janin sehingga ibu bisa segera memeriksakan kehamilannya pada petugas kesehatan. Namun sebaliknya, apabila seorang ibu hamil tidak tahu tentang gerakan janin berkurang, mungkin akan menganggap bahwa itu hal yang

wajar, sehingga mereka tidak tahu bahwa hal tersebut bisa menyebabkan gawat janin hingga berujung pada kematian janin dalam rahim.

Informasi tentang gerakan janin berkurang, dapat ibu hamil peroleh dari pelayanan antenatal care ataupun dari penyuluhan petugas kesehatan. Namun bila ibu hamil mempunyai kesadaran sendiri, maka mereka bisa berinisiatif untuk aktif mencari informasi seputar gerakan janin berkurang melalui media cetak, media elektronik ataupun bertanya pada petugas kesehatan. Dengan tingginya pengetahuan yang dimiliki ibu hamil, maka dia dapat lebih waspada menjaga janin dalam kehamilannya dan rutin memeriksakan kehamilannya.

5. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang nyeri perut yang hebat

Tabel 4.8 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang nyeri perut yang hebat yaitu sebanyak 45 orang (61,64%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 28 orang (38,36%).

Dari hasil penelitian, ibu hamil tahu bahwa nyeri perut yang hebat merupakan tanda bahaya kehamilan. Namun mereka tidak tahu komplikasi yang dapat terjadi dari gejala itu sendiri. Ibu hamil dengan tingkat pengetahuan rendah menganggap mungkin itu merupakan sakit perut biasa dan tidak berpengaruh pada kehamilannya. Dengan pengetahuan yang lebih tinggi, seorang ibu hamil akan tahu bahwa nyeri perut yang hebat mungkin pertanda dari kehamilan ektopik terganggu sehingga mereka bisa segera memeriksakan kehamilannya pada petugas kesehatan untuk mendapatkan tindakan medis.

Perbedaan tingkat pengetahuan yang dimiliki ibu hamil akan mempengaruhi sikap dan tindakan ibu hamil itu sendiri terhadap kewaspadaan menjaga kehamilannya. Pengetahuan yang dimiliki dapat diaplikasikan dalam upaya menjaga kesehatan dirinya maupun janin dalam kandungannya. Sehingga dapat menekan angka kematian ibu dan janin.

Dari hasil pemeriksaan *Antenatal Care* yang dilakukan ibu hamil di Puskesmas, mereka tahu tentang tanda bahaya nyeri perut yang hebat dalam kehamilan. Dari pengetahuan inilah ibu hamil dapat mengenali tanda bahaya nyeri perut yang hebat sehingga dapat ditangani lebih dini.

6. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang bengkak pada muka dan tangan

Tabel 4.9 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang Bengkak pada muka dan tangan yaitu sebanyak 42 orang (57,53%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 31 orang (42,47%).

Kebanyakan ibu hamil akan mengalami bengkak pada masa kehamilan. Namun mereka menganggap bahwa bengkak pada muka dan tangan merupakan hal yang biasa dialami selama masa kehamilan. Mereka tidak mengetahui komplikasi yang dapat terjadi jika bengkak berlangsung terus menerus selama kehamilan. Bengkak yang tidak hilang dengan istirahat disertai hipertensi mungkin gejala awal eklampsia. Ibu hamil yang tahu tentang gejala ini akan lebih waspada apabila mengalami bengkak pada muka dan tangan. Berbeda dengan ibu hamil yang membiarkan bengkak pada muka dan tangan tanpa upaya pertolongan medis karena dia tidak tahu tentang bahaya dari gejala itu sendiri.

Pengetahuan yang dimiliki ibu hamil tentunya berbeda-beda. Ini jelas akan berpengaruh juga pada sikap dan tindakan ibu hamil apabila mengalami bengkak pada muka dan tangan. Selain pengetahuan yang di dapat dari penyuluhan ataupun media informasi, ibu hamil juga bisa tahu dari pengalaman. Terkadang mereka belajar dari pengalaman. Pengalaman yang ibu hamil miliki juga bisa bermanfaat bagi ibu hamil lainnya apabila mereka saling berbagi pengalaman kepada sesamanya. Dengan demikian mereka dapat mengetahui oedema yang wajar terjadi pada ibu hamil dan yang dapat membahayakan proses kehamilan ibu. Selain itu, hal tersebut juga dapat menciptakan rasa kepedulian diantara ibu hamil yang satu dan yang lainnya.

7. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang demam pada masa kehamilan

Tabel 4.10 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang demam pada masa kehamilan yaitu sebanyak 41 orang (56,16%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 32 orang (43,84%).

Dari hasil penelitian ini, pengetahuan ibu hamil tentang demam pada masa kehamilan menunjukkan kesadaran ibu dalam mencari informasi berkaitan dengan tanda bahaya kehamilan. Mereka tahu bahwa demam pada masa kehamilan merupakan tanda bahaya kehamilan. Demam itu sendiri bisa merupakan pertanda adanya infeksi dalam kehamilannya. Oleh karena itu ibu hamil perlu memeriksakan kehamilannya bila mengalami demam tinggi yang tidak hilang hanya dengan istirahat.

Pengetahuan yang dimiliki oleh ibu hamil disini tentunya akan memberikan dampak positif bagi ibu itu sendiri. Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan juga diperoleh dari hasil kerja para petugas kesehatan yang senantiasa memberikan penyuluhan dan juga konseling pada ibu hamil. Selain itu peran aktif ibu itu sendiri juga turut membantu dalam proses mencari informasi.

Perbedaan tentunya akan nampak dari ibu hamil yang memiliki pengetahuan yang lebih baik dari ibu hamil yang tidak tahu. Mereka yang tahu tentang demam itu sendiri tentunya akan mengupayakan kesembuhan dengan segera karena mereka telah mengetahui dampak dari demam pada masa kehamilan. Sedangkan ibu hamil yang tidak tahu tentunya juga akan mengupayakan kesembuhan dirinya namun tidak dengan segera melainkan mengkonsumsi obat-obat di warung sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh bagi janinnya. Disini jelas perbedaan yang nampak pada mereka. Kesadaran diri mereka nantinya juga akan berpengaruh pada kesehatan dirinya dan juga janinnya. Tinggi rendahnya pengetahuan yang mereka miliki juga memberikan gambaran tentang peran serta petugas kesehatan dalam menyampaikan informasi seputar kesehatan ibu dan janin sehingga apabila ibu mengalami demam, mereka tahu hal apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatannya. Pengetahuan yang sudah dimiliki sekarang tentunya harus terus ditingkatkan.

8. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang muntah yang berlebihan

Tabel 4.11 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang muntah yang berlebihan yaitu sebanyak 46 orang (63,01%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 27 orang (36,99%).

Dari hasil penelitian, lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang muntah yang berlebihan. Pengetahuan ini mereka dapatkan dari petugas kesehatan ataupun dari media informasi. Mereka tahu bahwa muntah yang berlebihan akan membahayakan kesehatan dirinya dan juga janinnya. Muntah yang berlebihan akan mengurangi asupan nutrisi untuk perkembangan janinnya. Namun bagi ibu hamil yang tidak tahu akan menganggap itu hal yang biasa dialami oleh ibu pada saat hamil. Mereka tidak tahu bahwa muntah terus menerus yang tidak segera dihentikan akan membahayakan kesehatannya. Mereka tidak tahu bahwa muntah bisa menyebabkan dehidrasi hingga tak sadarkan diri. Hal ini jelas merupakan hal yang perlu dirubah. Pengetahuan ibu hamil perlu ditingkatkan dalam upaya menjaga kesehatan selama hamil.

Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang muntah yang berlebihan nantinya akan dijadikan acuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu sehingga ibu hamil lebih aktif lagi dalam mencari informasi. Namu disini, Inisiatif ibu-ibu hamil dalam mencari informasi tentang tanda bahaya kehamilan patut menjadi contoh untuk ibu-ibu hamil di sarana kesehatan yang lain. Apabila semua ibu hamil sadar akan hal tersebut, maka angka kematian maternal dapat ditekan seminimal mungkin.

9. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perubahan penglihatan

Tabel 4.12 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang perubahan penglihatan yaitu sebanyak 39 orang (53,42%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 34 orang (46,58%).

Dalam penelitian ini, pengetahuan ibu hamil tentang perubahan penglihatan lebih rendah bila dibandingkan dengan pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan yang lainnya. Walaupun lebih dari setengah responden mengetahui perubahan penglihatan sebagai salah satu tanda bahaya kehamilan, namun banyak juga yang menganggap itu hal yang biasa. Memang di masyarakat awam, umumnya mereka tidak terlalu mengetahui perubahan penglihatan sebagai tanda bahaya penglihatan. Hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik yang tahu tentang perubahan penglihatan itu sendiri. Namun bagi sebagian orang dianggap sebagai gangguan penglihatan yang biasa terjadi. Mereka tidak tahu bahwa perubahan penglihatan yang tiba-tiba merupakan gejala dari pre-eklampsia. Pengetahuan yang minim ini jelas perlu ditingkatkan. Dalam upaya menjaga kesehatan diri ibu hamil dan janinnya.

Pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan tidak hanya di peroleh dari penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang biasa dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan masyarakat, seperti : Puskesmas atau posyandu. Selain di lingkungan tempat tinggal masyarakat, rumah sakit tempat penelitian pun selalu memberikan informasi baik secara individual maupun secara umum atau dengan metode penyuluhan.

10. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang Ketuban Pecah Dini

Tabel 4.13 menunjukkan lebih banyak ibu hamil yang tahu tentang Ketuban Pecah Dini yaitu sebanyak 50 orang (68,49%) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 23 orang (31,51%).

Pengetahuan ibu hamil tentang ketuban pecah dini dalam penelitian ini memberikan gambaran kesadaran ibu hamil dalam mencari informasi tentang kesehatan kehamilannya. Mereka tahu apa itu ketuban pecah dini. Disini perlu juga diikuti dengan sikap dan tindakan yang cepat dan tepat apabila ibu mengalami ketuban pecah dini sehingga dapat segera ditolong. Namun tak sedikit juga ibu hamil yang tidak tahu tentang ketuban pecah dini. Mereka menganggap itu adalah hal biasa. Mereka tidak dapat membedakan air ketuban dengan cairan lainnya yang keluar dari vagina. Mereka menganggap itu hanya lendir yang biasa keluar pada saat hamil. Sehingga ibu hamil dengan ketuban pecah dini tidak segera dapat ditangani yang pada akhirnya dapat membahayakan keselamatan ibu dan janinnya.

Telah diketahui bersama, bahwa tingginya angka kematian ibu disebabkan karena komplikasi yang terjadi pada kehamilan dan persalinan. Salah satu penyebabnya yaitu karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh ibu hamil mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan. Oleh karena itu, begitu pentingnya bagi ibu hamil diberikan pengetahuan mengenai tanda bahaya pada kehamilan sehingga bahaya-bahaya tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar mengenai Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ibu hamil yang tahu tentang perdarahan pervaginam sebanyak 49 orang (67,12%) dan yang tidak tahu sebanyak 24 orang (32,88%).
2. Ibu hamil yang tahu tentang sakit kepala yang hebat sebanyak 53 orang (72,60%) dan yang tidak tahu sebanyak 20 orang (27,40%).
3. Ibu hamil yang tahu tentang kejang pada masa kehamilan sebanyak 44 orang (60,27%) dan yang tidak tahu sebanyak 29 orang (39,73%).
4. Ibu hamil yang tahu tentang gerakan janin berkurang sebanyak 41 orang (56,16%) dan yang tidak tahu sebanyak 32 orang (43,84%).
5. Ibu hamil yang tahu tentang nyeri perut yang hebat sebanyak 45 orang (61,64%) dan yang tidak tahu sebanyak 28 orang (38,36%).
6. Ibu hamil yang tahu tentang bengkak pada muka dan tangan sebanyak 42 orang (57,53%) dan yang tidak tahu sebanyak 31 orang (42,47%).
7. Ibu hamil yang tahu tentang demam pada masa kehamilan sebanyak 41 orang (56,16%) dan yang tidak tahu sebanyak 32 orang (43,84%).

8. Ibu hamil yang tahu tentang muntah yang berlebihan sebanyak 46 orang (63,01%) dan yang tidak tahu sebanyak 27 orang (36,99%).
9. Ibu hamil yang tahu tentang perubahan penglihatan sebanyak 39 orang (53,42%) dan yang tidak tahu sebanyak 34 orang (46,58%).
10. Ibu hamil yang tahu tentang ketuban pecah dini sebanyak 50 orang (68,49%) dan yang tidak tahu sebanyak 23 orang (31,51%).

B. Saran

1. Bagi ibu hamil agar tidak bersenggama dulu pada saat hamil muda. Perbaiki asupan gizi dan istirahat yang cukup. Segera periksakan diri pada petugas kesehatan apabila terjadi perdarahan pervaginam yang banyak, sering dan mengancam keselamatan ibu dan janin yang dikandung.
2. Bagi ibu hamil agar banyak istirahat bila mengalami sakit kepala dan jangan mengonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi dengan dokter. Namun bila sakit kepala tidak hilang, maka segera periksakan pada petugas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan.
3. Bagi ibu hamil agar lebih aktif mencari informasi tentang kejang pada masa kehamilan dan mengenali gejala-gejala awal dari tanda bahaya kehamilan ini. Dan apabila ibu mengalami kejang, maka keluarga segera memeriksakan ibu pada petugas kesehatan karena mungkin itu merupakan gejala eklampsia yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin.

4. Bagi ibu hamil agar rutin menghitung gerakan janinnya. Normalnya janin bergerak 3 kali dalam satu jam. Namun jika kurang dari itu ataupun gerakan janin semakin melemah bahkan tidak ada, maka sebaiknya memeriksakan kehamilannya pada petugas kesehatan karena bila dibiarkan akan mengakibatkan gawat janin. Perbaiki juga nutrisi ibu dan janin dengan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup.
5. Bagi ibu hamil agar mencari informasi tentang nyeri perut yang hebat untuk mengenali tanda bahaya kehamilan yang satu ini. Jika ibu merasakan nyeri perut yang hebat terus menerus dan sakitnya tidak hilang dengan istirahat, maka sebaiknya ibu memeriksakan kehamilannya pada petugas kesehatan demi keselamatan ibu dan janin.
6. Bagi ibu hamil yang mengalami bengkak pada muka dan tangan agar istirahat dengan posisi kaki ditinggikan. Kurangi makan makanan yang mengandung garam berlebih. Namun apabila tidak juga membaik, maka segera memeriksakan diri pada petugas kesehatan.
7. Bagi ibu hamil yang suhu badannya lebih dari 38°C agar banyak minum air putih, kompres untuk menurunkan suhu dan istirahat yang cukup. Namun jika keadaan ibu tak juga membaik, maka sebaiknya ibu memeriksakan diri pada petugas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan.

8. Bagi ibu hamil agar mengkonsumsi makanan yang tidak memicu mual, makan sedikit tapi sering dan memeriksakan diri pada petugas kesehatan apabila mengalami muntah yang berlebih dan mengganggu keadaan umum ibu.
9. Bagi ibu hamil yang mengalami perubahan penglihatan agar banyak istirahat namun apabila tidak hilang dengan istirahat maka segera memeriksakan diri pada petugas kesehatan.
10. Bagi ibu hamil apabila merasakan ada keluar cairan tidak terasa, berbau amis dan warna putih keruh maka segera mendatangi petugas kesehatan karena dikhawatirkan itu merupakan air ketuban yang pecah sebelum waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhafidz, Ahsin W. 2007. *Fikih Kesehatan*. Cet. 1. Jakarta: Amzah.
- Arikunto, S. 2008. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Cetakan 8. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aziz, AH. 2007. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Bandiyah, Siti. 2009. *Kehamilan, Persalinan & Gangguan Kehamilan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Chrisdiono. 2004. *Prosedur Tetap Obstetri & Ginekologi*. Jakarta: EGC.
- Damopoli, Firdayanti dan Ahmad. 2006. *Kehamilan*. Makassar: Alauddin Press.
- Kelly, Liz. 2007. *Sembilan Bulan Kehamilan & Kelahiran*. Jakarta: Arcan.
- Machfoedz, Ircham. 2010. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif & Kualitatif) Bidang Kesehatan, Keperawatan, Kebidanan, Kedokteran*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Manuaba, IGB. 2002. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC.
- Mochtar, R. 2002. *Sinopsis Obstetri*. Jakarta: EGC: Jakarta.
- Notoatmodjo, S. 2005. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Nugroho, Taufan. 2010. *Kasus Emergency Kebidanan Untuk Kebidanan dan Keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Pantiawati, Ika. 2010. *Asuhan Kebidanan I (Kehamilan)*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Saifuddin, AB. 2002. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.

- Salmah, S. 2006. *Asuhan Kebidanan Antenatal*. Jakarta: EGC.
- Sarwono,P. 2002. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- Sastrawinata, S. 2005. *Patologi Ginekologi*. Jakarta: EGC.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suririnah. 2011. *Kehamilan dan Persalinan*. <http://www.infoibu.com>, diakses tanggal 20 Mei 2012.
- Syah, M. 2000. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Jakarta: Rosda.
- Varney, Helen, dkk. 2007. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Edisi 4. Jakarta:EGC.
- WHO. 2000. *Kartu Menuju Sehat*. Jakarta.
- Widyastuti,S. 2010. *Tanda Bahaya Kehamilan*. www.3idanku.com, diakses tanggal 26 Februari 2010.
- Wiknjosastro, Hanifa. 2007. *Ilmu Kandungan*. Edisi 2. Cet. V. Jakarta: YBP-SP.

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Lusia Wahyu Beribe

Nim : 70400009017

Selain mendapatkan penjelasan mengenai penelitian ini saya mengerti segala informasi penelitian ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Maka saya bersedia dengan suka rela dan tanpa paksaan dari siapapun untuk menjadi responden penelitian yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Di Puskesmas Plus Bara-Baraya Tahun 2012”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar ,

2012

(Respondent)

KUESIONER PENELITIAN

GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG TANDA-TANDA BAHAYA KEHAMILAN DI PUSKESMAS PLUS BARA-BARAYA

TAHUN 2012

No. Kuesioner :

Tanggal :

A. Karakteristik responden

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

B. Pertanyaan tentang Tanda Bahaya Kehamilan

Berilah tanda check () pada kolom jawaban yang tersedia dengan memperhatikan kriteria dibawah ini:

“ Ya “ = Bila pernyataan benar, “ Tidak “ = Bila pernyataan salah

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Pada masa awal kehamilannya, ibu mungkin akan mengalami perdarahan yang sedikit (perdarahan implantasi) dan ini normal terjadi.		
2.	Perdarahan pada kehamilan merupakan tanda bahaya kehamilan.		

3.	Perdarahan pervaginam yang banyak dan sering merupakan gejala awal terjadinya abortus.		
4.	Perdarahan pervaginam yang banyak dan sering terjadi pada kehamilan tidak perlu mendapat penanganan medis.		
5.	Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala hebat yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat.		
6.	Sakit kepala hebat yang menetap dan tidak hilang dengan istirahat dalam kehamilan bukan merupakan tanda bahaya kehamilan.		
7.	Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan tidak akan mengganggu kondisi kesehatan ibu dan janin.		
8.	Sakit kepala yang hebat cukup diatasi dengan minum obat sakit kepala dan tidak perlu ke dokter.		
9.	Kejang biasanya didahului oleh gejala-gejala sakit kepala, mual, nyeri ulu hati hingga muntah.		
10.	Kejang merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan.		
11.	Kejang merupakan kondisi yang wajar dialami ibu hamil.		
12.	Ibu hamil yang mengalami kejang tidak perlu mendapat perawatan yang intensive.		
13.	Ibu mulai merasakan gerakan bayi selama bulan ke-5 atau ke-6.		
14.	Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam 1 jam.		
15.	Kurangnya gerakan janin biasanya pengaruh dari kondisi ibu, nutrisi, dan trauma saat hamil.		
16.	Dengan berkurang atau menghilangnya gerak janin dapat menjadi pertanda bahwa terjadi gawat janin.		
17.	Nyeri perut hebat selama kehamilan adalah normal.		
18.	Nyeri perut yang hebat, menetap dan tidak hilang dengan istirahat dapat mengancam keselamatan ibu dan janin.		

19.	Nyeri perut yang hebat cukup diatasi dengan minum obat sakit perut.		
20.	Nyeri perut yang hebat bisa merupakan gejala awal terjadinya abortus atau kehamilan di luar kandungan (Kehamilan Ektopik Terganggu).		
21.	Bengkak (oedema) pada wajah dan kaki yang menetap dan tidak hilang dengan istirahat disertai tekanan darah tinggi merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan		
22.	Hampir separuh dari ibu-ibu hamil akan mengalami bengkak yang normal pada kaki yang biasanya muncul pada sore hari dan biasanya hilang setelah beristirahat atau dengan meninggikan kaki lebih tinggi daripada kepala.		
23.	Apabila ibu hamil mengalami bengkak (oedema) pada wajah dan kaki, maka perlu mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak garam.		
24.	Bengkak (oedema) pada wajah dan kaki yang menetap selama kehamilan disertai tekanan darah tinggi tidak perlu mendapatkan penanganan dokter.		
25.	Ibu menderita demam dengan suhu $> 38\text{ C}$ dalam kehamilan merupakan suatu masalah.		
26.	Demam tinggi bukan merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan.		
27.	Demam tinggi yang dialami ibu hamil merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan.		
28.	Infeksi dapat terjadi selama kehamilan, persalinan dan masa nifas sehingga ibu mengalami demam tinggi.		
29.	Pada sepanjang masa kehamilan, ibu hamil akan mengalami mual dan muntah berlebihan.		
30.	Mual dan muntah terus menerus sampai ibu lemah dan tidak dapat bangun akan membahayakan keadaan ibu dan janin.		
31.	Mual muntah berlebihan dan ibu tidak bisa makan, tidak akan menyebabkan dehidrasi.		

32.	Ibu yang mengalami mual muntah berlebih perlu dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan “ cairan pengganti “.		
33.	Penglihatan tiba-tiba kabur dan berbayang, penglihatan ganda, seperti melihat titik-titik atau cahaya disertai sakit kepala hebat merupakan tanda bahaya kehamilan.		
34.	Perubahan penglihatan disertai sakit kepala yang hebat dapat diatasi dengan memakai kaca mata dan tidak perlu ke dokter.		
35.	Masalah visual yang mengindikasikan keadaan yang mengancam jiwa misalnya pandangan kabur tiba-tiba atau terbayang dan disertai sakit kepala yang hebat.		
36.	Perubahan penglihatan ringan (minor) adalah normal.		
37.	Jika keluar cairan ibu tidak terasa, berbau amis dan warna putih keruh berarti yang keluar adalah air ketuban.		
38.	Ketuban dinyatakan pecah dini jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung.		
39.	Ketuban Pecah dini tidak menyebabkan infeksi.		
40.	Ketuban pecah Dini dapat menyebabkan terjadinya gawat janin.		

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS

Nama : Lusya Wahyu Beribe
Nim : 70400009017
Tempat / tanggal lahir : Merauke, 27 November 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku : Flores
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mannuruki IV No.VIII C

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 1996-2002 : SDK II Larantuka , Kab.Flores Timur.
2. 2002-2005 : SMP Negeri 1 Larantuka, Kab.Flores Timur.
3. 2005-2008 : SMA Negeri 1 Larantuka, Kab.Flores Timur.
4. 2009-2012 : Prodi kebidanan Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Sulawesi Selatan.