

**GAMBARAN PENYEBAB TERJADINYA KEMATIAN MATERNAL
DI KABUPATEN PANGKEP PERIODE JANUARI 2010
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2011**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan (S.Kep) Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

UMMI HAYATI ALIAH
70300107128

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

ABSTRAK

Nama : Ummi Hayati Aliah
NIM : 70300107128
Judul : **Gambaran Penyebab Terjadinya Kematian Maternal di Kabupaten Pangkep Periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2011**

Angka Kematian Maternal (AKM) merupakan indikator yang mencerminkan status kesehatan ibu, terutama resiko kematian bagi ibu pada waktu hamil, melahirkan dan nifas (Depkes RI, 2004). Setiap tahun diperkirakan 529.000 wanita di dunia meninggal sebagai akibat komplikasi yang timbul dari kehamilan dan persalinan, sehingga diperkirakan terdapat AKM sebesar 400 per 100.000 kelahiran hidup (estimasi kematian maternal dari WHO/UNICEP/UNFPA tahun 2000). Hal ini memiliki arti bahwa satu orang wanita di belahan dunia akan meninggal setiap menitnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan penyebab terjadinya kematian maternal di Kabupaten Pangkep periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2011.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik. Responden sebanyak 7 orang populasi, semuanya dijadikan responden. Pengambilan data dengan data sekunder hasil pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2011.

Hasil penelitian dari 7 responden tersebut. 3 responden mengalami kematian maternal karena perdarahan, 3 responden karena preeklamsia dan 1 responden karena infeksi.

Saran dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas untuk menghindari terjadinya kematian maternal dan menurunkan AKM. Bagi Institusi, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu literatur bagi mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya serta seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada umumnya. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam hal perencanaan dan penanggulangan terjadinya kematian maternal. Bagi Peneliti, semoga dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam hal bagaimana penyebab terjadinya kematian maternal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan hasil konsepsi antara ovum (sel telur) dengan spermatozoa. Lama kehamilan mulai sampai partus adalah 280 hari (40 minggu) dan antara tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Kehamilan merupakan saat yang menyenangkan dan dinanti-nanti, tetapi juga dapat menjadi kegelisahan menghadapi persalinan (Prawihardjo, 2005).

Berbagai masalah saat kehamilan, persalinan dan nifas dapat menyebabkan Kematian maternal menurut batasan dari *The Tenth Revision of The International Classification of diseases* (ICD-10) adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tidak bergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya, tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO, 2003).

Angka Kematian Maternal (AKM) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan ukuran bagi kemajuan kesehatan suatu negara, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan ibu dan anak. AKM merupakan indikator yang mencerminkan status kesehatan ibu, terutama resiko kematian bagi ibu pada waktu hamil, melahirkan dan nifas (Depkes RI, 2004).

AKM, angka kematian anak termasuk AKB dan angka harapan hidup waktu lahir telah ditetapkan sebagai indikator - indikator derajat kesehatan dalam Indonesia sehat 2010. Kematian maternal merupakan masalah kompleks yang tidak hanya memberikan pengaruh pada para wanita saja, akan tetapi juga mempengaruhi keluarga bahkan masyarakat sekitar. Kematian maternal akan meningkatkan resiko terjadinya kematian bayi. Kematian wanita pada usia reproduktif juga akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan dan dapat menyebabkan kemunduran perkembangan masyarakat, karena wanita merupakan pilar utama dalam keluarga yang berperan penting dalam mendidik anak - anak, memberikan perawatan kesehatan dalam keluarga dan membantu prekonomian keluarga (UNFPA, 2003).

Setiap tahun diperkirakan 529.000 wanita di dunia meninggal sebagai akibat komplikasi yang timbul dari kehamilan dan persalinan, sehingga diperkirakan terdapat AKM sebesar 400 per 100.000 kelahiran hidup (estimasi kematian maternal dari WHO/UNICEP/UNFPA tahun 2000). Hal ini memiliki arti bahwa satu orang wanita di belahan dunia akan meninggal setiap menitnya. Kematian maternal 98% terjadi di Negara berkembang dan sebenarnya sebagian besar kematian itu dapat dicegah. Angka kematian maternal di negara - negara maju berkisar antara 20 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan di negara - negara berkembang angka ini hampir 20 kali lebih tinggi yaitu berkisar antara 440 per 100.000 KH. Di wilayah Asia Tenggara diperkirakan terdapat 240.000 kematian maternal setiap tahunnya, sehingga diperoleh angka kematian maternal 210 per KH (WHO, 2003).

Indonesia sebagai Negara berkembang, masih memiliki AKM yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1992 (AKM) di Indonesia 425 per 100.000 KH dan menurun menjadi 375 per KH pada SKRT 1995. Sedangkan pada SKRT 2001, AKM kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 396 per KH dan dari SDKI 2002 / 2003 AKM menjadi sebesar 307 per 100.000 KH dan dari SDKI 2002 sampai dengan 2003 AKM menjadi 307 per 100.000 KH. Hal ini menunjukkan bahwa AKM di Indonesia cenderung stagnan. AKM di Indonesia bila di bandingkan dengan AKM di seluruh dunia tampak hampir sama dan akan tampak jauh berbeda bila dibandingkan dengan negara – negara maju atau bahkan dengan negara – negara di Asia Tenggara (Djaja S, 2003).

AKM di Sulawesi Selatan menurut hasil Survei Kesehatan Daerah (SKD) tahun 2006 menunjukkan angka sebesar 133 per 100.000 KH. Tahun 2007 sebesar 143 per 100.000 KH. Tahun 2008 sebesar 121 per 100.000 KH. Tahun 2009 sebesar 118 per 100.000 KH. Kematian tersebut terdiri dari ibu hamil (19%), Kematian Ibu bersalin (46%) dan kematian ibu nifas (35%) (Dinkes Sul – Sel, 2010).

Penyebab terpenting kematian maternal di Indonesia adalah perdarahan 40 sampa dengan 60%, infeksi 20 sampai dengan 30% dan keracunan kehamilan 20 sampai dengan 30%, sisanya sekitar 5% disebabkan penyakit lain yang memburuk saat kehamilan atau persalinan. Perdarahan sebagai penyebab kematian ibu terdiri atas perdarahan antepartum dan perdarahan postpartum. Perdarahan antepartum merupakan kasus gawat darurat yang kejadiannya

berkisar 3% dari semua persalinan, penyebabnya antara lain plasenta previa, solusio plasenta, dan perdarahan yang belum jelas sumbernya (Nina, 2008).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kematian maternal. WHO pada tahun 1999 memprakarsai program *Making Pregnancy Safer (MPS)*, untuk mendukung negara – negara anggota dalam usaha untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan maternal akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. MPS merupakan komponen dari prakarsa *Safe Matherhood* yang dicanangkan pada tahun 1987 oleh WHO untuk menurunkan kematian maternal, namun demikian AKM di dunia masih tinggi. Berbagai konferensi dunia yang diselenggarakan untuk membahas tentang kematian maternal telah banyak dilakukan dengan tujuan untuk merumuskan strategi menurunkan kematian maternal, mulai dari konferensi tentang kematian di Nairobi, Kenya tahun 1987, *World Summit for Children* di New York tahun 1990, *The International Conference on population and Devolopment (ICPD)* pada tahun 1994 sampai dengan yang terakhir *The Millenium Summit in 2000*, dimana semua anggota PBB berkomitmen dengan *Millenium Development Goals* untuk menurunkan tiga perempat angka kematian maternal pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kematian maternal merupakan permasalahan masyarakat global yang menjadi prioritas utama (UNFPA, 2003).

Upaya penurunan angka kematian maternal di Indonesia telah banyak dilakukan. Kebijakan Depertemen Kesehatan RI dalam upaya *Safe Matherhood*, yaitu pelayanan kesehatan berencana, Pelayanan antenatal,

persalinan yang bersih dan aman, dan pelayanan obstetric esensial. *Safe Matherhood* yang dicanangkan pemerintah Indonesia Pada tahun 1988 adalah penurunan AKM menjadi 225 per 100.000 KH pada tahun 2000. Selanjutnya dengan dicanangkan Gerakan Nasional Kehamilan yang Aman (*Making Pregnancy Safer*) pada tahun 2000 maka target penurunan AKM pada tahun 2010 adalah 125 per 100.000 KH, dan pada tahun 2015 diharapkan angka kematian maternal telah mencapai 80 per 100.000 KH. Dalam perkembangannya, penurunan angka kematian maternal yang dicapai tidak seperti yang diharapkan. Sehingga pada tanggal 26 januari 2012 Pemerintah Indonesia dengan USAID Launcihng program *Expanding Maternal Survical (EMAS)* yang diharapkan memberi dampak yang nyata dengan menurunkan AKM dan AKB di Indonesia secara absolute pada tahun 2012 sampai dengan 2016 (Arisman, 2004).

AKM di Kabupaten Pangkep pada tahun 2005 sampai dengan 2009 cenderung mengalami penurunan kecuali pada tahun 2007 ada sedikit peningkatan dari tahun 2006. Jumlah ibu mati pada tahun 2006 ada 6 orang atau 1,28 per 1000 Kelahiran Hidup, tahun 2007 meningkat menjadi 7 orang atau 0,13 per 1000 Kelahiran Hidup, tahun 2008 ada 6 kematian atau 1,1 per 1000 Kelahiran Hidup dan pada tahun 2009 mengalami lagi penirunan yang sangat drastis yaitu dengan 1 kematian atau 0,18 per 1000 Kelahiran Hidup.

Jumlah kematian ibu pada tahun 2010 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1 orang menjadi 3 orang atau meningkat menjadi 0,52 per 1000 Kelahiran Hidup. Dimana ada satu kematian ibu yang berasal dari wilayah

kepulauan yang masih memerlukan intervensi mendalam baik dari Sumber Daya Manusia maupun sarana (Dinkes Kab. Pangkep, 2012). Oleh karena itu, hal ini menjadi pertimbangan utama bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Gambaran Penyebab Terjadinya Kematian Maternal Di Kabupaten Pangkep”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Gambaran Penyebab Terjadinya Kematian Maternal Di Kabupaten Pangkep?”.

Permasalahan dijabarkan dalam beberapa sub permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kejadian perdarahan yang menyebabkan kematian maternal di Kabupaten Pangkep.
2. Bagaimana gambaran kejadian infeksi yang menyebabkan kematian maternal di Kabupaten Pangkep.
3. Bagaimana gambaran kejadian preeklamsia yang menyebabkan kematian maternal di Kabupaten Pangkep.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Diketuinya gambaran penyebab terjadinya kematian maternal di Kabupaten Pangkep.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya gambaran kejadian perdarahan yang menyebabkan terjadinya kematian maternal.
- b. Diketuainya gambaran kejadian infeksi yang menyebabkan terjadinya kematian maternal
- c. Diketuainya gambaran kejadian preeklamsia yang menyebabkan terjadinya kematian maternal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, seperti:

1. Secara Teoritis

Penelitian tentang gambaran penyebab terjadinya kematian maternal akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu keperawatan, khususnya ilmu keperawatan maternitas

2. Secara Praktis

a. Bagi ibu hamil

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ibu hamil, melahirkan dan nifas untuk menghindari terjadinya kematian maternal dan menurunkan AKM.

b. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan merupakan bahan bacaan bagi Mahasiswa

Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep

Sebagai bahan masukan dalam hal perencanaan dan penanggulangan terjadinya kematian maternal dan diharapkan para dokter dan bidan memantau ibu hamil, bersalin dan nifas.

d. Bagi peneliti sendiri

Peneliti dapat memperoleh pengetahuan nyata yaitu gambaran penyebab terjadinya kematian maternal sehingga dapat menambah wawasan peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Definisi Kehamilan

Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin yang dimulai sejak konsepsi dan berakhir sampai terjadinya permulaan persalinan (Manuaba, 2004).

Kehamilan merupakan hasil konsepsi antara ovum atau sel telur dengan spermatozoa. Lama kehamilan terjadi mulai sejak konsepsi sampai partus adalah 280 hari atau 40 minggu dan antara tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu. Kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur. Kehamilan antara 28 sampai 36 minggu disebut premature (Farrer, 2001).

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua yaitu dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan (Saifuddin, dkk, 2006).

Kehamilan adalah masa seorang ibu membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Dalam kehamilan dapat terjadi banyak gestasi yakni misalnya dalam kasus kembar atau triplet.

Kehamilan terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran atau 38 minggu dari pembuahan. Istilah medis untuk wanita hamil adalah gravid, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio (minggu-minggu awal) dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida atau gravida 1. Seorang wanita yang belum pernah hamil dikenal sebagai gravida 0 (Farrer, 2001).

2. Pandangan Islam Tentang Kehamilan

a. Proses Kejadian Manusia

Allah S.W.T. sebagai pencipta makhluk, telah menjelaskan proses demi proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang perempuan. Proses perubahan janin dari setetes mani hingga menjadi manusia yang sempurna. Sebelum teknologi berkembang, hal itu merupakan perkara ghaib yang tidak diketahui oleh manusia, karena letaknya yang sangat dalam. Belum ada alat yang dapat menjangkau hingga ke dalam rahim tersebut (Thalbah, 2009).

Al-Qur'an menjelaskan proses kejadian manusia sebagai berikut :

- 1) Manusia diciptakan Allah S.W.T. Berasal dari saripati tanah, (QS. Al Hijr (15) : 28).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَلِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصَلٍ مِّنْ حَمٍَٔ

مَّسْنُونٍ

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk” (AlQur’an dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas menjelaskan peristiwa kejadian atau kehidupan manusia di persada bumi ini. Betapa mengagumkan Allah S.W.T. dalam ciptaan-Nya. Dia menciptakan dari unsur-unsur yang remeh dan menjijikkan yaitu dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam menjadi satu makhluk yakni Manusia (Quraisy Shihab, 2002).

- 2) Dari segumpal tanah lalu menjadi nutfah (didalam rahim), segumpal darah, segumpal daging, tulang dibungkus dengan daging dan akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna (QS.Almu'minun (23) : 12-14).

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءآخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12), kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13), kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu

tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik (14). (Al-Qur'an dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas menjelaskan kuasa Allah S.W.T. menciptakan manusia melauai tujuh tahap proses kejadian manusia yang sangat mengagumkan sehingga ia lahir di bumi ini. Allah S.W.T. juga mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat-Nya. Proses penciptaan manusia yang mengagumkan tersebut membuktikan perlunya beriman dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta (Ibnu Qasir, 2002).

- 3) Ditiupkan Ruh (QS. Al Hijr (15) : 29).

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud, (Al-Qur'an dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika Allah S.W.T telah menyempurnakan bentuknya (manusia) dengan sebaik-baiknya, akan ditiupkan ke dalamnya roh ciptaan-Nya yang dapat mengantar manusia lebih mampu mengenal Allah S.W.T. Sehingga manusia akan lebih beriman, berbudi luhur, serta berperasaan halus (Ibnu Qasir, 2002).

- 4) Sebelum Ruh ditiupkan, ketika masih di alam ruh, manusia telah berjanji mentauhidkan Allah (QS. Al A'raf (7) : 172).

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
 أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُوا يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Terjemahnya:

dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",(Al-Qur'an dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika manusia masih berada dalam rahim ibunya, manusia sudah berjanji akan mentauhidkan Allah S.W.T. sebelum ia lahir di muka bumi ini.

Ayat-ayat di atas menerangkan tahap-tahap penciptaan manusia dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Hal tersebut menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan-Nya sehingga *Allah Jalla wa 'Alaa* saja yang berhak untuk disembah (Al Atsari, 2010). "*Allah Jalla wa Alaa*" adalah Allah Maha Agung dan di Atas segala-galanya. Kata "jalla" merupakan kata kerja intransitif yang kata sifatnya adalah "jalil" yang artinya "agung". Kata "Wa" artinya adalah "dan". Kata "Alaa" artinya adalah

“Di Atas”. Sehingga jika digabungkan kata-kata “Jalla wa Alaa” berarti Allah Yang Maha Agung dan di Atas Segala-galanya.

Selama 160 hari yaitu selama 16 minggu (4 bulan) telah terjadi perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut antara lain bentuk kepala masih dominan, wajah menyerupai manusia, pada pemeriksaan kasar mata dan telinga serta hidung mulai menyerupai bentuk sebenarnya, perbandingan lengan sampai kaki sesuai serta muncul rambut pada bagian kepala.

Usia kehamilan 20 minggu terjadi perkembangan antara lain tungkai sangat bertambah panjang, mulai terlihat kelenjar sebacea, hidung dan telinga membentuk tulang, secara kasar otak terbentuk dan gerakan janin cukup kuat untuk dapat dirasakan ibu. Kehamilan 24 minggu terjadi perkembangan yakni tubuh janin menjadi langsing tetapi dengan perbandingan sesuai, kulit menjadi merah dan berkeriput, pembentukan kelenjar keringat, pembentukan darah meningkat dalam sum-sum tulang dan janin dapat mendengar.

Usia kehamilan 28 minggu terjadi perkembangan yakni badan langsing, keriput berkurang dan berwarna merah, terbentuk kuku, kelopak mata terbuka kembali, lapisan retina selesai dibentuk, dapat menerima cahaya dan pupil dapat bereaksi terhadap cahaya.

Usia kehamilan 30 sampai 31 minggu terjadi perkembangan yakni lemak subkutan mulai terkumpul, tampak lebih bulat, kulit merah muda dan licin, mengambil posisi persalinan, dapat menengok ke

samping, sadar akan suara dari luar tubuh ibu dan testis turun ke dalam skrotum.

Usia kehamilan 36 minggu terjadi perkembangan yakni kulit janin berwarna merah muda, tubuh bulat, tubuh biasanya gemuk, dapat membalik dan mengangkat kepala. Usia kehamilan 40 minggu terjadi perkembangan yakni kulit halus dan berwarna merah muda, rambut sedang atau banyak, tampak tulang rawan hidung dan cuping hidung, gerakan aktif dan perlahan, tonus baik, dapat mengangkat kepala, percabangan paru-paru, siklus tidur sampai bangun teratur, testis di dalam skrotum dan labia mayora berkembang baik (Lamadhah, 2009).

Diungkapkan dalam Hadits Rasulullah S.A.W mengenai proses penciptaan manusia yaitu:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِزْوَانَ بْنِ رِزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ (أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عُلَقَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلُ ذَلِكَ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Artinya :

“Dari Abu Abdirahman, Abdullah Bin Mas’ud, ia berkata, “Rasulullah S.A.W, orang yang benar (Ash Shadiq) lagi dibenarkan (Al Mashduq), bercerita kepada kami, “Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut (rahim) ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk nutfah. Kemudian menjadi ‘Alaqah selama empat puluh hari juga. Kemudian menjadi mudhghah selama empat puluh hari juga. Setelah itu, ada seorang malaikat yang diutus padanya, kemudian ia meniupkan ruh kepadanya”, (Riwayat Bukhari Muslim).

b. Hubungan Antara Menyusui dan Kehamilan

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan pokok dan paling baik bagi anak terutama ketika hari-hari pertama kelahirannya. Islam telah menegaskan kepada orang tua agar memberikan ASI yang cukup kepada anaknya hingga usia 2 tahun (Al Atsari, 2010). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 233, yaitu:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَ آتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, (Al-Qur'an dan terjemahan, 2010).

Al-Qur`an dengan tegas menyebutkan bahwa waktu yang ideal adalah dua tahun. Hal ini dikarenakan di balik perintah al-Qur`an mengandung pesan yang ideal. Selama kurun waktu dua tahun, bayi mudah terserang penyakit dan kandungan ASI bisa melawan serangan penyakit yang hendak menyerang tubuh sang bayi. ASI juga memiliki manfaat besar membentuk perkembangan intelensia, rohani serta perkembangan emosional sang bayi. Dekapan ibu ketika menyusui bayinya bisa bersentuhan langsung dengan ibu dan mendapat kehangatan kasih sayang dan rasa aman (Quraisy Shihab, 2002).

3. Tanda - Tanda Kehamilan

Seorang wanita dikatakan hamil perlu dilakukan pemeriksaan sebelumnya terhadap data subyektif dan obyektif pada wanita tersebut. Data subyektif artinya segala sesuatu yang dirasakan atau dialami oleh wanita yang sedang hamil atau sering disebut dengan gejala kehamilan. Data obyektif adalah segala hal yang dapat diamati oleh orang lain pada diri seorang wanita yang sedang hamil atau diistilahkan dengan tanda kehamilan. Firman Allah S.W.T. dalam QS. Al-Imran (3) : 41 yaitu:

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ قَالَ ءَايَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا
وَأَذْكُرَ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Berkata Zakariya: "Berilah aku suatu tanda (bahwa isteriku telah mengandung)". Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari", (Al-Qur'an dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah S.W.T. memberikan Zakariya tanda atas kehamilan istrinya. Tanda istri Zakariya mengandung ialah bahwa Zakariya sendiri tidak dapat berbicara dengan orang lain selama tiga hari. Selama tiga hari itu dia hanya dapat mempergunakan isyarat dengan tangan dan kepala, Zakariya tidak lalai dari berzikir dan bertasbih kepada Allah. Allah S.W.T. menjadikan Zakaria tidak bisa berbicara selama tiga hari agar seluruh waktunya dipergunakan untuk zikir dan bertasbih kepada-Nya sebagai pernyataan syukur yang hakiki (Quraishy Shihab, 2002).

a. Tanda dugaan kehamilan

1) Amenore (terlambat datang bulan)

2) Mual dan muntah.

Hal ini terjadi karena pengaruh estrogen dan progesteron yakni terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan

3) Ngidam

4) Sinkope atau pingsan.

Hal ini terjadi karena gangguan sirkulasi ke daerah kepala (sentral) menyebabkan iskemia susunan saraf dan menimbulkan sinkope.

5) Payudara tegang.

Hal ini terjadi karena pengaruh estrogen, progesteron dan somatomamotropin menimbulkan deposit lemak dan air serta garam pada payudara.

6) Sering miksi.

Hal ini terjadi karena desakan rahim ke depan menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh dan sering miksi.

7) Konstipasi atau Obstipasi.

Hal ini terjadi karena pengaruh progesteron yakni menghambat peristaltik usus menyebabkan kesulitan untuk buang air besar.

8) Pigmentasi kulit pada daerah pipi, dinding perut dan sekitar payudara

9) Varices atau penampakan pembuluh darah vena (Manuaba, 2004).

b. Tanda-tanda Kemungkinan Kehamilan

1) Perut membesar

2) Uterus membesar

3) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif

c. Tanda Pasti Kehamilan

1) Gerakan janin dalam rahim : Terlihat atau teraba gerakan janin dan teraba bagian – bagian janin.

2) Denyut jantung janin, didengar dengan stetoskop laenec, alat kardiografi, alat doppler (Manuaba, 2004).

4. Perubahan Fisiologi Kehamilan

Secara fisiologi ibu mengalami perubahan nyata untuk menunjang perkembangan janin dan sebagai persiapan ibu dalam persalinan dan laktasi.

Perubahan fisiologi pada ibu selama kehamilan tersebut antara lain :

a. Payudara

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. Perubahan payudara tersebut disebabkan karena adanya pengaruh hormon Estrogen dan Progesteron serta Somatomammotropin.

Hormon Estrogen berfungsi menimbulkan penimbunan lemak dan air serta garam sehingga payudara tampak makin membesar, tekanan sistem saraf akibat penimbunan lemak, air dan garam menyebabkan rasa sakit pada payudara.

Hormon Progesteron berfungsi mempersiapkan asinus sehingga dapat berfungsi dan menambah jumlah sel asinus. Hormon Somatomammotropin berfungsi melakukan penimbunan lemak sekitar alveolus payudara dan merangsang pengeluaran kolostrum pada kehamilan.

b. Rahim atau Uterus

Pertumbuhan uterus yang fenomenal pada trimester pertama berlanjut sebagai respon terhadap stimulus kadar hormon estrogen dan progesteron. Rahim yang semula besarnya sejempol atau beratnya 30 gram akan mengalami hipertropi dan hiperplasia sehingga menjadi seberat 1000 gram saat akhir kehamilan. Pada minggu ke tujuh ukuran

uterus sebesar ayam negeri, pada minggu ke 10 uterus mencapai ukuran buah jeruk, pada minggu ke 12 uterus mencapai ukuran buah grafepruit (jeruk asam yang berwarna kuning yang besarnya sekitar dua kali jeruk biasa), dan pada minggu ke 40 gestasi. Uterus juga mengalami perubahan berat dan posisi. Dinding - dinding otot menguat dan menjadi lebih elastis. Selama trimester kedua bentuk uterus bulat. Hal ini dikarenakan janin yang memanjang, uterus menjadi lebih besar, lebih lonjong dan membesar keluar rongga panggul menuju rongga abdomen.

c. Vagina

Hormon kehamilan mempersiapkan vagina supaya distensi selama persalinan dengan memproduksi mukosa vagina yang tebal. Peningkatan vaskularisasi menimbulkan warna kebiru-biruan yang disebut tanda chadwicks suatu tanda kehamilan dan dapat muncul pada minggu keenam, tetapi dengan mudah terlihat pada minggu ke 8 kehamilan (Hamilton, 2004).

B. Proses Persalinan Dan Perawatan Masa Nifas

1. Proses Persalinan Normal

Proses melahirkan normal akan terjadi ketika usia kandungan sudah mencapai kurang lebih 9 bulan 10 hari. Persalinan ini berarti dilakukan tanpa melalui operasi yang kita kenal dengan istilah medis bedah caesar. Pada kelahiran normal, bayi akan keluar berdasarkan tanggal yang sudah diperhitungkan sejak awal kehamilan. Kita tahu bahwa

kelahiran normal biasanya diartikan sebagai kelahiran spontan dimana bayi keluar melewati liang vagina (Hamilton 1995).

Proses persalinan terbagi ke dalam empat tahap, yaitu :

a. Kala I (Tahap Pembukaan)

In partu (partus mulai) ditandai dengan lendir bercampur darah, karena serviks mulai membuka dan mendatar. Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler sekitar karnalis servikalis karena pergeseran ketika serviks mendatar dan terbuka. Pada kala ini terbagi atas dua fase yaitu:

Fase laten: dimana pembukaan serviks berlangsung lambat, sampai pembukaan 3 cm.

Fase aktif: yang terbagi atas 3 subfase yaitu akselerasi, steady dan deselerasi.

Kala I adalah tahap terlama, berlangsung 12 - 14 jam untuk kehamilan pertama dan 6 - 10 jam untuk kehamilan berikutnya. Pada tahap ini mulut rahim akan menjadi tipis dan terbuka karena adanya kontraksi rahim secara berkala untuk mendorong bayi ke jalan lahir. Pada setiap kontraksi rahim, bayi akan semakin terdorong ke bawah sehingga menyebabkan pembukaan jalan lahir. Kala I persalinan disebut lengkap ketika pembukaan jalan lahir menjadi 10 cm, yang berarti pembukaan sempurna dan bayi siap keluar dari rahim. Masa transisi ini menjadi masa yang paling sangat sulit bagi ibu. Menjelang berakhirnya kala I, pembukaan

jalan lahir sudah hampir sempurna. Kontraksi yang terjadi akan semakin sering dan semakin kuat. Anda mungkin mengalami rasa sakit yang hebat, kebanyakan wanita yang pernah mengalami masa inilah yang merasakan masa yang paling berat. Anda akan merasakan datangnya rasa mulas yang sangat hebat dan terasa seperti ada tekanan yang sangat besar ke arah bawah, seperti ingin buang air besar. Menjelang akhir kala pertama, kontraksi semakin sering dan kuat, dan bila pembukaan jalan lahir sudah 10 cm berarti bayi siap dilahirkan dan proses persalinan memasuki kala II.

b. Kala II (Tahap Pengeluaran Bayi)

Pada kala pengeluaran janin, rasa mulas terkordinir, kuat, cepat dan lebih lama, kira-kira 2 - 3 menit sekali. Kepala janin turun masuk ruang panggul sehingga terjadilah tekanan pada otot - otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa mencedan. Anda merasa seperti mau buang air besar, dengan tanda anus terbuka. Pada waku mencedan, kepala janin mulai kelihatan, vulva (bagian luar vagina) membuka dan perineum (daerah antara anus dengan vagina) meregang. Dengan mencedan terpimpin, akan lahirlah kepala diikuti oleh seluruh badan janin. Ibu akan merasakan tekanan yang kuat di daerah perineum. Daerah perineum bersifat elastis, tapi bila dokter/bidan memperkirakan perlu dilakukan pengguntingan di daerah perineum (episiotomi),

maka tindakan ini akan dilakukan dengan tujuan mencegah perobekan paksa daerah perineum akibat tekanan bayi.

c. Kala III (Tahap Pengeluaran Plasenta)

Dimulai pada saat bayi telah lahir lengkap. berakhir dengan lahirnya plasenta. Kelahiran plasenta : lepasnya plasenta dari insersi pada dinding uterus, serta pengeluaran plasenta dari kavum uteri.

Lepasnya plasenta dari insersinya : mungkin dari sentral (*Schultze*) ditandai dengan perdarahan baru, atau dari tepi / marginal (*Matthews-Duncan*) jika tidak disertai perdarahan, atau mungkin juga serempak sentral dan marginal. Pelepasan plasenta terjadi karena perlekatan plasenta di dinding uterus adalah bersifat adhesi, sehingga pada saat kontraksi mudah lepas dan berdarah. Pada keadaan normal, kontraksi uterus bertambah keras, fundus setinggi sekitar / di atas pusat. Plasenta lepas spontan 5-15 menit setelah bayi lahir (jika lepasnya plasenta terjadi sebelum bayi lahir, disebut *solusio/abruptio placentae* – keadaan gawat darurat obstetrik).

d. Kala IV (Tahap Observasi Pascapersalinan)

Sampai dengan 1 jam postpartum, dilakukan observasi. 7 pokok penting yang harus diperhatikan pada kala 4 :

- 1) kontraksi uterus harus baik,
- 2) tidak ada perdarahan pervaginam atau dari alat genital lain,

- 3) plasenta dan selaput ketuban harus sudah lahir lengkap,
- 4) kandung kencing harus kosong,
- 5) luka-luka di perineum harus dirawat dan tidak ada hematoma,
- 6) resume keadaan umum bayi, dan
- 7) resume keadaan umum ibu (Manuaba, 2004).

2. Perawatan Masa Nifas

Perawatan masa nifas adalah perawatan terhadap wanita hamil yang telah selesai bersalin sampai alat – alat kandungan kembali seperti sebelum hamil, lamanya kira – kira 6 – 8 minggu. Akan tetapi, seluruh alat genitalia baru pulih kembali seperti sebelum ada kehamilan dalam waktu 3 bulan.

Perawatan masa nifas dimulai sebenarnya sejak kala uri dengan menghindarkan adanya kemungkinan – kemungkinan perdarahan postpartum dan infeksi. Bila ada perlukaan jalan lahir atau luka bekas episiotomi, lakukan penjahitan dan perawatan luka dengan sebaik – baiknya. Penolong persalinan harus tetap waspada sekurang – kurangnya 1 jam setelah melahirkan, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya perdarahan postpartum.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan masa nifas :

a. Mobilisasi

Umumnya wanita sangat lelah setelah melahirkan, lebih – lebih bila persalinan berlangsung lama, karena si ibu harus cukup

beristirahat, dimana ia harus tidur terlentang selama 8 jam postpartum untuk mencegah perdarahan postpartum. Kemudian ia boleh miring ke kiri dan ke kanan untuk mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli. Pada hari kedua telah dapat duduk, hari ketiga telah dapat jalan – jalan dan hari keempat dan kelima boleh pulang. Mobilisasi ini tidak mutlak, bervariasi tergantung pada adanya komplikasi persalinan, nifas, dan sembuh luka.

b. Diet / Makanan

Makanan yang diberikan harus bermutu tinggi dan cukup kalori, yang mengandung cukup protein, banyak cairan, serta banyak buah – buahan dan sayur – sayuran karena si ibu ini mengalami hemokonsentrasi.

c. Buang Air Kecil

Buang air kecil harus secepatnya dilakukan sendiri. Kadang – kadang wanita sulit kencing karena pada persalinan *m. sphincter vesicae et urethrae* mengalami tekanan oleh kepala janin dan spasme oleh iritasi *much. Sphincter ani*. Juga oleh karena adanya udem kandung kemih yang terjadi selama persalinan. Bila kandung kemih penuh dengan sulit kencing sebaiknya lakukan kateterisasi, sebab hal ini dapat mengundang terjadinya infeksi. Bila infeksi telah terjadi, maka pemberian antibiotika sudah pada tempatnya.

d. Buang Air Besar

Buang air besar harus sudah ada dalam 3 – 4 hari postpartum. Bila ada obstipasi dan timbul berak yang keras, dapat kita lakukan pemberian obat pencahar (laxantia) peroral atau parenteral, atau dilakukan klisma bila masih belum berakhir. Karena jika tidak, feses dapat tertimbun di rektum, dan menimbulkan demam.

e. Demam

Sesudah bersalin, suhu badan ibu naik $\pm 0,5$ C dari keadaan normal, tetapi tidak melebihi 38 C. Dan sesudah 12 jam pertama suhu badan akan kembali normal. Bila suhu lebih dari 38 C, mungkin telah ada infeksi.

f. Kontraksi

Hal ini timbul akibat kontraksi uterus dan biasanya lebih terasa sedang menyusui. Hal ini dialami selama 2 – 3 hari sesudah bersalin. Perasaan sakit ini timbul bila masih ada sisa selaput ketuban, plasenta atau gumpalan dari cavum uteri. Bila si ibu sangat mengeluh, dapat diberikan analgetik atau sedativa supaya ia dapat beristirahat tidur.

g. Laktasi

Jam sesudah persalinan si ibu disuruh mencoba menyusui bayinya untuk merangsang timbulnya laktasi, kecuali adas kontraindikasi untuk menyusui bayinya, misalnya: menderita thypus abdominalis, tuberkulosis aktif, DM berat, psikosi atau

puting susu tertarik ke dalam, leprae atau kelainan pada bayinya sendiri misalnya pada bayi sumbing (*labiognato palatoschizis*) sehingga ia tidak dapat menyusu oleh karena tidak dapat menghisap, minuman harus diberikan melalui sonde.

C. Tinjauan Umum Tentang kematian Maternal

1. Defenisi Kematian Maternal

Kematian maternal menurut batasan dari *The Tenth Revision of The International Classification of diseases* (ICD-10) adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tidak bergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya, tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (Hariono, 2000).

Batasan 42 hari dapat berubah, karena seperti telah diketahui bahwa dengan adanya prosedur – prosedur dan teknologi baru maka terjadinya kematian dapat diperlama dan ditunda, sehingga ICD – 10 juga memasukkan suatu kategori baru yang disebut kematian maternal lambat (*late maternal death*) yaitu penyebab kematian wanita akibat obstetri langsung atau tidak langsung yang terjadi lebih dari 42 hari tetapi kurang dari satu tahun setelah berakhirnya kehamilan (WHO, 2003).

Kematian maternal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Kematian obstetri langsung (*diret obstetric death*) yaitu kematian yang timbul sebagai akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, yang disebabkan oleh tindakan kelalaian, ketidaktepatan penanganan, atau dari rangkaian peristiwa yang timbul dari keadaan – keadaan tersebut diatas. Komplikasi – komplikasi tersebut meliputi perdarahan antepatum maupun postpartum, preeklamsia / eklamsia, infeksi, persalinan macet dan kematian pada kehamilan muda.
- b. Kematian obstetri tidak langsung (*indirect obstetric death*) yaitu kematian maternal yang diakibatkan oleh penyakit yang sudah diderita sebelum kehamilan atau persalinan atau penyakit yang timbul selama kehamilan yang tidak berkaitan dengan penyebab obstetri langsung, akan tetapi diperburuk oleh pengaruh fisiologi akibat kehamilan, sehingga keadaan penderita menjadi semakin buruk. Kematian obstetri tidak langsung ini disebabkan misalnya oleh karena hipertensi, penyakit jantung, diabetes, hepatitis, anemia, malaria, tuberkolosis, HIV / AIDS, dan lain – lain (Saifuddin AB, 2006).

2. Epidemiologi Kematian Maternal

Menurut WHO, setiap tahun kurang lebih terdapat 210 juta wanita hamil di seluruh dunia. Lebih dari 20 juta jiwa wanita mengalami kesakitan akibat dari kehamilannya, beberapa diantaranya bersifat menetap. Kehidupan 8 juta wanita di seluruh dunia menjadi terancam dan setiap tahun diperkirakan terdapat 529.000 wanita meninggal sebagai akibat kompliasi yang timbul karena kehamilan dan

persalinan, dimana sebagian besar dari kematian ini sebenarnya dapat dicegah (UNFPA, 2004).

Penyebab langsung kematian maternal di Indonesia adalah perdarahan 40 sampai dengan 60 persen, infeksi 20 sampai dengan 30 persent dan keracunan kehamilan 20 sampai dengan 30 persen, sisanya sekitar 5 persen disebabkan penyakit lain yang memburuk saat kehamilan atau persalinan. Perdarahan sebagai penyebab kematian ibu terdiri atas perdarahan antepartum dan perdarahan postpartum. Perdarahan antepartum merupakan kasus gawat darurat yang kejadiannya berkisar 3 persen dari semua persalinan, penyebabnya antara lain plasenta previa, solusio plasenta, dan perdarahan yang belum jelas sumbernya (Nina, 2008).

Keadaan ibu pra – hamil dapat berpengaruh terhadap kehamilannya. Penyebab tidak langsung kematian maternal ini antara lain adalah anemia, kurang energi kronis (KEK) dan keadaan “4 terlalu” (terlalu muda atau tua, terlalu sering dan terlalu banyak) (Saifudin AB, 2000).

3. Faktor Penyebab Kematian Maternal

a. Perdarahan

Perdarahan didefinisikan sebagai hilangnya 500 ml atau lebih darah. Perdarahan terjadi semasa kehamilan, saat melahirkan dan setelah melahirkan. Perdarahan terdiri dari perdarahan antepartum dan perdarahan postpartum (Verneys, Heien, 2002).

1) Perdarahan antepartum

Perdarahan antepartum adalah perdarahan pervaginam yang terjadi pada kehamilan antara 28 minggu sampai sebelum bayi lahir. Perdarahan antepartum merupakan komplikasi kehamilan dengan frekuensi sekitar 5 sampai dengan 10 persen. Perdarahan antepartum merupakan keadaan gawat darurat kebidanan yang dapat mengakibatkan kematian pada ibu maupun janin dalam waktu singkat (Royston E, 1998).

Penyebab perdarahan antepartum yang berbahaya pada umumnya bersumber pada kelainan plasenta, yaitu plasenta previa dan solusio plasenta, sedangkan perdarahan antepartum yang tidak bersumber pada kelainan plasenta, misalnya perdarahan akibat kelainan pada serviks uteri dan vagina pada umumnya tidak seberapa berbahaya, karena kehilangan darah yang terjadi relatif sedikit dan tidak membahayakan nyawa ibu dan janin, kecuali perdarahan akibat invasif serviks uteri (Wibowo, 2004).

Plasenta previa adalah keadaan dimana plasenta terletak abnormal yaitu pada segmen bawah uterus, sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh *ostium uteri internum*. Keadaan ini mengakibatkan perdarahan pervaginam pada kehamilan 28 minggu atau lebih, karena segmen bawah uterus telah terbentuk, dan dengan bertambah tuanya kehamilan, segmen bawah uterus akan lebih melebar dan serviks mulai membuka. Pelebaran segmen bawah uterus

dan pembukaan serviks akan menyebabkan terlepasnya sebagian plasenta dari dinding uterus, sehingga mengakibatkan perdarahan. Perdarahan ini tidak dapat dihindarkan karena ketidakmampuan serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi menghentikan perdarahan. Perdarahan yang terjadi tanpa alasan dan tanpa rasa nyeri merupakan gejala utama dan pertama dari plasenta previa. Perdarahan yang terjadi pertama kali pada umumnya sangat ringan dan segera berhenti, yang disusul dengan perdarahan berikutnya, dan biasanya terjadi semakin berat, darah berwarna merah segar, berlainan dengan perdarahan pada solusio plasenta yang berwarna kehitaman (Royston E, 1998).

Solusio plasenta merupakan keadaan terlepasnya plasenta dari tempat insersinya yang normal, diantara usia kehamilan 28 minggu sampai sebelum janin lahir. Perdarahan dapat terjadi dari pembuluh darah plasenta atau pembuluh darah uterus yang akan membentuk hematoma, sehingga plasenta terdesak dan akhirnya terlepas. Pada umumnya perdarahan akan terus – menerus, oleh karena otot uterus yang telah meregang oleh kehamilan tidak mampu untuk lebih berkontraksi untuk menghentikan perdarahan (Wibowo, 2004).

2) Perdarahan Postpartum

Perdarahan, terutama perdarahan postpartum memberikan kontribusi 25% pada kematian maternal, khususnya ibu menderita anemia akibat keadaan kurang gizi atau adanya infeksi malaria.

Insidensi perdarahan postpartum berkisar antara 5 sampai dengan 8 persen. Perdarahan ini berlangsung tiba – tiba dan kehilangan darah dapat dengan cepat menjadi kematian pada keadaan dimana tidak terdapat perawatan awal untuk mengendalikan perdarahan, baik berupa obat, tindakan pemijatan uterus untuk merangsang kontraksi, dan transfusi darah bila diperlukan (WHO, 2004).

Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi setelah anak lahir dan jumlahnya melebihi 500 ml. Perdarahan dapat terjadi sebelum, saat atau setelah plasenta keluar. Hal – hal yang menyebabkan perdarahan postpartum adalah atonia uteri, perlukaan jalan lahir, terlepasnya sebagian plasenta dari uterus, tertinggalnya sebagian dari plasenta, dan kadang – kadang perdarahan juga disebabkan oleh kelainan proses pembekuan darah akibat *hipofibrinogenemia* yang terjadi akibat solusio plasenta, retensi janin mati dalam uterus dan emboli air ketuban (Martohoesodo S, 2001).

b. Infeksi

1) Infeksi Pada Kehamilan

Infeksi pada kehamilan adalah infeksi jalan lahir pada masa kehamilan, baik pada kehamilan muda maupun tua. Infeksi dapat terjadi oleh sebab langsung yang berkaitan dengan kehamilan, atau akibat infeksi lain di sekitar jalan lahir. Infeksi pada kehamilan muda adalah infeksi jalan lahir yang terjadi pada kehamilan kurang dari 20 – 22 minggu. Penyebab yang paling sering terjadi adalah

abortus yang terinfeksi. Infeksi jalan lahir pada kehamilan tua adalah infeksi yang terjadi pada kehamilan trimester II dan III. Infeksi jalan lahir ini dapat terjadi akibat ketuban pecah sebelum waktunya, infeksi saluran kencing, misalnya sistitis, nefritis atau akibat penyakit sistemik, seperti malaria, demam tifoid, hepatitis, dan lain – lain (Depkes RI, 2000).

Pada abortus yang tidak lengkap (*abortus inkomplitus*), dimana sebagian hasil konsepsi masih tertinggal dalam uterus, dan pada abortus buatan yang dilakukan tanpa memperlihatkan aseptis dan antiseptis, sering mengakibatkan komplikasi berupa infeksi (*abortus infeksius*). Jika infeksi tidak diatasi, dapat terjadi infeksi yang menyeluruh (terjadi penyebaran kuman atau toksin ke dalam peredaran darah atau peritoneum) sehingga menimbulkan abortus septik. Pada abortus septik, virulensi bakteri tinggi, dan infeksi menyebar ke miometrium, tuba, parametrium, dan peritoneum. Apabila infeksi menyebar lebih jauh, dapat terjadi peritonitis umum atau sepsis, pasien dapat mengalami syok septik.

Risiko kematian maternal akibat abortus septik meningkat pada wanita – wanita yang tidak menikah, wanita usia muda, dan pada mereka yang melakukan prosedur abortus yang tidak secara langsung mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam uterus (Samil, 2006).

2) Infeksi Nifas

Infeksi nifas merupakan keadaan yang mencakup semua peradangan yang disebabkan oleh masuknya kuman – kuman ke dalam alat genital pada waktu persalinan dan nifas. Kuman penyebab infeksi dapat masuk kedalam saluran genital dengan berbagai cara, missal melalui tangan penolong persalinan yang tidak bersih atau penggunaan instrumen yang kotor. Mula – mula infeksi terbatas pada uterus, dimana terdapat rasa nyeri dan nyeri tekan pada perut bagian bawah, dengan cairan vagina yang berbau busuk. Demam, nyeri perut yang bertambah, muntah, nyeri kepala dan kehilangan nafsu makan menandakan terjadinya penyebaran infeksi ke tempat lain. Selanjutnya dapat terjadi abses di tuba fallopi, panggul dan diafragma bagian bawah. Pada kasus yang berat, infeksi dapat menyebar ke dalam aliran darah (septikemia), menimbulkan abses dalam otak, otot dan ginjal. Jika infeksi tidak dikendalikan, selanjutnya dapat terjadi gangguan mental dan koma (Soepardiman, 2004).

Insidensi infeksi nifas berkisar antara 2 sampai dengan 8 persen dari seluruh wanita hamil dan memberikan kontribusi sebesar 8 persen terhadap kejadian kematian maternal setiap tahunnya. Beberapa faktor – predisposisi infeksi nifas adalah keadaan kurang gizi, anemia, higiene persalinan yang buruk, kelelahan ibu, sosial ekonomi rendah, proses persalinan yang

bermasalah seperti partus lama / macet, koriomnionitis, persalinan traumatik, manipulasi yang berlebihan dan kurang baiknya proses pencegahan infeksi (Saifudin, 2000).

c. Preeklamsia (Toksemia Gravidarum)

Kehamilan dapat menyebabkan terjadinya hipertensi pada wanita yang sebelum kehamilannya memiliki tekanan darah normal (normotensi) atau dapat memperberat keadaan hipertensi yang sebelumnya telah ada. Hipertensi pada kehamilan merupakan keadaan pada masa kehamilan yang ditandai dengan terjadinya kenaikan tekanan darah lebih dari 140 / 90 mmHg atau kenaikan tekanan darah sistolik lebih dari 30 mmHg dan atau diastolik lebih dari 15 mmHg. Hipertensi pada kehamilan yang sering dijumpai adalah preeklamsia dan eklamsia (Cunningham, 2003).

Preeklamsia berat dan khususnya eklamsia merupakan keadaan gawat karena dapat mengakibatkan kematian ibu dan janin. Preeklamsia ringan dapat muda berubah menjadi preeklamsia berat, dan preeklamsia berat mudah menjadi eklamsia dengan timbulnya kejang (Depkes RI, 2004).

Tanda khas preeklamsia adalah tekanan darah yang tinggi, ditemukannya protein dalam urin dan pembekuan jaringan (edema) selama trimester II kehamilan. Pada beberapa kasus, keadaan tetap ringan sepanjang kehamilan, akan tetapi pada kasus yang lain, dengan meningkatnya tekanan darah dan jumlah protein dan urin, keadaan

dapat menjadi berat. Terjadi nyeri kepala, muntah, gangguan penglihatan, dan kemudian anuria. Pada stadium akhir dan paling berat terjadi eklamsia, pasien akan mengalami kejang. Jika preeklamsia / eklamsia tidak ditangani secara cepat, akan terjadi kehilangan kesadaran dan kematian maternal (Royston, 1998).

Kematian maternal akibat hipertensi pada kehamilan sering terjadi (merupakan 12% dari seluruh penyebab kematian maternal) dan membentuk satu dari tiga trias penyebab utama kematian maternal, yaitu perdarahan dan infeksi. Menurut perkiraan, di seluruh dunia kurang 50.000 wanita meninggal setiap tahun akibat preeklamsia (Cunningham, 2003).

d. Gangguan Persalinan

1. Distosia (persalinan lama)

Distosia atau persalinan lama, didefinisikan sebagai persalinan yang abnormal atau sulit. Sebabnya dapat dibagi dalam tiga golongan berikut ini:

- a). Kelainan tenaga (kelainan his). His yang tidak normal dalam kekuatan atau sifatnya menyebabkan rintangan pada jalan lahir yang lazim terdapat pada setiap persalinan, tidak dapat diatasi sehingga persalinan mengalami hambatan atau kemacetan.
- b). Kelainan Janin. Persalinan dapat mengalami gangguan atau kemacetan karena kelainan dalam letak atau dalam bentuk janin.

- c). Kelainan jalan lahir. Kelainan dalam ukuran atau bentuk jalan lahir bisa menghalangi kemajuan persalinan atau menyebabkan kemacetan.

2. Ketuban Pecah Dini

Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Sedangkan dalam keadaan normal, selaput ketuban pecah dalam proses persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut ketuban pecah dini pada kehamilan prematur. Dalam keadaan normal 8 – 10 % perempuan hamil aterm akan mengalami ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini prematur terjadi pada 1 % kehamilan.

Ketuban pecah dini dalam persalinan secara umum disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh, bukan karena seluruh selaput ketuban rapuh. Terdapat keseimbangan antara sintesis dan degradasi ekstraselular matriks. Perubahan struktur, jumlah sel, dan katabolisme kolagen menyebabkan aktifitas kolagen berubah dan menyebabkan selaput ketuban pecah.

Komplikasi yang timbul akibat ketuban pecah dini bergantung pada usia kehamilan, dapat terjadi infeksi maternal ataupun neonatal, persalinan prematur, hipoksia karena kompresi

tali pusat, deformitas janin, meningkatkan insiden seksio sesarea, atau gagalnya persalinan (Prawirohardjo, 2009)




BAB III


KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan menjelaskan gambaran penelitian. Kerangka konsep dibuat berdasarkan kerangka teori yang dikemukakan oleh MC Carthy dan Maine 1992 dalam Hasnah (2011) digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan landasan teori di atas maka peneliti membuat kerangka konsep penelitian sebagai berikut:



Keterangan:

 : Variabel yang diteliti

 : Variabel yang tidak diteliti

B. Kerangka Kerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Data kematian maternal di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penyebab terjadinya kematian maternal



Data dianalisis berdasarkan penyebab kematian maternal

Data dianalisis berdasarkan penyebab kematian maternal



Menggambarkan penyebab kematian maternal



Kesimpulan dan saran

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

Defenisi operasional dapat menghindari kesalahpahaman dan membatasi ruang lingkup permasalahan serta menghindari pengambilan data yang tidak terkait dengan penelitian. Defenisi operasional dan kriteria objektif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Defenisi Operasional dan Kriteria Ojektif

No	Penyebab KM	Definisi Operasional	Kriteria Objektif
1	Kematian Maternal	Kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, persalinan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan.	

Tabel 3.1 Defenisi Operasional dan Kriteria Ojektif (Lanjutan)

No	Penyebab KM	Definisi Operasional	Kriteria Objektif
a.	Perdarahan	Perdarahan didefinisikan sebagai hilangnya 500 ml atau lebih darah pada masa hamil, melahirkan dan nifas.	- Perdarahan, bila: kehilangan darah sebanyak ≥ 500 ml. - Tidak Perdarahan, bila: Kehilangan darah sebanyak < 500 ml.
b.	Infeksi	Masuknya kuman – kuman ke dalam alat genital, Pada masa kehamilan, Persalinan, dan nifas.	-Ya: Bila terjadi peningkatan suhu tubuh $> 37^{\circ}\text{C}$ - Tidak: Bila Suhu tubuh 37°C .
c.	Pre eklamsia	Bila ibu hamil, Melahirkan dan nifas Mengalami peningkatan Tekanan darah, odema dan proteinuria.	Ya : - Bila hasil TD $> 140/90$ mmHg. - Odema (+) - Hasil lab. Proteinuria (+) Tidak: -Bila hasil TD $\leq 140/90$ mmHg -Odema (-) -Hasil lab. Proteinuria(-)

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan penyebab kejadian kematian maternal di Kabupaten Pangkep dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2011.

B. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah semua data ibu yang mengalami kematian maternal di Kabupaten Pangkep selama tahun 2010 sampai dengan 2011 dan tercatat dalam data kematian maternal di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep sebanyak 7 responden.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010).

Sampel yang diambil adalah keseluruhan data ibu yang mengalami kematian maternal di Kabupaten Pangkep tahun 2010 sampai dengan 2011 sesuai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep sebanyak 7 responden.

C. Teknik Sampling

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Total Sampling.

D. Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2011.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa angket untuk data sekunder. Berisi identitas ibu, umur, paritas, perdarahan, infeksi dan preeklamsia.

Data untuk penyebab kematian maternal dimana, pengolahan data dengan member kode yaitu dengan kode ya = 2 (dua) terjadi perdarahan, infeksi dan preeklamsia dan tidak terjadi perdarahan, infeksi, dan preeklamsia dengan kode 1 (satu).

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 09 sampai dengan 12 Agustus 2012.

F. Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan penyajian data yang dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentasi dengan pengolahan tabel. Data yang diolah secara sistematis terlebih dahulu dinyatakan dalam langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seleksi

Seleksi bertujuan mengklasifikasi data yang masuk menurut kategori.

2. Editing

Editing merupakan langkah pengecekan kembali terhadap data yang telah masuk dalam usaha melengkapi data yang masih kurang. Memeriksa data, memeriksa jawaban, memperjelas dan melakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan kemudian memeriksa kelengkapan dan kesalahan.

3. Koding

Koding adalah pemberian nilai pada opsi-opsi yang telah lengkap. Setelah proses koding selesai data kemudian ditabulasi atau diolah dalam tabel, selanjutnya diuraikan dari presentasi dan hasil perhitungan tersebut.

4. Tabulasi

Tabulasi adalah penyesuaian data yang merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa sehingga mudah dijumlah, disusun dan ditata untuk disajikan dan dianalisis.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data kematian maternal kemudian menggambarkan penyebab kematian maternal.

H. Etika Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan izin kepada direktur tempat diadakannya penelitian untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilaksanakannya penelitian. Adapun etika dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

1. *Anonimity* (tanpa nama)

Anonimity berarti nama responden tidak dicantumkan pada angket atau kuesioner. Peneliti hanya menuliskan kode pada lembar kuesioner tersebut.

2. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Peneliti menjamin kerahasiaan informasi yang telah diperoleh dari responden, hanya kelompok data tertentu saja yang akan dilaporkan dalam hasil penelitian (Hidayat, 2009).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian *deskriptif analitik* yang bertujuan mendapatkan gambaran penyebab terjadinya kematian maternal di Kabupaten Pangkep periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 09 sampai dengan 12 Agustus 2012. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 7 data ibu yang mengalami kematian maternal dan memenuhi kriteria dengan teknik total sampling. Sesuai dengan penelitian, diperoleh data responden sebagai berikut:

1. Responden 1, 4, dan 5 mengalami kematian maternal karena perdarahan saat hamil dan melahirkan.
2. responden 2, 3 dan 6 mengalami kematian maternal karena preeklamsia saat persalinan dan nifas.
3. responden 7 mengalami kematian maternal karena infeksi saat hamil.

a) Karakteristik Responden

1) Karakteristik Umur Responden

Karakteristik umur responden bervariasi dari umur 20 sampai dengan di atas 35 tahun. Responden yang berumur 20 sampai 35 tahun, sebanyak 3 orang ibu atau sebesar 42,85%. Responden yang berumur > 35 tahun, sebanyak 4 orang ibu atau sebesar 57,14%.

Karakteristik umur responden digambarkan dalam tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Ibu Berdasarkan Umur Ibu Yang Mengalami Kematian Maternal

No.	Umur Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	20 – 35 tahun	3	42,85
2.	>35 tahun	4	57,14
Total		7	100

Sumber: Data Sekunder 2010 – 2011

2) Karakteristik Paritas Responden

Karakteristik paritas responden bervariasi dari paritas 2 – 3 orang anak dan paritas >3 orang anak. Responden pada paritas 2 – 3 orang anak sebanyak 2 orang ibu atau sebesar 28,58%. Responden pada paritas >3 orang anak sebanyak 5 orang ibu atau sebesar 71,42%.

Karakteristik paritas responden digambarkan dalam tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Ibu Berdasarkan Paritas Ibu Yang Mengalami Kematian Maternal

No.	Paritas Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	2 – 3 orang	2	28,58
2.	>3 orang	5	71,42
Total		7	100

Sumber: Data Sekunder 2010 - 2011

b) Kematian Maternal

1. Distribusi Frekuensi Ibu Berdasarkan Penyebab Kematian Maternal di Kabupaten Pangkep

Penyebab kematian Ibu beraneka ragam diantaranya perdarahan, infeksi, dan preeklampsia. Kematian maternal ibu yang disebabkan oleh perdarahan dan preeklampsia sebanyak 6 orang ibu atau masing-masing sebanyak 3 orang ibu atau sebesar 42,85%, sedangkan kematian maternal yang disebabkan oleh infeksi sebanyak 1 orang ibu atau sebesar 12,48%.

Distribusi frekuensi ibu berdasarkan penyebab kematian maternal tersebut digambarkan dalam tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Ibu Berdasarkan Penyebab Kematian Maternal di Kabupaten Pangkep Tahun 2010 – 2011.

No.	Penyebab KM	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Perdarahan	3	42,85
2.	Infeksi	1	14,28
3.	Preeklamsia	3	42,85
	Total	7	100

Sumber: Data Sekunder 2010 – 2011

2. Kejadian Kematian Maternal

Kejadian kematian Ibu seimbang pada saat hamil dan melahirkan yaitu sebanyak 4 orang ibu dimana masing - masing sebanyak 2 orang atau sebesar 28,57% dan kejadian kematian maternal ibu pada saat hamil ditemukan sebanyak 3 orang ibu atau sebesar 42,85%.

Distribusi frekuensi ibu berdasarkan kejadian kematian maternal ibu digambarkan dalam tabel 5.4 berikut ini :

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Ibu Berdasarkan Kematian Maternal Saat Hamil, Melahirkan dan Nifas di Kabupaten Pangkep Tahun 2010 – 2011.

No.	Kematian Maternal	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Hamil	3	42,85
2.	Melahirkan	2	28,85
3.	Nifas	2	28,85
Total		7	100

Sumber: Data Sekunder 2010 - 2011

B. Pembahasan

Kematian merupakan salah satu rahasia ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Kematian akan mendatangi setiap makhluk Allah yang bernyawa dengan penyebab yang berbeda-beda tanpa dapat ditawar-tawar. Ni'mat hamil dan melahirkan yang dialami oleh seorang Ibu tidak jarang menjadi penyebab kematiannya. Namun, tidak ada hal yang sia-sia dalam pandangan Allah. Seorang ibu yang meninggal karena melahirkan maka akan diganjar dengan pahala seperti orang yang mati syahid (Fadhlihsan, 2011).

Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Shafwan bin Umayyah radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bahwa beliau bersabda:

“Orang yang mati akibat wabah tha'un (kolera) adalah syahid, orang yang mati tenggelam adalah syahid, orang yang mati dalam peperangan adalah syahid, orang yang mati karena penyakit perut

adalah syahid dan wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid.”

Dalam riwayat lain disebutkan:

“Wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid, ia akan ditarik oleh anaknya dengan tali pusarnya ke dalam surga.”

1. Penyebab kematian maternal karena perdarahan

Responden yang mengalami kematian maternal berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 sebanyak 7 orang. Penyebab kematian maternal itu disebabkan karena 3 faktor yaitu perdarahan sebanyak 3 orang ibu, infeksi sebanyak 1 orang ibudan preeklamsia sebanyak 3 orang ibu.

Peneliti mengasumsikan bahwa kematian karena perdarahan disebabkan karena kelainan pada plasenta. Perdarahan terjadi akibat dari gangguan pada saat melahirkan plasenta. Hal tersebut akibat usia ibu >35 tahun. Perdarahan dapat juga disebabkan karena paritas >3. Paritas >3 juga mempunyai resiko untuk mengalami plasenta previa lebih tinggi. Hal tersebut akibat alat – alat reproduksi yang berperan dalam proses kehamilan tidak efektif lagi.

Anak merupakan harta yang paling berharga dalam sebuah perkawinan. Maka sewajarnya orang tua harus menjaga dan merawat anak-anaknya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Kahfi (18) : 46 yaitu:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia dan amal- amal yang kekal lagi baik, lebih baik pahalanya disisi tuhan, dan lebih baik di cita-citanya,(Alquran dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak merupakan titipan Allah yang diberikan kepada manusia selaku orang tua. Anak bagaikan sebuah perhiasan maka kewajiban orang tua untuk menjaga hingga menjadi dewasa (Quraisy Shihab, 2002).

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Hermansyah (2008) yang menyatakan bahwa organ – organ reproduksi wanita pada usia > 35 tahun mengalami degenerasi / mengalami kemunduran sehingga kemungkinan terjadinya komplikasi / penyakit – penyakit dalam kehamilan dan persalinan. Selain itu, pada kehamilan lebih dari 35 tahun sirkulasi darah yang ke plasenta sudah kurang adekuat sehingga plasenta akan meluas ke bagian bawah segmen bawah rahim yang vaskularisasinya lebih baik untuk mencukupi kebutuhan janin. Sedangkan kehamilan yang berulang – ulang menyebabkan rahim ibu tidak sehat lagi untuk kehamilan berikutnya sebab pada waktu melahirkan, kerusakan pada pembuluh darah dinding rahim tidak

dapat dihindari. Meningkatnya paritas ibu dapat memberi kemungkinan terjadinya plasenta previa.

Plasenta previa adalah keadaan dimana plasenta terletak abnormal yaitu pada segmen bawah uterus, sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Keadaan ini mengakibatkan perdarahan pervaginam pada kehamilan 28 minggu atau lebih, karena segmen bawah uterus telah terbentuk, dan dengan bertambah tuanya kehamilan, segmen bawah uterus akan lebih melebar dan serviks mulai membuka. Pelebaran segmen bawah uterus dan pembukaan serviks akan menyebabkan terlepasnya sebagian plasenta dari dinding uterus, sehingga mengakibatkan perdarahan. Perdarahan ini tidak dapat dihindarkan karena ketidakmampuan serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi menghentikan perdarahan. Perdarahan yang terjadi tanpa alasan dan tanpa rasa nyeri merupakan gejala utama dan pertama dari plasenta previa. Perdarahan yang terjadi pertama kali pada umumnya sangat ringan dan segera berhenti, yang disusul dengan perdarahan berikutnya, dan biasanya terjadi semakin berat. Darah berwarna merah segar, berlainan dengan perdarahan pada solusio plasenta yang berwarna kehitaman (Royston, 1998).

Retensio plasenta adalah terlambatnya kelahiran plasenta selama setengah jam setelah persalinan bayi. Pada beberapa kasus dapat terjadi retensi plasenta berulang (*habitual retensio plasenta*).

Plasenta harus dikeluarkan karena dapat menimbulkan bahaya perdarahan, infeksi karena sebagian benda mati, plasenta inkarserata, polip plasenta, dan terjadi degenerasi ganas kario karsinoma. Dalam melakukan pengeluaran plasenta secara manual perlu diperhatikan tekniknya sehingga tidak menimbulkan komplikasi seperti perforasi dinding uterus, bahaya infeksi, dan inersio uteri (Ida, 2010).

2. Penyebab kematian maternal karena preeklamsia

Responden yang mengalami kematian maternal berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 sebanyak 7 orang. Penyebab kematian maternal itu disebabkan karena preeklamsia sebanyak 3 orang ibu.

Peneliti mengasumsikan bahwa kematian maternal karena preeklamsia disebabkan karena dari data demografi responden ada 3 responden atau keseluruhan data kematian maternal karena preeklamsia berada pada kategori umur di atas 35 tahun. Usia lebih dari 35 tahun merupakan resiko tinggi terjadinya preeklamsia pada kehamilan karena telah terjadi perubahan – perubahan akibat penuaan organ – organ sehingga kemungkinan untuk mendapatkan penyakit – penyakit dalam masa kehamilan akan meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Armanda (2005), menyatakan bahwa faktor predisposisi preeklamsia, usia 35 tahun ke

atas dimana keseluruhan data yang diperoleh pada responden keseluruhannya berumur 35 tahun ke atas.

Berdasarkan data usia lebih dari 35 tahun, dalam tubuh telah terjadi perubahan – perubahan akibat penuaan organ – organ. Dengan begitu, kemungkinan untuk mendapatkan penyakit – penyakit dalam masa kehamilan yang berhubungan dengan umur akan meningkat, seperti penyakit darah tinggi (hipertensi), keracunan kehamilan, (preeklamsia/eklamsia), diabetes , penyakit jantung dan pembuluh darah. Disebut resiko tinggi karena kemungkinan hasil kehamilan yang buruk/ komplikasi pada usia ini akan semakin meningkat (Amiruddin dkk, 2007).

3. Penyebab kematian maternal karena infeksi

Responden yang mengalami kematian maternal yang disebabkan oleh infeksi berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep Periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 sebesar 1 orang. Peneliti mengasumsikan bahwa penyebab kematian maternal yang disebabkan oleh infeksi dikarenakan peralatan yang digunakan tidak steril sehingga menyebabkan kuman – kuman masuk ke dalam alat genitalia. Selain itu berdasarkan data, infeksi tersebut didapatkan pada saat kehamilan yaitu terjadi abortus. Ini mengidentifikasi bahwa abortus tersebut dapat menyebabkan perdarahan yang jika tidak mendapatkan penanganan yang steril sangat beresiko terjadinya infeksi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nur'aeni (2011), yang menyatakan bahwa data dari Kabupaten Cilacap sebagian besar abortus yang terjadi yaitu abortus yang terinfeksi artinya abortus yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan dialami usia remaja.

Infeksi pada kehamilan adalah infeksi jalan lahir pada masa kehamilan, baik pada kehamilan muda maupun tua. Infeksi dapat terjadi oleh sebab langsung yang berkaitan dengan kehamilan, atau akibat infeksi lain disekitar jalan lahir. Infeksi pada kehamilan muda adalah infeksi jalan lahir yang terjadi pada kehamilan kurang dari 20 – 22 minggu. Penyebab yang paling sering terjadi adalah abortus yang terinfeksi. Infeksi jalan lahir pada kehamilan tua adalah infeksi yang terjadi pada kehamilan trimester II dan III. Infeksi jalan lahir ini dapat terjadi akibat ketuban pecah sebelum waktunya, infeksi saluran kencing, misalnya sistitis, nefritis atau akibat penyakit sistemik, seperti malaria, demam tifoid, hepatitis, dan lain – lain (Depkes RI, 2000).

C. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan Peneliti


Penelitian ini merupakan pengalaman pertama bagi peneliti. Kurangnya pengalaman dan ilmu penunjang yang dimiliki oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yang baik menjadi kendala dalam pelaksanaan penelitian.

2. Keterbatasan Instrumen

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sedangkan pengumpulan data yang terdapat di Kabupaten Pangkep masih dilakukan secara manual.

3. Keterbatasan Subjek Penelitian

Kurangnya sampel penelitian yang ada di Kabupaten Pangkep sehingga penelitian kurang maksimal.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang penyebab kematian maternal di Kabupaten Pangkep periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 di Kabupaten Pangkep dapat disimpulkan:

1. Kematian maternal akibat perdarahan sebanyak 3 responden atau sebesar 42,85%.
2. Kematian maternal akibat infeksi sebanyak 1 responden atau sebesar 14,28%.
3. Kematian maternal akibat preeklamsia sebanyak 3 responden atau sebesar 42,85%.

B. Saran

1. Bagi Ibu Hamil
Diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas untuk menghindari terjadinya kematian maternal dan menurunkan AKI.
2. Bagi Institusi
Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu literatur bagi mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya serta seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada umumnya.

3. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam hal perencanaan dan penanggulangan terjadinya kematian maternal .

4. Bagi Peneliti

Semoga dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam hal bagaimana penyebab terjadinya kematian maternal.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2010
- Al Atsari, Abdul Muslim. 2010. *Mengetahui Bagaimana Proses Penciptaan Manusia Qur'an dan Sunnah.* (<http://qurandansunnah.wordpress.com.html>). diakses pada tanggal 10 juni 2011.
- Arisman, 2004. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kematian Maternal Dipuskesmas Selat Li Kapuas kalimantan Tengah. Skripsi keperawatan fakultas k.edokteran airlangga Surabaya.*Diakses tanggal 09 Agustus 2012.
- Cunningham FG, et al. 2003. *William obstetrics 20 tahun edition.* International, Inc: 2003.
- Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan. 2010. *Profil kesehatan Sulawesi Selatan.*
- Djaja S, Mulyono L, Afifah T. 2003. Jakarta: Majalah Kedokteran Atmajaya vol 2.
- Fadhlihsan. 2011. *Wanita Meninggal Saat Melahirkan Syahid.*
<http://fadhlihsan.wordpress.com/2011/07/24/wanita-meninggal-saat-melahirkan-syahid/> Di akses tanggal 8 September 2012
- Farrer, Helen. 2001. *Perawatan Maternitas.* Ed. 2. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Hamilton, Persis Mary. 1995. *Dasar-dasar Keperawatan Maternitas.* Ed 6. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Hasnah. 2011. *Mari Beraksi Sebelum Terjadi Reaksi dalam menurunka tingkat kesakitan & Kematian Ibu di Indonesia.* Makassar: Alauddin University Press.
- Hermansyah. 2008. *Plasenta Letak Rendah.*
<http://tubulus.multiply.com/journal/itm/47/plasentaletakrendah> di akses tanggal 30 agustus 2012
- Ida Ayu Chandranita, 2010. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan Kb untuk Pendidikan Bidan Edisi 2.* Jakarta: EGC

- Ida, Bagus. 2004. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita. Ed. 4*. Jakarta: EGC Editor Arcan.
- Lamadhah, Athif. 2009. *Buku Pintar Kehamilan dan Melahirkan*. Jogjakarta: Diva Press.
- Manuaba I,B,G. 2004. *Penuntun Kepaniteraan Klinik Obstetri Dan Ginekologi, Ed. 2*. Jakarta: EGC.
- Nina & Djamilus, Fausia. 2008. *Faktor Resiko Kematian Maternal*. (<http://alijeco.com/2008/05/faktor-resiko-kejadian-kematian-maternal.html>). Diakses pada tanggal 21 Agustus 2012.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Ed. 1. Jakarta: Salemba Medika.
- Prawihardjo, Sarwono. 2005. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawiharjo.
- Prawihardjo, Sarwono. 2009. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawiharjo.
- Quraisy Shihab. *Tafsir Al-Misbah :Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 8*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Saifudin AB, dkk. 2004. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo.
- Saifuddin, Abdul Bari, dkk. 2006. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal 281*. Ed. 1. Cetakan 4. Jakarta: Yayasan bina pustaka Sarjono Prawihardjo.
- Samil RS, 2004. *Penyakit Kardiovaskuler*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- Soepardiman M. 2004. *Infeksi Nifas*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thalbah Hisham. 2009. *Kemukjizatan Penciptaan Manusia, Ensiklopedia 2 Mukjizat Alqur'an dan Hadis*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, PT Sapta Sentosa.
- Tim Kajian AKI-AKA, Depkes RI. 2004. *Kajian kematian ibu dan anak di Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta: Depkes RI.

UNFPA, 2004. *Maternal Mortality*. Update 2004, delivery into good hands. New York.

Varneys, Heien. 2002. *Buku Saku Bidan*. Jakarta: EGC.

WHO, 2003. *Maternal mortality in 2000*. Department of Reproductive Health and Research WHO

Wibowo B, 2004. *Ilmu Kebidanan Edisi 3*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.

