

**STUDI PENETRASI PERKUTAN *ETHOSOME* NIFEDIPIN
DENGAN VARIASI KONSENTRASI BASIS
DALAM BENTUK SEDIAAN GEL
SECARA *IN VITRO***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
RAY ANAH SHAD
NIM. 70 100 108 069

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, September 2012

Penyusun,

RAY ANAH SHAD
NIM: 70100108069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Studi Penetrasi Perkulutan *Ethosome* Nifedipin Dengan Variasi Konsentrasi Basis Dalam Bentuk Sediaan Gel Secara *In Vitro*", yang disusun oleh , Ray Anah Shad NIM: 70100108069, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2012, bertepatan 27 Syawal 1433 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 14 September 2012 M
27 Syawal 1433 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, M.PH., MH. Kes.** (.....)

Sekretaris : **Fatmawati Mallapiang, SKM., M. Kes.** (.....)

Pembimbing I : **Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.** (.....)

Pembimbing II: **Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt.** (.....)

Penguji I : **Surya Ningsi, S.Si., Apt.** (.....)

Penguji II : **Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.** (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, M.PH., MH. Kes
NIP. 19530119 198110 1 001.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga sampai skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Kesehatan Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penghargaan setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang tiada tara penulis persembahkan kepada kedua orang tua khususnya Ibunda Sri Handayani (almarhumah), Ibunda A. Bungawata dan Ayahanda Sapoddin yang telah membesarkan, menyekolahkan hingga perguruan tinggi dan memberikan kasih sayang yang tiada batas kepada penulis hingga sekarang, Kakandaku tercinta Mahmud Hady Shad, Adindaku tersayang, Nurur Rahmiyyah, Dzul Ardzil Adzim, Inda Dzil Ardzyii dan Anisa Samsil Mu'arifah Absa serta keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-NYA kepada kalian. Amiin Ya Rabbal Alamin

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Isriany Ismail, S.Si, M.Si, Apt., selaku pembimbing pertama dan Ibu Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing kedua sekaligus Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini, semoga bantuan dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan dan melakukan penelitian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si, Apt., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Drs. Wahyuddin G, M.Ag., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Surya Ningsi, S.Si,Apt., selaku Penguji Kompetensi yang senantiasa memberikan saran dan arahan pada penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag., selaku Penguji Agama yang senantiasa memberikan saran dan bimbingan khususnya di bidang agama.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Farmasi yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. Baik yang berada di luar maupun di dalam lingkup Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Kakanda Angkatan 2005, 2006 dan 2007, selalu membantu, mencurahkan tenaga dan pikirannya kepada penulis selama penelitian di Laboratorium Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Saudara-saudaraku seperjuangan, Emulsi, Angkatan 2008 yang selalu memberikan motivasi kepada penulis serta adik-adik angkatan 2009, 2010 dan 2011 yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis akan selalu berdoa semoga bantuan yang telah diberikan dapat dinilai disisi Allah swt, sebagai amal saleh dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, Namun besar harapan kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Farmasi.

Makassar, September 2012

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	4
C. <i>Tujuan Penelitian</i>	4
D. <i>Manfaat Penelitian</i>	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Anatomi Kulit</i>	6
B. <i>Absorpsi Perkulatan</i>	12
C. <i>Strategi Penghantaran Obat Melalui Kulit</i>	14
D. <i>Ethosom</i>	18
E. <i>Nifedipin</i>	24
F. <i>Gel</i>	28
G. <i>Uji Difusi In Vitro Pada Sediaan Transderma l</i>	30
H. <i>Tinjauan Agama</i>	31
BAB III METODE KERJA	
A. <i>Alat dan Bahan</i>	41
B. <i>Cara Kerja</i>	
1. <i>Formula</i>	41
2. <i>Pembuatan Ethosom</i>	42
3. <i>Pembuatan Sediaan Gel</i>	43
4. <i>Pembuatan Kurva Baku Nifedipin</i>	43
5. <i>Uji Daya Penetrasi Menggunakan Sel Difusi</i>	44

BAB	IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A.	<i>Hasil Penelitian</i>	46
	B.	<i>Pembahasan</i>	49
BAB	V	PENUTUP	
	A.	<i>Kesimpulan</i>	58
	B.	<i>Saran</i>	58
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN-LAMPIRAN		62
BIOGRAFI		74



DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
1. Formula Ethosom	41
2. Rancangan Formula Basis Gel Ethosom Nifedipin	42
3. Rancangan Formula Gel Ethosom Nifedipin.....	42
4. Absorbansi Vs Kadar Nifedipin Menggunakan Dapar Fosfat pH 7,4 (mengandung Natrium Lauril Sulfat 2,5% b/v)	46
5. Hasil Pengukuran Kadar Nifedipin Yang Melintasi Membran Dalam Larutan Dapar Fosfat pH 7,4 (mengandung Natrium Lauril Sulfat 2,5% b/v)	47
6. Kecepatan Melintasi Membran Nifedipin Per Jam Dari Sediaan Gel Ethosom Berdasarkan Uji Penetrasi Selama 12 Jam	48
7. Kumulatif Dan Kecepatan Terpenetrasi Nifedipin Dari Sediaan Gel Ethosom.....	48
8. Contoh Perhitungan Kecepatan Melintasi Membran Nifedipin ($\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{jam}^{-1}$) Selama 12 Jam Formula I Replikasi 1	65
9. Kecepatan Melintasi Membran ($\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{jam}^{-1}$) Sediaan Gel Ethosom Nifedipin Selama 12 Jam Pada Formula I	66
10. Kecepatan Melintasi Membran ($\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{jam}^{-1}$) Sediaan Gel Ethosom Nifedipin Selama 12 Jam Pada Formula II	67
11. Kecepatan Melintasi Membran ($\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{jam}^{-1}$) Sediaan Gel Ethosom Nifedipin Selama 12 Jam Pada Formula III.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Penampang kulit	6
2. Bentuk sel penyusun epidermis	10
3. Rute absorpsi perkutan	14
4. Mekanisme kerja ethosom	19
5. Struktur Fosfatidilkolin	22
6. Rumus Struktur Nifedipin	24
7. Sel Difusi Franz	31
8. Grafik Kurva Baku Nifedipin	46
9. Grafik hubungan Nifedipin yang melintasi membran ($\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$) terhadap waktu (menit)	47
10. Skema Kerja Pembuatan Ethosom	62
11. Skema Kerja Pembuatan Basis Gel	63
12. Skema Kerja Pengujian Penetrasi Perkutan	64
13. Grafik Hubungan Waktu Dengan Jumlah Nifedipin Yang Terdifusi/Luas Area Pada Formula I	66
14. Grafik Hubungan Waktu Dengan Jumlah Nifedipin Yang Terdifusi/Luas Area Pada Formula II	67
15. Grafik Hubungan Waktu Dengan Jumlah Nifedipin Yang Terdifusi/Luas Area Pada Formula III	68
16. Suspensi Ethosom	69
17. Ethosom	70
18. Sediaan Gel Ethosom Nifedipin	71
19. Modifikasi Sel Difusi Franz	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pembuatan ethosom	62
2. Pembuatan basis gel.....	63
3. Pengujian penetrasi perkutan	64
4. Tabel dan perhitungan	65
5. Gambar Pembuatan Gel <i>Ethosome</i> Nifedipin	70
6. Gambar Sel Difusi Franz.....	73



ABSTRAK

Nama Penyusun : Ray Anah Shad
NIM : 70100108069
Judul Skripsi : Studi Penetrasi Perkutan *Ethosome* Nifedipin Dengan Variasi Konsentrasi Basis Dalam Bentuk Sediaan Gel Secara *In Vitro*.

Telah dilakukan penelitian tentang studi penetrasi perkutan *ethosome* nifedipin dengan variasi konsentrasi basis dalam bentuk sediaan gel secara *in vitro*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efek pembentuk gel terhadap kemampuan penetrasi *ethosome* nifedipin yang diformulasikan dalam bentuk gel secara *in vitro*. *Ethosome* Nifedipin dibuat dalam bentuk sediaan gel menggunakan karbopol 940 dengan variasi basis 0,5%, 1%, dan 1,5%. Uji penetrasi perkutan dilakukan dengan menggunakan metode sel difusi Franz dengan kulit tikus sebagai membran difusi. Penetapan kadar nifedipin yang berpenetrasi melintasi kulit dilakukan selama 12 jam. Cairan kompartemen reseptor terdiri dari larutan dapar fosfat pH 7,4 dan natrium lauril sulfat 2,5% b/v, cuplikan dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 340 nm.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nifedipin yang melintasi membran pada Formula I sebanyak $6123,748 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$ dengan kecepatan melintasi membran $8,394 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{menit}^{-1}$ ($r = 0,990$). Formula II sebanyak $4979,071 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$ dengan kecepatan melintasi membran $6,869 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{menit}^{-1}$ ($r = 0,985$). Sedangkan Formula III sebanyak $3914,641 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$ dengan kecepatan $5,193 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{menit}^{-1}$ ($r = 0,963$). Dari ketiga konsentrasi pembentuk basis gel yang digunakan, diketahui bahwa karbopol 940 dengan konsentrasi 0,5% memiliki kemampuan penetrasi obat yang terbaik. Dapat disimpulkan bahwa formulasi gel *ethosome* nifedipin dapat digunakan secara transdermal. Semakin tinggi konsentrasi basis yang digunakan, maka semakin kecil kemampuan *ethosome* untuk berpenetrasi melintasi kulit dan semakin kecil pula laju penetrasinya.

ABSTRACT

Author : Ray Anah Shad
Student Reg. Number : 70100108069
Title : In Vitro - Percutaneous Penetration With Various Basis
Concentration Of Gel Ethosome Nifedipine
Formulation.

Had been researched about in vitro percutaneous penetration whit various basis concentration of gel ethosome nifedipine formulation. The research is to find out the effect of basis gel forming in vitro penetration of gel ethosome nifedipine ability. Where ethosome made in the gel dosage form using carbopol 940 of various basis 0,5%, 1%, and 1,5%. Percutaneous penetration test performed with Franz diffusion cells using mouse skin as a diffusion membrane. Assay of nifedipine which penetrate through the skin for 12 hours. The compartment of receptor were consisting of phosphate buffer solution pH 7,4 and Sodium Lauryl Sulphate (SLS) 2,5% w/v, samples were analyzed using spectrophotometer UV-Vis at a wavelength of 340 nm.

Results of testing showed that nifedipine across the membrane in Formula I as much $6123,748 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$ with across of the membrane speed $8,394 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{minuts}^{-1}$ ($r = 0,990$). Formula II as much as $4979,071 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$ with across of the membrane speed $6,869 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{minuts}^{-1}$ ($0,985$). While the Formula III as much as $3914,641 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$ with across of the membran speed $5,193 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{minuts}^{-1}$ ($0,963$). Of the three concentrations of gel-forming base were used, it is known that karbopol 940 with a concentration of 0,5% has the ability to the best penetrate of medicine. It can be concluded that the formulation of nifedipin ethosome gel can be used transdermally. The higher the concentration of base used, the fewer ethosome that penetration of the skin and its penetration rate is small anyway.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Penelitian mengenai obat-obatan terus dilakukan sehingga diperoleh obat dengan efikasi yang maksimal. Beberapa obat memiliki indeks terapi yang sempit dan penggunaannya dibatasi karena memiliki efek samping. Oleh karena itu, formulasi obat terus dikembangkan untuk mendapatkan efektivitas terapi yang diharapkan. Beberapa teknik sedang dikembangkan agar obat dapat mencapai target di tempat spesifik tanpa mempengaruhi jaringan lain sehingga dapat mencegah efek toksik (Sukamdiyah, 2011: 1-2).

Pemberian sediaan obat dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu inhalasi, oral, injeksi dan topikal. Sediaan farmasi penggunaan oral masih menjadi pilihan saat ini, padahal memiliki banyak kelemahan. Pemberian obat secara oral paling umum dilakukan karena mudah, aman dan murah (Gunawan, 1987: 3). Kerugian pemberian melalui oral adalah ada obat yang dapat mengiritasi saluran cerna, dan perlu kerja sama dengan penderita, dan tidak bisa dilakukan saat pasien koma. Selain itu, banyak faktor dapat mempengaruhi bioavailabilitasnya (Ansel, 1989: 102) karena tidak semua obat yang diabsorpsi dari tempat pemberian akan mencapai sirkulasi sistemik. Sebagian obat yang diberikan secara oral akan dimetabolisme oleh enzim di dinding usus atau di hati pada lintasan pertamanya melalui organ-organ tersebut (metabolisme atau eliminasi lintas pertama). Eliminasi lintas pertama

obat dapat dihindari atau dikurangi dengan cara pemberian sublingual, rektal, transdermal, inhalasi dan injeksi.

Seiring perkembangan teknologi sediaan farmaseutik, sediaan topikal kini dikembangkan untuk lebih dari sekedar untuk tujuan permukaan kulit (*topical delivery*), akan tetapi telah dikembangkan untuk efek yang lebih dalam yaitu *regional* dan *transdermal delivery* (Ismail, 2009: 27). Penghantaran transdermal merupakan penggunaan obat secara topikal untuk tujuan pengobatan sistemik. Sebagian besar obat yang diberikan melalui kulit berpenetrasi dengan mekanisme difusi pasif, jadi obat harus berdifusi menembus kulit dan sampai pada sirkulasi sistemik. Penetrasi senyawa pada pemberian secara transdermal berkaitan dengan pemilihan pembawa, sehingga bahan aktif dapat berdifusi dengan mudah ke dalam kulit (Sukria, 2009: 2). Keuntungan pemberian obat secara transdermal yaitu : tidak dipengaruhi oleh pH saluran cerna dan aktivitas enzim, menghindari *first-pass effect* dihati, memperpanjang aktivitas obat, efek obat dapat dihentikan dengan cepat, dapat diberikan kepada pasien yang tidak sadar dan dalam keadaan koma (Ansel, 1989: 496).

Kesulitan utama dalam mendesain obat dengan penggunaan secara transdermal adalah penetrasi melalui kulit. Untuk meningkatkan penetrasi pada kulit dengan tujuan penghantaran obat secara transdermal, beberapa cara telah digunakan seperti peningkat penetrasi dan gelembung (*vesicles*) seperti liposom, nioson, transferosom, dan ethosom (Cristina *et al*, 2010: 130).

Ethosom adalah *vesicles* yang tersusun dari fosfolipid (fospatidilkolin, fospatidilserin, asam fospatidik), etanol dengan kadar tinggi dan air. Kadar etanol yang tinggi menyebabkan ethosom dapat berpenetrasi ke dalam kulit melalui lipid interseluler, etanol dapat meningkatkan fluiditas lipid dari membran sel dan menurunkan kepadatan lipid multilayer pada membran sel, sehingga permeabilitas kulit menjadi meningkat (Akiladevi, 2010: 1). Ethosom merupakan gelembung yang lembut dan lunak untuk meningkatkan penghantaran zat aktif. Ini menunjukkan bahwa sifat fisika dan kimia dari ethosom dapat membawa obat secara efektif melewati stratum korneum menuju lapisan kulit yang lebih dalam dibandingkan dengan liposom (Dave *et al*, 2010: 81).

Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa senyawa aktif seperti acyclovir (pengobatan herpes), zidovudine (pengobatan AIDS), tryhexypenidyl HCl (pengobatan sindrom parkinson), eritromicyn (antibiotik untuk *S. aureus*), insulin (pengobatan diabetes melitus), testosteron (pengobatan hipogonadis pada pria), cannabidol (inflamasi dan udema), minodiksil (pertumbuhan rambut), basitrasin (pengobatan ubtuk infeksi dermal) telah berhasil dirancang untuk tujuan transdermal dalam bentuk ethosom (Patel, 2007: 5). Pada tahun 2011, telah dapat dibentuk ethosom yang menggunakan nifedipin dengan penyerapan yang optimum sebesar 81.055 % dan menggunakan fosfatidilkolin 1.5% (Hamzah, 2011: 57). Tahun 2012, telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh konsentrasi etanol terhadap penyerapan nifedipin pada formula ethosom dengan penyerapan

optimum sebesar 71,440% dan menggunakan etanol sebanyak 50% (Rizal, 2012: 66).

Nifedipin merupakan antagonis kalsium yang digunakan untuk pengobatan angina dan hipertensi. Antagonis kalsium tidak menimbulkan gangguan metabolik atau gangguan elektrolit seperti pada diuretik (Lim, 2009: 14). Mudah larut dalam lemak sehingga dapat diabsorpsi pada pemberian oral maupun sublingual dan dieliminasi di hati. Antagonis kalsium terikat pada protein plasma (70-98%), mudah diabsorpsi setelah pemberian peroral tetapi sebagian besar mengalami metabolisme lintas pertama di hati melalui jalur oksidatif yang mengakibatkan metabolismenya berjalan cepat, sehingga bioavailabilitasnya tidak begitu tinggi (sekitar 60%) (Lim, 2009: 41). Oleh karena itu, nifedipin membutuhkan suatu sistem penghantaran obat agar dapat meningkatkan bioavailabilitasnya. Sistem penghantaran obat yang dimaksudkan adalah ethosom, bentuk ethosom dapat diberikan secara semisolid (dalam bentuk gel atau krim).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah formulasi gel ethosom nifedipin dapat digunakan secara transdermal dengan melihat studi penetrasi perkutan melalui membran kulit hewan coba ?
2. Apakah konsentrasi pembentuk basis mempengaruhi kecepatan penetrasi nifedipin melintasi kulit ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efek pembentuk gel terhadap kemampuan penetrasi ethosom nifedipin yang diformulasikan dalam bentuk gel secara *in vitro*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini untuk masyarakat umum adalah memberikan bentuk alternatif sediaan nifedipin melalui jalur transdermal.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Anatomi Kulit*

Kulit manusia, merupakan organ terluas dari tubuh. Berat total kulit manusia adalah 3 kg dengan luas permukaan 1,5 – 2 m² (Grassi, Mario, *et al* 2007: 53). Kulit terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Juga terdapat komponen kulit seperti folikel rambut, saluran keringat, kelenjar apokrin, dan kuku. Secara umum, kulit berfungsi sebagai pelindung, pengatur suhu tubuh, dan indra peraba (Walter K.A, 2002: 1).



Gambar 1. Penampang Kulit (Light, 2004: 95)

1. Epidermis

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang mempunyai ketebalan sekitar 50 μm – 1,5 mm, umumnya berfungsi sebagai

penghalang terpenting dari hilangnya air, elektrolit, dan nutrisi tubuh, serta menahan masuknya senyawa asing dari luar. Epidermis merupakan bagian yang paling tipis (1-10% dari kulit) tetapi memberikan kontribusi sekitar 80% terhadap permeabilitas kulit. Lapisan ini sangat kering ($\leq 15\%$ air) dan terdiri dari ribuan sel-sel gepeng yang saling berkesinambungan dan kebanyakan adalah sel yang mati, disebut dengan korneosit. Sel-sel tersebut merupakan diferensiasi akhir dari kulit yang dimulai pada stratum basal. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar yang paling menarik untuk diperhatikan dalam perawatan kulit. Epidermis melekat erat pada dermis karena secara fungsional epidermis memperoleh zat-zat makanan dan cairan antar sel dari plasma yang merembes melalui dinding-dinding kapiler dermis ke dalam epidermis (Grassi, Mario, *et al* 2007: 53).

Lapisan epidermis terdiri dari lima lapisan utama yang tersusun dari luar ke dalam berturut-turut: *stratum korneum*, *stratum lusidum*, *stratum granulosum*, *stratum spinosum*, dan *stratum basale* (*germinativum*).

a. Lapisan tanduk (*stratum corneum*)

Merupakan lapisan epidermis yang paling atas. Lapisan tanduk terdiri atas beberapa lapis sel pipih, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Lapisan ini sebagian besar terdiri atas keratin yaitu sejenis protein yang tidak larut dalam air dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia (Grassi, Mario, *et al* 2007: 56).

b. Lapisan bening (*stratum lucidum*)

Lapisan bening disebut juga lapisan barrier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk, dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir (*stratum granulosum*). Lapisan bening terdiri dari protoplasma sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar (tembus cahaya). Lapisan ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Proses keratinisasi bermula dari lapisan bening (Grassi, Mario, *et al* 2007: 55).

c. Lapisan berbutir (*stratum granulosum*)

Lapisan berbutir terdiri dari 1-4 lapis sel dan tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, berbutir kasar dan berinti mengkerut. Merupakan daerah transisi antara *stratum spinosum*. Lapisan ini tampak lebih jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki (Grassi, Mario, *et al* 2007: 55).

d. Lapisan bertaju (*stratum spinosum*)


Lapisan ini disebut juga lapisan *malphigi* terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Jika sel-sel lapisan saling berlepasan, maka seakan-akan selnya bertaju. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein (Grassi, Mario, *et al* 2007: 56).

Bentuk sel berkisar antara bulat ke bersudut banyak (*polygonal*), dan makin ke arah permukaan kulit makin besar ukurannya. Di antara sel-sel taju terdapat celah antar sel halus yang berguna untuk peredaran cairan jaringan ekstraseluler dan pengantaran butir-butir melanin. Sel-sel di bagian lapis taju yang lebih dalam, banyak yang berada dalam salah satu tahap mitosis. Kesatuan-kesatuan lapisan taju mempunyai susunan kimiawi yang khas, inti-inti sel dalam bagian basal taju mengandung kolesterol, asam amino dan *glutation* (Grassi, Mario, *et al* 2007: 56).

e. Lapisan benih (*stratum germinativum* atau *stratum basale*)

Lapisan ini merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak (silinder) dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Alas sel-sel torak ini bergerigi dan bersatu dengan lamina basalis di bawahnya. Lamina basalis adalah struktur halus yang membatasi epidermis dengan dermis. Pengaruh lamina basalis cukup besar terhadap pengaturan metabolisme demoidermal dan fungsi-fungsi vital kulit. Di dalam lapisan ini sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis dan sel-sel tadi bergeser ke lapisan-lapisan lebih atas, akhirnya menjadi sel tanduk. Di dalam lapisan benih terdapat pula sel-sel bening (*clear cells, melanoblasts* atau *melanosites*) pembuat pigmen melanin kulit. Stratum basal dipertimbangkan sebagai penghasil utama dari keratinosit yang bermigrasi ke lapisan yang paling luar. Sel-sel tersebut memiliki

bentuk prisma dan terhubung dengan lainnya oleh desmosom. Sebagai tambahan keratonosit, epidermis mengandung dua sel utama yaitu melanosit dan sel Langerhans (Walter K.A, 2002: 21).



Gambar 2. Bentuk sel penyusun epidermis (Walter K.A, 2002: 20).

2. Dermis

Lapisan ini disebut juga korium, terletak lapisan kulit yang terletak antara epidermis dan jaringan lemak subkutan. Tebal lapisan sekitar 0,3 - 4 mm, tergantung bagian tubuh. Dermis ini mengandung jaringan padat dari serabut protein, seperti kolagen, retikulum dan elastin yang disimpan dalam kelenjar dasar amorf dari mukopolisakarida (Walter K.A, 2002: 25 ; Grassi, Mario, *et al* 2007: 56).

Fungsi dermis ini terutama melindungi tubuh dari luka, menjadikan epidermis lebih fleksibel, penghalang terhadap infeksi dan sebagai organ penyimpan air. Dalam dermis terdapat kapiler darah, ujung-ujung saraf, pembuluh limfa, kelenjar keringat, folikel rambut dan kelenjar sebacea.

Kelenjar keringat ditemukan diseluruh permukaan tubuh dan mensekresikan suatu larutan encer garam dan beberapa komponen lain (95% keringat berupa air). Keringat mempunyai pH 4,5 - 5,5. Fungsi utama kelenjar ini untuk mengontrol panas dan sekresinya dirangsang oleh temperatur luar yang tinggi dan atau proses dalam tubuh yang menghasilkan panas.

Kelenjar sebacea terdapat pada bagian leher tiap folikel. Kelenjar ini mensekresikan material minyak dengan komposisi: trigliserida 57,5%; ester-ester lilin 26%; squalene 12%; ester-ester kolesterol 3%; kolesterol 1,5%. Komposisi sebum ini bervariasi tergantung umur, jenis kelamin dan bangsa. Sebum ini menyebabkan terbentuknya lapisan tipis diskontinyu bahan lipofil pada beberapa permukaan kulit, karenanya sebum dapat merupakan rute absorpsi obat untuk obat-obat yang larut lemak (Walter K.A, 2002: 25; Grassi, Mario, *et al* 2007: 57).

3. Endodermis (Hipodermis)

Hipodermis adalah lapisan terdalam dari kulit, tebalnya 0,5 – 2 cm tergantung pada umur, ras dan daerah tubuh, merupakan kelanjutan dari dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak, penghubung antara dermis dengan jaringan lain dibawahnya seperti otot. Hipodermis kaya akan jaringan penghubung yang mengandung beberapa serat elastik. Pada beberapa bagian tubuh tertentu terdapat otot polos (Walter K.A, 2002: 26; Grassi, Mario, *et al* 2007: 58).

B. *Absorpsi Perkutanan*

Absorpsi perkutan dapat didefinisikan sebagai absorpsi obat ke dalam stratum korneum (lapisan tanduk) dan selanjutnya obat menembus lapisan dibawahnya dan akhirnya obat masuk dalam sirkulasi darah.

Kulit relatif impermeabel untuk sebagian besar senyawa, untuk itu perlu banyak pertimbangan untuk pemberian obat-obatan melalui kulit untuk efek sistemik. Prasyarat untuk absorpsi obat transdermal adalah bahwa obat dapat melintasi lapisan-lapisan dari epidermis dan masuk ke jaringan yang terdapat di dermis, sehingga obat dapat mencapai kapiler pembuluh darah. Pengujian absorpsi perkutan secara *in vitro* menunjukkan bahwa stratum korneum merupakan sawar utama untuk banyak senyawa. Stratum korneum impermeabel terhadap molekul-molekul hidrophilik dan sangat permeabel untuk molekul lipofilik. Hal ini dikarenakan sel-sel penyusun stratum korneum yang terdiri dari lemak dan protein keratin serta susunannya yang padat (Grassi, Mario, *et al* 2007: 58).

Untuk pengobatan setempat sering diperlukan penembusan zat aktif ke dalam struktur kulit yang lebih dalam, hal tersebut penting dilakukan bila diperlukan konsentrasi dalam jaringan yang terletak di bawah daerah pemakaian yang cukup tinggi agar diperoleh efek yang dikehendaki dan sebaliknya penyerapan oleh pembuluh darah diusahakan agar seminimal mungkin sehingga terjadinya efek sistemik dapat dihindari.

Akan tetapi pada pemakaian sediaan topikal efek sistemik, zat aktif harus masuk ke dalam peredaran darah dan selanjutnya dibawa ke jaringan yang kadang-kadang terletak jauh dari tempat pemakaian dan pada konsentrasi tertentu dapat menimbulkan efek farmakologik.

Penyerapan perkutan merupakan gabungan fenomena penembusan suatu senyawa dari lingkungan luar ke bagian kulit sebelah dalam dan fenomena penyerapan dari struktur kulit ke dalam peredaran darah atau getah bening. Istilah 'perkutan' menunjukkan bahwa proses penembusan terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapan terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda.


Kulit merupakan perintang yang efektif terhadap penetrasi perkutan obat atau senyawa eksternal. Absorpsi obat perkutan dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat dan pembawa serta kondisi kulit. Pada pemakaian obat secara topikal, obat berdifusi dalam pembawanya dan kontak dengan permukaan kulit (stratum korneum dan sebum) selanjutnya menembus epidermis (Grassi, Mario, *et al* 2007: 59-60).

Penetrasi obat melewati kulit dapat terjadi dengan dua cara :

1. **Rute trans-epidermal**, yaitu difusi obat menembus stratum korneum.

Terdiri dari rute *trans-seluler* dan rute *intra-seluler*. Rute trans-seluler merupakan jalur terpendek dimana bahan obat melewati membran lipid maupun korneosit, tetapi rute ini memiliki resistansi yang besar terhadap penetrasi. Rute yang lebih umum adalah melalui rute inter-seluler. Bahan obat melintasi membran lipid antara korneosit

2. **Rute transfolikular** (*trans-appendageal*), yaitu difusi obat melewati pori kelenjar keringat dan sebum. Rute yaitu melalui kelenjar dan folikel rambut memiliki kontribusi yang kecil terhadap penetrasi per kutan (Walter K.A, 2002: 103).



Gambar 3. Rute absorpsi perkutan (Benson, 2005: 25)

C. Strategi Penghantaran Obat Melalui Kulit

Penggunaan obat di kulit dapat ditujukan untuk mengobati kelainan dermatologis (*topical delivery*), pengobatan jaringan lebih dalam seperti otot dan vena (*regional delivery*) dan lebih jauh penetrasi obat ke sirkulasi sistemik (*transdermal delivery*).

1. Topical delivery

Sasaran dalam penghantaran topikal adalah merancang penampung obat (drug reservoir) di kulit. Penetrasi molekul aktif ke lapisan kulit yang lebih dalam atau hingga ke sistem sirkulasi tidak diperlukan. Ditujukan untuk penggunaan secara langsung di kulit pada kerusakan lapisan kutan

atau pada manifestasi kutan akibat penyakit, dengan maksud untuk membatasi efek farmakologi atau efek lain pada permukaan kulit atau pada kulit. Absorpsi sistemik mungkin tidak dapat dihindari.

Bentuk sediaan farmasi yang dipilih adalah dari jenis formulasi semi solid, dimana jenisnya mendominasi sistem untuk penghantaran topikal, dengan basis yang terdiri dari antara lain wax, parafin liquidum, cera, dan vaselin.

2. *Regional delivery*

Penggunaan obat di kulit untuk mengobati penyakit atau mengurangi gejala di jaringan yang lebih dalam dibawah tempat pemberian. Sasarannya adalah efek atau aksi farmakologis pada otot, vaskular, persambungan dan lainnya yang terletak di bawah atau disekitar tempat pemberian. Aksinya lebih sedikit dibawah pemberian sistemik. Aktivitas ini memerlukan absorpsi perkutan dan penumpukan, salah satunya tergantung dari kebocoran belakang obat dari pembuluh vena pada tempat pemberian. Sebaiknya difusi belakang bukan proses yang efisien, konsekuensinya, terjadi pengambilan sistemik dari substansi, meskipun tidak disukai, hal ini tidak dapat dihentikan. Meskipun demikian, konsentrasi region lebih tinggi dari pada pemberian sistemik pada total tubuh yang sama terpapar obat. Memfokuskan obat pada jaringan yang dikehendaki, sulit untuk dibuktikan dengan tegas. Hal ini menjadi pertimbangan karena validitas dari terapi regional.

Bentuk sediaan farmasi yang dipilih adalah formulasi yang dalam bentuk ointment, krim, *adhesive patch*, plester, dengan basis yang mengandung antara lain minyak lemak, dan lanolin (Walter K.A, 2002; Grassi, Mario, *et al* 2007: 107).

3. *Systemic delivery (Transdermal delivery)*

Penghantaran transdermal merupakan pemberian obat di kulit untuk pengobatan penyakit sistemik melalui penetrasi obat ke sirkulasi sistemik dan ditujukan pada pencapaian kadar aktif sistemik dari obat. Meskipun bentuk sediaan ointment diterapkan pada jenis terapi ini, *adhesive system* dengan ukuran yang tepat dapat digunakan. Disini, absorpsi perkutan dengan akumulasi obat sistemik yang cukup besar sangat mutlak diperlukan. Idealnya tidak ada akumulasi lokal obat tetapi hal tersebut tidak bisa dihindari. Obat dipaksa untuk melintas dengan kecepatan difusi yang relatif kecil dari luas area tertentu dari patch, akibatnya besar potensi terjadinya iritasi atau sensitasi akibat konsentrasi obat pada jaringan dibawah patch.

Bentuk sediaan farmasi yang dipilih adalah yang diformulasi dalam bentuk mikroemulsi, nanopartikel, dan menggunakan reservoir (patch).

Dalam prakteknya, penghantaran zat terlarut melintasi kulit berhubungan dengan beberapa kesulitan seperti :

- a. Absorpsi perkutan bervariasi tergantung pada daerah kulit yang diberikan, kerusakan kulit, umur dan perbedaan spesies.

- b. Efek metabolisme tingkat pertama kulit (skin's first-pass metabolik)
- c. Kapasitas *reservoir* di kulit
- d. Iritasi dan toksisitas lain yang disebabkan oleh produk topikal
- e. Keragaman dan sebab dari kulit termasuk pergantian kulit dan metabolisme
- f. Penjelasan yang tidak cukup terhadap kriteria bioequivalen
- g. Tidak lengkapnya pemahaman terhadap teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi atau memperlambat absorpsi percutan.

Bagaimanapun, kontrol penghantaran zat terlarut melintasi kulit menjadi hal yang menarik, lebih lanjut, berkembang teknologi untuk mendukungnya, seperti peningkat penetrasi kimia (*chemical penetration enhancement*), *sonophoresis*, *transferosomes* dan *elektroforasi* (Walter K.A, 2002; Grassi, Mario, *et al* 2007: 108).

Sifat barrier dari lapisan subkutan menyebabkan tidak efektifnya penetrasi molekul ionik dan senyawa yang sangat polar. Penetrasi molekul lipofilik mudah menembus barrier tersebut, akan tetapi penetrasinya dicegah oleh bagian hidrofilik dari kulit (epidermis dan dermis). Molekul kecil ampifilik dengan titik lebur yang rendah dan kelarutannya dalam minyak (subkutan) dan air (epidermis dan dermis) memiliki kesempatan untuk melintasi kulit. Molekul besar seperti peptida dan protein sangat sulit untuk dihantarkan, oleh karena itu jumlah produk transdermalnya dipasaran sangat terbatas (Walter K.A, 2002; Grassi, Mario, *et al* 2007: 108).

D. *Ethosom*

Ethosom merupakan bentuk modifikasi dari liposom dan mengandung etanol yang tinggi. Sistem ethosom terdiri dari fosfolipid, etanol dan air. Ethosom dapat berpenetrasi melalui kulit, meningkatkan penghantaran obat sampai pada kulit terdalam dan sistem sirkulasi (Kumar R *et al.* 2010: 111).

Ethosom adalah sistem gelembung yang menarik serta inovatif dalam teknologi farmasi dan penghantaran obat ditahun belakangan ini. Yang menarik dalam pembawa ini adalah kemampuannya untuk berpenetrasi sempurna melalui kulit manusia. Ethosom bersifat lembut, gelembung yang lunak sesuai untuk meningkatkan penghantaran zat aktif. Karakteristik fisika kimia ethosom telah memperlihatkan bahwa gelembung pembawa ini dapat membawa bahan aktif lebih efektif melalui stratum korneum sampai ke lapisan paling dalam kulit dibandingkan dengan liposom. Aspek inilah yang sangat penting dalam desain pembawa yang digunakan secara topikal ataupun pemberian obat secara sistemik (Dave *et al.* 2010: 81-82).

Ethosom telah digunakan dalam beberapa aplikasi seperti farmasi, bioteknologi, kosmetik dan nutrisi. Gelembung lembut ini menghadirkan pembawa baru dalam meningkatkan penghantaran melalui kulit. Ukuran dari gelembung ethosom dapat diatur dari 10 nanometer sampai mikron (Raj *et al.*, 2010: 3).


Mekanisme penghantaran obat oleh ethosom maupun liposom dapat dianggap berasal dari interaksi ethosom dengan lapisan lipid pada kulit. Suatu mekanisme interaksi yang mungkin terjadi ada dua fase yaitu :

a. Efek etanol

Etanol membantu penetrasi di kulit dengan cara menembus ke dalam lipid interseluler dan meningkatkan fluiditas dari membran sel lipid serta menyusutkan lapisan lipid multilayer pada membran sel.

b. Efek ethosom

Peningkatan fluiditas dari membran sel lipid yang disebabkan oleh etanol pada ethosom dapat meningkatkan penyerapan air (permeabilitas) pada kulit. Sehingga ethosom akan diserap dengan mudah melalui lapisan multilayer yang menyusut dan menyatu, kemudian melepaskan obat ke dalam lapisan kulit yang terdalam (hipodermik/ subkutan) (Akiladevi *et al*, 2010: 1).



Gambar 4. Mekanisme kerja ethosom (Anitha *et al*, 2011: 20)

1. Kelebihan ethosom

Adapun kelebihan dari ethosom antara lain :

- a. Ethosom dapat meningkatkan permeasi melalui kulit untuk transdermal dan dermal.

- b. Ethosom merupakan pembawa dalam penghantaran beberapa obat (peptide dan molekul protein).
- c. Komposisi ethosom aman dan komponen-komponen ini dapat digunakan dalam farmasi dan kosmetik.
- d. Tingkat kepatuhan pasien yang tinggi, bentuk ethosom dapat diberikan secara semisolid (dalam bentuk gel atau krim).
- e. Tingkat pemasaran yang menarik karena memiliki teknologi yang tinggi. Relatif sederhana dalam pembuatan karena tidak membutuhkan teknik yang khusus (Maurya *et al*, 2011: 33).

2. Metode pembuatan ethosom

Ethosom dapat dibuat dengan menggunakan dua metode yang sangat sederhana yaitu metode panas dan metode dingin.

a. Metode panas

Pada metode ini, fosfolipid didispersikan dalam air yang dipanaskan hingga suhu 40°C menggunakan tangas air hingga terbentuk larutan koloid. Pada bejana terpisah etanol dan propilen glikol dicampur dan dipanaskan hingga 40°C . Pada saat campuran mencapai suhu 40°C , ditambahkan fase organik ke dalam air. Obat dilarutkan dalam air atau etanol kemudian dituang pada bagian hidrofilik/ hidrofobik. Ukuran gelembung dari pembuatan ethosom dapat disusut sesuai keinginan dengan penggunaan sonikasi (Akiladevi *et al*, 2010: 3).

b. Metode dingin


Metode ini paling umum digunakan dalam pembuatan ethosom. Dalam metode ini fosfolipid, obat dan bahan lipid lainnya dilarutkan menggunakan etanol dalam bejana tertutup pada suhu kamar, diaduk dengan kuat menggunakan mixer. Propilen glikol atau poliol lainnya ditambahkan selama proses pengadukan. Selanjutnya, campuran ini dipanaskan pada suhu 30°C menggunakan tangas air. Air yang dipanaskan hingga 30°C dalam bejana terpisah, ditambahkan ke dalam campuran. Diaduk selama 5 menit dalam bejana tertutup. Ukuran gelembung dari pembuatan ethosom dapat disusut sesuai keinginan dengan penggunaan sonikasi (Akiladevi *et al*, 2010: 3).

3. Bahan pembentuk ethosom

Ethosom utamanya terdiri dari fosfatidilkolin, hidroalkohol, glikol dengan konsentrasi yang tinggi, dan air. Fosfatidilkolin yang digunakan dapat berupa fosfatidilkolin kedelai, fosfatidilkolin terhidrogenase, fosfatidilkolin dari telur, dipalmitat fosfatidilkolin. Sedangkan alkohol dapat digunakan etanol, isopropil alkohol, propilen glikol dan transkutol (Cristina *et al*, 2010).

a. Fosfolipid

Fosfolipid berbentuk serbuk putih, kadang-kadang terlihat bersih, hampir tidak berwarna jika dalam larutan kloroform dan metilen klorid. Fosfolipid dapat diperoleh dari bahan alam seperti telur, kacang kedelai, atau juga dari sintesis.



Gambar 5. Struktur Fosfatidilkolin (Leekumjorn, 2004)

Fosfolipid merupakan molekul amfifilik dan merupakan komponen terbesar yang menyusun membran sel. Mereka dapat menggabungkan diri dan membentuk beberapa struktur, termasuk misel dan liposom. Fosfatidilkolin memiliki kelarutan yang rendah dalam air.

Beberapa formulasi farmasi yang menggunakan fosfolipid untuk membentuk beberapa tipe liposom, termasuk unilamellar (satu membran bilayer yang mengelilingi bagian air), multilamellar (dua atau lebih membran kosentris, masing-masing mengelilingi bagian air).

Lipid lapis ganda terbentuk karena sifat termodinamika fosfolipid, terjadi transisi struktur lipid lapis ganda dari fasa gel (padat) menjadi fasa kristal cair karena pengaruh perubahan temperatur. Hal ini berkaitan erat dengan penggunaan liposom sebagai penghantar obat dalam proses preparasi dan pemilihan jenis fosfolipid. Sifat termodinamika yang harus diperhatikan pada fosfolipid adalah fasa transisi dan interaksi molekular dari fosfolipid (Abdasah, 2004). Dalam hal ini, maka pemilihan metode pembuatan ethosom juga sangat diperhatikan. Temperatur yang digunakan dalam pembuatan

ethosom adalah 30°C dan 40°C tergantung dari suhu transisi fosfolipid yang digunakan. Untuk membentuk gelembung dengan penjerapan obat yang optimal.


b. Etanol

Touitou menemukan dan menyelidiki sistem gelembung lipid yang ditambahkan alkohol dengan konsentrasi relatif tinggi dan dinamakan ethosom. Perbedaan mendasar pada liposom dan ethosom terletak pada komposisinya. Efek sinergik dari kombinasi etanol dengan konsentrasi yang tinggi 20-50% dalam gelembung membentuk ethosom telah disarankan sebagai alasan utama untuk kemampuan yang lebih baik dalam permeasi kulit. Konsentrasi etanol yang tinggi 20-50% dalam formulasi ethosomal mengganggu aturan lipid bilayer kulit. Oleh karena itu, ketika terintegrasi ke dalam gelembung membran, ini akan memberikan kekuatan terhadap gelembung untuk berpenetrasi ke stratum korneum. Sejauh ini dalam kaitannya dengan konsentrasi etanol yang tinggi, membran lipid ethosomal telah dikemas lebih renggang dibanding dengan gelembung konvensional tetapi memiliki stabilitas yang sama. Inilah yang membuat strukturnya lebih lembut dan lunak yang memberikan kebebasan yang lebih stabil dari membran, yang mana akan menyelip masuk melalui lipid stratum korneum yang diintegrasikan (Touitou, 2009).

E. *Nifedipin*

1. Sifat fisika kimia

Nifedipin merupakan pemblok kalsium *channel* dengan rumus kimia $C_{17}H_{18}N_2O_6$ dan nama kimia Dimethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate. Berat molekul nifedipin yaitu 346,3. Pemerian nifedipin yaitu serbuk kristal berwarna kuning dengan titik leleh 172 sampai 174. Nifedipin praktis tidak larut dalam air, sedikit larut dalam ethanol, larut dalam aseton dan kloroform, memiliki koefisien partisi log P (oktanol/air) 2,2 dengan panjang gelombang maksimum pada larutan asam 238 nm dan 338 nm (Moffat *et al*, 2005).



Gambar 6. Rumus Struktur Nifedipin (Moffat *et al*, 2005).

Ketika terpapar sinar matahari atau cahaya dengan panjang gelombang buatan akan berubah menjadi derivat nitrofenilpiridin, paparan sinar UV berperan penting dalam terbentuknya derivat nitrofenilpiridin. Bentuk larutannya dibuat pada tempat yang gelap atau dengan cahaya yang mempunyai panjang gelombang lebih besar dari 420 nm. Digunakan

segera setelah pemakaian pertama. Terlindung dari cahaya (Moffat *et al*, 2005).

2. Farmakologi

Nifedipin termasuk senyawa kelompok 1,4-dihidropiridin, merupakan antagonis kalsium yang digunakan untuk pengobatan angina dan hipertensi. Pada penggunaan secara oral lebih dari 80 % diabsorpsi di usus, akan tetapi ketersediaan hayatinya lebih rendah sekitar (40-60 %) karena adanya *first pass effect* (Mutschler, 1999: 477). Waktu paruh plasma sekitar 2-6 jam, ikatan protein plasma sekitar 92-98 % (Moffat *et al*, 2005).

a. Hipertensi

Dalam sel normal, kadar ion kalsium bebas lebih rendah daripada ruang ekstrasel. Perubahan atau pengaturan dapat dilakukan dengan pembukaan atau penutupan saluran kalsium, pembebasan atau pengikatan kalsium intrasel serta oleh pompa ion kalsium yang terdapat dalam membran sel dan dalam membran intrasel (Mutschler, 1999: 475). Antagonis kalsium menghambat masuknya kalsium ke dalam sel-sel otot polos koroner jantung. Menghambat influks kalsium pada sel otot polos pembuluh darah dan miokard. Di pembuluh darah, antagonis kalsium terutama menimbulkan relaksasi arterioli, sedangkan vena kurang dipengaruhi (Gunawan, 2007: 358). Hal ini menurunkan resistensi perifer dan menyebabkan penurunan tekanan darah karena konsentrasi ion kalsium (bebas) intrasel menentukan keadaan

kontraktilitas sel otot polos pembuluh, jelaslah bahwa antagonis kalsium bekerja sebagai vasodilatasi (Mutschler, 1999: 489). Sifat antagonis kalsium adalah :

- 1) Golongan dihidropiridin (nifedipin, nikardipin, isradipin) bersifat vaskuloselektif yang menguntungkan karena menurunkan resistensi perifer tanpa penurunan fungsi jantung yang berarti dan relatif aman dalam kombinasi dengan β -bloker.
- 2) Bioavailabilitas oral relatif rendah, disebabkan karena eliminasi presistemik (metabolisme lintas pertama) yang tinggi di hati.
- 3) Kadar puncak tercapai dengan cepat, hal ini menyebabkan tekanan darah turun dengan cepat dan ini dapat mencetuskan iskemia miokard atau serebral.
- 4) Waktu paruh umumnya pendek/sedang, sehingga kebanyakan harus diberikan 2 atau 3 kali sehari.
- 5) Semua antagonis kalsium dimetabolisme di hati, penggunaannya pada sirosis hati dan usia lanjut harus dilakukan dengan sangat hati-hati (Gunawan, 2007: 358).

Efek penurunan tekanan darah akan makin besar, jika tekanan darah awal makin tinggi. Pada orang dengan tekanan darah normal, pada penggunaan obat dengan dosis terapeutik, tekanan darah hampir tidak berubah (Mutschler, 1999: 489). Pada pasien hipertensi, dalam suatu penelitian retrospektif menunjukkan bahwa penggunaan penyekat

kanal kalsium kerja singkat terutama dengan dosis tinggi berhubungan dengan peningkatan bahaya infark jantung.

Nifedipin kerja singkat paling sering menyebabkan hipotensi dan dapat menyebabkan iskemia miokard atau serebral. Refleks takikardia dan palpitasi mempermudah terjadinya serangan angina pada pasien PJK. Hipotensi sering terjadi pada pasien usia lanjut. Nifedipin lepas lambat dengan mula kerja yang lambat menimbulkan efek samping yang lebih jarang dan lebih ringan (Gunawan, 2007: 359).

b. Angina

Antagonis kalsium memblok kanal kalsium tipe L yang sensitif tegangan pada otot polos arteri dan menyebabkan vasodilatasi. Nifedipin kurang mempengaruhi kinetik kanal kalsium, sehingga tidak tergantung pada frekuensi stimulasi dan tidak mempengaruhi konduksi jantung tetapi mempunyai efek yang lebih kuat terhadap otot polos dari otot jantung atau sistem konduksi (Gunawan, 2007: 476). Nifedipin diberikan oral dan mempunyai waktu paruh lebih pendek (kira-kira 4 jam) sehingga perlu dosis berulang. Efek vasodilatasi nifedipin berguna dalam pengobatan angina yang disebabkan spasme koroner spontan. Efek samping disebabkan karena vasodilatasi berlebihan yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang tidak diinginkan, kenaikan frekuensi jantung reflektoris, sakit kepala, pusing, mual, gangguan saluran cerna, pemerahan kulit dan udem pada kaki

(Mutschler, 1999: 477). Kontraindikasinya pada aritmia dan hipotensi parah (Gunawan, 2007: 359).

F. *Gel*

Gel adalah sistem padat atau setengah padat dari paling sedikit dua konstituen yang terdiri dari massa seperti pagar yang rapat dan diselusupi oleh cairan. Jika matrik yang saling melekat kaya akan cairan, maka produk ini seringkali disebut *jelly*.

Gel mempunyai kekakuan yang disebabkan oleh jaringan yang saling menganyam dari fase terdispersi yang mengurung dan memegang medium pendispersi. Perubahan dalam temperatur dapat menyebabkan gel tertentu mendapatkan kembali bentuk sol atau bentuk cairnya. Juga beberapa gel menjadi encer setelah pengocokan dan segera menjadi setengah padat atau padat kembali setelah dibiarkan tidak terganggu untuk beberapa waktu tertentu, peristiwa ini dikenal sebagai tiksotropi (Ansel, 1989: 390-392).

Penyerapan senyawa pada pemberian transdermal berkaitan dengan pemilihan bahan pembawa sehingga bahan aktif dapat berdifusi dengan mudah ke dalam struktur kulit. Bahan pembawa dapat mempengaruhi keadaan dengan mengubah permeabilitas kulit dalam batas fisiologik dan bersifat reversible terutama dengan meningkatkan kelembaban kulit (Aiache, 1993).

Adapun bahan-bahan pembentuk gel yang digunakan pada formulasi ini adalah :

1. Karbopol

Karbopol merupakan bahan pembentuk gel yang sempurna. Dapat membentuk gel dengan baik dan juga merupakan penambah viskositas. Selain itu karbopol juga dijadikan sebagai pembentuk gel transparan dengan konsentrasi 0,5-2,0 % (Rowe, 2006: 111).

2. Trietanolamin (TEA)

Trietanolamin digunakan pada sediaan topikal pada emulsi, pemerian: cairan kental, tidak berwarna hingga kuning pucat, bau lemah mirip amoniak, higroskopik. Kelarutan : mudah larut dalam air dan dalam etanol (95%) P, larut dalam kloroform. Konsentrasi digunakan sebagai pengemulsi 2-4 % trietanolamin dan 2-5 kali pada asam lemah. Dalam formulasi ini berfungsi sebagai pengalkali (Rowe, 2006: 794) dengan konsentrasi 0,5% b/b (Agoes, 2008: 183).

3. Gliserin

Gliserin digunakan secara luas dalam berbagai variasi formulasi farmasetik yang mencakup sediaan oral, ophtalmik, topikal, sediaan parenteral, kosmetik dan produk makanan. Dalam sediaan topikal formulasi farmasetik dan kosmetik, gliserin terutama digunakan sebagai humektan dan emolient. Gliserin digunakan sebagai humektan dalam sediaan kosmetik dengan konsentrasi hingga 30 % (Rowe, 2006: 301). Dengan penambahan gliserol 10 % sebagai bahan pembuat lunak dinilai krim dapat kilau mutiara dan lebih menjadi cemerlang. Untuk pembuatan gel digunakan dengan konsentrasi 10,0% b/b (Agoes, 2008: 183).

4. Propilen glikol


Propilen glikol secara luas digunakan sebagai pelarut dan pengawet dalam berbagai sediaan parenteral dan non parenteral pada konsentrasi 15-25% (Rowe, 2006: 624). Penggunaan metil paraben sebagai antimikroba dalam suatu sediaan akan tereduksi oleh bahan-bahan surfaktan non ionik seperti polisorbat 80 dan turunan selulosa. Untuk mengoptimalkan kembali kerja metil paraben tersebut maka dikombinasi dengan propilen glikol sebanyak 10% (Rowe, 2006: 468).

5. Metil paraben

Digunakan sebagai pengawet antimikroba dalam kosmetik, produk makanan, dan berbagai jenis formulasi farmasi. Pemerian : serbuk putih, berbau, serbuk higroskopik, mudah larut dalam air. Digunakan pada pengawet kosmetik, makanan dan sediaan farmasetik. Dapat digunakan sendiri, kombinasi dengan pengawet paraben lain atau dengan antimikroba lainnya. Konsentrasi sebagai pengawet untuk sediaan topikal adalah 0,02-0,3 % (Rowe, 2006: 466).

G. Uji Difusi In Vitro Pada Sediaan Transdermal

Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Industri Vankel di awal tahun 1990. Sel difusi Franz adalah suatu metode yang sederhana untuk pengujian sediaan semipadat. Alat ini terdiri dari kompartemen donor yang berukuran kecil, kompartemen penerima berbentuk silinder yang dilengkapi dengan magnet *stir-bar*. Metode ini digunakan untuk pengujian disolusi terhadap peningkatan penetrasi secara *in vitro*.



Gambar 7. Sel Difusi Franz (Lienberg, 2004: 20)

H. Tinjauan Agama

1. Islam dan Ilmu Pengetahuan

Islam merupakan agama akal (*reason*) sekaligus nurani (*conscience*). Seseorang mengenali kebenaran yang telah dinyatakan agama dengan menggunakan ilmunya, tetapi menarik kesimpulan dari kebenaran yang telah dilihatnya dengan mengikuti nuraninya. Seseorang yang menggunakan kemampuan akal dan nuraninya dalam mempelajari objek apapun di dalam alam semesta ini, sekalipun ia bukanlah seorang pakar, akan paham bahwa tersebut telah diciptakan oleh Pemilik kebijakan, Ilmu dan Kekuatan yang agung (Yahya, 2004: 14).

Agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya, agama merupakan sumber tunggal yang menyediakan jawaban pasti dan akurat, misalnya untuk pertanyaan bagaimana kehidupan dan alam semesta

tercipta. Dengan demikian, jika dimulai pada landasan yang tepat, riset akan mengungkapkan kebenaran mengenai asal-usul alam semesta dan pengaturan kehidupan dalam waktu tersingkat serta dengan upaya dan energi minimum. Seperti dinyatakan oleh Albert Einstein, yang dianggap sebagai ilmuwan terbesar abad ke-20, “Sains tanpa agama adalah pincang”, dengan perkataan lain, ilmu pengetahuan tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tetapi justru membuang waktu dalam mencapai hasil tertentu, atau lebih buruk lagi sering kali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan (Yahya, 2004: 11).

Di dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan manusia untuk memikirkan dan mengkaji tanda-tanda penciptaan di sekitar mereka. Rasulullah Muhammad saw, Sang utusan Allah, juga memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. Barang siapa menyelidiki seluk-beluk alam semesta dengan segala sesuatu yang hidup dan tak hidup di dalamnya dan memikirkan serta menyelidiki apa yang dilihatnya di sekitarnya, akan mengenali kebijakan, Ilmu dan kekuasaan abadi Allah (Yahya, 2004: 15).

Orang yang memikirkan hal-hal seperti inilah yang dinamakan orang berfikir dan dapat mencapai kesimpulan yang sangat bermakna dari apa yang ia pikirkan. Seseorang juga berfikir hal-hal yang bermakna, penuh hikmah dan penting setiap saat semenjak bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur dan mengambil hikmah ataupun kesimpulan dari apa yang dipikirkannya.

Dalam al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman memikirkan dan merenungkan secara mendalam segala kejadian yang ada dan mengambil pelajaran yang berguna dari apa yang mereka pikirkan.

Dalam al-Qur'an Ali Imran, 3: 190-191 Allah berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”.

Hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan, pada hakikatnya, ditetapkan dan diatur oleh Allah Yang Maha hidup lagi *Qayyum* (Maha menguasai dan Maha mengelola sesuatu). Hakikat ini kembali ditegaskan pada ayat ini dan salah satu bukti kebenaran hal tersebut adalah mengundang manusia untuk berpikir, karena

Sesungguhnya dalam penciptaan, yakni kejadian seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di langit atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian dan perputaran bumi dan porosnya, yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang perbedaannya, baik dalam masa maupun dalam panjang dan pendeknya terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni. Yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai kepada bakti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah swt (Shihab, 2009: 370).

Ulul albab yang disebutkan pada ayat adalah orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang terus-menerus mengingat Allah, dengan ucapan dan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, atau bagaimanapun dan mereka memikirkan tentang penciptaan, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan: “Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia, tanpa tujuan yang hak. Apa yang kami alami, atau lihat, atau dengar dari keburukan atau kekurangan. Mahasuci Engkau dari semua itu. Itu adalah ulah atau dosa dan kekurangan kami yang dapat menjerumuskan kami ke dalam siksa neraka maka peliharalah kami dari siksa neraka (Shihab, 2009: 372).

Di atas, terlihat bahwa objek zikir adalah Allah, sedang objek pikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Ini berarti

pengenalan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada kalbu, sedang pengenalan alam raya oleh penggunaan akal, yakni berpikir (Shihab, 2009: 373).

Ayat di atas menyatakan bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang berfikir, maka mereka mampu melihat hal-hal yang menakjubkan dari ciptaan Allah dan mengagungkan kebesaran serta kebijaksanaan Allah (Yahya, 2004: 15).

Sains adalah penyelidikan terhadap dunia materi yang kita tinggali melalui pengamatan dan percobaan. Oleh karena itu, melalui aktivitas penyelidikan, sains akan menghasilkan berbagai kesimpulan berdasarkan informasi yang akan yang dikumpulkan lewat pengamatan dan percobaan. Kenyataan memperlihatkan bahwa para sarjana muslim klasik bukan hanya sekedar penerjemah dan penerus tradisi pola pemikiran Yunani. Para ilmuwan muslim juga memberi kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan, yakni dengan melakukan observasi dan eksperimen. Pertanyaan yang relevan adalah apabila tradisi Yunani hanya mewariskan satu pola pendekatan atas berbagai fenomena, dari manakah para ilmuwan muslim mendapat ide orisinal yakni penggunaan observasi dan eksperimen dalam memahami ciptaan? Satu-satunya jawaban yang mungkin dan masuk akal adalah pesan yang berulang-ulang dengan redaksional yang berbeda-beda di dalam kitab suci Alquran seperti *alam tara*, *afala ta'qilun*, *Afala tubsirun*, *afala tatazakarun* dan *afala tanzurun*, *afala tatafakkarun*

untuk memahami fenomena alam. Allah swt. berfirman dalam Q.S al-An'am, 6: 50

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنَّا نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ قُلْ
هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

Terjemahnya :

"Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) Aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) Aku mengatakan kepadamu bahwa Aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya)?" (Departemen agama RI, 2008).

2. Perspektif Islam Terhadap Pengobatan

Islam memandang ilmu pengetahuan dan teknologi pengobatan sebagai cabang dari ilmu pengetahuan, untuk memahami secara ilmiah dari cara pengobatan dengan memperhatikan bagaimana cara seseorang untuk merancang suatu obat yang lebih baik digunakan bagi manusia dengan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Pengetahuan semacam ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah swt, sehingga kita harus terus berusaha untuk menggali ilmu-ilmu pengobatan.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah, 2: 269

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
 أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Terjemahnya :

Allah menganugerahkan al-Hikmah (kefahaman yang dalam tentang al-Qur'an dan as-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang banyak. dan Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).

Allah swt. sebagai Tuhan yang mempunyai tanda-tanda ketuhanan-Nya berupa hasil-hasil ciptaan-Nya, berupa langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya. Termasuk juga kejadian-kejadian yang berlangsung dalam makhluk-Nya tersebut seperti Allah swt. menciptakan penyakit dan juga menciptakan obatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dari Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بِرَأْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 (رواه مسلم)

Artinya :

“Masing-masing penyakit pasti ada obatnya. Kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh dengan izin Allah Azza wa jalla”. (H.R. Muslim) (An-Naisaburi,1998).

Dalam *shohih* 'l-Bukhori dan *Muslim*, dari Abu Huroiroh bahwa ia berkata : Rasulullah saw. Bersabda :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه ابن مخره)

Artinya :

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit, kecuali Allah menurunkan obatnya”. (H.R. Ibnu Majah) (al-Quzwain, 2008).

3. Alkohol yang Digunakan dalam Obat

Dalam ilmu kimia, yang dimaksud alkohol adalah senyawa organik yang dalam struktur molekulnya memiliki gugus hidroksil (OH). Namun yang dimaksud dalam kehidupan sehari-hari adalah etil alkohol atau etanol dengan rumus kimia C_2H_5OH . Alkohol merupakan zat cair yang lebih ringan dari air, mudah terbakar, dan dapat bercampur dengan air, mudah menguap, mudah melarutkan lemak dan berbagai senyawa organik. Sifat ini memungkinkan alkohol digunakan sebagai pelarut dalam bahan obat. Alkohol dapat dibuat secara sintesis dan fermentasi, tapi kebanyakan alkohol diperoleh dengan cara fermentasi. Pada dasarnya fermentasi dapat dilakukan terhadap bahan pangan yang mengandung karbohidrat (zat tepung/gula) seperti beras/ketan, ubi, jagung, gandum, kurma dan berbagai jenis buah lain, utamanya yang terasa manis.

Permasalahan alkohol sering dikaitkan dengan khamr yang nyata-nyata diharamkan meminumnya. Hal tersebut cukup beralasan mengingat hadist Nabi yang menyatakan:

كُلُّ خَمْرٍ مُسْكِرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya:

Setiap minuman yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram (H.R. Muslim)

Yang jadi *illah* (sebab) pengharaman khamr adalah karena memabukkan. Khamr diharamkan karena *illah* (sebab pelarangan) yang

ada di dalamnya yaitu karena memabukkan. Jika *illah* tersebut hilang, maka pengharamannya pun hilang. Karena sesuai kaedah “*al hukmu yaduuru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman* (hukum itu ada dilihat dari ada atau tidak adanya *illah*)”. *Illah* dalam pengharaman khomr adalah memabukkan dan *illah* ini berasal dari al-Qur’an, As-Sunnah dan ijma’ (kesepakatan ulama kaum muslimin).

Komponen khamr yang memabukkan adalah alkohol. Oleh karena sering kali khamr disebut pula alkohol. Kalau khamr sudah jelas nas hukumnya yaitu haram untuk meminumnya baik dalam jumlah banyak maupun sedikit.

Berdasarkan kemampuan alkohol melarutkan berbagai bahan organik, alkohol banyak digunakan dalam pembuatan obat minum. Secara umum ada empat fungsi alkohol dalam obat minum yaitu sebagai pelarut, preservatif, penyegar, dan zat aktif dalam obat. Pada sediaan obat luar, alkohol sering merupakan zat aktif (kompres, lotion, desinfektan, dan sebagainya) di samping sebagai zat pembawa. Pemakaian alkohol untuk obat luar dan kosmetika dapat diterima, karena ia segera lenyap atau menguap setelah diaplikasikan (Tim perumus, 1998).

Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin menjelaskan, “Adapun beberapa obat yang menggunakan campuran alkohol, maka itu tidaklah haram selama campuran tersebut sedikit dan tidak nampak memberikan pengaruh (Tuasikal, 2010).

Komisi fatwa MUI pada Agustus 2000 menetapkan bahwa yang disebut minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol minimal 1%. Jadi diperbolehkan menggunakan obat yang mengandung alkohol dibawah 1% untuk dikonsumsi, lebih dari 1% maka ia tidak boleh dan termasuk minuman khamr yang dilarang oleh syari'at.

Dalam penelitian ini, pembuatan *ethosome* nifedipin menggunakan alkohol sebanyak 50% untuk membantu membentuk karakter gelembung yang elastis serta membantu pelarutan obat nifedipin. Namun, alkohol bebas dari hasil sentrifus tidak digunakan dan selanjutnya *ethosome* dikering anginkan untuk menguapkan alkohol bebas yang masih tersisa. Sehingga alkohol yang terkandung dalam sediaan obat akan berkurang drastis jumlahnya. Selain itu, obat ini hanya digunakan secara topikal (obat luar) sehingga tidak memabukkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat- Alat yang Digunakan

Alat-alat gelas yang biasa digunakan di laboratorium, magnetik stirrer, sentrifuge, spektrofotometer UV-VIS (*Genesis*), spoit dan sel difusi yang dimodifikasi, serta timbangan analitik.

2. Bahan- Bahan yang Digunakan

Air suling, Dapar fosfat pH 7,4, Ethanol (*Merk*), Fosfatidilkolin (*Sigma Aldrich*), Karbopol, Nifedipin (*Bayer*), Mencit, Metil paraben, NaCl 0,9%, Propilen glikol, TEA, natrium lauril sulfat (*Texapon*).

B. Cara Kerja

1. Formula

Tabel 1. Formula ethosom * (Rizal, 2012: 66)

Bahan	Konsentrasi b/v
Nifedipin	0,05%
Etanol	50%
Fospatidilkolin	1,5%
Air suling hingga	20 ml

*ethosom mengandung nifedipin setara 7,144 mg

Tabel 2. Rancangan formula basis gel ethosom nifedipin

Bahan	Konsentrasi % (b/b)		
	I	II	III
Karbopol 940	0,5	1	1,5
Gliserin	10	10	10
TEA	0,5	0,5	0,5
Metil paraben	0,18	0,18	0,18
Propilen glikol	10	10	10
Air suling hingga	100	100	100

Tabel 3. Rancangan formula gel ethosome nifedipin

Bahan	Konsentrasi % (b/b)		
	I	II	III
Ethosome nifedipin	2,08 g	2,08 g	2,08 g
Basis gel hingga	100	100	100

Ket : sediaan gel mengandung ethosom nifedipin 2,08 gram setara dengan 10 mg nifedipin / gram gel.

2. Pembuatan ethosom (metode panas) (Rizal, 2012: 67)

Dalam metode ini fosfolipid didispersikan dalam air dengan pemanasan pada suhu 40°C sampai terbentuk larutan koloid. Pada tempat yang lain etanol dipanaskan sampai suhu 40°C dan nifedipin yang dilarutkan di dalamnya. Kemudian keduanya dicampur pada suhu 40°C dengan menggunakan magnetic stirrer pada 700 rpm selama 30 menit.

Ethosom yang telah terbentuk disimpan selama 12 jam pada suhu 4°C dan disentrifus selama 3 jam dengan kecepatan 10.000 rpm. Kemudian dipisahkan ethosom dari lapisan supernatannya.

3. Pembuatan sediaan gel

Pembuatan gel ethosom nifedipin dilakukan dengan cara ditimbang karbopol, didispersikan ke dalam sejumlah kecil air panas yang sebelumnya telah dilarutkan metil paraben ke dalamnya, aduk dan diamkan. Ditambahkan TEA (diaduk hingga homogen). Ditambahkan gliserin dan propilen glikol ke dalam campuran, diaduk hingga homogen dan didiamkan selama 1 x 24 jam.

Setelah terbentuk basis gel kemudian ditambahkan ethosom nifedipin basah sebanyak 2,08 gram dengan kadar nifedipin setara 10 mg/gram gel, homogenkan.

4. Pembuatan kurva baku nifedipin (Sheer A, Chauhan M, 2011; Munir, 2011)

a. Pembuatan medium penerima

Dibuat medium penerima dari dapar fosfat pH 7,4 sebanyak 1000,0 ml yang mengandung natrium lauril sulfat 2,5% b/v. Pembuatan medium penerima dilakukan dengan cara melarutkan natrium lauril sulfat dalam sebagian kecil larutan buffer fosfat pH 7,4, kemudian dicukupkan volumenya dengan dapar fosfat pH 7,4 hingga 1000,0 ml.

b. Penentuan panjang gelombang maksimum dalam medium penerima

Dibuat satu konsentrasi nifedipin dengan medium penerima (dapar fosfat pH 7,4 yang mengandung natrium lauril sulfat 2,5% b/v). Kemudian ditentukan panjang gelombang maksimumnya dengan spektrofotometer UV-VIS.

c. Pengukuran absorban deret konsentrasi

Dibuat satu seri konsentrasi nifedipin baku lalu diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang yang telah ditentukan di atas. Kemudian dibuat persamaan kurva bakunya yaitu hubungan antara absorban dengan konsentrasi masing-masing larutan baku sehingga diperoleh persamaan garis $y = ax + b$.

5. Uji daya penetrasi menggunakan sel difusi (Sheer A, Chauhan M, 2011)

a. Penetapan kadar nifedipin yang melintasi membran

Kompartemen cairan penerima pada alat sel difusi diisi dengan dapar fosfat pH 7,4 sebanyak 100 ml dengan penambahan natrium lauril sulfat 2,5% b/v. Sediaan gel ethosom nifedipin sebanyak 1 g (mengandung 10 mg nifedipin), dioleskan secara merata pada kulit mencit dengan luas area $9,42 \text{ cm}^2$ ($\theta = 1 \text{ cm}$) yang diletakkan pada alat sel difusi. Suhu kompartemen penerima disesuaikan suhunya 37°C . Pengambilan cuplikan (4 ml) dilakukan berturut-turut pada menit ke- 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480, dan 720. Volume cairan yang diambil segera digantikan dengan medium yang baru pada suhu yang sama.

Cuplikan kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang maksimumnya.

b. Penentuan fluks nifedipin yang melintasi membran

Fluks nifedipin ditentukan dengan membuat kurva hubungan antara konsentrasi nifedipin yang melintasi membran vs waktu sehingga diperoleh persamaan kurva linear $y = ax + b$.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

1. Hasil Absorbansi Nifedipin

Tabel 4. Absorbansi Vs Kadar Nifedipin Menggunakan Dapar Fosfat pH 7,4 (mengandung natrium lauril sulfat 2,5% b/v)

No.	Kadar ($\mu\text{g/ml}$)	Absorban
1.	20	0,286
2.	30	0,463
3.	40	0,600
4.	50	0,735
5.	60	0,891

2. Kurva Baku Nifedipin Menggunakan Pelarut Dapar Fosfat pH 7,4 (mengandung natrium lauril sulfat 2,5% b/v)




Gambar 8. Grafik Kurva Baku Nifedipin

3. Hasil Pengukuran Kadar Nifedipin yang Melintasi Membran

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kadar Nifedipin Yang Melintasi Membran Dalam Larutan Dapar Fosfat pH 7,4 (mengandung natrium lauril sulfat 2,5% b/v)

No.	Waktu (menit)	Nifedipin yang melintasi membran ($\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$)		
		F1	FII	FIII
1.	5	0	0	0
2.	10	0	0	0
3.	15	0	0	0
4.	30	0	0	0
5.	60	50,955	0	0
6.	90	414,922	36,396	0
7.	120	1246,587	227,479	0
8.	240	2080,072	898,999	331,047
9.	480	3384,895	2742,493	1837,315
10.	720	6123,748	4979,071	3914,641

Ket : FI = konsentrasi basis gel 0,5%
 FII = konsentrasi basis gel 1%
 FIII = konsentrasi basis gel 1,5%



Gambar 9. Grafik hubungan Nifedipin yang melintasi membran ($\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$) terhadap waktu (menit).

4. Kecepatan Melintasi Membran

Tabel 6. Kecepatan melintasi membran Nifedipin per jam dari sediaan gel ethosome berdasarkan uji penetrasi selama 12 jam.

No.	Sampel	Fluks ($\mu\text{g. cm}^{-2}.\text{menit}^{-1}$)
1	Formula I	8,394
2	Formula II	6,869
3	Formula III	5,193

Ket : FI = konsentrasi basis gel 0,5%
 FII = konsentrasi basis gel 1%
 FIII = konsentrasi basis gel 1,5%

5. Jumlah Kumulatif Nifedipin yang Melintasi Membran dan Kecepatan Melintasi Membran Dari Sediaan Gel Ethosome.

Tabel 7. Kumulatif dan kecepatan terpenetrasi Nifedipin dari sediaan gel ethosom.

No.	Sampel	Kumulatif Nifedipin yang melintasi membran ($\mu\text{g.cm}^{-2}$)	Fluks ($\mu\text{g.cm}^{-2}.\text{menit}^{-1}$)	R ²	r
1.	Formula I	6123,748	8,394	0,982	0,990
2.	Formula II	4979,071	6,869	0,971	0,985
3.	Formula III	3914,641	5,193	0,929	0,963

Ket : FI = konsentrasi basis gel 0,5%
 FII = konsentrasi basis gel 1%
 FIII = konsentrasi basis gel 1,5%

B. *Pembahasan*

Hipertensi dikenal secara luas sebagai penyakit kardiovaskuler. Seseorang dikatakan hipertensi bila terjadi peningkatan tekanan darah diastolik atau sistolik. Pada kebanyakan kasus, hipertensi terdeteksi pada saat pemeriksaan fisik karena alasan penyakit tertentu, sehingga sering disebut sebagai “*silent killer*”. Tanpa disadari penderita mengalami komplikasi pada organ-organ vital seperti jantung, otak, ataupun ginjal. Gejala-gejala hipertensi, seperti pusing, gangguan penglihatan, dan sakit kepala, sering kali terjadi pada saat hipertensi (Depkes, 2006: 12).

Angina pectoris merupakan gejala utama dari iskemia miokard, yang terjadi bila suplai oksigen ke jantung tidak cukup sehingga terjadi penumpukan asam laktat dan menimbulkan nyeri angina yang khas. Untuk pengobatan hipertensi dan angina biasanya digunakan obat dari golongan antagonis kalsium yaitu nifedipin.

Nifedipin bekerja dengan cara meningkatkan suplai oksigen miokard melalui dilatasi langsung arteri epikardial sehingga dapat mengatasi atau mencegah vasospasme koroner pada angina selain itu tekanan darah menurun akibat tegangan dinding ventrikel selama sistol (*afterload*) berkurang (Gunawan, 1987: 314).

Selama ini pemilihan bentuk sediaan nifedipin untuk penyakit hipertensi dan angina masih terfokus pada pemberian secara oral karena sifatnya yang mudah larut dalam lemak, akan tetapi metabolisemenya berjalan

dengan cepat di hati sehingga sebagian dari dosis oral mengalami lintas pertama di hati dan menyebabkan bioavailabilitasnya tidak begitu tinggi. Dengan memanfaatkan sifat dari nifedipin yang mudah larut dalam lemak sehingga memungkinkannya diformulasikan dalam bentuk sediaan transdermal dan digunakan secara topikal.

Untuk membantu nifedipin agar dapat melintasi kulit hingga dapat sampai pada sirkulasi sistemik diperlukan sebuah sistem penghantaran yaitu ethosom. Ethosom merupakan bentuk modifikasi dari liposom dan mengandung etanol yang tinggi. Ethosom adalah sistem gelembung yang menarik serta inovatif dalam teknologi farmasi dan penghantaran obat ditahun belakangan ini. Yang menarik dalam pembawa ini adalah kemampuannya untuk berpenetrasi sempurna melalui kulit manusia. Ethosom bersifat lembut, gelembung yang lunak sesuai untuk meningkatkan penghantaran zat aktif. Karakteristik fisika kimia ethosom telah memperlihatkan bahwa gelembung pembawa ini dapat membawa bahan aktif lebih efektif melalui stratum korneum sampai ke lapisan paling dalam kulit. Aspek inilah yang sangat penting dalam desain pembawa yang digunakan secara topikal ataupun pemberian obat secara sistemik (Dave *et al*, 2010: 81-82).

Ethosom merupakan gelembung yang bersifat ampifatik sehingga sangat efektif digunakan pada obat yang bersifat ampifilik, hidrofilik, maupun lipofilik seperti nifedipin. Obat-obat yang bersifat hidrofilik akan terjerap pada kompartemen hidrofilik, obat-obat yang bersifat ampifilik akan tersebar

pada lipid bilayernya, sedangkan obat-obat lipofilik akan terjerap pada kompartemen lipofilik.

Dalam penelitian ini digunakan formula ethosom dengan komposisi etanol 50%, fosfatidilkolin 1,5%, dan nifedipin 0,05%, komposisi ini memberikan kadar obat terjerap paling tinggi (Rizal, 2012: 75). Pembuatan ethosom dilakukan dengan menggunakan metode panas sebab metode ini dapat membantu pembentukan lapisan lipid bilayer. Penggunaan etanol pada konsentrasi tinggi menyebabkan gelembung menjadi lebih lunak dan fleksibel sehingga obat lebih mudah masuk ke dalam lipid bilayer. Selain itu, etanol membantu penetrasi di kulit dengan cara menembus ke dalam lipid interseluler dan meningkatkan fluiditas dari membran sel lipid serta menyusutkan lapisan lipid multilayer pada membran sel (Akiladevi *et al*, 2010: 3). Fosfatidilkolin berfungsi sebagai pembentuk gelembung dan penjerap obat pada ethosom.

Pada penelitian ini, ethosom nifedipin yang telah terbentuk digunakan untuk pemakaian topikal dengan terlebih dahulu diformulasikan dalam bentuk sediaan gel menggunakan konsentrasi karbopol 940 berbeda-beda yaitu 0,5%, 1%, dan 1,5%. Penggunaan konsentrasi basis gel yang berbeda-beda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efek pembentuk gel terhadap kemampuan penetrasi ethosom nifedipin yang diformulasikan dalam bentuk gel secara *in vitro*.

Gel merupakan sistem semisolid terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel kecil anorganik atau molekul-molekul besar organik yang

diinterpenetrasikan dalam sebuah cairan. Sistem gel yang paling sederhana terdiri dari air yang dikentalkan dengan getah alam misalnya tragakan dan xanthan, bahan semisintetik misalnya metilselulosa, karboksimetilselulosa, atau hidroksietilselulosa ataupun bahan sintetik misalnya karbopol. Viskositas dari gel umumnya tergantung dari jumlah atau berat molekul dari bahan pengental yang ditambahkan.

Selulosa murni tidak larut dalam air karena sifat kristalinitas yang tinggi. Substitusi dengan gugus hidroksi menurunkan kristalinitas dengan menurunkan pengaturan rantai polimer dan ikatan hidrogen antar rantai (Mauliarhani, 2012: 143). Keberadaan bahan oksidator dalam formulasi gel yang mengandung selulosa juga harus dihindari karena degradasi oksidatif pada rantai polimer dapat menyebabkan penurunan secara cepat viskositas dari sediaan gel yang dibuat (Anonim, 2008).

Karbopol merupakan polimer dari selulosa yang ditaut silang dengan alilsukrosa. Diperoleh dari sintesa asam akrilat yang mengandung tidak kurang dari 56-68% gugus asam karboksilat, serta memiliki bobot molekul yang tinggi. Bersifat koloidal hidrofilik yang membentuk massa mengental yang lebih baik dari *gelling agent* alam. Untuk gel lubrikan diperlukan 0,3-1%. Untuk gel sediaan farmasi diperlukan 0,5-2%.

Ada beberapa jenis karbopol antara lain karbopol 934 (pH 5,5 - 11), karbopol 940 (pH 3 - 11), dan karbopol 941 (pH 3,5 - 11). Berdasarkan penelitian, diantara ketiga jenis karbopol tersebut yang paling stabil adalah karbopol 940. Karbopol jenis ini merupakan campuran resin akrilik larut air,

yang mempunyai sifat membentuk kekentalan sempurna karena memiliki viskositas yang tinggi antara 40.000 – 60.000 cP meskipun konsentrasi yang digunakan kecil dengan penetralan menggunakan basa yang cukup, larut dalam air dan alkohol, bersifat tiksotropik, membentuk sediaan yang transparan dan bekerja efektif pada rentang pH yang luas (Mauliarhani, 2012: 144). Karbopol 940 digunakan sebagai basis gel karena bersifat non toksik dan tidak menimbulkan reaksi hipersensitif ataupun reaksi-reaksi alergi terhadap penggunaan secara topikal (Rowe, 2006: 112).

Metil paraben yang terdapat dalam formula berfungsi sebagai pengawet yang dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas sediaan dengan mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme sebab sediaan mempunyai kadar air relatif tinggi yang merupakan medium untuk pertumbuhan mikroorganisme.

Penggunaan TEA sebagai pengalkali bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan menghilangkan kekeruhan sebab karbopol yang terdispersi dalam air akan membentuk larutan asam keruh. Gliserin dan propilen glikol dapat berfungsi sebagai peningkat kestabilan gel, pelembab, mampu melarutkan zat aktif yang tak larut dalam air dan meningkatkan penyebaran obat serta memberikan tampilan yang lebih jernih dan transparan pada gel. Terakhir, masukkan ethosom nifedipin, aduk hingga homogen.

Selanjutnya untuk pengujian secara *in vitro* menggunakan sel difusi Franz dengan diameter 1 cm. Membran yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit tikus. Membran yang digunakan dapat berupa spesimen kulit,

sebagai pengganti kulit manusia dapat digunakan kulit kelinci, tikus, babi, bahkan ular. Membran kulit yang digunakan harus mengandung stratum corneum dan lapisan epidermis (Sany, 2009: 17). Sedangkan kompartemen reseptor berisi dapar fosfat pH 7,4 yang mengandung natrium lauril sulfat 2,5% (b/v). Pemilihan dapar fosfat pH 7,4 dimaksudkan sebagai pengganti cairan tubuh. Penambahan natrium lauril sulfat sebanyak 2,5% b/v diharapkan dapat mensimulasi surfaktan anionik garam empedu dalam cairan usus (Suwalidi, 1992: 42).

Sel difusi diletakkan di atas *magnetik stirer* diaduk dengan kecepatan 50 rpm pada kompartemen reseptor agar terjadi homogenisasi yang dapat mempercepat proses pelarutan zat yang terpenetrasi, dan dipertahankan suhunya pada 37°C. Hal ini menggambarkan suhu tubuh manusia. Suhu harus tetap dijaga sebab akan mempengaruhi banyaknya zat aktif yang terdifusi masuk ke dalam kulit. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin banyak zat aktif yang larut dalam kompartemen reseptor sehingga nilai serapan yang diukur akan semakin besar. Membran pada kompartemen donor harus bersentuhan langsung dengan kompartemen reseptor agar obat yang diletakkan pada membran dapat berpenetrasi langsung ke dalam cairan reseptor.

Absorpsi perkutan dapat didefinisikan sebagai absorpsi obat ke dalam stratum korneum (lapisan tanduk) dan selanjutnya obat menembus lapisan dibawahnya dan akhirnya obat masuk dalam sirkulasi darah.

Kulit relatif impermeabel untuk sebagian besar senyawa, untuk itu perlu banyak pertimbangan dalam pemberian obat-obatan melalui kulit untuk efek sistemik. Prasyarat untuk absorpsi obat transdermal adalah bahwa obat dapat melintasi lapisan-lapisan dari epidermis dan masuk ke jaringan yang terdapat di dermis, sehingga obat dapat mencapai kapiler pembuluh darah. Oleh karenanya digunakanlah ethosome sebagai media yang dapat membantu bahan aktif yaitu nifedipin untuk melintasi membran dan sampai pada sirkulasi sistemik. Jenis penghantaran obat yang sesuai adalah secara topikal menggunakan sediaan semisolid seperti gel.

Mekanisme penghantaran obat oleh ethosom hingga mencapai sirkulasi sistemik yaitu dengan meningkatkan fluiditas dari membran sel lipid yang disebabkan oleh etanol pada ethosom dapat meningkatkan penyerapan air (permeabilitas) pada kulit. Sehingga ethosom akan diserap dengan mudah melalui lapisan multilayer yang menyusut dan menyatu, kemudian melepaskan obat ke dalam lapisan kulit yang terdalam (hipodermik/subkutan) (Akiladevi *et al*, 2010: 1).

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan ethosome nifedipin dari sediaan gel mampu berpenetrasi dan bahan obat dapat melintasi membran sel difusi. Pelepasan nifedipin dari sediaan gel yang melintasi membran sel difusi pada formula I sebanyak $6123,748 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$ dengan persentase 60,007%, formula II sebanyak $4979,071 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$ dengan persentase 48,790% dan formula III sebanyak $3914,641 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$ dengan persentase 38,360%.

Selain itu pelepasan nifedipin dari sediaan gel yang melintasi membran sel difusi pada formula I memiliki kecepatan $8,394 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{menit}^{-1}$ ($r = 0,990$), formula II $6,869 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{menit}^{-1}$ ($r = 0,985$), dan formula III sebesar $5,193 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{menit}^{-1}$ ($r = 0,963$). Dari ketiga konsentrasi basis karbopol 940 diketahui bahwa ethosome nifedipin memiliki kemampuan penetrasi obat yang terbaik dengan menggunakan konsentrasi 0,5%. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada maka dapat disimpulkan bahwa ethosome dikatakan dapat meningkatkan penetrasi jika mampu melepaskan bahan aktif obat $\geq 30\%$.

Berdasarkan persamaan linear jumlah bahan aktif yang terpenetrasi per satuan waktu dari masing-masing formula gel ethosom nifedipin menunjukkan nilai r yang mendekati linear ($r > 0,95$). Dimana nilai r tertinggi terdapat pada formula I dan nilai r terendah pada formula III. Hal ini menandakan bahwa penggunaan basis gel pada ethosome nifedipin mempengaruhi kecepatan dan jumlah bahan aktif yang terpenetrasi melalui membran. Dan jumlah obat yang melintasi membran akan bertambah besar seiring dengan penambahan waktu (Lucida, 2007).

Hasil penelitian juga menunjukkan kecenderungan menurunnya konsentrasi obat yang terpenetrasi. Penggunaan konsentrasi basis gel yang berbeda pada setiap formula juga memperlihatkan perbedaan konsistensi pada sediaan dan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh bahan obat untuk berpenetrasi pertama kalinya melintasi membran. Pada formula I bahan obat berpenetrasi pertama kalinya melintasi membran. Pada formula I bahan obat berpenetrasi pertama kalinya pada menit ke-30, formula II pada menit ke-60,

dan formula III pada menit ke-120. Semakin tinggi konsentrasi basis gel yang digunakan menyebabkan viskositas gel semakin tinggi dan bahan aktif akan semakin lama untuk dapat berpenetrasi karena harus melintasi barrier viskositas dalam basis.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Formulasi gel ethosom nifedipin dapat digunakan secara transdermal dengan melihat studi penetrasi perkutan melalui membran kulit hewan coba.
2. Konsentrasi pembentuk basis mempengaruhi kecepatan penetrasi nifedipin melintasi kulit. Semakin tinggi konsentrasi basis yang digunakan maka semakin sedikit bahan obat yang dapat melintasi kulit dan semakin kecil pula laju penetrasinya.

B. *Saran*

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara *in vivo* untuk mengetahui efektivitas sediaan gel ethosom nifedipin.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdasah, Marline. 2004. *Liposom sebagai sistem penghantar obat kanker (review altikel)*. Jurusan farmasi UNPAD.
- Agoes, Goeswin. 2008. *Pengembangan Sediaan Farmasi*. Bandung: ITB.
- Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2005. Bandung: Departemen Agama RI.
- Al-Quzwain, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid. 2008. *Sunan Ibnu Majah*. Maktabah Al-Ma'rifat. Riyadh.
- Anitha, P, 2011. *Ethosomes - A noninvasive vesicular carrier for transdermal drug delivery*. Int. J. Rev. Life. Sci.
- An-Naisaburi, Al-Imam Al-Hasan Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. 1998. *Shahih Muslim*. Dar As-salam. Riyadh.
- Ansel, Howard C. 2008. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi edisi IV*. Jakarta: UI Press.
- Atul K.G, Lalit M.N, Meenakshi C. 2010. *Gel Containing Ethosomal Vesicles For Transdermal Delivery Of Aceclofenak*. New Delhi, India: Dipsar, Universty Of Delhi.
- Benson, Heather A.E. 2005. *Transdermal Drug Delivery: Penetration Enhancement Techniques*. Western Australia: Biomedical Research Institute, School of Pharmacy, Perth.
- Depkes. 2006. *Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Hipertensi*. Jakarta.
- Dinu, Cristina. 2010. *Elastic Vesicles as Drugs Carriers Through The Skin*. Farmacia Vol.58,2.
- Grassi, Mario, et.al. 2007. *Understanding drug Realese and Absorpstion Mechanisms* . London: Taylor & Francis Group.
- Gunawan , sulistia Gan. 2007. *Farmakologi dan Terapi edisi V*. Jakarta: UI Press.
- Ismail, Isriany. 2010. *Uji tingkat Bioavailabilitas Niosom Ketoprofen pada Kelinci*. Makassar.
- Ismail, Isriany. 2009. *Strategi Penggunaan Obat Melalui Kulit*. Makassar, UIN Alauddin Makassar.


- Kumar R, 2010. *Ethosomes : Novel Vesicular Carriers In Transdermal Drugs Delivery*. Journal of Global Pharma Technology.
- Kumar, Pavan. 2010. *Ethosomes: A Priority in Transdermal Drug Delivery*. International Journal of Advances in Pharmaceutical Sciences.
- Kumar.R, et al. 2009. *Ethosomes: Novel Vesicular Carriers In Transdermal Drug Delivery*. School of Pharmaceutical Sciences. Shobhit University, Meerut.,U.P, India.
- Lachman, Leon. 1994. *Teori dan praktek farmasi industri, edisi 3*. UI Press. Jakarta.
- Light, Douglas, et.al. 2004. *Cells, Tissues, and Skin*. Houston, Texas: University of Texas Medical School.
- Leekumjorn, Sukit. 2004. *Synthesis and Characterization of Potential Drug Delivery Systems using Nonionic Surfactant "Niosome"*. Florida: University of South Florida.
- Manosroi A., Jantrawut P., Khositsuntiwong N., Manosroi W., Manosroi J. 2009. *Novel Elastic Nanovesicles for Cosmeceutical and Pharmaceutical Applications*. Chiang Mai. J. Sci.
- Martodiharjo, Suwaldi. 1992. *Kinetika dan Mekanisme Disolusi Sulfadiazina Dalam Media Natrium Lauril Sulfat*. Fakultas Farmasi, UGM.
- Maurya et al. 2011. *Enhancement of Transdermal Permeation of Indinavir Sulfate via Ethosome Vesicles*. The African Journal of Pharmaceutical Sciences and Pharmacy.
- Moffat, Anthony C et al. 2005. *Clarke's Analysis of Drug & Poisons*. Pharmaceutical Press
- Mutscher, Ernst, 1999. *Dinamika Obat edisi V*. Bandung: Penerbit ITB.
- Patel, Sanjay. 2007. *Ethosome: A Promising Tool For Transdermal Delivery Of Drugs*. India.
- Rizal. 2012. *Pengaruh Konsentrasi Etanol Terhadap Penjerapan Nifedipin Pada Formula Ethosom*. Makassar. UIN Alauddin.
- Rowe C, Raymond. 2009. *Handbook Of Pharmaceutical Excipient*. Edisi VI. Pharmaceutical Press. London.

- Sany, Uty Sukria. 2009. *Efek Penambahan Berbagai peningkat Penetrasi Terhadap Penetrasi Perkulatan Gel Piroksikam Secara In Vitro*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sheer A, Chauhan M. 2011. *Ethosome As Vesicular Carrier For Enhanced Transdermal Delivery Of Ketoconazole- Formulation And Evaluation*. Departement Of Pharmaceutics, Delhi Institute Of Pharmaceutical and Research (DIPSAR), New Delhi, India.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukamdiyah, Mita. 2011. *Pembuatan Niosom Berbasis Maltodextrinde DE 5-10 Dari Pati Beras (Amilum oryzae)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sukria, Uty. 2009. *Efek penambahan berbagai peningkat penetrasi terhadap perkulatan gel piroksikam secara in vitro*. Surakarta: Universitas muhammadiyah.
- Tiwari, Raj Kumar. 2010. *Ethosomes : A Potential Carries for Transdermal Drug Delivery*. *Int.J.Drug Dev. & Res.*
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. *Hukum Islam : Polemik Alkohol Dalam Obat-Obatan*. <http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2966-polemik-alkohol-dalam-obat-obatan.html> (Diakses pada 09 September 2012).
- Toutou E. 1999. *Compositions for applying active substances to or through the skin*. US Patent.
- Vivek D, Dharendra K, Shaila L, Sarvesh P. 2010. *Ethosome For Enhanced Transdermal Drug Delivery Of Aceclofenac*. India: Banashtali University, Rajasthan.
- Walters, Kenneth A, 2002, *Dermatological and Transdermal Formulation*. New York: Marcel Dekker Inc.
- Yahya, Harun. 2004. *Alquran dan Sains*. Bandung: Penerbit Dzikra.

Lampiran 1. Pembuatan Ethosom




Gambar 10. Skema Kerja Pembuatan Ethosom

Lampiran 2. Pembuatan Basis Gel

Gambar 11. Skema Kerja Pembuatan Basis Gel

Lampiran 3. Pengujian Penetrasi Perkutan



Gambar 12. Skema Kerja Pengujian Penetrasi Perkutan

Lampiran 4. Tabel dan Perhitungan

Tabel 8. Contoh Perhitungan Kecepatan Melintasi Membran Nifedipin ($\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{jam}^{-1}$) Selama 12 Jam Formula I Replikasi 1

Waktu (menit)	a	C ($\mu\text{g}/\text{ml}$)	$\mu\text{g}/40\text{ ml}$	koreksi ($\mu\text{g}/4\text{ml}$)	μg terdifusi	μg terdifusi/luas area ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)
5	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0
60	0,016	1	40	0	40	50,955
90	0,06	4,143	165,714	160	325,714	414,923
120	0,059	4,071	162,857	662,857	985,714	1255,687
240	0,069	4,786	191,429	651,429	1665,714	2121,929
480	0,162	11,429	457,143	765,714	2697,143	3435,851
720	0,279	19,786	791,429	1828,571	4860,000	6191,083

Keterangan :

Persamaan garis Nifedipin $y = 0,014x + 0,002$

$$C (\mu\text{g}/\text{ml}) = \frac{(a) - 0,002}{0014}$$

$$\mu\text{g}/40\text{ ml} = C (\mu\text{g}/\text{ml}) \times 40$$

koreksi ($\mu\text{g}/4\text{ ml}$) : untuk menit ke-5 = 0

untuk menit ke 10 = $C (\mu\text{g}/\text{ml}) \times 4$

μg terdifusi = $\mu\text{g}/40\text{ ml}$ + koreksi ($\mu\text{g}/4$) mulai dari menit ke-10


$$\mu\text{g terdifusi/luas area} (\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}) = \frac{\mu\text{g terdifusi}}{\text{luas membran}}$$

$$\text{fluks} (\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{jam}^{-1}) = \frac{\mu\text{g terdifusi/luas area} (\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2})}{\text{tiap menitnya}}$$

persamaan garis antara μg terdifusi/waktu $y = 7,446x + 14,27$

Tabel 9. Kecepatan Melintasi Membran ($\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{Jam}^{-1}$) Sediaan Gel Ethosom Nifedipin Selama 12 Jam Pada Formula I


No.	Waktu (menit)	μg terdifusi/ luas area ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	Fluks ($\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{menit}^{-1}$)
1.	5	0	8,394
2.	10	0	
3.	15	0	
4.	30	0	
5.	60	50,955	
6.	90	414,922	
7.	120	1246,587	
8.	240	2080,072	
9.	480	3384,895	
10.	720	6123,748	
kumulatif Nifedipin yang melintasi membran ($\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$)		6123,748	



Gambar 13. Grafik Hubungan Waktu Dengan Jumlah Nifedipin Yang Terdifusi/Luas Area Pada Formula I

Tabel 10. Kecepatan Melintasi Membran ($\mu\text{g}\cdot\text{Cm}^{-2}\cdot\text{Jam}^{-1}$) Sediaan Gel Ethosom Nifedipin Selama 12 Jam Pada Formula II


No.	Waktu (menit)	μg terdifusi/ luas area ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	Fluks ($\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{menit}^{-1}$)
1.	5	0	6,869
2.	10	0	
3.	15	0	
4.	30	0	
5.	60	0	
6.	90	36,396	
7.	120	227,479	
8.	240	898,999	
9.	480	2742,493	
10.	720	4979,071	
kumulatif Nifedipin yang melintasi membran ($\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$)		4979,071	



Gambar 14. Grafik Hubungan Waktu Dengan Jumlah Nifedipin Yang Terdifusi/Luas Area Pada Formula II

Tabel 11. Kecepatan Melintasi Membran ($\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{Jam}^{-1}$) Sediaan Gel Ethosom Nifedipin Selama 12 Jam Pada Formula III

No.	Waktu (menit)	μg terdifusi/ luas area ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	Fluks ($\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{menit}^{-1}$)
1.	5	0	5,193
2.	10	0	
3.	15	0	
4.	30	0	
5.	60	0	
6.	90	0	
7.	120	0	
8.	240	331,047	
9.	480	1837,315	
10.	720	3914,641	
kumulatif Nifedipin yang melintasi membran ($\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$)		3914,641	



Gambar 15. Grafik Hubungan Waktu Dengan Jumlah Nifedipin Yang Terdifusi/Luas Area Pada Formula III

Perhitungan dosis nifedipin dalam sediaan gel ethosome nifedipin:

$$0,208 \text{ gram ethosome nifedipin} \approx 7,144 \text{ mg nifedipin}$$

$$2,08 \text{ gram ethosome nifedipin} \approx 71,44 \text{ mg nifedipin}$$

Sediaan gel yang dibuat sebanyak 7 gram maka dosis nifedipin dalam sediaan adalah :

$$\frac{71,44 \text{ mg nifedipin}}{7 \text{ gram gel}} = 10,205 \text{ mg/gram gel}$$

Perhitungan persentase pelepasan nifedipin melintasi membran:

Dik: $C_{\text{awal}} = 10,205 \text{ mg} = 10205 \mu\text{g}$

$$C_{\text{FI}} = 6123,748 \mu\text{g}$$

$$C_{\text{FII}} = 4979,071 \mu\text{g}$$

$$C_{\text{FIII}} = 3914,641 \mu\text{g}$$

Maka:

$$\% \text{ FI} = \frac{6123,748}{10205} = 60,007\%$$

$$\% \text{ FII} = \frac{4979,071}{10205} = 48,790\%$$


$$\% \text{ FIII} = \frac{3914,641}{10205} = 38,360\%$$

MAKASSAR

Lampiran 5. Gambar Pembuatan Gel *Ethosome* Nifedipin




Gambar 16. Suspensi Ethosom




Gambar 17. Ethosom



Formula I



Formula II



Formula III

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gambar 18. Sediaan Gel Ethosom Nifedipin

Lampiran 6. Gambar Sel Difusi Franz



Gambar 19. Modifikasi Sel Difusi Franz

Keterangan :

1. Kompartemen donor
2. Kompartemen reseptor
3. Magnet batang
4. Pengatur kecepatan putaran
5. Pengatur suhu

BOIGRAFI



Ray Anah shad, dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 29 Nopember 1988. Penulis yang kerap kali disapa “Anah” atau “Ray” ini merupakan anak ke-2 dari pasangan Sri Handayani (almarhumah) dan Sapoddin. Pendidikan formal berawal dari tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri Inpres Tangkala II kecamatan Biringkanaya tahun 1996-1999, kemudian pindah ke SD Negeri Kompleks Sambung Jawa yang terletak di kecamatan Mamajang pada tahun 1999-2001. Dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di kota Parepare yaitu SLTP Negeri 1 Parepare pada tahun 2001-2004 dan SMA Negeri 1 Parepare pada tahun 2004-2007. Kemudian pada tahun 2008 melanjutkan kuliah pada program sarjana Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi. Selama menempuh masa perkuliahan mengikuti organisasi yaitu HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Farmasi periode 2009-2010 dan ISMAFARSI periode 2008-2012.