

**DISTRIBUSI KEJADIAN SEKSIO SESAREA DI RUMAH SAKIT
KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK (RSKDIA) SITI FATIMAH
MAKASSAR PERIODE MEI TAHUN 2013**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

ROSELLAH

70300109074

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu menyertai penulis dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Distribusi Kejadian Seksio Sesarea di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan input dalam penyempurnaan selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta dukungan moril maupun material dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga dan sembah sujudku kepada Ayahanda Muh.Alwi dan kepada Ibunda Jumiati yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis dengan segala usaha, doa, cucuran keringat dan kasih sayangnya. Semua Beliau lakukan demi suksesnya studi penulis. Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT.M.S., selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta stafnya.
2. Bapak Dr. Dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH., MH.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan beserta stafnya.
3. Ibu DR. Nur hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku ketua jurusan prodi keperawatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Risnah S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing I yang senantiasa dengan kerelaan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta perhatian kepada penulis dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
5. dr. Rosdianah, S.Ked., M.Kes selaku pembimbing II yang selalu setia dan selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir.
6. Ibu Hj. Asriani S.KM., M.Kes selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Prof. H. Darussalam, M.Ag selaku penguji Agama yang senantiasa meberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dr.H.Leo Prawirohardjo, Sp.OG (K), M.Kes., M.M,phD selaku kepala RSKDIA Siti Fatimah Makassar dan seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis selama pendidikan.
10. Kepada keluarga Besarku yang selama ini selalu mendukung, memotivasi dan memberikan semangat dan bantuan materi demi selesainya studi penulis.
11. Kepada sahabat-sahabatku, Andi Enni Yulfanita dan Jackline Moh.Idrus yang selama ini selalu menemani hari-hariku baik dalam suka maupun duka. Terima kasih banyak atas dukungan dan semangat yang selama ini kalian berikan kepada penulis.
12. Kepada K'Eka, K'Ian, K'Dani, K'Wilda dan K'ical, K'alif dan April, Wedi, nana, dilla yang selalu memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis agar cepat selesai.
13. Kepada teman-teman kelompok komunitas nita, nanna, pity, ito AA dar, AA yani dan ulfa.
14. Kepada semua teman-teman di Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya di jurusan Keperawatan angkatan 2009, terkhususnya lagi kelas B1 dan B2. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada penulis sendiri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Juli 2013

ROSELLAH

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Abstrak.....	xii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan	
1. Pengertian Persalinan.....	7
2. Etiologi Persalinan.....	7
3. Patofisiologi Persalinan.....	9
4. Proses Persalinan.....	10
5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persalinan.....	12
6. Faktor-faktor Yang Menghambat Persalinan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Seksio Sesarea	
1. Sejarah Seksio Sesarea.....	14
2. Etimologi Seksio Sesarea.....	17

3. Definisi Seksio Sesarea.....	20
4. Indikasi Seksio Sesarea.....	22
5. Keuntungan Seksio Sesarea.....	27
6. Efek Samping Seksio Sesarea.....	27
7. Jenis-jenis Seksio Sesaria.....	31
8. Komplikasi Seksio Sesarea.....	33
BAB III Kerangka Konsep	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Definisi Operasional.....	36
BAB IV Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Waktu dan Tempat.....	38
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Pengolahan Data.....	39
F. Analisis Data.....	40
G. Etika Penelitian.....	40
BAB V Hasil Dan Pembahasan	
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan.....	53
BAB IV Simpulan Dan Saran	
A. Simpulan.....	66
B. Saran	66
Daftar Pustaka.....	68

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Definisi Operasional.....	36
Tabel 2: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Umur.....	44
Tabel 3: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Riwayat Obstetri	46
Tabel 4: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Jarak Kehamilan.....	47
Tabel 5: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Pekerjaan Ibu.....	48
Tabel 6: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu	50
Tabel 7: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis, Non Medis, Dan <i>Support System</i>	52
Tabel 8: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis.....	54
Tabel 9: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis dari Faktor Ibu.....	56
Tabel 10: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis Dari Faktor Janin.....	58
Tabel 11: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Non Medis.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Persalinan Seksio Sesarea.....	20
Gambar 2: Kerangka Konsep.....	35
Gambar 3: Gambar Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Umur.....	45
Gambar 4: Gambar Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Pekerjaan Ibu.....	49
Gambar 5: Gambar Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu	51
Gambar 6: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis, Non Medis, dan <i>Support System</i>	53
Gambar 7: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis.....	55
Gambar 8: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis dari Faktor Ibu.....	57
Gambar 9: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis dari Faktor Janin.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Definisi Operasional.....	36
Tabel 2: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Umur.....	44
Tabel 3: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Riwayat Obstetri.....	45
Tabel 4: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Jarak Kehamilan.....	46
Tabel 5: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Pekerjaan Ibu.....	47
Tabel 6: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu.....	48
Tabel 7: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis, Non Medis dan <i>Support System</i>	49
Tabel 8: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis.....	50
Tabel 9: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis dari Faktor Ibu..	51
Tabel 10: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis dari Faktor Janin.....	52
Tabel 11: Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Non Medis.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Persalinan Seksio Sesarea.....	20
Gambar 2: Kerangka Konsep.....	35



ABSTRAK

Nama : Rosellah

NIM : 70300109074

**Judul Skripsi : Distribusi Kejadian Seksio Sesarea di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar Periode Mei Tahun 2013.
Dibimbing oleh Risnah dan Rosdianah**

Persalinan merupakan pengeluaran hasil konsepsi (janin) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). Fenomena yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini menjelaskan tentang peningkatan perempuan yang meminati seksio sesarea sebagai proses persalinannya. Bahkan seksio sesarea telah menjadi *trend* di masa kini. Beberapa diantara mereka melakukan persalinan seksio sesarea dengan alasan tidak ingin merasakan sakit ataupun karena adanya dorongan dari suami atau keluarga. Untuk itu, dilakukan penelitian tentang distribusi kejadian seksio sesarea di rumah sakit khusus daerah ibu dan anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar periode Mei tahun 2013.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif observasional* dengan pendekatan *cross sectional*. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu *total sampling*, dimana jumlah sampel yang diteliti sebanyak 42 orang. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari responden dengan menggunakan teknik wawancara dengan jenis pertanyaan terbuka dan terpimpin yang telah dirancang sebelum ke lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 42 orang yang melakukan persalinan seksio sesarea terdapat 38 orang dengan alasan indikasi medis dan 4 orang dengan alasan meminta sendiri untuk dilakukan seksio sesarea. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seksio sesarea belum dapat dikatakan sebagai *trend* karena hanya sebagian kecil yang meminta untuk dilakukan seksio sesarea. Namun, dengan angka tersebut sudah dapat dikatakan bahwa ibu sudah dapat menentukan bagaimana ia nantinya melahirkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya seorang petugas kesehatan memberikan penjelasan tentang risiko yang dapat ditimbulkan jika melakukan persalinan seksio sesarea.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan merupakan proses fisiologis yang dialami oleh setiap wanita hamil dan merupakan saat dinanti-nantikan ibu hamil untuk dapat merasakan kebahagiaan melihat dan memeluk bayinya. Proses persalinan dapat dilakukan melalui jalan lahir (vagina atau persalinan pervaginam) dan persalinan melalui sayatan pada dinding perut dan dinding rahim (perabdominan) yang dikenal dengan bedah cesar atau seksio sesarea. Setiap wanita menginginkan persalinannya berjalan lancar dan dapat melahirkan bayi dengan sempurna. Persalinan bisa saja berjalan secara normal, namun tidak jarang proses persalinan mengalami hambatan dan harus dilakukan dengan operasi (Kasdu, 2003).

Pada masa lalu melahirkan dengan cara operasi merupakan hal yang menakutkan karena dapat menyebabkan kematian. Beberapa tahun terakhir ini angka kejadian seksio sesarea meningkat di dunia, tak terkecuali Indonesia. Dengan berkembangnya kecanggihan bidang ilmu kedokteran pandangan tersebut mulai bergeser, seksio sesarea telah menjadi alternatif pilihan persalinan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pusat Studi Obstetri dan Ginekologi di Washington DC tahun 1994 menunjukkan bahwa setengah dari jumlah kelahiran seksio sesarea yang tercatat, secara medis sebenarnya tidak diperlukan. Ditemukannya bedah sesar memang dapat

mempermudah proses persalinan sehingga banyak ibu hamil yang lebih senang memilih jalan ini walaupun sebenarnya bisa melahirkan secara normal. Faktanya, menurut Bensons dan Pernolls, angka kematian pada operasi sesarea adalah 40-80 tiap 100.000 kelahiran hidup. (Adjie, 2002, dalam Himapid:2009).

Menurut WHO, jumlah angka seksio sesarea yang ideal di suatu rumah sakit adalah 20 sampai 25 persen. Keputusan seksio sesarea yang dilakukan akan mempengaruhi jumlah angka seksio sesarea (*SC rate*) di suatu rumah sakit. Banyak rumah sakit yang melakukan operasi seksio sesarea tanpa ada indikasi medis yang jelas. Hal ini akan meningkatkan jumlah *SC rate* di rumah sakit tersebut. Di Amerika Serikat, angkanya bertambah dari 4,5 persen pada tahun 1965 menjadi 23 persen pada tahun 1985 dan kenaikan ini tercatat di semua negara bagian untuk wanita segala usia (Mochtar R:2004).

Di Indonesia menurut data survey nasional pada tahun 2007, angka kejadian seksio sesarea adalah 921.000 dari 4.039.000 persalinan atau sekitar 22,8 persen dari seluruh persalinan (Anita:2009). Sedangkan di RS. Pirngadi Medan juga meningkat dengan pesat dari 2,5 persen tahun 1968 menjadi 10 persen tahun 1981. Kemudian, berdasarkan survei demografi dan kesehatan tahun 2009 hingga 2010 mencatat angka persalinan seksio sesarea secara nasional berjumlah kurang lebih 20,5 persen dari total persalinan. Namun, berbagai survei menemukan bahwa persentase persalinan seksio sesarea pada beberapa rumah sakit di kota besar seperti Jakarta dan Bali berada jauh di atas

angka tersebut. Secara umum jumlah persalinan seksio sesarea di rumah sakit pemerintah adalah sekitar 30 sampai 35 persen dari total persalinan, sedangkan di rumah sakit swasta jumlahnya sangat tinggi yaitu sekitar 30 sampai 80 persen dari total persalinan (Rasyid:2009).

Data yang didapatkan dari dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 ditemukan 4305 kasus seksio sesarea dan meningkat 5304 pada tahun 2010 menjadi 8366 kasus (Profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan). Di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr.Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1994 dari sejumlah 1358 persalinan, 212 atau 15,6 persen diantaranya dilakukan dengan bedah sesar dan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar terjadi peningkatan dari 5,5 persen pada tahun 2000 menjadi 8,4 persen pada tahun 2001, kemudian sebesar 10 persen dari seluruh persalinan pada tahun 2002 dan 17 persen pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2012 persalinan seksio sesarea yaitu sejumlah 448 orang atau kurang lebih 50 orang setiap bulannya di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar. Kemudian pada data sekunder Rumah Sakit Bersalin Pertiwi pada tahun 2008, tercatat 620 atau 38,3 persen persalinan dilakukan melalui bedah sesar dari total 1619 persalinan (Himapid:2009).

Pertolongan operasi persalinan dengan seksio sesarea mempunyai sejarah yang panjang. Bahaya infeksi merupakan ancaman serius sehingga banyak terjadi kematian. Perkembangan teknologi seksio sesarea demikian

majunya sehingga bahayanya makin dapat ditekan. Oleh karenanya persalinan seksio sesarea makin banyak dilakukan.

Seksio sesarea merupakan isu kesehatan yang mempengaruhi kehidupan wanita saat melahirkan. Banyak dilema, ketakutan dan kecemasan yang muncul pada saat detik-detik terakhir kehamilan, sehingga seorang wanita memutuskan untuk dilakukan seksio sesarea. Pertimbangan dilakukan seksio sesarea saat ini, selain atas indikasi medis, juga banyak dengan alasan non medis, dan bahkan permintaan pasien, sehingga seksio sesarea saat ini sudah banyak menjadi pilihan wanita yang akan melahirkan (Kasdu:2003).

Penelitian Basalamah dan Galuardi tahun 1993 beberapa alasan yang mendasari permintaan seksio sesarea adalah karena para ibu yang bekerja sangat terikat dengan waktu dan sudah memiliki jadwal tertentu. Alasan lainnya adalah masalah kepercayaan yang mengaitkan waktu kelahiran dengan peruntungan nasib dengan harapan apabila anak dilahirkan pada tanggal atau jam sekian maka rezeki dan kehidupannya kelak lebih baik, keyakinan bayi yang dilahirkan dengan seksio sesarea akan lebih terjamin kesehatannya.

Berdasarkan hasil penelitian Sarmana (2004) menyatakan bahwa dilakukannya persalinan seksio sesarea adalah karena adanya anjuran dari suami dengan alasan lebih aman dan praktis tidak perlu menunggu waktu lebih lama menanti kelahiran bayi dan kekhawatiran melihat ibu menjerit kesakitan serta adanya rasa khawatir terjadi sesuatu pada bayi jika melahirkan secara spontan. Selanjutnya, seksio sesarea yang mulai memasyarakat

sehingga persalinan dengan operasi cenderung meningkat tiap tahunnya. Hasil penelitian di Brazil pada tahun 2000 menyatakan bahwa dokter melakukan tindakan seksio sesarea karena adanya tekanan dan dorongan dari pasien, suami dan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Bagaimana Distribusi Kejadian Seksio Sesarea di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar Periode Mei Tahun 2013”.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk diketahuinya kejadian seksio sesarea yang dilakukan atas indikasi medis.
2. Untuk diketahuinya kejadian seksio sesarea yang dilakukan karena non medis.
3. Untuk diketahuinya kejadian seksio sesarea yang dilakukan atas *support system*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Terkait

Dengan adanya penelitian ini, maka bagi instansi dapat menerapkan dan menjelaskan kepada klien tentang konsep seksio sesarea secara menyeluruh sebelum melakukan seksio sesarea.

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat lebih menambah ilmu tentang kejadian seksio sesarea dan dapat menjadi bahan acuan ketika seseorang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang seksio sesarea.

3. Bagi Ilmu Pendidikan

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan yang lebih banyak tentang seksio itu sendiri dan bagaimana seharusnya orang yang mengetahui lebih tentang seksio sesarea untuk membagi ilmunya kepada yang lain.

4. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, maka masyarakat bisa lebih menambah ilmu tentang seksio sesarea dan menjadi bahan pertimbangan ketika ingin mengambil keputusan saat ingin melakukan persalinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSALINAN

1. Pengertian Persalinan

- a. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Sarwono:2006)
- b. Persalinan normal adalah proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala dengan ibu sendiri, tanpa bantuan alat – alat serta tidak melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam (Mochtar:2004)

2. Etiologi Persalinan

Sebab terjadinya persalinan sampai kini masih merupakan teori – teori yang kompleks. Faktor – faktor hormonal, pengaruh prostaglandin, struktur uterus, sirkulasi uterus, pengaruh syaraf dan nutrisi disebut sebagai faktor – faktor yang mengakibatkan mulainya persalinan.

Menurut Sarwono (2006) mulai dan berlangsungnya persalinan, antara lain :

a. Teori Penurunan Hormon

Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron yang terjadi kira – kira 1 – 2 minggu sebelum partus dimulai. Progesteron

bekerja sebagai penenang bagi otot – otot uterus dan akan menyebabkan kekejangan pembuluh darah sehingga timbul his bila kadar progesteron turun.

b. Teori Plasenta Menjadi Tua

Villi korialis mengalami perubahan – perubahan, sehingga kadar estrogen dan progesteron menurun yang menyebabkan kekejangan pembuluh darah, hal ini akan menimbulkan kontraksi rahim.

c. Teori Berkurangnya Nutrisi Pada Janin

Jika nutrisi pada janin berkurang maka hasil konsepsi akan segera di keluarkan.

d. Teori Distensi Rahim

Keadaan uterus yang terus menerus membesar dan menjadi tegang mengakibatkan iskemia otot – otot uterus. Hal ini mungkin merupakan faktor yang dapat mengganggu sirkulasi uteroplasenter sehingga plasenta mengalami degenerasi.

e. Teori Iritasi Mekanik

Tekanan pada *ganglio servikale* dari *pleksus frankenhauser* yang terletak di belakang serviks. Bila ganglion ini tertekan, kontraksi uterus akan timbul.

f. Induksi Partus (*induction of labour*)

Partus dapat ditimbulkan dengan jalan :

- 1) Gagang laminaria : beberapa laminaria dimasukkan dalam kanalis servikalis dengan tujuan merangsang *pleksus frankenhauser*.
- 2) Amniotomi : pemecahan ketuban.
- 3) Oksitosin drips : pemberian oksitosin menurut tetesan infus.

3. Patofisiologi Persalinan

a. Menurut Manuaba (2005), tanda – tanda permulaan persalinan :

1. *Lightening* atau *settling* atau *dropping*

Yaitu kepala turun memasuki pintu atas panggul terutama pada primigravida. Pada multipara tidak begitu jelas.

2. Perut kelihatan lebih melebar, fundus uterus turun.

3. Perasaan sering – sering atau susah kencing (*polakisuria*) karena kandung kemih tertekan oleh bagian terbawah janin.

4. Perasaan sakit di perut dan dipegang oleh adanya kontraksi. Kontraksi lemah di uterus, kadang – kadang di sebut “ *traise labor pains*”.

5. Serviks menjadi lembek, mulai mendatar dan sekresinya bertambah juga bercampur darah (*bloody show*).

b. Menurut Mochtar (2004), tanda – tanda inpartu :

1. Rasa sakit oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering dan teratur.

2. Keluar lendir bercampur darah (*bloody show*) yang lebih banyak karena robekan - robekan kecil pada serviks.
3. Kadang- kadang ketuban pecah dengan sendirinya.
4. Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan pembukaan telah ada.

4. Proses Persalinan

Proses persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu:

a. Kala I (Kala Pembukaan)

In partu (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah (*bloody show*), karena serviks mulai membuka (dilatasi) dan mendatar (*effacement*). Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler sekitar kanalis servikalis karena pergeseran ketika serviks mendatar dan terbuka. Kala pembukaan dibagi atas 2 fase, yaitu:

- 1) Fase laten: di mana pembukaan serviks berlangsung lambat, sampai pembukaan 3 cm berlangsung dalam 7-8 jam.
- 2) Fase aktif: berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 subfase:
 - a) Periode akselerasi: berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm.
 - b) Periode dilatasi maksimal (*steady*): selama 2 jam pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm.
 - c) Periode deselerasi: berlangsung lambat, dalam waktu 2 jam pembukaan jadi 10 cm atau lengkap.

b. Kala II (Kala Pengeluaran Janin)

Pada kala pengeluaran janin, his terkoordinir, kuat, cepat dan lebih lama, kira-kira 2-3 menit sekali. Kepala janin telah turun masuk ruang panggul sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa mencedan. Karena tekanan pada rektum, ibu merasa seperti mau buang air besar dengan tanda anus terbuka. Pada waktu his, kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka dan perineum meregang. Dengan his mencedan yang terpinpin, akan lahirlah kepala, diikuti oleh seluruh badan janin. Kala II pada primi 1 ½-2 jam pada multi ½-1 jam.

c. Kala III (Kala Pengeluaran Uri)

Setelah bayi lahir, kontraksi rahim istirahat sebentar. Uterus teraba keras dengan fundus uteri setinggi pusat dan berisi plasenta yang menjadi tebal 2 kali sebelumnya. Beberapa saat kemudian, timbul his pelepasan dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5-10 menit seluruh plasenta terlepas, terdorong ke dalam vagina dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan dari atas simfisis atau fundus uteri. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc.

d. Kala IV (Kala Pengawasan)

Adalah kala pengawasan selama 1 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengamati keadaan ibu terutama terhadap bahaya

perdarahan postpartum. Lamanya persalinan pada primi dalam kala I yaitu sekitar 13 jam, kala II sekitar 1 jam dan kala III sekitar $\frac{1}{2}$ jam. Sehingga lama persalinan pada primi yaitu sekitar $14 \frac{1}{2}$ jam. Sedangkan lamanya persalinan pada multi dalam kala I yaitu sekitar 7 jam, kala II sekitar $\frac{1}{2}$ jam dan kala III sekitar $\frac{1}{4}$ jam sehingga lama persalinan pada multi yaitu $7 \frac{3}{4}$ jam (Mochtar:2004).

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persalinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan yaitu:

a. *Passage* (Jalan Lahir)

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang padat, dasar panggul, vagina dan entriotus (Lubang Luar Vagina). Meskipun jaringan lunak khususnya lapisan-lapisan otot dasar panggul ikut menunjang keluarnya bayi, tetapi panggul ibu jauh lebih berperan dalam proses persalinan.

Janin harus menyesuaikan dirinya terhadap jalan yang relatif kaku. Oleh karena itu ukuran dan bentuk panggul harus ditentukan sebelum persalinan dimulai.

b. *Passanger* (Janin dan Plasenta)

Passenger atau jalan lahir terdiri dari beberapa faktor, yakni ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap, dan posisi janin karena plasenta juga harus melewati jalan lahir, maka dia juga dianggap sebagai bagian dari *passenger* yang menyertai janin, namun plasenta jarang menghambat proses persalinan pada kehamilan normal.

c. *Power* (kekuatan)

Kekuatan terdiri dari kemampuan ibu melakukan kontraksi involunter dan volunter secara bersamaan untuk mengeluarkan janin dan plasenta dari uterus. Kontraksi involunter disebut juga kekuatan primer, menandai dimulainya persalinan. Apabila serviks berdilatasi, usaha volunter dimulai untuk mendorong yang disebut kekuatan sekunder, dimana kekuatan ini memperbesar kekuatan kontraksi involunter (Mochtar:2004).

6. Faktor-Faktor yang Menghambat Persalinan

Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan penghambat persalinan yaitu faktor ibu seperti panggul sempit. Sedangkan faktor janin seperti kelainan letak dan gawat janin. Ketika persalinan tidak dapat dilakukan secara spontan maka atas indikasi tersebut dilakukanlah persalinan seksio sesarea (Sarwono:2006).

Dengan adanya berbagai faktor yang bisa menghambat suatu persalinan normal, dapat kita hubungkan dengan salah satu ayat dalam Al-Quran surah Ar`Rad ayat 8.

Allah berfirman dalam Q.S Ar-Ra`d 13/ayat 8:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Terjemahannya:

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh Setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.

Kandungan dari ayat tersebut yaitu Allah SWT memberitahu tentang pengetahuan-Nya yang menjangkau segala sesuatu dan bahwa tiada sesuatu yang samar atau tersembunyi dari-Nya. Dia mengetahui apa yang dikandung dalam rahim manusia dalam hal ini ibu. Dari ayat tersebut menjelaskan juga tentang Allah SWT mengetahui apakah janin yang dalam kandungan itu, baik atau buruk, bernasib malang atau mujur, berumur panjang atau pendek, lahir dengan normal atau meninggal sebelum waktu (gugur) atau tinggal lebih lama dalam kandungan (Said:2003).

B. TINJAUAN UMUM TENTANG SEKSIO SESAREA

1. Sejarah Seksio Sesarea

Pada awalnya, seksio sesarea dikembangkan sebagai salah satu metode modern di bidang kedokteran untuk membantu menurunkan angka kematian ibu akibat melahirkan. Menurut literatur sejarah, tindakan operasi sesarea dilakukan untuk menolong kelahiran seorang bayi laki-laki yang dikemudian hari menjadi kaisar Roma yang dikenal, yaitu Julius Caesar. Jadi, operasi sesarea sudah terkenal sejak jaman Julius Caesar. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan pada tahun 700 sebelum Masehi, ketika kekaisaran Roma berada di bawah kekuasaan Numa pompilius, setiap wanita yang meninggal dalam persalinan disebabkan melahirkan bayi melalui sayatan pada perutnya.

Namun dalam sejarah kedokteran, seksio sesarea baru disebut sebagai cara untuk melahirkan bayi setelah tahun masehi (tepatnya tahun

1794) yaitu ketika seorang dokter di Virginia Amerika Serikat melakukan operasi pada istrinya. Saat itu, sejarah kedokteran Amerika mencatat hanya sekitar 10% wanita yang dapat hidup setelah persalinan dengan operasi. Hal ini disebabkan prosedur operasi yang belum dapat menjamin keselamatan ibu akibat peralatan operasi yang tidak steril, efek obat bius, antibiotik, teknik pembedahan, perdarahan, pemantauan pasca operasi, manajemen serta kontrol rasa sakit yang belum ada.

Angka persalinan dengan menggunakan seksio sesarea cukup tinggi terjadi di Indonesia. Apalagi, sebagian diantaranya dilakukan tanpa pertimbangan medis. Beberapa alasan yang mendasari kecenderungan melahirkan dengan operasi semakin meningkat (terutama di kota-kota besar). Alasan paling banyak adalah anggapan yang salah bahwa dengan operasi, ibu tidak akan mengalami rasa sakit seperti halnya pada persalinan alami. Hal ini terjadi karena kekhawatiran atau kecemasan menghadapi rasa sakit yang akan terjadi pada persalinan alami. Memang pada persalinan dengan seksio yang direncanakan, baik karena pertimbangan medis maupun tidak, ibu tidak akan merasakan saat-saat kontraksi sebelum persalinan. Kontraksi merupakan keadaan kejang otot rahim atau pengerutan otot rahim sehingga menjadi lebih pendek untuk merangsang pembukaan rahim yang lebih lebar untuk persiapan persalinan alami. Sebagian besar wanita yang telah melahirkan, pada saat kontraksi mereka merasakan rasa sakit yang luar biasa. Saat-saat inilah yang sangat sering menakutkan sebagian wanita yang akan melahirkan sehingga

banyak diantaranya yang memutuskan lebih baik melahirkan dengan seksio sesarea.

Melihat kecenderungan yang ada di Indonesia, tidak mengherankan apabila kemudian pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama pemerintah (Departemen kesehatan dan Departemen kesejahteraan sosial) melakukan pemantauan terhadap tindakan persalinan dengan seksio sesarea. Sebelumnya, berbagai upaya menurunkan angka persalinan seksio sesarea sudah dilakukan. Misalnya, surat edaran direktorat jenderal pelayanan medik (Dirjen Yanmedik) Depkes RI tanggal 12 september 2000, menyatakan bahwa angka kelahiran seksio untuk rumah sakit pendidikan atau rujukan provinsi, ditargetkan turun menjadi 20%, sedangkan untuk rumah sakit swasta 15%.

Namun tidak sedikit pula persalinan seksio tersebut dilakukan karena kondisi ibu maupun janin tidak memungkinkan untuk melahirkan secara alami. Apalagi biaya yang harus dikeluarkan jika melakukan seksio sesarea ini tidak kecil, meskipun dengan alasan apapun, orang dengan ekonomi menengah ke bawah lebih memilih melahirkan bayi secara alami.

Dengan adanya perbedaan proses persalinan antara persalinan pervaginam dengan persalinan seksio sesarea namun tidak menjadi suatu alasan bahwa penghormatan seorang anak kepada ibu juga berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran surah Lukman.

Allah berfirman dalam Q.S Lukman 31/ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
 أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahannya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Kandungan dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia supaya berbakti kepada ibu-bapaknya, menanti keduanya, dan melaksanakan semua haknya. Manusia dikandung oleh ibunya dengan menderita kelemahan fisik yang makin hari semakin bertambah berat, hingga sampai berakhirnya masa nifas (setelah melahirkan). Kemudian Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada Dia atas nikmat-nikmat yang telah diterimanya. Selain itu, manusia juga diperintahkan untuk mensyukuri ibu-bapaknya, karena kedua orang tua merupakan penyebab kelahiran mereka di dunia. Orang tua juga telah menderita berbagai kesukaran dalam mengasuh dan mendidik anaknya. (Said:2003).

2. Etimologi Seksio Sesarea

Ada beberapa unsur yang dapat menjelaskan asal kata “Caesar”:

- a. Istilah dapat diambil dari kata kerja bahasa Latin *caedere* yang berarti “membedah”. Dengan demikian “seksio sesaria” menjadi gaya bahasa retorik (Lestari:2009).

- b. Istilah yang mungkin diambil dari Romawi kuno Julius Caesar yang disebut-sebut dilahirkan dengan metode tersebut. Dalam sejarah, hal ini sangat tidak memungkinkan karena ibunya masih hidup ketika ia mencapai usia dewasa (seksio sesarea tidak mungkin dilakukan pada masa tersebut terkait dengan teknologi yang tidak mendukung), tetapi legenda tersebut telah bertahan sejak abad ke-2 SM (Lestari:2009).
- c. Hukum romawi yang menjelaskan bahwa prosedur tersebut perlu dilakukan pada ibu hamil yang meninggal untuk menyelamatkan nyawa sang bayi. Hal ini dikenal dengan istilah *lex caesarea*, sehingga hukum Romawi mungkin menjadi asal usul istilah ini (Lestari:2009).

Secara umum, istilah “seksio sesarea” merupakan gabungan dari hal-hal tersebut diatas. Kata kerja *caedo* dalam kalimat *a matre caesus* (“membedah ibunya”) digunakan pada masa Romawi untuk mendeskripsikan operasi tersebut (Lestari:2009).

Peran pasangan dapat sebagai orang yang memberi asuhan, sebagai orang yang berespon terhadap perasaan rentan wanita hamil, baik pada aspek biologis maupun dalam hubungannya dengan ibunya sendiri. Dukungan pria menunjukkan keterlibatannya dalam kehamilan pasangannya dan persiapan untuk terikat dengan anaknya (Bobak: 2005).

Berdasarkan hasil penelitian Sarmana (2004) menyatakan bahwa dilakukannya persalinan *sectio caesarea* adalah karena adanya anjuran dari suami dengan alasan lebih aman dan praktis tidak perlu

menunggu waktu lebih lama menanti kelahiran bayi dan kekhawatiran melihat ibu menjerit kesakitan serta adanya rasa khawatir terjadi sesuatu pada bayi jika melahirkan secara spontan. Hasil penelitian di Brazil menyatakan bahwa dokter melakukan tindakan seksio sesarea karena adanya tekanan dan dorongan dari pasien, suami dan keluarga (Salfariani:2009).

Dengan adanya penelitian yang mengatakan bahwa terkadang suami juga ikut menentukan bagaimana istrinya harus melahirkan karena alasan tidak ingin istrinya merasakan kesakitan dapat dikaitkan dengan salah satu ayat dalam surah Al-Araaf.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Araaf 7/ayat 189:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

Terjemahannya:

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

Kandungan dari ayat diatas adalah Allah menciptakan sepasang manusia dari jiwa yang satu (suami) dan dirinya yakni dari jiwa yang satu yaitu ibu. Allah SWT menciptakan pasangannya yakni

istrinya agar suami atau pasangan itu merasa senang dan cenderung hatinya kepada istrinya. Pada hakikatnya sebaliknya pun demikian, yakni agar istri tenang dan cenderung hatinya kepada suaminya (Said: 2003).

Menurut Kasdu (dalam penelitian Salfariani) kecenderungan memilih persalinan *sectio caesarea* karena para ibu khususnya di kota-kota besar banyak yang bekerja. Mereka sangat terikat dengan waktu dan sudah memiliki jadwal tertentu kapan mereka harus kembali bekerja.

3. Definisi Seksio Sesaria



Sumber: Ningri 2009

- a. Seksio sesarea adalah persalinan melalui pembedahan untuk mengeluarkan bayi dari rahim lewat insisi pada perut bagian bawah dari rahim (Walley:2005).
- b. Seksio sesarea adalah suatu persalinan buatan dimana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding depan perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin diatas 5000 gram (Sarwono:2006).

- c. Seksio sesarea adalah proses persalinan dengan melalui pembedahan dimana insisi dilakukan di perut ibu (laparotomi) dan rahim (histerektomi) untuk mengeluarkan bayi (Lestari:2009).
- d. Seksio sesarea adalah lahirnya janin melalui insisi di dinding abdomen (laparotomi) dan dinding uterus (histerektomi) (Cunningham:2006).
- e. Seksio sesarea adalah suatu cara melahirkan janin dengan sayatan pada dinding uterus melalui uterus melalui dinding depan perut (Ningri:2009).
- f. Seksio sesarea adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding depan perut atau vagina atau suatu histerektomi untuk melahirkan janin dari dalam rahim (Mochtar:2004).

Karena seksio sesarea merupakan operasi besar, maka biasanya prosedur ini dilakukan hanya bila ada alasan medis bagi seksio sesarea, kelahiran normal lewat vagina merupakan jalan lebih aman bagi ibu dan bayinya (Whalley:2005).

Ibu yang melahirkan bayi dengan seksio sesarea dianjurkan untuk tidak mengandung kembali kurang dari 18 bulan dari tindakan seksio. Karena mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya robekan rahim. Dimana kemungkinan rahimnya robek adalah sebesar tiga kali lipat dibandingkan mereka yang menunggu lebih lama sebelum melahirkan kembali. Hal ini karena belum selesainya penyembuhan luka rahim karena operasi yang pertama (Maulana:2008)

4. Indikasi Seksio Sesarea

Allah SWT, Dia yang menyembuhkan dari segala macam penyakitnya dan keraguan. Kesembuhan ada dua macam yaitu kesembuhan *maknawi rubi*, yaitu kesembuhan dari penyakit hati, dan kesembuhan yang nampak terlihat, yaitu kesembuhan badan (Al-Qahthani:2005).

Allah SWT telah menyebutkan dua jenis kesembuhan ini dalam Kitab-Nya (al-Quran) dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam Sunnah-nya.

Nabi Saw bersabda:

((مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.))

Artinya :

“Allah tidak menurunkan satu penyakit pun, kecuali menurunkan obatnya.”(HR. Al-Bukhari). Dikutip dari al-Qahthani (2005)

Kemudian, Firman Allah SWT dalam Q.S. Yunus 10/ayat 57:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

Kandungan dari ayat di atas adalah Allah SWT telah memberikan pelajaran kepada umatnya serta memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada-Nya (Said:2003).

Seksio sesarea dalam hukum islam dibolehkan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku bahwa melahirkan secara seksio sesarea sebenarnya diperbolehkan jika memang ada alasan medis yang darurat. Misalnya posisi janin sungsang, gawat janin atau hal lain yang biasa membahayakan ibu dan anak bila dilakukan proses melahirkan secara normal.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh seorang ulama Dr.Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya Fatawa Maushiro. Iya berkata”hal ini berarti keberadaan janin akan membahayakan sang ibu, padahal ibu adalah sang induk sedangkan anak adalah cabang, oleh karena itu tidak boleh mengorbankan induk demi cabang. (Al-Qardhawi:2010)

Menurut Kasdu (2003) indikasi seksio sesarea dibagi menjadi dua faktor:

a. Faktor Janin

1. Bayi terlalu besar. Berat bayi sekitar 4000 gram atau lebih, menyebabkan bayi sulit keluar dari jalan lahir.
2. Kelainan letak bayi. Ada dua kelainan letak janin dalam rahim yaitu letak sungsang dan lintang.
3. Janin abnormal. Janin abnormal misalnya kerusakan genetik dan hidrocephalus.

4. Ancaman gawat janin (*Fetal distress*). Gangguan pada janin melalui tali pusat akibat ibu menderita hipertensi atau kejang rahim. Gangguan pada bayi juga diketahui adanya mekonium dalam air ketuban. Apabila proses persalinan sulit melalui vagina maka dilakukan operasi seksio sesarea.
5. Faktor plasenta. Ada beberapa kelainan plasenta yang menyebabkan keadaan gawat darurat pada ibu dan janin sehingga harus dilakukan persalinan dengan operasi bila itu plasenta previa dan solutio plasenta.
6. Kelainan tali pusat. Ada dua kelainan tali pusat yang biasa terjadi yaitu prolaps tali pusat dan terlilit tali pusat.
7. *Multiple pregnancy*. Tidak selamanya bayi kembar dilaksanakan secara operasi. Persalinan kembar memiliki resiko terjadinya komplikasi misalnya lahir prematur sering terjadi preeklamsi pada ibu. Bayi kembar dapat juga terjadi sungsang atau letak lintang. Oleh karena itu pada persalinan kembar dianjurkan di rumah sakit, kemungkinan dilakukan tindakan operasi.
8. Kala II lama. Kala II dalam persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi. Adapun tanda dan gejala dari kala II yaitu :
 - a) Ibu merasa ingin mendedan bersamaan dengan terjadinya kontraksi.

- b) Ibu merasa adanya peningkatan tekanan pada rektum dan vagina.
- c) Perineum menonjol.
- d) Vulva, vagina dan spingter ani membuka.
- e) Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah.

Apabila terjadi keadaan yang patologis seperti tidak ada kemajuan dalam kala II yang nantinya dapat mengancam jiwa maka harus selalu disampaikan pada ibu dan keluarga bahwa persalinan ini harus diakhiri dengan tindakan operatif yaitu seksio sesarea (Sarwono:2006).

9. Primi tua

Umur terbagi menjadi:

- 1) Umur muda : <20 tahun (primi muda)
- 2) Umur ideal : 20-35 tahun
- 3) Umur tua : >35 tahun

Ibu yang hamil terlalu muda, perkembangan alat-alat reproduksinya belum optimal. Sebaliknya pada ibu yang terlalu tua, fungsi alat reproduksinya telah mengalami kemunduran. Selain itu, pada usia tua komplikasi dari kehamilan semakin besar. Hal inilah yang menjadi indikasi medis untuk dilakukannya seksio sesarea.

10. Serotinus

Kehamilan lewat waktu yang berarti kehamilan yang melampaui usia 292 hari atau 42 minggu dengan gejala

kemungkinan komplikasinya. Kehamilan lewat waktu disebut juga sebagai kehamilan serotinus, *prolonged pregnancy*. Penyebab terjadinya kehamilan lewat waktu adalah ketidakpastian tanggal haid terakhir, adanya kelainan kongenital dan lain-lain (Sarwono:2006).

b. Faktor Ibu

1. Usia

Ibu yang melahirkan pertama kali diatas usia 35 tahun atau wanita usia 40 tahun ke atas. Pada usia ini seseorang memiliki penyakit yang beresiko misalnya hipertensi jantung, kencing manis dan eklamsia.

2. Tulang Panggul

Cephalopelvic disproportion (CPD) adalah ukuran lingkaran panggul ibu tidak sesuai dengan ukuran lingkaran kepala janin.

3. Persalinan sebelumnya dengan operasi

4. Faktor hambatan jalan lahir

Gangguan jalan lahir terjadi adanya tumor atau mioma. Keadaan ini menyebabkan persalinan terhambat atau tidak maju adalah distosia.

5. Ketuban pecah dini

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sekitar 60-70% bayi yang mengalami ketuban pecah dini akan lahir sendiri 2×24 jam. Apabila bayi tidak lahir lewat waktu, barulah dokter akan melakukan tindakan operasi seksio sesarea.

6. Gagal Drips (Sarwono:2006).

5. Keuntungan seksio sesarea

a. Keuntungan seksio sesarea yaitu:

Membuat persalinan menjadi lebih singkat, tidak ada kompresi jalan lahir, tidak ada sepsis dari jalan lahir, menurunkan resiko ruptur uterus setelah riwayat seksio sesarea (Rabe:2002).

b. Kerugian seksio sesarea yaitu:

Kemungkinan merusak kandung kemih dan usus, trombosis dan emboli, gangguan penyembuhan luka, kekhawatiran terjadinya ruptur pada seksio sesarea berikutnya (Rabe:2002).

6. Efek Samping Seksio Sesarea

Seksio sesarea adalah pilihan ketika masalah tertentu muncul. Sebagian wanita berfikir bahwa persalinan akan berjalan lebih cepat dan mudah lewat seksio sesarea. Namun, seksio sesarea sebenarnya tidak mudah bagi sang ibu maupun bayinya, seperti yang dipikirkan oleh ibu. Kelahiran normal adalah pilihan terbaik. Adapun beberapa resiko yang muncul dari seksio sesarea:

a. Bagi Ibu

- 1) Masalah-masalah yang berhubungan dengan anastesi yang digunakan untuk pembedahan.
- 2) Rasa aman selama beberapa minggu pasca persalinan.
- 3) Resiko infeksi dan kehilangan darah lebih besar daripada kelahiran via vagina.

- 4) Lebih sulit bagi anda merawat bayi.
 - 5) Lebih banyak masalah dengan kehamilan selanjutnya (termasuk masalah untuk hamil kembali dan memiliki plasenta yang sehat).
 - 6) Resiko seksio sesarea yang lebih besar untuk persalinan berikutnya (Whalley:2005).
- b. Bagi janin:

1) Gangguan pernapasan

TTNB (*transient Tachynea of the New Born*) adalah gangguan pernapasan yang paling sering dikhawatirkan terjadi pada bayi sesar. Gangguan ini terjadi akibat cairan yang memenuhi paru-paru janin selama berada dalam rahim tidak terkompensasi mengingat bayi sesar tinggal “terima jadi”. Padahal, proses persalinan pervaginam melewati jalan lahir yang memungkinkan cairan yang memenuhi paru-paru semasa janin berada dalam rahim dipompa habis keluar.

Selain itu, proses kompresi juga terjadi berkat kontraksi rahim ibu secara berkala. Kontraksi yang lama-kelamaan semakin kuat ini akan menekan ubun bayi, sehingga cairan dalam paru-parunya ikut keluar. Pada bayi sesar kedua proses tadi tidak terjadi dengan sempurna (Johnson:2004).

2) Rendahnya sistem kekebalan tubuh

Data berdasarkan *evidence base* memang belum ada. Namun pada proses persalinan normal, bayi berpindah dari rahim

yang steril ke lingkungan luar melalui proses yang berlangsung lama dan melibatkan kontraksi selama berjam-jam. Saat lahir pun, mulut bayi tidak tertutup sehingga banyak kuman yang masuk ke dalam mulut, bahkan sampai ke pencernaan. Akibatnya, bayi mengalami kontak alami dengan mikroba floral dalam jalan lahir ibunya yang kemudian berkoloni di ususnya, hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan dan pematangan sistem kekebalan tubuhnya (Johnson:2004).

3) Rentan alergi

Baik dari kondisi “kotor” di jalan lahir yang tidak dilalui si bayi yang dilahirkan secara sesar, maupun tertundanya pemberian ASI sesegera mungkin, membuat risiko alergi pada bayi jadi lebih tinggi. Belum lagi paparan antibiotik yang biasanya diberikan kepada bayi sesar sebagai langkah berjaga-jaga dari kemungkinan infeksi, juga meningkatkan risiko alergi (Johnson:2004).

4) Emosi cenderung rapuh

Meski belum terbukti melalui penelitian ilmiah, kondisi psikologis bayi sesar diduga cenderung lebih rapuh dibandingkan bayi yang dilahirkan secara normal. Faktanya, bayi yang lahir normal memang dihadapkan pada kondisi tidak nyaman dimana ia harus melewati jalan lahir yang sempit dan berliku disertai tekanan hebat akibat kontraksi rahim. Perjuangan inilah yang

diyakini memberi kontribusi tersendiri terhadap kepribadian anak kelak.

Akan tetapi, pola asuh yang diberikan orangtua dan bagaimana pengaruh lingkungan terbukti lebih ikut memberi warna apakah seseorang lebih tahan banting atau tidak ketika menghadapi stress kehidupan (Johnson:2004).

5) Terpengaruh anastesi

Kondisi ini mungkin saja terjadi. Karenanya, tim dokter yang terdiri dari dokter kebidanan dan kandungan, dokter anak, dan dokter anastesi harus berhitung secermat mungkin agar pembiusannya berpengaruh seminimum mungkin. Untuk itu, umumnya anastesi yang digunakan adalah anastesi spinal yang berdosis rendah. Penggunaan bius total membuat bayi terlihat agak ngantuk karena dikeluarkan saat masih dibawah pengaruh anastesi (Johnson:2004).

6) Minim peluang IMD

Bayi sesar kurang mendapatkan kesempatan untuk menjalani IMD alias inisiasi menyusui dini. Karena kondisi bayi sesar berbeda dengan kondisi bayi lahir normal yang bisa langsung ditempelkan di dada ibunya dengan refleks yang cukup kuat untuk mencapai payudara ibu. Sementara pada seksio sesarea, hal ini tak bisa segera dilakukan mengingat bayi biasanya langsung dipasang infus dan selang oksigen guna membantu

pernapasannya. Si ibu pun umumnya masih dalam keadaan “teler” akibat pengaruh obat anastesi (Johnson:2004).

7. Jenis-jenis Seksio Sesarea

a. Seksio sesarea klasik atau korporal yaitu Insisi memanjang pada segmen atas uterus. Indikasi seksio sesarea klasik:

- 1) Bila terjadi kerusakan dalam memisahkan kandung kencing untuk mencapai segmen bawah rahim, misalnya karena ada perlekatan-perlekatan akibat pembedahan seksio sesarea yang lalu atau adanya tumor-tumor di daerah segmen bawah rahim.
- 2) Janin besar dalam letak lintang, khususnya jika selaput ketuban sudah pecah dan bahu terjepit dalam jalan lahir.
- 3) Plasenta previa dengan implantasi plasenta di sebelah anterior.
- 4) Pada beberapa kasus bayi dengan berat badan lahir rendah dan segmen bawah uterus tidak mengalami penipisan.

a) Kelebihannya:

1. Mengeluarkan janin lebih cepat.
2. Tidak mengakibatkan komplikasi kadung kemih.
3. Sayatan bisa diperpanjang.

b) Kekurangannya:

1. Infeksi mudah menyebar secara intra abdominal.
2. Untuk persalinan selanjutnya sering terjadi ruptur uteri spontan.

b. Seksio Sesarea Transperitonealis Profunda

Seksio sesarea yang dilakukan dengan membuat sayatan melintang konkaf pada segmen bawah rahim (*low servix transversal*) kira-kira 10 cm.

1) Kelebihannya:

- a) Penjahitan berkurang dibandingkan cara klasik.
- b) Perdarahan berkurang dibandingkan cara klasik.
- c) Kemungkinan ruptur uteri kecil.

2) Kekurangannya:

Luka dapat menyebar ke kiri atau ke kanan sehingga menyebabkan ruptur uteri putus sehingga menyebabkan perdarahan lebih banyak.

c. Seksio Sesarea Ekstra Peritonealis

Rongga peritoneum tidak dibuka dulu dilakukan pada pasien dengan infeksi intra uterin yang berat, sekarang jarang dilakukan.

d. *Caesarean section Hysterectomy*

Setelah seksio sesarea, dikerjakan histerektomi dengan indikasi yaitu atonia uteri, plasenta akreta, mioma uteri dan infeksi intra uterin yang berat (Bagian Obstetri & Ginekologi FK Unpad, 2007).

8. Komplikasi Seksio Sesarea

Menurut Mochtar (2004), komplikasi seksio sesarea sebagai berikut :

- a. Infeksi puerperal (Nifas)
Kenaikan suhu beberapa hari merupakan infeksi ringan, kenaikan suhu yang disertai dehidrasi serta perut kembung termasuk infeksi sedang. Sedangkan peritonitis, sepsis serta ileus paralitik merupakan infeksi berat.
- b. Perdarahan dapat disebabkan karena pembuluh darah banyak yang terputus atau dapat juga karena atonia uteri.
- c. Luka kandung kemih dan emboli paru.
- d. Kemungkinan ruptur uteri spontan pada kehamilan mendatang.

Komplikasi Seksio Sesarea (Sarwono:2006):

1. Pada Ibu
 - a. Infeksi puerperalis
 - b. Perdarahan
 - c. Komplikasi-komplikasi lain seperti luka kandung kencing, embolisme paru-paru, dan sebagainya yang sangat jarang terjadi.
 - d. Suatu komplikasi yang baru kemudian tampak, ialah kurang kuatnya parut pada dinding uterus, sehingga pada kehamilan berikutnya bisa terjadi ruptur uteri.
2. Pada Bayi

Nasib anak yang dilahirkan dengan seksio sesarea banyak tergantung dari keadaan yang menjadi alasan untuk melakukan seksio

sesarea. Menurut statistik di negara-negara dengan pengawasan antenatal dan intranatal yang baik, kematian perinatal paska seksio sesarea berkisar antara 4 dan 7%.

Walaupun dari segi keamanan tindakan operasi sesar makin aman, tetap saja operasi ini mempunyai risiko. Angka kematian paska persalinan lebih tinggi dari angka kematian ibu secara umum. Risiko kematian persalinan sesar bervariasi antara 2-30 kali dari persalinan per vaginam. Komplikasi operasi tergantung dari beberapa keadaan, antara lain keadaan pasien waktu masuk rumah sakit, keterampilan operator, selain itu adalah sangat penting pengalaman dan keterampilan ahli anastesinya. Oleh karena itu, angka kematian persalinan sesar dan persalinan per vaginam tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Angka kematian pasca operasi sesar berkisar antara 0-30 kali angka kematian pasca persalinan per vaginam. Sebagai gambaran yang ekstrim, di rumah sakit pendidikan Leiden, Nederland pada dekade 80-an, angka kematian ibu per 1000 operasi sesar adalah 0.

Angka persalinan sesar di rumah sakit pendidikan/pusat rujukan Dr. Hasan Sadikin Bandung, pada tahun 81-90 adalah 9,1%, dengan angka kematian per 1000 operasi sesar berkisar dari 2,6-4,5 (Wirakusumah F:2005).


BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Pendekatan Masalah

Masalah dalam penelitian adalah semakin banyaknya ibu yang memilih proses persalinan seksio sesarea padahal resikonya sangat tinggi. Penelitian ini berusaha untuk melihat kejadian seksio sesarea yang dilakukan atas indikasi medis, non medis dan *support system*. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melihat berapa besar distribusi kejadian seksio sesarea di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar Tahun 2013. Hal yang dilihat pada penelitian ini yaitu seksio sesarea dilakukan atas indikasi medis, non medis dan *support system*.

KERANGKA KONSEP

VARIABEL DEPENDEN VARIABEL INDEPENDEN



----- Variabel yang akan diteliti

B. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Alat Ukur
1.	Seksio sesarea	Seksio sesarea adalah mengakhiri suatu kehamilan dengan cara mengeluarkan janin dengan melakukan pembedahan pada dinding perut.	Indikasi medis, <i>support system</i> , dan non medis.	Wawancara dengan pasien dan rekam medik
2.	Indikasi Medis	Indikasi medis dalam kedokteran memiliki arti sebagai pertanda atau alasan. Hal inilah yang menjadi alasan untuk dilakukan seksio sesarea.	Faktor janin yaitu bayi terlalu besar, kelainan letak bayi, janin abnormal, anca man gawat janin, faktor plasenta, kelainan tali pusat, kala II lama, primi tua, dan serotinus. Sedangkan faktor ibu yaitu usia, tulang panggul, persalinan sebelumnya	Wawancara dengan pasien dan rekam medik

			dengan operasi, faktor hambatan jalan lahir, ketuban pecah dini dan gagal drips.	
3.	<i>Support system</i>	Dukungan atau dorongan orang terdekat untuk melakukan sesuatu.	Suami dan keluarga. (terkecuali keinginan ibu hamil).	Wawancara dengan pasien
4.	Indikasi Non medis	Alasan untuk melakukan tindakan medis yang bukan dari alasan medis tetapi karena hal lain misalnya alasan pekerjaan.	Keinginan ibu sendiri.	Wawancara dengan pasien

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian bersifat deskriptif observasional dengan pendekatan *cross sectional*. *Cross Sectional* adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan hanya pada waktu sekali saja dan tidak untuk penelitian yang berlanjut (Sudijdo:2002).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2013. Penelitian akan dilaksanakan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian (Notoatmodjo: 2002). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua ibu yang melakukan persalinan dengan cara seksio sesarea tahun 2012 sejumlah 448 orang atau kurang lebih 50 orang setiap bulannya.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling* yaitu semua ibu hamil yang melakukan seksio sesarea di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar pada bulan Mei tahun 2013.

D. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah sebuah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis (Nursalam:2003).

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan pada data primer dan data sekunder . Data primer ini didapatkan dengan cara wawancara dengan ibu yang telah melakukan seksio sesarea. Data primer ini digunakan untuk mendapatkan data tentang non medis (keinginan ibu sendiri) dan untuk mendapatkan data tentang *support system*. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara melihat rekam medik pasien karena data sekunder tersebut dikumpulkan untuk melihat hasil tentang indikasi medis. Sedangkan data primer dan data sekunder tersebut diambil dari seluruh ibu yang telah melakukan persalinan seksio sesarea pada bulan Mei 2013 di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar.

E. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah mengolah data dengan cara editing, koding, dan tabulasi (Sugiyono:2009)

Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan:

1. *Editing*, setelah data terkumpul maka dilakukan pemeriksaan kelengkapan data menurut karakteristik masing-masing dan memeriksa kesinambungan data.

2. *Coding*, data yang terkumpul diberi kode atau simbol menurut pengamatan yang telah dilakukan.
3. *Tabulating*, setelah pengkodean data, kemudian dikelompokkan dalam suatu tabel.
4. *Entry Data*, memasukkan data ke program komputer untuk proses analisis data dengan menggunakan program SPSS.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis dengan cara analisis univariat. Analisis univariat bertujuan untuk memperlihatkan distribusi frekuensi dan persentase dari variabel yang akan diteliti.

G. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memandang perlu adanya rekomendasi dari institusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan dengan mengajukan permohonan izin kepada instansi tempat penelitian yaitu Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar. Setelah mendapat persetujuan barulah diadakan penelitian dengan menekankan masalah etika. Menurut Yurisa (2008), Komite Nasional Etika Penelitian membagi menjadi empat etika yang harus ada dalam melakukan penelitian kesehatan meliputi :

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*).

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan

untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*Informed Consent*) yang terdiri dari :

- a. Penjelasan manfaat penelitian
 - b. Penjelasan kemungkinan resiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan.
 - c. Penjelasan manfaat yang akan di dapatkan.
 - d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian.
 - e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja.
 - f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.
2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*Respect For Privacy And Confidentiality*).

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek.

Peneliti dapat menggunakan koding (*inisial* atau *identification number*) sebagai pengganti identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*Respect For Justice And Inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*Balancing Harms And Benefits*).

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan ditingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Rumah sakit tempat peneliti melakukan penelitian bernama Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar yang sebelumnya beberapa kali berganti nama. Rumah sakit ini pada tahun 1931 bernama RB. Melania. Kemudian pada tahun 1966 berubah nama menjadi RSB Fatimah Pendidikan Bidan Ujung Pandang. Pada tahun 1983 bernama RSB. Siti Fatimah. Lalu, pada tanggal 2 Februari 2002 RSB. Siti Fatimah berubah nama menjadi RSIA. Siti Fatimah sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.12, tanggal 4 Februari 2002. Setelah beberapa kali berganti nama, rumah sakit ini sekarang bernama Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar.

Rumah sakit ini terletak di jalan Gunung Merapi No.73, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah sakit ini didirikan di atas tanah dengan luas 2.383 m dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Gunung Merapi
2. Sebelah timur berbatasan dengan jalan Gunung Lokon
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Sungai Pareman
4. Sebelah barat berbatasan dengan perumahan penduduk.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun 2013. Dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari pasien sedangkan data sekundernya didapatkan dari rekam medik di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar.

B. Hasil Penelitian

Distribusi responden kejadian seksio sesarea berdasarkan umur di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar Bulan Mei tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1
Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Umur
Di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak
(RSKDIA) Siti Fatimah Makassar Bulan Mei Tahun 2013

No	Umur	Jumlah	Persen (%)
1	< 20 tahun	1	2,4
2	20-35 tahun	27	64,3
3	>35 tahun	14	33,3
Jumlah		42 orang	100

Sumber: Rekam Medik RSKDIA Siti Fatimah Makassar, 2013

Dari tabel 5.1 diatas, distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan umur ibu saat melakukan persalinan seksio sesarea paling banyak pada umur 20-35 sebanyak 27 orang (64,3 %), disusul dengan umur ibu > 35 tahun sebanyak 14 orang (33,3 %) dan paling sedikit pada umur ibu <20 tahun sebanyak 1 orang (2,4 %).

Untuk melihat lebih jelas distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan umur ibu saat melakukan persalinan seksio sesarea dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Selain distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan umur ibu saat melakukan persalinan seksio sesarea, dapat juga dilihat tabel tentang distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan riwayat obstetri ibu, yang nampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Riwayat Obstetri Ibu di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar Periode Mei Tahun 2013

No	Riwayat Obstetri	Jumlah	Persen (%)
1	Primipara	19	45,2
2	Multipara	22	52,4
3	Grandemultipara	1	2,4
Jumlah		42	100

Sumber :Rekam Medik RSKDIA Siti Fatimah Makassar, 2013

Dari tabel 5.2, nampak bahwa distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan riwayat obstetri paling banyak pada ibu dengan riwayat primipara sebanyak 19 orang (45,2 %), disusul oleh multipara sebanyak 22 orang (52,4), dan paling sedikit pada ibu dengan riwayat obstetri grandemultipara sebanyak 1 orang (2,4 %).

Selain tentang distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan riwayat obstetri ibu maka distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan jarak kehamilan dengan kehamilan sebelumnya. Berikut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3
Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Jarak Kehamilan di
Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA)
Siti Fatimah Makassar Periode Mei Tahun 2013

No	Jarak Kehamilan	Jumlah	Persen (%)
1	<1,5 tahun	1	2,4
2	1,5-2 tahun	13	31
3	2-3 tahun	9	21,4
4	Kehamilan pertama	19	45,2
Jumlah		42	100

Sumber : Data Primer, 2013

Dari tabel 5.3, paling banyak pada kehamilan pertama atau tidak mempunyai jarak kehamilan dengan kehamilan sebelumnya sebanyak 19 orang (45,2 %), disusul oleh ibu yang mempunyai jarak kehamilan antara 1,5-2 tahun sebanyak 13 orang (31 %) dan paling sedikit pada jarak <1,5 tahun sebanyak 1 orang (2,4 %).

Selain tabel diatas juga nampak tabel tentang distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan pekerjaan ibu yang dapat kita lihat pada tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.4
Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Pekerjaan Ibu
Di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKDIA)
Siti Fatimah Makassar Bulan Mei Tahun 2013

No	Pekerjaan	Jumlah	Persen (%)
1	PNS	3	7,1
2	IRT	33	78,6
3	Wiraswasta	6	14,3
Jumlah		42 orang	100

Sumber :Rekam Medik RSKDIA Siti Fatimah Makassar, 2013

Dari tabel 5.4, ibu yang melakukan seksio sesarea paling banyak adalah ibu yang mempunyai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 33 orang (78,6 %), disusul oleh ibu yang mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 6 orang (14,3 %) dan paling sedikit adalah ibu yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 3 orang (7,1 %).

Sedangkan, distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan tingkat pendidikan ibu, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5
Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu
di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA)
Siti Fatimah Makassar Bulan Mei Tahun 2013

No	Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1	SD	2	4.8
2	SMP	7	16.7
3	SMA	27	64.3
4	S1	5	11.9
5	D3	1	2.4
Jumlah		42	100

Sumber :Rekam Medik RSKDIA Siti Fatimah Makassar, 2013

Dari tabel 5.5, distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan tingkat pendidikan ibu di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar bulan Mei tahun 2013, paling banyak pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 27 orang (64,3 %), disusul tingkat pendidikan SMP sebanyak 7 orang (16,7 %), S1 sebanyak 5 orang (11,9 %), SD sebanyak 2 orang (4,8 %) dan paling sedikit pada tingkat pendidikan D3 sebanyak 1 orang (2,4 %).

Dari hasil penelitian nampak bahwa persalinan seksio sesarea paling banyak dilakukan oleh ibu yang berumur 20 sampai 35 tahun (64,3 %), dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 27 orang (64,3 %) dan mempunyai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 33 orang (78,6 %).

Berikut dapat kita lihat tentang distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan indikasi medis, non medis dan *support system* di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar Bulan Mei Tahun 2013.

Tabel 5.6
Distribusi Kejadian Seksio Sesarea
Berdasarkan Indikasi Medis, Non Medis dan *Support system* di
Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah
Makassar Bulan Mei Tahun 2013

Jumlah persalinan seksio sesarea	Indikasi Medis		Non Medis	Support system	
	Faktor Ibu (%)	Faktor Janin (%)	Permintaan pasien (%)	Orangtua Pasien (%)	Suami (%)
42 orang (100 %)	24 orang (57,2 %)	14 orang (33,3 %)	4 orang (9,5)	0	0

Sumber: Data Primer dan Rekam Medik RSKDIA Siti Fatimah Makassar, 2013

Dari tabel 5.6, didapatkan sebanyak 42 orang yang melakukan persalinan seksio sesarea di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar pada bulan Mei tahun 2013. Dari 42 orang ini, seksio sesarea dengan indikasi medis sebanyak 38 orang (90,5 %). Kemudian seksio sesarea dengan indikasi non medis sebanyak 4 orang (9,5 %). Sedangkan seksio sesarea yang dilakukan karena *support system* sebanyak 0 (0 %).

Persalinan seksio sesarea dengan indikasi medis terdiri dari dua faktor yaitu faktor ibu dan faktor janin. Faktor Ibu sebanyak 24 orang (57,2 %) dan faktor janin sebanyak 14 orang (33,3 %).

Indikasi medis yang digunakan untuk melakukan seksio sesarea, terdiri dari beberapa faktor yang dapat dilihat pada tabel 5.7 di bawah ini.

Tabel 5.7
Distribusi Kejadian Seksio Sesarea
Berdasarkan Indikasi Medis di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan
Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar Bulan Mei Tahun 2013

No	Indikasi Medis	Jumlah	Persen %
1	Kelainan letak janin	3	7,9
2	Gawat Janin	5	13,2
3	Plasenta Previa	5	13,2
4	Serotinus	1	2,6
5	Panggul sempit atau CPD	3	7,9
6	Persalinan sebelumnya dengan operasi	15	39,5
7	Faktor penghambat	4	10,5
8	KPD	1	2,6
9	Gagal drips	1	2,6
	Jumlah	38	100

Sumber : *Rekam Medik RSKDIA Siti Fatimah Makassar, 2013*

Dari tabel 5.7, tentang distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan indikasi medis di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar bulan Mei tahun 2013, nampak bahwa indikasi dilakukan seksio sesarea terbanyak adalah karena persalinan sebelumnya dengan operasi sebanyak 15 orang (39,5 %), disusul dengan gawat janin dan plasenta previa sebanyak 5 orang (13,2 %), faktor penghambat sebanyak 4 orang (10,5 %), panggul sempit atau CPD dan

kelainan letak janin sebanyak 3 orang (7,9 %), disusul oleh serotinus, KPD dan gagal drips masing-masing sebanyak 1 orang (2,6 %).

Persalinan seksio sesarea berdasarkan indikasi medis terdiri dari dua faktor yaitu faktor Ibu dan faktor Janin. Rincian dari kedua faktor tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.8 dan tabel 5.9.

Tabel 5.8
Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis dari Faktor Ibu di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar Bulan Mei Tahun 2013

No	Faktor Ibu	Jumlah	Persen %
1	Panggul sempit atau CPD	3	12,5
2	Persalinan sebelumnya dengan Operasi	15	62,5
3	Faktor penghambat	4	16,6
4	KPD	1	4,2
5	Gagal Drips	1	4,2
Jumlah		24	100

Sumber : *Rekam Medik RSKDIA Siti Fatimah Makassar, 2013*

Dari tabel 5.8, persalinan seksio sesarea berdasarkan indikasi medis dari faktor ibu, paling banyak yaitu karena persalinan sebelumnya dengan operasi sebanyak 15 orang (62,5 %), disusul dengan adanya faktor penghambat sebanyak 4 orang (16,6 %), panggul sempit atau CPD sebanyak 3 orang (12,5 %), dan yang paling sedikit yaitu KPD dan gagal drips sebanyak 1 orang (4,2 %).

Selain indikasi medis dari faktor ibu, selanjutnya dapat kita lihat tentang distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan indikasi medis dari faktor janin pada tabel 5.9 di bawah ini.

Tabel 5.9
Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Indikasi Medis dari Faktor Janin di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar Bulan Mei Tahun 2013

No	Faktor janin	Jumlah	Persen (%)
1	Kelainan letak janin	3	21,5
2	Gawat janin	5	35,7
3	Plasenta previa	5	35,7
4	Serotinus	1	7,1
Jumlah		14	100

Sumber : Rekam Medik RSKDIA Siti Fatimah Makassar, 2013

Dari tabel 5.9, persalinan seksio sesarea berdasarkan indikasi medis dari faktor janin, paling banyak terjadi yaitu gawat janin dan plasenta previa masing-masing sebanyak 5 orang (35,7%), kelainan letak janin sebanyak 3 orang (21,5 %) dan yang paling sedikit adalah serotinus sebanyak 1 orang (7,1 %).

Selanjutnya, distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan indikasi non medis yang dapat dilihat pada tabel 5.10 di bawah ini.

Tabel 5.10
Distribusi Kejadian Seksio Sesarea Berdasarkan Non Medis
di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA)
Siti Fatimah Makassar Bulan Mei Tahun 2013

Indikasi Non Medis (dari 42 persalinan seksio sesarea)	Jumlah	Persen %
	4	9,5

Sumber : Data Primer, 2013

Dari tabel 5.10, persalinan berdasarkan indikasi non medis sebanyak 4 orang (9,5 %) dari 42 persalinan seksio sesarea di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar bulan Mei tahun 2013. Persalinan seksio sesarea dilakukan atas permintaan pasien dengan alasan tidak kuat lagi menahan sakit karena telah mendapatkan his sejak beberapa jam yang lalu.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Penelitian ini untuk melihat berapa besar distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan indikasi medis, non medis dan *support system* di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar periode bulan Mei tahun 2013. Setelah melakukan pengolahan data, maka hasilnya dibahas berdasarkan variabel yang diteliti.

1. Indikasi Medis

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa dari 42 orang yang melakukan persalinan dengan seksio sesarea, indikasi medis yang paling banyak dilakukan seksio sesarea adalah persalinan sebelumnya dengan operasi yaitu sebanyak 15 orang (39,5%), disusul dengan gawat janin dan plasenta previa sebanyak 5 orang (13,2%), faktor penghambat sebanyak 4 orang (10,5 %), panggul sempit atau CPD dan kelainan letak janin masing-masing sebanyak 3 orang (7,9 %). Kemudian, paling sedikit serotinus, KPD, gagal drips masing-masing sebanyak 1 orang (2,6 %).

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa persalinan seksio sesarea berdasarkan indikasi medis paling banyak adalah karena persalinan sebelumnya dengan operasi. Hal ini disebabkan karena 15 orang (39,5 %) ini sebelumnya telah menjalani operasi yang sama pada persalinan sebelumnya. Oleh sebab itu, ibu yang pernah menjalani hal yang sama sebaiknya memberikan waktu kepada tubuh untuk memulihkan kembali fungsi-fungsi tubuh untuk mempersiapkan kembali pada persalinan selanjutnya dengan cara mempunyai jarak kehamilan yang memang telah ditentukan oleh dokter ataupun petugas kesehatan lainnya. Karena dengan adanya riwayat operasi seksio sesarea sebelumnya maka jika ingin hamil kembali sebaiknya pada 18 bulan atau 1,5 tahun setelah melahirkan sebelumnya untuk mencegah terjadinya ruptur uteri. Selain itu, persalinan sebelumnya dengan

persalinan selanjutnya sebaiknya jangan juga terlalu lama karena hal ini bisa menyebabkan jaringan parut yang telah ada memungkinkan terjadinya juga ruptur uteri.

Berdasarkan asumsi peneliti bahwa ibu yang sebelumnya pernah melakukan persalinan seksio sesarea maka dalam persalinan selanjutnya menjadi indikasi untuk dilakukannya lagi persalinan dengan jalan yang sama dengan sebelumnya yaitu operasi seksio sesarea.

Kemudian, selama bertahun-tahun uterus yang mengalami jaringan parut akibat insisi bedah seperti pada seksio sesarea merupakan kontraindikasi untuk persalinan karena risiko terjadinya ruptur uterus sangat besar. Lebih dari 90% kasus ruptur uterus berkaitan dengan riwayat seksio sesarea. Hal ini dikarenakan terpisahnya jaringan parut bekas seksio sesarea sebelumnya akibat inkoordinasi kontraksi uterus pada saat persalinan (Cunningham:2005).

Pasien dengan jaringan parut akibat seksio sesarea kemungkinan mengalami robekan jaringan parut simptomatik pada kehamilan berikutnya. Angka ruptur uteri dilaporkan terjadi pada berbagai jenis insisi uterus saat seksio sesarea, terutama pada insisi klasik. Morbiditas dan mortalitas dapat terjadi antara lain akibat rasa nyeri yang hebat, perdarahan pervaginam masif, peningkatan risiko infeksi, dan kematian janin dalam kandungan. Oleh karena itu, untuk menghindari morbiditas dan mortalitas pada ibu dengan riwayat seksio

sesarea, maka persalinan seksio sesarea merupakan pilihan yang utama saat ini (Cunningham:2005).

Selain itu, seorang wanita setelah melahirkan membutuhkan 2 sampai 3 tahun untuk memulihkan tubuhnya dan mempersiapkan dirinya pada persalinan berikutnya serta memberi kesempatan pada luka untuk sembuh dengan baik. Jarak persalinan yang pendek akan meningkatkan risiko terhadap ibu dan anak (Mochtar:1998).

Hal ini disebabkan karena bentuk dan fungsi organ reproduksi belum kembali dengan sempurna sehingga fungsinya akan terganggu apabila terjadi kehamilan dan persalinan kembali. Jarak antara dua persalinan yang terlalu dekat menyebabkan meningkatnya anemia yang dapat menyebabkan BBLR, kelahiran preterm, dan lahir mati, yang mempengaruhi proses persalinan dari faktor bayi (*passanger*).

Lalu, jarak kehamilan yang terlalu jauh berhubungan dengan bertambahnya umur ibu. Hal ini akan terjadi proses degeneratif, melemahnya kekuatan fungsi-fungsi otot uterus dan otot panggul yang menyebabkan kekuatan his tidak adekuat sehingga banyak terjadi partus lama.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Unsi (2009) yang menyatakan bila sudah menjalani bedah sesar, maka kelahiran selanjutnya juga dengan bedah sesar dikarenakan dikhawatirkan terjadinya ruptur uteri (Sadiman:2008). Penelitian yang

lain yang dilakukan oleh Pangastuti pada tahun 2003 mengatakan bahwa lebih dari 85 % persalinan seksio sesarea dilakukan sebab adanya riwayat seksio sesarea sebelumnya. Bisa saja dilakukan persalinan pervaginam pada persalinan berikutnya tapi memiliki kemungkinan 0,09 % sampai 0,8 % mengalami ruptur jaringan parut (Chapman:2006).

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Roeshadi RH tahun 2000 di RSIA Rosiva Medan bahwa proporsi ibu yang mengalami persalinan dengan seksio sesarea tertinggi 21,7 % berdasarkan faktor janin adalah letak sungsang.

Berdasarkan teori yang mengatakan bahwa jarak kehamilan sebaiknya 2 sampai 3 tahun untuk memulihkan tubuh setelah melakukan persalinan dan untuk mempersiapkan diri pada persalinan berikutnya dapat kita hubungkan dengan salah satu ayat yang terdapat dalam surah Lukman ayat 14:

Allah berfirman dalam Q.S Lukman 31/ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahannya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Kandungan dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia supaya berbakti kepada ibu-bapaknya, menanti keduanya, dan melaksanakan semua haknya. Manusia dikandung oleh ibunya dengan menderita kelemahan fisik yang makin hari semakin bertambah berat, hingga sampai berakhirnya masa nifas (setelah melahirkan). Kemudian Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada Dia atas nikmat-nikmat yang telah diterimanya. Selain itu, manusia juga diperintahkan untuk mensyukuri ibu-bapaknya, karena kedua orang tua merupakan penyebab kelahiran mereka di dunia. Orang tua juga telah menderita berbagai kesukaran dalam mengasuh dan mendidik anaknya (Said:2003).

Berdasarkan surah lukman ayat 14 juga menerangkan berapa lama seorang anak diasuh, dididik dan dibesarkan oleh kedua orangtua. Hal ini berarti, dalam Al-quran saja telah menjelaskan berapa lama sebaiknya seorang ibu merawat, mendidik dan membesarkan anaknya jika memang masih ingin mempunyai anak. Seiring dengan waktu selama 2 tahun, fungsi tubuh juga sudah kembali pulih untuk persalinan selanjutnya.

Selain indikasi karena adanya operasi sebelumnya dengan operasi seksio sesarea juga terdapat seksio sesarea karena adanya faktor penghambat yang menjadi indikasi dilakukannya seksio sesarea. oleh sebab itu, harus dilakukan seksio sesarea untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa gangguan

jalan lahir karena adanya tumor atau mioma serta penyulit lainnya yang menyebabkan persalinan terhambat maka menjadi indikasi untuk dilakukannya seksio sesarea (Kasdu:2003).

Kemudian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari 42 persalinan terdapat 3 orang diantaranya karena indikasi medis panggul sempit atau CPD. Seorang ibu yang memiliki panggul sempit merupakan indikasi mutlak untuk dilakukan seksio sesarea untuk menyelamatkan si ibu dan bayinya saat persalinan berlangsung. Hal ini sesuai dengan teori bahwa CPD merupakan keadaan yang menggambarkan ketidaksesuaian antara kepala janin dan panggul ibu sehingga janin tidak dapat keluar melalui vagina. CPD disebabkan oleh panggul sempit, janin yang besar ataupun kombinasi keduanya (Bidanthina:2012).

Selain karena adanya persalinan sebelumnya dengan operasi, CPD dan Faktor penghambat ada juga indikasi lain yang menjadi indikasi untuk dilakukan seksio sesarea yaitu gagal drips dan ketuban pecah dini (KPD). Hasil penelitian ini, terdapat 1 orang dari 42 persalinan dilakukan seksio sesarea karena gagal drips. Hal ini disebabkan karena setelah mendapat suntikan oksitosin agar otot uterus bisa berkontraksi, akan tetapi tetap saja tidak kemajuan maka indikasi untuk dilakukan seksio sesarea.

Kemudian, selain karena gagal drips seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari hasil penelitian terdapat 1 orang dilakukan seksio sesarea karena ketuban pecah dini (KPD). KPD juga menjadi indikasi untuk dilakukan seksio sesarea apabila ketuban telah pecah lebih dari 24 jam. Dalam keadaan normal, selaput ketuban pecah dalam proses persalinan. Namun, 8-10% perempuan hamil aterm akan mengalami ketuban pecah dini di mana selaput ketuban pecah sebelum persalinan. Komplikasi yang timbul akibat KPD dapat terjadi infeksi maternal ataupun neonatal, korioamnionitis, persalinan prematur, dan hipoksia. Oleh karena itu, penatalaksanaannya adalah dengan terminasi kehamilan (Sarwono:2008). Sedangkan menurut Taber Apabila KPD terjadi >24 jam dan persalinan belum terjadi, maka harus segera dilakukan persalinan seksio sesarea (Taber:2002).

Hal yang dijelaskan sebelumnya bahwa indikasi medis terdiri dari dua faktor yaitu faktor ibu dan faktor janin. Persalinan sebelumnya dengan operasi, faktor penghambat, CPD, KPD dan gagal drips adalah indikasi medis berdasarkan faktor ibu. Kemudian, indikasi medis dari faktor janin berdasarkan hasil penelitian yaitu kelainan letak janin, gawat janin, plasenta previa dan serotinus.

Lalu, Menurut Winkjosastro (2000) bahwa indikasi dari janin dilakukannya seksio sesarea diantaranya adalah gawat janin, kelainan letak janin, plasenta previa mengalami risiko kematian janin yang ditimbulkan dari kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 42 persalinan terdapat masing-masing 5 orang (13,2 %) yang disebabkan karena indikasi medis plasenta previa. Plasenta previa menyebabkan bagian terdepan janin seringkali sulit untuk memasuki pintu atas panggul. Oleh karena itu, dilakukan seksio sesarea. Seksio sesarea pada plasenta previa selain untuk mengurangi kematian bayi, juga terutama dilakukan untuk kepentingan ibu, maka seksio sesarea juga dilakukan pada plasenta previa walaupun anak sudah meninggal (Sinaga:2009).

Begitupun dengan gawat janin, harus dilakukan seksio sesarea jika janin dalam keadaan gawat janin karena tidak memungkinkan untuk persalinan pervaginam. Biasanya disebabkan adanya mekonium dalam air ketuban (Kasdu:2003). Selain karena plasenta previa dan gawat janin, dari hasil penelitian juga ada seksio sesarea yang dilakukan karena kelainan letak janin. Kelainan letak janin adalah kelainan pada janin yang tidak berputar sesuai waktu semasa janin berada di dalam kandungan sehingga pada saat persalinan janin berada pada letak lintang ataupun letak sungsang (Bobak:2005).

Kemudian, dari penelitian ini terdapat 1 orang (2,6 %) karena indikasi medis serotinus. Serotinus adalah kehamilan lewat waktu yang berarti kehamilan yang melampaui usia 292 hari atau 42 minggu dengan gejala kemungkinan komplikasinya. Penyebab terjadinya kehamilan lewat waktu adalah ketidakpastian tanggal haid terakhir atau

adanya kelainan kongenital (Sarwono:2006). Ketika seorang ibu yang diindikasikan mengalami serotinus maka dilakukanlah seksio sesarea apabila ibu belum juga mendapat tanda-tanda persalinan.

2. Non Medis

Dari hasil penelitian, terdapat persalinan seksio sesarea dengan non medis yaitu sebanyak 4 orang (9,5 %) dari 42 persalinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh silviani pada tahun 2010, didapatkan hasil 7% dari persalinan seksio sesarea tidak ada keterangan indikasi medis. Menurut penelitian Gondo dan Sugiharta di RSUD Sanglah Denpasar Bali, dilaporkan bahwa terjadi peningkatan angka kejadian persalinan seksio sesarea on request dari 2,5% pada tahun 2001 menjadi 5% pada tahun 2006. Selain itu, penelitian Gondo (2006) yang melaporkan persentase seksio sesarea dengan indikasi medis sebesar 65,18%, sedangkan yang bukan dengan indikasi medis sebesar 34,82%. Angka ini merupakan bukti konkret bahwa saat ini seksio sesarea bukan lagi hanya indikasi medis, tetapi banyak faktor bukan medis yang dapat mempengaruhi. Pelaksanaan tindakan seksio sesarea dengan indikasi bukan medis menyebabkan peningkatan angka kejadian persalinan seksio sesarea.

Dengan melihat hasil yang diperoleh dari penelitian ini maka sekarang ini seksio sesarea sudah merupakan alternatif yang dipilih oleh ibu yang akan melahirkan, walaupun ibu hamil tersebut masih dapat melahirkan dengan normal. Seksio sesarea ini tidaklah dianjurkan bagi

ibu yang masih dapat melahirkan secara normal. Alasan ibu hamil memilih seksio sesarea daripada melahirkan secara normal agar terhindar dari rasa sakit sewaktu persalinan. Alasan ini sebenarnya tidaklah tepat. Melahirkan secara normal lebih ringan resikonya dibandingkan dengan seksio sesarea (Handoko:2006).

Menurut Kasdu (2003) banyak ibu yang beranggapan salah bahwa dengan operasi, ibu tidak akan mengalami rasa sakit seperti halnya pada persalinan alami. Hal ini terjadi karena kekhawatiran atau kecemasan menghadapi rasa sakit yang akan terjadi pada persalinan alami. Akibatnya untuk menghilangkan itu semua mereka berpikir melahirkan dengan cara operasi.

Selain itu, dalam penelitian ini juga didapatkan hasil 9,5 % dari persalinan seksio sesarea dengan permintaan pasien sendiri. Saat ini seksio sesarea telah menjadi *trend* di masyarakat. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persalinan seksio sesarea belum bisa dikatakan sebagai *trend* karena hanya sebagian kecil persalinan seksio sesarea dilakukan karena permintaan pasien sendiri. Akan tetapi, Ibu yang meminta untuk dilakukannya seksio sesarea adalah ibu yang memang sudah mempunyai pendidikan yang cukup sehingga pasien sudah mandiri dalam menentukan pilihannya dengan cara apa ia akan melahirkan tanpa bergantung lagi pada keputusan dokter ataupun keluarga lainnya.

C. Support System

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persalinan seksio sesarea di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar bulan Mei tahun 2013, 0 % dari 42 persalinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarmana pada tahun 2004, bahwa dilakukannya persalinan seksio sesarea adalah karena adanya anjuran dari sumai dengan alasan lebih aman dan praktis tidak perlu menunggu waktu lebih lama menanti kelahiran bayi dan kekhawatiran melihat ibu menjerit kesakitan serta adanya rasa khawatir terjadi sesuatu pada bayi jika melahirkan secara spontan. Penelitian berbeda di Brazil bahwa dokter melakukan tindakan seksio sesarea karena adanya tekanan dan dorongan dari suami dan keluarga.

Penelitian diatas tidak sejalan dengan hasil yang didapatkan peneliti. Sebab, dari keseluruhan pasien masih didominasi oleh karena adanya indikasi medis dan hanya sebagian kecil yang memang sudah bisa untuk meminta sendiri dilakukannya seksio sesarea dengan alasan tidak tahan lagi menahan rasa sakit. Sedangkan untuk seksio sesarea yang dilakukan karena adanya dukungan dari suami ataupun keluarga lainnya masih belum ditemukan dalam penelitian karena masih banyak pasien yang memang masih mengikuti instruksi dari dokter.

Hal ini berarti persalinan yang dilakukan oleh pasien masih berdasarkan indikasi medis dan juga karena permintaan pasien sendiri. Jadi, dari hasil penelitian ini suami ataupun keluarga belum dapat menjadi alasan untuk pemilihan persalinan.



BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan indikasi medis sebanyak 38 orang (90,5%) dari 42 orang. Indikasi medis terdiri dari dua faktor yaitu faktor ibu dan faktor janin. Indikasi medis dari faktor ibu sebanyak 24 orang (57,2 %) dan faktor janin sebanyak 14 orang (33,3 %).
2. Distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan non medis sebanyak 4 orang (9,5 %) dari 42 persalinan.
3. Sedangkan, distribusi kejadian seksio sesarea berdasarkan *support system* sebanyak 0 (0 %).

B. Saran

1. Bagi Ibu

Keputusan untuk melakukan persalinan seksio sesarea hendaknya didasarkan pada indikasi medis. Hal ini guna menghindari komplikasi persalinan dan risiko seksio sesarea pada persalinan berikutnya di mana kemungkinan komplikasi persalinannya lebih besar. Apabila seorang ibu menginginkan tindakan seksio sesarea untuk melahirkan bayinya, hendaknya dilakukan konseling dengan dokter kandungan agar dapat mengambil keputusan secara bijak.

2. Bagi Rumah Sakit

Meningkatkan pelayanan obstetrik yang memadai, sehingga dapat menjadi rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan terbaik bagi pasien-pasien persalinan dengan penyulit yang memerlukan tindakan seksio sesarea.

3. Bagi Masyarakat

Sebelum melakukan persalinan, hendaknya melakukan konsultasi dulu dengan dokter ataupun petugas kesehatan agar jika persalinan nantinya memang karena keputusan itu yang terbaik untuk si ibu dan si bayinya kelak dengan memperhatikan apa dampak jika seseorang melakukan persalinan seksio sesarea.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Bidanthina. 2012. *Chepalopelvic disproportion*.

<http://bidanthina.blogspot.com/2012/03/chepalopelvic-disproportion-cpd.html>. diakses tanggal 22 maret 2013

Al-Qardhawi. 2010. *Fatawa Musora*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i

Al-Qathani, Sa'id bin 'Ali bin Wahf. 2005. *Syarah Asma'-Ul Husna*. Jakarta:Pustaka Imam Syafi'i

Anita. 2009. http://www.idi.com/info_seksio20%sesarea

Bagian Obstetri & Ginekologi FK Unpad, 2007. *Obstetri Operatif*. El Star of set, Bandung

Bahreisy, Salim & Said Bahreisy. 2003. *Tafsir Ibnu Katsier*. Jilid 6. Kuala Lumpur:Victoria Agencie

Bobak. 2005. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Cetakan I. Jakarta:EGC

Chandranita, Ida Ayu. 2009. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: EGC.

Chapman. 2006. *Persalinan Pervainam*. Jakarta:PT.Buana Ilmu Populer

Cunningham FG,dkk. 2005. *Obstetri William*. Edisi XXI. Vol 2. Jakarta: EGC

Cunningham, F.G. 2006. *Obstetri Williams*. Editor bahasa Indonesia:EGC dr.profitasari, dkk. Alih bahasa: dr. Andry Hartanto, dr. Y. Joko Sayono & dr. Barhm U. Vol.3. Jakarta: EGC

Departemen Agama RI. 2008. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang:PT Karya Toha Putra

Gondo KH. dan Sugiharta K. 2006. *Profil Operasi Seksio Sesarea di SMF Obstetri & Ginekologi RSUP Sanglah Denpasar, Bali Tahun 2001 dan 2006*. CDK 175/ vol.37 no.2/ Maret-April 2010. Diakses 25 Maret 2013

Handoko. 2006. *Sembilan Bulan yang Menakjubkan, Seri Ayah Bunda dan bayi*. Jakarta : Penerbit Gaya Favorit

- Himapid.2009.seputar-seksio-caesar.html.Posted
<http://himapid.blogspot.com/2009/08/August,2009>
- Johnson, Ruth.2004. *Buku Ajar Praktek Kebidanan*. Cetakan I. Jakarta:EGC
- Kasdu, D. 2003. *Operasi Caesar Masalah dan Solusinya*. Jakarta:Puspa Sehat
- Lestari. 2009. Bedah Besar.<http://id.wikipedia.com>.Posted August 2009
- Manuaba, F.G. 1998. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB*. Ed.2. Jakarta:EGC
- Maulana, M.2008. *Penyakit Kehamilan dan Pengobatannya*. Jogjakarta:Katahati
- Mochtar, R.1998. *Sinopsis Obstetri*. Jilid II. Jakarta: EGC
- Mochtar, R.2004. *Sinopsis Obstetri*. Jilid IV. Jakarta: EGC
- Ningri. 2009. Askep seksio Panggul Sempit.<http://rusari.com>.Posted September 2009
- Nursalam. 2003. *Manajemen Keperawatan*. Cetakan kedua. Jakarta:Salemba Medika
- Prawiroharjo, Sarwono. 2006. *Ilmu Kebidanan*. Edisi III. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo
- Prawiroharjo, Sarwono. 2008. *Ilmu Kebidanan*. Edisi IV. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo
- Rabe, T. 2002. *Buku Saku Ilmu Kebidanan*. Jakarta:Hipokrates
- Rasyid. 2009. <http://persalinanseksio.com//2011/09/10>. Diakses tanggal 2 Februari 2013
- Sadiman, M.Ridwan. 2009. *Jurnal Kesehatan Faktor–Faktor yang Berhubungan dengan Persalinan Seksio Caersaria di RSUD Ahmad Yani Metro Tahun 2008*.
- Saifuddin, AB. 2001. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Edisi I. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo
- Salfariani, intan. 2009. *Jurnal Faktor Pemilihan Persalinan Sectio Caesarea Tanpa Indikasi Medis Di Rsu Bunda Thamrin Medan*.
<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jkk/article/view/94/84>

- Sarmana. 2004. FKM USU. *Determinan Non Medis dalam Permintaan Persalinan Sectio Caesarea di RS St. Elisabeth Medan.*
- Sinaga, Marisid Ezra. 2009. *Karakteristik Ibu yang mengalami persalinan seksio sesarea yang dirawat inap di rumah sakit umum daerah sidikalang tahun 2007. bersalin*
- Sudidjo, Sastroasmoro. 2002. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Klinik.* Jakarta:CV.Agung Seto
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Bandung:Alfabeta
- Taber, B. 2002. *Kapita Selekta Kedaruratan Obsetri dan Ginekologi (Alih bahasa Supriyadi T dan Gunawan J).* Jakarta: EGC
- Whalley, J. 2005. *Panduan Cepat Bagi Ibu Hamil dan Bersalin.* Cetakan I:Jakarta:PT Bhuana Ilmu Populer
- Whalley, J. 2008. *Panduan Cepat Bagi Ibu Hamil dan Bersalin.* Cetakan II:Jakarta:PT Bhuana Ilmu Populer
- Winkjosastro. 2002. *Ilmu Kebidanan.* Jakarta :yayasan bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Wirakusumah, F. 2005. *Persalinan Sesar.* Suatu Telaah Global Indonesia. *Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia* Vol. 44, No. 7, July

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rosellah, lahir pada tanggal 2 Mei 1991 di Safirma Estate, Malaysia. Anak sulung dari 2 bersaudara yang merupakan buah hati dari pasangan Muh.Alwi dengan Jumiati. penulis mulai mengenyam dunia pendidikan di SD Inpres 12/79 Tassipi Bone dan tamat pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Ajangale dan tamat pada tahun 2006.

Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMAN Unggulan Luwu Utara dan tamat pada tahun 2009. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di bangku kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di kota Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan menyelesaikan studinya pada tahun 2013 .

Setelah menjalani dan lulus di kampus hijau ini, penulis berharap semoga dapat menjadi perawat yang profesional dan menerapkan ilmunya di lingkungan masyarakat.