

FORMULASI, UJI STABILITAS FISIK KRIM TABIR SURYA
EKSTRAK ETANOL KULIT BATANG KAYU JAWA
(Lannea cormendalica (Houtt.) Merr.).



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR AZIZAH
NIM: 70100118061

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Azizah
NIM : 70100118061
Tempat/Tgl. Lahir : Puurau, 03 April 2001
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Formulasi, Uji Stabilitas Fisik Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Romangpolong, Februari 2024

Penyusun

Nur Azizah

NIM : 70100118061

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Formulasi, Uji Stabilitas Fisik Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Kulit Batang Kayu Jawa (Lannea cormendalica (houtt.)merr.)*" yang disusun oleh Nur Azizah, NIM: 70100118061, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 28 Februari 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 28 Februari 2024 M
18 Syaban 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati Muchsin, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: apt. Khaerani, S. Farm., M. Farm. Klin	(.....)
Munaqisy I	: apt. Dra. Hj. Faridha Yenni Nonci, M. Si	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. Muh. Kurdi, M. Hi	(.....)
Pembimbing I	: Dr. apt. Mukhriani, S. Si., M. Si	(.....)
Pembimbing II	: apt. Nur Azizah Syahrana, S. Farm., M. Farm	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati Muchsin, Sp. OG., M. Kes
NIP. 198106212006042002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih atas segala limpah kasih, karunia dan kehendak-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Formulasi, Uji Stabilitas Fisik Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea Cormendalica* (Houtt.) Merr.) dapat diselesaikan dengan baik. terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, do’a dan bimbingan dari berbagai pihak.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Hana dan Ayahanda (alm) Haris yang tak henti-hentinya memberi doa serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Dr. H. Andi Aderus, Lc., M. A. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Makassar.

5. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Dr. dr. Dewi Setiawan Muchsin, Sp. OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S. KM., MARS. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Dr. Fatmawati, S.Kep., Ners., M.Kep. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Apt. Muh Rusdi, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Apt. Khaerani, S.farm., M.Farm. Klin. Selaku sekertaris Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
12. Dr. Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing dan mengarahkan peneliti dengan tulus dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi.

14. Apt. Dra. Hj. Faridha Yenni Nonci., M.Si selaku Penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan tuntunan dan arahan yang baik dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
15. Drs. H. Muh Kurdi., M. Hi selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan arahan yang baik dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
16. Bapak dan Ibu dosen yang tulus dan ikhlas dalam membagi seluruh ilmunya, semoga Allah SWT. membalas jasa-jasa beliau. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang sediaan Farmasi.

Samata, Februari 2024

Penyusun

Nur Azizah

NIM : 70100118061

DAFTAR ISI


	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Uraian Tumbuhan.....	8
B. Antioksidan	9
C. Kulit	12
D. Anatomi Kulit	15
E. Tabir Surya.....	20
F. Krim.....	29
G. Ekstraksi.....	34
H. Spektrofotometri UV-Vis.....	37
I. Tinjauan Islam.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Sampel	45
D. Instrumen Penelitian.....	45
E. Cara Kerja	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73
RIWAYAT HIDUP PENELITI	103



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rancangan Formula Sediaan Krim Tabir Surya	47
Tabel 2. Hasil Etanol Kulit Batang Kayu jawa (<i>lannea coromandelica</i>)	53
Tabel 3. Hasil Skrining Fitokimia Kulit Batang Kayu Jawa.....	53
Tabel 4. Nilai SPF Krim 0%	54
Tabel 5. Nilai SPF Krim 0,25%	54
Tabel 6. Nilai SPF Krim 0,5%	54
Tabel 7. Nilai SPF Krim 1%	55
Tabel 8. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 0%.....	55
Tabel 9. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0%.....	56
Tabel 10. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 0,25%.....	56
Tabel 11. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,25%.....	56
Tabel 12. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 0,5%.....	57
Tabel 13. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,5%.....	57
Tabel 14. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 1%.....	58
Tabel 15. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 1%.....	58
Tabel 16. Hasil Pengujian Organoleptik krim.....	58
Tabel 17. Hasil Pengujian Homogenitas krim	59
Tabel 18. Hasil Pengujian pH krim.....	59
Tabel 19. Hasil Pengujian daya sebar krim.....	59
Tabel 20. Hasil Pengujian viskositas krim.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanaman Kulit Batang Kayu Jawa (Rahmadani, 2015)	8
Gambar 2. Proses Penyerapan Sinar Matahari ke Kulit (Isfardiyana & Safitri, 2014).....	15
Gambar 3. Lapisan-lapisan Epidermis Kulit Tebal (Kalangi, 2013).....	16
Gambar 4. Struktur Kulit (Kalangi, 2013).....	17
Gambar 5. Kurva Pengujian SPF Krim 0%	87
Gambar 6. Nilai Absorbansi Krim 0%	87
Gambar 7. Kurva Pengujian SPF Krim 0,25	88
Gambar 8. Nilai Absorbansi Krim 0,25%	88
Gambar 9. Kurva Pengujian SPF Krim 0,5%	89
Gambar 10. Nilai Absorbansi Krim 0,5%	89
Gambar 11. Kurva Pengujian SPF Krim 1%	90
Gambar 12. Nilai Absorbansi Krim 1 %	90
Gambar 13. Kurva Persen Transmisi Eritema 0%	91
Gambar 14. Persen Transmisi Eritema 0%	91
Gambar 15. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 0,25%	92
Gambar 16. Persen Transmisi Eritema Krim 0,25%	92
Gambar 17. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 0,5%	93
Gambar 18. Persen Transmisi Eritema Krim 0,5%	93
Gambar 19. Kurva Persen Eritema Krim 1%	94
Gambar 20. Persen Transmisi Eritema Krim 1%	94
Gambar 21. Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0%	95
Gambar 22. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0%	95
Gambar 23. Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,25%	96
Gambar 24. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,25%	96
Gambar 25. Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,5%	97
Gambar 26. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,5%	97
Gambar 27. Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 1%	98
Gambar 28. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 1%	98
Gambar 29. Hasil Uji Organoleptik Krim (0%, 0,25%, 0,5%, 1 %)	99
Gambar 30. Hasil Uji Homogenitas Krim Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa	99
Gambar 31. Hasil Uji pH Krim Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa	100
Gambar 32. Hasil Uji pH Krim Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa	100
Gambar 33. Hasil Uji pH Krim Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa	101
Gambar 34. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit Batang Kayu Jawa	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian	73
Lampiran 2. Skema Ekstraksi.....	74
Lampiran 3. Skema Prosedur Pembuatan Krim	75
Lampiran 4. Skema Pengujian Sediaan Krim.....	76
Lampiran 5. Skema Uji Potensi Tabir Surya	79
Lampiran 6. Skema Uji Fitokimia	80
Lampiran 7. Perhitungan Kadar 4000 ppm	82
Lampiran 8. Perhitungan Nilai SPF Krim	82
Lampiran 9. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0%	83
Lampiran 10. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,25%	84
Lampiran 11. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,5%	85
Lampiran 12. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim 1%.....	86
Lampiran 13. Hasil Uji SPF Krim 0%.....	87
Lampiran 14. Hasil Uji SPF Krim 0,25%.....	88
Lampiran 15. Hasil Uji SPF Krim 0,5%.....	89
Lampiran 16. Hasil Uji SPF Krim 1%.....	90
Lampiran 17. Hasil Uji Eritema Krim 0%	91
Lampiran 18. Hasil Uji Eritema Krim 0,25%	92
Lampiran 19. Hasil Uji Eritema Krim 0,5%	93
Lampiran 20. Hasil Uji Eritema Krim 1%	94
Lampiran 21. Hasil Uji Pigmentasi Krim 0%	95
Lampiran 22. Hasil Uji Pigmentasi Krim 0,25%	96
Lampiran 23. Hasil Uji Pigmentasi Krim 0,5%	97
Lampiran 24. Hasil Uji Pigmentasi Krim 1%	98
Lampiran 25. Hasil Evaluasi Uji Organoleptik Krim	99
Lampiran 26. Hasil Evaluasi Uji Homogenitas Krim.....	99
Lampiran 27. Hasil Evaluasi Uji pH Krim	100
Lampiran 28. Hasil Evaluasi Uji Daya Sebar Krim.....	100
Lampiran 29. Hasil Evaluasi Uji Viskositas Krim	101
Lampiran 30. Hasil Pengujian Fitokimia.....	102

ABSTRAK

Nama : Nur Azizah
NIM : 70100118061
Judul Skripsi : Formulasi, dan Uji Stabilitas Fisik Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.).

Telah dilakukan penelitian tentang formulasi dan penentuan potensi tabir surya dari krim ekstrak kulit batang kayu jawa (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak kulit batang kayu jawa yang efektif dalam formulasi sediaan krim tabir surya, mengetahui karakteristik fisik sediaan krim tabir surya, serta potensi kulit batang kayu jawa sebagai tabir surya terkait nilai SPF, persen transmisi eritema, dan persen transmisi pigmentasi. Krim dibuat dalam 4 formula dengan variasi konsentrasi ekstrak kulit batang kayu jawa 0% (F0), 0,25% (F1), 0,5% (F2), 1% (F3). Parameter stabilitas adalah pengamatan organoleptis, homogenitas, daya sebar, pH, dan viskositas. Kemudian diukur efektivitas tabir surya dari sediaan berdasarkan nilai SPF, persen transmisi eritema, serta persen transmisi pigmentasi. Hasil menunjukkan bahwa ketiga krim memenuhi persyaratan evaluasi fisik sediaan krim yang baik, serta memiliki aktivitas tabir surya yakni F0 dengan nilai SPF 13,700, F1 dengan nilai SPF 27,774 memberi efek proteksi maksimal, F2 dengan nilai SPF 32,828 memiliki efek proteksi maksimal, serta F3 dengan nilai SPF 35,563 memberi efek proteksi ultra. Ketiga krim memiliki nilai persen eritema <1 maka digolongkan dalam kategori sunblock. Sehingga dapat disimpulkan bahwa F0, F1, F2, F3 memiliki aktivitas tabir surya.

Kata Kunci : (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.), Tabir Surya, Transmisi Eritema, Transmisi Pigmentasi, Spektrofotometer UV-Vis

ABSTRACT

Nama : Nur Azizah
NIM : 70100118061
Judul Skripsi : Formulation and Physical Stability Test of Sunscreen Cream with Ethanol Extract of Javanese Bark (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.).

Research has been carried out on the formulation and determination of the sunscreen potential of Javanese bark extract cream (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.). This research aims to determine the effective concentration of Javanese tree bark extract in the formulation of sunscreen cream preparations, to determine the physical characteristics of sunscreen cream preparations, as well as the potential of Javanese tree bark as a sunscreen related to the SPF value, percent transmission of erythema, and percent transmission of pigmentation. The cream is made in 4 formulas with varying concentrations of Javanese bark extract, 0% (F0), 0.25% (F1), 0.5% (F2), 1% (F3). Stability parameters are organoleptic observations, homogeneity, spreadability, pH, and viscosity. Then the sunscreen effectiveness of the preparation was measured based on the SPF value, percent transmission of erythema, and percent transmission of pigmentation. The results show that the three creams meet the physical evaluation requirements for good cream preparations, and have sunscreen activity, namely F0 with an SPF value of 13,700, F1 with an SPF value of 27,774 providing maximum protective effect, F2 with an SPF value of 32,828 having maximum protective effect, and F3 with a value of SPF 35,563 provides ultra protective effects. The three creams have an erythema percent value <1 so they are classified in the sunblock category. So it can be concluded that F0, F1, F2, F3 have sunscreen activity.

Keywords : (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.), Sunscreen, Erythema Transmission, Pigmentation Transmission, UV-Vis Spectrophotometer

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki paparan sinar matahari yang cukup tinggi. Sinar matahari selain sebagai sumber cahaya alami juga dapat bermanfaat untuk menyehatkan kulit dan tulang. Namun apabila jumlah paparan sinar matahari berlebih dapat mengakibatkan kerusakan kulit seperti kulit terbakar, eritema, hiperplasia, pengerutan kulit, penuaan kulit, serta kanker kulit (Pramiastuti 2019).

Paparan sinar matahari yang berlebihan atau dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan efek negatif pada kulit, baik yang bersifat akut (cepat) maupun kronik (lama). Penggunaan tabir surya dapat menyerap, menghamburkan dan memantulkan radiasi sinar UV di area tubuh yang sering terpapar (Minerva 2019).

Tabir surya merupakan suatu sediaan yang secara fisik atau kimia dapat menghambat penetrasi sinar UV ke dalam kulit. Penggunaan tabir surya terus bertambah sejak dekade terakhir oleh karena kesadaran akan bahaya sinar ultraviolet yang ditimbulkan. Selain tabir surya dari bahan sintetis, tabir surya alami juga dapat diperoleh dari bahan alam. Mambro dan Fonseca (2005), menyatakan bahwa diantara berbagai macam senyawa fenolik, flavonoid diduga komponen yang dapat menangkal radikal induksi ultraviolet (UV) dan memberikan efek perlindungan terhadap radiasi UV dengan menyerap sinar UV. Tabir surya dapat menyerap sedikitnya 85% sinar matahari pada panjang gelombang 290-320 nm untuk UV-B tetapi dapat meneruskan sinar pada panjang

gelombang lebih dari 320 nm untuk UV-A. Oleh karena itu dibutuhkan tabir surya yang dapat melindungi kulit dari bahaya radiasi sinar matahari (Nasution, Yeti, and Ardhiyati 2021).

Flavonoid, tanin, antarquinon, sinamat dan lain-lain telah dilaporkan memiliki kemampuan sebagai perlindungan terhadap sinar UV. Senyawa fenolik khususnya golongan flavonoid dan tanin mempunyai potensi tabir surya karena adanya gugus kromofor (ikatan rangkap terkonjugasi) yang mampu menyerap sinar UV, baik UV A maupun UV B sehingga mengurangi intensitasnya pada kulit (Ismail et al. 2014)

Tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica*) merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang masih sering digunakan masyarakat karena memiliki berbagai khasiat antara lain digunakan untuk mengobati luka dalam maupun luar seperti diare, mual dan muntah (Muhammad Tahir and Winda, 2023). Berdasarkan skrining fitokimia kulit batang tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica*) dilaporkan mengandung senyawa golongan karbohidrat, steroid, alkaloid, terpenoid, saponin, tannin, dan flavonoid (Yumita et al. 2019).

Adanya kandungan flavonoid dan tanin dari ekstrak kulit batang kayu jawa dapat dijadikan acuan untuk menetapkan potensi tabir suryanya, karena senyawa flavonoid dan tanin memiliki gugus benzen aromatis terkonjugasi yang mampu menyerap sinar UV-A atau UV-B yang dapat menyebabkan efek buruk terhadap kulit.

Sediaan kosmetik yang berbahan dasar ekstrak dari tanaman yang memiliki fungsi sebagai tabir surya sangat diminati oleh masyarakat karena

adanya kekhawatiran akan efek samping penggunaan kosmetik berbahan dasar senyawa aktif tabir surya sintetik (Nur Saadah Daud., 2018). Saat ini banyak beredar sediaan tabir surya di masyarakat dengan berbagai bentuk sediaan. Salah satunya adalah bentuk sediaan krim. Krim merupakan salah satu bentuk sediaan kosmetik yang banyak diminati masyarakat. Sifat fisik dan stabilitas sediaan topikal akan menentukan efektivitas sediaan semipadat saat dioleskan ke kulit. Di samping itu, sediaan krim ini merupakan sediaan yang mudah dicuci, bersifat tidak lengket, memberikan efek melembabkan kulit, serta memiliki kemampuan penyebaran yang baik (Wiranto, 2021).

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kosmetik yang aman dan berasal dari bahan alami menjadi salah satu pertimbangan untuk memformulasi suatu sediaan krim tabir surya yang diekstraksi dari tanaman untuk memformulasi dan mengetahui potensi krim tabir surya dari ekstrak kulit batang kayu jawa sehingga diharapkan dengan penelitian ini dapat meningkatkan efektifitas dan aplikasi modern pemanfaatan tanaman dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bidang kosmetika pelindung atau tabir surya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana stabilitas fisik sediaan krim tabir surya ekstrak etanol kulit batang kayu jawa?
2. Berapa konsentrasi ekstrak etanol kulit batang kayu jawa yang efektif sebagai tabir surya setelah dilakukan uji spf?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Formulasi

Formulasi krim adalah sediaan setengah padat dari sampel ekstrak kulit batang kayu jawa dengan variasi konsentrasi ekstrak terdiri dari fase minyak dan air.

b. Tabir surya

Tabir surya merupakan salah satu kosmetik skincare yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari dari krim ekstrak kulit batang kayu jawa.

c. Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan kental kulit batang kayu jawa (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.) yang diperoleh dengan mengekstraksi bahan aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut dan massa atau serbuk yang tersisadi perlakuan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan

d. Kayu Jawa

Kayu tammate (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.) adalah tumbuhan dari keluarga Anacardiaceae, yang merupakan salah satu tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia khususnya di Sulawesi

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah formulasi dan

uji potensi sediaan krim tabir surya ekstrak etanol kulit batang kayu
jawa (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.)

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian oleh Erwin Prawirorihardjo (2015) dengan judul “ Uji Aktivitas Antioksidan dan Uji Toksisitas Ekstrak Etanol 70% dan Ekstrak Air Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*)” untuk menguji aktivitas antioksidan dan toksisitas ekstrak etanol 70% dan ekstrak air kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*). Ekstrak etanol 70% diperoleh melalui metode maserasi, sedangkan ekstrak air diperoleh melalui metode dekokta. Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH (2,2 Difenil-1 Pikrihidrazil) dengan vitamin C sebagai kontrol positif. Hasil uji aktivitas antioksidan yang dilakukan menunjukkan nilai AAI (Antioxidant activity index) ekstrak etanol 70%, ekstrak air, dan vitamin C berturut-turut 5,5679 (sangakuat); 0,0667 (lemah); dan 9,6254 (sangat kuat).
2. Penelitian oleh Rao et al tahun 2014 dengan judul “Hepatoprotective and antioxidant activity of *Lannea coromandelica* Linn. on thioacetamide induced hepatotoxicity in rats” didapatkan kandungan senyawa aktif flavan-3-ol dari golongan fenolik, terpenoid dan alkaloid sebagai antikanker hati (HepG2) secara in vivo dengan mekanisme kerja menghambat pertumbuhan tumor berdasarkan hasil penelitian memiliki nilai IC₅₀ (83,28 ± 2,12) g/mL, untuk aktivitas penangkal radikal DPPH. Hasil menyimpulkan bahwa ekstrak etanol dan kombinasi air dan ekstrak kulit kayu alkohol *Lannea coromandelica* menunjukkan potensi

hepatoprotektif dan antioksidan.

3. Pada Jurnal Antioxidant and Analgesic Activities of *Lannea coromandelica* Linn. Bark Extract (B. Alam et al., 2012) di dapatkan kandungan senyawa aktif kuersetin dari golongan flavonoid sebagai antikanker hati (HepG2) secara in vivo dengan mekanisme kerja kuersetin menghambat sel proliferasi dan menginduksi apoptosis pada beberapa jenis kanker sel MCF-7. Kuersetin dari golongan flavonoid menunjukkan antioksidan penting aktivitas, tidak hanya dengan menghambat pembentukan ROS, tetapi juga dengan mempengaruhi aktivitas berbagai macam enzim detoksifikasi, seperti: sebagai siklooksigenase, lipoksigenase dan oksida nitrat yang dapat diinduksi sintase.

E. Tujuan Penelitian

1. Menentukan stabilitas fisik sediaan krim tabir surya dari ekstrak etanol kulit batang kayu jawa
2. Menentukan konsentrasi ekstrak etanol kulit batang jayu jawa yang efektif sebagai tabir surya setelah dilakukan uji spf

F. Manfaat Penelitian

1. Diperoleh krim ekstrak etanol kulit batang kayu jawa yang berpotensi sebagai tabir surya
2. Diperoleh data ilmiah konsentrasi ekstrak kulit batang kayu jawa dalam sediaan yang dapat memberikan potensi tabir surya yang baik dan dapat menunjang pengembangan dan pemanfaatannya, khususnya dalam ilmu farmasi

3. Meningkatkan nilai ekonomi ekstrak etanol kulit batang kayu jawa sebagai bahan alami dari produk kecantikan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tumbuhan



Gambar 1. Tanaman Kulit Batang Kayu Jawa (Rahmadani, 2015)

1. **Klasifikasi** (J. N. Gunjal, 2019)

Regnum : Plantae

Phylum : Magnoliophyta

Class : Spermatophyta

Subclass : Rosids

Order : Sapindales

Family : Anacardiaceae

Genus : Lannea

Species : *Lannea coromandelica* Houtt.Merr.

2. Nama Daerah

Tanaman *lannea coromandelica* ini memiliki beragam nama daerah yakni dalam bahasa Jawa dinamakan kayu jaran, dalam bahasa Makassar dinamakan tammate, dan dalam bahasa Bugisnya dinamakan aju jawa (J. N. Gunjal, 2019).

3. Morfologi

Tanaman kayu tammate merupakan tanaman habitus, biasanya tinggi pohonnya mencapai 6-8 meter, berakar tunggang, batang bercabang. Daun majemuk gasal (ganjil), bentuk anak daun bulat memanjang, ada bekas ibu tangkai daun pada cabang/ ranting, pertulangan daun menyirip. Berwarna hijau pucat. Di lingkungan yang lebih lembab pohon ini tumbuh lebih besar hingga menjadi 20 meter. Di Sri Lanka *Lannea coromandelica* sering tumbuh di singkapan batu atau inselbergs (Nurzakinah, 2021)

4. Uraian Senyawa Kimia

Kandungan senyawa yang terdapat di dalam tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica*) yaitu tannin, saponin, flavonoid, alkaloid, quinon, glikosida, terpenoid, fenol, komarin, steroid, plobatanins, antarquinon, glikosida jantung dan lain sebagainya (Nurzakinah, 2021).

B. Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menetralkan kereaktifan radikal bebas. Terdapat beberapa senyawa sintesis eksogen yang dapat digunakan

sebagai antioksidan adalah vitamin E dan BHA (Butylated Hydroxylanisole). Radikal bebas merupakan suatu atom atau molekul yang kehilangan elektron pada orbit terluarnya. Radikal bebas bisa dihasilkan dari respirasi aerobik dan berbagai proses metabolisme lainnya dalam tubuh . Jika kadar dari radikal bebas dalam tubuh terlalu tinggi, maka dapat menurunkan fungsi sel dan menginduksi kematian sel (Wandita and Musfiroh 2018).

Sumber antioksidan alami banyak terdapat dalam bahan pangan misalnya buah-buahan, rempah-rempah, teh, coklat, dedaunan, biji-bijian, sayur-sayuran, enzim dan protein. Pada umumnya aktivitas antioksidan disebabkan karena tumbuhan tersebut mengandung senyawa metabolit sekunder/senyawa aktif, diantaranya adalah flavonoid, fenolik, tannin, antosianin (Rahmi 2017).

Senyawa antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralkan radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Senyawa ini memiliki struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas tanpa terganggu sama sekali fungsinya dan dapat memutus reaksi berantai dari radikal bebas (Pratiwi, Yusran, and Islawati 2023).





Antioksidan diperlukan untuk mencegah stres oksidatif. Stres oksidatif adalah kondisi ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas yang ada dengan jumlah antioksidan di dalam tubuh. Radikal bebas merupakan senyawa yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan dalam orbitalnya, sehingga bersifat sangat reaktif dan mampu mengoksidasi molekul di sekitarnya (lipid, protein, DNA, dan karbohidrat). Antioksidan bersifat sangat mudah

dioksidasi, sehingga radikal bebas akan mengoksidasi antioksidan dan melindungi molekul lain dalam sel dari kerusakan akibat oksidasi oleh radikal bebas atau oksigen reaktif (Werdhawati 2014).

Dikutip dari Rahmi (2017) Ada tiga macam mekanisme kerja antioksidan pada radikal bebas, yaitu:

- a) Antioksidan primer yang mampu mengurangi dismutase (SOD), glutathione peroksidase, dan katalase stabil. Contohnya adalah superoksida yang dapat mengubah radikal superoksida menjadi molekul mengubahnya menjadi produk yang lebih.
- b) Antioksidan air pembentukan radikal bebas baru dengan cara memutus reaksi berantai dan sekunder berperan mengikat radikal bebas dan mencegah amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah vitamin A (betakaroten), vitamin C, vitamin E, dan senyawa fitokimia.
- c) Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, seperti memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas.

Reaksi berantai pada radikal bebas (tanpa ada antioksidan) terdiri dari tiga tahap, yaitu:



Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal bebas (R^*) yang

sangat reaktif, karena (RH) melepaskan satu atom hidrogen, hal ini dapat disebabkan adanya cahaya, oksigen atau panas. Pada tahap propagasi, radikal (R^*) akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi (ROO^*). Radikal peroksi selanjutnya akan menyerang RH (misalnya pada asam lemak) menghasilkan hidroperoksida dan radikal baru. Hidrogen peroksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek seperti aldehida dan keton (Inggrid & Santoso, 2014).

C. Kulit

Kulit mempunyai sistem perlindungan alami yaitu lapisan melanin. Semakin coklat warna kulit maka semakin tebal lapisan melanin pada kulit, sehingga memberi perlindungan lebih banyak bagi kulit. Oleh karena itu, semakin putih kulit seseorang semakin rentan terhadap radiasi ultraviolet (UV). Mengingat bahaya dari radiasi ultraviolet (UV) matahari maka kulit perlu dilindungi meski tubuh telah menyediakan sistem perlindungan alami.

Berikut beberapa cara untuk melindungi kulit dari bahaya sinar matahari serta mengurangi risiko terkena kanker kulit (Perempuan, 2008).

- a. Batasi waktu terkena sinar matahari secara langsung
- b. Sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan, gunakan tabir surya atau sunblock
- c. Kenakan pakaian yang melindungi kulit seperti topi yang lebar, kaca mata hitam dengan lensa pelindung anti UV, celana panjang, pakai lengan panjang, ataupun jaket.

Indonesia merupakan negara tropis yang penuh dengan limpahan sinar matahari sepanjang tahunnya. Sinar matahari sendiri merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Matahari dapat memancarkan berbagai macam sinar matahari yang dapat dilihat (*visibel*) maupun yang tidak dapat dilihat. Sinar matahari 400 nm sedangkan sinar matahari dengan panjang gelombang 10 nm – 400 nm yang disebut dengan sinar ultra violet tidak dapat dilihat dengan mata.

Dalam beberapa hal sinar ultra violet bermanfaat untuk manusia yaitu diantaranya untuk mensistesa vitamin D dan juga berfungsi untuk membunuh bakteri. Sinar ultraviolet (UV) dapat digolongkan menjadi UV-A dengan panjang gelombang diantara 320 – 400 nm, UV-B dengan panjang gelombang 290 -320 nm dan UV-C dengan panjang gelombang 10 -290 nm. Semua sinar UV-A di pancarkan ke bumi sedangkan sinar UV-B sebagai di pancarkan ke bumi (terutama yang panjang gelombangnya mendekati UV-A). Sinar UV-B dengan panjang gelombang lebih dekat dan sinar UV-C tidak dapat di pancarkan ke bumi karena diserap lapisan ozon di atmosfer bumi. Dengan demikian apabila lapisan ozon yang ada di atmosfer rusak, sinar UV-B yang masuk ke bumi akan semakin banyak (BPOM, 2009).

Dari ketiga jenis sinar ultraviolet yang sudah dibahas, masing-masing memiliki ciri-ciri dan tingkat perawatan efek radiasi yang berbeda-beda. Namun pada umumnya sinar ultraviolet yang terpapar masuk bumi baik itu sinar UV-A, UV-B maupun UV-C, dapat memberikan dampak sebagai berikut : (Ana, 2014).

a. Kemerahan pada kulit

Bahaya sinar ultraviolet yang pertama adalah memberikan efek kemerahan pada kulit. Secara umum sinar ultraviolet terutama sinar UV-B dapat menimbulkan gejala kemerahan pada kulit. Hal ini merupakan suatu bentuk iritasi kulit yang terpapar sinar ultraviolet. Biasanya gejala ini juga disertai rasa gatal pada bagian kulit yang memerah.

b. Kulit terasa seperti terbakar

Sinar ultraviolet juga dapat membuat kulit memiliki gejala seperti terbakar.

c. Dapat menimbulkan eritema

Eritema merupakan kondisi dimana kulit kaki mengalami kemerahan dan bengkak.

d. Menimbulkan penyakit katarak

Katarak merupakan kondisi mata yang tertutup atau terhalang selaput - selaput tertentu sehingga membuat penglihatan menjadi berkabut dan tidak jelas. Selain faktor usia paparan sinar UV juga menjadi salah satu pemicu timbulnya katarak.

e. Dapat memicu pertumbuhan sel kanker

Paparan sinar UV dapat menimbulkan terjadinya kerusakan forokimia pada DNA dari sel-sel yang berada di dalam tubuh. Hal ini akan memicu terbentuknya kanker terutama kanker kulit pada manusia.

f. Radiasi sinar UV-A yang menebus dermis dapat merusak sel kulit

g. Kulit dapat kehilangan elastisitas

Paparan sinar UV-A yang dapat menebus bagian dermis kulit dapat


merusak sel-sel yang berada pada dermis .Hal ini membuat elastisitas kulit menjadi berkurang

h. Kerut pada bagian kulit

Kerutan pada kulit merupakan salah satu efek samping dari hilangnya dan berkurangnya elastisitas kulit

i. Kanker kulit

Beberapa jenis kanker kulit disebabkan oleh UV. Sinar matahari di siang dan sore hari sangat riskan untuk merusak kulit. Sel-sel kulit dapat memburuk akibat terkena sinar matahari.




Gambar 2. Proses Penyerapan Sinar Matahari ke Kulit (Isfardiyana & Safitri, 2014)

D. Anatomi Kulit

Pada tubuh manusia,kulit memiliki banyak fungsi mulai dari pelindung otak,pengontrol suhu tubuh,hingga menjadi indikator pertama timbulnya suatu penyakit di tubuh misalnya kulit pucat,ini salah satu indikator mungkin kurangnya zat besi.

Kulit merupakan organ yang tersusun dari 4 jaringan dasar :


1. Epitel, trauma epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Pembuluh darah pada dermisnya dilapisi oleh endotel. Kelenjar-kelenjar kulit merupakan kelenjar epitelial.
2. Jaringan ikat, seperti serat-serat kolagen dan elastin, dan sel-sel lemak pada dermis.
3. Jaringan otot, dapat ditemukan pada dermis. Jaringan otot berupa jaringan otot polos, yaitu otot penegak rambut dan pada dinding pembuluh darah, sedangkan jaringan otot berkorak terdapat pada otot-otot ekspresi wajah.
4. Jaringan saraf, sebagai reseptor sensoris yang dapat ditemukan pada kulit berupa ujung saraf bebas dan berbagai badan akhir saraf (Kalangi, 2013).



Gambar 3. Lapisan-lapisan Epidermis Kulit Tebal (Kalangi, 2013)

Struktur Kulit

Kulit terdiri dari 2 lapisan utama yaitu epidermis yang merupakan jaringan epitel yang berasal dari ektoderm dan dermis yang merupakan jaringan ikat agak padat yang berasal dari mesoderm. Dibawah lapisan dermis terdapat hipodermis yang berupa jaringan ikat lebih longgar (Kalangi, 2013).



Gambar 4. Struktur Kulit (Kalangi, 2013)

a) Epidermis

Epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang nampak oleh mata. Ketebalan epidermis berkisar antara 0,4 – 1,5 mm. Mayoritas sel, 80% dari keseluruhan sel, yang terdapat pada epidermis adalah keratinosit (Chu, 2012). Epidermis terdiri dari 5 lapisan yaitu, dari dalam ke luar, stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum dan stratum korneum (Kalangi, 2013).

1) Stratum Basal (Lapis Basal, Lapis Benih)

Merupakan lapisan yang paling dalam dan terdiri atas satu lapis sel yang tersusun berderet-deret di atas membran basal dan melekat pada dermis dibawah nya. Bentuk sel nya kuboid atau silindris. Inti sel lebih besar dari ukuran sel nya dan sitoplasma nya basofilik. Pada lapisan ini biasanya terlihat gambaran mitotik sel, poliferasi sel nya berfungsi untuk regenerasi sel. Sel-sel pada lapisan ini bermigrasi ke arah permukaan untuk memasok sel-sel pada lapisan yang lebih superfisial (Kalangi, 2013).

2) Stratum Spinosum (Lapis Taju)

Pada lapisan ini terdiri dari beberapa jenis sel yang besar berbentuk poligonal dengan inti nya yang lonjong sitoplasma nya kebiruan. Pada taju inilah terletak desmosom yang melekatkan sel-sel satu sama lain pada lapisan ini. Semakin ke atas bentuk sel semakin gepeng (Kalangi, 2013).

3) Stratum Granulosum (Lapis Berbutir)

Lapisan ini terdiri dari 2 sampai 4 lapis sel gepeng yang megandung banyak granula basofilik yang disebut granula kerattohialin, jika dilihat dengan mikroskop elektron erupakan partikel amorf tanpa membran etapi dikelilingi ribosom (Kalangi, 2013).

4) Stratum Lusidum (Lapis Bening)

Lapisan ini terdiri dari 2 sampai 3 lapis sel gepeng yang tembus cahaya, dan agak eosinofilik. Tidak ada inti maupun organel pada sel-sel lapisan ini. Walaupun ada sedikit desmosom, tetapi pada lapisan ini adhesi kurang sehingga pada sajian seringkali tampak garis celah yang memisahkan stratum korneum dari lapisan lain di bawahnya (Kalangi, 2013).

5) Stratum Korneum (Lapis Tanduk)

Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel-sel mati, pipih dan tidak berinti serta sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Sel-sel yang paling permukaan merupakan sisik zat tanduk yang terdehidrasi yang selalu terkelupas (Kalangi, 2013)

b) Dermis

Lapisan dermis merupakan sistem integrasi dari jaringan konektif

fibrosa, filamentosa, dan difus yang juga merupakan lokasi terdapatnya pembuluh darah dan saraf di kulit. Serabut kolagen merupakan komponen yang paling banyak terdapat di dermis. Pada dermis juga didapatkan adneksa kulit yang berasal dari epidermis, fibroblas, makrofag dan sel mast (Chu, 2012). Dermis merupakan komponen terbesar yang menyusun kulit dan membuat kulit memiliki kemampuan elastisitas dan dapat diregangkan. Lapisan kulit ini juga memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari trauma mekanik, mengikat air, membantu dalam proses regulasi suhu tubuh dan mengandung reseptor sensorik. Terdapat dua regio dari dermis, yaitu papilla dermis dan retikuler dermis. Kedua regio tersebut dapat terlihat secara histologi. Papilla dermis berbatasan dengan epidermis, mengikuti kontur epidermis, dan biasanya ketebalannya tidak lebih dari 2 kali tebal epidermis. Sedangkan retikuler dermis membentuk sebagian besar lapisan dermal. Lapisan ini terutama tersusun dari serabut kolagen dengan diameter besar (Chu, 2012).

c) Hipodermis

Sebuah lapisan subkutan di bawah retikularis dermis disebut hipodermis. Ia berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa di antaranya menyatu dengan yang dari dermis (Kalangi, 2013). Hipodermis tersusun dari kumpulan sel-sel adiposit yang tersusun menjadi lobulus-lobulus yang dibatasi oleh septum dari jaringan ikat fibrosa (Chu, 2012). Jaringan pada hipodermis berfungsi untuk melindungi tubuh, berperan sebagai cadangan

energi dan melindungi kulit serta berperan sebagai bantalan kulit. Lapisan ini juga memiliki peran secara kosmetik yaitu dalam membentuk kontur tubuh seseorang. Selain itu, lemak juga memiliki fungsi endokrin dengan melakukan komunikasi dengan hipotalamus melalui sekresi leptin untuk mengubah energi di tubuh dan regulasi nafsu makan.

Warna Kulit

Warna kulit ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: pigmen melanin berwarna coklat dalam stratum basal, derajat oksigenasi darah dan keadaan pembuluh darah dalam dermis yang memberi warna merah serta pigmen empedu dan karoten dalam lemak subkutan yang memberi warna kekuningan. Perbedaan warna kulit tidak berhubungan dengan jumlah melanosit tetapi disebabkan oleh jumlah granul-granul melanin yang ditemukan dalam keratinosit (Kalangi, 2013).

Dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen melanin. Banyaknya pigmen melanin di dalam kulit ditentukan oleh faktor-faktor ras, individu, dan lingkungan (Kusantati, 2008).

Melanin dan mekanisme pigmentasi (tanning) adalah pigmen alamiah kulit yang memberikan warna coklat. Proses pembentukan pigmen melanin terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat diantara sel-sel keratinosit didalam lapisan basal (Stratum germinativum

E. Tabir Surya

Menurut Permenkes RI nomor 376/menkes/per/VIII/1990, tabir surya adalah zat yang dapat menyerap sedikitnya 85% sinar matahari pada panjang

gelombang 290 sampai 320 nm tetapi dapat meneruskan sinar pada panjang gelombang lebih dari 320 nm. Efektivitas sediaan tabir surya dalam menahan paparan sinar matahari dan panas dipengaruhi oleh stabilitas bahan aktif dan stabilitas sediaan tabir surya tersebut. Berdasarkan mekanisme kerjanya, bahan aktif tabir surya dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme fisika (pengeblok fisik) serta mekanisme kimia (penyerap kimiawi).

Tabir surya memiliki dua cara kerja berbeda dalam melindungi kulit. Yang pertama, tabir surya dapat memantulkan sinar UV agar tidak terkena kulit. Sedangkan yang kedua, tabir surya dapat menyerap sinar UV sebelum mengenai kulit kita. Tabir surya yang mempunyai nilai Sun Protection Factor (SPF) ≥ 4 mampu melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Nilai SPF menunjukkan kemampuan tabir surya dalam memberikan perlindungan kulit di bawah sinar matahari tanpa kulit mengalami eritema. Bahan kimia sintetik masih banyak dipakai dalam pembuatan sediaan tabir surya, sedangkan bahan alam belum banyak dimanfaatkan dalam industry produk tabir surya.

Menurut Lavi (2013), mekanisme proteksi tabir surya terhadap kulit dijelaskan sebagai berikut molekul bahan kimia tabir surya yang menyerap energi dari sinar UV, kemudian mengalami eksitasi dari ground state ketingkat energi yang lebih tinggi. Sewaktu molekul yang tereksitasi kembali ke kedudukan yang lebih rendah akan melepaskan energi yang lebih rendah dari energi semula yang diserap untuk menyebabkan eksitasi, maka sinar UV dari energi yang lebih tinggi setelah diserap energinya oleh bahan kimia maka akan mempunyai energi yang lebih rendah. Sinar UV dengan energi yang lebih rendah akan kurang atau tidak

menyebabkan efek sunburn pada kulit.

Pengukuran efektivitas suatu sediaan tabir surya secara *in vitro* dapat ditentukan dengan menentukan nilai persen (%) transmisi eritema, persen (%) transmisi pigmentasi, serta nilai Faktor Perlindungan Matahari (FPM) atau dikenal juga dengan “Sun Protection Factor” (SPF) secara spektrofotometrik.

1. Nilai transmisi eritema dan nilai transmisi pigmentasi

Efektivitas tabir surya dapat ditentukan dengan metode penentuan persen eritema dan persen pigmentasi dengan menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis. Ekstrak yang diperoleh diukur absorbansinya pada panjang gelombang 292-372 nm. Dari nilai serapan yang diperoleh dihitung nilai serapan dan nilai persen transmisinya dengan rumus $A = -\log T$. Nilai transmisi eritema dihitung dengan cara mengalikan nilai transmisi dengan faktor efektivitas eritema (F_e) pada panjang gelombang 292-372 nm. Nilai transmisi pigmentasi dihitung dengan cara mengalikan nilai transmisi (T) dengan faktor efektivitas pigmentasi (F_p) pada panjang gelombang 292-372 nm. Selanjutnya nilai persen transmisi eritema dihitung dengan rumus (Aisyah, 2006).

$$\% T_e = \frac{E_e}{\Sigma f_e} = \frac{\Sigma (T \times F_e)}{\Sigma f_e}$$

$$\% T_p = \frac{E_p}{\Sigma f_p} = \frac{\Sigma (T \times F_p)}{\Sigma f_p}$$

Keterangan:

% T_e : Nilai persen transmisi eritema

% T_p : Nilai persen transmisi pigmentasi

$$E_e = \Sigma (T \times F_e)$$

$$E_p = \Sigma (T \times F_p)$$

Persen transmisi eritema (% T_e) menggambarkan jumlah sinar matahari yang diteruskan setelah mengenai tabir surya, sehingga dapat menyebabkan eritema kulit (kulit menjadi kemerahan). Demikian juga persen transmisi pigmentasi (% T_p) menggambarkan jumlah sinar matahari yang diteruskan setelah mengenai tabir surya sehingga dapat menyebabkan pigmentasi kulit (kulit menjadi lebih gelap) (Sugihartini, 2011).

Persen transmisi eritema adalah persen total fluks eritema yang diteruskan oleh bahan tabir matahari. Transmisi eritema bahan tabir matahari atau fluks eritema bahan tabir matahari dapat ditentukan secara spektrofotometri dengan mengukur intensitas sinar yang diteruskan oleh bahan tabir matahari pada panjang gelombang eritomatogenik kemudian dikalikan dengan fluks eritema/fluks pigmentasi (Balsam, 1972).

Berikut ini merupakan nilai fluks eritema (F_e) dan fluks pigmentasi (F_p) untuk sediaan tabir surya.

Tabel 1. Transmisi Eritema Sediaan Tabir Surya (Maulida, 2015)

Rentang Panjang Gelombang (nm)	Fluks Eritema
290 – 295	0,1105
295 – 300	0,6720
300 – 305	1,0000
305 – 310	0,2008
310 – 315	0,1364
315 – 320	0,1125
Total Fluks Eritema	2,2322

Tabel 2. Transmisi Pigmentasi Sediaan Tabir Surya (Maulida, 2015)

Rentang Panjang Gelombang (nm)	Fluks Pigmentasi
320 – 325	0,1079
325 – 330	0,1020
330 – 335	0,0936
335 – 340	0,0798
340 – 345	0,0669
345 – 350	0,0570
350 – 355	0,0488
355 – 360	0,0456
360 – 365	0,0356
365 – 370	0,0310
370 – 375	0,0260
Total Fluks Pigmentasi	2,9264

Tabel 3. Kategori Penilaian Tabir Surya (Maulida, 2015)

%Te	%Tp	Kategori Penilaian Tabir Surya
< 1	3 – 40	<i>Sunblock</i>
1 – 6	42 – 86	Proteksi Ultra
6 – 12	45 – 86	<i>Suntan</i>
10 – 18	45 – 86	<i>Fast Tanning</i>

a. *Sunblock*

Sunblock merupakan kemampuan ekstrak untuk memproteksi secara total kulit yang sangat sensitif terhadap sinar UV A dan UV B. Aktivitas tabir surya ekstrak sebagai sunblock mampu menghalangi paparan sinar UV ke dalam kulit sehingga melindungi kulit dari terjadinya eritema dan pigmentasi (Whenny et al. 2015).

Sunblock dalam pengertian tabir surya yaitu kemampuan suatu molekul kimia memproteksi secara total sinar matahari penyebab eritema dan

pigmentasi dari sinar ultraviolet yang spesifik pada UV A panjang gelombang 322,5-372,5 nm dan pada UV B panjang gelombang 292,5-337,5 nm (Athiyah et al. 2015).

b. Proteksi ekstra

Proteksi ekstra dalam pengertian tabir surya yaitu kemampuan suatu molekul kimia memproteksi kulit yang sensitif dengan cara mengabsorbsi 95% atau lebih radiasi sinar UV pada panjang gelombang 290-320 nm. Sehingga lebih banyak 20 melindungi kulit dari paparan sinar UV B penyebab eritema kulit (Athiyah et al. 2015)

Proteksi ekstra adalah kemampuan ekstrak sebagai bahan tabir surya yang memberikan perlindungan terhadap eritema dengan mengabsorbsi kurang dari 85 % radiasi sinar UV B serta mencegah terjadinya pigmentasi. Kemampuan bahan pada kategori ini akan menghasilkan sedikit eritema tanpa rasa sakit. Kategori proteksi ekstra tabir surya digunakan untuk melindungi jenis kulit yang sensitif (Whenny et al. 2015).

c. *Suntan*

Suntan standar adalah kategori penilaian aktivitas tabir surya dimana suatu bahan mampu mencegah sengatan sinar matahari dengan mengabsorbsi 95% atau lebih radiasi UV B. Kategori suntan standar menyerap sebagian besar sinar UV B dan menyerap sedikit sinar UV A sehingga dapat menyebabkan pigmentasi tanpa terjadinya eritema. Suntan standar mampu mencegah terjadinya eritema pada kulit normal atau jenis kulit yang tidak sensitif (Whenny et al. 2015).

Suntan Standard dalam pengertian tabir surya yaitu kemampuan suatu molekul kimia memproteksi kulit normal atau yang tidak sensitif dengan menyerap sebagian besar sinar UV B dan menyerap sedikit sinar UV A. Menurut Wilkinson dan Moore suntan standard mengandung bahan yang disebut tabir surya yang mengabsorbsi sedikitnya 85% radiasi sinar UV pada panjang gelombang 290-320 nm tetapi meneruskan sinar UV pada panjang gelombang yang lebih besar dari 320 nm dan menghasilkan kulit coklat ringan yang bersifat sementara (Athiyah et al. 2015).

d. *Fast Tanning*

Fast tanning dalam pengertian tabir surya yaitu kemampuan suatu molekul kimia yang menyerap sinar UV-A dan UV-B paling sedikit. Menurut Cumpelik fast tanning mampu meneruskan sebesar 15% sinar UV - B penyebab eritema. syarat tanning ialah harus mampu memberikan transmisi penuh pada rentang panjang gelombang 300-400 nm untuk memberikan efek terhadap penggelapan maksimum pada kulit (Athiyah et al. 2015). Tujuan preparasi tabir surya adalah untuk meminimalisir efek berbahaya dari radiasi matahari.

Berdasarkan penggunaannya, tabir surya dapat diklasifikasikan menjadi:

a. *Sunburn preventife agents*

Yaitu tabir surya yang mengabsorbsi 95 % atau lebih radiasi UV dengan panjang gelombang 290-320 nm.

b. *Suntanning agents*

Yaitu tabir surya yang mengabsorbsi sedikitnya 85 % dari radiasi UV

dengan rentang panjang gelombang dari 290-320 nm tetapi meneruskan sinar UV pada panjang gelombang yang lebih besar dari 320 nm dan menghasilkan tan ringan yang bersifat sementara. Bahan-bahan ini akan menghasilkan eritema tanpa adanya rasa sakit Tabir surya pada kedua kategori tersebut merupakan kategori tabir surya kimia yang mengabsorpsi rentang tertentu dari radiasi UV

a. *Opaque sunblock agents*

Bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimum dalam bentuk penghalang secara fisik. Titanium dioksida dan zink oksida merupakan senyawa yang paling sering digunakan dalam kelompok ini. Titanium dioksida memantulkan dan memencarkan semua radiasi pada rentang UV-Vis (290-777 nm), sehingga dapat mencegah atau meminimalkan kulit terbakar (*sunburn*) dan pencokelatan kulit (suntan) (Wilkinson dan Moore, 1982).

Menurut Cumpelick (1972), Sediaan tabir surya dapat dikategorikan sebagai sunblock (Sediaan yang dapat menyerap hampir semua sinar UV-B dan sinar UV-A) apabila memiliki persentase transmisi eritema <1% dan persentase transmisi pigmentasi 3-40% Jika persentase transmisi eritema 6-18% dan persentase transmisi pigmentasi 45-86% dikategorikan sebagai suntan atau dapat dikatakan suatu bahan yang menyerap sebagian besar sinar UV-B dan menyerap sedikit sinar UV-A (Agustin et.al, 2013).

Eritema merupakan salah satu tanda terjadinya proses inflamasi akibat paparan sinar UV dan terjadi apabila volume darah dalam pembuluh darah dermis

meningkat hingga 38% di atas volume normal, sedangkan pigmentasi adalah perubahan warna kulit seseorang yang disebabkan adanya penyakit atau perlukan yang bisa menimbulkan perubahan warna yang lebih gelap akibat peningkatan jumlah melanin (Yulistiati, 2002).

2. Pengukuran nilai Sun Protection Factor (SPF) secara spektrofotometrik

Pengukuran nilai SPF suatu sediaan tabir surya dapat dilakukan secara in vitro. Metode pengukuran nilai SPF secara in vitro secara umum terbagi dalam dua tipe. Tipe pertama adalah dengan cara mengukur serapan atau transmisi radiasi UV melalui lapisan produk tabir surya pada plat kuarsa atau biomembran. Tipe yang kedua adalah dengan menentukan karakteristik serapan tabir surya menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran dari tabir surya yang diuji. Menurut More, B. H. et al. (2013) dalam menentukan nilai SPF dapat menggunakan persamaan berikut ini :

$$SPF = CF \times \sum_{290}^{320} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times A(\lambda)$$

Keterangan:

EE = Spektrum efek eritemal

I = Intensitas spectrum sinar

A = Serapan produk tabir surya

CF = Faktor koreksi (10)

Nilai EE x I adalah suatu konstanta. Nilai dari panjang gelombang 250-350 nm dan setiap selisih 5 nm telah ditentukan oleh Sayre, et al. dalam Dutra et al. (2004) seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Nilai EE x I pada panjang gelombang 250-350 nm (Maulida, 2015).

Panjang Gelombang (λ nm)	EE x I
290	0,0150
295	0,0817
300	0,2874
305	0,3278
310	0,1864
315	0,0839
320	0,0180
Total	1

Menurut Food Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, efektivitas tabir surya dalam suatu sediaan diklasifikasikan menjadi lima kelompok menurut nilai SPF-nya, antara lain (Damogalad et al., 2013).

Tabel 5. Keefektifan tabir surya berdasarkan nilai SPF

SPF	Kategori Proteksi Tabir Surya
2-4	Proteksi minimal
4-6	Proteksi sedang
6-8	Proteksi ekstra
8-15	Proteksi maksimal
≥ 15	Proteksi ultra

Penentuan efektivitas tabir surya meliputi penentuan nilai SPF, persentase transmisi eritema (% Te) dan persentase transmisi pigmentasi (% Tp). Penentuan nilai SPF dan % Te adalah untuk menunjukkan efektivitas tabir surya terhadap sinar UV-B, sedangkan % Tp ditentukan untuk melihat efektifitas tabir surya terhadap sinar UV-A. Suatu tabir surya dikatakan memiliki efektivitas yang baik bila memiliki nilai SPF yang tinggi, serta % Te dan % Tp yang kecil (Widyastuti, 2015).

F. Krim

Krim merupakan sediaan setengah padat yang dapat berupa emulsi dari

satu atau lebih bahan obat yang terdispersi dalam basis yang sesuai dan mengandung air tidak kurang dari 60%. Krim digunakan sebagai pemakaian luar atau topikal, terdispersi di dalam cairan pembawa dan ditambah dengan zat pengemulsi yang sesuai untuk menstabilkan (Lumentut, Edi, and Rumondor 2020).

Komponen krim terdiri dari bahan dasar, bahan aktif dan bahan tambahan. Bahan dasar terdiri dari fase minyak, fase air dan emulgator atau surfaktan. Emulgator dan surfaktan berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase yang tidak saling bercampur, sedangkan bahan tambahannya dapat meliputi pengawet, pengkhelet, pelembab, pewarna dan pewangi (Mektildis 2018).

Berdasarkan tipe emulsinya, krim terbagi atas dua tipe yaitu (Maulida. 2010):

1. Krim minyak-air (M/A)

Bila fase lipofil terdispersi dalam fase hidrofil maka sistem ini disebut emulsi minyak dalam air. Krim M/A sering disebut sebagai “vanishing krim” karena sifatnya yang bila dioleskan pada kulit dapat menghilang dari permukaan dan akan memberikan efek pendinginan pada kulit. Hal ini terjadi karena air sebagai fasa kontinyu akan menguap dan akan meningkatkan konsentrasi zat larut air pada lapisan yang melekat.

2. Tipe emulsi air-minyak (A/M)

Bila fase hidrofil terdispersi dalam fase lipofil maka sistem ini disebut emulsi air dalam minyak. Konsistensi krim A/M dapat bervariasi dan tergantung pada komposisi fase minyak, fase air dan campuran zat pengemulsi yang dipakai.

Perbandingan relatif kedua fase dan sifat fase masing-masing zat menunjukkan pengaruh yang nyata.

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan krim adalah sebagai berikut:

a. Asam stearate

Asam stearat ($C_{18}H_{36}O_2$) berbentuk keras, berwarna putih atau agak kuning mengkilap, kekuningan. Memiliki sedikit bau (dengan ambang batas bau 20 ppm) dan rasa seperti lemak. Dalam formulasi topikal, asam stearat digunakan sebagai zat pengemulsi dan pelarut. Asam stearat bebas larut dalam benzena, karbon tetraklorida, kloroform, dan eter (95%), heksana, dan propilenglikol, praktis tidak larut dalam air. Asam stearat adalah bahan yang stabil; antioksidan juga bisa ditambahkan ke dalamnya. Bahan ini harus disimpan dalam wadah tertutup, di tempat sejuk dan kering. Asam stearat tidak cocok dengan sebagian besar logam hidroksida dan mungkin tidak cocok dengan basis, zat pereduksi, dan zat pengoksidasi (Rowe, Sheskey, and Quinn 2020).

b. Lanolin

Lanolin muncul sebagai zat lilin berwarna kuning pucat, tidak beraturan dengan bau khas yang samar. Lanolin yang meleleh adalah cairan bening atau hampir bening. Lanolin banyak digunakan dalam formulasi farmasi topikal sebagai agen pengemulsi dan emolien. Lanolin dapat digunakan sebagai pembawa hidrofobik dan dalam pembuatan krim dan salep air dalam minyak. Ketika dicampur dengan

minyak nabati yang sesuai atau dengan parafin lunak, menghasilkan krim emolien yang menembus kulit dan karenanya memfasilitasi penyerapan obat. Lanolin bercampur dengan sekitar dua kali berat airnya sendiri, tanpa pemisahan, untuk menghasilkan emulsi stabil yang tidak mudah menjadi tengik selama penyimpanan. Produk topikal berbasis lanolin memiliki sifat emolien yang sangat baik karena kemiripan kimia dan fisik yang unik dari lanolin dengan lipid kulit manusia. Selain kemampuan semioklusifnya, produk ini juga mampu memungkinkan transportasi dua arah air (Rowe, Sheskey, and Quinn 2020).

c. Metil paraben

Methylparaben ($C_8H_8O_3$) terjadi sebagai kristal tidak berwarna atau kristal putih bubuk. Tidak berbau atau hampir tidak berbau dan memiliki sedikit rasa terbakar. Dalam kosmetik, methylparaben adalah pengawet antimikroba yang paling sering digunakan, dapat digunakan baik sendiri atau dalam kombinasi dengan paraben lain atau dengan agen antimikroba lainnya. Paraben efektif pada rentang pH yang luas dan memiliki spektrum luas aktivitas antimikroba yang luas (Rowe, Sheskey, and Quinn 2020)

d. Propil paraben

Propilparaben ($C_{10}H_{12}O_3$) berbentuk putih, kristal, tidak berbau, dan tidak berasa bubuk. Propilparaben banyak digunakan sebagai pengawet antimikroba dalam kosmetika, produk pangan, dan formulasi

farmasi. Ini dapat digunakan sendiri, dalam kombinasi dengan ester paraben lainnya, atau dengan agen antimikroba lainnya. Ini adalah salah satu yang paling sering pengawet yang digunakan dalam kosmetik (Rowe, Sheskey, and Quinn 2020)

e. Trietanolamin

Trietanolamin ($C_6H_{15}NO_3$) adalah kental berwarna bening, tidak berwarna hingga kuning pucat cairan yang sedikit berbau amoniak. Trietanolamin banyak digunakan dalam formulasi farmasi topikal, terutama dalam pembentukan emulsi. Ketika dicampur dalam proporsi yang sama dengan asam lemak, seperti: asam stearat atau asam oleat, trietanolamin membentuk sabun anionik dengan pH sekitar 8, yang dapat digunakan sebagai zat pengemulsi untuk menghasilkan emulsi minyak dalam air yang berbutir halus dan stabil. Konsentrasi yang biasanya digunakan untuk emulsifikasi adalah 2–4% v/v triethanolamine dan 2-5 kali lipat dari asam lemak (Rowe, Sheskey, and Quinn 2020)

Kombinasi asam stearat dan TEA karena TEA akan membentuk suatu emulsi o/w yang sangat stabil apabila dikombinasikan dengan asam lemak bebas. Asam lemak yang sesuai dikombinasikan dengan TEA adalah asam stearat karena asam stearat tidak mengalami perubahan warna, krim dengan menggunakan asam stearat dan trietanolamin stabil selama penyimpanan (Saryanti, Setiawan, and Safitri 2019).

G. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dan campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama (Mukhrani 2014).

Secara umum metode ekstraksi dibedakan berdasarkan ada tidaknya proses pemanasan. Pemanasan ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses ekstraksi, juga bergantung pada senyawa target yang diharapkan setelah proses ekstraksi.

Berikut ini jenis-jenis ekstraksi bahan alam yang sering dilakukan :

a. Ekstraksi Cara Dingin

Metoda ini artinya tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung, tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa yang dimaksud rusak karena pemanasan. Jenis ekstraksi dingin adalah maserasi dan perkolasi.

Berikut penjelasan singkat tentang metode ekstraksi cara dingin.

1. Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari.

Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dengan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel.

2. Perkolasi

Perkolasi adalah proses penyarian simplisia dengan jalan melewati pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu percolator. Perkolasi bertujuan supaya zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan. cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak kebawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan. Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain: gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler dan daya geseran (friksi)

b. Ekstraksi Cara Panas

Metoda ini pastinya melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan cara dingin. Metodanya adalah refluks, ekstraksi dengan alat soxhlet dan infusa.

Berikut penjelasan singkat tentang metode ekstraksi cara panas.

1. Reflux

Salah satu metode sintesis senyawa anorganik adalah refluks, metode ini digunakan apabila dalam sintesis tersebut menggunakan pelarut yang volatil. Pada kondisi ini jika dilakukan pemanasan biasa maka pelarut akan menguap sebelum reaksi berjalan sampai selesai. Prinsip dari metode refluks adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Sedangkan aliran gas N_2 diberikan agar tidak ada uap air atau gas oksigen yang masuk terutama pada senyawa organologam untuk sintesis senyawa anorganik karena sifatnya reaktif.

2. Soxhlet

Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Sokletasi digunakan pada pelarut organik tertentu. Dengan cara pemanasan, sehingga uap yang timbul setelah dingin secara kontinyu akan membasahi sampel, secara teratur pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah membawa senyawa kimia pada labu distilasi yang diuapkan dengan rotary

evaporator sehingga pelarut tersebut dapat diangkat lagi bila suatu campuran organik berbentuk cair atau padat ditemui pada suatu zat padat, maka dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut yang diinginkan.

3. Infusa

Infusa merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu proses infusdasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90°C selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gr maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara yang biasa dilakukan adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panci dengan air secukupnya selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90°C sambil sekali-sekali diaduk. Saring selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume yang diinginkan. Apabila bahan mengandung minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah dingin (Sudarwati and Fernanda 2019).

H. Spektrofotometri UV-Vis

Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu jenis spektroskopi yang sering digunakan dalam analisis kimia dan biologi. Spektrofotometer ini pada interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Apabila seberkas radiasi (cahaya) dikenakan pada cuplikan (larutan sampel), maka sebagian dari cahaya diserap oleh molekul – molekul sesuai dengan struktur dari molekul. Setiap senyawa dalam sampel memiliki tingkatan tenaga yang spesifik. Bila cahaya mempunyai perbedaan energi antara tingkatan dasar dan tingkatan tereksitasi yang mengenai cuplikan, maka elektron – elektron pada tingkatan dasar akan

dieksitasi ke tingkatan tereksitasi, dan sebagian energi cahaya yang sesuai diserap dengan panjang gelombang ini. Elektron yang tereksitasi melepaskan tenaga melalui proses radiasi panas dan akan kembali pada tingkatan dasar lagi. Perbedaan energi antara tingkat dasar dengan tingkat tereksitasi yang spesifik untuk tiap – tiap bahan/senyawa menyebabkan frekuensi yang diserap juga berbeda – beda (Sastrohamidjojo, 2001).

Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. (Khopkar, 2007).

Suatu spektrofotometer UV-Vis dapat mengukur dan merekam spektrum senyawa tumbuhan dalam bentuk larutan. Spektrum tampak terentang panjang dari 400 nm (ungu) sampai 750 nm (merah), sedangkan spektrum ultraviolet terentang dari 100 nm sampai 400 nm (Fessenden, 1994).

Pendeteksian senyawa dengan cara sederhana menggunakan spektrofotometer ultraviolet dilakukan pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Radiasi senyawa pada panjang gelombang 254 nm menunjukkan radiasi gelombang pendek, sedangkan pada panjang gelombang 366 nm menunjukkan radiasi panjang gelombang. Bila senyawa menyerap sinar UV, maka akan tampak sebagai bercak gelap pada latar belakang yang berfluoresensi (Stahl, 1985)

Sinar radiasi UV-Vis adalah panjang gelombang antara 180 – 380 nm untuk

UV dan panjang gelombang 380 – 780 nm untuk visible (Hayati, 2007). Cahaya didasarkan yang dapat dilihat oleh manusia disebut cahaya tampak/visibel. Biasanya cahaya terlihat merupakan campuran dari cahaya yang mempunyai berbagai panjang gelombang dari 400 nm hingga 750 nm.

Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembandingan (Khopkar, 2007).

1. Sumber Cahaya

Sumber yang biasa digunakan pada spektroskopi absorpsi adalah lampu wolfram. Arus cahaya tergantung pada tegangan lampu. Lampu hidrogen atau lampu deuterium digunakan untuk sumber pada daerah UV. Lampu tungstein merupakan campuran dari filamen tungstein gas iodin (halogen), oleh sebab itu lampu tungstein-iodin pada spektrofotometer sebagai sumber radiasi pada daerah sinar tampak dengan rentang panjang gelombang 380-900 nm.

Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang gelombang pada spektrofotometer pada daerah ultraviolet khususnya daerah disekitar panjang gelombang 365 nm dan sekaligus mengecek resolusi monokromator.

2. Monokromator

Berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada spektrofotometer

biasanya terdiri dari susunan meliputi celah (slit), filter, prisma, kisi dan celah keluar.

a) Celah (slit) Celah monokromator

Bagian yang pertama dan terakhir dari suatu sistem optik monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator berperan penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromatis dan resolusi panjang gelombang.

b) Filter optik Cahaya tampak yang

Radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang berupa campuran cahaya dengan berbagai panjang gelombang. Filter optik berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya tampak yang diteruskan sesuai dengan warna filter optik yang dipakai. Filter optik yang sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang berwarna. Dengan adanya filter optik sebagai bagian monokromator akan dihasilkan pita cahaya yang sangat sempit sehingga kepekaan analisisnya lebih tinggi. Dan lebih dari itu akan didapatkan cahaya hampir monokromatis sehingga akan mengikuti hukum Lambert-Beer pada analisis kuantitatif.

c) Prisma dan Kisi (grating) Prisma dan Kisi

Merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis.

3. Sel absorpsi

Pada pengukuran di daerah tampak, kuvet kaca dapat digunakan, tetapi untuk pengukuran pada daerah UV menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak

tembus cahaya pada daerah ini. Umumnya tebal kuvet adalah 10 mm, tetapi yang lebih kecil maupun yang lebih besar tetap dapat digunakan. Sel yang biasa digunakan berbentuk persegi, bentuk silinder juga dapat digunakan. Kuvet yang digunakan harus tertutup untuk pelarut organik. Sel yang baik adalah kuarsa atau gelas hasil leburan serta seragam keseluruhannya.

4. Detektor

Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang.

5. Amplifier

Amplifier dibutuhkan pada saat sinyal listrik elektronik yang dilahirkan setelah melewati detektor untuk menguatkan karena penguat dengan resistensi masukan yang tinggi sehingga rangkaian detektor tidak terserap habis yang menyebabkan keluaran yang cukup besar untuk dapat dideteksi oleh suatu alat pengukur.

I. *Tinjauan Islam*

Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat penyakit dan merupakan anugerah Allah SWT, karena Allah SWT tidak memberi penyakit tanpa disertai dengan obat (penyembuhnya). Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia memanfaatkan keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan. Inilah yang harus manusia pelajari dan manfaatkan, sebagaimana dalam firman-Nya: sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q.S. An-Nahl/16:11)

Dijelaskan pada tafsir Ibnu Katsir, Allah mengeluarkannya dari bumi, dengan air yang hanya satu macam ini, keluarlah buah-buahan itu dengan segala perbedaan, macamnya, rasanya, warnanya, baunya dan bentuknya sebagai bukti bahwasannya tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) kecuali Allah. (Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al, et al., 2019)

Dijelaskan pada tafsir ringkas Kementerian Agama RI, dengan air hujan itu pula dia menumbuhkan untuk kamu beragam tanam-tanaman yang dapat kamu manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kamu. Dengan air hujan itu pula dia menumbuhkan pohon-pohon penghasil buah, seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan dari pohon-pohon yang tidak disebutkan. Sungguh, pada yang demikian itu, yakni turunnya hujan dan kenikmatan yang ditimbulkannya, benar-benar terdapat tanda yang nyata mengenai kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir.

Ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia mencari, memanfaatkan dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena

merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan. Dalam penelitian ini, maka digunakan tanaman kulit batang kayu jawa (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.). yang memiliki banyak manfaat dan telah digunakan menjadi pengobatan tradisional untuk diketahui fungsinya sebagai antioksidan.

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Zat yang maha mulia menyembuhkan sebagaimana dalam firmanNya Q.S Asy-syu'ara 80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ ۖ

Terjemahnya:

Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir Al- misbah (Quraish Shihab) Firman-Nya: (وَإِذَا مَرَضْتُ) waidza maridhtu/dan apabila aku sakit, berbeda dengan redaksi lainnya. Perbedaan pertama adalah penggunaan kata idza/ apabila dan mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya apa yang dibicarakan, dalam hai ini adalah sakit. Ini mengisyaratkan bahwa sakit - berat atau ringan, fisik atau mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Perbedaan kedua adalah redaksinya yang menyatakan “Apabila aku sakit” bukan “Apabila Allah menjadikan aku sakit”. Namun demikian, dalam hai penyembuhan seperti juga dalam pemberian hidayah, makan dan minum - secara tegas beliau menyatakan bahwa Yang melakukannya adalah Dia, Tuhan semesta alam itu.

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa berbicara tentang nikmat secara tegas Nabi Ibrahim as. menyatakan bahwa sumbernya adalah Allah swt., berbeda dengan ketika berbicara tentang penyakit. Ini karena penganugerahan

nikmat adalah sesuatu yang terpuji, sehingga wajar disandarkan kepada Allah, penyakit adalah sesuatu yang dapat dikatakan buruk sehingga tidak wajar dinyatakan bersumber dari Allah swt. Demikian Nabi Ibrahim as. mengajarkan bahwa segala yang terpuji dan indah bersumber dari-Nya. Adapun yang tercela dan negatif, maka hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya pada diri sendiri.

Perlu dicatat juga bahwa penyembuhan sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim as. ini, bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadits Nabi Muhammad saw. yang memerintahkan untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim as. itu hanya bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah Allah SWT.

Dalam hal ini, salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat adalah kulit batang kayu jawa yang berkhasiat sebagai antioksidan yang diformulasikan dalam bentuk sediaan krim. Antioksidan dapat dimanfaatkan dalam berbagai jenis penyakit dan untuk krim antioksidan biasanya digunakan untuk mencegah kerutan pada wajah sebagai bagian dari menjaga kecantikan diri karena Allah itu indah dan menyukai keindahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif untuk melakukan formulasi dan uji stabilitas fisik krim tabir surya ekstrak etanol kulit batang kayu jawa (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi, Laboratorium Farmasetik, Laboratorium Kimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2023 – Januari 2024

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental. Pendekatan ini dilakukan dengan memformulasi ekstrak etanol kulit batang kayu jawa (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.) sebagai krim tabir surya.

Sampel

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu kulit batang kayu jawa (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.)

Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Timbangan analitik, gelas ukur, beaker glass,, cawan porselen, pipet

tetes, waterbath, lumping dan alu, kertas saring, blender, rotary evaporator, pH meter, spektrofotometri uv-vis, viscometer Brookfield.

2. Bahan yang digunakan

Ekstrak kulit batang kayu jawa, asam stearate, setil alcohol, lanolin, gliserin, trietanolamin, metilparaben, propilparaben, akuades, etanol 70%.

Cara Kerja

1. Penyiapan Sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel kulit batang kayu jawa yang diperoleh dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kulit batang kayu jawa dipisahkan dengan bagian batang dan dicuci dengan air mengalir (Ismail et al. 2015).

b. Pengolahan sampel

Kulit batang diambil dari batang utama dengan ukuran dan lebar sekitar 10-15 cm. Sampel lalu diambil dan dipisahkan dari batang kemudian dibersihkan, dan dicuci dengan air bersih yang mengalir. Setelah itu sampel dikeringkan, kemudian dipotong-potong kecil dan selanjutnya dikeringkan dalam lemari pengering dan dihaluskan dengan cara diblender, sampel siap diekstraksi (Ismail et al. 2015)

2. Ekstraksi

Sampel kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica Hout merr*) yang telah kering ditimbang sebanyak 500 gr dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan etanol hingga simplisia terendam. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di

tempat yang tanpa pemaparan sinar matahari sambil sesekali diaduk, selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan pelarut etanol. Hal ini dilakukan selama 3 x 24 jam. Filtrat yang diperoleh kemudian dikumpulkan, dipekatkan dan cairan penyaringnya diuapkan hingga diperoleh ekstrak etanol yang kental. (Ismail et al. 2015)

3. Pembuatan Krim

a. Rancangan Formula

Formulasi pembuatan krim diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Qonitah et al. 2022)

Tabel 1. Rancangan Formula Sediaan Krim Tabir Surya

Nama Bahan	F0(%)	F1(%)	F2(%)	F3(%)
Ekstrak etanol kulit batang kayu jawa	0	0,25	0,5	1
Asam stearate	5	5	5	5
Setil alcohol	2	2	2	2
Gliserin	10	10	10	10
TEA	1	1	1	1
Lanolin	1	1	1	1
Metil Paraben	0,02	0,02	0,02	0,02
Propil paraben	0,2	0,2	0,2	0,2
Aquadest	Ad 100 ml	Ad 100 ml	Ad 100 ml	Ad 100 ml

b. Prosedur pembuatan krim

Campuran fase minyak terdiri dari bahan larut lemak yaitu setil alkohol, lanolin, dan asam stearat dileburkan pada penangas air hingga mencapai suhu 70°C kemudian ditambahkan propil paraben. Campuran fase air terdiri dari bahan larut air seperti gliserin dan trietanolamin dileburkan pada sebagian aquades panas hingga mencapai suhu 70°C lalu ditambahkan metil paraben. Formula sediaan krim tabir surya dibuat dengan mengabungkan ekstrak etanol kulit batang kayu jawa, campuran fase air, dan fase minyak yang digerus secara konstan hingga terbentuk massa krim yang stabil (Qonitah et al. 2022).

4. Uji Stabilitas Krim

Sediaan krim tabir surya dilakukan pengecekan terhadap homogenitas, viskositas atau kekentalan, daya sebar, pH, organoleptis, dan daya lekat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik fisika kimia dari sediaan.

a) Uji organoleptik

Uji organoleptis dilakukan dengan mengamati perubahan bentuk, warna, dan bau dari sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol kulit batang kayu jawa (Hakim, Meliana, and Utami 2020).

b) Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan dengan cara mengoleskan

sampel sebanyak 0,1 gram pada gelas objek lalu diamati. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat bagian yang tidak tercampurkan dengan baik. (Nurisyah, Asyikin, and Cartika 2020)

c) Uji pH

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Pengujian ini dilakukan dengan cara membenamkan alat/elektroda pada sediaan krim yang diuji, kemudian tunggu beberapa detik sampai angka pada layar stabil dan dicatat nilai pH yang muncul pada layar. Rentang pH yang dapat diterima kulit berkisar 4,0-7,5 (Wahyuddin et al. 2020)

d) Uji daya sebar

Kaca transparan diletakkan di atas kertas milimeter blok. Pada kaca tersebut diletakkan 0,5 g krim, kemudian ditutup dengan kaca transparan yang lain dan dibiarkan selama 1 menit untuk mendapatkan beberapa diameter penyebaran yang terbentuk. Kemudian dilanjutkan dengan menambahkan beban diatas kaca transparan tersebut beban 50, 100, dan 150 g dan diamati diameter penyebaran yang terbentuk. Spesifikasi sediaan adalah krim dapat menyebar dengan mudah dan merata (Saryanti, Setiawan, and Safitri 2019).

e) Uji daya lekat

Sediaan krim sebanyak 0,5 g diletakkan di atas object glass yang telah ditentukan luasnya (oleskan pada bagian yang halus)

pada alat uji. Object glass yang lain (bagian permukaan yang halus) diletakkan di atas krim tersebut, kemudian diletakkan beban 500 g selama 5 menit. Beban seberat 80 g dilepaskan sehingga menarik object glass bagian bawah. Dicatat waktu yang diperlukan hingga kedua object glass terlepas (Saryanti, Setiawan, and Safitri 2019)

f) Uji viskositas

Viskositas sediaan diukur dengan menggunakan viskometer. Krim dimasukkan dalam beaker glass, selanjutnya pasang spindel nomor 64, lalu spindel diturunkan sampai batas spindel tercelup pada sediaan krim, kemudian dinyalakan dengan ditekannya tombol on. Kecepatan alat diatur mulai 0,3 rpm. Dari masing-masing pengukuran dengan perbedaan kecepatan rpm dibaca skalanya hingga jarum merah yang bergerak telah stabil (Nurisyah, Asyikin, and Cartika 2020).

5. Uji Potensi Tabir Surya

Penentuan efektivitas tabir surya dilakukan dengan menentukan nilai SPF secara in vitro dengan spektrofotometri UV-Vis, dengan cara masing-masing krim (0,25%, 0,5% dan 1%) ditimbang sebanyak 0,1 g, ditambahkan etanol sebanyak 25 mL dan dicampur hingga homogen. Spektrofotometer UV-Vis dikalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan etanol. Dimasukkan etanol sebanyak 1 ml kedalam kuvet kemudian kuvet dimasukkan kedalam spektrofotometer UV-Vis untuk

proses kalibrasi. Selanjutnya, dibuat kurva serapan uji dalam kuvet, dengan panjang gelombang antara 290-320 nm, gunakan etanol sebagai blanko. Kemudian tetapkan serapan rata-ratanya dengan interval 5 nm (Damogalad, Jaya Edy, and Sri Supriati 2013).

Hasil absorbansi masing-masing konsentrasi krim dicatat dan kemudian nilai SPFnya dihitung dengan rumus (Harjanti and Nilawati 2020):

$$SPF = CF \times \sum_{290}^{320} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times A(\lambda)$$

6. Uji Fitokimia

a) Uji Alkaloid

Sebanyak 5 mL ekstrak etanol kulit batang kayu jawa ditambahkan dengan 5 mL HCl 1% lalu diaduk, dan disaring. Selanjutnya diambil filtrat dimasukkan dalam tabung reaksi A, B,C, masing-masing sebanyak 1 mL filtrat. Tabung reaksi A ditambahkan pereaksi Mayer, tabung reaksi B ditambahkan pereaksi Wagner dan tabung reaksi C ditambahkan pereaksi Dragendorff. Positif alkaloid ditandai dengan adanya endapan putih untuk pereaksi Mayer, endapan cokelat untuk pereaksi Wagner dan endapan cokelat kemerahan untuk pereaksi Dragendorff (Fitriyanti, Nasrudin, dan Rudi 2019).

b) Uji Flavonoid

Sebanyak 2 mL ekstrak kulit batang kayu jawa dipanaskan kurang lebih 5 menit. Setelah dipanaskan masing-masing ditambahkan dengan 0,1 gram bubuk Mg dan 3 tetes HCl pekat. Jika masing-masing larutan

terbentuk warna jingga sampai merah tua, maka positif mengandung flavonoid (Reiza, Rijai, and Mahmudah 2019).

c) Uji Fenolik

Sebanyak 1 mL ekstrak etanol kulit batang kayu jawa yang telah dilarutkan ditambahkan 3 tetes FeCl_3 1%. Terdapat warna hitam, biru atau ungu menunjukkan adanya fenolik (Reiza, Rijai, and Mahmudah 2019)

d) Uji Saponin

Sebanyak 1 mL ekstrak etanol kulit batang kayu jawa ditambahkan dengan 1 ml akuades, lalu dikocok jika busa yang terbentuk dapat bertahan selama 5 menit maka ekstrak positif adanya saponin (Reiza, Rijai, and Mahmudah 2019)

e) Uji Terpenoid

Sebanyak 1 mL ekstrak kulit batang kayu jawa ditambahkan 2 mL kloroform lalu ditambahkan dengan 0,3 mL $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{p})$. Lapisan dipermukaan atau antarmuka berwarna coklat kemerahan menunjukkan adanya terpenoid (Fitriyanti, Nasrudin, and Rudi 2019).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 1,7 kg kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) kemudian dikeringkan dilemari pengering, dan diperoleh 300 gram simplisia kulit batang kayu jawa kemudian diekstraksi secara maserasi dengan menggunakan etanol 70% sebanyak 5 liter. Diperoleh ekstrak kental sebanyak 56 gr.

Tabel 2. Hasil Etanol Kulit Batang Kayu jawa (*lannea coromandelica*)

Berat Sampel	Berat Simplisi	Jenis Ekstrak	Berat Ekstrak	% Rendemen
1,7	300 gram	Ekstrak kental	56 gram	18,9%

2. Hasil Skrining Fitokimia

Tabel 3. Hasil Skrining Fitokimia Kulit Batang Kayu Jawa

Senyawa	Pereaksi	Hasil
Alkaloid	Ditambahkan 5 ml Hcl (+) Mayer (+) Dragendroff (+) Wagner	Tidak terbentuk endapan putih keruh pada pereaksi mayer (-) Tidak terbentuk endapan merah pada pereaksi dragendroff (-) Tidak terbentuk endapan coklat pada pereaksi wagner (-)
Flavonoid	(+) Serbuk Mg (+) HCl pekat	Terbentuknya warna jingga sampai merah (+)
Fenolik	(+) FeCl %1	Terbentuknya warna hitam, biru atau ungu (+)
Saponin	(+) Aquadest	Terbentuknya busa/buih

		(+)
Terpenoid	(+) 2 ml kloroform (+) 0,3 ml H ₂ SO ₄	Terbentuknya lapisan permukaan warna coklat kemerahan (+)

3. Hasil Nilai Sun Protection Factor (SPF)

a. Krim 0%

Tabel 4. Nilai SPF Krim 0%

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE X I	EE X I x A	SPF	Keterangan
290	2.744	0.015	0.04116	13.7006	Proteksi Maksimal
295	2.067	0.0817	0.16887		
300	1.603	0.2874	0.46070		
305	1.270	0.3278	0.41630		
310	1.047	0.1864	0.19516		
315	0.882	0.0839	0.0740		
320	0.770	0.018	0.01386		
Σ			1.37006		

b. Krim 0,25%

Tabel 5. Nilai SPF Krim 0,25%

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE X I	EE X I x A	SPF	Keterangan
290	3.658	0.015	0.05487	27.77435	Proteksi Ultra
295	3.664	0.0817	0.299349		
300	3.394	0.2874	0.975436		
305	2.763	0.3278	0.905711		
310	2.096	0.1864	0.390694		
315	1.553	0.0839	0.130297		
320	1.171	0.018	0.021078		
Σ			2.777435		

c. Krim 0,5%

Tabel 6. Nilai SPF Krim 0,5%

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE X I	EE X I x A	SPF	Keterangan
290	3.590	0.015	0.05385		
295	3.624	0.0817	0.296081		

300	3.626	0.2874	1.042112	32.82845	Proteksi Ultra
305	3.503	0.3278	1.148283		
310	2.884	0.1864	0.537578		
315	2.111	0.0839	0.177113		
320	1.546	0.018	0.027828		
Σ			3.282845		

d. Krim 1%

Tabel 7. Nilai SPF Krim 1%

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE X I	EE X I x A	SPF	Keterangan
290	3.717	0.015	0.055755	35.56338	Proteksi Ultra
295	3.841	0.0817	0.31381		
300	3.947	0.2874	1.134368		
305	3.730	0.3278	1.222694		
310	3.210	0.1864	0.598344		
315	2.382	0.0839	0.19985		
320	1.751	0.018	0.031518		
Σ			3.556338		

4. Hasil Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi

a. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 0%

Tabel 8. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 0%

Panjang gelombang (nm)	Transmitan Eritema	Fluks Eritema (Fe)	T x Fe	%Te	Ket
292.5 nm	0.588	0.1105	0.064974	5.94041	Proteksi ekstra
297.5 nm	2.186	0.672	1.468992		
302.5 nm	5.317	1.000	5.317		
307.5 nm	9.989	0.2008	2.005791		
312.5 nm	15.278	0.1364	2.083919		
317.5 nm	20.618	0.1125	2.319525		
Σ			13.2602		

Tabel 9. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0%

Panjang gelombang (nm)	Transmitan Pigmentasi (Tp)	Fluks Pigmentasi (Fp)	T x Fp	% Tp	Ket
322.5	10.513	0.1079	1.134353	47.10463	Proteksi ekstra
327.5	19.294	0.102	1.967988		
332.5	29.422	0.0936	2.753899		
337.5	38.404	0.0798	3.064639		
342.5	47.956	0.0669	3.208256		
347.5	59.294	0.057	3.379758		
352.5	69.883	0.0488	3.41029		
357.5	83.262	0.0456	3.796747		
362.5	95.695	0.0356	3.406742		
367.5	110.32	0.031	3.41992		
372.5	121.44	0.026	3.15744		
Σ			32.70003		

b. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 0,25%

Tabel 10. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 0,25%

Panjang gelombang (nm)	Transmitan Eritema	Fluks Eritema (Fe)	T x Fe	%Te	Ket
292.5 nm	0.018	0.1105	0.001989	0.41775	Sunblock Total
297.5 nm	0.027	0.672	0.018144		
302.5 nm	0.088	1.000	0.088		
307.5 nm	0.395	0.2008	0.079316		
312.5 nm	1.628	0.1364	0.222059		
317.5 nm	4.649	0.1125	0.523013		
Σ			0.932521		

Tabel 11. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,25%

Panjang gelombang (nm)	Transmitan Pigmentasi (Tp)	Fluks Pigmentasi (Fp)	T x Fp	% Tp	Ket
322.5	24.816	0.1079	2.677646	34.94331	Proteksi ekstra
327.5	28.688	0.102	2.926176		
332.5	32.186	0.0936	3.01261		
337.5	34.894	0.0798	2.784541		
342.5	37.249	0.0669	2.491958		
347.5	39.207	0.057	2.234799		

352.5	41.246	0.0488	2.012805		
357.5	42.567	0.0456	1.941055		
362.5	43.874	0.0356	1.561914		
367.5	45.260	0.031	1.40306		
372.5	46.580	0.026	1.21108		
Σ			24.25764		

c. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 0,5%

Tabel 12. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 0,5%

Panjang gelombang (nm)	Transmitan Eritema	Fluks Eritema (Fe)	T x Fe	%Te	Ket
292.5 nm	0.018	0.1105	0.001989	0.103605	Sunblock Total
297.5 nm	0.018	0.672	0.012096		
302.5 nm	0.019	1	0.019		
307.5 nm	0.047	0.2008	0.009438		
312.5 nm	0.267	0.1364	0.036419		
317.5 nm	1.354	0.1125	0.152325		
Σ			0.231266		

Tabel 13. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,5%

Panjang gelombang (nm)	Transmitan Pigmentasi (Tp)	Fluks Pigmentasi (Fp)	T x Fp	% Tp	Ket
322.5	9.886	0.1079	1.066699	29.56522	Sunblock Total
327.5	15.684	0.102	1.599768		
332.5	21.657	0.0936	2.027095		
337.5	26.688	0.0798	2.129702		
342.5	31.555	0.0669	2.11103		
347.5	36.6	0.057	2.0862		
352.5	42.109	0.0488	2.054919		
357.5	47.432	0.0456	2.162899		
362.5	52.148	0.0356	1.856469		
367.5	57.891	0.031	1.794621		
372.5	62.876	0.026	1.634776		
Σ			20.52418		

d. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 1%

Tabel 14. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 1%

Panjang gelombang	Transmitan Eritema	Fluks Eritema (Fe)	T x Fe	%Te	Ket
292.5 nm	0.017	0.1105	0.001879	0.06895	Sunblock Total
297.5 nm	0.013	0.672	0.008736		
302.5 nm	0.015	1	0.015		
307.5 nm	0.03	0.2008	0.006024		
312.5 nm	0.16	0.1364	0.021824		
317.5 nm	0.893	0.1125	0.100463		
Σ			0.153925		

Tabel 15. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 1%

Panjang gelombang (nm)	Transmitan Pigmentasi (Tp)	Fluks Pigmentasi (Fp)	T x Fp	% Tp	Ket
322.5	2.717	0.1079	0.293164	16.35179	Sunblock Total
327.5	5.723	0.102	0.583746		
332.5	9.287	0.0936	0.869263		
337.5	12.619	0.0798	1.006996		
342.5	16.178	0.0669	1.082308		
347.5	20.186	0.057	1.150602		
352.5	24.993	0.0488	1.219658		
357.5	30.083	0.0456	1.371785		
362.5	35.401	0.0356	1.260276		
367.5	41.394	0.031	1.283214		
372.5	47.323	0.026	1.230398		
Σ			11.35141		

2. Hasil Evaluasi krim

a. Uji Organoleptik

Tabel 16. Hasil Pengujian Organoleptik krim

Krim	Bentuk	Warna	Bau
F0	Semi padat	Putih	Khas
F1	Semi padat	Pink pucat	Khas

F2	Semi padat	Pink pucat	Khas
F3	Semi padat	Bata	Khas

b. Uji Homogenitas

Tabel 17. Hasil Pengujian Homogenitas krim

Formula krim	Homogenitas
F0	Homogen
F1	Homogen
F2	Homogen
F3	Homogen

c. Uji pH

Tabel 18. Hasil Pengujian pH krim

Formula Krim	pH
F0	6,0
F1	5,9
F2	4,8
F3	4,8

d. Uji daya sebar

Tabel 19. Hasil Pengujian daya sebar krim

Formula krim	Daya sebar (cm)
F0	5,2
F1	5,3
F2	5,5
F3	5,6

e. Uji Viskositas

Tabel 20. Hasil Pengujian viskositas krim

Formula krim	Viskositas (Cps)
F0	59530
F1	40100
F2	28300
F3	19600

Pembahasan

Salah satu tumbuhan yang sudah lama digunakan masyarakat sebagai ramuan obat tradisional untuk penyembuhan adalah tumbuhan kayu tammate (*Lannea coromandelica* (Houtt) Merr). Tumbuhan ini mudah ditemukan di Sulawesi Selatan, tumbuhan ini merupakan tumbuhan liar yang biasa digunakan sebagai tanaman pagar (Paramudita, et al. 2017). Berdasarkan skrining fitokimia kulit batang tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica*) dilaporkan mengandung senyawa golongan karbohidrat, steroid, alkaloid, terpenoid, saponin, tannin, dan flavonoid (Yumita et al. 2019).

Metode ekstraksi yang digunakan yaitu maserasi dikarenakan kulit batang kayu jawa memiliki kandungan flavanoid yang tidak tahan terhadap panas. Ditimbang sebanyak 300 gr simplisia kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) dimasukkan ke dalam wadah maserasi ditambahkan pelarut etanol 70% sebanyak 2 liter (sampai simplisia terendam sepenuhnya) kemudian diaduk, wadah maserasi ditutup dan disimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari (ruangan gelap) selama 3x24 jam (3 hari) dengan pengaduk setiap hari. Dipisahkan antara ampas dan filtrat, kemudian ampas diekstraksi kembali dengan

etanol 70% sebanyak 3x ekstraksi. Filtrat yang diperoleh dari hasil maserasi disaring dengan menggunakan kertas saring untuk memperoleh hasil ekstraksi yang jernih, kemudian filtrat tersebut di rotary evaporator dan diuapkan dengan menggunakan hair dryer sehingga diperoleh ekstrak kental kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*).

Penggunaan etanol sebagai pelarut karena etanol dapat menarik senyawa aktif yang lebih banyak dibandingkan jenis pelarut lainnya. Etanol memiliki titik didih yang rendah yaitu 79 °C sehingga memerlukan panas yang lebih sedikit untuk proses pemekatan. Etanol 70 % merupakan pelarut yang lebih polar dari etanol 96% dan lebih non polar dari etanol 50% sehingga senyawa yang sifatnya polar akan cenderung terlarut lebih banyak dalam etanol 70% (Riwanti, et al. 2018).

Skrining fitokimia dilakukan pada ekstrak kulit batang kayu jawa sebagai analisis kualitatif sebagai gambaran awal untuk mengetahui metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya (Wirdayanti and Sofiyanti 2019). Dilakukan 5 pengujian yakni uji alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin dan terpenoid. Pada pengujian senyawa alkaloid, hasil yang didapatkan setelah penambahan reagen mayer adalah tidak terbentuknya endapan putih, pada penambahan reagen dragendorff tidak terbentuk endapan warna coklat kemerahan, dan pada penambahan reagen wagner tidak terbentuk endapan coklat. Positif alkaloid ditandai dengan adanya endapan putih untuk pereaksi Mayer, endapan cokelat untuk pereaksi Wagner dan endapan cokelat kemerahan untuk pereaksi Dragendorff (Fitriyanti, Nasrudin, and Rudi 2019). Pada pengujian flavonoid,

hasil yang didapatkan setelah penambahan sedikit serbuk Mg dan 1 ml HCl pekat serta dilakukan pengocokan yaitu terbetuknya warna jingga/merah. Jika berubah menjadi warna jingga/merah menunjukkan hasil positif (Reiza, Rijai, and Mahmudah 2019). Pada pengujian terpenoid, hasil yang didapatkan setelah penambahan kloroform dan H_2SO_4 yaitu perubahan warna menjadi coklat kemerahan. Hasil positif mengandung terpenoid ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat kemerahan (Fitriyanti, Nasrudin, and Rudi 2019). Pada pengujian saponin, hasil yang didapatkan setelah ditambahkan 9 ml aquadest, dan dilakukan pengocokan secara vertical selama 10 detik, yaitu menunjukkan adanya busa. Apabila terbentuk busa stabil selama tidak kurang dari 10 detik maka disimpulkan bahwa larutan uji mengandung saponin (Reiza, Rijai, and Mahmudah 2019). Pada pengujian fenolik hasil yang didapatkan setelah penambahan FeCl 1% yaitu perubahan warna menjadi hitam, biru atau ungu. Sampel mengandung fenolik ditandai dengan timbulnya warna hitam (Reiza, Rijai, and Mahmudah 2019). Berdasarkan uraian hasil skrining fitokimia tersebut kulit batang kayu jawa dari ekstrak etanol dapat dikatakan mengandung senyawa flavonoid, fenolik terpenoid, dan saponin.

Kemudian dibuat krim dengan mencampurkan dua fase yaitu fase air dan fase minyak serta penambahan ekstrak kulit batang kayu jawa dengan berbagai konsentrasi untuk mengetahui potensi ekstrak tersebut sebagai tabir surya. Formulasi tabir surya ini menggunakan basis lanolin karena lanolin digunakan dalam formulasi farmasi topikal sebagai bahan dasar krim dan losion emolien (Rowe, et al). Fase minyak dibuat dengan cara melelehkan lanolin, asam stearat,

setil alkohol, span 80 dalam penangas air suhu 70°C, kemudian ditambahkan propil paraben. Fase air kemudian dibuat dengan melarutkan metil paraben dalam air yang dipanaskan hingga 70°C, kemudian ditambahkan TEA dan tween 80. Emulsi dibuat dengan menambahkan fase air ke dalam fase minyak sambil diaduk dalam mortar hingga terbentuk corpus emulsi yang stabil. Kemudian masukkan ekstrak kulit batang kayu jawa secara perlahan dan gerus dalam lumpang sampai diperoleh emulsi yang homogen membentuk krim. Tipe emulsi krim adalah w/o dimana pada saat pencampuran fase minyak sebagai fase eksternal karena dimasukkan terlebih dahulu kemudian fase air sebagai fase internal yang tersebar kedalam minyak (Nurisyah, et al 2020).

Penentuan potensi tabir surya kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) secara in vitro dengan metode spektrofotometri untuk menentukan nilai absorbansi dan nilai transmittan pada tiap panjang gelombang. nilai absorbansi pada panjang gelombang 290-400 nm dengan interval 5 nm dan nilai % transmittan pada panjang gelombang 292,5-372,5 nm dengan interval 5 nm. Penentuan potensi tabir surya ini dilakukan dengan menghitung nilai sun protection factor (SPF), persen transmisi eritema (%Te) dan persen transmisi pigmentasi (%Tp). Penentuan %Te dan SPF adalah untuk menunjukkan efektivitas tabir surya terhadap UV-B, sedangkan untuk %Tp adalah untuk menunjukkan efektivitas tabir surya terhadap UV-A (Juanita and Juliadi 2020).

Dari pengujian didapatkan hasil bahwa krim konsentrasi ekstrak 0% memiliki %Te 5,9404 dan %Tp 47.1046. Pada krim dengan konsentrasi

ekstrak 0,25% memiliki % Te 0,4177 dan % Tp 34,94331. Pada konsentrasi ekstrak krim 0,5% memiliki %Te 0,1036 dan % Tp 29,5622. Krim dengan konsentrasi ekstrak 1% memiliki % Te sebesar 0,0689.dan % Tp sebesar 16.3517. Berdasarkan nilai transmisi eritema dan pigmentasi, dapat disimpulkan bahwa ketiga formulasi krim ini termasuk dalam kategori *sunblock / total block* untuk eritema karena berada pada range (<1 %). Sementara persen transmisi pigmentasi berada dalam kategori *sunblock / total block* karena berada pada range (3-40 %). Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka nilai persen transmisi eritema (% Te) dan persen transmisi pigmentasi (% Tp) semakin rendah. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas antioksidan dari ekstrak kulit batang kayu jawa yang dapat mencegah terjadinya eritema dan pigmentasi (Restika, 2017).

Pengujian *Sun Protection Factor* (SPF) bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu tabir surya dalam menyerap radiasi yang mengenai kulit. SPF adalah nilai yang menunjukkan kekuatan tabir surya dalam melindungi kulit dari sengatan sinar UV. Pengujian SPF dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 290-320 nm setiap interval 5 nm (Harjanti and Nilawati 2020).

Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak kulit batang kayu jawa maka nilai SPF sediaan semakin tinggi, dimana pada konsentrasi ekstrak 0% memiliki nilai SPF sebesar 13.7000 dalam hal ini termasuk proteksi minimal , ekstrak dengan konsentrasi 0,25 % diperoleh nilai SPF sebesar 27.7743 dalam hal ini termasuk dalam kategori *ultra* dengan

range 20, ekstrak dengan konsentrasi 0,5% dengan nilai SPF sebesar 32.8284 sehingga dalam hal ini termasuk dalam kategori *ultra* dengan range 20, sedangkan krim dengan konsentrasi ekstrak 1% dengan nilai SPF sebesar 35.5633 sehingga dalam hal ini termasuk dalam kategori *ultra* dengan range lebih dari 20. Bahan tambahan dalam sediaan mempengaruhi aktivitas ekstrak, karena sediaan dapat menghambat pelepasan kandungan senyawa aktif dari ekstrak untuk berdifusi ke dalam media, sehingga ekstrak yang terkandung dalam sediaan tidak terlepas sepenuhnya dalam media. Oleh karena itu, aktivitas sediaan yang diperoleh lebih rendah daripada aktivitas ekstraknya (Ramdani, et al 2021).

Selanjutnya dilakukan evaluasi fisik sediaan krim yaitu uji organoleptis untuk melihat tampilan fisik sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Berdasarkan hasil yang diperoleh, bentuk sediaan berupa setengah padat dengan warna pink pucat dan bau yang khas. Warna yang dihasilkan oleh krim ekstrak kulit batang kayu jawa tergantung dari konsentrasi krim yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka warna krim semakin gelap.

Uji homogenitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya bagian-bagian yang belum tercampur dengan baik dalam komposisi krim. Berdasarkan hasil pengujian krim 0%, 0,25%, 0,5%, dan 1% menunjukkan krim homogen yang dibuktikan dengan tidak adanya gumpalan pada krim.

Uji pH dilakukan pada ketiga krim untuk mengetahui keamanan sediaan krim saat digunakan, sehingga krim tidak menimbulkan iritasi pada kulit. pH

kulit yaitu 4,5-6,5 (Nurisyah, et al 2020). Agar sediaan aman dan cocok dengan kulit, maka sediaan harus berada pada rentang pH tersebut agar tidak terjadi iritasi kulit. Pengujian pH dari keempat krim ekstrak kulit batang kayu jawa didapatkan hasil nilai pH yang diinginkan dan aman untuk kulit yakni krim 0% berada pada pH 6,0, krim 0,25% berada pada pH 5,9 , krim 0,5% berada pada pH 4,8, dan krim 1% berada pada pH 4,8.

Uji daya sebar bertujuan untuk mengetahui kelunakan massa krim sehingga dapat dilihat kemudahan pengolesan sediaan ke kulit. Daya sebar yang baik menyebabkan kontak antara obat dengan kulit menjadi luas, sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung cepat. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal adalah 5-7 cm (Tungadi, et al 2023). Pengujian daya sebar pada krim didapatkan hasil yakni krim 0% memiliki daya sebar 5,2 cm, krim 0,25% dengan daya sebar 5,3 cm, krim 0,5 memiliki daya sebar 5,5 cm . Sedangkan krim 1% memiliki daya sebar 5,6 cm. Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan daya sebar berbanding lurus dengan nilai viskositas yang ditunjukkan pada setiap formula. Viskositas krim tersebut semakin menurun selama penyimpanan sehingga tahanan cairan untuk mengalir semakin berkurang sehingga daya sebar krim meningkat (Swastika, et al 2013). Semakin besar daya sebar, luas permukaan kulit yang kontak dengan krim akan semakin luas dan zat aktif akan terdistribusi dengan baik. Krim yang baik memiliki nilai daya sebar yang besar sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah pada permukaan kulit yang luas tanpa penekanan yang berlebihan.

Uji viskositas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kekentalan pada sediaan krim. Pengukuran viskositas dilakukan dengan menggunakan viskometer *Brookfield*. Hasil penelitian menunjukkan nilai viskositas krim 0% sebesar 59530 cPs, nilai viskositas krim 0,25% sebesar 40100 cPs, nilai viskositas krim 0,5% sebesar 28300 cPs sedangkan nilai viskositas krim 1% sebesar 19600 cPs. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak kulit batang kayu jawa dalam sediaan krim maka semakin tinggi juga nilai viskositasnya. Menurut SNI 16-4399-1996 tentang standar mutu sediaan krim tabir surya, viskositas sediaan yang baik berkisar antara 2000- 50.000 cPs, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga krim tersebut memenuhi standar viskositas yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Evaluasi fisik krim tabir surya ekstrak kulit batang kayu jawa krim memenuhi syarat evaluasi sediaan ya pengujian organoleptik, homogenitas, pH, daya sebar dan viskositas krim.
2. Konsentrasi ekstrak kulit batang kayu jawa yang efisien sebagai tabir surya yakni krim dengan konsentrasi ekstrak 1%.

B. Saran

Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan perbandingan basis dan mengubah karakteristik fisik krim sehingga baik di nilai pasaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al- Syeikh. Cet.4, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8, Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2019
- Athiyah, Meilisa; Islamuddin Ahmad; Laode Rijai. Aktivitas Tabir Surya Ekstrak Akar Bandotan (*Ageratum conyzoides* L.). Jurnal Sains dan Kesehatan Vol.1 No.4. 2015.
- Badan POM RI, 2009, Bahan Berbahaya Dalam Kosmetik, In: Kosmetik Pemutih (Whitening), Naturakos, Vol. III No.8. Edisi Agustus 2008, Jakarta.
- Balsam, M.S.,1972, Cosmetic Science and Technology, Edisi Kedua, New York, John Willy and Son Inc, 179-218
- Damogalad, Viondy, Hosea Jaya Edy, And Hamidah Sri Supriati. 2013. "Formulasi Krim Tabir Surya Ekstrak Kulit Nanas (*Ananas Comosus* L Merr) Dan Uji In Vitro Nilai Sun Protecting Factor (Spf)." *Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi – Unsrat* 2(02): 2302–2493.
- Fitriyanti, Nasrudin, And La Rudi. 2019. "Fitokimia Dan Aktivitas Antioksidan Kombinasi Imbang Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea Coromandelica*) Dan Rimpang Jahe Emprit (*Zingiber Officinale* Var. *Rubrum*)." *Jurnal Pendidikan Kimia Universita Halu Oleo* 4(2): 102–9.
- Hakim, Zainur Rahman, Dewi Meliana, And Pri Iswati Utami. 2020. "Formulasi Dan Uji Sifat Fisik Sediaan Lulur Krim Dari Ekstrak Etanol Daun Sirsak (*Annona Muricata* L.) Serta Penentuan Aktivitas Antioksidannya." *Jurnal Sains Farmasi & Klinis* 7(2): 135.
- Harjanti, Reslely, And Anita Nilawati. 2020. "Aktivitas Antioksidan Dan Potensi Tabir Surya Serum Ekstrak Terpurifikasi Daun Wangon (*Olex Psittacorum* (Willd.) Vahl.)" *Jurnal Farmasi Indonesia* 17(1): 18–28.
- Ismail, Isriany Et Al. 2014. "Formulasi Dan Penentuan Nilai Spf (Sun Protection Factor) Sediaan Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum Sanctum* L.)." *Jurnal Farmasi Uin Alauddin Makassar* 2(1): 6–11.
- Ismail, Isriany, Gemy Nastity Handayany, A Armisman, And Watri Ratnasari. 2015. "Formulasi Dan Uji Efektifitas Antioksidan Krim Ekstrak Etanol Korteks Kayu Jawa (*Lannea Caromandelica* (Houtt) Merr.) Dengan Metode Dpph." *Jf Fik Uinam* 2(3): 93–98.
- Juanita, Rr. Asih, And Debby Juliadi. 2020. "Penetapan Potensi Tabir Surya Krim Ekstrak Etanol Daun Ceremai (*Phyllanthus Acidus* L.) Dengan Spektrofotometri Uv-Vis." *Jurnal Farmagazine* 7(1): 51.
- Lumentut, Natalia, Hosea Jaya Edi, And Erladys Melindah Rumondor. 2020.

- “Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Krim Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Goroho (*Musa Acuminata* L.) Konsentrasi 12.5% Sebagai Tabir Surya.” *Jurnal Mipa* 9(2): 42.
- Maulida, A. N. (2015). Uji Efektivitas Krim Ekstrak Temu Giring (*Curcuma heyneana* Val.) sebagai Tabir Surya secara In Vitro.
- Mektildis, Rosalia. 2018. “Formulasi Krim Ekstrak Etanol Kulit Batang Faloak (*Sterculia Quadrifida* R.Br).” *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia* Vol.1(10): 27.
- Minerva, Prima. 2019. “Penggunaan Tabir Surya Bagi Kesehatan Kulit.” *Jurnal Pendidikan Dan Keluarga* 11(1): 87.
- Muhammad Tahir, Muhammad Tahir, And Winda. 2023. “Pengaruh Penggunaan Jumlah Gula Terhadap Uji Hedonik Serbuk Instan Batang Kayu Jawa (*Lannea Coromandelica* (Houtt) Merr).” *Jurnal Kesehatan Yamsi Makassar* 7(1): 89–100.
- Mukhriani. 2014. ““Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, Dan Identifikasi Senyawa Aktif,” J. Kesehat., Vol. Vii, No. 2, P. 361, 2014.” *J. Kesehat.* Vii(2): 361. <https://doi.org/10.1007/S11293-018-9601-Y>.
- Nasution, Musyirna Rahmah, Afrida Yeti, And Bella Ardhiyati. 2021. “Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Etanol Daun Tenggek Burung (*Euodia Redlevi*) Secara In Vitro.” *Jops (Journal Of Pharmacy And Science)* 4(2): 44–51.
- Nur Saadah Daud, Musdalipah. 2018. “Optimasi Formula Losio Tabir Surya Ekstrak Kulit Buah Naga Super Merah (*Hylocereus Costaricensis*).” 15(01): 26–37.
- Nurisyah, Nurisyah Nurisyah, Asyari Asyikin, And Harpolia Cartika. 2020. “Aktivitas Antioksidan Krim Ekstrak Etil Asetat Kulit Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*) Yang Ditetapakan Dengan Metode Dpph.” *Media Farmasi* 16(2): 215.
- Paramudita, A Eka, Ramdani, And Iwan Dini. 2017. “Isolasi Dan Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak N- Heksana Kulit Batang Kayu Jawa *Lannea Coromandelica* (Houtt) Merr.” *Jurnal Chemica* 18(1): 64–75.
- Pramiastuti, Oktariani. 2019. “Penentuan Nilai Spf (Sun Protection Factor) Ekstrak Dan Fraksi Daun Kecombrang (*Etlingera Elatior*) Secara In Vitro Menggunakan Metode Spektrofotometri.” *Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi* 8(1): 14.
- Pratiwi, A.R, Yusran, And Islawati. 2023. “Analisis Kadar Antioksidan Pada Ekstrak Daun Binahong Hijau *Anredera Cordifolia* (Ten.) Steenis.” *Bioma : Jurnal Biologi Makassar* 8(August 2022): 66–74.


<https://journal.unhas.ac.id/index.php/bioma>.

- Qonitah, Fadilah, Reni Ariastuti, Nurul Astia Wuri, And Pratiwi Maharani. 2022. "Evaluasi Fisik Formula Krim Yang Mengandung Ekstrak Etanol Daun Jeruk Purut (Citrus Hystrix)." 2: 10–16.
- Rahmi, Hayatul. 2017. "Review: Aktivitas Antioksidan Dari Berbagai Sumber Buah-Buahan Di Indonesia." *Jurnal Agrotek Indonesia* 2(1): 34–38.
- Ramdani, Yuyun, Agus Dwi Ananto, And Wahida Hajrin. 2021. "Variasi Metode Ekstraksi Dan Penetapan Nilai Spf Ekstrak Rumput Laut Merah (Eucheuma Cottonii)." *Acta Pharmaciae Indonesia : Acta Pharm Indo* 9(1): 31.
- Reiza, Inul Ahmanda, Laode Rijai, And Febrina Mahmudah. 2019. "Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit Nanas (Ananas Comosus (L.) Merr)." *Proceeding Of Mulawarman Pharmaceuticals Conferences* 10: 104–8.
- Riwanti, Pramudita, Farizah Izazih, And Amaliyah Amaliyah. 2018. "Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Etanol Pada Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol 50,70 Dan 96% Sargassum Polycystum Dari Madura." *Journal Of Pharmaceutical-Care Anwar Medika* 2(2): 35–48.
- Rowe, Raymond C, Paul J Sheskey, And Marian E Quinn. 2020. "Handbook Of Pharmaceutical Excipients." *Remington: The Science And Practice Of Pharmacy*: 633–43.
- Saryanti, Dwi, Iwan Setiawan, And Romadona Ayu Safitri. 2019a. "Optimasi Formula Sediaan Krim M/A Dari Ekstrak Kulit Pisang Kepok (Musa Acuminata L.) Optimization Of M / A Cream Formula From Kepok Banana Peel (Musa Acuminata L .) Extract." *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia* 1(3).
- Sudarwati, Tri Puji Lestari, And M.A Hanny Ferry Fernanda. 2019. *Aplikasi Pemanfaatan Daun Pepaya (Carica Papaya) Sebagai Biolarvasida Terhadap Larva Aedes Aegypti*.
- Sugihartini, N. 2011. Optimasi Komposisi Tepung Beras dan Fraksi Etanol Daun Sendok (Plantago major L.) dalam Formulasi Tabir Surya dengan Metode Simplex Lattice Design. *Jurnal Ilmiah Kefarmasian*. 1(2).
- Swastika, Alissya, Mufrod, And Purwanto. 2013. "Antioxidant Activity Of Cream Dosage Form Of Tomato Extract (Solanum Lycopersicum L.)." *Traditional Medicine Journal* 18(3): 2013.
- Tungadi, Robert, Mahdalena Sy. Pakaya, And Piliya Wati D.As'ali. 2023. "Formulasi Dan Evaluasi Stabilitas Fisik Sediaan Krim Senyawa Astaxanthin." *Indonesian Journal Of Pharmaceutical Education* 3(1): 117–24.


- Wahyuddin, Munifah Et Al. 2020. "Formulasi Dan Uji Stabilitas Krim Antioksidan Sari Buah Naga Merah (*Hylocereus Polyrhizus*) Dengan Menggunakan Variasi Emulgator." *Jurnal Farmasi Uin Alauddin Makassar* 8(1): 21–31.
- Wandita, Galuh Ayu, And Ida Musfiroh. 2018. "Review Artikel: Tanaman Suku Zingiberaceae Yang Memiliki Aktivitas Sebagai Antioksidan." *Farmaka* 16(2): 564–71.
- Werdhawati, Asri. 2014. "Peran Antioksidan Untuk Kesehatan." *Biotek Medisiana Indonesia* 3(1): 59–68.
- Whenny; Rolan Rusli; Laode Rijai. Aktivitas Tabir Surya Ekstrak Daun Cempedak (*Artocarpus champeden Spreng*). *Jurnal Sains dan Kesehatan*. Vol.1 No.4.2015.
- Widyastuti.Rizqi Ikhwanda Fratama. Ade Seprialdi. Pengujian Aktivitas Antioksidan dan Tabir Surya Ekstrak Etanol Kulit Buah Naga Super Merah (*Hylocereus costaricensis* (F.A.C. Weber) Britton & Rose). *Scientia* Vol.5 No.2. 2015
- Wirdayanti, And Nery Sofiyanti. 2019. "Skrining Fitokimia Lima Jenis Tumbuhan Paku Polypodiaceae Dari Provinsi Riau Phytochemical Screening Of Five Species Of Polypodiaceae Ferns From Riau Province." *Biota* 4(2): 40–49.
- Yumita, Yumita, Abdul Rahman Razak, Indriani, And Syaiful Bahri. 2019. "Analisis Klt Bioautografi Ekstrak Kulit Batang Tanaman Kayu Jawa (*Lannea Coromandelica*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus Aureus* Dan *Shigella Dysentriae*." *Kovalen: Jurnal Riset Kimia* 5(2): 191–96.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian




Lampiran 2. Skema Ekstraksi




Lampiran 3. Skema Prosedur Pembuatan Krim

Lampiran 4. Skema Pengujian Sediaan Krim


a. Uji Organoleptis



b. Uji Homogenitas




c. Uji pH




d. Uji Daya Sebar




e. Uji Viskositas




Lampiran 5. Skema Uji Potensi Tabir Surya

Lampiran 6. Skema Uji Fitokimia


a. Uji Alkaloid




b. Uji Flavonoid




c. Uji Fenolik



d. Uji Saponin



e. Uji Terpenoid



Lampiran 7. Perhitungan Kadar 4000 ppm

$$\text{Ppm} = \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}}$$

$$4000 \text{ ppm} = \frac{\mu\text{g}}{25 \text{ ml}}$$

$$\mu\text{g} = 4000 \text{ ppm} \times 25 \text{ ml}$$

$$\mu\text{g} = 100000$$

$$\mu\text{g} = 100 \text{ mg} \approx 0,1 \text{ gram}$$

Lampiran 8. Perhitungan Nilai SPF Krim

a. Krim 0%

$$\text{SPF} = \text{CF} \times \sum_{320}^{290} \text{EE}(\lambda) \times \text{I}(\lambda) \times \text{A}(\lambda)$$

$$\text{SPF} = \text{CF} \times \sum_{320}^{290} 0,0411+0,1688+0,4607+0,4163+0,1951+0,0740+0,0138$$

$$\text{SPF} = 10 \times 1,3700$$

$$\text{SPF} = 13.7000$$

b. Krim 0,25%

$$\text{SPF} = \text{CF} \times \sum_{320}^{290} \text{EE}(\lambda) \times \text{I}(\lambda) \times \text{A}(\lambda)$$

$$\text{SPF} = \text{CF} \times \sum_{320}^{290} 0,0548+0,2993+0,9754+0,9057+0,3906+0,1302+0,0210$$

$$\text{SPF} = 10 \times 2,7774$$

$$\text{SPF} = 27,7743$$

c. Krim 0,5 %

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times A(\lambda)$$

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} 0,0538+0,2960+1,0421+1,1482+0,5375+0,1771+0,0278$$

$$SPF = 10 \times 3,2828$$

$$SPF = 32,8284$$

d. Krim 1%

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times A(\lambda)$$

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} 0,0557+0,3138+1,1343+1,2226+0,5983+0,1998+0,0315$$

$$SPF = 10 \times 3,5563$$

$$SPF = 35,5633$$

Lampiran 9. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0%

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma (T \times Fe)}{\Sigma fe}$$

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma (0,0649+1,4689+5,3170+2,005+2,0839+2,3195)}{2,2322}$$

$$\% Te = \frac{13,2602}{2,2322}$$

$$\% Te = 5,9404$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi

$$\% T_p = \frac{E_p}{\Sigma f_p} = \frac{\Sigma (T \times F_p)}{\Sigma f_p}$$

$$\% T_p = \frac{E_p}{\Sigma f_p} = \frac{\Sigma (1,1343+1,9679+2,7538+3,0646+3,2082+3,3797+3,4102+3,7967+3,4067+3,4199+3,1574)}{0,6942}$$

$$\% T_p = \frac{32,7000}{0,6942}$$

$$\% T_p = 47,1046$$

Lampiran 10. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,25%

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% T_e = \frac{E_e}{\Sigma f_e} = \frac{\Sigma (T \times F_e)}{\Sigma f_e}$$

$$\% T_e = \frac{E_e}{\Sigma f_e} = \frac{\Sigma (0,0019+0,0181+0,088+0,0793+0,222+0,5230)}{2,2322}$$

$$\% T_e = \frac{0,9325}{2,2322}$$

$$\% T_e = 0,4177$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi

$$\% T_p = \frac{E_p}{\Sigma f_p} = \frac{\Sigma (T \times F_p)}{\Sigma f_p}$$

$$\% T_p = \frac{E_p}{\Sigma f_p} = \frac{\Sigma (2,6776+2,9261+3,0126+2,7845+2,4919+2,2347+2,0128+1,9410+1,5619+1,4030+1,2110)}{0,6942}$$

$$\% T_p = \frac{24,2576}{0,6942}$$

$$\% T_p = 34,9433$$

Lampiran 11. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,5%

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma (T \times Fe)}{\Sigma fe}$$

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma (0,0019+0,0120+0,018+0,0094+0,0364+0,1523)}{2,2322}$$

$$\% Te = \frac{0,2312}{2,2322}$$

$$\% Te = 0,1036$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi

$$\% Tp = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma (T \times Fp)}{\Sigma fp}$$

$$\% Tp = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma (1,0666+1,5997+2,0270+2,1297+2,1110+2,0862+2,0549+2,1628+1,8564+1,7946+1,6347)}{0,6942}$$

$$\% Tp = \frac{20,5241}{0,6942}$$

$$\% Tp = 29,5652$$

Lampiran 12. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim 1%

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma (T \times Fe)}{\Sigma fe}$$

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma(0,0018+0,0087+0,015+0,0060+0,0218+0,1004)}{2,2322}$$

$$\% Te = \frac{0,1539}{2,2322}$$

$$\% Te = 0,0689$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi


$$\% Tp = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma (T \times Fp)}{\Sigma fp}$$

$$\% Tp = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma (0,2931+0,5837+0,8692+1,0069+1,0823+1,1506+1,2196+1,3717+1,2602+1,2832+1,2303)}{0,6942}$$

$$\% Tp = \frac{11,3514}{0,6942}$$

$$\% Tp = 16,3517$$

Lampiran 13. Hasil Uji SPF Krim 0%



Gambar 5. Kurva Pengujian SPF Krim 0%

Scanning
Test Name: _Defaul
18:09


Wavelength	Abs
290.0	2.744
295.0	2.067
300.0	1.603
305.0	1.270
310.0	1.047
315.0	0.882
320.0	0.770

The table provides specific absorbance values at 5 nm intervals from 290.0 nm to 320.0 nm. The absorbance values decrease as the wavelength increases, which is consistent with the trend shown in the graph in Gambar 5.

Gambar 6. Nilai Absorbansi Krim 0%

UNIVERSITAS ISLAM KECER
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 14. Hasil Uji SPF Krim 0,25%



Gambar 7. Kurva Pengujian SPF Krim 0,25

Scanning
Test Name: EM
7:19pm 8Jan24


Wavelength	Abs
290.0	3.658
295.0	3.664
300.0	3.394
305.0	2.763
310.0	2.096
315.0	1.553
320.0	1.171

ID#: 1
Baseline collected 8Jan24

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Gambar 8. Nilai Absorbansi Krim 0,25%

Lampiran 15. Hasil Uji SPF Krim 0,5%



Gambar 9. Kurva Pengujian SPF Krim 0,5%

Scanning
Test Name: EM
6:57pm 8Jan24


Wavelength	Abs
290.0	3.590
295.0	3.624
300.0	3.626
305.0	3.503
310.0	2.884
315.0	2.111
320.0	1.546

ID#: 1
Baseline collected 8Jan24

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

The table provides specific absorbance values at 5 nm intervals from 290.0 to 320.0 nm. The values show a general downward trend as the wavelength increases, with a slight peak at 300.0 nm.

Gambar 10. Nilai Absorbansi Krim 0,5%


Lampiran 16. Hasil Uji SPF Krim 1%**Gambar 11 .Kurva Pengujian SPF Krim 1%**

The table displays the scanning results for SPF Krim 1%. The x-axis represents Wavelength (nm) from 290.0 to 320.0. The y-axis represents Absorbance (Abs) from 1.640 to 3.060. The curve shows a peak absorbance of approximately 3.060 at 290.0 nm, which decreases as the wavelength increases to 320.0 nm. The test name is EM, and the baseline was collected on 8Jan24.

Wavelength	Abs
290.0	3.717
295.0	3.841
300.0	3.947
305.0	3.730
310.0	3.210
315.0	2.382
320.0	1.751

Gambar 12 .Nilai Absorbansi Krim 1 %

Lampiran 17. Hasil Uji Eritema Krim 0%



Gambar 13 .Kurva Persen Transmisi Eritema 0%

Scanning
Test Name: Default 18:18 190ct22


Wavelength	%T
292.5	0.597
297.5	2.192
302.5	5.320
307.5	9.960
312.5	15.202
317.5	20.523

ID#: 1
Baseline collected 190ct22

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Gambar 14 .Persen Transmisi Eritema 0%

Lampiran 18. Hasil Uji Eritema Krim 0.25%



Gambar 15. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 0,25%

Scanning
Test Name: EM
7:22pm 8Jan24

Wavelength	%T
292.5	0.018
297.5	0.027
302.5	0.088
307.5	0.395
312.5	1.628
317.5	4.649

ID#: 1
Baseline collected 8Jan24

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample


The figure is a table showing the percentage of light transmission (%T) as a function of wavelength (nm) for Eritema Krim 0.25%. The table has two columns: 'Wavelength' and '%T'. The data points are as follows:

Wavelength	%T
292.5	0.018
297.5	0.027
302.5	0.088
307.5	0.395
312.5	1.628
317.5	4.649

The table is titled 'Scanning' and 'Test Name: EM'. The date and time are '8Jan24' at '7:22pm'. The ID is '1' and the baseline was collected on '8Jan24'. The table is part of a software interface with buttons for 'Collect', 'Graph', 'Edit', 'Measure', 'Baseline', 'Data', and 'Sample'.

Gambar 16 .Persen Transmisi Eritema Krim 0,25%

Lampiran 19. Hasil Uji Eritema Krim 0,5%



Gambar 17. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 0,5%

Scanning
Test Name: EM
7:11pm 8Jan24


Wavelength	%T
292.5	0.018
297.5	0.018
302.5	0.019
307.5	0.047
312.5	0.267
317.5	1.354

ID#: 1
Baseline collected 8Jan24

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Gambar 18 .Persen Transmisi Eritema Krim 0,5%

Lampiran 20. Hasil Uji Eritema Krim 1%



Gambar 19 .Kurva Persen Eritema Krim 1%

Scanning
Test Name: EM
7:32pm 8Jan24

Wavelength	%T
292.5	0.017
297.5	0.013
302.5	0.015
307.5	0.030
312.5	0.160
317.5	0.893


ID#: 1
Baseline collected 8Jan24

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

The table provides the specific data points for the scanning test, showing a significant increase in %T at higher wavelengths, particularly at 317.5 nm.

Gambar 20. Persen Transmisi Eritema Krim 1%

Lampiran 21. Hasil Uji Pigmentasi Krim 0%



Gambar 21 .Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0%

Scanning
Test Name: EM
7:44pm 8Jan24

Wavelength	%T
322.5	10.513
327.5	19.294
332.5	29.422
337.5	38.404
342.5	47.956
347.5	59.294
352.5	69.883
357.5	83.262
362.5	95.695
367.5	110.32

ID#: 1
Baseline collected 8Jan24

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Scanning
Test Name: EM
7:44pm 8Jan24


Wavelength	%T
372.5	121.44

ID#: 1
Baseline collected 8Jan24

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Gambar 22. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0%

Lampiran 22. Hasil Uji Pigmentasi Krim 0,25%



Gambar 23 .Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,25%

Scanning
Test Name: _Defaul
18:23 190ct22

Wavelength	%T
322.5	24.816
327.5	28.688
332.5	32.186
337.5	34.894
342.5	37.249
347.5	39.207
352.5	41.246
357.5	42.567
362.5	43.874
367.5	45.260

ID#: 1
Baseline collected 190ct22

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

The figure shows a table of transmittance data on a handheld device screen. The table has two columns: 'Wavelength' and '%T'. It lists 11 data points from 322.5 nm to 367.5 nm in 5 nm increments. The %T values range from 24.816 to 45.260. The screen also shows the test name as '_Defaul' and the time as 18:23 on 190ct22.

Scanning
Test Name: _Defaul
18:23 190ct22

Wavelength	%T
372.5	46.580


ID#: 1
Baseline collected 190ct22

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

The figure shows a single data point from the transmittance table on a handheld device screen. The table has two columns: 'Wavelength' and '%T'. It lists one data point at 372.5 nm with a %T value of 46.580. The screen also shows the test name as '_Defaul' and the time as 18:23 on 190ct22.

Gambar 24. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,25%

Lampiran 23. Hasil Uji Pigmentasi Krim 0,5%



Gambar 25 .Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,5%

Scanning
Test Name: EM
7:24pm 8Jan24

Wavelength	%T
322.5	9.886
327.5	15.684
332.5	21.657
337.5	26.688
342.5	31.555
347.5	36.600
352.5	42.109
357.5	47.432
362.5	52.148
367.5	57.891

ID#: 1
Baseline collected 8Jan24

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Scanning
Test Name: EM
7:24pm 8Jan24

Wavelength	%T
322.5	9.886
327.5	15.684
332.5	21.657
337.5	26.688
342.5	31.555
347.5	36.600
352.5	42.109
357.5	47.432
362.5	52.148
367.5	57.891
372.5	62.876


ID#: 1
Baseline collected 8Jan24

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

esc 1 2 3 clear

Gambar 26 .Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,5%

Lampiran 24. Hasil Uji Pigmentasi Krim 1%



Gambar 27. Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 1%

Scanning
Test Name: EM
7:36pm 8Jan24

Wavelength	%T
322.5	2.717
327.5	5.723
332.5	9.287
337.5	12.619
342.5	16.178
347.5	20.186
352.5	24.993
357.5	30.083
362.5	35.401
367.5	41.394

ID#: 1
Baseline collected 8Jan24

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Scanning
Test Name: EM
7:36pm 8Jan24

Wavelength	%T
372.5	47.323

ID#: 1
Baseline collected 8Jan24

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample


Gambar 28 .Persen Transmisi Pigmentasi Krim 1%

Lampiran 25. Hasil Evaluasi Uji Organoleptik Krim




Gambar 29 .Hasil Uji Organoleptik Krim (0%, 0,25%, 0,5%, 1 %)

Lampiran 26. Hasil Evaluasi Uji Homogenitas Krim




Gambar 30. Hasil Uji Homogenitas Krim Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa

Lampiran 27. Hasil Evaluasi Uji pH Krim



Gambar 31 .Hasil Uji pH Krim Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa

Lampiran 28. Hasil Evaluasi Uji Daya Sebar Krim



Gambar 32 .Hasil Uji pH Krim Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa

Lampiran 29. Hasil Evaluasi Uji Viskositas Krim



Gambar 33 .Hasil Uji pH Krim Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa

M A K A S S A R

Lampiran 30. Hasil Pengujian Fitokimia

Gambar 34. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit Batang Kayu Jawa

RIWAYAT HIDUP PENELITIAN



Nur Azizah dilahirkan di Puurau pada tanggal 03 April 2001. Peneliti merupakan anak ketiga dari pasangan (Alm) Haris dan Hana, dan memiliki dua orang kakak bernama Ifan Afandi dan Nurfaiza sat orang adik bernama Muh Ikhsan. Saat ini peneliti berdomisili di Gowa di Kompleks Graha Surandar Blok A/1.

Peneliti memulai jenjang pendidikan di TK Pertiwi Kolaka pada tahun 2006, kemudian melanjutkannya di SD Negeri 3 Laloeha pada tahun 2007-2012, dan memasuki SMP Negeri 3 Pakue pada tahun 2013-2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pakue pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di kampus peradaban Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR