

**GAMBARAN FAKTOR RISIKO KEJADIAN HIV-AIDS PADA USIA
PRODUKTIF DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU DAN
RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
PERIODE MEI 2011 – APRIL 2012**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh :

ANGGI ANGRAINI ZAINUL
NIM : 70400009002

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.


Samata- Gowa, Agustus 2012

Penyusun



Anggi Angraini Zainul

70400009002



HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Anggi Angraini Zainul

NIM : 70400009002

Judul : Gambaran Faktor Risiko Kejadian HIV-AIDS Pada Usia
Produktif di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr.
Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode 2011-2012

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI) Program DIII Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Makassar, Agustus 2012

Pembimbing,


dr. Rini Fitriani, M.Kes


NIP : 19800808 200801 2 021

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH


Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Gambaran Faktor Risiko Kejadian HIV- AIDS di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode 2011-2012**” yang disusun oleh **Anggi Angraini Zainul**, Nim: **70400009002**, mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian hasil yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).


Samata-Gowa, 23 Agustus 2012
05 Syawal 1433 H


DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr.dr.H.Rasjidin Abdullah, MPH., MH.Kes (... )

Sekretaris : Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb (... )


Pembimbing : dr. Rini Fitriani, M. Kes (... )

Penguji I : dr. Nadyah Haruna, M.Kes (... )

Penguji II : Drs. Supardin, M.HI (... )

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes
NIP. 19530119 1981 101001

QUOTATIONS

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ أَتُكذِّبَانِ

(Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?)

(Q.S. Al- Rahman/55:13)

“Malu itu sebagian dari iman. Jika kamu tidak merasa malu, maka kerjakanlah apa yang engkau suka”

(Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam)

“Seseorang itu menjadi bahan cerita setelah ia berlalu, maka jadilah bahan cerita yang baik bagi orang sadar”

(Ibnu Duraid Al- Urdi)

“Flow just like a water, that’s a life. so, make your water flows to the right place”

(Author)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

ABSTRAK

Penulis : Anggi Angraini Zainul
NIM : 70400009002
Pembimbing : dr. Rini Fitriani, M.Kes
Judul : **Gambaran Faktor Risiko Kejadian HIV-AIDS pada Usia Produktif di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode 2011-2012**

Insiden HIV-AIDS telah menjadi permasalahan dunia yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Rata-rata penderita HIV-AIDS berada pada usia produktif. Hal ini akan berdampak terhadap pembangunan nasional yang akan mengancam kehidupan penduduk bahkan kehidupan sebuah bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor risiko kejadian HIV-AIDS pada usia produktif. Metode penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Populasi adalah semua penderita HIV-AIDS usia produktif yang terdaftar di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sampel dipilih berdasarkan data sekunder dan diperoleh 40 kasus di Puskesmas Jumpandang Baru dan 132 kasus di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 129 kasus (75%) penderita HIV-AIDS beragama Islam, dan Non Islam sebanyak 43 kasus (25%). Perilaku heteroseksual adalah faktor risiko terbanyak yakni sebanyak 87 kasus (51%), yang kedua adalah IDU yaitu sebesar 40% (69 orang). Kelompok usia produktif terbanyak di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar adalah usia 29-34 tahun, yakni sebanyak 64 kasus (37%).

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, bersikap saling setia terhadap pasangan seksual, menghindari penggunaan jarum suntik secara bersama-sama, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha Esa adalah cara yang terbaik dalam mencegah penularan HIV-AIDS. tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa diperlukan kerjasama diantara semua komunitas pelayanan yang terkait terutama dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial untuk melakukan penyuluhan, dan konseling dalam memberdayakan masyarakat guna mengurangi angka kejadian HIV-AIDS.

Daftar Pustaka : 44 literatur (2001-2012)
Kata Kunci : heteroseksual, HIV-AIDS, IDUs, usia produktif

ABSTRACT

Author : Anggi Anraini Zainul
NIM : 70400009002
Instructure : dr. Rini Fitriani, M.Kes
Title : Description of Risk Factors for HIV-AIDS Incidents in Productive Age at Jumpandang Baru Health Center and RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Period 2011-2012

The incidents of HIV-AIDS has become world's problem that require treatment in a comprehensive manner. The average sufferers of HIV-AIDS was in a productive age. It can impact on national development which threat the lives of people even the life of a nation.

This study was aimed to know the description of risk factors for incident HIV-AIDS in productive age. Method of the study is descriptive with used purposive sampling. Population is all of HIV-AIDS sufferers who was in a productive age that listed at Jumpandang Baru Health Center and RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sample was selected using a secunder data and obtained 40 cases in Jumpandang Baru Health Centers and 132 cases in RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo.

The results showed that 129 cases (75%) of HIV-AIDS sufferers were muslim and other religion were 43 people (25%). Heterosexual behavior is the highest risk factor in 87 cases (51%), and the secondary risk factor is IDUs as many 69 cases (40%). The most productive age group in Jumpandang Baru Heath Center and RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar is 29-34 years old in 64 cases (37%).

Based on the results, it suggested that not having sex outside marriage, being faithful to each spouse, avoiding in sharing needles and being closer to Almighty God is the best way to prevent transmission of HIV-AIDS but we can deny that the cooperation between overall of the services to the community outreach especially in health and social services should work together to educating and counseling to empower people due to decrease the incident of HIV-AIDS.

Bibliography : 44 literature (2001-2012)
Keywords : heterosexual, HIV-AIDS, IDUs, productive age

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha sempurna, dengan limpahan rahmat, berkah dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran, sang maha cahaya, penabur cahaya ilham, pilar nalar kebenaran dan kebaikan yang terindah.

Shalawat dan salam kepada sang *Uswatun Khasanah*, baginda Rasulullah Muhammad SAW. beserta keluarga beliau, para sahabat dan sahabatiyah atas suri tauladannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Gambaran Faktor Risiko Kejadian HIV-AIDS Pada Usia Produktif di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode 2011 sampai dengan 2012”** sebagai persembahan terakhir perjalanan studi di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang tercinta.

Niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Dalam Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6 disebutkan *“Fa'innamaalusriyusran”* (sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan). Kalimat itulah yang menjadi pedoman semangat penulis meskipun terdapat berbagai kesulitan yang dihadapi pada saat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan di dalam penulisan ini. Pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda **Sinar Intang** (Almh.) dan Ayahanda **Zainul Arifin** atas segala perhatian, kasih sayang, do'a restu serta pengorbanannya yang tak terhingga begitupun kepada saudara-saudariku dan semua pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, do'a serta bantuan-bantuan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Selesainya penyusunan karya tulis ilmiah ini, juga tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
2. **Bapak Dr. dr. Rasjidin Abdullah M.Ph., MH.Kes** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajaran stafnya yang telah menyediakan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. **Ibu Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb.**, selaku Ketua Jurusan Kebidanan dan seluruh staf jurusan kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Amd.Keb.

4. **Ibu dr. Rini Fitriani, M.Kes** selaku Pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi kepada penulis dari awal hingga akhir proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. **Ibu dr. Nadyah Haruna M.Kes** selaku Penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. **Bapak Drs. Supardin M.HI.**, selaku Penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Para dosen dan seluruh staf UIN Alauddin terkhusus pada Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasihat selama penulis menimba ilmu di Jurusan Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
8. Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
9. Walikota Makassar/Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG) Kota Makassar yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar beserta para staf dinas kesehatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.

11. Direktur RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar beserta seluruh pegawai dan staf rumah sakit khususnya kepada Pokja HIV-AIDS yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
12. Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Makassar beserta seluruh pegawai dan staf puskesmas yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan
13. Semua saudari seperjuangan di Kebidanan UIN Alauddin Makassar Angkatan 2009 yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya dalam rangka penyelesaian studi ini.
14. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa dan mengharapkan kiranya segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mempunyai nilai ibadah disisi Allah SWT. Dan semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, Amin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, Agustus 2012

Penulis

Anggi Angraini Zainul
70400009002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI	iv
QUOTATIONS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum tentang Virus.....	8

1. Definisi virus	8
2. Istilah dan definisi dalam virologi	9
3. Klasifikasi virus	10
4. Replikasi virus.....	14
5. Konsep Patofisiologi penyakit virus	21
6. Terapi Antivirus	28
B. Tinjauan Umum Tentang HIV dan AIDS	32
1. Pengertian HIV dan AIDS	32
2. Struktur HIV	34
3. Siklus replikasi HIV	36
4. Immunopatogenesis.....	36
5. Manifestasi klinis	40
6. Diagnosis.....	45
7. Penularan	47
8. Pengobatan	49
9. Pencegahan.....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Variabel yang Diteliti	58
1. Usia Produktif	58
2. Perilaku Seksual.....	59
3. IDU.....	61
D. Tinjauan Islam Tentang Faktor Risiko HIV-AIDS pada Usia Produktif	62
E. Kerangka Konsep.....	70

1. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti	70
2. Bagan Kerangka Konsep	73
3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	74
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis Penelitian	77
B. Tempat & Waktu Penelitian	77
C. Populasi dan Sampel	78
D. Besar Sampel.....	79
E. Cara Pengumpulan Data	81
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	81
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	82
A. Hasil Penelitian	82
B. Pembahasan.....	90
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMRIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Famili virus binatang yang menginfeksi manusia	13
Tabel 2.2 Infeksi virus pada manusia berdasarkan jalan masuknya	18
Tabel 2.3 Contoh-contoh campuran Antivirus.....	31
Tabel 2.4 Kriteria AIDS menurut CDC	46
Tabel 2.5 Faktor-faktor yang meningkatkan risiko transmisi HIV	48
Tabel 2.6 Berbagai daftar obat antiretroviral	53
Tabel 4.1: Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan jenis infeksi oportunistik di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar periode Mei 2011 sampai dengan April 2012	85
Tabel 4.2: Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Faktor risiko Heteroseksual di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar periode Mei 2011 sampai dengan April 2012.....	88
Tabel 4.3: Distribusi penderita HIV-AIDS Faktor risiko Homoseksual di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar periode Mei 2011 sampai dengan April 2012	88
Tabel 4.4: Distribusi penderita HIV-AIDS Faktor risiko Biseksual di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar periode Mei 2011 sampai dengan April 2012	89

Tabel 4.5: Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Faktor risiko IDU di Puskesmas Jumpang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar periode Mei 2011 sampai dengan April 2012	89
--	----



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1: Virus –virus DNA	11
Gambar 2.2: Virus –virus RNA	12
Gambar 2.3: Struktur Anatomi HIV	34
Gambar 2.4: Perjalanan Alamiah Infeksi HIV-AIDS	45
Grafik 4.1: Distribusi Penderita HIV-AIDS berdasarkan Jenis Kelamin di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011 sampai April 2012	82
Grafik 4.2: Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011-April 2012	83
Grafik 4.3: Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Status Pekerjaan di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011-April 2012.....	84
Grafik 4.4: Distribusi Penderita HIV-AIDS berdasarkan Agama di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011 sampai April 2012	86
Grafik 4.5: Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Usia Produktif di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011 sampai April 2012	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Master Tabel Penelitian

Lampiran 2. Surat permohonan Izin Pengambilan Data

Lampiran 3. Surat Keterangan Izin/Rekomendasi Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 5. Surat Keterangan telah selesai Meneliti

Lampiran 6. Biodata Penulis



DAFTAR SINGKATAN

<i>ADCC</i>	: <i>Antibody Dependent Cell Cytotoxicity</i>
<i>AIDS</i>	: <i>Acquired Immunodeficiency Syndrom</i>
<i>APC</i>	: <i>Antigen Presenting Cell</i>
<i>ARV</i>	: <i>Anti Retroviral</i>
<i>CD</i>	: <i>Cluster of Differentiation</i>
<i>CDC</i>	: <i>Centers Desease Control</i>
<i>CMV</i>	: <i>Cytomegalovirus</i>
<i>DNA</i>	: <i>Deoxyribonucleic Acid</i>
<i>HAART</i>	: <i>Highly Active Anti Retroviral Therapy</i>
<i>HIV</i>	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
<i>Ig</i>	: <i>Immunoglobulin</i>
<i>GALT</i>	: <i>Gut-Associated Lymphoid Tissue</i>
<i>KPAN</i>	: <i>Komisi Nasional Penanggulangan AIDS Nasional</i>
<i>LGP</i>	: <i>Limfadenopati Generalisata Persisten</i>
<i>LSL</i>	: <i>Lelaki Seks Lelaki</i>
<i>LSM</i>	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
<i>MHC</i>	: <i>Major Histocompatibility Complex</i>
<i>NK</i>	: <i>Natural Killer</i>
<i>NRTI</i>	: <i>Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor</i>
<i>NNRTI</i>	: <i>Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor</i>
<i>ODHA</i>	: <i>Orang Dengan HIV/AIDS</i>

PBB	: Persatuan Bangsa- Bangsa
PCR	: <i>Polymerase Chain Reaction</i>
PTRM	: Program Terapi Rumatan Metadon
RNA	: <i>Ribonucleic Acid</i>
TNF	: <i>Tumour Necrosis Factor</i>
Tc	: <i>T Cytotoxic</i>
Td	: <i>T Delay</i>
Th	: <i>T Helper</i>
Ts	: <i>T Supressor</i>
UNAIDS	: <i>United Nation of AIDS</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan karena rusaknya sistem kekebalan tubuh oleh infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*. Sistem kekebalan tubuh bertugas untuk melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang setiap hari menyerang dari luar. Salah satu unsur yang penting dalam sistem kekebalan tubuh adalah sel CD4, yaitu salah satu jenis sel darah putih. Sel CD4 ini dibunuh oleh HIV saat menggandakan diri dalam darah sehingga semakin lama seseorang terinfeksi HIV, berakibat pada pengurangan jumlah sel CD4. Penurunan jumlah sel CD4 ini menyebabkan melemahnya kemampuan sistem kekebalan untuk melindungi tubuh dari infeksi (Spritia, 2009).

Kasus HIV-AIDS berkembang sangat cepat di seluruh dunia. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah orang yang telah terinfeksi oleh virus tersebut. 40 juta orang diperkirakan telah terinfeksi dan lebih dari 20 juta orang meninggal dunia serta menginfeksi lebih dari 6000 orang usia produktif (KPAN, 2007 dalam Purwaningsih dan Widayatun, 2008).

Benua Asia diindikasikan memiliki laju infeksi HIV tertinggi di dunia. Prevalensi HIV tertinggi terdapat di wilayah Asia Tenggara dengan trend epidemik yang bervariasi di setiap negara. Trend epidemik di Kamboja,

Myanmar, dan Thailand menunjukkan penurunan, sedangkan di Indonesia dan Vietnam justru semakin meningkat (Dorothy, 2011).

WHO dan UNAIDS memberi peringatan bahaya kepada tiga negara di Asia yang saat ini disebut-sebut pada titik infeksi HIV bahkan dapat dikatakan ketiga negara tersebut berada dalam posisi serius. Berdasarkan laporan WHO dan UNAIDS ketiga negara tersebut adalah China, India dan Indonesia yaitu negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia (Dorothy, 2011).

Pada awalnya kasus infeksi HIV-AIDS di Indonesia ditemukan pada laki-laki dari kelompok homoseksual dan biseksual yang sekarang ini telah menyebar ke semua orang tanpa kecuali berpotensi untuk terinfeksi HIV. Risiko penularan terjadi tidak hanya pada populasi berperilaku risiko tinggi. Data yang ada menunjukkan bahwa HIV-AIDS telah menginfeksi ibu rumah tangga, bahkan pada anak-anak atau bayi yang dikandung tertular dari ibu pengidap HIV (Nugroho dan Sugih, 2009).

Virus HIV tidak mudah menular dan disebarkan melalui cara-cara yang jumlahnya terbatas. Penularan baru terjadi jika ada pertukaran cairan tubuh antara orang yang terinfeksi HIV dengan yang belum terinfeksi. Cara penularan yang utama di Indonesia adalah melalui hubungan seks tidak aman dan berbagi jarum suntik yang tidak steril. Sekalipun penularan melalui pengguna narkoba suntik adalah paling efektif, namun dari segi potensi jumlah kelompok berisiko, ditahun 2007 KPAN sudah melihat penularan melalui jalur seksual tetap akan menjadi cara penularan utama di Indonesia dalam dekade kedepan (KPAN, 2007 dalam Nugroho dan Sugih, 2009).

Laporan dari Kementerian Kesehatan RI dari Januari sampai dengan Maret 2012 jumlah kasus baru HIV yang dilaporkan sebanyak 5991 kasus sedangkan AIDS sebanyak 551 kasus. Persentase kasus HIV-AIDS yang tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 25-49 tahun (75,4%) diikuti kelompok umur 20-24 tahun (15,0%) dengan rasio kasus antara laki-laki dan perempuan adalah 1:1. Persentase faktor risiko tertinggi adalah hubungan seks tidak aman pada heteroseksual (46,6%), penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasin (12,6%), dan LSL (6%) (Kementerian Kesehatan RI, 2012).

Pekerja seksual atau perbuatan zina seperti melacur dan homoseksual dalam Islam adalah jelas hukumnya. Allah SWT sudah menyatakan bahwa zina merupakan cara hubungan seks yang paling buruk dan dimurkai olehNya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isrâ/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Depag, 2011).

Ayat di atas menegaskan bahwa: “Dan janganlah kamu mendekati zina” dengan melakukan hal-hal—walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan seseorang terjerumus dalam keburukan itu; “sesungguhnya ia”, yakni zina itu, “adalah suatu perbuatan” amat “keji” yang melampaui batas dalam ukuran apapun “dan suatu jalan yang buruk” dalam menyalurkan kebutuhan biologis (Shihab, 2009).

Allah SWT telah memperingatkan secara tegas untuk menghindari perbuatan zina. Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti perzinaan memiliki rangsangan yang sangat kuat karena itu, Al-Qur'an melarang mendekatinya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu (Shihab, 2009). Salah satu hal yang berkaitan dengan keburukan dari hubungan perzinaan tersebut adalah risiko penularan infeksi HIV-AIDS bagi para pelaku perzinaan baik yang datang maupun yang didatangi (*Al-fâ'il wa al-maf'ûl bih*).

Orang yang terjangkit HIV-AIDS di Indonesia sebenarnya sangat sulit diukur dan masih belum diketahui keadaan sesungguhnya secara tepat seperti halnya fenomena "gunung es" dimana penderita yang kelihatan hanya sebagian kecil dari yang semestinya. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjalani tes pemeriksaan HIV-AIDS. Kendala utamanya adalah stigma negatif, diskriminasi, serta kurangnya pengetahuan tentang HIV-AIDS.

Kawasan Timur Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan menempati urutan keempat setelah Bali, Jawa Barat dan Jawa timur dalam hal jumlah kasus AIDS terbanyak pada periode Januari hingga Maret 2012 (Kementerian

Kesehatan RI, 2012). Semua wilayah kabupaten/kota di dalam wilayah propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kasus HIV-AIDS. Rata-rata penderita berada pada usia produktif berstatus anak sekolah, mahasiswa dan pekerja dengan perkiraan mencapai 7.500-8.000 kasus (Gobel, 2011).

Merebaknya epidemi HIV-AIDS telah menjadi permasalahan dunia yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan elemen berbagai masyarakat dunia, mulai dari negara, LSM, Masyarakat Internasional dan juga PBB. Epidemi HIV-AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa dan dapat menyebabkan usia harapan hidup menjadi terhambat atau bahkan menjadi mundur yang selanjutnya dapat mengancam kehidupan penduduk bahkan kehidupan sebuah bangsa (Purwaningsih dan Widayatun, 2008).

Data hasil survei awal dari Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, sepanjang tahun 2011 jumlah seluruh penderita baru HIV-AIDS yang berusia produktif masing-masing adalah 43 orang dan 391 orang dengan kelompok usia berkisar antara 15-49 tahun di kedua tempat.

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di atas maka perlu diketahui faktor risiko yang mempengaruhi kejadian HIV-AIDS pada usia produktif. Hal inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengangkat penelitian mengenai “Gambaran faktor risiko kejadian HIV-AIDS pada usia

produktif di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode 2011-2012”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran faktor risiko perilaku heteroseksual pada usia produktif terhadap kejadian HIV-AIDS?
2. Bagaimana gambaran faktor risiko perilaku homoseksual pada usia produktif terhadap kejadian HIV-AIDS?
3. Bagaimana gambaran faktor risiko perilaku biseksual pada usia produktif terhadap kejadian HIV-AIDS?
4. Bagaimana gambaran faktor risiko IDU pada usia produktif terhadap kejadian HIV-AIDS?
5. Bagaimana pandangan Islam terhadap kejadian HIV-AIDS pada usia produktif?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran faktor risiko kejadian HIV-AIDS pada usia produktif di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar periode 2011 sampai dengan 2012.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko perilaku heteroseksual pada usia produktif terhadap kejadian HIV-AIDS

- b. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko perilaku homoseksual pada usia produktif terhadap kejadian HIV-AIDS
- c. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko perilaku biseksual pada usia produktif terhadap kejadian HIV-AIDS
- d. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko IDU pada usia produktif terhadap kejadian HIV-AIDS
- e. Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap kejadian HIV-AIDS pada usia produktif.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan pada masyarakat tentang karakteristik dan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya HIV-AIDS khususnya pada usia produktif.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam institusi untuk mengembangkan proses belajar mengajar, serta dapat melengkapi bacaan di perpustakaan.
3. Sebagai aplikasi ilmu dan pengalaman berharga serta dapat menambah wawasan ilmiah dan pengetahuan penulis tentang gambaran karakteristik dan faktor risiko kejadian HIV-AIDS pada usia produktif serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Virus

1. Definisi Virus

Virus adalah agen infeksius terkecil dengan ukuran diameter antara 20 nm sampai kira-kira 300 nm yang hanya mempunyai satu jenis asam nukleat (DNA atau RNA) sebagai genom mereka. Asam nukleat terbungkus mentel protein yang dikelilingi oleh membran dari lipid. Unit infeksius secara keseluruhan disebut virion (Brooks, 2005).

Dalam lingkungan ekstraseluler virus akan diam (*inert*). Virus hanya akan mengalami replikasi di dalam sel hidup dengan menjadi parasit pada tingkat gen. Asam nukleat virus mengandung informasi penting untuk bisa menghasilkan keturunannya yaitu dengan cara memprogram sel inang yang diinfeksi agar mensintesis makromolekul virus-spesifik. Setiap siklus replikasi menghasilkan asam nukleat dari mantel protein virus dalam jumlah yang banyak. Mantel protein virus bergabung bersama-sama membentuk kapsid yang berfungsi membungkus dan menjaga stabilitas asam nukleat virus terhadap lingkungan ekstraseluler. Selain itu juga berfungsi mempermudah penempelan serta penetrasi virus terhadap sel baru yang dapat dimasukinya (Brooks, 2005).

2. Istilah dan Definisi Dalam Virologi

- a) Kapsid : Mantel protein yang membungkus genom asam nukleat
- b) Kapsomer : Unit morfologik yang terlihat dengan mikroskop elektron, terletak di atas permukaan ikosahedral partikel virus. Kapsomer mewakili kluster-kluster polipeptida tetapi unit morfologik tersebut secara kimiawi bukan menjadi bagian penting batas dari unit struktur.
- c) Virus lemah : Sebuah partikel virus yang secara fungsional mengalami kekurangan dalam beberapa aspek replikasi.
- d) Amplop : Sebuah membran lipid yang mengelilingi partikel virus. Ini diperoleh melalui proses pertunasan yang menembus membran sel selama pematangan virus. Glikoprotein yang dikodekan oleh virus ditunjukkan di atas permukaan amplop. Proyeksi ini disebut peplomer.
- e) Nukleokapsid : Suatu kompleks protein asam nukleat yang mewakili bentuk bungkus gen virus. Istilah ini biasanya digunakan dalam kasus dimana nukleokapsid adalah substruktur dari kompleks partikel virus yang lebih banyak.
- f) Unit Struktur : Protein dasar yang membentuk dinding mantel. Struktur ini biasanya terdiri dari kumpulan lebih dari satu sub unit protein yang tidak sama (non identik). Unit struktur ini sering dianggap sebagai sebuah protomer.
- g) Sub unit : Sebuah rantai polipeptida virus yang terkumpul menjadi satu.

- h) Virion : Partikel virus lengkap. Struktur ini (virion) membantu pemindahan asam nukleat viral dari satu sel ke sel yang lain (Brooks, 2005).

3. Klasifikasi Virus

Klasifikasi virus yang modern menurut Gillespie dan Bamford (2007) dalam buku *At a Glance Microbiology and Infection*, dibuat berdasarkan materi genetik, cara replikasi, struktur dan simetri protein seluler (kapsid), serta ada tidaknya *envelope* (amplop).


a. Materi genetik dan replikasi

1) Virus DNA

Virus DNA dapat berbentuk untai ganda (*double stranded*, ds) maupun untai tunggal (*single stranded*, ss). Virus DNA untai ganda mencakup poxvirus, herpesvirus, adenovirus, papovavirus, dan polioma virus. Kedua virus terakhir, papovavirus dan polioma virus, merupakan virus kecil yang berhubungan dengan tumor jinak seperti kutil, dan tumor ganas seperti kanker serviks. Virus Hepatitis B merupakan virus beruntai ganda dengan ada bagiannya yang beruntai tunggal.

Virus DNA biasanya bereplikasi dalam nukleus sel pejamu, memproduksi polimerase yang mereproduksi DNA virus. DNA virus biasanya tidak tergabung dalam DNA kromosom pejamu.

Gambar 2.1: Virus –virus DNA



Sumber : <http://aguskrisnoblog.wordpress.com>
(Krisno, 2011)

2) Virus RNA

Virus RNA mempunyai untai tunggal RNA yang mengadopsi strategi reproduksi yang berbeda tergantung dari sifat RNA, *sense* atau *antisense*. RNA *sense* (positif) dapat bertindak langsung sebagai mRNA. mRNA ini ditranslasi ke dalam protein struktural dan suatu RNA polimerase yang tergantung RNA. Virus dengan RNA *antisense* (negatif) mengandung RNA polimerase yang tergantung RNA yang mentranskripsi genom virus ke dalam mRNA. Kemungkinan lain, RNA yang ditranskripsi dapat bertindak sebagai cetakan untuk RNA virus (*antisense*) selanjutnya.

Retrovirus memiliki RNA *sense* untai tunggal yang tidak dapat bertindak sebagai mRNA. RNA ini ditranskripsikan ke dalam DNA oleh reverse transkriptase dan bergabung dengan DNA pejamu. Transkripsi selanjutnya untuk membentuk mRNA dan RNA genomik virus berada di bawah pengendalian enzim.

Gambar 2.2: Virus –virus RNA



Sumber : <http://aguskrisnoblog.wordpress.com>
(Krisno, 2011)

b. Simetri Kapsid

Asam nukleat virus ditutupi oleh lapisan protein yang terbuat dari suatu unit berulang (kapsid), dengan simetri ikosahedral, maupun helikal. Pada simetri ikosahedral, kapsid membentuk struktur yang hampir sferis. Simetri helikal ditemukan pada virus RNA yang memiliki kapsid terikat di sekitar asam nukleat helikal. Suatu struktur berdasarkan unit berulang mengurangi jumlah gen yang diberikan untuk lapisan virus dan menyederhanakan proses perakitan virus.

c. *Envelope* (amplop)

Pada beberapa virus, asam nukleat dan protein kapsid dari virus (nukleokapsid) dikelilingi oleh amplop lipid yang diambil dari sel atau membran inti pejamu. Membran pejamu diubah oleh protein atau glikoprotein pengkode virus, yang dapat bertindak sebagai reseptor untuk sel pejamu lainnya. Virus beramplop bersifat sensitif terhadap

zat yang dapat melarutkan membran lipid misalnya eter (Gillespie, 2007).

Tabel 2.1: Famili Virus Binatang yang Menginfeksi Manusia

Inti asam nukleat	Virion: bentuk tangkup kapsid	Amplop atau Telanjang	Sensitifitas eter	Asam Nukleat	Famili Virus
DNA	Icosahedral	Telanjang	Resisten	ss ds sirkuler ds	Parvoviridae Papovaviridae Adenoviridae
		Amplop	Sensitif	ds sirkuler ds	Hepadnaviridae Herpesviridae
	komplek	Mantel kompleks	Resisten	ds	Poxviridae
RNA	Icosahedral	Telanjang	Resisten	ss ss ss ds bersegmen	Picornaviridae Astroviridae Calicividae Reoviridae
		Amplop	Sensitif	ss	Togaviridae
	Tidak diketahui atau kompleks	Amplop	Sensitif	ss ss bersegmen	Flaviviridae Arenaviridae
				ss ss diploid	Coronaviridae Retroviridae
	Heliks	Amplop	Sensitif	ss bersegmen ss bersegmen ss ss ss	Bunyaviridae Orthomyxoviridae Paramyxoviridae Rhabdoviridae Bornaviridae Filoviridae

Keterangan :

ss = untai tunggal (*single stranded*)

ds = untai ganda (*double stranded*)

Sumber: Mikrobiologi Kedokteran
(Brooks 2005, 4)

Amplop virus mengandung glikoprotein. glikoprotein amplop virus berbeda dengan lipid yang berada di membran virus yaitu berasal dari membran sel inang tetapi glikoprotein amplop virus dikode oleh virus. Glikoprotein permukaan virus beramplop yang melekatkan partikel virus kepada sel target dengan cara berinteraksi dengan reseptor sel. Glikoprotein juga sering terlibat dalam penggabungan

membran pada tahap infeksi. Glikoprotein juga sebagai antigen virus yang penting. Sebagai akibat dari posisinya yang berada di luar permukaan virion, mereka sering terlibat dalam interaksi partikel virus dengan antibodi penetralisir (Brooks, 2005).

4. Replikasi Virus

Perkembangbiakan virus hanya terjadi pada sel yang hidup. Sel inang harus menyediakan mesin energi dan sintesis serta berat molekul prekursor yang rendah untuk sintesis protein virus dan asam nukleat. Protein virus harus disintesis oleh mesin sintesis sel inang untuk tujuan replikasi virus sehingga gen virus harus mampu memproduksi mRNA yang bisa dipakai (Brooks, 2005).

Tidak semua infeksi menghasilkan virus baru. Infeksi yang produktif terjadi di dalam sel yang permisif (selalu membolehkan) dan menghasilkan produksi virus yang infeksius. Infeksi yang abortif (gugur) akan gagal memproduksi keturunan virus, salah satunya karena sel mungkin non permisif dan tidak mampu mendukung ekspresi semua gen virus atau karena infeksi virus mungkin defektif, kekurangan beberapa gen virus fungsional. Suatu infeksi laten bisa terjadi dengan persistensi genom virus, ekspresi genom virus tidak ada atau sedikit dan sel yang diinfeksi tetap bertahan hidup (Brooks, 2005).

Tahap-tahap replikasi virus secara umum sebagai berikut:

a. Penempelan, Penetrasi dan Pelepasan Mantel

Langkah pertama kali pada infeksi virus adalah penempelan, yaitu interaksi sebuah virion dengan reseptor spesifik yang terletak di permukaan sebuah sel. Molekul reseptor berbeda untuk virus yang berlainan tetapi umumnya glikoprotein. Ikatan reseptor diyakini mencerminkan konfigurasi homolog secara kebetulan antara struktur permukaan virion dan suatu komponen permukaan sel. sebagai contoh, virus HIV mengikat reseptor CD4 pada sel sistem imun (Brooks, 2005).

Setelah pengikatan terjadi, partikel virus dimasukkan ke dalam sel. Tahap ini disebut sebagai penetrasi atau penelanan (*engulfment*). Dalam beberapa sistem, hal ini ditentukan oleh endositosis yang diperantarai reseptor, dengan pengambilan partikel virus yang tertelan masuk ke dalam endosom. Dalam beberapa sistem, terdapat penggabungan amplop virion dengan membran plasma sel, Sistem tersebut meliputi interaksi dari penyatuan protein virus dengan reseptor sel yang kedua. Contoh reseptor kemokin untuk HIV (Brooks, 2005).

Pelepasan mantel terjadi secara bersamaan atau segera setelah penetrasi. Pelepasan mantel/selubung adalah pemisahan secara fisik asam nukleat virus dari komponen struktur luar virion dengan demikian ia dapat berfungsi. Gen bisa dilepaskan sebagai

asam nukleat bebas (Picornavirus) atau sebagai sebuah nukleokapsid (Reovirus). Nukleokapsid biasanya mengandung polimerase. Pelepasan mantel mungkin memerlukan pH asam di dalam endosom. Infektifitas virus parental (berkaitan dengan orang tua) hilang pada tahap pelepasan mantel (Brooks, 2005).

b. Ekspresi Gen Virus dan Sintesis Komponen Virus

Virus melakukan replikasi primer pada tempat masuk kemudian menyebar dalam inang. Terdapat bermacam-macam mekanisme penyebaran virus, rute yang paling sering adalah melalui aliran darah atau limfe. Kehadiran virus di dalam darah disebut viremia (Brooks, 2005).

Fase viremia pada banyak infeksi virus umumnya pendek. Virus cenderung menunjukkan spesififikasi organ dan sel. Perkembangan sel dan jaringan demikian oleh virus tertentu biasanya merefleksikan keberadaan dari reseptor spesifik permukaan sel untuk virus itu. Reseptor adalah komponen permukaan sel dimana daerah permukaan virus (kapsid/amplop) bisa berinteraksi secara spesifik dan memulai infeksi. Reseptor adalah penentu dari sel yang berfungsi dalam metabolisme sel normal, dan menjadikannya memiliki gaya gabung untuk virus tertentu (Brooks, 2005).

Fase sintesis dari siklus replikasi virus terjadi setelah pelepasan selubung gen virus. Tema esensial dalam replikasi virus

adalah mRNA spesifik harus direkam dari asam nukleat virus untuk keberhasilan ekspresi dan duplikasi informasi gen. Ketika hal ini dilakukan, virus-virus menggunakan komponen sel untuk menerjemahkan mRNA (Brooks, 2005).

Beragam kelas virus memakai jalan yang berlainan untuk sintesa mRNA tergantung pada struktur asam nukleat virus. Beberapa virus (Contoh: Rhabdovirus) membawa RNA polimerase untuk sintesa mRNA. Virus RNA dari jenis ini disebut virus untai-negatif (*negative sense*), gen RNA untai tunggal mereka yang melengkapi mRNA lazim disebut untai positif (*positive sense*). Virus untai negatif harus menyediakan RNA polimerase mereka sendiri, sementara sel eukaryotik kekurangan enzim sehingga mampu untuk mensintesa mRNA lepas dari sebuah template RNA (Brooks, 2005).

Dalam proses replikasi virus, semua makromolekul spesifik virus disintesa dalam suatu rangkaian yang sangat teratur. Pada beberapa infeksi virus, terlebih yang melibatkan virus yang mengandung DNA untai, protein virus awal disintesa segera setelah infeksi dan protein lambat dibuat hanya diakhir infeksi, setelah sintesa DNA virus sebaliknya, sebagian besar informasi genetik dari virus yang mengandung RNA diekspresikan pada waktu yang sama (Brooks, 2005).

Tabel 2.2: Infeksi Virus Pada Manusia Berdasarkan Jalan Masuknya

Jalan Masuk	Kelompok Virus	Menyebabkan Gejala Lokal Pada Tempat Masuk	Menyebabkan Infeksi Umum Dan Penyakit Organ Spesifik
Saluran pencernaan	Adenovirus	Kebanyakan spesies	
	Herpesvirus	Epstein-Barr virus, herpes simplex virus	Varicella virus
	Poxvirus		Smallpox virus
	Picornavirus	Rhinovirus	Beberapa enterovirus
	Togavirus		Rubella virus
	Orthomyxovirus	Influenza virus	
	Paramyxovirus	Parainfluenza virus, respiratory syncytial virus	Mumps virus, measles virus
	Coronavirus	Kebanyakan spesies	
Mulut, saluran intestinal	Adenovirus	Kebanyakan spesies	
	Herpesvirus	Epstein-Barr virus, herpes simplex virus	Sitomegalovirus
	Picornavirus		Beberapa enterovirus termasuk poliovirus dan hepatitis A virus
	Reovirus	Rotavirus	
Kulit, Trauma ringan	Papovavirus	Papillomavirus	
	Herpesvirus	Herpes simplex virus	
	Poxvirus	<i>Molluscum contagiosum virus, orf virus</i>	
Injeksi	Herpes virus		Epstein-Barr virus, cytomegalovirus
	Hepadnavirus		Hepatitis B
	Retrovirus		Human immunodeficiency virus
Gigitan	Rhabdovirus		Rabies virus
	Togavirus		Beberapa spesies termasuk <i>eastern equine encephalitis virus</i>
	Flavivirus		Beberapa spesies termasuk <i>yellow fever virus</i>

Sumber: Mikrobiologi Kedokteran
(Brooks 2005, 39)

c. Morfogenesis dan Pelepasan

Gen virus dan kapsid polipeptida yang baru disintesa bergabung bersama-sama membentuk keturunan virus. Kapsid ikosahedral dapat memadat di dalam tanpa adanya asam nukleat, dimana nukleokapsid virus dengan simetri heliks tidak dapat terbentuk tanpa RNA virus. Tidak ada mekanisme khusus untuk mengeluarkan virus yang tidak beramplop (Brooks, 2005).

Virus yang beramplop menjadi matang dengan cara proses pertunasan. Glikoprotein amplop spesifik virus disisipkan ke dalam membran seluler. Nukleokapsid viral kemudian bertunas melewati membran pada tempat yang telah berubah ini, dan dalam proses ini memperoleh amplop. Pertunasan seringkali terjadi pada membran plasma tetapi mungkin termasuk membran yang lain di dalam sel. Virus yang beramplop tidak infeksius selama mereka masih memiliki amplopnya. Oleh karena itu keturunan virion yang infeksius secara khas tidak terakumulasi dalam sel terinfeksi (Brooks, 2005).

Kelebihan jumlah komponen virus bisa terakumulasi dan terlibat dalam pembentukan badan inklusi (struktur spesifik virus) di dalam sel. Sebagai akibat dari efek replikasi virus yang sangat merusak, akhirnya timbul efek sitopatik seluler dan sel akan mati tetapi, terdapat keadaan dimana sel tidak rusak oleh virus dalam

waktu yang lama, maka akan berkembang infeksi persisten (Brooks, 2005).

Mekanisme yang diinduksi virus bisa mengatur apoptosis, yakni suatu kejadian yang terprogram secara genetik yang membuat sel mengalami kerusakan oleh dirinya sendiri. Beberapa infeksi virus menghambat apoptosis secara dini, yang memberikan waktu untuk menghasilkan keturunan virus yang tinggi selain itu, beberapa virus secara aktif menginduksi apoptosis pada tahap lambat yang akan membantu penyebaran virus ke sel yang baru (Brooks, 2005).

Kerusakan sel oleh infeksi virus dalam jaringan target dan perubahan fisiologi inang karena kerusakan jaringan menyebabkan berkembangnya penyakit. Gejala umum yang menyebabkan banyak infeksi virus, seperti malaise dan anorexia, dapat disebabkan dari elemen-elemen respon inang seperti produksi sitokin (Brooks, 2005).

Inang bisa menyerah ataupun sembuh dari infeksi virus. Mekanisme penyembuhan melibatkan imunitas humoral dan yang diperantarai oleh sel, interferon, dan sitokin lain, dan kemungkinan faktor-faktor pertahanan inang lainnya. Stadium terakhir dalam patogenesis adalah pelepasan virus infeksius ke dalam lingkungan. Ini merupakan langkah penting untuk mempertahankan infeksi virus dalam populasi inang. Pelepasan biasanya terjadi dari

permukaan tubuh yang terlibat dalam jalan masuk virus. Pelepasan terjadi pada stadium yang berbeda dari penyakit, tergantung agen tertentu yang terlibat. Sel terinfeksi akhirnya lisis dan mengeluarkan partikel virus (Brooks, 2005).

5. Konsep Patofisiologi Penyakit Virus

Penyakit virus merupakan beberapa abnormalitas (struktural dan fungsional) yang dihasilkan dari infeksi virus pada organisme inang. Infeksi virus yang gagal pada inang disebut infeksi tidak nyata (subklinis). Dibawah ini adalah prinsip-prinsip penting yang berhubungan dengan penyakit infeksi virus:

- a. Banyak infeksi virus bersifat subklinis
- b. Penyakit yang sama dapat disebabkan oleh virus yang berbeda
- c. Virus yang sama bisa menyebabkan penyakit yang berbeda-beda
- d. Penyakit yang dihasilkan tidak ada hubungannya dengan morfologi virus
- e. Hasil keluaran dari kasus yang khusus ditentukan oleh interaksi dari virus dan inang yang dipengaruhi oleh genetika masing-masing.

Patogenesis virus merujuk pada interaksi antara virus dengan faktor inang yang mengarah pada timbulnya penyakit. Suatu virus dapat bersifat patogen bagi inang tertentu jika bisa menginfeksi dan menyebabkan tanda-tanda penyakit pada inang tersebut (Brooks, 2005).

Baik komponen humoral maupun seluler dari respon imun terlibat dalam pengendalian infeksi virus. Bila pertahanan non spesifik belum dapat mengatasi invasi mikroorganisme maka imunitas spesifik akan terangsang. Mekanisme pertahanan spesifik adalah mekanisme pertahanan yang diperankan oleh sel limfosit, dengan atau tanpa bantuan komponen sistem imun lainnya seperti makrofag dan komplemen. Makrofag merupakan sel yang berperan dalam mempresentasikan antigen (*APC = Antigen Presenting Cell = makrofag*) sedang komplemen adalah sistem yang melibatkan sampai sebanyak 30 protein dan reseptor yang saling berinteraksi. Protein dan reseptor ini membentuk sebagian jenjang penguatan pertahanan, yang bertanggung jawab untuk menghancurkan antigen (Coad dan Dunstall, 2002).

Pada imunitas spesifik akan terbentuk antibodi dan limfosit efektor yang spesifik terhadap antigen yang merangsangnya sehingga terjadi eliminasi antigen. Sel yang berperan dalam imunitas spesifik ini adalah APC, sel limfosit T, dan sel limfosit B. Sel limfosit T dan limfosit B masing-masing berperan pada imunitas selular dan imunitas humoral. Sel limfosit T akan meregulasi respons imun dan melisis sel target yang dihuni antigen. Sel limfosit B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan memproduksi antibodi yang akan menetralkan atau meningkatkan fagositosis antigen dan lisis antigen oleh komplemen, serta meningkatkan sitotoksitas sel yang mengandung antigen yang dinamakan proses *Antibody Dependent Cell Cytotoxicity (ADCC)* (Hanifah, 2011).

Imunitas spesifik hanya ditujukan terhadap antigen tertentu yaitu antigen yang merupakan ligannya. Respon imun spesifik juga menimbulkan memori imunologis yang akan cepat bereaksi bila pejamu terpajan lagi dengan antigen yang sama di kemudian hari (Hanifah, 2011).

Invasi mikroba memicu berbagai efektor non spesifik dan sinyal inflamasi sehingga mikroba mudah diserang oleh berbagai molekul dan sel efektor. Sinyal inflamasi memacu fagosit oleh makrofag dan neutrofil yang berikatan dengan dinding pembuluh darah dan bergerak ke tempat infeksi untuk memakan mikroba penyebab infeksi. Selama proses ini sinyal inflamasi lainnya meningkatkan mobilisasi fagosit dan mediator lewat CRP, MBL dan komplemen melalui aliran darah ke tempat infeksi. Sel dendritik/makrofag memakan dan memproses komponen mikroba, bermigrasi melalui saluran limfe ke kelenjar limfoid yang dekat dan mempresentasikan antigen ke sel T. Sel T yang diaktifkan bermigrasi ke tempat infeksi dan memberikan bantuan ke sel NK dan makrofag. Sitokin yang diproduksi selama respon non spesifik mendukung dan mengarahkan respon imun spesifik ke tempat infeksi (Hanifah, 2011).

Sitokin merupakan merupakan protein-protein kecil sebagai mediator dan pengatur immunitas, inflamasi dan hematopoesis. Sitokin adalah salah satu dari sejumlah zat yang disekresikan oleh sel-sel tertentu dari sistem kekebalan tubuh yang membawa sinyal antara sel-sel lokal, dan dengan demikian memiliki efek pada sel-sel lain. Sitokin dihasilkan sebagai respon terhadap stimulus sistem imun (Decker dan Janet, 2009).

Nama sitokin yang lain diantaranya limfokin (sitokin yang dihasilkan limfosit), monokin (sitokin yang dihasilkan monosit), kemokin (sitokin dengan aktivitas kemotaktik), dan interleukin (sitokin yang dihasilkan oleh satu leukosit dan beraksi pada leukosit lainnya) (Decker dan Janet, 2009).

a. **Imunitas Seluler**

Imunitas seluler adalah imunitas yang diperankan oleh limfosit T dengan atau tanpa bantuan komponen sistem imun lainnya. Limfosit T adalah limfosit yang berasal dari sel pluripotensial yang pada embrio terdapat pada *yolk sac*, kemudian pada hati dan limpa, lalu pada sumsum tulang. Dalam perkembangannya sel pluripotensial yang akan menjadi limfosit T memerlukan lingkungan timus untuk menjadi limfosit T matur (Hanifah, 2011).

Di dalam timus, sel prekursor limfosit T akan mengekspresikan molekul tertentu pada permukaan membrannya yang akan menjadi ciri limfosit T (*T-Cell Receptors/TCR*). Molekul-molekul pada permukaan membran ini dinamakan juga petanda permukaan (*surface marker*), dan dapat dideteksi oleh antibodi monoklonal yang oleh WHO diberi nama dengan huruf *CD* yang artinya *Cluster of Differentiation* (Hanifah, 2011).

Secara garis besar, limfosit T yang meninggalkan timus dan masuk ke darah perifer (limfosit T matur) terdiri atas limfosit T dengan petanda permukaan molekul CD4 dan limfosit T dengan petanda

permukaan molekul CD8. Sel limfosit CD4 sering juga dinamakan sel T4 dan sel limfosit CD8 dinamakan sel T8 (Hanifah, 2011).

Secara fungsional, sel limfosit T dibagi atas limfosit T regulator dan limfosit T efektor. Limfosit T regulator terdiri atas limfosit T penolong (*T-Helper/Th* = CD4) yang akan menolong meningkatkan aktivasi sel imunokompeten lainnya, dan limfosit T penekan (*T-Supressor/Ts* = CD8) yang akan menekan aktivasi sel imunokompeten lainnya bila antigen mulai tereliminasi. Sedangkan limfosit T efektor terdiri atas limfosit T sitotoksik (*T-Cytotoxic/Tc* = CD8) yang melisis sel target, dan limfosit T yang berperan pada hipersensitivitas lambat (*T/Td* = CD4) yang merekrut sel radang ke tempat antigen berada (Hanifah, 2011).

Antigen dapat dipresentasikan ke sel T oleh karena keberadaan dari *Major Histocompatibility Complex (MHC)*. MHC terbagi atas dua kelas. MHC kelas I dapat ditemukan di berbagai permukaan dari kebanyakan sel di tubuh dan berfungsi sebagai *billboard* yang menginformasikan kepada sel Tc tentang apa yang terjadi dalam tubuh. Kemudian sel Tc akan melihat apa yang terjadi pada sel tersebut dan kemudian memutuskan apakah sel tersebut patut dihancurkan (Hanifah, 2011).

MHC kelas II juga berfungsi sebagai *billboard* namun hal ini ditujukan untuk sel Th. Hanya sel tertentu di tubuh yang membuat MHC kelas II dan disebut *Antigen Presenting Cell (APC)*. Penyusun

dari kedua kelas MHC ini berbeda, MHC kelas I terdiri dari satu rantai panjang (*heavy chain*) serta sebuah rantai pendek (beta-2 mikroglobulin) sedangkan MHC kelas II terdiri dari dua rantai panjang (alfa-beta). Beberapa sel tertentu dapat memunculkan MHC kelas I dan II dan juga *co-stimulation*. Tiga tipe dari APC telah berhasil diidentifikasi yakni sel dendritik aktif, makrofag aktif, dan sel B aktif (Hanifah, 2011).

b. Imunitas Humoral

Imunitas humoral adalah imunitas yang diperankan oleh sel limfosit B dengan atau tanpa bantuan sel imunokompeten lainnya. Tugas sel B akan dilaksanakan oleh imunoglobulin yang disekresi oleh sel plasma. Terdapat lima kelas imunoglobulin, yaitu IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE (Hanifah, 2011).

Limfosit B juga berasal dari sel pluripotensial yang perkembangannya pada mamalia dipengaruhi oleh lingkungan bursa fabricius dan pada manusia oleh lingkungan hati, sumsum tulang dan lingkungan yang dinamakan *Gut-Associated Lymphoid Tissue (GALT)*. Sel B yang telah dibentuk di sumsum tulang tidak berada dalam bentuk aktif. Saat muncul patogen, sel B kemudian diaktifkan melalui dua cara yang disebut *T cell-dependent activation* dan *T cell-independent*. Setelah mengalami aktivasi sel B akan berproliferasi dan kemudian bersiap untuk tahap selanjutnya yakni maturasi (*class switching, somatic hypermutation, career decision*) (Hanifah, 2011).

Antigen akan berikatan dengan imunoglobulin permukaan sel B dan dengan bantuan sel Th akan terjadi aktivasi enzim dalam sel B sedemikian rupa hingga terjadilah transformasi blast, proliferasi, dan diferensiasi menjadi sel plasma yang mensekresi antibodi dan membentuk sel B memori (Hanifah, 2011).

Antibodi yang disekresi dapat menetralkan antigen sehingga infektivitasnya hilang, atau berikatan dengan antigen sehingga lebih mudah difagosit oleh makrofag dalam proses yang dinamakan opsonisasi. Kadang fagositosis dapat pula dibantu dengan melibatkan komplemen yang akan berikatan dengan bagian Fc antibodi sehingga adhesi kompleks antigen-antibodi pada sel makrofag lebih erat, dan terjadi endositosis serta penghancuran antigen oleh makrofag. Adhesi kompleks antigen-antibodi komplemen dapat lebih erat karena makrofag selain mempunyai reseptor Fc juga mempunyai reseptor C3B yang merupakan hasil aktivasi komplemen. Selain itu, ikatan antibodi dengan antigen juga mempermudah lisis oleh sel Tc yang mempunyai reseptor Fc pada permukaannya (Peristiwa ADCC). Lisis antigen dapat pula terjadi karena aktivasi komplemen. Komplemen berikatan dengan bagian Fc antibodi sehingga terjadi aktivasi komplemen yang menyebabkan terjadinya lisis antigen (Hanifah, 2011). Hasil akhir aktivasi sel B adalah eliminasi antigen dan pembentukan sel memori yang kelak bila terpapar lagi dengan antigen serupa akan cepat berproliferasi dan berdiferensiasi (Hanifah, 2011).

6. Terapi Antivirus

Tidak seperti virus, replikasi bakteri dan protozoa tidak bertumpu pada perangkat seluler inang, sehingga organisme-organisme ini merupakan target langsung perkembangan obat-obat antibakteri dan antiprotozoa. Karena virus adalah parasit intraseluler obligat, agen antivirus harus mampu menghambat fungsi virus secara selektif tanpa merusak inang (Brooks, 2005). Berikut adalah beberapa kelas antivirus:

a. Analog Nukleosida/*Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)*

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI) adalah analog nukleosida yang menghambat kerja *reverse transkriptase* enzim yang bertanggung jawab dalam konversi RNA virus menjadi duplikat DNA (Gillespie dan Bamford, 2007).

Analog dapat menghambat enzim seluler seperti juga enzim petanda virus. Tipe-tipe baru analog dapat menghambat enzim petanda virus secara spesifik dengan hambatan minimal pada enzim sel inang yang mirip. Varian-varian virus yang resisten terhadap obat biasanya lambat laun akan meningkat dengan cukup pesat. Pemakaian kombinasi obat-obat antivirus dapat menunda timbulnya varian resisten, misalnya terapi *triple drug* yang dipakai untuk mengobati infeksi HIV (Brooks, 2005).

Contoh-contoh analog nukleosida meliputi asiklovir (*acycloguanosine*), lamivudin (3TC), stavudin (d4T), tenofivir,

didanosin (ddI), zalcitabin (ddC), ribavirin, vidarabin (*adenine arabinosida*), dan zidovudin (*azidothymidine, AZT*).

b. Analog Nukleotida

Analog nukleotida berbeda dari analog nukleosida dalam hal adanya ikatan grup fosfat. kemampuannya untuk berada dalam sel-sel pada waktu yang lama menambah potensi analog nukleotida ini. Contohnya adalah Cidofovir (Brooks, 2005).

c. Penghambat *reverse transkriptase non-nukleosida (Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor/ NNRTI)*

Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) seperti nevirapin, efavirenz, dan delavirdin menghambat *reverse transkriptase* dengan mekanisme alternatif dari NRTI. Obat ini menjadi efektif dalam regimen kombinasi (Gillespie dan Bamford, 2007).

Nevirapin adalah obat pertama yang termasuk penghambat *reverse transkriptase non-nukleosida*. Ia bekerja secara langsung berikatan dengan *reverse transkriptase* dan memecah tempat katalitik enzim (Brooks, 2005).

d. Penghambat Protease (*Protease Inhibitor*)

Inhibitor Protease merupakan senyawa antiretrovirus yang efektif ketika digunakan sebagai agen tunggal. Senyawa dari inhibitor protease dapat menghasilkan penurunan terbanyak dalam hal jumlah virus. Senyawa ini meliputi atazanivir, indinavir, lopinivir, ritonavir, dan saquinavir (Gillespie dan Bamford, 2007).

Saquinavir adalah penghambat protease pertama yang dibenarkan untuk penatalaksanaan infeksi HIV. Obat ini dirancang menggunakan model komputer sebagai molekul yang sesuai dengan tempat kedudukan aktif dari enzim protease HIV. Obat-obat demikian menghambat protease virus yang dibutuhkan pada tahap lanjut dari siklus replikasi untuk memecah struktur protein virus yang akan membentuk *core* virion matur dan mengaktifasi *reverse transkriptase* yang akan dipakai dalam putaran infeksi berikutnya. Penghambatan protease menghasilkan partikel virus yang non infeksius (Brooks, 2005).

e. Jenis Agen Antivirus Lain

Komposisi lain yang telah terbukti memiliki aktivitas antivirus pada kondisi tertentu (Brooks, 2005), di antaranya:

1) Amantandin dan Rimantandin

-Amin-amin sintetis ini secara spesifik menghambat virus influenza A dengan cara memblokir pelepasan selubung virus.

Mereka harus diberikan sebagai profilaksis agar mendapatkan efek protektif yang signifikan (Brooks, 2005). Amantandin mencegah *uncoating* dan pelepasan RNA virus. telah muncul adanya resistensi. Pemberian amantandin jangka pendek dapat mencegah munculnya penyakit selama wabah, tetapi biasanya digunakan pada pasien yang berisiko tinggi.

2) Foscarnet (Asam fosfonoformat, PFA)

-Foscarnet suatu analog organik dari pirofosfat anorganik, merupakan penghambat selektif polimerase DNA virus dan reverse transkriptase pada kedudukan ikatan pirofosfat.

Tabel 2.3: Contoh-Contoh Campuran Antivirus Yang Dipakai Untuk Pengobatan Infeksi Virus

Obat	Analog Nukleosida	Mekanisme Kerja	Spektrum Virus
Asiklovir	Ya	Penghambat polimerase virus	Herpesvirus
Amantandin	Tidak	Memblokir pelepasan selubung virus	Influenza A
Cidofovir	Tidak	Penghambat polimerase virus	Sitomegalovirus, herpes simpleks
Didanosin (ddI)	Ya	Penghambat <i>reverse transkriptase</i>	HIV-1, HIV-2
Foscarnet	Tidak	Penghambat polimerase virus	Herpesvirus, HIV-1, HBV
Gansiklovir	Ya	Penghambat polimerase virus	Sitomegalovirus
Indinavir	Tidak	Penghambat protease HIV	HIV-1, HIV-2
Lamivudin (3TC)	Ya	Penghambat <i>reverse transkriptase</i>	HIV-1, HIV-2, HBV
Nevirapin	Tidak	Penghambat <i>reverse transkriptase</i>	HIV-1
Ribavirin	Ya	Mungkin memblokir capping mRNA virus	Virus sinitium respirasi, influenza A, demam lassa
Ritonavir	Tidak	Penghambat protease HIV	HIV-1, HIV-2
Saquinavir	Tidak	Penghambat protease HIV	HIV-1, HIV-2
Stavudin (d4T)	Ya	Penghambat <i>reverse transkriptase</i>	HIV-1, HIV-2
Trifluridin	Ya	—	Keratitis Herpesvirus
Valasiklovir	Ya	Penghambat polimerase virus	Herpesvirus
Vidarabin	Ya	Penghambat polimerase virus	Herpesvirus, vaccinia, HBV
Zalsitabin (ddC)	Ya	Penghambat <i>reverse transkriptase</i>	HIV-1, HIV-2, HBV
Zidovudin (AZT)	Ya	Penghambat <i>reverse transkriptase</i>	HIV-1, HIV-2, HBV

Sumber: Mikrobiologi Kedokteran (Brooks 2005, 50)

3) Methisazone

Methisazone adalah agen yang bersejarah sebagai penghambat virus cacar (smallpox). Methisazone adalah agen antivirus pertama

yang mempunyai andil dan dijelaskan pada kampanye eradikasi smallpox. Methisazone memblokir tahap lanjut replikasi virus yang menghasilkan bentuk immatur partikel virus non infeksius.

B. Tinjauan Umum Tentang HIV dan AIDS

1. Pengertian HIV dan AIDS

HIV adalah jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sel imun yang terinfeksi adalah CD4 sel T, makrofag, dan sel dendritik. CD4 sel T secara langsung maupun tidak langsung dihancurkan oleh virus tersebut. HIV termasuk genus retrovirus dan tergolong ke dalam famili lentivirus. Infeksi dari famili lentivirus ini khas ditandai dengan sifat latennya yang lama, masa inkubasi yang lama, replikasi virus yang persisten dan keterlibatan dari susunan saraf pusat (SSP). Adapun ciri khas untuk jenis retrovirus yaitu: dikelilingi oleh membran lipid, mempunyai kemampuan variasi genetik yang tinggi, mempunyai cara yang unik untuk replikasi serta dapat menginfeksi seluruh jenis vertebrata (Depkes, 2006).

AIDS adalah kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. AIDS melemahkan atau merusak sistem pertahanan tubuh, sehingga akhirnya berdatanganlah berbagai jenis penyakit lain. Umumnya keadaan AIDS ini ditandai dengan adanya berbagai infeksi baik akibat virus, bakteri, parasit maupun jamur. Keadaan infeksi ini yang dikenal dengan infeksi oportunistik (Depkes, 2006).

Virus HIV terdiri dari 2 grup, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Masing-masing grup mempunyai lagi berbagai subtipe, dan masing-masing subtipe secara evolusi yang cepat mengalami mutasi. Diantara kedua grup tersebut, yang paling banyak menimbulkan kelainan dan lebih ganas di seluruh dunia adalah grup HIV-1 (Brooks, 2005).


Virus HIV-1 memiliki 10 subtipe yang diberikan kode A sampai J. Virus subtipe B merupakan prevalen di Amerika Serikat dan Eropa Barat, ditemukan terutama pada pria homoseksual dan penggunaan obat suntik. Subtipe C dan E ditularkan melalui hubungan seksual. Subtipe C, yang merupakan prevalen di Afrika sub-Sahara, juga ditemukan di Amerika Utara. Subtipe E, yang merupakan penyebab epidemi di Thailand, memiliki daya afinitas yang lebih kuat terhadap sel epitel baik saluran reproduksi pria maupun wanita. Sebaliknya, subtipe B tidak mudah ditularkan melalui sel epitel saluran reproduksi, tetapi langsung masuk ke dalam tubuh melalui kontak pada darah. Subtipe E telah ditemukan hanya pada isolasi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Karena subtipe C dan / atau E mempunyai afinitas tinggi pada sel epitel saluran reproduksi, epidemi HIV yang baru dapat terjadi pada populasi heteroseksual. Penelitian vaksinasi saat ini masih ditujukan untuk pengembangan vaksinasi terhadap virus subtipe B.

2. Struktur HIV

Envelope berisi:

- a) lipid yang berasal dari membran sel host.
- b) mempunyai 72 semacam paku yang dibuat dari gp 120 dan gp 41, setiap paku disebut trimer dimana terdiri dari 3 copy dari gp 120, gp 41.

Gambar 2.3: Struktur Anatomi HIV



Sumber: Depkes RI, 2006
(<http://binfar.depkes.go.id>)

- c) Protein yang sebelumnya terdapat pada membran sel yang terinfeksi.
- d) gp120 : glikoprotein yang merupakan bagian dari *envelope* (sampul) yang tertutup oleh molekul gula untuk melindungi dari pengenalan antibodi, yang berfungsi mengenali secara spesifik reseptor dari permukaan target sel dan secara tidak langsung berhubungan dengan membran virus lewat membran glikoprotein.
- e) gp41 : transmembran glikoprotein yang berfungsi melakukan trans membran virus, mempercepat fusi (peleburan) dari host dan membran virus dan membawa HIV masuk ke sel host.

- f) RNA dimer dibentuk dari 2 *single strand* dari RNA.
- g) *Matrix protein* : garis dari bagian dalam membran virus dan bisa memfasilitasi perjalanan dari HIV DNA masuk ke inti host.
- h) Nukleokapsid : mengikat RNA genom.
- i) *Capsid protein* : inti dari virus HIV yang berisikan 2 kopi dari RNA genom dan 3 macam enzim (*reverse transcriptase*, protease dan integrase).

Virus HIV mengandung 3 gen yang dibutuhkan untuk replikasi retrovirus yaitu *gag*, *pol*, *env*. Terdapat lebih dari 6 gen tambahan pengatur ekspresi virus yang penting dalam patogenesis penyakit. Satu protein replikasi fase awal yaitu protein *Tat*, berfungsi dalam transaktivasi dimana produk gen virus terlibat dalam aktivasi transkripsional dari gen virus lainnya. Transaktivasi pada HIV sangat efisien untuk menentukan virulensi dari infeksi HIV. Protein *Rev* dibutuhkan untuk ekspresi protein struktural virus. *Rev* membantu keluarnya transkrip virus yang terlepas dari nukleus. Protein *Nef* menginduksi produksi kemokin oleh makrofag, yang dapat menginfeksi sel yang lain (Brooks, 2005).

Gen HIV-*env* memberikan kode pada sebuah protein 160-kilodalton (kD) yang kemudian membelah menjadi bagian 120-kD (eksternal) dan 41-kD (transmembranosa). Keduanya merupakan glikosilat, glikoprotein 120 yang berikatan dengan CD4 dan mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu perlekatan virus dengan sel target (Brooks, 2005).

3. Siklus Replikasi HIV

Virus HIV hanya dapat bereplikasi dengan menggunakan atau memanfaatkan sel pejamunya. Siklus replikasi dari awal virus masuk ke sel tubuh sampai menyebar ke organ tubuh yang lain melalui 7 tahapan (Depkes, 2006), yaitu:

- a. Sel - sel target mengenali dan mengikat HIV
 - 1) HIV berfusi (melebur) dan memasuki sel target
 - 2) gp41 membran HIV merupakan mediator proses fusi
 - 3) RNA virus masuk ke dalam sitoplasma
 - 4) Proses dimulai saat gp120 HIV berinteraksi dengan CD4 dan ko-reseptor.
- b. RNA HIV mengalami transkripsi terbalik menjadi DNA dengan bantuan enzim *reverse transkriptase*
- c. Penetrasi HIV DNA ke dalam membran inti sel target
- d. Integrasi DNA virus ke dalam genom sel target dengan bantuan enzim integrase.
- e. Ekspresi gen-gen virus.
- f. Pembentukan partikel-partikel virus pada membran plasma dengan bantuan enzim protease.
- g. Virus-virus yang infeksius dilepas dari sel, yang disebut virion.

4. Immunopatogenesis

Setelah virus masuk dalam tubuh maka target utamanya adalah limfosit CD4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul

permukaan CD4. Pada permukaan sel ini terdapat molekul glikoprotein yang disebut CD4 yang dapat berikatan dengan glikoprotein amplop virus HIV. Kerusakan CD4 pada limfosit ini merupakan salah satu penyebab terjadinya efek immunosupresif oleh virus (Brooks, 2005).

Virus menuju ke kelenjar limfe dan berada dalam sel dendritik selama beberapa hari. kemudian terjadi sindrom retroviral akut semacam flu (serupa infeksi mononukleosis) disertai viremia hebat dengan keterlibatan berbagai kelenjar limfe. Pada tubuh timbul respon imun humoral maupun selular. Sindrom ini akan hilang setelah 1 atau 3 minggu. Kadar virus yang tinggi dalam darah dapat diturunkan oleh sistem imun tubuh. Proses ini berlangsung berminggu-minggu sampai terjadi keseimbangan antara pembedakan virus baru dan upaya eliminasi oleh respon imun. Titik keseimbangan disebut *set point* dan amat penting karena menentukan perjalanan penyakit selanjutnya. Bila tinggi, perjalanan penyakit menuju AIDS akan berlangsung lebih cepat (Mandal, 2006).

Sel limfosit CD4 berperan sebagai pengatur utama respon imun. Ketika sel ini diaktifkan oleh kontak dengan antigen, mereka akan berespons melalui pembelahan sel dan menghasilkan limfokin seperti interferon, interleukin dan *Tumour Necrosis Factor (TNF)*. Limfokin ini berfungsi sebagai mediator dalam respon imun yang mengendalikan pertumbuhan dan maturasi sel limfosit tipe lainnya terutama sel T sitotoksik/supresor (CD8) dan limfosit B penghasil antibodi. Limfokin

juga memicu maturasi dan fungsi monosit dan makrofag jaringan (Hanifah, 2011).

Awal setelah infeksi virus HIV, respon antibodi belum terganggu, sehingga timbul antibodi terhadap *envelope* dan protein *core* virus yang merupakan bukti prinsip adanya infeksi HIV. Aktivasi poliklonal limfosit B selanjutnya ditunjukkan dengan adanya peningkatan konsentrasi immunoglobulin serum. Hal ini mungkin terjadi akibat aktivasi langsung virus terhadap sel B. Pada stadium penyakit selanjutnya, konsentrasi immunoglobulin cenderung untuk turun (Hanifah, 2011).

Efek paling penting dari virus HIV adalah terhadap respon imun selular (sel T). Pada awal infeksi, dalam beberapa hari atau minggu, seperti pada infeksi virus lainnya akan terdapat peningkatan jumlah sel sitotoksik/supresor CD8. Meski penderita masih berada dalam kondisi seropositif sehat, pada paparan ulang antigen tidak terjadi peningkatan sel CD8 lagi. Hal ini dapat disebabkan berkurangnya limfokin interleukin 2 yang dikeluarkan sel limfosit CD4 untuk memicu CD8. Seseorang akan tetap seropositif dan sehat untuk jangka waktu yang lama. Petanda progresivitas dari penyakit ini yaitu selain gejala klinik, juga ditunjukkan dengan cepatnya penurunan jumlah sel limfosit CD4. Sel limfosit CD8 juga bisa ikut berkurang pada tahap lebih lanjut akibat gangguan produksi limfokin oleh limfosit CD4, Fungsi sel-sel lainnya seperti monosit, makrofag dan sel NK juga ikut terganggu. Infeksi progresif HIV pada

akhirnya akan menyebabkan penurunan imunitas progresif (Hanifah, 2011).

Serokonversi (perubahan antibodi negatif menjadi positif) terjadi 1 sampai 3 bulan setelah infeksi, tetapi pernah juga dilaporkan sampai 8 bulan. Kemudian pasien akan memasuki masa tanpa gejala. Dalam masa ini terjadi penurunan terhadap jumlah CD4 (Jumlah normal 800-1000) yang terjadi setelah replikasi persisten HIV dengan kadar RNA virus relatif konstan. Mula-mula jumlah penurunan CD4 sekitar 30-60/tahun, tapi pada 2 tahun terakhir penurunan jumlah menjadi cepat, 50-100/tahun, sehingga tanpa pengobatan, rata-rata masa dari infeksi HIV sampai masa AIDS adalah 8-10 tahun, dimana jumlah CD4 akan mencapai dibawah 200 (Mandal, 2006).

Waktu paruh virus dalam plasma adalah sekitar 6 jam, dan siklus hidup virus rata-rata 2,6 hari. Limfosit T-CD4 yang terinfeksi memiliki waktu paruh 1,6 hari. Karena cepatnya proliferasi virus ini dan angka kesalahan *reverse transkriptase* HIV yang berikatan, diperkirakan bahwa setiap nukleotida dari genom HIV mungkin bermutasi dalam basis harian (Brooks, 2005).

Pada akhirnya pasien akan menderita gejala-gejala konstitusional dan penyakit klinis yang nyata seperti infeksi oportunistik atau neoplasma. Level virus yang lebih tinggi dapat terdeteksi dalam plasma selama tahap infeksi yang lebih lanjut. HIV yang dapat terdeteksi dalam plasma selama

tahap infeksi yang lebih lanjut dan lebih virulin daripada yang ditemukan pada awal infeksi (Brooks, 2005).

Infeksi oportunistik dapat terjadi karena para pengidap HIV terjadi penurunan daya tahan tubuh sampai pada tingkat yang sangat rendah, sehingga beberapa jenis mikroorganisme dapat menyerang bagian-bagian tubuh tertentu. Bahkan mikroorganisme yang selama ini komensal bisa jadi ganas dan menimbulkan penyakit.

5. Manifestasi Klinis

Perjalanan klinis pasien dari tahap terinfeksi HIV sampai tahap AIDS, sejalan dengan penurunan derajat imunitas pasien, terutama imunitas selular dan menunjukkan gambaran penyakit yang kronis. Penurunan imunitas biasanya diikuti adanya peningkatan risiko dan derajat keparahan infeksi oportunistik serta penyakit keganasan (Depkes RI, 2003).

Menurut KPA (2007) gejala klinis terdiri dari 2 gejala yaitu gejala mayor (umum terjadi) dan gejala minor (tidak umum terjadi).

a. Gejala mayor:

- 1) Berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan
- 2) Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan
- 3) Demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan
- 4) Penurunan kesadaran dan gangguan neurologis
- 5) Dimensia/ HIV ensefalopati

b. Gejala minor:

- 1) Batuk menetap lebih dari 1 bulan
- 2) Dermatitis generalisata
- 3) Adanya herpes zoster multisegmental dan herpes zoster berulang
- 4) Kandidias orofaringeal
- 5) Herpes simpleks kronis progresif
- 6) Limfadenopati generalisata
- 7) Retinitis virus Sitomegalo.

Adapun petanda perkembangan HIV (Depkes, 2006) dapat diketahui melalui:

a. Jumlah CD4

Kecepatan penurunan CD4 (baik jumlah absolut maupun persentase CD4) telah terbukti dapat dipakai sebagai petunjuk perkembangan penyakit AIDS. Jumlah CD4 menurun secara bertahap selama perjalanan penyakit. Kecepatan penurunannya dari waktu ke waktu rata-rata 100 sel/tahun. Jumlah CD4 lebih menggambarkan progresifitas AIDS dibandingkan dengan tingkat *viral load*, meskipun nilai prediktif dari *viral load* akan meningkat seiring dengan lama infeksi.

b. Viral Load Plasma

Kecepatan peningkatan *viral load* (muatan virus dalam plasma) dapat dipakai untuk memperkirakan perkembangan infeksi HIV.

Viral load meningkat secara bertahap dari waktu ke waktu. Pada 3 tahun pertama setelah terjadi serokonversi, *viral load* berubah seolah hanya pada pasien yang berkembang ke arah AIDS, setelah masa tersebut perubahan *viral load* dapat terdeteksi, baik akselerasinya maupun jumlah absolutnya kemudian, keduanya dapat dipakai sebagai petanda progresivitas penyakit (Depkes, 2006).

Gambaran klinis infeksi HIV dapat disebabkan HIV-nya sendiri (sindrom retroviral akut, dimensia HIV, infeksi oportunistik, atau kanker yang terkait AIDS). Perjalanan penyakit HIV dibagi dalam tahap-tahap berdasarkan klinis dan jumlah CD4. Infeksi HIV secara umum dapat dibagi dalam empat stadium yang berbeda (Suryani, *et al*, 2009) yaitu:

a. Stadium 1: Infeksi Akut (CD4 = 500 – 1000 /ml)

Stadium ini terjadi setelah masa inkubasi 3-6 minggu. Gejala berlangsung selama 1- 2 minggu. Pada stadium ini timbul gejala-gejala mirip flu termasuk demam, artralgia, malaise, dan anoreksia. Timbul juga gejala kulit (bercak-bercak merah, urtikaria), gejala saraf (sakit kepala, kaku kuduk) dan gangguan gastrointestinal (nausea, vomitus, diare, nyeri perut). Gejala-gejala ini bersesuaian dengan pembentukan awal antibodi terhadap virus. Gejala akan menghilang setelah respon imun awal menurunkan jumlah partikel virus, walaupun virus tetap dapat bertahan pada sel-sel lain yang terinfeksi. Fase ini sangat menular karena terjadi viremia.

Selama stadium ini, ada sejumlah besar HIV pada darah perifer dan sistem imun pun mulai berespon terhadap virus dengan memproduksi antibodi HIV dan limfosit sitotoksik. Serokonversi terjadi pada fase ini dan antibodi virus mulai dapat dideteksi 3 – 6 bulan setelah infeksi.

b. Stadium 2: Stadium Asimtomatik Klinis (CD4 = 500 – 750 /ml)

Stadium ini dapat berlangsung lebih dari 10 tahun. Stadium ini, seperti namanya, bebas dari gejala-gejala mayor, meskipun sebenarnya terjadi replikasi virus secara lambat di dalam tubuh. Dapat juga terjadi Limfadenopati Generalisata Persisten (LGP). Pada fase ini sudah mulai terjadi penurunan jumlah sel CD4, tetapi masih berada pada tingkat 500/ml. Jumlah HIV dalam darah perifer turun hingga tingkat yang sangat rendah tetapi orang tetap terinfeksi dan antibodi HIV dapat dideteksi di dalam darah, sehingga tes antibodi akan menunjukkan hasil positif. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa HIV tidak dalam masa dorman selama stadium ini, melainkan sangat aktif di kelenjar limfa.

c. Stadium 3: Infeksi HIV Simtomatik (CD4 = 100 – 500 /ml)


Pada stadium ini terjadi penurunan CD4 yang progresif. Terjadi penyakit-penyakit infeksi kronis tapi tidak mengancam kehidupan. Seiring dengan berjalannya waktu sistem imun menjadi sangat rusak oleh HIV. Hal ini disebabkan oleh tiga alasan utama:

- 1) Kelenjar limfe dan jaringan menjadi rusak akibat aktivitas bertahun-tahun.
- 2) HIV bermutasi dan menjadi lebih patogen, dengan kata lain lebih kuat dan lebih bervariasi.
- 3) Tubuh gagal untuk mengganti sel-sel T penolong yang hilang. Karena kegagalan sistem imun, gejala-gejala pun berkembang. Kebanyakan gejala-gejala tersebut tidak terlalu berat, tetapi karena sistem imun makin rusak, gejala-gejalanya pun semakin memburuk. Infeksi HIV asimtomatik terutama disebabkan oleh kanker dan infeksi oportunistik yang secara normal dicegah oleh sistem imun.

d. Stadium 4: Perkembangan dari HIV ke AIDS

AIDS merupakan stadium akhir dari infeksi HIV. Penderita dinyatakan mengidap AIDS bila dalam perkembangan infeksi selanjutnya menunjukkan infeksi-infeksi dan kanker oportunistik yang mengancam jiwa penderita dan jumlah CD4 mencapai $< 200/\text{ml}$. Karena sistem imun menjadi semakin rusak, penyakit-penyakit yang terjadi menjadi semakin menuju kepada diagnosis AIDS.

Gambar 2.4: Perjalanan Alamiah Infeksi HIV-AIDS



Sumber: Depkes RI, 2006
<http://binfar.depkes.go.id>

6. Diagnosis

Diagnosis HIV-AIDS ditegakkan melalui manifestasi klinik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan antibodi pada masa *Window Period* masih negatif sehingga perlu dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan PCR atau biakan virus.

Indikasi tes antibodi HIV adalah kecurigaan kemungkinan risiko penularan seperti melakukan hubungan seks yang tak aman, pecandu narkotika suntikan, pasien penyakit menular seksual (PMS), pasien hemofilia (yang sering mendapat infus/faktor pembentukan sebelum tahun 1985), tusukan jarum yang telah digunakan pada orang terinfeksi HIV, serta bayi yang lahir dari ibu terinfeksi HIV. Tes ini bisa dilakukan pada masa tanpa gejala (asimtomatik).

Diagnosis infeksi HIV berdasar kemungkinan penularan dan pemeriksaan antibodi HIV positif (telah dikonfirmasi dengan tes Western

Blot). Diagnosis AIDS didasarkan adanya penyakit infeksi oportunistik atau kanker terkait yang telah ditetapkan dan antibodi HIV positif. Pada revisi kriteria keadaan yang berhubungan dengan AIDS tahun 1993, ditambahkan jumlah CD4 dibawah 200 sebagai salah satu kriteria sehingga, meski belum ada infeksi oportunistik atau kanker terkait, bila jumlah CD4 telah dibawah 200 digolongkan dalam AIDS (Mandal, 2006).

Adapun revisi kriteria diagnosis AIDS menurut CDC Amerika Serikat tahun 1993 untuk keadaan yang berhubungan dengan HIV, sebagai berikut :

Tabel 2.4: Kriteria AIDS menurut CDC

Kriteria diagnosis AIDS	
-	Jumlah CD4 <200 sel/mm ³
-	Kanker serviks invasif
-	Kandidiasis bronki, trakea, paru-paru, esophagus
-	Kriptokokosis ekstra pulmonalis
-	Kokidiomikosis ekstra pulmonalis atau tersebar
-	Kriptosporidiosis >1 bulan
-	Sitomegalovirus selain hepar, limpa, atau limpatik
-	Ensefalopati HIV
-	Lesi HSF yang berlangsung >1 bulan, atau Bronkitis, Pneumonitis, Esovagitis
-	Histoplasmosis ekstrapulmonalis atau tersebar
-	Isosporiasis >1 bulan
-	Sarkoma Karposi
-	Limfoma Burkitt
-	Limfoma imunoblastik
-	Limfoma primer otak
-	Kompleks <i>M. Avium</i>
-	<i>M. Tuberculosis</i>
-	Infeksi Mikrobakterial lain di luar paru-paru
-	Pneumonia <i>Pneumocystis Carinii</i>
-	Pneumonia berulang, penyebab apapun
-	Leukoensefalopati multifokal
-	Septikemia Salmonella berulang
-	Toksoplasmosis otak
-	Sindrom pelisutan.

Sumber : Buku Ajar Asuhan Kebidanan
(Varney 2006, 153)

Diagnosis HIV-AIDS ditegakkan berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan petunjuk dari gejala-gejala klinis atau dari adanya perilaku risiko tinggi individu tertentu. Diagnosis laboratorium dapat dilakukan dengan dua metode :

- a. Langsung, yaitu isolasi virus dari sampel, umumnya dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron dan deteksi antigen virus. Salah satu deteksi antigen virus yang populer adalah PCR (*Polymerase Chain Reaction*).
- b. Tidak langsung, dengan melihat respon zat anti spesifik dengan *ELISA*, *Western Blot*, *Immunofluorescent Assay (IFA)*, atau *Radioimmuno-precipitation Assay (RIPA)*. Untuk diagnosis yang lazim digunakan adalah tes *ELISA* karena sensitifitas tinggi 98.1% - 100 % dan biasanya memberikan hasil positif 2 – 3 bulan sesudah infeksi.

7. Penularan

HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia. Cairan yang berpotensi mengandung HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Penularan HIV dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu : kontak seksual, kontak dengan darah atau sekret yang infeksius, ibu ke anak selama masa kehamilan, persalinan dan pemberian ASI.

Risiko penularan setelah satu pajanan tunggal untuk darah dan produk darah adalah >90%, 14% untuk penularan vertikal, 0,5-1,0% untuk penyalahgunaan obat suntik, 0,2-0,5% untuk membran mukosa genital, dan <0,1% untuk membran mukosa non genital (Mandal, 2006).

Penularan HIV lainnya yaitu melalui pekerjaan khususnya pekerja kesehatan dan petugas laboratorium. Bisa juga terjadi ketika melakukan prosedur tindakan medik ataupun terjadi sebagai kecelakaan kerja (tidak sengaja) bagi petugas kesehatan.

Tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa air liur dapat menularkan infeksi baik melalui ciuman maupun pajanan lain misalnya sewaktu bekerja pada pekerja kesehatan. Selain itu, pada air liur terdapat inhibitor terhadap aktivitas HIV.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko transmisi HIV yang meningkat dituliskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.5: Faktor-faktor yang Meningkatkan Risiko Transmisi HIV

Transmisi	Faktor yang meningkatkan risiko
Umum pada setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Viral Load</i> yang tinggi - Adanya AIDS - Serokonversi (perubahan antibodi negatif menjadi positif) - Jumlah CD4 rendah
Seksual	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi bersamaan dengan PMS lain - Perilaku seksual resertif atau insertif - Tidak disirkumsisi - Peningkatan jumlah pasangan seksual
Penggunaan obat suntik	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan peralatan secara bersama-sama dan penggunaan berulang - Penggunaan IV atau subkutan
Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Trauma dalam - Darah yang terlihat dalam peralatan - Penempatan alat arteri atau vena sebelumnya.
Transmisi Vertikal	<ul style="list-style-type: none"> - Pecah ketuban lama - Persalinan pervaginam - Menyusui - tidak ada profilaksis HIV

Sumber : *Lecture Notes Penyakit Infeksi*
(Mandal, 2006)

8. Pengobatan

Sampai saat ini masih belum ditemukan pengobatan HIV-AIDS yang efisien. Beberapa usaha tetap dilakukan baik usaha penemuan obat maupun vaksinnnya. Obat yang digunakan saat ini tidak dapat menyembuhkan penyakit HIV-AIDS. Pengobatan yang ada hanya sebatas untuk mengatasi infeksi atau simptom dari penyakit HIV-AIDS sehingga rasa sakit penderita dapat berkurang atau hilang. Hal tersebut juga dapat memperpanjang hidup penderita.

Pengobatan HIV-AIDS secara medis dapat digolongkan menjadi 3 (Suryani, *et al.*, 2009), yaitu:

a. Pengobatan Suportif

HIV dan nutrisi keduanya sangat berhubungan. Infeksi HIV dapat memicu adanya malnutrisi. Oleh karena pengobatan AIDS meningkat dengan pesat pada daerah-daerah miskin di seluruh dunia, maka pertanyaannya adalah bagaimana obat dapat bekerja dengan baik apabila nutrisi makanannya tidak cukup baik. Oleh karena itu, pada penderita HIV perlu diperhatikan pula mengenai nutrisi

Nasihat mengenai diet perlu disesuaikan dengan kondisi penderita. Akan tetapi, umumnya rekomendasi untuk orang yang hidup dengan infeksi HIV yang belum menunjukkan gejala biasanya sama dengan orang lainnya, yang berarti diet yang seimbang dan sehat. Terdapat tiga perbedaan yang penting, yaitu:

- 1) Orang yang terinfeksi HIV cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak, maka jumlah kalori harus 10% lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kalori yang biasanya disarankan serta lebih dari 30% lebih tinggi selama masa penyembuhan dari penyakit. Keseimbangan dari lemak, protein, dan karbohidrat harus dipertahankan supaya tetap sama.
- 2) Banyak ahli merekomendasikan multivitamin harian (biasanya yang tanpa zat besi, kecuali pada wanita yang sedang menstruasi atau orang dengan defisiensi zat besi).
- 3) WHO merekomendasikan suplemen vitamin A setiap 4-6 bulan pada anak-anak yang terinfeksi HIV dan hidup di daerah miskin.

Orang yang positif terkena HIV yang kehilangan selera makan harus berusaha keras untuk memastikan bahwa mereka telah cukup makan. Beberapa saran yang membantu antara lain, memakan beberapa makanan kecil per hari, melakukan latihan untuk merangsang nafsu makan, dan mencari saran dari tenaga kesehatan atau ahli gizi.

b. Pencegahan Dan Pengobatan Infeksi Oportunistik

Meliputi penyakit infeksi oportunistik yang sering terdapat pada penderita infeksi HIV dan AIDS.

- 1) Tuberkulosis

Sejak epidemi AIDS maka kasus TBC meningkat kembali. Dosis INH 300 mg setiap hari dengan vitamin B6 50 mg paling tidak untuk masa satu tahun.

2) Toksoplasmosis

Sangat perlu diperhatikan makanan yang kurang masak terutama daging yang kurang matang. Obat : TMP-SMX 1 dosis/hari.

3) CMV

Virus ini dapat menyebabkan Retinitis dan dapat menimbulkan kebutaan, Ensefalitis, Pneumonitis pada paru, infeksi saluran cerna yang dapat menyebabkan luka pada usus.

Obat : Gansiklovir kapsul 1 gram tiga kali sehari.

4) Jamur

Jamur yang paling sering ditemukan pada penderita AIDS adalah jamur Kandida. Obat : Nistatin 500.000 u per hari

Flukonazol 100 mg per hari.

c. Pengobatan Antiretroviral

Terapi HIV-AIDS saat ini dilakukan terapi kimia (*chemotherapy*) yang menggunakan obat antiretroviral virus (ARV) yang berfungsi menekan perkembangbiakan virus HIV. Prinsip dasar dalam pemberian ARV adalah bahwa ARV sampai saat ini bukan untuk menyembuhkan. Bila digunakan dengan benar berhubungan dengan perbaikan kualitas hidup penderita. Tujuan pengobatan yang ingin dicapai adalah:

- 1) memperpanjang usia hidup orang yang terinfeksi,
- 2) mencapai tumbuh dan kembang yang optimal,

- 3) menjaga, menguatkan dan memperbaiki sistem imun dan mengurangi infeksi oportunistik,
- 4) menekan replikasi virus HIV dan mencegah progresifitas penyakit,
- 5) mengurangi morbiditas dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam terapi menggunakan obat ARV ini, umumnya dilakukan dengan kombinasi beberapa jenis obat. Pemakaian kombinasi NRTI dengan NNRTI dan PI ini saat ini dikenal sebagai *Highly Active Anti Retroviral Therapy (HAART)*. Penamaan ini didasarkan atas peningkatan survival, pengurangan kemungkinan infeksi oportunistik dan komplikasi lain, perbaikan pertumbuhan dan fungsi neurokognitif dan peningkatan kualitas hidup penderita HIV.

Infeksi HIV ke AIDS muncul dengan rata-rata sekitar sembilan sampai sepuluh tahun tanpa adanya HAART dan waktu bertahan setelah memiliki AIDS hanya 9.2 bulan. HAART meningkatkan waktu bertahan antara 4 dan 12 tahun (Suryani, *et al.*, 2009). Berikut adalah daftar obat anti retroviral:

Tabel 2.6: Berbagai Daftar Obat Anti Retroviral

Kombinasi multi kelas

Kombinasi	Nama Dagang	Keterangan
efavirenz + TDF + FTC	Atripla	Diberikan saat perut kosong

Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs):

Singkatan	Nama Generik	Nama Dagang	Keterangan
3TC	Lamivudine	Epivir	Diberikan dengan atau tanpa makanan
ABC	Abacavir	Ziagen	Diberikan dengan atau tanpa makanan
AZT atau ZDV	Zidovudine	Retrovir	Diberikan dengan atau setelah makan
d4T	Stavudine	Zerit	Diberikan dengan atau tanpa makanan
ddC ²	Zalcitabine	Hivid	Diberikan dengan atau setelah makan
ddI	Didanosine	Videx (tablet)	Diberikan pada perut yang kosong 30 menit sebelum makan; hindari alkohol
		Videx EC (capsule)	Diberikan pada perut yang kosong satu jam sebelum makan; hindari alkohol
FTC	emtricitabine	Emtriva	Diberikan dengan atau tanpa makanan
TDF	Tenofovir	Viread	Diberikan dengan atau tanpa makanan

NRTIs Yang Dikombinasikan:

Kombinasi	Nama Dagang	Keterangan
ABC + 3TC	Epzicom (US)	Diberikan dengan atau tanpa makanan
	Kivexa (Europe)	
ABC+AZT+3TC ³	Trivizir	Diberikan dengan atau tanpa makanan
AZT + 3TC	Combivir	Diberikan dengan atau tanpa makanan
TDF + FTC	Truvada	Diberikan dengan atau tanpa makanan

Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs):

Nama Generik	Nama Dagang	Keterangan
delavirdine	Rescriptor	Dilisensi di AS tapi tidak di Inggris. Diberikan dengan atau tanpa makanan. Tunggu selama satu jam sebelum diberikan ddI atau antasida.
efavirenz	Sustiva (US)	Diberikan ketika perut kosong
	Stocrin (Europe)	
etravirine	Intelence	Dilisensi di AS tapi tidak di Inggris. Diberikan bersama makanan
nevirapine	Viramune	Diberikan dengan atau tanpa makanan

Protease Inhibitors (PIs)

Nama Generik	Nama Dagang	Keterangan
Amprenavir/ fosamprenavir	Agenerase/ Lexiva (US)	Diberikan dengan atau tanpa makanan
	Agenerase/ Telzir (Europe)	
Atazanavir	Reyataz	Diberikan dengan makanan
Darunavir	Prezista	Diberikan dengan makanan
Indinavir	Crixivan	Diberikan saat perut kosong jika tidak diberikan bersama dengan ritonavir
Lopinavir+ Ritonavir	Kaletra	Beberapa formula harus diberikan dengan makanan. Beberapa formula perlu didinginkan hingga lebih dari 6 minggu
	Aluvia (developing world)	
Nelfinavir	Viracept	Diberikan bersama makanan
Ritonavir	Norvir	Diberikan bersama makanan atau suplemen makanan cair
Saquinavir	Fortovase (soft gel capsule)	Diberikan dalam dua jam makan. Perlu didinginkan hingga lebih dari 3 bulan
	Invirase (hard gel capsule)	Diberikan dalam dua jam makan
Tipranavir	Aptivus	Diberikan bersama makanan

Fusion or Entry Inhibitors

Nama Generik	Nama Dagang	Keterangan
T-20 atau enfuvirtide	Fuzeon	Harus disiapkan dari serbuk dan diinjeksikan pada paha, lengan atau abdomen
Maraviroc	Celsentri (Europe)	Diberikan dengan atau tanpa makanan
	Selzentry (US)	

Integrase Inhibitors

Nama Generik	Nama Dagang	Keterangan
Raltegravir	Isentress	Diberikan dengan atau tanpa makanan

Sumber : Makalah Diagnostik Klinik HIV-AIDS
(Suryani, *et al.*, 2009)

Pengobatan HIV biasanya melibatkan tiga obat yang diberikan bersama-sama (*triple drug*). WHO merekomendasikan bahwa disebagian besar kasus, *first line* regimen harus mengandung dua buah obat dari kelompok nukleoside/nukleotida (NRTI) dan satu obat dari kelompok non-nukleosida (NNRTI). Obat dari kelompok Protease Inhibitor (PI) kurang cocok untuk digunakan dalam pengobatan awal karena harganya, jumlah

pil yang harus diberikan, dan beberapa efek samping yang dapat timbul dengan obat-obat protease (Suryani, *et al.*, 2009).

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memulai pengobatan antiretroviral (Mandal, 2006), diantaranya:

- 1) Pengobatan dianjurkan apabila penderita asimtomatik, kadar CD4 > 500 tapi RNA HIV (*viral load*) dalam darah tinggi (lebih dari 30.000 kopi/ml).
- 2) Pengobatan dilakukan pada pasien HIV dengan gejala tanpa memandang kadar CD4.
- 3) Pengobatan boleh ditunda bila penderita asimtomatik, dengan kadar CD4 > 350 dan *viral load* rendah (< 10.000 kopi/ml).

9. Pencegahan

Ada 4 cara untuk mencegah penularan HIV, yaitu :

- a. A : *Abstinence* = tidak melakukan hubungan seks berisiko tinggi.
- b. B : *Be faithful* = bersikap saling setia
- c. C : *Condom* = cegah dengan memakai kondom secara konsisten dan benar
- d. D : *Drugs* = Hindari pemakaian narkoba suntik

Cara-cara mengurangi risiko penularan AIDS antara lain melalui seks aman yaitu dengan melakukan hubungan seks tanpa melakukan penetrasi penis ke dalam vagina, anus, ataupun mulut. Bila air mani tidak masuk ke dalam tubuh pasangan seksual maka risiko penularan akan berkurang. Apabila ingin melakukan senggama dengan penetrasi maka

seks yang aman adalah dengan menggunakan alat pelindung berupa kondom. Penelitian terhadap pasangan yang salah satunya terinfeksi menunjukkan bahwa dengan penggunaan kondom yang konsisten, laju infeksi HIV terhadap pasangan yang belum terinfeksi di bawah 1% per tahun (Suryani, *et al.*, 2009).

Bagi mereka yang belum melakukan hubungan seks perlu diberikan pendidikan. Selain itu, paket informasi AIDS juga perlu dilengkapi informasi untuk meningkatkan kewaspadaan berbagai elemen masyarakat akan berbagai bentuk rangsangan yang datang dari lingkungan.

Dalam upaya pencegahan penularan melalui narkoba suntik dilakukan pelayanan program terapi rumatan metadon (PTRM), yakni dengan memberi metadon sejenis narkoba sintesis kelas dua dengan sekali suntik dalam sehari namun tidak menyebabkan kecanduan. Tujuannya untuk melakukan terapi bertahap bagi pengguna narkoba suntik tersebut (Suryani, *et al.*, 2009).

Peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, masyarakat maupun kelompok sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Pengetahuan kesehatan akan berpengaruh kepada perilaku sebagai hasil jangka menengah (*intermediate impact*) dari pendidikan kesehatan. Kemudian perilaku kesehatan akan berpengaruh pada peningkatan indikator kesehatan masyarakat sebagai keluaran (*outcome*) pendidikan kesehatan (Notoadmodjo, 2005).

Keimanan dan ketaqwaan yang lemah serta tertekannya jiwa menyebabkan seseorang berusaha untuk melarikan diri dari kenyataan hidup dan ingin diterima dalam lingkungan atau kelompok tertentu. Oleh karena itu diperlukan peningkatan keimanan dan ketaqwaan melalui ajaran-ajaran agama.

Bagi petugas kesehatan, alat-alat yang dianjurkan untuk digunakan sebagai pencegah antara lain sarung tangan, baju pelindung, jas laboratorium, pelindung muka atau masker, dan pelindung mata. Pilihan alat tersebut sesuai dengan kebutuhan aktivitas pekerjaan yang dilakukan tenaga kesehatan. Adapun komponen dasar kewaspadaan universal yang spesifik untuk bidang kebidanan (Varney, 2006) adalah sebagai berikut :

- a. Kewaspadaan barrier yang tepat harus digunakan untuk mencegah paparan kulit dan membran mukosa terhadap darah, cairan amnion, sekresi vagina, semen, kontak berulang dengan ASI, dan cairan tubuh atau sekresi yang mengandung darah yang terlihat. Kewaspadaan barrier meliputi sarung tangan, gaun pelindung atau *apron*, masker, pelindung mata, pelindung kaki, dan penutup mulut atau barrier lain untuk digunakan selama resusitasi.
- b. Sarung tangan harus dipakai ketika melakukan pemeriksaan vagina; pengumpulan kultur dari lesi; membantu kelahiran; flebotomi, tusukan di jari dan tumit; menangani bayi baru lahir sebelum bayi tersebut dimandikan dan dikeringkan; dan menangani setiap *sanitary pad* atau

bed pad, pakaian, linen, atau benda-benda lain yang dikotori cairan tubuh.

- c. Tangan atau permukaan kulit yang telah terkontaminasi harus dicuci dengan segera dan menyeluruh.
- d. Jarum-jarum tidak boleh ditutup kembali, juga tidak boleh dibuang dari spuit sekali-pakai (*disposable syringes*), dibengkokkan, dipatahkan atau dimanipulasi dengan menggunakan tangan setelah digunakan.
- e. Semua alat tajam dan jarum harus ditempatkan di wadah sekali pakai anti bocor yang ditempatkan di area yang mudah dijangkau.

Bagi seorang ibu yang terinfeksi AIDS bisa menularkan virus tersebut kepada bayinya ketika masih dalam kandungan, melahirkan atau menyusui. ASI juga dapat menularkan HIV, tetapi bila wanita sudah terinfeksi HIV pada saat mengandung maka ada kemungkinan si bayi lahir sudah terinfeksi HIV. Maka dianjurkan agar seorang ibu tetap menyusui anaknya sekalipun HIV positif. Bayi yang tidak diberi ASI berisiko lebih besar tertular penyakit lain atau menjadi kurang gizi.

C. Tinjauan Umum Tentang Variabel Yang Diteliti

1. Usia Produktif

Usia atau umur adalah salah satu satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan benda atau makhluk baik yang hidup maupun mati. Misalnya umur manusia dikatakan lima tahun diukur sejak ia lahir hingga waktu umur ia dihitung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Usia produktif merupakan usia ketika seseorang masih mampu bekerja, menghasilkan sesuatu, dan berpotensi untuk mempunyai keturunan baik yang berstatus belum kawin, kawin ataupun janda/duda.

Badan Pusat Statistik menetapkan batas usia produktif di Indonesia adalah 15 tahun sampai 50 tahun sedangkan usia pensiun kerja 55 tahun. Pemerintah menetapkan, usia non-produktif mulai usia kurang dari 15 tahun sampai usia lebih dari 55 tahun (Prianti dan Nurul Fitriani, 2011).

2. Perilaku Seksual

Perilaku seksual menurut Sarwono (2010:174) adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis sedangkan Nevid., *et al* (1995) mendefinisikan perilaku seks sebagai semua jenis aktifitas fisik yang menggunakan tubuh untuk mengekspresikan perasaan erotis atau perasaan afeksi (Kusuma 2011).

Perilaku seksual pada manusia dapat diartikan sebagai aktifitas yang kompleks dan tidak hanya terbatas pada melepaskan ketegangan melalui orgasme. Secara garis besar perilaku seks dapat dikelompokkan menjadi perilaku yang normal dan perilaku seksual yang menyimpang. Perilaku seksual yang normal memiliki makna perilaku yang tidak merugikan diri sendiri dan dilakukan kepada lawan jenis dan diakui

masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang menurut Hawkins, memiliki makna sebagai perilaku seksual yang cenderung destruktif bagi diri sendiri maupun orang lain (Hartanto, 2006 dalam Hartono, 2009).

Pada dasarnya seksualitas mengacu pada stimulasi erotis. Orientasi seksual adalah pola ketertarikan seksual emosional, romantis, dan/atau seksual terhadap laki-laki, perempuan, keduanya, tak satupun, atau jenis kelamin lain (Umy, 2010).

Bentuk perilaku seksual mulai dari bergandengan tangan, berpelukan, bercumbu, *petting*, sampai berhubungan seksual. Perilaku seks aman adalah perilaku seks tanpa mengakibatkan terjadinya pertukaran cairan tubuh. Hubungan seks tanpa menggunakan kondom merupakan perilaku seks yang berisiko tinggi terhadap penularan penyakit menular seksual termasuk HIV-AIDS.

Perilaku seks secara umum dibagi jadi tiga kelompok besar:

a. Heteroseksual

Secara singkat heteroseksual dapat diartikan sebagai ketertarikan kepada orang lain yang berjenis kelamin berbeda. Perilaku heteroseksual ini ditandai dengan adanya minat seksual dan afeksi yang ditunjukkan lawan jenisnya. Lebih spesifik, Sinolungan (Palupi, 2010) menyebutkan bahwa heteroseksual adalah orang yang puas melakukan hubungan seks dengan orang yang berbeda jenis kelamin (Nugroho, K.Priyo dan Sugih Hartono. 2009).

b. Homoseksual

Homoseksual berasal dari kata *homo* yang berarti sama dan *sexual* yang berarti hubungan seksual (Master dkk,1992). dijelaskan bahwa kata homoseksual dipakai untuk menggambarkan seorang laki-laki atau perempuan yang secara khusus mempunyai hubungan dengan orang lain dengan jenis kelamin yang sama dalam suatu waktu tertentu. Menurut Katchadourian (1989), homoseksual secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perilaku seksual dan aktivitas hubungan seksual dengan individu yang mempunyai jenis kelamin yang sama (Raharjo, 2009).

c. Biseksual

Biseksual merupakan gabungan dari heteroseksual dan homoseksual, yaitu perilaku seks yang dilakukan pada jenis kelamin yang sama dan pada saat yang bersamaan juga dilakukan pada jenis kelamin yang lain (Hartono, 2009).

3. IDU (*Injecting Drug User*)

Definisi *Injecting Drug User (IDU)* menurut BNN (2007) merupakan salah satu jenis pengguna narkoba yang lebih spesifik. Komunitas IDU tersebut hanya menggunakan narkoba yang disuntikkan secara intravena, subkutan dan intramuskular. IDU lebih berisiko terkena banyak penyakit menular dibandingkan pengguna narkoba lainnya, disebabkan perilaku IDU sendiri yang sering berbagi jarum antar sesama IDU (*needle sharing*), sehingga akan lebih mudah tertular penyakit

(misalnya HIV-AIDS). Jenis obat yang sering disuntikkan IDU adalah heroin, kokain, dan juga sejenis amfetamin, buprenorpin, benzodiazepin, dan barbiturat (Labaka, 2011).

Pengaruh jangka panjang IDU Pengguna narkoba jenis suntik memiliki banyak dampak negatif bagi diri dan lingkungannya, antara lain: Pembuluh darah vena rusak akibat penggunaan alat suntik tidak steril, tetanus, gangguan pada jantung, dada, dan tenggorokan, menstruasi tidak teratur, impotensi pada pria, sembelit/mulas kronis dan tindak kekerasan dan kejahatan (Labaka, 2011).

D. Tinjauan Islam Tentang Faktor Risiko HIV-AIDS pada Usia Produktif

Dalam kehidupan di dunia, sakit adalah hal yang sangat mungkin dapat dialami oleh siapapun, bahkan terkadang dalam satu waktu seseorang bisa terkena beberapa jenis penyakit. Adapun hal yang perlu diingat bahwa orang yang sedang sakit disyariatkan baginya untuk memperhatikan dua perkara, yaitu: Yang pertama, tidak mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran terhadap ketetapan Allah swt. atas dirinya, karena kesabaran seorang muslim menandakan keimanan dirinya (Zuhri, 2011), sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya yang berarti:

“Sungguh menakjubkan keadaan seorang muslim, (karena) sesungguhnya semua urusannya berakibat baik (baginya), dan yang demikian ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang muslim, (yaitu) apabila mendapat nikmat dia bersyukur sehingga akibatnya

baik baginya dan apabila tertimpa musibah dia bersabar dan akibatnya (juga) baik baginya” (Zuhri, 2011).

Begitu pula hendaknya orang yang sakit juga melakukan introspeksi diri dari kesalahan-kesalahannya karena musibah yang menimpa seseorang merupakan akibat dari kesalahannya sehingga dengan kesabarannya dan upaya mengintrospeksi diri tersebut akan menjadi sebab terhapuskan dosa-dosanya. Adapun perkara kedua yang perlu diperhatikan oleh orang yang sakit adalah berobat dengan pengobatan yang bermanfaat serta tidak mencari bentuk pengobatan yang menyelisihi syariat. Hal ini karena Allah telah menetapkan bahwa segala penyakit itu ada obatnya.

Al-Imam Muslim *Rahimahumullah* menyebutkan dalam salah satu hadits yang beliau riwayatkan dengan sanadnya melalui jalan sahabat Jabir bin ‘Abdillah ra., dari Nabi saw., bahwasanya beliau bersabda yang artinya “Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat penyakit tersebut mengenai (orang yang sakit) maka dia akan sembuh atas izin Allah” (HR. Muslim) (Zuhri, 2011). Maka hendaknya yang dilakukan adalah berusaha untuk mencari tahu tentang obat atau tatacara pengobatannya, karena tidak setiap orang mengetahuinya demikian pula dalam pengobatan terhadap HIV-AIDS.

Keadaan ini mengisyaratkan kepada manusia agar senantiasa bersabar atas ketetapan yang diberikan Allah swt., sebagaimana firmanNya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ



Terjemahnya :

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (Depag, 2011).

“Sungguh, kami pasti akan terus menerus menguji kamu” mengisyaratkan bahwa hakikat kehidupan dunia, antara lain ditandai oleh keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Ujian yang diberikan Allah “sedikit” kadarnya bila dibandingkan dengan potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia (Shihab, 2009).

Patut dicamkan bahwa ayat sebelum ini mengajarkan shalat dan sabar. Jika demikian, yang diajarkan itu harus diamalkan sebelum datangnya ujian Allah ini. Demikian pula ketika ujian berlangsung. Itulah sebabnya rasul saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui sahabat nabi saw. Hudzaifah Ibn al-Yaman, bahwa “apabila beliau dihadapkan pada suatu kesulitan/ujian, beliau melakukan shalat.” Karena itu pula ayat di atas ditutup dengan perintah, “Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar” (Shihab, 2009).

Sabar dari segi bahasa berarti mencegah atau menahan, sedangkan dari epistemologi berarti salah satu akhlak utama yang dengannya orang bertahan dari segala perbuatan yang kurang baik, yakni: menahan hati dari hawa nafsu, menahan jiwa dari kedukaan, kegelisahan, kegundahan, kemarahan atas suatu

musibah, cobaan, ujian, ataupun kesulitan, menahan lisan dari mengadu sakit serta menahan diri dari perbuatan maksiat atau zalim lainnya.

Seorang muslim yang bersabar terhadap keputusan dan ketentuan Allah swt. adalah merupakan sikap tawakkal. Tawakkal merupakan bekal hidup seseorang yang beriman yang bisa menjadikan lebih tabah dalam menghadapi apapun bentuk cobaan atau musibah yang menimpa. Dengan sikap tawakkal seorang mukmin akan merasa tenang dalam hidupnya.

Sebagai seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Rabb-nya, janganlah orang yang sehat dan kuat tertipu dengan kekuatannya, sehingga merasa dirinya bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa memohon kepada Tuhannya. Sebaliknya, jangan pula orang yang tertimpa musibah atau dalam kondisi lemah berputus asa dari rahmat-Nya mengingat bahwa putus asa adalah sifat yang sangat tercela. Orang yang berputus asa sama artinya telah berburuk sangka kepada *Rabb*-nya, serta menganggap bahwa rahmat Allah swt. itu sangat sedikit terhadap hamba-hambanya (Zuhri, 2011). Allah swt. telah menyebutkan dalam firman-Nya ketika mengabarkan perkataan Nabi-Nya Ibrahim as. dalam Q.S. Al-Hijr/15: 56

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

“Ibrahim berkata: tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat” (Depag, 2011).

Ayat di atas menjelaskan bahwa berita gembira disampaikan kepada nabi Ibrahim as. karena “Dia” yakni nabi Ibrahim as., “berkata” menyanggah

dugaan bahwa dia berputus asa bahwa, “Aku sama sekali tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah karena aku percaya penuh kepadaNya dan kekuasaanNya apalagi tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat, yakni yang tidak menemukan jalan kebenaran serta tidak menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah (Shihab, 2009)

Bagi seseorang yang sudah terinfeksi HIV-AIDS untuk tidak berputus asa dari rahmat dan hidayah Allah karena Allah tidak pernah memberikan ujian kepada umatnya di luar batas kemampuannya, untuk itulah seseorang yang tengah sakit terkhusus karena infeksi HIV-AIDS sepatutnya untuk bersabar dan tidak berputus asa seperti yang telah dicontohkan oleh nabi Ibrahim as.

Adapun sebagian besar faktor risiko yang menyebabkan HIV-AIDS tersebut terjadi pada mereka yang telah melakukan pelanggaran. Walaupun sebenarnya mereka mengetahui bahwa hal yang dilakukan tersebut adalah suatu perbuatan yang salah sehingga Allah SWT memberikan sanksi yang berupa penyakit HIV-AIDS. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Nisâ’/3:

111

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Depag, 2011).

Ayat di atas mengingatkan manusia dalam konteks anjuran bertaubat, bahwa “barang siapa yang mengerjakan dosa”, apapun dosa itu, maka

“sesungguhnya ia mengerjakannya atas” kemudharatan “dirinya sendiri,” yakni Allah akan menjatuhkan sanksi atas pelakunya, dia tidak dapat melemparkan kesalahan kepada orang lain, tidak juga dapat mengalihkannya kepada orang lain, sebagaimana orang lain tidak dapat melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ini sangat mudah bagi Allah karena “Allah” sejak dahulu hingga kini dan masa yang akan datang “Maha Mengetahui” yang kecil maupun yang besar “lagi Maha Bijaksana” sehingga tidak menjatuhkan sanksi dan ganjaran kecuali pada tempatnya yang wajar dan benar (Shihab, 2009).

Para ahli HIV-AIDS telah menyebut virus dan penyakit ini sebagai masalah kemanusiaan yang besar. Ia merupakan penyakit menular dan akan menjadi beban berat bagi pelayanan kesehatan, sistem sosial, ekonomi, serta akan menimbulkan banyak masalah etik, legal, sosial yang menyangkut stigmatisasi, diskriminasi dan hak asasi manusia.

Fakta-fakta medis mengenai ODHA (orang dengan HIV/AIDS) menunjukkan bahwa mereka yang terkena virus ini tidak hanya orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang melanggar norma agama, melainkan juga para isteri baik-baik dan juga anak-anak. Berkaitan dengan hal ini, Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Anfâl/8: 25

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya :

“Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya” (Depag, 2011).

Ayat di atas berpesan “Dan” di samping berkewajiban memenuhi panggilan Allah dan Rasul, juga “hindarilah” datangnya “siksa yang” bila ia datang “sekali-kali tidak menimpa secara khusus orang-orang yang zalim”, yakni yang melanggar dan enggan memperkenankan seruan Rasul “diantara kamu”, orang mukmin yang telah memperkenankan seruan itu. Karena itu, jangan lesu atau jemu mengajak kepada kebaikan dan mencela kemungkaran. “Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksa-Nya” (Shihab, 2009).

Penyebaran virus HIV-AIDS terjadi karena perbuatan-perbuatan yang melanggar, sehingga dalam hal ini Allah swt. memberikan isyarat kepada manusia untuk saling memperbaiki hubungan antar manusia (*Hablum minanas*) dengan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran (*wa-tawâshau bil haq wa-tawâshau bis-sobr*).

Apabila ada yang melanggar perintahNya, akan timbul kekacauan karena yang melanggar telah melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Ketika hal itu terjadi maka akan timbul kekacauan dan akan lahir instabilitas yang mengakibatkan semua anggota masyarakat yang taat maupun yang durhaka ditimpa krisis (Shihab, 2009). Dalam konteks ini, Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

“Tidak satu masyarakat pun yang melakukan kedurhakaan sedang ada anggotanya yang mampu menegur/menghalangi mereka, tetapi dia tidak melakukannya, kecuali dekat Allah akan segera menjatuhkan

bencana yang menyeluruh atas mereka” (HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain-lain melalui Ibnu Jarir) (Shihab, 2009).

Sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. Akibat kesalahan tidak selalu hanya menimpa yang bersalah. Karena apabila kemungkaran telah meluas, dan tak ada yang tampil meluruskannya, hal tersebut berarti masyarakat tidak lagi terusik perasaan dan gairah keagamaannya akibat kemungkaran tersebut. Barang siapa yang sikapnya seperti demikian maka dapat dinilai merestui kemungkaran dan ini menjadikan yang bersangkutan terlibat secara tidak langsung dalam kemungkaran, sehingga ia pun berdosa dan wajar mendapat sanksi dari Allah swt. Keterusikan perasaan inilah yang merupakan tingkat terendah dari bentuk penolakan terhadap kemungkaran.

Demikianlah Allah menjelaskan ayatnya dalam Al-Qur'an agar manusia dapat mengambil pelajaran kehidupan sehingga tidak mudah terjerumus dan mengikuti langkah-langkah syetan yang mengakibatkan ia tertular HIV-AIDS. Allah menjelaskan keadaan sosok orang-orang yang mengenal Allah swt. dengan pengenalan yang sebenar-benarnya sehingga dengan sebab itu, mereka menjadi orang-orang yang senantiasa yakin akan pertolongan Allah swt. dan senantiasa berprasangka baik kepadaNya. Begitu pula dengan sebab keimanan mereka kepada Allah swt., mereka menjadi orang yang yakin bahwa Allah swt. Maha kuasa untuk melakukan apa yang dikehendakiNya dan bahwasanya Allah swt. sangat luas rahmatNya serta sangat besar kebaikan dan keutamaanNya kepada hamba-hambaNya.

E. KERANGKA KONSEP

1. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti

Penelitian yang dilakukan terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel terpengaruh oleh adanya variabel independen sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen.

a. Variabel Dependen

HIV-AIDS pada usia produktif akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa.

Meningkatnya derajat kesakitan dan kematian khususnya pada usia produktif ini dapat menyebabkan usia harapan hidup menjadi terhambat atau bahkan menjadi mundur yang selanjutnya dapat mengancam kehidupan penduduk bahkan kehidupan sebuah bangsa.

b. Variabel Independen

1) Perilaku Seksual

a) Heteroseksual

Penularan dari pria ke pasangan wanita secara bermakna lebih banyak daripada sebaliknya. Perkiraan penularan dengan satu kali hubungan seksual tanpa pelindung berkisar dari 9:10.000 sampai 5:1000. Kebanyakan wanita yang terinfeksi HIV melalui seks heteroseksual. Beberapa wanita menjadi

terinfeksi karena mereka mungkin tidak menyadari faktor risiko pasangan laki-laki untuk infeksi HIV atau memiliki pengetahuan dan persepsi yang kurang mengenai faktor risiko HIV (CDC, 2011).

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan virus pada serviks, dan lalu meningkatkan risiko wanita positif HIV yang menularkan pasangannya termasuk kehamilan, ektopik servikal, kontrasepsi hormonal, infeksi vagina, penyakit menular seksual, dan perkembangan penyakit seperti yang ditunjukkan oleh muatan virus tinggi atau jumlah CD4 yang menurun (Varney, 2006). Telah banyak bukti menunjukkan bahwa keberadaan Infeksi Menular Seksual (IMS) meningkatkan kemudahan seseorang terkena HIV, sehingga IMS dianggap sebagai kofaktor HIV. Oleh karena itu, upaya pengendalian infeksi HIV dapat dilaksanakan dengan melakukan pengendalian IMS (Syarifuddin, 2008).

b) Homoseksual

Kenyataan lain di masyarakat adalah seringnya terjadi perpindahan orientasi seksual karena sesuatu sebab di satu saat tertentu. Hal ini lazim disebut dengan Pseudohomoseksual. Misalnya seorang heteroseksual yang terpaksa memuaskan atau menyalurkan libido seksualnya dengan sesama jenis dengan berbagai alasan, misalnya karena keterbatasan materi, waktu,

kesempatan, keterpaksaan, lingkungan, gaya hidup dan lain sebagainya (Umy, 2010).

c) Biseksual

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan seksualitas yang sehat yang berhubungan dengan fungsi dan proses sistem reproduksi. Seksualitas dalam hal ini berkaitan erat dengan anatomi dan fungsional alat reproduksi atau alat kelamin manusia dan dampaknya bagi kehidupan fisik dan biologis manusia. Termasuk didalamnya bagaimana menjaga kesehatannya dari gangguan seperti PMS dan HIV/AIDS (Herbaleng, 2001 dalam Hartono, 2009).


PMS dan HIV/AIDS menjadi sangat serius, karena dapat dengan mudah menyebar dari satu orang kepada orang lain utamanya karena perilaku biseksual.

2) IDU (*Injecting Drugs User*/ Pengguna Narkoba Suntik)

Berdasarkan data tahun 2009, sebesar 4% penyebab HIV-AIDS tidak diketahui adalah penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau alat-alat kesehatan lainnya. Karena hal seperti ini sangat jarang diperhatikan oleh masyarakat atau pun petugas kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang untuk memperhatikan kebersihan alat-alat kesehatan dan lingkungannya (Islain, 2011).

2. Bagan Kerangka Konsep

Berdasarkan dasar pemikiran variabel penelitian di atas, maka adapun bagan kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan :



: Variabel independen



: Variabel dependen



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

3. Defenisi Operasional & Kriteria Objektif

a. Usia Produktif

Usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja, menghasilkan sesuatu, dan berpotensi untuk mempunyai keturunan baik yang berstatus belum kawin, kawin ataupun janda/duda.

Kriteria Objektif

Usia Produktif : Jika umur 15 tahun - 55 tahun

Belum/tidak produktif : Jika umur < 15 tahun atau > 55 tahun

b. Perilaku Seksual

Perilaku seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seksual yang berisiko tinggi tertular HIV-AIDS seperti perilaku seks yang tidak menggunakan kondom, menderita PMS, perilaku seksual resertif atau insertif, tidak disirkumsisi dan peningkatan jumlah pasangan seksual (Mandal, 2006) baik yang berperilaku heteroseksual, homoseksual, ataupun biseksual.

1) Heteroseksual

Kriteria Objektif

- Risiko tinggi : melakukan hubungan seks dengan orang yang berbeda jenis kelamin tanpa menggunakan kondom, menderita PMS, perilaku seksual resertif atau insertif, tidak disirkumsisi dan adanya peningkatan jumlah pasangan seksual.

- Risiko rendah : melakukan hubungan seks dengan menggunakan kondom, tidak menderita PMS, disirkumsisi dan tak ada peningkatan jumlah pasangan seksual.

2) Homoseksual

Kriteria Objektif

- Risiko tinggi : melakukan hubungan seks dengan orang yang berjenis kelamin sama.
- Risiko rendah : tidak melakukan hubungan seks dengan orang yang berjenis kelamin sama.

3) Biseksual

Kriteria Objektif

- Risiko tinggi : melakukan hubungan seksual baik dengan laki-laki maupun perempuan tanpa menggunakan kondom, menderita PMS, perilaku seksual resertif atau insertif, tidak disirkumsisi.
- Risiko rendah : tidak melakukan hubungan seksual dengan kedua jenis kelamin, menggunakan kondom, tidak menderita PMS, disirkumsisi.

c. *IDU (Injecting Drugs User)*

IDU yang dimaksud adalah penggunaan narkoba yang disuntikkan secara intravena, subkutan dan intramuskular serta ada kebiasaan menggunakan jarum suntik secara bergantian (BNN, 2011).

- Risiko tinggi : menggunakan jarum suntik secara bergantian
- Risiko rendah : tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian survei deskriptif. Dalam survei, penelitian tidak dilakukan terhadap semua populasi, tetapi hanya mengambil sebagian dari populasi (sampel) kemudian hasil dari penelitian tersebut dapat digeneralisasikan sebagai hasil populasi. Dalam penelitian survei deskriptif, penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu komunitas atau masyarakat (Notoatmodjo, 2005).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yakni:

- a. RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 11 Tamalanrea Makassar.
- b. Puskesmas Jumpandang Baru yang bertempat di Jalan Ir. Juanda No. 1 Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 7 Mei hingga 30 Juni tahun 2012.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita HIV-AIDS usia produktif pada bulan Mei 2011 hingga April 2012 yang terdaftar di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar sebanyak 45 orang dan di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar sebanyak 195 orang.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah keseluruhan objek yang diteliti atau dianggap mewakili seluruh populasi dengan kriteria inklusi. Sampel diambil dengan metode *Non Probability Sampling* atau **Nonrandom Sampling** (cara pengambilan sampel yang tidak acak) yaitu cara pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama kepada setiap anggota untuk terambil sebagai sampel, dengan teknik *Purposive Sampling* yakni pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan (Amirin, 2011).

a. Kriteria Inklusi

- 1) Penderita yang dirawat inap maupun dirawat jalan di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
- 2) Menderita HIV-AIDS sesuai dengan hasil pemeriksaan dan diagnosa dokter
- 3) Berusia produktif (15 – 55 tahun)
- 4) Status pasien memenuhi variabel yang diteliti

b. Eksklusi

- 1) Tidak menderita HIV-AIDS
- 2) Berusia < 15 tahun dan atau > 55 tahun
- 3) Status pasien yang tidak memenuhi kriteria variabel yang diteliti.

D. Besar Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi orang yang berusia produktif yang terdiagnosa HIV-AIDS di PKM Jumpandang Baru sebanyak 45 orang dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan jumlah populasi sebanyak 195 orang pada bulan Mei tahun 2011 hingga bulan April tahun 2012 dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan :

N = Besar populasi

d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan.

n = Besar sampel (Notoatmodjo, 2005)

d = 0,05 → d² = 0,0025

1. Puskesmas Jumpangang Baru Makassar (N = 45)

$$n = \frac{45}{1 + 45 (0,05^2)}$$

$$n = \frac{45}{1 + 0,1125}$$

$$n = 40$$

Jadi, besar sampel yang terambil di Puskesmas Jumpangang Baru adalah sebanyak 40 orang

2. RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar (N = 195)

$$n = \frac{195}{1 + 195 (0,05^2)}$$

$$n = \frac{195}{1 + 195 (0,05^2)}$$

$$n = 132$$

Jadi, besar sampel yang terambil di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar adalah sebanyak 132 orang

E. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan dikumpulkan dengan mengunjungi lokasi penelitian dan mengambil data sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan penelitian yang didasarkan pada data dari rekam medik pasien.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah secara manual dengan menggunakan kalkulator dan ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan besar persentase disertai penjelasan.

Analisis data dapat dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat persentase data yang terkumpul dan disajikan dalam bentuk gambar/grafik distribusi frekuensi dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori kepustakaan yang ada. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$P = f/n \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase yang dicari

f = Frekuensi faktor variabel

n = Jumlah sampel

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik Umum Penderita HIV-AIDS

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebagian besar penderita HIV-AIDS di Puskesmas Jumpang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar adalah laki-laki dengan persentase 70% (120 orang) dan perempuan 30% (52 orang).




Sumber: Data Sekunder

Grafik 4.1. Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Jenis Kelamin di Puskesmas Jumpang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011- April 2012

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penderita HIV-AIDS yang terbanyak adalah Sekolah Menengah Akhir (SMA) yaitu sebanyak 105 orang (61%) dan tingkat pendidikan terbanyak yang kedua adalah SMP yakni sebanyak 41 orang (24%).




Sumber: Data Sekunder

Grafik 4.2 Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Puskesmas Jumpang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011-April 2012

c. Berdasarkan Pekerjaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penderita HIV-AIDS di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar adalah pekerja yakni sebanyak 135 orang (78%) dan yang tidak bekerja sebanyak 37 orang (22%). Dilihat dari distribusi pekerjaan, didapatkan pasien HIV-AIDS terbanyak dari kalangan wiraswasta, yaitu sebanyak 35 orang (26%) disusul kemudian karyawan swasta 32 orang (24%) dan IRT (Ibu Rumah Tangga) sebanyak 31 orang (23%).



Sumber: Data Sekunder

Grafik 4.3. Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Pekerjaan di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011-April 2012

d. Berdasarkan Jenis Infeksi Oportunistik

Tabel 4.1
Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Jenis Infeksi Oportunistik di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011- April 2012

Infeksi Oportunistik	Total	
	n	%
Kandidiasis Oral	86	71
Tuberkulosis	44	36,36
PCP	12	10
Diare Kronik	16	13
Hepatitis C	8	7
CAP	6	5
CMV	1	0,8
Toksoplasmosis	3	2,4
Meningitis	4	3,3
PPE	1	0,8
Herpes Genital	1	0,8
Herpes Simpleks	1	0,8
Limfoma	1	0,8
Laringitis	1	0,8
Bronchitis	1	0,8
Mycocarditis	1	0,8
Dermatitis seboroik	1	0,8
ISPA	1	0,8
Varicella	1	0,8
Pneumoni thoraks	1	0,8
Total	121	


Sumber: Data Sekunder

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 172 kasus HIV-AIDS, sebesar 121 orang (70%) diantaranya menderita IO kemudian didistribusikan berdasarkan satu jenis IO yang paling banyak diderita adalah Kandidiasis Oral yakni sebanyak 86 kasus (71%).

2. Karakteristik Khusus Penderita HIV-AIDS

a. Berdasarkan Agama

Hasil penelitian diperoleh bahwa penderita HIV-AIDS yang berusia produktif di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagian besar beragama Islam, yakni sebanyak 129 orang (75%) dan Non Islam sebanyak 43 orang (25%).




Sumber: Data Sekunder

Grafik 4.4. Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Agama di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011-April 2012

UNIVERSITAS
ALAUDDIN
M A K A S S A R

b. Berdasarkan Usia Produktif

Data diatas menunjukkan bahwa kelompok usia produktif penderita HIV-AIDS yang terbanyak di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo adalah kelompok usia 29-34 tahun yaitu sebanyak 64 kasus (37%) disusul kemudian kelompok usia 23-28 tahun yakni sebanyak 51 kasus (30%).



Sumber: Data Sekunder

Grafik 4.5. Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Usia Produktif di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011 sampai April 2012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

c. Berdasarkan Faktor Risiko

1) Perilaku Seksual

a) Heteroseksual

Tabel 4.2
Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Faktor Risiko
Heteroseksual di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP
Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode
Mei 2011 sampai April 2012

Heteroseksual	Frekuensi	Persentase (%)
Risiko Rendah	85	49
Risiko Tinggi	87	51
Jumlah	172	100

Sumber: Data Sekunder

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 172 kasus HIV-AIDS, sebanyak 87 kasus (51%) perilaku heteroseksual risiko tinggi terinfeksi HIV-AIDS dan 85 kasus (49%) diantaranya berisiko rendah terinfeksi HIV-AIDS.

b) Homoseksual

Tabel 4.3
Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Faktor Risiko
Homoseksual di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP
Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode
Mei 2011 sampai April 2012

Homoseksual	Frekuensi	Persentase (%)
Risiko Rendah	158	92
Risiko Tinggi	14	8
Jumlah	172	100

Sumber: Data Sekunder

Data di atas menunjukkan bahwa, terdapat 14 kasus (8%) perilaku homoseksual risiko tinggi terinfeksi HIV-AIDS dan sebanyak 138 kasus (92%) berisiko rendah terinfeksi HIV-AIDS.

c) **Biseksual**

Tabel 4.4
Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Faktor Risiko Biseksual di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011 sampai April 2012

Biseksual	Frekuensi	Persentase (%)
Risiko Rendah	170	99
Risiko Tinggi	2	1
Jumlah	172	100

Sumber: Data Sekunder

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 172 kasus HIV-AIDS, terdapat sebanyak 2 kasus (1%) perilaku biseksual risiko tinggi terinfeksi HIV-AIDS dan 170 orang lainnya berisiko rendah terinfeksi HIV-AIDS.

2) **IDU**

Tabel 4.5
Distribusi penderita HIV-AIDS berdasarkan Faktor Risiko IDU di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Mei 2011- sampai April 2012

IDU	Frekuensi	Persentase (%)
Risiko Rendah	103	60
Risiko Tinggi	69	40
Jumlah	172	100

Sumber: Data Sekunder

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 69 kasus (40%) terinfeksi HIV-AIDS karena perilaku risiko tinggi IDU dan sebanyak 103 orang (60%) berisiko rendah terinfeksi HIV-AIDS.

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Umum Penderita HIV-AIDS

a. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin adalah perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologi laki-laki dan perempuan yang menentukan perbedaan peran mereka dalam menyelenggarakan upaya meneruskan garis keturunan. Perbedaan ini terjadi karena mereka memiliki alat-alat untuk meneruskan keturunan yang berbeda, yang disebut alat reproduksi (Sholihah, 2006).

Jenis kelamin merupakan salah satu variabel yang dapat memberikan perbedaan angka kejadian pada laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini ditimbulkan karena bentuk anatomi, fisiologi, pekerjaan dan lain-lain.

Hasil penelitian diperoleh persentase tertinggi penderita HIV-AIDS ditemukan pada penderita dengan jenis kelamin laki-laki yakni 70% (120 orang) dan perempuan sebesar 30% (52 orang). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Gobel (2008) pada “Survei Karakteristik Penderita HIV-AIDS Di Kota Makassar Tahun 2007” bahwa penderita HIV-AIDS tertinggi ditemukan pada penderita dengan jenis kelamin laki-laki di BLU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan RSU Labuang Baji, dengan jumlah kasus masing-masing 172 orang (79,3%)

dan 72 orang (80,2%) sedangkan survei oleh KPA Papua mendapatkan bahwa dari total 3185 kasus HIV-AIDS, 53,44% diantaranya adalah laki-laki, sisanya 46,56% adalah perempuan (Amiruddin R, 2007 dalam Gobel, 2008).

Perilaku dan pergaulan laki-laki cenderung terlihat lebih rentan tertular HIV-AIDS dibanding perempuan. Hal ini disebabkan laki-laki lebih banyak melakukan aktifitas diluar rumah, bertemu dengan banyak orang, serta berinteraksi dengan berbagai lingkungan sehingga tidak menutup kemungkinan berperilaku risiko tinggi terinfeksi HIV terlebih lagi jika tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan beragama yang cukup kuat.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan didefinisikan sebagai proses dan sistem pengajaran secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada peserta didik dalam peran yang aplikatif, yaitu pendidikan yang mampu diterapkan secara konkrit dan menjadikan peserta didik memiliki keterampilan hidup (*lifeskill*) sehingga pendidikan di sini berarti lebih dari sekadar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga kepada transfer keterampilan.

Pendidikan merupakan proses pengembangan kepribadian dan intelektual seseorang yang dilaksanakan secara sadar dan bertanggung jawab. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya tingkat

pengetahuannya relatif baik sehingga gaya hidup dan perilakunya cenderung ke arah perilaku hidup sehat dan positif (Gobel, 2008).

Persentase jumlah pasien HIV-AIDS berdasarkan tingkat pendidikan terakhir di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar didapatkan jumlah terbanyak adalah Sekolah Menengah Akhir (SMA) yaitu sebanyak 105 orang (61%) dan SMP sebanyak 41 orang (24%). Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penderita HIV-AIDS berada pada tingkat pendidikan yang cukup baik dan memadai. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa meskipun tingkat pendidikan dan pengetahuan sudah cukup memadai, hal tersebut tak lantas menutup kemungkinan untuk berperilaku negatif jika tanpa didasari keimanan yang kokoh.

Salah satu hasil penelitian yang mendukung, dilakukan oleh Tjarsa (2005) tentang pengetahuan, sikap dan perilaku seksual berisiko AIDS pada remaja di Klinik Catur Warga Denpasar mendapatkan bahwa meskipun 82% remaja mempunyai pengetahuan yang sudah cukup baik tentang HIV-AIDS, namun perilakunya masih negatif dimana hanya 9,8% responden yang menggunakan kondom saat melakukan hubungan seks dengan pasangannya (Gobel, 2008).

c. Pekerjaan

Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan, diperbuat untuk mendapatkan nafkah atau menghasilkan uang. Pekerjaan yang dilakukan akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan seseorang. Pekerja adalah

mereka yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang-barang atau juga dengan bertujuan untuk memperoleh penghasilan (Gobel, 2008).

Sebagian besar penderita HIV-AIDS di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar adalah pekerja yakni sebanyak 135 orang (78%) dan yang tidak bekerja sebanyak 37 orang (22%). Dilihat dari distribusi pekerjaan, didapatkan pasien HIV-AIDS terbanyak dari kalangan wiraswasta, yaitu sebanyak 35 orang (26%). Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Innes Angita (2011) di RSUP Dr. Kariadi Semarang dimana pasien HIV/AIDS terbanyak berasal dari kalangan pegawai swasta (21,43%), buruh (21,43%) dan Ibu Rumah Tangga (19,05%) (Angita, 2011).

Banyaknya penderita HIV-AIDS dikalangan pekerja dapat dikarenakan tingkat aktifitas pekerja yang aktif, dan mobilitas yang tinggi sehingga banyak berinteraksi dengan khalayak umum dan berbagai lingkungan termasuk berinteraksi dengan penderita HIV-AIDS yang tidak diketahui seropositifnya.

d. Infeksi Oportunistik

Infeksi oportunistik adalah infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme penyebab penyakit yang terjadi akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Mikroorganisme ini sangat umum berada pada tubuh yang normal dan tidak menyebabkan penyakit karena dikendalikan oleh sistem kekebalan tubuh yang sehat tetapi, karena mikroorganisme tersebut 'memanfaatkan kesempatan' (*opportunity*) yang diberikan oleh sistem

kekebalan tubuh yang rusak sehingga menimbulkan penyakit infeksi oportunistik yang disebabkan oleh berbagai virus, jamur, bakteri yang dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh termasuk kulit, paru-paru dan otak (Murni, 2003 dalam Gobel, 2008).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 172 penderita HIV-AIDS di Puskesmas Jumpang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, sebanyak 121 kasus (70%) HIV-AIDS diantaranya menderita IO. Dari 121 kasus (70%) penderita HIV-AIDS yang menderita IO, kemudian didistribusikan berdasarkan satu jenis IO yang diderita, memperlihatkan bahwa Kandidiasis Oral adalah yang terbanyak yakni sebanyak 86 kasus (71%). Hal ini kemungkinan disebabkan karena selain sistem kekebalan tubuh yang sudah menurun tidak diimbangi dengan asupan nutrisi dan *personal hygiene* yang baik khususnya pada daerah oral sehingga hal ini memicu timbulnya Kandidiasis Oral.

Penelitian ini memiliki kesamaan pada penelitian yang dilakukan di beberapa tempat misalnya di RS Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta menunjukkan bahwa infeksi oportunistik yang tersering adalah kandidiasis orofaringeal sebesar 80,8% (Djoerban dan Djauzi, 2003 dalam Angita, 2011). Di RSUP Dr. Kariadi Semarang didapatkan pasien HIV/AIDS dengan infeksi oportunistik kandidiasis orofaringeal sebesar 79% (Sofro, *et al.*, 2006 dalam Angita, 2011).

Kandidiasis orofaringeal adalah infeksi oportunistik mukosa yang dalam banyak kasus disebabkan oleh jamur *Candida albicans*, tetapi dapat pula disebabkan oleh spesies lain seperti *Candida glabrata*, *Candida tropicalis*, dan *Candida krusei* (Ellepola, 2000 dalam Angita, 2011). Pada penelitian Egusa, dkk dilaporkan bahwa pasien HIV dengan kandidiasis orofaringeal memiliki risiko 2,5 kali lebih progresif menjadi AIDS daripada pasien HIV tanpa kandidiasis orofaringeal (Sharma, 2006 dalam Angita, 2011).

2. Karakteristik Khusus Penderita HIV-AIDS

a. Agama

Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar penderita HIV-AIDS beragama Islam, yakni sebanyak 129 orang (75%) dan Non Islam sebanyak 43 orang (25%). Banyaknya penderita HIV-AIDS yang beragama Islam dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia khususnya di Kota Makassar beragama Islam. Tingginya angka orang islam yang menderita HIV-AIDS menyiratkan bahwa hal lain yang turut berpengaruh adalah kualitas keimanan yang dimiliki oleh setiap orang Islam itu sendiri.

Seorang muslim yang beriman memiliki suatu konsep kehidupan yaitu Al-Qur'an, yang di dalamnya terdapat semua petunjuk yang mengatur semua sisi kehidupannya baik yang *haq* maupun yang *bathil* sehingga ia dapat memilih untuk melakukan yang benar ataupun yang salah. Allah swt., berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 208

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Depag, 2011).

Kata (السِّلْمِ) *as-silm*, yang diterjemahkan dengan “kedamaian” atau “islam”, makna dasarnya adalah “damai” atau “tidak mengganggu”. Orang yang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam “wadah kedamaian” itu secara menyeluruh (*kâffah*/كَافَّةً) sehingga semua kegiatannya berada dalam koridor kedamaian tanpa terkecuali (Shihab, 2009).

Ayat tersebut di atas menuntut setiap yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam, jangan hanya percaya dan mengamalkan sebagian ajarannya dan menolak atau mengabaikan sebagian yang lain, memeluk agama islam tetapi tidak melaksanakan perintah Allah swt. tetapi justru melakukan berbagai pelanggaran terhadap syariat islam.

Kata (خطوات الشَّيْطَانِ) *khatuwât asy-syaithân*/ langkah-langkah syaitan mengandung isyarat bahwa dalam menjerumuskan manusia, syaitan menempuh jalan bertahap, langkah demi langkah, menyebabkan yang dirayu tidak sadar bahwa dirinya telah terjerumus ke jurang kebinasaan (Shihab, 2009). Oleh karena itu, sebagai seorang muslim marilah kita berusaha untuk lebih mendekatkan diri dan mengenal *Rabb*

kita dengan sebenar-benarnya karena setan selalu menggoda manusia, baik yang durhaka terutama yang taat, sehingga dengan mengenal Allah swt. maka kita akan semakin mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini.

Seseorang yang mengetahui Allah swt. adalah *Rabb* yang memiliki sifat hikmah dan Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya, tentu akan bersabar dan tetap istiqamah di atas syariat-Nya, karena dia mengerti bahwa di balik datangnya musibah dan ujianNya, ada hikmah yang Allah SWT kehendaki, sehingga dengan ujian tersebut terbedakanlah antara orang yang bersabar dengan yang tidak bersabar. Seseorang yang telah mengenal Rabbnya tidak akan melanggar syariat-Nya tatkala dirinya ditimpa musibah yang menyebabkan ia terjerumus dalam penyakit seperti HIV-AIDS.

b. Usia Produktif

Tingkat usia produktif penderita HIV-AIDS terbanyak di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo adalah kelompok usia 29-34 tahun yaitu sebanyak 64 orang (37%) disusul kemudian kelompok usia 23-28 tahun yakni sebanyak 51 orang (30%). Hasil ini hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Innes Angita (2011) dimana persentase tertinggi penderita HIV-AIDS adalah kelompok umur 30 – 39 tahun.

Tingginya prevalensi HIV-AIDS pada umur produktif ini disebabkan karena orang pada kelompok umur tersebut merupakan

kelompok usia produktif dan aktif melakukan berbagai macam aktifitas, dalam aktifitasnya mereka melakukan kontak dengan orang lain tidak terkecuali kontak dengan penderita HIV-AIDS, selain aktifitas fisik yang besar pada kelompok umur ini, produksi hormon seks pada kelompok umur ini sangat besar sehingga aktifitas seksualnya pun meningkat, bila tidak ada pengendalian diri maka akan terjerumus pada seks bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penularan HIV-AIDS (Endang, 2002 dalam Gobel, 2008).

c. Faktor risiko

1) Perilaku Seksual

a) Heteroseksual

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari 172 kasus, sebanyak 87 kasus (51%) heteroseksual risiko tinggi terinfeksi HIV-AIDS dan 85 kasus (49%) diantaranya berisiko rendah terinfeksi HIV-AIDS. Hasil penelitian ini sesuai dengan laporan hasil survei KPAN dan BNN, peningkatan jumlah penderita tidak lagi didominasi penggunaan jarum suntik tapi mulai didominasi perilaku seks bebas luar nikah atau heteroseksual (Amirullah, 2011). Walaupun agama dan budaya Indonesia tidak permisif terhadap hubungan seks diluar nikah, dalam kenyataannya penularan melalui hubungan seksual meningkat di hampir semua provinsi.

Data Departemen Kesehatan (2007) di Indonesia diperoleh bahwa terdapat sekitar 221.000 penjaja seks dan 3 juta lebih

pelangganya. Jumlah ini belum termasuk waria penjaja seks yang juga melayani pelanggan WPS yang jumlahnya mencapai 28.000 orang (Nugroho dan Sugih, 2009).

Seks komersial merupakan penyumbang penting berkembangnya penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS kedalam populasi umum dimana pelanggannya merupakan jembatan antara kelompok berisiko dengan populasi umum (UNAIDS, 2002 dalam Nugroho dan Sugih, 2009).

Seks komersial ini mengikuti mekanisme pasar, dimana semakin meningkat jumlah pelanggan (permintaan), akan diikuti juga dengan meningkatnya jumlah penjaja seks (penawaran) sehingga sekalipun jumlah pria yang membeli seks komersial meningkat, frekuensi kontak seks komersial sebenarnya akan relatif sama karena akan diimbangi dengan naiknya penawaran sehingga tingkat risiko tertular HIV masih relatif sama (Nugroho dan Sugih, 2009).

Survei Surveilans Perilaku (SSP) juga menunjukkan bahwa kelompok pria beristri yang suka membeli seks juga meningkat tajam. Sepertiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah beristri pun suka membeli seks (Nugroho dan Sugih, 2009).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ali (2005) pada “Survei Pengetahuan dan Perilaku Berisiko Sopir Pete-Pete Kampus Unhas terhadap HIV/AIDS” menunjukkan bahwa dari 98 sopir, ada 60 sopir (61%) pernah melakukan hubungan seksual diluar status

perkawinan dari jumlah ini ada 34 sopir (56,7%) yang pernah melakukan hubungan seksual secara bebas atau berganti-ganti pasangan dan sebesar 51 orang (85%) dari 60 sopir tersebut pernah berhubungan seksual dengan PSK (Ali, 2005).

Penularan HIV melalui hubungan seks yang tidak aman ini, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Mu'minûn/23: 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan mereka menyangkut kemaluan-kemaluan mereka adalah pemelihara-pemelihara kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak wanita yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidaklah dicela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah pelampau-pelampau batas” (Depag, 2011).

Kata *hâfizhûn* terambil dari kata *hifzh* yang antara lain berarti *memelihara* atau *menahan*. yang dimaksud adalah memelihara kemaluan sehingga tidak digunakan pada tempat dan waktu yang tidak dibenarkan agama serta menahannya sehingga selalu terawasi dan tidak tergelincir dalam keburukan (Shihab, 2009).

Ayat di atas menjelaskan tentang orang mukmin yang akan memperoleh kebahagiaan, yaitu mereka yang selalu menjaga kemaluan, yakni tidak menyalurkan kebutuhan biologis melalui hal dan cara-cara yang tidak dibenarkan atau yang tidak diestui agama,

kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka yaitu suami atau isteri mereka sehingga barang siapa mencari pelampiasan hawa nafsu di balik itu, maka mereka itulah pelampau-pelampau batas ajaran agama dan moral sehingga wajar bila mereka mendapat azab yakni penyakit HIV dan AIDS.

2) Homoseksual

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 172 kasus yang diteliti, terdapat 14 kasus (8%) perilaku homoseksual yang berisiko tinggi terinfeksi HIV-AIDS dan sebanyak 138 kasus (92%) berisiko rendah. Homoseksual ini berisiko tinggi terinfeksi HIV-AIDS karena dalam berhubungan seksual seperti anal seks, akan terjadi luka pada jaringan sehingga virus HIV dapat masuk ke dalam tubuh melalui jaringan tubuh yang terluka.

Komunitas *gay* (sebutan homoseksual bagi laki-laki) dipandang rentan terhadap penularan PMS dan HIV/AIDS mengingat perilaku seksual komunitas *gay* yang cenderung bebas dan berganti-ganti pasangan serta rendahnya informasi tentang kesehatan reproduksi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa umur 18-29 tahun sebanyak 45% telah menjadi mitra seksual dan ditemukan 9% diantaranya positif HIV/AIDS (Hirshfield *et.al*, 2003 dalam Hartono, 2009).

Penelitian menunjukkan (Triningsih, 2006 dalam Hartono, 2009) bahwa perilaku seksual pada *gay* dapat dibedakan menjadi 3

kategori yaitu: 1) Perilaku oral genital, memeluk, dan mencium; 2) Seks anal; 3) Tindakan alternatif seperti *Fisting* (yaitu berupa tangan tapi bukan mengepal, dimasukkan kedalam rektum pasangan).

Orang yang mengarahkan kebutuhan seksualnya pada perilaku homoseksual kemungkinan dikarenakan adanya dorongan kepuasan seks dengan sesama jenis, tidak senang atau karena ketidakpuasan terhadap heteroseksual, serta ketakutan terhadap pengalaman heteroseksual (Master, dkk, 1992 dalam Raharjo, 2009).

Kecenderungan seseorang menjadi homoseksual maupun heteroseksual dipengaruhi oleh orientasi seksual yang muncul. Munculnya perilaku homoseksual dikemukakan oleh Kinsey (dalam Davidson dan Neale, 1974) bahwa data-data yang menunjukkan pada perilaku homoseksual disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) Adanya peristiwa yang mengarah pada individu terhadap pengalaman seksual pada sesama jenis; 2) Akibat dari kondisi-kondisi pengalaman yang ada; 3) Secara tidak langsung pengaruh opini orang lain serta opini masyarakat akan memberikan dampak pada seseorang untuk memutuskan atau menolak tipe dari hubungan seksual ini (Raharjo, 2009).

Perbuatan homoseksual di dalam Islam adalah perbuatan yang sama sekali tidak dapat ditolerir karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap fitrah/kodrat manusia. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A'raf/7: 80-81

وَأُوطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
 الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ
 أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٢﴾

Terjemahnya:

“Dan (Kami juga telah mengutus) nabi Lûth. (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya: ‘apakah kamu mengerjakan fâhisyah yang tidak satu pun mendahului kamu mengerjakannya di alam raya. Sesungguhnya kamu telah mendatangi lelaki untuk syahwat bukan wanita bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas”.

Ayat di atas menyatakan: “Dan” Kami juga mengutus nabi “Lûth”. Ingatlah “ketika dia berkata kepada kaumnya” yang ketika itu melakukan kedurhakaan besar: ”Apakah kamu mengerjakan fâhisyah”, yakni melakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual “yang tidak satu pun mendahului kamu mengerjakannya di alam raya”, yakni di kalangan makhluk hidup di dunia ini. “Sesungguhnya kamu telah mendatangi lelaki untuk” melampiaskan “syahwat” (nafsu) melalui mereka yang sesama jenis, “bukan” terhadap “wanita” yang secara naluriah seharusnya kepada merekalah kamu (lelaki) menyalurkan naluri seksual. Hal itu kamu lakukan terhadap lelaki bukan disebabkan wanita tidak ada atau tidak mencukupi kamu, tetapi itu kamu lakukan karena kamu durhaka “bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas” sehingga melakukan pelampiasan syahwat bukan pada tempatnya (Shihab, 2009).

Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamai *fâhisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Hubungan seks yang merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan terhadap lawan jenis. Jika terjadi homoseksual baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun wanita dengan wanita, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Setiap pelanggaran terhadap fitrah mengakibatkan apa yang diistilahkan dengan *Uqûbatul fithrah* (sanksi fitrah) (Shihab, 2009).

Dalam konteks pelanggaran terhadap fitrah seksual, sanksinya antara lain apa yang dikenal dewasa ini dengan penyakit AIDS. Penyakit ini ditemukan pertama kali pada seorang yang ternyata melakukan hubungan seksual secara tidak normal. Kemudian, ditemukan pada orang-orang lain dengan kebiasaan seksual yang serupa. Penyebab utama AIDS adalah hubungan yang tidak normal itu dan inilah antara lain yang disebut *fâhisyah* di dalam Al-Qur'an. Dalam satu riwayat yang oleh sementara ulama dinyatakan sebagai hadits nabi Muhammad SAW., dinyatakan yang artinya:

“Tidak merajalela *fâhisyah* dalam satu masyarakat sampai mereka terang-terangan melakukannya kecuali tersebar pula wabah dan penyakit diantara mereka yang belum pernah dikenal oleh generasi terdahulu” (Shihab, 2009).

“Pelampauan batas” yang menjadi penutup dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa kelakuan kaum nabi Lûth as. yakni perbuatan homoseksual, telah melampaui fitrah kemanusiaan sekaligus menyia-

nyiakkan potensi yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar guna kelanjutan jenis manusia.

3) **Biseksual**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 172 kasus HIV-AIDS, terdapat sebanyak 2 kasus (1%) perilaku biseksual risiko tinggi yang terinfeksi HIV-AIDS dan 170 kasus lainnya berisiko rendah terinfeksi HIV-AIDS. Menurut hasil penelitian Ratnawati (2002) bahwa perilaku oral seks dan anal seks yang dilakukan komunitas waria dalam berhubungan seksual sangat berisiko terhadap terjadinya PMS dan HIV/AIDS (Hartono, 2009).

Meskipun jumlah penderita HIV-AIDS karena perilaku biseksual tidak sebanyak faktor risiko heteroseksual dan homoseksual, jumlah ini tetap dipandang sebagai ancaman yang sewaktu-waktu bisa bertambah bila tidak dilakukan pengendalian.

d. **IDU**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 69 kasus (40%) perilaku IDUs risiko tinggi yang tertular HIV-AIDS. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Fatmah Afrianti Gobel (2008) yang menemukan bahwa mayoritas (46,2%) penderita HIV/AIDS dikarenakan faktor risiko IDU. Perbedaan ini disebabkan karena telah terjadi perubahan mode transmisi dimana faktor heteroseksual menjadi lebih dominan diantara semua jalur transmisi HIV-AIDS.

Penularan HIV-AIDS melalui penyalahgunaan jarum suntik ini dalam pandangan Islam, ada kecenderungan bahwa penderita tidak memperhatikan sisi kebersihan sehingga terjangkit virus HIV. Islam menekankan kepada umatnya betapa penting arti kesehatan dalam hidup.

Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada pengobatan (*al-wiqayah khairum-minal 'ilaj*) sehingga untuk menuju pada upaya pencegahan tersebut, Islam menekankan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan secara lahir dan batin. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 222

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

“...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri”.

Bertaubat sebagaimana dikemukakan pada ayat tersebut diatas akan menghasilkan kesehatan mental, sedangkan kebersihan lahiriah menghasilkan kesehatan fisik. Dalam Islam kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan adalah pangkal kesehatan, sedangkan kesehatan merupakan modal utama untuk dapat hidup produktif dan melaksanakan peribadatan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah*” (HR Muslim). Dengan demikian, rendahnya kesadaran terhadap kebersihan akan mengancam kesehatan yang akhirnya akan berdampak pada tingginya angka penularan HIV-AIDS.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Perilaku heteroseksual merupakan mode transmisi yang paling banyak menyebabkan HIV-AIDS pada usia produktif. Sebanyak 87 kasus (51%) perilaku heteroseksual risiko tinggi terinfeksi HIV-AIDS.
2. Perilaku homoseksual risiko tinggi yang terinfeksi HIV-AIDS terdapat sebanyak 14 kasus (8%) diantara 172 kasus penderita HIV-AIDS yang berusia produktif.
3. Perilaku biseksual risiko tinggi yang terinfeksi HIV-AIDS terdapat sebanyak 2 kasus (1%) diantara 172 kasus penderita HIV-AIDS yang berusia produktif.
4. Sebanyak 69 kasus (40%) diantara 172 kasus penderita HIV-AIDS yang berusia produktif tertular HIV-AIDS karena perilaku risiko tinggi IDU.
5. Penderita HIV-AIDS yang berusia produktif di Puskesmas Jumpandang Baru dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagian besar beragama Islam, yakni sebanyak 129 orang (75%) dan Non Islam sebanyak 43 orang (25%).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar:

1. Tidak melakukan hubungan seks di luar nikah.
2. Bersikap saling setia terhadap pasangan suami isteri.
3. Menghindari penggunaan jarum suntik secara bersama-sama.
4. Kerjasama diantara semua komunitas pelayanan yang terkait terutama dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial sangat diperlukan dalam melakukan penyuluhan, dan konseling untuk memberdayakan masyarakat guna mengurangi angka kejadian HIV-AIDS.
5. Seorang muslim sudah sepatutnya untuk lebih mengenal Rabb-nya dengan bertaqwa sebenar-benarnya. Dengan mengenal Allah swt. seorang muslim akan senantiasa selalu berusaha menjaga syariat yang telah ditentukanNya sehingga tidak tergelincir dalam praktik-praktik yang dapat menyebabkannya terinfeksi HIV-AIDS dan bagi orang yang sudah terlanjur terinfeksi HIV-AIDS agar segera bertaubat serta menyucikan diri karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dalam ayat lain disebutkan pula Allah swt. maha pengampun, sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Zumar/39:53

﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Depag, 2011).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah.** 2011. *"Ibu Rumah Tangga Rawan Terkena HIV"* (Online). <http://www.tempo.co> (Diakses 02 maret 2012).
- Amirin, Tatang M.** 2009. *"Populasi dan sampel penelitian 3 : Pengambilan sampel dari populasi tak-terhingga dan tak-jelas"* (Online). <http://tatangmanguny.wordpress.com> (Diakses 19 maret 2012).
- Angita, Innes. 2011. *"Karakteristik Pasien HIV/AIDS dengan Kandidiasis Orofaringeal di RSUP Dr Kariadi Semarang"* (Online). Karya Tulis Ilmiah. Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2011. <http://eprints.undip.ac.id> (Diakses Maret 2012).
- Ali, A Rahim. 2005. *"Laporan Hasil Survei Pengetahuan dan Perilaku Berisiko Sopir Pete-pete Kampus Unhas terhadap HIV/AIDS"* (Online). Disajikan dalam rangka memperingati hari HIV/AIDS sedunia 1 desember 2005. <http://arali2008.files.wordpress.com> (Diakses Maret 2012)
- BNN. 2011. *"Ringkasan Eksekutif Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia tahun 2011 (kerugian sosial dan ekonomi)"*(Online). <http://www.bnn.go.id> (Diakses, Mei 2012)
- Brooks, Geo F., Janet S. Butel, dan Stephen A. Morse. *Medical Microbiology*. Terj. Nani Widorini dan Dripa Sjabana, *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika, 2005.
- Cdc. 2011. *"HIV among Women"* (Online). <http://www.cdc.gov/hiv/> (Diakses 06 maret 2012).
- Coad, Jane dan Melvyn Dunstall. *Anatomy and Physiology for Midwives*. Terj. Brahm U. Pendit dan Monica Ester, *Anatomi dan Fisiologi untuk Bidan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002.
- Decker, M dan Janet. 2006. *"Sitokin-sitokin imun selektif dan aktivitasnya"* (Online). <http://microzet.arizona.edu/> (Diakses 21 maret 2012).
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. *"Al-Quran dan Terjemahnya."* Bandung: Al Mizan Publishing House.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2003. *"Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia"* (Online). <http://data.unaids.org> (Diakses 21 Oktober 2011).

- _____. 2006. *"Pedoman Pelayanan Kefarmasian Untuk Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)"*. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI (Online). <http://binfar.depkes.go.id> (Diakses 23 April 2012).
- Dorothy, M Russel. 2011. *"Bebas dari 6 Penyakit Paling Mematikan"*. Yogyakarta: MedPress.
- Gassing, Qadir dan Wahyuddin Halim. *"Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi"*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Gillespie, Stephen H dan Katleen B Bamford. *Medical Microbiology and Infection at A Glance: Third Edition*. Terj. Stella Tinia, Rina Astikawati, dan Amalia Safitri, *At a Glance Mikrobiologi Medis dan Infeksi* Ed. III. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Gobel, Fatmah Afrianty. 2008. *"Survei Karakteristik Penderita HIV/AIDS di Kota Makassar tahun 2007."* Jurnal Madani FKM UMI Vol.I No.2 (Online). <http://isjd.pdii.lipi.go.id> (Diakses 21 Maret 2012)
- _____. 2011. *"Epidemi HIV/AIDS di Sulawesi Selatan"* (Online). <http://kesehatan.kompasiana.com> (Diakses 19 Maret 2012).
- Hartono, Aput. 2009. *"Faktor Risiko Kejadian Penyakit Menular Seksual (PMS) pada Komunitas Gay Mitra Strategis Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta."* Skripsi Sarjana Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Surakarta (Online). <http://etd.eprints.ums.ac.id> (Diakses Maret 2012).
- Hidayat. A., Aziz Alimul. 2007. *"Metode Penelitian & Teknik Analisa Data."* Jakarta: Salemba Medika.
- Hanifah, Rizka. 2011. *"Sistem Imun Adaptif atau Spesifik"* (Online). <http://allergyclinic.wordpress.com> (Diakses 19 Maret 2012).
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *"Laporan Situasi Perkembangan HIV/AIDS di Indonesia sampai dengan Maret 2012"* (Online). Ditjen PP&PL Kementerian Kesehatan RI. <http://www.aidsindonesia.or.id> (Diakses 30 Juni 2012).
- Kusuma, P Wiranata. 2011. *"Definisi Perilaku Seksual"* (Online). <http://pwwkorganization.blogspot.com> (Diakses 14 Maret 2012).
- Krisno, Agus. 2011. *"Klasifikasi virus"* (Online). <http://aguskrisnoblog.wordpress.com> (diakses 1 April 2012).

- Labaka, Dimas. 2011. “*Penelitian IDU (injecting drug user)*” (Online). http://dimas-nursehalut.blogspot.com/2011/07/penelitian-idu-injecting-drug-user_06.html (Diakses 06 juni 2012)
- Latarul M. Islain. 2011. “*Al-Qur’an Sebagai Vaksin HIV/AIDS Dalam Konsep Islam*” (Online). <http://muhlatarulislain.blospot.com/> (Diakses 13 Desember 2011).
- Mandal, B.K, *et al.*, eds. 2006. “*Lecture Notes: Penyakit Infeksi*” edisi keenam. Jakarta: Erlangga,
- Mansyoer, Arif, *et al.*, eds. 2001. “*Kapita Selekta Kedokteran.*” Jakarta: Media Aesculapius FK UI.
- Nugroho, K.Priyo dan Sugih Hartono. 2009. “*Perilaku Seksual dan Struktur Sosial: Studi tentang Epidemic HIV dan AIDS di Indonesia.*” (Online). Jurnal Indonesian Society for Social Transformation (INSIST) Yogyakarta (Diakses Agustus 2012).
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. “*Metodologi Penelitian Kesehatan*”. Cet. 3. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Purwaningsih, Sri Sunarti dan Widayatun. 2008. “*Perkembangan HIV dan AIDS di Indonesia: Tinjauan Sosio Demografi.*” Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. III, No. 2 (Online). <http://isjd.pdii.lipi.go.id> (Diakses 21 Maret 2012).
- Prianti, Martina dan Nurul Fitriani. 2011. “*Usia Produktif Dorong Pertumbuhan Ekonomi*” (Online). <http://www.indonesiainancetoday.com>. (Diakses 23 April 2012).
- Raharjo, Trubus. 2009. “*Dorongan Seksual dan Kecenderungan Perilaku Homoseksual pada Santri Remaja di Pesantren*” (Online). Jurnal Muria Universitas Muria Kudus (Diakses Agustus 2012).
- Shihab, M Quraish. 2009. *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* Vol. IV, Vol. VII, dan Vol. VIII. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholihah, Nikmatus. 2006. “*Gender dan jenis kelamin*” (Online). <http://pmiiliga.wordpress.com> (Diakses 06 Juni 2012).
- Spiritia. 2009. “*Dasar AIDS*” (Online). Pemberdayaan Positif, Lembaran Informasi No. 1 <http://spiritia.or.id/> (Diakses 06 Januari 2012).
- Stang. “*Panduan Penulisan Skripsi*”. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2008.

- Suryani, Mega Dewi, *et al.*, eds. 2009. “*Makalah Diagnostik Klinik HIV-AIDS*” (Online). Departemen Farmasi Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. <http://exuico.multiply.com> (Diakses 23 April 2012).
- Syaifuddin, Abdul Bari, *et al.*, eds. 2008. “*Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*” Ed IV Cet.I. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Uaksena. 2011. “*Pengertian Pendidikan dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan*” (Online). <http://elearningpendidikan.com> (diakses 04 Juli 2012).
- Umy. 2010. “*Mengenal Orientasi Seksual*” (Online). <http://blog.umy.ac.id/> (diakses 23 april 2012).
- Al-Atsariyah, Ummu Ishaq. “*Sikap Keliru Saat Sakit (Bag.I)*”. *Majalah AsySyariah Edisi 074* (Online). <http://asysyariah.com> (Diakses Agustus 2012).
- Varney, Helen, Jan M. Kriebs, dan Carolyn L. Gregor. 2006. “*Buku Ajar Asuhan Kebidanan*”, Vol 1. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- _____. 2006. “*Buku Ajar Asuhan Kebidanan*”, Vol 2. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Zuhri, Syaifuddin. “*Berobat dalam Tinjauan Syariat*”. *Majalah AsySyariah Edisi 048* (Online). <http://asysyariah.com> (Diakses Agustus 2012).

BIODATA PENULIS

A. Identitas Penulis

Nama lengkap : Anggi Angraini Zainul
NIM : 70400009002
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat /Tgl Lahir : Ujung Pandang, 26 November 1991
Suku /Bangsa : Makassar/Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Maccini Raya No. 1 Makassar

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1997-2003 : Sekolah Dasar Inpres Maccini I/I, Makassar
2. Tahun 2003-2006 : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tridharma
MKGR, Makassar
3. Tahun 2006-2009 : Sekolah Menengah Atas (SMA) Ittihad, Makassar
4. Tahun 2009-2012 : Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
Sulawesi Selatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

MASTER TABEL PENELITIAN

No.	No.Reg	Nama	Umur	JK		Agama		Pendidikan					Pekerjaan							Faktor Risiko				Infeksi Oportunistik				
				L	P	0	1	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	KO	TB	DK
1	420501	Tn A	47	√		√						√												√				T, CMV
2	341427	Tn E	30	√		√							√	√												√		PCP
3	510933	Tn Z	44	√		√							√		√								√					CAP
4	528932	Tn A	27	√		√						√				√									√	√		
5	530422	Tn I	33	√		√						√			√										√	√	√	
6	530227	Ny N	41		√	√					√												√	√				
7	529960	Ny Y	29		√	√						√											√	√				CAP
8	532822	Tn Y	32	√			√						√										√		√			HG
9	534193	Tn J	30	√		√		√							√								√					PT
10	533480	Tn I	28	√		√							√		√								√					Hep. C
11	535384	Tn A	34	√		√							√			√							√		√			
12	535620	Tn J	51	√		√						√											√			√		
13	382773	Tn H	23	√			√					√			√								√					PCP
14	536063	Tn H	29	√		√						√			√								√					Wasting
15	536054	Ny A	20		√	√						√											√					
16	536578	Tn A	53	√		√							√			√							√			√		
17	537463	Tn D	32	√			√						√			√									√		√	
18	537760	Tn E	30	√			√						√	√									√			√		
19	538132	Tn E	45	√			√	√						√											√	√	√	√

20	538659	Tn F	24	√		√			√		√						√				√		
21	538648	Tn A	31	√		√			√		√						√	√	√				
22	539232	Tn D	32	√	√				√		√						√				√		
23	538878	Ny Y	34		√	√			√										√				PPE
24	539319	Tn D	27	√		√			√		√							√	√				
25	540569	Tn S	33	√		√			√									√	√		√		
26	540620	Ny H	33		√	√			√								√	√		√	√		
27	539558	Ny A	23		√	√			√								√	√		√			M, T, C
28	541584	Ny E	27		√	√			√		√							√	√				Hep.C
29	542296	Tn H	52	√		√			√									√		√			Hep.C
30	543628	Tn S	31	√		√			√									√	√				
31	543853	Tn R	26	√		√			√									√		√	√		
32	544305	Ny R	38		√	√			√									√	√		√	√	
33	544451	Tn R	30	√		√			√		√							√	√	√			
34	544733	Tn V	23	√		√			√		√							√	√	√			M
35	544697	Tn S	38	√		√			√									√					APP
36	545077	Tn R	25	√		√			√		√							√		√			
37	545267	Ny Y	31		√	√			√		√							√		√			
38	546009	Tn V	36	√		√			√		√							√		√		√	Hep.C
39	465600	Tn A	47	√		√			√									√		√			
40	466272	Tn Y	50	√		√			√		√							√					
41	467902	Ny V	30		√	√			√									√	√				
42	544119	Ny S	24		√	√			√									√	√				
43	466124	Ny S	28		√	√			√		√							√	√				PCP
44	465880	Ny E	26		√	√			√		√							√	√				

70	517319	Tn M	26	√	√			√						√			√		√			
71	517553	Tn A	32	√	√			√		√							√	√	√			
72	517568	Tn F	23	√	√			√		√							√					
73	520213	Tn A	32	√		√		√				√					√	√				
74	521439	Ny M	27		√	√		√		√							√	√				
75	521346	Ny M	23		√	√			√			√				√						
76	477899	Ny M	51		√	√		√				√				√		√	√			ISPA
77	475206	Tn H	31	√		√		√		√						√						DS
78	475519	Tn M	39	√		√		√				√			√			√				
79	477223	Ny S	26		√	√		√				√			√							Pneumoni
80	477592	Tn M	26	√		√		√		√						√		√	√			PCP
81	477782	Tn H	42	√		√		√				√			√			√				Mycocarditis
82	479224	Ny S	26		√	√		√			√				√			√				
83	479225	Tn I	25	√		√		√			√						√	√				Wasting
84	404468	Tn S	53	√		√				√	√				√			√				T, CAP
85	480336	Tn S	33	√		√		√				√				√	√					PCP
86	480586	Ny N	28		√	√		√					√		√			√				PCP
87	480683	Tn I	30	√		√		√				√				√			√			Wasting, CAP
88	479651	Ny N	21		√		√		√				√		√							
89	481230	Ny S	21		√	√		√					√		√							PCP, Limfoma
90	481842	Ny R	19		√	√		√					√		√							
91	524361	Tn L	30	√		√		√				√				√	√	√				
92	524206	Tn I	17	√		√		√				√		√		√						Bronchitis
93	524506	Ny A	48		√		√		√			√			√			√				
94	523600	Tn R	23	√		√		√				√				√		√				

95	524589	Ny A	17		√		√			√				√						√		√					
96	523260	Tn S	45	√		√				√				√						√		√	√				
97	539331	Tn Y	27	√			√			√										√		√					
98	539319	Tn N	37	√		√				√				√						4		√	√	√			
99	529481	Ny E	33		√	√				√										√	√		√				
100	530391	Tn A	47	√		√				√				√							√		√				
101	533275	Tn A	19	√		√				√				√							√		√				
102	536486	Ny S	44		√	√				√				√							√		√				
103	538589	Tn A	35	√		√				√				√							√		√			Laringitis	
104	475356	Tn I	31	√		√				√				√							√	√	√				
105	474909	Tn A	48	√		√				√				√								√			√		
106	444124	Ny J	28		√		√			√				√								√				Varicella	
107	466174	Ny J	31		√	√				√				√								√				K, PCP	
108	473333	Tn M	32	√		√				√				√								√				T	
109	471251	Tn I	25	√			√			√				√								√				K	
110	468479	Tn S	40	√			√				√	√									√			√		K	
111	470525	Tn I	24	√		√				√				√							√						
112	523240	Tn S	45	√		√				√				√								√		√	√		
113	520275	Tn D	27	√		√				√				√								√		√			Wasting
114	525468	Tn A	41	√		√				√				√							√		√	√			Wasting
115	525298	Tn A	43	√		√				√				√							√		√	√			
116	482024	Tn F	34	√		√				√				√							√	√					
117	482156	Tn J	30	√		√				√				√								√				√	
118	482231	Ny S	30		√		√			√				√	√							√	√				
119	482392	Ny A	32		√	√				√				√								√				√	

120	482838	Tn N	43	√	√					√			√					√			√	√
121	483153	Tn S	36	√	√					√		√						√			√	√
122	482049	Tn H	30	√	√					√			√					√				Hep.C
123	481384	Tn A	44	√	√					√			√					√		√	√	
124	484338	Tn M	32	√	√					√			√					√		√	√	
125	484361	Tn M	44	√	√					√			√					√		√	√	
126	482626	Ny D	31		√	√				√				√	√							
127	520204	Tn S	48	√	√				√				√						√			
128	519816	Tn A	22	√	√					√			√					√	√			
129	518143	Tn M	37	√	√					√			√					√	√			HS
130	520664	Ny I	35		√	√				√			√							√		
131	448288	Tn T	37	√	√					√			√						√	√		
132	522414	Ny R	30		√		√			√				√				√	√			
133	413	Tn R	23	√	√		√						√				√		√	√		
134	428	Tn N	28	√	√			√					√						√			
135	432	Tn D	29	√	√					√			√						√			
136	434	Tn I	30	√		√				√			√						√			
137	435	Tn J	30	√		√		√					√						√			
138	434	Ny R	33		√	√				√				√	√							
139	454	Tn S	28	√	√					√			√						√			
140	455	Ny A	22		√	√				√			√	√								
141	472	Tn K	27	√	√					√			√						√			
142	722	Tn L	28	√		√				√			√						√			
143	723	Tn J	34	√		√				√			√						√			
144	724	Tn H	24	√	√					√			√						√			

