

**HUBUNGAN SOSIAL EKONOMI DAN ASUPAN TABLET Fe
DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS TAMANGAPA
TAHUN 2012**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat (Gizi) Pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar.

Oleh : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

ELFIRA JUNIANTI. Z

70200108026

ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan nikmat tak terhingga yang diberikan-Nya sehingga skripsi dengan judul “*Hubungan Sosial Ekonomi dan Asupan Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Tahun 2012*” telah dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Alauddin Makassar.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Sebagai *uswatun hasanah*, yang telah berjuang untuk menyempurnakan akhlak manusia di atas muka bumi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari selama mengikuti perkuliahan di UIN Alauddin Makassar sampai penyusunan proposal skripsi ini, diperoleh banyak bimbingan, bantuan, dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa patut menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS., selaku rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak DR. dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH., MH. Kes, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Ibu Irviani A. Ibrahim, SKM, M. Kes dan bapak M. Fais Satrianegara, SKM, MARS, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan serta kesempatan yang sangat berharga bagi penulis.
4. Bapak dr. Muh. Khidri Alwi, M. Kes dan Burhanuddin, Lc, M.Th.I, selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepala Puskesmas Tamangapa Makassar dan seluruh stafnya yang telah memberikan izin penelitian di Puskesmas Tamangapa Makassar.
6. Kepada kepala perpustakaan dan stafnya telah memberikan pelayanan yang baik selama proses penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tua saya Zainal Abidin. F dan Rosmini Said, S. Pd yang selalu memberi motivasi, bantuan, dan iringan doa yang tiada putus-putusnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kakakku tercinta Faisal Hasan, ST yang selalu siap menemani dan memberi semangat selama proses konsultasi dan dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Saudara seperjuanganku Nurfaidah dan A. Amelia Amanda yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan telah menemani selama proses konsultasi dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan yang tak dapat dituliskan namanya satu per satu yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
Tiada imbalan yang dapat penulis berikan, hanya kepada Allah SWT.

Penulis menyerahkan segalanya dengan penuh keikhlasan dan semoga segala amal bakti yang diberikan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian studi ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Makassar, 7 Juli 2012

Penulis,

Elfira Junianti Z



ABSTRAK

Nama : Elfira Junianti

NIM : 70200108026

Judul : Hubungan Sosial Ekonomi dan Asupan Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Tahun 2012

Anemia adalah salah satu dari empat masalah gizi utama di Indonesia yang dialami oleh sekitar 51% ibu hamil. Menurut WHO anemia pada kehamilan merupakan penyebab 40% kematian ibu-ibu di negara berkembang selain terhadap ibu, anemia pada kehamilan diduga berakibat buruk pada janin yang dikandungnya. Defisiensi zat-zat nutrisi telah diduga sebagai penyebab tersering anemia. Sekitar 75% anemia pada kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi. WHO juga melaporkan prevalensi ibu-ibu hamil yang mengalami defisiensi besi sekitar 35-75% dan semakin meningkat seiring pertambahan usia kehamilan. Hal ini sungguh disayangkan mengingat pentingnya kecukupan nutrisi terutama zat besi untuk pertumbuhan dan perkembangan usia janin yang semakin kompleks seiring pertambahan usia kehamilan.

Metode penelitian adalah studi analitik dengan metode potong lintang (*cross sectional*). Sampel pada penelitian ini adalah semua ibu hamil yang berkunjung / memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Tamangapa pada saat penelitian berlangsung pada tanggal 4 - 6 juni 2012, yaitu sebanyak 40 sampel.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dari 40 ibu hamil yang diteliti didapatkan bahwa 42,5 % dan yang tidak menderita anemia 57,5 %, kemudian dari tingkat pendidikan didapatkan bahwa yang memiliki tingkat pendidikan cukup yaitu 62,5 % dan yang memiliki tingkat pendidikan kurang yaitu sebanyak 37,5 %. Sedangkan dari tingkat pengetahuan bahwa yang memiliki tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 27,5 % dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang sebanyak 72,5 %. Sedangkan dari tingkat pendapatan keluarga didapatkan bahwa tingkat pendapatan cukup yaitu sebanyak 27,5 % dan yang memiliki tingkat pendidikan kurang sebanyak 72,5 %. Kemudian dengan tingkat konsumsi tablet fe cukup sebanyak 72,5 % dan dengan tingkat konsumsi tablet fe kurang sebanyak 27,5 %.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyarankan kepada puskesmas yang terkait untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para ibu hamil, dan untuk dilakukan penelitian lanjutan tentang faktor-faktor lain yang berhubungan dengan anemia pada ibu hamil.

Kata kunci: Anemia ibu hamil, sosial ekonomi.

Daftar Pustaka : 27, tahun 1994 - 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Umum Anemia	6
1. Pengertian Anemia	6
2. Tipe – Tipe Anemia	8
3. Klasifikasi Anemia	9
4. Penyebab Anemia	10
5. Resiko Anemia	11
6. Akibat Anemia	11
7. Pencegahan dan Penanggulangan Anemia	12
B. Tinjauan Umum Anemia Ibu Hamil	16
1. Gejala Anemia	18
2. Patofisiologi	19
3. Pengaruh Anemia Pada Kehamilan dan Janin	21
C. Tinjauan Umum Sosial Ekonomi	22
1. Pendapatan Keluarga	24
2. Pendidikan Ibu Hamil	28
3. Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Anemia	30
4. Sumber-Sumber Pengetahuan	32
5. Cara Mengukur Pengetahuan	33
E. Tinjauan Umum Asupan Fe	34
1. Mekanisme Fe Mempengaruhi Hb	39
2. Asupan Zat besi	40
BAB III KERANGKA KONSEP	42
A. Dasar Pemikiran Variabel yang Di Teliti	42
1. Pendidikan Ibu	42
2. Penegtahuan Ibu Hamil	42

3. Pendapatan Keluarga.....	43
4. Asupan Tablet Fe	43
B. Pola Pikir Variabel yang Di Teliti	44
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	45
1. Anemia Ibu Hamil	45
2. Pendidikan Ibu	45
3. Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Anemia	46
4. Pendapatan Keluarga.....	47
5. Asupan Tablet Fe	47
D. Hipotesis Penelitian	49
1. Hipotesis Nol (Ho)	49
2. Hipotesis Alternatif	49
BAB IV METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	50
a. Lokasi Penelitian	50
b. Waktu Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel.....	50
a. Populasi.....	50
b. Sampel.....	50
c. Tehnik Pengambilan Sampel.....	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	51
a. Data Primer	51
b. Data Sekunder	51
E. Pengolahan dan Analisis Data	52
a. Editing Data	52
b. Coding	52
c. Analisis Data	52
F. Instrumen Penelitian.....	52
G. Penyajian Data	53
H. Proses Pemeriksaan Hb	53
a. Alat dan Bahan.....	53
b. Prosedur Pemeriksaan	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan	65
C. Keterbatasan Penelitian	77

BAB VI PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
5.1 Distribusi kejadian anemia ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar januari – juni tahun 2012	56
5.2 Distribusi tingkat pendidikan ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar januari – juni tahun 2012	57
5.3 Distribusi tingkat pengetahuan ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar januari – juni tahun 2012	57
5.4 Distribusi tingkat pendapatan ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar januari – juni tahun 2012	58
5.5 Distribusi Konsumsi Tablet Fe ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar januari – juni tahun 2012	58
5.6 Hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar periode januari – juni tahun 2012	59
5.7 Hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar periode januari – juni tahun 2012	60
5.8 Hubungan tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar periode januari – juni tahun 2012	61
5.9 Hubungan tingkat konsumsi Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar periode januari – juni tahun 2012	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah-masalah kesehatan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, masalah gizi dan pangan merupakan masalah yang mendasar karena secara langsung menentukan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan derajat kesehatan. Masalah gizi di Indonesia yang belum teratasi, salah satunya adalah anemia. Anemia masih merupakan masalah pada wanita Indonesia sebagai akibat kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi juga mengakibatkan kekurangan hemoglobin (Hb) dimana zat besi sebagai salah satu unsur pembentukannya. Hemoglobin berfungsi sebagai pengikat oksigen yang sangat dibutuhkan untuk metabolisme sel, hal ini dapat menyebabkan anak lahir dengan berat badan rendah, keguguran dan juga menyebabkan anemia pada bayinya. (Michael J. Gibney, Gizi Kesmas, 2008)

Badan kesehatan dunia (WHO) melaporkan bahwa prevalensi ibu-ibu hamil yang mengalami defisiensi besi sekitar 35-75%, serta semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia kehamilan. (Yasir Arifin, 2009)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hikmawaty K.dkk, dengan judul “Anemia ibu hamil di daerah Inpres desa tertinggal Kab.Bantaeng” tahun 2007. Pemantauan dari hasil-hasil penelitian tentang ciri-ciri ibu yang mengalami kematian antara lain mengidap anemia khususnya anemia gizi merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia. Masalah anemia ibu hamil

ini masih cukup tinggi walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk menguranginya antara lain melalui suplementasi zat besi lewat pemberian tablet Fe melalui puskesmas. Namun komplikasi yang ditimbulkan oleh anemia adalah meningkatnya AKI, kematian bayi, kelahiran *premature*, dan berat badan lahir rendah. Tentunya hal ini akan menghambat usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Angka ini meski dibawah angka nasional tetap harus diwaspadai mengingat masih tingginya angka kejadian anemia. Apalagi pemerintah menargetkan penurunan prevalensi anemia ibu hamil menjadi 40% pada tahun 1998 dan menjadi 9% pada tahun 2019.

Husaini (2003) melaporkan anemia ibu hamil sebesar 50-70% sedangkan prevalensi anemia di Indonesia menurut (SKRT) sebesar 51,3%. Sulawesi Selatan sendiri memiliki prevalensi anemia ibu hamil sebesar 76,17%. (Ngatimin,2005)

Prevalensi anemia ibu hamil belum mengalami perubahan dari tahun 1995-2000, namun Departemen Kesehatan RI sampai dengan tahun 2010 akan berusaha menurunkan prevalensi anemia ibu hamil dari 51% menjadi 40% (Depkes RI, 2006). Sementara dari sumber Survei (SKRT) tahun 2007, prevalensi anemia gizi besi (Fe) pada ibu hamil mencapai 40,1%.

Sebanyak 70 persen ibu hamil di berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan, mengidap penyakit anemia. Dalam jangka panjang penyakit tersebut dikhawatirkan menjadi penyebab *lost generation* atau kehilangan generasi berikutnya. Di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa anemia pada ibu hamil

cukup tinggi yaitu dari 511 ibu hamil terdapat 379 ibu hamil yang menderita anemia (Data Periode Januari - Desember 2011) dan prevalensi anemia ibu hamil adalah 74,16%.

Relatif tingginya kejadian anemia pada ibu hamil diduga oleh faktor pengetahuan ibu hamil tentang anemia, dan sosial ekonomi, serta aspek lain yang paling penting yaitu suplementasi tablet zat besi (Fe) dan juga motivasi petugas selama kehamilan karena dapat mencegah terjadinya anemia. Berdasarkan data penderita anemia pada ibu hamil yang terdapat di Puskesmas Tamangapa, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Hubungan Sosial Ekonomi dan Asupan Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini yaitu:

Apakah ada hubungan sosial ekonomi ibu hamil dan asupan tablet besi dengan kejadian anemia ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan sosial ekonomi dan asupan tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil.
- b. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu hamil dengan kejadian anemia pada ibu hamil.
- c. Untuk mengetahui hubungan pendapatan keluarga dengan kejadian anemia pada ibu hamil.
- d. Untuk mengetahui hubungan asupan tablet besi (Fe) dengan kejadian anemia pada ibu hamil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan petugas kesehatan dalam usaha penanggulangan anemia ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa.

2. Manfaat Ilmiah

- a. Sebagai bahan kajian pustaka bagi masyarakat dan peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini.
- b. Sebagai wahana penulis untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan dalam penelitian kesehatan.

3. Manfaat Institusi

Sebagai bahan masukan atau informasi bagi Departemen Kesehatan dan institusi terkait lainnya dalam rangka menentukan kebijakan untuk pencegahan anemia ibu hamil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Masalah gizi meskipun sering berkaitan dengan masalah kekurangan pangan, pemecahannya tidak selalu berupa peningkatan produksi dan pengadaan pangan. Pada kasus tertentu seperti dalam keadaan krisis (bencana kekeringan, perang, kekacauan sosial, krisis ekonomi), masalah gizi muncul akibat masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yaitu kemampuan rumah tangga untuk memperoleh makanan untuk semua anggotanya. Menyadari hal itu, peningkatan status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjamin setiap anggota masyarakat untuk memperoleh makanan yang cukup jumlah dan mutunya. Dalam konteks itu, masalah gizi tidak lagi semata-mata masalah kesehatan tetapi juga masalah kemiskinan, pemerataan dan masalah kesempatan kerja. Salah satu program gizi pemerintah adalah upaya mengurangi angka kejadian anemia khususnya pada ibu hamil salah satunya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya zat besi serta zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan yang memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh melalui penyuluhan yang biasanya dilaksanakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) serta posyandu. (Supriasa, 2001)

Munculnya masalah gizi yang dipicu oleh masalah ketahanan pangan tingkat rumah tangga yaitu ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap anggota keluarga secara maksimal dan menyeluruh dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan mengakibatkan kehilangan generasi yang berkualitas.

A. Tinjauan Umum Anemia

1. Pengertian Anemia

Anemia (dalam bahasa Yunani; Tanpa darah) adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin (protein pembawa oksigen) dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang memungkinkan mereka mengangkut oksigen dari paru-paru, dan mengantarkannya ke seluruh bagian tubuh. Anemia menyebabkan berkurangnya jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah, sehingga darah tidak dapat mengangkut oksigen dalam jumlah sesuai yang diperlukan tubuh. Anemia adalah keadaan dimana kadar sel-sel darah merah dan hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Hemoglobin terdapat dalam sel-sel darah merah dan merupakan pigmen pemberi warna merah sekaligus pembawa oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Oksigen ini akan digunakan untuk membakar gula dan lemak menjadi energi. Hal ini dapat menjelaskan mengapa kurang darah dapat menyebabkan gejala lemah dan lesu yang tidak biasa. Paru-paru dan jantung juga terpaksa kerja keras untuk mendapatkan oksigen dari darah yang menyebabkan nafas terasa pendek. Walaupun gejalanya tidak terlihat atau samar-samar dalam jangka waktu lama. Kondisi ini tetap dapat membahayakan jiwa jika dibiarkan dan tidak diobati. Jika anda mengalami gejala lemah, lesu berkepanjangan, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebabnya. Anemia

biasanya terdeteksi atau sedikitnya dapat dipastikan setelah pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar sel darah merah, hematokrit dan hemoglobin. Pengobatan bisa bervariasi tergantung pada diagnosisnya. Sel-sel darah baru dibuat setiap hari dalam sumsum tulang belakang. Zat gizi yang diperlukan untuk pembuatan sel-sel ini adalah besi, protein dan vitamin terutama asam folat dan B12. Dari semua ini, besi dan protein yang paling penting dalam pembentukan hemoglobin. (Atikah Proverawati, 2009)

Anemia merupakan suatu gangguan hematologis dengan adanya penurunan jumlah sel darah merah, jumlah hemoglobin atau jumlah volume paket sel (hematokrit) atau suatu keadaan dimana kadar Hb dalam darah kurang dari normal. Di dalam masyarakat dikenal juga kurang darah. Anemia dapat terjadi karena defisiensi zat gizi secara umum dan spesifik. Zat gizi yang berperan dalam pembentukan darah ialah ferum, vitamin E, vitamin B₁₂, vitamin B₆, vitamin C, Protein dan Asam Folat. (Anindya, 2007)

Anemia didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana kadar hemoglobin kurang dari normal sebagai ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah merah dalam produksinya guna mempertahankan kadar Hb pada tingkat normal.

Anemia adalah istilah yang menunjukkan rendahnya hitungan sel darah merah dan kadar hemoglobin dan hematokrit di bawah normal dan

disebut anemia dalam kehamilan jika kadar Hb pada wanita kurang dari 11/100. (WHO,2003)

Dengan demikian maka anemia adalah keadaan dimana kadar Hb seseorang kurang dari batas normal. Batas normal kadar Hb pada wanita dewasa adalah 12 gr/100 ml pada keadaan hamil kadar Hb normal 11gr/100 ml.

2. Tipe-tipe Anemia

Ada dua tipe anemia yang dikenal selama ini yaitu anemia gizi dan non-gizi. Anemia gizi adalah keadaan kurang darah akibat kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan serta produksi sel-sel darah merah, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Anemia gizi itu sendiri ada beberapa macam, yaitu (Nurchasanah, 2009):

- a. Anemia gizi besi, terjadi karena kekurangan pasokan zat besi (Fe).
Zat besi merupakan inti molekul hemoglobin yang merupakan unsur utama dalam sel darah merah. Jadi, kekurangan pasokan zat besi bisa menyebabkan menurunnya produksi hemoglobin.
- b. Anemia gizi vitamin E, vitamin E merupakan faktor esensial bagi integritas sel darah merah. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan integritas dinding sel darah merah menjadi lemah dan tidak normal sehingga sangat sensitif terhadap hemolisis (pecahnya sel darah merah).

- c. Anemia gizi asam folat, sering disebut juga anemia megaloblastik atau makrositik. Dalam hal ini keadaan sel darah merah penderita tidak normal dengan ciri-ciri bentuknya lebih besar, jumlahnya sedikit, dan belum matang.
- d. Anemia gizi vitamin B₁₂ atau disebut pernicious. Gejalanya mirip dengan gejala pada anemia gizi asam folat, tetapi disertai dengan gangguan pada sistem pencernaan bagian dalam.
- e. Anemia gizi vitamin B₆ atau disebut siderotic. Keadaannya mirip dengan anemia gizi besi, tetapi jika darah dites di laboratorium, serum besinya normal.

Anemia non-gizi bisa terjadi akibat pendarahan, seperti luka akibat kecelakaan, Haid, atau penyakit darah yang bersifat genetik seperti thalasemia (kerusakan DNA), hemophilia (kelainan pembekuan darah), dan lain-lain. (Nurchasanah, 2009)

3. Klasifikasi Anemia

Berdasarkan klasifikasi WHO tahun 1972 kadar hemoglobin pada wanita hamil dapat dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut :

- a. Normal : ≥ 11 gr/100 ml
- b. Anemia ringan : 8-10 gr/100 ml
- c. Anemia berat : < 8 gr /100 ml

Berdasarkan Purnawan dkk tahun 1982, anemia dalam kehamilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Anemia defisiensi : 62,5 %.
- b. Anemia megaloblastik : 29,0 %.
- c. Anemia hipoplastik : 8,0 %.
- d. Anemia hemolitik : 0,7 %.

4. Penyebab Anemia

Pada umumnya anemia disebabkan oleh tidak tersedianya zat-zat dalam tubuh yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Zat-zat yang berperan dalam pembentukan sel darah merah adalah protein, vitamin (asam folat, vitamin B₁₂, vitamin C, vitamin E) dan mineral. Tetapi dari sekian banyak penyebab terjadinya anemia adalah anemia defisiensi besi. (Mochtar,1998)

Secara terperinci penyebab terjadinya anemia adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah besi dalam darah tidak cukup, hal ini disebabkan oleh:
 - 1) Ketersediaan zat besi dalam makanan yang kurang
 - 2) Praktek pemberian makanan yang kurang baik
 - 3) Sosial ekonomi yang rendah
- b. Absorpsi zat besi rendah yang disebabkan oleh:
 - 1) Komposisi makanan yang kurang beragam
 - 2) Terdapat zat-zat penghambat absorpsi zat besi
- c. Kebutuhan zat besi yang tinggi disebabkan oleh:

- 1) Pertumbuhan fisik
 - 2) Kehamilan dan menyusui
- d. Kehilangan darah yang disebabkan oleh:
- 1) Pendarahan kronis
 - 2) Parasit
 - 3) Infeksi
 - 4) pelayanan kesehatan yang rendah

5. Resiko Anemia

Anemia dapat berakibat fatal pada ibu hamil karena ibu hamil memerlukan banyak tenaga untuk melahirkan. Selain itu, pada saat melahirkan biasanya darah keluar dalam jumlah yang banyak sehingga kondisi anemia akan memperburuk keadaan ibu hamil. Kekurangan darah dan pendarahan akut merupakan penyebab utama kematian ibu saat melahirkan. Ibu hamil yang menderita anemia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan zat-zat gizi bagi dirinya dan janin dalam kandungannya. Oleh karena itu, keguguran, kematian bayi dalam kandungan, berat badan lahir rendah, atau kehamilan prematur rawan terjadi pada ibu hamil yang menderita anemia.

6. Akibat Anemia

Akibat anemia pada wanita dikaitkan dengan defisiensi Fe anemia yang dapat menimbulkan efek kematian, hasil kelahiran, kemampuan dan kapasitas kerja. Anemia berat dengan Hb < 4 g/dl dikaitkan dengan peningkatan kematian, umumnya terjadi pada kondisi stress pasca

persalinan karena fungsi oksigen dan jantung terganggu oleh menurunnya kadar Hb. Konsentrasi Hb ibu hamil dapat mempengaruhi berat lahir bayi dan kelahiran prematur. Akibat lain yang ditimbulkan anemia adalah penurunan performa kerja pada kelompok usia dewasa. Wanita penderita anemia kurang produktif bekerja dibandingkan dengan wanita tanpa anemia. Anemia gizi berisiko terhadap ibu melahirkan dan pendarahan hebat pada saat melahirkan dan juga pada bayi yang dikandungnya.

Anemia pada kehamilan atau kekurangan kadar hemoglobin dalam darah dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius bagi ibu dalam kehamilan, persalinan dan nifas yaitu dapat mengakibatkan abortus, infeksi intra partum dan post partum. Anemia berat dengan Hb kurang dari 4 gr/100 ml dapat mengakibatkan komplikasi dan dapat terjadi pada hasil konsepsi yaitu kematian mudah, kematian perinatal, dan cacat bawaan.


7. Pencegahan dan Penanggulangan Anemia

Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia pada dasarnya mengatasi penyebabnya. Pada anemia berat (kadar Hb < 8 gr%). Biasanya terdapat penyakit yang melatar belakangi yaitu antara lain penyakit TBC, infeksi cacing dan malaria. Sehingga, selain penanggulangan anemia gizi dapat dilakukan pengobatan terhadap penyakit tersebut. Pencegahan dan penanggulangan anemia dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

a. Meningkatkan konsumsi zat besi dari makanan.

Mengonsumsi pangan hewani, seperti daging, ikan, hati atau telur dalam jumlah cukup sebenarnya dapat mencegah anemia gizi besi. Namun, bagi masyarakat kita harga pangan hewani tergolong cukup tinggi sehingga sulit dijangkau. Untuk itu, diperlukan alternatif lain untuk mencegah anemia gizi besi. Makanan yang beraneka ragam memiliki zat gizi yang saling melengkapi. Sayuran hijau dan buah-buahan ditambah dengan kacang-kacangan dan padi-padian yang cukup banyak mengandung zat besi dan vitamin-vitamin lain untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Mengonsumsi makanan yang cukup beragam jumlah maupun kualitasnya dapat membantu mencegah anemia gizi besi.

Sehubungan dengan hal diatas Allah berfirman dalam surah An-Nahl/16 : 66



Terjemahnya : dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.

Makanan yang dikonsumsi haruslah baik untuk kesehatan dan halal untuk dikonsumsi sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-baqarah/ 2 : 168-169 :



Terjemahannya : 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu

169. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

(Departeman Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya : 25).

Ajakan ayat diatas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir.

Tidak semua yang ada di bumi otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain, untuk digunakan bisanya sebagai obat. Dengan demikian tidak semua yang ada di bumi halal dimakan karena tidak semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walaupun semua untuk kepentingan manusia. Karena itu Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang halal.

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama. Namun demikian tidak

semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, wajib, sunnah, mubah dan makruh. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai kondisi masing-masing. Ada yang halal buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan halal tapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat diatas yakni halal lagi baik. (M.Quraish Shihab , Tafsir Almisbah vol.1 : 456)

Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini (al Baqarah: 168) berkata,” Setelah Allah Menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dialah Tuhan yang tidak bergantung pada makhluk, maka Dia Menjelaskan bahwa Dialah Tuhan Yang Maha Pemberi rizki kepada semua makhluk-Nya. Ketika menyebutkan karunia-Nya, Dia Membolehkan mereka untuk memakan apa yang halal di muka bumi, sebagai karunia dari Allah. ‘*Al Thayyib*’ (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal. (Ali Mustafa Yaqub, 2009)

Al Imam Asy-Syaukani ketika menjelaskan ayat ini, ia berkata,” Firman-Nya ‘*halalan*’ posisinya sebagai *maf’ul* (objek) atau *hal* (penjelas). Sesuatu disebut halal karena melepas (*ihlal*) ikatan bahaya dari padanya. ‘*Thayyib*’ di sini adalah sesuatu yang dipandang lezat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi’i dan ulama lainnya. Menurut Imam Malik dan ulama lainnya, “Ia

(*Thayyib*) adalah halal. Kata ini digunakan sebagai penguat firman-Nya '*halalan*'. (Ali Mustafa Yaqub, 2009)

b. Suplemen zat Besi.

Suplementasi zat besi dimaksudkan sebagai upaya pengobatan, untuk dikonsumsi setiap hari sampai keadaan ibu hamil yang mengalami anemia dapat pulih kembali. Pemberian suplementasi besi menguntungkan karena dapat memperbaiki status hemoglobin dalam waktu relatif singkat.

c. Penanggulangan Penyakit Infeksi dan Parasit

Penyakit infeksi dan parasit merupakan salah satu penyebab anemia. Dengan menanggulangi penyakit infeksi dan memberantas parasit diharapkan dapat meningkatkan status besi dalam tubuh. Tentu saja upaya ini harus diikuti dengan peningkatan konsumsi pangan yang seimbang dan beragam. Bila penyakit infeksi tersebut dapat diatasi, maka kemungkinan anemia lebih kecil.

B. Tinjauan Umum Anemia Ibu Hamil

Anemia gizi besi pada ibu hamil masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dimana angka kematian ibu hamil yang cukup tinggi. Penyebab utama anemia ini adalah kekurangan zat besi. Selama kehamilan terjadi peningkatan kebutuhan zat besi hampir tiga kali lipat untuk pertumbuhan janin dan keperluan ibu hamil (Depkes RI, 2006). Konsekuensi anemia pada ibu hamil dapat membawa pengaruh buruk baik terhadap kesehatan ibu maupun janinnya, keadaan ini dapat meningkatkan morbiditas

maupun mortalitas ibu dan anak. Suatu penelitian menunjukkan bahwa angka kematian ibu sebanyak 265/100.000 penduduk berhubungan erat dengan anemia yang dideritanya ketika hamil (Depkes RI, 2006). Keadaan kurang zat besi (Fe) merupakan fenomena yang kompleks.

Anemia dalam kehamilan yang paling sering dijumpai adalah anemia akibat kekurangan besi. Selama kehamilan, darah bertambah banyak yang lazim disebut hipervolemia. Akan tetapi bertambahnya plasma, sehingga terjadi pengenceran darah. Pertumbuhan tersebut berbanding, yaitu: plasma 30% dan sel darah merah 18% sebagai konsekuensinya kadar hemoglobin dalam darah akan menurun. (Manuaba, 1998)

Anemia dalam kehamilan didefinisikan sebagai penurunan kadar hemoglobin kurang dari 11g/dl selama masa kehamilan pada trimester 1 dan ke-3 dan kurang dari 10 g/dl selama masa post partum pada trimester 2. Darah akan bertambah banyak dalam kehamilan yang lazim disebut hidremia dan hipervolemia. Akan tetapi, bertambahnya sel darah kurang di bandingkan dengan bertambahnya plasma sehingga terjadi pengenceran darah. Perbandingan tersebut adalah : plasma 30 %, sel darah 18 % dan hemoglobin 19 %. Pengenceran darah dianggap sebagai penyesuaian diri secara fisiologi dalam kehamilan dan bermanfaat bagi wanita. Pertama, pengenceran tersebut akan meringankan beban jantung yang harus bekerja lebih berat dalam masa hamil, kerja jantung lebih ringan apabila viskositas darah rendah, resistensi perifer berkurang pula, sehingga tekanan darah tidak naik. Kedua, pada perdarahan waktu persalinan, jumlah unsur besi yang hilang akan lebih

sedikit dibandingkan dengan apabila darah itu tetap kental. Bertambahnya darah dalam kehamilan sudah dimulai sejak kehamilan 10 minggu dan mencapai puncaknya dalam kehamilan antara 32 dan 36 minggu. Anemia lebih sering dijumpai dalam kehamilan. Hal itu disebabkan karena dalam kehamilan keperluan akan zat-zat makanan bertambah dan terjadi pula perubahan-perubahan dalam darah dan sumsum tulang (Depkes, 2000; Katz, 2000). Penyelidikan berangkai pada 21 wanita di R.S. Dokter Cipto Mangunkusumo Jakarta dari kehamilan 8 minggu sampai persalinan dan 40 hari paska persalinan, bahwa kadar Hb, jumlah eritrosit, dan nilai hematokrit, ketiga-tiganya turun selama kehamilan sampai 7 hari paska persalinan. Setelah itu ketiga nilai itu meningkat, dan pada 40 hari paska persalinan mencapai angka-angka yang kira-kira sama dengan angka-angka di luar kehamilan. Hasil penyelidikan ini disokong oleh penyelidikan lain pada 3.531 wanita hamil yang dilakukan dalam waktu dan rumah sakit yang sama. (Hanifa, 2007)

Pengambilan nilai 11 g/dl sebagai batas terendah untuk kadar Hb dalam kehamilan. Seorang wanita hamil yang memiliki Hb kurang dari 11g/100 ml barulah disebut menderita anemia dalam kehamilan. Karena itu, para wanita hamil dengan Hb antara 11 dan 12 g/dl tidak dianggap anemia patologik, akan tetapi anemia fisiologik atau *psedoanemia*. (Supariasa, 2001)

1. Gejala Anemia

Gejala anemia pada kehamilan yaitu ibu mengeluh, sering pusing, mata berkunang-kunang, malaise, lidah luka, nafsu makan menurun (

anoreksia), konsentrasi hilang, nafas pendek (pada anemia parah) dan keluhan mual muntah lebih hebat pada hamil muda. keluhan anemia yang paling sering dijumpai dimasyarakat adalah yang lebih dikenal dengan 5L, yaitu: lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai. Disamping itu penderita kekurangan zat besi akan menurunkan daya tahan tubuh yang mengakibatkan mudah terkena infeksi. (Kasdu,Dini dkk 2004)

2. Patofisiologis

Anemia lebih sering dijumpai dalam kehamilan. Hal itu disebabkan karena dalam kehamilan keperluan akan zat-zat makanan bertambah dan terjadi pula perubahan-perubahan dalam darah dan sum-sum tulang. Darah bertambah banyak dalam kehamilan yang lazim disebut hipervolemia. Akan tetapi bertambahnya sel-sel darah kurang dibandingkan dengan bertambahnya plasma, sehingga terjadi pengenceran darah. Pertambahan tersebut berbanding, yaitu : plasma 30% sel darah merah 19%. Pengenceran darah dianggap sebagai penyesuaian diri secara fisiologis dalam kehamilan dan bermanfaat bagi wanita. Pertama-tama pengenceran itu meringankan beban jantung yang harus bekerja lebih besar dalam masa hamil karena sebagai akibat hidremia cardiac output meningkat. Kerja jantung lebih ringan. Kehamilan memerlukan tambahan zat besi untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan membentuk sel darah merah janin dan plasenta. Makin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan melahirkan akan

makin banyak kehilangan zat besi dan menjadi makin anemis. (Manuaba,2001)

Kebutuhan zat besi pada wanita hamil yaitu rata-rata mendekati 800 mg. Kebutuhan ini terdiri dari, sekitar 300 mg diperlukan untuk janin dan plasenta serta 500 mg lagi digunakan untuk meningkatkan massa haemoglobin maternal. Kurang lebih 200 mg lebih akan dieksresikan lewat usus, urin dan kulit. Makanan ibu hamil setiap 100 kalori akan menghasilkan sekitar 8-10 mg zat besi. Perhitungan makan 3 kali dengan 2500 kalori akan menghasilkan sekitar 20-25 mg zat besi perhari. Selama kehamilan dengan perhitungan 288 hari, ibu hamil akan menghasilkan zat besi sebanyak 100 mg sehingga kebutuhan zat besi masih kekurangan untuk wanita hamil. kebutuhan ibu hamil akan Fe meningkat (untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah) sebesar 200-300%. Perkiraan besaran zat besi yang perlu ditimbun selama hamil ialah 1040 mg. Dari jumlah ini, 200 mg Fe tertahan oleh tubuh ketika melahirkan dan 840 mg sisanya hilang. Sebanyak 300 mg Fe ditransfer ke janin, dengan 50-75 mg untuk pembentukan plasenta, 450 mg untuk menambah jumlah darah merah, dan 200 mg lenyap ketika melahirkan. Besarnya angka kejadian anemia ibu hamil pada trimester I kehamilan adalah 20%, trimester II sebesar 70%, dan trimester III sebesar 70%. Hal ini disebabkan karena pada trimester I kehamilan, zat besi yang dibutuhkan sedikit karena tidak terjadi menstruasi dan pertumbuhan janin masih lambat. Menginjak trimester II - III, volume darah dalam tubuh

wanita akan meningkat sampai 35%, ini ekuivalen dengan 450 mg zat besi untuk memproduksi sel-sel darah merah. Sel darah merah harus mengangkut oksigen lebih banyak untuk janin. Sedangkan saat melahirkan, perlu tambahan besi 300 – 350 mg akibat kehilangan darah. Sampai saat melahirkan, wanita hamil butuh zat besi sekitar 40 mg per hari atau dua kali lipat kebutuhan kondisi tidak hamil.

3. Pengaruh Anemia Pada Kehamilan dan Janin

Anemia dalam kehamilan memberi pengaruh kurang baik bagi ibu, baik dalam kehamilan, persalinan maupun dalam nifas.

a. Pengaruh anemia terhadap kehamilan.

1) Bahaya selama kehamilan

- a) Dapat terjadi aborsi.
- b) Persalinan prematuritas.
- c) Hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim.
- d) Mudah terjadi infeksi.
- e) Ketuban pecah dini.

2) Bahaya Pada Saat Persalinan.

- a) Gangguan his kekuatan mengejan.
- b) Kala pertama dapat berlangsung lama, dan terjadi partus terlantar.
- c) Kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan.

d) Kala uri dapat diikuti retensio plasenta, dan pendarahan post partum.

3) Pada kala nifas

- a) Pengeluaran Asi berkurang.
- b) Anemia kala nifas.
- c) Mudah terjadi infeksi.

b. Bahaya terhadap janin

Sekalipun tampaknya janin mampu menyerap berbagai kebutuhan dari ibunya tetapi dengan anemia akan mengurangi kemampuan metabolisme tubuh sehingga mengganggu pertumbuhan perkembangan janin dalam rahim.

C. Tinjauan Umum Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi adalah suatu konsep dan untuk mengukur sosial ekonomi keluarga harus melalui variabel-variabel pendapatan keluarga, tingkat pendidikan, dan pekerjaan (Notoatmodjo, 2005). Keadaan sosial ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan jumlah makanan yang tersedia dalam keluarga sehingga turut menentukan status gizi keluarga tersebut. Yang termasuk dalam faktor sosial ekonomi adalah (Supariasa, 2001).

1. Keadaan penduduk di suatu masyarakat
2. Keadaan keluarga
3. Pendidikan

- a. Tingkat pendidikan ibu/bapak
 - b. Keberadaan buku-buku
 - c. Usia anak sekolah
4. Perumahan
 5. Dapur
 6. Penyimpanan makanan
 7. Air
 8. Kakus

Sedangkan data ekonomi dari faktor sosial ekonomi meliputi :

1. Pekerjaan orang tua
2. Pendapatan keluarga
3. Kekayaan yang terlihat
4. Pengeluaran / anggaran
5. Harga makanan yang tergantung pada pasar dan variasi musim.

Banyak faktor sosial ekonomi yang sukar untuk dinilai secara kuantitatif, khususnya pendapatan dan kepemilikan (barang berharga, tanah, ternak) karena masyarakat enggan untuk membicarakannya kepada orang yang tidak dikenal, termasuk ketakutan akan pajak dan perampokan. Tingkat pendidikan termasuk dalam faktor sosial ekonomi karena tingkat pendidikan berhubungan status gizi yaitu dengan meningkatkan pendidikan kemungkinan akan dapat meningkatkan pendapatan sehingga daya beli makanan untuk mencukupi kebutuhan gizi keluarga. (Achadi,2007)

Kurangnya pemberdayaan keluarga dan pemanfaatan sumber daya masyarakat mempengaruhi faktor sosial ekonomi keluarga, termasuk kurangnya pemberdayaan wanita dan tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu hamil termasuk faktor sosial ekonomi yang akan mempengaruhi status gizi ibu hamil tersebut. (Arifin.T, 2005)

1. Pendapatan keluarga

Pendapatan adalah hasil gaji, upah, imbalan yang diterima seseorang atas kegiatan yang dilakukannya. Pendapatan akan mempengaruhi pola kegiatan dan pola pikir termasuk kesempatan untuk memanfaatkan potensi dan fasilitas yang tersedia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. (BPS, 2004)

Kemiskinan sebagai salah satu determinan sosial ekonomi merupakan penyebab gizi kurang yang pada umumnya menduduki posisi pertama (Suharjo, 2008). Kemiskinan merupakan keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain.

Tolak ukur pada umumnya digunakan untuk penggolongan seseorang atau masyarakat dikatakan miskin adalah tingkat pendapatan.

Pendapatan merupakan nilai maksimal yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti semula. (Rustam, 2002)

Terdapat hubungan antara pendapatan dan keadaan status gizi. Hal itu karena tingkat pendapatan merupakan faktor yang menentukan

kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi (FKM UI, 2007). Kemampuan keluarga untuk membeli bahan makanan antara lain tergantung pada besar kecilnya pendapatan keluarga. Keluarga dengan pendapatan terbatas kemungkinan besar akan kurang dapat memenuhi kebutuhan makannanya terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuhnya.

M.K Benet mengemukakan bahwa tingkat pendapatan akan mengakibatkan individu cenderung meningkatkan kualitas konsumsi pangannya dengan harga yang lebih mahal per unit zat gizinya. Pada tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah, permintaan terhadap pangan diutamakan pada pangan yang padat energi yang berasal dari hidrat arang, terutama padi-padian. Apabila pendapatan meningkat pada konsumsi pangan akan beragam, serta pada umumnya terjadi peningkatan konsumsi pangan yang lebih bernilai gizi tinggi, serta meningkatkan pula konsumsi pangan di luar rumah.

Pendapatan keluarga adalah semua hasil perolehan yang didapat oleh anggota keluarga dalam bentuk uang sebagai hasil pekerjaannya. Pendapatan keluarga meliputi penghasilan dengan hasil-hasil lain. Pendapatan keluarga mempunyai peran penting terutama dalam memberikan efek terhadap taraf hidup mereka. Efek di sini lebih berorientasi pada kesejahteraan dan kesehatan, dimana perbaikan pendapatan akan meningkatkan tingkat gizi masyarakat. Pendapatan akan menentukan daya beli terhadap pangan yang dapat mempengaruhi status

gizi. Adanya hubungan antara pendapatan dan status gizi telah banyak dikemukakan para ahli (Sojogyo,1994).

Peningkatan pendapatan akan membawa masyarakat membelanjakan penghasilannya untuk barang-barang yang dipasarkan, baik untuk menunjang upaya peningkatan gizi, berupa makanan bergizi tinggi, bahan-bahan untuk perbaikan sanitasi serta usaha untuk mendapatkan pengobatan dini ketika sakit. Dengan demikian jelas ada hubungan antara pendapatan dan gizi. (Ngatimin, 1997).

Semakin tinggi pendapatan, semakin bertambah pula persentasi pertambahan pembelanjannya termasuk sayur-sayuran, dan jenis-jenis makanan lainnya. Dengan demikian, pendapatan merupakan faktor determinan untuk menentukan kuantitas dan kualitas makanan. Maka dari itu jelas ada hubungan antara pendapatan dengan gizi yang didorong oleh pengaruh yang menguntungkan dari pendapatan yang meningkat bagi perbaikan kesehatan dan masalah keluarga lainnya yang berkaitan dengan keadaan gizi dan hampir berlaku umum terhadap semua tingkat pendapatan orang-orang miskin dan lemahnya daya beli mereka telah memungkinkannya untuk mengatasi kebiasaan makanan dan cara-cara tertentu yang menghalangi perbaikan gizi yang efektif, terutama untuk anak-anak mereka. (Soerdjibroto, 2004)

Besar kecilnya pendapatan suatu wilayah sangat tergantung pada sumber-sumber perekonomian yang ada di daerah itu, dengan tidak memandang dari ketidakpemilikan dari sumber-sumber itu. Tingginya

tingkat pendapatan masyarakat mencerminkan status kesehatan seseorang. (Suharjo, 2003)

Sehubungan dengan hal di atas Allah berfirman dalam surah At-Thalaq/65 : 7

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَّيِّبُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِي يَوْمِ إِطْلَاقِهَا
 وَلِلَّهِ غَايَةُ الْمَقْصَدِ وَإِن يُنكحِ الرجلُ النكاحَ طلاقاً أو نكاحاً
 فليؤتيها من ماله مما آتاه الله من رزقه ولا يكرهها ولا يؤذي بها
 نفساً ولا يملك ما بين يديه من رزقها ولا يملك أن يردَّها
 إلى نفسه إلا أن يرضى الله فإن الله هو الغني الرحيم

Terjemahnya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Adapun hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah Ra :

حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه
 عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى اللهم
 عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما
 يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح
 فقال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي
 بنيك (رواه المسلم).

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujrin al-Sa’di, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu

sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban suami terhadap isterinya adalah memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Seiring dengan itu al-Sarakshi menjelaskan bahwa kewajiban suami tersebut muncul disebabkan oleh dua faktor yaitu karena isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami (*tamkin*) serta timbulnya kepemilikan suami terhadap isteri (*tamlík*), sehingga hak isteri untuk berusaha terhalang karena kesibukannya mengurus kepentingan suami. Di samping kedua pendapat tersebut, Umar Qadir bin Umar al-Syaibani dan Ibrahim bin Muhammad bin Dhiwyan dalam mazhab Hanbali menyatakan bahwa umat Islam telah sepakat mewajibkan para suami untuk menafkahi isterinya apabila keduanya telah dewasa dan isteri tidak nusuz. (Mamfaluthy al-fuadhil ma'az, 2002)

2. Pendidikan Ibu Hamil

Menurut Langeveld dalam penelitian Mardina pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh dan bantuan yang diberikan kepada anak untuk pendewasaan atau membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sehari-hari. Pengertian pendidikan bahkan lebih diperluas cakupannya sebagai aktivitas dan fenomena. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk

praktis) maupun mental, dan sosial sedangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak, yang kedua pengertian ini harus bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah (Hadist).

Ditinjau dari pendapatan pendidikan dapat dibagi atas :

- a. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diperoleh dari sekolah secara teratur, sistematis (mulai dari TK sampai pada Perguruan Tinggi).
- b. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari dengan sadar ataupun tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati, didalam keluarga, pekerjaan ataupun pergaulan sehari-hari.
- c. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan secara teratur, disengaja tetapi tidak terlalu mengikat peraturan yang ketat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja peserta didik untuk perbaikan taraf hidup mereka.

Tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi kematian ibu. Hasil penelitian Mardina 2006 ibu yang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Tamat SMA dan PT/ Akademik), kurang mengalami anemia. Sebaliknya bagi ibu yang tidak memiliki pendidikan akan besar kemungkinan mengalami anemia pada saat kehamilan. (Mardina 2006)

Dalam pandangan Islam, manusia bukan saja terdiri dari komponen fisik dan materi, namun terdiri juga dari spiritual dan jiwa. Oleh sebab itu, sebuah institusi pendidikan bukan saja memproduksi anak didik yang akan memiliki kemakmuran materi, namun juga yang lebih penting adalah melahirkan individu-individu yang memiliki diri yang baik sehingga mereka akan menjadi manusia yang serta bermanfaat bagi ummat dan mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Institusi pendidikan perlu mengarahkan anak didik supaya mendisiplinkan akal dan jiwanya, memiliki akal yang pintar dan sifat-sifat dan jiwa yang baik, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, memiliki pengetahuan yang luas, yang akan menjaganya dari kesalahan-kesalahan, serta memiliki hikmah dan keadilan.

Tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah mencari ridha Allah Swt. Dengan pendidikan, diharapkan akan lahir individu-individu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya dan ummat manusia secara keseluruhan. Disebabkan manusia merupakan fokus utama pendidikan, maka seyogianyalah institusi-institusi pendidikan memfokuskan kepada substansi kemanusiaan, membuat sistem yang mendukung kepada terbentuknya manusia yang baik, yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan.

3. Pengetahuan Ibu hamil Tentang Anemia

Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui atau apa yang akan diketahui berkenaan dengan suatu hal. Biasanya pendidikan, usia, penyuluhan, pengalaman dan perkembangan media media masa adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Anemia sering dialami oleh ibu-ibu, utamanya oleh ibu yang sedang dalam masa kehamilan. Hal ini dikarenakan Volume darah Selama kehamilan akan meningkat sebanyak kurang lebih 40-50% untuk memenuhi kebutuhan bagi sirkulasi plasenta. Volume plasma meningkat lebih banyak dari pada volume sel darah merah (yang peningkatannya hanya sekitar 30%) dari kesemuanya itu akan mengakibatkan hemodilusi dengan penurunan kadar Hb hingga mencapai kurang lebih 80% dari nilai normal sehingga sering dapat mengakibatkan anemia.

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu”, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain untuk tindakan seseorang, karena perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih bertahan lama dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. sebelum orang mengadopsi perilaku baru didalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan yakni : kesadaran, merasa tertarik, menimbang-nimbang, dan *Adoption*.

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif menurut (Notoatmodjo, 2007) mempunyai beberapa tingkatan yakni:

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap obyek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada suatu situasi atau kondisi sebenarnya (*real*).

d. Analisis (*Analisis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu metode kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti, dapat menggambarkan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

4. Sumber-sumber Pengetahuan

Pengetahuan seseorang dapat diperoleh dari berbagai usaha baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Usaha yang dilakukan dengan sengaja meliputi berbagai metode dan konsep baik melalui proses pendidikan maupun proses pengalaman. (Yadi, 2008)

5. Cara Mengukur Pengetahuan

Pengetahuan dapat diukur dengan melalui pertanyaan kuesioner tentang pengetahuan anemia ibu hamil. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita inginkan atau kita ukur dapat disesuaikan dengan tingkatan pengetahuan. (Notoatmodjo, 2003)

Para ibu hamil hendaknya memperluas pengetahuan serta pemahaman tentang berbagai macam penyakit yang dapat mengenyainya baik disaat sebelum hamil maupun saat kehamilan. Pengetahuan tentang penyakit anemia sangat penting agar ibu hamil dapat terhindar dari masalah-masalah kehamilan yang dapat menyulitkan baik dimasa kehamilan, saat proses persalinan ataupun akibat pada bayi yang akan dilahirkan. Apabila seorang ibu hamil memiliki pengetahuan yang lebih tentang anemia dalam kehamilan maka kemungkinan besar ibu akan berpikir untuk menentukan sikap, berperilaku untuk mencegah, menghindari atau mengatasi masalah anemia dalam kehamilan tersebut. Dan ibu memiliki kesadaran untuk melakukan kunjungan *antenatal* untuk memeriksakan kehamilannya, sehingga apabila terjadi resiko pada masa kehamilan tersebut dapat ditangani secara dini dan tepat oleh tenaga

kesehatan. Hal ini juga dimaksudkan untuk dapat membantu menurunkan angka kematian ibu yang cukup tinggi di Indonesia. (Erni Dmayanti, 2009).

D. Tinjauan Umum Asupan Fe

Walaupun wanita hamil berhenti menstruasi, tambahan besi tetap diperlukan untuk fetus, plasenta dan peningkatan volume darah ibu. Jumlah ini mendekati 1000 mg besi, lebih besar ketika memasuki awal kehamilan. Kebutuhan per hari selama kehamilan meningkat dari 0,8 per hari dalam trisemester pertama naik menjadi 6.3 mg per hari dalam trisemester ketiga. Intervensi yang paling mudah dan paling luas jangkauannya adalah melalui institusi Posyandu dan Puskesmas. Kebijakan pemerintah adalah memberikan tablet Fe (Ferro Sulfat 200 mg setara dengan Fe elemen 60 mg dan asam folat 0,25 mg) untuk semua ibu hamil sebanyak satu kali satu tablet selama 90 hari. Diperkirakan jumlah tersebut mencukupi kebutuhan tambahan zat besi selama kehamilan yaitu 1000 mg di samping yang berasal dari makanan.

Suplementasi tablet zat besi adalah pemberian zat besi folat yang berbentuk tablet. Tiap tablet 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat, yang diberikan oleh pemerintah pada ibu hamil untuk mengatasi masalah anemia gizi besi. (Departemen Kesehatan, 1999)

Zat besi sangat penting untuk mengkompensasi peningkatan volume darah yang terjadi selama kehamilan dan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin yang adekuat.

Besi merupakan mineral makro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan, yaitu sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia dewasa. Besi mempunyai beberapa fungsi esensial didalam tubuh yakni sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, sebagai elektron di dalam sel, dan sebagai bagian terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. (Almatsier, 2003)

Kebutuhan besi (yang diabsorpsi atau fisiologis) harian dihitung berdasarkan jumlah zat besi dari makanan yang diperlukan untuk mengatasi kehilangan basal, kehilangan karena menstruasi dan kebutuhan bagi pertumbuhan. Kebutuhan tersebut bervariasi menurut umur dalam kaitannya dengan berat badan. Pada wanita mengalami kehilangan besi yang dibutuhkan sekitar 0,8 per hari. Namun wanita dewasa kehilangan zat besi tambahan akibat menstruasi dan hal ini menaikkan kebutuhan rata-rata setiap harinya sehingga zat besi yang harus diserap setiap harinya 1,4 mg per hari (jumlah ini memenuhi kebutuhan wanita yang sedang menstruasi, untuk memenuhi kebutuhan yang 10 % lagi diperlukan absorpsi harian paling sedikit 2,4 mg zat besi guna mengimbangi kehilangan yang sangat tinggi saat menstruasi. (Michael, 2005)

Fungsi utama zat besi adalah untuk mengangkut O_2 dan CO_2 untuk pembentukan darah. Jumlah zat besi yang harus diserap tubuh setiap harinya

hanya 1 mg atau setara 10-20 mg zat besi yang terkandung dalam makanan. Zat besi dalam pangan nabati berbentuk ikatan feri, di dalam tubuh ikatan feri ini harus dipecah terlebih dahulu dalam bentuk ferra oleh getah lambung. Sementara dalam pangan hewani zat besi sudah berada dalam bentuk ikatan ferro yang lebih mudah diserap. Dalam bahasa ilmiah zat besi dari pangan hewani sering disebut heme-iron sedangkan yang berasal dari nabati disebut non heme-iron. (Ali Khomsan, 2003)

Zat besi dalam makanan dapat berbentuk heme yakni berikatan dengan protein atau dalam bentuk nonheme yaitu senyawa besi organik yang kompleks. Ketersediaan zat besi untuk tubuh kita dapat dibedakan antara heme dan non heme. Zat besi heme berasal dari hemoglobin dan mmioglobin yang hanya terdapat dalam bahan makanan hewani, yang dapat diabsorpsi secara langsung dalam bentuk kompleks zat besi phorphyrin (iron phorphyrin kompleks). Jumlah zat besi heme yang diabsorpsi lebih tinggi dari pada nonheme. Untuk seseorang yang cadangan zat besi dalam tubuhnya rendah, zat besi heme ini dapat diapsorpsi lebih dari 35%, sedangkan buat orang yang simpanan besinya cukup banyak (lebih dari 500 gram) maka absorpsi zat besi heme ini kurang lebih 25%. Dari hasil analisa bahan makanan didapatkan bahwa sebanyak 30-40% zat besi di dalam hati dan ikan, serta 60 % zat besi dalam daging sapi, kambing, dan ayam adalah dalam bentuk heme.


Zat besi dapat diserap hanya 5 %, pada umumnya terdapat didalam bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran,

yakni ditempat tumbuhnya, kamu menggembalakan ternak kamu sehingga binatang itu dapat makan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging, dan bulu. (Shihab, 2002)

Sedangkan, maksud ayat 11 yaitu Setelah ayat yang lalu menyebut tumbuh-tumbuhan secara umum, ayat ini menyebut beberapa yang paling bermanfaat atau populer dalam masyarakat arab tempat dimana turunnya al-Qur'an dengan menyatakan bahwa Dia, yakni Allah SWT, menumbuhkan bagi kamu dengannya, yakni dengan air hujan itu. Tanaman-tanaman dari yang paling cepat layu sampai yang paling panjang usiannya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang paling panjang usiannya, demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu jadikan makanan yang halal atau minuman yang haram, dan dari segala macam atau sebagian buah-buahan, selain yang di sebut itu. Sesungguhnya pada yang demikian, yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu, benar-benar ada tanda yang sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Mahakuasa. Tanda itu berguna bagi kaum yang memikirkan. Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah tempat tumbuhnya berdempet, tetapi ragam dan rasanya berbeda-beda. (Shihab, 2002)

Dijelaskan pula pada surah An- Nahl/16:14





Terjemahan: Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (Departemen Agama RI, Syamil Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2005).

Maksud dari ayat diatas adalah dimulai dengan makhluk secara umum, kemudian binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, disusul yang terhampar seperti air dan semacamnya, lalu yang berwarna-warni. Itu semua untuk membuktikan keesaan dan keniscayaan hari kemudian. Melalui ayat diatas, diuraikan apa yang terdapat didalam air, lagi tertutup olehnya. Ayat ini menyatakan bahwa: dan Dia yakni Allah swt. yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikannya arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan agar kamu dapat menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-ikan dan sebangsanya yang terdiam disana sehingga kamu dapat memakan darinya daging yang segar yakni binatang-binatang laut itu dan kamu dapat mengeluarkan yakni mengupayakan dengan cara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan darinya yakni dari laut dan sungai itu perhiasan yang kamu pakai seperti permata, mutiara, merjan, dan semacamnya. Dan disamping itu, kamu melihat wahai yang dapat melihat, menalar, dan merenung betapa kuasa Allah swt. sehingga bahtera dapat berlayar padanya membawa barang-barang dan bahan makanan, kemudian betapapun beratnya bahtera itu, ia tidak tenggelam sedang air yang dilaluinya sedemikian lunak. Allah menundukkan

itu agar kamu memanfaatkannya dan agar kamu bersungguh-sungguh mencari rezeki sebagian dari karunia-Nya itu dan agar kamu terus menerus bersyukur, yakni menggunakan anugrah itu sesuai dengan tujuan penciptaannya untuk kepentingan kamu dan generasi-generasi sesudah kamu dan juga untuk makhluk-makhluk selain kamu. (Shihab, 2002)

1. Mekanisme Fe Mempengaruhi Hb

Zat besi dalam tubuh terdiri dari proses penyerapan, pengangkutan, pemanfaatan, penyimpanan, dan pengeluaran. Penyerapan terutama terjadi di bagian usus halus dengan bantuan alat angkut protein khusus. Ada dua jenis alat angkut protein di dalam sel mukosa usus halus yang membantu penyerapan besi, yaitu transferin dan ferritin. Transferin mukosa mengangkut besi dari saluran cerna ke dalam sel mukosa dan memindahkannya ke transferin reseptor yang ada dalam sel mukosa. Selebihnya disimpan sebagai ferritin, dan sebagian hilang melalui usus halus yang dibuang. Setelah itu transferin reseptor mengangkut besi melalui darah ke semua jaringan tubuh. Selanjutnya sebagian besar transferin darah membawa besi ke sumsum tulang dan bagian tubuh lain.

Di dalam sumsum tulang besi digunakan untuk membuat hemoglobin yang merupakan bagian dari sel darah merah, kelebihan besi dapat disimpan sebagai matalotionein, dari simpanan besi dapat dimobilisasi untuk keperluan tubuh seperti pembentukan hemoglobin, setelah itu diangkut ke hati dan limpa, kemudian hati dan limpa mengeluarkan besi dari sel darah merah dan mengikatkan ke transferin,

yang lebih disimpan sebagai ferritin dan hemosiderin terutama yang terdapat dalam hati. Besi yang dibawa oleh transferin sebagian hilang dalam keringat dan sebagian hilang melalui darah yang mengakibatkan kadar hemoglobin dibawah normal. Pada saat kadar hemoglobin dibawah normal maka terjadi anemia defisiensi zat besi.

2. Asupan Zat Besi

Zat besi adalah salah satu unsur yang diperlukan dalam proses pembentukan sel darah merah. Sel darah merah ini mengandung senyawa kimia hemoglobin, yang berfungsi membawa oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh tubuh.

Bila asupan zat besi sebagai salah satu mikro nutrisi ini berkurang, tubuh kita akan mengalami penurunan kadar hemoglobin, yang kita sebut dengan anemia. Akibat berkurangnya jumlah sel darah merah tersebut, darah tidak dapat mengangkut oksigen dalam jumlah sesuai yang diperlukan tubuh.

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dasar pemikiran variable yang diteliti adalah :

1. Pendidikan Ibu

Pendidikan ibu berkaitan dengan tingkat pengetahuan ibu, semakin tinggi pendidikan ibu maka semakin luas dan dalam ilmu pengetahuannya, sehingga semakin besar kemungkinan memiliki atau mendapatkan sumber informasi sehingga mampu mencegah dan mengatasi masalah kesehatannya khususnya apabila terjadi anemia sewaktu hamil. Pendidikan memegang peranan penting pada setiap perubahan perilaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan tingginya pendidikan yang ditempuh diharapkan tingkat pengetahuan seseorang akan bertambah sehingga memudahkan dalam menerima atau mengadopsi perilaku yang positif.

2. Pengetahuan Ibu Hamil

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan ini dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang berperilaku sesuai keyakinan tersebut. Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai macam sumber, misalnya

media massa, media elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, media poster, kerabat dekat dan sebagainya. (Mustafa, 1995)

3. Pendapatan Keluarga


Pendapatan adalah hasil gaji, upah, imbalan yang diterima seseorang atas kegiatan yang dilakukannya. Pendapatan akan mempengaruhi pola kegiatan dan pola pikir termasuk kesempatan untuk memanfaatkan potensi dan fasilitas yang tersedia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu keluarga maka semakin tinggi pula daya beli keluarga tersebut sehingga berdampak terhadap kuantitas dan kualitas pangan yang tersedia dalam keluarga yakni cukup dan memenuhi semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh.

4. Asupan Tablet Fe

Fungsi utama zat besi adalah untuk mengangkut O_2 dan CO_2 untuk pembentukan darah. Jumlah zat besi yang harus diserap tubuh setiap harinya hanya 1 mg atau setara 10-20 mg zat besi yang terkandung dalam makanan. Pada wanita mengalami kehilangan besi yang dibutuhkan sekitar 0,8 mg per hari. Anemia pada kehamilan atau kekurangan kadar hemoglobin dalam darah dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius bagi ibu dalam kehamilan, persalinan dan nifas yaitu dapat mengakibatkan abortus, infeksi intra partum dan post partum. Anemia berat dengan Hb kurang dari 4 gr/100 ml dapat mengakibatkan komplikasi dan dapat terjadi pada hasil konsepsi yaitu

kematian mudah, kematian perinatal, cacat bawaan. Pemberian tablet Fe diharapkan mampu mencegah anemia pada ibu hamil.

B. Pola Pikir Variabel Yang Diteliti



Keterangan:

Variabel Independen :

Variabel Dependen :

—————> : Variabel yang akan diteliti

- - - - -> : Variabel yang tidak diteliti

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Anemia ibu hamil

Anemia ibu hamil adalah suatu keadaan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari 11 gr/100 ml diperoleh dari hasil laboratorium puskesmas Tamangapa.

Kriteria Objektif:

a. Anemia.

Apabila kadar hemoglobin (Hb) ibu hamil kurang dari 11 gr/100 ml.

b. Tidak anemia

Bila kadar hemoglobin (Hb) ibu hamil lebih atau sama dengan 11 gr/100 ml.

Sumber : Wiknjosoastro,1999

2. Pendidikan Ibu

Pendidikan ibu adalah jenjang pendidikan formal yang terakhir yang dimiliki oleh ibu dengan mengacu pada undang-undang No.20 tahun 2003 mengenai wajib belajar 9 tahun.

Kriteria Objektif

a. Cukup

Tingkat pendidikan ibu minimal tamat SMP atau sederajat

b. Kurang

Tingkat pendidikan ibu tidak tamat SMP atau sederajat

Sumber : Mardina 2006

3. Pengetahuan Ibu Tentang Anemia

Pengetahuan anemia pada ibu hamil adalah hasil tahu yang dimiliki ibu hamil tentang anemia yang meliputi pengertian anemia, tanda dan gejala anemia, dampak anemia pada kehamilan dan pencegahan anemia.

Dengan alat ukur kuesioner, yang diberi skor 1 untuk jawaban yang benar dan skor 0 untuk jawaban yang salah. Penentu kriteria objektif untuk variable pengetahuan dengan menggunakan skala Likert (Sofyan,2002) dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Nilai (x)} &= \text{Skor tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} : \\ &= 1 \times 10 \\ &= 10\end{aligned}$$

$$\text{Persentase (x)} = \frac{10}{10} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai terendah(x)} &= \text{Skor terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} : \\ &= 0 \times 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase (x)} &= \frac{0}{10} \times 100\% \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Range (R)} &= X-Y \\ &= 100-0\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Karena kriteria dibagi dalam 2 kategori yaitu cukup dan kurang:

$$I = \frac{R}{K} = \frac{100\%}{2} = 50\% = 50\%$$

Jadi kriterianya adalah :

a. Pengetahuan cukup

Jika nilai skor responden $> 50\%$.

b. Pengetahuan Kurang

Jika nilai nilai skor responden $\leq 50\%$.

4. Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga adalah segala bentuk penghasilan atau penerimaan seluruh anggota keluarga dalam bentuk rupiah yang diterima setiap bulannya. Pendapatan dalam penelitian ini adalah penghasilan (gaji) yang didapat keluarga ibu hamil dalam sebulan dari sumber pendapatan keluarga sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1.265.000 (BPS, 2012).

a. Cukup

Jika pendapatan kepala keluarga \geq Rp 1.265.000.

b. Kurang

Jika pendapatan kepala keluarga $<$ Rp 1.265.000

5. Asupan Tablet Fe

Walaupun wanita hamil berhenti menstruasi, tambahan besi tetap diperlukan untuk fetus, plasenta dan peningkatan volume darah ibu. Jumlah ini mendekati 1000 mg besi, lebih besar ketika memasuki awal kehamilan. Kebutuhan per hari selama kehamilan meningkat dari 0,8 per hari dalam trisemester pertama naik menjadi 6.3 mg per hari dalam

trimesester ketiga. Intervensi yang paling mudah dan paling luas jangkauannya adalah melalui institusi Posyandu dan Puskesmas. Kebijakan pemerintah adalah memberikan tablet Fe (Ferro Sulfat 200 mg setara dengan Fe elemen 60 mg dan asam folat 0,25 mg) untuk semua ibu hamil sebanyak satu kali satu tablet selama 90 hari. Diperkirakan jumlah tersebut mencukupi kebutuhan tambahan zat besi selama kehamilan yaitu 1000 mg di samping yang berasal dari makanan.

Suplementasi tablet zat besi adalah pemberian zat besi folat yang berbentuk tablet. Tiap tablet 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat, yang diberikan oleh pemerintah pada ibu hamil untuk mengatasi masalah anemia gizi besi (Departemen Kesehatan, 1999).

Asupan Tablet Fe dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang di beri tablet Fe oleh petugas puskesmas.

Kriteria Objektif :

a. Cukup

Jika tablet Fe yang diberikan dihabiskan ≥ 10 tablet dalam satu bulan.

b. Kurang

Jika tablet Fe yang diberikan tidak dihabiskan ≤ 10 tablet dalam satu bulan.

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Nol (H_0)

- a. Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil
- b. Tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu hamil dengan kejadian anemia pada ibu hamil
- c. Tidak ada hubungan antara pendapatan ibu hamil dengan kejadian anemia pada ibu hamil
- d. Tidak ada hubungan antara asupan Fe ibu hamil dengan kejadian anemia pada ibu hamil

2. Hipotesis Alternatif

- a. Ada hubungan antara pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil
- b. Ada hubungan antara pengetahuan ibu hamil dengan kejadian anemia pada ibu hamil
- c. Ada hubungan antara pendapatan ibu hamil dengan kejadian anemia pada ibu hamil
- d. Ada hubungan antara asupan Fe ibu hamil dengan kejadian anemia pada ibu hamil

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *survey analitik* dengan menggunakan pendekatan *Cross sectional study* yaitu melihat hubungan pendidikan ibu, pengetahuan ibu hamil tentang anemia, pendapatan keluarga, dan asupan tablet Fe ibu hamil dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, jalan Tamangapa Raya No. 26 H.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama 2 minggu, pada bulan Juni yaitu mulai pada tanggal 4 - 16 juni 2012.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Tamangapa.

2. Sampel

Sampel yang diambil adalah semua ibu hamil yang berkunjung / memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Tamangapa pada saat

penelitian berlangsung pada tanggal 4 - 16 juni 2012, yaitu sebanyak 40 sampel.

Metode pengambilan sampelnya yaitu *non random sampling*. *Non random sampling* adalah pengambilan sampel yang didasarkan atas kemungkinan yang dapat diperhitungkan.

3. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara *accidental sampling*. *Accidental sampling* yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia. (Dr. Soekidjo, 2005)

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

a. Sosial ekonomi

Data sosial ekonomi diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner.

b. Asupan tablet Fe

Data asupan tablet Fe diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner.

2. Data sekunder

Data diperoleh dari Puskesmas Tamangapa Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, buku dan referensi lain tahun 2012 yang terkait dengan pembahasan peneliti.

E. Pengolahan dan Analisis Data

1. Editing Data

Dalam tahap ini dimaksudkan untuk melakukan pengecekan kembali setiap lembar daftar pertanyaan dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner. Kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi.

2. Coding

Pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian jawaban dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan kode-kode tertentu (angka). Untuk keperluan ini dibuatkan lembar khusus untuk mentabulasikan data setelah transferring data agar menandakan proses data entry.

3. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan secara komputasi dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows. Analisis data dilakukan dengan mengisi hipotesis Nol (H_0) dengan menggunakan rumus Chi square (X^2) untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel dependen dengan variabel independen.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berupa pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

data atau informasi tentang tingkat pendidikan ibu hamil, tingkat pengetahuan ibu hamil tentang anemia, pendapatan keluarga, dan asupan Tablet Fe.

G. Penyajian Data

Data yang telah diolah dan dianalisis selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan digambarkan atau dijelaskan dalam bentuk kalimat.

H. Proses Pemeriksaan Hb

a. Alat dan Bahan

a. Alat

1. Hb digital
2. Check strip
3. Lancet
4. Kapas steril
5. Alcohol 70%


b. Bahan

- Darah

b. Prosedur Pemeriksaan

1. Siapkan alat.
2. Bersihkan jari yang akan diambil darahnya terlebih dahulu dengan kapas yang mengandung alkohol.
3. Gunakan auto lancet untuk mengambil darah pada jari yang telah diolesi alkohol.

4. Buang darah pertama yang menetes dengan mengusapnya dengan kapas alkohol, selanjutnya tetesan darah kedua diambil menggunakan check strip.
5. Lakukan pemeriksaan pada alat Hb digital.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa, selama 2 minggu yaitu mulai tanggal 4 - 16 juni 2012. Dengan mengambil sampel sebanyak 40 orang ibu hamil yang tercatat dalam buku register ibu periode Januari - Juni 2012. Data diolah dan dianalisis disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dilengkapi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Deskripsi hasil penelitian

a. Kejadian anemia

Tabel 5.1
Distribusi Kejadian Anemia ibu Hamil
Di Puskesmas Tamangapa Makassar
Periode Januari – Juni
Tahun 2012

Kejadian Anemia	n	%
anemia	17	42.5
tidak anemia	23	57.5
Total	40	100.0

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 40 sampel terdapat 17 (42.5%) ibu hamil yang menderita anemia yaitu ibu hamil yang memiliki kadar Hb dibawah 11 mg/dl dan 23 (57.5%) ibu hamil yang

tidak mengalami anemia yakni ibu hamil yang mempunyai kadar Hb diatas atau sama dengan 11 mg/dl.

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 5.2
Distribusi Tingkat Pendidikan ibu Hamil
Di Puskesmas Tamangapa Makassar
Periode Januari – Juni
Tahun 2012

Tingkat pendidikan	n	%
Kurang	15	37.5
Cukup	25	62.5
Total	40	100.0

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 40 sampel terdapat 15 (37.5%) ibu hamil dengan tingkat pendidikan kurang yaitu ibu hamil yang tidak tamat SMP dan 25 (62.5%) ibu hamil dengan tingkat pendidikan cukup yaitu tamat SMP.

c. Tingkat Pengetahuan

Tabel 5.3
Distribusi Tingkat Pengetahuan ibu Hamil
Di Puskesmas Tamangapa Makassar
Periode Januari – Juni
Tahun 2012

Tingkat pengetahuan	n	%
Kurang	29	72.5
Cukup	11	27.5
Total	40	100.0

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 40 sampel terdapat 29 (72.5%) ibu hamil dengan tingkat pengetahuan kurang yaitu ibu hamil yang memperoleh skor dibawah atau sama dengan 50 dan 11 (27.5%) ibu hamil dengan tingkat pengetahuan cukup yaitu ibu hamil yang memperoleh skor diatas 50.

d. Pendapatan keluarga

Tabel 5.4
Distribusi Tingkat Pendapatan ibu Hamil
Di Puskesmas Tamangapa Makassar
Periode Januari – Juni
Tahun 2012

Tingkat Pendapatan	n	%
Kurang	29	72.5
Cukup	11	27.5
Total	40	100.0

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 40 sampel terdapat 29 (72.5%) ibu hamil dengan tingkat pendapatan kurang yaitu ibu hamil yang mempunyai tingkat pendapatan keluarga dibawah atau sama dengan Rp. 1.265.000 dan sebanyak 11 (27.5%) ibu hamil dengan tingkat pendapatan cukup yaitu ibu hamil yang mempunyai tingkat pendapatan keluarga diatas Rp. 1.265.000.

e. **Tingkat Konsumsi Tablet Fe**

Tabel 5.5
Distribusi Konsumsi Tablet Fe ibu Hamil
Di Puskesmas Tamangapa Makassar
Periode Januari – Juni
Tahun 2012

Konsumsi Tablet Fe	n	%
Kurang	11	27.5
Cukup	29	72.5
Total	40	100.0

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 40 sampel terdapat 11 (27.5%) ibu hamil dengan tingkat konsumsi tablet Fe kurang yaitu ibu hamil yang mengkonsumsi tablet Fe dibawah 15 butir dalam sebulan dan sebanyak 29 (72.5 %) ibu hamil dengan tingkat konsumsi tablet Fe cukup yaitu ibu hamil yang mengkonsumsi tablet Fe sebanyak 15 sampai 30 tablet Fe dalam sebulan.

2. Analisis Hubungan Variabel yang di Teliti

a. Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil

Tabel 5.6
Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kejadian Anemia
pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tamangapa Makassar
Periode Januari – Juni
Tahun 2012

Tingkat Pendidikan	Kejadian Anemia				Jumlah		X ² (P)
	Anemia		Tidak Anemia		n	%	
	n	%	n	%			
Kurang	5	33.3	10	66.7	15	100%	0.705
Cukup	12	48.0	13	52.0	25		
Jumlah	17	42.5	23	57.5	40		

Sumber : Data Primer , 2012

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 15 ibu hamil yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan menderita anemia sebanyak 5 orang (33.3%), sedangkan yang tidak anemia sebanyak 10 orang (66.7%). Sedangkan dari 25 ibu hamil dengan tingkat pendidikan cukup yang menderita anemia sebanyak 12 orang (48.0%), dan yang tidak menderita anemia sebanyak 13 orang (52.0%).

Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai $p \ 0.750 > 0.05$ berarti H nol diterima dan H alternatif ditolak yakni tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian anemia pada

ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar periode Januari - Juni 2012.

b. Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil

Tabel 5.7
Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kejadian Anemia
pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tamangapa Makassar
Periode Januari - Juni
Tahun 2012

Tingkat Pengetahuan	Kejadian Anemia				Jumlah		X ² (P)
	Anemia		Tidak Anemia		n	%	
	n	%	n	%			
Kurang	27	93,1	2	6,9	29	100%	0.001
Cukup	4	36,4	7	63,6	11		
Jumlah	31	77,5	9	22,5	40		

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari 29 orang ibu hamil dengan tingkat pengetahuan kurang yang menderita anemia sebanyak 27 orang (93,1%), dan yang tidak menderita anemia sebanyak 2 (6,9%), sedangkan dari 11 orang ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan cukup yang menderita anemia sebanyak 4 orang (36,4%), sedangkan yang tidak menderita anemia sebanyak 7 orang (63,6%).

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai $p\ 0.001 < 0.05$ berarti Hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak yang artinya ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di puskesmas Tamangapa Makassar periode Januari - Juni 2012.

c. Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil

Tabel 5.8
Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kejadian Anemia
pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tamangapa Makassar
Periode Januari – Juni
Tahun 2012

Tingkat Pendapatan	Kejadian Anemia				Jumlah		X ² (P)
	Anemia		Tidak Anemia		n	%	
	n	%	n	%			
Kurang	13	44.8	16	55.2	29	100%	0.730
Cukup	4	36.4	7	63.6	11		
Jumlah	17	42.5	23	57.5	40		

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 29 ibu hamil yang memiliki tingkat pendapatan rendah terdapat 13 (44.8%) ibu hamil yang menderita anemia, dan yang tidak menderita anemia terdapat 16 (55.2%) ibu hamil. Sedangkan dari 11 ibu hamil yang memiliki tingkat pendapatan keluarga cukup terdapat 4 (36.4%) ibu hamil

yang menderita anemia dan terdapat 7 (63.6%) ibu hamil yang tidak menderita anemia.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai $p = 0.730 > 0.05$ menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a alternatif ditolak yang berarti tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar periode Januari – Juni 2012.

d. Hubungan Tingkat Konsumsi Fe Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil

Tabel 5.9
Hubungan Tingkat Konsumsi Tablet Fe dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tamangapa Makassar Periode Januari – Juni Tahun 2012

Konsumsi Tablet Fe	Kejadian Anemia				Jumlah		X^2 (P)
	Anemia		Tidak Anemia		n	%	
	n	%	N	%			
Kurang	9	81.8	2	18.2	11	100%	0.003
Cukup	8	27.6	21	72.4	29		
Jumlah	17	42.5	23	57.5	40		

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari 11 ibu hamil yang kurang mengkonsumsi tablet Fe terdapat 9 (81.8%) ibu hamil yang menderita anemia, dan terdapat 2 (18.2 %) ibu hamil yang tidak

menderita anemia. Sedangkan dari 29 ibu hamil yang cukup mengkonsumsi tablet Fe terdapat 8 (27.6 %) ibu hamil yang menderita anemia, dan 23 (57.5) ibu hamil yang tidak menderita anemia.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p $0.003 < 0.05$ yang berarti H alternatif diterima dan H nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar periode Januari -juni 2012.



B. Pembahasan

a. Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Hamil Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil

Pendidikan merupakan latar belakang yang dapat meningkatkan intelektual, maka salah satu cara untuk memudahkan masyarakat khususnya ibu hamil menerima ide-ide baru dalam menentukan makanan yang akan dikonsumsinya. Pendidikan juga sebagai proses pengembangan kepribadian yang dilaksanakan secara sadar dan penuh tanggung jawab. (Mardina, 2006)

Tingkat pendidikan ibu yang akan memberikan pengaruh dalam penerimaan informasi yang diberikan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi bagi dirinya dan janin yang dikandungnya. Dengan demikian akan berpengaruh pada keadaan ibu yang sehat dan pertumbuhan janin yang sehat pula. Berdasarkan teori ditemukan bahwa pendidikan rendah seorang ibu yang berpeluang menderita anemia. Hal ini berarti dari hasil yang ditemukan sesuai dengan teori diatas.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar masyarakat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya dan masyarakat. Pendidikan yang dijalani seseorang memiliki pengaruh pada peningkatan

kemampuan berfikir, dengan kata lain seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan dapat mengambil keputusan yang lebih rasional, umumnya terbuka untuk menerima perubahan atau hal baru dibandingkan dengan individu yang berpendidikan lebih rendah.

Pendidikan juga merupakan mengembangkan potensi-potensi manusiawi masyarakat baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan berkurangnya lokasi untuk pembelian makanan sehari-hari sehingga mengurangi jumlah dan kualitas makanan ibu per hari yang berdampak pada penurunan status gizi. Gangguan gizi yang umum pada perempuan adalah anemia, karena secara fisiologis mengalami menstruasi tiap bulan. Sumber makanan yang diperlukan untuk mencegah anemia umumnya berasal dari sumber protein yang lebih mahal, dan sulit terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Kekurangan tersebut memperbesar risiko anemia pada remaja dan ibu hamil serta memperberat risiko kesakitan pada ibu dan bayi baru lahir. Anemia berperan terhadap tingginya angka kematian ibu hamil dan semakin meningkat seiring dengan penambahan usia kehamilan. Tingkat

pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi kematian ibu. Hasil penelitian Mardina 2006 ibu yang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Tamat SMA dan PT/ Akademik), kurang mengalami anemia. Sebaliknya bagi ibu yang tidak memiliki pendidikan akan besar kemungkinan mengalami anemia pada saat kehamilan. (Mardina 2006)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat ibu hamil yang memiliki tingkat pendidikan kurang tetapi tidak menderita anemia dan ada pula ibu hamil yang memiliki tingkat pendidikan cukup tetapi masih menderita anemia, hal ini disebabkan karena pendidikan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil. Walaupun ibu hamil tersebut memiliki tingkat pendidikan rendah tetapi mampu memperoleh informasi, baik dari media maupun melalui penyuluhan dan saran dari orang lain maka akan mempengaruhi cara berpikirnya dan akhirnya mengkonsumsi makanan yang mengandung nilai gizi yang tinggi dan sebaliknya ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi tetapi kurang mendapatkan informasi dan tidak mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh maka pada akhirnya akan mempengaruhi cara memilih makanannya sehingga berpengaruh terhadap status anemia ibu hamil. Selain itu, kejadian anemia juga dipengaruhi oleh faktor individu ibu hamil dalam mengkonsumsi makanan. Misalnya karena pengaruh ngidam berlebihan yang menyebabkan ibu hamil resisten terhadap suatu jenis makanan yang

ternyata mengandung nilai gizi tinggi. Selain itu, hal ini disebabkan oleh perubahan tingkah laku ibu hamil yang berbeda dengan saat sebelum hamil, misalnya sebelum hamil senang mengkonsumsi beraneka ragam makanan tetapi pada saat hamil selera makannya berubah dan cenderung menyukai satu jenis makanan saja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji statistik chi-square diperoleh nilai $p = 0.750 > 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di puskesmas Tamangapa periode januari-juni 2012.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cisilia Sero M di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu Jakarta tahun 2008 dengan judul “Faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia gizi pada ibu hamil”, nilai $p = 0,053 > 0,05$ yang berarti tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Puspitaningrum di Rumah Bersalin Bhakti Kota Semarang tahun 2011 dengan judul “Hubungan pengetahuan tentang pendidikan ibu, konsumsi Tablet fe dengan kadar hb pada ibu hamil”, nilai $p = 0,0001 < 0,05$ yang berarti ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil.

pengetahuan gizi diharapkan dapat memilih asupan makanan yang bernilai gizi baik dan seimbang bagi dirinya sendiri, janin, dan keluarga. Pengetahuan gizi yang baik dapat membantu seseorang belajar bagaimana menyimpan, mengolah serta menggunakan bahan makanan yang berkualitas untuk dikonsumsi. Pengetahuan merupakan hasil dari akibat proses penginderaan, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang atau terbentuknya praktek. Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. (Notoatmodjo, 2003)

Pengetahuan yang kurang menyebabkan bahan makanan bergizi tidak dikonsumsi secara optimal. Pemilihan bahan makanan dan pola makan yang salah, cukup berperan dalam terjadinya anemia. Keadaan anemia ini bisa disebabkan karena pengetahuan ibu hamil tentang gizi yang rendah dan tidak teratur. Selain memang juga zat besi yang dapat diserap dari bahan makanan hanya sedikit. Kurangnya pengetahuan dan salah konsep tentang kebutuhan gizi dan nilai pangan adalah umum dijumpai. Kemiskinan dan kekurangan persediaan pangan yang bergizi merupakan faktor penting masalah kurang gizi atau kemampuan

menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. (Erni Damayanti, 2009)

Para ibu hamil yang hendaknya memperluas pengetahuan tentang berbagai macam penyakit yang dapat mengenainya, baik disaat sebelum hamil maupun saat kehamilan. Pengetahuan tentang penyakit anemia sangat penting agar ibu hamil dapat terhindar dari masalah kehamilan yang dapat menyulitkan baik dimasa kehamilan, saat proses persalinan ataupun akibat pada bayi yang akan dilahirkan. Apabila seorang ibu hamil memiliki pengetahuan yang lebih tentang anemia dalam kehamilan maka kemungkinan besar ibu akan berfikir untuk menentukan sikap, berperilaku untuk mencegah dan menghindari atau untuk mengatasi masalah anemia dalam kehamilan tersebut. (Mustafa, 1995)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa terdapat ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tetapi tidak menderita anemia. Dari 29 orang ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan kurang terdapat 2 orang ibu hamil yang tidak mengalami anemia dan 27 ibu hamil lainnya menderita anemia. Hasil ini cenderung menunjukkan ibu hamil dengan tingkat pengetahuan kurang akan mengalami anemia. Ibu hamil yang tidak menderita anemia bisa disebabkan oleh faktor konsumsi makan yang baik. Walaupun pengetahuannya kurang, namun ternyata dari makanan yang dikonsumsi banyak mengandung zat besi, termasuk kepatuhan mengkonsumsi tablet

fe bukan didasari karena pengetahuan tapi atas perintah dokter / bidan di puskesmas. Sedangkan dari 11 orang ibu hamil dengan tingkat pengetahuan cukup terdapat 4 orang menderita anemia dan 7 lainnya tidak mengalami anemia. Hal ini cenderung menunjukkan bahwa ibu hamil dengan pengetahuan cukup tidak mengalami anemia. Namun ada 4 ibu hamil yang masih menderita anemia, ini disebabkan oleh faktor kesadaran, kemauan, dan kemampuan ibu hamil tersebut untuk mengkonsumsi makanan dan juga teblet fe. Walaupun ibu hamil tersebut tahu tentang kejadian anemia tetapi tanpa kesadaran, kemauan, dan kemampuan dari diri sendiri untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan mematuhi aturan dokter / bidan maka tidak menutup kemungkinan anemia masih akan tetap dialami oleh setiap ibu hamil.

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan uji chi-square menunjukkan $p < 0.001 < 0.05$ yang berarti ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar periode januari- juni 2012. Hal ini sesuai dengan pemaparan yang ada diatas bahwa semakin baik tingkat pengetahuan seorang ibu hamil maka ibu hamil cenderung tidak mengalami anemia.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Puspitaningrum di Rumah Bersalin Bhakti Kota Semarang 2011 dengan judul “Hubungan pengetahuan tentang pendidikan ibu, konsumsi

Tablet fe dengan kadar hb pada ibu hamil”, nilai p $0,0003 < 0,05$ yang berarti ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil.

c. Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil

Pendapatan keluarga adalah semua hasil perolehan yang didapat oleh anggota keluarga dalam bentuk uang sebagai hasil pekerjaannya. Pendapatan keluarga meliputi penghasilan dengan hasil-hasil lain. Pendapatan keluarga mempunyai peran penting terutama dalam memberikan efek terhadap taraf hidup mereka. Efek di sini lebih berorientasi pada kesejahteraan dan kesehatan, dimana perbaikan pendapatan akan meningkatkan tingkat gizi masyarakat. Pendapatan akan menentukan daya beli terhadap pangan yang dapat mempengaruhi status gizi. (Rustam, 1995)

Peningkatan pendapatan akan membawa masyarakat membelanjakan penghasilannya untuk barang-barang yang dipasarkan, baik untuk menunjang upaya peningkatan gizi, berupa makanan bergizi tinggi, bahan-bahan untuk perbaikan sanitasi serta usaha untuk mendapatkan pengobatan dini ketika sakit. (Sojogyo, 1994)

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada ibu hamil dipuskesmas Tamangapa Makassar didapatkan bahwa responden berpendapatan cukup

(\geq Rp 1.265.000) yaitu sebanyak 11 responden (27,5%) sedangkan 29 responden (72,5%) berpendapatan rendah ($<$ Rp 1.265.000).

Dari 29 ibu hamil yang memiliki tingkat pendapatan rendah terdapat 13 (44.8 %) ibu hamil yang menderita anemia, dan yang tidak menderita anemia terdapat 16 (55.2 %) ibu hamil. Sedangkan dari 11 ibu hamil yang memiliki tingkat pendapatan keluarga cukup terdapat 4 (36.4 %) ibu hamil yang menderita anemia dan terdapat 7 (63.6 %) ibu hamil yang tidak menderita anemia.

Dari hasil tersebut terlihat kecenderungan bahwa ibu hamil yang memiliki pendapatan kurang lebih banyak yang tidak menderita anemia dibanding ibu hamil hamil yang berpendapatan cukup. Hal ini disebabkan antara lain, karena pendapatan termasuk faktor sosial ekonomi yang sukar dinilai secara kuantitatif yang disebabkan karena masyarakat enggan untuk membicarakan kepada orang yang tidak dikenal dalam artian masyarakat kurang terbuka kepada peneliti tentang pendapatan riil yang diperoleh keluarganya, yaitu pendapatan yang dikemukakan kepada peneliti dibawah nilai pendapatan yang sebenarnya. Selain itu, para ibu hamil secara merata diberikan Tablet Fe oleh petugas puskesmas tanpa memungut biaya dari ibu hamil, ini berarti bahwa baik ibu hamil yang memiliki pendapatan rendah maupun cukup bisa memperoleh asupan Fe berupa tablet Fe. Sehingga asupan Fe ibu hamil bukan semata-mata bersumber dari ibu hamil sendiri yang didukung oleh

daya beli keluarga melainkan ditunjang juga oleh pemberian Tablet Fe dari Puskesmas. Sedangkan bagi ibu hamil yang berpendapatan cukup tapi masih menderita anemia, hal ini bisa disebabkan oleh pendapatan yang diperoleh tidak sepenuhnya digunakan untuk membeli bahan makanan tetapi lebih banyak digunakan untuk membeli barang perlengkapan rumah tangga disamping itu faktor pengetahuan, kesadaran, kemauan, berperan penting terhadap daya beli ibu hamil dalam menentukan jenis makanan yang akan dikonsumsi karena sebelum membeli bahan makanan ibu hamil pasti akan mengambil keputusan sesuai dengan pengetahuannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa dengan menggunakan uji statistik chi-square diperoleh hasil $p = 0,730 > 0,05$ ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian anemia pada ibu hamil.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cisilia Sero M di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu Jakarta tahun 2008 dengan judul “Faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia gizi pada ibu hamil”, nilai $p = 0,161 > 0,05$ yang berarti tidak ada hubungan antara pendapatan dengan kejadian anemia pada ibu hamil.

d. Hubungan Asupan Tablet Zat Besi (Fe) Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil

Besi merupakan mineral makro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan, yaitu sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia dewasa. Besi mempunyai beberapa fungsi esensial didalam tubuh yakni sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, sebagai elektron di dalam sel, dan sebagai bagian terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. (Almatsier, 2003)

Anemia pada kehamilan umumnya terjadi akibat kekurangan zat besi di dalam tubuh. Selama kehamilan absorpsi zat besi berlangsung lebih efisien dan memberikan respon yang sangat baik terhadap pengobatan ferro sulfat secara oral. Dengan demikian anemia ibu hamil dapat dicegah dan diobati dengan memberikan tablet Fe setiap hari. (Ali Khomsan, 2003)

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar didapatkan tingkat konsumsi Tablet Fe yang cukup yaitu 29 responden (72,5%) sedangkan tingkat konsumsi Tablet Fe yang kurang yaitu sebanyak 11 responden (27,5%).

Dari 11 ibu hamil yang kurang mengkonsumsi tablet Fe terdapat 9 (81.8 %) ibu hamil yang menderita anemia, dan terdapat 2 (18.2 %) ibu hamil yang tidak menderita anemia. Sedangkan dari 29 ibu hamil yang cukup mengkonsumsi tablet Fe terdapat 8 (27.6 %) ibu hamil yang menderita anemia, dan 23 (57.5) ibu hamil yang tidak menderita anemia.


Dari hasil tersebut terlihat bahwa ibu hamil yang mengkonsumsi tablet fe dalam jumlah cukup cenderung tidak mengalami anemia dibandingkan dengan ibu hamil yang mengkonsumsi tablet fe dalam jumlah kurang. Namun masih ada pula ibu hamil yang menderita anemia meski telah mengkonsumsi tablet fe dalam jumlah cukup. Ini dapat terjadi karena adanya masalah dalam pencernaan seperti mual dan muntah pada ibu hamil sehingga tablet fe tersebut belum terabsorpsi secara optimal didalam tubuh. Selain itu, penyerapan fe dalam tubuh harus didukung oleh zat gizi yang lain misalnya vitamin c sehingga dibutuhkan asupan makanan selain tablet fe. Sedangkan ada pula ibu hamil yang tidak mengalami anemia tetapi tingkat konsumsi tablet fe nya kurang. Hal ini disebabkan karena tingkat kebutuhan fe mampu terpenuhi berdasarkan konsumsi makanan sehari-hari.

Hasil uji statistik chi square menunjukkan bahwa nilai $p < 0.003 < 0.005$ berarti ada hubungan antara konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa Makassar.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putrini (2010) "Faktor-Faktor yang berhubungan dengan anemia gizi pada ibu hamil di Puskesmas Pallangga 2010" dimana hasil penelitian yang menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi Tablet Fe dengan kejadian anemia gizi pada ibu hamil.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan dalam penelitian, yaitu keterbatasan Dalam Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, dimana keakuratan data yang di peroleh anatra variabel-variabel yang diteliti sangta tergantung pada kejujuran dan keterbukaan responden serta sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menggali data dari responden sehingga fakta yang ada dapat dijamin keakuratannya.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari 40 ibu hamil yang diteliti didapatkan bahwa 42,5 % dan yang tidak menderita anemia 57,5 %, kemudian dari tingkat pendidikan didapatkan bahwa yang memiliki tingkat pendidikan cukup yaitu 62,5 % dan yang memiliki tingkat pendidikan kurang yaitu sebanyak 37,5 %. Sedangkan dari tingkat pengetahuan bahwa yang memiliki tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 27,5 % dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang sebanyak 72,5 %. Sedangkan dari tingkat pendapatan keluarga didapatkan bahwa tingkat pendapatan cukup yaitu sebanyak 27,5 % dan yang memiliki tingkat pendidikan kurang sebanyak 72,5 %. Kemudian dengan tingkat konsumsi tablet fe cukup sebanyak 72,5 % dan dengan tingkat konsumsi tablet fe kurang sebanyak 27,5 %.

Dari empat variabel yang diteliti, dihasilkan dua variabel diantaranya yang bermakna, yaitu tingkat pengetahuan dan tingkat konsumsi tablet fe. Sedangkan dua variabel lainnya dihasilkan tidak bermakna yaitu tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan keluarga.

B. SARAN

1. Perlunya kebijakan program kerja untuk puskesmas Tamangapa Makassar khususnya menangani anemia pada ibu hamil.
2. Dalam rangka mencegah risiko kehamilan yang disebabkan oleh pengetahuan yang kurang, diharapkan ibu-ibu mendapatkan penyuluhan tentang gizi yang dilakukan oleh petugas puskesmas atau yang terkait secara berkala.
3. Dalam rangka memberi pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil maka diharapkan petugas puskesmas menyediakan ruangan periksa yang lebih baik agar ibu hamil tidak berdesakan dan pemeriksaan berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu membuat nyaman pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadi,E.2007.Gizi dan Kesehatan Masyarakat.PT Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Almatsier,Sunita.2009.Prinsip Dasar Ilmu Gizi.PT Gramedia pustaka Utama:Jakarta
- Aal-fuadhil ma'az, Mamfaluthy.2002. *Kewajiban-Nafkah-Dalam-Rumah-Tangga*.www.google.com. diakses pada 19 juni 2012
- Arifin Tohar,2005.Gizi Buruk Ancaman Generasi Yang Hilang
- Anindiya.2007.*Anemia/rajawana./jurnal/32 health*.www.rajawana.com,diakses pada 5 Desember 2011.
- BPS.2012. Balai Pusat Statistik Makassar.www.anakunhas.com/2012/02/upah-minimum-kota-makassar-2012.diakses pada 23 februari 2012
- Departemen Agama RI.2005.*Syamil Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT.Syamil cipta media
- Depkes RI.2007.*satu dari 2 orang Indonesia menderita Anemia*.Republik Indonesia.www.google.com,diakses pada 6 desember 2011.
- _____1999. *Pemberian Tablet Fe pada Ibu Hamil*. Republik Indonesia.www.google.com,diakses pada 20 februari 2012.
- Dini,Kasdu.2004.*Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan*.jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Gibney, Michael J.2008.*Gizi Kesmas buku kedokteran*. Jakarta: Penerbit buku Kedokteran.
- Hanifa. 2007.*Ilmu Kebidanan Edisi ketiga*. Jakarta : YBP-SP
- Ismael,Sofyan.1995. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*.jakarta: Bina Aksara
- Khomsan,Ali.2003.Pangan dan Gizi untuk Kesehatan.PT Rajagravindo Persada:Jakarta
- Mochtar.1998.*sinopsis Obstetri Fisiologis dan Patologis,jilid I*. Jakarta: Penerbit EGC.
- Manuaba,1998.*Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta : Penerbit EGC.

- Mustafa Yaqub, Ali.2009. *Apa-Itu-Thayyib-Dan-Apa-Pula-Itu-Halal*.
www.google.com,diakses pada 19 januari 2012
- Nurchasanah.2009.*Ensiklopedi Kesehatan Wanita*.yogyakarta: Familia Pustaka Keluarga
- Ngatimin.1997.Antropologi dan perilaku kesehatan (disertasi)
- Notoatmodjo,Soekidjo,Dr.2005.*Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT rineka Cipta
- Proverawati,Atikah.2009.*buku Ajar Kebidanan*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Gravindo Persada.
- Putrini.”faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Pallangga.Skripsi program S1 Universitas Indonesia Timur.2010
- Puspitaningrum,Dewi.2011.*Hubungan Pengetahuan Tentang Anemia, Pendidikan Ibu, Konsumsi Tablet Fe Dengan Kadar Hb Pada Ibu Hamil Trimester Iii Di Rb Bhakti Ibu Kota Semarang*.www.google.com,diakses pada 10 juli 2012.
- Sero M.Cisilia.2008.*Faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia gizi pada ibu hamil*. .www.google.com,diakses pada 10 juli 2012.
- Supariasa.2001.*Penilaian Status Gizi*.jakarta: penerbit buku Kedokteran EGC
- Soejogyo.1994.pengkajian status gizi studi epidemiologi:Jakarta RSCM bagian Instalasi Gizi
- Shihab,Quraish.2002.Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Al Quran.Lanter hati:Jakarta
- WHO.2003.*kesehatan Keluarga masyarakat*.www.google.com,diakses pada 9 Desember 2011.
- Wahyuni.2009.*pemberian Tablet Fe pada ibu hamil*.www.google.com,diakses pada 19 januari 2012
- Wirakusumah,2007, *7 dari 10 Wanita hamil Terkena anemia*.www.infokes.com diakses tanggal 2 januari 2011.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner penelitian
2. Master tabel (SPSS) penelitian
3. Hasil analisis data
4. Surat permohonan izin pengambilan data awal di Puskesmas Tamangapa Makassar.
5. Surat permohonan izin penelitian dari UIN Alauddin Makassar kepada Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Cq. Balitbangda Prov. Sulawesi Selatan.
6. Surat izin / rekomendasi penelitian dari pemerintah prov.Sulawesi Selatan Badan Peneltian dan Pengembangan Daerah kepada Walikota Makassar.
7. Surat izin penelitian dari pemerintah Kota Makassar Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
8. Surat izin penelitian dari pemerintah Kota Makassar Dinas Kesehatan kepada Kepala Puskesmas Tamangapa Makassar.
9. Surat keterangan selesai meneliti dari Puskesmas Tamangapa Makassar.
10. Dokumentasi foto peneltian
11. Daftar Riwayat Hidup

KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN SOSIAL EKONOMI DAN ASUPAN TABLET FE TERHADAP KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAMANGAPA TAHUN 2012

No responden :

Tgl wawancara :

Kelurahan :

A. Data Responden

Nama :

Umur :

Jumlah anggota keluarga :

Umur kehamilan : bulan

Hemoglobin (Hb) : mg/dl

B. Sosial Ekonomi

1. Pendapatan keluarga Per Bulan : Rp
 - a. Pendapatan ayah : Rp
 - b. Pendapatan ibu : Rp
 - c. Pendapatan anggota keluarga lain : Rp
 - d. Total pendapatan keluarga keseluruhan : Rp

2. Pendidikan Terakhir :
- Tidak tamat SD/Tidak sekolah
 - Tamat SD
 - Tamat SMP atau sederajat
 - Tamat SMA atau sederajat
 - Akademi atau PT

C. Asupan Tablet Fe

1. Apakah ibu menghabiskan 10 butir tablet Fe dalam 1 bulan ?
- Ya
 - Tidak

Jika tidak, kenapa?

Jawab :

D. Pengetahuan Tentang Anemia

1. Apakah yang dimaksud dengan anemia pada ibu hamil?
- Keadaan dimana Hb dibawah normal (<11 mg/dl)
 - Seseorang mengalami kekurangan cairan tubuh yang mempengaruhi kondisi tubuh
 - Kekurangan berbagai zat gizi yang berdampak pada kesehatan ibu dan janin
 - Kondisi yang kurang sehat karena kurangnya istirahat pada ibu hamil
2. Apakah yang menjadi ciri-ciri anemia ?
- Pusing

- b. Lapar
 - c. Haus
 - d. Muntah
3. Apakah akibat yang dapat ditimbulkan oleh penderita anemia pada ibu hamil?
- a. Kekurangan cairan tubuh
 - b. Pendarahan pada saat melahirkan
 - c. Susah tidur pada malam hari
 - d. Takut pada saat akan melahirkan
4. Apakah kegunaan jika ibu hamil rajin mengonsumsi tablet Fe selama masa kehamilan?
- a. Berguna untuk ibu dan bayi yang dikandungnya tidak mengalami kecacatan pada saat lahir
 - b. Tidak tahu
 - c. Dapat mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil
 - d. Mencegah kelahiran premature
5. Minuman manakah di bawah ini mengandung zat besi dan bermanfaat bagi ibu hamil?
- a. Susu
 - b. Susu campur teh
 - c. Kopi campur susu
 - d. Sirup

6. Apakah dampak yang ditimbulkan terhadap janin yang dikandung jika ibu hamil menderita anemia ?
- Pertumbuhan dan perkembangan janin terhambat
 - Ukuran janin sangat besar sehingga susah untuk melahirkan
 - Janin sering bergerak dan ibu sering mengalami kesakitan
 - Janin mengalami perubahan posisi yang tidak signifikan
7. Apakah manfaat jika ibu hamil cerdas memilih makanan yang beraneka ragam dan mempunyai zat gizi yang cukup?
- Dapat mencegah terjadinya penyakit terhadap bayi saat lahir
 - Dapat mencegah terjadinya anemia selama hamil
 - Supaya makanan yang disediakan beragam dan bergizi
 - Dapat menambah berat badan bayi selama dalam kandungan
8. Dimanakah ibu biasa mendengarkan penyuluhan tentang anemia?
- Di sekolah
 - Di pasar
 - Di puskesmas
 - Di rumah
9. Bagaimanakah cara mencegah anemia agar tidak terjadi pada ibu hamil selama masa kehamilannya?
- Meningkatkan konsumsi zat besi dari makanan
 - Mengonsumsi sayuran segar
 - Menghindari makanan yang mengandung pemanis buatan dan pengawet

d. Mengonsumsi makanan dalam porsi besar

10. Apakah ibu mengetahui jenis makanan dan minuman yang mengandung zat besi ?

a. Ya

b. Tidak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
konsumsitafetfe * anemia1	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%

Konsumsi tablet fe * anemia1 Crosstabulation

			anemia1		Total
			anemia	tidak anemia	
konsumsitafetfe	kurang	Count	9	2	11
		% within konsumsitafetfe	81.8%	18.2%	100.0%
	cukup	Count	8	21	29
		% within konsumsitafetfe	27.6%	72.4%	100.0%
Total		Count	17	23	40
		% within konsumsitafetfe	42.5%	57.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.598 ^a	1	.002		
Continuity Correction ^b	7.507	1	.006		
Likelihood Ratio	9.955	1	.002		
Fisher's Exact Test				.003	.003
Linear-by-Linear Association	9.358	1	.002		
N of Valid Cases ^b	40				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,68.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
tingkatpendapatan * anemia1	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%

Tingkat pendapatan * anemia1 Crosstabulation

			anemia1		Total
			anemia	tidak anemia	
tingkatpendapatan	kurang	Count	13	16	29
		% within tingkatpendapatan	44.8%	55.2%	100.0%
	cukup	Count	4	7	11
		% within tingkatpendapatan	36.4%	63.6%	100.0%
Total		Count	17	23	40
		% within tingkatpendapatan	42.5%	57.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.234 ^a	1	.629		
Continuity Correction ^b	.016	1	.900		
Likelihood Ratio	.236	1	.627		
Fisher's Exact Test				.730	.454
Linear-by-Linear Association	.228	1	.633		
N of Valid Cases ^b	40				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,68.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
tingkatpendidikan * anemia1	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%

Tingkat pendidikan * anemia1 Crosstabulation

			anemia1		Total
			anemia	tidak anemia	
tingkatpendidikan	kurang	Count	5	10	15
		% within tingkatpendidikan	33.3%	66.7%	100.0%
	cukup	Count	12	13	25
		% within tingkatpendidikan	48.0%	52.0%	100.0%
Total		Count	17	23	40
		% within tingkatpendidikan	42.5%	57.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.825 ^a	1	.364		
Continuity Correction ^b	.334	1	.563		
Likelihood Ratio	.836	1	.361		
Fisher's Exact Test				.512	.283
Linear-by-Linear Association	.805	1	.370		
N of Valid Cases ^b	40				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,38.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstabs pengetahuan dan kadar HB (anemia/tidak anemia)

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
tingkatpengetahuan * anemia1	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%

Tingkat pengetahuan * anemia1 Crosstabulation

			anemia1		Total
			anemia	tidak anemia	
tingkatpengetahuan	kurang	Count	27	2	29
		% within tingkatpengetahuan	93.1%	6.9%	100.0%
	cukup	Count	4	7	11
		% within tingkatpengetahuan	36.4%	63.6%	100.0%
Total		Count	31	9	40
		% within tingkatpengetahuan	77.5%	22.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14.724 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	11.650	1	.001		
Likelihood Ratio	13.677	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	14.356	1	.000		
N of Valid Cases ^b	40				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,48.

b. Computed only for a 2x2 table

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama : ELFIRA JUNIANTI. Z
- Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 30 Juni 1990
- Suku : Bugis
- Agama : Islam
- Alamat : BTN Taman Kalimata B /13 Gowa
- E-mail / Facebook : vhira_ kesmas@yahoo.co.id
- Riwayat Pendidikan :
1. TK IDHATA I Bulukumba, tamat tahun 1996
 2. SD Negeri 6 Tanah Kongkong Bulukumba, tamat tahun 2002
 3. SLTP Negeri 2 Bulukumba, tamat tahun 2005
 4. SMA Negeri 1 Gangking Bulukumba, tamat tahun 2008
 5. Mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2008 - 2012).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R