

**GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG KANKER  
SERVIKS DI SMA NEGERI 15 MAKASSAR TAHUN 2013**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Ahli Madya Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Oleh**  
**FADLIYATUL FAJRI**  
**NIM. 70400007012**  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

## Abstrak

**FADLIYATUL FAJRI, 70400007012**

**Pembimbing: dr. Nadyah, S.ked**

**“Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Kanker Serviks di SMA Negeri 15 Makassar 2010”**

**Xii+VI BAB+72 Halaman+16 Gambar+2 Tabel**

Berdasarkan data WHO, jumlah pengidap kanker serviks di dunia mencapai 2,2 juta jiwa per tahun. Di mana Departemen Kesehatan RI menyatakan sampai saat ini terdapat rata-rata 100 kasus kanker serviks setiap 100 ribu penduduk Indonesia per tahun. Sementara Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (2009) menyatakan kasus kanker serviks sebanyak 97 di rumah sakit dan 177 di puskesmas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap remaja tentang penyakit kanker serviks. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptis dengan jumlah populasi 345 dan dapatkan 179 sampel yang dipilih secara purposive sampling serta pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Dari penelitian diperoleh 67 responden (37,4%) yang memiliki pengetahuan cukup dan 112 responden (62,6%) yang memiliki pengetahuan kurang tentang kanker serviks. Sedangkan 130 responden (72,6) mampu menyikapi fenomena kanker serviks secara positif dan 49 responden (27,4%) yang bersikap negatif terhadap kanker serviks.

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja di SMA Negeri 15 Makassar memiliki pengetahuan cukup tentang kanker serviks dan mampu menyikapi fenomena kanker serviks dengan benar dan tepat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kanker serviks adalah satu dari sekian kanker yang paling menakutkan bagi wanita. Angka harapan hidup yang minim dan mahalnya pengobatan bila terserang, membuat kanker serviks kian terasa mengerikan bagi siapa pun. Mengingat tingkat bahaya dan mahalnya biaya mengatasi derita kanker serviks inilah, kita perlu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang penyakit ini. (Nurcahyo 2010, 41)

Di dunia angka kematian yang disebabkan oleh penyakit kanker serviks masih ada di bawah angka kematian yang disebabkan oleh kanker paru-paru. Hal ini mungkin karena penderitanya hanya pada wanita saja. Namun demikian, kanker ini tetap menjadi perhatian dunia sebab angka kematian karena kanker ini meningkat tajam. Menurut penelitian di Australia dilaporkan setidaknya ada 85 penderita kanker serviks dan 40 pasiennya meninggal dunia. (Sukaca 2009, 25).

Untuk seluruh dunia, jumlah pengidap penyakit pembunuh ini mencapai 2,2 juta jiwa per tahun. Kanker serviks menduduki urutan pertama dalam jumlah kasus kanker di negara-negara berkembang, sementara di negara maju hanya menempati urutan ke-10. Ini berarti, tingkat pemahaman dan informasi mengenai penyakit ini cukup penting dalam upaya mengurangi angka kematian yang diakibatkannya. (Nurcahyo 2010, 42-43)

Kanker serviks merupakan jenis kanker yang paling banyak pengidapnya di Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan negara kedua di dunia setelah Cina yang memiliki pengidap kanker serviks terbanyak. Padahal kanker ini termasuk kanker yang mudah dideteksi secara dini dan bisa dicegah/diobati sebelum berkembang lebih lanjut. (Ghofar 2009, 100)

Departemen Kesehatan RI menyatakan bahwa sampai saat ini terdapat rata-rata 100 kasus kanker serviks setiap 100 ribu penduduk Indonesia per tahun. Sementara data Yayasan Kanker Indonesia (2007) menunjukkan angka yang lebih hebat, 500 ribu wanita di Indonesia terdeteksi mengidap kanker serviks setiap tahun dan separuhnya meninggal akibat kanker tersebut. (Nurchahyo 2010, 42)

Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan kanker yang paling banyak mendera masyarakat adalah kanker payudara dan kanker leher rahim (serviks). Data Dinas menyebutkan penderita kanker serviks dan payudara terbesar ada di kota Makassar, kabupaten Gowa, Wajo, Bone, dan Luwu Utara.

Kasus kanker payudara yang tercatat sebanyak 203 kasus di rumah sakit, dan 316 di puskesmas. Lalu kanker serviks 109 kasus di rumah sakit, dan 275 kasus di puskesmas. Sedangkan pada 2009 jumlah kasus kanker payudara 252 di rumah sakit dan 600 di puskesmas. Sedangkan kasus kanker serviks 97 di rumah sakit dan 177 di puskesmas. (<http://www.tempointeraktif.com>)

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di atas maka tidak menutup kemungkinan jumlah penderita kanker serviks akan terus bertambah. Maka sangat diperlukan pengetahuan tentang kanker serviks secara dini terutama pengenalan

tentang kanker serviks pada usia remaja agar dapat meminimalisasi faktor resiko terjadinya kanker tersebut.

Oleh karena itu, perubahan fisik yakni kematangan seksual pada remaja haruslah dibarengi dengan bekal pengetahuan kesehatan reproduksi. Sehingga, hal-hal yang berkaitan dengan gangguan sistem reproduksi terutama kanker serviks dapat dicegah sehingga dapat menekan angka morbiditas dan mortalitas akibat kanker tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, adapun rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis antara lain sebagai berikut:

“Bagaimana gambaran pengetahuan dan sikap remaja tentang kanker serviks di SMA Negeri 15 Makassar?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan dan sikap remaja tentang kanker serviks di SMA Negeri 15 Makassar.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Memperoleh informasi tentang pengetahuan remaja tentang kanker serviks di SMA Negeri 15 Makassar.
- b. Memperoleh informasi tentang sikap remaja tentang kanker serviks di SMA Negeri 15 Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait dalam penentuan arah kebijakan dalam menentukan prioritas perencanaan program pendidikan kesehatan.

### 2. Manfaat Ilmiah

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kebidanan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti lain selanjutnya.

### 3. Manfaat bagi Peneliti

Sebagai aplikasi ilmu dan pengalaman berharga serta dapat menambah wawasan ilmiah dan pengetahuan penulis tentang pendidikan kesehatan.

## **E. Sistematika Penulisan**

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

#### B. Perumusan Masalah

#### C. Tujuan Penelitian

##### 1. Tujuan Umum

##### 2. Tujuan Khusus

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
2. Manfaat Ilmiah
3. Manfaat bagi Peneliti

#### E. Sistematika Penulisan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan

1. Definisi Pengetahuan
2. Tingkatan Pengetahuan

#### B. Tinjauan Umum tentang Sikap

1. Definisi Pengetahuan
2. Tingkatan Sikap

#### C. Tinjauan Umum tentang Remaja

1. Definsi Remaja
2. Perkembangan Remaja
3. Perubahan Psikologi Remaja

#### D. Tinjauan Umum tentang Sistem Reproduksi Wanita

1. Anatomi Genitalia Interna
2. Anatomi Genitalia Eksterna

#### E. Tinjauan Khusus tentang Kanker Serviks

1. Definisi Kanker Serviks
2. Faktor yang Mempengaruhi Kanker serviks
3. Epidemiologi Kanker Serviks

4. Mendeteksi Gejala Kanker Serviks
5. Tingkat Perkembangan Kanker Serviks
6. Pemeriksaan Kanker Serviks
7. Pengobatan Kanker Serviks
8. Kanker Serviks dan Kehamilan
9. Pencegahan Kanker Serviks

F. Tinjauan Islam tentang Kanker Serviks

**BAB III KERANGKA KONSEP**

- A. Dasar Penelitian Variabel Penelitian
- B. Skema Kerangka Konsep
- C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif
  1. Pengetahuan
  2. Sikap
  3. Kanker Serviks

**BAB IV METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Populasi dan Sampel
- D. Teknik Pengambilan Sampel
- E. Metode Pengumpulan Data
- F. Metode Pengolahan dan Analisis Data
- G. Penyajian Data
- H. Etika Penelitian



## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

## BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan**

##### **1. Definisi Pengetahuan**

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “tahu”, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra, yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoatmodjo 2005, 127-128)

##### **2. Tingkat Pengetahuan**

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yakni:

a) Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, “tahu” ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b) Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan cara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c) Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

d) Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e) Sintesis (Synthesis)

Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan.

f) Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. (Notoatmodjo 2005, 29-30)

## **B. Tinjauan Umum tentang Sikap**

### **1. Definisi Sikap**

Dalam memberikan definisi tentang sikap, di antara para ahli banyak terjadi perbedaan. Terjadinya hal ini karena sudut pandang yang berbeda tentang sikap itu sendiri.

Azwar (2007), menggolongkan definisi sikap dalam tiga kerangka pemikiran. Pertama, kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood. Menurut mereka sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Berarti sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (unfavorable) pada objek tersebut.

Kedua, kerangka pemikiran ini diwakili oleh ahli seperti Chief, Bogardus, LaPierre, Meard dan Gordon Allport. Menurut kelompok pemikiran ini sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

Ketiga, kelompok pemikiran ini adalah kelompok yang berorientasi pada skema triadic (triadic schema). Menurut pemikiran ini suatu sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi di dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek. (Azwar 2007, 4-5)

Sedangkan menurut Bruno (1987), sikap (attitude) adalah kecenderungan yang relative menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. (Syah 2006, 123)

## 2. Tingkatan Sikap

Seperti halnya pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tindakan yakni:

### a. Menerima (receiving)

Orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek)

### b. Merespon (responding)

Memberikan jawaban apabila ditanya, menyelesaikan dan mengerjakan tugas yang diberikan adalah suatu tindakan dari sikap.

### c. Menghargai (valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

### d. Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah merupakan sikap yang paling tinggi.

(<http://en.wikipedia.org/wiki>)

## C. Tinjauan Umum tentang Remaja

### 1. Definisi Remaja

Remaja sebagai periode tertentu dari kehidupan merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam kajian psikologi. Di negara-negara Barat, istilah remaja dikenal dengan “adolescence” yang berasal dari kata dalam bahasa Latin “adolescere” (kata bendanya *adolescencia* = remaja), yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. (Desmita 2007, 189)

Menurut WHO (badan PBB untuk kesehatan dunia) batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi remaja yang digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10 sampai 19 tahun dan belum kawin. Sementara itu, menurut BKKBN (Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi) batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun. ([www.ceria.bkkbn.go.id](http://www.ceria.bkkbn.go.id))

Secara umum masa remaja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: (Konopka, 1973 dalam Pikunas, 1976; Ingersoll 1989)

a. Masa remaja awal (12-15 tahun)

Pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebayanya.

b. Masa remaja pertengahan (15-18 tahun)

Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri (self-directed). Pada masa ini remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkait dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai. Selain itu penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi individu.

c. Masa remaja akhir (19-22 tahun)

Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identity*. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa, juga menjadi ciri dari tahap ini. (Agustiani 2006, 29)

## 2. Perkembangan Remaja

Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Pada masa ini individu mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Perubahan-perubahan tersebut secara umum sebagai berikut:

a. Perubahan ciri-ciri seks primer

Ciri-ciri seks primer menunjuk pada organ tubuh yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Ciri-ciri seks primer ini berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bagi anak laki-laki, ciri-ciri seks primer yang sangat penting ditunjukkan dengan pertumbuhan yang cepat dari batang kemaluan (penis) dan kantung kemaluan (scrotum), yang mulai terjadi pada usia sekitar 12 tahun dan berlangsung sekitar 5 tahun untuk penis dan 7 tahun untuk skrotum.

Sementara itu, pada anak perempuan, perubahan ciri-ciri seks primer ditandai dengan munculnya periode menstruasi, yang disebut dengan menarche, yaitu menstruasi yang pertama kali dialami oleh seorang gadis. (Desmita 2007, 192-193)

b. Perubahan ciri-ciri seks sekunder

Ciri-ciri seks sekunder adalah tanda-tanda jasmaniah yang tidak langsung berhubungan dengan proses reproduksi, namun merupakan tanda-tanda yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di antara tanda-tanda jasmaniah yang terlihat pada laki-laki adalah tumbuhnya kumis dan janggut, jakun, bahu dan dada melebar, suara berat, tumbuh bulu di ketiak, di dada, di kaki dan di lengan, dan di sekitar kemaluan, serta otot-otot menjadi kuat. Sedangkan pada perempuan terlihat payudara dan pinggul yang membesar, suara menjadi halus, tubuh bulu di ketiak dan disekitar kemaluan. (Desmita 2007, 193-194)



### 3. Perubahan Psikologi Remaja

Stanley Hall mengemukakan bahwa masa remaja merupakan masa penuh gejolak dan emosi dan ketidak seimbangan, yang tercakup dalam “strom dan stress”. Dengan demikian remaja mudah terkena pengaruh oleh lingkungan. Remaja diombang-ambingkan oleh munculnya:


- a. Kekecewaan dan penderitaan
- b. Meningkatnya konflik, pertentangan-pertentangan dan krisis penyesuaian
- c. Impian dan khayalan
- d. Pacaran dan percintaan
- e. Keterasingan dari kehidupan dewasa dan norma kebudayaa. (Singgih 2008, 205)

Selain itu, beberapa tugas perkembangan bagi remaja adalah:

- a. Menerima keadaan fisiknya
- b. Memperoleh kebebasan emosional
- c. Mampu bergaul
- d. Menemukan model untuk identifikasi
- e. Mengetahui dan menerima kemampuan sendiri
- f. Memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma
- g. Meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian kekanak-kanakan. (Singgih 2008, 207)

## D. Tinjauan Umum tentang Sistem Reproduksi Wanita

### 1. Anatomi Genitalia Eksterna



**Gambar 1 Genitalia Eksterna**

**Sumber: Atlas Anatomi**

a. Mons veneris

Mons veneris adalah bagian yang menonjol di atas simfisis dan pada wanita dewasa ditutup oleh rambut kemaluan. Pertumbuhan rambut kemaluan ini tergantung dari suku bangsa dan juga dari jenis kelamin. Pada wanita umumnya batas atasnya melintang sampai pinggir atas simfisis, sedangkan ke bawah sampai di sekitar anus dan paha.

b. Labia mayora

Labia mayora atau bibir besar terdiri atas bagian kanan dan kiri, lonjong mengecil ke bawah, terisi oleh jaringan lemak yang serupa dengan yang ada di mons veneris. Ke bawah dan ke belakang kedua labia mayora bertemu dan membentuk kommisura posterior.

c. Labia minora

Labia minora atau bibir kecil adalah suatu lipatan tipis dari kulit sebelah dalam bibir besar. Ke depan kedua bibir kecil bertemu dan membentuk di atas klitoris preputium klitoridis, dan di bawah klitoris frenulum klitoridis. Ke belakang kedua bibir kecil juga bersatu dan membentuk fossa navikulare.

d. Klitoris

Klitoris kira-kira sebesar kacang ijo, tertutup oleh preputium klitoridis, dan terdiri atas glans klitoridis, korpus klitoridis, dan dua krura yang menggantungkan klitoris ke osis pubis. Glands klitoridis terdiri atas jaringan yang dapat mengembang, penuh dengan urat saraf, hingga amat sensitif.

e. Vulva

Vulva berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari muka ke belakang dan dibatasi oleh klitoris, kanan dan kiri oleh kedua bibir kecil, dan di belakang oleh perineum.

f. Bulbus vestibule sinistra et dekstra

Terletak di bawah selaput lender vulva, dekat ramus osis pubis. Besarnya 3-4 cm panjang, 1-2 cm lebar, dan 0,5-1 cm tebal. Mengandung banyak pembuluh darah.

g. Introitus vagina

Introitus vagina mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Pada seorang virgo selalu dilindungi oleh labia minora; jika bibir kecil

ini dibuka, maka barulah dapat dilihat, ditutupi oleh selaput darah (himen).

h. Perineum

Perineum terletak antara vulva dan anus, panjangnya rata-rata 4 cm. (Sarwono 2005, 31-33)

## 2. Anatomi Genitalia Interna

a. Vagina

Setelah melewati introitus vagina, kita temukan liang kemaluan yang merupakan suatu penghubung antara introitus dan uterus. Arahnya sejajar dengan arah dari pinggir atas simfisis ke promontorium. Dinding depan dan belakang vagina berdekatan satu sama lain, masing-masing panjangnya 6,5 cm dan 9 cm. (Sarwono 2005, 34)

b. Serviks

Leher rahim merupakan bagian dari alat reproduksi yang sering ditumbuhi kanker. Leher rahim terletak di bagian bawah rahim. Tugasnya adalah membantu jalannya sperma dari vagina menuju rahim. Leher rahim mengeluarkan jenis lendir tertentu dengan tugas yang berbeda-beda. Jenis-jenis lendir itu berada dalam daerah yang berbeda-beda.

Jenis-jenis lendir yang ada di dalam leher rahim adalah:

1) Lendir daerah L, lendir ini menyebabkan rasa basah serta lengket.

Tugasnya menghancurkan sperma yang bermutu rendah dan

membentuk jaringan untuk mendukung daerah daerah lendir S dan P.

- 2) Lendir daerah G, Lendir gestagenic yang begitu pekat dan tidak dapat ditembus. Terbentuk di bagian bawah leher rahim. Lendir ini menghalangi sperma masuk ke dalam leher rahim. Tugasnya melindungi system reproduksi wanita dari infeksi.
- 3) Lendir daerah F, Lendir daerah F berasal dari sel-sel yang tersebar di sepanjang leher rahim dan belum diketahui fungsinya.
- 4) Bulir-bulir Z, Enzim dalam bulir-bulir Z ini bergabung dengan lendir P dan mempunyai tugas yaitu menghasilkan sifat zat cair
- 5) Lendir daerah X, Lendir ini menimbulkan rasa basah dan licin pada vulva. Tugasnya membentuk benang-benang yang menjadi saluran transportasi bagi sel sperma.
- 6) Lendir daerah P, Pada lendir P terdiri beberapa sub jenis lendir yaitu;
  - a) Lendir P2, dapat muncul pada masa subur dan mempunyai peran mencairkan lendir.
  - b) Lendir P6, Kebanyakan terdapat di bagian atas leher rahim, tugasnya membantu sperma serta menimbulkan rasa basah dan licin pada vulva. (Sukaca 2009, 16-17)

c. Uterus

Uterus berbentuk seperti buah advokat atau buah peer yang sedikit gepeng kea rah muka belakang: ukurannya sebesar telur ayam dan


mempunyai rongga. Dindingnya terdiri atas otot-otot polos. Ukuran panjang uterus adalah 7-7,5 cm, lebar di atas 5,25 cm, tebal 2,5 cm, dan tebal dinding 1,25 cm. Uterus terdiri atas fundus uteri, korpus uteri, dan serviks uteri. (Sarwono 2005, 36)

d. Tuba Fallopi

Tuba fallopii terdiri atas: 1) pars interstisialis, bagian yang terdapat di dinding uterus; 2) pars istmika, merupakan bagian medial tuba yang sempit seluruhnya; 3) pars ampullaris, bagian yang berbentuk sebagai saluran agak lebar, tempat kosepsi terjadi; 4) infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka ke arah abdomen dan mempunyai fimbria. (Sarwono 2005, 41)

e. Ovarium

Wanita pada umumnya mempunyai 2 indung telur kanan dan kiri, yang dengan mesovarium menggantung bagian belakang ligamentum latum, kiri dan kanan. Ovarium adalah kurang lebih sebesar ibu jari tangan dengan panjang kira-kira 4 cm, lebar dan tebal kira-kira 1,5 cm. Struktur ovarium terdiri dari: 1) korteks di sebelah luar yang diliputi oleh epithelium germinativum yang berbentuk kubik, dan di dalam terdiri dari stroma serta folikel-folikel primordial; dan 2) medulla di sebelah dalam korteks tempat terdapatnya stroma dengan pembuluh-pembuluh darah, serabut-serabut saraf, dan sedikit otot polos. (Sarwono 2005, 41-42)



**Gambar 2 Anatomi Genitalia Interna**

**Sumber: Atlas Anatomi**

## **E. Tinjauan Umum tentang Kanker Serviks**

### **1. Definisi Kanker Serviks**

Kanker di uterus atau rahim sebenarnya adalah kanker pada badan rahim, yang sebenarnya mempunyai perbedaan jaringan dengan leher rahim. Dimana kanker serviks memiliki definisi, di antaranya:

- a. Kanker serviks adalah suatu proses keganasan yang terjadi pada serviks, sehingga jaringan di sekitarnya tidak dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. (Sukaca 2009, 24-25)
- b. Kanker serviks atau sering dikenal dengan kanker mulut rahim/kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada servik uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina). (<http://www.abeindo.com>)

- c. Kanker rahim disebut juga kanker serviks, atau kanker leher rahim, atau kanker mulut rahim menyerang bagian mulut/leher rahim. (Nurchahyo 2010, 41)
- d. Karsinoma serviks uteri merupakan kelanjutan dari lesi prakanker serviks uteri atau CIN, dengan perkembangan penyakit yang lebih cepat. (Manuaba 2008, 316)
- e. Kanker leher rahim atau disebut juga kanker serviks adalah sejenis kanker yang 99,7% disebabkan oleh *human papilloma virus* (HPV) onkogenik, yang menyerang leher rahim. (www.wikipedia.com)

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Kanker Serviks

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya kanker leher rahim. HPV adalah virus yang “menjadi pelaku” merusak sel, tetapi terdapat faktor-faktor pendukung yang memunculkan peluang bagi virus ini. Braid (1991) dalam Bertiani E. Sukaca (2009) merinci 3 golongan faktor pemicunya, yaitu faktor individu, faktor pasangan dan faktor risiko.

### a. Faktor Individu

#### 1) HPV (Human Papilloma Virus)

HPV disebut sebagai virus yang menyebabkan 97% kasus *Karsinoma Skuamosa*. Terdapat lebih dari 138 varian HPV, namun hanya 4 tipe yang telah diketahui secara positif mengganggu wilayah alat kelamin manusia. HPV 16 dan HPV 18 dinyatakan positif menyebabkan hampir 70% kasus kanker leher rahim.



Sedangkan dua varian lain, yaitu HPV 6 dan HPV 11 adalah penyebab munculnya kutil kelamin yang berpotensi berkembang menjadi tumor.

## 2) Faktor Etiologik


Pada kenyataannya terdapat ribuan jenis virus yang berperan dalam proses kemunculan kanker rahim. Ribuan di antaranya terdapat jenis virus DNA, yaitu virus dengan kemampuan menyusupkan susunan asam nukleat ke dalam pita DNA sehingga merusak informasi dan perintah DNA.

Faktor etiologik yang perlu mendapat perhatian adalah infeksi *Human Papilloma Virus* (HPV). HPV tipe 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56 dan 58 sering ditemukan pada kanker dan lesi prakanker. HPV adalah DNA virus yang menimbulkan proliferasi pada permukaan epidermal dan mukosa. Infeksi *virus papilloma* sering terdapat pada wanita yang aktif secara seksual. (Evidence Base 2007, 6)

## 3) Perubahan Fisiologis pada Jaringan Epitel

Ada dua jenis epitel pada serviks, yaitu epitel skuamosa dan kolumnar. Di antara keduanya terdapat lapisan penghubung yang disebut Sambungan Skuamosa-Kolumnar (SSK). Pada kondisi semacam pubertas atau lainnya di mana terdapat peningkatan aktivitas seksual, posisi SSK dapat bergeser. Melalui mekanisme perubahan pH dan sebagainya, jaringan akan membentuk lapisan

skuamosa baru sehingga juga muncul SSK baru. pH yang rendah dan signifikan akan terjebak SSK asli dan SSK baru. Dalam waktu tertentu, ini dapat mendukung proses kerusakan (mutasi) sel di jaringan epitel tersebut.



**Gambar 3 SSK**

**Sumber: Gawat Darurat Obstetri Ginekologi & Obsterti  
Ginekologi Sosial untuk Profesi Bidan**

4) Herpes Simpleks Virus (HVS)

Varian HVS2 adalah jenis virus yang dikenal berperan dalam pembentukan sel kanker, meski sebenarnya bukan penyebab utama, tetapi hanya faktor risiko yang mendukung atau memicu kerusakan sel saja, sebagaimana zat kimia tertentu.

5) Merokok

Wanita perokok memiliki peluang dua kali lebih besar untuk mengidap kanker rahim dibanding wanita yang tidak merokok. Asap tembakau yang dihirup dari asap rokok mengandung *Polycyclic aromatic hydrocarbon heterocyclic nitrozamines*. Zat

ini akan turut diedarkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh. Para ahli telah menemukan fakta bahwa kandungan asap tembakau mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi virus. Bahkan pada laki-laki yang mengidap HPV, senyawa nikotin akan mempercepat reproduksi dan penggandaan sel HPV dalam tubuhnya. Kandungan nikotin di dalam lendir serviks meningkatkan daya reproduksi sel *Squamous intraepithelial lesions*, jenis sel yang dikenal berpotensi termutasi menjadi sel kanker ganas.

6) Pemakaian Celana Ketat

Faktor ini memegang tidak secara langsung memunculkan sel kanker. Seperti diketahui, di daerah vulva dan vagina terdapat banyak sekali mikroorganisme yang sebagian kecilnya berpotensi infeksi. Pemakaian celana ketat dapat meningkatkan suhu vagina sehingga akan merusak daya hidup sebagian mikroorganisme, dan mendukung perkembangan sebagian mikroorganisme lainnya. Akhirnya, pertumbuhan mikroorganisme menjadi tidak seimbang. Kondisi tersebut memungkinkan perkembangan mikroorganisme yang justru menyebabkan terjadinya infeksi.

7) Umur

Peningkatan usia seseorang diikuti oleh penurunan kinerja organ-organ dan kekebalan tubuhnya. Dan itu membuatnya relatif mudah

terserang berbagai infeksi. Kanker rahim berpotensi paling besar pada usia antara 35-55 tahun.

#### 8) Paritas

Paritas adalah kemampuan wanita untuk melahirkan secara normal. Pada proses persalinan normal, bayi bergerak melalui mulut rahim dan ada kemungkinan sedikit merusak jaringan epitel di tempat tersebut. Pada kasus wanita yang melahirkan lebih dari dua kali dan dengan jarak yang terlalu dekat. Kerusakan jaringan epitel ini berkembang ke arah pertumbuhan sel abnormal yang berpotensi ganas.

#### b. Faktor Pasangan

##### 1) Usia Berhubungan Seks Pertama Kali

Usia ketika wanita mulai melakukan hubungan seks secara aktif juga menjadi salah satu faktor pemicu kanker rahim. Pada dasarnya, organ-organ seksual wanita mengalami perkembangan yang lambat dan harus berada dalam kondisi matang untuk bisa menjalankan tugasnya. Meskipun secara fungsional rahim wanita dinyatakan sudah berfungsi sejak mengalami menstruasi (9-15 tahun), namun kesiapan total umumnya baru tercapai pada usia sekitar 20 tahun, di mana secara mental, wanita juga sudah siap untuk berhubungan seksual secara sadar.

Hubungan seksual yang dilakukan terlalu dini dapat berpengaruh pada kerusakan jaringan epitel serviks atau dinding rongga vagina.

Kondisi tersebut dapat bertambah buruk mengarah pada kelainan sel dan pertumbuhan abnormal. Wanita yang melakukan hubungan seksual secara aktif sejak sebelum 17 tahun, memiliki potensi 3 kali lebih besar untuk mengidap kanker rahim dibanding wanita yang tidak melakukan hubungan seksual pada usia tersebut.

2) Multipartner Sex (Berganti-ganti pasangan seks)

Faktor penyebab yang satu ini memiliki potensi penularan yang tinggi. Virus HPV dapat ditularkan melalui hubungan seksual baik normal maupun oral. Oleh karenanya, perilaku ini menjadi salah satu faktor penyebar kasus kanker serviks. Pria yang berhubungan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat menularkan virus HPV kepada istrinya di rumah.

c. Faktor Risiko

1) Penurunan Sistem Kekebalan Tubuh

Tubuh kita memiliki serangkaian system kekebalan yang secara otomatis berusaha mengatasi gangguan-gangguan infeksi dan pertumbuhan sel abnormal. Namun dalam kondisi tertentu, system kekebalan ini dapat melemah sehingga pengendalian gangguannya pun melemah. Kondisi semacam ini terdapat pada wanita yang menjalani operasi gagal ginjal, atau pengiap virus HIV. Dengan melemahnya sistem kekebalan, maka perkembangan infeksi tidak terhambat, dan pertumbuhan sel abnormal terus meningkat hingga mencapai tahap invasif (menyebarkan kemana-mana).

## 2) Makanan

Faktor risiko makanan berlaku untuk hampir semua jenis kanker. Seperti telah dikemukakan oleh Prof. Li Peiwen, makanan berupa gorengan berpotensi menimbulkan senyawa karsinogenik. Pada makanan yang mengandung banyak karbohidrat, ketika digoreng, maka karbohidratnya akan terurai dan bereaksi dengan asam amino. Hasil persenyawaannya bersifat karsinogen, yakni berpotensi *dysplasia*.

## 3) Pemakaian Pil KB

Pemakaian pil KB secara terus-menerus berpotensi menimbulkan kanker serviks. Pada pemakaian lebih dari lima tahun, risiko ini menetap menjadi 2 kali lebih besar disbanding wanita yang tidak memakai pil KB.

Pil KB menghambat ovulasi dengan cara menjaga kekentalan lendir mulut rahim agar tidak mampu ditembus oleh luncuran sperma. Pemakaian pil KB ini akan menghentikan perdarahan dan menstruasi, bahkan berpotensi membuat penggunaanya mengalami pembekuan darah. WHO menyatakan pemakaian pil KB mengandung resiko kanker rahim bagi wanita sebesar 19,1 kali lebih besar, dan meningkat terus sesuai lama pemakaiannya.

## 4) Ras

Pola kehidupan sosioekonomi tiap-tiap ras dapat dapat berpengaruh terhadap peningkatan risiko mengidap kanker rahim.

Hasil penelitian menunjukkan ras Afrika-Amerika paling berisiko tinggi mengidap kanker rahim. Sementara Amerika-Hispanik cenderung di bawahnya. Adapun ras Asia-Amerika relatif sama dengan Amerika-Hispanik.

5) Polusi Udara

Polusi udara baik yang berasal dari asap rokok, emisi kendaraan, pabrik dan sebagainya memiliki banyak kandungan senyawa karsinogen yang berpotensi memunculkan sel kanker.

6) Pemakaian obat DES

DES (Diethylstilbestrol) adalah obat penguat kehamilan yang dikonsumsi untuk mencegah keguguran. Obat ini sekarang sudah tidak populer. Para ahli menyimpulkan DES berpotensi menimbulkan sel kanker di wilayah serviks.

7) Pemakaian Antiseptik di Vagina

Wanita modern ingin selalu tampil sempurna termasuk di wilayah pribadinya. Kini banyak sekali produk antiseptik khusus vagina yang biasa membuat vagina lebih bersih dan selalu wangi. Namun pemakaian antiseptik yang terlalu sering tidak baik. Antiseptik tersebut dapat membunuh bakteri di sekitar vagina, termasuk bakteri yang menguntungkan. Dan apabila digunakan dalam dosis yang terlalu sering, maka zat antiseptik tersebut dapat mengakibatkan iritasi pada kulit bibir vagina yang sangat lembut.

Iritasi ini biasa berkembang menjadi sel abnormal yang berpotensi displasia. (Nurchahyo 2010, 46-54)

### 3. Epidemiologi Kanker Serviks

Hubungan antara aktivitas seksual dengan kanker serviks pertama kali diketahui 150 tahun yang lalu ketika ditemukan bahwa penyakit ini jarang terjadi pada biarawati dan banyak terjadi pada wanita tuna susila. Data epidemiologis berikutnya telah mengidentifikasi bahwa onset aktivitas seksual pada usia remaja dan pasangan seksual multiple merupakan tanda-tanda risiko tinggi untuk kanker serviks. Insidensi penyakit ini lebih tinggi pada wanita berpenghasilan rendah namun pengaruh dari faktor ini tidak terlepas dari aktivitas seksual yang dimulai saat usia dini dan pasangan seksual multiple. Merokok merupakan faktor risiko bebas pada kanker serviks. Tanda-tanda dari pria dengan risiko tinggi telah diketahui; pria yang memiliki pasangan seksual sebelumnya yang menderita kanker serviks atau pria yang menderita kanker penis akan meningkatkan risiko pasangan seksual.

Dan data epidemiologis yang menunjukkan bahwa kanker serviks memiliki sifat seperti penyakit menular seksual merangsang penelitian terhadap agen-agen yang berpotensi sebagai penyebab. Sebenarnya semua yang dapat ditemukan di dalam atau diletakkan di dalam, saluran genitalia wanita dapat menjadi agen yang ditularkan melalui hubungan seks. Kandidat yang paling sering menjadi penyebab adalah human papilloma virus (HPV), Walaupun data epidemiologis yang lebih baru



menunjukkan bahwa infeksi HPV saja tidak cukup. Sementara sebanyak 85% kanker serviks memiliki risiko tinggi terhadap HPV, prevalensi infeksi HPV saja pada kelompok kontrol yang tidak mengalami neoplasma serviks masih sangat tinggi. (Heffner & Schust 2006, 94)

#### **4. Mendeteksi Gejala Kanker Rahim**

Pada fase sebelum terjangkitnya kanker sering penderita tidak mengalami gejala atau tanda yang khas. Namun sering ditemukan gejala-gejala sebagai berikut:

- a. Keluar cairan encer dari vagina (keputihan)
- b. Pendarahan setelah senggama yang kemudian dapat berlanjut menjadi perdarahan yang abnormal
- c. Timbulnya perdarahan setelah menopause
- d. Pada fase invasif dapat keluar cairan berwarna kekuning-kuningan, berbau dan dapat bercampur dengan darah
- e. Timbul gejala-gejala anemia bila terjadi perdarahan kronis
- f. Timbul nyeri panggul (pelvis) atau di perut bagian bawah bila ada radang panggul. Bila nyeri terjadi di daerah pinggang ke bawah, kemungkinan terjadi hidronefrosis. Selain itu, bisa juga timbul nyeri di tempat-tempat lainnya.
- g. Pada stadium lanjut, badan menjadi kurus kering karena kurang gizi, oedema pada kaki, timbul iritasi kandung kencing dan poros usus besar bagian bawah (rectum), terbentuknya fistel vesikovaginal, atau timbul gejala-gejala akibat metastasis jauh. (Sukaca 2009, 71-72)

## 5. Tingkat Perkembangan Kanker Serviks

### a. Cara Penularan HPV

Cara HPV menularkan virusnya dapat dilakukan dengan berbagai jalur yaitu:

#### 1) Melalui jalur seksual

Jalur seksual dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu hubungan intim, kelamin-kelamin, tangan-kelamin. Kebanyakan pria dan wanita yang telah berhubungan intim berisiko terinfeksi HPV, apalagi yang sering berganti pasangan dan kehidupan seksualnya tidak bersih, maka lebih dari 75% pernah terinfeksi HPV.

#### 2) Melalui jalur nonseksual

Penularan jalur nonseksual adalah dengan cara penularan langsung. Misalnya dari ibu ke bayinya pada saat persalinan. Tentu saja ini pada ibu yang telah tertular virus HPV.

#### 3) Tidak melalui kelamin

Penularan tidak melalui kelamin misalnya pakaian dalam, alat-alat kedokteran yang tidak steril (tapi ini sangat kecil kemungkinan).

Bagi orang yang terkena HPV maka hanya dua kemungkinan yaitu:

a) 80% akan sembuh dengan sendirinya oleh sistem kekebalan tubuhnya yang tinggi.

b) 10-20% kemungkinan akan menjadi infeksi yang menetap, yang kemudian berisiko menjadi kanker. (Sukaca 2009, 56-57)

b. Keadaan Sel Prakanker

Lesi berarti kelainan. Tahap paling awal dari pertumbuhan sel kanker serviks adalah lesi *skuomosa intraepitel*. Tahap ini berupa kelainan awal dari sel skuamosa (dinding celah mulut rahim), namun baru sebatas di permukaan *skuomosa* dan dalam area sangat kecil. Kelainan sel ini pun masih sulit dideteksi dan belum menunjukkan gejala apa pun yang dirasakan pengidap. Lesi intraepitel ini dapat hilang oleh sistem kekebalan tubuh, namun dapat juga berkembang terus-menerus meski sangat lambat. (Nurchahyo 2010, 61)



**Gambar 4 Serviks Normal**

**Gambar 5 Displasia**

**Sumber: Panduan Penatalaksanaan Kanker Ginekologi Berdasarkan Evidence Base**

Sel-sel yang tidak normal ini bisa dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu:

1) Lesi tingkat rendah

Lesi tingkat rendah adalah perubahan awal pada ukuran, bentuk dan jumlah sel yang membentuk permukaan serviks. Ada beberapa lesi tingkat rendah hilang dengan sendirinya. Namun ada pula lesi

yang lain tumbuh menjadi lebih besar dan lebih tidak normal. Lesi ini dapat membentuk lesi tingkat tinggi.


Lesi tingkat rendah biasadisebut displasia ringan atau *neoplasia intraepitel servikal 1* (NIS 1). Lesi tingkat rendah lebih sering ditemukan pada wanita yang berusia 25-35 tahun, tetapi juga bisa terjadi pada semua kelompok umur.

2) Lesi tingkat tinggi

Lesi tingkat tinggi adalah sejumlah besar sel prakanker yang tampak sangat berbeda dari sel yang normal. Perubahan pada prakanker ini hanya terjadi pada sel permukaan serviks. Walaupun selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sel-sel tersebut tidak akan menjadi ganas, namun dapat menyusup ke lapisan serviks lebih dalam.


Lesi tingkat tinggi biasa disebut dengan displasia menengah atau displasia berat, NIS 2 atau 3 atau karsinoma in situ. Lesi tingkat tinggi paling sering ditemukan pada wanita yang berusia 30-40 tahun.

Setelah menjalani lesi tingkat rendah dan tingkat tinggi maka sel-sel yang abnormal dapat menyebar ke serviks, jaringan maupun organ lain. Hal itulah yang disebut dengan kanker serviks. (Sukaca 2009, 72-73)



**Gambar 6 Lesi Tingkat Rendah Gambar 7 Lesi Tingkat Tinggi**

**Sumber: Gawat Darurat Obstetri Ginekologi & Obsterti Ginekologi Sosial untuk Profesi Bidan**



**Gambar 8 Perkembangan Sel Kanker**

**Sumber: At a Glance Sistem Reproduksi**

c. Stadium kanker serviks


Perkembangan kanker serviks secara bertahap, tetapi progresif. Proses terjadinya kanker ini dimulai dengan sel yang mengalami mutasi lalu berkembang menjadi sel displastik sehingga terjadi kelainan epitel yang disebut displasia. Dimulai dari dysplasia ringan,

displasia sedang, displasia berat, dan akhirnya menjadi Karsinoma In-Situ (KIS), kemudian berkembang lagi menjadi karsinoma invasif. Tingkat displasia dan KIS dikenal juga sebagai tingkat pra-kanker. Dari displasia menjadi karsinoma In-Situ diperlukan waktu 1-7 tahun, sedangkan Karsinoma In-Situ menjadi invasif berkisar 3-20 tahun. (Sukaca 2009, 27-28)

Tingkat keganasan klinik kanker serviks menurut IFGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) yaitu:

1) Stadium I

Kanker telah tumbuh ke lapisan dalam serviks, namun belum menyebar ke luar area serviks. Pada tahap ini dokter belum mampu melihat kanker tanpa bantuan mikroskop.



**Gambar 9 Stadium I A**


**Gambar 10 Stadium I B**

**Sumber: Cara Cerdas Menghadapi Kanker Serviks**

- a) Stadium IA1 dengan kedalaman < 3 mm, dan luas < 7 mm.
- b) Stadium IA2 dengan kedalaman 3-5 mm, dan luas < 7 mm.
- c) Stadium IB1 dengan luas < 4 cm
- d) Stadium IB2 dengan luas > 4 cm

## 2) Stadium II

Pada stadium ini, perkembangan kanker telah membesar dan sudah mampu dilihat dengan tanpa bantuan mikroskop. Kanker telah melebar ke luar mulut rahim, namun belum sampai ke dinding panggul dan hanya mencapai bagian atas rongga vagina.



**Gambar 11 Stadium II A**


**Gambar 12 Stadium II B**

**Sumber: Cara Cerdas Menghadapi Kanker Serviks**


- a) Stadium IIA, kanker telah mencapai daerah permukaan dinding atas rongga vagina, meski belum masuk ke jaringan lebih dalam.
- b) Stadium IIB, kanker telah menyebar ke daerah dinding vagina dan serviks tetapi belum mencapai dinding panggul.

## 3) Stadium III

Kanker telah meluas ke bagian jaringan lunak vagina dan serviks sepanjang dinding panggul. Pada stadium ini memungkinkan terjadinya hambatan saluran kemih karena terjepit oleh desakan tumor ganas.



Gambar 13 Stadium III A



Gambar 14 Stadium III B


Sumber: Cara Cerdas Menghadapi Kanker Serviks

#### 4) Stadium IV

Ini adalah stadium lanjut dengan tingkat keparahan tinggi.



Gambar 15 Stadium IV A



Gambar 16 Stadium IV B

Sumber: Cara Cerdas Menghadapi Kanker Serviks

- a) Stadium IVA, dimana kanker telah menyebar ke organ terdekat seperti kandung kemih, rectum, atau usus besar
- b) Stadium IVB, kanker menyebar sampai ke organ lain seperti paru-paru atau hati. (Nurcahyo 2010, 62-64)



## 6. Pemeriksaan Kanker Serviks

Ada beberapa cara memeriksakan kanker serviks, diantaranya:

### a. Mendeteksi kanker serviks dengan Pap smear

Wanita yang dianjurkan untuk melakukan tes pap smear biasanya mereka yang tinggi aktivitas seksualnya. Namun tidak menjadi kemungkinan juga wanita yang tidak mengalami aktivitas seksualnya memeriksakan diri. Berikut ini adalah wanita-wanita sasaran tes pap smear:

- 1) Setiap 6-12 bulan untuk wanita yang berusia muda sudah menikah atau belum namun aktivitas seksualnya sangat tinggi.
- 2) Setiap 6-12 bulan untuk wanita yang berganti-ganti pasangan seksual atau pernah menderita infeksi HPV atau kutil kelamin.
- 3) Setiap tahun untuk wanita yang berusia di atas 35 tahun
- 4) Setiap tahun untuk wanita yang memakai pil KB
- 5) Setiap 2-3 tahun untuk wanita yang berusia di atas 35 tahun.
- 6) Pap test setahun sekali bagi wanita antara umur 40-60 tahun dan juga bagi wanita di bawah 20 tahun yang seksual aktif.
- 7) Sesudah 2x pap test (-) dengan interval 3 tahun dengan catatan bahwa wanita resiko tinggi harus lebih sering menjalankan pap test.
- 8) Sesering mungkin jika hasil Pap smear menunjukkan abnormal sesering mungkin setelah penilaian dan pengobatan prakanker maupun kanker serviks.

b. IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat)

Merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin dengan menggunakan asam asetat 3-5%. Alat ini begitu sederhana sebab saat memeriksakannya tidak perlu ke laboratorium dan dapat dilakukan oleh bidan. Namun jika hasilnya positif maka pemeriksaan sebaiknya dilanjutkan dengan pap smear di laboratorium atau gynescopy oleh dokter ahli kandungan.

c. Mendiagnosis serviks dengan kolposkopi

Koloskopi merupakan suatu pemeriksaan untuk melihat permukaan leher rahim. Pemeriksaan ini menggunakan mikroskop berkekuatan rendah yang memperbesar permukaan leher rahim. Perbesarannya dari 10-40 kali dari ukuran normal. Ini dapat membantu mengidentifikasi area permukaan leher rahim yang menunjukkan ketidaknormalan.

d. Vagina inflammation self test card

Vagina inflammation self test card adalah alat pendeteksian yang dapat menjadi "warning sign". Yang ditest dengan alat ini adalah tingkat keasaman (pH), test ini cukup akurat, sebab pada umumnya apabila seorang wanita terkena infeksi, mioma, kista bahkan kanker serviks, kadar pHnya tinggi. Dengan begitu maka melalui tests ini paling tidak wanita dapat mengetahui kondisi vagina mereka secara kasar.

e. Schillentest

Cara kerja pemeriksaan ini adalah:

- 1) Serviks diolesi dengan larutan yodium
- 2) Sel yang sehat warnanya akan berubah menjadi coklat
- 3) Sedangkan sel yang abnormal warnanya menjadi putih atau kuning.
- 4) Jika terkena karsinoma tidak berwarna.

f. Kolpomikroskopi

Kolpomikroskopi adalah pemeriksaan yang bergabung dengan pap smear. Kolpomikroskopi dapat melihat hapusan vagina (Pap Smear) dengan pembesaran sampai 200 kali.

## 7. Pengobatan Kanker Serviks

Pengobatan kanker sangat bervariasi, bergantung pada tahap stadium pada saat penanganannya. Perlu ditekankan pada setiap orang bahwa penanganan kanker tidak selalu harus berakhir di ujung pisau bedah atau sinar laser yang menyakitkan, serta serangkaian kemoterapi yang juga tidak dirasakan. Kanker bisa saja ditangani dengan pengobatan sederhana, atau sedikit penyinaran apabila bisa dideteksi selagi masih dini.

Berikut beberapa uraian singkat mengenai langkah-langkah pengobatan yang lazim dilakukan untuk melawan kanker rahim:

a. Vaksinasi

Vaksin diberikan sebagai pencegah kanker. Namun pada tahap lesi prakanker terutama pada displasia ringan dan sedang, vaksin dapat diberikan sebagai upaya membantu pertahanan tubuh dan membasmi infeksi HPV yang sudah mulai terjadi. Beberapa jenis vaksin telah

ditemukan dan terbukti secara klinis mampu mendesak perkembangan HPV 6, 11, 16, dan 18 yang terbukti menjadi penyebab utama dalam kasus lesi prakanker. Beberapa vaksin tersebut sudah beredar di Indonesia. Beberapa macam vaksinasi yang bisa diberikan antara lain:

1) HPV dan Screening

Cara ini adalah cara kombinasi pemberian vaksin HPV dan screening. Teknik ini terbukti mampu menyembuhkan lesi displasia ringan dan mencegah kembalinya virus HPV.

2) Vaksin ASO4

Vaksin dari sistem ajuvan ini belum lama ditemukan. Kelebihannya adalah kehebatan fungsinya mendongkrak sistem kekebalan tubuh hingga mampu mengusir HPV 16 dan 18 yang menjangkiti tahap dysplasia ringan. ASO4 juga menjamin 100% lenyapnya HPV 16 dan 18 dalam 5,5 tahun. Kelebihan lain dari vaksin adalah bisa diberikan kepada wanita dengan rentang usia yang panjang, antara 10-55 tahun.

3) Cervarix

Tipe vaksin ini juga memberikan jaminan 100% perlindungan terhadap HPV 16 dan 18. Bahkan produsen cervarix menjajikan perlindungan tambahan terhadap HPV 31,45, dan 52. Cervarix terbukti aman dan telah diujukan kepada 40.000 subjek. Cervarix diberikan dalam tiga kali vaksinasi, masing-masing berjarak 1 bulan.

#### 4) Gardasilr

Diproduksi oleh industri kimia dan obat Merck. Produsen gardasilr menjamin kemampuannya menagatasi HPV 6, 11, 16, dan 18. Gardasilr diberikan selama tiga kali, masing-masing berjarak 2 bulan.

#### b. Radioterapi

Radioterapi atau penyinaran adalah pengobatan dengan menggunakan sinar ion dari jenis sinar X, sinar gamma, atau gelombang panas (hyperthermia) yang ditembakkan ke sel-sel kanker. Metode ini dianggap cukup akurat dan aman.

#### c. Biopsy (Operasi)

Biopsy adalah pengobatan yang cukup lazim dilakukan, terutama untuk kanker stadium yang masih memungkinkan disembuhkan (stadium2-3). Operasi pembedahan ini bertujuan mengangkat jaringan tumor ganas dan memisahkan dari jaringan tubuh. Biopsy juga memiliki kemungkinan gagal sebagaimana jenis pengobatan lain.

#### d. Konisasi

Adalah semacam operasi, namun tidak seperti operasi besar, hanya mengangkat jaringan selaput yang mengandung selaput lendir serviks. Konisasi dilakukan apabila hasil sitologi meragukan, terutama jika dibandingkan dengan hasil histologik. Konisasi dilakukan menggunakan pisau beda khusus. Sesudah konisasi biasanya akan dilakukan kuretase.

e. Histerektomi

Histerektomi adalah operasi pengangkatan rahim. Biasanya histerektomi dihindari oleh pengidap kanker yang masih berusia muda, sebab setelah menjalani his –terektomia ialah ia tidak bisa lagi mengandung. Histerektomi juga membawa risiko berupa rasa sakit dan menopause dini bagi yang menjalaninya. Biasanya hal ini dilakukan sebagai pilihan terakhir.

Pada praktiknya, terdapat berbagai macam istilah histerektomi, namun hal ini sekedar perkembangan teknis saja. Misalnya sebagai berikut:

- 1) Histerektomi total, pengangkatan seluruh organ rahim dan mulut rahim
- 2) Histerektomi subtotal, hanya mengangkat bagian atas uterus. Mulut rahim tetap di tempatnya.
- 3) Histerektomi radikal, pengangkatan seluruh organ rahim, bagian atas rongga vagina dan jaringan sekitarnya
- 4) Histerektomi dan *salfingo-ooforektomi* bilateral, pengangkatan rahim, mulut rahim, kedua tuba fallopii, dan ovarium.

Pengangkatan ovarium ini mengakibatkan menopause dini.

f. Kemoterapi

Kemoterapi adalah pengobatan kanker menggunakan obat-obatan tingkatan tinggi yang telah dirancang aktif bekerja di dalam sel. Kemoterapi diberikan baik sebagai pengobatan tunggal maupun

pendukung pasca biopsy. Pengobatan jenis ini bekerja di dalam sel dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker serta meningkatkan daya kekebalan tubuh yang diharapkan turut menghentikan perkembangan sel kanker. Pada kasus stadium IV atau IIIB dimana kondisi pengidap tidak memungkinkan untuk dioperasi (karena tingkat penyebaran kankernya yang telah meluas, atau faktor-faktor daya tahan penderita terhadap risiko operasi), Kemoterapi juga bisa dijalankan sebagai pengobatan paliatif yang berfungsi mengurangi rasa sakit dan membuat penderita memiliki semangat untuk menjalani sisa hidup yang lebih baik.

g. Terapi Biologis

Terapi biologis adalah pengobatan pada kanker yang telah menyebar ke bagian tubuh lain. Terapi ini biasanya menggunakan interferon atau biasa dikombinasikan dengan kemoterapi. Prinsip kerja dan tujuan terapi biologis ini adalah membantu tubuh penderita meningkatkan kekebalan tubuh dan mempertahankan kinerja sel-sel normal, agar tubuh tetap dapat asupan nutrisi yang cukup.

h. Terapi Alternatif dan Tradisional

Di Indonesia banyak sekali terapi alternatif yang menawarkan kesembuhan penderita dari kanker. Bila kebetulan anda mengalami hal buruk tersebut, anda bisa mencoba terapi alternatif meski harus tetap waspada. Banyak kasus pengobatan alternatif yang ternyata hanya menipu saja. Anda bisa membandingkannya melalui berbagai sumber

buku, majalah, internet, atau bahkan konsultasi dengan dokter mengenai salah satu terapi alternative yang anda ingin anda coba. Terapi alternatif semacam bekam, akupuntur, reiki, bionergi, terapi herbal dan sebagainya. (Nurchahyo 2010, 65-73)

## 8. Kanker Serviks dan Kehamilan

### a. Stadium Kanker Serviks pada Kehamilan

Stadium kanker serviks pada kehamilan dapat dibagi menjadi:

#### 1) Stadium I A

- a) Trimester I dilakukan abortus provokatus dilanjutkan dengan radiasi atau histerektomi totalis
- b) Trimester II (sampai 20 minggu) dilakukan histerektomi dan dilanjutkan dengan radiasi atau histerektomi atau dilanjutkan radiasi atau histerektomi totalis.
- c) Trimester II > 20 minggu, atau trimester III ditunggu sampai janin viable, kemudian dilakukan seksio sesarea dan dilanjutkan dengan histerektomi total atau radiasi.

#### 2) Stadium I B – II A

##### a) Trimerster I

Radiasi untuk abortus provokatus yang dilanjutkan dengan radiasi / operasi radikal.

##### b) Trimester II < 20 minggu

Histerektomi dan dilanjutkan dengan radiasi atau operasi radikal.



- c) Trimester II > 20 minggu atau trimester III

Ekspektatif sampai janin viable, kemudian dilakukan seksio sesar dan dilanjutkan dengan radiasi atau histerektomi radikal.

- 3) Stadium II B – III B

- a) Trimester I

Radiasi untuk abortus provaktus dan post abortus ditambah radiasi sampai lengkap.

- b) Trimester II < 20 minggu

Histerektomi dan dilanjutkan dengan radiasi

- c) Trimester II > 20 minggu atau trimester III

Ekspektatif atau janin viable kemudian dilakukan seksio sesarea dan dilanjutkan dengan radiasi.

- 4) Stadium IV A

- a) Trimester I

Radiasi untuk abortus provokatus yang dilanjutkan dengan radiasi paliatif, bila ada respon diteruskan sampai dicapai dosis kuratif.

- b) Trimester II < 20 minggu

Histerektomi dan dilanjutkan dengan radiasi paliatif dan bila ada respon dapat ditambah sehingga dicapai dosis kuratif.

- c) Trimester II > 20 minggu atau trimester III

Ekspektatif sampai janin viable kemudian dilakukan seksio sesarea, radiasi paliatif, diteruskan sampai dicapai dosis kuratif.

## 5) Stadium IV B

### a) Trimester I

Radiasi untuk abortus provokatus yang dilanjutkan dengan radiasi paliatif atau kemoterapi

### b) Trimester II < 20 minggu

Histerektomi, bila tidak ada keluhan (asimtomatik) dilanjutkan dengan kemoterapi, bila ada keluhan (simptomatik) diberikan radiasi.

### c) Trimester II > 20 minggu atau trimester III

Ekspektatif sampai janin viable, kemudian dilakukan seksio sesarea. Bila tidak ada keluhan (asimptomatik) dilanjutkan dengan kemoterapi, bila ada keluhan (simptomik) dilanjutkan dengan radiasi. (Sukaca 2009, 84-86)

## b. Pengobatan Kanker Serviks pada Kehamilan

Meskipun sedang hamil namun kanker serviks dapat ditanggulangi. Namun perlu diingat untuk menanggulangi kanker ini harus memperhatikan beberapa aspek. Untuk merencanakan pengobatan ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu usia janin, stadium pada kanker, dan keinginan penderita.

### 1) Operasi

Jika penderita akan memilih operasi maka harus ada perencanaan yang jelas. Perencanaan itu sebagai berikut:

- a) Pada kehamilan umur 0-3 bulan, atau pada awal trimester dapat dilakukan operasi tertahap. Operasi dilaksanakan dengan cara histerektomia radikal dan limfadenektomi.
  - b) Pada kehamilan umur 3-6 bulan, atau pada trimester kedua dilakukan dengan cara menunggu sampai kanker menjadi matang. Setelah itu dapat melakukan seksio sesarea idasik. Dilanjutkan dengan histerektomi radikal dan limfadenektomi.
  - c) Pada kehamilan umur 6-9 bulan, atau pada trimester III dapat dilakukan dengan seksio sesarea. Dilanjutkan dengan histerektomi radikal dan limfadenektomi.
  - d) Pasca melahirkan, maka dapat melakukan radikal dan limfadenektomi.
- 2) Radiasi

Pengobatan dapat dilakukan dengan cara radiasi, perencanaannya sebagai berikut:

- a) Pada kehamilan umur 0-3 bulan, atau pada awal trimester dapat dengan radiasi eksternal (3000 rads). Menunggu abortis spontan. Jika diperlukan dapat melakukan histerektomi. Dilanjutkan dengan radiasi intrakapiter dan radiasi eksternal.
- b) Pada kehamilan 6-9 bulan, atau pada trimester III dapat dilakukan dengan seksio sesarea. Dilanjutkan dengan radiasi eksternal dan dilanjutkan dengan radiasi intrakapiter.

- c) Pada pasca melahirkan, pengobatan sama saat normal. Biasanya diberikan radiasi eksternal dahulu kemudian radiasi intrakapiter.

### 3) Persalinan

Jenis persalinan yang disarankan adalah:

- a) Persalinan pervaginam
- b) Persalinan perabdominal

(Sukaca 2009, 84-86)

## 9. Pencegahan Kanker Serviks

Telah diuraikan di depan bagaimana tingginya risiko kematian pengidap kanker rahim, terutama jika sampai mereka terlambat mendeteksinya. Pengobatannya pun tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat dan memakan biaya materi serta nonmateri yang besar. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan agar dapat hidup sehat dan bebas dari ancaman bahaya kanker.

### a. Berhubungan seksual pada waktunya

Organ kelamin wanita mengalami perkembangan terus-menerus sejak anak-anak hingga remaja akhir. Para ahli kandungan menyatakan usia aman bagi wanita untuk berhubungan seksual adalah mulai usia 20 tahun. Sebelum usia tersebut, alat kelamin dan mental wanita mungkin belum matang. Bagi wanita, berhubungan seksual pada usia dini dapat mengakibatkan iritasi dan infeksi akibat ketidaksiapan fisik dan mental serta minimnya pengetahuan seksual.

b. Tidak berganti-ganti pasangan seksual

Risiko munculnya infeksi dan penularan virus HPV semakin besar seiring meningkatnya frekuensi seseorang melakukan hubungan seksual, apalagi bila berganti-ganti pasangan. Kebanyakan orang hanya menghubungkan risiko hubungan seksual dengan AIDS. Sementara penggunaan kondom untuk mencegah AIDS tidak cukup kuat bagi pencegahan virus HPV. HPV dapat menular melalui oral seks. Oleh karenanya, menjaga frekuensi hubungan seksual dan memantapkan diri berkomitmen pada satu pasangan hidup resmi adalah tindakan yang lebih aman.

c. Melakukan vaksinasi HPV

Sekarang ini telah ditemukan banyak sekali jenis vaksin anti HPV. Vaksinasi ini bisa dilakukan sejak seorang wanita berusia 9 tahun, dan belum terlambat dilakukan bagi wanita berusia 55 tahun.

d. Melakukan pemeriksaan rutin

Pahamilah bahwa sel kanker adalah sel berbahaya yang berkembang dengan sangat lambat namun pasti. Ia membutuhkan waktu 15-20 tahun untuk menunjukkan gejala gangguan yang terasa. Pada saat gangguan itu terasa, sesungguhnya kita sudah sedikit terlambat.

Banyak pilihan pemeriksaan yang bias dijalani. *Pap Smear* adalah metode yang saat ini paling populer dan dianggap cukup populer dan cukup akurat dalam mendeteksi kelainan sel pada mulut rahim. Selain

itu, juga ada metode *Koloskopy*. Dan yang relative murah adalah IVA (Inspeksi Vagina dengan Asam Asetat). IVA dapat dilakukan oleh bidan dan petugas medis Puskesmas.

e. Kurangi kebiasaan merokok

Tembakau mengandung nikotin dan zat karsinogenik lainnya. Kemudian asap rokok menghasilkan senyawa berbahaya, yaitu *Polycyclic aromatic hydrocarbon heterocyclic nitrosamines* yang sangat berbahaya bagi sel-sel normal. Pecahan dari senyawa ini dapat mengganggu susunan senyawa DNA dan mengubah informasi serta prosedur pembelahan sel hingga tak terkontrol. Wanita perokok memiliki risiko 2 kali lebih besar untuk mengidap kanker rahim daripada wanita bukan perokok.

f. Tidak mencuci vagina terlalu sering

Uji penelitian menunjukkan bahwa produk pembersih vagina yang mengandung antiseptik dan deodoran berisiko menimbulkan iritasi pada permukaan jaringan lunak vagina.

g. Mengatur pola makan

Mengatur pola makan sangat penting dalam upaya menghindari kanker. Tidak hanya pada kasus kanker rahim, tetapi semua jenis kanker bisa dipengaruhi oleh pola makan yang tidak sehat. Makanan berlemak tinggi, daging yang dipanggang dengan api, serta daging asap dan goreng berpotensi menyisakan zat karsinogenik serta radikal

bebas yang berbahaya bagi perkembangan sel tertentu. (Nurcahyo 2010, 75-79)

## F. Tinjauan Islam tentang Kanker Serviks

Salah satu perkembangan baru pada usia remaja yang perlu diperhatikan adalah mulai timbulnya rasa senang atau ketertarikan pada lawan jenis. Bahkan rasa ketertarikan itu tidak sebatas senang memandang atau senang bercengkrama dengan lawan jenis, melainkan seiring pertumbuhan fisik yang mulai sempurna dan organ-organ seks mulai berfungsi, timbul keinginan pada remaja untuk melapaskan hasrat seksual. (Al-Bukhori 2005, 1)

Sementara pada pemaparan sebelumnya bahwa usia ketika wanita mulai melakukan hubungan seks secara aktif juga menjadi salah satu faktor pemicu kanker serviks. Dimana, pada dasarnya organ-organ seksual wanita mengalami perkembangan yang lambat dan harus berada dalam kondisi matang untuk bisa menjalankan tugasnya. Meskipun secara fungsional rahim wanita dinyatakan sudah berfungsi sejak mengalami menstruasi (9-15 tahun), namun kesiapan total umumnya baru tercapai pada usia sekitar 20 tahun, di mana secara mental, wanita juga sudah siap untuk berhubungan seksual secara sadar. Itulah sebabnya di dalam Q.S. Al-Isra'/17: 32 dengan tegas Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Larangan zina dalam ayat di atas sangat tegas, bahkan Allah melarangnya dengan kalimat “janganlah kalian dekati zina”. Larangan ini mengandung arti bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan akan mendatangkan mudharat. Oleh karena itu yang harus diajuhi tidak hanya zinanya tetapi juga semua perbuatan yang mengarah kepada zina.

Bahkan Allah SWT menurunkan secara tegas ayat yang berisikan hukuman bagi pezina perempuan dan laki-laki yaitu seratus kali dera. Di dalam ayat tersebut sangat nampak betapa hinanya perbuatan zina di hadapan Allah SWT. Bahkan sakin tercelanya, Allah SWT melarang untuk memberikan belas kasihan kepada pezina dan hukumannyapun harus diberikan di depan orang-orang beriman.

Q.S. An-Nuur/24 : 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Pada ayat di atas, perempuan pezina lebih awal disebutkan daripada laki-laki pezina. Ini berarti betapa banyaknya dampak yang akan didapatkan bagi perempuan pezina dibanding laki-laki pezina. Jika dikaitkan dengan ilmu



kedokteran, maka ada banyak penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, baik itu free-sex maupun multipartner sex. Dimana diantara penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual lebih banyak diderita oleh perempuan. Salah satu contohnya adalah kanker serviks yang merupakan jenis kanker yang diderita oleh perempuan karena hubungan seksual yang tidak diderita oleh laki-laki. Jadi, sangat tepat jika pada Q.S. An-Nuur/24 : 2 Allah SWT lebih awal menyebutkan perempuan yang berzina daripada laki-laki yang berzina.

Selain itu makanan juga merupakan salah satu faktor yang memicu pertumbuhan sel-sel kanker. Sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat tentang makanan yang halal, sehat dan bergizi, serta menyadari bahaya minuman keras.

Q.S. An-Nahl/16 : 69

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا ۖ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

Kemudian makanlah dari (segala) macam buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.

Sangatlah tepat firman Allah SWT pada surah An-Nahl ayat 69 yang menganjurkan kita untuk mengonsumsi buah-buahan karena perlu diketahui bahwa makanan yang dianjurkan untuk mencegah kanker adalah makanan yang

mengandung vitamin C, beta karoten dan asam folat. Dimana ketiganya dapat memperbaiki atau memperkuat mukosa serviks. Beta karoten banyak terdapat dalam wortel, vitamin C terdapat dalam buah-buahan berwarna oranye, sedangkan asam folat terdapat dalam makanan hasil laut. Kekurangan vitamin C, beta karoten dan asam folat bisa menyebabkan timbulnya kanker serviks. (Bertiani 2009, 122)

Sedangkan minuman keras merupakan sesuatu yang diharamkan di dalam ajaran Islam. Ini terbukti dengan banyaknya firman Allah yang mengharamkannya. Berikut merupakan ayat-ayat yang secara tegas mengharamkan minuman keras.

Q.S. Al-Maidah/5: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sungguhnyaa minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Q.S. Almaidah/5: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT akan membawa dampak yang begitu besar, seperti halnya alkohol yang merupakan salah satu faktor resiko pemicu kanker serviks.

Tubuh memiliki serangkaian sistem kekebalan yang secara otomatis berusaha mengatasi gangguan-gangguan infeksi dan pertumbuhan sel abnormal. Namun dalam kondisi tertentu, sistem kekebalan ini dapat melemah sehingga pengendalian gangguannyapun melemah. Salah satu kondisi semacam ini terdapat pada orang yang mengonsumsi alkohol. Dengan melemahnya sistem kekebalan, maka perkembangan infeksi virus HPV yang merupakan penyebab kanker serviks tidak terhambat dan pertumbuhan sel abnormal terus meningkat hingga mencapai tahap invasif (menyebar kemana-mana). (Nurchahyo 2010, 52)

Tak kalah pentingnya masalah kebersihan pada daerah kewanitaan yang merupakan faktor predisposisi terjadinya kanker serviks. Walaupun kebersihan bukanlah penyebab utama dari kanker serviks, tetapi kurangnya kebersihan pada daerah kewanitaan dapat menyebabkan bakteri-bakteri patogen berkembang biak dan dapat menyebabkan infeksi. Dimana kita ketahui bahwa pada seseorang yang terkena infeksi maka sistem imunitas/kekebalan tubuhnya akan menurun sehingga perlawanan terhadap suatu penyakitpun akan menurun. Termasuk virus HPV akan mudah untuk menyerang serviks sehingga akan mempercepat proses terjadinya kanker.

Perhatian Islam pun tak luput dari pentingnya menjaga kebersihan. Bahkan Allah sangat mencintai bagi mereka yang selalu mensucikan diri. Sebagaimana firmanNya di dalam surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan kebersihan.

Q.S. Al-Baqarah/2: 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Sebagai kesimpulan, Al-qur'an merupakan gudang ilmu yang sangat komplit karena sebelum ilmu kedokteran mengungkapkan semua yang berkaitan tentang suatu penyakit, baik itu penyebab, pencegahan, maupun pengobatannya Islam sudah terlebih dahulu mengajarkan kita bagaimana mencegah dan mengobatinya.

### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEP**

##### **A. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian**

Kanker rahim sering disebut juga sebagai kanker serviks atau kanker mulut rahim. Dimana kanker ini muncul karena pertumbuhan sel kanker di mulut rahim yang disebabkan oleh virus HPV (Human Papilloma Virus). Kanker ini juga dipicu oleh kebiasaan merokok, hubungan seksual pada usia dini, berganti-ganti pasangan seksual, gangguan sistem kekebalan tubuh, pemakaian pil KB, dan infeksi herpes genitalis menahun. (Nurcahyo 2010, 19)

Virus HPV menyerang mulai adanya kematangan seksual, yaitu mulai anak berumur 9 tahun hingga lansia umur 70 tahun. Dengan begitu, maka ketika ada kontak seksual, sangat mungkin selama hidup seorang wanita berada dalam ancaman HPV. (Bertiani 2009, 26)


Saat ini banyak sekali para remaja yang mengatasnamakan cinta dalam melakukan hubungan seks. Jika dia jatuh cinta pada seseorang, ungkapan rasa cinta itu biasanya diungkapkan dengan seks. Padahal wanita yang melakukan hubungan seksual secara aktif sebelum usia 17 tahun, memiliki potensi 3 kali lebih besar untuk mengidap kanker serviks dibanding wanita yang tidak melakukan hubungan seksual pada usia tersebut. (Nurcahyo 2010, 51)

Itulah sebabnya sangat diperlukan pengetahuan tentang kanker serviks secara dini terutama pengenalan kanker serviks pada usia remaja agar dapat meminimalisasi faktor resiko terjadinya kanker tersebut. Selain itu, bekal agama

juga sangat diperlukan agar para remaja mampu menyikapi fenomena kanker serviks ini dengan benar dan tepat.

## B. Skema Kerangka Konsep

Berdasarkan dasar pemikiran variabel penelitian di atas, maka skema kerangka konsep penelitian ini adalah:



Keterangan:



## C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

### 1. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pengetahuan responden mengenai kanker serviks yang diketahui melalui jawaban-

jawaban yang dikemukakan oleh responden dengan cara pengisian kuesioner.

Kriteria objektif:

- a. Cukup: Bila skor responden minimal 60% dari total skor pertanyaan tentang pengetahuan kanker serviks.
- b. Kurang : Bila responden skor kurang dari 60% dari total skor pertanyaan tentang pengetahuan kanker serviks.

## 2. Sikap

Sikap yang dimaksud dalam penelitian adalah pernyataan setuju dan tidak setuju tentang kanker serviks yang diketahui melalui jawaban yang dikemukakan oleh responden dengan cara pengisian kuesioner.

Kriteria objektif:

- a. Positif : Bila responden menjawab benar 60% atau lebih dari pertanyaan sikap.
- b. Negatif : Bila responden menjawab benar kurang dari 60% dari pertanyaan sikap.

## 3. Kanker serviks

Kanker serviks merupakan sebuah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim/serviks. Yaitu bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran pengetahuan dan sikap remaja di SMA Negeri 15 Makassar tentang kanker serviks.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian adalah SMU Negeri 15 Makassar yang bertempat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, dengan alasan sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah nasional bertaraf internasional di Sulawesi Selatan dan memenuhi persyaratan untuk dijadikan tempat penelitian bagi peneliti.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan tanggal 04 Juni 2010.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa SMA Negeri 15 Makassar kelas X dan XI dengan sebanyak 345 orang.



## 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah siswa SMA Negeri 15 Makassar kelas X dan XI yang menjadi responden sebanyak 179 orang.

### a. Inklusi

- 1) Siswa SMA Negeri 15 Makassar
- 2) Bersedia menjadi responden
- 3) Berjenis kelamin perempuan

### b. Eksklusi

- 1) Siswa SMU Negeri 15 Makassar yang sedang cuti
- 2) Tidak bersedia berpartisipasi
- 3) Berjenis kelamin laki-laki

## **D. Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dilakukan secara “purposive sampling” yaitu sampel yang dipilih sesuai dengan kriteria inklusi agar relevan dengan desain penelitian sehingga memperoleh data tentang tingkat pengetahuan dan sikap siswa mengenai kanker serviks.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan didapatkan melalui data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara kunjungan ke lokasi penelitian dan membagikan kuesioner untuk diisi sendiri oleh responden. Kuesioner yang

dibagikan berupa pertanyaan yang menggali pengetahuan dan sikap siswa SMA Negeri 15 mengenai kanker serviks.

#### F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan data dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator, data dikumpulkan melalui kuesioner dengan daftar pertanyaan pengetahuan dengan tiga alternatif pilihan dan daftar pernyataan sikap dengan dua alternatif pilihan. Data disajikan dalam bentuk table distribusi frekuensi.

Untuk setiap jawaban, responden diberikan penilaian dengan sistem “tanpa denda” dengan formula rumus sebagai berikut:

$$S = R$$

Keterangan:

S = Skor yang diperoleh

R = Jawaban yang benar

2. Analisis data dapat dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat presentase data yang terkumpul dan disajikan table distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya presentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori keperustakaan yang ada. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$P = f/n \times 100\%$$

## **G. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Editing**

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

### **2. Coding**

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk jawaban yang salah. Untuk pilihan jawaban ragu-ragu, diberi kode (2) untuk kepentingan tabulasi data, namun pilihan jawaban ragu-ragu tetap dimasukkan dalam kategori jawaban salah.

### **3. Tabulating**

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

## **H. Etika Penelitian**

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang menyelimuti:

1. Tanpa nama (anonymity)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

2. Kerahasiaan (confidentiality)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Kanker Serviks di SMA Negeri 15 Makassar diperoleh sampel sebanyak 179 responden yang merupakan bagian dari populasi sebanyak 216 orang, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan.

Penyajian data mengenai Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Kanker Serviks di SMA Negeri 15 Makassar Tahun 2010 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Remaja tentang Kanker Serviks di SMA Negeri 15 Makassar Tahun 2010**

Pengetahuan	F	%
Cukup	67	37,4
Kurang	112	62,6
<b>Jumlah</b>	<b>179</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 1, responden pada SMA Negeri 15 Makassar berjumlah 179 orang yang terdiri dari 67 orang (37,4%) yang memiliki pengetahuan cukup tentang kanker serviks dan 112 orang (62,6) yang memiliki pengetahuan kurang tentang kanker serviks.

**Tabel 2. Distribusi Frekuensi Gambaran Sikap Remaja tentang Kanker Serviks di SMA Negeri 15 Makassar Tahun 2010**

Sikap	F	%
Positif	130	72,6
Negatif	49	27,4
<b>Jumlah</b>	<b>179</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil pengolahan data primer

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 179 responden sebanyak 130 responden (72,6%) yang memiliki sikap positif terhadap kanker serviks dan 49 responden (27,4%) yang memiliki sikap negatif terhadap kanker kerviks.

## B. Pembahasan

### 1. Pengetahuan

Dari 179 responden pada SMA Negeri 15 Makassar didapatkan 67 responden (37,4%) yang memiliki pengetahuan cukup dan 112 responden (62,6%) yang memiliki pengetahuan kurang tentang kanker serviks, ini berarti pengetahuan responden masih minim mengenai definisi, penyebab, cara penularan, gejala, perkembangan, pemeriksaan, pengobatan, dan pencegahan kanker serviks.

Kurangnya pengetahuan pada remaja di SMA Negeri 15 Makassar ini disebabkan karena responden belum pernah mendapatkan materi tentang kesehatan reproduksi khususnya kanker serviks sebelumnya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seks masih dianggap tabu dan

belum saatnya seorang remaja mengetahui secara mendalam tentang seks itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal saja, tetapi juga dapat diperoleh melalui penginderaan terhadap suatu objek tertentu melalui media-media ataupun pengalaman. Dimana internet merupakan salah satu media yang paling diminati oleh para remaja sekarang untuk memperoleh berbagai informasi termasuk kanker serviks.

Jadi, walaupun sebagian besar responden belum pernah mendapatkan materi khusus di sekolah tentang kanker serviks, tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa responden yang telah mendapatkan informasi tentang kanker serviks melalui media-media ataupun pengalaman sebelumnya. Sehingga didapat 67 responden (37,4%) yang memiliki pengetahuan cukup tentang kanker serviks walaupun jumlahnya sangat minim.

## 2. Sikap

Dari 179 responden pada SMA Negeri 15 Makassar didapatkan 130 orang (72,6%) yang bersikap positif terhadap kanker serviks dengan cara berusaha menghindari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kanker serviks. Dimana sikap yang paling dominan ditunjukkan para responden adalah tidak akan melakukan hubungan seks pranikah, tidak akan mengonsumsi alkohol, tidak akan merokok, akan menjaga kebersihan sistem reproduksinya, berprinsip bahwa mencegah kanker serviks lebih

baik daripada mengobatinya dan walaupun kanker serviks masih dianggap sebagai penyakit yang memalukan bagi masyarakat awam tetapi sebagian responden bersedia untuk memeriksakannya jika terdapat salah satu gejala dari kanker tersebut.

Sedangkan dari 179 responden didapatkan hanya 49 orang (27,4%) saja yang bersikap negatif terhadap kanker serviks. Ini berarti masih ada sebagian kecil remaja di SMA Negeri 15 Makassar yang belum mampu menyikapi fenomena kanker serviks secara benar dan tepat. Hal ini dikarenakan karena kurangnya pengetahuan tentang cara pencegahan, pemeriksaan dan pengobatan kanker serviks secara dini serta bahaya dari kanker serviks sendiri. Dimana berdasarkan pengolahan data awal menunjukkan bahwa hampir semua responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang kanker serviks akan bersikap negatif terhadap fenomena kanker serviks.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai gambaran pengetahuan dan sikap remaja tentang kanker serviks di SMA Negeri 15 Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Remaja di SMA Negeri 15 Makassar cukup mengetahui tentang kanker serviks, hal ini ditunjukkan dengan 37,4% responden yang mengetahui penyebab, cara penularan, gejala, perkembangan, pemeriksaan, pengobatan, dan pencegahan kanker serviks.
2. Remaja di SMA Negeri 15 Makassar mampu menyikapi fenomena kanker serviks dengan tepat dan benar, hal ini ditunjukkan dengan 72,6% responden berusaha menjauhi penyebab kanker serviks dan siap berkonsultasi dengan dokter jika terdapat salah satu gejala dari kanker tersebut.

#### **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka diharapkan agar setiap sekolah dapat meningkatkan pengetahuan siswanya tentang kanker serviks melalui penyuluhan yang tidak hanya melibatkan siswa tetapi juga orang tuanya.
2. Diharapkan kepada siswa agar pro aktif untuk mencari tahu tentang kanker serviks melalui media-media lain seperti internet, majalah, koran, dan lain-

lain ataupun mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi khususnya kanker serviks.

3. Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk sikap diperlukan adanya peran aktif orang tua dan pengajar guna memupuk sikap positif yang dimiliki oleh siswa dan menumbuhkan sikap positif bagi siswa lain. Dimana hal ini dapat ditempuh melalui jaringan komunikasi yang baik antara pengajar, orang tua dan siswa tentang fenomena kanker serviks sehingga para siswa mampu menyikapinya dengan tepat dan benar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Assyari. *Definisi dan Jenis-Jenis Sikap*. <http://en.wikipedia.org/wiki>, diakses 25 Maret 2010.
- Agustiani, H. 2006. *Psikologi Perkembangan*. Edisi 1. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Al-Bukhori, Jefri. 2005. *Sekuntum Mawar untuk Remaja*. Edisi 1. Jakarta: Pustaka Almarwadi.
- Al-Quran & Terjemahannya. Departemen Agama RI. 2005. Bandung: CV Penerbit J-ART
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bkkbn. *Remaja*. <http://ceria.bkkbn.go.id>, diakses 25 Maret 2010.
- Desmita. 2007. *Psikologi Perkembangan*. Edisi 3. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Evidence, Base. 2007. *Panduan Penatalaksanaan Kanker Ginekologi berdasarkan Evidence Base*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Ghofar, Abdul. 2009. *Cara Mudah Mengenal dan Mengobati Kanker*. Edisi 1. Yogyakarta: Flamingo.
- Gunarsa, Singgih D dan Gunarsa, Yulia. 2008. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Cet. 13. Jakarta: Gunung Mulia.
- Heffner, Linda J., dan Danny J. Schust. 2006. *At a Glance Sistem Reproduksi*. Edisi 2. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat. A., Aziz Alimul. 2007. *Metode Penelitian & Teknik Analisa Data*. Jakarta: Salemba Medika.

- Manuaba, I.A. Chandranita, I.B.G.Fajar Manuaba, dan I.G.B. Manuaba. 2008. *Gawat-Darurat Obstetri-Ginekologi & Obstetri-Ginekologi Sosial untuk Profesi Bidan*. Edisi 1. Jakarta: EGC.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Cet. 3. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurchahyo, Jalu. 2010. *Awas Bahaya Kanker Rahim dan Kanker Payudara*. Cet. 1. Yogyakarta: Wahana Totalita Publisher.
- Raven.P. 2007. *Atlas Anatomi*. Edisi 17. Cet. 25. Jakarta:Penerbit Djambatan.
- Sukaca, Bertiani E. 2009. *Cara Cerdas Menghadapi Kanker Serviks (Leher Rahim)*. Cet. 1. Yogyakarta: Genius Publisher.
- Syah, Muhibbin. 2006. *Psikologi Belajar*. Edisi Revisi 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tempo Interaktif, Makassar. *Kanker Serviks dan Payudara Terbanyak di Sulawesi Selatan*. <http://www.tempointeraktif.com>, diakses 25 Maret 2010.
- Wikipedia. *Kanker Leher Rahim*. <http://wikipedia.com>, diakses 30 Maret 2010.
- Wiknjosastro, Hanifa. 2007. *Ilmu Kandungan*. Edisi 2. Cet. V. Jakarta: YBP-SP.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Ilmu Kebidanan*. Edisi 3. Cet. VII. Jakarta: YBP-SP.