

**HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE DENGAN CACINGAN PADA ANAK DI
WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAMANGAPA ANTANG MAKASSAR**



Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
IRAWATI
NIM. 703 001 090 30

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penyusun ini sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Agustus 2013

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM **IRAWATI**
NIM. 70300109030
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul *Hubungan Personal Hygiene dengan Kejadian Cacingan pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar*, dapat diselesaikan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Makassar. Tidak lupa pula kami haturkan salam dan taslim kepada baginda besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya yang telah membawa ajaran islam kepada kita semua.

Kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Ismail dan Ibunda Sarina. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, dukungan, semangat, dan do'a restu disetiap langkah ini, yang tidak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar, kiranya amanah yang diberikan pada penulis tidak sia-sia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat hambatan mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penelitian. Namun Alhamdulillah atas bimbingan, arahan, kerja sama, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. H. A. Qadir Gassing HT, M.S. selaku rektor UIN Alauddin Makassar.
2. PJS Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A, Pembantu Dekan I, Ibu Fatmawaty Mallapiang.,SKM.,M.Kes., Pembantu Dekan II, Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si, Apt, dan Pembantu Dekan III, Drs. Wahyudin G., Mag serta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Alfi Syahar Yakub, S.Kep.,M.Kep, selaku pembimbing I dan Bapak Nurhidayat Jafar,S.Kep.,Ns.,M.Kep, selaku pembimbing II yang dengan keikhlasan dan kesabaran meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka arahan, bimbingan dan informasi yang lebih aktual.
4. Ibu DR. Nurhidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes., selaku ketua jurusan Keperawatan serta penguji I dan Bapak Drs. Supardin., M.Hi selaku penguji II yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Keperawatan yang tak sempat dituliskan namanya satu per satu yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dari awal pendidikan hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Balitbangda pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan rekomendasi izin penelitian bagi peneliti.
7. Direktur Puskesmas Tamangapa Antang Makassar, beserta staf yang telah membantu dalam penelitian ini.

8. Kedua adikku tersayang (Irma dan Ilham) yang selalu memberi dukungannya serta Sahabat-sahabatku “manuruki 48” (*Anti, Wati, Marda, Dian, Jul, Ayu, Najma, Novi, Itha, Obhe, Icha, Ida dan Nurul, Suhud, Heri, Febri dan Ijal*) dan semua angkatan 09 terkhusus keperawatan “B” .
9. Teman seperjuangan skripsiku, Syahrulia dan Nursanti Sawil yang selama proses konsultasi dan proses lain dalam perjalanan skripsi selalu bersama-sama.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya. Insha Allah, Amin.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samata, 31 Juli 2013

Penulis,

IRAWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Infeksi Cacingan	7
B. Tinjauan Umum Tentang Personal Hygiene	20
BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN.....	33
A. Kerangka Konsep	33
B. Kerangka Kerja.....	35
C. Defenisi Operasional	36
D. Hipotesis Penelitian	39

BAB IV	METODE PENELITIAN	40
	A. Desain Penelitian	40
	B. Jadwal Penelitian	41
	C. Populasi dan Sampel.....	41
	D. Tehnik Sampling	42
	E. Pengumpulan Data.....	43
	F. Pengolahan dan Analisis Data.....	43
	G. Penyajian Data.....	46
	H. Etika Penelitian.....	46
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	50
	A. Hasil Penelitian.....	50
	B. Pembahasan	64
BAB VI	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik.....	49
Tabel 5.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebiasaan Mencuci Tangan.....	50
Tabel 5.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebiasaan Memakai Alas kaki	51
Tabel 5.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebersihan Kuku.....	52
Tabel 5.5	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebiasaan Jajan.....	52
Tabel 5.6	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebiasaan Jajan.....	53
Tabel 5.7	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kejadian Cacingan.....	54
Tabel 5.8	Hasil Uji Chi-Square Dan Uji OR Hubungan Personal Hygiene Dengan kejadian Cacingan	55
Tabel 5.9	Hasil Uji Chi-Square Dan Uji OR Hubungan Kebiasaan Mencuci Tangan Dengan Kejadian Cacingan.....	56
Tabel 5.10	Hasil Uji Chi-Square Dan Uji OR Hubungan Kebiasaan Memakai Alas Kaki Dengan Kejadian Cacingan.....	57
Tabel 5.11	Hasil Uji Chi-Square Dan Uji OR Hubungan Kebersihan Kuku Dengan Kejadian Cacingan	58
Tabel 5.12	Hasil Uji Chi-Square Dan Uji OR Hubungan Kebiasaan Jajan Dengan Kejadian Cacingan.....	59
Tabel 5.13	Hasil Uji Chi-Square Dan Uji OR Hubungan Kebiasaan Defekasi/BAB Dengan Kejadian	60


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Morfologi dan Lingkaran Hidup Cacing Gelang.....	9
Gambar 2.2	Morfologi dan Daur Hidup Cacing Cambuk	12
Gambar 2.3	Morfologi dan Daur Hidup Cacing Tambang	15
Gambar 2.4	Cara Mencuci Tangan yang Benar	28



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Persetujuan Responden
- Lampiran 2 Daftar Kuesioner
- Lampiran 3 Master Tabel dan Output
- Lampiran 5 Persuratan



ABSTRAK

NAMA : IRAWATI
NIM : 703 001 09030
JUDUL : Hubungan Personal Hygiene dengan Kejadian Cacingan pada Anak Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar (dibimbing oleh Alfi Syahar Yakub dan Nurhidayat Jafar)

Penyakit-penyakit infeksi di Indonesia pada umumnya masih cukup tinggi. Salah satu penyakit yang insidennya masih tinggi adalah infeksi cacingan yakni cacing usus yang ditularkan melalui tanah (*soil transmitted helminthiasis*). Hal ini terjadi mengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris dengan tingkat sosial ekonomi, pengetahuan, keadaan sanitasi lingkungan dan hygiene masyarakat masih rendah serta beriklim tropis sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya infeksi dan penularan cacing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan personal hygiene dengan kejadian cacingan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional dengan pendekatan *case control* yakni suatu penelitian (survey) analitik dimana dilakukan identifikasi subjek (kasus) yang telah terkena penyakit (efek), kemudian ditelusuri secara retrospektif ada atau tidak adanya faktor resiko yang berperan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak yang terdiagnosa cacingan pada bulan Januari sampai Mei 2013 sebanyak 40 kasus dan sebanyak 40 anak yang tidak cacingan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar. Teknik penarikan sampel adalah dengan menggunakan *total sampling* dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus statistik uji *Chi-square* dengan derajat kemaknaan ($\alpha=0,05$) dan untuk melihat kejelasan tentang dinamika hubungan antara faktor resiko dan efek dilihat melalui nilai rasio odds (OR).

Berdasarkan analisis *Chi-square* dengan uji *pearson chi-square* antara variabel *personal hygiene* dengan kejadian cacingan diperoleh nilai p sebesar 0,000. Karena nilai $p < 0,05$ yaitu 0,000 (OR= 21,000, 95%CI 4,5-99,1), maka hipotesis alternatif diterima. Sehingga *personal hygiene* merupakan faktor resiko terjadinya efek sebab OR > 1.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah ada hubungan personal hygiene dengan kejadian cacingan pada anak. Oleh sebab itu sosialisasi tentang personal hygiene dan pemberian obat cacing tetap dilaksanakan puskesmas dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan prevalensi kecacingan dimasa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit-penyakit infeksi di Indonesia pada umumnya masih cukup tinggi. Salah satu penyakit yang insidennya masih tinggi adalah infeksi cacingan yakni cacing usus yang ditularkan melalui tanah (*soil transmitted helminthiasis*). Hal ini terjadi mengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris dengan tingkat sosial ekonomi, pengetahuan, keadaan sanitasi lingkungan dan hygiene masyarakat masih rendah serta beriklim tropis sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya infeksi dan penularan cacing (Djamilah, 2003).

Cacing yang tergolong dalam Soil-Transmitted Helminth adalah *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis* serta cacing tambang yaitu *Necator americanus* dan *Ancylostoma duodenale*. Di Indonesia infeksi oleh Soil-Transmitted Helminth ini paling banyak disebabkan oleh *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Necator americanus* (Palgunadi, 2012).

World Health Organization (2010) memperkirakan lebih dari 1 milyar penduduk terinfeksi *Ascaris*, 740 juta terinfeksi cacing tambang, 795 juta terinfeksi *trichuris*. Prevalensi tertinggi ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2012) mengemukakan kecacingan tersebar dan menjangkiti hampir seluruh penduduk di seluruh dunia, terutama di Indonesia sebagai daerah tropis, dengan prevalensi kecacingan mencapai 79-83 persen. Berdasarkan hasil survey Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan & PPM Kementerian Kesehatan, anak Indonesia yang menderita penyakit kecacingan angkanya rata-rata berada di kisaran 30 persen (Depkes, 2010).

Johnny S., dokter spesialis anak dari Rumah Sakit dr. Oen, Surakarta mengatakan Indonesia yang beriklim tropis dan lembab berpotensi tinggi membuat anak terserang penyakit cacingan. Kondisi tersebut semakin parah ketika musim hujan. Hal ini dikarenakan anak-anak sering kali bermain ditempat yang becek. Jika kebersihan mereka tidak diawasi oleh orang tua, kemungkinan terkena cacingan menjadi lebih besar (Mufidah, 2012).

Cacingan kemudian akan mempengaruhi pemasukan (*intake*), pencernaan (*digestif*), penyerapan (*absorpsi*), dan metabolisme makanan. Secara kumulatif infeksi cacingan dapat menimbulkan kekurangan gizi berupa kalori dan protein, serta kehilangan darah yang berakibat menurunnya daya tahan tubuh dan menimbulkan gangguan tumbuh kembang anak. Khusus anak usia sekolah, keadaan ini akan berakibat buruk pada kemampuannya dalam mengikuti pelajaran di sekolah (Manalu, 2006 dalam Andaruni, 2012).

Ada beberapa hal yang seringkali diabaikan oleh para orang tua, yang justru menjadi penyebab masuknya cacing kedalam tubuh anak adalah *personal hygiene* pada diri anak yang dianggap tidak penting, namun sering kali luput dari pantauan mereka. Misalnya, memelihara kuku hingga panjang, jajan makanan di sembarang tempat, dan tidak mencuci tangan sebelum makan (Mufidah, 2012).

Penelitian Nurjannah (2012) pada siswa Sekolah Dasar Negeri Jatinagor menunjukkan sebanyak 3,2 persen responden termasuk kedalam kategori *hygiene* dan 96,8 persen tidak *hygiene*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fitri (2012) di Tapanuli Selatan, menunjukkan jumlah siswa yang positif terinfeksi kecacingan sebanyak 60 persen. Dimana personal higiene siswa berdasarkan kriteria kebersihan kuku sebanyak 43 persen siswa baik dan 57 persen siswa tidak baik, penggunaan alas kaki sebanyak 42 persen siswa baik dan 58 persen siswa tidak baik dan kebiasaan cuci tangan siswa sebanyak 37 persen siswa baik dan 63 persen siswa tidak baik. Jadi personal higiene siswa berdasarkan kriteria kebersihan kuku, penggunaan alas kaki dan kebiasaan cuci tangan siswa adalah sebanyak 28 persen siswa baik dan 72 persen siswa tidak baik. Dari penelitiannya juga menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara kebersihan kuku, penggunaan alas kaki dan kebiasaan cuci tangan siswa dengan kejadian infeksi kecacingan.

Penelitian tentang infeksi cacingan sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Veny Hadju (1996, dalam Waqiah, 2010) didaerah pemukiman kumuh di

Makassar, dengan hasil bahwa terdapat 92 persen anak terinfeksi oleh *Ascaris* dan *Trichuris* serta 98 persen terinfeksi *Hookworm*. Sementara hasil penelitian Haryati (2001, dalam Nahdiyati, 2012) di SD Inpres Jambua, desa Bonto Marannu, kabupaten Maros menemukan 43 persen murid yang menderita kecacingan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Tamangapa, kelurahan Tamangapa kecamatan Manggala Kota Makassar, menunjukkan bahwa jumlah anak usia sekolah dasar yang menderita cacingan pada tahun 2011 yakni mencapai 149 orang anak sedangkan pada tahun 2012 jumlah penderita infeksi cacingan adalah 195 orang anak. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anak yang menderita cacingan adalah meningkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk mengetahui apakah ada hubungan personal hygiene dengan cacingan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Adapun tujuan penelitian ini yaitu diketahuinya hubungan personal hygiene dengan cacingan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.

2. Tujuan khusus
 - a. Diketuainya hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan cacangan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.
 - b. Diketuainya hubungan antara pemakaian alas kaki dengan cacangan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.
 - c. Diketuainya hubungan antara kebersihan kuku dengan cacangan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.
 - d. Diketuainya hubungan antara kebersihan jajanan dengan kejadian cacangan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.
 - e. Diketuainya hubungan antara kebiasaan defekasi/BAB dengan kejadian cacangan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmiah, terkhusus pada pengetahuan tentang teori dan konsep penyakit cacangan yang dapat dikembangkan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat bagi institusi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka perbaikan dan

pengembangan kualitas sanitasi lingkungan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada anak sehingga dapat mencegah terjadinya cacangan.

3. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dalam upaya menambah ilmu dan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kejadian cacangan disamping sebagai syarat memperoleh gelar sarjana keperawatan (S.Kep.) pada Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Infeksi Cacingan

1. Pengertian Infeksi Cacingan

Entjang (2003) infeksi adalah masuknya mikroba ke dalam jaringan tubuh, kemudian berkembang biak dan menimbulkan gejala penyakit. Hadirnya agent penyakit diatas permukaan tubuh, pakaian, benda-benda kotor lainnya bukanlah merupakan suatu infeksi tetapi menggambarkan telah terjadi kontaminasi terhadap permukaan tubuh atau barang tersebut.

Cacingan adalah salah satu jenis penyakit infeksi yang disebabkan oleh adanya cacing di dalam usus manusia. Penyakit ini mudah menular dari satu orang ke orang lain. Walaupun banyak dijumpai pada anak-anak, cacingan juga menginfeksi orang dewasa, terutama yang tidak begitu mempedulikan kebersihan (Mufidah, 2012).

Infeksi kecacingan adalah infeksi yang disebabkan oleh beberapa jenis cacing kelas Nematoda Usus khususnya yang penularannya melalui tanah, diantaranya cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), cacing cambuk (*Trichuris trichiura*), dan cacing tambang (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*) (Entjang, 2003).

2. Jenis Cacing Penyebab Cacingan

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, ditemukan bukti bahwa ada beberapa jenis cacing yang sering kali menyerang anak-anak. Adapun cacing tersebut adalah sebagai berikut:

a. Cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*)

Hospes defenitifnya hanya manusia, jadi manusia pada infeksi cacing ini sebagai hospes obligat. Cacing dewasanya berhabitat dirongga usus halus.

1) Morfologi dan Lingkaran Hidup

Cacing dewasa hidup didalam rongga usus halus manusia. Panjang cacing yang betina 20-40 cm dan cacing jantan 15-31 cm. cacing betina dapat bertelur sampai 200.000 butir sehari, yang dapat berlangsung selama masa hidupnya yaitu kira-kira 1 tahun. Telur ini tidak menetas di dalam tubuh manusia, tapi dikeluarkan bersama tinja hospes.

Telur cacing ini ada yang dibuahi, disebut *Fertilized*. Bentuk ini ada dua macam, yaitu mempunyai *cortex*, disebut *Fertilized-corticated* dan yang lain tidak mempunyai *cortex*, disebut *Fertilized-decorticated*. Ukuran telur ini 60 x 45 mikron. Telur yang tidak dibuahi disebut *unfertilized*, ukurannya lebih lonjong: 90 x 40 mikron dan tidak mengandung embrio di dalamnya.

2) Patologi dan gejala klinis

Infeksi *A. lumbricoides* akan menimbulkan penyakit *Ascariasis*. Penyakit ini menimbulkan gejala yang disebabkan oleh stadium larva dan stadium dewasa.

- a) Stadium larva, yaitu kerusakan pada paru-paru yang menimbulkan gejala yang disebut Sindroma Loffler yang terdiri dari batuk-batuk, eosinofil dalam darah meningkat.
- b) Stadium dewasa, biasanya terjadi gejala usus ringan. Pada infeksi berat, terutama pada anak-anak dapat terjadi malabsorpsi yang memperberat malnutrisi karena perampasan makanan oleh cacing dewasa. Bila cacing dewasa menumpuk dapat menimbulkan ileus obstruksi. Bila cacing nyasar ke tempat lain dapat terjadi infeksi ektopik pada apendiks dan *ductus choledochus* (Safar, 2010).

3) Epidemiologi

Telur *A. lumbricoides* keluar bersama tinja, pada tanah yang lembab dan tidak terkena sinar matahari langsung telur tersebut berkembang menjadi bentuk infeksi. Infeksi *A. lumbricoides* terjadi bila telur yang infeksi masuk melalui mulut bersama makanan atau minuman dan dapat pula melalui tangan yang kotor (Depkes, 2006).

b. Cacing cambuk (*Trichuris trichiura*)


Hospes definitifnya adalah manusia dan dapat menimbulkan Triachuriasis. Cacing ini pernah ditemukan pada babi dan kerbau. Cacing dewasa berhabitat di usus besar seperti Colon dan Caecum. Penyebaran secara kosmopolit, terutama di daerah panas dan lembab. Frekuensi di Indonesia 75-90% .

1) Morfologi dan Daur Hidup

Cacing betina 3,5-5 cm dan jantan 3,0-4,5 cm. Tiga per lima, anterior tubuh halus seperti benang, dua per lima bagian posterior tubuh lebih tebal, berisi usus dan perangkat alat kelamin. Cacing jantan tubuhnya membengkok ke depan hingga membentuk satu lingkaran penuh, satu spikula tunggal menonjol keluar melalui selaput rekraksi. Bagian posterior tubuh cacing betina membulat tumpul dan vulva terletak pada ujung anterior bagian yang tebal dari tubuhnya.

Seekor cacing betina dalam satu hari dapat bertelur 3000-4000 butir. Telur cacing ini berbentuk tempayan dengan semacam tutup yang jernih dan menonjol pada kedua kutub, besarnya 50 mikron. Telur ini di tanah dengan suhu optimum dalam waktu 3-6 minggu menjadi matang (infektif) (Safar, 2010). Cara infeksi langsung terjadi bila telur yang matang tertelan oleh manusia (*hospes*), kemudian *larva* akan keluar dari dinding telur dan masuk

ke dalam usus halus sesudah menjadi dewasa cacing turun ke usus bagian *distal* dan masuk ke *kolon asendens* dan *sekum*. Masa pertumbuhan mulai tertelan sampai menjadi cacing dewasa betina dan siap bertelur sekitar 30-90 hari. Cacing dewasa dapat hidup selama setahun dalam saluran usus (Gandahusada, 2006).



2) Patologi dan gejala klinis

Jika infeksi ringan, biasanya hanya timbul diare. Namun, apabila infeksi berat, sebagian besar permukaan usus besar akan mengandung cacing cambuk. Akibatnya, diare yang terjadi juga relatif berat dan dapat berlangsung terus menerus. Selain itu, dengan usus yang luka, akan terjadi anemia sebagai komplikasi perdarahan (Mufidah, 2012). Selain itu infeksi yang berat juga dapat menyebabkan nyeri perut, diare campur darah (kolitis), dan prolaps rectum (Mandal, 2008).

3) Epidemiologi

Yang penting untuk penyebaran penyakit adalah kontaminasi tanah dengan tinja. Telur tumbuh di tanah liat, tempat lembab, dan teduh dengan suhu optimum kira-kira 30 derajat *celcius*. Di berbagai negeri pemakaian tinja sebagai pupuk kebun merupakan sumber infeksi.

Frekuensi di Indonesia masih sangat tinggi. Di beberapa daerah pedesaan di Indonesia frekuensinya berkisar antara 30-90 %. Di daerah yang sangat endemik infeksi dapat dicegah dengan pengobatan penderita *trikuriasis*, pembuatan jamban yang baik dan pendidikan tentang sanitasi dan kebersihan perorangan, terutama anak. Mencuci tangan sebelum makan, mencuci dengan baik sayuran yang dimakan mentah adalah penting apalagi di negera-negera yang memakai tinja sebagai pupuk (Gandahusa, 2006).

Dahulu infeksi *Trichuris trichiura* sulit sekali diobati. Antihelminthik seperti *tiabendazol* dan *ditiazanin* tidak memberikan hasil yang memuaskan. Pengobatan yang dilakukan untuk infeksi yang disebabkan oleh *Trichuris trichiura* adalah *Albendazole*, *Mebendazole* dan *Oksantel pamoate* (Dachi, 2005).

c. Cacing tambang

Cacing tambang ada beberapa spesies yang penting diantaranya *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*, *Ancylostoma caninum*,


Ancylostoma braziliense dan *Ancylostoma ceylanicum*. Namun cacing tambang yang menginfeksi manusia yakni *Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus* (Safar, 2010).

Manusia merupakan satu-satunya pejamu *Ancylostoma duodenale* (cacing tambang yang umum) dan *Necator americanus*. Infeksi sering terjadi pada semua negara tropis dan subtropis yang tanahnya secara luas terkontaminasi dengan tinja manusia dan orang-orang sering berjalan tanpa alas kaki (Mandal, 2008).

a) Morfologi dan Daur Hidup

Ancylostoma duodenale ukurannya lebih besar dari *Necator americanus*. Yang betina ukurannya 10-13 mm x 0,6 mm, yang jantan 8-11 x 0,5 mm, bentuknya menyerupai huruf C, *Necator americanus* berbentuk huruf S, yang betina 9-11 x 0,4 mm dan yang jantan 7-9 x 0,3 mm. Rongga mulut *Ancylostoma duodenale* mempunyai 2 pasang gigi, *Necator americanus* mempunyai sepasang benda kitin. Alat kelamin pada yang jantan adalah tunggal yang disebut bursa copulatrix. *A. duodenale* betina dalam satu hari bertelur 10.000 butir, sedang *N. americanus* 9000 butir. Telur dari kedua spesies ini tidak dapat dibedakan, ukurannya 40-60 mikron, bentuk lonjong dengan dinding tipis dan jernih. Ovum dari telur yang baru dikeluarkan tidak bersegmen. Ditanah dengan suhu optimum 23°C-33°C, ovum akan berkembang menjadi 2, 4 dan 8

lobus. Telur ini ditanam pada suhu 0°C, dapat hidup dalam waktu/hari dan dapat hidup dalam beberapa hari pada suhu 45°C sedang pada suhu optimum 23°C-33°C dalam waktu 24-48 jam telur akan menetas dan keluar larva rhabditiform yang makan dari bahan sisa organik yang ada disekitarnya. Cacing ini mempunyai mulut yang terbuka. Dalam waktu 3-5 hari, larva menjadi lebih panjang dan kurus dengan mulut tertutup dan runcing. Larva ini disebut filiform yang infeksiif dan dapat hidup di tanah dengan suhu optimum dalam waktu 2 minggu, dan larva ini akan mati bila kemarau, kena panas langsung, atau banjir. Larva filariform ini dapat menembus kulit manusia lalu memasuki kapiler darah dan jantung kanan, kemudian akan mencapai paru-paru. Setelah melewati bronkus dan trakea, larva masuk ke laring akhirnya masuk ke usus halus dan tumbuh menjadi dewasa. Seekor cacing *A. Duodenale* mengisap darah dalam satu hari 0,2-0,3 ml, sedang *N. Americanus* hanya 0,05-0,1 ml (Safar, 2010).



b) Patologi dan Gejala klinis

Cacing tambang hidup dalam rongga usus halus. Selain mengisap darah, cacing tambang juga menyebabkan perdarahan pada luka tempat bekas tempat isapan. Infeksi oleh cacing tambang menyebabkan kehilangan darah secara perlahan-lahan sehingga penderita mengalami kekurangan darah (*anemia*) akibatnya dapat menurunkan gairah kerja serta menurunkan produktifitas. Kekurangan darah akibat cacingan sering terlupakan karena adanya penyebab lain yang lebih terfokus (Depkes, 2006).

Gejala klinis karena infeksi cacing tambang antara lain:

a. Stadium larva :

Bila banyak larva filiform sekaligus menembus kulit, maka terjadi perubahan kulit yang disebut ground itch yang dapat berupa bintik-bintik merah dan gatal.

b. Stadium dewasa :

Dapat menyebabkan terjadinya anemia hipokrom mikrositer dan eosinofilia (Gandahusada, 2006).

Gejala klinik yang disebabkan oleh cacing tambang dewasa juga dapat berupa nekrosis jaringan usus, gangguan gizi, dan kehilangan darah.

- 1) Nekrosis jaringan usus, yang lebih diakibatkan dinding jaringan usus yang terluka oleh gigitan cacing dewasa.

- 2) Gangguan gizi, penderita banyak kehilangan karbohidrat, lemak dan terutama protein, bahkan banyak unsur besi (Fe) yang hilang sehingga terjadi malnutrisi.
- 3) Kehilangan darah, darah yang hilang itu dikarenakan dihisap langsung oleh cacing dewasa (Onggowaluyo, 2001 dalam Sumanto, 2010)

Lesu, tidak bergairah, konsentrasi belajar kurang, pucat, rentan terhadap penyakit, prestasi kerja menurun, dan *anemia* merupakan manifestasi klinis yang sering terjadi. Di samping itu juga terdapat *eosinofilia* (Depkes, 2006).

c) Epidemiologi

Cacing ini terdapat hampir diseluruh daerah khatulistiwa, terutama di daerah pertambangan. Frekuensi cacing ini di Indonesia masih tinggi kira-kira 60-70%, terutama di daerah pertanian dan pinggir pantai (Safar, 2010).

Cacing ini menghisap darah hanya sedikit namun luka-luka gigitan yang berdarah akan bertahan lama, setelah gigitan dilepaskan dapat menyebabkan anemia yang lebih berat. Kebiasaan defekasi di tanah dan pemakaian tinja sebagai pupuk kebun sangat penting dalam penyebaran infeksi penyakit ini. Tanah yang baik untuk pertumbuhan *larva* adalah tanah gembur (pasir, humus) dengan suhu optimum untuk *N. americanus* 32°C-38°C, sedangkan

untuk *A. duodenale* lebih rendah 23°C-25°C, pada umumnya *A. duodenale* lebih kuat. Untuk menghindari infeksi dapat dicegah dengan memakai sandal atau sepatu (alas kaki) bila keluar rumah (Gandahusada, 2006).

3. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Cacingan

a) Personal hygiene

Didalam dunia keperawatan *personal hygiene* merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. *Personal hygiene* adalah kebersihan dan kesehatan perorangan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit pada diri sendiri maupun orang lain (Tarwoto dan Wartoh, 2006). *Personal hygiene* menjadi penting karena *personal hygiene* yang baik akan meminimalkan pintu masuk (*portal of entry*) mikroorganisme yang ada dimana-mana dan pada akhirnya mencegah seseorang terkena penyakit (Saryono, 2010). *Personal hygiene* yang tidak baik akan mempermudah tubuh terserang berbagai penyakit, seperti penyakit infeksi (misalnya cacingan), penyakit saluran cerna dan penyakit kulit (Nurjannah, 2012).

b) Sanitasi lingkungan

Kondisi sanitasi lingkungan sangat erat hubungannya dengan infestasi cacing. Hal ini dikarenakan sanitasi lingkungan yang tidak memadai dapat menjadi sumber penularan cacing pada tubuh manusia (Mardiana dan Djarismawati, 2008).

Penyakit cacingan biasanya terjadi di lingkungan yang kumuh terutama di daerah kota atau daerah pinggiran. Jumlah prevalensi *Ascaris lumbricoides* banyak ditemukan di daerah perkotaan dan jumlah prevalensi tertinggi ditemukan di daerah pinggiran atau pedesaan yang masyarakatnya sebagian besar masih hidup dalam kekurangan (Dachi, 2005).

Data Direktorat Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan memperlihatkan, kondisi sanitasi yang buruk memicu angka kematian anak akibat paparan penyakit cacingan diare, tipus dan polio. Khusus tentang prevalensi cacingan, Depkes, pada tahun 2007 menyebutkan sekitar 35,3 persen penduduk Indonesia diperkirakan terpapar cacingan (Sudarianto, 2012).

4. Akibat Cacingan

Pada umumnya, anak-anak yang terinfeksi cacingan akan mengalami gejala-gejala tertentu seperti lemah, letih, loyo dan lemas. Hal ini dikarenakan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh diserap oleh cacing, sehingga mengganggu pertumbuhan dan daya tahan tubuh. Akibatnya, mereka mudah sakit.

Secara umum, berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh infeksi cacing:

a) Lesu dan Lemas

Hal ini dikarenakan kurang darah (anemia). Penyebab utamanya ialah cacing tambang yang mengisap darah di dalam usus, sehingga membuat tubuh menjadi lemas karena kekurangan darah.

b) Berat Badan Rendah

Hal ini dikarenakan tubuh kekurangan gizi. Ketika cacing berada dalam usus, nutrisi makanan yang seharusnya diserap oleh tubuh, justru menjadi makanan cacing.

c) Batuk yang Tak Kunjung Sembuh

Terkadang, ada cacing yang dapat hidup di dalam paru-paru, sehingga menyebabkan batuk yang tak kunjung sembuh.

d) Nyeri di Perut

Keberadaan cacing di dalam usus juga dapat menimbulkan sakit perut, yang juga dapat menyebabkan diare (Mufidah, 2012).

B. Tinjauan Umum Tentang Personal Hygiene

1. Pengertian Personal Hygiene

Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata Personal yang artinya perorangan dan Hygiene berarti sehat. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebersihan perorangan atau personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan, baik fisik maupun psikisnya (Isro'in, 2012).

Sedangkan menurut Azrul Azwar, hygiene adalah usaha kesehatan masyarakat yang mempelajari pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, upaya mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan kesehatan tersebut, upaya mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan kesehatan tersebut, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin pemelihara kesehatan (Daud, 2001).

Departemen pendidikan nasional (2001) hygiene adalah ilmu tentang kesehatan dan berbagai usaha untuk mempertahankan dan memperbaiki kesehatan. Hygiene perorangan dapat tercapai bila seseorang mengetahui pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri, karena pada dasarnya hygiene adalah mengembangkan kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan (Yulianto, 2006).

Dalam Islam, kebersihan dijadikan sebagai salah satu ajaran pokok bagi seorang muslim, bukan semata-mata takut pada penyakit. Dengan demikian maka kebersihan menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dari ajaran ibadah dan puasa, bahkan Islam menjadikan sebagai bagian dari iman dalam hadis Rasul Muslim, Rasulullah saw. bersabda:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya:

“Kebersihan merupakan sebagian dari iman”.

Dari hadis tersebut, dikemukakan bahwa Islam merupakan agama yang membawa manusia pada hakikat kesucian. Baik kesucian yang bersifat lahiriah seperti wudhu dan mandi, ataupun kesucian yang sifatnya bathiniah, seperti kesucian hati dan jiwa (Al-Fanjari, 2006).

Islam merupakan akidah pertama, bahkan norma ilmiah pertama yang memperkenalkan dan memerintahkan prinsip steril yang diidentikkan dengan bersuci (thaharah). Yang dimaksud dengan istilah “bersuci” (thaharah) adalah membersihkan atau membebaskan sesuatu dari bakteri atau benda yang mengandung bakteri, sedang sesuatu yang kotor atau mengandung jamur diidentikkan dengan “najis” (Al-Fanjari, 2006).

Adapun cara bersuci (thaharah) diterangkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur’an surah Al-Maa-idah {5}: 6 yakni:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah...” (Depertemen Agama RI, 2009).

Ayat di atas memberi petunjuk tentang persiapan jasmani, yaitu dengan menjelaskan cara menyucikan diri dengan berwudhu. Dimana

apabila seseorang telah berniat dan membulatkan hati untuk melaksanakan shalat sedang saat itu ia dalam keadaan tidak suci/berhadas kecil, maka dianjurkan untuk berwudhu, yakni *basuhtah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku*, kemudian diperintahkan untuk membasuh sedikit atau sebagian atau seluruh kepala, kedua kaki sampai kedua mata kaki dan diperintahkan untuk membasahi seluruh bagian badan atau mandi apabila dalam keadaan *junub*. Dengan demikian maka seorang muslim yang akan melaksanakan shalat atau menghadap Allah swt. harus bersih dari najis dan bakteri yang melekat pada tubuhnya (Shihab, 2009).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa baik dalam Islam maupun di dunia kesehatan kebersihan atau kesucian merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan selain digunakan untuk sholat berwudhu dan membaca basmalah juga sebaiknya dilakukan sebelum makan agar seseorang bersih dari bakteri atau najis yang melekat pada tubuhnya dan makana yang dikonsumsi mendapat berkah dari Allah swt.

Kemudian pada ayat lain menjelaskan bahwa Allah swt. sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah {2}: 222, Allah swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

“... dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Depertemen Agama RI, 2009).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa bertaubat adalah menyucikan diri dari kotoran batin, sedang menyucikan diri dari kotoran lahir adalah mandi atau berwudhu. Ini berarti bahwa Islam ditegakkan atas prinsip kebersihan. Segala sesuatu harus dimulai dari kesucian, baik kesucian batiniah maupun kesucian fisik atau lahiriah (Shihab, 2009).

Sehingga ketika seseorang telah melakukan taubat kepada Allah swt. berarti ia telah menyucikan diri lahir dan bathin dari segala kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya.

Selain hadis dan ayat tersebut di atas masih banyak ayat yang menggambarkan pentingnya kebersihan dalam Islam. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kebersihan yaitu Q.S. Al-Mudatsir {74:4} :

ALA UDDIN
M A K A S S A R

وَتِيَابِكَ فَطَهَّرَ

Terjemahnya:

“Dan pakaianmu bersihkanlah.” (Depertemen Agama RI, 2009).

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa semua pemeluk agama, apapun agamanya, terlebih lagi Islam menyadari bahwa agama pada dasarnya menganjurkan kebersihan batin seseorang. Membersihkan pakaian tidak

akan banyak artinya jika badan seseorang kotor, selanjutnya membersihkan pakaian dan badan belum berarti jika jiwa masih ternodai oleh dosa. Ada orang yang ingin menempuh jalan pintas dengan berkata, ” yang penting adalah hati atau jiwa, biarlah badan atau pakaian kotor karena Tuhan tidak memandang kepada bentuk-bentuk lahir” . Sikap tersebut jelas tidak dibenarkan oleh ayat ini jika kita memahaminya dalam arti hakiki. Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa pengertian hakiki tersebut mengantar kepada keharusan memerhatikan kebersihan badan dan jiwa karena, jangankan jiwa atau badan, pakaianpun diperintahkan untuk dibersihkan. Disisi lain, dipahami dari petunjuk ayat ini bahwa seseorang yang bertugas melayani masyarakat dan membimbingnya harus memiliki penampilan yang menyenangkan, antara lain kebersihan pakaiannya (Shihab, 2009).

2. Macam-macam Personal Hygiene

- a) Perawatan kulit
- b) Perawatan kaki, tangan dan kuku
- c) Perawatan rongga mulut dan gigi
- d) Perawatan rambut
- e) Perawatan mata, telinga dan hidung.

3. Tujuan Personal Hygiene

- a) Meningkatkan derajat kesehatan seseorang
- b) Memelihara kebersihan diri seseorang

- c) Memperbaiki personal hygiene yang kurang
- d) Mencegah penyakit
- e) Meningkatkan rasa percaya diri
- f) Menciptakan keindahan (Isro'in, 2012).

Pada dasarnya ruang lingkup usaha personal hygiene dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian, yaitu:

- a. Hygiene badan, seperti usaha memelihara kebersihan tangan dan kuku, perawatan kebersihan kaki, rambut, gigi, mulut, mata dan lain-lain.
- b. Hygiene pakaian dan peralatan lain, seperti menghindari penggunaan secara lama dan atau yang kotor dari pakaian, maupun pakaian dalam, handuk dan sikat gigi.
- c. Hygiene makanan dan minuman yaitu sejak pemilahan bahan makanan hingga penyajiannya, kebiasaan tidak jajan, mencuci sayur lalapan secara bersih helai demi helai dengan menggunakan air yang mengalir dan lain-lain (waqiah, 2010).

Menurut Departemen Kesehatan R.I (2001) usaha pencegahan penyakit cacangan antara lain: menjaga kebersihan badan, kebersihan lingkungan dengan baik, makanan dan minuman yang baik dan bersih, memakai alas kaki, membuang air besar di jamban (kakus), memelihara kebersihan diri dengan baik seperti memotong kuku dan mencuci tangan sebelum makan. Kebersihan perorangan penting untuk pencegahan.

1. Kebiasaan Mencuci Tangan

Kebanyakan penyakit cacangan ditularkan melalui tangan yang kotor. Kebersihan tangan sangat penting karena tidak ada bagian tubuh lainnya yang paling sering kontak dengan mikroorganisme selain tangan (waqiah, 2010).

Cuci tangan dengan menggunakan air saja merupakan hal yang umum dilakukan di seluruh dunia. Namun ternyata kebiasaan ini kurang efektif dibandingkan dengan cuci tangan memakai sabun. Pasalnya, sabun dapat meluruhkan lemak dan kotoran yang mengandung kuman. Dengan penggunaan yang benar, semua sabun memiliki efektifitas yang sama dalam meluruhkan kuman-kuman penyebab penyakit.

Cuci tangan pakai sabun adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit diare dan pneumonia yang merupakan penyebab utama kematian anak. Setiap tahun, lebih dari 3,5 juta anak tidak dapat hidup hingga usianya yang ke-5 karena diare dan pneumonia.

Selain itu, perilaku cuci tangan pakai sabun, baik sebelum dan setelah makan, setelah bermain, setelah BAK/BAB harus dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga hingga sekolah. Dan untuk menanamkan perilaku ini lakukanlah pada anak-anak karena mereka akan merekamnya dalam ingatan dan menjadi agen perubahan.



Meski sudah sering cuci tangan, ternyata ada cara cuci tangan yang benar. Cara cuci tangan yang benar adalah dengan mencuci tangan di air mengalir:

- a) Buka keran air, basahi tangan dan berikan sabun,
- b) Gosok kedua punggung tangan,
- c) Lanjutkan dengan gosok jari satu persatu dengan menyatukan kedua telapak tangan,
- d) Gosok kedua buku-buku jari,
- e) Lanjutkan dengan menggosok ibu jari,
- f) Gosok jari di tengah telapak tangan lalu bilas dengan air dan lap hingga kering (Suzannita, 2013).

2. Kebiasaan Memakai Alas Kaki

Kulit merupakan tempat masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Tanah gembur (pasir, humus) merupakan tanah yang baik untuk pertumbuhan larva cacing. Jika seseorang menginjakkan kakinya ditanah tanpa menggunakan alas kaki dan jika kebersihan serta pemeliharaan kaki tidak diperhatikan maka dapat menjadi sasaran

pintu masuknya kuman-kuman penyakit ke dalam tubuh, termasuk larva cacing (Gandahusada, 2006).

Oleh karena itu, pemakaian alas kaki saat keluar rumah ataupun ke WC (water closet), serta perawatan dan pemeliharaan kaki sangat penting. Menyela-nyela jari-jari kedua telapak kaki adalah termasuk sunnah dalam bersuci, kemudian hendaknya seseorang tidak menginjakkan kakinya selain pada tempat yang suci.

Hindari berjalan tanpa memakai alas kaki karena dapat mencegah infeksi pada luka dan masuknya telur cacing pada kaki yang tidak beralas. Dengan memakai alas kaki, maka dapat memutuskan hubungan bibit penyakit ke dalam tubuh, sehingga infeksi kecacingan dapat dihindari (Waqiah, 2010).

3. Kebersihan Kuku

Kuku tangan yang panjang dan kotor menyebabkan tertimbunnya kotoran dan kuman penyakit. Islam adalah perintis pertama yang berbicara tentang bakteri dan kotoran yang dimasukkan kategori dengan istilah *khabats*, atau *khataya* (Al-Fanjari, 2006).

Telur cacing sering kali terselip pada kuku yang kotor. Kondisi ini sering terjadi pada anak yang sering bermain ditanah serta pada orang dewasa yang bekerja dikebun atau disawah (Nadesul, 2000).

Telur cacing yang berada di tanah dapat pindah ke sela-sela jemari tangan atau terselip pada kuku. Sehingga saat memakan

makanan, telur cacing yang melekat dibawah kuku yang panjang dan kotor akan ikut tertelan bersama makanan yang dimakan. Oleh karena itu, kuku sebaiknya selalu dipotong pendek dan dijaga kebersihannya dengan menggunakan pemotong kuku atau gunting tajam, jika ada jaringan yang kering disekitar kuku maka dioleskan *lotion* atau minyak mineral, kuku direndam jika tebal dan kasar untuk menghindari penularaninfeksi cacing dari tangan ke mulut (Waqiah, 2010).

4. Kebersihan Jajanan

Budaya jajan menjadi bagian dari keseharian hampir semua kelompok usia dan kelas sosial, termasuk anak usia sekolah dan golongan remaja (Titi S, 2004 dalam Afandi, 2012). Hampir semua anak usia sekolah suka jajan (91,1 persen), selain nilai gizi makanan jajanan yang relatif rendah, keamanan pangan makanan jajanan juga menjadi masalah. Hasil penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyimpulkan bahwa persentase makanan jajanan anak Sekolah Dasar (SD) yang dicampur dengan berbagai zat berbahaya masih sangat tinggi. Sebagai salah satu alternatif makanan bagi anak sekolah, nilai gizi dan nilai keamanan maka makanan jajanan masih perlu mendapat perhatian (Muhilal dkk, 2006 dalam Afandi, 2012).

Penyakit yang diderita oleh anak SD terkait perilaku jajanan yang tidak sehat salah satu diantaranya adalah cacingan yang mencapai

40-60 persen. Akibat perilaku yang tidak sehat ini dapat pula menimbulkan persoalan yang lebih serius seperti ancaman penyakit menular pada anak usia sekolah (Depkes, 2005).

Perilaku anak jajan di sembarang tempat yang kebersihannya tidak dapat dikontrol oleh orang tua, tidak terlindung dan dapat tercemar oleh debu dan kotoran yang mengandung telur cacing, juga dapat menjadi sumber penularan infeksi kecacingan pada anak. Selain melalui tangan, transmisi telur cacing juga dapat melalui makanan dan minuman, terutama makanan jajanan yang tidak dikemas dan tidak tertutup rapat. Telur cacing yang ada di tanah/debu akan sampai pada makanan tersebut jika diterbangkan oleh angin atau dapat juga melalui alat yang sebelumnya hinggap di tanah/selokan, sehingga kaki-kakinya membawa telur cacing tersebut, terutama pada jajanan yang tidak tertutup (Endriani, 2012).

5. Kebiasaan Defekasi/Buang Air Besar

Perilaku defekasi (buang air besar) yang kurang baik dan di sembarang tempat diduga menjadi faktor risiko dalam infeksi cacing. Secara teoritik, telur cacing memerlukan media tanah untuk perkembangannya. Adanya telur cacing pada tinja penderita yang melakukan aktifitas defekasi di tanah terbuka semakin memperbesar peluang penularan larva cacing pada masyarakat di sekitarnya (Maryanti, 2006).

Penyebaran penyakit cacingan dapat melalui terkontaminasinya tanah dengan tinja yang mengandung telur *Trichuris trichiura*, telur tumbuh dalam tanah liat yang lembab dan tanah dengan suhu optimal $\pm 30^{\circ}\text{C}$ (Depkes R.I, 2004 dalam Dachi, 2005). Tanah liat dengan kelembapan tinggi dan suhu yang berkisar antara 25°C - 30°C sangat baik untuk berkembangnya telur *Ascaris lumbricoides* sampai menjadi bentuk infeksi (Gandahusada, 2000). Sedangkan untuk pertumbuhan larva *Necator americanus* yaitu memerlukan suhu optimum 28°C - 32°C dan tanah gembur seperti pasir atau humus, dan untuk *Ancylostoma duodenale* lebih rendah yaitu 23°C - 25°C tetapi umumnya lebih kuat (Gandahusada, 2006).

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Penelitian

Cacingan adalah salah satu jenis penyakit infeksi yang disebabkan oleh adanya cacing di dalam usus manusia yang ditularkan melalui tanah (*Soil Transmitted Helminths*) yakni cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), cacing cambuk (*Trichuris trichiura*), dan cacing tambang (*Anchylostoma duodenale/Necator americanus*).


Tingginya prevalensi kecacingan di Indonesia karena daerah ini beriklim tropis dan berkelembaban tinggi, personal hygiene dan sanitasi lingkungan kurang terutama di daerah kumuh dan pedesaan, penyuluhan kesehatan yang kurang dan kepadatan penduduk yang berlebihan.

Infeksi cacing usus dapat terjadi dengan menelan telur cacing, karena mulut dengan berbagai alat, minuman atau makanan yang terkontaminasi atau kontak langsung dengan tubuh pada saat anak melakukan aktifitasnya. Anak dapat terinfeksi cacing karena tidak memperhatikan kebersihan diri atau *personal hygiene* yang terdiri dari kebiasaan mencuci tangan, pemakaian alas kaki, kebersihan kuku, kebersihan jajanan dan kebiasaan BAB.

Variable yang diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Variable terikat (*dependent variable*), yakni kejadian cacangan
2. Variable bebas (*independent variable*), yakni personal hygiene yang terdiri dari kebiasaan mencuci tangan, pemakaian alas kaki, kebersihan kuku, kebersihan jajanan dan kebiasaan BAB.

Berdasarkan konsep pemikiran seperti yang disebut di atas, maka di susunlah pola pikir variable yang diteliti sebagai berikut:



Keterangan :




: variabel terikat (*dependent variable*)



: variabel bebas (*independent variable*)



: variabel yang tidak diteliti

B. Kerangka Keja

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Obyektif

1. Personal hygiene

Yaitu kebiasaan responden memelihara kesehatan dan kebersihan diri dengan membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun, menggunakan alas kaki, membersihkan kuku, tidak jajan sembarangan dan kebiasaan BAB yang baik dalam lima bulan terakhir.

Kriteria Objektif

Personal hygiene dalam penelitian ini dinyatakan:

- a. Baik : Jika terpenuhi 3 dari 5 kriteria diatas.
- b. Buruk : Jika hanya 2 kriteria atau tidak ada kriteria yang terpenuhi.

2. Kebiasaan mencuci tangan

Yaitu kebiasaan responden mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar dan setelah bermain ditanah menggunakan sabun dan air mengalir dalam lima bulan terakhir.

Kriteria Objektif

Perilaku mencuci tangan dalam penelitian ini dinyatakan:

- a. Baik : Jika dalam wawancara responden menjawab selalu mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar dan setelah bermain ditanah menggunakan sabun.
- b. Buruk : Jika hanya 1 kriteria atau tidak ada kriteria yang terpenuhi.

3. Memakai alas kaki

Yaitu kebiasaan responden menggunakan alas kaki setiap keluar rumah dan pada waktu istirahat sekolah dalam lima bulan terakhir.

Kriteria Objektif

Kebiasaan memakai alas kaki dalam penelitian ini dinyatakan:

- a. Baik : Jika dalam wawancara responden menjawab selalu menggunakan alas kaki setiap keluar rumah dan pada waktu istirahat sekolah dalam lima bulan terakhir.
- b. Buruk : Jika tidak sesuai dengan kriteria di atas.

4. Kebersihan kuku

Yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh responden untuk memotong dan membersihkan kuku tangan dan kuku kaki sekali seminggu serta tidak menggigit kuku dalam lima bulan terakhir.

Kriteria Objektif

Kebiasaan membersihkan kuku dalam penelitian ini dinyatakan:

- a. Baik : Jika dalam wawancara responden menjawab memotong dan membersihkan kuku sekali seminggu serta tidak menggigit kukunya.
- b. Buruk : Jika hanya 1 kriteria atau tidak ada kriteria yang terpenuhi.

5. Kebersihan Jajanan

Yaitu suatu tindakan yang dilakukan responden untuk tidak jajan sembarangan dan membeli jajanan yang terbungkus atau tertutup dalam lima bulan terakhir.

Kriteria Objektif

Kebiasaan jajan dalam penelitian ini dinyatakan:

- a. Bersih : Jika dalam wawancara responden menjawab tidak suka jajan sembarangan dan hanya membeli jajan yang terbungkus atau tertutup.
 - b. Tidak bersih : Jika tidak sesuai kriteria diatas.
6. Kebiasaan Defekasi/BAB

Yaitu suatu tindakan yang dilakukan responden buang air besar atau defekasi di WC dan mencuci tangan setelah buang air besar dengan sabun dan air bersih dalam lima bulan terakhir.

Kriteria Objektif

Kebiasaan defekasi dalam penelitian ini dinyatakan:

- a. Baik : Jika dalam wawancara responden menjawab buang air besar di WC dan mencuci tangan setelah buang air besar dengan sabun dan air bersih dalam lima bulan terakhir.
- b. Buruk : Jika tidak sesuai kriteria diatas.

7. Infeksi cacing

Infeksi cacing adalah kejadian cacingan pada responden yang telah didiagnosis oleh petugas kesehatan selama lima bulan terakhir yang diambil dari rekam medik (data sekunder) di Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.

Kriteria Objektif

- a. Terinfeksi cacing : Jika anak terdiagnosa cacingan dipuskesmas Tamangapa Antang Makassar.
- b. Tidak terinfeksi cacing : Jika tidak sesuai dengan kriteria diatas.

D. Hipotesis Penelitian

1. Ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan cacingan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.
2. Ada hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki dengan cacingan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.
3. Ada hubungan antara kebersihan kuku dengan cacingan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.
4. Ada hubungan antara kebersihan jajanan dengan cacingan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.
5. Ada hubungan antara kebiasaan defekasi/BAB dengan cacingan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitiannya. Dalam pengertian lebih sempit desain penelitian mengacu pada jenis atau macam penelitian yang dipilih untuk mencapai tujuan penelitian (Notoatmodjo, 2005).

Berdasarkan tujuan penelitian, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan *case control* yakni suatu penelitian (survey) analitik dimana dilakukan identifikasi subjek (kasus) yang telah terkena penyakit (efek), kemudian ditelusuri secara retrospektif ada atau tidak adanya faktor resiko yang berperan.

Adapun gambaran desain penelitian ini yaitu menggunakan desain penelitian kasus kontrol (*case control*), sering juga disebut *retrospektive study*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik observasional yang menelaah hubungan antara efek (penyakit atau kondisi kesehatan) tertentu dengan faktor resiko tertentu. Penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi pasien (anak) dengan efek atau penyakit tertentu (yang disebut sebagai kasus) dan kelompok tanpa efek (disebut sebagai kontrol), kemudian secara

retrospektif diteliti faktor risiko yang dapat menerangkan mengapa kasus terkena efek, sedang kontrol tidak.

B. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian mulai bulan 26 Juni sampai 02 Juli 2013 di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak yang terdiagnosa cacangan di Puskesmas Tamangapa pada bulan Januari sampai Mei 2013 sebanyak 40 kasus dan sebanyak 40 anak yang tidak cacangan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar. Subyek penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu populasi kasus (*case*) dan populasi kontrol (*control*).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang

diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 *case* dan 40 anak sebagai *control* di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.

D. Teknik Sampling

Sampling adalah proses menyeleksi responden dari populasi untuk dapat mewakili populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan total sampling yaitu sebanyak 80 anak, dengan kelompok kasus sebanyak 40 anak dan kelompok kontrol sebanyak 40 anak.

1) Sampel kasus

Sampel kasus dalam penelitian ini ditentukan dengan kriteria:

a) Inklusi sebagai berikut:

Anak yang terdiagnosa cacangan di Puskesmas Tamangapa Antang Makassar selama 5 bulan terakhir dan dapat diajak berkomunikasi.

b) Eksklusi sebagai berikut:

Tidak bersedia menjadi responden.

2) Sampel kontrol

Sampel kontrol dalam penelitian ini ditentukan dengan kriteria:

a) Inklusi sebagai berikut:

Anak yang tidak cacian tetapi beresiko mengalami cacian di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.

b) Eksklusi sebagai berikut:

Anak yang tidak cacian yang tidak bersedia menjadi responden di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.

E. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada responden dengan menggunakan skala guttman.

2. Data Sekunder

Data penunjang lainnya diperoleh dari instansi terkait dengan objek penelitian yakni Puskesmas Tamangapa Antang Makassar.

F. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan penyajian datanya dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentasi dengan pengolahan tabel. Data yang diolah secara sistematis terlebih dahulu dinyatakan dalam langkah –langkah sebagai berikut:

a. Seleksi

Seleksi bertujuan mengklasifikasi data yang masuk menurut kategori.

b. Editing

Editing merupakan langkah pengecekan kembali terhadap data yang telah masuk dalam usaha melengkapi data yang masih kurang. Memeriksa data, memeriksa jawaban, memperjelas dan melakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan kemudian memeriksa kelengkapan dan kesalahan.

c. Koding

Koding adalah pemberian nilai pada opsi-opsi yang telah lengkap. Setelah proses koding selesai data kemudian ditabulasi atau diolah dalam tabel, selanjutnya diuraikan dari presentasi dan hasil perhitungan tersebut.

d. Tabulasi

Tabulasi adalah penyesuaian data yang merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa sehingga mudah dijumlah, disusun dan ditata untuk disajikan dan dianalisis.

2) Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisa Univariat

Analisa univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisa ini menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel yang diteliti

b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan pada tiap variabel yang diteliti dan dihubungkan dengan kejadian cacangan pada anak. Analisis ini digunakan untuk melihat besarnya resiko antara variabel yang diteliti dengan kejadian cacangan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar (Arikunto, 2006).

Hubungan antar variabel dapat diketahui dengan uji statistik *Chi Square* (X^2) dengan batas kemaknaan (α) 0,05 dengan menggunakan sistem komputerisasi SPSS *for Windows*. *Chi Square* adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan dependen. Untuk melihat kejelasan tentang dinamika hubungan antara faktor resiko dan efek dilihat melalui nilai rasio odds (OR). Dasar pengambilan hipotesis penelitian berdasarkan pada tingkat signifikan (nilai ρ), yaitu jika nilai $\rho \leq 0,05$ berarti hipotesis penelitian diterima. Adapun interpretasi *Odds Ratio* (OR) adalah sebagai berikut:

- 1) Bila OR =1, variabel yang diduga faktor resiko tersebut tidak berpengaruh dalam terjadinya efek (tidak ada hubungan).

- 2) Bila $OR > 1$, dan rentang interval kepercayaan tidak mencakup angka 1, berarti *exposure* merupakan faktor resiko terjadinya efek.
- 3) Bila $OR < 1$, dan rentang interval kepercayaan tidak mencakup angka 1, berarti *exposure* yang diteliti dapat mengurangi terjadinya efek (faktor pencegah).

G. Penyajian Data

Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan tabel dalam bentuk narasi.

H. Etika Penelitian

Komite Nasional Etika Penelitian (2007) membagi menjadi empat etika yang harus ada dalam melakukan penelitian kesehatan meliputi :

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*).

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari:

- a. Penjelasan manfaat penelitian.
- b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan.

- c. Penjelasan manfaat yang akan didapatkan.
- d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian.
- e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja.
- f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.

Namun kadangkala, formulir persetujuan subyek tidak cukup memberikan proteksi bagi subyek itu sendiri terutama untuk penelitian-penelitian klinik karena terdapat perbedaan pengetahuan dan otoritas antara peneliti dengan subyek. Kelemahan tersebut dapat diantisipasi dengan adanya prosedur penelitian.

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*).

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan, tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan

koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*).

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi

subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *observasional* untuk mengetahui adanya hubungan antara personal hygiene dengan kejadian cacangan pada anak dengan pendekatan *case control*. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2013 di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar. Data dikumpulkan dari sampel yang berjumlah 80 responden, dimana sebanyak 40 anak menjadi kasus dan 40 anak sebagai kontrol dan memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Dimana teknik pengambilan sampel adalah dengan cara *total sampling* yang merupakan suatu cara pengumpulan sampel dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel atau objek penelitian. Hasil penelitian ini diperoleh dengan cara langsung ke rumah responden dan membagikan kuesioner yang kemudian diisi oleh responden. Setelah semua data terkumpul maka dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kemudian data diolah dan dianalisa secara univariat dan bivariat. adapun hasil penelitian ini disajikan dengan pola analisis yang telah dirumuskan yaitu karakteristik responden, analisis univariat dan analisis bivariat. Berikut ini peneliti akan menyajikan analisa data terhadap setiap variabel.

1. Karakteristik Responden

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar Tahun 2013

Karakteristik	Cacingan (<i>case</i>)		Tidak Cacingan (<i>control</i>)	
	N	%	n	%
Jenis kelamin				
Laki-laki	22	55	22	55
Perempuan	18	45	18	45
Jumlah	40	100	40	100
Umur				
5-8 tahun	16	40	16	40
9-12 tahun	24	60	24	60
Jumlah	40	100	40	100
Pendidikan				
SD	40	100	40	100
Jumlah	40	100	40	100

Sumber: Data Primer dan Sekunder

Berdasarkan tabel 5.1 di atas pada kelompok kasus dan kontrol menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 22 anak atau 55 persen dan responden terbesar terdapat pada kelompok kasus dan kontrol yaitu pada kelompok umur 9-12 tahun sebanyak 24 anak atau 60 persen serta tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah seluruh responden duduk dibangku sekolah dasar (SD) sebanyak 40 anak atau 100 persen dari kelompok kasus dan kelompok kontrol.

2. Analisis Univariat

Analisis Univariat dilakukan untuk menilai distribusi frekuensi dari variabel-variabel yang relevan dengan penelitian dan tujuan penelitian, sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

a. Kebiasaan Mencuci tangan

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebiasaan Mencuci Tangan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar Tahun 2013

Kebiasaan Mencuci Tangan	Cacingan (<i>case</i>)		Tidak Cacingan (<i>Control</i>)	
	n	%	n	%
Baik	2	5	20	50
Buruk	38	95	20	50
Jumlah	40	100	40	100

Sumber: Data Primer

Tabel 5.2 menunjukkan pada kelompok kasus terdapat 2 anak atau 5 persen memiliki kebiasaan mencuci tangan yang baik dalam lima bulan terakhir dan terdapat 38 anak atau 95 persen yang memiliki kebiasaan mencuci tangan yang buruk. Sedangkan pada kelompok kontrol sebanyak 20 atau 50 persen anak yang memiliki kebiasaan mencuci tangan yang baik dan sebanyak 20 atau 50 persen anak juga memiliki kebiasaan mencuci tangan yang buruk.

b. Memakai Alas Kaki

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebiasaan Memakai Alas Kaki di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar Tahun 2013

Kebiasaan Memakai Alas Kaki	Cacingan (<i>case</i>)		Tidak Cacingan (<i>Control</i>)	
	n	%	n	%
Baik	2	5	22	55
Buruk	38	95	18	45
Jumlah	40	100	40	100

Sumber: Data Primer

Tabel 5.3 menunjukkan pada kelompok kasus yang memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang baik dalam lima bulan terakhir yaitu sebanyak 2 anak atau 5 persen dan yang memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang buruk dalam lima bulan terakhir yaitu sebanyak 38 anak atau 95 persen. Sedangkan pada kelompok control yang memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang baik sebanyak 22 anak atau 55 persen dan yang memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang buruk sebanyak 18 anak atau 45 persen.

c. Kebersihan Kuku

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebersihan Kuku di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar Tahun 2013

Kebersihan Kuku	Cacingan (<i>case</i>)		Tidak Cacingan (<i>Control</i>)	
	n	%	n	%
Baik	9	22,5	29	72,5
Buruk	31	77,5	11	27,5
Jumlah	40	100	40	100

Sumber: Data Primer

Tabel 5.4 menunjukkan pada kelompok kasus yang memiliki kebersihan kuku yang baik dalam lima bulan terakhir yaitu sebanyak 9 anak atau 22,5 persen dan yang memiliki kebersihan kuku yang buruk sebanyak 31 anak atau 77,5 persen. Sedangkan pada kelompok kontrol yang memiliki kebersihan kuku yang baik sebanyak 29 anak atau 72,5 persen yang memiliki kebersihan kuku yang buruk sebanyak 11 anak atau 27,5 persen.

d. Kebersihan Jajanan

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebersihan Jajanan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar Tahun 2013

Kebersihan Jajanan	Cacingan (<i>case</i>)		Tidak Cacingan (<i>Control</i>)	
	n	%	n	%
Bersih	1	2,5	20	50
Tidak bersih	39	97,5	20	50
Jumlah	40	100	40	100

Sumber: Data Primer

Tabel 5.5 menunjukkan pada kelompok kasus yang memiliki kebersihan jajanan dalam lima bulan terakhir yaitu sebanyak 1 anak atau 2,5 persen dan yang memiliki jajanan yang tidak bersih sebanyak 39 anak atau 97,5 persen. Sedangkan pada kelompok kontrol yang memiliki kebersihan jajanan yaitu sebanyak 20 anak atau 50 persen dan yang memiliki jajanan yang tidak bersih juga sebanyak 20 anak atau 50 persen.

e. Kebiasaan Defekasi/BAB

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebiasaan Defekasi di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar Tahun 2013

Kebiasaan Defekasi/BAB	Cacingan (<i>case</i>)		Tidak Cacingan (<i>Control</i>)	
	n	%	n	%
Baik	5	12,5	19	47,5
Buruk	35	87,5	21	52,5
Jumlah	40	100	40	100

Sumber: Data Primer

Tabel 5.6 menunjukkan pada kelompok kasus yang memiliki kebiasaan defekasi/BAB yang baik dalam lima bulan terakhir yaitu sebanyak 5 anak atau 12,5 persen dan yang memiliki kebiasaan defekasi/BAB yang buruk sebanyak 35 anak atau 87,5 persen. Sedangkan pada kelompok kontrol yang memiliki kebiasaan defekasi/BAB yang baik yaitu sebanyak 19 anak atau 47,5 persen dan yang memiliki Kebiasaan Defekasi/BAB yang buruk sebanyak 21 anak atau 52,5.

f. Personal Hygiene

Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Personal Hygiene di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar Tahun 2013

S Personal Hygiene m	Cacingan (<i>case</i>)		Tidak Cacingan (<i>Control</i>)	
	n	%	n	%
b Baik	2	5	21	52,5
r Buruk	38	95	19	47,5
Jumlah	40	100	40	100

Data Primer dan Sekunder

Berdasarkan tabel 5.7 di atas menunjukkan pada kelompok kasus yang memiliki *personal hygiene* baik dalam lima bulan terakhir sebanyak 2 anak atau 5 persen dan yang memiliki *personal hygiene* buruk sebanyak 38 anak atau 95 persen. Sedangkan pada kelompok kontrol yang memiliki *personal hygiene* baik dalam lima bulan terakhir sebanyak 21 anak atau 52,5 persen dan yang memiliki *personal hygiene* buruk sebanyak 19 anak atau 47,5 persen.

3. **Analisis Bivariat**

Analisis bivariat dilakukan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel dalam penelitian ini, yaitu *personal hygiene* dengan kejadian cacingan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar. Analisis bivariat dilakukan untuk mencari hubungan antara kedua variabel yang diteliti. Uji yang dilakukan dalam mencari hubungan antara kedua variabel adalah dengan menggunakan uji statistik dengan *Chi-Square*

kemudian ditentukan kekuatan hubungannya dengan mencari *Odds Ratio* (*OR*). Adapun hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Hubungan Personal Hygiene dengan Kejadian Cacingan

Tabel 5.8 Hasil Uji Chi-Square dan Uji OR Hubungan Personal Hygiene dengan Kejadian Cacingan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar (n= 40)

Pesonal Hygiene	Cacingan (<i>case</i>)		Tidak Cacingan (<i>Control</i>)		P	OR
	n	%	n	%		
Baik	2	5	21	52,5	0,000	21,000
Buruk	38	95	19	47,5		

Sumber: Data Primer, 2013

Dari hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kasus yang memiliki *personal hygiene* baik dalam lima bulan terakhir sebanyak 2 anak atau 5 persen dan yang memiliki *personal hygiene* buruk sebanyak 38 anak atau 95 persen. Sedangkan pada kelompok kontrol yang memiliki *personal hygiene* baik dalam lima bulan terakhir sebanyak 21 anak atau 52,5 persen dan yang memiliki *personal hygiene* buruk sebanyak 19 anak atau 47,5 persen.

Hasil uji statistik dengan *pearson chi-square* antara variabel *personal hygiene* dengan kejadian cacingan diperoleh nilai p sebesar 0,000. Karena nilai $p < 0,05$ yaitu 0,000 ($OR = 21,000$, 95%CI 4,5-99,1), maka hipotesis alternatif diterima. Sehingga *personal hygiene* merupakan faktor resiko terjadinya efek sebab $OR > 1$. Nilai OR sebesar 21,0, hal ini berarti anak

yang memiliki personal hygiene yang buruk memiliki kemungkinan 21 kali lebih besar mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang memiliki personal hygiene yang baik.

b. Hubungan Antara Kebiasaan Mencuci Tangan dengan Kejadian Cacingan

Tabel 5.9 Hasil Uji Chi-Square dan Uji OR Hubungan Kebiasaan Mencuci Tangan dengan Kejadian Cacingan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar (n= 40)

Kebiasaan Mencuci Tangan	Cacingan (<i>case</i>)		Tidak Cacingan (<i>Control</i>)		P	OR
	n	%	n	%		
Baik	2	5	20	50	0,000	19,000
Buruk	38	95	20	50		

Sumber: Data Primer, 2013

Dari hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kasus terdapat 2 anak atau 5 persen memiliki kebiasaan mencuci tangan yang baik dalam lima bulan terakhir dan terdapat 38 anak atau 95 persen yang memiliki kebiasaan mencuci tangan yang buruk. Sedangkan pada kelompok kontrol sebanyak 20 atau 50 persen anak yang memiliki kebiasaan mencuci tangan yang baik dan sebanyak 20 atau 50 persen anak juga memiliki kebiasaan mencuci tangan yang buruk.

Hasil uji statistik dengan *pearson chi-square* antara variabel kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian cacingan diperoleh nilai p sebesar 0,000. Karena nilai $p < 0,05$ yaitu 0,000 (OR= 19,000, 95%CI 4,0-89,6), maka

hipotesis alternatif diterima. Sehingga kebiasaan mencuci tangan merupakan faktor resiko terjadinya efek sebab OR > 1. Nilai OR sebesar 19,0 hal ini berarti anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan, setelah BAB dan setelah bermain ditanah memiliki kemungkinan 19 kali lebih besar mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang mencuci tangan.

c. Hubungan Antara Kebiasaan Memakai Alas Kaki dengan Kejadian Cacingan

Tabel 5.10 Hasil Uji Chi-Square dan Uji OR Hubungan Kebiasaan Memakai Alas Kaki dengan Kejadian Cacingan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar (n= 40)

Kebiasaan Memakai Alas Kaki	Cacingan (<i>case</i>)		Tidak Cacingan (<i>Control</i>)		P	OR
	N	%	N	%		
Baik	2	5	22	55	0,000	23,222
Buruk	38	95	18	45		

Sumber: Data Primer, 2013

Dari hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kasus yang memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang baik dalam lima bulan terakhir yaitu sebanyak 2 anak atau 5 persen dan yang memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang buruk dalam lima bulan terakhir yaitu sebanyak 38 anak atau 95 persen. Sedangkan pada kelompok control yang memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang baik sebanyak 22 anak atau 55 persen dan yang memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang buruk sebanyak 18 anak atau 45 persen.

Hasil uji statistik dengan *pearson chi-square* antara variabel kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian cacingan diperoleh nilai p sebesar 0,000. Karena nilai $p < 0,05$ yaitu 0,000 (OR= 23,222, 95%CI 4,92-109,67), maka hipotesis alternatif diterima. Sehingga kebiasaan memakai alas kaki merupakan faktor resiko terjadinya efek sebab OR > 1 . Nilai OR sebesar 23,2 hal ini berarti anak yang tidak memakai alas kaki memiliki kemungkinan 23,2 kali lebih besar mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang memakai alas kaki.

d. Hubungan Antara Kebersihan Kuku dengan Kejadian Cacingan

Tabel 5.11 Hasil Uji Chi-Square dan Uji OR Hubungan Kebersihan Kuku dengan Kejadian Cacingan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar (n= 40)

Kebersihan Kuku	Cacingan (<i>case</i>)		Tidak Cacingan (<i>Control</i>)		ρ	OR
	N	%	N	%		
Baik	9	22,5	29	72,5	0,000	9,081
Buruk	31	77,5	11	27,5		

Sumber: Data Primer, 2013

Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kasus yang memiliki kebersihan kuku yang baik dalam lima bulan terakhir yaitu sebanyak 9 anak atau 22,5 persen dan yang memiliki kebersihan kuku yang buruk sebanyak 31 anak atau 77,5 persen. Sedangkan pada kelompok kontrol yang memiliki kebersihan kuku yang baik sebanyak 29 anak atau 72,5 persen yang memiliki kebersihan kuku yang buruk sebanyak 11 anak atau 27,5 persen.

Hasil uji statistik dengan *pearson chi-square* antara variabel kebersihan kuku dengan kejadian cacangan diperoleh nilai p sebesar 0,000. Karena nilai $p < 0,05$ yaitu 0,000 (OR= 9,081, 95%CI 3,3-25,1), maka hipotesis alternatif diterima. Sehingga kebersihan kuku merupakan faktor resiko terjadinya efek sebab OR > 1 . Nilai OR sebesar 9,081 hal ini berarti anak dengan kuku yang kotor memiliki kemungkinan 9,1 kali lebih besar mengalami cacangan dibandingkan dengan anak yang memiliki kuku yang bersih.

e. Hubungan Antara Kebersihan Jajanan dengan Kejadian Cacangan

Tabel 5.12 Hasil Uji Chi-Square dan Uji OR Hubungan Kebiasaan Jajan dengan Kejadian Cacangan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar (n= 40)

Kebersihan Jajanan	Cacangan (<i>case</i>)		Tidak Cacangan (<i>Control</i>)		ρ	OR
	N	%	N	%		
Bersih	1	2,5	20	50	0,000	39,000
Tidak bersih	39	97,5	20	50		

Sumber: Data Primer, 2013

Dari hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kasus yang memiliki kebersihan jajanan dalam lima bulan terakhir yaitu sebanyak 1 anak atau 2,5 persen dan yang memiliki jajanan yang tidak bersih sebanyak 39 anak atau 97,5 persen. Sedangkan pada kelompok kontrol yang memiliki kebersihan jajanan yaitu sebanyak 20 anak atau 50 persen dan yang memiliki jajanan yang tidak bersih juga sebanyak 20 anak atau 50 persen.

Hasil uji statistik dengan *pearson chi-square* antara variabel kebersihan jajanan dengan kejadian cacangan diperoleh nilai p sebesar 0,000. Karena nilai $p < 0,05$ yaitu 0,000 (OR= 39,000, 95%CI 3,3-25,1), maka hipotesis alternatif diterima. Sehingga kebersihan jajanan merupakan faktor resiko terjadinya efek sebab OR > 1 . Nilai OR sebesar 39,0 hal ini berarti anak yang memiliki jajanan yang tidak bersih kemungkinan 39 kali lebih besar mengalami cacangan dibandingkan dengan anak yang memiliki jajanan yang bersih.

f. Hubungan antara kebiasaan Defekasi/BAB dengan kejadian cacangan

Tabel 5.13 Hasil Uji Chi-Square dan Uji OR Hubungan Kebiasaan Defekasi/BAB dengan Kejadian Cacangan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar (n= 40)

S u m b	Cacangan (<i>case</i>)		Tidak Cacangan (<i>Control</i>)		ρ	OR
	N	%	N	%		
	Baik <i>e</i>	5	12,5	19		
Buruk <i>r</i>	35	87,5	21	52,5		

:
Data Primer, 2013

Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kasus yang memiliki kebiasaan defekasi/BAB yang baik dalam lima bulan terakhir yaitu sebanyak 5 anak atau 12,5 persen dan yang memiliki kebiasaan defekasi/BAB yang buruk sebanyak 35 anak atau 87,5 persen. Sedangkan pada kelompok kontrol yang memiliki kebiasaan defekasi/BAB yang baik yaitu sebanyak 19 anak

atau 47,5 persen dan yang memiliki kebiasaan defekasi/BAB yang buruk sebanyak 21 anak atau 52,5 persen.

Hasil uji statistik dengan *pearson chi-square* antara variabel kebiasaan BAB dengan kejadian cacingan diperoleh nilai ρ sebesar 0,001. Karena nilai $\rho < 0,05$ yaitu 0,001 (OR= 6,333, 95%CI 2,1-19,1), maka hipotesis alternatif diterima. Sehingga kebiasaan jajan merupakan faktor resiko terjadinya efek sebab OR > 1 . Nilai OR sebesar 6,3 hal ini berarti anak dengan kebiasaan defekasi/BAB yang buruk memiliki kemungkinan 6,3 kali lebih besar mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang memiliki kebiasaan defekasi/BAB yang baik.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan *software* statistik serta disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka pembahasan hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hubungan antara personal hygiene dengan kejadian cacingan

Dari 40 kasus cacingan pada anak hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kasus terdapat 38 anak atau 95 persen yang mengalami cacingan memiliki personal hygiene yang buruk sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 21 anak atau 52,5 persen memiliki personal hygiene yang baik. Melalui hasil analisa data dengan menggunakan uji statistik *chi-square* didapatkan ρ value $< 0,05$ ($\rho = 0,000$), dapat diartikan bahwa H_a diterima

atau dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara personal hygiene dengan kejadian cacangan.

Nilai OR sebesar 21,0, hal ini berarti anak yang memiliki personal hygiene yang buruk memiliki kemungkinan 21 kali lebih besar mengalami cacangan dibandingkan dengan anak yang memiliki personal hygiene yang baik.

Penemuan ini sesuai dengan yang ditemukan oleh Rusmanto (2012) ada hubungan yang significant antara perilaku personal higiene siswa dengan kejadian kecacingan di Sekolah Dasar Negeri Rapadaya II Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan nilai ($p=0,045$). Penelitian Fitri J (2012) menemukan adanya hubungan antara personal hygiene dengan kejadian infeksi kecacingan murid sekolah dasar di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nilai OR 6,000 (95% CI : 3,580-10,057). Hal ini disebabkan karena penyebaran penyakit cacangan paling banyak ditemukan di daerah dengan kelembaban tinggi yaitu pada kelompok yang *personal hygienenya* kurang baik. Hasil penelitian Asror (2005) juga menemukan adanya hubungan antara hygiene perorangan dengan kejadian kecacingan pada petugas pengangkut sampah di kota pekalongan dengan nilai ($p\text{ value}=0,001$).

Hal tersebut sesuai dengan teori Saryono (2010) yang menjelaskan bahwa *personal hygiene* yang baik akan meminimalkan pintu masuk (*portal of entry*) mikroorganisme yang ada dimana-mana dan pada akhirnya

mencegah seseorang terkena penyakit. Dimana *personal hygiene* yang tidak baik akan mempermudah tubuh terserang berbagai penyakit seperti penyakit infeksi (seperti cacangan), penyakit kulit dan penyakit saluran pencernaan.

Smith (2012) juga menjelaskan bahwa mendidik anak mengenai hygiene yang baik adalah cara terbaik untuk mencegah penyebaran infeksi tidak hanya untuk perkembangan masa kanak-kanak tetapi sampai dewasa. Prinsip-prinsip personal hygiene seharusnya sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan contoh mengenai praktik personal hygiene yang baik merupakan cara terbaik orang tua dalam mengajarkan anaknya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya:

“Kebersihan merupakan sebagian dari iman.” (H.R. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang kebersihan (thaharah). Dimana kebersihan (thaharah) yang dimaksud adalah membersihkan atau membebaskan sesuatu dari bakteri atau benda yang mengandung bakteri, sedang sesuatu yang kotor atau mengandung jamur diidentikkan dengan “najis” (Al-Fanjari, 2006).

Dari penelitian ini juga menunjukkan pada kelompok terdapat 2 anak atau 5 persen memiliki personal hygiene yang baik tetapi mengalami cacangan dan terdapat 19 anak atau 47,5 persen pada kelompok kontrol memiliki personal hygiene yang buruk. Hal ini dapat terjadi karena cacangan

tidak hanya disebabkan oleh personal hygiene semata melainkan beberapa faktor lain seperti sanitasi lingkungan yang buruk dan tingkat kemiskinan seseorang. Seperti yang dijelaskan oleh Peter Hotez (2008) bahwa semakin parah tingkat kemiskinan masyarakat akan semakin berpeluang untuk mengalami infeksi cacing. Penyakit cacingan biasanya terjadi di lingkungan yang kumuh terutama didaerah kota atau daerah pinggiran (Hotes, 2008). Sedangkan menurut Phiri (2000) yang dikutip Peter J. Hotes (2008) bahwa jumlah prevalensi *Ascarislumbricoides* banyak ditemukan di daerah perkotaan. Sedangkan menurut Albonico yang dikutip Hotes bahwa jumlah prevalensi tertinggi ditemukan di daerah pinggiran atau pedesaan yang masyarakat sebagian besar masih hidup dalam kekurangan.

Peneliti berpendapat bahwa *personal hygiene* dapat tercapai bila seseorang mengetahui pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri, karena pada dasarnya *personal hygiene* adalah mengembangkan kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan diri.

b. Hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian cacingan

Hasil penelitian menunjukkan dari 40 responden pada kelompok kasus terdapat 38 anak atau 95 persen yang tidak mencuci tangan sebelum makan, setelah BAB dan setelah bermain ditanah dengan air mengalir menggunakan sabun sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 20 anak atau 50 persen yang mencuci tangan. Melalui hasil analisa data dengan menggunakan uji statistik *chi-square* didapatkan $p\text{ value} < 0,05$ ($p = 0,000$), dapat diartikan

bahwa Ha diterima atau dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian cacingan.

Nilai OR sebesar 19,0 hal ini berarti anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan, setelah BAB dan setelah bermain ditanah memiliki kemungkinan 19 kali lebih besar mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang mencuci tangan.

Penemuan ini sesuai yang ditemukan oleh Andaruni yang menemukan adanya hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan infeksi cacingan pada anak di SDN 01 Pasirlangu Cisarua dengan persentasi yang mendukung terhadap kejadian infeksi cacingan itu sebanyak 52,95 persen. Hasil penelitian Budi (2012) juga menemukan adanya hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan infestasi cacing usus pada siswa sekolah dasar negeri 119 manado dengan nilai p sebesar 0,04 ($p < 0.05$).

Hal tersebut sesuai dengan teori Purwanijayanti (2006) juga menjelaskan bahwa anak-anak paling sering terserang penyakit cacingan karena biasanya jari-jari tangan mereka dimasukkan ke dalam mulut atau makan nasi tanpa cuci tangan dimana tangan yang kotor atau yang terkontaminasi dapat memindahkan bibit penyakit kedalam tubuh.

Depkes (2006) juga menjelaskan bahwa telur cacing gelang keluar bersama tinja pada tempat yang lembab dan tidak terkena sinar matahari, telur tersebut tumbuh menjadi infeksi. Infeksi cacing gelang terjadi bila telur yang infeksi masuk melalui mulut bersama makanan atau minuman dan

dapat pula melalui tangan yang kotor (tercemar tanah dengan telur cacing). Menurut Gandahusa (2006) Pemakaian tinja sebagai pupuk kebun sangat penting dalam penyebaran infeksi penyakit cacingan sehingga mencuci tangan sebelum makan, mencuci dengan baik sayuran yang dimakan mentah adalah penting apalagi di negara-negara yang memakai tinja sebagai pupuk.

Dari penelitian ini juga terdapat 2 anak atau 5 persen pada kelompok kasus yang mencuci tangan sebelum makan, setelah BAB dan setelah bermain ditanah tetapi mengalami cacingan dan pada kelompok kontrol terdapat 20 anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan, setelah BAB dan setelah bermain ditanah. Peneliti berasumsi bahwa masih terinfeksi anak walaupun sudah mencuci tangan karena mereka mencuci tangan hanya dengan air saja tanpa memakai sabun, sehingga kuman-kuman masih ada yang menempel ditangan. Ada juga responden yang menurut mereka nanti pada saat akan makan makanan pokok baru mereka mencuci tangan sedangkan pada saat akan makan selain makanan pokok yakni jajan, mereka tidak mencuci tangan terlebih dahulu.

Hal tersebut sesuai dengan teori Suzannita (2013) yang mengatakan cuci tangan dengan menggunakan air saja merupakan hal yang umum dilakukan di seluruh dunia. Namun ternyata kebiasaan ini kurang efektif dibandingkan dengan cuci tangan memakai sabun. Pasalnya, sabun dapat meluruhkan lemak dan kotoran yang mengandung kuman. Dengan

penggunaan yang benar, semua sabun memiliki efektifitas yang sama dalam meluruhkan kuman-kuman penyebab penyakit.

Peneliti berasumsi bahwa mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun maka secara otomatis tubuh kita akan terlindung dari bibit penyakit yang masuk melalui tangan.

c. Hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian cacangan

Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kasus yang memiliki kebiasaan tidak memakai alas kaki sebanyak 38 anak atau 95 persen sedangkan pada kelompok kontrol yang memakai alas kaki sebanyak 22 anak atau 55 persen. Melalui hasil analisa data dengan menggunakan uji statistik *chi-square* didapatkan $p \text{ value} < 0,05$ ($p = 0,000$), dapat diartikan bahwa H_a diterima atau dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian cacangan.

Nilai OR sebesar 23,2 hal ini berarti anak yang tidak memakai alas kaki memiliki kemungkinan 23,2 kali lebih besar mengalami cacangan dibandingkan dengan anak yang memakai alas kaki.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hariyani (2010) yang menunjukkan adanya hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian cacangan pada siswa Sekolah Dasar Yayasan Dinamika Indonesia Bantar Gerbang Bekasi Jawa Barat. Penelitian Fitri J (2012) juga menemukan adanya hubungan antara pemakaian alas kaki dengan kejadian infeksi kecacangan murid sekolah dasar di Kecamatan

Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nilai p value = 0,000 dan nilai OR 5,524 (95% CI : 2,840-10,743).

Hal ini sesuai dengan teori Gandahusada (2006) juga menjelaskan bahwa kulit merupakan tempat masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Tanah gembur (pasir, humus) merupakan tanah yang baik untuk pertumbuhan larva cacing. Jika seseorang menginjakkan kakinya ditanah tanpa menggunakan alas kaki dan jika kebersihan serta pemeliharaan kaki tidak diperhatikan maka dapat menjadi sasaran pintu masuknya kuman-kuman penyakit ke dalam tubuh, termasuk larva cacing.

Mandal (2008) yang menyatakan bahwa Infeksi sering terjadi pada semua negara tropis dan subtropis yang tanahnya secara luas terkontaminasi dengan tinja manusia dan orang-orang sering berjalan tanpa alas kaki. Depkes RI (2001) juga menjelaskan telur dan larva cacing banyak terdapat di tanah. Semakin sering kontak dengan tanah maka resiko terinfeksi cacing semakin besar.

Dari penelitian ini juga didapatkan pada kelompok kasus sebanyak 2 anak yang memakai alas kaki tetapi masih mengalami cacingan dan sebanyak 18 anak pada kelompok kontrol yang tidak memakai alas kaki. Hal ini dapat terjadi karena perilaku makan anak dalam kehidupan sehari-hari juga mempengaruhi infeksi cacingan seperti yang dijelaskan oleh Etjang (2003) yang menyatakan bahwa perilaku makan dalam kehidupan sehari-hari dapat

menyebabkan penularan infeksi cacingan misalnya, mengkonsumsi makanan secara mentah atau setengah matang berupa ikan, daging dan sayuran.

Peneliti berasumsi bahwa perawatan serta pemeliharaan kaki sangat penting agar tidak menjadi sarang atau tempat masuknya kuman-kuman penyakit ke dalam tubuh, termasuk telur cacing. Pemakaian alas kaki dapat mencegah terjadinya infeksi luka serta infeksi kecacingan. Anak usia sekolah merupakan kelompok rentan terinfeksi cacing karena pola bermain anak pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari tanah sementara itu pada saat anak bermain seringkali lupa menggunakan alas kaki.

d. Hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian cacingan

Hasil analisis hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian cacingan diperoleh sebanyak 31 anak atau 77,5 persen kelompok kasus yang mengalami cacingan memiliki kuku yang kotor sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 29 anak dengan persentasi 72,5 persen yang memiliki kuku yang bersih. Hasil uji statistik *chi-square* didapatkan p value $< 0,05$ ($p = 0,000$), dapat diartikan bahwa H_a diterima atau dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian cacingan.

Nilai OR sebesar 9,1 hal ini berarti anak dengan kuku yang kotor memiliki kemungkinan 9,1 kali lebih besar mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang memiliki kuku yang bersih.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yulianto Evi (2007) yang menunjukkan adanya hubungan antara kebersihan

kuku dengan kejadian penyakit cacangan pada siswa Sekolah Dasar Negeri Rowosari 01 Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Penelitian yang sama dilakukan Haryati (2004) yang menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara kebersihan kuku dengan kejadian cacangan pada pemulung di tpa gunung tugel kabupaten banyumas dengan nilai p value=0,018.

Nadesul (2000) mengemukakan bahwa telur cacing sering kali terselip pada kuku yang kotor. Kondisi ini sering terjadi pada anak yang sering bermain ditanah serta pada orang dewasa yang bekerja dikebun atau disawah. Onggowaluyo (2001) juga menjelaskan bahwa penularan infeksi cacangan bisa saja melalui kuku jari tangan yang panjang yang kemungkinan terselip telur cacing dan nantinya bisa tertelan ketika makan.

Kangmuz (2011) juga menjelaskan bahwa Islam adalah perintis pertama yang berbicara tentang bakteri dan kotoran yang dimasukkan dalam istilah “*khabats*” atau “*khataya*” atau “*syaitan*”. Rasulullah saw bersabda:

قَلَّمْ أَظْفَارِكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفْعُدُ عَلَى مَا طَالَ تَحْتَهَا

Terjemahnya:

“potonglah kukumu, sesungguhnya syetan duduk (bersembunyi) di bawah kukumu yang panjang” (HR. Bukhari Muslim).

Hadis diatas dengan jelas menunjukkan adanya bakteri yang tersembunyi di bawah kuku-kuku, seperti telur cacing, bakteri *thypoeid* dan *desentri*. Banyak bakteri yang hidup di bawah kuku yang panjang dan kotor. Kondisi semacam ini dapat menularkan penyakit, yakni ketika kita setelah berak tidak mencuci tangan dengan bersih hingga bakteri yang ada pada

tangan berpindah ke makanan. Di antara penyakit yang dipindahkan adalah semua penyakit yang dibawa lalat terutama telur cacing seperti *ascaris* (cacing gelang, yaitu cacing yang hidup di dalam usus halus manusia) dan cacing pita dengan segala macamnya dan penyakit *typhoeid*, *solamania*, *desentri* dan keracunan makanan.

Dari penelitian ini juga di dapatkan pada kelompok kasus ada 9 anak atau 22,5 persen yang memiliki kuku yang bersih tetapi masih mengalami cacingan dan pada kelompok kontrol terdapat 11 anak atau 27,5 persen yang memiliki kuku yang kotor tetapi tidak mengalami cacingan. Hal ini dapat terjadi karena upaya dari seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri yang meliputi memelihara kebersihan, cara hidup yang teratur, meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan jasmani, menghindari terjadinya penyakit, dan pemeriksaan kesehatan masih kurang.

Peneliti berasumsi bahwa meskipun anak-anak selalu mencuci tangan sebelum makan tetapi tidak terbiasa memotong kuku secara rutin yakni sekali seminggu maka besar kemungkinannya untuk terinfeksi cacingan karena telur cacing dapat masuk kedalam tubuh melalui kotoran yang berada dibawah kuku pada saat makan. Hal ini sesuai dengan teori Gandahusada, (2000) yang menyatakan bahwa kuku sebaiknya selalu dipotong pendek untuk menghindari penularan cacing dari tangan ke mulut.

- e. Hubungan antara kebersihan jajanan dengan kejadian cacingan

Hasil penelitian menunjukkan dari 40 kasus cacingan pada anak terdapat 39 anak atau 97,5 persen yang memiliki jajanan yang tidak bersih sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 20 anak atau 50 persen yang memiliki jajanan yang bersih. Melalui hasil uji statistik *chi-square* didapatkan $p \text{ value} < 0,05$ ($p = 0,000$), dapat diartikan bahwa H_a diterima atau dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara kebersihan jajanan dengan kejadian cacingan.

Nilai OR sebesar 39,0 hal ini berarti anak yang memiliki jajanan yang tidak bersih kemungkinan 39 kali lebih besar mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang memiliki jajanan yang bersih.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Juanda (2005) yang menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan jajan dengan kejadian cacingan pada anak SD di Komplek SD Muara Ciujung barat Kecamatan Rangka Sibitung Kabupaten Lebak.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Endriani (2012) bahwa perilaku anak jajan di sembarang tempat yang kebersihannya tidak dapat dikontrol oleh orang tua, tidak terlindung dan dapat tercemar oleh debu dan kotoran yang mengandung telur cacing dapat menjadi sumber penularan infeksi kecacingan pada anak.

Depkes RI (2005) juga mengemukakan bahwa penyakit yang diderita oleh anak SD terkait perilaku jajanan yang tidak sehat salah satu diantaranya adalah cacingan yang mencapai 40-60 persen. Akibat perilaku yang tidak

sehat ini dapat pula menimbulkan persoalan yang lebih serius seperti ancaman penyakit menular pada anak usia sekolah.

Dari penelitian ini juga terdapat 1 anak atau 2,5 persen pada kelompok kasus yang memiliki kebiasaan jajan yang baik tetapi mengalami cacangan sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 20 anak yang memiliki kebiasaan jajan yang buruk. Hal ini dapat terjadi karena anak yang terutama pada usia sekolah dasar sangat suka jajan, sehingga walaupun anak membeli jajanan yang bersih tetapi ketika memakan jajanan tersebut anak tidak mencuci tangan dapat memungkinkan anak tersebut mengalami cacangan. Hal sesuai dengan teori Nadesul (2000) yang mengatakan bahwa tidak mencuci tangan sebelum mengkonsumsi jajanan juga dapat menjadi sumber penularan infeksi kecacingan pada anak.

Peneliti berpendapat hampir semua anak usia sekolah suka jajan, akan tetapi kebiasaan jajan yang tidak sehat seperti membeli jajanan disembarang tempat dan tidak terbungkus atau tertutup dapat memicu anak mengalami cacangan, sebab penularan telur cacing dapat melalui jajanan yang tidak tertutup atau terbungkus yang sebelumnya telah dihindangi lalat atau telah tercemar oleh debu atau tanah yang mengandung telur cacing.

f. Hubungan antara kebiasaan Defekasi/BAB dengan kejadian cacangan

Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kasus terdapat 35 anak atau 87,5 persen yang memiliki kebiasaan Defekasi/BAB yang buruk Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 19 anak atau 47,5 persen yang

memiliki kebiasaan BAB yang baik. Melalui hasil analisa data dengan menggunakan uji statistik *chi-square* didapatkan $p\ value < 0,05$ ($p = 0,001$), dapat diartikan bahwa H_a diterima atau dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan defekasi/BAB dengan kejadian cacingan.

Nilai OR sebesar 6,3 hal ini berarti anak dengan kebiasaan defekasi/BAB yang buruk memiliki kemungkinan 6,3 kali lebih besar mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang memiliki kebiasaan defekasi/BAB yang baik.

Penemuan ini sesuai dengan yang ditemukan oleh Sumanto yang menyatakan bahwa kebiasaan defekasi/BAB yang buruk memiliki kemungkinan 4,3 kali mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang memiliki kebiasaan defekasi/BAB yang baik dengan nilai OR : 4,3 pada 95 % CI : 2,1-8,9.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Maryanti (2006) bahwa perilaku defekasi (buang air besar) yang kurang baik dan di sembarang tempat diduga menjadi faktor risiko dalam infeksi cacing. Secara teoritik, telur cacing memerlukan media tanah untuk perkembangannya. Adanya telur cacing pada tinja penderita yang melakukan aktifitas defekasi di tanah terbuka semakin memperbesar peluang penularan larva cacing pada masyarakat di sekitarnya.

Soekidjo (2003) juga menyatakan bahwa peranan tinja dalam penyebaran penyakit sangat besar. Di samping dapat langsung mengkontaminasi makanan, minuman, sayuran, air, tanah, serangga (lalat,

kecoa, dan sebagainya), dan bagian- bagian tubuh dapat terkontaminasi oleh tinja tersebut. Benda-benda yang telah terkontaminasi oleh tinja dari seseorang yang sudah menderita suatu penyakit tertentu merupakan penyebab penyakit bagi orang lain. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan tinja disertai dengan cepatnya penambahan penduduk, akan mempercepat penyebaran penyakit-penyakit yang ditularkan lewat tinja. Penyakit yang dapat disebarkan oleh tinja manusia antara lain: tipus, disentri, kolera, bermacam-macam cacing (cacing gelang, cacing kremi, cacing tambang), schistosomiasis, dan sebagainya. Sehingga buang air besar dan buang air kecil harus di dalam jamban, jangan disungai atau di sembarang tempat karena dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Dari penelitian ini juga diperoleh sebanyak 5 anak atau 12,5 persen pada kelompok kasus memiliki kebiasaan BAB yang baik tetapi mengalami cacingan dan pada kelompok kontrol terdapat 21 anak yang memiliki kebiasaan BAB yang buruk. Hal ini dapat terjadi disebabkan faktor sanitasi lingkungan seperti yang dikemukakan oleh Soedarto (2010) secara epidemiologik ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian kecacingan yaitu, faktor sanitasi lingkungan dan faktor manusia. Dalam penanggulangan cacingan pengawasan sanitasi air dan makanan sangat penting, karena penularan cacing terjadi melalui air dan makanan yang terkontaminasi. Sanitasi lingkungan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Untuk mencapai kemampuan hidup di masyarakat maka harus memperhatikan

penyediaan air bersih, pengelolaan jamban dan kamar mandi, dan pengelolaan limbah.

Peneliti berasumsi bahwa walaupun anak buang air besar di WC tetapi jika setelah defekasi/BAB tidak mencuci tangan dengan sabun maka besar kemungkinan untuk mengalami cacingan karena kuman-kuman atau telur cacing masih menempel ditangan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hendrik L. Blum yang dikutip Soekidjo (2003) bahwa usaha pencegahan penyakit cacingan yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun setelah dari kamar mandi/WC, selalu mencuci tangan dengan sabun setelah bermain, sebelum memegang makanan, infeksi cacing tambang bisa dihindari dengan selalu mengenakan alas kaki, gunakan desinfektan setiap hari di tempat mandi dan tempat buang air besar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang hubungan antara *personal hygiene* dengan kejadian cacangan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan antara personal hygiene dengan kejadian cacangan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar dengan nilai ρ value $< 0,05$ ($\rho = 0,000$) dan anak yang memiliki personal hygiene yang buruk memiliki resiko 21 kali lebih besar mengalami cacangan dibandingkan dengan anak yang memiliki personal hygiene yang baik.
2. Ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian cacangan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar dengan nilai ρ value $< 0,05$ ($\rho = 0,000$) dan anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan, setelah BAB dan setelah bermain ditanah memiliki resiko 19 kali lebih besar mengalami cacangan dibandingkan dengan anak yang mencuci tangan.
3. Ada hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian cacangan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar dengan nilai ρ value $< 0,05$ ($\rho = 0,000$) dan anak yang tidak

- memakai alas kaki memiliki resiko 23,2 kali lebih besar mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang memakai alas kaki
4. Ada hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian cacingan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar dengan nilai ρ *value* $< 0,05$ ($\rho = 0,000$) dan anak dengan kuku yang kotor memiliki resiko 9,1 kali lebih besar mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang memiliki kuku yang bersih.
 5. Ada hubungan antara kebiasaan jajan dengan kejadian cacingan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar dengan nilai ρ *value* $< 0,05$ ($\rho = 0,000$) dan anak yang memiliki kebiasaan jajan yang buruk resiko 39 kali lebih besar mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang memiliki kebiasaan jajan yang baik
 6. Ada hubungan antara kebiasaan Defekasi/BAB dengan kejadian cacingan pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar dengan nilai ρ *value* $< 0,05$ ($\rho = 0,001$) dan anak dengan kebiasaan defekasi/BAB yang buruk memiliki resiko 6,3 kali lebih besar mengalami cacingan dibandingkan dengan anak yang memiliki kebiasaan defekasi/BAB yang baik.

B. Saran

1. Petugas kesehatan perlu memberikan penyuluhan yang intensif yakni sekali dalam sebulan kepada warga khususnya anak usia sekolah dasar tentang pentingnya *personal hygiene*.
2. Pemerintah setempat bekerja sama dengan petugas kesehatan bagian sanitasi dan bagian pemberantasan penyakit menular yang ada di puskesmas dan di dinas kesehatan kota Makassar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang teratur dan terjadwal untuk mengetahui kondisi kesehatan anak.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian cacangan.
4. Seseorang khususnya seorang Muslim sebaiknya sebelum makan berwudhu atau minimal mencuci tangan dan membaca Basmalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Alfid T. 2012. “*Pengaruh Peer Group Support Terhadap Perilaku Jajanan Sehat Siswa Kelas 5 Sdn Ajung 2 Kalisat Jember*”. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Alfid%20Tri%20A.doc> Diakses 19 Juni 2013.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi. 2006. *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam. Cet. II*; Jakarta: Bumi Aksara.
- Andaruni, Adisti. 2012. “*Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Infeksi Cacingan Pada Anak Di SDN 01 Pasirlangu Cisarua*”. Skripsi. Bandung, <http://journals.unpad.ac.id/ejournal/article/view/597/651> (Diakses 31 januari 2013).
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asror, Farikhun. 2005. *Hubungan Higiene Perorangan Dengan Kejadian Kecacingan Pada Petugas Pengangkut Sampah Di Kota Pekalongan*. <http://eprints.undip.ac.id/28727/1/2463.pdf> (3 Agustus 2013).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2012. *Faktor Risiko Kecacingan Pada Anak Sekolah Dan Kebijakan Pengendalian Kecacingan Di Provinsi Kalimantan Selatan (Tahap II)*. Official Website http://grey.litbang.depkes.go.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jkpk_bppk-annidalukm-3418&q=kecacingan (Diakses 3 Mei 2013).
- Budi, 2012. *Hubungan Antara Higiene Perorangan Dengan Infestasi Cacing Usus Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 119 Manado*. [http://idim Manado.org/wp-content/uploads/2012/07/HUBUNGAN-ANTARA-HIGIENE PERORANGAN-DENGAN-INFESTASI-CACING.pdf](http://idim Manado.org/wp-content/uploads/2012/07/HUBUNGAN-ANTARA-HIGIENE-PERORANGAN-DENGAN-INFESTASI-CACING.pdf) (Diakses 4 Agustus 2013).
- Dachi, Rahmat. 2005. “*Hubungan Perilaku Anak Sekolah Dasar No. 174593 Hatoguan Terhadap Infeksi Cacing Perut Di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir*”. [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15363/1/mkides2005-%20\(5\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15363/1/mkides2005-%20(5).pdf) (Diakses 5 februari 2013).
- Daud, Anwar. 2001. *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*. Makassar: Hasanuddin University Press.

- Departemen Kesehatan R.I. 2001. *Pedoman Modul dan Materi Pelatihan "Dokter Kecil"*. Jakarta: Depkes R.I.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Syaamil Al-qur'an*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Depkes RI. 2005. *Aspek Gizi Makanan Jajanan*. Official Website <http://www.depkes.go.id> Diakses 19 Juni 2013.
- Depkes RI. 2006. "Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/MENKES/SK/VI/2006 tentang Pedoman Pengendalian Cacingan." Official Website RI. [http://www.hukor.Depkes.go.id/up_prod_kepmenkes/KMK% 20No.%20424%20ttg%20Pedoman%20Pengendalian%20Cacingan.pdf](http://www.hukor.Depkes.go.id/up_prod_kepmenkes/KMK%20No.%20424%20ttg%20Pedoman%20Pengendalian%20Cacingan.pdf) (Diakses 2 Februari 2013).
- Departemen Kesehatan RI. 2010. "Pencanangan Hari Waspada Cacing" Official Website <http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/1151-pencanangan-hari-waspada-cacing.html> (Diakses 24 Mei 2013).
- Djamilah, Moerniyati. 2003. "Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Hygiene Perorangan dengan Kejadian Infeksi Kecacingan pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari". Skripsi Sarjana, Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, Makassar.
- Endriani. 2012. "Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak Usia 1-4 Tahun". <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/113/jtptunimus-gdl-endriani-5642-3-babii.pdf> Diakses 19 Juni 2013.
- Etjang, Indian. 2003 *Mikrobiologi dan Parasitologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fitri, J., Saam, Z., Hamidy, MY. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Risiko Infeksi Kecacingan Murid Sekolah Dasar Di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2012" <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIL/article/view/964/957> (Diakses 25 Mei 2013).
- Gandahusada, S. 2000. *Helminologi, In: Parasitologi Kedokteran*. Jakarta: FKUI.
- Gandahusada, Sriasi, dkk. 2006. *Parasitologi Kedokteran*. Cet. VI; Jakarta: FKUI.

- Hariyani. 2010. *Hubungan Hygiene Sanitasi Perorangan Dengan Kejadian Penyakit Cacingan Pada Siswa Sekolah Dasar Yayasan Dinamika Indonesia Bantar Gerbang Bekasi Jawa Barat*. <http://www.scribd.com/doc/45680536/69/Hubungan-antara-hygiene-sanitasi-perorangan-dengan-Kejadian-penyakit-cacingan-pada-siswa-sekolah-dasar-yayasan-dinamika-indonesia-bantar-gerbang-bekasi-jawa-barat> (Diakses 17 JULI 2013).
- Haryati, Siti. 2004. *Hubungan Praktek Kebersihan Diri Dan Higiene Perseorangan Dengan Kejadian Kecacingan Perut Pada Pemulung Di Tpa Gunung Tugel Kabupaten Banyumas*. <http://eprints.undip.ac.id/20264/1/2174.pdf> (Diakses 4 Agustus 2013).
- Hotez PJ, Broker S, Bethony JM,. 2004. *Hookworm infection*. England: J Media
- Isro'in, Laily. 2012. *Personal Hygiene*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Juanda. 2005. *Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan kejadian Cacingan Dan Hubungan Kejadian Cacingan Dengan Anemia Pada Anak SD Di Komplek SD Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangka Sibitung Kabupaten Lebak*. http://eprints.undip.ac.id/37279_1/JUANDAG2A008003.pdf (Diakses 17 Juli 2013).
- Kangmuz. 2011. *Memahami Ayat-Ayat Dan Hadits Nabi Tentang Kesehatan*. <http://www.kangmuz.com/2011/07/29/memahami-ayat-ayat-dan-hadits-nabi-tentang-kesehatan/> (Diakses 26 Juni 2013).
- KNEPK. 2007. *Komisi Nasional Etika Penelitian Kesehatan*. [Http://www.knepk.litbang.depkes.go.id/knepk/situs web. komisi nasional etik penelitian kesehatan.html](http://www.knepk.litbang.depkes.go.id/knepk/situs_web_komisi_nasional_etik_penelitian_kesehatan.html) (Diakses 26 Juni 2013).
- Mandal, B., dkk. 2008. *Penyakit Infeksi*. Ed. VI; Jakarta: Erlangga.
- Mardiana dan Djarismawati. 2008. *Prevalensi Cacing Usus pada Murid Sekolah Dasar Wajib Belajar Pelayanan Gerakan Terpadu Pengetasan Kemiskinan Daerah Kumuh di Wilayah DKI Jakarta*. *Jurnal Ekologi Kesehatan*. Vol. 7, No. 2 Agustus 2008. <http://www.ekologi.litbang.Depkes.go.id/data/vol%207/5-Mardiana.pdf>. Diakses 11 juni 2013.
- Maryanti, 2006. *“Hubungan Perilaku Pemakaian APD dan Kebersihan Diri Dengan Kejadian Infeksi Cacing Tambang”*. <http://www.library@unair.ac.id> Diakses 18 Juni 2013.

- Mufidah, Fatchul. 2012. *Cermat Penyakit-penyakit Yang Rentan Didderita Anak Usia Sekolah*. Jogjakarta: Flashbooks.
- Nadesul, Hendrawan. 2000. "Bagaimana Kalau Cacingan?". Cet. 3; Jakarta: Puspa Swara.
- Nahdiyati. 2012. *Studi Infeksi Kecacingan dan Anemia pada Siswa Sekolah Dasar Di Daerah Endemik Malaria, Kabupaten Mamuju*.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/mgmi/article/download/428/370>
(Diakses 25 mei 2013).
- Nurjannah, Anna. 2012. "Gambaran Personal Hygiene Siswa Sekolah Dasar Negeri Jatinangor".<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/6730/1/09E01727.pdf> (Diakses 25 Mei 2013).
- Notoatmodjo,S. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*.Jakarta:Rhineka Cipta.
- Palgunadi, Bagus. 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kecacingan yang Disebabkan oleh Soil-Transmitted Helminth Di Indonesia." Skripsi. Surabaya. <http://elib.fk.uwks.ac.id/jurnal/download> (Diakses 31 januari 2013).
- Purnawijayanti, Hiasinta A. 2006. *Sanitasi, Higiene, dan Keselamatan Kerja dalam Pengolahan Makanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Rusmanto, Dwi. 2012. *Hubungan Personal Hygiene Siswa Kelas 4, 5 dan 6 dengan Prevalensi Kecacingan Siswa di Sekolah Dasar Negeri Rapadaya II Kecamatan Omben Kabupaten Sampang*.
<http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/5577849953abs.pdf> (Diakses 4 agustus 2013)
- Safar, Rosdiana. 2010. *Parasitologi Kedokteran*. Bandung: Yrama Widya.
- Saryono. 2010. *Catatan Kuliah kebutuhan Dasar Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an/M. Quraish Shihab*. Jakarta: Lentera Hati.
- Smith, 2012. *What Kids Need to Know About Personal Hygiene*.
<http://www.ehow.com> Diakses 4 agustus 2013

- Soedarto.2010. *Penyakit Tropis*. Jakarta:Erlangga
- Soekidjo, Notoatmodjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Sudariato. 2012. *Buruknya Sanitasi Lingkungan Masyarakat Berdampak Buruk Terhadap Kematian Anak*. http://dinkes.sulsel.go.id/new/index.php?option=com_content&task=view&id=852&Itemid=1 Diakses 11 juni 2013.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto, Didik. 2010. “*Faktor Risiko Infeksi Cacing Tambang Pada Anak Sekolah*.” Skripsi. Demak. <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/463/512> (Diakses 5 februari 2013).
- Suzannita. 2010. “*Hari Cuci Tangan Sedunia*.” <http://www.suzannita.com/hari-cuci-tangan-sedunia/> (Diakses 23 April 2013).
- Tarwoto dan Wartonah. 2006. *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Onggowaluyo, J. S. 2001. *Parasitologi Medik 1 Helmintologi*. Jakarta: EGC.
- Waqiah, Ummul. 2010. “*Hubungan Hygiene Perorangan dengan Kejadian Infeksi Kecacingan pada pemulung di TPA Antang Makassar*.” Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Makassar.
- WHO. 2010. “*Soil-transmitted helminths*,” Official Website WHO. http://www.who.int/intestinal_worms/en/ (Diakses 5 februari 2013).
- Yulianto, Evi. 2007. “*Hubungan Hygiene Sanitasi dengan Kejadian Penyakit Cacingan pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Rowosari 01 Kecamatan Tembalang*.” Skripsi. Semarang. <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH11ea/3086d1cd.dir/doc.pdf> (diakses 02 februari 2013).

L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITI ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MANGSAJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

Alamat:

Dengan ini saya menyatakan bersedia dan tidak keberatan menjadi responden di dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Hubungan Personal Hygiene dengan Cacingan pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar”. Dimana pernyataan ini saya buat dengan suka rela dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN (_____)
M A K A S S A R

DAFTAR KUESIONER
HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN INFEKSI
CACINGAN PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS TAMANGAPA ANTANG, MAKASSAR

A. Identitas Respdnen

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
Pendidikan :
Nama orang tua :

B. Panduan Wawancara

Data Perilaku Personal Hygiene

Beri tanda silang (x) pada jawaban yang dipilih

Kebiasaan Mencuci Tangan

1. Apakah setiap mau makan adik selalu mencuci tangan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Jika ya, menggunakan apa adik mencuci tangan?
 - a. Air saja
 - b. Sabun dan air mengalir
3. Apakah setelah buang air besar (berak) adik selalu mencuci tangan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Jika ya, dengan apakah adik mencuci tangan setelah buang air besar (berak)?
 - a. Air dan sabun

- b. Air saja
5. Apakah adik sering bermain di tanah?
- a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah adik pernah makan sambil bermain di tanah?
- a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah setelah bermain di tanah adik mencuci tangan?
- a. Ya
 - b. Tidak
8. Dengan apakah adik mencuci tangan setelah bermain di tanah?
- a. Air dan sabun
 - b. Air saja

Pemakaian Alas Kaki

9. Apakah adik menggunakan alas kaki (sepatu, sandal) setiap keluar rumah?
- a. Ya
 - b. Tidak
10. Pada waktu istirahat sekolah apakah adik sering bermain sambil membuka sepatu?
- a. Ya
 - b. Tidak

Kebersihan Kuku

11. Apakah adik memotong kuku sekali seminggu?
- a. Ya
 - b. Tidak
12. Apakah adik sering menggigit kuku?
- a. Ya
 - b. Tidak

13. Apakah adik senang memiliki kuku yang panjang?
- Ya
 - Tidak
14. Apakah adik sering memiliki kuku yang kotor atau hitam?
- Ya
 - Tidak

Kebiasaan Jajan

15. Apakah adik suka jajan sembarangan?
- Ya
 - Tidak
16. Apakah jajan yang adik beli terbungkus/tertutup?
- Ya
 - Tidak

Kebiasaan BAB/Defekasi

17. Apakah adik buang air besar di WC?
- Ya
 - Tidak
18. Apakah adik buang air besar dikebun?
- Ya
 - Tidak
19. Apakah adik buang air besar disungai?
- Ya
 - Tidak
20. Apakah adik setelah buang air besar mencuci tangan dengan sabun dan air bersih?
- Ya
 - Tidak

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			MASTER TABEL KASUS									
2												
3												
4			IDENTITAS RESPONDEN									
5		No.	Nama/Inisial	JK	Kode	Umur (thn)	Kode	Pendidikan	kode	Agama	Alamat	
6												
7		1	An. H	L	1	9	2	SD	1	Islam	Jln. Nurul Hidayah	
8		2	An. R	L	1	8	1	SD	1	Islam	Kampung kajang	
9		3	An. A	L	1	9	2	SD	1	Islam	Jln. Tamangapa Raya	
10		4	An. A	L	1	9	2	SD	1	Islam	Jln. Tamangapa Raya III	
11		5	An. A	L	1	9	2	SD	1	Islam	Jln. Reformasi	
12		6	An. A	L	1	8	1	SD	1	Islam	Kampung kajang	
13		7	An. M	L	1	7	1	SD	1	Islam	Jln. Tamangapa Raya II	
14		8	An. I	L	1	7	1	SD	1	Islam	Bontoa	
15		9	An. R	L	1	6	1	SD	1	Islam	Jln. Reformasi	
16		10	An. M	L	1	8	1	SD	1	Islam	Jln. Tamangapa Raya II	
17		11	An. F	L	1	9	2	SD	1	Islam	Bontoa	
18		12	An. I	L	1	8	1	SD	1	Islam	Jln. Tamangapa Raya	
19		13	An. A	L	1	9	2	SD	1	Islam	Bontoa	
20		14	An. I	L	1	10	2	SD	1	Islam	Jln. AMD	
21		15	An. A	L	1	10	2	SD	1	Islam	Borong Jambu Raya	
22		16	An. R	L	1	11	2	SD	1	Islam	Jln. AMD Borong Jambu II	
23		17	An. B	L	1	10	2	SD	1	Islam	Jln. AMD Borong Jambu	
24		18	An. F	L	1	11	2	SD	1	Islam	TPA.S	
25		19	An. A	L	1	7	1	SD	1	Islam	TPA.S	
26		20	An. S	L	1	8	1	SD	1	Islam	TPA.S	
27		21	An. R	L	1	12	2	SD	1	Islam	M. Baiturrahman	
28		22	An. Z	L	1	11	2	SD	1	Islam	Tamangapa Raya	
29		23	An. S	P	2	7	1	SD	1	Islam	TPA.S	
30		24	An. R	P	2	6	1	SD	1	Islam	Jln. Biring Romang	
31		25	An. J	P	2	6	2	SD	1	Islam	Kampung Bugis	
32		26	An. N	P	2	9	2	SD	1	Islam	M. Nurul Hidayah	
33		27	An. I	P	2	8	1	SD	1	Islam	Jln. TPA.S Antang Raya	
34		28	An. N	P	2	10	2	SD	1	Islam	Kampung Berua	
35		29	An. S	P	2	10	2	SD	1	Islam	Jln. Mesjid Nurul Hidayah	
36		30	An. K	P	2	10	2	SD	1	Islam	Jln. Mesjid Nurul Hidayah	
37		31	An. W	P	2	10	2	SD	1	Islam	Jln. AMD Borong Jambu	
38		32	An. S	P	2	8	1	SD	1	Islam	TPA.S	
39		33	An. F	P	2	10	2	SD	1	Islam	Kamber	
40		34	An. I	P	2	8	1	SD	1	Islam	Jln. M. Baiturrahman	
41		35	An. R	P	2	9	2	SD	1	Islam	TPA.S	
42		36	An. W	P	2	10	2	SD	1	Islam	Jln. AMD Borong Jambu	
43		37	An. N	P	2	7	1	SD	1	Islam	Jln. Muhammadiyah	
44		38	An. N	P	2	6	1	SD	1	Islam	Jln. AMD Borong Jambu II	
45		39	An. N	P	2	10	2	SD	1	Islam	Tamangapa	
46		40	An. M	P	2	9	2	SD	1	Islam	Bontoa	
47												
48												
49			Ket:									
50			Jenis Kelamin			Umur						
51			1 = Laki-laki			1= 5-8 tahun						
52			2= Perempuan			2= 9-12 tahun						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE			
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6		No.	inisial	KEBIASAAN MENCUCI TANGAN								PEMAKAIAN ALAS KAKI		KEBERSIHAN KUKU				KEBERSIHAN JAJANAN			KEBIASAAN BAB				KATEGORI PH	keadaan anak								
7		1	An. H	SOAL 1	SOAL 2	SOAL 3	SOAL 4	SOAL 5	SOAL 6	SOAL 7	SOAL 8	KATEGORI	SOAL 9	SOAL 10	KATEGORI	SOAL 11	SOAL 12	SOAL 13	SOAL 14	KATEGORI	SOAL 15	SOAL 16	KATEGORI	SOAL 17	SOAL 18	SOAL 19	SOAL 20	KATEGORI						
8		2	An. R	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1	0	1	1	1	2	0	1	1	0	2	2	2	1	0	0	0	0	1		
9		3	An. A	1	1	2	1	1	1	1	1	0	2	1	0	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	1	
10		4	An. A	1	1	2	1	1	1	2	1	0	1	1	0	1	1	1	2	0	1	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	1		
11		5	An. A	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	0	2	1	2	2	2	1	1	1	1		
12		6	An. A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	1	1	2	2	1	0	0	0	1		
13		7	An. M	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
14		8	An. I	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	2	2	1	1	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
15		9	An. R	1	1	2	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	2	2	1	1	1	1	0	2	2	2	2	2	1	0	0	1		
16		10	An. M	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
17		11	An. F	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
18		12	An. I	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0	1		
19		13	An. A	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	2	2	1	1	1	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0	1		
20		14	An. I	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
21		15	An. A	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
22		16	An. R	1	1	2	2	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
23		17	An. B	1	1	2	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	2	2	1	2	1	0	0	0	1		
24		18	An. F	1	1	2	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	2	2	2	2	2	1	0	0	1		
25		19	An. A	1	1	2	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	2	2	1	2	2	2	2	2	1	0	0	1		
26		20	An. S	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	0	1	2	2	1	1	1	1	0	2	1	2	2	2	1	1	1	1		
27		21	An. R	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	2	2	1	1	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
28		22	An. Z	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
29		23	An. S	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0	1		
30		24	An. R	1	1	2	1	1	2	1	1	0	2	2	1	1	1	2	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
31		25	An. J	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	2	1	2	1	0	0	0	1		
32		26	An. N	2	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	2	1	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
33		27	An. I	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	2	2	1	1	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
34		28	An. N	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	1	0	1	2	1	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
35		29	An. S	1	1	2	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	2	0	2	1	2	1	0	0	0	0	1		
36		30	An. K	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	2	0	1	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0	1		
37		31	An. W	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
38		32	An. S	1	1	2	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
39		33	An. F	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	2	0	1	2	1	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
40		34	An. I	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	2	0	2	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
41		35	An. R	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	2	1	1	0	1	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0	1		
42		36	An. W	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	2	1	1	0	2	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
43		37	An. N	1	1	2	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	2	2	1	2	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
44		38	An. N	1	1	2	1	1	1	1	1	0	2	1	0	1	2	1	2	1	1	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0	1		
45		39	An. N	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
46		40	An. M	1	1	1	1	1	2	1	1	0	1	2	0	1	1	1	2	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	1		
47		41	An. R	1	1	2	2	1	2	2	2	0	2	1	0	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	0	1	0	1	2	
48		42	An. R	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	0	2	2	2	2	2	1	1	1	2		
49		43	An. D	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	0	2	2	2	2	2	1	0	1	0	1	2
50		44	An. E	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	0	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2		
51		45	An. H	1	1	2	2	1	2	1	1	0	2	1	0	1	2	2	2	1	2	1	0	2	2	2	2	2	1	0	0	0	2	
52		46	An. E	2	2	1	1																											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
87																																



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1												
2												
3												
4			MASTER TABEL KONTROL									
5			IDENTITAS RESPONDEN									
6			IDENTITAS RESPONDEN									
7			IDENTITAS RESPONDEN									
	No.	Nama/inisial	Jenis kelamin	Kode	Umur (thn)	Kode	Pendidikan	Agama	Alamat			
9	1	An. R	L	1	9	2	SD	Islam	Jln. Nurul Hidayah			
10	2	An. R	L	1	8	1	SD	Islam	Kampung kajang			
11	3	An. D	L	1	9	2	SD	Islam	Jln. Tamangapa Raya			
12	4	An. E	L	1	9	2	SD	Islam	Jln. Tamangapa Raya III			
13	5	An. H	L	1	9	2	SD	Islam	Jln. Reformasi			
14	6	An. E	L	1	8	1	SD	Islam	Kampung kajang			
15	7	An. L	L	1	7	1	SD	Islam	Jln. Tamangapa Raya II			
16	8	An. F	L	1	7	1	SD	Islam	Bontoa			
17	9	An. S	L	1	6	1	SD	Islam	Jln. Reformasi			
18	10	An. W	L	1	8	1	SD	Islam	Jln. Tamangapa Raya II			
19	11	An. S	L	1	9	2	SD	Islam	Bontoa			
20	12	An. S	L	1	8	1	SD	Islam	Jln. Tamangapa Raya			
21	13	An. A	L	1	9	2	SD	Islam	Bontoa			
22	14	An. A	L	1	10	2	SD	Islam	Jln. AMD			
23	15	An. A	L	1	10	2	SD	Islam	Borong Jambu Raya			
24	16	An. A	L	1	11	2	SD	Islam	Jln. AMD Borong Jambu II			
25	17	An. W	L	1	10	2	SD	Islam	Jln. AMD Borong Jambu			
26	18	An. I	L	1	11	2	SD	Islam	TPA.S			
27	19	An. A	L	1	7	1	SD	Islam	TPA.S			
28	20	An. A	L	1	8	1	SD	Islam	TPA.S			
29	21	An. I	L	1	12	2	SD	Islam	M. Baiturrahman			
30	22	An. I	L	1	11	2	SD	Islam	Tamangapa Raya			
31	23	An. N	P	2	7	1	SD	Islam	TPA.S			
32	24	An. R	P	2	6	1	SD	Islam	Jln. Biring Romang			
33	25	An. M	P	2	6	2	SD	Islam	Kampung Bugis			
34	26	An. S	P	2	9	2	SD	Islam	M. Nurul Hidayah			
35	27	An. I	P	2	8	1	SD	Islam	Jln. TPA.S Antang Raya			
36	28	An. A	P	2	10	2	SD	Islam	Kampung Berua			
37	29	An. K	P	2	10	2	SD	Islam	Jln. Mesjid Nurul Hidayah			
38	30	An. F	P	2	10	2	SD	Islam	Jln. Mesjid Nurul Hidayah			
39	31	An. S	P	2	10	2	SD	Islam	Jln. AMD Borong Jambu			
40	32	An. A	P	2	8	1	SD	Islam	TPA.S			
41	33	An. F	P	2	10	2	SD	Islam	Kamber			
42	34	An. S	P	2	8	1	SD	Islam	Jln. M. Baiturrahman			
43	35	An. A	P	2	9	2	SD	Islam	TPA.S			
44	36	An. S	P	2	10	2	SD	Islam	Jln. AMD Borong Jambu			
45	37	An. R	P	2	7	1	SD	Islam	Jln. Muhammadiyah			
46	38	An. S	P	2	6	1	SD	Islam	Jln. AMD Borong Jambu II			
47	39	An. S	P	2	10	2	SD	Islam	Tamangapa			
48	40	An. F	P	2	9	2	SD	Islam	Bontoa			
49												
50			Ket:									
51			Jenis Kelamin		Umur							
52			1 = Laki-laki		1= 5-8 tahun							
53			2= Perempuan		2= 9-12 tahun							