

**ISOLASI DAN IDENTIFIKASI MIKROBA PENGHASIL
ANTIBIOTIKA DARI AIR BUNGUNG BARANIA
KELURAHAN MATAALLO KECAMATAN
BAJENG KABUPATEN GOWA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi

Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh

ANNIZA TRI HARDIYANTI J.

NIM. 701001 09012

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2013
ABSTRAK

NamaPenyusun :Anniza Tri Hardiyanti j.
NIM :70100109012
JudulSkripsi :Isolasi Mikroba Penghasil Antibiotik dari air Bungung Barania Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Telah dilakukan penelitian isolasi mikroba penghasil antibiotika dari air Bungung Barania Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan adanya mikroba dari air Bungung Barania yang dapat menghasilkan antibiotik. Tahap pertama isolasi mikroba dilakukan pengenceran 10^{-1} hingga 10^{-3} dengan menggunakan metode tuang pada medium Glukosa Nutrien Agar (GNA) dan Potato Dextrosa Agar (PDA). Hasil isolasi didapatkan 5 isolat bakteri dan 3 isolat jamur yang menunjukkan zona bening di sekitarnya, kemudian difermentasi menggunakan medium Maltosa Yeast Broth (MYB). Aktivitasnya diujikan menggunakan metode difusi agar dalam medium Glukosa Nutrien Agar (GNA) terhadap mikroba uji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang memberikan aktivitas yang terbaik adalah isolat AB1₁, isolat AB2₁, dan isolat AB3₁, sedangkan isolat jamur yang memberikan aktivitas terbaik hanya pada Isolat AJ2₁. Tahap selanjutnya dilakukan pengamatan morfologi, secara mikroskopik dilakukan pengecatan Gram, dimana isolat AB1₁ adalah Gram positif berbentuk bulat, AB2₁, dan AB4₁ termasuk Gram positif berbentuk bulat, isolat AB3₁ dan AB5₁ termasuk Gram negatif berbentuk bulat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Author : Anniza Tri Hardiyanti J.
Student Reg. Number : 70100109012
Title : Isolation of Microbe Producing Antibiotic from
Bungung Barania water Mataallo Politycal District
Bajeng Subdistrict Gowa Regency

A research about isolation of microbe producing antibiotic from Bungung Barania Mataallo Politycal District Bajeng Subdistrict Gowa Regency water has been performed. The purpose of this research is getting microbe from Bungung Barania water that can result antibiotic. In first step, isolation of microbe was done by diluting at concentration 10^{-1} to 10^{-3} by using pour method on Nutrien Agar (NA) medium and Potato Dextrose Agar (PDA) medium. The result of isolation was 5 bacteria isolate and 3 fungus isolate which then fermented by using Maltosa Yeast Broth (MYB) medium. Their activity was tested by using agar diffusion method on Glukose Nutrient Agar (GNA) medium to tested microbe.

The result of isolation showed that isolate which had activity to microbe were $AB1_1$ isolate, $AB2_1$ isolate, dan $AB3_1$ isolate, whereas isolats which had activity to fungus were $AJ2_1$ isolate. Next step, observation of morphology was done in a microscopic manner by Gram painting which $AB1_1$ isolate was positif Gram bacteria that has shape like stick, $AB2_1$ and $AB4_1$ isolate, were positive Gram bacteria that their shape was spherical; $AB3_1$ and $AB5_1$ isolate was negative Gram bacteria that their shape was spherical.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak berkah kepada penyusun, diantaranya keimanan dan kesehatan serta kesabaran sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada-Nyalah penyusun menyerahkan diri dan menumpahkan harapan, semoga segala aktivitas dan produktivitas penyusun mendapatkan limpahan rahmat dari Allah swt.

Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad saw., keluarga, para sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam dan Ummat yang mengikuti ajaran-Nya hingga akhir zaman.

Puji dan syukur penulis haturkan atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah swt kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Tak lupa pula salawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad swt yang telah membawa ummatnya dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang.

Rasa terima kasih penulis kepada semua pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa

banyak sekali hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tanpa abantuan dari semua pihak-pihak pendukung, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikannya.

Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda Jamaluddin Malik SE,MM dan Hj. Nursatma yang tak pernah berhenti memberikan doa restu, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materi selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih senantiasa penulis haturkan kepada segenap Civitas Akademik UIN Alauddin Makassar antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS selaku Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr.H. Ahmad Sewang.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Fatmawaty Mallapiang S.Km.,M.Kes.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra.Hj.Faridha Yenny Nonci,M.Si.,Apt.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, sekaligus pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan, pengarahan serta membimbing sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Wahyudi G.,M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

6. Ibu Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, sekaligus pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan, pengarahan serta membimbing sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Haeria S.Si, M.Si selaku sekretaris jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, selaku penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan bantuan, pengarahan serta membimbing sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Syamsuduha Saleh M.,Ag selaku Dewan Penguji Agama yang telah banyak memberikan bantuan, pengarahan serta membimbing sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Kepada segenap Dosen dan staf Farmasi UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan kepada penyusun sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan penelitian hingga selesainya skripsi ini.
10. Segenap Laboran Farmasi UIN Alauddin Makassar atas bantuan dan kerjasamanya selama penyusun melaksanakan pendidikan.
11. Teman - teman angkatan 2009, yang menjadi teman seperjuangan selama penulis melaksanakan pendidikan di Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt, oleh karena itu

dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan memohon saran dan kritik yang membangun dari segala pihak guna untuk kesempurnaan skripsi dan penelitian selanjutnya.

Akhirnya, penulis sangat berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang farmasi pada umumnya dan semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayah di dalamnya. Amin Ya Robbal A'lamin

Makassar, Agustus 2013

Penulis,


ANNIZA TRI HARDIYANTI J.
NIM. 70100109012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Sejarah Bungung Barania	6
B. Mikroba Air.....	10
C. Antibiotika.....	10
D. Isolasi Bakteri.....	12
E. Identifikasi Bakteri.....	13
F. Uraian Mikroba Uji.....	13
G. Tinjauan Islam mengenai mikroba penghasil Antibiotika.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Alat yang Digunakan	23
B. Bahan yang digunakan	23
C. Prosedur kerja	24
D. Penyiapan Mikroba Uji	25
E. Pengujian aktivitas antibiotika	26

	F. <i>Identifikasi mikroba</i>	26
BAB	IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
	A. <i>Hasil Pengamatan</i>	33
	B. <i>Pembahasan</i>	45
BAB	V KESIMPULAN DAN SARAN	53
	A. <i>Kesimpulan</i>	53
	B. <i>Saran</i>	54
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Pengenceran Isolat Bakteri.....	32
Tabel 2	Hasil Pengenceran Isolat Jamur.....	32
Tabel 3	Hasil Pemurniaan Isolat Mikroba.....	33
Tabel 4	Hasil Pengukuran Zona Hambat dari Isolat Bakteri.....	34
Tabel 5	Hasil Pengukuran Zona Hambat dari Isolat Jamur.....	35
Tabel 6	Hasil pengamatan Makroskopik Pada Medium GNA.....	36
Tabel 7	Hasil Pengamatan Bentuk koloni pada medium GNA, GNA Miring dan medium NB.....	37
Tabel 8	Hasil Pengamatan Bentuk koloni pada medium PDA dan PDA Miring.	37
Tabel 9	Hasil pengamatan pada pengecatan Gram.....	38
Tabel 10	Hasil pengamatan pada Uji Motilitas.....	38
Tabel 11	Hasil pengamatan pada Uji Katalase.....	39
Tabel 12	Hasil pengamatan pada Uji Indol.....	39
Tabel 13	Hasil pengamatan pada Uji Metil Merah.....	40
Tabel 14	Hasil pengamatan pada Voges Proskauer.....	41
Tabel 15	Hasil pengamatan pada Uji Sitrat.....	41
Tabel 16	Hasil pengamatan pada Uji Produksi H ₂ S	42
Tabel 17	Hasil pengamatan pada Uji Pencairan Gelatin.....	42
Tabel 18	Hasil pengamatan pada Uji Pertumbuhan Pada Beberapa Variasi Suhu..	43
Tabel 19	Hasil pengamatan pada Uji Pertumbuhan Pada Beberapa Variasi pH...	43




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Foto Isolat Bakteri dari air Bungung Barania pada Media Agar...	64
Gambar 2	Foto Hasil Pemurnian Isolat mikroba dari Bungung Barania dengan Metode Kuadran.....	65
Gambar 3	Foto Hasil Isolat Murni pada Medium Agar Miring	66
Gambar 4	Foto Hasil Fermentasi Isolat Mikroba.....	66
Gambar 5	Foto Hasil Pengujian Penghambatan Fermentat Isolat Bakteri Dan Jamur terhadap Mikroba Uji	67
Gambar 6	Foto Hasil Pengamatan Makroskopik Isolat Bakteri dan jamur Pada Medium NA dan PDA di Cawan Petri	72
Gambar 7	Foto Hasil Pengamatan Makroskopik isolat Bakteri dan Jamur yang ditusukkan Pada Medium Agar	74
Gambar 8	Foto Hasil Pengamatan Makroskopik isolat Bakteri dan Jamur Pada Medium Agar miring.....	74
Gambar 9	Foto Pengecatan Gram	75
Gambar 10	Foto hasil Uji Motil dan Uji Indol.....	82
Gambar 11	Foto hasil Uji Metil Merah dan Uji Voges Preskuer.....	82
Gambar 12	Foto hasil Uji Sitrat dan Uji H ₂ S.....	82
Gambar 13	Foto hasil Uji pertumbuhan beberapa variasi suhu	83
Gambar 10	Foto hasil Uji Katalase.....	83
Gambar10	Foto Bungung Barania.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pembuatan Medium.....	57
Lampiran II Pembuatan Reagen.....	61
Lampiran III Skema Kerja	63
Lampiran IV Hasil Pengamatan	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Kabupaten Gowa Kecamatan Bajeng tepatnya Kelurahan Mataallo yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah penduduk 3853 jiwa yang tersebar dalam di tiga lingkungan yakni lingkungan Jatia dengan luas wilayah 25,05 Ha, lingkungan Timpopo dengan luas wilayah 77,09 Ha, dan lingkungan Kutulu dengan luas wilayah 78,13 Ha, secara umum wilayah kelurahan Mataallo ini memiliki jenis tanah liat berwarna kecoklatan dengan kondisi iklim tropis dengan suhu rata-rata mencapai 28-32°C dengan memiliki dua tipe musim yakni musim hujan terjadi pada bulan nopember hingga maret dan musim kemarau di mulai pada bulan juli hingga oktober adapun keadaan topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata mencapai 300-500 meter dari permukaan laut. (Renstra Kelurahan Mataallo:2011)

Ditempat yang jaraknya sekitar 13,40 km dari Ibu kota Kabupaten Gowa ini terdapat sumber mata air dengan luas 3x3 meter dan kedalaman sekitar 10 meter yang masyarakat sering menyebut dengan nama Bungung Barania tepatnya di lingkungan Kutulu. Bungung Barania ini memiliki makna bersejarah bagi kebesaran kerajaan Bajeng di masa lalu pada saat masa

kepemimpinan Syech Abdul Rahman atau Karaeng Loe, maka Bungung Barania merupakan salah satu objek wisata di Bajeng pada saat ini.

Di tempat ini terjadi fenomena yang cukup menarik, menurut Hj. Jumatiah Daeng Bau yang merupakan seorang penjaga Bungung Barania sejak tahun 1954 atau sekitar 59 tahun yang lalu, mengaku setiap bulannya sekitar 150 hingga 200 orang datang berkunjung untuk mengambil air dari Bungung Barania, Sebagai bahan pengobatan alternatif dalam penyembuhan penyakit, diantara penyakit yang pernah terobati dengan menggunakan air Bungung Barania yakni sakit perut, gatal pada kulit dan beberapa penyakit lainnya, Adapun cara penggunaan air Bungung Barania yang selama ini digunakan untuk pengobatan yakni dengan cara diminum ada pula yang dimandikan pada tubuh penderita penyakit, biasanya cara ini digunakan untuk penyembuhan penyakit kulit. Hj. Jumatiah Daeng Bau pun mengaku pernah mengalami gatal dan timbul bercak-bercak merah pada kulitnya, Setelah menggunakan air Bungung Barania untuk mandi beberapa kali Ia pun sembuh dari penyakit kulit yang dideritanya. Tidak hanya itu Hj. Hasiyah Daeng Rannu Pun mengaku pernah mengalami sakit perut ringan kemudian mengambil inisiatif meminum air Bungung Barania kemudian rasa sakit perutnya berangsur-angsur hilang,

Dari penuturan ini, maka ada kemungkinan terdapat mikroba penghasil antibiotika yang terkandung di dalam air Bungung Barania. Sebagaimana diketahui mikroorganisme dapat menghasilkan bahan antibiotika, Antibiotika ini mempunyai kemampuan menghambat atau mematikan mikroorganisme lain dan hal ini yang menjadi faktor utama penyembuhan beberapa penyakit

infeksi ringan yang disebabkan oleh mikroba dengan penggunaan air Bungung Barania.

Keberadaan mikroba penghasil antibiotika yang terkandung dalam air Bungung Barania dapat ditunjang oleh beberapa faktor, sebagaimana diketahui bahwa air merupakan salah satu tempat hidup yang baik untuk mikroba. Faktor lain yakni letak mata air itu sendiri yang berasal dari dalam tanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa mikroba dapat berasal dari tanah dan adanya pohon-pohon besar yang berada tidak jauh dari letak mata air tersebut, hal ini juga patut jadi pertimbangan karena mikroba juga dapat berasal dari berbagai bagian tumbuhan. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan utama adalah adanya akar-akar dari pohon-pohon yang langsung berada didalam tanah tempat mata air berada.

Dari penjelasan tersebut, perlu diadakan penelitian tentang Identifikasi Mikroba Penghasil Antibiotik dari air Bungung Barania Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT tidak menciptakan sesuatu tidak dengan sia – sia. Apa yang diciptakan- Nya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia seperti mikroorganisme yang dapat menjadi bahan antibiotika. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al- Imran/3: 190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ



Terjemahnya:

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Ayat ini menunjukkan sebagai manusia yang memiliki ilmu pengetahuan maka sepantasnya kita mengakui kebesaran Allah SWT, dimana telah terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak lagi diragukan kebenarannya dalam penciptaan langit dan bumi dan segala yang terdapat di dalamnya dan menyadari bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah SWT memiliki mamfaat yang berguna untuk kehidupan manusia, seperti halnya mikroba yang memiliki banyak mamfaat salah satunya sebagai penghasil bahan antibiotika yang berguna dalam penyembuhan beberapa penyakit infeksi.

B. **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah:

1. Apakah terdapat mikroba penghasil antibiotik dari air Bungung Barania Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
2. Bagaimana karakteristik mikroba penghasil antibiotik dari air Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pemanfaatan mikroba sebagai antibiotik

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh isolat mikroba penghasil antibiotik dari air bungung Barania kecamatan Bajeng kabupaten Gowa.
2. Untuk mengidentifikasi mikroba penghasil antibiotik dari air Bungung Barania kelurahan Mataallo kecamatan Bajeng kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui adanya aktivitas senyawa antibiotika yang dihasilkan oleh mikroba air Bungung Barania Kelurahan Mataallo kecamatan Bajeng kabupaten Gowa.

D. Manfaat penelitian

1. Sebagai acuan dalam produksi antibiotika baru yang dihasilkan mikroba pada air Bungung Barania kelurahan Mataallo kecamatan Bajeng kabupaten Gowa.
2. Sebagai acuan pandangan Islam terhadap pemanfaatan mikroba sebagai antibiotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Bungung Barania

Pada abad 15 silam, salah seorang Raja yang pernah berkuasa di bantaeng bernama Syech Abdul Rahman yang berasal dari negeri Arab, tapi karena sudah menyatu dengan warga Makassar Bantaeng maka Syech itu kemudian diberi nama Baso Daeng Pabeta. Kemudian karena system pemerintahan yang dijalankan berhasil baik dan membuat negerinya maju dan rakyatnya sejahtera, maka rakyat Bantaeng saat itu memberinya gelar dengan nama Karaeng Loe artinya Raja yang sangat dihormati karena keberhasilannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam memimpin Kerajaan Bantaeng, Karaeng Loe tak ingin dijadikan pemimpin seumur hidup, walau rakyat Bantaeng saat itu menuntut agar Karaeng Loe tetap di Bantaeng namun Karaeng Loe ingin agar pemerintahan di Bantaeng ada regenerasi. Atas pertimbangan itulah Karaeng Loe menunjuk salah seorang kadernya untuk menggantikannya kemudian Karaeng Loe mendirikan sebuah kerajaan kecil, namanya Kerajaan Bajeng. Namun karena adanya penghianatan yang dilakukan oleh salah seorang Gallarrang (Raja salah satu wilayah Kerajaan Induk), sehingga Karaeng Loe dan pengikutnya hijrah lagi ke wilayah barat. Di perkampungan baru yang mereka itulah Karaeng Loe merasa terhibur dan senang tinggal di tempat barunya, itulah sebabnya kampung itu disebut Limbung (Dalam bahasa Makassar A'limbung- limbung

artinya bersenang-bersenang). Di Negeri Limbung itulah dibangun sebuah Istana yang disebut Balla Lompoa, di Mataallo. (Tika zainuddin dkk, 2010:55)

Suatu hari Karaeng Loe ingin melihat dari dekat negeri yang baru didatanginya. Ia berjalan menelusuri daerah hutan dan persawahan. Akhirnya Karaeng Loe dan Pengikutnya sampai di sebuah perkampungan namanya Kampung Mataallo. Di kampung Mataallo inilah Karaeng Loe dan Pengikutnya kehausan. Mereka ingin minum, namun tak ada air setetes pun yang mengalir disungai apalagi sumur penduduk sangat jauh. Dalam kondisi haus dan lapar, Karaeng Loe mendapatkan ilham dari yang Maha Kuasa. Tongkat yang selalu di pegang itu kemudian di tancapkannya didekat sebuah pohon besar. Tanah tempat ditancapkannya tongkat tersebut kemudian membentuk sebuah lubang besar tak lama kemudian keluar air yang jernih. Di saat air jernih keluar di lubang besar tersebut Karaeng Loe dan pengikutnya lalu beramai-ramai meminum sekaligus mandi disumur itu. Setelah minum dan mandi, Karaeng Loe dan pengikutnya merasa ada perubahan dalam dirinya. Tadinya penakut dan lemah, tiba-tiba menjadi pemberani dan memiliki kondisi tubuh yang kuat. Lubang besar yang mengeluarkan sumber air kemudian dipelihara baik-baik. Dinding sumur tersebut disusun batu bata supaya tidak longsor. Karena sumur itu dianggap sangat bertuah, sehingga Karaeng Loe dan pengikutnya saat itu menamakan sumur bertuah tersebut dengan nama Bungung Barania (Artinya bila air sumur itu diminum dan dipakai mandi akan menimbulkan rasa perkasa pada diri seseorang).

Melihat keajaiban dari Bungung Barania tersebut. Karaeng Loe memerintahkan, agar pengkaderan prajurit Kerajaan Bajeng dilakukan di dekat sumur bertuah itu. Para prajurit yang sudah terlatih kemudian dimandikan di sumur itu. Setelah mereka mandi dan minum, para prajurit lepasan Bungung Barania itu dengan gagah berani melakukan perlawanan terhadap musuh-musuhnya di medan tempur. . (Tika zainuddin dkk, 2010:56)

Suatu kebiasaan bagi masyarakat di Kerajaan Bajeng. Para prajurit kerajaan sebelum berangkat ke medan perang, terlebih dahulu dilakukan upacara pemberangkatan. Mereka mandi dan minum di sumur bertuah itu. Mengingat Bungung Barania memiliki makna bersejarah bagi kebesaran masyarakat Bajeng di masa lalu, maka setiap dua tahun sekali dilakukan upacara gaung di sekitar sumur tersebut. Bungung Barania sampai sekarang menjadi salah satu objek wisata sejarah Bajeng, jaraknya sekitar 10 km dari arah selatan kota Sungguminasa. Sumur tersebut berukuran 3x3 meter, diluar sumur bertuah itu diberi pagar keliling masing-masing sisi sebanyak 40 buah tombak yang bermakna pasukan patampuloa (empat puluh), kedalamannya sekitar 10 meter. (Tika zainuddin dkk, 2010:61)

B. Air

Air adalah materi esensial atau materi yang dibutuhkan untuk kehidupan. Dalam tubuh manusia air terdapat berkisar antara 50-70 % dari seluruh berat badan pengaruh air terhadap kesehatan tergantung dari kualitas air yang digunakan.

Air merupakan medium pembawa mikroorganisme patogenik yang berbahaya bagi kesehatan, patogen yang sering ditemukan dalam air terutama adalah bakteri-bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan seperti *Vibrio cholera* penyebab penyakit kolera, *Salmonella typhosa* penyebab tifus, serta *Escherichia coli*. (Fardias,1992)

C. Mikroba Air

Mikroba dapat diperoleh dari lingkungan air, tanah, udara, substrat yang berupa bahan pangan, tanaman dan hewan. Jenis mikroba dapat berupa bakteri, khamir, kapang, dan yang lainnya. (Dwyana,2006)

Mikroba yang terdapat didalam air berasal dari berbagai sumber seperti udara, tanah, sampah, lumpur, tanaman hidup atau mati, hewan hidup atau mati (bangkai), kotoran manusia atau hewan, bahan organik lainnya, dan sebagainya. Mikroba tersebut mungkin tahan lama hidup didalam air atau tidak tahan lama hidup didalam air karena lingkungan hidupnya yang tidak cocok. (Fardiaz,1992)

D. Antibiotika

Mikroorganisme dapat menyebabkan banyak bahaya dan kerusakan. Hal itu nampak dari kemampuannya menginfeksi manusia, hewan, serta tanaman, menimbulkan penyakit yang berkisar dari infeksi ringan sampai kepada kematian (Pelczar, dkk, 1988: 447).

Oleh karena itu kebutuhan antibiotika baru masih sangat diperlukan terutama yang efektif melawan bakteri resistensi, virus, protozoa, fungi atau tumor, untuk mendapatkan antibiotika baru. Para peneliti banyak melakukan

berbagai cara seperti biotransformasi senyawa-senyawa tertentu dengan bantuan mikroba atau membuat derivat antibiotika baru dari mikroba yang ada di alam. (Naid,5)

Tujuan dari terapi antibiotika adalah untuk menghambat atau dapat membasmi mikroba sehingga dapat menyembuhkan atau mengendalikan penyakit. (Nadyah 2011:85)

Antibiotik adalah produk metabolik yang dihasilkan suatu organisme tertentu yang dalam jumlah amat kecil bersifat merusak atau menghambat mikroorganisme lain (Pelczar:1988,511)

Antibiotika yang pertama kali ditemukan adalah penisilin oleh Alexander Fleming pada tahun 1929. Dalam penemuannya yang secara tidak sengaja tersebut, diperoleh adanya hambatan terhadap pertumbuhan biakan staphylococcus oleh adanya kontaminasi dari sejenis jamur yaitu penicillium yang belakangan diketahui menghasilkan antibiotika penisilin.

Antibiotika dapat diproduksi oleh bakteri dan fungi. Keberadaan mikroba tersebut terdapat dimana-mana di alam ini, baik di darat, di udara maupun di laut. (Djide,36)

Jenis antibiotika sangat beragam. Namun demikian dapat diklasifikasikan berdasarkan atas spektrum antibiotikanya, aksi atau mekanisme kerjanya, cara biosintesisnya atau berdasarkan atas struktur kimianya. (Djide,246)

Penggolongan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitasnya dapat dibagi atas beberapa golongan yaitu:

1. Antibiotika dengan spektrum luas, efektif baik terhadap gram positif maupun gram negatif. Sebagai contoh adalah turunan tetrasiklin, turunan amfenikol, turunan aminoglikosida, turunan makrolida, rifampisin, beberapa turunan penisilin (ampisilin, amoksisilin, bikampisin, karbenisilin, hetasilin, dan lain-lain dan sebagian besar turunan sefalosporin).
2. Antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram positif. Sebagai contohnya basitrasin, eritromisin, sebagian besar turunan penisilin sebagai benzil penisilin, kloksasalin, penisilin G prokain dan beberapa turunan sefalosporin.
3. Antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram negatif. Sebagai contoh kolistin, polimiksi B sulfat, vimisin, dan sulfomisin.
4. Antibiotika yang aktivitas dominan pada mycobacteriae. Sebagai contoh streptomisin, kanamisin, sikloserin, vimisin, dan lain-lain.
5. Antibiotika yang aktif terhadap jamur. Sebagai contoh adalah Grisofulvin, antibiotika polien (nistatin, amfoterisin B).
6. Antibiotika yang aktif terhadap neoplasma (anti kanker). Contohnya adalah aktinomisin, bleomisin, mitomisin, mitramisin dan lain-lain.

Berdasarkan atas struktur kimianya antibiotika dibagi menjadi 10 kelompok yaitu:

1. Antibiotika β -laktam (turunan penisilin, sefalosporin, dan β -laktam non klasik)

2. Turunan amfenikol
3. Turunan tetrasiklin
4. Aminoglikosida
5. Antibiotika makrolida
6. Antibiotika polipeptida
7. Antibiotika linkosamida
8. Antibiotika polien
9. Antibiotika ansamisin
10. Antibiotika antrasiklin (Djide,347)

E. *Isolasi Antibiotika*

Mikroba dalam alam hampir selalu dalam keadaan tercampur. Isolasi suatu galur murni pada prinsipnya dapat dilakukan dengan secara bertingkat yang dikenal sebagai cara konvensional. Tingkat pertama biasa dilakukan secara manual, yaitu dengan cara sejauh mungkin mengencerkannya. Beberapa tingkat pengenceran terakhir dipupuk pada media dengan harapan akan tumbuh koloni yang dianggap murni. Tingkat kedua adalah dengan media yang bersifat selektif bagi mikroba tertentu atau mikroba tertentu yang mungkin masih satu golongan. Tingkat ketiga dari koloni yang seolah oleh sudah murni masih perlu diencerkan kembali atau diisolasi ulang agar tingkat kemurniannya lebih meyakinkan untuk selanjutnya dilakukan metode karakterisasi sebagai pembuktian bahwa galur isolat yang di peroleh benar-benar murni. (Djide,37)

F. Identifikasi bakteri

Karakteristik dapat diketahui dengan serangkaian pengujian biokimia pada organisme. (Brown:2005,237)

Karakteristik yang dicari biasanya bersifat positif atau negatif sehingga hasil apapun dapat digunakan untuk memberikan hasil yang unik dalam diferensial. Uji-uji didesain sedemikian rupa untuk memberikan kemampuan membedakan secara maksimum antara kelompok mikroorganisme. (Djide:2008,304)

G. Uraian Mikroba Uji

1. *Escherichia coli* (Garrity, 2004: 24-141)

a. Klasifikasi

Kerajaan : Plantae

Asal : Bacteria

Divisi : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Keluarga : Enterobacteriaceae

Jenis : *Escherichia*

Spesies : *Escherichia coli*

b. Sifat dan Morfologi

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang lurus, 1, 1-1,5 μm x 2,0-6,0 μm , motil dengan flagellum peritrikus atau non motil. Tumbuh dengan mudah pada medium

nutrient sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas. (Pelczar, 1986: 949)

2. *Staphylococcus aureus* (Garrity, 2004: 24-187)

a. Klasifikasi

Kerajaan : Plantae

Asal : Bacteria

Bagian : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Ordo : Bacillales

Keluarga : Staphylococcaceae

Jenis : *Staphylococcus*

Spesies : *Staphylococcus aureus*

b. Sifat dan Morfologi

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif, sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5-1,5 μm , terdapat tunggal dan berpasangan, dan secara khas membelah diri lebih dari satu bidang sehingga membentuk kolom tidak teratur. Dinding sel mengandung dua komponen utama, peptidoglikan dan asam teikoat. Metabolisme secara respiratif dan fermentatif. Tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerob. Suhu optimum 35-40°C. terutama berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas. Kisaran inangya luas, dan banyak galur merupakan patogen potensial. (Pelczar, 2008: 954-955)

3. *Pseudomonas aeruginosa* (Garrity, 2004: 24-95)

a. Klasifikasi

Kerajaan : Plantae

Asal : Bacteria

Bagian : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Ordo : Pseudomonadales

Keluarga : Pseudomonadaceae

Jenis : *Pseudomonas*

Spesies : *Pseudomonas aeruginosa*

b. Sifat dan Morfologi

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif dengan berbentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5 – 1,0 µm. motil dengan flagellum polar, monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka. Metabolism dengan respirasi, beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan H₂ atau CO₂ sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima electron universal, dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan. (Pelczar, 1986: 952)

4. *Vibrio Sp* (Garrity, 2004: 24-109)

a. Klasifikasi

Kerajaan : Plantae

Asal : Bacteria
Bagian : Proteobacteria
Kelas : Gammaproteobacteria
Ordo : Vibrionales
Keluarga : Vibrionaceae
Jenis : *Vibrio*
Spesies : *Vibrio Sp*

b. Sifat dan morfologi

Vibrio sp adalah bakteri gram negatif berbentuk batang pendek, tidak membentuk spora, sumbunya melengkung atau lurus 0,5 μm , terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagellum polar atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagellum dalam satu berkas polar. Mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam keadaan lingkungan kurang menguntungkan, tidak tahan asam dan tidak membentuk kapsul. Tumbuh baik dan cepat pada medium nutrient baku, metabolisme dengan respirasi dan fermentasi. Suhu optimum berkisar dari 18 sampai 37° C.

5. *Bacillus subtilis* (Garrity, 2008: 24-172)

a. Klasifikasi

Kerajaan : Plantae
Asal : Bacteria
Bagian : firmicutes

Kelas : Bacilli
Ordo : Bacillales
Keluarga : Bacillaceae
Jenis : *Bacillus*
Spesies : *Bacillus subtilis*

b. Sifat dan Morfologi

Bacillus subtilis memiliki sel berbentuk batang, 0,3 – 2,2 µm x 1,27 – 7,0µm, sebagian besar motil; flagellum khas lateral. Membentuk endospora; tidak lebih satu sel sporangium. Termasuk bakteri gram positif, bersifat kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi sejati, fermentasi sejati, atau kedua-duanya, yaitu respirasi dan fermentasi. Aerobik sejati atau anaerobik fakultatif. (Pelczar, 1986: 947)

6. *Streptococcus mutans* (Garrity, 2004: 24-203)

a. Klasifikasi

Kerajaan : Plantae
Asal : Bacteria
Bagian : Firmicutes
Kelas : Bacilli
Ordo : Lactobacillales
Keluarga : Streptococcaceae
Jenis : *Streptococcus*
Spesies : *Streptococcus mutans*

b. Sifat dan Morfologi

Streptococcus mutans berbentuk bulat, termasuk bakteri gram positif dan biasanya tidak berpigmen. Berdiameter 0,5 – 1,5 μm , koloni bulat cembung dengan permukaan licin atau sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau sebagian tidak beraturan. Koloni buram berwarna biru terang, bersifat fakultatif aerob, dapat tumbuh pada suhu 450°C dan suhu optimumnya. Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, polisakarida, protein dan asam lipokoat. (Pelczar, 1986: 955)

7. *Salmonella typhi* (Garrity, 2004: 24-203)

a. Klasifikasi

Kerajaan : Plantae

Asal : Bacteria

Bagian : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Keluarga : Enterobacteriaceae

Jenis : *Salmonella*

Spesies : *Salmonella typhi*

b. Sifat dan morfologi

Salmonella typhi adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus dengan ukuran 0,7 – 1,5 μm , biasanya tunggal dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, jenis yang bergerak

berflagela peritrik, hidup secara aerobik fakultatif, meragikan glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas. Tumbuh optimal pada suhu 37°C dan berkembang baik pada suhu kamar. Bakteri ini dapat ditemukan pada saluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini merupakan penyebab demam tifoid karena adanya infeksi akut pada usus halus manusia dan hewan. (Pelczar, 1986: 948)

8. *Staphylococcus epidermidis* (Garrity, 2004: 24-178)

a. Klasifikasi

Kerajaan : Plantae

Asal : Bacteria

Bagian : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Ordo : Bacillales

Keluarga : Staphylococcaceae

Jenis : Staphylococcus

Spesies : *Staphylococcus epidermidis*

b. Sifat dan Morfologi

Staphylococcus epidermidis sel-selnya berbentuk bola, berdiameter 0,5–1,5 µm, terdapat tunggal atau berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang, sehingga membentuk gerombol yang tidak teratur. Merupakan bakteri Gram

positif, tidak ditemukan adanya protein A, sedangkan ribitol digantikan oleh gliseril. (Pelczar, 1986: 954)

9. *Candida albicans* (Kill, 1995: 136)

a. Klasifikasi

Kerajaan : Plantae
Asal : Fungi
Bagian : Ascomycota
Sub bagian : Saccharomycotina
Kelas : Saccharomycetales
Keluarga : Saccharomycetacea
Jenis : *Candida*
Spesies : *Candida albicans*

b. Sifat dan morfologi

Candida albicans mempunyai bentuk sel bermacam-macam. Menghasilkan banyak pseudomiselium, dapat dijumpai pada posisi yang khas menurut pengucapan multilateral. Disimilasi mungkin oksidatif, tetapi pada banyak spesies juga sangat fermentatif. Di dalam medium cair dapat berbentuk endapan, cincin dan pelikel (Pelczar, 2008: 953).

H. Tinjauan Islam Mengenai Mikroba Penghasil Antibiotika

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT tidak ada yang tidak memiliki mamfaat sebagaimana dalam firman-Nya, Q.S Al-Imran/3: 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ



Terjemahnya:

“ (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Dan Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang di kehendaki-Nya untuk memberi nikmat kepada umat manusia sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Luqman/31:20

الْمَ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

كِتَابِ مُنِيرٍ

Terjemahnya:

“ Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Maha besar Allah SWT atas segala sesuatu yang telah diciptakannya untuk manusia. Serta menjadikan semua kejadian yang berlangsung di langit maupun di bumi agar umat manusia senantiasa mengambil pelajaran dan mengingat kekuasaan Allah SWT Q.S Ar-Ruum/30 :24

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan menurunkan air hujan dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnyanya.

Dari itu umat muslim haruslah senantiasa mengingat Allah SWT atas semua kebesaran Nya, Nabi Muhammad SAW Bersabda:

وَالْمَيِّتِ الْحَيِّ مَثَلُ رَبِّهِ يَذُكُرُ لَا وَالَّذِي رَبَّهُ يَذُكُرُ الَّذِي مَثَلُ

Terjemahnya:

“Permisalan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti orang yang hidup dengan yang mati.”
(HR. Al-Bukhar no. 6407)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat yang Digunakan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Autoklaf, Bunsen, Botol coklat, Cawan petri, Erlenmeyer, Gelas piala, Gelas ukur, Inkubator, Laminar Air Flow (LAF), lemari pendingin, Mikroskop, Oven, Pipet tetes, Rak tabung, Sentrifuges, Shaker, Spektrofotometer, Tali pengikat, Tabung reaksi dan Timbangan analitik

B. Bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan adalah Sampel Air Bungung Barania Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Air suling, Alkohol 70%, Biakan murni mikroba yaitu *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Vibrio sp*, *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Candida albicans*. Medium Metil Red-Voges Proskauer (MR-VP), Medium Gelatin, Medium Glukosa Nutrien Agar (GNA), Medium Natrium Broth (NB), Medium Phenilamine Deaminase Agar, Medium Potato Dekstrosa Agar (PDA), Medium Simmon Citrate Agar (SCA), Medium Sulfit Indol Motility (SIM), Medium Triple Sugar Iron Agar (TSIA), Medium Tripton, dan Medium Maltosa Yeast Ekstrak Broth (MYB).

A. *Prosedur kerja*

1. Sterilisasi Alat

Alat yang digunakan dicuci dengan deterjen lalu dibilas dengan air suling, kemudian alat-alat gelas disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan diatas Bunsen.

2. Pengambilan sampel

Diambil sampel dari air Bungung Barania Kutulu Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menggunakan botol kaca yang sebelumnya leher botol telah diikat dengan tali untuk memudahkan pengambilan sampel langsung mata air, kemudian dibawa ke laboratorium.

3. Pembuatan suspensi sampel

Sampel air lalu dimasukkan dalam botol pengencer dan dicukupkan dengan air suling steril hingga 10 ml (pengenceran 10^{-1}). Sampel dari pengenceran 10^{-1} kemudian dibuat pengenceran lagi hingga menjadi 10^{-3} .

4. Pemiakan mikroba sampel

Suspensi sampel dari setiap pengenceran diambil 1 ml secara aseptis, kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri, lalu ditambahkan medium Glukosa Nutrien Agar (GNA) untuk bakteri diinkubasi 1x24 jam dan medium Potato Dekstrosa Agar (PDA) untuk jamur Kemudian diinkubasi 3x24 jam hari pada suhu 37°C.

5. Seleksi dan isolasi mikroba penghasil antibiotika pada sampel

Setelah diinkubasi dilakukan pengamatan terhadap koloni yang tumbuh yang memperlihatkan adanya hambatan berupa daerah bening di sekelilingnya. Koloni ini selanjutnya diisolasi hingga diperoleh biakan murni yang hanya terdiri dari satu macam koloni dengan metode kuadran, Biakan murni tersebut lalu dipindahkan pada agar miring sebagai stok.

6. Fermentasi biakan murni

Koloni biakan murni diambil 1 ose, diinokulasikan dalam medium NA miring lalu diinkubasi pada suhu 37°C selama 1x24 jam, kemudian disuspensikan dengan 2 ml larutan NaCl fisiologis dan diinokulasikan dalam 10 ml medium pembenihan cair MY-Broth, diinkubasi pada suhu kamar selama 1x24 jam dan dikocok menggunakan shaker dengan kecepatan 170 rpm.

B. Penyiapan Mikroba Uji

1. Peremajaan mikroba uji

Biakan mikroba uji yaitu *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Vibrio sp*, *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Candida albicans*. masing-masing diambil 1 ose biakan mikroba diinokulasikan dengan cara digoreskan biakan bakteri pada medium GNA lalu diinkubasikan pada suhu 37°C selama 1x24 jam dan biakan jamur pada medium PDA lalu diinkubasi pada suhu 37°C 3x24 jam.

2. Pembuatan suspensi mikroba uji

Mikroba uji yang telah diremajakan disuspensikan dengan larutan NaCl fisiologis steril lalu diukur transmittannya pada 25%T dengan menggunakan spektrofotometer, sebagai blanko digunakan larutan NaCl fisiologis, sedangkan untuk mikroba uji khamir dibuat suspensi dengan cara yang sama tetapi dengan pengukuran transmittan pada 75%T.

C. *Pengujian Aktivitas Antibiotika*

Suspensi mikroba uji sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam 15 ml medium Glukosa Nutrien Agar (GNA) untuk bakteri dan medium Potato Dekstrosa Agar (PDA) untuk jamur dihomogenkan, kemudian dibiarkan hingga setengah memadat. Setelah itu diletakkan paper disk yang sudah direndam dengan filtrat hasil fermentasi secara aseptis. Diinkubasi pada suhu 37°C selama 1x24 jam. Daerah hambatan berupa zona bening di sekitar paper disk yang berisi hasil fermentasi, setelah itu diukur dan dicatat.

D. *Pengamatan morfologi secara makroskopik*

- a. Medium Nutrien Agar (NA) dituang ke dalam cawan petri steril sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan 1 ml isolat mikroba, dibiarkan memadat, setelah memadat kemudian diinkubasikan pada suhu 37°C, selama 1x24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk koloni, elevasi, tepi dan struktur dalam. Dilakukan hal yang sama pada isolat lainnya.
- b. Medium Nutrien Agar (NA) dipipet 10 ml dibiarkan memadat dalam tabung reaksi dengan posisi tegak, setelah memadat kemudian diinokulasikan isolat mikroba secara tusukan dengan ose lurus,

selanjutnya diinkubasikan pada suhu 37°C, selama 1x24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk koloninya. Dilakukan hal yang sama pada isolat lainnya.

- c. Medium Nutrien Agar (NA) dipipet 7 ml dalam tabung reaksi kemudian dimiringkan, dibiarkan memadat kemudian diinokulasikan isolat mikroba dengan cara digoreskan dengan ose bulat. Setelah memadat diinkubasikan pada suhu 37°C, selama 1x24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk koloninya. Dilakukan hal yang sama pada isolat lainnya.
- d. Medium Nutrien Broth (NB) dipipet 10 ml dalam tabung reaksi, kemudian diinokulasikan isolat mikroba dengan ose bulat. Setelah memadat diinkubasikan pada suhu 37°C, selama 1x24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk koloni, warna dan keadaan permukaannya. Dilakukan hal yang sama pada isolat lainnya.
- e. Dilakukan identifikasi seperti di atas terhadap isolat jamur menggunakan medium PDA dengan masa inkubasi selama 3x24 jam pada suhu kamar.

E. Identifikasi Morfologi Secara Mikroskopik Dengan Pewarnaan Gram

Gelas objek dibersihkan dengan alcohol 70% kemudian difiksasi di atas lampu spiritus, selanjutnya isolate aktif diambil secara aseptik dan diletakkan di atas gelas objek lalu diratakan. Difiksasi kembali di atas lampu spiritus, setelah dingin ditetaskan cat Gram A (Kristal violet) 2-3 tetes selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Setelah itu

ditetesi dengan Gram B(Iodium) selama 1 menit, dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Kemudian ditetesi dengan Gram C (Alkohol 70%) selama 30 detik, dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Terakhir ditetesi dengan Gram D (Safranin) selama 45 detik, lalu dicuci dengan air mengalir dan kelebihan air dihilangkan dengan kertas serap. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat bentuk dan warna sel di bawah mikroskop dengan pembesaran tertentu.

F. *Pengujian Aktivitas Biokimia*

a. Uji motilitas

Medium SIM (Sulfid Indol Motility) dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, tabung pertama diisi dengan isolat murni biakan mikroba dengan cara ditusukkan dan tabung yang kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1x24 jam, pada suhu 37°C, bila terdapat pertumbuhan di sekitar daerah tusukan berarti motilitas positif, dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol, dilakukan hal yang sama pada masing-masing isolat lainnya.

b. Uji katalase

Dibersihkan Objek glass, diteteskan beberapa tetes larutan H₂O₂ 3% di atas gelas objek tersebut. Diambil sedikit biakan isolat murni biakan mikroba dengan ose, diletakkan dalam tetesan H₂O₂ diamati adanya gelembung-gelembung O₂ di dalam tetesan H₂O₂ di bawah mikroskop. Dilakukan hal yang sama pada masing-masing isolat lainnya.

c. Uji Indol

Medium cair Trypton 1% dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, tabung pertama diisi dengan isolat murni biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 48 jam, pada suhu 37°C, diamati terjadinya Indol dengan menambahkan 0,2-0,3 ml reagen Erlich atau Kovac ke dalam setiap tabung. Dikocok perlahan-lahan dan dibiarkan tabung berada dalam posisi tegak supaya larutan reagen dapat terkumpul di permukaan medium. Adanya Indol dapat diketahui dengan timbulnya warna merah tua pada lapisan atas permukaan medium, dibandingkan hasil ini dengan tabung kontrol. Dilakukan hal yang sama pada masing-masing isolat lainnya.

d. Uji Metil Merah

Medium Metil Merah dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, tabung pertama diisi dengan isolat murni biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 5-7 hari pada suhu 37°C, ditambahkan 5 tetes pereaksi metil merah, diamati perubahan yang terjadi. Bila terjadi warna merah berarti mikroba tersebut memproduksi asam, dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol. Dilakukan hal yang sama pada masing-masing isolat lainnya.

e. Uji Voges Proskauer

Medium MR-VP dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, tabung reaksi pertama diisi dengan isolat murni biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1x24 jam pada suhu 37°C, ditambahkan 0,6 ml alfa-naftol dan 0,2 ml KOH 40%, diamati perubahan yang terjadi. Bila terjadi warna merah berarti mikroba tersebut memproduksi asam, dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol. Dilakukan hal yang sama pada masing-masing isolat lainnya.

f. Uji Sitrat

Medium SCA (Simmons Citrat Agar) dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, dibiarkan memadat, tabung reaksi pertama diisi dengan isolat murni biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1x24 jam pada suhu 37°C, diamati perubahan yang terjadi. Bila hasilnya positif medium berubah warna menjadi biru dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol. Dilakukan hal yang sama pada masing-masing isolat lainnya.

g. Produksi H₂S

Medium miring KIA (Kligler Iron Agar), dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, dibiarkan memadat, tabung reaksi pertama diisi dengan isolat murni biakan mikroba dengan cara ditusuk lurus dan digores, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1x24 jam pada suhu 37°C, diamati terjadinya H₂S yang ditunjukkan oleh adanya warna hitam di sepanjang tusukan pada

medium dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol. Dilakukan hal yang sama pada masing-masing isolat lainnya.

h. Uji Fenilalanin Deaminase

Medium Phenilalanin dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, dibiarkan memadat, tabung reaksi pertama diisi dengan isolat murni biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1x24 jam pada suhu 37°C, ditambahkan 0,2 ml FeCl₃ 10%, diamati perubahan yang terjadi. Bila terjadi warna hijau berarti hasilnya positif dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol. Dilakukan hal yang sama pada masing-masing isolat lainnya.

i. Hidrolisis Urea

Medium Urea Broth, dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, dibiarkan memadat, tabung reaksi pertama diisi dengan isolat murni biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1x24 jam pada suhu 37°C, diamati perubahan yang terjadi. Bila positif menghidrolisis urea maka terjadi perubahan warna menjadi merahdan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol. Dilakukan hal yang sama pada masing-masing isolat lainnya.

j. Uji Pencairan Gelatin

Medium Gelatin dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, tabung pertama diinokulasikan dengan isolat murni biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1x24 jam pada suhu 37°C, dimasukkan semua tabung ke dalam

lemari es selama 30 menit. Bila positif terjadi hidrolisis gelatin, maka medium akan tetap cair dibandingkan hasil ini dengan tabung kontrol. Dilakukan hal yang sama pada masing-masing isolat lainnya.

k. Uji Pertumbuhan Pada Beberapa Variasi Suhu

Medium NB dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, tabung pertama diinokulasikan dengan isolat murni biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1x24 jam, di dalam lemari es untuk 4°C, dilakukan hal yang sama untuk suhu inkubasi 25°C dan 37°C, di dalam inkubator, dan pada masing-masing isolat lainnya. Bila hasil positif terjadi kekeruhan dan dibandingkan dengan kontrol.

l. Uji Pertumbuhan Pada Beberapa Variasi pH

Medium NB dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi, ditambahkan Asam Asetat hingga pH 3, tabung reaksi pertama diisi dengan isolat murni biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1x24 jam dalam inkubator. Dilakukan hal yang sama dengan penambahan Ammonium Hidroksida hingga pH 10 dan pada masing-masing isolat lainnya. Diamati perubahan yang terjadi. Bila hasil positif terjadi kekeruhan pada medium dan dibandingkan dengan kontrol.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Isolasi mikroba dari air Bungung Barania Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 5 isolat bakteri dan 3 isolat jamur, dapat dilihat pada tabel 1 dan 2; Gambar 1.

Tabel 1. Hasil Pengenceran Isolat Bakteri

No	Pengenceran	Jumlah isolat	Kode Isolat
1	10^{-1}	5	AB1 ₁ , AB2 ₁ , AB3 ₁ , AB4 ₁ dan AB5 ₁
2	10^{-2}	0	-
3	10^{-3}	0	-

Tabel 2. Hasil Pengenceran Isolat Jamur

No	Pengenceran	Jumlah Isolat	Kode Isolat
1.	10^{-1}	3	AJ1 ₁ , AJ2 ₁ dan AJ3 ₁
2.	10^{-2}	0	-
3.	10^{-3}	0	-

2. Pemurniaan Isolat Mikroba.

Dari hasil pemurniaan diperoleh 5 isolat bakteri dan 5 isolat jamur. Dapat dilihat pada tabel 3; Gambar 2.

Tabel 3. Hasil Pemurniaan Isolat Mikroba

No	Isolat Bakteri dan Jamur	Biakan Mikroba
1.	AB1 ₁	Isolat Bakteri ke-1
2.	AB2 ₁	Isolat Bakteri ke-2
3.	AB3 ₁	Isolat Bakteri ke-3
4.	AB4 ₁	Isolat Bakteri ke-4
5.	AB5 ₁	Isolat Bakteri ke-5
6.	AJ1 ₁	Isolat Jamur ke-1
7.	AJ2 ₁	Isolat Jamur ke-2
8.	AJ3 ₁	Isolat Jamur ke-3

3. Fermentasi Isolat Mikroba

Isolat yang telah dimurnikan difermentasikan menggunakan medium MYB (Maltosa Yeast Broth) selama 1x24 jam sambil di shaker dengan kecepatan 170 rpm, dapat dilihat pada gambar 3.

4. Uji Aktivitas Antibiotika

Hasil uji aktivitas antibiotika dilakukan dengan cara difusi agar dengan mikroba uji dan diukur zona hambatnya, dapat dilihat pada tabel 4 dan 5; Gambar 4

Tabel 4. Hasil Pengukuran Zona Hambat dari Isolat Bakteri.

No	Isolat	r	Diameter Zona Hambatan (mm)								
			EC	SA	SM	Vsp	BS	PA	SE	ST	CA
1.	AB1	1	0	10	9	9	0	0	0	10	0
		2	0	10	9	9	0	0	0	10	0
		3	0	11	9	9	0	0	0	9	0
		\bar{x}	0	10,3	9	9	0	0	0	9,6	0
2.	AB2	1	0	0	11	8	8	9	11	9	0
		2	0	0	11	8	8	8	11	8	0
		3	0	0	11	8	7	9	11	9	0
		\bar{x}	0	0	11	8	7,6	8,6	11	8,6	0
3.	AB3	1	10	0	11	10	10	0	9	0	10
		2	10	0	11	10	10	0	8	0	10
		3	11	0	11	10	10	0	9	0	9
		\bar{x}	10,3	0	11	10	10	0	8,6	0	9,6
4.	AB4	1	9	9	10	0	10	10	10	10	0
		2	9	9	10	0	10	10	10	10	0
		3	9	9	9	0	9	10	10	11	0
		\bar{x}	9	9	9,6	0	9,6	10	10	10,3	0
5.	AB5	1	8	0	0	10	9	0	10	0	9
		2	8	0	0	10	8	0	10	0	9
		3	8	0	0	10	9	0	10	0	9
		\bar{x}	8	0	0	10	8,6	0	10	0	9

Keterangan :

r : Replikasi

\bar{x} : Rata-rata

EC : *Escherchia coli*

SA : *Staphylococcus aureus*

BS : *Basillus subtilis*

ST : *Salmonella typhi*

CA : *Candida albicans*

SE : *Staphylococcus epidermidis*

SM : *Streptococcus mutan* **PA** : *Pseudomonas aeruginosa*

Vsp : *Vibrio sp*

Tabel 5. Hasil Pengukuran Zona Hambat dari Isolat Jamur.

No	Isolat	r	Diameter Zona Hambatan (mm)								
			EC	SA	SM	Vsp	BS	PA	SE	ST	CA
1.	AJ1 ₁	1	9	0	10	0	0	0	8	8	9
		2	8	0	10	0	0	0	8	8	9
		3	9	0	9	0	0	0	8	9	9
		\bar{x}	8,6	0	9,6	0	0	0	8	8,3	9
2.	AJ2 ₁	1	0	8	8	9	0	0	10	9	8
		2	0	8	9	9	0	0	10	9	8
		3	0	7	8	9	0	0	11	10	8
		\bar{x}	0	7,6	8,6	9	0	0	10,3	9,3	8
3.	AJ3 ₁	1	0	8	9	9	0	8	9	0	8
		2	0	8	9	9	0	8	9	0	8
		3	0	9	9	10	0	7	9	0	7
		\bar{x}	0	8,6	9	9,3	0	7,6	9	0	7,6

Keterangan :

r : Replikasi

BS : *Basillus subtilis*

\bar{x} : Rata-rata

ST : *Salmonella typhi*

EC : *Escherchia coli*

CA : *Candida albicans*

SA : *Staphyllococcus aureus*

SE : *Staphyllococcus epidermidis*

SM : *Streptococcus mutan*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

Vsp : *Vibrio sp*

5. Identifikasi Morfologi secara Makroskopik.

- a. Hasil pengamatan bentuk koloni dari Isolat bakteri yang di inokulasikan ke medium GNA (Glukosa Nutrient Agar) dan PDA (Potato Destrosa Agar) pada cawan petri yang diinkubasi pada suhu 37°C selama 1x24 jam, pada tabel 6; Gambar 5.

Tabel 6. Hasil pengamatan Makroskopik Pada Medium GNA.

No	Kode Isolat	Bentuk		
		Permukaan	Tepi	Tinggi
1.	AB1 ₁	Rhizoid	Berombak	Cembung
2.	AB2 ₁	Foliform	Halus	Berbukit
3.	AB3 ₁	Rhizoid	Berombak	Berbukit
4.	AB4 ₁	Foliform	Halus	Berbukit
5.	AB5 ₁	Foliform	Halus	Cembung

- b. Hasil pengamatan bentuk koloni dari Isolat bakteri dan jamur yang di tusukkan ke medium GNA (Glukosa Nutrient Agar) dan PDA (Potato Destrosa Agar), pada tabung reaksi dengan posisi tegak yang diinkubasi pada suhu 37°C selama 1x24 jam, pada tabel 7 dan 8 ;Gambar 6.
- c. Hasil pengamatan bentuk koloni dari Isolat bakteri yang di goreskan ke medium GNA (Glukosa Nutrient Agar) miring dan PDA (Potato Destrosa Agar) miring ,kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 1x24 jam, pada tabel 7 dan 8 ;Gambar 7.
- d. Hasil pengamatan bentuk koloni dari Isolat bakteri yang di inokulasikan ke medium GNB (Glukosa Nutrient Broth) pada tabung reaksi yang

diinkubasi pada suhu 37°C selama 1x24 jam, pada tabel 7 dan 8; Gambar 8.

Tabel 7. Hasil Pengamatan Bentuk koloni pada medium GNA, GNA Miring dan medium NB

No	Kode Isolat	Bentuk		
		GNA	GNA Miring	NB
1.	AB1 ₁	Manik-manik	Filiform	Cincin
2.	AB2 ₁	Filiform	Filiform	Pelikel
3.	AB3 ₁	Filiform	Filiform	Pelikel
4.	AB4 ₁	Manik-manik	Manik-manik	Selaput
5.	AB5 ₁	Manik-manik	Manik-manik	Pelikel

Tabel 8. Hasil Pengamatan Bentuk koloni pada medium PDA dan PDA Miring.

No	Kode Isolat	Bentuk	
		PDA	PDA Miring
1.	AJ1 ₁	Manik-manik	Manik-manik
2.	AJ2 ₁	Filiform	Filiform
3.	AJ3 ₁	Rhizoid	Rhizoid

6. Identifikasi Morfologi secara Mikroskopik dengan Pengecatan Gram.

Hasil yang dipengamatan dari 5 isolat diperoleh 1 Gram positif dan 4 Gram negatif, pada tabel 10 dan Gambar 9.

Tabel 9. Hasil pengamatan pada pengecatan Gram.

No	Kode Isolat	Pengecatan Gram		
		Warna	Bentuk	Keterangan
1.	AB1 ₁	Ungu	Batang	Gram Positif
2.	AB2 ₁	Ungu	Bulat	Gram Positif
3.	AB3 ₁	Merah	Bulat	Gram Negatif
4.	AB4 ₁	Ungu	Bulat	Gram Positif
5.	AB5 ₁	Merah	Bulat	Gram Negatif

7. Pengujian Aktivitas Biokimia

a. Uji Motilitas

Hasil pengamatan motilitas disekitar daerah tusukan isolat bakteri pada medium SIM, dari 5 isolat diperoleh motilitas dan non motilitas. Pada tabel 10; Gambar 10

Tabel 10. Hasil pengamatan pada Uji Motilitas.

No	Kode Isolat	Hasil	Keterangan
1.	AB1 ₁	Tidak Hitam	Non Motil
2.	AB2 ₁	Tidak Hitam	Non Motil
3.	AB3 ₁	Tidak Hitam	Non Motil
4.	AB4 ₁	Tidak Hitam	Non Motil
5.	AB5 ₁	Tidak Hitam	Non Motil

b. Uji Katalase

Hasil pengamatan pada isolat yang diletakkan diatas objek glass kemudian di tetesi dengan H₂O₂, Hasil yang diperoleh pada tabel 11; Gambar 15

Tabel 11. Hasil pengamatan pada Uji Katalase

No	Kode Isolat	Hasil	Keterangan
1.	AB1 ₁	Tidak Ada Gelembung	Tidak Menghasilkan Enzim Katalase
2.	AB2 ₁	Ada Gelembung	Menghasilkan Enzim Katalase
3.	AB3 ₁	Ada Gelembung	Menghasilkan Enzim Katalase
4.	AB4 ₁	Ada Gelembung	Menghasilkan Enzim Katalase
5.	AB5 ₁	Ada Gelembung	Menghasilkan Enzim Katalase

c. Uji Indol

Hasil pengamatan pada medium Tripton 1% yang telah diinokulasikan biakan bakteri kemudian di inkubasi pada 48 jam pada suhu 37°C. Di peroleh hasil pada tabel 12; Gambar 10.

Tabel 12 . Hasil pengamatan pada Uji Indol.

No	Kode Isolat	Warna Medium	Keterangan
1.	AB1 ₁	Bening	Tidak Menghasilkan Enzim Triptonase
2.	AB2 ₁	Bening	Tidak Menghasilkan Enzim Triptonase

3.	AB3 ₁	Merah	Menghasilkan Enzim Triptonase
4.	AB4 ₁	Merah	Menghasilkan Enzim Triptonase
5.	AB5 ₁	Bening	Tidak Menghasilkan Enzim Triptonase

d. Uji Metil Merah

Hasil pengamatan pada medium Metil merah yang telah diinokulasikan isolat yang diinkubasi selama 7 hari pada suhu 37°C kemudian di tambahkan pereaksi Metil Merah, diperoleh hasil pada tabel 13; Gambar 11

Tabel 13. Hasil pengamatan pada Uji Metil Merah.

No	Kode Isolat	Warna	Keterangan
1.	AB1 ₁	Merah	Memproduksi Asam
2.	AB2 ₁	Merah	Memproduksi Asam
3.	AB3 ₁	Merah	Memproduksi Asam
4.	AB4 ₁	Merah	Memproduksi Asam
5.	AB5 ₁	Merah	Memproduksi Asam

e. Uji Voges Proskauer

Hasil pengamatan pada medium Metil merah yang telah diinokulasikan isolat yang diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C kemudian di tambahkan pereaksi Barrit's, diperoleh hasil pada tabel 14; Gambar 11.

Tabel 14. Hasil pengamatan pada Voges Proskauer.

No	Kode Isolat	Hasil	Keterangan
1.	AB1 ₁	Merah	Memproduksi 2,3 Butanediol
2.	AB2 ₁	Merah	Memproduksi 2,3 Butanediol
3.	AB3 ₁	Merah	Memproduksi 2,3 Butanediol
4.	AB4 ₁	Merah	Memproduksi 2,3 Butanediol
5.	AB5 ₁	Merah	Memproduksi 2,3 Butanediol

f. Uji Sitrat

Hasil pengamatan pada medium SCA (Simmons Citrate Agar) yang telah diinokulasikan isolat yang diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C, diperoleh hasil pada tabel 15; Gambar 12

Tabel 15. Hasil pengamatan pada Uji Sitrat.

No	Kode Isolat	Warna medium	Keterangan
1.	AB1 ₁	Hijau	Tidak dapat menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon
2.	AB2 ₁	Biru	Dapat menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon
3.	AB3 ₁	Biru	Dapat menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon
4.	AB4 ₁	Biru	Dapat menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon
5.	AB5 ₁	Biru	Dapat menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon

g. Uji Produksi H₂S

Hasil pengamatan pada medium KIA (Kligler's Iron Agar) yang telah diinokulasikan isolat yang diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C, diperoleh hasil pada tabel 16; Gambar 12.

Tabel 16. Hasil pengamatan pada Uji Produksi H₂S .

No	Kode Isolat	Hasil	Keterangan
1.	AB1 ₁	Orange	Tidak memproduksi H ₂ S
2.	AB2 ₁	Orange	Tidak memproduksi H ₂ S
3.	AB3 ₁	Orange	Tidak memproduksi H ₂ S
4.	AB4 ₁	Orange	Tidak memproduksi H ₂ S
5.	AB5 ₁	Orange	Tidak memproduksi H ₂ S

h. Uji Pencairan Gelatin

Hasil pengamatan pada medium Gelatin yang telah diinokulasikan isolat yang diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C, kemudian diinkubasi dengan suhu 4°C diperoleh hasil pada tabel 17; Gambar 14

Tabel 17. Hasil pengamatan pada Uji Pencairan Gelatin .

No	Kode Isolat	Hasil	Keterangan
1.	AB1 ₁	Tetap Cair	Terjadi hidrolisis Gelatin
2.	AB2 ₁	Tetap Cair	Terjadi hidrolisis Gelatin
3.	AB3 ₁	Tetap Cair	Terjadi hidrolisis Gelatin
4.	AB4 ₁	Tetap Cair	Terjadi hidrolisis Gelatin
5.	AB5 ₁	Tetap Cair	Terjadi hidrolisis Gelatin

i. Uji Pertumbuhan Pada Beberapa Variasi Suhu

Hasil pengamatan pada medium GNA (Glukosa Nutrient Agar) yang telah diinokulasikan isolat yang diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 4°C, 25°C dan 37°C, diperoleh hasil pada tabel 17; Gambar 13

Tabel 18. Hasil pengamatan pada Uji Pertumbuhan Pada Beberapa Variasi Suhu.

No	Kode Isolat	Suhu		
		4°C	25°C	37°C
1.	AB1 ₁	-	+	+
2.	AB2 ₁	-	+	+
3.	AB3 ₁	-	+	+
4.	AB4 ₁	-	+	+
5.	AB5 ₁	-	+	+

j. Uji Pertumbuhan pada Beberapa Variasi pH

Hasil pengamatan pada medium GNA (Glukosa Nutrient Agar) yang telah diinokulasikan isolat yang diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C dengan pH 3 dan pH 7, diperoleh hasil pada tabel 18; Gambar 14.

Tabel 19. Hasil pengamatan pada Uji Pertumbuhan Pada Beberapa Variasi pH.

No	Kode Isolat	pH	
		pH 3	pH 7
1.	AB1 ₁	-	+
2.	AB2 ₁	-	+
3.	AB3 ₁	-	+
4.	AB4 ₁	-	+

5.	AB5 ₁	-	+
----	------------------	---	---

B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan mengisolasi mikroba dari air Bungung Barania Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Kemudian dilanjutkan dengan pemurnian isolat, fermentasi isolat bakteri, pengujian aktivitas antibiotika, identifikasi morfologi secara makroskopik dan mikroskopik, serta uji aktivitas biokimia dari isolat yang didapatkan.

Dalam mengisolasi mikroorganisme, digunakan metode tuang dengan cara dibuat pengenceran dari 10^{-1} sampai 10^{-3} untuk menurunkan jumlah mikroorganisme agar tidak terjadi penumpukan koloni sehingga memudahkan dalam pengisolasian.

Adapun media yang digunakan yang mengisolasi mikroba air yaitu media GNA (Glukosa Nutrient Agar) untuk bakteri dan media PDA (Potato Destrosa Agar) untuk jamur. Karena kedua media tersebut mengandung nutrient untuk kehidupan dan pertumbuhan mikroba air, yaitu ekstrak beef sebagai sumber protein, pepton sebagai sumber asam amino, ekstrak kentang sebagai sumber karbohidrat, dan destrosa sebagai sumber karbon.

Mikroba air yang diperoleh ditunjukkan dengan adanya koloni bakteri yang menghambat pertumbuhan bakteri disekitarnya pada medium GNA (Glukosa Nutrient Agar) diperoleh 5 isolat yang diambil pada pengenceran 10^{-1} dan pada medium PDA (Potato Destrosa Agar) diperoleh 3 isolat. Pada masing-masing medium pertumbuhan tidak didapatkan isolat dari

pengenceran 10^{-2} dan 10^{-3} , karena jumlah koloni yang tumbuh sangat sedikit, dan tidak terdapat koloni yang membentuk zona hambat.

Hasil isolasi lalu dimurnikan dengan metode kuadran sehingga diperoleh kultur koloni mikroba yang murni, yaitu isolat hanya mengandung satu bentuk morfologi koloni yang sama dengan metode kuadran yang berpola goresan yang berbeda yang dibagi menjadi empat daerah, yaitu daerah pertama merupakan tempat goresan awal selanjutnya dilanjutkan ke daerah goresan kedua yang awal goresannya dimulai dari bagian ujung pada akhir goresan di daerah pertama. Perlakuan yang sama dilakukan pada daerah goresan ketiga dan keempat, sehingga pada daerah keempat akan diperoleh koloni yang terpisah. Selanjutnya isolat murni yang didapatkan kemudian dibuat menjadi kultur dalam media agar miring sebagai stok.

Setelah memperoleh isolat yang murni, dilakukan fermentasi dalam medium MYB (Maltosa Yeast Broth) selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C selama 1×24 jam. Kemudian dishaker dengan kecepatan 170 rpm selama 1×24 jam agar bakteri mencapai fase stasioner dan menghasilkan metabolit sekunder.

Media fermentasi yang digunakan adalah media MYB (Maltosa Yeast Broth), karena media ini merupakan media cair yang mengandung ekstrak yeast sebagai sumber protein, maltosa dan destrosa sebagai sumber karbon dan pepton sebagai sumber asam amino yang dibutuhkan dalam pertumbuhan, sintesis sel, keperluan energi dalam metabolisme mikroorganisme.

Kemudian dilakukan uji aktivitas antibiotika dengan menggunakan metode difusi agar, adapun mikroba uji yang digunakan yaitu *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Vibrio sp*, *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Candida albicans*. Pemilihan mikroba uji didasari oleh sifat patogenik dari mikroba uji tersebut seperti *Escherichia coli* bakteri penyebab diare, *Staphylococcus aureus* bakteri penyebab, *Pseudomonas aeruginosa* dapat menimbulkan toksigenik pada mata sehingga menyebabkan kebutaan, *Vibrio sp* merupakan bakteri penyebab kolera, *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans* bakteri penyebab plak pada gigi, *Salmonella typhi* penyebab thifus, *Staphylococcus epidermidis* menyebabkan infeksi kulit, dan *Candida albicans* penyebab vaginitis atau keputihan

Hasil pengujian aktivitas antibiotika menunjukkan hampir semua isolat memberikan aktivitas terhadap mikroba uji, hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya zona hambatan. Adapun isolat yang memberikan daya hambat terbesar diantara lain isolat AB1₁ yang memberikan daya hambat terbesar terhadap *Staphylococcus aureus* yaitu 10,33 mm dibandingkan dengan mikroba uji *Salmonella thyposa* yaitu 10 mm, *Vibrio sp* yaitu 9 mm dan *Streptococcus mutans* yaitu 9 mm. Isolat AB2₁ memberikan daya hambat terbesar terhadap *Staphylococcus epidermidis* dan *Streptococcus mutans* yaitu 11 mm dibandingkan dengan mikroba uji *Salmonella thyposa* dan *Pseudomonas aeruginosa* yaitu 8,66 mm, *Vibrio sp* yaitu 8 mm dan *Bacillus subtilis* yaitu 7,66 mm. Isolat AB3₁ memberikan daya hambat terbesar

terhadap *Streptococcus mutans* yaitu 11 mm dibandingkan dengan mikroba uji *E.coli* yaitu 10,33 mm, *Vibrio sp* dan *Bacillus subtilis* yaitu 10 mm, *Candida albicans* yaitu 9,66 mm, dan *Staphylococcus aureus* yaitu 8,66 mm. Isolat AB4₁ memberikan daya hambat terbesar terhadap *Salmonella thyposa* yaitu 10,33 mm dibandingkan dengan mikroba uji *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus epidermidis* yaitu 10 mm, *Bacillus subtilis* dan *Streptococcus mutans* yaitu 9,66 mm, serta *E.coli* dan *Staphylococcus aureus* yaitu 9 mm. Isolat AB5₁ memberikan daya hambat terbesar terhadap *Staphylococcus epidermidis* dan *Vibrio sp* yaitu 10 mm dibandingkan dengan mikroba uji *Candida albicans* yaitu 9 mm, *Bacillus subtilis* yaitu 8,66 mm, dan *E.coli* yaitu 8 mm.

Sedangkan hasil pengujian aktivitas antibiotika terhadap jamur pada isolat AJ1₁ yang memberikan daya hambat terbesar terhadap *Streptococcus mutans* yaitu 9,6 mm dan *Candida albicans* yaitu 9 mm dibandingkan dengan mikroba uji *E.coli* yaitu 8,66 mm, *Salmonella typhi* yaitu 8,33 mm, dan *Staphylococcus epidermidis* yaitu 8 mm. Isolat AJ2₁ memberikan daya hambat terbesar terhadap *Staphylococcus epidermidis* yaitu 10,33 mm dibandingkan dengan mikroba uji *Salmonella typhi* yaitu 9,33 mm, *Vibrio sp* yaitu 9 mm dan *Streptococcus Mutans* yaitu 8,66 mm, *Candida albicans* yaitu 8 mm dan *Staphylococcus aureus* yaitu 7,6 mm. Isolat AJ2₁ memberikan daya hambat terbesar terhadap *Vibrio sp* yaitu 9,33 mm dibandingkan dengan mikroba uji *Streptococcus Mutans* dan *Staphylococcus epidermidis* yaitu 9 mm, *Staphylococcus aureus* yaitu 8,66 mm dan *Candida albicans* yaitu 7,88 mm

.yang di tunjukan dengan menghambat pertumbuhan mikroba lain (memberikan daerah bening disekitarnya), diketahui bahwa bahan antibiotika adalah bahan yang dihasilkan oleh mikroorganisme, yang mempunyai kemampuan menghambat atau mematikan mikroorganisme lain. (Djide:2008,344)

Selanjutnya dilakukan pengamatan secara mikroskopik, yaitu dengan pengecatan Gram. Pengecatan Gram pada isolat bakteri dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri yang diperoleh agar dapat diklasifikasikan sebagai bakteri Gram positif atau bakteri Gram negatif. Isolat AB3₁ dan AB5₁ hasil penelitian termasuk ke dalam bakteri Gram negatif, dimana Gram negatif memiliki dinding sel yang tipis sehingga pada pemberian cat penutup (Safranin) dapat terwarnai. Sedangkan isolat AB1₁, AB2₁ dan AB4₁ termasuk ke dalam bakteri Gram positif, dimana bakteri Gram positif mempunyai kadar lipid dan protein yang rendah sehingga mengalami denaturasi protein pada dinding selnya oleh pencucian dengan alkohol sehingga protein menjadi keras dan beku, pori-pori mengecil sehingga kompleks kristal violet dan Iodium dipertahankan karenanya sel bakteri berwarna biru atau ungu.

Pada uji motilitas, ke-5 isolat bakteri pada medium SIM tidak terdapat pertumbuhan di daerah tusukan isolat karena tidak terdapat warna hitam disekitar tusukan, hal ini menunjukkan bahwa ketujuh isolat bersifat non motil (tidak bergerak). Isolat mikroba positif bersifat motil jika terdapat warna hitam disekitar tusukan dalam medium SIM (Sulfid Indol Motility) yang menandakan terjadi pergerakan oleh isolat bakteri. (Prescott:2002,148)

Pada uji katalase, dengan adanya gelembung gas pada objek gelas setelah diinokulasikan bakteri dan ditetesi dengan larutan H₂O₂ 3% menunjukkan isolat bakteri AB₂₁, AB₃₁, AB₄₁ dan AB₅₁ positif sedangkan AB₁₁ negatif. Tes ini untuk mendeteksi adanya enzim katalase, dimana enzim ini melindungi bakteri H₂O₂ yang dapat terakumulasi selama proses metabolisme aerobik. Jika H₂O₂ terakumulasi dapat menjadi toksik bagi organisme. Dengan adanya enzim katalase dapat memecah H₂O₂ menjadi molekul air dan oksigen, sehingga tidak toksik lagi.

Pada uji Sitrat pada media SCA, isolat AB₂₁, AB₃₁, AB₄₁ dan AB₅₁ menunjukkan hasil positif karena mengalami perubahan warna dari hijau menjadi biru dan AB₁₁ negatif karena tidak terdapat warna biru di daerah isolat bakteri ditusukkan. Uji ini digunakan untuk melihat kemampuan mikroorganisme menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon dan energi. Bila mikroorganisme mampu menggunakan sitrat, maka asam akan dihilangkan dari medium biakan, sehingga menyebabkan peningkatan pH dan mengubah warna medium dari hijau menjadi biru. (Prescott:2002,155)

Pada uji produksi H₂S pada media miring TSIA, semua isolat menunjukkan hasil negatif dengan tidak adanya warna hitam di sepanjang tusukan pada medium yang menandakan adanya pembentukan H₂S.

Pada uji pencairan gelatin, ke-5 isolat bakteri memberikan hasil positif, dimana setelah diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C, kemudian didiamkan dalam lemari es selama 30 menit, semua medium tetap cair yang menunjukkan hasil positif. Gelatin adalah protein yang bila didinginkan


membentuk gel. Beberapa mikroorganisme tertentu mampu menghidrolisis gelatin. Gelatin yang telah dicerna tidak mampu membentuk gel dan bersifat cair.

Pada uji Indol, isolat bakteri AB4₁ dan AB5₁ memberikan hasil positif dengan adanya indol yang ditandai dengan timbulnya warna merah tua, sedangkan hasil negatif untuk isolat bakteri AB1₁, AB2₁ dan AB3₁. Pada medium cair Trypton 1% setelah diinokulasi dengan isolat murni biakan mikroba dan diinkubasikan selama 48 jam pada suhu 37°C, ditambahkan reagen Erlich ke dalam setiap tabung dan dikocok perlahan-lahan. Apabila timbul warna merah tua, isolat bakteri mampu mengurai asam amino triptofan yang ada pada media biakan dan menghasilkan indol sebagai produk buangan. Asam amino triptofan merupakan komponen asam amino yang lazim terdapat pada protein, sehingga asam amino ini dengan mudah dapat digunakan oleh mikroorganisme. Dimana asam amino triptofan apabila dihidrolisis oleh enzim triptofamase akan menghasilkan indol, asam piruvat dan ammonia. (Prescott:2002,154)

Untuk uji Pertumbuhan pH dari hasil pengamatan yang dilakukan, semua isolat tumbuh pada pH 7, untuk pH 10 dan pH 3 tidak ada pertumbuhan pada ke-7 isolat. Dari Hasil tersebut terjadi dikarenakan kerja enzim yang mengkatalisis berbagai reaksi metabolisme sel dipengaruhi oleh tingkat pH. Sesuai dengan pendapat Pelczar (1986), daya kerja enzim sangat dipengaruhi oleh pH. Jika pH di atas atau di bawah pH optimum maka kerja enzim akan terhambat. Terhambatnya kerja enzim menyebabkan terhambatnya

pula metabolisme sel sehingga sel terhambat untuk tumbuh dan berkembang. Perbedaan sensitivitas isolat bakteri terhadap pH tergantung oleh jenis enzim yang mengkatalisis berbagai reaksi metabolisme.

Untuk uji Pertumbuhan Suhu, ke-5 isolat bakteri pada suhu 37°C dan 25°C mengalami kekeruhan pada tabung yang menandakan terjadinya pertumbuhan, sedangkan pada suhu 4°C ke-7 isolat bakteri tidak mengalami pertumbuhan, sehingga ke-7 isolat tersebut termasuk dalam mikroba mesofilik. (Prescott:2002,239)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa isolasi mikroba penghasil antibiotika dari air Bungung Barania Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, menghasilkan 5 isolat bakteri dan 3 isolat jamur yang memiliki aktivitas antimikroba terhadap beberapa mikroba uji.

Morfologi, aktivitas, dan isolat yang diperoleh adalah :

No.	Isolat	Morfologi	Mikroba yang dihambat
1.	ABI ₁	Gram Positif (Batang)	1. <i>Staphylococcus aureus</i> 2. <i>Streptococcus mutans</i> 3. <i>Vibrio sp</i> 6. <i>Salmonella typhi</i>
2.	AB2 ₁	Gram Positif (bulat)	1. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 2. <i>Streptococcus mutans</i> 3. <i>Vibrio sp</i> 4. <i>Bacillus subtilis</i> 5. <i>Staphylococcus epidermidis</i> 6. <i>Salmonella typhi</i>
3.	AB3 ₁	Gram Negatif (bulat)	1. <i>Escherichia coli</i> 2. <i>Streptococcus mutans</i> 3. <i>Vibrio sp</i> 4. <i>Bacillus subtilis</i> 5. <i>Staphylococcus epidermidis</i> 6. <i>Candida albicans</i>
4.	AB4 ₁	Gram Positif (bulat)	1. <i>Streptococcus mutans</i> 2. <i>Escherichia coli</i> 3. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 4. <i>Staphylococcus aureus</i> 5. <i>Staphylococcus epidermidis</i> 6. <i>Bacillus subtilis</i>

			7. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
5.	AB5 ₁	Gram Negatif (Bulat)	1. <i>Candida albicans</i> 2. <i>Vabrio sp</i> 3. <i>Staphylococcus epidermidis</i> 4. <i>Bacillus subtilis</i> 5. <i>Escherichia coli</i>

B. Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian identifikasi lebih lanjut terhadap koloni mikroba air Bungung Barania Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sehingga didapatkan marga atau sejenisnya. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan pada penelitian identifikasi mikroba penghasil antibiotika dari air Bungung Barania Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. PT. Syamil Cipta Media: Bandung.
- Brown, Alfred E. *Benson's Mikrobiological Applications Ninth Edition*. New York: Auburn University, 2005
- Djide, Natsir dan Syahrudin Kadir. *Dasar – Dasar Bioteknologi Farmasi*. Makassar: UNHAS, 2007.
- Djide, Natsir dan Sartini. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 2008.
- _____. *Penuntun Praktikum Bioteknologi Farmasi*. Makassar: UNHAS, 2010.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1979
- Dwidjoseputro. *Dasar-dasar Mikrobiologi*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Fardiaz, S. *Polusi Air dan Udara*. Jakarta: Kanisius, 1992.
- Farid . Nurfidin. 2012. *Isolasi Mikroba Penghasil Antibiotik dari Limbah Kantin Disekitar Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar*. Makassar UIN Alauddin Makassar
- Fuad AB. Muhammad. 2011. *Shahih Al-lu'lu wal marjan kumpulan lengkap hadis Bukhari muslim*. Akbarmedia: Jakarta
- Garrity, M. George. 2004. “*Taxonomic Outline of the Prokaryotes Bergey's Manual[®] of Systematic Bacteriology, Second Edition*”, Bergey's outline: New York.
- Irianto, Koes. 2002. *Mikrobiologi Menguk Dunia Mikroorganisme*. Penerbit CV .Yrama Widya Bandung.
- Naid, T. 1999. “ *Potensi Bioteknologi dalam Produksi dan Pengembangan Antibiotika Baru Menuju Paradigma Sehat*”, Hasanuddin University npress.
- Pelczar, Michael J. 1986. “ *Dasar-dasar Mikrobiologi*”, Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta

- Pelczar, Michael J. 1988. “ *Dasar-dasar Mikrobiologi*”, Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta
- Pratiwi, Sylvia T. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Prescott, Harley. 2002. *Laboratory Exercises in Microbiology*. The MC-Graw Hill Companies. New York
- Safitri .Dr Ratu MS ,dkk 2010. *Medium Analisis Mikroorganisme (Isolasi dan Kultur)* CV.Trans Info Media :Jakarta Timur
- Shihab M , Quraisy . 2002 . *Tafsir Al- misbah Volume 2* , Penerbit Lentera Jakarta
- Suriawiria, Unus, Prof. Drs. 2008. “*Mikrobiologi Air*”, Penerbit Alumni: Jakarta.
- Tika, Zainuddin., Mas’ud kasim, Ilyas, Ridwan Syam, dan Suriati. 2010. “*Sejarah Kerajaan Bajeng*”. Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan: Makassar.



Lampiran I. Pembuatan Medium

a. Nutrient Agar

a. Glukosa Nutrient Agar (GNA)

Komposisi:

Glukosa	1,0 g
Ekstrak Beef	3,0 g
Pepton	5,0 g
Agar	15,0 g
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan:

Ditimbang bahan sebanyak 23,0 g dilarutkan dalam 1000 ml sampai larut, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

b. Nutrient Broth (NB)

Komposisi:

Ekstrak Beef	3,0 g
Pepton	5,0 g
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan:

Semua bahan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai

1000 ml aquadest, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

c. Maltose Yeast Broth

Komposisi:

Maltosa	10 g
Yeast Ekstrak	3 g
Pepton	5 g
Dekstrosa	10 g
Aquadest hingga	1000 ml

Pembuatan:

Semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer dan dilarutkan dalam aquadest kemudian dipanaskan sampai mendidih hingga semua larut. Disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm.

d. Medium PDA

Komposisi:

Potato	200 g
Dekstrosa	10 g
Agar	15 g
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan:

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan

sampai 1000 ml air suling, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

e. Medium Gelatin

Gelatin	150 g
Aquadest	1000 ml

f. Koser Citrat Agar (SCA)

NaCl	5 g
MgSO ₄ ·7H ₂ O	0,28 g
(NH ₄) ₂ HPO ₄	1 g
K ₂ HPO ₄	1g
Asam sitrat	2 g
Aquadest	1000 ml

g. Medium MR dan VP (glukosa fosfat Broth)

D- glukosa	0,5 g
K ₂ HPO ₄	0,5 g
Peptone	0,5 g
Aquadest	1000 mL

h. SIM (Motility)

Pepton dari kasein	20,0 g
Pepton daging	6,6 g
NH ₄ Fe sitrat	0,2 g
Na ₂ S ₂ O ₃	0,2 g
Agar	3,0 g

Aquadest 1000 ml

i. Medium tripton 1 %

Tripton 10 g

Air suling 1000 ml

Lampiran II. Pembuatan Pereaksi

a) Cat A

- Larutan pokok Kristal violet

Komposisi:

Kristal violet 20,0 g

Etanol 95% 100,0 ml

- Larutan Oksalat

Ammonium oksalat 1,0 g

Air suling 100,0 ml

Larutan yang digunakan di laboratorium:

Larutan pokok Kristal violet 1 bagian

Air suling 10 bagian

Larutan pokok Ammonium oksalat 4 bagian

Pembuatan:

Dicampur larutan (1) dan (2), kemudian disimpan dalam wadah tertutup gelas.

b) Cat B

- Larutan Iodium

Komposisi:

Kristal iodium	1,0 g
Kalium iodide	2,0 g
Air suling	5,0 ml

Pembuatan:

Setelah kedua bahan tersebut larut, ditambahkan air suling 240 ml dan 60 ml cairan Natrium bikarbonat 5%.

c) Cat C

- Larutan pemucat

Komposisi:

Etanol 95%	250 ml
------------	--------

Aseton	250 ml
--------	--------

Pembuatan:

Dicampurkan kedua bahan tersebut, kemudian disimpan dalam wadah tertutup gelas.

d) Cat D

- Larutan pokok safranin

Komposisi:

Safranin O	2,5 g
------------	-------

Etanol 95%	100,0 ml
------------	----------

Larutan yang digunakan di laboratorium diencerkan dengan safranin,

Larutan pokok safranin	1 bagian
------------------------	----------

Air suling 5 bagian

Pembuatan:

Dicampurkan kedua bahan tersebut, kemudian disimpan dalam botol tertutup gelas.

e) Reagen Kovac's

Komposisi :

P-dymethylaminobenzaldehyd	5 g
Ethanol	75 ml
Hydrochloric acid	25 ml

Pembuatan:

P-dymethylaminobenzaldehyd dilarutkan dengan Amyl Alcohol di homogenkan kemudian ditambahkan Hydrochloric acid homogenkan , masukkan dalam botol coklat.

f) Reagen Barrit's

Komposisi: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Larutan A

1-naftol	6 g
Etil alkohol 95%	100 ml

Larutan B

KOH	40 g
Aquadest	100 ml

g) Metil merah

Metal merah	0,1 g
-------------	-------


Etil alkohol 95%

300 ml



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


LAMPIRAN IV
FOTO HASIL PENGAMATAN



Gambar 1. Foto Isolat dari Air Bungung Barania

Keterangan:

- A: Isolat Bakteri pengenceran 10^{-1}
- B: Isolat Bakteri pengenceran 10^{-2}
- C: Isolat Bakteri pengenceran 10^{-3}
- D: Isolat Jamur pengenceran 10^{-1}
- E: Isolat Jamur pengenceran 10^{-2}
- F: Isolat Jamur pengenceran 10^{-3}



Gambar 2. Foto Pemurniaan Isolat dari Air Bungung Barania dengan metode Kuadran

Keterangan:

AB1¹: Isolat Bakteri Ke-1

AB2¹: Isolat Bakteri Ke-2

AB3¹: Isolat Bakteri Ke-3

AB4¹: Isolat Bakteri Ke-4

AB5¹: Isolat Bakteri Ke-5

AJ1¹: Isolat Jamur Ke-1

AJ2¹: Isolat Jamur Ke-2

AJ3¹: Isolat Jamur Ke-3



A



B

Gambar 3. Stok Biakan Mikroba

Keterangan:

A: Isolat Bakteri pada Medium GNA Miring

B: Isolat Jamur pada Medium PDA Miring



A




B

Gambar 4. Biakan Mikroba pada medium MYB (Maltosa Yeast Broth)


Keterangan:

A: Isolat Bakteri pada Medium MYB (Maltosa Yeast Broth)


B: Isolat Jamur pada Medium MYB (Maltosa Yeast Broth)




A




B




C




D




E




F




G




H




I



J




K




L




M



N




O



Gambar 5. Foto Pengujian Penghambatan Fermentat terhadap Mikroba Uji

Keterangan:

- A : Pengujian Isolat Bakteri pada *Staphylococcus epidermidis*
- B : Pengujian Isolat Bakteri pada *Bacillus subtilis*
- C : Pengujian Isolat Bakteri pada *Vibrio sp*
- D : Pengujian Isolat Bakteri pada *Escherchia coli*
- E : Pengujian Isolat Bakteri pada *Pseudomonas aeruginosa*
- F : Pengujian Isolat Bakteri pada *Staphylococcus aureus*
- G : Pengujian Isolat Bakteri pada *Streptococcus mutans*
- H : Pengujian Isolat Bakteri pada *Salmonella thypi*
- I : Pengujian Isolat Bakteri pada *Candida albicans*
- J : Pengujian Isolat Jamur pada *Pseudomonas aeruginosa*
- K : Pengujian Isolat Jamur pada *Staphylococcus aureus*
- L : Pengujian Isolat Jamur pada *Staphylococcus epidermidis*
- M : Pengujian Isolat Jamur pada *Streptococcus mutans*
- N : Pengujian Isolat Jamur pada *Salmonella thypi*
- O : Pengujian Isolat Jamur pada *Escherchia coli*
- P : Pengujian Isolat Jamur pada *Bacillus subtilis*
- Q : Pengujian Isolat Jamur pada *Vibrio sp*
- R : Pengujian Isolat Jamur pada *Candida albicans*



Gambar 6. Foto Pengamatan Makroskopik Isolat pada medium GNA (Glukosa Nutrient Agar) dan PDA (Potato Destrosa Agar) dengan Metode tuang

Keterangan:


- A : AB1 (Isolat Bakteri Ke-1)
- B : AB2 (Isolat Bakteri Ke-2)
- C : AB3 (Isolat Bakteri Ke-3)
- D : AB4 (Isolat Bakteri Ke-4)
- E : AB5 (Isolat Bakteri Ke-5)
- F : AJ1 (Isolat Jamur Ke-1)
- G : AJ2 (Isolat Jamur Ke-2)
- H : AJ3 (Isolat Jamur Ke-3)



Gambar 7. Foto Pengamatan Makroskopik Isolat yang ditusukkan pada medium GNA (Glukosa Nutrient Agar) dan PDA (Potato Destrosa Agar)

Keterangan:

- AB1 :Isolat Bakteri Ke-1
- AB2 :Isolat Bakteri Ke-2
- AB3 :Isolat Bakteri Ke-3
- AB4 :Isolat Bakteri Ke-4
- AB5 :Isolat Bakteri Ke-5
- AJ1 :Isolat Jamur Ke-1
- AJ2 :Isolat Jamur Ke-2
- AJ3 :Isolat Jamur Ke-3




Gambar 8. Foto Pengamatan Makroskopik Isolat pada medium GNA (Glukosa Nutrient Agar) Miring dan PDA (Potato Destrosa Agar) Miring

Keterangan:

- AB1 :Isolat Bakteri Ke-1
- AB2 :Isolat Bakteri Ke-2


AB3 :Isolat Bakteri Ke-3
 AB4 :Isolat Bakteri Ke-4
 AB5 :Isolat Bakteri Ke-5
 AJ1 :Isolat Jamur Ke-1
 AJ2 :Isolat Jamur Ke-2
 AJ3 :Isolat Jamur Ke-3




Gambar 9. Foto Pengamatan Mikroskopik Isolat dengan Pengecatan Gram

Keterangan:


A:AB1(Isolat Bakteri Ke-1)
 B:AB2 (Isolat Bakteri Ke-2)
 C:AB3 (Isolat Bakteri Ke-3)
 D:AB4 (Isolat Bakteri Ke-4)
 E :AB5 (Isolat Bakteri Ke-5)




Gambar 10. Foto Hasil uji Motil (A) dan Uji Indol (B)



Gambar 11. Foto Hasil uji Metil Merah (A) dan Uji Voges Proskuer (B)




Gambar 12. Foto Hasil uji Sitrat (A) dan Uji H₂S (B)



Gambar 13. Foto Hasil Uji Pertumbuhan pada beberapa Variasi suhu; 4°C (A), 25°C (B), dan 37°C (C)

Gambar 14. Foto Hasil Uji Pertumbuhan pada pH 3(A) dan pH 7(B)



Gambar 15. Foto Hasil Uji Katalase

Keterangan:

- A:AB1(Isolat Bakteri Ke-1)
- B:AB2 (Isolat Bakteri Ke-2)
- C:AB3 (Isolat Bakteri Ke-3)
- D:AB4 (Isolat Bakteri Ke-4)
- E :AB5 (Isolat Bakteri Ke-5)



*Gambar 16. Foto Bungung Barania Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng
Kabupaten Gowa*

BIOGRAFI



Anniza Tri Hardiyanti J. lahir pada tanggal 08 september 1991 , putri dari pasangan Jamaluddin Malik,SE.,MM dan Hj. Nursatma. In nama panggilanannya merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Penulis memulai pendidikannya Di SDN Jatia, Kemudian melanjutkannya ke SMP Negeri Unggulan 1 Bajeng selama tiga tahun, setelah lulus, kembali penulis melanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri 1 Sungguminasa di kabupaten Gowa. Karena keinginan bisa bermanfaat bagi orang lain akhirnya penulis memilih melanjutkan pendidikannya ke UIN Alauddin Makassar pada jurusan farmasi. Hingga akhirnya penulis menjalani kehidupan sebagai mahasiswi Farmasi dan membuat suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul “Isolasi MikrobaPenghasil Antibiotik dari Air Bungung Barania Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” demi memperoleh gelar Strata Satu dalam bidang Farmasi pada kampus UIN Alauddin Makassar.