

**ANALISIS KADAR NATRIUM BENZOAT DALAM SIRUP MARKISA  
DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**OLEH :**

**NOVIANI PRATIWI**  
**NIM. 70100108049**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2012**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Agustus 2012

Penulis,

**NOVIANI PRATIWI**

NIM. 70100108049



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Kadar Natrium Benzoat dalam Sirup Markisa dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis ” yang disusun oleh Noviani Pratiwi, NIM: 70100108049, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 31 Agustus 2012 M yang bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1433 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 31 Agustus 2012 M

13 Syawal 1433 H

### DEWAN PENGUJI :

**Ketua** : **Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH.,MH.Kes** (.....)

**Sekretaris** : **Drs. Wahyudin G. M.Ag** (.....)

**Pembimbing I** : **Haeria, S.Si.,M.Si** (.....)

**Pembimbing II** : **Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,Apt** (.....)

**Penguji I** : **Mukhriani, S.Si.,Apt** (.....)

**Penguji II** : **Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag** (.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,

**Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH.,MH.Kes**  
**Nip. 1953 0119 198110 1 001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat kepada Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terlaksana.

Skripsi yang disusun dengan judul “Analisis Kadar Natrium Benzoat dalam Sirup Markisa dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Berkat kesabaran dan kemauan yang keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung atau tidak langsung, baik moril maupun material. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Ungkapan terima kasih dan bakti sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, serta segenap keluarga yang memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH., MH.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Fatmawaty Mallapiang,SKM.,M.Kes selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
5. Bapak Drs. Wahyuddin. G, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
6. Ibu Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt selaku Ketua Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
7. Bapak Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag sebagai penguji keislaman yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
8. Ibu Haeria, S.Si., M.Si selaku Sekertaris Jurusan Farmasi sekaligus sebagai pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
9. Ibu Mukhriani S.Si., Apt sebagai penguji akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
10. Ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt sebagai penasihat akademik yang telah banyak memberikan arahan.
11. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta staf dalam lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas jerih payah selama mendidik selama di bangku kuliah.
12. Rekan-rekan mahasiswa jurusan farmasi angkatan 2005, 2006, 2007, dan 2008 terkhusus kepada rekan-rekan angkatan 2008 dan para Laboran dan yang telah memberikan bantuan selama penelitian baik secara fisik maupun dalam bentuk motivasi.

13. Adik-adik mahasiswa jurusan farmasi angkatan 2009, 2010, dan 2011 yang selalu memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Makassar, 31 Agustus 2012

PENULIS



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
A. Buah Markisa .....	5
B. Sirup Markisa .....	9
C. Bahan Pengawet.....	10
D. Uraian Natrium Benzoat.....	14
E. Spektrofotometri.....	16
F. Tinjauan dari Segi Islam.....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Alat dan Bahan .....	31
B. Prosedur Kerja .....	31

BAB	IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	34
		A. Hasil Pengamatan .....	34
		B. Pembahasan .....	35
BAB	V	PENUTUP .....	40
		A. Kesimpulan.....	40
		B. Saran .....	40
		DAFTAR PUSTAKA .....	41
		LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	44
		BIOGRAFI.....	61



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
1. Pengukuran serapan maksimum.....	34
2. Perhitungan kadar natrium benzoat dalam sampel.....	35
3. Bahan tambahan makanan.....	47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1 Rumus struktur natrium benzoat.....	15
2 Skema ekstraksi natrium benzoat .....	43
3 Skema analisis ekstrak natrium benzoat .....	43
4 Kurva baku natrium benzoat .....	34
5 Sampel sirup markisa.....	58
6 Penyaringan sampel.....	58
7 Ekstraksi sampel.....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1 Skema kerja.....	43
2 Perhitungan-perhitungan.....	45
3 Bahan tambahan makanan.....	47
4 Dokumen penelitian.....	58



## ABSTRAK

Nama Penyusun : Noviani Pratiwi

NIM : 70100108049

Judul Skripsi : “Analisis Kadar Natrium Benzoat dalam Sirup Markisa dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis”

---

Telah dilakukan penelitian analisis kadar natrium benzoat dalam sirup markisa dengan metode spektrofotometri Uv-Vis, yang bertujuan untuk mengetahui kadar natrium benzoat dalam tiga sirup markisa yang berbeda dan juga mengetahui apakah kandungan natrium benzoat dalam sampel tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 1 g/kg.

Penelitian dimulai dengan penyaringan sampel dari bulir buah kemudian penambahan HCl 1 M dan diekstraksi dengan eter, dimana ekstrak eter selanjutnya dilarutkan dengan alkohol dan dianalisis pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 288 nm.

Adapun hasil yang diperoleh adalah konsentrasi natrium benzoat dalam sirup markisa sampel A sebesar 4,68 g/kg, sampel B sebesar 9,06 g/kg dan sampel C sebesar 6,36 g/kg. dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kadar natrium benzoat dari ketiga sampel tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Maka dari kesimpulan ini disarankan kepada masyarakat maupun produsen agar lebih memperhatikan penggunaan bahan tambahan makanan untuk tidak melebihi dari batas yang telah ditetapkan.

**Kata kunci:** natrium benzoat, metode spektrofotometri UV-Vis.

## ABSTRACT

Nama Penyusun : Noviani Pratiwi  
NIM : 70100108049  
Judul Skripsi : "Analysis of Benzoate Sodium in circulating Passionfruit Syrup at Makassar's City by Methodics Spectrophotometry UV Vis"

---

Was done analysis research titrates benzoate sodium in passionfruit syrup by methodics spektrofotometri Uv Vis, one that intent to know benzoate sodium rate in three different passionfruit syrup and also knows if benzoate sodium content in that sample standard pock already been established government which is 1 g / kg.

Research began by sample winnow of fruit seed then increased HCl 1 M and then extraction with ether, where is succeeding ether extract dissolved by alcohol and is analysed on UV Vis's spectrophotometer on wavelength 288 nm.

There is result even that acquired is concentrate benzoate sodium in passionfruit syrup sample a. as big as 4,68 g / kg, sample b as big as 9,06 g / kg and samples c as big as 6,36 g / kg. of that result gets to be taken by conclusion that benzoate sodium rate of sample third not accomplish specified default by commanding.

Therefore of this conclusion is suggested to society and also that producer is more paying attention purpose supplemental foods for don't exceed from bounds already being established.

**Key word:** benzoate sodium, spektrofotometri UV Vis's method.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Markisa merupakan buah asli dari Amerika Latin. Namun, buah ini sudah banyak dibudidayakan di daerah tropis, termasuk di Indonesia dan termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan (Muhammad, 2011). Di Sulawesi Selatan, sebanyak 7,177 ton buah markisa kebanyakan tumbuh pada tiga daerah yang bertempat di daerah Gowa (54%), Enrekang (37%) dan Tator (9%). Semua buah markisa diproses di Sulawesi Selatan bertempat di Kota Makassar. Proses produksi diawali dengan menyortir buah markisa segar yang telah disuplai oleh pengumpul rata-rata hanya 5% buah yang disuplai ditolak sehubungan dengan tidak tercapainya standar mutu yang diinginkan. Buah markisa kemudian dicuci dan disimpan selama dua malam untuk menghasilkan buah yang masak dan memberikan aroma yang baik. Kemudian buah di belah dan mengeluarkan pulpnya dari kulit. Untuk menghasilkan squash ataupun sirup, pulp dimasukkan ke dalam mikser untuk dipisahkan dari bijinya. Kemudian diberi campuran bahan tambahan seperti pengawet dan pemanis agar dapat disimpan sebagai stok (Murray, 2007: 4).

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia, telah terjadi peningkatan produksi minuman ringan yang beredar di masyarakat. Pada minuman ringan sering ditambahkan kofein, pengawet dan pemanis buatan yang kadarnya perlu diperhatikan,

karena apabila konsumsinya berlebihan dapat membahayakan kesehatan (Hayun, 2004: 149).

Pemakaian bahan pengawet dari satu sisi menguntungkan karena dengan bahan pengawet, bahan pangan dapat dibebaskan dari mikroba. Baik bersifat patogen yang dapat menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan lainnya maupun mikrobial yang nonpatogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan, misalnya pembusukan. Namun disisi lain, bahan pengawet pada dasarnya adalah senyawa kimia yang merupakan bahan asing yang masuk bersama bahan pangan yang dikonsumsi. Apabila mengkonsumsi bahan tambahan pangan yang dosisnya tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar dapat menimbulkan kerugian bagi pemakainya, baik yang bersifat langsung misalnya keracunan ataupun yang tidak bersifat langsung atau kumulatif misalnya apabila bahan pengawet yang digunakan bersifat karsinogenik. Dalam kehidupan sekarang ini banyak dijumpai pemakaian bahan pengawet secara luas, sebagai contoh, bahan pangan keluaran pabrik pada umumnya menggunakan bahan tambahan pangan (*food additives*) termasuk didalamnya bahan pengawet secara sengaja ditambahkan agar bahan pangan yang dihasilkan dapat mempertahankan kualitasnya dan memiliki umur simpan lebih lama sehingga memperluas jangkauan distribusinya (Wisnu, 2006: 18).

Efektivitas bahan pengawet tergantung pada konsentrasi dan jenis bahan pengawet serta jenis mikroba yang terdapat dalam bahan makanan. Bahan

pengawet kimia dapat mengganggu permeabilitas sel, mengganggu kerja enzim dan mengganggu sistem genetik (Purba,1985: 31).

Menurut Undang-Undang RI No.7 Tahun 1996 tentang pangan, pada Bab II Pasal 10 dicantumkan,(1) “ setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang telah ditetapkan. (2) “ Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (BPOM RI, 2011: 9).

Islam juga telah mengajarkan untuk tidak melakukan segala sesuatunya dengan berlebih-lebihan sebagaimana telah diterangkan pada Q.S. Tāha / 20: 81

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ  
تَحَلَّى عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Terjemahnya :

“Makanlah di antara rezki yang baik yang Telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia” (Departemen Agama, 2005: 317).

Berdasarkan uraian tersebut perlu diteliti kadar pengawet natrium benzoat dalam sirup markisa yang diproduksi di Makassar.



**B. Rumusan Masalah**

1. Berapa kadar pengawet natrium benzoat dalam sirup markisa?
2. Apakah kadar natrium benzoat yang terkandung dalam sirup markisa tersebut sudah memenuhi standar (1 g/kg ) yang telah ditetapkan oleh Permenkes RI No: 722/MEN.KES/PER/IX/88 tentang bahan tambahan pangan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kadar natrium benzoat dalam tiga merek sirup markisa berbeda yang beredar di kota Makassar.
2. Mengetahui apakah kadar natrium benzoat dalam sirup memenuhi standar (1 g/kg) yang telah ditetapkan oleh Permenkes RI No:722/MEN.KES/PER/IX/88 tentang bahan tambahan pangan.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi tentang kadar natrium benzoat dalam tiga merek sirup markisa berbeda yang beredar di kota Makassar.
2. Memberikan informasi apakah kadar natrium benzoat dalam sirup sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Permenkes RI No:722/MEN.KES/PER/IX/88 tentang bahan tambahan pangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Buah Markisa*

Markisa asam (*Passiflora edulis* Sims) mempunyai nama umum *granadilla* atau *passion fruit* (Inggris), markisa (Indonesia), termasuk dalam family Passifloraceae. Diperkirakan ada 500 spesies *Passiflora* dalam family Passifloraceae, diantaranya spesies-spesies tersebut *P. edulis* Sims memiliki ciri-ciri spesifik markisa (Karsinah, 2010: 30). Adapun klasifikasi markisa sebagai berikut; Kingdom: *Plantae*; Divisi: *Magnoliophyta*; Kelas: *Magnoliopsida*; Ordo: *Malpighiales*; Family: *Passifloraceae*; Genus: *Passiflora*; Spesies: *Passiflora edulis* (Backer, 1963: 291). Dalam spesies ini terdapat dua forma yang berbeda, yaitu:

1. Forma *edulis* atau forma ungu dikenal dengan markisa ungu, yang termasuk forma ini adalah markisa asam dengan kulit buah berwarna ungu, merah, atau hitam. Markisa asam berkulit buah ungu hanya dapat tumbuh dan berkembang baik di daerah subtropis dan dataran tinggi tropis, sedangkan markisa asam berkulit buah merah atau markisa merah dapat beradaptasi di dataran rendah tropis.
2. Forma *flavicarpa* atau forma kuning dikenal dengan markisa kuning, yaitu markisa asam dengan kulit buah berwarna kuning disebut juga *rola* atau *yellow passion fruit*. Forma ini dapat beradaptasi di dataran rendah tropis (Karsinah, 2010: 30).

Di Indonesia, markisa asam yang dibudidayakan secara komersial adalah markisa ungu, yang ditanam di daerah dataran tinggi. Daerah penghasil markisa ungu masih terpusat di beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara, antara lain: Kabupaten Karo, Simalungun, Dairi dan Tapanuli Utara, serta Provinsi Sulawesi Selatan antara lain, Kabupaten Gowa, Sinjai, Enrekang dan Polmas. Sampai saat ini hanya ada dua varietas unggul markisa yang dilepas, yaitu varietas Malino dari Sulawesi Selatan dan varietas Berastagi dari Sumatra Utara yang dilepas pada tahun 2000. Markisa ungu merupakan bahan baku utama industri pengolahan sirup atau sari buah markisa (Karsinah, 2010: 31).

Selain markisa ungu, markisa kuning dapat dijumpai di daerah dataran rendah di Indonesia. Jenis ini pada umumnya ditanam sebagai tanaman pekarangan. Markisa kuning dapat dijumpai di daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Bogor, Simalungun, Langkat dan Medan serta di beberapa daerah lainnya. Di samping markisa ungu dan kuning tersebut, saat ini dapat dijumpai jenis markisa merah yang ditanam oleh sebagian masyarakat di daerah Katonopan, Mandailing Natal dan Pematang Siantar, Sumatra Utara. Markisa merah juga masih ditanam sebagai tanaman pekarangan. Markisa kuning dan merah biasa digunakan sebagai bahan jus markisa, namun belum digunakan sebagai bahan industri sari buah markisa. Walaupun jenis ini tidak banyak digunakan di Indonesia, namun di sebagian negara penghasil markisa, markisa kuninglah yang umum dibudidayakan sebagai bahan baku jus maupun konsentrat (Karsinah, 2010: 31).

Dari tiga jenis markisa asam yang dibudidayakan di Indonesia, masing-masing dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Markisa ungu
  - a. Bentuk daun menjari dengan ukuran daun lebih kecil dan lebih tipis daripada markisa kuning dan merah, panjang tangkai 2-3 cm, panjang daun 9-12 cm, lebar 7-9 cm, daun muda dan tangkainya berwarna hijau muda.
  - b. Ruas batang lebih pendek dari pada markisa kuning dan markisa merah, panjang ruas 5-7 cm, sulur muda berwarna hijau muda.
  - c. Ukuran bunga lebih kecil, mahkota tambahan memiliki dua baris luar benang yang bergelombang dan memencar, panjang 2-3 cm, pangkalnya putih bercampur ungu, dan tiga baris dalam papila yang pendek berwarna ungu.
  - d. Buah muda berwarna hijau dan buah tua atau masak berwarna ungu tua, kulit buah agak tipis dan keras.
  - e. Tanaman mampu berbuah lebat, buah berbentuk bulat sampai lonjong atau oval, berdiameter 4,6-5,7 cm, bobot 45-60 gram, sari buah berwarna kuning oranye, rasanya asam-asam manis dengan aroma markisa yang kuat (aroma terbaik).
2. Markisa merah
  - a. Bentuk daun menjari dengan ukuran daun lebih besar dan lebih tebal dari pada markisa ungu, panjang tangkai 3-5 cm, panjang daun 10-13

cm, lebar daun 11-14 cm, daun muda dan tangkainya berwarna hijau kecoklatan.

- b. Panjang ruas batang 7-10 cm, sulur muda berwarna kecoklatan.
  - c. Ukuran bunga besar, diameter 7-8 cm, mahkota tambahan berbentuk benang dan memencar, panjang  $\pm$  3,5 cm, pangkal berwarna ungu dan ujung berwarna putih.
  - d. Buah muda berwarna hijau sedangkan buah tua atau masak berwarna merah berbintik putih, kulit buah agak tebal dan agak keras.
  - e. Tanaman mampu berbuah cukup lebat, buah berbentuk bulat sampai bulat agak lonjong atau oval, berdiameter 6,2-7,5 cm, bobot 75-120 gram, sari buah berwarna kuning oranye, rasa asam manis dengan aroma seperti jambu biji.
3. Markisa kuning
- a. Bentuk daun menjari dengan ukuran daun lebih tebal dan lebih besar dari pada markisa ungu, panjang tangkai 2-4 cm, panjang daun 10-13 cm, lebar 9-12 cm, daun muda berwarna hijau sedangkan tangkai berwarna hijau kecoklatan.
  - b. Ruas batang panjang 7-10 cm, sulur muda berwarna kecocoklatan.
  - c. Ukuran bunga besar diameter 7-8 cm, mahkota tambahan berbentuk benang dan memencar, panjang  $\pm$  3,5 cm, pangkal berwarna ungu dan ujung berwarna putih.

- d. Buah muda berwarna hijau sedangkan buah tua atau masak berwarna kuning muda atau kuning berbintik putih, kulit buah agak tebal dan keras.
- e. Tanaman mampu berbuah cukup lebat, buah berbentuk bulat sampai bulat agak lonjong atau oval, berdiameter 5-7 cm, bobot 55-130 gram, sari buah berwarna kuning kuning, rasa asam manis dengan aroma seperti jambu biji (Karsinah, 2010, 32).

#### **B. *Sirup Markisa***

Di Indonesia, buah markisa asam pada umumnya dikonsumsi dalam bentuk segar berupa jus dan diolah menjadi sirup atau sari buah. Industri pengolahan markisa di Indonesia yang menghasilkan sirup dari sari markisa berada di Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan dengan menggunakan bahan baku markisa ungu (Karsinah, 2010: 31).

Buah markisa yang di proses di Sulawesi Selatan bertempat di kota Makassar. Proses produksi diawali dengan menyortir buah markisa segar yang telah disuplai oleh pengumpul; rata-rata hanya 5% buah yang disuplai ditolak sehubungan dengan tidak tercapainya standar mutu yang diinginkan. Buah markisa kemudian dicuci dan disimpan selama dua malam untuk menghasilkan buah yang masak dan memberikan aroma yang baik. Kemudian buah di belah dan mengeluarkan bulirnya dari kulit. Untuk menghasilkan squash ataupun sirup, bulir dimasukkan ke dalam mikser untuk dipisahkan dari bijinya. Untuk menghasilkan pulp kualitas ekspor, bulir didinginkan hingga pada suhu 10-20 °C. Untuk menghasilkan squash, bulir

dimasukkan kedalam satu mixer untuk memisahkan regangan tunggal dengan bijinya. Selama proses pengolahan, regangan tunggal dicampurkan dengan bahan pengawet (benzoat) dan disimpan sebagai stok untuk digunakan sebagai suplai jangka pendek. Untuk menghasilkan squash, regangan tunggal dicampur dengan gula encer pada campuran 40% regangan tunggal dan 60% gula encer serta agen pengawet (Morrays, 2007 : 4).

### C. *Bahan Pengawet*

Pemakaian bahan pengawet dari satu sisi menguntungkan karena dengan bahan pengawet, bahan pangan dapat dibebaskan dari kehidupan mikroba. Baik yang dapat menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan lainnya maupun mikrobial yang nonpatogen yang menyebabkan kerusakan bahan pangan, misalnya pembusukan. Namun disisi lain, bahan pengawet pada dasarnya adalah senyawa kimia yang merupakan benda asing yang masuk bersama bahan pangan yang dikonsumsi. Apabila pemakaian bahan pangan yang dosisnya tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar menimbulkan kerugian bagi pemakainya, baik yang bersifat langsung atau kumulatif misalnya keracunan ataupun yang tidak bersifat langsung atau kumulatif misalnya apabila bahan pengawet yang digunakan bersifat karsinogenik. Dalam kehidupan sekarang ini banyak dijumpai pemakaian bahan pengawet secara luas, sebagai contoh, bahan pangan keluaran pabrik pada umumnya menggunakan bahan tambahan pangan (*food additives*) termasuk didalamnya bahan pengawet secara sengaja ditambahkan agar bahan pangan yang dihasilkan dapat mempertahankan kualitasnya dan

memiliki umur simpan lebih lama sehingga memperluas jangkauan distribusinya (Wisnu, 2007: 18).

Menurut Undang-undang RI No. 7 Tahun 1996 tentang pangan, pada Bab II Pasal 10 tentang Bahan Tambahan Makanan dicantumkan, (1) "Setiap orang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang telah ditetapkan. (2) "Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (BPOM RI, 2011: 9).

Adapun bahan makanan yang diizinkan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/MEN.KES/PER/IX/88 tentang bahan makanan:

1. Bahan tambahan ,makanan yang diizinkan digunakan pada makanan terdiri dari golongan:
  - a. Antioksidan (*Antioksidant*)
  - b. Antikepal (*Anticaking Agent*)
  - c. Pengatur Keasaman (*Acidity regulator*)
  - d. Pemanis Buatan (*Artificial Sweetener*)
  - e. Pemutih dan pematang tepung (*Flour Treatment Agent*)
  - f. Pengemulsi, pemantap, pengental (*Emulsifier, Stabilizer, Thickener*)
  - g. Pengawet (*Preservative*)



- h. Pengeras (*Ossifying Agent*)
  - i. Pewarna (*Colouring Agent*)
  - j. Penyedap rasa dan aroma penguat rasa (*Flavor, Flavor Enhancer*)
  - k. Sekuesteran (*Sequestrant*)
2. Untuk produk makanan yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam antioksidan, maka hasil bagi masing-masing bahan dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari satu.
  3. Untuk produk makanan yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam pengawet, maka hasil bagi masing-masing bahan dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari satu.
  4. Batas penggunaan “secukupnya” adalah penggunaan yang sesuai dengan cara produksi yang baik, yang maksudnya jumlah wajar yang diperlukan sesuai dengan tujuan penggunaan tambahan bahan makanan tersebut.
  5. Pada bahan tambahan makanan golongan pengawet. Batas maksimum penggunaan garam benzoat dihitung sebagai asam benzoat, garam sorbat sebagai asam sorbet dan senyawa sulfit sebagai  $SO_2$ .
  6. Pemanis buatan adalah bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan yang tidak atau hampir mempunyai nilai gizi.
  7. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme (Standar, 1995: 12).

Penambahan bahan pengawet pada makanan secara umum bertujuan untuk:

1. Menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen.
2. Memperpanjang umur simpan pangan.
3. Mencegah penurunan kualitas gizi, warna, citarasa dan bau pangan yang diawetkan.
4. Menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah.
5. Menyembunyikan kerusakan bahan pangan (Wisnu, 2006: 21).


Terdapat beberapa persyaratan bahan pengawet kimia, selain persyaratan yang dituntut untuk semua bahan tambahan pangan antara lain sebagai berikut, :

1. Memberi arti ekonomis dari pengawetan.
2. Digunakan hanya apabila cara-cara pengawetan yang lain tidak mencukupi atau tidak tersedia.
3. Memperpanjang umur simpan dalam pangan.
4. Tidak menurunkan kualitas (warna, cita rasa dan bau) bahan pangan yang diawetkan.
5. Mudah dilarutkan

6. Menunjukkan sifat-sifat antimikroba pada jenjang pH pangan yang diawetkan.
7. Aman dalam jumlah yang diperlukan
8. Mudah ditentukan dengan analisis kimia
9. Tidak menghambat enzim-enzim pencernaan
10. Tidak dekomposisi atau tidak bereaksi untuk membentuk suatu senyawa kompleks yang bersifat lebih toksik.
11. Mudah dikontrol dan didistribusikan secara merata dalam bahan pangan
12. Mempunyai spektra antimikroba yang luas yang meliputi macam-macam pembusukan oleh mikroba yang berhubungan dengan bahan pangan yang diawetkan (Wisnu, 2006: 22).

#### D. *Uraian Natrium Benzoat*

Natrium benzoat memiliki nama resmi NATRII BENZOAS dengan rumus molekul  $C_7H_5NaO_2$  dan berat molekul sebesar 114. Pemerianaanya berupa butiran atau serbuk hablur putih tidak berbau atau hampir tidak berbau, kelarutan dalam 2 bagian air dan dalam 90 bagian etanol (95%) P. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, penggunaannya sebagai zat tambahan (Dirjen POM Edisi III, 1995: 396).



Dalam penggunaannya, asam benzoat kurang kelarutannya dalam air dibandingkan dalam bentuk garamnya, sehingga pemakaiannya sering digunakan dalam bentuk garamnya yaitu natrium benzoat (Winarno, 1980: 23).

Sari buah dengan keasaman tinggi dapat diawetkan dengan 0,1 % (1000 ppm) Natrium benzoat tetapi sekalipun digunakan 0,2% tidak akan dapat mengawetkan produk dengan keasaman rendah. Natrium benzoat kurang efektif dalam suatu bahan pangan yang mempunyai pH mendekati 3,0. PH optimum dari natrium benzoat sebagai penghambat pertumbuhan mikroba adalah sekitar 2,5-4,0 lebih rendah dari pada asam sorbat dan asam propionat (Furia, 1972: 30).

Mekanisme kerja natrium benzoat sebagai bahan pengawet adalah berdasarkan permeabilitas membran sel mikroba terhadap molekul-molekul asam benzoat tidak terdisosiasi. Dalam suasana pH 4,5 molekul-molekul asam benzoat tersebut dapat mencapai sel mikroba yang membran selnya mempunyai sifat permeabel terhadap asam benzoat yang tidak terdisosiasi. Sel mikroba yang mempunyai pH cairan sel netral akan dimasuki molekul-molekul benzoat, maka molekul asam benzoat akan terdisosiasi dan menghasilkan ion-ion  $H^+$ , sehingga akan menurunkan pH mikroba tersebut, akibatnya metabolisme sel akan terganggu dan akhirnya sel mati (Winarno dan Laksmi, 1974: 30).

Adapun dampak penggunaan natrium benzoat bagi tubuh adalah :

1. Dapat menyebabkan kanker karena natrium benzoat bersifat karsinogenik.
2. Untuk asam benzoat dan natrium benzoat biasa menimbulkan reaksi alergi dan penyakit saraf.
3. Berdasarkan penelitian Badan Pangan Dunia (FAO), konsumsi benzoat yang berlebihan pada tikus dapat menyebabkan kematian dengan gejala-gejala hiperaktif, kencing terus menerus dan penurunan berat badan (Subani, 2008: 24).

#### **E. Spektrofotometri**

Spektrofotometri adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrofotometer dan fotometer. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi.

Spektrofotometri UV-Vis adalah anggota teknik analisis spektroskopik yang memakai sumber REM (radiasi elektromagnetik) ultraviolet dekat (190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dengan memakai instrumen spektrofotometer (Modul, 2007: 4).

Spektrofotometer sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Jadi spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 2008: 225).

Panjang gelombang cahaya UV atau nampak jauh lebih pendek daripada panjang gelombang radiasi infra merah. Satuan yang akan digunakan untuk memberikan panjang gelombang ini adalah *nanometer* ( $1 \text{ nm} = 10^{-7} \text{ cm}$ ). Spektrum nampak terentang dari sekitar 400 nm (ungu) ke 750 nm (merah), sedangkan spektrum ultraviolet berjangka dari 100 nm ke 400 nm (Fessenden, 1984: 436).

Kelebihan spektrofotometer dibandingkan dengan fotometer adalah panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi dan ini diperoleh dengan alat pengurai seperti prisma, grating ataupun celah optis. Pada fotometer filter, sinar dengan panjang gelombang yang diinginkan diperoleh dengan berbagai filter dengan berbagai warna yang mempunyai spesifikasi melewatkan trayek panjang gelombang tertentu. Pada fotometer filter, tidak mungkin diperoleh panjang gelombang yang benar-benar monokromatis, melainkan suatu trayek panjang gelombang 30-40 nm. Sedangkan pada spektrofotometer, panjang gelombang yang benar-benar terseleksi dapat diperoleh dengan bantuan alat pengurai cahaya seperti prisma. Suatu

spektrofotometer tersusun dari sumber spectrum tampak yang kontinyu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel dan blangko ataupun pembanding.

Cara kerja spektrofotometer secara singkat adalah sebagai berikut; Tempatkan larutan pembanding, misalnya blangko dalam sel pertama sedangkan larutan yang akan dianalisis pada sel kedua. Kemudian pilih foto sel yang cocok 200 nm-650 nm agar daerah  $\lambda$  yang diperlukan dapat terliputi. Dengan ruang foto sel dalam keadaan tertutup “noI” galvanometer di dapat dengan menggunakan tombol *dark-current*. Pilih  $\lambda$  yang diinginkan, buka fotosel dan lewatkan berkas cahaya pada blangko dan “noI” galvanometer didapat dengan memutar tombol sensitivitas. Dengan menggunakan tombol transmitansi, kemudian atur besarnya pada 100%. Lewatkan berkas cahaya pada larutan sampel yang akan dianalisis. Skala absorbansi menunjukkan absorbansi larutan sampel (Khopkar, 2008: 228).

Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinyu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blangko dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blangko ataupun pembanding (Khopkar, 2008: 226).

#### 1. Sumber Tenaga Radiasi

Sumber tenaga radiasi terdiri dari benda yang tereksitasi hingga ke tingkat tenaga yang tinggi oleh sumber listrik bertegangan tinggi atau oleh pemanasan listrik. Benda atau materi yang kembali ke tingkat tenaga yang lebih rendah atau ke tingkat dasarnya, melepaskan foton dengan

tenaga-tenaga yang karakteristik yang sesuai dengan  $\Delta E$ , yaitu perbedaan tenaga antara tingkat tereksitasi dan tingkat dasar rendah.

a. Sumber Radiasi Ultraviolet

Sumber-sumber radiasi ultraviolet yang kebanyakan digunakan adalah lampu hidrogen dan lampu deuterium. Mereka terdiri dari sepasang elektroda yang terselubung dalam tabung gelas dan diisi dengan gas hidrogen atau deuterium pada tekanan yang rendah. Bila tegangan yang tinggi dikenakan pada elektroda-elektroda, maka akan dihasilkan elektron-elektron yang mengeksitasi elektron-elektron lain dalam molekul gas ke tingkatan tenaga yang tinggi. Bila elektron-elektron kembali ke tingkat dasar mereka melepaskan radiasi dalam daerah sekitar 180 dan 350 nm. Sumber radiasi UV yang lain adalah lampu xenon, tetapi dia tidak se stabil lampu hidrogen.

b. Sumber Radiasi Terlihat

Sumber radiasi terlihat dan radiasi infra merah dekat yang biasa digunakan adalah lampu filament tungsten. Filament dipanaskan oleh sumber arus searah (DC), atau oleh baterai. Filament tungsten menghasilkan radiasi kontinu dalam daerah antara 350 dan 2500 nm (Modul, 2007: 17).

2. Monokromator : merupakan serangkaian alat optik yang menguraikan radiasi polikromatik menjadi jalur-jalur yang efektif/panjang gelombang-gelombang tunggalnya dan memisahkan panjang gelombang-gelombang



tersebut menjadi jalur-jalur yang sangat sempit (Modul, 2007: 18).

Alatnya dapat berupa prisma ataupun grating (Khopkar, 2008: 226).

3. Sel absorpsi : Pada pengukuran di daerah tampak, kuvet kaca atau kuvet kaca corex dapat digunakan, tetapi untuk pengukuran pada daerah UV kita harus menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini. Umumnya tebal kuvet adalah 10 mm, tetapi yang lebih kecil ataupun yang lebih besar dapat digunakan. Sel yang biasa digunakan berbentuk persegi, tetapi bentuk silinder dapat juga digunakan. Kita harus menggunakan kuvet yang bertutup untuk pelarut organik (Khopkar, 2008: 227). Sebelum sel dipakai harus dibersihkan dengan air, atau jika dikehendaki dapat dicuci dengan larutan detergen atau asam nitrat panas (Modul, 2007: 16).
4. Detektor : Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang (Khopkar, 2008: 227).

Suatu molekul memiliki panjang gelombang sendiri-sendiri. Panjang gelombang suatu molekul memiliki panjang gelombang yang tetap agar tercapai absorbansi yang maksimum.

Kromofor berasal dari kata Chromophorus yang berarti pembawa warna. Dalam pengertian yang dikembangkan, kromofor merupakan suatu gugus fungsi yang menyerap radiasi elektromagnetik apakah gugus itu berwarna atau tidak. Digunakan untuk menyatakan gugus tidak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam daerah-daerah ultraviolet yang terlihat.

Auksokrom adalah suatu substituen pada kromofor yang menghasilkan pergeseran merah. Ciri auksokrom adalah heteroatom yang langsung terikat pada kromofor, misalnya :  $-\text{OCH}_3$ ,  $-\text{Cl}$ ,  $-\text{OH}$ ,  $\text{NH}_2$ . Contoh : pada konjugasi pasangan elektron bebas pada atom nitrogen akan mengeser serapan maksimum dari harga ikatan ganda terisolasi pada 190 nm ke 230 nm. Substituen nitrogen adalah auksokrom. Suatu auksokrom akan memperpanjang kromofor dan menghasilkan suatu kromofor baru (Modul, 2007: 7-8).

Pergeseran merah atau efek batokromik merupakan pergeseran serapan maksimum kepanjang gelombang lebih panjang. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan pelarut atau adanya suatu auksokrom. Geseran kepanjang gelombang yang lebih panjang mencerminkan fakta bahwa elektron dalam suatu sistem tergabung (terkonjugasi) kurang kuat dari pada dalam suatu sistem tak tergabung.

Pergeseran biru atau efek hipokromik merupakan pergeseran ke panjang gelombang lebih pendek. Hal ini disebabkan oleh perubahan pelarut atau adanya konjugasi dari elektron pasangan bebas pada atom nitrogen anilina dengan sistem ikatan  $\pi$  cincin benzen dihilangkan dengan adanya protonasi. Anilina menyerap pada 230 nm ( $\epsilon$  8600) tetapi dalam larutan asam puncak utamanya hampir sama dengan benzen yaitu 203 nm ( $\epsilon$  7500), terjadi pergeseran biru.

Efek hiperkromik → kenaikan dalam intensitas serapan

Efek hipokromik → penurunan dalam intensitas serapan

(Modul,2007: 8).

Semua molekul mempunyai energi yang dapat digambarkan menjadi beberapa fenomena.

- a. Molekul secara keseluruhan dapat bergerak yang kejadian ini disebut dengan translasi; energi yang berhubungan dengan translasi disebut dengan energi translasional.
- b. Bagian molekul (atom atau sekelompok atom) dapat bergerak karena berkenaan satu sama lain. Gerakan ini disebut dengan vibrasi dan energinya dinamakan dengan energi vibrasional.
- c. Molekul dapat berotasi pada sumbunya dan rotasi ini dikarakterisasi dengan energi rotasional.
- d. Disamping bentuk gerakan– gerakan tersebut, suatu molekul memiliki konfigurasi elektronik, dan energinya (energi elektronik) tergantung pada keadaan elektronik molekul (Rohman, 2007: 124).

Berkas radiasi dikenakan pada cuplikan dan diukur intensitas radiasi yang ditransmisikan. Radiasi yang diserap oleh cuplikan ditentukan dengan membandingkan intensitas dari berkas radiasi yang ditransmisikan bila spesies penyerap tidak ada dengan intensitas yang ditransmisikan bila spesies penyerap ada. Kekuatan radiasi dari berkas cahaya sebanding dengan jumlah foton per detik yang melalui satu satuan luas penampang. Jika foton yang mengenai cuplikan tenaga yang sama dengan yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya perubahan tenaga, maka serapan dapat terjadi (Modul, 2007: 8).

Jika suatu molekul sederhana dikenakan radiasi elektromagnetik maka molekul tersebut akan menyerap radiasi elektromagnetik yang energinya sesuai. Interaksi antara molekul dengan radiasi elektromagnetik ini akan meningkatkan energi potensial elektron pada tingkat keadaan tereksitasi. Apabila pada molekul yang sederhana tadi hanya terjadi transisi elektronik pada satu macam gugus yang terdapat pada molekul, maka hanya akan terjadi satu absorpsi yang merupakan garis spektrum. Kenyataannya, spektrum UV-Vis yang merupakan korelasi antara absorbansi (sebagai ordinat) dan panjang gelombang (sebagai absis) bukan merupakan garis spektrum akan tetapi merupakan suatu pita spektrum. Terbentuknya pita spektrum UV-Vis tersebut disebabkan oleh terjadinya eksitasi elektronik lebih dari satu macam pada gugus molekul yang sangat kompleks. Terjadinya dua atau lebih pita spektrum UV-Vis diberikan oleh molekul dengan struktur yang lebih kompleks karena terjadi beberapa transisi sehingga mempunyai lebih dari satu panjang gelombang maksimal (Rohman, 2007: 123).

Panjang gelombang dimana terjadi eksitasi elektronik yang memberikan absorban maksimum disebut sebagai panjang gelombang maksimum ( $\lambda_{maks}$ ). Penentuan panjang gelombang maksimum yang pasti (tetap) dapat dipakai untuk identifikasi molekul yang bersifat karakteristik-karakteristik sebagai data sekunder. Dengan demikian spektrum visibel dapat dipakai untuk tujuan analisis kualitatif (data sekunder) dan kuantitatif.

Molekul-molekul yang memerlukan lebih banyak energi untuk promosi elektron akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang lebih pendek. Molekul yang menyerap energi lebih sedikit akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang lebih panjang. Senyawa yang menyerap cahaya dalam daerah tampak memiliki elektron yang lebih mudah dipromosikan daripada senyawa yang menyerap cahaya pada panjang gelombang UV yang lebih pendek.

Pemisahan tenaga yang paling tinggi diperoleh bila elektron-elektron dalam ikatan tereksitasi yang menimbulkan serapan dalam daerah dari 120-200 nm. Daerah ini dikenal sebagai daerah Ultraviolet (UV) vakum dan relatif tidak banyak menimbulkan keterangan. Diatas 200 nm eksitasi elektron. Dari orbital-orbital p dan d, dan orbital  $\pi$  terutama sistem konjugasi  $\pi$  segera dapat diukur, dan spektra yang diperoleh memberikan banyak keterangan.

Analisis kualitatif dengan metode spektrofotometri UV-Vis hanya dipakai untuk data sekunder atau data pendukung. Pada analisis kualitatif dengan metode spektrofotometri UV-Vis yang dapat ditentukan ada 2 yaitu :

1. Pemeriksaan kemurnian spektrum UV-Vis.
2. Penentuan panjang gelombang maximum.

Pada penentuan panjang gelombang maksimum didasarkan atas perhitungan pergeseran panjang gelombang maximum karena adanya penambahan gugus pada sistem kromofor induk (Modul, 2007: 5-6).

Kuantitasnya energi yang diserap oleh suatu senyawa berbanding terbalik dengan panjang gelombang radiasi :

$$\Delta EM = hv / (\text{per}\lambda)$$

Dimana :

$\Delta E$  : Energi yang diabsorpsi

$h$  : tetapan planck ( $6,6 \cdot 10^{-27}$  erg.det)

$v$  : Frekuensi (Hz)

$c$  : tetapan cahaya ( $3 \cdot 10^{10}$  cm/s)

$\lambda$ : panjang gelombang (cm) (Fessenden, 1984: 436).

Menurut Hukum Beer, yang hanya berlaku untuk cahaya monokromatis dan larutan yang sangat encer, serapan ( $A$ ) dan konsentrasi ( $c$ ) adalah :

$$A = k \cdot c$$

Dalam hukum Lambert-Beer, maka diperoleh bahwa serapan berbanding lurus dengan konsentrasi dan ketebalan lapisan:

$$A = k \cdot c \cdot b$$

Umumnya digunakan dua satuan  $c$  (konsentrasi zat yang menyerap) yang berlainan, yaitu gram per liter atau mol per liter. Nilai tetapan ( $k$ ) dalam hukum Lambert-Beer tergantung pada sistem konsentrasi mana yang digunakan. Bila  $c$  dalam gram per liter, tetapan disebut dengan absorptivitas ( $a$ ) dan bila dalam mol per liter tetapan tersebut adalah absorptivitas molar ( $\epsilon$ ). Jadi dalam sistem dikombinasikan, hukum Lambert-Beer dapat mempunyai dua bentuk:

$A = a . b . c \text{ } ^g/l$  atau  $A = \epsilon . b . C \text{ } ^{mol/liter}$  (Rohman, 2008: 125).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis spektrofotometri ultraviolet:

a. Pemilihan panjang gelombang maksimum

Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah panjang gelombang dimana terjadi serapan maksimum. Untuk memperoleh panjang gelombang serapan maksimum, dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara absorbansi dengan panjang gelombang dari suatu larutan baku pada konsentrasi tertentu.

b. Pembuatan Kurva Kalibrasi

Dibuat seri larutan baku dari zat yang akan dianalisis dengan berbagai konsentrasi. Masing –masing absorbansi larutan dengan berbagai konsentrasi diukur, kemudian dibuat kurva yang merupakan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi. Bila hukum Lambert-Beer terpenuhi maka kurva kalibrasi berupa garis lurus.

c. Pembacaan absorbansi sampel atau cuplikan

Absorbansi yang terbaca pada spektrofotometer hendaknya antara 0,2 sampai 0,8 atau 15 % sampai 70% jika dibaca sebagai transmittan. Anjuran ini berdasarkan anggapan bahwa pada kisaran nilai absorbansi tersebut kesalahan fotometrik yang terjadi adalah paling minimal (Rohman, 2008: 126).

### F. Tinjauan dari segi Islam

Islam merupakan agama yang sempurna dari segi universalnya, yang mengatur kehidupan manusia dalam setiap kondisinya. Memerintahkan dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan melarang segala sesuatu yang menimbulkan bahaya, serta mensyariatkan adab terhadap diri sendiri dan orang lain (Muhammad, 2010: 426). Islam juga mengatur tentang makanan, sesuai firman Allah swt. dalam Q.S. al-A'raaf/ 7 : 31

﴿ يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ۙ ﴾

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”(Departemen Agama, 2005: 154 ).

Dan makanlah makanan apa saja yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang berlebih-lebihan dalam hal apapun itu (Shihab, 2002: 87). Diterangkan pula dalam Q.S. an-Nahl /16 : 114.

﴿ فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ

﴿ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ۙ ﴾



Terjemahnya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah”(Departemen Agama, 2005: 280 ).

Pilihlah wahai orang-orang beriman, jalan kesyukuran dan *makanlah* sebagian dari *apa yang direzkikan*, yakni dianugerahkan *oleh Allah kepada kamu*. Makanlah itu *dalam keadaan halal lagi baik*, lezat dan bergizi serta berdampak positif bagi kesehatan; dan *syukurilah nikmat Allah* agar kamu tidak ditimpa apa yang menimpa negeri-negeri terdahulu jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (Shihab,2002: 757). Demikian juga pada Q.S. al-Baqarah/2: 168-169

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ  
 مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui” (Departemen Agama, 2005: 25)

Ajakan ayat tersebut ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik sebagai kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa, atau kawasan, dengan merugikan orang lain, itu bertentangan dengan ketentuan Allah (Shihab, 2002: 456).

Penciptaan langit dan bumi dalam keadaan seperti tersedianya air, dan tumbuh berkembang dan berbuahnya pohon-pohon menunjukkan betapa Allah telah menciptakan alam raya demikian bersahabat dengan manusia sehingga menjadi kewajiban manusia menyambut persahabatan itu sebagaimana dikehendaki Allah swt. dengan menjadikan manusia khalifah di bumi (Shihab, 2002: 151-152). Seperti diterangkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[30], padahal kamu Mengetahui (Departemen Agama, 2005: 5).

Dijadikan bumi *terhampar* bukan berarti dia diciptakan demikian.

Bumi diciptakan Allah bulat atau bulat telur, itu adalah hakikat ilmiah yang sulit di bantah. Lalu Dia menjadikan bulat itu terhampar bagi manusia, yakni kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka akan melihat atau mendapatkannya terhampar. Itu dijadikan Allah agar manusia dapat meraih sebanyak mungkin dari dijadikannya bumi demikian (Shihab, 2002: 149)

*Dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai bagian rezeki untuk kamu.* Sama dengan kata *air*, kata *rezeki* pun dalam ayat ini mengandung makna sebagian. Jika demikian, sumber rezeki bukan hanya buah-buahan yang tumbuh akibat hujan tapi masih banyak lainnya yang

terhampar dibumi (Shihab, 2002: 150). Seperti diterangkan pula dalam Q.S. al-Ra'd/ 13: 3

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا  
زُوجِينَ اثْنَيْنِ يُعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan[765], Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”(Departemen Agama, 2005: 495).

Dan bukan hanya benda-benda langit yang Allah ciptakan dan atur peredarannya *Dia yang membentangkan bumi*, sebagaimana kamu lihat dengan pandangan mata. Dia menundukkannya hingga kamu dapat berjalan di seluruh persada bumi yang nyaman dan *menjadikan gunung-gunung* betapapun tingginya dan tertancap di bumi, dan menjadikan *sungai-sungai* mengalir air tawar *padanya*. Dan dari air tawar itu, *dia menjadikan padanya* yakni di Bumi itu *semua buah-buahan* dari berbagai macam dan jenis *berpasang-pasangan* dan beranak pinak. Ada yang putih dan ada yang merah. Ada yang manis dan ada yang masam. *Allah menutupkan malam kepada siang* sehingga antara lain mengakibatkan matangnya buah-buahan. *Sesungguhnya pada yang demikian itu* yakni semua yang disebut diatas *terdapat ayat-ayat* yakni tanda-tanda yang sangat jelas bagi keesahan dan kebesaran Allah, *bagi kaum* yang bersungguh-sungguh merenung dan *memikirkannya* (Shihab, 2002: 210).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Alat dan bahan yang digunakan*

##### 1. Alat-alat

Alat yang digunakan adalah erlenmeyer (Pyrex), corong pisah (Pyrex), gelas ukur (Pyrex), neraca analitik (KERN ALJ 220-4 NM), pipet mikro 100-1000 mikro (Socorex isba S.A), Spektrofotometri UV-Vis (GENESYS 10S UV-VIS), vial bening.

##### 2. Bahan-bahan

Bahan yang digunakan adalah Bahan baku pembanding natrium benzoat, eter, HCl 1 M, NaCl, NaOH 10 %, NH<sub>4</sub>OH, FeCl<sub>3</sub> 5%, etanol PA, aquades, kertas saring, sampel sirup markisa.

#### *B. Prosedur kerja*

##### 1. Penyiapan Sampel

Diambil sampel markisa dari tiga jenis sirup markisa secara acak. Masing-masing sampel di ambil 10 ml dan disaring dengan kertas saring hingga terpisah filtrat dan residunya, diambil bagian filtrat lalu selanjutnya dilakukan ekstraksi.

## 2. Penentuan Kadar

### a. Analisis Kualitatif

Uji dengan  $\text{FeCl}_3$

Sampel larutan sebanyak 50 gram dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml tambah 10 ml  $\text{NaOH}$  10% agar bersifat basa dan larutan  $\text{NaCl}$  jenuh (30 gram/ml dalam 100 ml air), tepatkan tanda kocok dan biarkan selama 2 jam, kemudian saring dengan kertas saring.

Sebanyak 50 ml filtrat masukkan ke dalam corong pisah 250 ml, asamkan dengan  $\text{HCl}$  (1:3) berlebih, kemudian tambahkan 10-15 ml eter lalu kocok. Lapisan eter ditampung dalam labu Erlenmeyer 50 ml kemudian diuapkan di atas penangas air. Larutkan residu dengan pemanasan dan tambah beberapa pengujian  $\text{NH}_4\text{OH}$  sampai basa, dan hilangkan kelebihan  $\text{NH}_3$  dengan penguapan, kemudian tambah beberapa pengujian  $\text{FeCl}_3$  5% netral. Apabila terbentuk endapan kecoklatan berarti positif mengandung benzoat.

### b. Analisis Kuantitatif

Cara kerja:

#### a. Ekstraksi.

Sebanyak 2,0 ml sampel sirup markisa dimasukkan kedalam Erlenmeyer bertutup dan ditimbang beratnya, kemudian ditambahkan 3,0 ml  $\text{HCl}$  1 M, lalu diekstraksi dengan 10 ml dietil eter dengan pengojog laboratorium selama 30 menit, diulangi prosedur ekstraksi sebanyak 2 kali dan ekstrak dikumpulkan dalam

cawan porselin. Kemudian ekstrak dietil eter diuapkan pada penangas suhu 35°C. Ekstrak sampel dimasukkan kedalam labu takar 10 ml dan dilarutkan dengan 10 ml etanol PA, Kemudian dibaca spektrum absorbansinya terhadap blanko pada panjang gelombang 288 nm.

b. Pembuatan kurva standar natrium benzoat.

Sebanyak 1000,0 mg natrium benzoat dilarutkan dalam etanol PA sampai 100,0 ml. Dilakukan pengenceran pada konsentrasi 8000, 6000, 4000, dan 2000 ppm. Dengan cara diambil sebanyak 2 ml dari larutan baku dan diencerkan dengan 10 ml etanol PA untuk konsentrasi 2000 ppm, dan hal yang sama dilakukan seterusnya hingga konsentrasi 8000 ppm.

c. Penentuan panjang gelombang maksimum.

Diukur absorbansi masing-masing konsentrasi pada spektrofotometer Uv-Vis pada panjang gelombang 200-400 nm.


## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Pengamatan

Tabel 1. Hasil pengukuran serapan Natrium Benzoat murni pada panjang gelombang 288nm.

No.	Konsentrasi (ppm)	Serapan (A)
1.	2000	0,159
2.	4000	0,252
3.	6000	0,362
4.	8000	0,442
5.	10000	0,532



Gambar 1. Kurva baku Natrium Benzoat pada panjang gelombang 288 nm.

Tabel 2. Hasil perhitungan kadar Natrium Benzoat pada sampel sirup markisa secara Spektrofotometri UV-Vis.

No.	Sampel	Berat sampel (gram)	Absorban (A)	Kadar Rata-rata (g/kg)
1.	A	2,26	0,341	4,68
		2,28	0,327	
		2,32	0,341	
	<b>Jumlah rata-rata</b>	<b>2,286</b>	<b>0,336</b>	
2.	B	2,17	0,697	9,06
		2,35	0,622	
		2,24	0,417	
	<b>Jumlah rata-rata</b>	<b>2,253</b>	<b>0,5786</b>	
3.	C	2,25	0,472	6,36
		2,24	0,493	
		2,25	0,311	
	<b>Jumlah rata-rata</b>	<b>2,246</b>	<b>0,4253</b>	

### B. Pembahasan

Asam benzoat merupakan bahan pengawet yang luas penggunaannya dan sering digunakan pada bahan makanan. Karena kelarutan garamnya lebih besar maka biasa digunakan dalam bentuk garam natrium benzoat yang jika dicampurkan kedalam bahan makanan garam benzoat tersebut terurai menjadi bentuk efektifnya atau bentuk asam benzoat (Winarno, 1997: 23).

Benzen dalam struktur asam benzoat menyerap dengan kuat pada 184 nm ( $\epsilon = 47.000$ ) dan pada 202 nm ( $\epsilon = 7.000$ ) dan mempunyai sederet pita absorpsi antara 230-270 nm. Panjang gelombang 260 nm sering dilaporkan



sebagai  $\lambda_{\max}$  untuk benzen, karena itulah posisi absorpsi terkuat pada panjang gelombang di atas 200 nm. (Fessenden, 1986: 441-442). Untuk itu pada penelitian ini digunakan metode analisis dengan spektrofotometri UV-Vis karena melihat adanya gugus ikatan rangkap dalam struktur natrium benzoat yang dapat dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis

Pada preparasi sampel, dilakukan penyaringan terlebih dahulu untuk menghilangkan serat-serat buah yang ada dalam sampel sehingga tidak mengganggu proses penyerapan radiasi pada saat pengukuran.

Penambahan pelarut HCl 1 M dilakukan agar dapat mempermudah perolehan senyawa asam benzoat yang lebih banyak pada sampel melalui proses hidrolisis. Dimana natrium yang ada dalam struktur natrium benzoat akan terlepas dan berikatan dengan klorida dari penambahan HCl dengan membentuk garam yang terlarut dalam air dan hidrogen akan berikatan dengan karboksilat dan benzen membentuk senyawa asam benzoat, dimana asam benzoat ini akan terekstraksi dengan penambahan eter.



Panjang gelombang yang akan digunakan dalam analisa sampel ditentukan berdasarkan dari absobansi maksimum yang dihasilkan dari salah satu konsentrasi yang digunakan dalam penentuan kurva baku, dimana konsentrasi natrium benzoat standar yang digunakan adalah 2000, 4000, 6000, 8000 dan 10000 ppm dengan perolehan absorbansi maksimum berturut-turut adalah 0,159, 0,252, 0,362, 0,442 dan 0,532.

Absorbansi yang terbaca pada spektrofotometer hendaknya antara 0,2 sampai 0,8 atau 15 % sampai 70%. Anjuran ini berdasarkan anggapan bahwa pada kisaran nilai absorbansi tersebut kesalahan fotometrik yang terjadi adalah paling minimal (Rohman, 2008: 126).

Berdasarkan dari pengukuran panjang gelombang natrium benzoat standar pada penelitian ini diperoleh serapan maksimum pada panjang gelombang 288 nm dan menghasilkan kurva baku dengan persamaan regresi  $y = 0,068 + 0,00005x$ .

Panjang gelombang UV ataupun tampak bergantung pada mudahnya pelepasan elektron, molekul yang memiliki lebih banyak energi untuk pelepasan elektron akan menyerap panjang gelombang yang lebih pendek, dan molekul yang memerlukan energi lebih sedikit akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih panjang (Fessenden, 1986: 437).

Pada struktur natrium benzoat terdapat ikatan rangkap terkonjugasi yang ketika ikatan rangkap terkonjugasi tersebut terdapat banyak dalam suatu molekul maka makin kecil energi yang diperlukan molekul tersebut untuk mencapai keadaan terseksitasi. Makin kecil energi yang diperlukan molekul tersebut untuk tereksitasi maka akan menyerap panjang gelombang yang lebih panjang.

Dari persamaan regresi yang diperoleh dilakukan perhitungan konsentrasi pengawet natrium benzoat pada masing-masing sampel, sehingga pada penelitian ini diperoleh kadar natrium benzoat yang terkandung dalam

sampel A sebesar 4,68 g/kg, pada sampel B sebesar 9,06 g/kg dan sampel C sebesar 6,36 g/kg. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga sampel sirup markisa tersebut tidak memenuhi ketentuan batas penggunaan bahan tambahan makanan yang tertera pada peraturan Menteri Kesehatan RI No.722/MEN.KES/PER/IX/88 yang menyatakan bahwa batas penggunaan natrium benzoat sebagai pengawet dalam sirup dan sari buah sebesar 1 g/kg.

Pada penggunaan yang berlebihan, natrium benzoat dapat menyebabkan keram perut dan dalam penggunaan jangka waktu yang lama berpotensi menimbulkan penyakit kanker dan dapat merusak sistem saraf manusia (Winarno, 1974: 2).


Maka ditinjau dari segi syariat keislaman, ketiga sirup markisa tersebut belum bisa dikatakan *tayyib*, walaupun dari segi zatnya termasuk makanan halal, namun kadar pengawet yang berlebihan memiliki dampak buruk bagi kesehatan baik secara langsung maupun dalam jangka panjang yang tidak dapat mendukung kesehatan, sesuai dengan Q.S. Tāha / 20 : 81

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ  
تَحَلَّلَ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Terjemahnya :

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang Telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia” (Departemen Agama, 2005: 317).

Makanlah makanan apa saja yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang berlebih-lebihan dalam hal apapun itu (Shihab, 2002: 87).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kadar pengawet natrium benzoat yang terkandung dalam sirup markisa sampel A sebesar 4,68 g/kg, pada sampel B sebesar 9,06 g/kg dan sampel C sebesar 6,36 g/kg.
2. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga sampel sirup markisa tersebut tidak memenuhi ketentuan batas penggunaan bahan tambahan makanan yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.722/MEN.KES/PER/IX/88 yang menyatakan bahwa batas penggunaan natrium benzoat sebagai pengawet dalam sirup dan sari buah sebesar 1 g/kg.

#### ***B. Implikasi***

Sebaiknya masyarakat dan produsen lebih memperhatikan penggunaan bahan tambahan makanan untuk tidak melebihi dari batas yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Bandung : CV. Penerbit J-ART, 2005.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. *Act Of Food*. [http://agri.sucofindo.co.id/Extra/PDF/BPOM\\_Undang-undang\\_Pangan.pdf](http://agri.sucofindo.co.id/Extra/PDF/BPOM_Undang-undang_Pangan.pdf). (20 Desember 2011).
- Backer, C.A. *Flora of Java (Spermatophytes Only)*. Vol I. N.V.P. Noordhoff. Netherlands. 1963.
- Concise International Chemical Assessment Document 26. *Benzoic Acid and Sodium Benzoate*. [http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/cicad26\\_rev\\_1.pdf](http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/cicad26_rev_1.pdf). (20 Desember 2011).
- Departemen Kesehatan RI. *Bahan Tambahan Makanan*. Bhratara Karya Aksara. Jakarta. 1988.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Departemen Kesehatan RI. Jakarta. 1979.
- Fessenden, R. J., Fessenden, J, S., *Kimia Organik Jilid 2*. Penerbit Erlangga, Jakarta. 1984.
- Furia, A.Z., *hand Book of Food Additives*. Chemical Ink Publish. New York. 1972. Tinjauan terhadap jurnal penelitian *Pengaruh Kosentrasi Natrium Benzoat dan lama Penyimpanan Terhadap Mutu Minuman Sari Buah Sirsak (Annona muricata L) Berkarbonasi*. Suyetmi Zentimer. USU Repository. 2009.
- Hayun, Yahdiana Harahap, dan Citra Nur Aziza. *Penetapan Kadar Sakarin, Asam benzoate, Asam sorbet, Kofeina dan Aspartam di Dalam Beberapa Minuman Ringan Bersoda Secara KCKT*. Majalah ilmu kefarmasian. Vol. I, No.3. 2004.pdf <http://jurnal.farmasi.ui.ac.id/pdf/2004/v01n03/Hayun010303.pdf?...> (20 Desember 2011).
- Harmita. *Opini Amankah Pengawet Makanan Bagi Manusia?*. FMIPA-UI. Depok. Pdf. <http://jurnal.farmasi.ui.ac.id/pdf/2006/v03n01/opini0301.pdf?PHPSESSID=50ac0ac476b31f8693bfbb726df823c1>. (8 Januari 2012).
- Jaeger, Peter. *Study of the Market For Rwandan Passion Fruit In Europe*. 2001. pdf. [http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PNACN662.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACN662.pdf) (28 Desember 2011).
- Karsinah, R.C. Hutabarat, dan A. Manshur. *Iptek Hortikultura*. Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Sumatra Barat. 2010. Pdf. <http://hortikultura.litbang.Deptan.Go.id/IPTEK/Karsinah-markisaasam.pdf> (7 Februari 2012).
- Khopkar S.M. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Terjemahan oleh Saptorahardjo. UI-Press. Jakarta. 2007.
- Modul kuliah *Spektroskopi*. Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. 2007. pdf.

- <http://wanibesak.files.wordpress.com/.../modul-kuliah-fakultas-farmasi-uni...pdf> (20 Desember 2011).
- Morey, Phillip, Morelink Asia Pacific. 2007. *Passion Fruit Demand Study Indonesia*. Australia: IFC World Bank SADI.pdf. [http://aci.gov.au/files/.../SMAR-2007-197%20Passionfruit%20\[Bahasa\].pdf](http://aci.gov.au/files/.../SMAR-2007-197%20Passionfruit%20[Bahasa].pdf). (5 Januari 2012).
- Muhammad, Alif K. Sahide dan Micha Ekaputra P. *Analisis Aspek Ekonomi Dalam Pengembangan Pasar Produk Hutan Desa Labbo Kabupaten Bantaeng. Jurnal Hutan dan Masyarakat*. Volume. 6, No.1, Mei 2011. Pdf. <http://repository.unhas.ac.id/.../...pdf>. (21 Desember 2011).
- Muhammad, Syaikh. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Darus Sunnah. Jakarta. 2010.
- Nursyifa. *Berdasarkan Al-quran dan assunnah*. <http://www.nursyifa.com>. (23 Desember 2011).
- Purba, A., dan H. Rusmarilin. *Dasar Pengolahan Pangan Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas USU*. Medan. 1985. Tinjauan terhadap jurnal penelitian *Pengaruh Kosentrasi Natrium Benzoat dan lama Penyimpanan Terhadap Mutu Minuman Sari Buah Sirsak (Annona muricata L) Berkarbonasi*. Suyetmi Zentimer.USU Repository. 2009.
- Rohman A & Gandjar I.G. *Kimia Farmasi Analisis*. Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2008.
- Rohman, Abdul. *Analisis Bahan Pangan*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. 2011.
- Subani. *Penentuan Kadar Natrium Benzoat, Kalium Sorbat,dan Natrium Sakarin Dalam Sirup Dengan Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan*. 2008. Pdf. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/13901/1/09E00348.pdf>. (25 Desember 2011).
- Shihab,M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati. Jakarta. 2002.
- Standar Nasional Indonesia. *Bahan Tambahan Makanan*. Badan Standarisasi Nasional. SNI 01-0222-1995. Pdf. [http://agri.sucofindo.co.id/Extra/PDF/SNI\\_01-0222-1995\\_Bahan\\_Tambahan\\_makanan.pdf](http://agri.sucofindo.co.id/Extra/PDF/SNI_01-0222-1995_Bahan_Tambahan_makanan.pdf) (6 Februari 2012 )
- Wisnu, C. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta. 2006. Tinjauan terhadap jurnal penelitian *Penentuan Kadar Natrium Benzoat, Kalium Sorbat,dan Natrium Sakarin Dalam Sirup Dengan Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan*. Subani. 2008.
- Winarno, F.G dan B.S. Laksmi, *Dasar Pengawetan Pangan dan Cara Pencegahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1974. Tinjauan terhadap jurnal penelitian *Penentuan Kadar Natrium Benzoat, Kalium Sorbat,dan Natrium Sakarin Dalam Sirup Dengan Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan*. Subani. 2008.
- Winarno, F.G., S. Fardiaz dan D. Fardiaz, *Pengantar Teknologi Pangan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1980. Tinjauan terhadap jurnal penelitian *Pengaruh*

*Kosentrasi Natrium Benzoat dan lama Penyimpanan Terhadap Mutu Minuman Sari Buah Sirsak (Annona muricata L) Berkarbonasi.* Suetmi Zentimer.USU Repository. 2009.

Winarno, F.G., S. Fardiaz dan D. Fardiaz, *Kimia Pangan dan Gizi.* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1994. Tinjauan terhadap jurnal penelitian *Analisis Kadar Natrium benzoate sebagai pengawet minuman dalam Minuman Isotonik di Kota Medan di tahun 2011.* Shanggari Maniarsu.USU Repository. 2009.






## LAMPIRAN


### LAMPIRAN 1

#### a. Ekstraksi sampel



Gambar 1: Skema ekstraksi Natrium benzoat pada sampel

#### b. Analisis sampel




Gambar 2: Skema kerja Analisis ekstrak natrium benzoat dari sampel


c. Pengenceran larutan baku

Natrium benzoat pro analis sebanyak 1 gram di larutkan dalam etanol PA 100 ml (stok 10000 ppm). Selanjutnya diencerkan hingga menjadi 2000,4000,6000, dan 8000 ppm.

1. Konsentrasi 2000 dan 4000 ppm



2. Konsentrasi 6000 dan 8000 ppm



## LAMPIRAN 2. Perhitungan-perhitungan

$$Y = 0,068 + 0,00005x$$

Dimana; Y: absorban

$$a: 0,068$$

$$b: 0,00005$$

Sampel A: Absorban rata-rata : 0,334

Volume sampel : 2 ml

Berat sampel rata-rata : 2,286 gram

$$Y = a + bx$$

$$0,334 = 0,068 + 0,00005x$$

$$0,334 - 0,068 = 0,00005x$$

$$0,226 = 0,00005x$$

$$X = 5360 \mu\text{g/ml}$$

Kadar rata-rata dalam 2 ml = 10720  $\mu\text{g}$

Kadar dalam gram = 4689,4  $\mu\text{g/g}$

$$= 4,68 \text{ mg/g}$$

$$= 4,68 \text{ g/kg}$$

Sampel B: Absorban rata-rata : 0,5786

Volume sampel : 2 ml

Berat sampel rata-rata : 2,253 gram

$$Y = a + bx$$

$$0,5786 = 0,068 + 0,00005x$$

$$0,5786 - 0,068 = 0,00005x$$

$$0,5106 = 0,00005x$$

$$X = 10212 \mu\text{g/ml}$$

Kadar rata-rata dalam 2 ml = 20424  $\mu\text{g}$

Kadar dalam gram = 9065,2  $\mu\text{g/g}$

= 9,06 mg/g

= 9,06 g/kg

Sampel C: Absorban rata-rata : 0,4253

Volume sampel : 2 ml

Berat sampel rata-rata : 2,2467 gram

$Y = a + bx$

$$0,4253 = 0,068 + 0,00005x$$

$$0,4253 - 0,068 = 0,00005x$$

$$0,3573 = 0,00005x$$

$$X = 7146 \mu\text{g/ml}$$

Kadar rata-rata dalam 2 ml = 14292  $\mu\text{g}$

Kadar dalam gram = 6361,3  $\mu\text{g/g}$

= 6,36 mg/g

= 6,36 g/kg

## LAMPIRAN 3:

## BAHAN TAMBAHAN YANG DIIZINKAN

(PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR: 722/MEN.KES/PER/IX/88 TENTANG  
BAHAN TAMBAHAN MAKANAN)

## BAHAN PENGAWET

NO	NAMA BAHAN TAMBAHAN MAKANAN		JENIS / BAHAN MAKANAN	BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS		
1.	Asam Benzoat	Benzoic Acid	1. Kecap 2. Minuman ringan 3. Acar ketimun dalam botol  4. Margarin  5. Pekatan sari nanas	600 mg/kg 600 mg/kg 1 g/kg, tunggal atau campuran dengan kalium dan natrium benzoat atau dengan kalium sorbat. 1 g/kg, tunggal atau campuran dengan garamnya atau dengan asam sorbat dan garamnya. 1 g/kg, tunggal atau campuran dengan garamnya atau dengan asam sorbat dan garamnya, serta senyawa sulfit,

			6. Saus Tomat 7. Makanan lain	tetapi senyawa sulfit tidak lebih dari 500mg/kg 1g/kg 1g/kg
2.	Asam Propionat	Propionic Acid	1. Sediaan keju olahan  2. Roti	3 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam sorbat dan garamnya. 2g/kg
3.	Asam Sorbat	Sorbic Acid	Sediaan keju olahan	3 g/kg, tunggal atau campuran dengan garamnya atau dengan asam propionat dan garamnya.
4.	Belerang Dioksida	Sulfur Dioxide	1. Acar ketimun dalam botol 2. Jem dan jelli; marmalad 3. Pekatan sari buah;pasta tomat. 4. Gula bubuk (untuk hiasan kue); dekstroza bubuk 5. Gula pasir 6. Vinegar 7. Sirop 8. Bir; minuman ringan 9. Anggur 10. Sosis	50 mg/kg 100 mg/kg 350 mg/kg 20 mg/kg 70 mg/kg 70 mg/kg 70 mg/kg 70 mg/kg 200 mg/kg 450 mg/kg

			<p>11. Ekstrak kopi kering</p> <p>12. Gelatin</p> <p>13. Makanan lain</p>	<p>150 mg/kg</p> <p>1 g/kg</p> <p>500 mg/kg</p>
5.	Etil p-Hidroksibenzoat	Ethyl p-Hydroxybenzoat	Jem dan jelli	1 g/kg, tunggal atau campuran dengan garamnya atau dengan asam sorbat dan kalium sorbat.
6.	Kalium Benzoat	Potassium Benzoat	<p>1. Acar ketimun dalam botol</p> <p>2. Keju</p> <p>3. Margarin</p> <p>4. Apricot yang dikeringkan</p>	<p>1 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam benzoat dan natrium benzoat, atau dengan kalium sorbat.</p> <p>1 g/kg, tunggal atau campuran dengan garamnya atau dengan asam sorbat dan garamnya.</p> <p>1 g/kg, tunggal atau campuran dengan garamnya atau dengan asam sorbat dan garamnya.</p> <p>500 g/kg, tunggal atau campuran dengan garamnya</p>

			5. Jem dan jelli	1 g/kg, tunggal atau campuran dengan kalium sorbat atau dengan garam benzoat.
			6. Marmalad	500 mg/kg, tunggal atau campuran dengan kalium sorbat .
			7. Pekatan sari nanas	1 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam benzoat atau dengan asam sorbat dan garamnya dan senyawa sulfit, tetapi senyawa sulfit tidak lebih dari 500 mg/kg.
			8. Sirop; sari tomat	1g/kg
			9. Anggur; anggur buah dan minuman beralkohol lain	200 mg/kg
			10. Makanan lainnya kecuali:	1g/kg
			a. Daging	
			b. Ikan	
			c. Unggas	



7.	Kalium Bisulfit	Potassium Bysulphite	<p>1. Potongan kentang goreng beku</p> <p>2. Udang beku</p> <p>3. Pekatan sari nanas</p>	<p>50 mg/kg, tunggal atau campuran dengan senyawa sulfit lainnya.</p> <p>100mg/kg, bahan mentah; 30 mg/kg produk yang telah dimasak, tunggal atau campuran dengan senyawa sulfit lainnya.</p> <p>500 mg/kg, tunggal atau campuran dengan senyawa sulfit, atau dengan asam benzoat, asam sorbat dan garamnya.</p>
8.	Kalium Metabisulfit	Potassium Metabisulphite	<p>1. Potongan kentang goreng beku.</p> <p>2. Udang Beku</p>	<p>50 mg/kg, tunggal atau campuran dengan senyawa sulfit lainnya.</p> <p>100 mg/kg, bahan mentah 30 mg/kg produk yang telah dimasak, tunggal atau campuran</p>

				dengan senyawa sulfit lainnya.
9.	Kalium Nitrit	Potassium Nitrite	1. Daging Olahan; Daging awetan  2. Kornet Kalengan	125 mg/kg, tunggal atau campuran dengan natrium nitrit, dihitung sebagai natrium nitrit.  50 mg/kg, tunggal atau campuran natrium nitrit, dihitung sebagai natrium nitrit.
10.	Kalium Propionat	Potassium Propionate	Sediaan keju olahan	1 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam propionat atau dengan asam sorbat dengan garamnya.
11.	Kalium Sorbat	Potassium Sorbat	1. Sediaan keju olahan  2. Keju	3 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam sorbat atau dengan asam propionat dengan garamnya.  1 g/kg, tunggal atau campuran

				dengan asam sorbat. 1 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam sorbat atau dengan asam benzoat dan garamnya.
			3. Margarin	1 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam sorbat atau dengan asam benzoat dan garamnya.
			4. Apricot yang dikeringkan	500 mg/kg, tunggal atau campuran dengan asam sorbat.
			5. Acar ketimun dalam botol	1 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam benzoat, kalium benzoat dan natrium benzoat.
			6. Jem dan jelli	1 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam sorbat atau dengan senyawa benzoat.
			7. Marmalad	500 mg/kg, tunggal atau campuran dengan asam sorbat
			8. Pekatan sari nanas	1 g/kg, tunggal atau campuran

				dengan asam sorbat atau dengan asam benzoat dan garamnya dan senyawa sulfit tidak lebih dari 500 mg/kg.
12.	Kalium Sulfit	Potassium Sulphite	Lihat kalium bisulfit	Lihat kalium bisulfit
13.	Kalsium Benzoat	Calcium Benzoate	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekatan sari nanas</li> <li>2. Saus tomat; sirop; pekatan sari buah</li> <li>3. Anggur; anggur buah dan minuman beralkohol ain.</li> </ol>	<p>1 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam benzoat atau dengan asam sorbat dan garamnya dan senyawa sulfit tetapi senyawa sulfit tidak lebih dari 500 mg/kg.</p> <p>1 g/kg</p> <p>200 mg/kg</p>
14.	Kalsium Propionat	Calcium Propionat	Lihat asam propionat	Lihat asam propionat

15.	Kalsium Sorbat	Calcium Sorbate	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Margarin</li> <li>2. Pekatan sari nanas</li> </ol>	<p>1 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam sorbat atau dengan asam benzoat dan garamnya.</p> <p>1 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam sorbat atau dengan asam benzoate dan garamnya dan senyawa sulfit, tetapi senyawa sulfit tidak lebih dari 500 mg/kg.</p>
16	Metil p-Hidroksibenzoat	Methyl p-Hidroksilbenzoat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lihat etil p-hidroksibenzoat</li> <li>2. Acar ketimun dalam botol: kecap</li> <li>3. Ekstrak kopi cair</li> <li>4. Pasta tomat; sari buah</li> <li>5. Makanan lainnya kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daging</li> <li>b. Ikan</li> <li>c. Unggas</li> </ol> </li> </ol>	<p>Lifat etil p-hidroksibenzoat</p> <p>250 mg/kg</p> <p>450 mg/kg</p> <p>1 g/kg</p> <p>1 g/kg</p>


17.	Natrium Benzoat	Sodium Benzoat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lihat kalium benzoat</li> <li>2. Jem dan jelli</li> <li>3. Kecap</li> <li>4. Minuman ringan</li> <li>5. Saus tomat</li> <li>6. Makanan lain</li> </ol>	<p>Lihat kalium benzoate</p> <p>1 g/kg, tunggal atau campuran dengan asam sorbat dan garam kaliumnya atau dengan ester dari asam para hidroksilbenzoat</p> <p>600 mg/kg</p> <p>600 mg/kg</p> <p>1 g/kg</p> <p>1 g/kg</p>
18	Natrium Bisulfit	Sodium Hydrogen Sulphite	Lihat kalium bisulfit	Lihat kalium bisulfit
19.	Natrium Metabisulfit	Sodium Metabisulfit	Lihat kalium metabisulfit	Lihat kalium metabisulfit
20.	Natrium Nitrat	Sodium Nitrate	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daging olahan; daging awetan</li> <li>2. Keju</li> </ol>	<p>500 mg/kg, tunggal atau campuran dengan kalium nitrit</p> <p>50 mg/kg, tunggal atau campuran dengan kalium nitrit</p>
21.	Natrium Nitrit	Sodium Nitrite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daging olahan; daging awetan</li> </ol>	<p>125 mg/kg, tunggal atau campuran engan</p>

			2. Kernet kalengan	kalium nitrit 50 mg/kg, tunggal atau campuran dengan kalium nitrit.
22.	Natium Propionat	Sodium Propionat	Lihat asam propionat	Lihat asam propionat
23.	Natrium Sulfit	Sodium Sulfite	Lihat kalium bisulfit	Lihat kalium bisulfit
24.	Nisin	Nisin	Sediaan keju olahan	12,5 mg/kg
25.	Propel p- hidroksibenzoat	Propyl p- hidroksibenzoat	Lihat metal p-hidroksibenzoat	Lihat metal p- hidroksibenzoat

## LAMPIRAN 4. Dokumentasi Penelitian



Gambar 2. Sampel sirup markisa




Gambar 3. Penyaringan sampel





Gambar 4. Ekstraksi sampel dengan eter



## BIOGRAFI



Noviani Pratiwi biasa dipanggil Novi. Lahir di Makassar 22 november 1990. Anak pertama dari tiga bersaudara ini mengawali pendidikannya di TK Bhayangkari dan melanjutkannya di SD Negeri Panaikang I. Pada tahun 2005 menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya di SMP Negeri 12 Makassar dan pada tahun 2008 menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri 16 Makassar dan langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang Universitas. Dan dengan penyusunan skripsi ini penulis telah menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar Sarjana di Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R