

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN LAMA
HARI RAWAT PASIEN POST *APPENDECTOMY*
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A
SULTHAN DG. RADJA
BULUKUMBA**



SKRIPSI

*Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana keperawatan
(S.Kep) jurusan ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar*

ANDI ENNI YULFANITA

70300109006

**PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2013**

ABSTRAK

NAMA : ANDI ENNI YULFANITA
NIM : 70300109006
JURUSAN : KEPERAWATAN
FAKULTAS : ILMU KESEHATAN
JUDUL : FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN LAMA HARI RAWAT PASIEN POST APPENDECTOMY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HA SULTHAN DAENG RADJA BULUKUMBA.

Appendectomy adalah proses pengangkatan organ apendiks yang mengalami peradangan. Pasien –pasien dengan post pembedahan *Appendectomy* akan menjalani proses perawatan diruang rawat inap Rumah Sakit. Dimana lama perawatan setiap pasien akan berbeda-beda. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor usia, jenis penyakit *appendicitis*, penyakit penyerta, komplikasi dan infeksi luka operasi (ILO) dengan lama hari rawat pasien post *appendectomy*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan rancangan “*Cross Sectional Study*”, dan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *Accidental sampling*. Data dari setiap responden akan dimasukkan ke dalam komputer oleh peneliti. Analisis data yang diperoleh dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan analisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Dengan jumlah sampel sebanyak 15 orang, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa belum diperoleh hubungan yang signifikan dengan uji *chi-square* antara faktor independen terhadap faktor dependen. Dimana nilai hasil analisis *chi-square* masing-masing untuk usia adalah $p = 0,38$, jenis penyakit apendisitis $p = 0,448$, penyakit penyerta $p = 0,919$, komplikasi $p = 0,423$, infeksi luka operasi $p = 0$.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum didapatkan hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Masukan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat memaksimalkan jumlah responden yang ada untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya.

Daftar Pustaka : (1995-2012)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT., yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2013

Penulis,

Andi Enni Yulfanita

NIM. 70300109006



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Lama Hari Rawat Pasien Post Appendectomy di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba**” yang disusun oleh saudari **Andi Enni Yulfanita**, NIM: **70300109006**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Ilmu Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 1 Agustus 2013 M
23 Ramadhan 1434 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A	(.....)
Sekretaris	: Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt	(.....)
Penguji I	: Abd. Majid, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp KMB	(.....)
Penguji II	: Prof. DR. H. Darussalam, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Eny Sutria, S.Kep.,Ns. M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Basri Syam, S.Kep.,Ns. M.Kes	(.....)

Disahkan oleh:
Pjs. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A
NIP. 19520811 198203 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq hidayah dan Inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul :

“Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Lama Hari Rawat Pasien Post *Appendectomy* Di Rumah Sakit Umum Daerah Sulthan Daeng Radja Bulukumba.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian akhir pada pendidikan Strata satu (S1), Jurusan ilmu keperawatan Fakultas kesehatan Universitas Islam negeri alauddin makassar.

Dengan Segala Kerendahan hati, Melalui Kesempatan ini Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak **Andi Bustang dan Ibunda Alm. Andi Norma** serta saudara terbaikku **Andi Asbar dan Andi Rahmatiah** . Ucapan doa, kiranya beliau-beliau diampuni dan dikasihi oleh ALLAH SWT. Sebagaimana beliau-beliau mengasihi penulis semenjak kecil, yang atas asuhan dan limpahan kasih sayangnya, penulis beroleh kekuatan moril maupun materil dalam menapaki jenjang pendidikan.
2. **Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS**, selaku Rektor Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.
3. **Prof. DR. H. Ahmad M. Sewang, M.Ag**, Selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan.

4. **Dr.Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes** Selaku ketua prodi Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan serta sebagai Ibu yang selalu memberikan motivasi dan pengetahuan yang luas kepada kami anak didiknya.
5. **Eny Sutria,S.Kep., Ns., M.Kes dan Basri Syam S.Kep., Ns., M.Kes,** masing-masing sebagai pembimbing I dan II .
6. Selaku **Dosen serta staf** Program Studi Keperawatan yang telah memberi bantuan dan bimbingan selama peneliti mengikuti pendidikan.
7. **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba,** yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ditempat tersebut.
8. Pemberi motivasi dan semangatku yaitu sahabat-sahabatku **Mawan, Jackline dan Rosellah,** keponakan terbaik **Andi Arinal Ma'rifat.**
9. Teman-teman **KKN UIN Angkatan-48** dan seluruh rekan mahasiswa keperawatan yang tak sempat ku sebut namanya. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu.

Penulis mengakui bahwa banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan ini, oleh karenanya kritik dan saran untuk kesempurnaan Skripsi ini sangat di harapkan. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin,

Makassar, Juli 2013

Penulis

Andi Enni Yulfanita

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Abstrak	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Pengesahan Skripsi	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
I. Tinjauan tentang Penyakit Apendisitis	9
A. Defenisi	9
B. Etiologi	9
C. Patofisiologi Apendisitis	11
D. Klasifikasi Apendisitis	14
E. Manifestasi Klinis	17
F. Penatalaksanaan	18

II. Tinjauan tentang Post Operasi Apendisitis.....	20
A. Pengertian Operasi/Pembedahan.....	20
B. Fase Operasi/Pembedahan	21
C. Operasi Apendisitis/Apendiktomi	22
III. Tinjauan Lama Hari Rawat.....	24
IV. Tinjauan Faktor yang Berhubungan Lama Hari Rawat Pasien Post Apendiktomi.	25
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Kerangka Konsep.....	32
B. Variabel Penelitian.....	33
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	33
D. Hipotesis Penelitian.....	36
E. Kerangka Kerja	38
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Metode Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel.....	40
D. Tehnik Pengambilan Sampel.....	41
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Prosedur Pengumpulan Data.....	42
G. Pengolahan dan Analisa data	43
H. Etika Penelitian	45

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	48
1. Karakteristik Responden	48
2. Analisis Univariat.....	51
3. Analisis Bivariat.....	56
B. Pembahasan.....	63
C. Keterbatasan penelitian	72

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 5.1	Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	48
Tabel 5.2	Distribusi Frekuensi Usia Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba	49
Tabel 5.3	Distribusi frekuensi usia Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	49
Tabel 5.4	Distribusi Frekuensi usia Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba	50
Tabel 5.5	Distribusi Frekuensi usia Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba	50

Tabel 5.6	Distribusi Frekuensi lama hari rawat Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba	51
Tabel 5.7	Distribusi Frekuensi usia Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	52
Tabel 5.8	Distribusi Frekuensi usia Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba	52
Tabel 5.9	Distribusi Frekuensi usia Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba	53
Tabel 5.10	Distribusi Frekuensi usia Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	53
Tabel 5.11	Distribusi Frekuensi jenis penyakit apendisitis Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba	54

Tabel 5.12	Distribusi Frekuensi penyakit penyerta Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	54
Tabel 5.13	Distribusi Frekuensi komplikasi Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	55
Tabel 5.14	Distribusi Frekuensi infeksi luka operasi Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	55
Tabel 5.15	Hubungan faktor usia dengan lama hari rawat Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	56
Tabel 5.16	Hubungan faktor usia dengan lama hari rawat Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	57
Tabel 5.17	Hubungan faktor usia dengan lama hari rawat Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan	

	Daeng Radja Bulukumba.	57
Tabel 5.18	Hubungan faktor usia dengan lama hari rawat Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	
	Daeng Radja Bulukumba.	58
Tabel 5.19	Hubungan faktor jenis penyakit apendisitis dengan lama hari rawat Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	59
Tabel 5.20	Hubungan faktor penyakit penyerta apendisitis dengan lama hari rawat Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	60
Tabel 5.21	Hubungan faktor komplikasi dengan lama hari rawat Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	61
Tabel 5.22	Hubungan faktor infeksi luka operasi dengan lama hari rawat Pasien Post Appendectomy Di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Petugas kesehatan khususnya perawat dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan suatu pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Kesehatan dan gaya hidup dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah kurangnya konsumsi makanan berserat dalam menu sehari-hari, diduga sebagai salah satu penyebab terjadinya masalah kesehatan yaitu apendisitis (Bambang, 2010).

Apendiks merupakan saluran usus yang ujungnya buntu dan menonjol dari bagian awal usus besar atau sekum (cecum). Apendiks besarnya sekitar kelingking tangan dan terletak di perut kanan bawah. Strukturnya seperti bagian usus lainnya. Apendiks banyak mengandung kelenjar yang senantiasa mengeluarkan lendir dan dipercaya sebagai sistem imun. Apendisitis merupakan peradangan pada usus buntu/apendiks. Apendisitis adalah peradangan akibat infeksi pada usus buntu atau umbai cacing (apendiks). Infeksi ini bisa mengakibatkan terjadinya nanah (pus) (Arisandi, 2008).

Sedangkan menurut Jong (2005) apendisitis merupakan kasus infeksi intraabdominal yang sering dijumpai di negara-negara maju, sedangkan pada negara berkembang jumlahnya lebih sedikit, hal ini mungkin terkait dengan diet serat yang kurang pada masyarakat modern (perkotaan) bila

dibandingkan dengan masyarakat desa yang cukup banyak mengkonsumsi serat. Apendisitis dapat terjadi pada semua tingkat usia, umumnya menyerang orang dengan usia dibawah 40 tahun.

Perbandingan antara pria dan wanita mempunyai kemungkinan yang sama untuk menderita penyakit ini. Namun penyakit ini paling sering di jumpai pada dewasa muda antara umur 13-30 tahun. (Smeltzer, 2002)

Penelitian Omran *et al* (2003) di Kanada pada 65.675 penderita *appendicitis* didapat 38.143 orang (58%) laki-laki dan 27.532 orang (42%) perempuan. Penelitian Khanal (2004) di Rumah Sakit Tribhuvan Nepal pada 99 penderita *appendicitis* didapat 76 orang (76,8%) laki-laki dan 23 orang (23,2%) perempuan, serta kelompok umur 15-24 tahun 41 orang (41,4%), 25-34 tahun 38 orang (38,4%), 35-44 tahun 15 orang (15,2%), 45-54 tahun 3 orang (3,0%), 55-64 tahun 1 orang (1,0%), dan 65-74 tahun 1 orang (1,0%).

Penelitian Nwomeh (2006) di Amerika Serikat pada 788 penderita *appendicitis* didapat proporsi kulit putih 81%, kulit hitam 12%, dan lainnya 7%.30 Penelitian Salari (2007) di Iran pada 400 penderita *appendicitis* didapat 287 orang (71,7%) laki-laki dan 113 orang (28,3%) perempuan, serta kelompok umur 5-14 tahun 58 orang (14,5%), 15-19 tahun 114 orang (28,5%), 20-24 tahun 99 orang (24,8%), 25-34 tahun 102 orang (25,5%), dan 35 tahun 27 orang (6,8%).

Penelitian Richardson *et al* (2004) di Afrika Selatan, IR *appendicitis* 5 per 1.000 penduduk di pedesaan, 9 per 1.000 penduduk di periurban, dan 18 per 1.000 penduduk di perkotaan. Penelitian Penfold *et al* (2008) di Amerika

Serikat pada anak umur 2-20 tahun didapat bahwa perforasi *appendicitis* lebih cenderung di pedesaan (69,6%) daripada perkotaan (30,4%) ($p=0,042$).

Penelitian Dombal (1994) di Amerika Serikat terjadi penurunan kasus *appendicitis* dari 100 menjadi 52 per 100.000 penduduk periode tahun 1975-1991. Penelitian Walker (1995) di Afrika Selatan terjadi peningkatan kasus *appendicitis* dari 8,2 menjadi 9,5 per 100.000 penduduk periode tahun 1987-1994. Penelitian Bisset (1997) di Skotlandia terjadi penurunan kasus *appendicitis* dari 19,7 menjadi 9,6 per 10.000 penduduk periode tahun 1973-1993. Penelitian Ballester *et al* (2003) di Spanyol terjadi peningkatan kasus *appendicitis* dari 11,7 menjadi 13,2 per 10.000 penduduk periode tahun 1998-2003.

Sementara itu, *Appendicitis* dapat terjadi pada semua usia dan paling sering pada dewasa muda. Penelitian Addins (1996) di Amerika Serikat, *appendicitis* tertinggi pada usia 10-19 tahun dengan *Age Specific Morbidity Rate* (ASMR) 23,3 per 10.000 penduduk. Hal ini berhubungan dengan hiperplasi jaringan limfoid karena jaringan limfoid mencapai puncak pada usia pubertas.

Penelitian Omran *et al* (2003) di Kanada, *Sex Specific Morbidity Rate* (SSMR) pria : wanita yaitu 8,8 : 6,2 per 10.000 penduduk dengan rasio 1,4 : 1.14 Penelitian Gunerhan (2008) di Turki didapat SSMR pria : wanita yaitu 154,7 : 144,6 per 100.000 penduduk dengan rasio 1,07: 1. Kesalahan diagnosa *appendicitis* 15-20% terjadi pada perempuan karena munculnya gangguan yang sama dengan *appendicitis* seperti pecahnya folikel ovarium,

salpingitis akut, kehamilan ektopik, kista ovarium, dan penyakit ginekologi lain.

Faktor ras berhubungan dengan pola makan terutama diet rendah serat dan pencarian pengobatan. Penelitian Addins (1996) di Amerika Serikat, IR kulit putih : kulit hitam yaitu 15,4 : 10,3 per 10.000 penduduk dengan rasio 1,5 : 1. Penelitian Richardson *et al* (2004) di Afrika Selatan, IR kulit putih : kulit hitam yaitu 2,9 : 1,7 per 1.000 penduduk dengan rasio 1,7 : 1.

Komplikasi utama apendisitis adalah perforasi apendiks yang dapat berkembang menjadi abses, peritonitis bahkan shock. Insiden perforasi adalah 10% sampai 32% dan yang tertinggi adalah pada anak kecil dan lansia. Perforasi terjadi secara umum 24 pertama setelah awal nyeri. Angka kematian yang timbul akibat terjadi perforasi adalah 10-15% dari kasus yang ada. Sedangkan angka kematian pasien apendisitis akut adalah 0,2% – 0,8%. yang berhubungan dengan komplikasi penyakitnya dari pada akibat intervensi tindakan. (Sjamsuhidayat, R., & Jong, W. 2005).

Oleh karena itu, penting untuk segera memberikan pengobatan kepada pasien apendisitis. Pengobatan apendisitis dapat melalui dua cara yaitu operasi dan non operasi, pada kasus ringan apendisitis dapat sembuh hanya dengan pengobatan tetapi untuk apendisitis yang sudah luas infeksiya maka harus segera di lakukan operasi apendiktomi. Apendiktomi adalah pembedahan untuk mengangkat apendisitis yang meradang (Smeltzer, S., & Bare., B., 2002).

Pasien-pasien dengan post apendiktomi menjalani proses perawatan di ruang perawatan bedah di rumah sakit. Lama hari rawat inap pasien bervariasi tergantung jenis *appendicitis* yang dideritanya. Jika apendiks tidak ruptur, pasien dapat pulang dalam 1-2 hari, jika terdapat perforasi, ia dapat tinggal selama 4-7 hari, terutama jika terjadi peritonitis. (Sjamsuhidajat,R., & Jong, W., 2005).

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Wayang Wartawan (2011), Beberapa faktor yang berhubungan dengan keadaan klinis pasien, tindakan medis, pengelolaan pasien di ruangan maupun masalah administrasi rumah sakit bisa mempengaruhi terjadinya penundaan pulang pasien. Terutama pasien yang memerlukan tindakan medis atau pembedahan, faktor-faktor yang berpengaruh tersebut antara lain : komplikasi atau infeksi luka operasi, tenaga dokter yang menangani atau pelaksana operasi, hari pulang dari rumah sakit, umur penderita, pekerjaan, jenis penanggung biaya, alasan keluar dari rumah sakit, pemeriksaan penunjang medis, serta kelas perawatan yang dipilih.

Penelitian yang dilakukan oleh Suwardiman (2007) mengenai Faktor risiko kejadian infeksi luka operasi apendiktomi juga ikut mempengaruhi lama hari rawat, dimana infeksi luka operasi post apendiktomi meningkatkan lama hari rawat rata-rata 2 - 7 hari.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa infeksi luka operasi apendiktomi meningkatkan lama hari

rawat, menambah beban biaya langsung perawatan, menaikkan jumlah kunjungan rawat jalan dan menambah beban biaya langsung rawat jalan.

Berdasarkan survei yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah HA sulthan Dg. Radja Bulukumba jumlah pasien yang menjalani operasi *appendectomy* sebanyak 51 orang periode Januari – Mei 2013.

Oleh karena itu, Berdasarkan gambaran tersebut, maka terdapat perbedaan lama hari rawat pasien post apendiktomi berkisar dari 2 hari sampai 8 hari perawatan, adanya perbedaan tersebut peneliti tertarik untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan lama rawat pasien post apendiktomi, seperti faktor usia, klasifikasi penyakit *appendicitis*, penyakit penyerta, komplikasi dan Infeksi Luka Operasi (ILO).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah usia berhubungan dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi?
2. Apakah klasifikasi penyakit apendisitis berhubungan dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi?
3. Apakah penyakit penyerta berhubungan dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi?
4. Apakah komplikasi berhubungan dengan lama rawat pasien post apendiktomi?
5. Apakah infeksi luka operasi berhubungan dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Diketuainya faktor-faktor yang berhubungan dengan lama hari rawat pasien Post apendiktomi di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Dg. Radja Bulukumba

2. Tujuan khusus

- a. Diketuainya hubungan usia dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah HA sulthan Dg. Radja Bulukumba
- b. Diketuainya hubungan klasifikasi penyakit appendicitis dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah HA sulthan Dg. Radja Bulukumba.
- c. Diketuainya hubungan penyakit penyerta dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah HA sulthan Dg. Radja Bulukumba.
- d. Diketuainya hubungan komplikasi dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah HA sulthan Dg. Radja Bulukumba.
- e. Diketuainya hubungan infeksi luka operasi dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah HA sulthan Dg. Radja Bulukumba.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan :

1. Bagi institusi pendidikan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan untuk pengetahuan maupun pengembangan penelitian yang lain yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang dimaksudkan khususnya di keperawatan UIN Makassar.

2. Bagi instansi tempat penelitian

Diharapkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai penyakit terkait sehingga memungkinkan sebagai penentu kebijakan pada instansi tempat penelitian sehingga dapat menyusun perencanaan evaluasi guna upaya pencegahan apendisitis.

3. Bagi penulis

Merupakan pengalaman yang berharga sehingga dapat meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai studi keilmuan yang menjadi topik pada skripsi ini. Selain itu, menambah wawasan tentang pembuatan skripsi yang menjadi salah satu prasyarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan keperawatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Tentang Penyakit Apendisitis

A. Definisi

Appendicitis adalah peradangan/inflamasi pada apendiks. *Appendicitis* adalah penyebab paling umum inflamasi akut pada kuadran bawah kanan dari rongga abdomen, untuk bedah abdomen darurat. (Mubarak, 2009)

B. Etiologi

Begitu banyak hasil penelitian para ahli yang menyatakan kesalahan dalam makanan dapat mengganggu beberapa kerja tubuh, hingga akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti : penyakit kronis pada jantung, paru-paru, darah tinggi (hypertension), diabetes, penyakit lambung dan usus (peptic ulcer disease), kegemukan (obesity), depresi, tumor, kanker dsb. Itu bias jadi disebabkan karena manusia terlalu banyak makan, terlalu banyak garam, terlalu banyak gula, terlalu banyak lemak dan kholesterol, terlalu banyak bahan makanan tambahan (food additive), alkohol, merokok dsb.

Padahal semua yang berlebihan itu tidak disukai Allah SWT, seperti dalam firman-Nya Q.S Al A'raaf/7: 31 :

﴿ يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۗ ﴾

Terjemahannya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid. makan minumlah dan jangan berlebihan (melampaui batas yang dibutuhkan tubuh dan batas-batas yang dihalalkan)". Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan"

Ibn Abbas ra. Berkata : “makanlah sesukamu, dan pakailah sesukamu asalkan anda terhindar dari dua macam : boros dan sombong”.

Ikram menjelaskan lagi: “jangan berlebih-lebihan ialah pada memakai pakaian da makanan dan minuman.”

Ibnu munabbah berkata : “boros ialah jika orng berpakaian atau makan atau minum barang-barang yang diluar dari kesanggupannya.”

Berlebih-lebihan atau boros ialah melampaui batas yang patut. makanlah sampai kenyang; kalau sudah mulai kenyang berhentilah, jang diteruskan juga karena selera masih terbuka. Minumlah sampai lepas haus; kalau haus sudah lepas jangan diteruskan junga minum nanti badan menjadi lelah, sebagai tentara thalud yang dilarang minum sebelum menyebrang palestina kecuali seteguk air. Yang meminum lebih dari seteguk air maka lemahlah badannya, hingga tidak kuat berjuang lagi. (Prof. Dr. HAMKA)

Hal tersebut berkaitan dengan penyebab terjadinya Appendisitis yakni obstruksi , yakni penimbunan makanan yang sulit dicerna oleh tubuh. seperti yang telah dijelaskan dalam uraian diatas sebenarnya islam telah menganjurkan kita untuk makan dan minum yang seperlunya (jangan berlebihan) sebab makan dan minum yang berlebihan inilah yang akan memicu terjadinya *appendicitis*.

Appendicitis adalah infeksi pada appendix karena tersumbatnya lumen oleh fekalith (batu feces), hiperplasi jaringan limfoid, dan cacing usus. Obstruksi lumen merupakan penyebab utama *appendicitis*. Erosi membran mukosa appendix dapat terjadi karena parasit seperti *Entamoeba histolytica*, *Trichuris trichiura*, dan *Enterobius vermicularis*. (Sjamsuhidajat, R., dan Jong, W., 2005).

Selain itu, Menurut penelitian epidemiologis menunjukkan kebiasaan makan makanan rendah serat akan mengakibatkan konstipasi yang dapat menimbulkan *appendicitis*. Hal tersebut akan meningkatkan tekanan intra sekal, sehingga timbul sumbatan fungsional appendix dan meningkatkan pertumbuhan kuman flora pada kolon (Sjamsuhidajat De Jong, 2005).

C. Patofisiologi Apendisitis

Tubuh manusia memiliki mekanisme yang sangat rumit oleh karena itu tubuh harus dipelihara dengan baik. Salah satu segi pemeliharaan tubuh itu dengan makanan. Dan tentu saja jika fungsi tersebut ada yang salah, misalnya tubuh terserang penyakit maka manusia harus mengoreksi dirinya, tentu ada sesuatu yang salah dalam

segi perawatan dan pemeliharaannya. Karena Allah tak akan menghadirkan bencana disebabkan ulah manusia itu sendiri, seperti dalam firmanNya Q.S An Nisaa /4 : 79 :

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

Terjemahannya :

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Disini Tuhan menyebutkan engkau yakni tertuju kepada Rasul. Tetapi perkataan engkau disini bukan hanya ditujukan kepada Rasul melainkan kepada tiap diri-diri orang mukallaf. Rasul hanya jadia perantara untuk menyampaikan. Yakni bahwasanya nikmat dan Rahmat Allah cukuplah diberikan kepada manusia dialam ini. tidak ada yang kurang. Sehingga pada asalnya semuanya adalah baik. Tidak ada Tuhan Allah memberikan yang buruk. Manusia diberikan akan dan disuruhuntuk berusaha. Maka jika manusia gagal atau didalam menuju yang baik tiba-tiba buruk yang menimpa maka itu adalah dari diri manusia sendiri. Baik karena kesia-siaan atau karena manusia belum tahu dan belum berpengalaman yang terlebih wajib harus dijaga oleh manusia supaya dia mensyukuri nikmat Tuhan. (Prof. Dr. HAMKA)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah membuat manhaj ‘aturan’ , membuat jalan, menunjukkan kepada

kebaikan dan melarang kepada keburukan. Maka apabila manusia mengikuti manhaj, menempuh jalan ini, berusaha melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, niscaya Allah akan menolongnya. Oleh karena itu, setiap penyakit dapat menyerang manusia akibat ulah manusia itu sendiri, seperti halnya dengan apendisitis yang merupakan peradangan appendiks yang mengenai semua lapisan dinding organ tersebut. Tanda patogenetik primer diduga karena obstruksi lumen dan ulserasi mukosa menjadi langkah awal terjadinya apendisitis. Obstruksi intraluminal appendiks menghambat keluarnya sekresi mukosa dan menimbulkan distensi dinding appendiks. Sirkulasi darah pada dinding appendiks akan terganggu. Adanya kongesti vena dan iskemia arteri menimbulkan luka pada dinding appendiks. Kondisi ini mengundang invasi mikroorganisme yang ada di usus besar memasuki luka dan menyebabkan proses radang akut, kemudian terjadi proses irreversibel meskipun faktor obstruksi telah dihilangkan. Apendisitis dimulai dengan proses eksudasi pada mukosa, sub mukosa, dan muskularis propria. Pembuluh darah pada serosa kongesti disertai dengan infiltrasi sel radang neutrofil dan edema, warnanya menjadi kemerah-merahan dan ditutupi granular membran. Pada perkembangan selanjutnya, lapisan serosa ditutupi oleh fibrinoid supuratif disertai nekrosis lokal disebut apendisitis akut supuratif. Edema dinding appendiks menimbulkan gangguan sirkulasi darah sehingga terjadi ganggren, warnanya menjadi hitam kehijauan yang sangat potensial ruptur. Pada semua dinding appendiks tampak infiltrasi radang

neutrofil, dinding menebal karena edema dan pembuluh darah kongesti. (Sjamsuhidajat, R., dan Jong, W., 2005).

Appendiks yang pernah meradang tidak akan sembuh dengan sempurna, tetapi akan membentuk jaringan parut. Jaringan ini menyebabkan terjadinya perlengketan dengan jaringan sekitarnya. Perlengketan tersebut dapat kembali menimbulkan keluhan pada perut kanan bawah. Pada suatu saat organ ini dapat mengalami peradangan kembali dan dinyatakan mengalami eksaserbasi (Sjamsuhidajat, R., dan Jong, W., 2005)

D. Klasifikasi Apendisitis

Adapun klasifikasi apendisitis berdasarkan klinik patologis adalah sebagai berikut:

1. Apendisitis Akut

a) Apendisitis Akut Sederhana (*Cataral Appendicitis*)

Proses peradangan baru terjadi di mukosa dan sub mukosa disebabkan obstruksi. Sekresi mukosa menumpuk dalam lumen appendiks dan terjadi peningkatan tekanan dalam lumen yang mengganggu aliran limfe, mukosa appendiks jadi menebal, edema, dan kemerahan. Gejala diawali dengan rasa nyeri di daerah umbilikus, mual, muntah, anoreksia, malaise, dan demam ringan. Pada apendisitis kataral terjadi leukositosis dan appendiks terlihat normal, hiperemia, edema, dan tidak ada eksudat serosa.

b) Apendisitis Akut Purulenta (*Supurative Appendicitis*)

Tekanan dalam lumen yang terus bertambah disertai edema menyebabkan terbenyungnya aliran vena pada dinding appendiks dan menimbulkan trombosis. Keadaan ini memperberat iskemia dan edema pada appendiks. Mikroorganisme yang ada di usus besar berinvansi ke dalam dinding appendiks menimbulkan infeksi serosa sehingga serosa menjadi suram karena dilapisi eksudat dan fibrin. Pada appendiks dan mesoappendiks terjadi edema, hiperemia, dan di dalam lumen terdapat eksudat fibrinopurulen. Ditandai dengan rangsangan peritoneum lokal seperti nyeri tekan, nyeri lepas di titik Mc Burney, defans muskuler, dan nyeri pada gerak aktif dan pasif. Nyeri dan defans muskuler dapat terjadi pada seluruh perut disertai dengan tanda-tanda peritonitis umum.

c) Apendisitis Akut Gangrenosa

Bila tekanan dalam lumen terus bertambah, aliran darah arteri mulai terganggu sehingga terjadi infark dan gangren. Selain didapatkan tanda-tanda supuratif, appendiks mengalami gangren pada bagian tertentu. Dinding appendiks berwarna ungu, hijau keabuan atau merah kehitaman. Pada apendisitis akut gangrenosa terdapat mikroperforasi dan kenaikan cairan peritoneal yang purulen.

2. Apendisitis Infiltrat

Apendisitis infiltrat adalah proses radang appendiks yang penyebarannya dapat dibatasi oleh omentum, usus halus, sekum, kolon

dan peritoneum sehingga membentuk gumpalan massa flegmon yang melekat erat satu dengan yang lainnya.

3. Apendisitis Abses

Apendisitis abses terjadi bila massa lokal yang terbentuk berisi nanah (pus), biasanya di fossa iliaka kanan, lateral dari sekum, *retrocaecal*, *subcaecal*, dan *pelvic*

4. Apendisitis Perforasi

Apendisitis perforasi adalah pecahnya appendiks yang sudah ganggren yang menyebabkan pus masuk ke dalam rongga perut sehingga terjadi peritonitis umum. Pada dinding appendiks tampak daerah perforasi dikelilingi oleh jaringan nekrotik.

5. Apendisitis Kronis

Apendisitis kronik adalah nyeri perut kanan bawah lebih dari 2 minggu atau terjadi secara menahun . Apendisitis kronik sangat jarang terjadi. Prevalensi hanya 1-5 %. Diagnosis apendisitis kronik sulit ditegakkan. Terdapat riwayat nyeri perut kanan bawah yang biasa terjadi secara berulang (Pieter, 2005).

Apendisitis kronis merupakan lanjutan apendisitis akut supuratif sebagai proses radang yang persisten akibat infeksi mikroorganisme dengan virulensi rendah, khususnya obstruksi parsial terhadap lumen. Diagnosa apendisitis kronis baru dapat ditegakkan jika ada riwayat serangan nyeri berulang di perut kanan bawah lebih dari dua minggu, radang kronik appendiks secara makroskopik dan mikroskopik. Secara histologis, dinding appendiks menebal, sub

mukosa dan muskularis propria mengalami fibrosis. Terdapat infiltrasi sel radang limfosit dan eosinofil pada sub mukosa, muskularis propria, dan serosa. Pembuluh darah serosa tampak dilatasi. (Masjoer, arif, dkk. 2000)

E. Manifestasi Klinis

Keluhan *appendicitis* biasanya bermula dari nyeri didaerah umbilicus atau periumbilikus yang berhubungan dengan muntah. Dalam 2-12 jam nyeri akan beralih ke kuadran kanan bawah, yang akan menetap dan diperberat bila berjalan atau batuk. Terdapat juga keluhan anoreksia, malaise, dan demam yang tidak terlalu tinggi. Biasanya juga terdapat konstipasi, tapi kadang-kadang terdapat diare, mual, dan muntah.

Pada permulaan timbulnya penyakit belum ada keluhan abdomen yang menetap. Namun, dalam beberapa jam nyeri abdomen kanan bawah akan semakin progresif, dan dengan pemeriksaan saksama akan ditunjukkan satu titik dengan nyeri maksimal. Perkusi ringan pada kuadran kanan bawah dapat membantu menentukan lokasi nyeri. Nyeri lepas dan spasme biasanya juga muncul. Bila tanda rovsing, psoas, dan obturator positif akan semakin meyakinkan diagnosis klinis apendisitis. (Masjoer, arif, dkk. 2000)

Selain tanda dan gejala di atas, gejala *appendicitis* juga bervariasi tergantung dari stadiumnya, yaitu : Penyakit *appendicitis* akut (mendadak). Pada kondisi ini gejala yang ditimbulkan tubuh akan panas tinggi, mual-muntah, nyeri perut kanan bawah, nyeri saat berjalan

sehingga agak terbongkok, namun tidak semua orang akan menunjukkan gejala seperti ini, bisa juga hanya bersifat meriang, atau mual-muntah saja. (Sjamsuhidajat, R., dan Jong, W., 2005)

F. Penatalaksanaan

Menurut Mansjoer, Arif., dkk. (2000), penatalaksanaan apendisitis terdiri dari:

1. Sebelum operasi
 - a. Pemasangan sonde lambung untuk dekompresi
 - b. Pemasangan kateter untuk kontrol produksi urin
 - c. Rehidrasi
 - d. Antibiotik dengan spektrum luas, dosis tinggi dan diberikan secaraintravena
 - e. Obat – obatan penurun panas, phenergan sebagai anti mengigil, largaktil untuk membuka pembuluh – pembuluh darah perifer diberikan setelah rehidrasi tercapai
 - f. Bila demam, harus diturunkan sebelum diberi anestesi
2. Operasi Apendiktomi

Apendiks dibuang, jika apendiks mengalami perforata bebas, maka abdomen dicuci dengan garam fisiologis dan antibiotika. Abses apendiks diobati dengan antibiotika IV, massa mungkin mengecil, atau abses mungkin memerlukan drainase dalam jangka waktu beberapa hari. Apendiktomi dilakukan bila abses dilakukan operasi elektif sesudah 6 minggu sampai 3 bulan

3. Pasca Operasi

- a. Observasi Tanda-tanda vital untuk mengetahui terjadinya perdarahan di dalam, syok, hipertermia atau gangguan pernafasan.
- b. Angkat sonde lambung bila pasien telah sadar sehingga aspirasi cairan lambung dapat dicegah
- c. Baringkan pasien dalam posisi semi fowler
- d. Pasien dikatakan baik bila dalam 12 jam tidak terjadi gangguan, selam pasien dipuaskan
- e. Bila tindakan operasi lebih besar, misalnya pada perforata, puasa dilanjutkan sampai fungsi usus kembali normal.
- f. Berikan minum mulai 15 ml/jam selama 4 – 5 jam lalu naikkan menjadi 30 ml/jam. Keesokan harinya berikan makanan saring dan hari berikutnya diberikan makanan lunak
- g. Satu hari pascar operasi pasien dianjurkan untuk duduk tegak di tempat tidur selama 2x30 menit
- h. Pada hari kedua pasien dapat berdiri dan duduk di luar kamar
- i. Hari ke-7 jahitan dapat diangkat dan pasien diperbolehkan pulang

Apendiktomi harus dilakukan dalam beberapa jam setelah diagnosis ditegakkan. Jika apendiks telah perforata, terutama dengan peritonitis menyeluruh, resusitasi cairan yang cukup dan antibiotik spektrum luas mungkin diperlukan beberapa jam sebelum apendiktomi.

Pengisapan nasogastrik harus digunakan jika ada muntah yang berat atau perut kembung. Antibiotik harus mencakup organisme yang sering ditemukan (*Bacteroides*, *Escherichia coli*, *Klebsiella*, dan *pseudomonas spesies*). Regimen yang sering digunakan secara intravena adalah ampicilin (100 mg/kg/24 jam), gentamisin (5 mg/kg/24 jam), dan klindamisin (40 mg/kg/24 jam), atau metronidazole (Flagyl) (30 mg/kg/24 jam). Apendektomi dilakukan dengan atau tanpa drainase cairan peritoneum, dan antibiotik diteruskan sampai 7-10 hari. (Pieter, 2005).

II. TINJAUAN TENTANG POST APENDIKTOMI

A. Pengertian Operasi/Pembedahan

Operasi merupakan tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh Operasi (elektif atau kedaruratan) pada umumnya merupakan peristiwa kompleks yang menegangkan (Smeltzer, S & Bare., B. 2002). Perioperatif adalah suatu istilah gabungan yang mencakup tiga fase pengalaman pembedahan praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif. Operasi (perioperatif) merupakan tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh yang mencakup fase praoperatif, intraoperatif dan pascaoperatif (postoperatif) yang pada umumnya merupakan suatu peristiwa kompleks yang menegangkan bagi individu yang bersangkutan.

B. Fase Operasi/Pembedahan

Seperti yang telah disebutkan di atas, menurut Long (1989) terdapat tiga fase pembedahan yaitu :

a. Fase Praoperatif

Fase praoperatif dimulai saat keputusan untuk tindakan pembedahan dibuat dan berakhir dengan mengirim pasien ke kamar operasi. Lingkup kegiatan keperawatan dari pengkajian dasar pasien melalui wawancara praoperatif di klinik, ruang dokter, atau melalui telepon, dan dilanjutkan dengan pengkajian di tempat atau ruang operasi. Memberikan pendidikan kesehatan pada pasien yang akan menjalani operasi merupakan salah satu peran perawat pada fase praoperatif

b. Fase Intraoperatif

Fase intraoperatif dimulai saat pasien dikirim ke ruang operasi dan berakhir saat pasien dipindahkan ke suatu ruang untuk pemulihan dari anestesi. Pada fase ini, lingkup tindakan keperawatan dari mengkomunikasikan asuhan perencanaan pasien, mengidentifikasi kegiatan keperawatan yang dianjurkan untuk hasil yang diharapkan, dan menetapkan prioritas tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan disusun dalam pemikiran yang logis.

c. Fase Pascaoperatif

Fase pascaoperatif dimulai dengan mengirim pasien ke ruang pemulihan dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut di klinik atau di

rumah. Lingkup keperawatan pada fase ini mencakup rentang aktivitas yang luas. Pada fase pascaoperatif langsung, fokus termasuk mengkaji efek dari agens anestesia, dan memantau fungsi vital serta mencegah komplikasi. Aktivitas keperawatan kemudian berfokus pada peningkatan penyembuhan pasien dan melakukan penyuluhan.

C. Operasi Apendisitis/Apendiktomi

Pengobatan dalam setiap penyakit sangat dianjurkan dalam islam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam shahihnya, dari shahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda,

دَاءٌ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya :

“Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya”

Dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah dia berkata bahwa Nabi bersabda,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Terjemahnya :

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (HR. Muslim)

Di samping itu Ibnu Qayim memperingatkan pula, jika ditinjau dari kejiwaan "bahwa syarat sembuh dari penyakit haruslah berobat yang diterima akal dan yakin akan manfaat obat itu serta adanya berkah kesembuhan yang dibuat Allah".

Berdasarkan beberapa tinjauan hadits diatas, maka sebenarnya telah jelas dikatakan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Berhubungan dengan hal tersebut, maka salah satu pengobatan yang dilakukan untuk penderita apendisitis adalah dengan melakukan apendektomi. Dimana *Appendectomy* merupakan pengobatan yang paling baik bagi penderita *appendicitis*. Teknik tindakan *appendectomy* ada 2 macam, yaitu *open appendectomy* dan *laparoscopy appendectomy*. *Open appendectomy* yaitu dengan cara mengiris kulit daerah McBurney sampai menembus peritoneum, sedangkan *laparoscopy appendectomy* adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan alat *laparoscop* yang dimasukkan lewat lobang kecil di dinding perut. Keuntungan *laparoscopy appendectomy* adalah luka dinding perut lebih kecil, lama hari rawat lebih cepat, proses pemulihan lebih cepat, dan dampak infeksi luka operasi lebih kecil.

Apabila apendektomi tidak mengalami komplikasi, pasien dapat dipulangkan hari itu juga bila suhu dalam batas normal dan area operasi terasa nyaman. namun apabila terdapat komplikasi yang memperberat kondisi pasien maka klien harus dipertahankan dirumah sakit dan dipantau dengan ketat.

Adapun beberapa kemungkinan komplikasi yang memperberat keadaan post operasi *appendicitis* adalah adanya peritonitis, abses pelvis dan lumbal, abses subfrenik (abses dibawah diafragma), *ilileus* (paralitik dan mekanis). (Smalzer, S, & Bare., B. 2002)

III. TINJAUAN LAMA HARI RAWAT

Lama rawat inap menunjukkan beberapa hari lamanya seseorang pasien dirawat inap pada satu episode perawatan. Cara menghitung Lama dirawat adalah dengan menghitung selisih antara tanggal pulang (keluar dari RS, hidup maupun mati) dengan tanggal masuk RS. Dalam hal ini, untuk pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama lama dirawatnya dihitung sebagai satu hari (Nurlina 2010).

Pelayanan rawat inap adalah suatu kelompok pelayanan kesehatan yang terdapat di rumah sakit yang merupakan gabungan dari beberapa fungsi pelayanan. Kategori pasien yang masuk rawat inap adalah pasien yang perlu perawatan intensif atau observasi ketat karena penyakitnya. Menurut Revans (2004) bahwa pasien yang masuk pada pelayanan rawat inap mengalami tingkat proses transformasi, yaitu :

1. Tahap *Admission*, yaitu pasien dengan penuh kesabaran dan keyakinan dirawat tinggal dirumah sakit.
2. Tahap *Diagnosis*, yaitu pasien diperiksa dan ditegakkan diagnosis nya.
3. Tahap *treatment*, yaitu berdasarkan diagnosis pasien dimasukkan dalam program perawatan dan terapi
4. Tahap *Inspection*, yaitu secara terus menerus diobservasi dan dibandingkan pengaruh serta respon pasien atas pengobatan.
5. Tahap *Control*, yaitu setelah dianalisa kondisinya, pasien dipulangkan.
6. Pengobatan diubah atau diteruskan, namun dapat juga kembali ke proses untuk didiagnosa ulang.

Tidak ada teori pasti yang menyatakan tentang lama rawat inap pasien Appendicitis dirawat. Rata-rata lama rawat inap pasien appendicitis akut tanpa perforasi adalah 2 hari, sedangkan pasien appendicitis akut dengan perforasi adalah 4-5 hari. Kebanyakan pasien setelah operasi apendektomi sembuh spontan tanpa penyulit, namun komplikasi dapat terjadi apabila pengobatan tertunda atau telah terjadi peritonitis/peradangan di dalam rongga perut. Cepat dan lambatnya penyembuhan setelah operasi usus buntu tergantung dari usia pasien, kondisi, keadaan umum pasien, penyakit penyerta misalnya diabetes mellitus, komplikasi dan keadaan lainnya yang biasanya sembuh antara 10 sampai 28 hari.

IV. TINJAUAN FAKTOR YANG BERHUBUNGAN LAMA HARI RAWAT PASIEN POST APENDIKTOMI.

Rata-rata lama rawat inap pasien appendicitis akut tanpa perforasi adalah 2 hari, sedangkan pasien appendicitis akut dengan perforasi adalah 4-5 hari. Variasi lama rawat inap pasien ini dipengaruhi oleh beberapa factor yakni :

1. Usia.

Usia dalam kamus bahasa Indonesia adalah waktu hidup atau sejak dilahirkan. Sedangkan Usia biologis adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh seseorang.

Kategori Umur Menurut Depkes RI (2009):

- a) Masa balita = 0 - 5 tahun,
- b) Masa kanak-kanak = 5 - 11 tahun.

- c) Masa remaja Awal = 12 - 16 tahun.
- d) Masa remaja Akhir = 17 - 25 tahun.
- e) Masa dewasa Awal = 26 - 35 tahun.
- f) Masa dewasa Akhir = 36 - 45 tahun.
- g) Masa Lansia Awal = 46 - 55 tahun.
- h) Masa Lansia Akhir = 56 - 65 tahun.
- i) Masa Manula = 65 - sampai atas

Usia mempunyai hubungan dengan tingkat keterpaparan, besarnya resiko, serta sifat resistensi tertentu. Di samping itu, usia juga mempunyai hubungan yang erat dengan beragam sifat yang dimiliki oleh seseorang. Perbedaan penyakit menurut umur mempunyai pengaruh yang akan berhubungan dengan:

- 1) Perbedaan tingkat keterpaparan dan kerentanan menurut umur.
- 2) Perbedaan dalam proses pathogenesis.
- 3) Perbedaan dalam hal pengalaman terhadap penyakit tertentu

Makin besar umur penderita maka akan memerlukan lama hari rawat lebih lama. Pada beberapa penelitian, faktor umur mempengaruhi panjang lama hari rawat pasien bedah. Pasien yang sudah lanjut usia (diatas 45 tahun) cenderung lebih panjang lama hari rawatnya dibandingkan dengan pasien usia muda. Afif dan Ahmad (2008) menemukan bahwa pasien usia 65 tahun keatas berpotensi memiliki lama hari rawat yang lebih panjang.

2. Penyakit penyerta

Kebanyakan pasien setelah operasi appendektomi sembuh spontan tanpa penyulit, namun komplikasi dapat terjadi apabila pengobatan tertunda atau telah terjadi peritonitis/peradangan di dalam rongga perut. Cepat dan lambatnya penyembuhan setelah operasi usus buntu tergantung dari usia pasien, kondisi, keadaan umum pasien, penyakit penyerta misalnya diabetes mellitus, komplikasi dan keadaan lainnya yang biasanya sembuh antara 10 sampai 28 hari.

3. Jenis penyakit

Kasus yang akut dan kronis akan memerlukan lama hari rawat yang berbeda, dimana kasus yang kronis akan memerlukan lama hari rawat lebih lama dari pada kasus-kasus yang bersifat akut. Demikian juga penyakit yang tunggal pada satu penderita akan mempunyai lama hari rawat lebih pendek dari pada penyakit ganda pada satu penderita (Barbara J., 2008 ; Krzysztof, 2011)

4. Komplikasi

Komplikasi terjadi akibat keterlambatan penanganan appendicitis. Faktor keterlambatan dapat berasal dari penderita dan tenaga medis. Faktor penderita meliputi pengetahuan dan biaya, sedangkan tenaga medis meliputi kesalahan diagnosa, menunda diagnosa, terlambat merujuk ke rumah sakit, dan terlambat melakukan penanggulangan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan angka morbiditas dan mortalitas. Proporsi komplikasi appendicitis 10-32%, paling sering pada anak kecil

dan orang tua. Komplikasi 93% terjadi pada anak-anak di bawah 2 tahun dan 40-75% pada orang tua. CFR komplikasi 2-5%, 10-15% terjadi pada anak-anak dan orang tua. Anak-anak memiliki dinding appendiks yang masih tipis, omentum lebih pendek dan belum berkembang sempurna memudahkan terjadinya perforasi, sedangkan pada orang tua terjadi gangguan pembuluh darah. (Sjamsuhidajat, R. dan Jong, W., 2005).

Adapun jenis komplikasi diantaranya:

a) Abses

Abses merupakan peradangan appendiks yang berisi pus. Teraba massa lunak di kuadran kanan bawah atau daerah pelvis. Massa ini mula-mula berupa flegmon dan berkembang menjadi rongga yang mengandung pus. Hal ini terjadi bila appendicitis gangren atau mikroperforasi ditutupi oleh omentum.

b) Perforasi

Perforasi adalah pecahnya appendiks yang berisi pus sehingga bakteri menyebar ke rongga perut. Perforasi jarang terjadi dalam 12 jam pertama sejak awal sakit, tetapi meningkat tajam sesudah 24 jam.¹⁹ Perforasi dapat diketahui praoperatif pada 70% kasus dengan gambaran klinis yang timbul lebih dari 36 jam sejak sakit, panas lebih dari 38,50C, tampak toksik, nyeri tekan seluruh perut, dan leukositosis terutama *polymorphonuclear* (PMN). Perforasi, baik berupa perforasi bebas maupun mikroperforasi dapat menyebabkan peritonitis.

c) Peritonitis

Peritonitis adalah peradangan peritoneum, merupakan komplikasi berbahaya yang dapat terjadi dalam bentuk akut maupun kronis. Bila infeksi tersebar luas pada permukaan peritoneum menyebabkan timbulnya peritonitis umum. Aktivitas peristaltik berkurang sampai timbul ileus paralitik, usus meregang, dan hilangnya cairan elektrolit mengakibatkan dehidrasi, syok, gangguan sirkulasi, dan oligouria. Peritonitis disertai rasa sakit perut yang semakin hebat, muntah, nyeri abdomen, demam, dan leukositosis.

5. Infeksi luka operasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi luka operasi dan komplikasi pada umumnya, yaitu (Razi, Fakhrol, 2011):

1. Waktu / lama operasi

Makin lama waktu yang dibutuhkan untuk operasi maka akan mempengaruhi terhadap penyembuhan luka operasi dan juga akan meningkatkan terjadinya infeksi luka operasi, sehingga lama hari rawat akan lebih panjang.

2. Teknik operasi

Operasi yang menyebabkan kerusakan jaringan lebih luas akan mempunyai resiko terjadinya infeksi luka operasi yang lebih besar. 2. Jenis Operasi Pada jenis operasi elektif pasien dipersiapkan secara optimal, sedangkan pada operasi yang berjenis cito persiapannya tidak sebaik seperti pada operasi yang bersifat elektif,

oleh karena dengan ditundanya tindakan operasi akan membahayakan jiwa pasien. Sehingga dengan persiapan yang kurang optimal terutama pada operasi yang bersifat cito, resiko untuk terjadinya infeksi luka operasi menjadi lebih besar (Erbaydar, 2004).

Semua luka kronis adalah luka yang terkontaminasi tapi tidak selalu ada infeksi. Infeksi adalah pertumbuhan organisme pada luka yang berlebihan dan ditandai dengan terjadinya reaksi jaringan lokal maupun sistemik. Sebelum terjadi infeksi ada proses perkembangbiakan kuman mulai dari kontaminasi, kolonisasi, kritikal kolonisasi lalu infeksi. Luka dikatakan infeksi jika ada tanda inflamasi/infeksi, eksudat purulen/nanah, bertambah banyak dan sangat berbau, luka meluas/breakdown serta melalui pemeriksaan penunjang diagnostik seperti : leukosit dan makrofag meningkat, kultur eksudat : bakteri $> 10^6$ /gr jaringan. (Puspita, Irma an santy. 2012)

BAB III

KERANGKA KONSEP

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibahas, pada bab ini akan diuraikan kerangka konsep penelitian, kerangka kerja, definisi operasional dari variabel-variabel yang diteliti serta hipotesis penelitian. Uraian ini sepenuhnya mengacu pada tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan lama hari rawat pasien post appendectomy. Sebagaimana yang telah diuraikan di latar belakang masalah, terdapat variasi lama hari rawat inap pasien post *appendectomy* yakni 1-3 hari hingga 4-7 hari berdasarkan faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang berhubungan dengan lama hari rawat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Faktor internal (faktor yang ada dalam rumah sakit) :
2. Faktor eksternal (faktor yang ada diluar rumah sakit/ faktor yang berhubungan dengan karakteristik pasien)


Faktor internal dan eksternal merupakan variabel independen (variabel bebas) sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah lama rawat inap. Adapun faktor internal yang dimaksudkan adalah jenis penyakit, penyakit penyerta, komplikasi dan infeksi yang ditimbulkan. Sementara untuk faktor eksternal yang berkaitan dengan lama rawat inap pasien adalah usia. Untuk lebih jelasnya faktor-faktor tersebut (internal dan eksternal) dan hubungannya dengan lama rawat inap pasien *post appendectomy* dapat digambarkan pada skema dibawah ini:

A. Kerangka Konsep Penelitian

Variabel Independen

Variabel Dependen

Faktor internal



Ket :

 : Variabel yang diteliti/ Variabel independen.

 : Variabel Dependen.

B. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas (Independen variabel)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). (Nursalam : 2003). Dalam penelitian ini, Faktor internal dan eksternal merupakan variabel independen (variabel bebas). Adapun faktor internal yang dimaksudkan adalah klasifikasi penyakit Apendisitis, penyakit penyerta, komplikasi serta infeksi luka operasi yang ditimbulkan. Sementara untuk faktor eksternal yang berkaitan dengan lama rawat pasien apendisitis adalah usia.

2. Variabel terikat (Dependen variabel)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. (Nursalam: 2003). Adapun variabel dependennya adalah lama hari rawat pasien post apendiktomi.

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1) Usia

Usia adalah waktu hidup atau sejak dilahirkan. Dalam hal ini, umur pasien saat menjalani perawatan dalam tahun. Dimana usia dapat menjadi faktor yang akan mempengaruhi lama hari rawat.

Kriteria objektif :

- a) Masa kanak-kanak = 5 - 11 tahun.
- b) Masa remaja Awal = 12 - 16 tahun.
- c) Masa remaja Akhir = 17 - 25 tahun.

- d) Masa dewasa Awal = 26 - 35 tahun.
- e) Masa dewasa Akhir = 36 - 45 tahun.
- f) Masa Lansia Awal = 46 - 55 tahun.
- g) Masa Lansia Akhir = 56 - 65 tahun.
- h) Masa Manula = 65 - sampai atas

2) Penyakit Penyerta

Penyakit penyerta adalah penyakit sekunder yang menyertai penyakit apendisitis baik yang timbul sebelum operasi maupun setelah operasi yang dapat memperpanjang lama hari rawat pasien.

Kriteria objektif :

- a. Ada penyakit penyerta, (diabetes mellitus, Hipertensi, jantung, dan penyakit pencernaan lain, dan lainnya).
- b. Tidak ada penyakit penyerta (diabetes mellitus, Hipertensi, jantung, dan penyakit pencernaan lain, dan lainnya).

3) Klasifikasi penyakit

Klasifikasi penyakit adalah jenis penyakit apendisitis yang dialami oleh pasien sebelum dilakukan operasi, berdasarkan keluhan dan lamanya dialami yang dapat mempengaruhi lama hari rawat.

Kriteria objektif :

- a. *Appendicitis* akut. : nyeri yang dirasakan < 2 minggu
- b. *Appendicitis* kronik. : nyeri yang dirasakan > 2 minggu atau nyeri menahun

4) Komplikasi

Komplikasi adalah dampak yang dapat timbul pada penyakit apendisitis sebelum dilakukan operasi atau terjadi karena keterlambatan operasi yang dapat mempengaruhi lama hari rawat.

Kriteria objektif :

- a. Terdapat komplikasi.
- b. Tidak terdapat komplikasi.

5) Infeksi Luka Operasi (ILO)

Infeksi yang terjadi pada luka operasi apendisitis, yang ditandai dengan adanya tanda-tanda infeksi baik tanda local maupun sistemik, sehingga dapat memperpanjang hari rawat pasien.

Kriteria Objektif :

- a. Terdapat infeksi luka operasi
- b. Tidak terdapat infeksi luka operasi.

6) Lama Hari Rawat

Lama hari rawat menunjukkan lamanya pasien menjalani perawatan *post appendectomy* di ruang perawatan rumah sakit.

Kriteria Objektif :

- a. Sesuai : < 4 hari
- b. Tidak sesuai : 4 hari

D. Hipotesis Penelitian

1. Usia.

H0 : terdapat hubungan faktor usia dengan lama rawat pasien post apendiktomi.

H1 : tidak terdapat hubungan faktor usia dengan lama rawat pasien post apendiktomi.

2. Penyakit Penyerta.

H0 : terdapat hubungan faktor Penyakit penyerta dengan lama rawat pasien post apendiktomi.

H1 : tidak terdapat hubungan faktor Penyakit Penyerta dengan lama rawat pasien post apendiktomi.

3. Jenis Penyakit.

H0 : terdapat hubungan faktor Jenis Penyakit dengan lama rawat pasien post apendiktomi.

H1 : tidak terdapat hubungan faktor Jenis Penyakit dengan lama rawat pasien post apendiktomi..

4. Komplikasi

H0 : terdapat hubungan faktor komplikasi dengan lama rawat pasien post apendiktomi.

H1 : tidak terdapat hubungan faktor komplikasi dengan lama rawat pasien post apendiktomi.

5. Infeksi luka operasi

H0 : terdapat hubungan faktor luka infeksi dengan lama rawat pasien post apendiktomi.

H1 : tidak terdapat hubungan faktor luka infeksi dengan lama rawat pasien post apendiktomi.



E. Kerangka Kerja



Analisa data

Analisa data dilakukan untuk mengetahui faktor independen (usia, jenis penyakit apendisitis, penyakit penyerta, komplikasi, infeksi luka operasi) yang berhubungan dengan faktor dependen (lama hari rawat) dengan menggunakan analisis *chi-square* pada spss 16,0



Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan disertai dengan penjelasan setelahnya.



BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan rancangan “*Cross Sectional Study*” untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan lama perawatan pasien post apendektomi di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja BULUKUMBA. Dimana subjek penelitian dan pengukuran status karakter atau variabel subjek di ukur menurut keadaan atau statusnya secara stimulant pada suatu saat dalam suatu sampel populasi yang representative atau memberi kesempatan pada peneliti untuk melakukan analisa deskriptif dari variabel yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian adalah di Rumah sakit umum daerah HA sulthan Dg. Radja Bulukumba.
2. Waktu pengambilan data primer adalah 26 Juni- 13 Juli 2013.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang diteliti (Nursalam, 2003).

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pasien yang menjalani operasi *appendectomy* sebanyak 51 orang periode Januari – Mei 2013. semua pasien post operasi apendicitis yang dirawat dibagian

perawatan bedah Rumah sakit umum daerah H.A sulthan Dg. Radja Bulukumba sebagai tempat dilakukannya penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan sampling tertentu biasanya memenuhi atau mewakili populasi. (Nursalam, 2003).

Sampel pada penelitian ini adalah pasien Post apendiktomi yang dirawat di ruang perawatan bedah Rumah Sakit umum daerah HA sulthan Dg. Radja Bulukumba (ruang VIP, perawatan II dan perawatan III)

D. Teknik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dengan menggunakan tehnik *non probability sampling*, yaitu dengan tehnik *accidental sampling* dimana kriteria sampel dipilih berdasarkan kriteria inklusi penelitian, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Klien yang menjalani perawatan post Apendiktomi .
- b. Klien yang dirawat di ruang perawatan bedah di rumah sakit.
- c. Klien yang bersedia diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau bahan yang digunakan untuk proses pengumpulan data atau pengambilan data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data di lakukan dengan metode observasi dengan menggunakan daftar observasi dalam bentuk check list berupa daftar pengamatan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Data yang digunakan adalah data

primer. Data primer dalam penelitian ini adalah langsung meneliti kepada pasien post operasi apendisitis yang ada diruang rawat inap dengan menggunakan lembar Observasi.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu pendekatan kepada subjek atau responden dan proses pengumpulan subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian (Nursalam, 2003)

Prosedur pengumpulan data :

1. Mengurus kelengkapan surat pengantar dari institusi UIN Alauddin Makassar ke bagian yang di tujukan ke Rumah Sakit umum daerah HA sulthan Dg. Radja Bulukumba untuk melaksanakan penelitian.
2. Setelah mendapat persetujuan dari Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba, peneliti mulai melakukan surney ke ruang perawatan VIP, perawatan II, dan perawatan III di Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba.
3. Menentukan pasien yang memenuhi Kriteria inklusi.
4. Memberikan Penjelasan inform consent, tentang penelitian yang sedang dilakukan yakni untuk diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan lama hari rawat pasien post *Appendectomy* di Rumah sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba dan tujuan penelitian tersebut.
5. Meminta kesiapan dan kesediaan pasein untuk menjadi responden penelitian.

6. Setelah mendapat persetujuan responden, peneliti kemudian menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan diisi sendiri oleh peneliti.
7. Data responden yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis oleh peneliti kedalam *spss 16*.

G. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data.

a. Editing

Setelah lembar observasi diisi oleh responden, kemudian di kumpulkan dalam bentuk data, data tersebut di lakukan pengecekan dan memeriksa kelengkapan data, kesinambungan dan memeriksa keseragaman data.

b. Kodings.

Untuk memudahkan data, semua data atau jawaban disederhanakan dengan memberikan simbol-simbol tertentu untuk setiap jawaban.

c. Tabulasi.

Data di kelompokkan ke dalam tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki, kemudian data dianalisis secara statistik.

d. Pembersihan data.

Data yang telah di entry, di periksa kembali untuk memastikan bahwa data telah bersih dari kesalahan baik waktu pengkodean maupun membaca kode.

2. Analisis Data.

Analisis dilakukan dalam bentuk :

- a. Analisis Univariat, dilakukan untuk menggambarkan distribusi frekuensi masing-masing variabel, baik variabel dependen (lama hari rawat pasien post *Appendectomy*) maupun variabel independen (usia, jenis penyakit apendisitis, penyakit penyerta, komplikasi, infeksi luka operasi).
- b. Analisis Bivariat, dilakukan untuk melihat hubungan variabel independen (usia, jenis penyakit apendisitis, penyakit penyerta, komplikasi, dan infeksi luka operasi) dan variabel dependen (lama hari rawat pasien post *Appendectomy*) dengan menampilkan tabel-tabel silang untuk mengetahui korelasi faktor-faktor yang berhubungan dengan lama hari rawat pasien post *appendectomy* dengan uji *chi square* dengan tingkat kemaknaan = 0.05. untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel independen (usia, jenis penyakit apendisitis, penyakit penyerta, komplikasi, infeksi luka operasi) dengan variabel dependen (lama hari rawat pasien post *Appendectomy*). Dasar pengambilan hipotesis penelitian berdasarkan pada tingkat signifikan (nilai P), yaitu :
 - a) Jika nilai $P > 0,05$ maka hipotesis penelitian ditolak.
 - b) Jika nilai $P < 0,05$ maka hipotesis penelitian diterima

H. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan rekomendasi dari Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan instansi-instansi terkait lainnya. Setelah mendapat persetujuan maka peneliti melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika menurut KNEPK (Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan) (Yurisa, 2008) :

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*).

Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari :

- a) Penjelasan manfaat penelitian
- b) Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan
- c) Penjelasan manfaat yang akan didapatkan
- d) Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian
- e) Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja
- f) Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana

kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba, di ruang VIP, Perawatan II (Melati), dan perawatan III (Seruni).

Pengambilan data primer ini dilakukan pada tanggal 26 juni – 13 juli 2013 dengan jumlah sampel sebanyak 15 orang diperoleh dengan menggunakan metode *Accidental Sampling*. Setelah dilakukan pengolahan data melalui *SPSS 16.0*, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden

a. Karakteristik jenis kelamin

Tabel 5.1

Distribusi frekuensi jenis kelamin pasien *Post Appendectomy* di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba.

No.	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki- laki	7	46,7%
2.	Perempuan.	8	53,3%
Jumlah		15	100%

Sumber : data primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden dengan jenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 7 orang (46,7%) sedangkan responden perempuan sebanyak 8 orang (53,3%).

b. Karakteristik usia

Tabel 5.2
Distribusi frekuensi usia pasien Post *Appendectomy* di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba

No.	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	5 – 11 tahun	3	20%
2.	12 – 16 tahun	2	13,33%
Jumlah		5	33,33%

Sumber : data primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden dengan usia 5 – 11 tahun sebanyak 3 orang (20%) sedangkan responden usia 12 – 16 tahun sebanyak 2 orang (13,33%).

Tabel 5.3
Distribusi frekuensi usia pasien Post *Appendectomy* di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba

No.	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	17 – 25 tahun	2	13,3%
2.	26 – 35 tahun	1	6,7%
Jumlah		3	19,3%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden dengan usia 17 – 25 tahun sebanyak 2 orang (13,3%) sedangkan responden usia 26 – 35 tahun sebanyak 1 orang (6,7%).

Tabel 5.4
Distribusi frekuensi usia pasien Post *Appendectomy* di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba

No.	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	36 – 45 tahun	2	13,3%
2.	46 – 55 tahun	3	20%
Jumlah		5	33,33%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden dengan usia 36 – 45 tahun sebanyak 2 orang (13,3%) sedangkan responden usia 46 – 55 tahun sebanyak 3 orang (20%).

Tabel 5.5
Distribusi frekuensi usia pasien Post *Appendectomy* di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba

No.	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	56 – 55 tahun	2	13,33%
2.	65 – sampai atas	0	0%
Jumlah		2	13,33%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden dengan usia 56 – 65 tahun sebanyak 2 orang (13,33%) sedangkan responden usia 65 – sampai atas tidak terdapat satupun responden.

c. Katakarakteristik lama hari rawat

Tabel 5.6
Distribusi frekuensi lama hari rawat pasien Post *Appendectomy* di
Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba.

No.	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sesuai = < 4 hari	2	13,3%
2.	Tidak sesuai = 4 hari	13	86,7%
Jumlah		15	100%

Sumber : data primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden dengan lama hari rawat sesuai = < 4 hari hari hanya sebanyak 2 orang (13,3%) sedangkan lama hari rawat tidak sesuai = 4 hari sebanyak 13 orang (86,7%).

2. Analisis Univariat

Analisis Univariat pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari variable penelitian yang meliputi : Usia, Jenis Penyakit Apendisitis, Penyakit Penyerta, Komplikasi dan Infeksi Luka Operasi (ILO). Distribusi pada variable penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Berdasarkan faktor usia

Tabel 5.7
Distribusi frekuensi usia pasien Post *Appendectomy* di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba.

No.	Usia	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	5 – 11 tahun	3	20%
2.	12 – 16 tahun	2	13,33%
Jumlah		5	33,33%

Sumber : data primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden dengan usia 5 – 11 tahun sebanyak 3 orang (20%) sedangkan responden usia 12 – 16 tahun sebanyak 2 orang (13,33%).

Tabel 5.8
Distribusi frekuensi usia pasien Post *Appendectomy* di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba

No.	Usia	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	17 – 25 tahun	2	13,3%
2.	26 – 35 tahun	1	6,7%
Jumlah		3	19,3%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden dengan usia 17 – 25 tahun sebanyak 2 orang (13,3%) sedangkan responden usia 26 – 35 tahun sebanyak 1 orang (6,7%).

Tabel 5.9
Distribusi frekuensi usia pasien Post *Appendectomy* di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba

No.	Usia	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	36 – 45 tahun	2	13,3%
2.	46 – 55 tahun	3	20%
Jumlah		5	33,33%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden dengan usia 36 – 45 tahun sebanyak 2 orang (13,3%) sedangkan responden usia 46 – 55 tahun sebanyak 3 orang (20%).

Tabel 5.10
Distribusi frekuensi usia pasien Post *Appendectomy* di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba

No.	Usia	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	56 – 65 tahun	2	13,33%
2.	65 – sampai atas	0	0%
Jumlah		2	13,33%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden dengan usia 56 – 65 tahun sebanyak 2 orang (13,33%) sedangkan responden usia 65 – sampai atas tidak terdapat satupun responden.

b. Berdasarkan faktor jenis penyakit apendisitis

Tabel 5.11
Distribusi responden berdasarkan faktor jenis penyakit apendisitis di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba.

No.	Jenis penyakit Apendisitis	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Apendisitis akut	12	80%
2.	Apendisitis kronik	3	20%
Jumlah		15	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden dengan apendisitis akut sebanyak 12 orang (80%) sedangkan responden apendisitis kronik sebanyak 3 orang (20%).

c. Berdasarkan faktor penyakit penyerta

Tabel 5.12
Distribusi responden berdasarkan faktor penyakit penyerta di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba.

No.	Penyakit Penyerta	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Terdapat penyakit penyerta	7	46,3%
2.	Tidak terdapat penyakit penyerta	8	53,7%
Jumlah		15	100%

Sumber : data primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden yang terdapat penyakit penyerta sebanyak 7 orang (46,3%) sedangkan responden yang tidak terdapat sebanyak 8 orang (53,7%).

d. Berdasarkan faktor komplikasi

Tabel 5.13
Distribusi Responden berdasarkan Faktor komplikasi di Rumah Sakit
Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba.

No.	Komplikasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Terdapat Komplikasi	4	26,7%
2.	Tidisk terdapat komplikasi	11	73,3%
Jumlah		15	100%

Sumber : data primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden terdapat responden yang mengalami komplikasi sebanyak 4 orang (26,7%) sedangkan responden yang tidak mengalami komplikasi sebanyak 11 orang (73,3%).

e. Berdasarkan faktor Infeksi Luka Operasi (ILO)

Tabel 5.14
Distribusi responden berdasarkan faktor Infeksi Luka Operasi (ILO)
di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja
Bulukumba

No.	Infeksi Luka Operasi (ILO)	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Terdapat infeksi	0	0%
2.	Tidak terdapat infeksi	15	100%
Jumlah		15	100%

Sumber : data primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden tidak seorang pun yang mengalami Infeksi Luka Operasi/ILO (100%).

1. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen secara sendiri-sendiri (yakni usia, jenis penyakit apendisitis, penyakit penyerta, komplikasi dan infeksi luka operasi) dengan variable dependen (yakni lama hari rawat) dengan menggunakan uji statistik *chi-square* jenis table 2x2 dengan batas kemaknaan $\alpha = 0,05$.

- a. Hubungan faktor usia dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

Tabel 5.15
Hubungan faktor usia dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba.

Usia	Lama Hari Rawat			
	Sesuai = < 4 Hari		Tidak Sesuai = 4 Hari	
	n	%	n	(%)
5 – 11 tahun	0	0%	3	20%
12 – 16 tahun	0	0%	2	13,33%
Jumlah	0	0%	5	33,33%

Berdasarkan tabel 5.15 diperoleh data bahwa terdapat 3 responden dengan usia 5 – 11 tahun, dimana tidak terdapat satupun responden yang menjalani hari rawat sesuai = < 4 hari dan kategori tidak sesuai = 4 hari sebanyak 3 responden (20%) sedangkan usia 12 – 16 tahun terdapat 2 responden (13,33) dimana tidak terdapat responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai = < 4 hari dan 2 responden memiliki lama hari rawat kategori tidak sesuai = 4 hari (13,33%).

Tabel 5.16
 Hubungan faktor usia dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi
 di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja
 Bulukumba.

Usia	Lama Hari Rawat			
	Sesuai = < 4 Hari		Tidak Sesuai = 4 Hari	
	n	(%)	n	(%)
17 – 25 tahun	1	6,7%	1	6,7%
26 – 35 tahun	0	0%	1	6,7%
Jumlah	1	6,7%	2	13,4%

Berdasarkan tabel 5.16 diperoleh data bahwa terdapat 1 responden dengan usia 17 – 25 tahun, dimana terdapat 1 responden memiliki lama hari rawat sesuai < 4 hari (6,7%) dan tidak terdapat satupun responden yang menjalani hari rawat tidak sesuai 4 hari sedangkan usia 26 – 35 tahun terdapat 2 responden (13,4%) dimana tidak terdapat responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai = < 4 hari dan 1 responden memiliki lama hari rawat kategori tidak sesuai = 4 hari (6,7%)

Tabel 5.17
 Hubungan faktor usia dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi
 di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja
 Bulukumba.

Usia	Lama Hari Rawat			
	Sesuai = < 4 Hari		Tidak Sesuai = 4 Hari	
	n	(%)	n	(%)
36 – 45 tahun	1	6,7%	1	6,7%
46 – 55 tahun	0	0%	3	20%
Jumlah	1	6,7%	4	26,7%

Berdasarkan tabel 5.17 diperoleh data bahwa terdapat 1 responden dengan usia 36 – 45 tahun, dimana terdapat 1 responden memiliki lama hari rawat sesuai < 4 hari (6,7%) dan tidak terdapat satupun responden yang menjalani hari rawat tidak sesuai < 4 hari sedangkan usia 46 – 55 tahun terdapat 4 responden (26,7%) dimana tidak terdapat responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai < 4 hari dan 3 responden memiliki lama hari rawat kategori tidak sesuai < 4 hari (20%).

Tabel 5.18
Hubungan faktor usia dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba.

Usia	Lama Hari Rawat			
	Sesuai < 4 Hari		Tidak Sesuai < 4 Hari	
	n	(%)	n	(%)
56 – 65 tahun	0	0%	2	13,3%
65 – sampai atas	0	0%	0	0%
Jumlah	0	0%	2	13,3%

Berdasarkan tabel 5.18 diperoleh data bahwa terdapat 2 responden dengan usia 56 – 65 tahun, dimana tidak terdapat satupun responden yang menjalani hari rawat sesuai < 4 hari dan kategori tidak sesuai < 4 hari sebanyak 2 responden (13,3%) sedangkan usia 65 tahun sampai atas tidak ada satupun responden yang menjalani hari rawat sesuai < 4 hari dan tidak sesuai < 4 hari.

- b. Hubungan faktor jenis penyakit apendisitis dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

Tabel 5.19
Hubungan faktor jenis penyakit apendisitis dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba.

Jenis Penyakit Apendisitis	Lama Hari Rawat			
	Sesuai = < 4 Hari		Tidak Sesuai = 4 Hari	
	n	(%)	n	(%)
Apendisitis akut	2	13,3%	10	66,7%
Apendisitis kronik	0	0%	3	20%
Jumlah	0	13,3%	13	86,7%

$P = 0,448$

Berdasarkan tabel 5.19 diperoleh data bahwa terdapat 12 responden apendisitis akut dimana responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai = < 4 hari sebanyak 2 responden (13,3%) dan kategori lama = 4 hari sebanyak 10 responden (66,7%) sedangkan apendisitis kronik sebanyak 3 responden dimana tidak terdapat responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai = < 4 hari dan 3 responden memiliki lama hari rawat kategori tidak sesuai = 4 hari (20%).

Dari hasil uji statistic chi-square diperoleh nilai $p = 0,448$ yang berarti lebih besar dari $= 0,05$, dengan ini dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jenis penyakit apendisitis dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

- c. Hubungan faktor penyakit penyerta dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

Tabel 5.20
Hubungan faktor penyakit penyerta dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba.

Penyakit Penyerta	Lama Hari Rawat			
	Sesuai = < 4 Hari		Tidak Sesuai = 4 Hari	
	n	(%)	n	(%)
Terdapat penyakit penyerta	1	6,7%	6	40%
Tidak terdapat penyakit penyerta	1	6,7%	7	46,7%
Jumlah	2	13,4%	2	86,7%

$P = 0,919$

Berdasarkan tabel 5.20 diperoleh data bahwa 7 responden yang terdapat penyakit penyerta dimana responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai = < 4 hari sebanyak 1 responden (6,7%) dan kategori sesuai = 4 hari sebanyak 6 responden (40%) sedangkan responden yang tidak terdapat penyakit penyerta terdapat 8 responden dimana responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai = < 4 hari sebanyak 1 responden (6,7 %) dan 7 responden memiliki lama hari rawat kategori sesuai = 4 hari (47,7 %).

Dari hasil uji statistic chi-square diperoleh nilai $p = 0,919$ yang berarti lebih besar dari $= 0,05$, dengan ini dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara penyakit penyerta dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

- d. Hubungan faktor komplikasi dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

Tabel 5.21
Hubungan faktor komplikasi dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba.

Komplikasi	Lama Hari Rawat			
	Sesuai = < 4 Hari		Tidak Sesuai = 4 Hari	
	n	(%)	n	(%)
Terdapat komplikasi	1	6,7%	3	20%
Tidak terdapat komplikasi	1	6,7%	10	66,7%
Jumlah	2	13,4%	13	86,7%

$$P = 0,423$$

Berdasarkan tabel 5.21 diperoleh data bahwa ada 4 responden yang terdapat Komplikasi, dimana responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai = < 4 hari sebanyak 1 responden (6,7%) dan kategori tidak sesuai = 4 hari sebanyak 3 responden (20%) sedangkan responden yang tidak terdapat komplikasi sebanyak 11 responden, dimana responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai = < 4 hari sebanyak 1 responden (9,1 %) dan 10 responden memiliki lama hari rawat kategori lama = 4 hari (91,9 %).

Dari hasil uji statistic chi-square diperoleh nilai $p = 0,423$ yang berarti lebih besar dari $= 0,05$, dengan ini dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara komplikasi dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

- e. Hubungan faktor Infeksi luka Operasi (ILO) dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

Tabel 5.22
Hubungan faktor infeksi luka operasi dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba.

Infeksi Luka Operasi (ILO)	Lama Hari Rawat			
	Sesuai = < 4 Hari		Tidak Sesuai = 4 Hari	
	n	(%)	n	(%)
Terdapat ILO	0	0%	0	0%
Tidak terdapat ILO	2	13,3%	13	86,7%
Jumlah	2	13,3%	13	86,7%

Berdasarkan tabel 5.22 diperoleh data bahwa tidak terdapat satupun responden yang menderita infeksi luka operasi sedangkan berdasarkan hari rawat pasien yang menjalani perawatan < 4 hari sebanyak 2 responden dan 13 responden menjalani 4 hari perawatan.

B. Pembahasan

1. Faktor usia dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 5.16 sampai tabel 5.19 diperoleh bahwa prevalesi terbanyak yang menjalani post *Appendectomy* dengan lama hari rawat tidak sesuai < 4 hari di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba adalah kategori usia 5 – 11 tahun dan 46 – 55 tahun, dengan masing-masing terdiri atas 3 responden (20%) , adapun hal tersebut dapat dipengaruhi oleh system imun yang masih belum maksimal pada usia 5 – 11 tahun dan atau system imun yang mulai mengalami penurunan pada usia 46 – 55 tahun sehingga memungkinkan adanya lama hari rawat yang tidak sesuai.

Sedangkan untuk kategori lama hari rawat sesuai < 4 hari hanya terdapat 2 responden yakni masing-masing 1 responden untuk usia 17 -25 tahun dan 36 – 45 tahun.

Berdasarkan uji statistik *chi-square* didapatkan nilai $p = 0,386$ yang berarti lebih besar dari $\alpha = 0,05$, dengan ini dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara usia dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

Afif dan Ahmad (2008) menemukan bahwa makin besar umur penderita maka akan memerlukan lama hari rawat lebih lama. Pada beberapa penelitian, faktor umur mempengaruhi panjang lama hari rawat pasien bedah. Pasien yang sudah lanjut usia (diatas 45 tahun) cenderung

lebih panjang lama hari rawatnya dibandingkan dengan pasien usia muda.

Berdasarkan Q.S Yaasin/ 36 : 68 :

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahannya :

Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan Dia kepada kejadian(nya). Maka Apakah mereka tidak memikirkan.

Ini adalah hukum hidup yang harus dilalui oleh setiap manusia. Orang ingin berumur panjang. Kalau umur panjang pastilah tua! Kalau diri bertambah tua, pastilah kekuatan diri semasa muda kian lama kian hilang. Kian tua kian hilang kekuatan itu, hingga akhirnya kalau masih hidup juga makan akan kembali sebagai anak kecil. Itulah yang dinamai “Tua Pikun”. “Apakah mereka tidak fikirkan?” (ujung ayat 68)

Ujung ayat menyuruh berfikir baik-baik. Umur panjang yang tidak berisi, umur panjang yang tidak dipenuhi dengan ibadah yang baik adalah percuma. Sama artinya dengan kosong.

Ada juga orang yang berniat hendak beramal, hendak bersungguh-sungguh mengerjakan perintah agama setelah tua kelak. Inipun cara berfikir yang salah! Kalau sudah tua tenaga tidak lagi ada. Lebih baik sedang lagi mudah beramallah. Latihlah diri dengan kebajikan. Kadang-kadang kalau umur panjang hasil yang dirasakan setelah tua adalah buah amal perbuatan seketika lagi muda. Setelah tua hanya tinggal

mengenang-ngehang usaha dan kegiatan di kala muda saja, sedang buat bekerja seperti itu tidak bisa lagi.

Ketuaan adalah berarti kembali kecil. Bahkan lebih memberatkan daripada anak kecil sendiri. Kalau ada orang tua yang sudah pikun, yang sudah kembali seperti anak kecil, sehingga - maaf-maaf- sudah tidak sadar lagi ketika beliau kencing di celana, tidak kah anak cucunya tidak senag lagi membereskannya. Lainsekali dengan anak kecil dalam pangkuan. (Prof. Dr. HAMKA)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia akan kembali menjadi lemah dan kurang akal. Hal tersebut dapat pula menerangkan bahwa pertambahan usia juga mempengaruhi penurunan fungsi anatomi dan fisiologi manusia.

Hal tersebut dapat berkaitan dengan resiko terjadinya infeksi luka operasi pada pasien dengan usia lanjut Peningkatan risiko terjadi infeksi luka operasi biasa terjadi pada usia ekstrim yaitu sangat tua (geriatri) atau sangat muda. Umur termasuk faktor risiko dari terjadinya infeksi luka operasi yang berasal dari kondisi pasien, dan pada usia lanjut berkaitan dengan menurunnya daya tahan tubuh (Anonim,2008 ; Mangram, 1999).

Menurut pendapat Baratawidjaja dan Rengganis (2009), golongan usia lanjut lebih sering mendapatkan infeksi daripada usia muda hal ini disebabkan oleh karena terjadinya artropi tymus dengan fungsi yang nmenurun akibat involusi timus, jumlah sel T naif dan kualitas respon sel T semakin berkurang. Jumlah sel T memori meningkat tetapi semakin sulit untuk berkembang terutama sel CD8 dan

sel Th 1 sangat menurun. Diduga oleh karena aktivitas apoptosis. Sitokin Th2 IL6 meningkat sedang IL2 menurun. Pada usia 60 tahun jaringan timus hamper seluruhnya diganti oleh lemak, dan edukasi sel T dalam timus hamper hilang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Ismu Pujiyanto (1996) diketahui terdapat hubungan yang bermakna antara umur dengan lama hari rawat (nilai $r = 0,34689$).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terlihat bahwa secara karakteristik usia, teori yang ada telah sesuai dengan hasil. Dimana pada kategori usia kanak-kanak memang belum mencapai usia produktif sehingga sistem imunnya juga belum berfungsi maksimal, sama halnya dengan usia lansia awal yang telah mulai mengalami penurunan fungsi sistem imun sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan adanya perpanjangan lama hari rawat.

2. Faktor jenis penyakit apendisitis dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi

Berdasarkan tabel 5.19 diperoleh data bahwa terdapat 12 responden apendisitis akut dimana responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai = < 4 hari sebanyak 2 responden (13,3%) dan kategori tidak sesuai = 4 hari sebanyak 10 responden (67,7%) sedangkan apendisitis kronik sebanyak 3 responden dimana tidak terdapat responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai = < 4 hari dan 3 responden memiliki lama hari rawat kategori tidak sesuai = 4

hari (20%). Dari hasil uji statistic chi-square diperoleh nilai $p = 0,448$ yang berarti lebih besar dari $= 0,05$, dengan ini dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jenis penyakit apendisitis dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa kasus yang akut dan kronis akan memerlukan lama hari rawat yang berbeda, dimana kasus yang kronis akan memerlukan lama hari rawat lebih lama dari pada kasus-kasus yang bersifat akut. Demikian juga penyakit yang tunggal pada satu penderita akan mempunyai lama hari rawat lebih pendek dari pada penyakit ganda pada satu penderita (Barbara J., 2008 ; Krzysztof, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Ismu Pujianto (1996) ada hubungan antara jenis penyakit dengan lama hari rawat (nilai $\chi^2=98,252$).

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori. Tetapi, menurut saya adanya perpanjangan lama hari rawat untuk pasien apendisitis kronik tidak bergantung pada diagnosis apendisitis yang telah ditetapkan. Tetapi, dipengaruhi oleh ada atau tidaknya faktor infeksi yang menyertainya. Karena, Semua luka kronik adalah luka yang terkontaminasi tetapi belum tentu menghasilkan infeksi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternalnya. Jadi, perpanjangan lama hari rawat pasien apendisitis kronik dapat dilihat dari ada atau tidaknya infeksi yang menyertainya.

3. Faktor penyakit penyerta dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

Berdasarkan tabel 5.20 diperoleh data bahwa 7 responden yang terdapat penyakit penyerta dimana responden yang memiliki lama hari rawat kategori tidak sesuai = 4 hari sebanyak 6 responden (40%) lebih banyak dari pasien dengan kategori sesuai = < 4 hari sebanyak 1 responden (6,7%) . Cepat dan lambatnya penyembuhan setelah operasi usus buntu dapat dipengaruhi oleh ada tidaknya penyakit penyerta misalnya diabetes mellitus. Penyakit penyerta lain yang dialami pasien seperti diabetes terutama pada pasien yang memiliki kelebihan gula darah yang tidak terkontrol saat perioperasi diketahui dapat meningkatkan risiko terhadap infeksi luka operasi. Diketahui juga bahwa peningkatan level glukosa (>200 gm/dL) pasca operasi (< 48 jam) berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya infeksi luka operasi (Mangram, 1999). Hasil penelitian ini telah sejalan dengan teori tetapi belum menunjukkan hubungan yang signifikan jika dilakukan pengukuran statistik dimana nilai $p = 0,919$ lebih besar dari nilai taraf kesignifikanan = 0,05.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Hidajat (2010) menunjukkan hubungan yang signifikan antara diabetes miletus yang disertai dengan hipertensi dengan angka kejadian Infeksi Luka Operasi (ILO) dengan $p = 0,03$. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pada diabetes miletus terjadi angiopati diabetika dan

penurunan kapasitas limfosit dan penurunan kemampuan fagositosis neutrofil terhadap bakteri sehingga akan memudahkan terjadinya infeksi (Heyder, F. 1992). Dengan terjadinya infeksi inilah yang memungkinkan terjadinya lama hari rawat pasien.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini secara karekateristik telah sesuai dengan teori meskipun belum menunjukkan hasil yang signifikan melalui uji statistik *chi-square*, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kurangnya sampel yang diperoleh.

Penyakit penyerta pada semua jenis penyakit memang sangat mempengaruhi penyembuhan sebuah penyakit khususnya pada luka bekas operasi apendiktomi. Penyakit penyerta seperti penyakit pencernaan lain dapat mempengaruhi kerja organ pencernaan sehingga juga berdampak pada pneyembuhan luka post apendiktomi.

4. Faktor komplikasi dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

Berdasarkan tabel 5.21 diperoleh data bahwa ada 4 responden yang terdapat Komplikasi, dimana responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai = < 4 hari sebanyak 1 responden (6,7%) dan kategori tidak sesuai = 4 hari sebanyak 3 responden (20%) sedangkan responden yang tidak terdapat komplikasi sebanyak 11 responden, dimana responden yang memiliki lama hari rawat kategori sesuai = < 4 hari sebanyak 1 responden (6,7 %) dan 10 responden memiliki lama hari rawat kategori tidak sesuai = 4 hari (67,7 %).

Dari hasil uji statistic chi-square diperoleh nilai $p = 0,423$ yang berarti lebih besar dari $= 0,05$, dengan ini dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara komplikasi dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Razi, Fakhrul (2011) yang mengatakan bahwa makin lama waktu yang dibutuhkan untuk operasi maka akan mempengaruhi terhadap penyembuhan luka operasi dan juga akan meningkatkan terjadinya infeksi luka operasi, sehingga lama hari rawat akan lebih panjang.

Komplikasi adalah keadaan yang menghambat kesembuhan pasien pasca operasi sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari tindakan operasi itu sendiri. Komplikasi tersebut bisa berupa infeksi, kelalaian dalam teknik operasi, perawatan luka yang salah, akibat pemberian obat yang tidak semestinya dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Wayang Wartawan (2012) menemukan adanya 38 pasien yang bermasalah akibat komplikasi yang terjadi pasca operasi, dimana 27 orang pasien diantaranya mengalami penundaan pulang dari rumah sakit hingga sampai lebih dari 9 hari. Jika hal ini dibandingkan dengan pasien yang tidak mengalami komplikasi dan dianalisa dengan Chi Square didapatkanlah bahwa terjadi hubungan yang bermakna lamanya pasien dirawat di rumah sakit dengan adanya kejadian komplikasi pasca tindakan operasi.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini belum sesuai dengan teori yang ada hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan responden. Tetapi dampak yang ditimbulkan oleh komplikasi karena lambatnya penanganan operasi sebenarnya harus diwaspadai oleh penderita apendisitis sebab kemungkinan seperti perforasi dan peritonitis dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh khususnya system pencernaan.

5. Faktor infeksi luka operasi dengan lama hari rawat pasien post apendiktomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 15 responden, tidak satupun dari responden yang mengalami infeksi luka operasi sehingga hal ini menimbulkan sulitnya mengambil kesimpulan penelitian. Namun demikian, berdasarkan telaah teori yang berkaitan menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara infeksi luka operasi dengan lama hari rawat pasien post operasi apendiktomi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh suwardiman (2007) Rata-rata lama hari rawat pasien yang mengalami infeksi 5 - 8 hari dan 1- 3hari untuk pasien yang tidak terkena infeksi ($p < 0001$), jadi infeksi luka operasi pasca appendektomi meningkatkan lama hari rawat rata-rata 2 - 7 hari.

C. Keterbatasan penelitian

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya sampel yang dapat mewakili responden.
2. Penelitian yang hanya dilakukan di 1 (satu) Rumah Sakit saja.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat hubungan antara usia dengan lama hari rawat pasien post operasi apendektomi dengan nilai $p= 0,386$.
2. Tidak terdapat hubungan antara jenis penyakit apendisitis dengan lama hari rawat pasien post operasi apendektomi dengan nilai $p= 0,448$.
3. Tidak terdapat hubungan antara penyakit penyerta dengan lama hari rawat pasien post operasi apendektomi dengan nilai $p= 0,919$.
4. Tidak terdapat hubungan antara komplikasi dengan lama hari rawat pasien post operasi apendektomi dengan nilai $p= 0,423$.
5. Tidak terdapat hubungan antara infeksi luka operasi dengan lama hari rawat pasien post operasi apendektomi dengan nilai $p= 0$.

B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah HA Sulthan Dg. Radja Bulukumba, agar dapat mengurangi faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penambahan lama hari rawat pasien post operasi apendektomi.
2. Bagi institusi, agar dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa-mahasiswi mengenai faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penambahan lama hari rawat pasien post operasi apendektomi.

3. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah sampel penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan (sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya), dan mencari variabel lain agar kemungkinan besar variabel tersebut ada hubungannya dengan judul yang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Addins, D., et al, 1996. *The Epidemiology of Apendicitis and Appendectomy in the United States*. Am J Epidemiol, Vol 13. <http://www.paho.org>
- Al-Quran Digital versi 2.1, 2004. diambil dalam <http://www.alquran-digital.com>.
- Arisandi, D. 2008. *Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Apendisitis*. Pontianak: Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak.
- Anonim, 2008, *SIGN, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, Antibiotic Prophylaxis in Surgery*. <http://www.sign.ac.uk>, diakses pada tanggal 18 juni 2013.
- Ballester, et al, 2009. *The Epidemiology of Appendicitis in Valencia (Spain)*. Journal of Digestive Surgery, Volume 26, Issue 5, 2009. <http://www.gastroenterologi.com>
- Bahreisy H salim dan bahreisy said. 1998. *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Jilid : 3. Kuala Lumpur : Victory agency.
- Baratawidjaja. K.G. dan Rengganis I 2009. *Imunologi dasar*. Jakarta FKUI
- Bisset, A., 1997, *Appendectomy in Scotland: a 20-year epidemiological comparison*. Journal of Public Health, Volume 12, No 2. <http://jpubhealth.oxfordjournals.org>
- Bambang. 2010. *Asuhan Keperawatan pada Tn. J Post appendektomi di bangsal mawar RSUD Dr. Soediran Mangunsumarso Wonogiri*. Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah
- Barbara J, Billie F., Brahm Pendit 2006. *Buku Ajar Perawatan Perioperatif*. Volume 2. Praktik. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Departemen Kesehatan R.I., 2003. *Visi Misi Indonesia Sehat 2010*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan R.I., 2006. *Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005-2009*. Jakarta.
- Erbaydar, Akgun, et al 2004. *Estimation of increased hospital stay due to nosocomial infections in surgical patients: comparison of matched groups*. Istanbul University Medical School, Çapa, Istanbul, Turkey.
- Gibson, J., 2003. *Fisiologi dan Anatomi Modern*. Ed. 2, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.

- Heyder A.F. 1992. *kajian faktor-faktor resiko terhadap integritas vaskuler pada kejadian dan perluasan gangrene penderita non.insulin dependen diabetes miletus.*
- I Wayan Wartawan. 2011. *Analisis Lama Hari Rawat Pasien Yang Menjalani Pembedahan Di Ruang Rawat Inap Bedah Kelas III RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2011.*
- Krzysztof Siemionow. 2011. *Predictors of length of hospital stay after spine surgery.* Wisdom Teeth Surgery.
- Khanal, B., 2004. *Accuracy of Ultrasound in The Diagnosis of Acute Appendicitis.* <http://www.jstage.jst.go.jp>
- Mangram A. J., Horan T. C., Pearson M.L., Silver L. C., Jarvis W. R., 1999, *Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, Infect Control Hosp Epidemiol.*
- Mubarak, dkk. 2009. *Buku Ajar Ilmu Keperawatan Komunitas 2.* Jakarta : Sagung Seto.
- Masjoer, arif. Dkk. 2000. *Kapita selekta kedokteran.* Jakarta : Media Aesculapius.
- Nwomeh, B., et al, 2006. *Racial and Socioeconomic Disparity in Perforated Appendicitis. Official journal of the American academy Vol. 117 No. 3, March 2006.* <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>
- Nurlina, 2010. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan lama perawatan diabetes mellitus di rumah sakit.*
- Nursalam, 2003. *Konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan, pedoman scripsi, tesis, dan istrumen penelitian.* Jakarta : Salemba medika Pundi aksora.
- Omran M, Mcleod R, 2007. *The Epidemiology of Appendicitis in Ontario, Kanada.* Am J Epidemiol Volume 4. <http://faculty.ksu.edu.sa>
- Penfold, et al, 2008. *Geographic disparities in the risk of perforated appendicitis among children in Ohio.* International Journal of Health Geographics, Vol 56 No 7, 2008. <http://www.ik-healthgeographics.com>
- Puspita, Irma. An santy. S.Kp. RN WOC (ET) N. 2012. *Panduan praktis pemilihan balutan luka kronik.* Jakarta : Mitra Wacana Medika.
- Ponsky, et al, 2004. *Hospital and Patient Level Characteristics and the Risk of Appendiceal Rupture and Negative Appendectomy in Children.* <http://lib.bioinfo.pl>

- Potter, P., Perry, A., 2005. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Konsep, Proses, dan Praktik. Edisi 4. Volume 2.* Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Quthb Sayyid. 2008. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah naungan Al qur'an . jilid 3.* Depok : Gema Insani.
- Richardson, B., et al, 2004. *Appendicitis, fibre intake and bowel behaviour in ethnic groups in South Africa.* <http://biomedsearch.com>
- Razi, Fakhrol 2011. *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perawat terhadap Pencegahan Terjadinya Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Bedah RSUD Kota Langsa Tahun 2011.*
- Revens Regenal 2004. *Research Into Hospital Management and Organization.* Health Services Research Study Section of the United States Public Health Service. New York.
- Salari. A., Binesh. F., 2007. *Diagnostic value of anorexia in acute appendicitis, pak J Med SCI vol. 23 no. 1 january – march. 2007.* [http:// genepi. Qimr. Edu. Av](http://genepi. Qimr. Edu. Av).
- Sjamsuhidajat, R., dan Jong, W., 2005. *Buku Ajar Ilmu Bedah. Edisi revisi.* Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Smeltzer, S., Bare, B., 2002. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah.* Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Suwardiman. 2007. *Dampak infeksi luka operasi Appendektomi terhadap lama hari rawat dan biaya perawatan di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro Lampung*
- Smink, D., 2005. *Effects of Race, Insurance Status, and Hospital Volume on Perforated Appendicitis in Children. Pediatrics Journal, Vol. 115 No. 4, April 2005.* <https://www.mja.com.au>
- Tri Ismu Pujiyanto. 1996. *Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Lama Hari Rawt Di Bagian Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Kotamadya Dati Ii Semarang Tahun 1995.*
- Walker A. 1995. *Appendicitis : an African Perspective. Journal of The Royal Society of Medicine, Volume 88, November 1995.* <http://ajol.info>
- Yurisa, wella. 2008. *Etika Penelitian Kesehatan.* Riau

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LEMBAR OBSERVASI

INISIAL RESPONDEN :
NO.RM :
JENIS KELAMIN :
TANGGAL OPERASI :
LAMA HARI RAWAT SETELAH OPERASI :
TANGGAL PULANG :
OBSERVASI HARI KE- :
KELOMPOK (diisi oleh peneliti)

1. Berapa Usia pasien ?

- Masa kanak-kanak = 5 - 11 tahun.
 Masa remaja Awal = 12 - 16 tahun.
 Masa remaja Akhir = 17 - 25 tahun.
 Masa dewasa Awal = 26- 35 tahun.
 Masa dewasa Akhir = 36- 45 tahun.
 Masa Lansia Awal = 46- 55 tahun.
 Masa Lansia Akhir = 56 - 65 tahun.
 Masa Manula = 65 - sampai atas.

2. Apakah Jenis penyakit *Appendicitis* yang dialami pasien?

a. *Appendicitis* Akut

- Appendicitis* dengan perforasi.
 Appendicitis tanpa perforasi.

- b. *Appendicitis* kronik.
3. Apakah terdapat penyakit penyerta?
- a. Ada penyakit penyerta.
- Diabetes Mellitus Penyakit pencernaan lainnya.
- Hipertensi Lainnya :
- Jantung
- b. Tidak terdapat penyakit penyerta.
4. Apakah terdapat komplikasi sebelum operasi?
- a. Terdapat komplikasi
- Abses.
- Perforasi.
- Peritonitis.
- b. Tidak terdapat komplikasi.
5. Apakah terdapat infeksi luka operasi?
- a. Terdapat infeksi luka operasi.
- Infeksi lokal
- Infeksi sistemik
- b. Tidak terdapat infeksi luka operasi.

Bulukumba, Juni 2013

Pengumpul data

(Andi Enni Yulfanita)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis adalah Andi Enni Yulfanita, lahir di Bonto Bulaeng Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 November 1991, anak pasangan suami istri Andi Bustan dan Alm. Andi Norma. Penulis memulai pendidikannya dengan memasuki jenjang pendidikan formal di SD Negeri 188 Bonto Bulaeng Kab. Bulukumba pada tahun 1997, selama 6 tahun dan selesai pada tahun 2003 dan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP Negeri 4 Bulukumpa Kab. Bulukumba dan selesai pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bulukumpa Kab. Bulukumba, selama tiga tahun dan selesai pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan keperawatan fakultas ilmu Kesehatan. Adapun pengalaman organisasi pernah menjadi pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Bulukumpa dan SMP Negeri 4 Bulukumpa, pengurus HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

M A K A S S A R