

**KARAKTERISTIK IBU HAMIL DENGAN STATUS GIZI KURANG
DI RUMAH BERSALIN MATTIRO BAJI GOWA TAHUN 2013
PERIODE JANUARI - JUNI**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya kebidanan Jurusan Kebidanan
pada Fakultas Ilmu Kesehatan**

**UIN Alauddin Makassar
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ALAUDDIN
M A K A O L E H A R**

**NURUL MUAYYADAH
70400010056**

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2013

Penyusun

NURUL MUAYYADAH

70400010056

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2013

Nurul Muayyadah, 70400010056

Pembimbing : dr. Miswani Mukani Syuaib, S.Ked

“KARAKTERISTIK IBU HAMIL DENGAN STATUS KURANG DI RUMAH BERSALIN MATTIRO BAJI GOWA TAHUN 2013 PERIODE JANUARI - JUNI”

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. WHO menganjurkan jumlah tambahan sebesar 150 kkal perhari pada trimester I, 350 kkal sehari pada trimester II dan III. Sementara di Indonesia berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VI tahun 1998 ditentukan angka 285 kkal perhari selama kehamilan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik ibu hamil dengan status gizi kurang berdasarkan indikator IMT dengan variable penelitian yaitu pendidikan, pekerjaan, umur, dan paritas. Penelitian ini dilakukan tanggal 20-26 juli 2013 menggunakan metode deskriptif, Populasi sebanyak 332 orang dan dari 248 orang yang memiliki kriteria inklusi dimana terdapat 32 yang memiliki gizi kurang dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan indikator IMT, status gizi kurang terbesar terdapat pada tingkat pendidikan SD yaitu 11 orang (34,4%) dan status gizi kurang terkecil terdapat pada tingkat pendidikan SMA yaitu 4 orang (12,5%). Berdasarkan indikator IMT, status gizi kurang terbanyak didapatkan pada umur 20-35 tahun yaitu 26 orang (81,3%) dan status gizi kurang paling sedikit terdapat pada umur < 20 tahun yaitu 6 orang (18,7%). Berdasarkan indikator IMT, status gizi kurang terbanyak terdapat pada tingkat pekerjaan IRT yaitu 29 orang (90,6%) dan status gizi kurang yang paling sedikit terdapat pada tingkat pekerjaan Wiraswasta yaitu 3 orang (9,4%). Berdasarkan indikator IMT, status gizi terbanyak yaitu pada ibu primipara yaitu 18 sampel (56,2%) dan status gizi kurang juga paling sedikit terdapat pada ibu multipara yaitu 14 orang (43,8%).

Perlu peningkatan konseling pada ibu hamil tentang gizi untuk memenuhi kebutuhan janin dan ibu sehingga tidak terjadi kekurangan gizi.

Daftar Pustaka : 26 Literatur (2002-2013)

Kata Kunci : Karakteristik Ibu Hamil, Gizi Kurang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha sempurna, dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Serta shalawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun karya tulis yang berjudul **“Karakteristik Ibu Hamil Dengan Status Gizi Kurang Di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa Tahun 2013 Periode Januari - Juni”**

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis menghadapi banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian penelitian ini. Namun hal ini dapat teratasi dengan kerja keras dengan bimbingan dan dorongan, semangat bantuan serta doa dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis persembahkan kepada ibunda tercinta **Pahisyah, BA**, yang selama ini mengasuh, mendidik, dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang serta memberikan fasilitas yang cukup memadai, segala pengorbanan dan doa ibunda yang tulus dan ikhlas, serta motivasi yang diberikan tanpa pamrih, saudara – saudaraku **Ainul Muayyanah, S.Sos** dan

Bahrul Muammar, dan tak lupa kepada **Dra.Hj.Masnawati, MM** yang telah membimbing semasa kuliah diUIN Alauddin Makassar ini dan selalu memberikan dorongan serta motivasi beserta seluruh keluarga besarku terimakasih untuk semua bantuan, doa restunya yang tak berujung, segala pengertian dan nasehat yang tak pernah berhenti serta segala motivasi dan pengorbanan tiada akhir sehingga terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini.

Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT. M.S selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Sitti Saleha, S. Si.T, SKM., M.Keb, selaku ketua Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. dr. Miswani Mukani syuaib, S.Ked selaku pembimbing karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
5. dr. Raully Rahmadani, S.Ked selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

6. Dr. Firdaus Muhammad, MA selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis semasa pendidikan.
8. dr. Hj. Rina Andriaty M, Selaku Direktur Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin melakukan penelitian kepada penulis untuk penyelesaian karya tulis ilmiah.
9. Kepada Nurhidayatul Janna, dan Ria Anggreni yang telah banyak meberikan masukan dan saran-sarannya yang sangat membangun untuk menuju kesuksesan.
10. Kepada seluruh teman-teman jurusan Kebidanan Angkatan 2010 atas dukungan dan motivasinya serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan demi mencapai cita-cita.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua, amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Status Gizi Ibu Hamil

1. Pengertian..... 7
2. Pengertian Status Gizi..... 8
3. Indikator Status Gizi..... 8

B. Tinjauan Umum Tentang Gizi Ibu Dalam Masa Kehamilan

1. Definisi Masa Kehamilan..... 14
2. Tahap Perkembangan Janin dan Kebutuhan Nutrisi..... 14
3. Perubahan Fisik Dalam Kehamilan Ibu..... 17
4. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Ibu Hamil..... 19
5. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil..... 23
6. Menu Seimbang Untuk Wanita Hamil dan Janin..... 27
7. Gizi Pada Kondisi Tertentu Kehamilan..... 30

C. Tinjauan Islam tentang Gizi Dalam Kehamilan..... 33

BAB III. KERANGKA KONSEP

- A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti..... 40
- B. Variabel Yang Diteliti..... 41
- C. Bagan Kerangka Konsep..... 42
- D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif..... 42

BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian..... 45

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel.....	45
D. Tehnik Pengambilan Sampel.....	46
E. Pengumpulan Data.....	46
F. Pengolahan Data.....	46
G. Analisa Data.....	47
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	48
B. Pembahasan.....	51
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 5.1 Tabel Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu dengan Status Gizi Kurang Dengan Indikator IMT Berdasarkan Pendidikan..... 80
2. Tabel 5.2 Tabel Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu dengan Status Gizi Kurang Dengan Indikator IMT Berdasarkan Umur..... 49
3. Tabel 5.3 Tabel Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu dengan Status Gizi Kurang Dengan Indikator IMT Berdasarkan Pekerjaan..... 50
4. Tabel 5.4 Tabel Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu dengan Status Gizi Kurang Dengan Indikator IMT Berdasarkan Paritas..... 51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Konsul Karya Tulis Ilmiah
- Lampiran 2 : Master Tabel
- Lampiran 3 : Permohonan Izin penelitian dari Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Lampiran 4 : Permohonan izin penelitian dari BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Penelitian dari BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK dan LINMAS Pemerintah Kabupaten Gowa
- Lampiran 6 : Surat Bukti Penelitian dari Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa
- Lampiran 7 : Biodata Penulis



ABSTRACT

**DEPARTMENT OF MIDWIFERY
ISLAMIC STATE UNIVERSITY ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC Writing, AUGUST 2013**

Nurul Muayyadah, 70400010056

Supervisor: dr. Miswani Mukani Syuib, S.Ked

**"CHARACTERISTICS OF THE STATUS OF PREGNANT WOMEN WITH
LESS IN THE HOUSE OF MATERNITY MATTIRO BAJI GOWA PERIOD
JANUARY-JUNE 2013"**

Nutritional status is a state of the body as a result of food consumption and use of nutrients. WHO recommends an additional amount equal to 150 kcal per day in the first trimester, 350 kcal a day in the second and third trimester. While Indonesia's Widya Karya is based on the National Food and Nutrition VI in 1998 determined the number 285 kcal per day during pregnancy.

This study aims to investigate the characteristics of pregnant women with less nutritional status indicators based IMT with research variables: education, employment, age, and parity. This study was conducted on 20-26 July 2013 using the descriptive method, as many as 332 people and a population of 244 people who had inclusion criteria where there are 28 who have malnutrition with purposive sampling technique sampling.

The results showed IMT based indicators, the status of malnutrition are greatest at the level of primary education is 11 people (34,4%) and the smallest less nutritional status are at high school education level is 4 people (12,5%). Based on BMI indicator, obtained the highest malnutrition status at age 20-35 years is 26 people (81,3%) and less nutritional status are at least age <20 years, which is 6 people (18,7%). Based on BMI indicator, the status of the highest malnutrition rate of employment contained in the IRT at 29 people (90,6%) and lack the nutritional status of at least the level of employment contained in the Self that is one person 3 people (9,4%). Based on BMI indicator, ie the highest nutritional status of the mother primipara is 17 samples (56,2%), and nutritional status are less well at least in multiparous mothers are 14 people (43,8%).

Need increased counseling to pregnant women about nutrition to meet the needs of the fetus and the mother so there is no malnutrition.

References: 26 literature (2002-2013)

Keywords: characteristics of pregnant women, undernourished

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gizi pada wanita hamil adalah untuk mencapai status gizi ibu yang optimal sehingga ibu menjalani kehamilan dengan aman, melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik. Bayi yang akan dilahirkan dan perjalanan suatu penyakit pada ibu hamil perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan maka diperlukan adanya status diit dan nutrisi pada ibu hamil. Apabila di dalam masa awal kehamilan terjadi malnutrisi maka akan sangat mempengaruhi perkembangan dan kapasitas embrio untuk mempertahankan hidupnya, dan nutrisi yang buruk pada masa kehamilan lanjut akan mempengaruhi pertumbuhan janin (Kristiyanasari Weni, 2010).

Status gizi ibu hamil sangat mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan. Apabila status gizi ibu buruk, baik sebelum kehamilan dan selama kehamilan akan menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR). Di samping itu, akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan otak janin, anemia pada bayi baru lahir, bayi baru lahir mudah terinfeksi, abortus dan sebagainya. Kondisi anak yang lahir dari ibu yang kekurangan gizi dan hidup dalam lingkungan yang miskin akan menghasilkan generasi kekurangan gizi dan mudah terkena penyakit infeksi. Keadaan

ini biasanya ditandai dengan berat dan tinggi badan yang kurang optimal (Supariasa I Dewa Nyoman, 2002).

Kehamilan adalah suatu keadaan yang istimewa bagi seorang wanita sebagai calon ibu, karena pada masa kehamilan akan terjadi perubahan fisik yang mempengaruhi kehidupannya. Pola makan dan gaya hidup sehat dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim ibu. Pada waktu terjadi kehamilan akan terjadi banyak perubahan fisik, sosial maupun mental. Walaupun demikian para calon ibu harus tetap berada di dalam keadaan sehat optimal karena di sini seorang ibu tidak hidup dengan sendiri tetapi ia hidup bersama dengan janin yang dikandung. Oleh karena itu, para calon ibu harus memiliki gizi yang cukup sebelum hamil dan lebih lagi ketika hamil. Ibu yang hamil harus memiliki gizi yang cukup karena gizi yang didapat akan digunakan untuk dirinya sendiri dan juga janinnya. Seorang ibu yang tidak memiliki ataupun kekurangan gizi selama hamil maka bayi yang dikandungnya akan menderita kekurangan gizi. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus dan tidak segera diatasi maka bayi akan lahir dengan BBLR, sedangkan untuk ibu yang kekurangan gizi, maka selama ia menyusui ASI juga sedikit (Kristiyanasari Weni, 2010).

Untuk memperoleh besaran energi per hari, hasil penjumlahan ini kemudian dibagi dengan angka 250 (perkiraan lamanya kehamilan dalam hari) sehingga angka 300 kkal. Kebutuhan energi pada trimester I meningkat secara minimal. Kemudian sepanjang trimester II akhir kehamilan. Kemudian sepanjang trimester II dan III

kebutuhan energi terus meningkat sampai akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester II diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu seperti penambahan volume darah, pertumbuhan uterus, dan payudara, serta penumpukan lemak. Selama trimester III energi tambahan digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta (Kristiyanasari Weni, 2010).

WHO menganjurkan jumlah tambahan sebesar 150 kkal sehari pada trimester I, 350 kkal sehari pada trimester II dan III. Di Kanada, penambahan untuk trimester I sebesar 100 kkal dan 300 kkal untuk trimester II dan III. Sementara di Indonesia berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VI tahun 1998 ditentukan angka 285 kkal perhari selama kehamilan. Angka ini tentunya tidak termasuk penambahan akibat perubahan temperatur ruangan,kegiatan fisik, dan pertumbuhan (Kritiyanasari Weni, 2010). Sedangkan menurut AKG 2004 menetapkan tambahan kebutuhan energi ibu hamil pada trimester I sebanyak 180 kkal di atas kebutuhan sebelum hamil dan sebanyak 300 kkal pada trimester II dan III. Dengan demikian AKG energi ibu hamil berusia antara 19-49 tahun berkisar antara 2000-2200 kkal. Penambahan energi ini relatif tidak besar, yaitu 10-15% dari kecukupan energi ibu tidak hamil(1800-1900 kkal). Penambahan energi ini hendaknya dilakukan dengan penambahan makanan padat gizi, seperti susu, daging dan ayam tidak berlemak, ikan, telur, kacang-kacangan dan hasil olahnya seperti tahu dan tempe (Almatsier Sunita, dkk, 2011).

Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia pada tahun 2005 dan 2007 secara berurutan adalah sebesar 400 dan 228 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi sebesar 35 dan 34 per 1000 kelahiran hidup (Depkes RI, 2007 dan Ministry of Health RI, 2009). Walaupun cenderung menurun dari tahun ketahun, namun angka ini cukup tinggi. Selain dari faktor gizi, faktor lain yang berpengaruh terhadap jalannya kehamilan antara lain adalah jarak hamil terlalu bedekatan dan hamil pada usia remaja, serta merokok (Kristiyanasari Weni, 2010).

Menurut pengelompokan prevalensi gizi kurang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2007 mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2002), merupakan angka tertinggi di Negara ASEAN. Adapun penyebab langsung kematian ibu di Indonesia adalah perdarahan, infeksi dan eklamsia. Sedangkan penyebab tidak langsung kematian ibu ini adalah karena gizi kurang. Data statistik menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 63,5 % (Soegianto, 2004).

Dari data yang diperoleh di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa, didapatkan ibu hamil yang mempunyai Lingkar Lengan Atas < 23,5 menunjukkan gizi kurang terdapat 223 orang dari 813 ibu yang datang memeriksakan kehamilannya sepanjang tahun 2012, dan pada tahun 2013 periode Januari-April yang mempunyai Lingkar Lengan Atas < 23,5 terdapat 60 orang dari 201 ibu yang datang memeriksakan kehamilannya (Rekam Medik).

Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Karakteristik Ibu Hamil Dengan Status Gizi Kurang di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa pada tahun 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut “karakteristik ibu hamil dengan status gizi kurang di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa tahun 2013?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh karakteristik ibu hamil dengan status gizi kurang di Rumah Bersalin Mattiro baji Gowa tahun 2013?”.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik ibu hamil dengan status gizi kurang melalui pengukuran antropometrik (IMT) berdasarkan tingkat pendidikan.
- b. Mengetahui karakteristik ibu hamil dengan status gizi kurang berdasarkan umur.
- c. Mengetahui karakteristik ibu hamil dengan status gizi kurang berdasarkan pekerjaan.

- d. Mengetahui karakteristik ibu hamil dengan status gizi kurang berdasarkan paritas

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ibu

Sebagai masukan bagi ibu untuk dapat lebih memahami perlunya menjaga dan memelihara status gizi yang baik selama kehamilan.

2. Bagi Instansi tempat Penelitian

Sebagai bahan masukan bagi tempat penelitian dalam pengambilan kebijakan dalam peningkatan status gizi pada ibu hamil.

3. Bagi Institusi

Sebagai bahan bacaan dan informasi bagi institusi tempat pendidikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang status gizi pada ibu hamil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Status Gizi Ibu Hamil

1. Pengertian

- a. Gizi berasal dari bahasa Arab yaitu “Ghidza”. Gizi adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal oleh suatu organisme melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi (Proverawati Atikah, dkk, 2011).
- b. Ilmu gizi didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan yang di makan dengan kesehatan tubuh yang diakibatkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (Kristiyanasari weni, 2010).
- c. Zat gizi (*Nutrients*) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan (Sulistiyoningsih Hariyani, 2011).
- d. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi (Sulistiyonongsih Hariyani, 2011).

e. Gizi atau disebut juga nutrisi, merupakan ilmu yang mempelajari perihal makanan serta hubungannya dengan kesehatan. Ilmu pengetahuan tentang gizi (nutrisi) membahas sifat-sifat nutrient (zat-zat gizi) yang terkandung dalam makanan, pengaruh metaboliknya serta akibat yang timbul bila terdapat kekurangan (ketidakcukupan) zat gizi (Paath Erna Francin, 2004). Berdasarkan pengertian di atas, gizi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang makanan yang sehat baik bagi tubuh serta sifat-sifat nutrient yang terkandung di dalamnya.

2. Pengertian Status Gizi

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi (Sulistyoningsih Hariyani, 2011). Berdasarkan pengertian di atas status gizi adalah keadaan dimana tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Selama kehamilan akan memicu perubahan baik secara anatomis, fisiologis, maupun biokimia. Adanya perubahan tersebut akan sangat mempengaruhi kebutuhan gizi ibu hamil yang bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan janin (Sulistyoningsih Hariyani, 2011).

3. Indikator Status Gizi

Penataan gizi pada ibu hamil adalah menyiapkan cukup kalori, protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, mineral, dan cairan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ibu, janin, serta plasenta. Perencanaan gizi untuk ibu hamil sebaiknya mengacu pada RDA. Dibandingkan ibu yang tidak

hamil, kebutuhan ibu hamil akan protein meningkat sampai 68%, asam folat 100%, kalsium 50%, dan zat besi 200-300%. Bahan pangan yang digunakan harus meliputi enam kelompok, yaitu makanan yang mengandung protein (hewani dan nabati), susu dan olahannya, roti dan biji-bijian, buah dan sayur yang kaya akan vitamin C, sayuran berwarna hijau tua, buah dan sayur lain (Arisman,MB, 2009).

Penilaian status gizi merupakan suatu interpretasi dari sebuah pengetahuan yang berasal dari *study* informasi makanan (*dietary*), biokimia, dan antropometri. Sistem penilaian status gizi dibedakan menjadi dua yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung.

a. Penilaian status gizi secara langsung

Jenis parameter antropometri tergantung pada parameter yang digunakan. Parameter itu sendiri dalam antropometri adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia. Jenis parameter antropometri adalah umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada.

1. Umur

Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan umur akan menyebabkan lebih banyak interpretasi status gizi salah. Batas umur penuh (*completed year*) dan bulan usia penuh (*completed month*) (Proverawati Atikah,dkk, 2009).

2. Berat Badan

Seorang ibu yang sedang hamil mengalami kenaikan berat badan sebanyak 10-12 kg. Pada trimester I kenaikan berat badan seorang ibu tidak mencapai 1 kg, namun setelah mencapai trimester ke-II penambahan berat badan semakin banyak yaitu 3 kg dan pada trimester III sebanyak 6 kg. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya pertumbuhan janin, plasenta, dan air ketuban. Kenaikan berat badan yang ideal untuk seorang ibu yang gemuk yaitu 7 kg dan 12,5 kg untuk ibu yang tidak gemuk. Pengukuran berat badan merupakan pilihan utama :

- a. Parameter yang paling baik, mudah terlihat perubahan dalam waktu singkat karena perubahan konsumsi makanan dan kesehatan.
- b. Memberikan gambaran status gizi sekarang, jika dilakukan periodik memberikan gambaran pertumbuhan.
- c. Umum dan luas di pakai di Indonesia.
- d. Ketelitian pengukuran tidak banyak dipengaruhi oleh keterampilan pengukur.
- e. Digunakan di dalam KMS.
- f. BB/TB merupakan indeks yang tidak tergantung umur.
- g. Alat ukur dapat diperoleh di pedesaan dengan ketelitian tinggi: dacin (Proverawati Atikah,dkk, 2009).

3. Tinggi Badan

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, TB tumbuh seiring dengan penambahan umur. Pertumbuhan TB tidak seperti BB, relative kurang sensitive pada masalah kekurangan gizi dalam waktu singkat. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap TB akan nampak dalam waktu yang relatif lama. Merupakan parameter paling penting bagi keadaan yang telah lalu dan keadaan sekarang, jika umur tidak diketahui dengan tepat. Merupakan ukuran kedua yang penting, karena dengan menghubungkan BB dan TB, faktor umur dapat dikesampingkan.

Alat ukur :

- a. Alat pengukur panjang badan bayi : untuk bayi atau anak yang belum dapat berdiri.
- b. Microtoise : untuk anak yang sudah dapat berdiri.

4. Lingkar Lengan Atas

Merupakan salah satu pilihan untuk penentuan status gizi, karena mudah, murah dan cepat. Tidak memerlukan data umur yang terkadang susah diperoleh. Memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. LiLA mencerminkan cadangan energi, sehingga dapat mencerminkan :

- a. Status KEP pada balita.
- b. Kekurangan energi dan kalori (KEK) pada ibu WUS dan ibu hamil
: risiko bayi BBLR.

Pengukuran Lingkar Lengan Atas

Alat : suatu alat pita pengukur dari *fiber glass* atau sejenis kertas tertentu berlapis plastik. Ambang batasnya (*cut of points*) :

- a. LLA WUS dengan risiko KEK di Indonesia < 23.5 cm
- b. Pada bayi 0-30 hari : ≥ 9.5 cm
- c. Balita dengan KEP < 12.5 cm

Pengukuran LiLA atau LiLA dapat digunakan untuk mengetahui status gizi bayi, balita dan ibu hamil, anak sekolah serta dewasa. Indeks ini dapat digunakan tanpa mengetahui umur. Bersama dengan nilai trisepts skinfold dapat digunakan untuk menentukan otot lengan. Lingkaran otot lengan merupakan gambaran dari massa otot tubuh (Proverawati Atikah,dkk, 2011).

b. Pengukuran Secara Tidak Langsung

Pengukuran status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga yaitu : survey makanan, statistik vital dan faktor ekologi.

1. Survey Konsumsi

Survey konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Penggunaan pengumpulan data konsumsi makanan dapat

memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survey ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi (Proverawati Atikah,dkk, 2009).

2. Statistik Vital

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaan dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi (Proverawati Atikah,dkk, 2009).

3. Faktor Ekologi

Faktor ekologi adalah merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi multifaktor dari faktor lingkungan fisik, biologi, ekonomi, politik, dan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi, dan sebagainya. Penggunaan mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi (Proverawati atikah,dkk, 2009).

B. Tinjauan Umum Tentang Gizi Ibu Dalam Masa Kehamilan

1. Definisi Masa Kehamilan

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi (Prawirohardjo Sarwono, 2010). Kehamilan berlangsung selama 9 bulan menurut penanggalan international, 10 bulan menurut penanggalan luar, atau sekitar 40 minggu. Kehamilan dibagi menjadi tiga periode bulanan atau trimester. Trimester pertama adalah periode minggu pertama sampai minggu ke 13. Trimester kedua adalah periode minggu ke 14 sampai ke 26, sedangkan Trimester ke tiga, minggu ke 27 sampai kehamilan cukup bulan 38-40 minggu. Kehamilan 40 minggu ini disebut kehamilan matur (cukup bulan). Bila kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur. Kehamilan antara 28 dan 36 minggu disebut kehamilan prematur.

2. Tahap Perkembangan Janin dan Kebutuhan Nutrisi

(Almatsier Sunita, dkk, 2011) Tujuh bulan berikutnya merupakan tahap yang disebut tahap janin. Tiap organ tubuh janin tumbuh menjadi sempurna. Pertumbuhan terjadi dengan pesat dari kurang lebih enam gram pada bulan ketiga menjadi 3,0-3,5 kg pada waktu lahir. Pertumbuhan masing-masing organ terjadi dengan kecepatan berbeda. Contohnya, jantung mencapai bentuk sempurna sesudah kurang lebih 16 minggu, sedangkan paru-paru dalam waktu kurang lebih 26 minggu. Setiap organ dan jaringan sangat

peka terhadap kekurangan gizi dan racun pada periode yang masing-masing berbeda. Bila pembelahan dan jumlah sel suatu organ tidak terpenuhi dalam periode kritis tersebut, perbaikan tidak dapat dilakukan dikemudian hari. Oleh sebab itu selama kehamilan, seorang ibu harus senantiasa menjaga keadaan gizi dan kesehatannya.

a. Trimester I

Pembentukan manusia dimulai pada saat sel telur (ovum) dan sperma bersatu (fertilisasi) untuk membentuk zigot. Setelah 30 jam sel telur mengalami fertilisasi, zigot membelah diri menjadi dua. Pembelahan sel ini terjadi berulang kali; sel ini bergerak melalui pipa fallopi ke uterus. Disamping membelah diri, yang dinamakan hyperplasia, sel pun membesar (hipertrofi). Pada akhir trimester I, sebagian besar organ telah terbentuk dan janin sudah terasa bergerak.

Kekurangan gizi pada masa ini atau tekanan-tekanan lain yang diperoleh janin melalui ibu, misalnya penggunaan obat-obatan dan alkohol, radiasi, atau trauma, dapat berpengaruh negative terhadap janin untuk selamanya. Pengaruh paling berat adalah keguguran (abortus). Ibu harus menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya pada tahap tumbuh kembang janin dimasa ini, selain tentunya memperhatikan mutu gizi makanan. Walaupun dimasa ini ibu mungkin kurang mempunyai nafsu makan atau merasa mual dan ingin muntah, kecukupan gizi hendaknya

terus diupayakan. Disaat ini mutu gizi makanan lebih penting dari jumlah makanan. Oleh sebab itu ibu hendaknya mengkonsumsi yang padat gizi.

b. Trimester II

Pada awal trimester II berat janin kurang lebih mencapai 30 gram. Pada saat ini lengan, tangan, kaki, jari dan telinga telah terbentuk; janin mulai membentuk lekuk-lekuk pada rahang untuk mempersiapkan penepatan gigi. Organ tubuh jain termasuk tulang sudah terbentuk, dan denyut jantungnya sudah mulai terdengar . Janin sudah mulai kelihatan seperti bayi dan telah mulai bergerak yang dapat di rasakan oleh ibu. Pada masa ini janin masih mungkin dipengaruhi oleh toksin melalui ibu, tetapi tidak seberat pada trimester I.

Pada trimester II berat payudara ibu bertambah sebanyak kurang lebih 30%. Penambahan tersebut terjadi karena penumpukan lemak sebanyak 1-2 kg sebagai simpanan energi untuk pembentukan air susu ibu (ASI).

c. Trimester III

Pada awal trimester III berat janin kurang lebih mencapai 1 kg. trimester III ini merupakan masa kritis untuk pertumbuhan janin. Panjang janin menjadi dua kali panjang semula, sedangkan beratnya bertambah sebanyak kurang lebih 5 kali. Pada masa kehamilan 9-10 bulan, berat bayi biasanya mencapai 2500 gram - 3500 gram dengan panjang 45-50 cm. bagian lunak pada ubun-ubun menunjukkan tempat tulang tengkorak

menutup (*fontanel*). Tulang ini akan sepenuhnya menutup pada usia bayi antara 16-18 bulan.

3. Perubahan Fisik Dalam Kehamilan Ibu

(Kristiyanasari Weni, 2010) Adanya kehamilan maka akan terjadi penambahan berat badan yaitu sekitar 12,5 kg. berdasarkan Huliana peningkatan tersebut adalah sebanyak 15 % dari sebelumnya. Proporsi pertambahan berat badan tersebut dapat dilihat di bawah ini:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| a. Janin | : 25-27 % |
| b. Plasenta | : 5 % |
| c. Cairan amnion | : 6 % |
| d. Ekspansi volume darah | : 10 % |
| e. Pertumbuhan uterus dan payudara | : 11 % |
| f. Peningkatan cairan ekstraseluler | : 13 % |
| g. Peningkatan lemak tubuh | : 25-27 % |

Kehamilan itu merupakan masa yang sangat penting, karena pada masa ini kualitas seorang anak ditentukan. Pemeliharaan kehamilan dimulai dari perencanaan menu yang sangat besar. Masukan gizi pada ibu hamil sangat menentukan kesehatannya dan janin yang dikandungnya. Janin sangat tergantung kepada ibunya, untuk pernapasan, pertumbuhan, dan untuk melindungi dari penyakit. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan berbeda dengan masa sebelum hamil, peningkatan kebutuhan gizi hamil menurut

huliana (2100) sebesar 15 %, karena dibutuhkan untuk pertumbuhan rahim, payudara, volume darah, plasenta, air ketuban, dan pertumbuhan janin.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehamilan yang terkait dengan gizi :

- a. Trimester I : pada awal kehamilan(trimester I) mual dan muntah sering dialami wanita atau disebut *morning sickens*. Mual dan muntah pada awal kehamilan berhubungan dengan perubahan kadar hormonal pada tubuh wanita hamil. Pada saat hamil terjadi kenaikan kadar *hormone chorionic gonadotropin* (HCG) yang berasal dari plasenta. HCG meningkat produksinya pada tiga bulan pertama kehamilan dan turun kembali setelah bulan keempat, sehingga pada kehamilan memasuki bulan keempat rasa mual sudah mulai berkurang.

Mual dan muntah yang berlebihan pada kehamilan trimester I disebut *hiperemesis gravidarum*. Tanda-tanda hiperemesis gravidarum adalah berat badan turun 2,5-5 kg atau lebih, tidak dapat menelan makanan atau minuman selama 24 jam, mual hebat sehingga selalu muntah saat makan. Walaupun demikian ibu dan keluarga harus tetap mengingatkan kebutuhan gizi calon ibu tetap terjaga yaitu misalnya dengan makan yang hangat.

Pada kehamilan trimester I biasanya terjadi peningkatan berat badan yang tidak berarti yaitu sekitar 1-2 kg. kebutuhan energy pada trimester I meningkat secara minimal. WHO menganjurkan penambahan energy 10 kkal untuk trimester I .

- b. Trimester II dan III : terjadi penambahan berat badan yang ideal selama kehamilan trimester II dan III (Kristiyanasari Weni, 2010).

Tabel 12. Peningkatan berat badan selama hamil

IMT (kg/m ²)	Total kenaikan berat badan yang disarankan	Selama trimester II dan III
Kurus (IMT<18,5)	12,7-18,1 kg	0,5 kg/minggu
Normal (IMT18,5-22,9)	11,3-15,9 kg	0,4 kg/minggu
Overweight(IMT23-29,9)	6,8-11,3 kg	0,3 kg/minggu
Obesitas (IMT>30)		0,2 kg/minggu
Bayi kembar	15,9-20,4 kg	0,7 kg/minggu

Sumber: (Kristiyanasari Weni, 2010).

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Ibu Hamil

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gizi pada ibu hamil diantaranya yaitu :

a. Pendidikan

Pendidikan dalam hal ini biasanya dikaitkan dengan pengetahuan, akan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Salah satu contoh, prinsip yang dimiliki seseorang dengan pendidikan rendah biasanya adalah 'yang penting mengenyangkan', sehingga porsi bahan makanan sumber karbohidrat lebih banyak dibandingkan dengan kelompok bahan makanan lain. Sebaliknya,

kelompok orang dengan pendidikan tinggi memiliki kecenderungan memilih bahan makanan sumber protein dan akan berusaha menyeimbangkan dengan kebutuhan gizi lain (Sulistyoningsih Hariyani, 2011).

b. Umur

Semakin muda dan semakin tua umur seorang ibu yang sedang hamil, akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur muda perlu tambahan gizi yang banyak karena selain digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri juga harus berbagi dengan janin yang sedang dikandung. Sedangkan untuk umur yang tua perlu energy yang besar juga karena fungsi organ yang makin melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal maka memerlukan tambahan energy yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang berlangsung (Kristiyanasari Weni, 2010).

1) Ibu hamil pada usia kurang lebih 20 tahun

Ibu hamil yang kurang dari 20 tahun merupakan kehamilan yang sangat beresiko, baik terhadap ibunya maupun bayi yang dikandungnya. Karena pertumbuhan linear (tinggi badan) pada umumnya pada usia 16-18 tahun dilanjutkan dengan pematangan pertumbuhan rongga panggul beberapa tahun setelah pertumbuhan linear selesai yaitu pada usia 20 tahun. Akibat terhadap dirinya (hamil pada usia 20 tahun) meliputi komplikasi persalinan dan gangguan kekurangan gizi.

2) Pada usia ibu hamil di atas 35 tahun

Ibu yang hamil pertama pada usia kehamilannya 35 tahun mudah terjadi penyakit pada ibu dan organ kandungan yang telah menua, jalan lahir juga telah kaku. Ada kemungkinan lebih besar ibu hamil mendapatkan anak cacat, terjadi persalinan macet dan perdarahan.

c. Paritas

Paritas adalah jumlah kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang wanita (BKKBN, 2006). Paritas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap hasil konsepsi. Perlu diwaspadai karena ibu pernah hamil atau melahirkan anak 4 kali atau lebih, maka akan kemungkinan banyak ditemukan keadaan : kesehatan terganggu, anemia, kurang gizi, kekendoran pada dinding perut dan dinding rahim.

Menurut Prawirohardjo (2009), paritas dapat dibedakan menjadi primipara, multipara dan grandemultipara.

Paritas dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Primipara

Primipara adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak, yang cukup besar untuk hidup di dunia luar (Varney, 2006).

2. Multipara

Multipara adalah wanita yang sudah hamil, dua kali atau lebih (Varney, 2006).

3. Grandemultipara

Grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan 5 orang anak atau lebih (Varney, 2006).

Grandemultipara adalah wanita yang melahirkan 5 orang anak atau lebih dan biasanya mengalami penyulit dalam kehamilan dan persalinan (Manuaba, 2008). Dengan demikian grandemultipara adalah wanita yang melahirkan lebih dari 5 orang anak baik itu masih hidup maupun sudah meninggal dan pada kehamilan grandemultipara ini biasanya didapatkan penyulit dalam kehamilan dan persalinan.

d. Berat badan

Berat badan seorang ibu yang sedang hamil akan menentukan zat makanan yang diberikan agar kehamilannya dapat berjalan dengan lancar (Proverawati Atikah, dkk, 2009).

e. Status kesehatan

Status kesehatan seseorang kemungkinan sangat berpengaruh terhadap nafsu makannya. Seorang ibu dalam keadaan sakit otomatis akan memiliki nafsu makan yang berbeda dengan ibu yang dalam keadaan sehat. Namun ibu harus tetap ingat, bahwa gizi yang dia dapat akan dipakai untuk dua kehidupan yaitu bayi dan untuk dirinya sendiri (Kristiyanasari Weni, 2010).

f. Status ekonomi

Ekonomi seseorang mempengaruhi dalam pemilihan makanan yang akan dikonsumsi sehari-harinya. Seorang dengan ekonomi yang tinggi kemudian hamil maka kemungkinan besar sekali gizi yang dibutuhkan tercukupi ditambah lagi adanya pemeriksaan membuat gizi ibu semakin terpantau (Kristiyanasari Weni, 2010). Faktor yang berperan dalam menentukan status kesehatan seseorang dikaji dari tingkat sosial ekonomi (FKM UI, 2007) sosial ekonomi merupakan tingkat seseorang dalam masyarakat yang ditentukan oleh variabel pendapatan, pendidikan, pekerjaan, karena ini dapat mempengaruhi aspek kehidupan termasuk aspek kesehatan.

g. Jarak kehamilan pada kandungan yang bukan anak pertama

Status gizi ibu hamil belum dua tahun pasca persalinan sebelumnya, oleh karena itu belum siap untuk kehamilan berikutnya.

5. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil

a) Kebutuhan Energi

Selama proses kehamilan terjadi peningkatan kebutuhan kalori sejalan dengan adanya peningkatan laju metabolik basal dan penambahan berat badan yang akan meningkatkan penggunaan kalori selama aktifitas. Selain itu juga selama hamil, ibu membutuhkan tambahan energi/kalori untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, plasenta, jaringan payudara, dan cadangan lemak. Pada awal kehamilan trimester I kebutuhan energi masih

sedikit dan terjadi sedikit peningkatan pada trimester II. Pada trimester ke II, energi digunakan untuk penambahan darah, perkembangan uterus, pertumbuhan jaringan mammae, dan penimbunan lemak. Pada trimester III energi digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Sumber energi bisa didapat dengan mengkonsumsi beras, jagung, gandum, kentang ubi jalar, ubi kayu dan sagu (Proverawati Atikah, dkk, 2009).

b) Karbohidrat

Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Ibu hamil membutuhkan karbohidrat 1.500 kalori. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah sereal(padi-padian) dan produk olahannya, juga kentang, umbi dan jagung. Namun, karena tidak semua sumber karbohidrat baik, maka ibu hamil bisa memilih yang tepat. Misalnya sumber karbohidrat yang perlu dibatasi adalah gula dan makanan yang mengandung banyak gula, seperti cake, dan permen. Sedangkan karbohidrat yang sebaiknya dikonsumsi adalah karbohidrat kompleks yang terdapat pada gandum, kentang, serelia atau padi-padian yang tidak digiling. Jenis ini mengandung serat dan cukup kalori (Proverawati Atikah, 2009).

c) Protein dan Asam Amino

Protein digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan janin, protein memiliki peranan penting. Peran protein selama proses kehamilannya diantaranya yaitu selain untuk pertumbuhan dan perkembangan janin juga untuk pembentukan plasenta dan cairan amnion,

pertumbuhan jaringan maternal seperti pertumbuhan mammae ibu dan jaringan uterus, dan penambahan volume darah. Kebutuhan akan protein selama kehamilan tergantung pada usia kehamilan. Pada trimester I kurang dari 6 gram tiap hari sampai trimester ke II. Pada saat memasuki trimester akhir, pertumbuhan janin sangat cepat sehingga perlu protein dalam jumlah yang besar juga yaitu 10 gram. Ini dapat diartikan bahwa wanita hamil membutuhkan protein 10-15 gram lebih tinggi dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Protein tersebut dibutuhkan untuk membentuk jaringan baru, maupun plasenta dan janin. Sumber protein bisa didapat melalui protein hewani dan nabati. Protein hewani meliputi daging, ikan, unggas, telur dan kerang. Sedang untuk protein hewani bisa didapat dari daging sapi, ikan, unggas. Bahan makanan sumber protein nabati adalah kacang-kacangan seperti tahu, tempe, dan selai kacang. Selain itu, karena protein yang berasal dari ternak juga kaya dengan lemak, maka seimbangkan asupan protein hewani dan nabati. Pilih bahan makanan protein hewani yang berlemak rendah (Proverawati Atikah, 2009).

d) Lemak

Asam lemak Eicosapentanoic Acid(EPA) dan *Docosa hexanoic Acid* (DHA) memainkan peranan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus, khususnya untuk mata dan otak. Lemak dibutuhkan tubuh terutama untuk membentuk energi dan serta perkembangan system

syaraf janin. Oleh karena itu, ibu hamil tidak boleh sampai kurang mengkonsumsi lemak tubuh. Sebaliknya, bila asupannya berlebih dikhawatirkan berat badan akan meningkat tajam. Keadaan ini akan menyulitkan ibu hamil sendiri dalam menjalani kehamilan dan pasca persalinan. Karena itu ibu hamil dianjurkan makan makanan yang mengandung lemak tidak lebih dari 25% dari seluruh kalori yang dikonsumsi sehari. Bahan makanan sumber asam lemak Omega 3 antara lain kacang-kacangan dan hasil olahannya, serta jenis ikan laut lainnya, terutama ikan laut dalam (Proverawati Atikah, 2009).

e) Vitamin A

Ibu yang sedang hamil sebaiknya jangan terlalu sering mengkonsumsi vitamin A dalam jumlah yang besar karena akan menjadi stimulator yang mengakibatkan teratogen. Vitamin A mengalami peningkatan 25% dari sebelum hamil. Vitamin A berfungsi untuk membantu proses pertumbuhan sel dan jaringan tulang, mata, rambut, kulit, organ dalam dan fungsi rahim. Sumbernya adalah kuning telur, ikan dan hati. Sumber provitamin A atau karoten adalah wortel, labu kuning, bayam, kangkung, dan buah-buahan berwarna kemerah-merahan (Proverawati Atikah, 2009).

f) Vitamin C

Kebutuhan vitamin C untuk bayi pada masa kehamilan dan menjelang kelahiran yaitu berkisar antara 3-4 mg/hari. Ibu hamil membutuhkan vitamin C sebanyak 70 mg/hari. Asupan vitamin C dapat mencegah anemia.

Selain itu untuk membangun kekuatan plasenta, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan stress. Sumber vitamin C adalah buah dan sayur segar, antara lain jeruk, kiwi, papaya, bayam, kol, brokoli, dan tomat (Proverawati Atikah, 2009).

g) Asam Folat

RDA folat untuk wanita hamil yaitu 400 mg/hari yaitu dimana terjadi peningkatan sebanyak 10% dari sebelumnya. Makanan yang kaya akan asam folat dapat dijumpai pada sayuran hijau, jus jeruk, asparagus, dan brokoli (Proverawati Atikah, 2009).

h) Kalsium

Konsentrasi kalsium serum pada janin lebih besar dari pada ibu. Kalsium mengandung mineral yang penting untuk pertumbuhan janin dan membantu kekuatan kaki serta punggung. Membantu efek ketenangan diri saat bekerja. Kalsium dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan bakal gigi janin yang dimulai sejak usia kehamilan 8 minggu. Sumber kalsium adalah susu dan produk susu lainnya seperti keju, yoghurt, teri, udang kecil, dan kacang-kacangan (Proverawati Atikah, 2009).

6. Menu Seimbang Untuk Wanita Hamil dan Janin

Menurut Saptawati Bardoson, tidak banyak perbedaan menu sebelum dan setelah hamil. jadi seharusnya tidak ada kesulitan berarti dalam pengaturan menu makanan selama hamil. Berikut bahan makanan yang dianjurkan dalam sehari :

Table 13. contoh menu makan dalam sehari bagi ibu hamil

Bahan Makanan	Porsi hidangan sehari	Jenis hidangan
Nasi	5+ 1 porsi	<p>Makan Pagi: nasi 1,5 porsi (150 gram) dengan ikan/daging 1 potong sedang (40 gram), tempe 2 potong sedang (50 gram), sayur 1 mangkok dan buah 1 potong sedang</p> <p>Makan Selingan: susu 1 gelas dan buah 1 potong sedang</p> <p>Makan Siang: nasi 3 porsi (300 gram), dengan lauk, sayur dan buah sama dengan pagi</p> <p>Selingan: susu 1 gelas dan buah 1 potong sedang</p>
Sayuran	3 mangkuk	
Buah	4 potong	
Tempe	3 potong	
Daging	3 potong	
Susu	2 gelas	<p>Makan Malam: nasi 2,5 porsi (250 gram) dengan lauk, sayur dan buah sama dengan pagi/siang</p> <p>Selingan: susu 1 gelas</p>
Minyak	5 sendok teh	
Gula	2 Sendok makan	

Sumber: (Proverawati, Atika, 2009)

Kehamilan adalah suatu keadaan yang istimewa bagi seorang wanita sebagai calon ibu, karena pada masa kehamilan akan terjadi perubahan fisik yang mempengaruhi kehidupannya. Pola makan dan gaya hidup sehat dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim ibu. Pada waktu terjadi kehamilan akan terjadi banyak perubahan baik perubahan fisik, sosial maupun mental. Walaupun demikian para calon ibu harus tetap berada didalam keadaan sehat optimal karena disini seorang ibu tidak hidup dengan sendiri tetapi dia hidup bersama dengan janin yang dikandung. Oleh karena itu, para calon ibu harus memiliki gizi yang cukup sebelum hamil dan lebih lagi ketika hamil. Ibu yang hamil harus memiliki gizi yang cukup karena gizi yang didapat akan digunakan untuk dirinya sendiridan juga janinnya. Seorang ibu yang tidak memiliki ataupun kekurangan gizi selama masa kehamilan maka bayi yang dikandungnya akan menderita kekurangan gizi. Apabila hal ini berlansung terus-menerus dan tidak segera diatasi maka bayi akan lahir dengan berat badan rendah (dibawah 2500 gram), sedangkan ibu yang kekurangan gizi, maka selama ia menyusui ASI yang dihasilkan juga sedikit.

Apabila telah lebih lanjut ASI itu mengandung zat-zat berkwalitas untuk pertumbuhan manusia baik jasmani dan intelektual. ASI terutama mengandung DHA (asam dokosa hedsa noik) yang mengisi sel-sel manusia mulai dari janin di dalam kadungan sampai anak berumur 2 tahun. Selama perkembangan, sel otak seorang manusia itu akan diisi oleh DHA jika DHA itu tercukupi. Amun apabila jumlahnya hanya sedikit maka sel otak aka terisi

oleh lemak yang berpengaruh pada IQ manusia itu sendiri. Ibu hamil dianjurkan sekali untuk mengonsumsi banyak protein, yaitu sekitar 2-2,5 gram/kg berat badan. Protein menurut jenisnya dibedakan menjadi protein hewani dan nabati. Protein yang bermutu adalah protein hewani yang berasal dari telur, susu, dan ikan. Hal ini dikarenakan adanya kandungan DHA di dalamnya. Jenis ikan yang paling banyak mengandung DHA adalah ikan lemuru (Proverawati Atikah, 2009).

7. Gizi Pada Kondisi Tertentu Kehamilan

Gizi yang baik pada masa hamil selalu menjadi perhatian utama, namun dalam beberapa situasi. Anda perlu dan bahkan lebih menyadari akan makanan yang anda konsumsi. Jika kehamilan anda dikategorikan sebagai kehamilan khusus atau jika anda punya diet khusus, kebutuhan gizi anda akan lebih banyak dan pada kebutuhan normal.

Jika anda merupakan satu atau lebih dari golongan berikut dapatkanlah konseling gizi dan berhati-hatilah terutama mengonsumsi makanan bergizi. Konseling gizi yang baik disediakan mulai dari bidan anda, dokter maupun ahli gizi anda. Para pakar ini bias membantu anda merencanakan makanan anda dalam cara yang praktis dan bermanfaat (IBCIC Katie Brock, 2007).

a. Hamil kembar

Jika anda mengandung dua atau lebih bayi, anda perlu mengonsumsi lebih banyak kalori dan makanan bergizi (IBCIC Katie Brock, 2007).

b. Hamil usia remaja

Jika anda seorang remaja, anda masih tumbuh dan berkembang dan memiliki kebutuhan yang lebih besar dari pada orang dewasa untuk mengkonsumsi bahan makanan yang paling banyak mengandung gizi. Ketika hamil anda perlu makan terutama yang baik untuk memelihara pertumbuhan anda dan juga member makan janin anda (IBCIC Katie Brock, 2007).

c. Hamil yang dekat dengan kelahiran sebelumnya

Kadang-kadang, sebuah kehamilan menghabiskan cadangan gizi tertentu dalam tubuh anda seperti kalsium dan besi. Untuk mengisi cadangan-cadangan tersebut, tidak terjadi kekurangan gizi, jika anda punya waktu yang cukup di antara kehamilan. Namun demikian, jika kehamilan anda sangat dekat dengan kelahiran sebelumnya, cadangan anda biasa habis dan anda mungkin memerlukan kalori dan gizi tambahan. Lamanya waktu yang dibutuhkan di antara kehamilan untuk memperbaiki kekurangan cadangan tersebut, tentu saja tergantung pada status gizi secara keseluruhan dan kualitas asupan makanan anda. Bicaralah dengan bidan atau dokter anda tentang kebutuhan makanan bagi anda (IBCIC Katie Brock, 2007).

d. Makanan sayuran

Jika anda seorang vegetarian, dengan pengetahuan dan perencanaan yang cermat, anda bias member makan diri anda dengan tepat dan bayi yang anda kandung, terutama jika anda memasukkan susu dan telur dalam menu makanan anda. Perhatian utama anda adalah : perlunya mengkonsumsi kalori

yang cukup, perlunya memilih berbagai makanan yang kaya akan protein untuk mendapatkan semua protein penting setiap hari dan bagi mereka yang vegetarian, perlu dilengkapi dengan vitamin B 12 yang sebagian besar ditemukan dalam protein hewan (IBCIC Katie Brock, 2007).

e. Tidak toleran dengan susu

Jika anda tidak tahu dengan susu, pelajari cara-cara lain untuk mendapatkan kalsium yang cukup. Cobalah bentuk-bentuk susu yang dibiakkan, seperti keju, yang sering kali cocok pada mereka yang terganggu dengan konsumsi susu. Pilihan lainnya adalah dengan meminum susu dengan laktosa rendah, yang mengandung lactase (enzim yang membantu mengubah laktosa dalam susu menjadi gula yang lebih bias dicerna). Jika anda memang tidak menyukai rasa susu, cobalah masak dengan susu bubuk kering atau makan sup krem dan keju. Pilihlah tersebut akan memberikan anda manfaat susu tanpa merasakannya. Jika makanan anda tidak selalu mengandung produk susu, anda akan membutuhkan makanan lain yang kaya akan kalsium. Jika anda tidak memenuhi kebutuhan anda melalui asupan makanan anda, bagaimanapun, anda mungkin membutuhkan kalsium suplemen. Lakukan konsultasi dengan dokter atau bidan anda jika hal ini mengganggu anda (IBCIC Katie Brock, 2007).

f. Alergi makanan

Jika anda punya gangguan alergi makanan, anda mungkin memerlukan seorang ahli gizi untuk membantu anda merencanakan asupan

makanan yang sehat semasa hamil. Kadang-kadang, dengan menghilangkan gangguan makanan dapat mengarah kepada asupan makanan yang tidak benar, karena itu anda harus memerlukan bimbingan yang cermat (IBCIC Katie Brock, 2007).

C. Tinjauan Islam Tentang Gizi Dalam Kehamilan

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi (Prawirohardjo Sarwono, 2010). Kehamilan berlangsung selama 9 bulan menurut penanggalan international, 10 bulan menurut penanggalan luar, atau sekitar 40 minggu. Kehamilan dibagi menjadi tiga periode bulanan atau trimester. Trimester pertama adalah periode minggu pertama sampai minggu ke 13. Trimester kedua adalah periode minggu ke 14 sampai ke 26, sedangkan Trimester ke tiga, minggu ke 27 sampai kehamilan cukup bulan 38-40 minggu. Kehamilan 40 minggu ini disebut kehamilan matur (cukup bulan). Bila kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur. Kehamilan antara 28 dan 36 minggu disebut kehamilan prematur.

1. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang proses penciptaan manusia, berbunyi :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
 ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
 فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik.

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa proses kejadian manusia di dalam perut ibu mengalami beberapa tahapan. Dalam tahapan itu ada yang berkembang dengan baik dan ada pula yang perkembangannya kurang optimal tapi kesemuanya itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Swt. Ketidak optimalannya boleh jadi karena ulah manusia (ibunya) yang tidak tahu atau tidak memahami apa yang seharusnya dilaksanakan untuk menunjang kesempurnaan pertumbuhan janin dalam rahim. Karena diketahui bahwa Allah SWT selalu memberikan yang baik dan kalau ada yang tidak sesuai maka itu adalah ulah manusia itu sendiri dan disitulah ditetapkan Allah sebagai takdirnya yang bila diterima dengan sabar akan ditemukan hikmahnya. Di samping itu, proses kejadian manusia menunjukkan bahwa kehidupan ini adalah berproses dan setiap tahapan mengalami perubahan sehingga tanggung jawab pemeliharaan pun berubah. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh sombong dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki karena semuanya itu akan musnah dan kembali ke asalnya sebagaimana ia diciptakan. Dan meskipun bayi lahir prematur semua itu sudah menjadi rahasia Allah dan harus disyukuri karena Allah Swt pasti punya rencana yang terbaik. Dan harus diyakini bahwa tidak ada bedanya dihadapan

Allah swt bayi yang lahir dengan normal dan bayi yang lahir dengan prematur, proses kejadiannya pun sama.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan janin memerlukan pengamatan yang cermat, sehingga dapat memberikan asuhan sesuai dengan ibu hamil dan janinnya. Ini berarti bahwa salah satu nilai yang terkandung dalam proses pertumbuhan dan perkembangan janin adalah faktor kecermatan dan pemeliharaan ibu terhadap kehamilannya. Di sisi lain ayat di atas juga menekankan betapa pentingnya ibu mengandung memberikan perhatian terhadap anak-anaknya, dimulai dari masa kehamilan agar anak bisa lahir dengan normal dan tumbuh dengan baik. Bayi dikandung oleh ibu selama 9 bulan 10 hari dengan melewati beberapa tahap pertumbuhan, dimulai dari tahap pre-embriyonik yaitu dua setengah minggu pertama, selanjutnya tahap embriyonik; sampai akhir minggu ke delapan, dan tahap menjadi janin yaitu dari minggu ke delapan sampai kelahiran. Pada setiap tahapan, janin atau calon bayi memerlukan asupan nutrisi yang cukup dari ibunya agar pertumbuhannya bisa optimal sampai bayi dilahirkan. Akan tetapi, jika asupan nutrisi dari ibunya kurang misalnya ibu tidak memperhatikan makanannya dan kehamilannya, maka pertumbuhan janin dalam rahim akan terhambat dan tidak optimal, hal ini bisa menyebabkan bayi lahir sebelum waktunya atau lahir dalam keadaan prematur. Oleh sebab itu kewajiban anak yaitu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah sehingga sering terjadi berbagai komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan dan jika tidak segera ditangani maka akan

berakhir dengan kelahiran prematur. Oleh sebab itu tugas para bidan yaitu membantu ibu agar tetap memberikan perhatian dan pemeliharaan terhadap kandungannya. Selain itu juga, ayat tersebut di atas mengandung nilai tanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Di dalam Islam, pendidikan berawal dari pra kelahiran. Artinya perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku anak-anaknya, termasuk pada masa kehamilan (Mahmud, 2007).

2. Allah berfirman dalam Q.S Al-Maaidah : 88, berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya :

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beiman kepadanya.

Dalam ayat ini ditegaskan perintah memakan yang halal dan, dengan demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah pulalah praktik-praktik keberagaman yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi, dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadapNya adalah muminun, yakni orang-orang yang mantap keimanannya.

Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan, di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas. Dalam ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik (Shihab Quraish, 2009).

3. Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl : 114, berbunyi :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنُتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya :

Maka makanlah yang halal lagi baik rizki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Dijelaskan dalam ayat ini wahai orang-orang yang beriman makanlah sebagian dari apa yang direzekikan, yakni dianugerahkan, oleh Allah kepada kamu. Makanlah itu dalam keadaan halal lagi baik, lezat dan bergizi serta berdampak positif bagi kesehatan, dan syukurilah nikmat Allah agar kamu tidak ditimpa apa yang menimpa negeri-negeri terdahulu jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan, di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan kegiatan. Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik

untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh al-Qur'an adalah yang halal lagi baik baik (Shihab Quraish, 2009).

4. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dengan QS. Al-A'raf : 31 berbunyi :

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan al-Qisth dan meluruskan wajah di setiap mesjid, ayat ini mengajak: Hai anak-anak adam, pakailah pakaian kamu yang indah minimal dalam bentuk menutup aurat karena membukanya pasti buruk. Lakukan itu disetiap memasuki berada di mesjid, baik mesjid dalam arti bangunan khusus maupun dalam pengertian yang luas, yakni persada bumi ini, dan makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik serta minumlah apa saja, yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebihan dalam hal apa pun.

Penggalan akhir ayat ini merupakan salah satu prinsip yang diletakkan agama menyangkut kesehatan dan diakui pula oleh para ilmuwan terlepas apa pun pandangan hidup atau agama mereka. Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum (Shihab Quraish, 2009).



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. *Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti*

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi (Sulistyoningsih Hariyani, 2011). Di negara yang berkembang termasuk Indonesia masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama dan merupakan penyebab kematian wanita. Tidak dapat dipungkiri lagi dari masa kehamilan menjadi saat yang paling berbahaya bagi wanita dalam hidupnya.

Pendidikan adalah proses tumbuh kembang seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran, sehingga dalam penelitian itu perlu dipertimbangkan umur dan proses belajar, tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang untuk lebih menerima ide-ide dan teknologi yang baru, semakin meningkat batas seseorang, maka akan bertambah pengalaman yang mempengaruhi wawasan dan pengetahuan. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan adalah untuk mengubah pengetahuan (pengertian, pendapat, konsep-konsep), sikap dan persepsi serta menanamkan tingkah laku atau kebiasaan yang baru (Notoatmodjo, 2003).

Umur adalah usia ibu yang secara garis besar menjadi indikator dalam kedewasaan dalam setiap pengambilan keputusan yang mengacu pada setiap pengalamannya (Winkjosastro, 2005). Faktor umur sangat penting dalam

penentuan status gizi. Kesalahan penentuan umur akan menyebabkan interpretasi penentuan status gizi menjadi salah. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan yang akurat akan menjadi tidak berarti jika tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat.

Pekerjaan adalah aktifitas yang dilakukan sehari-hari. Dimana seluruh bidang pekerjaan umumnya di perlukan adanya hubungan sosial dan hubungan dengan orang baik, setiap orang harus dapat bergaul dengan orang lain, setiap orang harus bergaul dengan teman sejawat maupun berhubungan dengan atasan. Pekerjaan dapat menggambarkan tingkat kehidupan seseorang karena dapat mempengaruhi sebagian aspek kehidupan seseorang termasuk pemeliharaan kesehatan. Dinyatakan bahwa jenis pekerjaan dapat berperan dalam pengetahuan (Notoatmodjo, 2003).

Paritas adalah jumlah kehamilan (Winkjosastro, 2005), angka kelahiran dimana akan memberikan kontribusi besar terhadap asupan nutrisi pada bayi yang ibu kandung karena jumlah kelahiran dapat menurunkan stamina seorang ibu serta jumlah energy dalam tubuh ibu juga telah berkurang.


B. *Variable Yang Diteliti*

Berdasarkan tinjauan kepustakaan serta maksud dan tinjauan dari penelitian ini maka ada beberapa variabel yang diteliti yaitu:

1. Penilaian berdasarkan antropometri : Indeks Masa Tubuh (IMT) berdasarkan tingkat pendidikan.
2. Penilaian berdasarkan umur.

3. Penilaian berdasarkan pekerjaan.
4. Penilaian berdasarkan paritas.

C. *Bagan Kerangka Konsep*



D. *Definisi Operasioanal dan Kriteria Objektif*

1. Status gizi ibu hamil

Dalam penelitian ini status gizi ibu hamil adalah status gizi yang diperoleh dari pengukuran antropometrik yang terdiri dari :

a. Untuk pengukuran IMT (Indeks Masa tubuh) :

Kurus	: IMT < 18,5
Normal	: IMT 18,5 – 22,9
Overweight	: IMT 23-29,9
Obesitas	: IMT > 30

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah jenis pendidikan normal formal yang terakhir diselesaikan oleh responden, dengan kategori :

- a. Tidak sekolah
- b. Pendidikan dasar : SD, SLTP sederajat
- c. Pendidikan menengah : SMA sederajat
- d. Pendidikan tinggi : Akademi, Sarjana.

3. Usia

Yang dimaksud usia dalam penelitian ini adalah lama hidup ibu sejak dari lahir hingga pada saat data yang diperlukan dicatatkan pada buku rekam medik atau sesuai usia yang tertulis pada buku rekam medik.

- a. Ibu hamil pada usia kurang dari 20 tahun
- b. Ibu hamil pada usia antara 20 sampai 35 tahun
- c. Ibu hamil pada usia diatas 35 tahun.

4. Pekerjaan

- a. Pegawai negeri
- b. Pegawai swasta
- c. Wiraswasta
- d. IRT (ibu rumah tangga).

5. Paritas

Paritas adalah jumlah kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang wanita.

Kriteria objektif :

a. Primipara

Primipara adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak, yang cukup besar untuk hidup di luar

b. Multipara

Multipara adalah wanita yang melahirkan seorang anak lebih dari satu kali

c. Grandemultipara

Grandemultipara adalah wanita yang melahirkan 5 orang anak atau lebih dan biasanya mengalami penyulit dalam kehamilan dan persalinan.



BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan karekteristik ibu hamil dengan status gizi kurang di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa tahun 2013 periode Januari-Juni.

B. *Lokasi dan Waktu Penelitian*

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Bersalin Mattiro Baji yang bertempat di jalan Syamsuddin Tunru No. 115 Sungguminasa, Kabupaten Gowa Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini adalah karena Rumah Bersalin Mattiro Baji merupakan salah satu Rumah Bersalin yang mempergunakan pelayanan Kesehatan yang diprogramkan oleh pemerintah.

2. Penelitian dimulai pada bulan Juni.

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah semua ibu yang memeriksakan kehamilannya di *Antenatal Care* Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa 2013 periode Januari - Juni.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memeriksakan kehamilannya di *Antenatal Care* Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa 2013 periode Januari - juni yang memenuhi kriteria inklusi.

Kriteria inklusi :

- Ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya selama tahun 2013 periode Januari - Juni.

kriteria eksklusi :

- Data rekam medik yang dipelukan hilang atau tidak lengkap.

D. Tehnik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel secara purposive sampling dengan pertimbangan semua ibu *antenatal care* di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa tahun 2013 periode Januari-Juni.

E. Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari rekam medik (*medical record*) Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa tahun 2013 periode Januari- Juni.

F. Pengolahan Data

Data diolah secara manual menggunakan kalkulator dan ditampilkan dalam table distribusi frekuensi dan presentase.

G. Analisa data

Data diolah dengan menggunakan presentase dengan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut.

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan : P : Presentase yang dicari

f : Frekuensi variable yang diteliti

n : Jumlah Sampel




BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa pada tanggal 20 Juli sampai 26 Juli 2013. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa selama tahun 2013 periode Januari - Juni jumlah populasi ibu yang memeriksakan kehamilannya adalah sebanyak 303 orang. Dari ke-303 orang tersebut, yang memiliki data rekam medik lengkap dan memenuhi kriteria inklusi sebanyak 248 orang.

Dari 248 sampel yang memiliki gizi kurang terdapat 32 orang dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 248 yang memeriksakan kehamilannya di *Antenatal Care*.



Hasil penelitian ini secara lengkap disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan frekuensi sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tabel Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Dengan Status Gizi Kurang Dengan Indikator IMT Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan Ibu dengan Status Gizi Kurang	Frekuensi	Persentase (%)
SD	11	34,4
SMP	9	28,1
SMA	4	12,5
Perguruan Tinggi	-	-
Tidak Sekolah	8	25
Jumlah	32	100

Sumber Data : Rekam Medik ANC Tahun 2013 Periode Januari-Juni

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang mempunyai status gizi kurang ibu yang tingkat pendidikannya SD adalah sebanyak 11 orang (34,4 %), pada tingkat pendidikan SMP terdapat 9 orang (28,1 %), pada tingkat SMA terdapat 4 orang (12,5 %), pada tingkat Perguruan Tinggi tidak terdapat sampel, dan yang Tidak Sekolah terdapat 8 orang (25 %). Berdasarkan indikator IMT, status gizi kurang terbesar terdapat pada tingkat pendidikan SD yaitu 11 orang (34,4 %) dan status gizi kurang terkecil terdapat pada tingkat pendidikan SMA yaitu 4 orang (12,5 %).

Tabel 5.2**Tabel Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Dengan Status Gizi Kurang Dengan Indikator IMT Berdasarkan Umur**

Berdasarkan Umur Ibu dengan Status Gizi Kurang	Frekuensi	Persentase (%)
< 20 tahun	6	18,7
20-35 tahun	26	81,3
> 35 tahun	-	-
Jumlah	32	100

Sumber Data : Rekam Medik ANC Tahun 2013 Periode Januari-Juni

Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang memiliki status gizi kurang berdasarkan umur <20 tahun adalah 6 orang (18,7 %), umur 20-35 tahun terdapat 26 orang (81,3 %), dan pada umur >35 tidak terdapat sampel. Berdasarkan indikator IMT, status gizi kurang terbanyak didapatkan pada umur 20-35 tahun yaitu 26 orang (81,3 %) dan status gizi kurang paling sedikit terdapat pada umur < 20 tahun yaitu 6 orang (18,7 %).

Tabel 5.3**Tabel Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Dengan Status Gizi Kurang Dengan Indikator IMT Berdasarkan Pekerjaan**

Tingkat Pekerjaan Ibu dengan Status Gizi Kurang	Frekuensi	Persentase (%)
Pegawai Negeri	-	-
Pegawai Swasta	-	-
Wiraswasta	3	9,4
IRT	29	90,6
Jumlah	32	100

Sumber Data : Rekam Medik ANC Tahun 2013 Periode Januari-Juni

Tabel di atas tampak bahwa dari 32 ibu yang mempunyai status gizi kurang berdasarkan pekerjaan Pegawai Negeri tidak terdapat sampel, Pegawai Swasta tidak terdapat sampel, pada Wiraswasta terdapat 3 orang (9,4 %), dan IRT terdapat 29 sampel (90,6 %). Berdasarkan indikator IMT, status gizi kurang terbanyak terdapat pada tingkat pekerjaan IRT yaitu 29 orang (90,6 %) dan status gizi kurang yang paling sedikit terdapat pada tingkat pekerjaan Wiraswasta yaitu 3 orang (9,4 %).

Tabel 5.4

Tabel Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Dengan Status Gizi Kurang Dengan Indikator IMT Berdasarkan Paritas

Berdasarkan Paritas Ibu dengan Status Gizi Kurang	Frekuensi	Persentase (%)
Primipara	18	56,2
Multipara	14	43,8
Grandemultipara	-	-
Jumlah	32	100

Sumber Data : Rekam Medik ANC Tahun 2013 Periode Januari-Juni

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang memiliki status gizi kurang berdasarkan paritas terdapat pada Primipara 18 orang (56,2 %), Multipara terdapat 14 orang (43,8 %), dan tidak terdapat sampel pada Grandemultipara. Berdasarkan indikator IMT, status gizi terbanyak yaitu pada ibu primipara yaitu 17 sampel (56,2 %) dan status gizi kurang juga paling sedikit terdapat pada ibu multipara yaitu 14 orang (43,8 %).

B. Pembahasan

1. Pendidikan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang mempunyai status gizi kurang ibu yang tingkat pendidikannya SD adalah sebanyak 11 orang (34,4 %), pada tingkat pendidikan SMP terdapat 9 orang (28,1 %), pada tingkat SMA terdapat 4 orang (12,5 %), pada tingkat Perguruan Tinggi tidak terdapat sampel, dan yang Tidak Sekolah terdapat 8 orang (25 %). Berdasarkan indikator IMT, status gizi kurang terbesar terdapat pada tingkat pendidikan SD yaitu 11 orang (34,4 %) dan status gizi kurang terkecil terdapat pada tingkat pendidikan SMA yaitu 4 orang (12,5 %).

Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2011) menunjukkan bahwa status gizi kurang terbesar terdapat pada tingkat pendidikan SMA yaitu 4 orang (5,56%) dan status gizi kurang terkecil terdapat pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi yaitu 1 orang (1,39%). Menurut Sulistyoningsih Hariyani (2011) pendidikan biasanya dikaitkan dengan pengetahuan, akan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Menurut pendapat peneliti, dari rendahnya pendidikan akan lebih minimnya dalam pemilihan pemenuhan kebutuhan gizi, sedangkan pendidikan yang semakin tinggi maka seseorang tersebut akan lebih berusaha dalam memilih bahan makanan dan akan menyeimbangkan dalam pemenuhan gizinya.

Literatur yang ada mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita terutama yang bekerja pada sektor formal, maka wanita tersebut akan lebih mudah mendapatkan akses dari segala informasi, khususnya informasi kesehatan tentang pemeliharaan dan pelayanan kesehatan bagi diri dan keluarga. Dengan pendidikan yang tinggi ibu hamil dapat menjadikan *Antenatal Care* sebagai motivasi didalam pemeliharaan kesehatan dan kehamilannya. Sedangkan akibat dari rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan ibu tentang kesehatan khususnya tentang kehamilan, maka ibu kurang memperhatikan kehamilannya dan pada akhirnya memicu terjadinya kurang gizi pada saat mengandung. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian dimana mayoritas ibu yang mempunyai status gizi kurang lebih tinggi pada pendidikan SD dan status gizi kurang lebih rendah pada tingkat pendidikan SMA.

2. Umur

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang memiliki status gizi kurang berdasarkan umur <20 tahun adalah 6 orang (18,7 %), umur 20-35 tahun terdapat 26 orang (81,3 %), dan pada umur >35 tahun tidak terdapat sampel. Berdasarkan indikator IMT, status gizi kurang terbanyak didapatkan pada umur 20-35 tahun yaitu 26 orang (81,3 %) dan status gizi kurang paling sedikit terdapat pada umur < 20 tahun yaitu 6 orang (18,7 %).

Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2011) menunjukkan bahwa status gizi kurang terbesar terdapat pada umur < 20 tahun yaitu 5 orang (6,94%) dan status gizi kurang terkecil terdapat

pada umur 20-35 tahun yaitu 3 orang (4,27%). Menurut peneliti, berbanding terbalik dengan teori yang dimana terdapat status gizi kurang terbanyak umur 20-35 tahun, disebabkan karena yang memiliki umur 20-35 tahun terbanyak memiliki status pendidikan rendah sehingga mengalami keguncangan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan gizi selama kehamilannya.

Selain itu, terdapat perbedaan antara teori dengan penelitian yang dilakukan dimana didapatkan kelompok umur tertinggi yang mengalami status gizi kurang pada kelompok umur 20-35 tahun bahwa semakin cukup umur, tingkat kematangan seseorang akan lebih baik. Literatur mengatakan bahwa ibu yang beresiko mengalami status gizi kurang berada rentan pada umur <20 tahun karena organ-organ reproduksi dan fungsi fisiologisnya belum optimal dan secara fisiologisnya belum optimal dan secara psikologis belum mencapai emosi dan kejiwaan yang matang, sehingga akan berdampak pada pemeliharaan kesehatan dan perkembangan janin yang dikandungnya dan pada umur >35 tahun karena terjadi kemunduran fungsi dan reproduksinya. Menurut peneliti, adanya perbedaan yang didapat karena adanya faktor pendidikan sebab semakin tinggi umur tidak menutup kemungkinan mempunyai pendidikan tinggi.

Menurut Wibowo dan Basuki (2006), usia seseorang ibu berkaitan dengan perkembangan alat-alat produksinya. Usia reproduksi yang sehat dan aman adalah umur 20-35 tahun. Kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun secara biologis belum optimal, emosinya cenderung labil, mentalnya belum matang sehingga mudah mengalami keguncangan yang mengakibatkan kurangnya

perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi selama kehamilannya. Sedangkan kehamilan pada usia lebih dari 35 tahun berkait dengan kemunduran dan penurunan daya tahan tubuh serta berbagai penyakit.

3. Pekerjaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang mempunyai status gizi kurang berdasarkan pekerjaan Pegawai Negeri tidak terdapat sampel, Pegawai Swasta tidak terdapat sampel, pada Wiraswasta terdapat 3 orang (9,4%), dan IRT terdapat 29 sampel (90,6%). Berdasarkan indikator IMT, status gizi kurang terbanyak terdapat pada tingkat pekerjaan IRT yaitu 29 orang (90,6%) dan status gizi kurang yang paling sedikit terdapat pada tingkat pekerjaan Wiraswasta yaitu 3 orang (9,4%).

Menurut Notoatmodjo (2003) pekerjaan dapat menggambarkan tingkat kehidupan seseorang karena dapat mempengaruhi sebagian aspek kehidupan seseorang termasuk pemeliharaan kesehatan. Dinyatakan bahwa jenis pekerjaan dapat berperan dalam pengetahuan. Menurut Hardinsyah (2007) pekerjaan sebagai ibu rumah tangga memungkinkan pengalokasian waktu ibu untuk memperhatikan konsumsi dan kesehatan diri sendiri maupun keluarga menjadi lebih besar. Status dan jenis pekerjaan ibu mempengaruhi ketersediaan waktu ibu untuk mengelola pangan, hal ini cenderung untuk menjadi determinan keragaman konsumsi pangan di rumah tangga.

Menurut peneliti, bahwa ibu yang tidak bekerja memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dapat mempengaruhi sebagian kehidupan untuk

memenuhi kebutuhan gizinya sedangkan ibu yang bekerja lebih sedikit waktunya untuk memenuhi kebutuhan gizinya di karenakan kesibukan dalam bekerja.

4. Paritas

Penelitian menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang memiliki status gizi kurang berdasarkan paritas terdapat pada Primipara 18 orang (56,2 %), Multipara terdapat 14 orang (43,8 %), dan tidak terdapat sampel pada Grandemultipara. Berdasarkan indikator IMT, status gizi terbanyak yaitu pada ibu primipara yaitu 18 orang (56,2%) dan status gizi kurang paling sedikit terdapat pada ibu multipara yaitu 14 orang (43,8 %).

Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2011) menunjukkan bahwa status gizi kurang terbesar terdapat pada paritas multigravida yaitu 6 orang (8,33%) dan status gizi kurang terkecil terdapat pada paritas primigravida yaitu 4 orang (5,56%). Menurut winkjosastro (2005), angka kelahiran dimana akan memberikan kontribusi besar terhadap asupan nutrisi pada bayi yang ibu kandung karena jumlah kelahiran dapat menurunkan stamina seorang ibu serta jumlah energy dalam tubuh ibu juga telah berkurang.

Dimana menurut peneliti, hal ini disebabkan karena pada ibu primipara kekhawatirannya lebih tinggi karena baru mengalami kehamilan sehingga lebih memperhatikan asupan makanannya, sedangkan pada multipara sudah pernah mengalami kehamilan sebelumnya sehingga ibu tidak merasa khawir terhadap kehamilannya. Dan ibu yang pernah hamil sebelumnya berasumsi bahwa kehamilan selanjutnya sama dengan kehamilan sekarang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan indikator IMT, status gizi kurang terbesar terdapat pada tingkat pendidikan SD yaitu 11 orang (34,4 %) dan status gizi kurang terkecil terdapat pada tingkat pendidikan SMA yaitu 4 orang (12,5 %).
2. Berdasarkan indikator IMT, status gizi kurang terbanyak didapatkan pada umur 20-35 tahun yaitu 26 orang (81,3 %) dan status gizi kurang paling sedikit terdapat pada umur < 20 tahun yaitu 6 orang (18,7 %).
3. Berdasarkan indikator IMT, status gizi kurang terbanyak terdapat pada tingkat pekerjaan IRT yaitu 29 orang (90,6 %) dan status gizi kurang yang paling sedikit terdapat pada tingkat pekerjaan Wiraswasta yaitu 3 orang (9,4 %).
4. Berdasarkan indikator IMT, status gizi terbanyak yaitu pada ibu primipara yaitu 17 sampel (56,2 %) dan status gizi kurang juga paling sedikit terdapat pada ibu multipara yaitu 14 orang (43,8 %).

B. Saran

1. Diharapkan untuk ibu hamil selalu memeriksakan kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janinnya agar terhindar dari gizi kurang. Selain itu, agar para ibu selalu mengingat bahwa anak adalah titipan dari Allah Swt sehingga sebaiknya memperhatikan dan peduli kepada keadaan anak dalam hal ini menyangkut memperhatikan asupan makanan yang baik selama hamil.

2. Dimana dalam penelitian terdapat ibu hamil yang memiliki status gizi kurang yaitu 32 orang, normal 102 orang, overweight 95 orang, obesitas 19 orang. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumber informasi bagi Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa agar lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan akan pentingnya pola makan yang baik selama masa kehamilan sehingga kebutuhan akan zat gizi bisa terpenuhi.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan bacaan atau panduan khususnya kepada mahasiswa kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Karya Toha putra, Semarang, 2002.
- Almatsier, Sunita, dkk. *Gizi Seimbang Dalam Daur Kehidupan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Arisman. *Gizi dalam Daur Kehidupan*. Edisi 2. Jakarta: EGC, 2008.
- Bandiyah, Siti. *Kehamilan, Persalinan dan Gangguan Kehamilan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.
- Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Milik Departemen Agama R.I, 2003.
- Hardinsyah. 2007. Review faktor determinan keragaman konsumsi pangan. *Jurnal Gizi dan Pangan* 2(2): 55-74. Di akses tanggal 18 agustus 2013.
- IBCIC, Katie Brock. *Nutrisi, Medikasi dan Senam Kehamilan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Ika, Pantiawati dan Saryono. *Asuhan Kebidanan (kehamilan)*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Kristiyanasari, Weni. *Gizi Ibu hamil*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Notoadmodjo S. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Paath, Erna Francin, dkk. *Gizi Dalam Kesehatan reproduksi*. Jakarta: EGC, 2005.
- Prasetyono. *Menu Sehat Ibu Hamil*. Jogjakarta: DIVA Press, 2009.
- Prawirohardjo, sarwono. *Ilmu Kebidanan Edisi Ke 4*. Jakarta: PT. Bina Pustaka, 2010.
- Proverawati, Atikah dan Erna Kusuma Wati. *Ilmu Gizi Untuk Keperawatan dan Gizi Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.

- Proverawati, Atikah dan Siti Asfuah. *Gizi Untuk Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.
- Raputmasa. 2012. *Status Gizi Ibu Hamil*.
<http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/114/jtptunimus-gdl-kasmiangoc-5690-2-babii.pdf> di akses tanggal 20 Juli 2013
- Sihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishba Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sulistiyoningsih, Hariyani. *Gizi untuk Kesehatan Ibu dan Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Soegianto. 2012. *Prevalensi Anemia Gizi Pada Kehamilan*.
<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1keperwatan09/207314005/bab1.pdf> di akses tanggal 10 Juli 2013
- Supariasa, I Dewa Nyoman, dkk. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Widya Medika, 2002.
- Suparyanto. 2012. *Pertumbuhan Fisik Masa Prenatal*.
[at:http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/112/jtptunimus-gdl-iraputmasa-5591-3-babii.pdf](http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/112/jtptunimus-gdl-iraputmasa-5591-3-babii.pdf) di akses tanggal 20 Mei 2013
- Varney, Hellen. *Buku Ajar Kebidanan*. Jakarta: EGC, 2006.
- Wibowo A. Basuki H. 2006. Pola Perawatan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Masyarakat Pendatang. *The Journal of Public Health Indonesia* 3(1):5-18 di akses tanggal 17 Agustus 2013
- Wiknjosastro H. *Ilmu kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005.
- Yuniastuti, Ari. *Gizi dan Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN

Nama : Nurul Muayyadah

Nim : 70400010056

Judul : Karakteristik Ibu Hamil Dengan Status Gizi Kurang diRumah
Bersalin Mattiro Baji Gowa Tahun 2013 Periode Januari – Juni

No	Tanggal	Materi Konsul	Perbaikan	Paraf
1	15-02-2013	Judul	Perbaikan	
2	18-05-2013	Judul	Perbaikan Redaksional	
3	03-05-2013	Bab I	Perbaikan Bab I	
4	05-05-2013	Bab I	Acc	
5	12-05-2013	Bab II	Tehnik penulisan dan penambahan materi	
6	10-06-2013	Bab II	Acc	
7	11-06-2013	Bab III	Tehnik penulisan dan pembahasan materi	
8	20-06-2013	Bab III & Bab IV	Acc	

9	23-07-2013	Perbaikan daftar pustaka	Acc buat bahan presentasi	
10	25-07-2013	Power point	Acc power point siap ujian gandakan materi	
11	04-08-2013	Bab V & Bab VI	Perbaikan	
12	16-08-2013	Bab V, Bab VI & Perbaikan Daftar pustaka	Acc buat bahan presentasi	
13	26-08-2013	Power point	Acc power point siap ujian gandakan materi	

Makassar, 26 Agustus 2013

Mengetahui,

Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

dr. Miswani Mukani Syaib, S.Ked

Nip. 19870409 201101 2 009

BIODATA PENULIS



A. Identitas penulis

1. Nama : Nurul Muayyadah
2. Nim : 70400010056
3. Tempat/tanggal lahir : Marangkayu, 17 September 1992
4. Agama : Islam
5. Suku : Bugis
6. Alamat : BTN Pao-Pao Permai Blok E1/20
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ridwan
 - b. Ibu : Pahisyah, BA

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD Tahun 2004 di SD Negeri 001 Marangkayu
2. Tamat SMP Tahun 2007 di SMP Negeri 1 Marangkayu
3. Tamat SMA Tahun 2010 di SMA Negeri 1 Marangkayu
4. Pada Tahun 2010 mengikuti proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Kebidanan

MASTER TABEL
KARAKTERISTK IBU DENGAN STATUS GIZI KURANG DI RUMAH BERSALI
MATTIRO BAJI GOWA TAHUN 2013

NO	RESPONDEN	PENDIDIKAN					PEKERJAAN				UMUR			PARITA	
		SD	SLTP	SMA	PT	TS	P.N	P.S	WS	IRT	< 20 THN	20-35 THN	> 35 THN	PRIMI	MULTI
1	NY "N"	√								√	√			√	
2	NY "R"	√								√	√			√	
3	NY "M"		√							√	√			√	
4	NY "S"		√							√			√		√
5	NY "S"			√					√			√		√	
6	NY "K"	√								√		√			√
7	NY "M"		√							√		√			√
8	NY "J"			√					√				√		√
9	NY "K"		√							√					√
10	NY "R"	√								√					√
11	NY "W"			√						√					√
12	NY "J"					√				√				√	
13	NY "I"		√							√		√		√	
14	NY "N"		√							√		√			√
15	NY "N"			√						√		√		√	
16	NY "H"	√								√		√			√
17	NY "A"	√								√		√			√
18	NY "M"		√							√		√			√
19	NY "S"			√						√		√			√
20	NY "N"		√							√		√			√
21	NY "S"	√								√		√		√	
22	NY "R"					√				√		√			√
23	NY "R"			√						√		√			√
24	NY "W"					√				√		√		√	
25	NY "R"		√							√		√			√
26	NY "I"			√						√		√			√
27	NY "D"			√					√			√		√	

28	NY "E"	√							√		√			√
29	NY "H"		√						√		√			√
30	NY "S"		√						√		√			√
31	NY "E"			√					√		√		√	
32	NY "H"			√					√	√			√	
33	NY "S"		√						√		√			√
34	NY "I"	√							√			√	√	
35	NY "M"			√				√			√			√
36	NY "H"		√						√		√			√
37	NY "M"			√					√		√		√	
38	NY "I"			√					√		√		√	
39	NY "F"	√							√		√			√
40	NY "H"		√						√		√			√
41	NY "K"	√							√			√		√
42	NY "K"			√					√		√			√
43	NY "R"		√						√		√		√	
44	NY "S"	√							√		√			√
45	NY "S"			√					√		√			√
46	NY "S"		√					√			√		√	
47	NY "H"			√					√		√		√	
48	NY "A"				√			√			√			√
49	NY "S"			√					√		√			√
50	NY "E"		√						√		√		√	
51	NY "A"			√					√		√		√	
52	NY "P"		√						√		√		√	
53	NY "F"			√					√		√		√	
54	NY "S"			√					√		√			√
55	NY "R"		√						√		√			√
56	NY "I"			√					√		√			√
57	NY "S"			√				√			√		√	
58	NY "O"	√							√		√			√
59	NY "N"		√					√			√			√
60	NY "R"	√							√		√			√

61	NY "N"	√							√		√			√
62	NY "E"					√			√		√			√
63	NY "K"		√						√		√			√
64	NY "H"		√						√	√			√	
65	NY "R"			√				√			√		√	
66	NY "S"		√						√		√			√
67	NY "S"	√							√		√			√
68	NY "D"		√						√		√		√	
69	NY "R"			√					√	√			√	
70	NY "N"			√					√		√		√	
71	NY "S"		√						√		√		√	
72	NY "U"		√						√		√			√
73	NY "N"			√				√			√			√
74	NY "H"		√					√			√			√
75	NY "M"		√						√		√		√	
76	NY "F"					√			√		√			√
77	NY "H"		√						√		√			√
78	NY "N"	√							√		√			√
79	NY "B"	√							√		√		√	
80	NY "H"					√		√					√	√
81	NY "I"			√					√		√			√
82	NY "E"		√						√	√			√	
83	NY "N"		√						√		√		√	
84	NY "R"			√					√		√			√
85	NY "I"			√					√		√			√
86	NY "N"							√		√	√		√	
87	NY "H"					√		√			√			√
88	NY "H"	√							√		√			√
89	NY "A"		√						√		√		√	
90	NY "A"	√							√		√			√
91	NY "N"		√						√		√		√	
92	NY "A"			√					√		√			√
93	NY "H"			√				√			√		√	

94	NY "D"		√						√	√			√	
95	NY "H"		√						√		√		√	
96	NY "K"	√						√			√		√	
97	NY "H"		√						√			√	√	
98	NY "L"			√					√		√			√
99	NY "D"		√						√		√			√
100	NY "S"			√					√		√			√
101	NY "F"			√					√		√			√
102	NY "Y"			√				√			√			√
103	NY "S"	√							√	√			√	
104	NY "J"	√							√		√		√	
105	NY "H"		√						√		√			√
106	NY "P"		√						√		√			√
107	NY "N"			√					√			√		√
108	NY "S"		√						√		√			√
109	NY "H"			√					√		√			√
110	NY "A"	√							√		√			√
111	NY "F"		√						√		√			√
112	NY "H"			√					√		√			√
113	NY "S"			√					√			√		√
114	NY "R"			√					√		√		√	
115	NY "W"	√							√		√			√
116	NY "S"		√						√		√			√
117	NY "H"			√				√			√			√
118	NY "S"		√						√		√			√
119	NY "H"		√						√		√			√
120	NY "K"		√						√		√			√
121	NY "N"	√							√		√		√	
122	NY "N"		√						√		√			√
123	NY "R"	√							√		√			√
124	NY "L"			√				√				√		
125	NY "S"	√							√			√		√
126	NY "S"					√			√		√			√

127	NY "K"			√						√		√			√
128	NY "J"		√							√		√		√	
129	NY "H"		√							√		√			√
130	NY "A"				√		√					√			√
131	NY "H"	√								√		√			√
132	NY "H"	√								√	√			√	
133	NY "R"			√						√		√		√	
134	NY "R"			√						√		√			√
135	NY "R"		√							√			√		√
136	NY "A"			√						√			√		√
137	NY "R"		√							√	√			√	
138	NY "H"		√							√		√		√	
139	NY "R"		√							√	√			√	
140	NY "R"			√						√	√			√	
141	NY "J"	√								√		√		√	
142	NY "S"	√								√	√			√	
143	NY "S"	√								√		√		√	
144	NY "R"		√							√		√			√
145	NY "T"			√						√		√			√
146	NY "A"	√								√		√		√	
147	NY "S"	√								√		√			√
148	NY "N"		√							√		√			√
149	NY "R"		√							√		√			√
150	NY "H"		√							√		√			√
151	NY "I"		√							√	√				√
152	NY "M"		√							√		√		√	
153	NY "C"		√							√			√		
154	NY "S"		√							√		√			√
155	NY "E"	√								√		√		√	
156	NY "H"			√						√		√			√
157	NY "S"			√						√		√			√
158	NY "W"		√							√		√		√	
159	NY "H"			√					√			√			

160	NY "M"		√						√		√			√
161	NY "S"		√						√		√			√
162	NY "R"					√	√				√			√
163	NY "A"		√						√		√			√
164	NY "H"			√					√		√		√	
165	NY "R"		√						√		√			√
166	NY "R"			√					√		√			√
167	NY "S"		√						√		√			√
168	NY "N"		√						√		√		√	
169	NY "S"		√						√		√			√
170	NY "I"				√		√				√			√
171	NY "S"		√						√	√				√
172	NY "M"			√					√		√		√	
173	NY "R"		√						√	√			√	
174	NY "U"	√							√	√			√	
175	NY "H"	√							√		√			√
176	NY "R"			√					√		√			√
177	NY "K"				√		√				√			√
178	NY "W"			√					√		√		√	
179	NY "I"			√					√		√		√	
180	NY "I"				√		√				√		√	
181	NY "N"	√							√		√		√	
182	NY "M"		√						√		√			√
183	NY "R"		√						√		√			√
184	NY "E"				√		√				√			√
185	NY "S"		√								√			√
186	NY "S"		√						√		√			√
187	NY "R"	√						√			√		√	
188	NY "E"		√						√		√		√	
189	NY "N"			√					√		√		√	
190	NY "J"		√						√		√			√
191	NY "N"	√							√			√		√
192	NY "H"	√						√			√		√	

193	NY "E"		√						√		√		√	
194	NY "N"					√			√		√			√
195	NY "R"		√						√		√			√
196	NY "I"	√							√		√		√	
197	NY "N"		√						√	√			√	
198	NY "S"	√							√		√			√
199	NY "S"		√						√		√		√	
200	NY "S"		√						√		√			√
201	NY "F"		√						√		√		√	
202	NY "E"				√				√		√		√	
203	NY "M"		√						√		√		√	
204	NY "M"	√							√		√			
205	NY "K"	√							√			√		√
206	NY "M"		√						√		√			√
207	NY "S"				√				√		√			√
208	NY "S"		√						√		√			√
209	NY "E"				√			√			√		√	
210	NY "J"				√			√			√		√	
211	NY "S"		√					√			√			√
212	NY "H"		√					√			√			√
213	NY "A"		√					√			√			√
214	NY "S"				√			√			√		√	
215	NY "E"					√		√				√		
216	NY "R"				√			√			√			√
217	NY "R"				√			√			√		√	
218	NY "H"	√									√		√	
219	NY "F"		√					√			√			√
220	NY "R"	√						√			√			√
221	NY "M"		√					√			√			√
222	NY "J"				√			√			√			√
223	NY "K"	√						√			√			√
224	NY "A"				√			√			√		√	
225	NY "R"	√						√				√		√

226	NY "S"		√						√		√		√	
227	NY "M"			√					√		√			√
228	NY "R"		√						√		√		√	
229	NY "S"			√					√			√		
230	NY "S"				√			√			√			√
231	NY "A"			√					√	√			√	
232	NY "Y"			√					√		√		√	
233	NY "S"		√						√		√		√	
234	NY "H"		√						√		√			√
235	NY "N"			√				√			√			√
236	NY "G"			√					√		√		√	
237	NY "M"				√		√				√		√	
238	NY "N"			√					√		√			√
239	NY "S"	√							√		√			
240	NY "S"			√				√			√			√
241	NY "S"			√					√	√			√	
242	NY "M"		√						√		√		√	
243	NY "S"	√						√				√		
244	NY "Y"				√		√					√	√	
245	NY "H"		√						√		√		√	
246	NY "N"		√						√		√		√	
247	NY "R"		√						√		√			√
248	NY "M"				√		√				√			√

KETERANGAN :

- PT** = Perguruan Tinggi
- TS** = Tidak Sekolah
- P.N** = Pegawai Negeri
- P.S** = Pegawai Swasta
- WS** = Wiraswasta
- TB** = Tinggi Badan
- BB** = Berat Badan
- IMT** = Indeks Masa Tubuh

K = **Kurus**
N = **Normal**
OV = **Overweight**
OB = **Obesitas**




N

AS	BB	TB	IMT			
			K	N	OV	OB
	39	148	√			
	44	147		√		
	75	157				√
	65	153			√	
	55	157		√		
	49	151		√		
	49	147		√		
	79	159				√
	62	149			√	
	63	158			√	
	48	159		√		
	41	156	√			
	54	153			√	
	55	154			√	
	64	142				√
	51	153		√		
	55	163		√		
	54	149			√	
	47	150		√		
	51	161		√		
	55	150			√	
	46	154		√		
	41	149	√			
	30	156	√			
	60	160			√	
	77	166			√	
	47	155		√		




	50	150		√		
	64	155			√	
	62	152			√	
	52	147			√	
	91	162				√
	59	152			√	
	44	148		√		
	74	160			√	
	55	147			√	
	47	148		√		
	42	142		√		
	45	157	√			
	59	152			√	
	59	150			√	
	45	152		√		
	54	156		√		
	66	152			√	
	56	159		√		
	56	158		√		
	48	151		√		
	66	157			√	
	59	153			√	
	56	156			√	
	51	157		√		
	45	150		√		
	56	156			√	
	49	151		√		
	60	158			√	
	50	148		√		
	45	152		√		
	64	156			√	
	72	156			√	
	45	149		√		



	70	157			√	
	45	158	√			
	58	144			√	
	44	159	√			
	50	151		√		
	84	154				√
	51	154		√		
	51	153		√		
	55	150			√	
	57	151			√	
	46	145		√		
	45	143		√		
	41	145		√		
	56	160		√		
	56	160		√		
	37	144	√			
	56	160		√		
	51	155		√		
	56	147			√	
	66	143				√
	56	151			√	
	46	151		√		
	45	156		√		
	64	164			√	
	51	150		√		
	42	154	√			
	62	154			√	
	60	154			√	
	48	152		√		
	53	155		√		
	53	155		√		
	44	145		√		
	63	159			√	




	53	161		√		
	63	160			√	
	51	155		√		
	51	163		√		
	65	152			√	
	75	167			√	
	60	154			√	
	56	157		√		
	42	151	√			
	46	154		√		
	55	157		√		
	65	154			√	
	60	162			√	
	64	155			√	
	49	152		√		
	47	151		√		
	51	151		√		
	49	153		√		
	56	152			√	
	46	152		√		
	54	160		√		
	59	146			√	
	50	145			√	
	72	167			√	
	61	162			√	
	54	151			√	
	66	148				√
	44	147		√		
	59	155			√	
	57	149			√	
√	46	158	√			
	61	155			√	
	49	165	√			




	80	151				√
	55	154			√	
	54	146			√	
	77	164			√	
	47	148		√		
	38	153	√			
	46	151		√		
	55	150			√	
	58	150			√	
	65	150			√	
	42	154	√			
	40	141		√		
	50	158		√		
	56	165		√		
	55	151			√	
	51	156	√			
	82	162				√
	74	146				√
	49	157		√		
	38	151	√			
	59	161		√		
	40	146		√		
	46	159	√			
	53	162		√		
	57	156			√	
	52	154		√		
√	62	161			√	
	45	146		√		
	46	159	√			
	58	143			√	
	55	159	√			
	46	156				√
√	82	160			√	



	57	152			√	
	56	155				√
	76	155	√			
	40	152		√		
	47	145	√			
	44	160			√	
	55	154			√	
	70	162			√	
	64	162			√	
	65	165			√	
	73	156	√			
	37	144		√		
	55	159				√
	85	152		√		
	55	157		√		
	59	165			√	
	58	158				√
	86	154		√		
	47	146		√		
	47	159		√		
	52	160			√	
	55	153			√	
	61	155			√	
	65	148			√	
	67	151		√		
	51	163				√
	69	150			√	
	41	155	√			
	53	156		√		
	53	156		√		
	42	147		√		
	65	150			√	
	86	161				√



	24	155	√			
	25	159	√			
	21	156	√			
	22	165	√			
	42	148		√		
	38	139		√		
	35	144	√			
	74	154				√
	54	154		√		
	54	157		√		
	60	157			√	
√	60	153			√	
	58	159		√		
	43	156	√			
	58	158			√	
	66	153			√	
	47	148		√		
	153	152		√		
	65	158			√	
	56	152			√	
	49	152		√		
	47	154		√		
√	66	152			√	
	65	163			√	
	45	150		√		
	45	161	√			
	47	145		√		
	48	152		√		
	73	166			√	
	56	154			√	
	40	154	√			
	50	146			√	
	53	148			√	



	69	162			√	
	52	152		√		
	56	148			√	
√	55	156		√		
	58	145			√	
	45	148		√		
	55	162		√		
	38	144	√			
	53	155		√		
	44	145		√		
	73	150				√
	61	156			√	
	43	140		√		
√	61	164		√		
	60	150			√	
	50	154		√		
	48	158		√		
√	71	153				√
	68	164			√	
	49	147		√		
	60	151			√	
	54	150			√	
	49	156		√		

