

**GAMBARAN UMUM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI SUNTIK
DI PUSKESMAS PLUS BARA-BARAYA MAKASSAR
TAHUN 2011**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan
Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH :

NUR RAHMADANI

70400009030

**PRODI KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Agustus 2012

Penyusun

Nur Rahmadani



LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nur Rahmadani

Nim : 70400009030

Judul : Gambaran Umum Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik di Puskesmas
Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2011.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI) Program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2012.

Makassar, 27 Agustus 2012

Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S

Firdayanti,S.Si.T,M.Keb
Nip: 19751113 200604 2 001

Mengetahui :
Ketua Prodi Kebidanan
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Gambaran Umum Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2011**” yang disusun oleh **Nur Rahmadani, Nim : 70400009030**, mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 27 Agustus 2012
09 Syawal 1433 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Dr.dr.H.Rasjidin Abdullah, MPH.,MH.Kes. (.....)
Sekretaris : Drs. Wahyuddin G, M.Ag. (.....)
Pembimbing : Firdayanti, S.Si.T,M.Keb. (.....)
Penguji I : dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A,M.Kes. (.....)
Penguji II : Drs. Sabir Maidin, M.Ag. (.....)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes
NIP.19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini, dengan judul **“Gambaran Umum Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2011”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program DIII Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Salam dan Shalawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para orang yang senantiasa mengikuti sunah-Nya.

Selama proses penyelesaian Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, berkat petunjuk, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak maka hambatan dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ibu saya Sutia, S.Pd.I yang selalu mendo'akan ananda, ayahanda yang telah tiada Almarhum Rajadeng, S.Pd.I yang semasa hidupnya telah berjuang dengan segala ketulusan dan kesabaran dalam membesarkan, mengasuh, mendidik dan membina penulis hingga mampu menggapai suatu cita-cita yang mulia. Demikian pula kepada Suamiku serta

adik-adikku yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., Ms, selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Bapak Dr.dr. Rasyidin Abdullah, MPH., MH.Kes, selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
4. Ibu Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb, selaku ketua prodi kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md.Keb.
5. Ibu Firdayanti, S.Si.T., M.Keb, selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
6. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes, selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Bapak Drs. Muh. Sabir Maidin, M.Ag, selaku penguji agama yang telah memberikan masukan dan bimbingan baca Al-Qur'an kepada peneliti.

8. Para Dosen dan seluruh staf UIN Alauddin terkhusus pada Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menuntut ilmu dalam prodi Kebidanan.
9. Teman-teman seperjuanganku yang tak bisa disebut satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian studi ini.

Penulis telah berusaha menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dengan sebaik-baiknya, namun sebagai manusia biasa, penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para peneliti selanjutnya. Amin.

Makassar, 27 Agustus 2012

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Nur Rahmadani


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Kontrasepsi	7
B. Tinjauan Umum tentang Kontrasepsi Suntik	11
C. Tinjauan Umum Variable yang di Teliti	25
D. Tinjauan Islam tentang Alat Kontrasepsi.....	27
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel	33

B. Kerangka Konsep	37
C. Definisi Operational Dan Objektif Variabel Yang Di Teliti.....	37
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	40
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	41
F. Metode Analisa Data	41
G. Etika penelitian.....	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan	46
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Hal
Grafik 5.1 Penggunaan Responden berdasarkan Umur.....	43
Grafik 5.2 Penggunaan Responden berdasarkan Paritas.....	44
Grafik 5.3 Penggunaan Responden berdasarkan Pendidikan.....	45



DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
AKBK	: Alat Kontrasepsi Bawah Kulit
AKDR	: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
DMPA	: Depo Medroksi progesteron Asetat
Net-EN	: <i>Norethindrone Enanthate</i>
FSH	: <i>Follicle Stimulating Hormone</i>
IM	: Intra Muscular
LH	: <i>Luteinizing Hormone</i>
MOP	: Metode Operasi Pria
MOW	: Metode Operasi Wanita
PUS	: Pasangan Usia Subur

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Kegiatan Konsultasi.
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran III : Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Walikota Makassar.
- Lampiran IV : Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Makassar/Walikota Makassar kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Lampiran V : Surat Izin Penelitian dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Kepala Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar.
- Lampiran VI : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar
- Lampiran VII : Master Tabel Penelitian
- Lampiran VIII : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Nur Rahmadani, 70400009030
Nim : 70400009030
Judul : “Gambaran Umum Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar”.

Keluarga berencana adalah suatu metode/cara yang digunakan oleh pasangan usia subur untuk menjarangkan kehamilan/kelahiran dengan menggunakan obat, secara alami, ataupun dengan alat dan operasi yang akan berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah, ataupun keluarga itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang penggunaan alat kontrasepsi suntik di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2011. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Jumlah sampel 186 akseptor KB suntik dan data yang diambil adalah ibu yang menggunakan alat kontrasepsi suntikan yang tercatat di buku rekap medik di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2011.

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan alat kontrasepsi suntik di Puskesmas Plus Bara-Baraya Tahun 2011. Jumlah akseptor KB suntikan berdasarkan umur 20-35 tahun sebanyak 142 orang (76.34%) sedangkan <20 dan >36 tahun sebanyak 44 orang (23.65%). Jumlah akseptor KB jenis suntikan berdasarkan paritas 1-3 sebanyak 153 orang (82.25%) sedangkan ≥ 4 sebanyak 33 orang (17.74%). Jumlah akseptor KB jenis suntikan berdasarkan tingkat pendidikan maksimal tamat SLTP sebanyak 94 orang (50,5%) sedangkan tingkat pendidikan maksimal tamat SLTA sebanyak 92 orang (49,5%).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik menurut umur lebih banyak yang menggunakan pada umur 20-35 tahun di bandingkan umur <20 dan >36, menurut paritas lebih banyak paritas 1-3 dibandingkan ≥ 4 , sedangkan menurut tingkat pendidikan lebih banyak yang menggunakan pada pendidikan maksimal tamat SLTP di banding pendidikan maksimal tamat SLTA.

Kata Kunci: alat kontrasepsi, jenis suntik, paritas, pendidikan, umur.

Daftar Pustaka: 24 (2000-2011).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi. Program Keluarga Berencana (KB) menurunkan fertilitas agar dapat mengurangi beban pembangunan demi terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa Indonesia seperti yang disebutkan dalam UU No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Program KB merupakan suatu usaha langsung yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program alat kontrasepsi secara konsisten dan bersinambungan, selain itu program ini memiliki visi keluarga berkualitas 2015 di mana keluarga berkualitas disini adalah keluarga sejahtera, maju, mandiri, jumlah anak yang ideal berwawasan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

Keluarga berencana adalah suatu metode/cara yang digunakan oleh pasangan usia subur untuk menjarangkan kehamilan/kelahiran dengan menggunakan obat, secara alami, ataupun dengan alat dan operasi yang akan berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah, ataupun keluarga itu sendiri. Sampai sekarang cara kontrasepsi yang ideal belum ada. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu metode kontrasepsi yang baik adalah aman, berdaya guna, dapat diterima bukan hanya oleh klien tetapi juga oleh lingkungan

budaya dimasyarakat, bila metode tersebut dihentikan penggunaannya, klien akan segera kembali kesuburannya, kecuali untuk kontrasepsi mantap, dapat dipercaya, murah harganya dan terakhir dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan (Wiknjosastro, dkk, 2008).

Salah satu jenis kontrasepsi efektif yang menjadi pilihan kaum ibu adalah KB suntik, ini disebabkan karena aman, efektif, sederhana dan murah. Cara ini mulai disukai masyarakat dan diperkirakan setengah juta pasangan memakai kontrasepsi suntikan untuk mencegah kehamilan. Namun demikian KB suntik juga mempunyai banyak efek samping, seperti amenorea (30%), spotting (bercak darah) dan menoragia, seperti halnya dengan kontrasepsi hormonal lainnya dan dijumpai pula keluhan mual, sakit kepala (<1-17%), galaktorea (90%), perubahan berat badan (7-9%) (Hartanto, 2005).

Pada tahun 2011 pasangan usia subur yang berhasil digalang BKKBN Kota Makassar menjadi akseptor baru mencapai 51.208 pasangan atau 112% dari target 45.720 pasangan. Sementara pencapaian akseptor aktif tahun 2011 mencapai 127.045 pasangan, melebihi target 120% yang ditetapkan yakni sekitar 105.645 pasangan.

Berdasarkan catatan/data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh informasi bahwa yang menggunakan alat kontrasepsi 2011 yakni 25.241.737 akseptor. Untuk pemakaian kontrasepsi tertinggi adalah pengguna kontrasepsi suntikan sebanyak 166.424 akseptor (115.18%) (Data BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, 2011).

Data yang diperoleh dari dinas kesehatan 2011 tentang penggunaan alat kontrasepsi di wilayah Makassar dari jumlah PUS yaitu 227.596 orang adalah untuk penggunaan alat kontrasepsi suntik yang tetap menjadi urutan pertama adalah sebanyak 18.700 akseptor baru, 10.104 akseptor lama (Data Dinas Kesehatan, 2011).

Adapun data yang didapat dari Puskesmas Plus Bara-baraya yang merupakan salah satu Puskesmas yang dilengkapi dengan pelayanan Keluarga Berencana dimana terdapat jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 7240 di wilayah puskesmas, untuk penggunaan alat kontrasepsi yang tetap jadi urutan pertama adalah suntik sebanyak 4018 akseptor (Data Puskesmas Plus Bara-baraya, 2011).

Banyak faktor yang memengaruhi kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi suntikan antara lain pendapatan/ekonomi, umur, pendidikan, keluarga, pekerjaan, efek samping, paritas, kegagalan kontrasepsi, tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada gambaran umum dalam pemakaian alat kontrasepsi suntikan yaitu umur, paritas dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan asumsi pada latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul Gambaran Umum Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar Tahun 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran umum penggunaan alat kontrasepsi suntik di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar tahun 2011 berdasarkan umur ?
2. Bagaimanakah gambaran umum penggunaan alat kontrasepsi suntik di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar tahun 2011 berdasarkan paritas ?
3. Bagaimanakah gambaran umum penggunaan alat kontrasepsi suntik di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar tahun 2011 berdasarkan tingkat pendidikan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran umum tentang penggunaan alat kontrasepsi suntik di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2011.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui penggunaan alat kontrasepsi suntik menurut umur di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2011.
- b. Untuk mengetahui penggunaan alat kontrasepsi suntik menurut paritas di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2011.
- c. Untuk mengetahui penggunaan alat kontrasepsi suntik menurut tingkat pendidikan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program baik Departemen Kesehatan maupun pihak dari Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar.

2. Manfaat ilmiah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat institusi

Sebagai bahan acuan yang di harapkan dapat bermanfaat terutama dalam pengembangan institusi.

4. Manfaat penulis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan ujian akhir di jenjang D-III Kebidanan.
- b. Merupakan pengalaman ilmiah yang berharga dan dapat menambah pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis tentang faktor yang berhubungan dengan penggunaan alat kontrasepsi.

5. Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan sebagai sumber informasi tentang alat kontrasepsi sehingga nantinya masyarakat lebih paham dengan tentang penggunaan alat kontrasepsi dan mampu membantu pemerintah untuk melaksanakan program Keluarga Berencana.

6. Manfaat bagi keluarga

Diharapkan sebagai sumber informasi atau media penyuluhan tentang alat kontrasepsi sehingga keluarga tidak salah memilih dan mampu menciptakan keluarga kecil bahagia sejahtera.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi

1. Pengertian

Istilah Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti “melawan” atau “mencegah”, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan. Jadi, pengertian kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan (Wiknjosastro, dkk, 2008).

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap. Kontrasepsi dapat dilakukan tanpa menggunakan alat, secara mekanis, menggunakan obat alat, atau dengan operasi (Arief Masjoer, 2001).

Kontrasepsi menurut WHO *Expert Commite* adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk :

- a. Mendapatkan objektif-objektif tertentu
- b. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan
- c. Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan
- d. Mengatur interval diantara kehamilan
- e. Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan suami istri
- f. Menentukan jumlah anak dalam keluarga

2. Macam-Macam Metode Kontrasepsi

- a. Metode kontrasepsi sederhana
 1. Kondom
 2. Coitus Interruptus
 3. Keluarga Berencana Alami
 4. Diafragma/ servikal Cup
 5. Kontrasepsi Kimiawi/ spermicidal
- b. Metode kontrasepsi efektif
 1. Pil KB
 2. Suntikan KB
 3. AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit)/Implant
 4. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)/IUD
- c. Metode Kontrasepsi Mantap
 1. MOP (Metode Kontrasepsi Pria): Vasektomi
 2. MOW (Metode Kontrasepsi Wanita): Tubektomi

3. Tujuan Program KB

Tujuan program keluarga berencana adalah untuk meningkatkan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat atau angka kematian ibu dan bayi, mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang merupakan sumber daya manusia dengan mengendalikan kelahiran dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia.

4. Syarat-syarat kontrasepsi

Banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan jenis kontrasepsi karena terbatasnya metode yang tersedia, dan ketidaktahuan mereka tentang persyaratan dan keamanan metode kontrasepsi yang aman dan efektif bagi semua klien. Oleh karena itu berbagai faktor harus dipertimbangkan, seperti status kesehatan, efek samping potensial, konsekuensi kegagalan dan kehamilan yang tidak diinginkan, rencana besarnya jumlah keluarga, persetujuan pasangan, norma budaya lingkungan bahkan persetujuan orangtua (Saroaha, 2009).

Sampai sekarang cara kontrasepsi yang ideal belum ada. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu metode kontrasepsi yang baik adalah:

- a. Aman, artinya tidak akan menimbulkan komplikasi berat bila digunakan.
- b. Berdaya guna, artinya bila digunakan sesuai dengan aturan akan dapat mencegah terjadinya kehamilan.
- c. Dapat diterima bukan hanya oleh klien tetapi juga oleh lingkungan budaya dimasyarakat.
- d. Bila metode tersebut dihentikan penggunaannya, klien akan segera kembali kesuburannya, kecuali untuk kontrasepsi mantap.
- e. Dapat dipercaya.
- f. Tidak meninggalkan efek yang mengganggu kesehatan.
- g. Daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan.

- h. Tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan koitus.
- i. Tidak memerlukan motivasi yang secara terus menerus.
- j. Mudah pelaksanaannya.
- k. Murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- l. Dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan (Wiknjosastro, dkk, 2008).

5. Cara Kerja Kontrasepsi

- a. Mencegah ovulasi yaitu Kadar progesterin tinggi sehingga menghambat lonjakan *luteinizing hormone* (LH) secara efektif sehingga tidak terjadi ovulasi. Kadar *follicle-stimulating hormone* (FSH) dan LH menurun dan tidak terjadi lonjakan LH (LH Surge). Menghambat perkembangan folikel dan mencegah ovulasi. Progesteron menurunkan frekuensi pelepasan (FSH) dan (LH) .
- b. Lendir serviks menjadi kental dan sedikit, mengalami penebalan mukus serviks yang mengganggu penetrasi sperma. Perubahan - perubahan siklus yang normal pada lendir serviks. Sekret dari serviks tetap dalam keadaan di bawah pengaruh progesteron hingga menyulitkan penetrasi spermatozoa.
- c. Membuat endometrium menjadi kurang layak/baik untuk implantasi dari ovum yang telah di buahi, yaitu mempengaruhi perubahan-perubahan menjelang stadium sekresi, yang diperlukan sebagai

persiapan endometrium untuk memungkinkan nidasi dari ovum yang telah dibuahi.

- d. Mempengaruhi kecepatan transpor ovum di dalam tuba fallopi atau memberikan perubahan terhadap kecepatan transportasi ovum (telur) melalui tuba.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih kontrasepsi adalah :

- a. Faktor pasangan: usia, gaya hidup, frekuensi senggama, jumlah keluarga yang diinginkan, pengalaman dengan kontrasepsi yang lalu, sikap kewanitaan, sikap keperiaan.
- b. Faktor kesehatan: kontraindikasi absolut atau relative: status kesehatan, riwayat haid, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul.
- c. Faktor metode kontrasepsi: penerimaan dan pemakaian berkesinambungan dipandang dari pihak calon akseptor dan pihak medis (petugas KB), efektifitas, efek samping minor, kerugian, biaya dan komplikasi potensial (Saroha, 2009).

B. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Suntik

1. Pengertian Kontrasepsi Suntik

Kontrasepsi suntik adalah cairan atau obat yang digunakan untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel

telur yang matang dan sel sperma, dimana bahan bakunya mengandung hormon estrogen dan progesterone. (Glasia.A, Gebbie.A, 2005)

2. Jenis-Jenis Kontrasepsi Suntik

Terdapat dua jenis kontrasepsi suntik yang beredar di Indonesia yaitu:

1) Kontrasepsi Progestin

a) Macam-macam kontrasepsi progestin

Adapun macam-macam kontrasepsi progestin antara lain :

(1) Depo Medroksiprogesteron Asetat

Mengandung 150 mg DMPA, yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara di suntik intramuskular. Setelah suntikan pertama, kadar DMPA dalam darah mencapai puncak setelah 10 hari. DMPA dapat memberi perlindungan dengan aman selama tiga bulan.

(2) Depo Norethindrone Enanthate

Mengandung 200 mg NET-EN (Norethindrone Enanthate), diberikan setiap 2 bulan dengan cara disuntik intramuskular.

Kontrasepsi ini Sangat efektif, aman, dapat dipakai oleh semua perempuan dalam usia reproduksi, kembali kesuburan lebih lambat, kira-kira 3-4 bulan, tidak menekan produksi ASI sehingga cocok untuk masa laktasi. (Saifuddin, 2010)

b) Mekanisme kerja suntikan progestin

- (1) Menghalangi pengeluaran FSH dan LH sehingga tidak terjadi pelepasan ovum.
- (2) Mengentalkan lendir serviks, sehingga sulit ditembus spermatozoa.
- (3) Mengganggu peristaltik tuba fallopi, sehingga konsepsi dihambat.
- (4) Mengubah suasana endometrium, sehingga tidak sempurna untuk implantasi hasil konsepsi (Manuaba dkk, 2010).

c) Efektifitas suntikan progestin

Kontrasepsi suntik memiliki efektifitas tinggi, kurang dari 1 % dari 100 wanita akan mengalami kehamilan dalam 1 tahun pemakaian DMPA. Kontrasepsi suntik sama efektifnya dengan (Pil Oral Kombinasi) POK dan lebih efektif dari IUD (Hartanto 2004).

Efektif dapat terjaga apabila penyuntikan dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan (Saifuddin 2006).

d) Keuntungan suntikan progestin

- (1) Sangat efektif, dan mempunyai efek pencegahan kehamilan jangka panjang.
- (2) Tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri.
- (3) Tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung, dan gangguan pembekuan darah.
- (4) Tidak berpengaruh terhadap ASI.

- (5) Efek samping sedikit.
 - (6) Klien tidak perlu menyimpan obat suntik.
 - (7) Dapat digunakan oleh perempuan yang berusia diatas 35 tahun sampai perimenopause.
 - (8) Mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik.
 - (9) Menurunkan kejadian penyakit kangker payudara.
 - (10) Mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul.
- e) Keterbatasan suntikan progestin
- (1) Sering ditemukan gangguan haid. Pola haid yang normal dapat berubah menjadi amenorea perdarahan tidak teratur, perdarahan bercak, perubahan dalam frekuensi, lama dan banyaknya darah yang keluar, atau tidak haid sama sekali.
 - (2) Pada waktu tertentu harus kembali untuk mendapat suntikan
 - (3) Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya
 - (4) Peningkatan berat badan
 - (5) Tidak menjamin perlindungan terhadap infeksi menular seksual, infeksi HIV, Hepatitis B virus
 - (6) Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian, bukan karena terjadinya kerusakan/kelainan pada organ genitalia, melainkan karena belum habisnya pelepasan obat suntikan dari deponya (tempat suntikan).

(7) Pada penggunaan jangka panjang, terjadi perubahan pada lipid serum, dapat sedikit menurunkan densitas (kepadatan) tulang, dapat menimbulkan gangguan emosi (tetapi jarang), sakit kepala, jerawat, nervositas.

f) Indikasi suntikan progestin

- (1) Usia reproduksi, nullipara dan yang telah memiliki anak.
- (2) Menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan memiliki efektivitas tinggi.
- (3) Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai.
- (4) Setelah melahirkan dan tidak menyusui.
- (5) Setelah abortus atau keguguran.
- (6) Telah mempunyai banyak anak tetapi belum menginginkan tubektomi.
- (7) Perokok.
- (8) Tekanan darah, kurang 180/110 mmHg, masalah gangguan pembekuan darah atau anemia.
- (9) Menggunakan obat untuk epilepsi (fenitoin dan barbiturat) atau obat untuk tuberculosis (rifampisin).
- (10) Tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen.
- (11) Sering lupa menggunakan pil kontrasepsi.
- (12) Mendekati usia menopause dan tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi kombinasi.

g) Kontra indikasi suntikan progestin

- (1) Hamil atau dicurigai hamil karena risiko cacat pada janin 7 per 100.000 kelahiran.
- (2) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya.
- (3) Tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid, terutama amenorea.
- (4) Menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara.
- (5) Diabetes mellitus disertai komplikasi.
- (6) Kanker pada traktus genitalia.
- (7) Waktu mulai penggunaan kontrasepsi suntikan progestin.
- (8) Setiap saat siklus haid, asal ibu tersebut diyakini tidak hamil, mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid.
- (9) Perempuan yang menggunakan kontrasepsi hormonal lain dan ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan. Bila kontrasepsi sebelumnya sebelumnya dipakai dengan benar dan ibu tidak hamil, suntikan pertama dapat segera diberikan. Tidak perlu menunggu haid berikutnya datang.
- (10) Bila ibu sedang menggunakan kontrasepsi non hormonal dan ingin menggantinya dengan kontrasepsi hormonal, suntikan pertama kontrasepsi hormonal yang akan diberikan dapat segera disuntikkan, asal saja ibu tidak hamil. Pemberian tidak perlu menunggu haid berikutnya datang. Bila ibu disuntik setelah hari

ke-7 haid, maka selama tujuh hari setelah suntikan ibu tidak boleh bersenggama.

h) Mulai menggunakan kontrasepsi suntikan progestin

Adapun waktu mulai menggunakan kontrasepsi suntikan progestin adalah sebagai berikut:

- (1) Mulai hari pertama sampai hari ke 7 siklus haid.
- (2) Pada ibu yang tidak haid, injeksi pertama dapat diberikan setiap saat, asalkan saja ibu tersebut tidak hamil. Selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual.
- (3) Ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal lain dan ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan. Bila ibu telah menggunakan kontrasepsi hormonal sebelumnya secara benar, dan ibu tersebut tidak hamil, suntikan pertama dapat segera diberikan. Tidak perlu menunggu sampai haid berikutnya datang.
- (4) Bila ibu sedang menggunakan jenis kontrasepsi jenis lain dan ingin menggantinya dengan jenis kontrasepsi suntikan yang lain lagi, kontrasepsi suntikan yang akan diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi suntikan sebelumnya.
- (5) Ibu yang menggunakan kontrasepsi non hormonal dan ingin menggantinya dengan kontrasepsi hormonal, suntikan pertama kontrasepsi hormonal yang akan diberikan dapat segera diberikan, asal saja ibu tersebut tidak hamil, dan pemberiannya

tidak perlu menunggu haid berikutnya datang. Bila ibu disuntik setelah hari ke 7 haid, ibu tersebut selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual.

i) Cara penyuntikan kontrasepsi suntikan

- (1) Kontrasepsi suntikan DMPA, setiap 3 bulan dengan dosis 150 mg secara intramuscular yang dalam didaerah pantat (bila suntikan terlalu dangkal, maka penyerapan kontrasepsi suntikan berlangsung lambat, tidak bekerja segera dan efektif). Suntikan diberikan setiap 90 hari, tidak melakukan massase pada tempat suntikan.
- (2) Memberikan kontrasepsi suntikan Noristerat dalam dosis 200 mg sekali setiap 8 minggu untuk 6 bulan pertama (sama dengan 3 kali suntikan pertama), kemudian untuk selanjutnya sekali setiap 12 minggu.
- (3) Bersihkan kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol yang telah dibasahi dengan isopropyl alkohol 60%-90%. Tunggu dulu sampai kulit kering, baru disuntik.
- (4) Kocok obat dengan baik, dan hindarkan terjadinya gelembung-gelembung udara. Kontrasepsi suntikan ini tidak perlu didinginkan. Bila terdapat endapan putih padat pada dasar ampul, upayakan menghilangkannya dengan menghangatkannya.
- (5) Semua obat harus diisap ke dalam obat suntiknya.

j) Efek samping

(1) Meningkatkan/menurunnya berat badan 1 – 2 kg

1. Konseling

Menjelaskan pada calon akseptor bahwa kenaikan BB adalah salah satu efek samping kontrasepsi suntikan. Penyebab bertambahnya BB terjadi karena bertambahnya lemak tubuh dan bukan karena retensi cairan tubuh. Hipotesa para ahli: DMPA merangsang pusat pengendalian nafsu makan pada hipotalamus yang menyebabkan nafsu makan akseptor meningkat daripada biasanya (Hartanto, 2004).

2. Pengobatan

Diet merupakan pilihan utama, dianjurkan untuk melaksanakan diet rendah kalori, disertai olahraga teratur.

Bila berat badan berlebihan dianjurkan untuk cara kontrasepsi lain (Saifuddin, 2003).

(2) Gangguan haid

Terdapat berbagai istilah bagi gangguan haid yaitu:

1. Amenore adalah tidak datangnya haid selama akseptor mengikuti suntikan KB selama 3 bulan berturut-turut atau lebih
2. Spotting adalah bercak-bercak perdarahan diluar haid yang terjadi selama akseptor mengikuti kb suntik.

3. Metrorrhagie adalah perdarahan yang berlebih diluar siklus haid
4. Menometrhagie adalah datangnya haid yang berlebih jumlahnya tetapi dalam siklus haid.

(Wiknjosastro.H,2008)

(3) Mual, muntah, sakit kepala, panas dingin, pegal-pegal, nyeri perut, jerawat dan lain-lain. (Suratun, dkk 2008).

(4) Tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual, hepatitis B virus, atau infeksi virus HIV. Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian bukan karena terjadinya kerusakan atau kelainan pada organ genitalia, melainkan karena belum habisnya pelepasan obat suntikan dari deponya (tempat suntikan). Pada penggunaan jangka panjang yaitu diatas 3 tahun penggunaan dapat menurunkan kepadatan tulang, menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido. (Wiknjosastro.H,2008)

k) Instruksi yang perlu diberikan

Klien harus kembali ke klinik untuk mendapatkan suntikan kembali, setiap 12 minggu untuk DMPA, dan setiap 8 minggu untuk Noristerat (Saroha, 2009).

2) Suntikan Kombinasi

Suntikan kombinasi yaitu 25 mg Depo Medrosi Progesteron Asetat dan 5 mg Estradiol Sipionst yang diberikan injeksi IM sebulan

sekali (Cyclofem) dan 50 mg Noretindron Enantat dan 5 mg Estradiol Valerat yang diberikan injeksi IM sebulan sekali. (Mansjoer.A, dkk. 2001).

a) Cara kerja

- (1) Menekan ovulasi
- (2) Membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu
- (3) Perubahan pada endometrium (atrofi) sehingga implantasi terganggu
- (4) Menghambat transportasi gamet oleh tuba

b) Keuntungan

- (1) Sangat efektif (0,1-0,4 kehamilan per 100 perempuan) selama tahun pertama penggunaan.
- (2) Risiko terhadap kesehatan kecil, efek samping sangat kecil
- (3) Tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri
- (4) Tidak perlu dilakukan pemeriksaan dalam
- (5) Jangka panjang
- (6) Klien tidak perlu menyimpan obat suntik

c) Kerugian/keterbatasan

- (1) Terjadi perubahan pola haid seperti haid tidak teratur, perdarahan bercak/spotting, atau perdarahan sampai 10 hari.
- (2) Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan. Biasanya keluhan ini akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga

- (3) Klien harus kembali setiap 30 hari untuk mendapatkan suntikan.
 - (4) Bila digunakan bersamaan dengan Fenitoin dan barbiturate (obat epilepsi) atau rifampisin (obat untuk tuberkulosis), efektifitasnya berkurang.
 - (5) Dapat menyebabkan efek samping serius seperti serangan jantung, stroke, bekuan darah pada paru atau otak dan kemungkinan timbulnya tumor hati.
 - (6) Peningkatan berat badan
 - (7) Tidak menjamin perlindungan terhadap infeksi menular seksual, hepatitis B virus atau HIV/AIDS.
 - (8) Pemulihan kesuburan kemungkinan terlambat setelah pemakaian pil berhenti.
- d) Indikasi suntikan kombinasi
- (1) Usia reproduksi, telah memiliki anak maupun belum
 - (2) Ingin menggunakan kontrasepsi dengan efektifitas tinggi
 - (3) Memberikan ASI pasca persalinan >6 bulan
 - (4) Pasca persalinan tetapi tidak menyusui
 - (5) Anemia
 - (6) Nyeri hebat, haid tidak teratur
 - (7) Riwayat kehamilan ektopik
 - (8) Sering lupa minum pil
- e) Kontra indikasi suntikan kombinasi
- (1) Hamil atau diduga hamil

- (2) Menyusui, kurang dari 6 minggu pasca persalinan
 - (3) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya
 - (4) Penyakit hati akut (virus hepatitis)
 - (5) Usia >35 tahun dan merokok
 - (6) Riwayat penyakit jantung, stroke, atau dengan tekanan darah tinggi (>180/110 mmHg)
 - (7) Riwayat kelainan tromboemboli, riwayat kencing manis >20 tahun
 - (8) Kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala atau migraine
 - (9) Keganasan pada payudara
- f) Waktu mulai menggunakan suntikan kombinasi
- (1) Suntikan pertama dapat diberikan dalam 7 hari siklus haid, dan tidak diperlukan kontrasepsi tambahan. Bila suntikan pertama diberikan setelah hari ke-7 siklus haid, klien tidak boleh bersenggama selama 7 hari atau menggunakan kontrasepsi lain selama 7 hari.
 - (2) Bila klien tidak haid dan dapat dipastikan ibu tidak hamil, suntikan pertama dapat diberikan setiap saat. Klien tidak boleh bersenggama untuk 7 hari lamanya atau menggunakan metode kontrasepsi lain selama 7 hari berikutnya.

- (3) Bila klien dalam pasca persalinan 6 bulan, menyusui dan telah mendapat haid, maka suntikan pertama dapat diberikan asal ibu dipastikan tidak hamil.
- (4) Bila pasca persalinan >6 bulan, menyusui dan telah mendapat haid, maka suntikan pertama dapat diberikan pada siklus haid hari 1 dan 7.
- (5) Bila pasca persalinan 3 minggu, serta tidak menyusui, suntikan kombinasi dapat diberikan.
- (6) Pasca keguguran, suntikan kombinasi dapat segera diberikan atau dalam waktu 7 hari.
- (7) Bila ibu sedang menggunakan metode kontrasepsi hormonal, dan ingin menggantinya dengan suntikan kombinasi, asal saja ibu tersebut menggunakan kontrasepsi sebelumnya dengan benar, maka suntikan kombinasi dapat diberikan sesuai dengan jadwal kontrasepsi sebelumnya dan tidak diperlukan kontrasepsi lain.
- (8) Ibu yang tidak menggunakan kontrasepsi non hormonal dan ingin menggantinya dengan suntikan kombinasi, asal saja diyakini ibu tidak hamil maka suntikan pertama dapat segera diberikan tanpa perlu menunggu datangnya haid. Bila perlu diberikan pada hari ke 1-7 siklus haid, tidak diperlukan metode kontrasepsi lain. Bila sebelumnya menggunakan AKDR, dan ingin menggantinya dengan suntikan kombinasi, maka suntikan

pertama diberikan pada hari 1-7 siklus haid dan AKDR segera dicabut.

g) Cara menggunakan suntikan kombinasi

Suntikan kombinasi diberikan setiap bulan dengan suntikan intramuskular dalam. Klien diminta datang setiap 4 minggu. Suntikan ulang dapat diberikan 7 hari lebih awal, dengan kemungkinan terjadi gangguan perdarahan. Dapat juga diberikan setelah 7 hari jadwal yang telah ditentukan, dimana ibu yakin bahwa dirinya tidak hamil ibu. Tidak dibenarkan melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan metode kontrasepsi yang lain untuk 7 hari saja (Saifuddin, 2010).

h) Efektifitas suntikan kombinasi

Pada suntikan kombinasi efektifitasnya 1-4 kehamilan per 1000 perempuan sebelum tahun pertama penggunaan, asal penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegagalan yang terjadi pada umumnya dikarenakan oleh ketidakpatuhan untuk datang pada jadwal suntikan yang telah ditentukan atau teknik penyuntikan yang salah. Injeksinya harus benar-benar intragluteal.

C. Tinjauan Tentang Variable Yang Diteliti

1. Umur

Menurut kamus bahasa Indonesia (Difa Damis), umur merupakan lama waktu hidup atau ada (mulai sejak dilahirkan atau diadakan sampai sekarang).

Umur adalah usia akseptor berdasarkan ulang tahun terakhir saat memakai kontrasepsi berdasarkan kartu akseptor KB, umur dikelompokkan menjadi <20 tahun, 20-29 tahun, 30-35 tahun, dan >35 tahun.

Dimana umur merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan unsur manusia yang mempunyai hubungan yang kuat antara tingkat kematian bayi dan infertilitas. Berkaitan dengan kesejahteraan ibu dan anak terutama wanita dalam masa kehamilan karena menurut Yamada dalam buku kehamilan, kelahiran, perawatan ibu dan bayi dalam konteks budaya usia ibu yang terlalu muda atau terlampau tua akan memberikan risiko terhadap kehamilan ibu.

Kematian maternal wanita hamil dan melahirkan pada usia <20 tahun dan kembali meningkat sesudah usia >30 tahun, ternyata 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-30 tahun (Pinem Saroha, 2009).

2. Paritas

Menurut Mantra (2006) kemungkinan seorang ibu untuk menambah kelahiran tergantung kepada jumlah anak yang telah

dilahirkannya. Seorang ibu mungkin menggunakan alat kontrasepsi setelah mempunyai jumlah anak tertentu dan juga umur anak yang masih hidup. Semakin sering seorang ibu melahirkan anak, maka akan semakin memiliki risiko kematian dalam persalinan. Hal ini berarti jumlah anak akan sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga secara maksimal.

Paritas secara umum adalah banyaknya kelahiran hidup atau mati yang dialami oleh seorang wanita (Damis,2001).

Paritas adalah banyaknya anak yang dimiliki oleh akseptor KB yang memakai kontrasepsi, jumlah anak dikelompokkan atas 0, 1, 2, 3, >4. Masalah ini yang terjadi karena banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan.(Kusumaningrum 2009)

3. Pendidikan

Orang yang berpendidikan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keluarga berencana dan akan menilai manfaat dan kerugian bagi dirinya dan keluarga, sehingga dapat menentukan sikap individu selanjutnya dan memasuki tingkat perkembangan berikutnya yaitu mencoba terlebih dahulu sebelum menolak dan menerima keluarga berencana. Sehingga pemilihan terhadap kontrasepsi sangat ditentukan pengetahuan akseptor akan kontrasepsi yang mana ditentukan oleh tingkat pendidikan. (Arif Rifai 2010)

D. Tinjauan Islam Tentang Alat Kontrasepsi

Program KB telah memperoleh dukungan dari Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini terlihat dengan penandatanganan bersama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Indonesia (BKKBN), *Memorandum of Understanding* (MoU) nomor 1 tahun 2007 dan nomor: 36/HK.101/F1/2007 tentang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program KB Nasional melalui Peran Lembaga Keagamaan (Kusumaningrum 2009).

Istilah Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti “melawan” atau “mencegah”, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. (Suratun dkk, 2008).

Dalam istilah Arab, KB juga memiliki arti yang sama dengan *tanzhim al nasl*, yaitu pengaturan keturunan atau kelahiran. Penggunaan KB dalam Islam sampai saat ini masih *pro kontra*, sebagian ulama mengatakan KB adalah membunuh (PP Muhammadiyah 2009).

Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan yang sangat banyak. Namun tentunya bukan asal banyak, tetapi berkualitas sehingga perlu dididik dengan baik supaya dapat mengisi alam semesta ini dengan manusia yang saleh dan beriman (Salim, As-Sayyid, 2010).

Pelaksanaan KB dibolehkan dalam ajaran Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya, dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikannya agar menjadi akseptor KB. Bahkan menjadi dosa baginya jika ia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak menyanggupi biaya hidup, kesehatan dan pendidikannya. Hal ini berdasarkan pada Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَحْشَ الْذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahan:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Contoh metode pencegah kehamilan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW adalah *azl* yakni mengeluarkan air mani di luar vagina istri atau yang lazim disebut senggama terputus, namun tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai mana disebutkan :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا

Artinya :

Dari Jabir berkata: “Kami melakukan *azl* di masa Rasulullah saw, dan Rasulullah saw mendengarnya tetapi tidak melarangnya (HR Muslim).

Sesuai dengan hadis diatas maka tindakan menghindari kehamilan hukumnya boleh dengan analogis hukum ‘*azl*. Adapun kontrasepsi yang

dibolehkan menurut agama yaitu: menggunakan system kelender, kondom pil, suntik, dan alat-alat kontrasepsi lain jika menurut agama tidak membahayakan, baik fisik maupun kejiwaan maka dibolehkan.

Adapun alat kontrasepsi yang dilarang menurut agama yaitu menggunakan alat-alat kontrasepsi yang mengakibatkan alat-alat reproduksi tidak berfungsi dan mengakibatkan tidak dapat keturunan baik pada pria maupun wanita dengan persetujuan ataupun tidak dengan motifasi agama atau lainnya, maka hukumnya haram. Dan para ulama sepakat mengharamkannya. Contoh yaitu: vasektomi (pemutusan saluran sperma), tubektomi (pemutusan saluran telur), dan hysterotomi (pengangkatan rahim) (Salim, As-Sayyid. 2010).

Mencegah kehamilan karena darurat yang jelas, seperti jika wanita tidak melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan harus melakukan operasi untuk mengeluarkan anaknya. Atau melambatkan untuk jangkau waktu tertentu karena kemaslahatan yang dipandang suami istri maka tidak mengapa untuk mencegah kehamilan atau menundanya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan sebagian besar para sahabat tentang bolehnya 'azl.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحْبِرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِمْ وَلَا يَحْمِلُنَّ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَرَعَةَ سَمِعَتْ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالَقُهَا (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada

kami Musa -yaitu Ibn Uqbah- telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Ibn Muhairiz dari Abu Sa'id Al Khudzri saat perang bani Musthaliq, bahwa para sahabat mendapatkan para tawanan wanita, dan mereka ingin menikmatinya (jimak) namun tidak menginginkan para tawanan wanita itu hamil. Maka mereka bertanya kepada nabi tentang 'azl (mengeluarkan sperma di luar kenaluan wanita), maka Nabi bertanya: 'Bukan sebaiknyakah kalian tidak melakukannya, sebab Allah telah menetapkan siapa saja yang hidup hingga hari kiamat tiba? Sedang Mujahid berkata dari Qaza'ah aku mendengar Abu Sa'id berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidaklahl manusia yang dicipta melainkan Allah lah yang menciptanya". (Diriwayatkan Bukhari)

Dari hadis diatas melakukan 'azl di bolehkan oleh Rasulullah SAW asal ada kesepakatan antara pasangan suami istri melakukan 'azl, dan bukan karena alasan takut miskin atau takut disalahkan tetapi dibolehkan dengan alasan pengaturan kehamilan.

Hukum KB dalam Islam dilihat dari 2 pengertian yaitu :

1. *Tahdid an-nasl* (pembatasan kelahiran)

Jika program KB dimaksudkan untuk membatasi kelahiran, maka hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran. Bahkan terdapat banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak anak. Misalnya, tidak bolehnya membunuh anak apalagi karena takut miskin atau tidak mampu memberikan nafkah. Al-Qur'an surat al-Isra ayat 31 menjelaskan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Dalam ayat tersebut diatas maka Allah memerintahkan agar orang tua menjaga anaknya, mulai dari dia dalam kandungan hingga dia menjadi dewasa sholeh dan sholehah, dan kata *nahnu* yang berarti “kamilah” Allah memberikan rejeki kepada umatnya jika ia berusaha mencari rejeki tersebut.

2. *Tanzhim an-nasl* (pengaturan kelahiran)

Jika program KB dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya mubah, bagaimanapun motifnya.

Karena Allah SWT mensyariatkan untuk hamba-Nya untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat Rasulullah SAW. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang artinya:

“Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang dan subur rahimnya, karena aku akan bangga di hadapan para nabi dengan banyaknya kalian pada hari kiamat nanti” (HR.Abu Daud dan an-Nasa’i).

Maksud dari hadis diatas adalah Allah menciptakan wanita dengan kesuburan agar memiliki umat yang banyak, sehingga mereka beribadah kepada Allah, berjihad di jalan-Nya, melindungi kaum muslimin dengan izin Allah, Allah akan menjaga mereka dari tipu daya musuh-musuh mereka, dan sepantasnyalah kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah SWT. Kita boleh melakukan KB Jika dalam keadaan darurat dengan alasan seperti :

- (1) Sang istri tertimpa penyakit di dalam rahimnya, atau anggota badan yang lain, sehingga berbahaya jika hamil, maka tidak mengapa (menggunakan alat kontrasepsi tersebut) untuk keperluan ini.
- (2) Demikian juga, jika sudah memiliki anak banyak, sedangkan isteri keberatan jika hamil lagi, maka tidak terlarang menggunakan alat kontrasepsi dalam waktu tertentu, seperti setahun atau dua tahun dalam masa menyusui, sehingga ia merasa ringan untuk kembali hamil, sehingga ia bisa mendidik dengan selayaknya.

Adapun jika penggunaannya dengan maksud berkonsentrasi dalam berkarier atau supaya hidup senang atau hal-hal lain yang serupa dengan itu, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan wanita zaman sekarang, maka hal itu tidak boleh”.

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel

Ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam memilih kontrasepsi suntikan:

1. Kontrasepsi suntik

Kontrasepsi suntik adalah cairan atau obat yang digunakan untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur yang matang dan sel sperma dalam bentuk cairan yang mengandung Depo Medroxy Progesteron Acetat (DMPA) yang lazim disebut Depoprovera, Neo Oin (Noreoisteron Oenathate) yang lazim disebut Noristerat dan Cyclofem (suntikan kombinasi) yang diinjeksi ke dalam tubuh secara intramuskular dalam jangka waktu tertentu.

2. Umur

Umur ibu merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan unsur manusia yang turut berperan terhadap kondisi ibu maupun masyarakat tertentu sehingga pada umur tertentu cara efisien untuk mencegah mortalitas ibu dan anak karena dapat menolong pasangan suami istri menghindari kehamilan risiko tinggi.

Ada 3 fase yang ditempuh dalam mencapai tujuan dari pelayanan kontrasepsi, yaitu:

a. Fase penunda perkawinan/kesuburan

Bagi PUS dengan usia istri dibawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya tidak mempunyai anak dulu, karena berbagai alasan.

b. Fase menjarangkan kehamilan

Periode usia istri antara 20-30 tahun merupakan usia yang terbaik untuk melahirkan dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antara kelahiran adalah 2-4 tahun.

c. Fase menghentikan/mengakhiri kehamilan/kesuburan

Umur diatas 30 tahun terutama di atas 35 tahun sebaiknya mengakhiri kesuburan setelah mempunyai 2 orang anak (Pinem Saroha, 2009).

3. Paritas

Kemungkinan seorang ibu untuk menambah kelahiran tergantung kepada jumlah anak yang telah dilahirkannya. Seorang ibu mungkin menggunakan alat kontrasepsi setelah mempunyai jumlah anak tertentu dan juga umur anak yang masih hidup. Semakin sering seorang ibu melahirkan anak, maka akan semakin memiliki risiko kematian dalam persalinan. Hal ini berarti jumlah anak akan sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga secara maksimal.

Paritas adalah jumlah atau banyaknya anak yang telah dilahirkan oleh ibu tanpa memandang apakah anak lahir atau mati (Mamik, Desi, dan Kurnia, 2008).

4. Pendidikan

Pendidikan menunjukkan hubungan yang positif dengan pemakaian jenis kontrasepsi artinya semakin tinggi pendidikan cenderung kontrasepsi efektif. Hal itu dikarenakan pendidikan dapat memperluas pengetahuan mengenai alat kontrasepsi, mengetahui keuntungan yang diperoleh dengan memakai kontrasepsi, meningkatkan kecermatan dalam memilih alat kontrasepsi yang dibutuhkan dan juga kemampuan untuk mengetahui efek samping dari masing-masing alat kontrasepsi terutama alat kontrasepsi suntik (Arif Rifai, 2010).

5. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan perilaku kesehatan dalam hal ini melakukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan efek positif terhadap individu dan program kesehatan yang sedang dilaksanakan khususnya program Keluarga Berencana.


6. Pengetahuan

Pengetahuan adalah apa yang telah diketahui mampu diingat oleh setiap orang setelah mengalaminya, menyaksikan, mengamati, atau diajar sejak lahir sampai dewasa, khususnya setelah ia diberi pendidikan seperti penyuluhan. Pengetahuan yang cukup tentang KB sangat

tergantung pada informasi, baik melalui penyuluhan maupun media massa lain.

B. Kerangka Konsep

Dalam pemikiran diatas, maka dibuat suatu kerangka yang menjadi dasar pemikiran dalam variabel-variabel yang diteliti:



Keterangan :

- : Variabel dependen
- : Variabel dependen
- : Variabel independen
- : Variabel yang diteliti
- : Variabel yang tidak diteliti

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif Variable Yang Diteliti

1. Umur

Umur ibu adalah waktu lamanya akseptor menggunakan alat kontrasepsi suntikan dihitung berdasarkan tanggal lahir dengan saat

tercatat di buku register sebagai akseptor KB di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar tahun 2011.

Kriteria objektif :

- a. Risiko rendah : Umur akseptor 20-35 tahun
- b. Risiko tinggi : Umur akseptor <20 tahun dan >35 tahun

2. Paritas

Paritas adalah jumlah atau banyaknya anak yang telah dilahirkan oleh ibu tanpa memandang apakah anak lahir atau mati (Mamik, Desi, dan Kurnia, 2008).

Kriteria objektif :

- a. Risiko Rendah : Paritas 1-3
- b. Risiko Tinggi : Paritas ≥ 4

c. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang formal terakhir yang ditamatkan oleh akseptor dan memiliki ijazah dari pendidik tersebut.

Kriteria objektif :

- a. Risiko Tinggi : Apabila ibu menyelesaikan tingkat pendidikan minimal tamat SLTP.
- b. Risiko Rendah: Apabila ibu menyelesaikan tingkat pendidikan maksimal tamat SLTA.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang sesuatu keadaan secara objektif.

B. Tempat dan Waktu dan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bulan Maret 2012 terhadap pengguna alat kontrasepsi suntikan di Puskesmas Plus Bara-baraya tahun 2011.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang diteliti (Notoatmodjo 2005).

Populasi pada penelitian ini adalah akseptor KB yang sesuai laporan rekam medik di Puskesmas Plus Bara-baraya periode Oktober sampe Desember 2011 yaitu sebanyak 192 akseptor.

2. Sampel

Sampel adalah perwakilan dari populasi yang bukan merupakan duplikat, melainkan cermin yang dapat menggambarkan secara optimal keadaan populasi (Masyhuri, 2008).

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah semua akseptor KB yang menggunakan alat kontrasepsi suntik periode Oktober sampai Desember 2011 yaitu sebanyak 186 akseptor berdasarkan Kriteria inklusi.

Kriteria dalam penelitian ini adalah :

a. Kriteria Inklusi

Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi target yang akan diteliti. (Nursalam, 2003)

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah akseptor KB suntik yang memiliki catatan rekam medik lengkap tercantum.

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subyek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai hal (Nursalam, 2003).

Kriteria Eksklusi dalam penelitian ini adalah akseptor KB suntik yang rekam mediknya tidak lengkap.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yang berupa data sekunder yaitu data yang diambil dari status akseptor KB suntik yang sesuai dengan kriteria yaitu inklusi akseptor KB suntik di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar tahun 2011.

E. Pengolahan Data dan Penyajian Data

1. Pengolaan Data

Pengolaan data dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator berdasarkan variable yang diteliti.

2. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi dan presentase disertai penjelasan.

F. Metode Analisis Data

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis menggunakan formulasi untuk distribusi frekuensi atau persentase dengan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan : P : Persentase yang dicari

f : Frekuensi

n : Jumlah sampel

G. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi :

1. Tanpa nama (*Anonimity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

2. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012 di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar dengan jumlah akseptor 186 dalam periode Oktober-Desember 2011 yang menggunakan alat kontrasepsi suntikan dan memiliki kelengkapan data dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh melalui status dan rekam medik selanjutnya diolah dan hasilnya disajikan dalam tabel distribusi dan persentase dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang secara keseluruhan dapat di lihat sebagai berikut:


1. Gambaran penggunaan alat kontrasepsi berdasarkan Umur



Sumber : Data Sekunder 2011

Grafik 5.1 di atas menunjukkan bahwa dari 186 akseptor KB suntikan di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar Tahun 2011, maka di dapatkan mayoritas pengguna kontrasepsi suntik yang berisiko tinggi (<20 tahun dan >35 tahun) yaitu 44 akseptor (23.70%) dan minoritas yang berisiko rendah (20-35 tahun) yaitu 142 orang (76.30%), dimana diketahui bahwa pada usia 20-35 tahun merupakan usia produktif terjadi masa-masa kesuburan bagi wanita, pada usia tersebut sangat rentan untuk terjadi kehamilan.

2. Gambaran penggunaan alat kontrasepsi berdasarkan Paritas




Sumber: Data sekunder 2011

Grafik 5.2 dapat di simpulkan bahwa tahun 2011 paritas yang menggunakan alat Kontrasepsi suntik terbanyak adalah paritas yang risiko

rendah 1-3 sebanyak 153 akseptor (82.25%), sedangkan yang paling sedikit adalah paritas yang risiko tinggi ≥ 4 sebanyak 33 akseptor (17.74%) dimana diketahui semakin banyak anak maka akan bertambah pula jumlah penduduk. Adanya program KB, masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya mengikuti program KB, mereka merasa bahwa dengan mempunyai anak sebanyak 3-4 yang seharusnya hanya 1-2 maka mereka akhirnya harus menjadi akseptor KB yang aktif, agar masa depan anak-anaknya bisa lebih baik.

3. Gambaran penggunaan alat kontrasepsi berdasarkan Pendidikan



Sumber: Data Sekunder 2011

Grafik 5.3 di atas menunjukkan bahwa dari 186 akseptor KB suntikan di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar Tahun 2011, maka di

dapatkan mayoritas pengguna kontrasepsi suntik yang berpendidikan maksimal tamat SLTP yaitu 94 akseptor (50,50%) dan minoritas yang berpendidikan maksimal tamat SLTA yaitu 92 akseptor (49,50%).

B. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian mengenai Gambaran Umum Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar selama bulan Mei 2012, dengan jumlah akseptor 186 dalam periode Oktober-Desember 2011. Berikut ini akan dilakukan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan variabel yang diteliti meliputi umur, pendidikan dan pekerjaan sebagai berikut :

1. Umur Akseptor

Grafik 5.1 menjelaskan jumlah akseptor KB suntik sebanyak 186 di dapat bahwa yang menggunakan alat kontrasepsi yang tertinggi pada kelompok umur antara 20-35 tahun yaitu sebanyak 142 orang (76,3%) pada kelompok umur <20 dan >35 sebanyak 44 orang (23,7%) menempati urutan terendah.

Pada grafik 5.1 menunjukkan bahwa umur 20-35 tahun menempati urutan tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara teori dan hasil penelitian dimana sesuai dengan pola kontrasepsi yang rasional dalam perencanaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, usia istri antara 20-35 tahun merupakan masa untuk mengatur kesuburan (menjarangkan Kehamilan).

Pada usia tersebut merupakan periode yang paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak 1-3 orang dengan jarak kelahiran anak antara 2-4 tahun. Jika kehamilan terjadi pada umur <20 tahun merupakan masa menunda kehamilan bagi pasangan usia subur, dimana organ-organ reproduksi belum berfungsi dengan baik dan mempunyai risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi, mereka lebih mungkin menderita hipertensi yang di induksi oleh kehamilan atau anemia dan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.

Pada usia yang sudah >35 tahun. Wanita sangat dilarang atau tidak dianjurkan untuk hamil karena pada rentang usia ini, wanita sudah sangat berisiko untuk menjalani kehamilan dan juga persalinan. Mereka sangat berisiko terkena komplikasi-komplikasi atau kelainan yang menyertai kehamilan. Tidak hanya bagi ibu saja tetapi juga bagi janinnya (Pinem Saroha, 2009).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daliah (2010). Dimana berdasarkan hasil penelitiannya dari akseptor KB suntik sebanyak 333 akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi suntik yang tertinggi pada kelompok umur antara 20-35 tahun yaitu sebanyak 256 orang (76,8%) sedangkan pada kelompok umur <20 dan >35 sebanyak 77 orang (23,12%) menempati urutan terendah.

Ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori dimana para wanita muda berumur 20-35 tahun yang tidak menginginkan kehamilan sebaiknya di ajarkan untuk memakai kontrasepsi, apabila mereka aktif

melakukan hubungan seks tanpa memperdulikan usia mereka yang masih muda, paling tidak sebagian dan mungkin pula mayoritas dari remaja putri berumur <20 tahun yang sudah mengalami ovulasi sebelum periode haid mereka yang pertama kali. Usia 31-35 tahun masih dikategorikan sebagai usia produktif. Pada usia ini sudah berisiko untuk ibu hamil walaupun masih dikategorikan risiko sedang. Meskipun masih banyak wanita yang hamil pada usia ini, tetapi dianjurkan agar berhati-hati dan selalu rutin memeriksakan kehamilannya sehingga kehamilannya dapat dipantau (Pinem Saroha, 2009).

2. Paritas Akseptor

Seorang wanita di Negara yang sedang berkembang mempunyai rata-rata 5-6 anak seumur hidupnya, sedangkan hanya 2 anak di Negara yang sudah maju. Menurut Singarimbun (1997), para orang tua di Sunda dan Jawa, baik dikota maupun di desa, mempunyai konsep yang sama tentang besarnya keluarga ideal yakni 4 anak yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kalau di takdirkan memperoleh anak laki-laki saja, atau perempuan saja, maka jumlahnya tidak lebih dari 4-5 anak.

Tabel 5.2 menjelaskan jumlah akseptor KB suntik sebanyak 186 akseptor, yang menggunakan alat Kontrasepsi suntik terbanyak menurut paritas adalah risiko rendah 1-2 sebanyak 153 akseptor (82.25%), sedangkan yang paling sedikit adalah paritas yang risiko tinggi ≥ 4 sebanyak 33 akseptor (17.74%), hal ini sesuai dengan kebijakan program

keluarga berencana yang menganjurkan untuk menganut sistem keluarga, yaitu catur warga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daliah (2010). Dimana berdasarkan hasil penelitiannya dari akseptor KB suntik sebanyak 333 akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi suntik terbanyak adalah paritas 1-2 sebanyak 221 akseptor (66,63%) sedangkan yang paling sedikit adalah akseptor >3 sebanyak 112 (33,36%).

Ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori dimana anak adalah harapan atau cita-cita dari sebuah perkawinan. Berapa jumlah yang diinginkan, tergantung dari keluarga itu sendiri.

Dalam Islam para ulama sepakat bahwa bahwa KB dibolehkan syariat adalah usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karna situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga.

Keluarga Berencana (KB) yang selama ini kita laksanakan adalah untuk menjarangkan kelahiran, agar ibu dapat menyusukan anaknya cukup banyak dan cukup lama. Kontrasepsi untuk menjarangkan kelahiran akan dipakai sekurang-kurangnya 1 tahun selama-lamanya 3 tahun untuk mendapatkan jarak kelahiran anak antara 2-4 tahun.

Pasal 18 UU No.10 tahun 1992 yang menyatakan bahwa setiap pasangan suami istri dapat menentukan pilihannya dalam merencanakan dan mengatur jarak anak dan jarak antara kelahiran anak yang berlandasan

pada kesadaran dan tanggung jawab terhadap generasi sekarang maupun akan datang (Kusumaningrum 2009).

3. Pendidikan Akseptor

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha dan tindakan yang bertujuan untuk merubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan manusia. Suatu tingkat pendidikan yang cukup merupakan dasar dalam pengembangan daya nalar serta sarana bagi seseorang yang menerima pengetahuan. Kemampuan menerima seseorang yang inovatif akan lebih cepat diterima oleh seseorang yang dengan latar belakang pendidikan yang cukup. Hal ini dimungkinkan karena dalam proses pendidikan terjadi suatu sifat hakiki, yaitu tumbuhnya kemampuan dalam berfikir (Atmarita et al, 2004).

Tabel 5.3 menjelaskan jumlah akseptor KB suntik sebanyak 186 akseptor, yang menggunakan alat Kontrasepsi suntik terbanyak adalah pendidikan maksimal tamat SLTP sebanyak 94 (50,50%) akseptor, sedangkan yang paling sedikit pendidikan maksimal tamat SLTA adalah sebanyak 92 (49,50%) akseptor.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi umumnya lebih mudah menerima dan mengerti tentang sesuatu hal baru serta dapat berfikir lebih rasional dalam menanggapi sesuatu hal, akan tetapi pengalaman dan keadaan sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat untuk ber-KB, dan kurangnya akseptor KB suntik pada penelitian ini disebabkan juga karena

orang yang berpendidikan tinggi mampu memilih metode KB mana yang baik dan cocok di gunakan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daliah (2010). Berdasarkan hasil penelitiannya dari akseptor suntik terbanyak adalah pendidikan maksimal tamat SLTA sebanyak 220 (60%) akseptor, sedangkan yang paling sedikit pendidikan maksimal tamat SLTP adalah sebanyak 113 (33,90%) akseptor.

Pada umumnya mereka memilih alat kontrasepsi suntik karena dianjurkan oleh tenaga kesehatan dan alasan praktis, karena metode-metode ini cukup efektif dan efisien serta lebih mudah menggunakannya.

Pendidikan itu sendiri amat diperlukan seseorang lebih tanggap terhadap pemilihan alat kontrasepsi yang cocok dan aman. Tingkat pendidikan turut menentukan rendah tidaknya seseorang menyerap dan memakai pengetahuan (Notoatmodjo, 2007)

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Bara-Baraya tentang “Gambaran Umum Penggunaan Alat Kontrasepsi di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2011” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan alat kontrasepsi suntik tertinggi pada kelompok umur antara 20-35 tahun yaitu sebanyak 142 orang (76,30%) pada kelompok umur <20 dan >35 sebanyak 44 orang (23,70%) menempati urutan terendah.
2. Penggunaan alat kontrasepsi suntik terbanyak menurut paritas adalah risiko rendah 1-2 sebanyak 153 akseptor (82.25%), sedangkan yang paling sedikit adalah paritas yang risiko tinggi ≥ 4 sebanyak 33 akseptor (17.74%).
3. Penggunaan alat kontrasepsi suntik terbanyak menurut tingkat pendidikan adalah pendidikan maksimal tamat SLTP sebanyak 94 (50,5%) akseptor, sedangkan yang paling sedikit pendidikan maksimal tamat SLTA adalah sebanyak 92 (49,5%) akseptor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menyarankan agar :

1. Kepada petugas kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para akseptor sehingga mereka tetap akrab sebagai akseptor.
2. Mengajukan kepada petugas kesehatan untuk membantu akseptor dalam memilih jenis kontrasepsi yang sesuai dengan keinginannya dan menganjurkan untuk melakukan kunjungan ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran & Terjemahannya*. 2005. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Abu Malik. 2010. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Griya Ilmu.
- Anna. 2011. *Presentase Kependudukan indonesia*.
<http://health.kompas.com/read/2011/09/26/1510358/60.Persen.Penduduk.Pakai.Kontrasepsi> Di akses 26 Januari 2012.
- Arum, Sujiyatini. 2009. *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Brahm U, dkk . 2007. *Ragam Metode Kontrasepsi*. Jakarta; EGC.
- Daliah. 2011. " *Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi Suntik Terhadap Berat Badan Akseptor KB di Puskesmas Banyudono I Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali*". (Skripsi). Surakarta: UNS-F.
<http://etd.eprints.ums.ac.id/14907/1/COVER-INTISARI.pdf>. Diakses tanggal 21 Juni 2010.
- Everett, dan Suzanne. 2008. *Buku Saku Kontrasepsi & Kesehatan Seksual Reproduksi Edisi 2*. Jakarta; EGC.
- Glasia A, dan Gebbie A. 2005. *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Edisi 4. Jakarta: EGC.
- Hartanto, H. 2010. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kusumaningrum. R. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Jenis Kontrasepsi yang Digunakan pada Pasangan Usia Subur*.
<http://eprints.undip.ac.id>. Diakses tanggal 15 Agustus 2009.
- Notoadmojo. S. 2007. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Mamik, Desi, dan Kurnia. *Pengetahuan WUS Tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Bitinjau dari Usia, Pendidikan, Pekerjaan, dan Paritas*. Buletin Penelitian RSU dr Soetomo Vol 10, no 3 (2008): h.1-6
- Mansjoer.A, dkk. 2001. *Kapita Selekta Kedokteran Edisi 3 jilid 1*. Jakarta: Media Aesculapius.
- Manuaba.I, dkk. 2010. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB untuk Profesi Bidan Edisi 2*. Jakarta; EGC.
- Marsuki, Zainuddin. 2008. *Metodelogi Penelitian*. Malang: Refika Aditama

- Rifai, arif. 2008. *Pemakaian Alat Kontrasepsi Pemeluk Agama Islam*.
<http://www.digilib.ui.ac>. Di akses tanggal 11 mei 2010.
- Saifuddin, dkk. 2003. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta; YBP-SP.
- _____.2006. *Buku Acuan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta; YBP-SP.
- _____.2010. *Buku Panduan Praktis Pelayanan KB Edisi 2*, Jakarta: YBP-SP
- Saroha. P. 2009. *Kesehatan Reproduksi & Kontrasepsi*. Jakarta: Trans Info Media.
- Suratuh, dkk. 2008. *Pelayanan Keluarga Berencana & Pelayanan kontrasepsi*. Jakarta; Trans Info Media.
- Wiknjosastro.H, dkk. 2008. *Ilmu Kandungan Edisi keenam*. Jakarta: YBP-SP.
- _____. 2008. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: YBP-SP.
- Yosep. 2011. *Makalah Tentang Pandangan Islam Terhadap KB*.
<http://greenkonsep.wordpress.com/2011/12/18/makalah-tentang-pandangan-islam-terhadap-kb-keluarga-berencana>. Diakses tanggal 18 desember 2011.

MASTER TABEL
GAMBARAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI SUNTIK
DI USKESMAS PLUS BARA-BARAYA MAKASSAR
TAHUN 2011

No	No. Reg	Nama Akseptor	Umur		Paritas		Pendidikan	
			RR 20-35 tahun	RT <20->35 tahun	RR 1 – 3	RT ≥ 4	RR Maksimal SLTA	RT Maksimal SLTP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20xx/11	Ny "M	32 tahun		3		S.1	
2	27xx/11	Ny "R	21 tahun		1		SMA	
3	20xx/11	Ny "S	23 tahun		3			SD
4	20xx/11	Ny "S	38 tahun		3		SMA	
5	20xx/11	Ny "S	30 tahun		1		S. 1	
6	20xx/11	Ny "H		36 tahun	3		SMA	
7	20xx/11	Ny "S	28 tahun		3		D. 2	
8	20xx/11	Ny "R	30 tahun		1		SMA	
9	20xx/11	Ny "S	34 tahun			4	S.1	
10	20xx/11	Ny "A		41 tahun		7		SD
11	20xx/11	Ny "S	28 tahun		2			SMP
12	20xx/11	Ny "J	31 tahun		2		SMA	
13	20xx/11	Ny "N		39 tahun	1		S. 1	
14	20xx/11	Ny "H		36 tahun	2		SMA	
15	20xx/11	Ny "S	27 tahun		3		S.1	
16	27xx/11	Ny "S	28 tahun		2		SMA	
17	20xx/11	Ny "J		45 tahun		4		SD
18	20xx/11	Ny "P	35 tahun		3		S.1	
19	20xx/11	Ny "S	32 tahun		2		S.1	
20	20xx/11	Ny "T	29 tahun		2		SMA	
21	20xx/11	Ny "S	33 tahun		2		SMA	
22	20xx/11	Ny "J		39 tahun		5		SMP
23	20xx/11	Ny "J	26 tahun		1			SMP
24	20xx/11	Ny "E	26 tahun		2		SMA	
25	20xx/11	Ny "B	27 tahun		3			SMP
26	20xx/11	Ny "R	30 tahun			4		SD
27	20xx/11	Ny "M		37 tahun	2			SMP
28	20xx/11	Ny "S	20 tahun		1			SMP
29	20xx/11	Ny "A	21 tahun		2		SMA	
30	20xx/11	Ny "S		19 tahun	2			SMP
31	20xx/11	Ny "S	33 tahun			4	SMA	
32	20xx/11	Ny "A	21 tahun		1		SMA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	20xx/11	Ny "M		41 tahun	3			SD
34	20xx/11	Ny "A		18 tahun	2		SMA	
35	20xx/11	Ny "H	30 tahun		3			SD
36	20xx/11	Ny "A		36 tahun	2		D.3	
37	20xx/11	Ny "S		37 tahun	2		D.3	
38	20xx/11	Ny "L	30 tahun		1		S.1	
39	20xx/11	Ny "H	23 tahun		2		SMA	
40	20xx/11	Ny "Y		37 tahun	1		S.2	
41	20xx/11	Ny "W	24 tahun		3			SMP
42	20xx/11	Ny "H	27 tahun			4		SD
43	20xx/11	Ny "H	21 tahun		1		SMA	
44	20xx/11	NY "N		18 tahun	1			SMP
45	20xx/11	NY "N	20 tahun		3			SD
46	20xx/11	Ny "R	23 tahun		2			SD
47	20xx/11	Ny "I	38 tahun			4		SD
48	20xx/11	Ny "H	24 tahun		1		SMA	
49	20xx/11	Ny "J		18 tahun	1			SD
50	20xx/11	Ny "R		18 tahun	1			SMP
51	20xx/11	Ny "S		36 tahun	3			SD
52	20xx/11	Ny "R	23 tahun		2		SMA	
53	20xx/11	Ny "S	22 tahun		2		SMA	
54	20xx/11	Ny "D	30 tahun		3		SMA	
55	20xx/11	Ny "A	21 tahun		1		SMA	
56	20xx/11	Ny "N	20 tahun		1		SMA	
57	20xx/11	Ny "F	31 tahun			4	SMA	
58	20xx/11	Ny "D		36 tahun	2			SMP
59	20xx/11	Ny "N	28 tahun		2		SMA	
60	20xx/11	Ny "S	21 tahun		2		SMA	
61	21xx/11	Ny "D		41 tahun		4		SD
62	21xx/11	Ny "Y		38 tahun		4		SD
63	21xx/11	Ny "Y	26 tahun		3			SMP
64	21xx/11	Ny "I	32 tahun		3		S.1	
65	21xx/11	Ny "H	33 tahun		3		D.2	
66	21xx/11	Ny "M	33 tahun		1		SMA	
67	21xx/11	Ny "L	23 tahun		1		SMA	
68	21xx/11	Ny "H		38 tahun		6		SD
69	21xx/11	Ny "R	21 tahun		1			SD
70	21xx/11	Ny "A		37 tahun		4		SD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	21xx/11	Ny "R	32 tahun		3		SMA	
72	21xx/11	Ny "E	35 tahun		3			SMP
73	21xx/11	Ny "M	30 tahun		2			SMP
74	21xx/11	Ny "A	22 tahun		1		SMA	
75	21xx/11	Ny "S	29 tahun		2		SMA	
76	21xx/11	Ny "Y	32 tahun		3			SMP
77	27xx/11	Ny "M	34 tahun			4		SD
78	21xx/11	NY "N	27 tahun		2			SMP
79	21xx/11	Ny "F	29 tahun			4		SMP
80	21xx/11	Ny "N	25 tahun		2		SMA	
81	21xx/11	Ny "H	25 tahun		3			SMP
82	21xx/11	Ny "I	30 tahun		1		D. 3	
83	21xx/11	Ny "A	33 tahun		2			SD
84	21xx/11	Ny "H	23 tahun		2			SD
85	21xx/11	Ny "A	23 tahun		1		SMA	
86	21xx/11	Ny "H	28 tahun			4		SD
87	21xx/11	Ny "J	34 tahun		2			SMP
88	21xx/11	Ny "M	32 tahun		1		S.1	
89	21xx/11	Ny "R	32 tahun		2			SMP
90	21xx/11	Ny "S	32 tahun		2		SMA	
91	21xx/11	Ny "S		38 tahun	2		SMA	
92	21xx/11	Ny "B		40 tahun		5		SD
93	21xx/11	Ny "S	25 tahun		2			SMP
94	21xx/11	Ny "N	25 tahun		1			SMP
95	21xx/11	Ny "E	21 tahun		1			SD
96	21xx/11	Ny "J	35 tahun			5		SD
97	21xx/11	Ny "H	22 tahun		3			SMP
98	21xx/11	Ny "I	20 tahun		2			SMP
99	21xx/11	Ny "A	30 tahun		2			SD
100	21xx/11	Ny "A	35 tahun		3			SD
101	21xx/11	Ny "K	28 tahun			4		SMP
102	21xx/11	Ny "S	28 tahun		3			SMP
103	21xx/11	Ny "D	22 tahun		2		SMA	
104	21xx/11	Ny "K	27 tahun			6		SD
105	21xx/11	Ny "E	35 tahun			6		SD
106	21xx/11	Ny "Y	33 tahun		2			SMP
107	21x/11x	Ny "M	27 tahun		1		S.1	
108	27xx/11	Ny "I	27 tahun		2		SMA	
109	21xx/11	Ny "D	29 tahun		2			SMP
110	21xx/11	Ny "F	27 tahun		2		SMA	
111	21xx/11	Ny "A		19 tahun	1		SMA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	21xx/11	Ny "I	28 tahun		2			SMP
113	21xx/11	Ny "N	21 tahun		1			SMP
114	21xx/11	Ny "A	23 tahun		2		SMA	
115	21xx/11	Ny "H	26 tahun		3			SMP
116	21xx/11	Ny "H	28 tahun		1		SMA	
117	21xx/11	Ny "A	29 tahun		2		S.1	
118	21xx/11	Ny "A	33 tahun		2			SD
119	21xx/11	Ny "H	23 tahun		1			SMP
120	21xx/11	Ny "R	25 tahun		1		SMA	
121	21xx/11	Ny "I	25 tahun		1		SMA	
122	21xx/11	Ny "M	27 tahun		1			SD
123	21xx/11	Ny "H		36 tahun	2			SD
124	21xx/11	Ny "L		19 tahun	1			SD
125	21xx/11	Ny "S	24 tahun		3		SMA	
126	21xx/111	Ny "N	26 tahun			7		SD
127	21xx/11	Ny "D	30 tahun		2		SMA	
128	21xx/11	Ny "R	35 tahun		3			SD
129	21xx/11	Ny "S		36 tahun	2			SD
130	21xx/11	Ny "S	29 tahun		1			SMP
131	21xx/11	Ny "R	21 tahun		1			SD
132	21xx/11	Ny "R	31 tahun		2			SMP
133	21xx/11	Ny "H	25 tahun		3			SD
134	21xx/11	Ny "F	29 tahun			4	SMA	
135	21xx/11	Ny "N		39 tahun	2			SD
136	21xx/11	Ny "M	21 tahun		2			SD
137	21xx/11	Ny "N	25 tahun		2			SD
138	21xx/11	Ny "T		19 tahun	1		SMA	
139	21xx/11	Ny "S	35 tahun		2		SMA	
140	21xx/11	Ny "N	27 tahun		2			SD
141	21xx/11	Ny "S	33 tahun		2			SD
142	21xx/11	Ny "H	27 tahun		2		S.1	
143	21xx/11	Ny "L	35 tahun			6		SD
144	21xx/11	Ny "A	35 tahun		2		S.1	
145	21xx/11	Ny "F	27 tahun		2		SMA	
146	21xx/11	Ny "M		46 tahun	2		S.1	
147	21xx/11	Ny "D	29 tahun			4		SD
148	21xx/11	Ny "H	28 tahun			5		SD
149	21xx/11	Ny "S		42 tahun	2		SMA	
150	21xx/11	Ny "S	30 tahun		2		S.1	
151	21xx/11	Ny "K	30 tahun		2		D.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	21xx/11	Ny "S		48 tahun		6		SD
153	21xx/11	Ny "S		41 tahun	2		SMA	
154	21xx/11	Ny "A	24 tahun			4		SMP
155	21xx/11	Ny "H	36 tahun			4		SMP
156	21xx/11	Ny "R	25 tahun		2		SMA	
157	21xx/11	Ny "D	31 tahun			4	S.1	
158	21xx/11	Ny "E	32 tahun		2		SMK	
159	27xx/11	Ny "A		18 tahun	2			SMP
160	27xx/11	Ny "D	30 tahun		2		SMA	
161	27xx/11	Ny "R		43 tahun	2		S.1	
162	21xx/11	Ny "N	24 tahun		2		SMA	
163	21xx/11	Ny "T	22 tahun		1		SMA	
164	21xx/11	Ny "E	26 tahun			4	SMA	
165	21xx/11	Ny "E		38 tahun	3			SD
166	21xx/11	Ny "F	33 tahun		2			SD
167	21xx/11	Ny "R	26 tahun		1		SMA	
168	21xx/11	Ny "M	25 tahun		2		D.3	
169	21xx/11	Ny "F	25 tahun		2			SMP
170	21xx/11	Ny "U		37 tahun	3		SMA	
171	21xx/11	Ny "D	20 tahun		1		S.1	
172	21xx/11	Ny "S	30 tahun		2		S.1	
173	27xx/11	Ny "R	26 tahun		1			SD
174	21xx/11	Ny "E	26 tahun		2		S.1	
175	21xx/11	Ny "A		19 tahun	1		D.2	
176	21xx/11	Ny "S	24 tahun		1		SMA	
177	21xx/11	Ny "L	30 tahun		2			SD
178	21xx/11	Ny "M	25 tahun		2			SD
179	21xx/11	Ny "N	31 tahun			5	SMA	
180	21xx/11	Ny "S	33 tahun		3		SMA	
181	21xx/11	Ny "H		36 tahun	2			SMP
182	21xx/11	Ny "R		36 tahun	2			SD
183	27xx/11	Ny "N		38 tahun	2		SMA	
184	21xx/11	Ny "K	23 tahun		2			SMP
185	21xx/11	Ny "S		36 tahun	3			SMP
186	21xx/11	Ny "M		19 tahun		5		SMP