

**GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PERAWATAN
PAYUDARA SELAMA KEHAMILAN DAN PADA MASA NIFAS
DI RB MATTIRO BAJI GOWA
TAHUN 2013**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
ALAUDDIN
M A K A S S A R

FITRIANI
70400010024

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Februari 2014

Penyusun

Fitriani
70400010024



HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Fitriani
Nim : 70400010024
Judul : Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Perawatan Payudara
Selama Kehamilan dan Pada Masa Nifas di RB Mattiro Baji Gowa
Tahun 2013.

Kti ini telah disetujui untuk dipertahankan dalam ujian akhir KTI
dihadapan tim penguji Program DIII kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar.



Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

dr. A. Tihardimanto, S.Ked
Nip : 19851030 200912 1 00 2



HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan Pada Masa Nifas 2013”** yang disusun oleh FITRIANI NIM: 70400010024, mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI), dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

GOWA, Februari 2014

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A	(.....)
Sekretaris	: Fatmawaty Mallapiang, SKM., M. Kes	(.....)
Pembimbing	: dr. A. Tihardimanto, S.Ked	(.....)
Penguji I	: dr. Dewi Setiawati, Sp. OG, M. Kes	(.....)
Penguji II	: Dra. Sohrah, M. Ag	(.....)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A
NIP.19520811 198203 1 001

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan Rahmat dan hidayah serta kenikmatan-kenikmatan yang sampai saat ini bisa kita rasakan. Salam dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada sahabat, keluarga dan orang-orang yang senantiasa berihlizam di jalannya. Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kesempatan dan kesehatan hingga bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul "Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan Pada Masa Nifas Di RB Mattiro Baji Gowa Tahun 2013".

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis sangat menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan masukan dalam penyempurnaan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Mengawali ucapan terima kasih disampaikan penghargaan yang istimewa kepada ayahanda Arifuddin dan ibunda tercinta Hasnawiah atas segala perhatian, kasih sayang, do'a restu serta pengorbanannya yang tak terhingga dan juga kepada kakak dan adikku tercinta. Begitupula kepada pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, do'a serta bantuan dalam bentuk apapun semoga keikhlasannya dibalas Allah subhanahu wa ta'ala.

Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. Qadir Gassing, M.Ag selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad M Sewang, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Firdayanti, S.SI.T.M.Keb, selaku ketua jurusan kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.md. Keb.
4. Bapak dr. A.Tihardimanto, S.Ked selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, masukan dan motivasinya dalam memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Ibu dr. Dewi Setiawati, Sp.OG, M.Kes, selaku penguji I Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu Dra. Sohrah, M.Ag, selaku penguji II Karya Tulis Ilmiah ini yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Para dosen Program Studi kebidanan yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Program Studi Kebidanan.
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
9. Willy Rasyid Djabbar, SE, selaku badan sekretaris RB Mattiro Baji beserta seluruh pegawai dan staf Puskesmas Mattiro Baji Gowa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
10. Semua teman-teman mahasiswi angkatan 2010 Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang tak bisa disebut satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya dalam rangka penyelesaian studi ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang ada di dalamnya, olehnya itu penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
A. Rumusan Masalah.....	3
B. Tujuan Penelitian	3
1. Tujuan Umum	3
2. Tujuan Khusus	4
C. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan	6
B. Tinjauan Umum Tentang Payudara.....	10

C. Tinjauan Umum Tentang Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan Pada Masa Nifas	18
D. Tinjauan Agama Tentang Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan pada Masa Nifas	43
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	47
BAB IV METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel	53
D. Metode Pengumpulan Data	55
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil penelitian	57
B. Pembahasan	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Ibu Hamil berdasarkan Paritas Di RB Mattiro	
Baji Gowa Tahun 2013	57
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Ibu Hamil Berdasarkan Umur Di RB Mattiro	
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Ibu Hamil Berdasarkan Pendidikan Di RB Mattiro Baji Gowa Tahun 2013	59
Baji Gowa Tahun 2013	58
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Ibu Hamil Berdasarkan Pekerjaan Di RB	
Mattiro Baji Gowa Tahun 2013	59
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Ibu Hamil Berdasarkan Agama Di RB	
Mattiro Baji Gowa Tahun 2013	60
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Ibu Hamil Berdasarkan Suku Di RB	
Mattiro Baji Gowa Tahun 2013	61
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Ibu Hamil tentang Pengertian Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan Pada Masa Nifas Di RB Mattiro	
Baji Gowa Tahun 2013	62
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Ibu Hamil tentang Cara Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan Pada Masa Nifas Di RB Mattiro Baji	
Gowa Tahun 2013	62
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Ibu Hamil tentang Manfaat Perawatan Payu- Dara Selama Kehamilan dan Pada Masa Nifas Di RB Mattiro Baji	
Gowa Tahun 2013	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bentuk Puting Susu Normal.....	13
Gambar 2. Bentuk Puting Susu Pendek	13
Gambar 3. Bentuk Puting Susu Panjang	13
Gambar 4. Bentuk Puting Susu Terbenam/terbalik.....	14
Gambar 5. Anatomi Payudara	15
Gambar 6. Pengurutan Buah Dada dari tengah ke samping kemudian ke Bawah.....	25
Gambar 7. Pengurutan Buah Dada berputar dari tengah ke samping Kemudian ke bawah.....	26



Gambar 8. Pengurutan buah dada berputar dari tengah ke samping Kemudian ke bawah	26
Gambar 9. Pengurutan buah dada dari pangkal ke puting dan membersihkan Payudara dengan waslap	26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Master Tabel
Lampiran 2	Lembar persetujuan menjadi responden
Lampiran 3	Lembar kuesioner
Lampiran 4	Lembar Konsul
Lampiran 5	Surat permohonan izin penelitian Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Lampiran 6	Surat izin penelitian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Lampiran 7	Surat rekomendasi penelitian pemerintah Kabupaten Gowa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
Lampiran 8	Surat keterangan penelitian di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa
Lampiran 9	Daftar riwayat hidup

Nama : Fitriani

NIM : 70400010024

Judul : **Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan Pada Masa Nifas Di RB Mattiro Baji Gowa Tahun 2013**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas di RB Mattiro Baji Gowa Tahun 2013 dari empat aspek yaitu pengetahuan ibu hamil tentang pengertian, cara, manfaat serta dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif dan cara pengambilan sampelnya secara *purposive sampling* serta untuk pengumpulan data dengan menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner.

Hasil penelitian didapatkan: dari 80 responden berdasarkan pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas 22 responden (27,5%) pengetahuan baik, 43 responden (53,8%) pengetahuan cukup, pengetahuan kurang 15 responden (18,8%). Pengetahuan tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas 43 responden (53,8%) pengetahuan baik, pengetahuan cukup 22 responden (27,5%), pengetahuan kurang 15 responden (18,8%). Pengetahuan tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas 26 responden (32,5%) pengetahuan baik, pengetahuan cukup 42 responden (52,5%), pengetahuan kurang 12 responden (15). Pengetahuan tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas 30 responden (37,5%) pengetahuan baik, pengetahuan cukup 33 responden (41,3%) tingkat pengetahuan kurang 17 responden (21,3%).

Dapat disimpulkan bahwa masih banyak ibu hamil yang belum mengetahui tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan untuk menambah pengetahuan ibu hamil.

Daftar Pustaka: 31 (2004 – 2013)

Kata Kunci : Pengetahuan, Ibu Hamil, Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan Pada Masa Nifas.

ABSTRACT

Name :Fitriani
Student Reg. Number :70400010024
Title :Overview of Pregnancy Awareness About Breast Care During Pregnancy and the Postpartum Period At RB Mattiro Baji Gowa in 2013

This study aims to describe the knowledge of pregnant women about breast care during pregnancy and the postpartum period in RB Mattiro Baji Gowa in 2013, from four aspects, namely knowledge of pregnant women about understanding way, benefits and perform breast care during pregnancy and the postpartum period. This research is a descriptive study and the way of sampling for data collection using primary data in the form of a questionnaire.

The results showed : of 80 respondents based on knowledge of pregnant women about breast care during pregnancy and the postpartum period 22 respondents (27,5%) good knowledge, 43 respondents (53,8%) sufficient knowledge, lack of knowledge of 15 respondents (18,8%). Knowledge about breast care during pregnancy and the postpartum period 43 respondents (53,8%) good knowledge, knowledge quite 22 respondents (27,5%), lack of knowledge of 15 respondents (18,8%). Knowledge of the benefits of breast care during pregnancy and the postpartum period 26 respondents (32,5%) good knowledge, knowledge quite 42 respondents (52,5%), lack of knowledge of 12 respondents (15%). Knowledge of the impact of not doing breast care during pregnancy and the postpartum period 30 respondents (37,5%) good knowledge, knowledge quite 33 respondents (41,3%) less than 17, the level of knowledge of respondents (21,35).

It can be concluded that there are many pregnant women who do not know about breast care during pregnancy and the postpartum period therefore, it is necessary to increase the knowledge of counseling pregnant women.

Bibliography : 31 (2005-2012)

Keyword : Knowledge, Pregnancy Women, Breast Care During Pregnancy and the Postpartum Period in.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perawatan payudara selama kehamilan adalah salah satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan dalam pemberian air susu ibu (ASI). Banyak ibu yang mengeluh bayinya tidak mau menyusu, biasanya ini disebabkan oleh faktor teknis seperti puting susu yang masuk atau posisi menyusui yang salah. Dalam meningkatkan pemberian ASI pada bayi, ibu-ibu membutuhkan bantuan dan informasi serta dukungan agar merawat payudara pada saat hamil untuk mempersiapkan ASI pada saat melahirkan sehingga menambah keyakinan bahwa mereka dapat menyusui bayinya dengan baik dan mengetahui manfaat perawatan payudara pada saat hamil (Nurhati, 2009).

Perawatan payudara pada masa nifas adalah suatu kebutuhan bagi ibu yang baru saja melahirkan. Masa nifas sendiri adalah selama enam minggu atau 40 hari setelah persalinan. Pada masa nifas perawatan payudara merupakan suatu tindakan yang sangat penting untuk merawat payudara terutama untuk memperlancar pengeluaran air susu ibu (ASI), (Karmiasih, 2012).

Perawatan payudara pada ibu nifas sangat penting karena salah satu manfaatnya yaitu melancarkan produksi ASI yang merupakan makanan pokok bagi bayi, perawatan payudara harus dilakukan dengan benar dan teratur sehingga

dapat memudahkan bayi mengkomsumsi ASI dan mengurangi resiko terjadinya luka saat menyusui seperti terjadi puting susu lecet. Salah satu tujuan perawatan payudara adalah mendeteksi dini bila ada kelainan pada payudara (puting susu lecet, payudara bengkak, mastitis, dan abses payudara) (Prमितasari, 2009).

Dengan melakukan perawatan payudara secara benar dan teratur dapat menguatkan, melenturkan dan mengatasi terpendamnya puting susu sehingga bayi mudah menghisap ASI dan juga menjaga kebersihan payudara, mencegah penyumbatan dan bermanfaat untuk memperkuat kulit sehingga mencegah terjadinya luka pada saat mulai menyusui (Oswari, 2004).

Salah satu masalah yang sering terjadi karena kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan payudara pada masa kehamilan dan masa nifas adalah bendungan ASI dimana payudara terasa berat, panas dan keras. Yang terjadi karena terlambat menyusukan atau perlekatan pada waktu menyusui yang kurang baik, jika bendungan ASI tidak ditangani dengan tepat dapat terjadi mastitis, sehingga dapat menyebabkan kesakitan (morbidity) pada ibu nifas (Sulistiyawati, 2009).

Berdasarkan laporan dari survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI, 2007), di usia lebih dari 25 tahun sepertiga wanita di dunia (38%) tidak menyusui bayinya karena terjadi pembengkakan payudara. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2008-2009 menunjukkan bahwa 55% ibu menyusui mengalami mastitis dan puting susu lecet, kemungkinan hal tersebut

disebabkan karena tehnik menyusui yang tidak benar dan tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Dari pengambilan data awal yang dilakukan peneliti di RB Mattiro Baji Gowa kunjungan ibu hamil pada bulan Januari-Desember 2012 sebanyak 3295 orang (Profil RB Mattiro Baji Gowa 2012). Peneliti memilih tempat penelitian di RB Mattiro Baji Karena banyaknya ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di RB Mattiro Baji dan mengingat begitu besarnya dampak yang dapat ditimbulkan jika tidak dilakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas. Maka penulis tertarik meneliti “Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas di RB Mattiro Baji Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dirumuskan masalah penelitian mengenai bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas di RB Mattiro Baji Gowa?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas di RB Mattiro Baji Gowa Tahun 2013.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang pengertian perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas?
- b. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas?
- c. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas?
- d. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas?

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Memberikan bahan masukan dalam rangka pengembangan dan pemikiran tentang pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

2. Manfaat Praktis

- a. bagi penulis yaitu dapat menjadi bahan referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya

- b. bagi profesi di harapkan hasilnya dapat menjadi masukan dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.
- c. bagi instansi lain diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

- a. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dukungan dalam menumbuhkan rasa percaya diri maupun sikap dan perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan fakta yang mendukung tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2011).
- b. Pengetahuan adalah merupakan hasil “Tahu” dan ini terjadi setelah orang penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu : indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan (Notoatmodjo, 2011).

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang dengan jalan apapun atau segala sesuatu yang diketahui orang lain yang didapat. Pengetahuan dapat juga dikatakan sebagai khasanah mental yang secara langsung turut memperkaya kehidupan kita. Pengetahuan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam

kehidupan yang dihadapi manusia sebagai dorongan psikologis (Notoatmodjo, 2011).

2. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu :

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai kemampuan untuk mengingat suatu materi yang telah dipelajari, dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. Cara kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain: menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi dan mengatakan.

b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai pengguna hukum-hukum, rumus, metode, prinsip-prinsip dan sebagainya.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek dalam suatu komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti kata kerja mengelompokkan, menggambarkan, memisahkan.

e. Sintesis (*Sinthesis*)

Sintesis adalah kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian dalam bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi atau objek tersebut berdasarkan suatu cerita yang sudah ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang sudah ada. (Notoatmodjo, 2011).

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang antara lain:

a. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang di berikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan.

b. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

c. umur

dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan aspek fisik dan psikologis (mental). Pertumbuhan pada fisik secara garis besar ada 4 kategori yaitu pertama perubahan ukuran, kedua perubahan proporsi, ketiga hilangnya ciri-ciri lama, keempat timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis atau mental taraf berpikir seseorang semakin matang dan dewasa (Notoatmodjo, 2005).

d. Paritas

Paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu, baik yang hidup ataupun dalam keadaan meninggal.

e. Sosial ekonomi

Tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi akan menambah tingkat pengetahuan.

f. Sumber informasi

Seseorang yang mempunyai sumber yang lebih banyak akan memiliki pengetahuan yang lebih luas (Soekanto, 2005).

B. Tinjauan Umum Tentang Payudara

1. Definisi Payudara

Payudara merupakan sumber air susu ibu yang akan menjadi makanan utama bagi bayi, karena itu jauh sebelumnya sudah harus dirawat. Payudara adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit dan di atas otot dada. Bagian-bagian payudara meliputi :

- a. Korpus (badan): Bagian yang membesar
- b. Areola: Bagian yang kehitaman di tengah
- c. Papila/puting: Bagian yang menonjol di puncak payudara


Di dalam korpus terdapat alveolus, yaitu unit terkecil yang memproduksi air susu ibu (ASI), terdiri dari beberapa sel asiner, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos, dan pembuluh darah. Beberapa alveolus mengelompok membentuk lobules, kemudian beberapa lobules berkumpul menjadi 15-20 lobus pada tiap payudara. Dari alveolus ASI disalurkan ke dalam saluran kecil (duktulus), kemudian beberapa saluran kecil bergabung membentuk saluran yang lebih besar (duktus laktiferus). Di bawah areola saluran yang besar lebar disebut sinus laktiferus. Akhirnya semua memusat ke dalam puting dan bermuara keluar. Di dalam dinding alveolus maupun saluran-saluran, terdapat otot polos yang bila berkontraksi memompa ASI keluar. (Mira, 2010).

2. Anatomi Fisiologi Payudara


Secara vertikal payudara terletak diantara kostal II dan IV, secara horisontal mulai dari pinggir sternum sampai linea aksilaris medialis. Kelenjar susu berada di jaringan sub kutan superficial dan profundus, yang menutupi muskulus pektoralis mayor. Ukuran normal 10-12 cm dengan beratnya pada wanita hamil adalah 200 gram, pada wanita hamil aterm 400-600 gram dan pada masa laktasi sekitar 600-800 gram. Bentuk dan ukuran payudara akan bervariasi menurut aktivitas fungsionalnya. Payudara menjadi besar saat hamil dan menyusui dan biasanya mengecil setelah menopause. Pembesaran ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan struma jaringan penyangga dan penimbunan jaringan lemak.

Ada 3 bagian utama payudara, korpus (badan), Areola, Papilla atau puting. Areola mammae (kalang payudara) letaknya mengelilingi puting susu dan berwarna kegelapan yang disebabkan oleh penipisan dan penimbunan pigmen pada kulitnya. Perubahan warna ini tergantung dari corak kulit dan adanya kehamilan. Pada wanita yang corak kulitnya kuning langsung akan berwarna jingga kemerahan, bila kulitnya kehitaman maka warnanya akan lebih gelap dan kemudian menetap.

Puting susu terletak setinggi interkosta IV, tetapi berhubung adanya variasi bentuk dan ukuran payudara maka letaknya pun akan bervariasi pula. Pada tempat ini terdapat lubang-lubang kecil yang merupakan muara dari duktus laktiferus, ujung-ujung serat otot polos yang tersusun secara sirkuler sehingga bila ada kontraksi maka duktus laktiferus akan memadat dan menyebabkan puting susu ereksi, sedangkan serat-serat otot yang longitudinal akan menarik kembali puting susu tersebut. Ada empat macam bentuk puting yaitu bentuk yang normal/umum, pendek/datar, panjang dan terbenam (*inverted*). Namun bentuk-bentuk puting ini tidak terlalu berpengaruh pada proses laktasi, yang penting adalah bahwa puting susu dan areola dapat ditarik sehingga membentuk tonjolan atau “dot” ke dalam mulut bayi. Kadang dapat terjadi puting tidak lentur terutama pada bentuk puting terbenam, sehingga butuh penanganan khusus agar bayi bias menyusu dengan baik.



Gambar 1. Bentuk puting susu normal



Gambar 2. Bentuk puting susu pendek



Gambar 3. Bentuk puting susu panjang




Gambar 4. Bentuk puting susu terbenam/terbalik (Asuhan Kebidanan, 2008).

Struktur payudara terdiri dari tiga bagian, yaitu kulit, jaringan subkutan (jaringan bawah kulit), dan corpus mammae. Corpus mammae terdiri dari parenkim dan stroma. Parenkim merupakan suatu struktur yang terdiri dari Duktus Laktiferus (duktus), Duktulus (duktulli), Lobus, dan Alveolus.

Ada 15-20 duktus laktiferus. Tiap-tiap duktus bercabang menjadi 20-40 duktuli. Duktulus bercabang menjadi 10-100 alveolus dan masing-masing dihubungkan dengan saluran air susu (*system duktus*) sehingga merupakan suatu pohon. Bila diikuti pohon tersebut dari akarnya pada puting susu, akan didapatkan saluran air susu yang disebut duktus laktiferus. Didaerah kalang payudara duktus laktiferus ini melebar membentuk sinus laktiferus tempat penampungan air susu. Selanjutnya duktus laktiferus terus bercabang-cabang menjadi duktus dan duktulus, tapi duktulus yang pada perjalanan selanjutnya disusun pada sekelompok alveoli. Didalam alveoli terdiri dari duktulus yang terbuka, sel-sel kelenjar

yang menghasilkan air susu dan miopitelium yang berfungsi memeras air susu keluar dari alveoli.



Gambar 5. Anatomi Payudara (Nugroho, 2011)

3. Perubahan payudara selama kehamilan

Perawatan payudara merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan untuk menyusui bayinya, hal ini dikarenakan payudara merupakan organ esensial penghasil ASI yaitu makanan pokok bayi baru lahir sehingga perawatannya harus dilakukan sedini mungkin. Dalam meningkatkan pemberian ASI pada bayi, masalah utama, dan prinsip bahwa ibu-ibu membutuhkan bantuan dan informasi serta dukungan agar merawat payudara pada saat hamil untuk mempersiapkan ASI pada saat melahirkan sehingga menambah keyakinan bahwa mereka dapat menyusui bayinya dengan baik dan mengetahui fungsi dan manfaat perawatan payudara pada saat hamil. Pada masa

kehamilan terjadi perubahan payudara yang disebabkan adanya peningkatan hormon estrogen. Pada minggu ke-6 sampai ke-8 jaringan lunak payudara menjadi lebih noduler, terdapat sensasi penuh, nyeri tekan, dan kesemutan, serta peningkatan suplai darah maka vena subkutan menjadi lebih nyata. Pada minggu ke-12 terjadi hiperpigmentasi pada areola dan papilla mammae, glandula sebacea di dalam areola membesar dan menyekresi sebum/minyak yang berguna melumasi mammae, muncul kelenjar-kelenjar yang disebut tuberkulum montgomeri, dan pada multigravida kolostrum sudah keluar. Fungsi kolostrum pada stadium ini adalah sebagai bakal keluarnya ASI secara bebas pada postnatal. Setelah 16 minggu muncul areola sekunder (suatu daerah yang berbercak yang timbul di daerah areola mammae). Kolostrum sejati setelah minggu ke-16, kolostrum ini mempunyai warna lebih kuning dan mempunyai konsistensi seperti krim. Dan warna areola lebih gelap pada waktu hamil (Mira, 2010).

Perawatan payudara yang dilakukan dengan benar dan teratur akan memudahkan si kecil mengkonsumsi ASI. Pemeliharaan ini juga merangsang produksi ASI dan mengurangi resiko luka saat menyusui (Suherni, 2008). Perawatan payudara merupakan suatu tindakan perawatan payudara yang dilaksanakan, baik oleh pasien maupun dibantu orang lain yang dilaksanakan mulai hari pertama atau kedua setelah melahirkan (Anggraini, 2010).

4. Perubahan payudara pada masa nifas

Masa nifas (puerperium) adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu (Saleha, 2009).

Periode masa nifas (puerperium) adalah periode waktu selama 6-8 minggu setelah persalinan. Proses ini dimulai setelah selesainya persalinan dan berakhir setelah alat-alat reproduksi kembali seperti keadaan sebelum hamil/tidak hamil sebagai akibat dari adanya perubahan fisiologi dan psikologi karena proses persalinan (Saleha, 2009).

Tahap perkembangan payudara dimulasi dari kehidupan intrauterine, yaitu dimulai pada minggu ke-4 kehidupan intrauterine. Saat lahir, payudara akan membesar pada hari pertama kehidupan. Hal ini disebabkan karena penarikan hormon maternal dari aliran darah bayi yang disertai dengan sekresi air susu (Mira, 2010).

Kolostrum sering juga disebut dengan susu jolong. Kolostrum adalah cairan emas, cairan pelindung yang kaya zat anti-infeksi dan berprotein tinggi. Kolostrum biasanya keluar pada hari pertama sampai hari keempat pascapartum. Pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan, tidak jarang kita mendengar seorang ibu baru mengatakan, “ASI saya belum keluar”. Sebenarnya, meski ASI yang keluar pada hari tersebut sedikit, tetapi volume yang ada di dalam payudara mendekati kapasitas lambung bayi yang berusia 1-2 hari, kolostrum yang encer dan sering kali

berwarna kuning atau dapat pula jernih ini lebih mengandung sel hidup yang menyerupai sel darah putih yang dapat membunuh kuman penyakit. Selain itu kolostrum juga merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan zat yang tidak terpakai dari usus bayi yang baru lahir sehingga mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang (Mira, 2010).

C. Tinjauan Umum Tentang Perawatan Payudara

1. Pengertian Perawatan Payudara

Perawatan payudara atau Breast Care adalah pemeliharaan payudara yang dilakukan untuk memperlancar ASI dan menghindari kesulitan pada saat menyusui dengan melakukan pemijatan (Weltford, 2009). Perawatan payudara sangat perlu dilakukan selama hamil sampai menyusui. Hal ini karena payudara merupakan satu- satu penghasil ASI yang merupakan makanan pokok bayi baru lahir sehingga harus dilakukan sedini mungkin (Azwar, 2008). Breast care disebut juga dengan perawatan payudara yang bertujuan untuk memelihara kebersihan payudara, memperbanyak atau memperlancar pengeluaran ASI sehingga dapat dengan mudah untuk proses menyusui (Anggraini, 2010).

Demi keberhasilan menyusui, payudara memerlukan perawatan sejak dini secara teratur. Perawatan payudara pada masa nifas bertujuan agar selama menyusui kelak produksi ASI cukup, tidak terjadi kelainan

pada payudara dan agar bentuk payudara tetap baik setelah menyusui (Nugroho, 2011).

2. Cara Perawatan Payudara

a. Perawatan Payudara Selama Kehamilan

Perawatan payudara yang dilakukan selama kehamilan akan membantu persiapan untuk menyusui anak nantinya. Bagian puting payudara harus digosok dan ditarik keluar perlahan-lahan selama kira-kira 2 menit setiap hari semenjak masa hamil muda. Apabila calon ibu menghendaki, obat gosok lanolin dapat diusapkan, terutama jika putingnya tergolong kering. Kira-kira sejak minggu ke-32, payudara harus dipijit dengan meletakkan kedua telapak tangan terbuka lebar disekeliling payudara, lalu menekannya ke arah puting sehingga akan terlihat ada cairan berwarna kuning yang keluar dari puting itu. Tindakan pemijatan ini dimaksudkan untuk menjaga agar saluran-saluran pada payudara tetap terbuka (Apel, 2011).

Perawatan payudara pada saat hamil :

Pada saat hamil, payudara akan membesar, sehingga BH yang kita miliki sebelumnya pasti akan terasa sempit. Oleh karena itu gantilah BH dengan ukuran yang pas sehingga bisa menyangga payudara dengan baik. Untuk menyusui bayi kita nanti, gantilah BH kita sebelumnya dengan BH khusus untuk menyusui. Pilih yang ukurannya pas, agar tidak menyebabkan infeksi pada payudara. Bersihkan payudara dan

puting. Mulailah merawat puting susu. Jika puting susu datar atau masuk ke dalam, konsultasikan dengan dokter sehingga bisa segera diatasi untuk mencegah kesulitan menyusui nantinya. Jangan gunakan sabun saat membersihkan payudara. Cukup basuh dengan air dan keringkan dengan handuk lembut. Sabun akan membuat payudara dan puting menjadi kering. Pada bulan-bulan terakhir kehamilan cobalah untuk memijat lembut payudara, terutama didaerah yang berwarna gelap (areola) dan disekitar puting untuk membuka saluran susu (Nadia, 2009).

Sebagai seorang tenaga kesehatan khususnya bidan harus benar-benar memperhatikan betapa pentingnya perawatan payudara untuk memperlancar produksi ASI. Perawatan payudara bisa dilakukan secara teratur 2 kali sehari, yaitu cucilah tangan sebelum masase, lalu tuangkan minyak kedua belah telapak tangan secukupnya, pengurutan dimulai dengan ujung jari caranya sokong payudara kiri dengan tangan kiri. Lakukan gerakan kecil dengan dua atau tiga jari tangan kanan mulai dari pangkal payudara dan berakhir dengan gerakan spiral pada daerah puting (Suherni, 2009).

Adapun langkah-langkah dalam perawatan payudara yaitu:

- 1) Pengurutan payudara
 - a. Tangan dilicinkan dengan minyak kelapa/baby oil

- b. Pengurutan payudara mulai dari pangkal menuju arah puting susu selama 2 menit (10 kali) untuk masing-masing payudara.
 - c. Handuk bersih 1-2 buah
 - d. Air hangat dan air dingin dalam baskom
 - e. Waslap atau sapu tangan dan handuk
- 2) Langkah-langkah pengurutan payudara
- a. Pengurutan yang pertama
Licinkan kedua tangan dengan minyak tempatkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara lakukan pengurutan, dimulai dari arah atas lalu arah sisi samping kiri kemudian kearah kanan, lakukan terus pengurutan kebawah atau melintang. Lalu kedua tangan dilepas dari payudara. Ulangi gerakan 20-30 kali untuk setiap satu payudara
 - b. Pengurutan yang kedua
Sokong payudara kiri dengan tangan kiri, kemudian dua atau tiga jari tangan kanan mulai dari pangkal payudara dan berakhir pada puting susu. Lakukan tahap mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi kearah puting susu. Lakukan gerakan 20-30 kali
 - c. Pengurutan yang ketiga
Menyokong payudara dengan satu tangan, sedangkan tangan lain mengurut dan menggemgam dari pangkal menuju ke puting susu. Lakukan gerakan 20-30 kali.

d. Pengompresan

Alat-alat yang disiapkan:

1. 2 buah kom sedang yang masing-masing diisi dengan air hangat dan air dingin
2. 2 buah waslap

Caranya:

Kompres kedua payudara dengan waslap hangat selama 2 menit, kemudian ganti dengan kompres dingin selama 1 menit. Kompres bergantian selama 3 kali berturut-turut dengan kompres air hangat

3. Menganjurkan ibu untuk memakai BH khusus untuk menyusui.

3) Perawatan puting susu

Puting susu memegang peranan penting pada saat menyusui. Air susu ibu akan keluar dari lubang-lubang pada puting susu oleh karena itu puting susu perlu dirawat agar dapat bekerja dengan baik, tidak semua wanita mempunyai puting susu yang menonjol (normal). Ada wanita yang mempunyai puting susu dengan bentuk yang mendatar atau masuk kedalam, bentuk puting susu tersebut tetap dapat mengeluarkan ASI jika dirawat dengan benar. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk merawat puting susu:

- a. Setiap pagi dan sore sebelum mandi puting susu (daerah areola mammae), satu payudara diolesi dengan minyak kelapa sekurang-kurangnya 3-5 menit, lama 4-5 kali.
- b. Jika puting susu normal, lakukan perawatan dengan oleskan minyak pada ibu jari dan telunjuk lalu letakkan keduanya pada puting susu dengan gerakan memutar dan ditarik-tarik selama 30 kali putaran untuk kedua puting susu.
- c. Jika puting susu datar atau masuk kedalam lakukan tahapan berikut:
 - 1) Letakkan kedua ibu jari disebelah kiri dan kanan puting susu, kemudian tekan dan hentakkan kearah luar menjauhi puting susu secara perlahan.
 - 2) Letakkan kedua ibu jari diatas dan dibawah puting susu lalu tekan serta hentakkan kearah puting susu secara perlahan.
- d. Kemudian untuk masing-masing puting digosok dengan handuk kasar agar kotoran-kotoran yang melekat pada puting susu dapat terlepas.
- e. Akhirnya payudara dipijat untuk mencoba mengeluarkan ASI. Lakukan langkah-langkah perawatan diatas 4-5 kali pada pagi dan sore hari, sebaiknya tidak menggunakan alkohol atau sabun untuk membersihkan puting susu karena akan menyebabkan puting susu kering dan lecet. Pengguna pompa ASI atau bekas jarum suntik yang dipotong ujungnya juga dapat digunakan

untuk mengatasi masalah pada puting susu yang terbenam (Anggraini, 2010).

b. Perawatan Payudara Pada Masa Nifas

Beberapa hari setelah melahirkan, sebelum ASI terbentuk, payudara ibu akan terus mengeluarkan kolostrum (cairan kental berwarna kekuningan). Tetap berikan kolostrum ini pada bayi, karena kolostrum ini akan memenuhi semua kebutuhan nutrisi bayi. Pada saat ASI mulai diproduksi, payudara mulai terasa kencang, bengkak dan tidak nyaman, karena itu segera susui bayi sesegera dan sesering mungkin. Namun agar tidak mengalami kesulitan selama periode menyusui, kita perlu melakukan perawatan payudara. Perawatan payudara setelah melahirkan dapat dengan melakukan beberapa pemijatan, demi kesehatan kita dan si kecil, memang harus ada ketelatenan untuk merawat payudara kita. Lakukan perawatan payudara dan puting selama kehamilan, selama menyusui dan juga setelah kita tidak menyusui bayi lagi. Ini sangat baik untuk menjaga dan merawat bagian tubuh kita dan menghindari penyakit kanker payudara yang biasa menyerang wanita. Dengan memberi perhatian khusus pada payudara, kita akan menyadari sejak dini segala perubahan dalam payudara dan juga bisa member nutrisi eksklusif untuk bayi kita (Nadia, 2009).

Perawatan payudara pada masa nifas merupakan kelanjutan dari perawatan payudara semasa hamil (Apel, 2011). Ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan perawatan payudara pasca persalinan, yaitu:

- a. Puting susu dikompres dengan kapas selama 3-4 menit, kemudian bersihkan dengan kapas minyak tadi
- b. Pengenyalan yaitu puting susu dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk diputar kedalam 20 kali keluar 20 kali
- c. Penonjolan puting susu yaitu:
 1. Puting susu cukup ditarik sebanyak 20 kali
 2. Dirangsang dengan menggunakan ujung waslap
 3. Memakai pompa puting susu
- d. Pengurutan payudara:
 1. Telapak tangan petugas diberi baby oil kemudian diratakan
 2. Peganglah payudara lalu diurut dari pangkal ke puting susu sebanyak 30 kali
 3. Pijatlah puting susu pada daerah areola mammae untuk mengeluarkan kolostrum
 4. Bersihkan payudara dengan air bersih memakai waslap

(Setiawati, 2012).




Gambar 6. Pengurutan buah dada dari tengah ke samping kemudian ke bawah



Gambar 7. Pengurutan buah dada berputar dari tengah ke samping kemudian ke bawah



Gambar 8. Pengurutan buah dada berputar dari tengah ke samping kemudian ke bawah



Gambar 9. Pengurutan buah dada dari pangkal ke puting dan membersihkan payudara dengan waslap (Varney, 2008).

Kadang-kadang, pada minggu pertama setelah melahirkan, payudara ibu akan terasa bengkak karena adanya sumbatan pada saluran ASI. Bila hal tersebut dibiarkan, lama-lama akan terjadi infeksi dan menyebabkan peradangan pada payudara, yang disebut mastitis. Peradangan tersebut dapat terjadi pada satu atau kedua payudara sekaligus penyebab pasti terjadinya mastitis belum diketahui. Umumnya terjadi pada minggu ke-2 hingga ke-7 setelah persalinan. Meskipun demikian, mastitis dapat juga terjadi pada wanita yang tidak menyusui ataupun hamil. Bakteri biasanya masuk melalui puting susu yang pecah-pecah atau terluka (Arini, 2012).

3. Manfaat Perawatan Payudara

a. Manfaat Perawatan Payudara Selama Kehamilan

Perawatan payudara dilakukan secara benar dan teratur agar dapat menguatkan, melenturkan dan mengatasi terpendamnya puting susu sehingga bayi mudah menghisap ASI dan juga menjaga kebersihan payudara, mencegah penyumbatan dan bermanfaat untuk memperkuat kulit sehingga mencegah terjadinya luka pada saat mulai menyusui. Perawatan payudara juga bermanfaat merangsang payudara

mempengaruhi hipofise untuk mengeluarkan hormon prolaktin dan oksitosin. Perawatan payudara pada masa kehamilan tidak diperkenankan sebagai upaya memperlancar pengeluaran ASI, tetapi bertujuan untuk menjaga kebersihan payudara, memperbaiki kondisi puting susu yang mengalami kelainan bentuk dan menstimulasi produksi ASI. Berat payudara akan bertambah selama hamil, karena itu ibu disarankan memakai bra yang sesuai dengan pembesaran payudara yang sifatnya menyokong payudara dari bawah dan bukan menekan dari depan. Ketika mandi, daerah puting payudara tidak boleh disabuni karena akan membuang lemak atau minyak alami yang diproduksi kelenjar Montgomery dan akan membuat puting payudara menjadi kering. Ibu hamil juga harus diberitahu bahwa pada trimester akhir payudara akan mengeluarkan cairan berwarna kekuningan yang dinamakan kolostrum. Untuk mencegah penyumbatan, kolostrum harus dikeluarkan. Perawatan payudara ini sebaiknya dilakukan selama masa kehamilan yaitu pada usia kehamilan setelah delapan bulan (trimester III). Ibu-ibu hamil tidak akan mengalami kesulitan dalam pemberian ASI bila sejak awal mengetahui bagaimana perawatan payudara (*breast care*) yang tepat dan benar (Bobak, 2004).

Perawatan payudara selama hamil memiliki banyak manfaat antara lain:

- Menjaga kebersihan payudara terutama kebersihan puting susu.

- Melenturkan dan menguatkan puting susu sehingga memudahkan bayi untuk menyusui.
- Merangsang kelenjar-kelenjar air susu sehingga produksi ASI banyak dan lancar.
- Dapat mendeteksi kelainan-kelainan payudara secara dini dan melakukan upaya untuk mengatasinya.
- Mempersiapkan mental ibu untuk menyusui.

Bila seorang ibu hamil tidak melakukan perawatan payudara dengan baik dan hanya melakukan perawatan menjelang melahirkan atau setelah melahirkan maka sering dijumpai masalah-masalah yang akan merugikan ibu dan bayi, diantaranya ASI tidak keluar, puting susu tidak menonjol, produksi ASI sedikit, infeksi pada payudara, dll. Masalah-masalah tersebut bisa dicegah dengan melakukan perawatan payudara sedini mungkin. perawatan payudara selama kehamilan adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan dalam pemberian air susu ibu (ASI). Manfaatnya yaitu dengan melakukan perawatan payudara secara benar dan teratur dapat menguatkan dan mengatasi terpendamnya puting susu sehingga bayi mudah menghisap ASI dan juga menjaga kebersihan payudara, mencegah penyumbatan dan bermanfaat untuk memperkuat kulit sehingga mencegah terjadinya luka pada saat mulai menyusui (Oswari, 2004).

Kehamilan merupakan masa yang menggembirakan bagi calon orang tua dan keluarga. Calon orang tua terutama calon ibu perlu memiliki pengetahuan dan kesiapan untuk hamil, melahirkan dan menyusui anak. Perawatan payudara bertujuan untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah tersumbatnya aliran susu sehingga memperlancar pengeluaran ASI, serta menghindari terjadinya pembengkakan dan kesulitan menyusui, selain itu juga menjaga kebersihan payudara agar tidak mudah terkena infeksi (Anggraini, 2010).

Perawatan payudara selama kehamilan adalah salah satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan dalam pemberian air susu ibu (ASI). Banyak ibu yang yang mengeluh bayinya tidak mau menyusui, biasanya ini dipengaruhi oleh faktor teknis seperti puting susu yang masuk atau posisi menyusui yang salah. Dalam meningkatkan pemberian ASI pada bayi, ibu-ibu membutuhkan bantuan dan informasi serta dukungan agar merawat payudara pada saat hamil untuk mempersiapkan ASI pada saat melahirkan sehingga menambah keyakinan bahwa mereka dapat menyusui bayinya dengan baik dan mengetahui fungsi dan manfaat perawatan payudara pada saat hamil (Nurhati, 2009).

b. Manfaat Perawatan Payudara Pada Masa Nifas

Payudara adalah salah satu bagian terpenting dalam tubuh seorang wanita. Selain bisa memperindah bentuk tubuh, payudara kita dapat memproduksi ASI (Air Susu Ibu) yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan anak. Jadi, merawat payudara sejak hamil dan setelah melahirkan sangat penting sekali. Selain berguna bagi kesehatan kita sendiri, juga berguna bagi kebutuhan nutrisi si kecil (Nadia, 2009). Menurut suherni (2009), setelah persalinan dan disaat menyusui selain payudara terlihat indah dan kencang, perawatan payudara yang dilakukan dengan benar dan teratur akan memudahkan si kecil mengkonsumsi ASI. Perawatan payudara merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan untuk menyusui nantinya, hal ini dikarenakan payudara merupakan organ esensial penghasil ASI yaitu makanan pokok bayi baru lahir sehingga perawatannya harus dilakukan sedini mungkin. Dalam meningkatkan pemberian ASI pada bayi, masalah utama dan prinsip yaitu bahwa ibu-ibu membutuhkan bantuan dan informasi serta dukungan agar merawat payudara pada saat hamil untuk mempersiapkan ASI pada saat melahirkan sehingga menambah keyakinan bahwa mereka dapat menyusui bayinya dengan baik dan mengetahui fungsi dan manfaat perawatan payudara pada saat hamil (Anwar, 2005).

Manfaat perawatan payudara yaitu menjaga kebersihan payudara, terutama kebersihan puting susu agar terhindar dari infeksi

melunakkan serta memperbaiki bentuk puting susu sehingga bayi dapat menyusui dengan baik (Enggar, 2011). Perawatan payudara adalah suatu tindakan untuk merawat payudara terutama pada masa nifas untuk memperlancar pengeluaran ASI. Perawatan payudara dapat dilakukan dua kali sehari yaitu saat mandi pagi dan mandi sore.

Berikut adalah manfaat perawatan payudara pada masa nifas yaitu:

- a. Memelihara kebersihan payudara sehingga bayi mudah menyusui pada ibunya
- b. Melenturkan dan menguatkan puting susu sehingga bayi mudah menyusui
- c. Mengurangi resiko luka saat bayi menyusui
- d. Merangsang kelenjar air susu sehingga produksi ASI menjadi lancar
- e. Untuk persiapan psikis ibu menyusui dan menjaga bentuk payudara
- f. Mencegah penyumbatan pada payudara
- g. Mencegah penyumbatan pada payudara (Karmiasih, 2012).

4. Dampak Tidak Melakukan Perawatan Payudara

a. Selama Kehamilan

perawatan payudara selama kehamilan adalah salah satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan dalam pemberian air susu ibu (ASI). Banyak ibu yang mengeluh bayinya tidak mau menyusui, biasanya ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti puting

susu yang masuk atau posisi menyusui yang salah. Dalam meningkatkan pemberian ASI pada bayi, ibu-ibu membutuhkan bantuan dan informasi serta dukungan agar merawat payudara pada saat hamil untuk mempersiapkan ASI pada saat melahirkan. Perawatan payudara selama kehamilan adalah salah satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan dalam pemberian ASI. Tetapi sebagian besar ibu hamil tidak melakukan perawatan payudara karena kurangnya pengetahuan dalam perawatan payudara itu sendiri. Walaupun ada ibu yang melakukan perawatan payudara, perilaku dan tehnik yang dilakukan pun belum benar. Padahal, selama kehamilan payudara akan membengkak dan daerah sekitar puting warnanya akan lebih gelap. Dengan adanya pembengkakan tersebut, payudara menjadi mudah teriritasi bahkan mudah luka.

Selama Sembilan bulan kehamilan jaringan payudara tumbuh dan menyiapkan fungsinya untuk menyediakan makanan bagi bayi baru lahir. Akan tetapi biasanya banyak kendala-kendala yang terjadi pada payudara akibat perubahan fisiologis post partum (Hamilton, 2005). Kendala-kendala tersebut seperti puting yang masuk ke dalam, payudara bengkak, nyeri pada puting susu, puting susu pecah-pecah, infeksi payudara. Saluran ASI tersumbat, laktasi yang tidak memadai dan juga produksi ASI yang kurang. Beberapa kendala tersebut ada yang bisa dideteksi atau dilihat pada saat ibu masih hamil. Akan tetapi ibu yang hamil sering kali mengabaikan atau bahkan tidak mengetahui

tentang proses pengembangan jaringan. Penghasil ASI juga merupakan titik awal yang sangat terpengaruh terhadap keberhasilan menyusui. Oleh karena itu perawatan payudara penting dilakukan selain untuk mempersiapkan ibu untuk menyusui juga untuk mencegah terjadinya kendala-kendala yang terjadi pada payudara setelah melahirkan (Roesli, 2004).

b. Pada Masa Nifas

Berbagai dampak negatif dapat timbul jika tidak dilakukan perawatan payudara sedini mungkin. Dampak tersebut meliputi :

1. Payudara Bengkak (Engorgement)

Sekitar hari ketiga atau keempat sesudah ibu melahirkan, payudara sering terasa lebih penuh, tegang, serta nyeri. Keadaan seperti ini disebut engorgement (payudara bengkak) yang disebabkan oleh adanya statis di vena dan pembuluh darah bening. Hal ini merupakan tanda bahwa ASI mulai banyak disekresi. Apabila dalam keadaan tersebut ibu menghindari menyusui karena alasan nyeri lalu memberikan *prelacteal feeding* (makanan stambahan) pada bayi, keadaan tersebut justru berlanjut. Payudara akan bertambah bengkak atau penuh karena sekresi ASI terus berlangsung sementara bayi tidak disusukan sehingga tidak terjadi perangsangan pada puting susu yang mengakibatkan refleksi oksitosin tidak terjadi dan ASI tidak dikeluarkan. Jika hal ini terus

berlangsung, ASI yang disekresi menumpuk pada payudara dan menyebabkan areola (bagian berwarna hitam yang melingkari puting) lebih menonjol, puting menjadi datar dan sukar dihisap oleh bayi ketika disusukan. Bila keadaan sudah sampai seperti ini, kulit pada payudara akan nampak lebih merah mengkilat, terasa nyeri sekali dan ibu merasa demam seperti influenza.

Untuk mencegah terjadinya payudara bengkak, beberapa cara yang dianjurkan antara lain sebagai berikut:

- a. Susukan bayi segera setelah lahir, apabila memungkinkan
- b. Susukan bayi tanpa dijadwal (*on demand/* sesuka bayi)
- c. Keluarkan ASI dengan tangan atau pompa bila produksi melebihi kebutuhan bayi
- d. Lakukan perawatan payudara pasca persalinan
- e. Keluarkan sedikit ASI sebelum menyusui agar payudara lebih lembek, sehingga puting lebih mudah diisap oleh bayi
- f. Kompres dingin untuk mengurangi sakit pada payudara
- g. Berikan kompres hangat sebelum menyusui untuk memudahkan bayi mengisap (menangkap) puting susu.
- h. Lakukan pengurutan (masase) payudara yang dimulai dari puting ke arah payudara untuk mengurangi peningkatan peredaran darah dan terjadinya stasis di pembuluh darah dan pembuluh getah bening dalam payudara (Andriyani, 2012).

Dalam keadaan ini hendaknya jangan terlalu banyak minum cairan. Namun bukan berarti tidak boleh sama sekali. Jika terasa haus, cukup minum setengah gelas air. Sekalipun demikian, sang ibu tidak boleh berhenti menyusui karena jika berhenti air susu akan memenuhi payudara, dan secara otomatis tubuh akan mengurangi produksi ASI (Lamadhah, 2009).

2. Bendungan ASI

Bendungan ASI adalah penyumbatan pada duktus laktiferus akibat hambatan aliran air susu karena tekanan internal dan eksternal (pembesaran dan pakaian ketat).

a. Tanda dan Gejala

keluhan pada ibu yang mengalami bendungan ASI adalah :

1. Payudara bengkak
2. Payudara keras
3. Payudara panas
4. Payudara terasa nyeri karena adanya pembengkakan yang terlokalisasi
5. Benjolan pada payudara terlihat jelas dalam perabaan terasa lunak

b. Etiologi

penyebab terjadinya bendungan ASI adalah :

1. Keterlambatan dalam pemberian ASI dini

2. Posisi menyusui yang kurang baik sehingga mulut bayi tidak menutupi areola mammae
3. Ibu tidak menyusui bayinya secara tidak terjadwal (on-demand)
4. Pakaian yang terlalu ketat

c. Penatalaksanaan Bendungan ASI

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi bendungan ASI adalah :

1. Anjurkan pada ibu untuk menyusui sedini mungkin dan tidak terjadwal
2. Ajarkan pada ibu cara menyusui yang baik apakah dengan cara duduk atau berbaring
3. Hindari pakaian yang ketat karena dapat menekan duktus laktiferus
4. Lakukan masase payudara dan pemerah ASI untuk meningkatkan aliran ASI dengan membersihkan sinus-sinus dan duktus-duktus laktiferus kolostrum pertama yang lengket. Duktus dan sinus ini digunakan untuk mengurangi pembengkakan, membantu bayi menyusu, dan mengumpulkan ASI untuk pemberian susu botol (mis : pada bayi premature atau ketika ibu tidak ada ditempat) (Setiawati, 2012).

3. Radang payudara (*Mastitis*)

Radang payudara (*mastitis*) adalah infeksi yang menimbulkan reaksi sistemik (seperti demam) pada ibu. Hal ini biasanya terjadi pada 1-3 pekan setelah melahirkan dan sebagai komplikasi saluran susu tersumbat. Keadaan ini biasanya diawali dengan puting susu lecet/luka. Gejala-gejala yang bias diamati pada radang payudara antara lain kulit Nampak lebih merah, payudara lebih keras serta nyeri dan berbenjol-benjol (merongkol).

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, ibu perlu dianjurkan agar tetap menyusui bayinya supaya tidak terjadi statis dalam payudara yang cepat menyebabkan terjadinya abses. Ibu perlu mendapatkan pengobatan (Antibiotika, antipiretik/penurun panas, dan analgesic/pengurang nyeri) serta banyak minum dan istirahat untuk mengurangi reaksi sistemik (demam). Bilamana mungkin, ibu dianjurkan untuk melakukan senam laktasi (senam menyusui) yaitu menggerakkan lengan secara berputar sehingga persendian bahu ikut bergerak ke arah yang sama. Gerakan demikian ini akan membantu memperlancar peredaran darah dan limfe di daerah payudara sehingga statis dapat dihidari yang berarti mengurangi kemungkinan terjadinya abses payudara (Andriyani, 2012).

4. Puting susu nyeri atau lecet

Puting susu nyeri pada ibu menyusui biasanya terjadi karena beberapa sebab sebagai berikut :

- a. Posisi bayi saat menyusui yang salah, yaitu puting susu tidak masuk ke dalam mulut bayi sampai pada areola sehingga bayi hanya mengisap pada puting susu saja. Hisapan/tekanan terus menerus hanya pada tempat tertentu akan menimbulkan rasa nyeri waktu diisap, meskipun kulitnya masih utuh.
- b. Pemakaian sabun, lotion, cream, alkohol dan lain-lain yang dapat mengiritasi puting susu.
- c. Bayi dengan tali lidah pendek (*frenulum linguae*) yang pendek sehingga menyebabkan bayi sulit mengisap sampai areola dan isapan hanya pada putingnya saja.
- d. Kurang hati-hati ketika menghentikan menyusui (mengisap).

Puting susu nyeri biasanya dapat disembuhkan setelah memperhatikan teknik menyusui yang benar, khususnya letak puting dalam mulut bayi, yaitu bibir bayi menutup areola sehingga tidak nampak dari luar, puting di atas lidah bayi, areola diantara gusi atas dan bawah.

5. Saluran Susu Tersumbat

Saluran susu tersumbat (*obstructive duct*) adalah suatu keadaan dimana terjadi sumbatan pada satu atau lebih saluran susu

yang disebabkan oleh tekanan jari waktu menyusui atau pemakaian BH yang terlalu ketat. Hal ini juga dapat terjadi karena komplikasi payudara bengkak yang berlanjut mengakibatkan kumpulan ASI dalam saluran susu tidak segera dikeluarkan sehingga merupakan sumbatan. Sumbatan ini pada wanita yang kurus dapat terlihat dengan jelas sebagai benjolan yang lunak pada perabaannya.

Untuk mengatasi terjadinya saluran susu tersumbat (*obstructive duct*) ada beberapa hal yang dianjurkan, antara lain :

- a. Sebaiknya ibu melakukan perawatan payudara setelah melahirkan agar tidak terjadi stasis dalam payudara yang mengakibatkan terjadinya radang payudara (*mastitis*).
- b. Gunakan BH dengan desain menopang (menyangga), bukan menekan payudara
- c. Keluarkan ASI setiap kali selesai menyusui bila payudara masih terasa penuh

Sumbatan saluran susu ini harus segera diatasi karena dapat berlanjut menjadi radang payudara (*mastitis*). Untuk mengurangi nyeri dan bengkak pada payudara dapat diberikan kompres hangat dan dingin, yaitu kompres hangat sebelum menyusui dengan tujuan mempermudah bayi mengisap puting susu dan kompres dingin setelah menyusui untuk mengurangi nyeri dan bengkak.

6. Kelainan puting susu

Kebanyakan ibu tidak memiliki kelainan anatomis payudara. Meskipun demikian, kadang-kadang dijumpai juga kelainan anatomis yang menghambat kemudahan bayi untuk menyusui, misalnya puting susu datar atau puting susu terpendam (tertarik ke dalam). Disamping kelainan anatomis, kadang dijumpai pula kelainan puting yang disebabkan oleh suatu proses, misalnya tumor.

a. Puting susu datar

Apabila areola dijepit antara jari telunjuk dan ibu jari di belakang puting, puting yang normal akan menonjol keluar, bila tidak, berarti puting datar. Ketika menyusui puting menjadi lebih tegang dan menonjol karena otot polos puting berkontraksi, meskipun demikian pada keadaan puting datar akan tetap sulit ditangkap/diisap oleh mulut bayi

b. Puting susu terpendam (tertarik ke dalam)

Sebagian atau seluruh puting susu tampak terpendam atau masuk ke dalam areola (tertarik ke dalam). Hal ini karena ada sesuatu dibawahnya yang menarik puting ke dalam, misalnya tumor atau penyempitan saluran susu. Kelainan puting tersebut seharusnya sudah dapat diketahui sejak hamil atau sebelumnya sehingga dapat diperbaiki dengan meletakkan kedua jari telunjuk atau ibu jari di daerah payudara, kemudian

dilakukan pengurutan menuju kearah berlawanan. Perlu diketahui bahwa tidak semua kelainan tersebut di atas dapat dikoreksi dengan cara tersebut. Untuk itu, ibu menyusui dianjurkan untuk mengeluarkan ASI-nya dengan manual (tangan) atau pompa kemudian diberikan pada bayi dengan sendok atau pipet.

7. Abses payudara

Kelanjutan/komplikasi dari radang payudara akan menjadi abses. Hal ini disebabkan oleh meluasnya peradangan dalam payudara tersebut dan menyebabkan ibu tampak lebih parah sakitnya, payudara lebih merah mengkilap, benjolan tidak sekeras pada radang payudara (*mastitis*), tetapi tampak lebih penuh/bengkak berisi cairan. Bila payudara seperti ini perlu segera diperiksakan ke dokter ahli supaya mendapat tindakan medis yang cepat dan tepat. Mungkin perlu dilakukan tindakan insisi untuk drainase (operasi kecil untuk mengeluarkan cairan/nanah), pemberian antibiotik dan analgesik (anti nyeri).

Ibu dianjurkan banyak minum dan istirahat. Bayi dihentikan untuk menyusui sementara waktu pada payudara sakit dan setelah sembuh dapat disusukan kembali. Akan tetapi, bayi tetap bias menyusui pada payudara yang sehat tanpa dijadwal (sesuka bayi) (Andriyani, 2012).

E. Tinjauan Agama Tentang Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan Pada Masa Nifas

Q.S. Al-Baqarah : 2/222, yaitu :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri^[137] dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci^[138]. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Ayat diatas menjelaskan tentang haid. Melakukan hubungan biologis pada waktu haid kadang-kadang dapat menimbulkan kenikmatan dalam kehidupan, seperti binatang di samping menimbulkan kotoran dan gangguan serta bahaya baik bagi si lelaki maupun si wanita. Tetapi, tidak dapat mewujudkan sasaran yang paling tinggi, apalagi fitrah yang sehat dan bersih pasti merasa jijik terhadapnya pada waktu itu. Karena fitrah yang sehat memiliki keputusan dari dalam untuk mengendalikan kehidupannya. Maka, sesuai dengan keputusannya, ia akan berpaling dari

melakukan hubungan biologis pada saat yang tidak memungkinkannya menanam benih dan menumbuhkan kehidupan. Sedangkan, melakukan hubungan biologis pada saat suci akan menimbulkan kenikmatan yang alami, dan mencapai tujuan fitrah (yang suci). Karena itu, datanglah jawaban terhadap pertanyaan tersebut,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah kotoran.’ oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.”

Lebih dari itu, masalah hubungan biologis bukan semata-mata masalah mencurahkan hasrat dan memperturutkan nafsu syahwat. Tetapi, ia terikat dengan perintah Allah. Karena ia merupakan suatu aktivitas yang diperintahkan

Dan ditugaskan dari Allah, yang diikat dengan aturan-aturan dan batas-batas tertentu,

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.”

Hal itu dilakukan di tempat menanam benih (vagina), bukan lainnya. Jadi, tujuannya bukan semata-mata melepaskan syahwat, melainkan untuk mengembangkan kehidupan dan mencari apa yang telah ditetapkan Allah. Maka, Allah menetapkan yang halal dan yang ditetapkan untuknya oleh Allah itu, dan bukan dia sendiri yang menimbulkan apa yang dicarinya itu. Allah memfardhukan sesuatu untuk mensucikan hamba-hamba-Nya. Dia mencintai orang-orang yang bertaubat kepada-Nya mana kala mereka berbuat salah dan kembali kepada-Nya sambil memohon ampunan-Nya.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

Haid adalah keluarnya darah dari rahim (melalui kemaluan) wanita dalam keadaan normal, bukan karena luka, sakit atau melahirkan. Menurut kebiasaan, mulai keluarnya ialah ketika seorang anak perempuan mencapai usia sekitar Sembilan tahun atau lebih. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita karena melahirkan. Lamanya tidak dapat ditentukan.

Dan Q.S. Al-Baqarah : 2/233, yaitu :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Terjemahnya :


“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh”

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya penyusuan bayi selama dua tahun penuh. Dari hasil pemeriksaan para ahli medis menunjukkan bahwa air susu ibu tersusun dari saripati yang benar-benar murni. Juga air susu ibu merupakan makanan yang paling baik untuk bayi, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi. Di samping itu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu ini berhubungan erat dengan perkembangan jiwa dan mental anak. Dengan demikian kurang tepat tindakan sementara para ibu yang tidak mau menyusui anaknya secara langsung hanya karena kepentingan pribadinya, umpamanya untuk memelihara kecantikan. Padahal hal ini bertentangan dengan fitrahnya sendiri dan secara tidak langsung ia tidak membina dasar hubungan keibuan dengan anaknya sendiri dalam bidang mental.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Skema Kerangka Konsep



2. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Penilaian pengetahuan dapat dilihat dari setiap item pertanyaan yang akan diberikan peneliti kepada responden. Kategori pertanyaan dapat ditentukan dengan kriteria:

Baik : Jika pertanyaan dijawab dengan benar 76-100%

Cukup : Jika pertanyaan dijawab dengan benar 56-75%

Kurang : Jika pertanyaan dijawab dengan benar <55%

(Arikunto, 2006).

- a. Pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Pengetahuan ibu hamil tentang pengertian perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil mengenai perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Kriteria Objektif

Pengetahuan baik :Jika pertanyaan dijawab dengan benar 76-100% dari seluruh pertanyaan tentang pengertian perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Pengetahuan cukup :Jika pertanyaan dijawab dengan benar 56-75% dari seluruh pertanyaan tentang pengertian perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Pengetahuan Kurang :Jika pertanyaan dijawab dengan benar <56% dari seluruh pertanyaan tentang pengertian perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

- b. Pengetahuan ibu hamil tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil

tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif

Pengetahuan baik :Jika pertanyaan dijawab dengan benar 76-100% dari seluruh pertanyaan tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Pengetahuan cukup :Jika pertanyaan dijawab dengan benar 56-75% dari seluruh pertanyaan tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Pengetahuan kurang :Jika pertanyaan dijawab dengan benar < 56% dari seluruh pertanyaan tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

- c. Pengetahuan ibu hamil tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil mengenai manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif

Pengetahuan baik :Jika pertanyaan dijawab dengan benar 76-100% dari seluruh pertanyaan tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Pengetahuan cukup :Jika pertanyaan dijawab dengan benar 56-75% dari seluruh pertanyaan tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Pengetahuan kurang :Jika pertanyaan dijawab dengan benar < 56% dari seluruh pertanyaan tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

- d. Pengetahuan ibu hamil tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil mengenai dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif

Pengetahuan baik :Jika pertanyaan dijawab dengan benar 76-100% dari seluruh pertanyaan tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Pengetahuan cukup :Jika pertanyaan dijawab dengan benar 56-75% dari seluruh pertanyaan tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Pengetahuan kurang :Jika pertanyaan dijawab dengan benar < 56% dari seluruh pertanyaan tentang dampak tidak

melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey dimana peneliti menguraikan atau memberi gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif mengenai gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RB Mattiro Baji di jalan Syamsuddin Tunru No. 115 Sungguminasa, Kabupaten Gowa Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini adalah karena RB Mattiro Baji Gowa merupakan salah satu RB yang mempergunakan pelayanan kesehatan yang diprogramkan oleh pemerintah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan pada bulan juli 2013

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arikunto (2006) populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan diri di ruangan ANC RB Mattiro Baji Gowa pada bulan Mei 2013 dengan jumlah populasi 99 orang.

2. Sampel

a. Pengertian Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006).

b. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dimana semua ibu hamil yang memenuhi kriteria inklusi pada saat melakukan penelitian dipilih sebagai sampel.

Adapun kriterianya yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi

- a. Ibu hamil yang bisa baca tulis
- b. ibu hamil yang bersedia menjadi responden

2. Kriteria Eksklusi

- a. Ibu hamil yang tidak bisa baca tulis

- b. Ibu hamil yang tidak bersedia menjadi responden
- c. Besar Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi ibu hamil yang memeriksakan diri di ruangan Antenatal Care di RB Mattiro Baji dengan jumlah populasi 80 orang.

Sampel dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

Keterangan :

N = Besar populasi

n = Besar sampel

d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan

Penyelesaian :

N = 99 orang

d = 0,05 → d² = 0,0025

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

$$n = \frac{99}{1 + 99(0,0025)}$$

$$n = \frac{99}{1 + (0,2225)}$$

$$n = \frac{99}{(1,2475)} = 80$$

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah minimal sebanyak 80 orang.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan menggunakan data primer yaitu dengan membagikan kuesioner kepada responden dalam bentuk angket

E. Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah secara manual menggunakan kalkulator dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

2. Pemberian Kode (coding)

Merupakan kegiatan pemberian kode atau numerik yang terdiri atas beberapa kategori.

3. Memasukkan data (data entry)

Adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master tabel kemudian membuat distribusi frekwensi sederhana.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh diolah selanjutnya dianalisis untuk mengetahui distribusi frekuensi atau presentase gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas di RB Mattiro Baji Gowa pada bulan juli 2013 dengan menggunakan rumus ditribusi frekuensi sebagai berikut:

$$P=f/n \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase yang dicari

f : Frekuensi faktor variabel

n : Jumlah sampel

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RB Mattiro Baji Gowa, data primer diperoleh dengan membagikan kuesioner pada 80 responden dan didapatkan hasil yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah paritas, umur pendidikan, pekerjaan, agama dan suku.

a. Paritas

Paritas responden bervariasi ada primipara, multipara dan grandemultipara yang dapat didistribusikan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Ibu Hamil Berdasarkan Paritas
Di RB Mattiro Baji Gowa

Tahun 2013

Paritas	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Primipara	60	75
Multipara	17	21,3
Grandemultipara	3	3,8
Jumlah	80	100

Sumber : Data Primer

Tabel 4.1 menunjukkan distribusi responden berdasarkan paritas, dari 80 responden, jumlah responden terbanyak adalah primipara sebanyak 55 (62,5%) responden, kemudian multipara sebanyak 18 (20,5%) responden, dan yang paling sedikit adalah grandemultipara sebanyak 15 (17,1%) responden.

b. Umur

Umur responden bervariasi antara 18 tahun sampai 44 tahun yang dapat didistribusikan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Ibu Hamil Berdasarkan Umur
Di RB Mattiro Baji Gowa
Tahun 2013

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
<20	4	5
20-35	70	87,5
>35	6	7,5
Jumlah	80	100

Sumber : Data Primer

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 80 responden, distribusi tertinggi pada kelompok umur 20-35 tahun sebanyak 70 (82,5%) responden, kemudian kelompok umur >35 tahun sebanyak 6 (7,5%) responden dan kelompok umur <20 tahun berjumlah 4 (5%) responden.

c. Pendidikan

Pendidikan yang pernah dilalui oleh responden dapat didistribusikan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Ibu Hamil berdasarkan Pendidikan
Di RB Mattiro Baji Gowa
Tahun 2013

Pendidikan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
SD	6	7,5
SMP	12	15
SMA	60	75
PT	2	2,5
Jumlah	80	100

Sumber : Data Primer

Tabel 4.3 menunjukkan distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan ibu hamil, distribusi tertinggi pada tingkat pendidikan responden yaitu SMA/SMK/MA berjumlah 60 responden (75%), kemudian SMP sebanyak 12 responden (15%), SD berjumlah 6 responden (7,5%) serta PT sebanyak 2 responden (2,5%).

d. Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Tabel 4.4
Distribusi frekuensi Ibu Hamil berdasarkan Pekerjaan
Di RB Mattiro Baji Gowa
Tahun 2013

Pekerjaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
IRT	67	83,8
SWASTA	11	13,8
PNS	2	

		2,5
Jumlah	80	100

Sumber : Data Primer

Tabel 4.4 menunjukkan distribusi responden berdasarkan pekerjaan ibu hamil dan yang terbanyak adalah responden yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 67 (83,8%), yang lainnya bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 11 responden (13,8%) dan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2 responden (2,5%).

e. Agama

Responden dalam penelitian ini adalah orang yang beragama dengan distribusi sebagai berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Ibu Hamil Berdasarkan Agama
Di RB Mattiro Baji Gowa
Tahun 2013

Agama	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Islam	74	92,5
Kristen	6	7,5
Jumlah	80	100

Sumber : Data Primer

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 80 responden, jumlah responden terbanyak adalah beragama Islam sebanyak 74 responden (92,5%) dan yang paling sedikit beragama Kristen sebanyak 6 responden (7,5%).

f. Suku

Suku responden dalam penelitian bervariasi ada yang berasal dari suku Jawa, Gorontalo, Flores, Makassar dan Bugis dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Ibu Hamil berdasarkan Suku
Di RB Mattiro Baji Gowa
Tahun 2013

Suku	Frekuensi	Persentase
Makassar	41	51,3
Bugis	30	37,5
Flores	3	3,8
Jawa	1	1,3
Lain-lain	5	6,3
Jumlah	80	100

Sumber : Data Primer

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 80 responden, jumlah responden terbanyak dari Suku Makassar sebanyak 41 responden (51,3%) kemudian Suku Bugis berjumlah 30 responden (37,5%), Suku Flores berjumlah 3 responden (3,85%), Suku Jawa sebanyak 1 responden (1,3%) dan dari Suku lain-lain seperti Suku Gorontalo dan Suku Manado sebanyak 5 responden (6,3%).

1. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan

Distribusi frekuensi berdasarkan pengetahuan sebagai berikut

- a. Pengetahuan ibu hamil tentang pengertian perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pengertian
Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan pada Masa Nifas
Di RB Mattiro Baji Gowa
Tahun 2013

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Baik	22	27,5
Cukup	43	53,8
Kurang	15	18,8
Jumlah	80	100

Sumber : Data Primer

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 80 responden yang diteliti diperoleh 22 responden (27,5%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang pengertian Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan Pada Masa Nifas , dan yang memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang pengertian Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan pada Masa Nifas berjumlah 43 responden (53,8%) kemudian yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang pengertian Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan pada Masa Nifas berjumlah 15 responden (18,8%).

- b. Pengetahuan ibu hamil tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Cara
Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan Pada
Masa Nifas Di RB Mattiro Baji Gowa
Tahun 2013

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	43	53,8
Cukup	22	27,5
Kurang	15	18,8
Jumlah	80	100

Sumber : Data Primer

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 80 responden yang diteliti diperoleh 43 responden (53,8%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas, dan yang memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berjumlah 22 responden (27,5%) kemudian yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berjumlah 15 responden (18,8%).

- c. Pengetahuan ibu hamil tentang perawatan manfaat payudara selama kehamilan dan pada masa nifas

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Manfaat
Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan Pada Masa
Nifas Di RB Mattiro Baji Gowa
Tahun 2013

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Baik	26	32,5
Cukup	42	52,5
Kurang	12	15
Jumlah	80	100

Sumber : Data Primer

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 80 responden yang diteliti diperoleh 26 responden (32,5%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas, dan yang memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berjumlah 42 responden (52,5%) kemudian yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berjumlah 12 responden (15%).

- d. Pengetahuan ibu hamil tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Dampak Tidak Melakukan Perawatan Payudara Selama Kehamilan dan Pada Masa Nifas Di RB Mattiro Baji Gowa Tahun 2013

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Baik	30	37,5
Cukup	33	41,3
Kurang	17	21,3
Jumlah	80	100

Sumber : Data Primer

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 80 responden yang diteliti diperoleh 30 responden (37,5%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas, dan yang memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan

dan pada masa nifas berjumlah 33 responden (41,3%) kemudian yang memiliki pengetahuan kurang tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berjumlah 17 responden (21,3%).

B. Pembahasan

1. pengetahuan ibu hamil tentang pengertian perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas

secara umum ibu hamil belum mengetahui betul pengertian perawatan payudara selama hamil dan pada masa nifas dan belum terlalu memahami sebenarnya apa itu perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas. Dari 80 responden hanya 22 responden (27,5%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang pengertian perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas, dan yang memiliki tingkat pengetahuan cukup berjumlah 43 responden (53,3%) kemudian yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang pengertian perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berjumlah 15 responden (15%).

Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh responden dalam hal ini tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas. Menurut Hendra (2008) pengetahuan juga dipengaruhi oleh sumber informasi. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu media massa, tenaga kesehatan maupun dari teman

dan keluarga. Oleh karena itu penyuluhan tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas pada ibu hamil sangatlah penting untuk menambah pengetahuan ibu hamil.

2. Pengetahuan ibu hamil tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas

Hasil penelitian menunjukkan hanya 15 responden (18,8%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas. Hal ini disebabkan karena umumnya responden pernah mendengar tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas. Namun demikian masih ada yang tidak memahami mengenai cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas sehingga belum bisa menghindari hal-hal yang bisa terjadi. Sebagian ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan baik karena pernah mendengar dan membaca hal tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2005) bahwa pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.

3. Pengetahuan ibu hamil tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 80 responden yang diteliti diperoleh 26 responden (32,5%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan

dan pada masa nifas, 42 responden (52,5%) dengan tingkat pengetahuan cukup dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berjumlah 12 responden (5%). Ini menunjukkan bahwa masih banyak ibu hamil yang kurang tahu tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

Oleh karena itu memberikan informasi kepada ibu hamil sangat penting dalam hal ini tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas baik melalui penyuluhan ataupun melalui kegiatan-kegiatan lain yang bisa menambah pengetahuan ibu hamil tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas karena kurang informasi salah satu penyebab ibu hamil tidak tahu.

4. Pengetahuan ibu hamil tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 80 responden yang diteliti diperoleh 30 responden (37,5%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas, dan yang memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berjumlah 33 responden (41,3%) kemudian yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang dampak

tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas berjumlah 17 responden (21,3%).

Pada umumnya responden cukup mengetahui tentang dampak tidak melakukan perawatan payudara selama kehamilan. Terlihat bahwa hanya 30 responden (37,5%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, 33 responden (41,3%) dengan tingkat pengetahuan cukup dan masih ada 17 responden (21,3%) yang kurang mengetahui sehingga ibu hamil menganggap remeh perawatan payudara tersebut padahal dampak tidak melakukan perawatan payudara berbahaya bagi kesehatan ibu.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islam menempatkan kebersihan pada posisi penting dalam kehidupan oleh karena itu menjaga kebersihan itu juga penting dengan pengetahuan yang kita miliki. Dari hasil penelitian mengenai gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas di RB Mattiro Baji Gowa Tahun 2013, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Sebagian besar ibu hamil di RB Mattiro Baji Gowa memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tentang pengertian perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas sebagian kecil memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan masih ada yang memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tentang pengertian perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.
2. Sebagian besar ibu hamil di RB Mattiro Baji Gowa memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas, sebagian kecil memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dan masih ada juga yang memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tentang cara perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.
3. Sebagian besar ibu hamil di RB Mattiro Baji Gowa memiliki tingkat pengetahuan yang tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan

dan pada masa nifas, sebagian kecil memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan masih ada juga yang memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tentang manfaat perawatan payudara selama kehamilan.

4. Sebagian besar ibu hamil di RB Mattiro Baji Gowa memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas, sebagian kecil memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan masih ada juga yang memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas.

B. Saran

1. Diharapkan kepada ibu hamil untuk senantiasa memperdalam dan memperluas lagi pengetahuan tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas, khususnya tentang cara menjaga kebersihan diri serta lingkungan terutama pada ibu hamil. Hal ini sangatlah penting sehingga Allah pun menganjurkan kepada hambanya untuk mensucikan diri sebagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Q.S Al-Baqarah/2: 222 yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (Departemen Agama RI, 2007).

Ayat ini menunjukkan disyariatkannya bersuci secara mutlak, karena Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bersuci, itulah sebabnya, bersuci secara mutlak adalah syarat sahnya shalat. Juga bersuci secara maknawi seperti (mensucikan diri) dari akhlak-akhlak yang hina, sifat-sifat yang rendah dan perbuatan-perbuatan yang kotor.

2. Diharapkan kepada para tenaga medis untuk lebih memperluas cakupan penyuluhan dan memberi informasi kepada ibu hamil untuk lebih mengetahui tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengetahuan sikap dan tindakan ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan dan pada masa nifas

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan terjemahnya. **Departemen Agama RI**. Bandung : CV Penerbit Diponegoro. 2007.
- Ambarwati, Wulandari. 2008. *Asuhan Kebidanan (NIFAS)*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Andriyani. 2012. *Panduan Kesehatan Wanita*. Makassar: As-Salam Publishing.
- Apel. 2011. *Tuntunan Lengkap Cara Merawat Kesehatan, Kecantikan, dan Keindahan Payudara*. Yogyakarta: Laksana.
- Abdullah. 2004. *Bab II Landasan Teori*. <http://bab II.Pdf>. diakses Tanggal 22 Mei 2013.
- AL-Habsyi, M. Bagir. 2005. *Fiqh Praktis*. Bandung : Mizan
- Arikunto. 2006. *Bab II*. <http://jptunimus-gdl-ratnamurni-6827-3-bab iii>. diakses Tanggal 23 Mei 2013.
- Azzam, M. Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Arikunto.2006. *Metode Penelitian*. <http://Keperawatan-unsoed.ac.id/dwi-skripsi-p41-p56>. diakses Tanggal 24 Juni 2013.
- Arini H. 2012. *Mengapa Seorang Ibu Harus Menyusui*. Yogyakarta: FlashBooks.
- Azwar. 2008. *Bab II*. <http://bab II. Pdf> . diakses Tanggal 23 Mei 2013.
- Hendra. 2008. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Sikap Terhadap Seks Pra Nikah*. <http://Pengetahuan. Pdf>. diakses Tanggal 11 September 2013.
- Mira. 2010. *Buku Ajar Biologi Reproduksi*. Jakarta: EGC.
- Notoatmodjo. 2011. *Analisis Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Beragama Siswa*. Makassar: Alauddin University Press.
- Nashiruddin, M. Syaikh. 2006. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor : Pustaka Ibnu Katsir.
- Nugroho. 2011. *ASI dan Tumor Payudara*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Notoatmodjo. 2005. *Chapter II*. <http://chapter II-3. Pdf>. diakses Tanggal 23 Mei 2013
- Perinansia. 2006. *Bab II*. <http://bab II. Pdf>. diakses Tanggal 23 Mei 2013.
- Quthb, Sayyid. 2008. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta : Gema Insani
- SDKI, 2007. *Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Cara Menyusui Yang Benar Dengan Perilaku Menyusui*. <http://jkpumpo-gdl-sitimaskan-188-1-abstrak-i.pdf>. diakses Tanggal 06 April 2013
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir Al Mishbah* : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: lentera hati.

- Saryono, Pramitasari. 2009. **Bab I Pendahuluan**. <http://jtptunimus-gdl-nurifanikh-5991-1-bab1.diakses> Tanggal 06 April 2013
- Saleha. 2009. **Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas**. Jakarta: Salemba Medika.
- Saryono, Pramitasari. 2009. **Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Ibu Hamil Tentang Perawatan Payudara**. <http://jkptumpo-gdl-nurekaraha-102-1-abstrak-1.pdf>. diakses Tanggal 06 Juni 2013.
- Saryono. 2011. **Bab III Metode Penelitian**. <http://eprints-undip.ac.id/24056/3> Bab III.pdf. diakses Tanggal 24 Juni 2013.
- Saryono. 2009. **Perawatan Payudara**. [http://Perawatan payudara. By one.html](http://Perawatan%20payudara.%20By%20one.html). diakses Tanggal 25 Juni 2013.
- Setiawati. 2012. **Obstetri Dasar**. Makassar: Diktat Kuliah.
- Suherni. 2009. **Tingkat Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Perawatan Payudara**. <http://intanyulia-95-1-intanyu-6.pdf>. diakses Tanggal 06 April 2013.
- Suherni. 2009. **Tingkat Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Perawatan Payudara**. <http://gdl-intanyulia-95-1-intanyu-6>. Pdf. diakses Tanggal 06 April 2013.
- Sulistyawati. 2009. **Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas** . Jakarta: Salemba Medika.
- Weltford. 2009. **Bab II**. [http://bab II](http://bab%20II). Pdf. diakses Tanggal 23 Mei 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Peneliti

Nama : Fitriani
Nim : 70400010024
T. T. L : Jeneponto, 05 Januari 1992
Suku : Makassar
Agama : Islam
Alamat : Pao-Pao Permai

B. Riwayat Pendidikan

SDN No. 21 Kampung Beru Kab. Jeneponto Tahun 1998 – 2004
SMPN 2 Turatea Kab. Jeneponto Tahun 2004 – 2007
SMA Negeri 1 Binamu Kab. Jeneponto Tahun 2007 – 2010
UIN Alauddin Makassar Tahun 2010 – 2013

C. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Arifuddin
Nama Ibu : Hasnawiah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Kampung Beru, Desa Bululoe, Kec. Turatea, Kab
Jeneponto