

**UJI SENSITIVITAS ANTIBIOTIKA TERHADAP BAKTERI
PENYEBAB DIARE DI PUSKESMAS MANGASA KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi

Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

**ALAUDDIN
M A K A S S A R**

Oleh

TRY ARDITA FEBRIANI

70100109087

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

“Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi ini beserta gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.”



Makassar, September 2013

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Try Ardita Febriani

NIM: 70100109087

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “ Uji Sensitivitas Beberapa Antibiotika Terhadap Bakteri Penyebab Diare Di Puskesmas Mangasa Kota Makassar,” yang disusun oleh Try Ardita Febriani, NIM: 70100109087, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang yang diselenggarakan pada hari , tanggal 2013 M, bertepatan dengan, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.

Makassar, September 2013
1433 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua Penguji : **Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt.** (.....)
Sekretaris Penguji : **Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.** (.....)
Penguji I : **Haeria, S.Si., M.Si** (.....)
Penguji II : **Dr. Hj.Syamsuduha Saleh, M.Ag** (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda H.Muh.Syahrir. dan Ibunda Hj.Suciati yang tiada hentihentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu memberikan nasehat, kritik, semangat, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar, kepada Ibu Gemy Nastity Handayani, S.Si, M.Si, Apt. selaku pembimbing pertama, dan juga selaku ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dan Ibu Isriany Ismail S.Si, M.Si., Apt selaku pembimbing kedua, dan Penasehat Akademik atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini, semoga bantuan

dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan dan melakukan penelitian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt. amin.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Para Wakil Dekan
2. Haeria S.Si, M.Si., selaku sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
3. Bapak/Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staff Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Hj.Syamsuduha Saleh, M.Ag selaku penguji agama, walaupun beliau menjadi penguji, tetapi beliau telah banyak memberikan saran dan nasehatnya tentang agama yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.
5. Bapak Kepala Puskesmas Mangasa yang telah bersedia meluangkan waktunya dan bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian di Puskesmas Mangasa Kota Makassar
6. Ibu Elis, selaku koordinator bagian media di Dinas Kesehatan yang telah memberi bantuan untuk mendapatkan medium selektif dan paper disk antibiotik yang digunakan dalam penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Laboran Farmasi Armisman Edy Paturusi, S.Farm, M.Si, Apt dan Muh. Rusydi S.Farm, Apt., yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.

Terima kasih yang teramat besar kepada Keluarga Besar Poli Umum Puskesmas Mangasa Kota Makassar yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis selama penelitian.

Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis khususnya teman-teman angkatan 2009 (*HIDR09ENASI*), kakak angkatan 05, 06,07,08 adik-adik angkatan 2010, terlebih kepada saudaraku Heryanto yang telah banyak membantu penulis agar terlaksananya penelitian dan skripsi ini, senantiasa mendorong dan memberikan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Amin

Makassar, September 2013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN Penyusun
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Uraian Diare	5
B. Antibiotika.....	8
C. Resistensi Antibiotika.....	11
D. Antibiotik Penanganan Diare	16
E. Uraian Mikroba Uji.....	18

	F. Pengujian Sensitivitas	19
	G. Tinjauan Islam Mengenai Mikroba Penghasil Antibiotika	24
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Alat dan Bahan	30
	B. Prosedur Kerja	30
	C. Identifikasi Mikroba	32
	D. Pengujian Sensitivitas	33
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	35
	B. Pembahasan	39
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	47
	B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		48
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		50
BIOGRAFI.....		66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Ukuran diameter zona hambat uji sensitivitas menurut NCCLS	22
2. Hasil Pengukuran Diamter Zona Hambatan Antibiotika	35
3. Uji Identifikasi bakteri <i>E.coli</i> dengan Lactosa Broth.....	36
4. Uji Lanjutan Identifikasi lanjutan <i>E.coli</i> dengan medium EMBA ..	36
5. Hasil Uji Identifikasi <i>Shigella</i> dan <i>Salmonella</i> pada medium SCB.	37
6. Hasil persentase dari sampel yang positif <i>Esherichia coli</i>	37
7. Hasil Pengamatan Morfologi Secara Mikroskopik.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pengambilan spesimen feses	54
2. Skema kerja uji sensitivitas	55
3. Kultur bakteri pada sampel feses Probandus A, B, C, D, dan E	56
4. Pengujian sensitivitas Antibiotika 3 Replikasi pada sampel feses probandus A	57
5. Pengujian sensitivitas Antibiotika 3 Replikasi pada sampel feses probandus B	58
6. Pengujian sensitivitas Antibiotika 3 Replikasi pada sampel feses probandus C	59
7. Pengujian sensitivitas Antibiotika 3 Replikasi pada sampel feses probandus D	60
8. Pengujian sensitivitas Antibiotika 3 Replikasi pada sampel feses probandus E	61
9. Pengujian identifikasi dugaan awal bakteri <i>E.coli</i> pada semua sampel feses dari tiap probandus	62
10. Pengujian identifikasi lanjutan bakteri <i>E.coli</i> pada semua sampel feses dari tiap probandus	63
11. Pengecatan Gram pada setiap sampel feses dari probandus	64
12. Diagram Persentase sensitifitas antibiotik terhadap bakteri penyebab Diare	65

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Pembuatan Medium	50
2. Pembuatan Cat Gram	52
3. Pengambilan Spesimen	54
4. Skema Kerja Uji Sensitivitas Beberapa Antibiotika Terhadap Bakteri Penyebab Diare	55
5. Kultur Bakteri Pada Feses.....	56
6. Hasil Uji Sensitivitas antibiotik terhadap bakteri penyebab diare	57
7. Hasil Uji Identifikasi bakteri penyebab diare	62
8. Diagram Persentase Uji sensitivitas antibiotik terhadap bakteri penyebab diare.....	65

ABSTRAK

Nama Penyusun : Try Ardita Febriani.
NIM : 70100109087
Judul Skripsi : Uji Sensitivitas Antibiotika Terhadap Bakteri
Penyebab Diare di Puskesmas Mangasa Kota Makassar

Telah dilakukan penelitian tentang uji sensitivitas antibiotika terhadap bakteri penyebab diare. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sensitivitas antibiotika dan antibiotika yang paling sensitif terhadap bakteri penyebab diare di Puskesmas Mangasa Kota Makassar. Sampel yang digunakan berupa feses cair dari pasien anak-anak yang terkena diare. Uji sensitivitas dilakukan dengan metode difusi agar *Kirby-Bauer*, dengan melihat zona hambatan dari masing-masing antibiotika. Kemudian dilanjutkan dengan uji identifikasi dengan menggunakan pengecatan gram dan mengkultur bakteri pada medium spesifik yaitu *Eosin Methylen Blue Agar*. Hasil yang diperoleh dari pengecatan gram adalah semuanya merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang. Dan semua menunjukkan hasil yang positif pada bakteri *Esherichia coli*. Masing-masing antibiotika menunjukkan persentase sensitif yang berbeda-beda pada sampel feses dari probandus yang diujikan yaitu ciprofloksasin 80%, kotrimoksazol 60%, kloramfenikol 20%. Untuk antibiotika yang menunjukkan intermedit persentasinya masing-masing yaitu kotrimoksazol 20%, ciprofloksasin 20%, kloramfenikol 20%. Sedangkan persentase resisten yang dihasilkan dari masing-masing antibiotika, yaitu kloramfenikol 60%, cotrimoksazol 20%, dan ciprofloksasin 0%. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri penyebab diare masih sensitif terhadap antibiotika kotrimoksazol yang digunakan di Puskesmas Mangasa Kota Makassar. Antibiotika yang paling sensitif diantara antibiotika yang diujikan untuk penyakit diare yaitu ciprofloksasin.

ABSTRACT

Writer's Name : TRY ARDITA FEBRIANI

Student Number : 70100109087

Title : Antibiotic Sensitivity test of the bacteria that cause diarrhea in the city of Makassar Health Center Mangasa

Had been done research on antibiotic sensitivity testing of the bacteria that cause diarrhea. This study was conducted to determine antibiotic sensitivity and antibiotic most sensitive to the bacteria that causes diarrhea in Mangasa Makassar Health Center. The samples used in the form of liquid feces pediatric patients with diarrhea. Sensitivity test was method using *Kirby-Bauer* agar diffusion, with a view of the inhibition zone of each antibiotic. Then continued with the identification test using gram staining and culturing of bacteria on the specific medium *Eosin Methylen Blue Agar*. The results of Gram's staining is everything a rod-shaped Gram-negative bacteria. And all showed positive results in *Esherichia coli* bacteria. Each one shows the percentage of sensitive antibiotics Different from samples feces of probandus tested at the 80% ciprofloxacin, cotrimoxazole 60%, chloramphenicol 20%. For intermediate percentages of antibiotics showed that cotrimoxazole respectively 20%, ciprofloxacin 20%, chloramphenicol 20%, while the percentage of resistance resulting from each of the antibiotics, namely chloramphenicol 60%, cotrimoksazol 20%, and 0% ciprofloxacin. From the results of the study showed that the bacteria that cause diarrhea are still sensitive to the antibiotic cotrimoxazole Mangasa used in Makassar Health Center. Antibiotika the most sensitive among the tested antibiotics for the diarrhea ciprofloxacin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diare merupakan salah satu macam penyakit tropis di Indonesia dengan angka kesakitan yang tinggi. Di Indonesia, diare juga merupakan masalah kesehatan, infeksi bakteri merupakan penyebab kematian diare yang sangat penting. Resistensi bakteri cenderung meningkat terus dari tahun ke tahun sehingga penderita diare akibat infeksi bakteri menjadi lebih sulit untuk diobati (Kosala,2009:1).

Di negara maju diperkirakan insiden diare sekitar 0,5-2 orang/tahun sedangkan di negara berkembang lebih dari itu. Di USA dengan penduduk sekitar 200 juta diperkirakan 99 juta episode diare akut pada dewasa terjadi setiap tahunnya. Menurut WHO, 1,8 juta orang (kebanyakan anak-anak) meninggal setiap tahun dari penyakit diare. Diare global menular tetap menjadi salah satu penyakit yang paling umum yang diderita anak-anak di bawah usia lima tahun dan menyumbang 15-30% kematian pada anak di bawah usia lima tahun (Shetty, 2009:212).

Diare akut masih merupakan masalah kesehatan anak terutama di dunia dan menjadi penyebab no.1 kematian anak di Negara berkembang. Kematian terutama disebabkan oleh dehidrasi (kekurangan cairan) akibat terlalu banyak cairan yang keluar pada saat diare. Diare sendiri didefinisikan sebagai buang air besar yang lebih sering dan lebih encer.

Diare dibedakan atas dua macam yaitu diare akut dan diare kronik. Diare akut adalah diare yang onset gejalanya tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 14 hari, sedang diare kronik yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Diare dapat disebabkan infeksi maupun non infeksi. Dari penyebab diare yang terbanyak adalah diare infeksi. Diare infeksi disebabkan virus, bakteri, dan Parasit. Bakteri penyebab yang paling umum dari infeksi akut diare adalah *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Shigella*, dan *Campylobacter*. Bakteri lain yang patogen termasuk, *Vibrio parahaemolyticus*, dan *Yersinia enterocolitica*. Masing-masing memiliki siklus hidup yang unik dan karakteristik virulensi. Penyebab diare akut akibat bakteri biasanya tidak dapat dibedakan secara klinis diagnosisanya dan membutuhkan isolasi organisme pada biakan tinja (Southwick, 2009 : 206).

Menurut data Elder Care, pengobatan yang dilakukan terhadap penyebab diare yaitu digunakan antibiotik (Donald W, 2009). Dokter umum dan dokter swasta lebih banyak memberikan antibiotika dan antidiare (Purnomo, 1996: 294-295). Antibiotik yang efektif dan aman telah berkembang begitu pesat sehingga dapat mengurangi mortalitas akibat penyakit infeksi secara drastis. Namun, keberhasilan tersebut terganggu dengan banyaknya bakteri yang kebal terhadap antibiotika. Hal ini disebabkan adanya penggunaan obat yang tidak rasional, penggunaan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan, baik itu berupa penggunaan yang tidak tuntas maupun penggunaan tanpa dasar pemeriksaan yang jelas.

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Mangasa Kota Makassar, sebab Puskesmas tersebut selalu menjadi rujukan dari beberapa wilayah dibagian selatan Kota Makassar misalnya wilayah Malengkeri, Tabariah, dan Mangasa. Berdasarkan data di Puskesmas Mangasa, pengobatan yang dilakukan terhadap penderita diare yaitu pemberian satu antibiotika berupa Kotrimoksazol. Karena hanya satu penggunaan antibiotik yang digunakan dalam pengobatan diare, maka perlu dilakukan pengujian apakah antibiotik tersebut masih sensitif ataukah sudah resisten agar dapat menjamin kesehatan bagi para penderita diare, yang dimana telah diketahui bahwa penyakit diare merupakan penyakit yang berbahaya dan biasanya sampai mematikan. Kemudian dilakukan pula pengujian antibiotika lain yang sering digunakan dalam pengobatan diare.

Untuk melihat sejauh mana efektifnya antibiotika yang sering diresepkan untuk penderita infeksi, maka pengujian untuk sebuah antibiotika dapat dilakukan secara ilmiah. Dengan menggunakan metode pengujian mikrobiologis, yaitu uji sensitivitas. Uji sensitivitas itu sendiri adalah suatu teknik untuk menetapkan sensitivitas suatu antibiotika dengan mengukur efek senyawa tersebut pada pertumbuhan suatu mikroorganisme.

Hal inilah yang mendasari dilakukannya penelitian mengenai uji sensitivitas beberapa antibiotika pada bakteri penyebab diare di Puskesmas Mangasa Kota Makassar.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan yang timbul yaitu :

1. Apakah antibiotika yang digunakan di Puskesmas Mangasa Kota Makassar masih sensitif terhadap bakteri penyebab diare ?
2. Antibiotika manakah yang masih sensitif terhadap bakteri penyebab diare ?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai penggunaan obat yang tepat ?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bahwa antibiotik yang digunakan di Puskesmas Mangasa Kota Makassar masih sensitif terhadap bakteri penyebab diare.
2. Mengetahui jenis antibiotika yang masih sensitif terhadap bakteri penyebab diare.
3. Mengetahui pandangan Islam mengenai penggunaan obat yang tepat.

D. Manfaat penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat :

1. Sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk mengetahui jenis-jenis antibiotika yang masih sensitif terhadap bakteri penyebab diare
2. Sebagai sumber informasi kepada dokter, dan apoteker tentang penggunaan antibiotika yang baik untuk masyarakat terhadap bakteri penyebab diare pada Puskesmas Mangasa Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diare

Penyakit diare hingga saat ini masih menjadi masalah di Indonesia. Padahal berbagai upaya penanganan, baik secara medik maupun upaya perubahan tingkah laku dengan melakukan pendidikan kesehatan terus dilakukan. Namun upaya-upaya tersebut belum memberikan hasil yang mengembirakan. Setiap tahun penyakit ini masih menduduki peringkat atas, khususnya di daerah-daerah miskin (Zein, 2004).

Diare adalah kondisi dimana terjadi frekuensi defekasi yang tidak biasa (lebih dari 3 kali sehari), juga perubahan dalam jumlah dan konsistensi (feses cair). Hal ini biasanya berkaitan dengan dorongan, rasa tak nyaman pada area perianal, inkontinensia, atau kombinasi dari faktor ini. Ada tiga faktor yang menentukan keparahannya yaitu, sekresi intestinal, perubahan penyerapan mukosa, dan peningkatan motilitas (Diane C, 2000 :121).

Diare dapat terjadi akibat adanya zat terlarut yang tidak dapat diserap di dalam feses, yang disebut diare osmotik, atau karena iritasi saluran cerna. Penyebab tersering diare dalam volume besar akibat iritasi adalah infeksi virus atau bakteri di usus halus atau usus besar. Iritasi usus oleh patogen mempengaruhi lapisan mukosa usus, sehingga terjadi peningkatan produk sekretorik, termasuk mukus. Iritasi mikroba juga memengaruhi lapisan otot sehingga terjadi peningkatan motilitas. Peningkatan motilitas

menyebabkan banyak air dan elektrolit terbuang karena waktu yang tersedia untuk penyerapan zat-zat tersebut di kolon berkurang. Individu yang mengalami diare berat dapat meninggal akibat syok hipovolemik dan ketidakteraturan elektrolit (Elizabeth,2009:598).

Klasifikasi diare yaitu :

1. Diare akut

Diare ini berlangsung kurang dari 2 minggu. Fenomena ini kemungkinan besar disebabkan oleh agen menular, seperti bakteri. Agen infeksius adalah salah satu faktor yang terkait dengan diare akut. Beberapa patogen ini dapat menyebabkan reaksi peradangan di usus dimana lapisan epitel rusak baik oleh racun yang dihasilkan oleh organisme atau organisme menyerang mukosa. Beberapa organisme yang menyebabkan respon inflamasi adalah "*Cytomegalovirus, Herpes simplex virus, Shigella, Salmonella, Chlamydia, Nisseria gonorrhoeae, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Escherichia coli*". Gejala diare inflamasi akut berupa demam, lesu, terdapat darah dan leukosit pada pengujian fesesnya. Adapun beberapa organisme menyebabkan diare akut yang tidak menghasilkan respon inflamasi meskipun orang tersebut mungkin memiliki demam ringan, mual, dan muntah. Yang termasuk organisme penyebab diare yaitu *Vibrio cholerae*.

2. Diare kronik

Diare ini berlangsung lebih dari dua minggu, tetapi biasanya diare yang dalam waktu satu bulan dikenal sebagai diare persisten. Diare kronis

dapat terjadi dari hasil penyakit, obat, kelainan genetik, atau sebagai penyebab lainnya (Suandi, 1989,61-65).

Menurut Kiddicare, Penanganan diare menjadi masalah tersendiri, WHO dan banyak negara di dunia berusaha untuk menemukan pedoman atau panduan yang paling tepat dalam penanganan diare akut. Sekarang ini dikenal istilah *4 Steps to threat diarrhea* atau dalam bahasa Indonesia: Empat langkah tuntas diare (LINTAS diare), yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

1. Berikan oralit

Bila anak diare segera berikan oralit. Hal ini diperlukan untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi. Oralit dapat diberikan dengan dosis 10cc/kg berat badan setiap kali anak mencret.

2. Teruskan pemberian ASI dan makanan lain

ASI dan makanan tetap diteruskan sesuai umur anak dan seperti menu pada saat anak sehat untuk mencegah kehilangan berat badan serta pengganti nutrisi yang hilang.

3. Berikan Zinc

Dalam beberapa penelitian terakhir telah dibuktikan manfaat pemberian zinc pada anak diare. Zinc terbukti dapat mengurangi lama dan beratnya diare, dan zinc diberikan selama 10 hari berturut-turut. Pemberian zinc adalah 10 mg setiap hari untuk anak di bawah 6 bulan dan 20 mg setiap hari untuk anak di atas 6 bulan.

4. Antibiotik selektif

Jangan berikan antibiotik kecuali atas petunjuk dokter. Pemberian antibiotik yang tidak tepat pada diare terkadang dapat memperburuk diare. Antibiotik juga dapat menyebabkan diare pada anak (*antibiotic associated diarrhea*).

Pemberian obat penghenti diare (seperti loperamide, kaolin pectin, attapulgit) tidak direkomendasikan untuk diberikan pada anak. KiddieCare Centre menyediakan vaksin Rotavirus yang dapat mencegah infeksi rotavirus sebagai penyebab diare akut utama

B. Antibiotika

Antibiotik adalah zat yang dibentuk oleh mikroorganisme yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme lain. Definisi ini harus diperluas karena zat yang bersifat antibiotik dapat pula dibentuk oleh beberapa hewan dan tanaman tinggi. Di samping itu berdasarkan antibiotika alam, dapat pula dibuat antibiotika baru secara sintesis parsial yang sebagian mempunyai sifat yang lebih baik. Sejak di temukan penisilin oleh Alexander Fleming sampai saat ini sudah beribu-ribu antibiotika yang ditemukan, dan hanya sebagian kecil yang dapat dipakai untuk maksud terapeutik. Yang berguna hanyalah antibiotika yang mempunyai kadar hambatan minimum (KHM) in vitro lebih kecil dari kadar zat yang di dapat dicapai dalam tubuh dan tidak toksik (Mutschler,1991 :634).

Penggolongan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitasnya dapat dibagi dalam beberapa golongan yaitu (Djide.N, 2008 :347) :

1. Antibiotika dengan spektrum luas, efektif baik terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif. Contoh: turunan tetrasiklin, turunan amfenikol, turunan aminoglikosida, turunan mikrolida, rifampisin, beberapa turunan ampisilin (ampisilin, amoksisilin, bakampisin, karbenisilin, hetasilin dan lainnya).
2. Antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram positif. Contoh: basitrasin, eritromisin, sebagian besar turunan penisilin, seperti benzyl penisilin, kloksasilin dan lainnya.
3. Antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram negatif. Contoh: kolistin, polimiksin B sulfat dan sulfomisin
4. Antibiotika yang aktivitasnya dominan pada mycobacteriaceae. Contoh: streptomisin, kanamisin, sikloserin, fimisin dan lainnya.
5. Antibiotika yang aktif terhadap jamur. Contoh: griseofulvin dan antibiotika polien (nistatin, amfoterisin B)
6. Antibiotika yang aktif terhadap neoplasma (antikanker). Contohnya: aktinomisin, bleomisin, mitomisin, midramisin, dan lainnya.

Antibiotika yang ideal sebagai obat harus memenuhi syarat-syarat (Jawetz,2005:159) :

1. Mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas (broad spectrum antibiotic)
2. Tidak menimbulkan terjadinya resistensi dari mikroorganisme patogen

3. Tidak menimbulkan efek samping yang buruk pada host (sel inang) seperti reaksi alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya
4. Tidak mengganggu keseimbangan flora normal dari host seperti flora usus dan flora kulit.

Berdasarkan mekanisme kerjanya antibiotika dibagi dalam beberapa kelompok (Ganiswarna, 1995, 572) :

1. Dinding sel: Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah penisilin, sefalosporin, basitrasin, vankomisin, dan sikloserin. Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan yaitu suatu kompleks polimer mukopetiptida (glikopeptida). Oleh karena itu, tekanan osmotik dalam sel kuman lebih tinggi daripada di luar sel kuman, akan menyebabkan terjadinya lisis yang merupakan efek dari bakterisida pada kuman yang peka. Contoh: Ampicilin, Amoxicilin dan Cefadroxil.
2. Menghambat metabolisme sel: Yang termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok sulfonamide, trimetoprim, asam p-aminosalisilat (PAS) dan sulfon. Dengan mekanisme kerja ini diperoleh efek bakteriostatik. Contoh: Sulfametaxazol dan Cotrimoxazol.
3. Mengganggu membran sel: obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah polimiksin, golongan polien serta berbagai antimikroba kemoterapeutik, misalnya antiseptik surface active agents. Contoh: Polimiksin B.

4. Menghambat sintesis protein: Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah golongan aminoglikosida, makrolida, linkomisin, tetrasiklin, kloramfenikol. Untuk kehidupannya, sel mikroba perlu mensintesis berbagai protein. Sintesis protein berlangsung di ribosom dengan bantuan m-RNA dan t-RNA. Pada bakteri, ribosom terdiri dari dua sub unit, yang berdasarkan konstanta sedimentasi dinyatakan sebagai ribosom 30S dan 50S. Contoh : Tetrasiklin, Kloramfenikol, Tiamfenikol dan Streptomisin.
5. Menghambat sintesis asam nukleat: Antimikroba yang termasuk golongan ini adalah rifampisin, dan golongan kuinolon. Contoh: Rifampicin, Siprofloksasin dan Ofloksasin.

C. Resistensi Antibiotika

Resistensi adalah ketahanan suatu mikroorganisme terhadap suatu antimikroba atau antibiotika tertentu (Djide.N,2008 :367).

Ada dua tipe utama resistensi inang (Pelczar,1998:590):

1. Resistensi spesifik, yang diarahkan terhadap mikroorganisme tertentu dan
2. Resistensi non spesifik atau alamiah.

Ada berbagai mekanisme yang menyebabkan suatu populasi kuman menjadi resisten terhadap antibiotika. Mekanisme tersebut antara lain adalah (Ganiswarna,2005 :575):

1. Perubahan tempat kerja (target site) obat pada mikroba
2. Mikroba menurunkan permeabilitasnya sehingga obat sulit masuk ke dalam sel
3. Inaktivasi obat oleh mikroba

4. Mikroba membentuk jalan pintas untuk menghindari tahap yang dihambat oleh antimikroba
5. Meningkatkan produksi enzim yang dihambat oleh antimikroba.

Berdasarkan asalnya, resistensi kuman dibagi menjadi dua kelompok(Djide.N, 2006, 273) :

1. Resistensi genetik, terdiri dari :

- a) Mutasi Spontan

Dengan mutasi spontan gen mikroba berubah sehingga mikroba yang sensitif terhadap suatu antibiotika menjadi resisten. Kejadian ini dinamakan mutasi spontan karena terjadi pengaruh ada tidaknya antibiotika tersebut. Dengan adanya antibiotika tersebut terjadi seleksi, galur yang telah resisten bermultiplikasi, sedang galur yang masih sensitif terbasmi, sehingga berakhir dengan terbentuknya populasi yang resisten.

- b) Resistensi dipindahkan

Mikroba dapat berubah menjadi resisten akibat memperoleh suatu elemen pembawa faktor resisten. Faktor resisten yang dipindahkan terdapat dalam dua bentuk plasmid dan episom.

2. Resistensi non genetik

Bakteri dalam keadaan istirahat (inaktivitas metabolik) biasanya tidak dipengaruhi oleh antimikroba. Keadaan ini dikenal sebagai resistensi non genetik. Mikroba tersebut dikenal sebagai persister. Mikroorganisme

dapat memperlihatkan resistensi terhadap suatu obat melalui berbagai mekanisme sebagai berikut (Dwyana, 2006, 149) :

a) Memproduksi enzim yang melumpuhkan

Diantara enzim ini termasuk betalaktamase (penisilinase) yang menghidrolisis penisilin dan enzim transferase yang melumpuhkan aminoglikosida.

b) Perubahan struktur reseptor atau molekul target

Dalam hal ini termasuk perubahan komponen ribosom yang diperlukan dalam interaksi seperti, eritromisin dan aminoglikosida.

c) Perubahan permeabilitas

Tetrasiklin mampu mengakumulasi mikroorganisme yang dapat dipengaruhi, tetapi tidak dapat untuk mikroorganisme yang resisten. Kerjanya mirip dengan aminoglikosida yang dapat ditransfer secara aktif ke dalam sel yang dipengaruhi, tetapi tidak dapat ke dalam sel yang resisten.

d) Mengubah jalur metabolik membentuk jalan pintas metabolik alternatif

Hal ini dapat timbul pada bakteri yang resisten terhadap sulfonamide dan fungi yang resisten terhadap flusitosin. Beberapa bakteri yang resisten terhadap sulfonamide dapat membentuk asam folat seperti sel mamalia.

e) Mengubah jumlah respon obat

Beberapa mikroorganisme menjadi resisten terhadap trimetoprim dengan mensintesis sejumlah besar enzim dehidrofolat reduktase yang merupakan tujuan dari kerja obat.

f) Menurunkan afinitas reseptor terhadap obat

Resistensi terhadap aminoglikosida mungkin berhubungan dengan hilangnya atau adanya perubahan protein spesifik pada ribosom 30S bakteri.

g) Meningkatnya destruksi obat

Ini merupakan mekanisme utama resistensi terhadap penisilin, aminoglikosida, dan kloramfenikol.

h) Berkurangnya perubahan obat menjadi bentuk aktif

Flusitosin adalah suatu obat antifungi yang harus berubah dalam tubuh mikroorganisme menjadi fluroasil, yang selanjutnya dimetabolisme menjadi bentuk aktif dari obat tersebut. Fungi dapat menjadi lebih resisten terhadap flusitosin dengan memindahkan aktivitas enzim disepanjang jalur pengaktifan.

Penyebab resistensi pada mikroba dapat terjadi secara vertikal (diturunkan ke generasi berikutnya) atau sering terjadi ialah secara horizontal dari suatu sel donor. Faktor-faktor yang memudahkan berkembangnya resistensi di klinik adalah sebagai berikut (Ganiswarna, 1995 :588):

1. Penggunaan antimikroba yang sering. Terlepas dari penggunaannya rasional atau tidak, antibiotik yang sering digunakan biasanya akan berkurang efektivitasnya.
2. Penggunaan antimikroba yang irasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan antimikroba yang irasional, terutama di rumah sakit, merupakan faktor penting yang memudahkan berkembangnya resistensi kuman.
3. Penggunaan antimikroba baru yang berlebihan
4. Penggunaan antimikroba untuk jangka waktu yang lama, pemberian antimikroba dalam waktu lama memberi kesempatan bertumbuhnya kuman yang lebih resisten (*first step mutant*).
5. Penggunaan antibiotik untuk ternak, kurang lebih separuh dari produksi antibiotik di dunia digunakan untuk suplemen pakan ternak. Kadar antibiotik yang rendah pada ternak memudahkan tumbuhnya kuman-kuman resisten.
6. Lain-lain: beberapa faktor lain yang berperan terhadap berkembangnya resistensi ialah kemudahan transportasi, perilaku seksual, sanitasi buruk, dan kondisi perumahan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mencegah terjadinya resisten maka dalam penggunaan antibiotika harus diingat (Entjang,2003 :53):

1. Jangan menggunakan antibiotika secara sembarangan tanpa mengetahui khasiatnya dengan pasti.

2. Antibiotika yang biasa dipakai secara sistemik jangan dipakai sebagai obat lokal (topical).
3. Pakailah dosis, cara pakai dan lama pemakaian secara benar pada setiap penyakit infeksi.
4. Lebih baik dipakai kombinasi antibiotika untuk meninggikan khasiatnya
5. Gantilah segera antibiotika yang dipakai, bila suatu bibit penyakit resisten terhadap antibiotika yang diberikan.

D. Antibiotik penanganan diare

Adapun beberapa antibiotik yang sering diresepkan oleh dokter kepada penderita diare di Puskesmas Mangasa di Makassar yaitu Kotrimoksazol. Berdasarkan data The Travel Clinic, penanganan diare akut menggunakan antibiotik, contohnya ciprofloxacin (cipro), norfloxacin, TMP/SMX (Bactrim, Septra), trimethoprim and azithromycin (Zithromax), Kloramfenikol.

menurut info obat dan kesehatan november 2012, antibiotik yang paling sering diresepkan dokter yaitu :

1. Antibiotika Golongan Kuinolon

Bekerja dengan menghambat satu atau lebih enzim topoisomerase yang bersifat esensial untuk replikasi dan transkripsi DNA bakteri Asam Nalidiksat adalah prototip antibiotika golongan kuinolon lama yang dipasarkan sekitar tahun 1960. Golongan kuinolon ini digunakan untuk

infeksi sistemik. Yang termasuk golongan ini antara lain adalah Ciprofloksasin, Ofloksasin, Moksifloksasin, Levofloksasin, Norfloksasin.

2. Antibiotika Golongan Makrolida

Bekerja dengan menghambat sintesis protein dari bakteri. Antibiotika golongan Makrolida mempunyai persamaan yaitu terdapatnya cincin lakton yang besar dalam rumus molekulnya. Golongan Makrolida menghambat sintesis protein kuman dengan jalan berikatan secara reversibel dengan ribosom, dan bersifat bakteriostatik atau bakterisid tergantung jenis kuman dan kadar obat Makrolida. Sekarang ini antibiotika Makrolida yang beredar di pasaran obat Indonesia adalah Eritromisin, Spiramisin, Klaritromisin dan Azitromisin.

3. Kombinasi Antimikroba

Karena kerja dari dua antimikroba Trimetropin dan Sulfametoksazol dalam menghambat reaksi enzimatik obligat berurutan sehingga kombinasi antimikroba ini memberikan efek sinergis. Kombinasi ini lebih dikenal dengan nama Kotrimoksazol.

Aktivitas kombinasi antimikroba Kotrimoksazol berdasarkan atas kerjanya pada dua tahap yang berurutan dalam reaksi enzimatik untuk membentuk asam tetrahidrofolat. Sulfametoksazol menghambat masuknya molekul PABA ke dalam molekul asam folat dan trimetropin menghambat terjadinya reaksi reduksi dari asam dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat. Trimetropin menghambat enzim Dihidrofolat

reduktase mikroba secara sangat selektif. Hal ini penting, karena enzim tersebut juga terdapat pada sel manusia.

4. Antibiotika Golongan Beta Laktam

Bekerja dengan menghambat sintesis peptidoglikan serta mengaktifkan enzim autolisis pada dinding sel bakteri. Contohnya, Amoksisislin.

5. Golongan Amfenikol.

Golongan ini mencakup senyawa induk kloramfenikol maupun derivat-derivatnya yakni Kloramfenikol, Antibiotika ini aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif.

E. Uraian tentang Mikroba uji

1. *Escherichia coli* (Arthur, 1994; Fardiaz, 1993; Garrity, 2004)

Klasifikasi

Domain : Bacteria

Phylum : Proteobacteria

Class : Gammaproteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Familia : Enterobacteriaceae

Genus : *Escherichia*

Spesies : *Escherichia coli*

Sifat dan Morfologi

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang lurus, 1,1-1,5 μm x 2,0-6,0 μm , motil dengan flagellum peritrikus atau non

motil. Tumbuh dengan mudah pada medium nutrisi sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas.

F. *Pengujian sensitivitas*

Tes sensitivitas dilakukan untuk mengetahui bahwa bakteri tersebut telah resisten terhadap berbagai sediaan antibiotika. Tes sensitivitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain (wahyutomo,2009):

1. Metode dilusi cair atau dilusi padat

Pendekatan yang lebih kuantitatif untuk menguji sensitivitas bakteri terhadap suatu antibiotika atau mencari nilai Minimum Inhibitory Concentration (MIC). MIC adalah konsentrasi terendah yang masih dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Kadar minimum yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan suatu mikroorganisme juga disebut Kadar Hambatan Minimum (KHM). Antimikroba dapat meningkatkan aktivitasnya dari bakteristatik menjadi bakteriosid, apabila kadar antimikrobanya ditingkatkan lebih besar dari MIC tersebut. Aktivitas antibakteri ditentukan oleh spektrum kerja, cara kerja, MIC, serta potensi pada MIC. Suatu bakteri dikatakan mempunyai aktivitas yang tinggi bila MIC terjadi pada kadar rendah tetapi mempunyai daya bunuh atau daya hambat yang besar. Pada dasarnya antibiotika diencerkan sampai didapatkan beberapa konsentrasi. Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi obat ditambah suspensi kuman dalam media cair, sedangkan pada dilusi padat, tiap konsentrasi obat dicampur dengan media agar lalu

ditanam kuman dalam media cair. Ada beberapa metode dilusi, yaitu Broth macrodilution, Microdilution, dan agar dilution test.

2. Metode difusi

Memakai media Mueller Hinton agar, ada beberapa cara, yaitu :

- a) Cara *Kirby Bauer* (diambil dari nama ahli mikrobiologi W. Kirby dan A. W. Bauer di tahun 1966), atau disebut filter *paper disk agar diffusion method*, juga dikenal sebagai NCCLS/ *National Committee For Clinical Laboratory Standards*. Prosedur difusi- kertas cakram-agar yang terstandarisasi merupakan cara untuk menentukan sensitivitas antibiotika untuk bakteri. Sensitivitas suatu bakteri terhadap antibiotik ditentukan oleh diameter zona hambat yang terbentuk. Semakin besar diameternya maka semakin terhambat pertumbuhannya, sehingga diperlukan standar acuan untuk menentukan apakah bakteri itu resisten atau peka terhadap suatu antibiotik. Faktor yang mempengaruhi metode Kirby-Bauer :
 - a. Konsentrasi mikroba uji
 - b. Konsentrasi antibiotika yang terdapat dalam cakram
 - c. Jenis antibiotik.
 - d. pH medium.

Prinsipnya yaitu adanya zona hambatan yang terlihat pada *paper disk* di medium Muller Hinton Agar yang telah diinkubasi selama 18- 24 jam.

b) Cara Joan- Stokes, yaitu dengan cara membandingkan radius zona hambatan yang terjadi antara bakteri kontrol yang sudah diketahui kepekaannya terhadap obat tersebut dengan isolat bakteri yang diuji. Pada cara ini, prosedur tes sensitivitas untuk bakteri kontrol dan bakteri uji dilakukan bersama- sama dalam satu piring agar.

3. *Antimicrobial Gradient*

Cara ini termasuk cara baru, dengan menggunakan satu jenis antibiotika dengan beberapa derajat konsentrasi yang diletakkan pada *strip plastic*, sering disebut E- test. Prinsipnya hampir sama dengan cara Kirby Bauer, yaitu meletakkan strip pada Muller Hinton, kemudian diinkubasi selama 12 jam dan dilakukan pengamatan adanya zona hambat E- test.

4. *Short Automated Instrument Systems (SIAIA)*

FDA (*Food and Drugs Administration*) memperkenalkan dua sistem untuk tes sensitivitas yang lebih cepat dan akurat, yaitu *MicroScan walk away* dan *Vitek systems utilize similar techniques*. Sebuah penampang *microdilution* diberi bakteri dengan jumlah yang telah diketahui sebelumnya, kemudian beberapa antibiotika dapat diberikan pada penampang *microdilution*. Dalam 3 sampai 10 jam akan muncul pada software informasi mengenai reaksi, identifikasi bakteri dan pola resistensi antibiotika. Cara ini merupakan cara terbaru dan menggunakan teknologi tercepat. Berdasarkan metode *Kirby Bauer*, beberapa antibiotika menunjukkan diameter daerah hambatannya dengan menggunakan disk sensitivitas (Benson, 1980, 11).

Prosedur yang paling sering digunakan dan dianjurkan oleh WHO (World Health Organisation) dan NCCLS (Nation Committe For Clinical Laboratory Standars) adalah metode difusi dengan cakram *Kirby-Bauer* (Depkes RI,1999).

Tabel 1. Ukuran Diameter Zona Hambat Menurut WHO dan Menunjukkan Standar Tes Sensitivitas suatu Disk Antimikroba menggunakan Metode Kirby Bauer di terbitkan Oleh NCCLS:

Evaluation of Zones of Inhibition ¹				
Antimicrobial	Content	Zone Diameter to nearest mm		
		Resistant mm or less	Intermediate mm range	Susceptible mm or more
Amikacin	30 µg	14	15-16	17
Ampicillin (gram-negative and enterococci)	10 µg	11	12-13	14
Ampicillin (staphylococci)	10 µg	20	21-28	29
Bacitracin	10 units	8	9-12	13
Carbenicillin (Enterobacteriaceae including Escherichia)	100 µg	17	18-22	23
Carbencillin (Pseudomonas aeruginosa)	100 µg	13	14-16	17
Cefamandole and cefoxitin	30 µg	14	15-17	18
Cefotaxime	30 µg	14	15-22	23
Cephalothin	30 µg	14	15-17	18
Chloramphenicol	30 µg	12	13-17	18
Clindamycin and lincomycin	2 µg	14	15-16	17
Colistin	10 µg	8	9-10	11
Erythromycin	15 µg	13	14-17	18
Gentamicin	10 µg	12	13-14	15
Kanamycin	30 µg	13	14-17	18
Methycilin (Penicillinase-resistant penicillin)	5 Mcg	10	10-13	13

class) or ciprofloksasin				
Nalidixic Acid (urinary tract infection organisms only)	30 µg	13	14-18	19
Neomycin	30 µg	12	13-16	17
Novobiocin	30 µg	17	18-21	22
Penicillin G (Staphylococci)	10 units	20	21-28	29
Penicillin G (other micro-organisms)	10 units	11	12-21	22
Polymyxin B	300 units	8	9-11	12
Rifampin (Neisseria meningitides)	5 µg	24		25
Streptomycin	10 µg	11	12-14	15
Sulfisoxazole (results may be applied to all sulfonamides)	300 µg	12	13-16	17
Tetracycline (results may be applied to all tetracyclines)	30 µg	14	15-18	19
Trimethoprim	5 µg	10	11-15	16
Trimethoprim/sulfamethoxazole)	1.25 µg/ 23.75 µg	10	11-15	16
Vancomycin	30 µg	9	10-11	12

G. Tinjauan Islam Mengenai Uji Sensitivitas

Seiring perkembangannya zaman di muka bumi ini terdapat berbagai macam penyakit yang merupakan cobaan dari Allah swt yang diberikan kepada hamba-Nya. Sesungguhnya, cobaan-cobaan itu merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan berdasarkan rahmat dan hikmah-Nya. Allah swt tidak menetapkan sesuatu, baik terhadap takdir kaum (takdir yang pasti berlaku di alam semesta ini) atau syar'i, melainkan di dalamnya terdapat hikmah yang amat besar, sehingga di dalam akal manusia tersebut apabila terdapat berbagai cobaan, ujian, penderitaan, penyakit dan kesulitan, semua itu mempunyai hikmah tertentu.

Allah berfirman Q.S. Ali' imran (3) :190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya :

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka". (Departemen Agama.2004:138)

Ayat-ayat di atas menyatakan: Salah satu bukti kebenaran yang diperintahkan oleh Allah swt yaitu mengundang manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di langit atau dalam pengaturan sistem kerja langit dan kejadian perputaran bumi pada porosnya, serta yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang, baik dalam masa yang panjang maupun masa yang pendek terdapat tanda-tanda keMahakuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni. (Shihab, Vol.2, 2002:370).

Ayat selanjutnya menjelaskan sebagian dari ciri-ciri yang disebut dengan Ulul Albab, yang disebut pada ayat yang lalu. Mereka adalah orang-orang, baik lelaki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah, dengan ucapan dan hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat sambil berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Mereka tetap memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, karena Allah tiada menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia, Artinya tanpa tujuan yang benar. Terlihat bahwa yang menjadi objek zikir pada ayat ini adalah Allah, sedangkan objek pikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pengenalan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada kalbu, sedang pengenalan alam raya oleh penggunaan akal, yakni berpikir. Akal memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk memikirkan fenomena alam. (Shihab, Vol.2, 2002:373).

Allah telah menciptakan bahwa alam semesta ini di peruntukkan untuk umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan pada Q.S. Al-Baqarah (2) :29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam kaitannya dengan ayat diatas, manusia dianjurkan untuk menyelidiki, memikirkan segala ciptaan Tuhan, diantaranya adalah uji sensitivitas antibiotika, pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui antibiotika manakah yang masih sensitif atau dengan kata lain antibiotika manakah yang terbaik untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri patogen.

Resistensinya suatu bakteri patogen terhadap beberapa antibiotik merupakan ujian yang diberikan Allah swt bagi para ahli medis khususnya seorang farmasis. Sebagai ahli farmasi beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau menghindari resisten bakteri terhadap antibiotika, salah satu caranya yaitu dengan melakukan tes sensitifitas bakteri terhadap antibiotika agar pemberian antibiotika dapat diberikan secara tepat sesuai dengan diagnosa penyebab penyakit infeksi. Karena masalah resistensi dari suatu antibiotika selalu ada, maka perlu dilakukan lanjutan penelitiannya.

Ujian yang berupa kesulitan hendaknya diambil hikmahnya karena dibalik kesulitan terdapat kemudahan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. AN-Nasyrah (94) : 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Terjemahnya :

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Departemen agama,2004:1073)

Ayat 5 di atas diulangi sekali lagi oleh ayat 6. Pengulangan tersebut sebagaimana banyak pengulangan ayat-ayat pada periode Mekkah. Sementara ulama memahami sebagai penekanan yang menyatakan “Apabila terulang satu kata dalam bentuk *definite*, kata pertama dan kedua mempunyai makna yang sama, berbeda halnya jika kata tersebut berbentuk *indefinite*”

Pada ayat 5, kata *al'usr* berbentuk *definite* (memakai alif dan lam) demikian pula kata tersebut pada ayat 6. Ini berarti bahwa *kesulitan* yang ditunjukkan pada ayat 5 sama halnya dengan kesulitan yang disebutkan pada ayat 6, berbeda dengan kata *yusran* (*kemudahan*). Kata tersebut tidak dalam bentuk *definite* sehingga *kemudahan* yang disebut pada ayat 5 berbeda dengan *kemudahan* yang disebut pada ayat 6, hal ini menjadikan kedua ayat tersebut mengandung makna “Setiap satu kesulitan akan disusul/dibarengi dengan dua kemudahan (Shihab, Vol. 15,2002:419). Dalam hubungannya dengan ayat diatas yaitu Allah selalu memberikan kemudahan atas kesulitan yang diberikan-Nya, dan masalah resistensi dalam pengobatan merupakan kesulitan dalam dunia farmasis, dan Allah memberikan kemudahan yaitu dengan suatu pengujian sensitivitas suatu antibiotik.

Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ
فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءَ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya :

“Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila didapatkan obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit maka penyakit itu akan hilang seizin Allah azza wa jalla” (H.R.Muslim) (An-Naisaburi,1998)

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah swt. yang menyembuhkan, akan tetapi Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya. Akan tetapi, didalam melakukan pengobatan hendaknya kita menyerahkan diri kepada Allah swt, karena Allah swt lah yang menyembuhkan, manusia hanya berusaha. Seperti yang terkandung dalam Q.S. Asy-syu'araa(26) :80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya :

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku”
(Departemen Agama,2004:727)

Penggunaan kata *idza/apabila* dalam firman-Nya (*wa idza maridhtu*) dan *apabila aku sakit* mengandung makna besarnya

kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya apa yang dibicarakan, dalam hal ini adalah sakit. Ayat diatas mengisyaratkan bahwa sakit berat atau ringan, fisik atau mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Redaksinya menyatakan “apabila aku sakit” bukan “Apabila Allah menjadikan aku sakit”. Namun, demikian, dalam hal penyembuhan secara tegas Nabi Ibrahim as menyatakan bahwa Yang melakukannya adalah Dia, Tuhan semesta alam (Shihab.2002:258).

Ayat diatas sangat jelas menekankan bahwa penyembuhan suatu penyakit itu semuanya berasal dari Allah swt, karena hanya Allah lah yang mempunyai Kuasa Yang sangat Besar terhadap apa yang diciptakan-Nya. Dalam Q.S.Al-Baqarah (2) :156

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah Kami kembali.

Termasuk juga dalam dunia pengobatan, manusia dalam hal ini hanya berusaha. seperti halnya para ahli farmasis hanya berusaha untuk menemukan atau meneliti tentang pengobatan, agar nantinya dalam hal obat yang digunakan mempunyai daya yang optimal terhadap suatu penyakit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan yang digunakan

1. Alat

Autoklaf (Smic model YX-280 B®), Cawan Petri, Inkubator (Mettler®), *Laminar Air Flow* (LAF) (ESCO), Lemari Pendingin (Modena), Ose bulat, Oven (Fisher®), Pinset, Spiritus, Timbangan Analitik (AND), dan Spoit 10 ml.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Cat A, Cat B, Cat C, Cat D, Cutton Bud, Kapas, Medium Mac-Conkey agar (Difco), Medium Lactosa Broth (LB), Medium Eosin Metylen Blue Agar (EMBA), NaCl 0,9%, Paper disc antibiotik yang di uji yaitu Kotrimoksazol 1,25 ug, Kloramfenikol 30 ug, Ciprofloksasin 5 ug, spesimen feses probandus yang mengalami diare.

B. Prosedur Kerja

1. Sterilisasi alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut lebar dibersihkan, direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat dari kaca disterilkan di oven pada

suhu 180⁰C selama 2 jam. Alat jarum suntik dan alat plastik berupa spoid (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

2. Teknik Penentuan Antibiotika

Antibiotika yang akan ditentukan sensitivitasnya dilakukan dengan cara mendata jenis antibiotik yang digunakan untuk penanganan penyakit diare di Puskesmas Mangasa di Makassar yakni Kotrimoksazol, dan antibiotik lain yang biasa digunakan untuk pengobatan diare yaitu Ciprofloxacin dan Kloramfenikol.

3. Teknik Penentuan Sampel

Sampel yang digunakan yaitu pasien diare yang berobat di Puskesmas Mangasa periode Mei 2013. Pasien tersebut merupakan pasien yang terkena diare akut yang disebabkan oleh bakteri yang telah didiagnosa oleh dokter seperti terdapat lendir atau darah di dalam fesesnya, dan pasien tidak mengkonsumsi antibiotika.

4. Teknik Pengambilan Spesimen

Spesimen yang digunakan berupa feses (tinja) dengan konsistensi cair dari pasien yang terkena diare, yang diperoleh dari Puskesmas Mangasa Kota Makassar pada bulan Mei 2013. Spesimen diambil dengan menampung feses cair dari penderita diare, yang ditampung dalam tube steril dan diberi NaCl 0,9% sebelum dikulturkan.

C. Identifikasi Mikroba

1. Pengamatan Morfologi Secara Mikroskopik dengan Pengecatan Gram

Disiapkan objek glass dan *deck glass* yang telah dibersihkan dan dibebaslemakkan dengan etanol 70%. Dibuat lapisan film yang tipis pada permukaan objek gelas, lapisan film tersebut berisi suspensi bakteri dari sampel feses. Lapisan film tersebut kemudian difiksasi dengan cara menyentuhkan permukaan kaca objek gelas pada nyala api. Setelah didinginkan preparat langsung ditambahkan dengan cat A yaitu berupa larutan kristal violet sebanyak 1-2 tetes, didiamkan selama 30 detik lalu dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan dengan tissue. Setelah kering dilakukan perlakuan yang sama seperti pada penambahan cat A secara bergantian mulai dari penambahan cat B berupa larutan kristal iodium dan kalium iodida (30 detik), cat C berupa larutan aseton dengan penambahan etanol (20 detik) dan cat D berupa larutan safranin (30 detik). Setelah itu, preparat siap untuk diamati di bawah mikroskop. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk morfologi dan warna dari bakteri. Warna ungu menunjukkan bakteri Gram positif, sedangkan warna merah menunjukkan bakteri Gram negatif.

2. Uji *Esherichia coli*

a. Identifikasi dengan medium LB

Dipipet medium Lactosa Broth sebanyak 9 ml ke dalam tabung reaksi yang telah berisi tabung durham, ditetesi 1-3 tetes Brom Timol Blue. Diambil 1 ose suspensi bakteri. Diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37°

C. Diamati perubahan warna, positif *E.coli* ditandai dengan perubahan warna dari hijau menjadi kuning pada medium dan dapat dilihat pula timbulnya gelembung pada tabung Durham.

b. Identifikasi lanjutan dengan medium EMBA

Diambil 1 ml suspensi bakteri yang positif pada medium Laktosa Broth dimasukkan ke dalam cawan petri. Dipipet medium EMBA sebanyak 10 ml ke dalam cawan petri. Dihomogenkan, ditunggu hingga memadat. Diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37 °C. Diamati koloni merah dalam hijau metalik.

C. Pengujian Sensitivitas

1. Penyiapan Antibiotika

Antibiotika yang digunakan dalam penanganan diare yaitu Kotrimoksazol, Ciprofloksasin, dan Kloramfenikol akan diujikan secara *disk diffusion*. Dimana paper disk yang berisi antibiotik tersebut di tempatkan pada cawan petri yang steril. Ketentuan mengenai resistensi dan sensitivitasnya didasarkan pada besarnya zona bebas bakteri di sekitar *disk* antibiotika dengan berpedoman pada *National Committee for Clinical Laboratory Standards* (NCCLS).

2. Metode Sensitivitas

Pengujian sensitivitas yang digunakan adalah cara difusi *Kirby- Bauer* dengan menggunakan medium Mac-Conkey Agar. Diambil sampel feses cair menggunakan ose kemudian digoreskan ke dalam medium Mac-Conkey Agar

(MCA) Miring, inkubasi 1 x 24 jam pada suhu 37° C. Sampel yang telah diinkubasi diukur kekeruhannya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 580 nm pada 25 % T. Bakteri yang telah di dapatkan diambil dengan menggunakan cotton bud yang steril, kemudian dioleskan pada permukaan medium Mac-Conkey Agar hingga rata. Diletakkan *paper disk* antibiotika Kotrimoksazol 1,25 ug, Ciprofloksasin 5 ug, dan Kloramfenikol 30 ug dengan menggunakan pinset steril, kemudian diinkubasi pada suhu 37° C selama 1 x 24 jam. Diamati dan diukur zona hambatan yang terbentuk.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

1. Uji Sensitivitas

Tabel 2. Hasil pengukuran diameter zona hambatan beberapa antibiotika.

No	Probandus	Jenis Antibiotika (ppm/ug)	Diameter rata-rata zona hambat (mm)	Tingkat Sensitivitas
1.	A	C 30 ug	14,75	Intermedit
		Cip 5 ug	10,08	Intermedit
		CTX 1,25 ug	20,79	Sensitif
2.	B	C 30 ug	21,92	Sensitif
		Cip 5 ug	17,33	Sensitif
		CTX 1,25 ug	19,42	Sensitif
3.	C	C 30 ug	8,16	Resisten
		Cip 5 ug	19,5	Sensitif
		CTX 1,25 ug	15,16	Intermedit
4.	D	C 30 ug	8,5	Resisten
		Cip 5 ug	14	Sensitif
		CTX 1,25 ug	6,92	Resisten
5.	E	C 30 ug	9,92	Resisten
		Cip 5 ug	24,08	Sensitif
		CTX 1,25 ug	22,75	Sensitif

Keterangan:

Semua Probandus adalah anak-anak

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Perempuan (7 tahun) | 4. Laki-laki (8 tahun) |
| 2. Perempuan (6 tahun) | 5. Perempuan (6 tahun) |
| 3. Laki-laki (9 tahun) | |
| C : Kloramfenikol | CTX : Kotrimoksazol |
| Cip : Ciprofloxacin | |

2. Identifikasi Bakteri penyebab diare

a. Lactosa Broth dengan tabung Durham dan ditetesi BTB

Tabel 3. Uji Identifikasi bakteri *E.coli* dengan Lactosa Broth

No	Kode Sampel	Perubahan Warna		Pertumbuhan	Ket.
		Sebelum	Sesudah		
1.	Probandus A	Hijau	Kuning	Ada	(+) <i>E.coli</i>
2.	Probandus B	Hijau	Kuning	Ada	(+) <i>E.coli</i>
3.	Probandus C	Hijau	Kuning	Ada	(+) <i>E.coli</i>
4.	Probandus D	Hijau	Kuning	Ada	(+) <i>E.coli</i>
5.	Probandus E	Hijau	Kuning	Ada	(+) <i>E.coli</i>

b. Uji Lanjutan dengan Medium Eosin Metilen Blue Agar (EMBA)

Tabel 4. Uji Lanjutan Identifikasi lanjutan *E.coli* dengan medium EMBA

No	Kode Sampel	Warna Koloni	Pertumbuhan	Keterangan
1.	Probandus A	Hijau Metalik	(+) Ada	(+) <i>E.coli</i>
2.	Probandus B	Hijau Metalik	(+) Ada	(+) <i>E.coli</i>
3.	Probandus C	Hijau Metalik	(+) Ada	(+) <i>E.coli</i>
4.	Probandus D	Hijau Metalik	(+) Ada	(+) <i>E.coli</i>
5.	Probandus E	Hijau Metalik	(+) Ada	(+) <i>E.coli</i>

c. Uji Identifikasi dengan medium SCB

Tabel 5. Hasil Uji Identifikasi *Shigella* dan *Salmonella* pada medium SCB

No	Kode Sampel	Perubahan Warna		Pertumbuhan	Ket.
		Sebelum	Sesudah		
1.	Probandus A	Kuning bening	Kuning bening	-	(-) <i>Salmonella</i> dan <i>Shigella</i>
2.	Probandus B	Kuning bening	Kuning bening	-	(-) <i>Salmonella</i> dan <i>Shigella</i>
3.	Probandus C	Kuning bening	Kuning bening	-	(-) <i>Salmonella</i> dan <i>Shigella</i>
4.	Probandus D	Kuning bening	Kuning bening	-	(-) <i>Salmonella</i> dan <i>Shigella</i>
5.	Probandus E	Kuning bening	Kuning bening	-	(-) <i>Salmonella</i> dan <i>Shigella</i>

Ket : (+) : Kuning bening menjadi keruh → (+) *Salmonella* dan *Shigella*

(-) : Warna tetap → (-) *Salmonella* dan *Shigella*

Tabel 6. Hasil persentase dari sampel yang positif *Esherichia coli*

Hasil persentase ini diperoleh dari jumlah probandus yang sensitif, intermedit, dan resisten dibagi dengan banyaknya probandus diare.

No	AB	Jumlah Probandus					
		Sensitif	%	Intermedit	%	Resisten	%
1.	Kloramfenikol	1	20 %	1	20 %	3	60 %
2.	Ciprofloxacin	4	80 %	1	20 %	-	0 %
3.	Kotrimoksazol	3	60 %	1	20 %	1	20%

d. Pengecatan Gram

Pengamatan dilakukan dengan melihat warna dari bakteri. Untuk bakteri gram positif menunjukkan warna ungu, sedangkan bakteri Gram negatif menunjukkan warna merah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bakteri Gram negatif yang berbentuk batang.

Tabel 7. Hasil pengamatan morfologi secara mikroskopik

No.	Kode Sampel	Pengecatan Gram		Bentuk
		Positif	Negatif	
1	Probandus A	Tak berwarna	Merah	Batang
2	Probandus B	Tak berwarna	Merah	Batang
3	Probandus C	Tak berwarna	Merah	Batang
4	Probandus D	Tak berwarna	Merah	Batang
5	Probandus E	Tak berwarna	Merah	Batang

B. Pembahasan

Uji sensitivitas antibiotik merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik. Uji kepekaan/sensitivitas bertujuan untuk mengetahui daya kerja/efektivitas dari suatu antibiotik dalam membunuh bakteri (wahyutomo,2009).

Sampel yang digunakan berupa feses cair yang diperoleh dari pasien anak-anak yang terkena diare di Puskesmas Mangasa. Hal ini dikarenakan diare akut tersebut merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar yang menyerang anak-anak, dan menjadi penyebab kematian anak di Negara berkembang, dilakukan di Puskesmas Mangasa Kota Makassar karena puskesmas tersebut selalu menjadi rujukan dari beberapa wilayah dibagian selatan Kota Makassar. Penderita diare tersebut telah didiagnosa oleh dokter bahwa penyebabnya adalah bakteri. Di dalam penelitian ini, diperoleh 10 pasien yang terkena diare, namun hanya ada 5 pasien diare yang bersedia memberikan sampel feses cairnya, hal ini dikarenakan bahwa beberapa pasien telah mengkonsumsi antibiotik, dan beberapa pasien lagi masih malu untuk memberikan fesesnya. Pasien yang telah mengkonsumsi antibiotik terlebih dahulu tidak diambil sebagai sampel dikarenakan nantinya akan mempengaruhi pengamatan diameter zona hambatnya. Uji Sensitivitas dilakukan terhadap antibiotika dari beberapa golongan yang berbeda dan yang sering diresepkan dari dokter, yaitu Kotrimoksazol, Ciprofloksasin, dan Kloramfenikol.

Mekanisme dari beberapa antibiotika yang digunakan, yaitu:
(Siswandono,1995:382)

1. Kloramfenikol; merupakan suatu antibiotik yang berspektrum luas, baik terhadap bakteri gram positif maupun negatif. Antibiotik ini dihasilkan oleh *Streptomyces venezuela*. Mekanisme kerja antibiotik kloramfenikol ialah menghambat sintesis protein yang dibutuhkan untuk pembentukan sel-sel bakteri sehingga kloramfenikol menghambat fungsi RNA dari bakteri.
2. Ciprofloxacin; merupakan golongan flourquinolone generasi ke dua yang berspektrum luas, bekerja dengan menyekat sintesis DNA bakteri dengan menghambat topoisomerase II bakteri (DNA gyrase) dan topoisomerase IV bakteri.
3. Cotrimoksazol; Aktivitas antibakteri kombinasi antara sulfametoksazol dan trimetoprim (kotrimoksazol) berdasarkan kerjanya pada dua tahap yang berurutan pada reaksi enzimatik untuk pembentukan asam tetrahidrofolat. Sulfonamida menghambat masuknya para-aminobenzoic acid (PABA) ke dalam molekul asam folat dan trimetoprim menghambat terjadinya reaksi reduksi dari dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat.

Uji sensitivitas didahului dengan pemastian penyebab diare dengan pengujian pengecatan gram dan identifikasi bakteri. Pengecatan gram merupakan identifikasi awal dan dimaksudkan untuk mengidentifikasi mikroorganisme dengan melihat bentuk dan morfologi dari mikroorganisme secara mikroskopik.

Jenis-jenis bakteri gram positif pada saluran cerna yaitu *Corinebacterium diphtheriae* penyebab penyakit gastrointestinal, biasanya juga penyebab faringitis disertai toksin. Bakteri gram negatif yaitu bakteri *Bacteriodes* penyebab infeksi luka, *Shigella* penyebab kolitis disertai diare, *Salmonella* penyebab penyakit enteritis disertai diare, *Pseudomonas aeruginosa* penyebab infeksi luka, *Vibrio cholera* penyebab penyakit diare berat, dan *Esherichia coli* penyebab paling utama diare akibat bakteri (Underwood.1999,52).

Biasanya penyebab infeksi gastrointestinal merupakan bakteri gram negatif (Underwood.1999,51). Penyebab diare sendiri merupakan bakteri *E.coli*, *Shigella*, *Vibrio cholera* dan *Salmonella sp*, semua bakteri tersebut termasuk kelompok bakteri gram negatif.

Hasil uji pengecatan gram menunjukkan bahwa feses pada penderita diare mengandung bakteri gram negatif yang ditandai dengan adanya warna merah pada saat diamati di mikroskop. Hal ini disebabkan ketika diberikan Cat A yaitu terdiri dari kristal violet dan amonium oksalat yang merupakan cat primer yang akan memberikan warna dari mikroorganisme dengan memberikan warna ungu. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian Cat B yaitu terdiri dari kristal iodium dan kalium iodida yang berfungsi memfiksasi cat primer yang diserap mikroorganisme target. Akibat pemberian Cat B, maka pengikatan warna oleh bakteri akan lebih baik (lebih kuat). Dan pada saat pemberian Cat C yang berupa aseton dan alkohol yang berfungsi d melunturkan cat sebelumnya, bakteri tersebut melunturkan warna dari

kompleks Cat A dan B, hal ini dapat disebabkan karena lipid dari bakteri terekstraksi dari dinding sel, pori-pori mengembang, kompleks kristal violet dan iodum akan keluar dari sel dan kompleks Cat A dan B pun akan luntur, sehingga sel menjadi tidak berwarna. Apabila diberikan Cat D yang berupa warna merah, sel bakteri tersebut akan menyerap warna merah tersebut (Djide. N,2006,67-72). Dari pengamatan mikroskopik pada semua sampel terlihat bentuk bakteri yaitu berbentuk batang.

Dalam penelitian ini telah dilakukan pengujian sensitivitas antibiotik terhadap bakteri yang diduga penyebab diare dari setiap probandus. Dilakukan pengujian terhadap bakteri *Shigella* dan *Salmonella* menggunakan medium spesifik yaitu menggunakan medium SCB, yang dilanjutkan dengan medium SSA dengan hasil positif berupa adanya koloni hitam. Tetapi dalam penelitian ini tidak ditemukan koloni hitam sehingga hasilnya negatif. Kemudian dilakukan pengujian terhadap bakteri *Esherichia coli*, dimana terlebih dahulu dilakukan pengujian dugaan dengan menggunakan medium LB dan penambahan 1-3 tetes BTB, Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya gelembung gas pada tabung durham, dan disertai perubahan warna dari hijau menjadi kuning. Hal ini disebabkan karena *E.coli* akan memfermentasikan laktosa sehingga menyebabkan perubahan warna media menjadi kuning akibat terbentuknya senyawa asam hasil fermentasi laktosa yang mengubah warna indikator BTB dari hijau menjadi kuning, dan terbentuk gas yang dapat dilihat dalam tabung durham. Dan kemudian dilanjutkan dengan uji penegasan menggunakan medium EMBA. Medium EMBA merupakan medium selektif

dan sekaligus medium penegasan untuk mengisolasi *Esherichia coli*. Eosin Y dan Methylen Blue pada medium ini menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan beberapa bakteri Gram negatif. Penentuan ada tidaknya *Esherichia coli* pada medium ini ditandai dengan adanya koloni merah dalam hijau metalik (Anonim.2001). Karena hasil identifikasi bakteri positif *Esherichia coli*, maka bakteri penyebab diare dari sampel yang diambil dari pasien diare di Puskesmas Mangasa Kota Makassar yaitu bakteri *Esherichia coli*.

Uji sensitivitas antibiotik terhadap bakteri penyebab diare dilakukan dengan menggunakan metode difusi. Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi karena mempunyai keuntungan ekonomis, sederhana (mudah dibuat). Prosedur yang paling sering digunakan dan dianjurkan oleh WHO (World Health Organization) dan NCCLS (Nation Committe For Clinical Laboratory Standars) adalah metode difusi dengan cakram Kirby-Bauer (Depkes RI,1999).

Hasil identifikasi pada pengujian dugaan menunjukkan bahwa semua sampel positif terdapat *E.coli*. Kemudian pada uji penegasan menunjukkan bahwa seluruh sampel A, B, C, D, dan E positif *Esherichia coli* . Hal ini dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan koloni berwarna merah dalam hijau metalik pada medium. Sedangkan untuk pengecatan Gram diperoleh seluruh sampel yang merupakan bakteri gram negatif Hal ini ditandai pada bentuknya yang batang dan berwarna merah pada pengamatan mikroskopik.

Hasil uji sensitivitas bakteri penyebab diare terhadap antibiotika yang digunakan menunjukkan bahwa 20% sensitif terhadap Kloramfenikol, 80% sensitif terhadap Ciprofloksasin, 60% sensitif terhadap Kotrimoksazol. Untuk antibiotika yang menunjukkan hasil intermedit yaitu Kloramfenikol 20%, siprofloksasin 20%, Kotrimoksazol 20%. Sedangkan persentasi resisten dari masing-masing antibiotika yaitu untuk Kloramfenikol 60%, siprofloksasin 0%, Kotrimoksazol 20%. Dalam hasil penelitian ini, antibiotik yang menunjukkan tingkat resisten paling tinggi yaitu pada antibiotik Kloramfenikol dengan presentase 60%. Hilangnya sensitivitas bakteri gram negatif terhadap kloramfenikol disebabkan karena adanya degradasi enzimatik, juga dapat disebabkan karena menurunnya permeabilitas dinding mikroorganisme atau karena mutasi ribosom pada bakteri. Dan menginaktivasi obat yang masuk, sehingga obat tidak mempunyai daya kerja yang efektif untuk membunuh mikroorganisme. Resistensi ciprofloksasin mungkin terjadi karena mutasi kromosom yang menyebabkan penurunan afinitas terhadap *DNA gyrase* dan topoisomerasi IV, sehingga daya kerja obat berkurang akibatnya mikroorganisme yang akan dihambat menjadi kebal terhadap obat. Resistensi Kotrimoksazol mungkin disebabkan oleh mutasi yang meningkatkan produksi PABA atau mengubah struktur molekul enzim yang berperan dalam sintesis folat sehingga afinitasnya terhadap sulfonamid menurun, sehingga bakteri tersebut akan kebal terhadap obat.

Adanya variasi hasil yang diperoleh ini disebabkan karena daya virulen dan invasi dari serotipe dan strain bakteri, jenis bakteri yang terdapat

pada sampel, faktor genetik dan daya tahan tubuh/ imunitas dari masing-masing probandus (Supardi,1999:165). Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Kloramfenikol merupakan antibiotika yang persentasi resistennya paling tinggi diantara antibiotika yang lain, yaitu 60%. Sedangkan antibiotika yang persentasi sensitifnya paling tinggi yaitu antibiotika Ciprofloksasin sebesar 80%.

Timbulnya resisten dari beberapa antibiotika ini disebabkan karena beberapa bakteri mempunyai kemampuan alami untuk kebal atau resisten terhadap efek pengobatan, misal dengan antibiotik, meskipun tidak berinteraksi secara langsung. Hal ini dapat terjadi karena bakteri mempunyai enzim yang dapat merusak obat. Reseptor tempat agen antimikroba bereaksi dapat berubah baik afinitas reseptor terhadap antimikroba maupun respon reseptor yang dapat menaikkan aktivitas sehingga dapat mengatasi obat tersebut. Berkurangnya akumulasi obat oleh adanya sel resisten terjadi dengan adanya penurunan permeabilitas membran sel terhadap antibiotik dan variasi jalur metabolisme tersebut oleh antimikroba. Obat yang dapat menghambat pertumbuhan antagonis kompetitif metabolisme normal, dapat menghasilkan metabolik yang berlebihan. Akibatnya obat tersebut tidak efektif lagi bagi bakteri (Setyabudi 1995).

Penggunaan obat terhadap suatu kasus penyakit misalnya diare akan lebih baik dan bermanfaat jika benar-benar memenuhi kriteria rasionalnya. Istilah penggunaan obat yang rasional dalam lingkungan biomedik mencakup kriteria, seperti obat yang benar, indikasi yang tepat, yaitu bahwa alasan

penulisannya didasarkan pada pertimbangan medik yang baik (tanpa cacat); obat yang tepat, berkaitan dengan manfaat, keamanan, kesesuaian bagi penderita dan biaya; penderita yang tepat, yaitu tidak ada kontraindikasi terjadi dan kemungkinan reaksi merugikan adalah minimal; dispensing yang benar termasuk informasi yang tepat bagi penderita tentang obat yang ditulis dokter, dan kepatuhan penderita pada pengobatannya (Siregar, 2004).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Antibiotika Kotrimoksazol yang digunakan di Puskesmas Mangasa Kota Makassar masih sensitif terhadap bakteri penyebab diare.
2. Antibiotika Ciprofloxacin paling sensitif dibandingkan dengan antibiotika Kotrimoksazol terhadap bakteri penyebab diare.
3. Islam mengajarkan kita untuk terus berusaha mencari kebenaran atas segala yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini, termasuk dalam hal pengobatan sering kali kita mengalami masalah resistensi atau dengan kata lain obat yang digunakan tidak mempunyai daya kerja yang optimal. Uji sensitivitas merupakan upaya bagi para ahli farmasi untuk meneliti apakah obat/antibiotika yang digunakan masih mempunyai daya kerja yang layak terhadap mikroorganisme atau tidak.

B. Saran

Sebaiknya dilakukan pengujian sensitivitas terhadap penyakit-penyakit yang lain, yang dalam pengobatannya menggunakan antibiotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim.
- Baughman, Diane C, Joann C. Hackey. 2000. *Buku saku keperawatan medikal-bedah oleh Bruner dan Suddarth*. Penerbit buku kedokteran (ECG). Jakarta
- Benson, Harold J. 1980. *Microbiological Applications A Laboratory manual in General Microbiology Third Edition*. Wm. C. Brown Company Publishers. USA, Pasadena City
- Departemen Agama. 2004. *Al-Quraan dan Terjemahnya*. PT. Bumi Restu. Jakarta
- Depkes RI. 1999. *Good Laboratory Practices*. DepKes RI. Jakarta.
- Difco. 1988. *Cultur Media Handbook*. E., Merck, Darmstadt, Federal Republic of Germany.
- Djide, M.N., dan Sartini. 2008. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Lembaga Penerbit UNHAS. Makassar
- Djide, M.N., 2010. *Mikrobiologi Klinik*. Bagian Mikrobiologi-Bioteknologi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Makassar
- Donald W, Reynolds Foundation. 2010. *ELDER CARE the Arizona Geriatric Education Center, and the Arizona Center on Aging November*, A Resource for Interprofessional Providers.
- Elizabeth J. Corwin. 2009. *Buku Saku Patofisiologi*. Penerbit Buku Kedokteran. Jakarta.
- Entjang Indan. 2003. *Mikrobiologi dan parasitologi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Ganiswarna, S., G. Dkk. 1995. *Farmakologi dan Terapi, Ed. IV*. Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta
- Garrity. G. M., Bell. J. A. and Lilburn. T. G. 2004. *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of Systematic Bacteriology*, 2th Edition. United States of America, Springer, New York Berlin Heidelberg.
- Jawetz, E., Melnick, J.L., and Adelberg, E.A. 2000. *Mikrobiologi kedokteran, Buku 1 & 2, bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran*. Universitas Airlangga, Salemba Medika. Jakarta
- Kosala, Khemasili. 2009. *Uji Aktivitas Antibakteri*. Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. Samarinda

- Mutschler ernst. 1991. *Dinamika obat*. ITB. Bandung
- Pelczar, M.J, Chan, E.C.S. 1988. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*, Jilid 2, Terjemahan Ratna Sri Hadioetomo. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Purnomo B, Firmansyah A, dan Hegar B. 1996. *Perilaku Rehidrasi Oral dengan Oralit pada Tatalaksana Diare Balita Antara Dokter Umum Puskesmas dan Dokter Umum Swasta di Kotamadya Jakarta Timur. Dalam : Kumpulan Abstrak Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak X (KONIKA)*. Bukit tinggi 16-20 juni
- Setiabudi. 1995. *Pengantar Antimikroba*.Gaya Baru, Jakarta.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Volume 2 dan 15 Surah Ali'Imran,Surah an-nisa*.Lentera Hati. Jakarta.
- Siswandono, Drs. 1995. *Kimia Medisinal*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Suandi, dr.I.K.G. 1989. *Diit Pada Anak Sakit*. Penerbit Buku Kedokteran.Jakarta.
- Supardi, I. dan Sukamto. 1999. *Mikrobiologi Alam Pengolahan dan Keamanan Pangan*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Shetty.N, J.W.Tang.2009. *Infectious Disease Phatoghnesis, Prevention, and Case Studies*. Department of Clinical Microbiology, University College London Hospitals.
- Southwick, Frederick. 2007. *Infectious Diseases A Clinical Short Course Second Edition*. McGraw-Hill Medical Publishing Division. New York.
- Underwood,J.C.E.1999. *Patologi Umum dan Sistemik Edisi 2*. Penerbit Buku Kedokteran.Jakarta.
- Wahyutomo ridha 2009. Tes sensitivitas untuk menentukan resistensi antibiotika. <http://www.tributememories.com>. Diakses 5 april 2012

Lampiran I : Pembuatan Medium .

1. Medium Mac.conkey agar (Safitri, 2010 :65)

Komposisi:

Gelatin Peptone		17,0 gram
Lactose		10,0 gram
Sodium Cholride		5,0 gram
Neutral Red		0,03 gram
Polipeptone		3,0 gram
Bile Salts		1,5 gram
Agar		13,5 gram
Crystal violet		0,001 gram
Air suling	hingga	1000 ml

Pembuatan :

Sebanyak 50,0 gram medium disuspensikan ke dalam 1 L aquades. Medium dipanaskan sampai mendidih agar tercampur dengan sempurna selama 1 menit.masukkan ke dalam tabung atau botol untuk disterilisasi di dalam autoklaf selama 15 menit, pada suhu 121°C.

2. Lactosa Broth (LB) (Difco,1998 :241)

Komposisi:

Beef Extract		3,0 g
Peptone		5,0 g
Lactose		5,0 g
Air suling	hingga	1000 ml

Pembuatan :

Ditimbang bahan sebanyak 13 gram dan dilarutkan dalam 1000 ml aquadest, kemudian dipanaskan hingga semua larut (homogen). Selanjutnya, disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

3. Eosin Methylene Blue Agar (EMBA) (Difco,1998 :173)

Peptone	10 g
Lactose	5 g
Sucrose	5 g
Dipotassium Phosphate	2 g
Agar	13.5 g
Eosin Y	0.4 g
Methylene Blue	0.065 g
Air suling	hingga 1000 ml

Pembuatan :

Sebanyak 36 gram medium disuspensikan ke dalam 1 L aquades. Medium dipanaskan sampai mendidih agar tercampur dengan sempurna selama 1 menit. Selanjutnya, disterilisasi di dalam autoklaf selama 15 menit, pada suhu 121°C.

Lampiran II. Pembuatan cat Gram (Bibiana,1994)

1. Cat A

- Larutan pokok kristal violet

Komposisi :

Kristal violet 20,0 gram

Etanol 95% 100,0 ml

- Larutan pokok oksalat

Amonium oksalat 1,0 gram

Air suling 100,0 ml

Larutan yang digunakan dilaboratorium

1. Larutan pokok kristal violet 1 bagian

Air suling 10 bagian

2. Larutan pokok ammonium oksalat 4 bagian

Pembuatan:

Dicampur (1) dan (2), kemudian disimpan dalam botol bertutup gelas.

2. Cat B

- Larutan iodium

Komposisi :

Kristal iodium 1,0 gram

Kalium iodida 2,0 gram

Air suling 5,0 ml

Pembuatan:

Setelah kedua bahan tersebut larut, ditambahkan

Air suling 240,0 ml

Cairan Natrium bikarbonat 5%	60,0 ml
------------------------------	---------

3. Cat C

- Larutan pemucat

Komposisi :

Etanol	250,0 ml
--------	----------

Aseton	250,0 ml
--------	----------

Pembuatan:

Dicampur kedua bahan tersebut, kemudian disimpan dalam botol bertutup gelas.

4. Cat D

- Larutan pokok Safranin

Komposisi :

Safranin	2,5 gram
----------	----------

Etanol 95%	100,0 ml
------------	----------

Larutan yang biasa digunakan dilaboratorium


Larutan pokok Safranin	1 bagian
------------------------	----------

Air suling	5 bagian
------------	----------

Pembuatan:


Dicampur kedua bahan tersebut, kemudian disimpan dalam botol bertutup gelas.

Lampiran III. Pengambilan Spesimen



Gambar 1. Skema Kerja Pengambilan Spesimen

Lampiran IV. Skema Kerja Uji Sensitivitas



Gambar 2. Skema kerja Uji Sensitivitas

Lampiran V. Kultur Bakteri Pada Feses

Gambar 3. Kultur Bakteri dari Tiap sampel feses dari probandus A,B,C,D,E

Lampiran VI. Hasil Uji Sensitivitas antibiotik terhadap bakteri penyebab diare



Keterangan :

1 : Kloramfenikol

2 : Ciprofloxacin

3 : Kotrimoksazol

Gambar 4. Pengujian Sensitivitas Antibiotik 3 Replikasi pada sampel feses dari probandus A



Keterangan :

1. Kloramfenikol
2. Ciprofloxacin
3. Kotrimoksazol

Gambar 5. Pengujian Sensitivitas Antibiotik 3 Replikasi pada sampel feses dari probandus B



Keterangan :

1. Kloramfenikol
2. Ciprofloxacin
3. Kotrimoksazol

Gambar 6. Pengujian Sensitivitas Antibiotik 3 Replikasi pada sampel feses dari probandus C



Keterangan :

1. Kloramfenikol
2. Ciprofloxacin
3. Kotrimoksazol

Gambar 7. Pengujian Sensitivitas Antibiotik 3 Replikasi pada sampel feses dari probandus D



Keterangan :

1. Kloramfenikol
2. Ciprofloxacin
3. Kotrimoksazol

Gambar 8. Pengujian Sensitivitas Antibiotik 3 Replikasi pada sampel feses dari probandus E

Lampiran VII : Hasil Uji Identifikasi bakteri penyebab diare



Sebelum penambahan suspensi bakteri




sesudah penambahan suspensi bakteri

Gambar 9. Pengujian identifikasi dugaan awal bakteri *E.coli* pada semua sampel feses dari semua probandus




Gambar 10. Pengujian identifikasi lanjutan bakteri *E.coli* pada semua sampel feses dari semua probandus



Gambar 11. Pengecatan gram pada setiap sampel feses dari probandus

Lampiran VIII. Diagram Persentase Uji sensitivitas antibiotik terhadap bakteri penyebab diare



Gambar 12. Diagram Persentase sensitifitas antibiotik terhadap bakteri penyebab diare

BIOGRAFI



TRY ARDITA FEBRIANI, lahir di kendari (Sulawesi Tenggara) pada hari jumat tanggal 15 Februari 1991. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara buah hasil dari ayahanda dan bundaku tercinta. Gadis sederhana dan lemah lembut ini memulai pengembaraan ilmunya di TK Kuncup Pertiwi, kendari selama 1 tahun. Kemudian dilanjutkan ke SD Ikip 1, Makassar selama 6 tahun. Sewaktu SD gadis ini pernah mengikuti Lomba FASI V (Festival Anak Shaleh yang ke-5) dan berhasil mewakili Sulsel ke ajang nasional. Dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Negeri 2 Makassar. Kemudian menerima hidayah dari sang pencipta untuk diterima sebagai siswi SMA Negeri 2 Makassar selama 3 tahun. Dia pun mencoba menggalli ilmunya lebih dalam lagi dengan melanjutkan studinya ke salah satu Universitas Negeri di Makassar yaitu bernama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan berstatus sebagai mahasiswi jurusan Farmasi Fakultas ilmu Kesehatan. Selama perkuliahan gadis yang tidak pernah berhenti berusaha ini, banyak memperoleh pengalaman-pengalaman baru, salah satunya adalah bekerja sambil kuliah, Wanita berkaca mata ini mempunyai motto **“selalu tetap berusaha dan berdoa, kerjakanlah sesuatu halmu dengan ikhlas”**. Dan motto inilah yang mendorongnya agar tetap berusaha dan tetap berjuang demi mencapai cita-cita nya yang sesungguhnya. Dan gadis berkaca mata ini selalu mengharapkan hal-hal yang baru datang di kehidupannya.