

**FORMULASI SEDIAAN KRIM DARI EKSTRAK ETANOL KUNYIT  
( *Curcuma domesticae*. Val ) DAN UJI EFEKTIVITAS TERHADAP  
BAKTERI *STAPHYLOCOCCUS AUREUS***



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh**

**NUR FADHILLAH THAMRIN  
70100107116**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDINMAKASSAR  
2012**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula shalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai tokoh pahlawan dan panutan penulis.

Skripsi dengan judul “Formulasi Sediaan Krim Dari Ekstrak Etanol Kunyit (*Curcuma domesticae*. Val) dan Uji Efektivitasnya Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, baik itu yang bersifat teknis maupun non-teknis. Namun berkat do’a, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala-kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis hanturkan kepada Ayahanda Drs. Thamrin Loga Wali, SH.MH dan Ibunda Suriani Arsyad. S.Ag yang tercinta, yang dengan penuh keiklasan, kesabaran telah memberikan doa, perhatian, bantuan baik moril maupun materil serta dorongan yang tak henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat penulis rampungkan berkat bantuan, petunjuk, arahan dan bimbingan dari :

- Ibu Isriany Ismail S.Si., M.Si, Apt., Sebagai pembimbing pertama serta Ibu Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si, Apt Selaku Pembimbing kedua serta sebagai Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
- Bapak Drs. Supardin. M.Hi, Selaku Penguji Agama dan Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci , M. Si, Apt selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.

Ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.A. Qadir Gassing, HT,M.S selaku rektor UIN alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah menjadikan UIN sebagai kampus yang telah banyak mencetak sarjana-sarjana yang berkualitas, berdaya guna serta memiliki kompetensi di masyarakat.
2. Bapak Dr.dr.Rasyidin Abdullah.,M.PH.,MH.Kes selaku Dekan beserta para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si, Apt. Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci , M. Si, Apt. Kepala laboratorium Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5. Ibu Isriany Ismail S.Si, M.si., Apt. sebagai pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Para Laboran Farmasi yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian dan seluruh rekan-rekan seperjuangan angkatan 2007 tanpa terkecuali khususnya rekan-rekan dari Farmasi C serta adik-adik jurusan farmasi angkatan 2008, 2009, 2010, 2011 dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi yang sederhana ini. Penyusunan menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, namun dengan upaya semaksimal mungkin akhirnya dapat disusun sebagaimana adanya sekarang ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

**Makassar, Mei 2012**

**Wassalam**

**Nur Fadhillah Thamrin**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. <i>Latar Belakang</i> .....	1
B. <i>Rumusan Masalah</i> .....	3
C. <i>Tujuan Penelitian</i> .....	4
D. <i>Manfaat Penelitian</i> .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. <i>Uraian Tumbuhan</i> .....	6
1. <i>Klasifikasi</i> .....	6
2. <i>Nama Daerah</i> .....	7
3. <i>Morfologi</i> .....	7
4. <i>Kandungan Kimia</i> .....	8
5. <i>Khasiat</i> .....	9
B. <i>Uraian Kulit</i> .....	10
1. <i>Kulit</i> .....	10
2. <i>Susunan Anatomi Fisiologi Kulit</i> .....	11
a. <i>Lapisan Epidermis</i> .....	13
b. <i>Lapisan dermis</i> .....	14
c. <i>Sub kutis</i> .....	14
C. <i>Absorpsi Perkulatan</i> .....	15
1. <i>Penetrasi transepidermal</i> .....	16

2. Penetrasi <i>Transappendageal</i> .....	16
D. <i>Uraian Infeksi- Infeksi Kulit Oleh Bakteri Staphylococcus aureus</i> ...	17
1. Bakteri Penyebab.....	17
2. Bentuk Infeksi Kulit.....	17
3. Jenis- jenis infeksi disebabkan oleh <i>Staphylococcus aureus</i> .....	18
E. <i>Uraian Krim</i> .....	22
F. <i>Uraian Emulgator</i> .....	23
1. Pembagian Emulgator.....	23
2. Mekanisme Emulgator.....	25
3. Sistem Keseimbangan Hidrofilik- Lipofilik.....	26
G. <i>Pembuatan Emulsi</i> .....	27
1. Metode Kontinental.....	27
2. Metode Inggris .....	27
3. Metode Botol.....	28
H. <i>Evaluasi Kestabilan Emulsi</i> .....	28
1. Kriming.....	28
2. Viskositas .....	28
3. Perubahan tetes terdispersi .....	29
4. Inverse Fase.....	29
I. <i>Kondisi penyimpanan dipercepat</i> .....	29
J. <i>Uraian Antimikroba</i> .....	30
1. Pengertian Antimikroba.....	30
2. Sifat Antimikroba.....	31
3. Prinsip Kerja Antimikroba.....	31
4. Mekanisme Antimikroba.....	33
5. Metode uji Antimikroba .....	34
K. <i>Uraian mikroba uji</i> .....	37
1. Klasifikasi .....	37
2. Sifat dan morfologi.....	37
L. <i>Uraian Tambahan</i> .....	38
M. <i>Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat</i> .....	41

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	51
A. <i>Alat dan Bahan</i> .....	51
B. <i>Prosedur Kerja</i> .....	51
1. Pengambilan Sampel.....	51
2. Pengolahan Sampel.....	52
3. Ekstraksi Sampel.....	52
4. Sterilisasi Alat.....	52
5. Pembuatan Medium.....	53
6. Penyiapan Bakteri Uji.....	53
7. Pembuatan Krim Ekstrak Etanol Rimpang Kunyit ( <i>Curcuma domesticate rhizoma</i> ).....	54
8. Pemeriksaan Hasil Sediaan .....	55
9. Pengujian Efektifitas Sediaan Terhadap Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> .....	57
10. Pengumpulan Dan Analisis Data.....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	58
A. <i>Hasil Penelitian</i> .....	58
1. Pengamatan Organoleptis.....	58
2. Penentuan Tipe Emulsi.....	58
3. Evaluasi Kestabilan Fisik.....	59
4. Pengukuran Daya Hambat.....	60
B. <i>Pembahasan</i> .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	69
A. <i>Kesimpulan</i> .....	69
B. <i>Saran</i> .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN</b> .....	78
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	112

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Klasifikasi Respon Hambatan Pertumbuhan Bakteri .....	35
2. Diameter Zona Hambat Formula .....	60
3. Perhitungan Konsentrasi Surfaktan Nonionik.....	78
4. Hasil pengamatan Uji tipe Emulsi.....	80
5. Hasil Pengukuran Volume Kriming ( % ).....	81
6. Hasil Pengukuran Viskositas Krim (poise).....	82
7. Analisis Statistika Viskositas.....	83
8. Analisis Varians Viskositas.....	84
9. Rentang Ukuran Tetes Terdispersi.....	85
10. Rentang Ukuran Tetes Terdispersi.....	85
11. Rentang Ukuran Tetes Terdispersi.....	86
12. Analisis Statistika Tetes Terdispersi.....	87
13. Analisis Varians Tetes Terdispersi.....	88
14. Hasil Uji BNJ Tetes Terdispersi .....	89
15. Hasil Pengukuran Zona Hambatan Krim Sebelum Dan Setelah Penyimpanan dipercepat mm (mm) .....	91
16. Analisis Statistika Zona Hambat Krim Sebelum dan Setelah Penyimpanan Dipercepat (mm).....	92
17. Analisis Varians Zona Hambatan Krim Sebelum dan Setelah Penyimpanan Dipercepat (mm).....	93
18. Hasil Uji BNJ Zona Hambatan .....	95
19. Hasil Pengukuran Zona Hambatan Krim Pada Kondisi Penyim- panan Dipercepat Inkubasi 1 x 24 Jam dan 2 x 24 Jam.....	96
20. Analisis Statistika Zona Hambat (mm) Krim Pada Kondisi Pen- yimpanan Dipercepat Inkubasi 1 x 24 Jam dan 2 x 24 Jam .....	97
21. Analisis Varians Zona Hambatan Krim Pada Kondisi Penyim- panan Dipercepat Inkubasi 1 x 24 Jam dan 2 x 24 Jam.....	98



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Tanaman Kunyit ( <i>Curcuma domesticate. Val</i> ).....	73
2. Skema Kerja Ekstraksi Kunyit ( <i>Curcuma domesticate. Val</i> ) .....	74
3. Skema Kerja Pembuatan krim Dengan surfaktan nonionic .....	75
4. Skema Pengujian Kestabilan Krim .....	76
5. Skema Pengujian Daya Hambat Sediaan Terhadap Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> .....	77
6. Histogram Viskositas Krim (poise) Sebelum Dan Seteah Kondisi Dipercepat .....	99
7. Histogram Ukuran Tetes Terdispersi Krim ( $\mu\text{m}$ ) Sebelum Dan Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat .....	99
8. Histogram Zona Hambatan Krim (mm) Sebelum dan Setelah Kondisi dipercepat .....	100
9. Pengamatan Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 .....	101
10. Uji Pengenceran Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat.....	102
11. Pengamatan Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 .....	103
12. Uji Pengenceran Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat .....	104
13. Uji Hantaran Listrik Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 an Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat ..	105
14. Uji Hantaran Listrik Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat ...	106
15. Uji Volume Kriming Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat.....	107
16. Uji Tetes Terdispersi Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat...	108
17. Uji Tetes Terdispersi Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat.....	109
18. Uji Efektifitas Sediaan Pada Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat Inkubasi 1 x 24 Jam Pada Suhu 37° C.....	110
19. Uji Efektifitas Sediaan Pada Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat Inkubasi 2 x 24 Jam Pada Suhu 37° C.....	110
20. Uji Efektifitas Sediaan Pada Pada Kondisi Setelah Penyimpanan	

Dipercepat Inkubasi 1 x 24 Jam Pada Suhu 37° C .....	111
21. Uji Efektifitas Sediaan Pada Pada Kondisi Setelah Penyimpanan	
Dipercepat Inkubasi 2 x 24 Jam Pada Suhu 37° C.....	111



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Perhitungan Konsentrasi Surfaktan Nonionik .....	78
2. Hasil Pengamatan Uji Tipe Emulsi .....	80
3. Pengukuran Volume Kriming (%).....	81
4. Hasil Pengukuran Viskositas Krim (poise) .....	82
5. Analisis Statistika Viskositas Krim Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) .....	83
6. Analisis Varians Viskositas .....	84
7. Rentang Ukuran Tetes Terdispersi.....	85
8. Analisis Statistika Tetes Terdispersi ( $\mu\text{m}$ ) Krim Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK).....	87
9. Analisis Varians Tetes Terdispersi.....	88
10. Perhitungan Skala Lensa Okuler Dengan Lensa Objektif.....	90
11. Hasil Pengukuran Zona Hambatan Krim (mm).....	91
12. Analisis Statistika Zona Hambatan (mm) Krim Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK).....	92
13. Analisis Varians Zona Hambatan Krim .....	93
14. Hasil Pengukuran Zona Hambatan Krim (mm).....	96
15. Analisis Statistika Zona Hambatan Krim (mm) Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK).....	97
16. Analisis Varians Zona Hambatan Krim .....	98

## ABSTRAK

**Nama Penyusun** : Nur Fadhillah Thamrin  
**Nim** : 70100107116  
**Judul Skripsi** : **Formulasi Sediaan Krim Ekstrak Etanol Kunyit ( *Curcuma domesticae*. Val ) dan uji efektivitasnya terhadap bakteri *staphylococcus aureus*.**

---

Telah dilakukan Formulasi sediaan krim ekstrak etanol kunyit (*Curcuma domesticae*. Val) dan uji efektivitasnya terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas fisik krim yang mengandung ekstrak etanol kunyit (*Curcuma domesticae*.Val)dengan menggunakan emulgator nonionik, serta efektifitasnya terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.

Kunyit (*Curcuma domesticae*. Val) diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol. Ekstrak kemudian dibuat krim dengan konsentrasi 9% dengan variasi kombinasi emulgator nonionik (tween 60 dan Span 60) konsentrasi 2%, 3%, 4%. Krim tersebut diuji kestabilan fisiknya berupa volume kriming, viskositas, ukuran tetes terdispersi, inversi fase dan uji efektivitasnya terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dengan metode penyimpanan dipercepat menggunakan metode difusi agar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis terhadap stabilitas fisik dan efektifitasnya terhadap sediaan dengan statistik RAK (Rancangan Acak Lengkap). Krim dengan kombinasi emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) konsentrasi 2% dan 3%, tidak mempengaruhi tekstur krim, warna, bau, viskositas, mempengaruhi ukuran tetes terdispersi dan volume kriming. Sedangkan krim yang menggunakan variasi emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) konsentrasi 4% tidak mempengaruhi tekstur krim, warna, bau, viskositas krim, ukuran tetes terdispersi, dan volume kriming. Krim dengan konsentrasi kombinasi emulgator nonionik 2%, 3%, dan 4% dapat menghambat pertumbuhan bakteri *staphylococcus aureus* ( $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada taraf 5% dan 1%). Bersifat bakterisid dan penyimpanan sediaan tidak mempengaruhi aktivitas penghambatan bakteri uji.

Ketiga krim yang diformulasikan dengan menggunakan variasi konsentrasi emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) dapat dikatakan stabil secara fisik dan optimum menghambat adalah krim yang diformulasi dengan menggunakan kombinasi konsentrasi emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) dengan konsentrasi 4%.

## ABSTRACT

**Name** : Nur Fadhillah Thamrin  
**Nim** : 70100107116  
**Title of Script** : **Formulation of cream ethanol extract of tumeric (*Curcuma domesticae*. Val) and to test its effectiveness against *Staphylococcus aureus*.**

---

Preparations have been made cream formulation of ethanol extract of turmeric (*Curcuma domesticae*. Val) and test its effectiveness against bacteria *Staphylococcus aureus*. This study aims to determine the physical stability of a cream containing ethanol extract of turmeric (*Curcuma domesticae*.Val) by using a nonionic emulsifier, as well as its effectiveness against bacteria *Staphylococcus aureus*.

Turmeric (*Curcuma domesticae*. Val) was extracted by maceration using ethanol method. The extract was then made creamy with a concentration of 9% with a variation of the combination of a nonionic emulsifier (tween 60 and Span 60) concentration of 2%, 3%, 4%. Physical stability of the creams were tested using the method kriming volume, viscosity of the emulsion, the size of the dispersed drops, phase inversion and test its effectiveness against the bacteria *Staphylococcus aureus* to use traditional methods of measuring the inhibition of the preparation.

The study analysis that states of the physical stability and preparation effectiveness were analysed by statistical RAK (Randomized block design). Cream with a combination of a nonionic emulsifier (Tween 60 and Span 60) concentration of 2% and 3%, does not affect the creamy texture, color, odor, viscosity, affect the size of the dispersed drops and the volume kriming. While the cream that uses a variation of a nonionic emulsifier (Tween 60 and Span 60) concentration of 4% does not affect the creamy texture, color, odor, viscosity of the cream, the size of the dispersed drops, and the volume kriming. Cream with a concentration of nonionic emulsifier combination of 2%, 3% and 4% can inhibit the growth of the bacteria *staphylococcus aureus* where  $F$  calculated  $< F$  table at the level of 5% and 1%. Inventory was bakterid and storage is not affecting the inhibitory activity of test bacteria.

Third-cream that is formulated by using the variation of the concentration of nonionic emulsifier (Tween 60 and Span 60) can be said to be physically stable and optimum block is the cream that is formulated using a combination of the concentration of nonionic emulsifier (Tween 60 and Span 60) with a concentration of 4%.

Formulation of the cream has done the ethanol extract of tumeric ( *Curcuma domesticae*.Val ) and to test its effectiveness against *Staphylococcus aureus*. This study aims to determine the physical stability of creams that contain ethanol extract of tumeric ( *Curcuma domesticae*. Val ) using emulgator nonionik, as well as its effectiveness against *Staphylococcus aureus*.

Leaves of tumeric ( *Curcuma domesticae*. Val ) was extracted with ethanol using a maceration method. Extracts then made cream with 7 % with the variation of concentration combinations of 2%, 3%, and 4%. Physical stability of creams were tested using the methods kriming volume, the viscosity of the emulsion, the size of the dispersed drops, phase inversion and the test its effectiveness against *Staphylococcus aureus* using the methods of measurement of the inhibition stocks.

Cream with a combination of emulgator nonionik ( Tween 60 dan Span 60) concentration of 2% and 3% dd not affect the cream texture, color, odor, viscosity, affect the size and volume of drops dispersed kreaming. Where as the use variasion emulgator cream nonionic ( Tween 60 dan Span 60 ) concentration of 4% does not affect the cream texture color, odor, viscosity cream, size and volume of drops dispersed creaming. Cream with a combination of consentrasyon emulgator nonionic 2%, 3% and 4% can inhibit the growth of *staphylococcus aureus*. Third cream, formulated using of variation of consentrasyon range nonionic ( Tween 60 dan Span 60 ) can be said to be physically stable, but the most stable is the cream formulated using combination of consentrasyon range nonionic ( Tween 60 dan Span 60 ) with concentration of 4%.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang***

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, itulah sebabnya upaya untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal sangat diperlukan. Berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk hidup dengan sehat bersama keluarga. Sebelum zaman berkembang pada umumnya masyarakat melakukan pengobatan tradisional yang bahan dasar obatnya berasal dari tumbuhan- tumbuhan yang mereka kenal dan berfungsi sebagai obat (Prakash, 2001).

Gatal- gatal merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat. Penyakit kulit ini dapat berasal dari lingkungan seperti gigitan jenis serangga tertentu dan aneka gangguan kulit, seperti dermatitis alergika, dermatitis topik, dermatitis kontak, dan parasit. Mikroorganisme pada kulit yang dapat menyebabkan gatal-gatal antara lain ialah dari genus *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Propionibacteria*, dan *Corynebacteria* (Djauhari. Edy P. : 2008 ; 20).

*Staphylococcus aureus* merupakan bakteri gram positif yang selalu ditemukan sebagai kuman flora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia. Dalam kondisi tertentu dapat menjadi penyebab infeksi baik pada manusia maupun pada hewan. Setiap jaringan tubuh dapat diinfeksi olehnya dan menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda- tanda yang khas, yaitu

peradangan, nekrosis, dan pembentukan abses. Infeksinya dapat berupa furunkel, yang ringan pada kulit sampai berupa suatu piema yang fatal (Syahrachman, Agus, 1994: 103 ).

Kunyit (*Curcuma domesticae*. Val) adalah tanaman herba berimpang. Kunyit termasuk tanaman memiliki banyak kegunaan dimasyarakat diantaranya sebagai bahan obat (antihistamin, antibakteri, antiinflamasi, antikoagulan, menurunkan tekanan darah, mengobati keseleo, dan memar ), bahan dasar jamu, bumbu masak, bahan pewarna dan kosmetik. Senyawa kimia yang terkandung dalam tumbuhan kunyit adalah kurkumin (sejenis senyawa polifenol), desmetoksikumin, bidesmetoksikurkumin dan minyak atsiri ( Anonim, 1995: 271).

Berdasarkan hasil penelitian Wijaya dan Taufik (2008) menunjukkan bahwa kunyit (*Curcuma domesticate*. Val) dengan konsentrasi 3,8% dan 9% mampu menghambat pertumbuhan *Bacillus cereu*, *Escherichia coli* *Staphylococcus aureus* dan flora mikroba lain sampai waktu kontak jam dan setelah waktu kontak 24 jam terjadi peningkatan jumlah mikroba.

Beberapa bentuk sediaan obat yang dimaksudkan untuk pemakaian pada kulit seperti salep, krim, lotio, larutan topikal dan tinktur menggambarkan bentuk sediaan dermatologi yang paling sering dipakai, tapi bagaimanapun preparat lain seperti pasta, liniment, serbuk dan aresol (juga bisa digunakan). Preparat yang digunakan pada kulit antara lain untuk efek fisik yaitu kemampuan bekerja sebagai pelindung kulit, pelincir, pelembut, zat pengering dan lain- lain atau untuk efek khusus dari bahan obat yang ada.



Preparat dijual bebas sering mengandung campuran dari bahan obat yang digunakan dalam pengobatan kondisi tertentu seperti infeksi kulit, gatal-gatal, luka bakar, sengatan dan gigitan serangga, kutu air, mata ikan, penebalan kulit dan keras, kutil, ketombe, jerawat, penyakit kulit kronis dan eksim (Ansel. C, Howard, 2005 : 489).

Krim merupakan bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi ke dalam bahan dasar yang sesuai. Krim biasanya digunakan sebagai emolien atau pemakaian obat pada kulit. Banyak dokter dan pasien lebih suka pada krim dari pada salep, untuk satu hal, umumnya bentuk sediaan yang menyenangkan, mudah menyebar rata, praktis, mudah digunakan dan dalam hal krim dari emulsi jenis minyak dalam air lebih mudah dibersihkan dari pada kebanyakan salep (Ansel,2005).

Ada dua tipe krim, krim tipe minyak dalam air (M/A) dan tipe air dalam minyak (A/M). Krim tipe M/A (*vanishing cream*) mudah dicuci dengan air, jika digunakan pada kulit, maka akan terjadi penguapan dan peningkatan konsentrasi dari suatu obat yang larut dalam air sehingga mendorong penyerapannya ke dalam jaringan kulit (Ansel,2005).

Sebagai bahan alam dengan menggunakan surfaktan untuk menformulasi sediaan krim digunakan terhadap beberapa konsentrasi emulgator untuk mendapatkan sediaan krim yang stabil.

Berdasarkan diatas maka akan dilakukan penelitian tentang formulasi sediaan krim ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana stabilitas fisik sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) dengan menggunakan emulgator surfaktan nonionik pada konsentrasi berbeda 2%, 3%, 4% ?
2. Apakah sediaan krim yang telah dibuat dapat menghambat pertumbuhan bakteri *staphylococcus aureus* ?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang pemakaian kunyit (*Curcuma domesticate. Val*) sebagai obat alternatif untuk pengobatan antibakteri ?

### **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui stabilitas fisik sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) dengan menggunakan emulgator nonionik serta efektivitasnya terhadap bakteri.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Diperoleh sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) yang berkhasiat sebagai antibakteri dan memiliki stabilitas fisik yang baik yang diharapkan dapat menjadi alternatif obat penyakit kulit, khususnya terhadap infeksi yang dapat disebabkan oleh bakteri.

2. Diperoleh data ilmiah mengenai stabilitas fisik yang mengandung ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) dengan menggunakan emulgator nonionik, serta efektivitasnya terhadap bakteri agar dapat menunjang pengembangan dan pemanfaatan khusus dibidang kesehatan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Uraian Tumbuhan*

Kunyit (*Curcuma domesticae*. Val) merupakan salah satu tanaman rempah atau tanaman obat- obatan. Habitat asli tanaman ini adalah wilayah asia khususnya wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami persebaran ke daerah Indonesia, Malaysia, Thailand, Cina, India, Vietnam, Taiwan, Filipina, Australia bahkan Afrika. Kunyit dapat tumbuh di berbagai tempat, tumbuh liar di ladang, di hutan (misalnya di hutan jati) ataupun ditanam di pekarangan rumah, di dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Selain itu, kunyit dapat tumbuh dengan baik di tanah yang baik tata pengairannya, curah hujannya cukup banyak. Selain untuk rempah Kunyit juga di tanam secara monokultur, kemudian akan di ekspor untuk bahan obat- obatan (Anonim, 2006).

#### **1. Klasifikasi** (Anonim, 2010)

Regnum	: Plantae
Division	: Spermatophyta
Sub division	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledonae
Sub Kelas	: Sympetalae
Ordo	: <i>Zingiberales</i>
Family	: <i>Zingiberaceae</i>

Genus : *Curcuma*

Spesies : *Curcuma domesticate. Val*

## 2. Nama Daerah

Kunyit secara empiris telah digunakan oleh masyarakat untuk mengobati berbagai penyakit. Kunyit mempunyai berbagai nama daerah yang berbeda-beda diantaranya : Jawa : kunyir, konengtemen (Sunda), konye, temokoneng (Madura). Kalimantan : kunit, janar (Banjar) ; cahang (Dayak Penabung). Sumatera : kakunye (Enggano) : kunyet (Aceh); kuning (Gayo); hunik (Batak); under (Nias) ; kunyit (Melayu); kunir (Lampung). Sulawesi: uinida (Talut); awalahu (Gorontalo); panigon (Tolili); uni kuni (Toraja); kunyi (Makassar); unyi (Bugis); nunyik (Mandar). Maluku : unin (Goram); unine (Seram Barat); gogohoki (Halmahera); guraci (Ternate). Papua : Rame (Kpaur); nikwai (Windesi) Kunyit juga mempunyai istilah asing inggris” turmeric (Ditjen POM. 1977).

## 3. Morfologi (Anonim, 2010) dan (Sumiati, 2004)

Tanaman kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40- 100 cm. Batang merupakan batang semu, tegak, bulat, membentuk rimpang dengan warna hijau kekuningan dan tersusun dari pelepah daun (agak lunak). Daun tunggal, bentuk bulat telur (lanset) memanjang hingga 10- 40 cm, lebar 8- 12,5 cm dan pertulangan menyirip dengan warna hijau pucat. Berbunga majemuk yang berambut dan bersisik dari pucuk batang semu, panjang 10- 15 cm, berwarna putih/ kekuningan. Ujung dan pangkal daun runcing, tepi daun yang rata. Kulit luar rimpang berwarna jingga

kecoklatan, daging buah merah jingga kekuning-kuningan (Sumiati, 2004).

Kunyit merupakan tanaman yang mudah diperbanyak dengan stek rimpang dengan ukuran 20- 25 gram stek. Bibit rimpang harus cukup tua. Kunyit tumbuh dengan baik di tanah yang tata pengairannya baik, curah hujan 2.000 mm sampai 4.000 mm tiap tahun dan di tempat yang sedikit terlindung. Tapi untuk menghasilkan rimpang yang lebih besar diperlukan tempat yang lebih terbuka. Rimpang kunyit berwarna kuning sampai kuning jingga (Sumiati, 2004)

Warna kulit rimpang adalah jingga kecoklatan atau berwarna terang agak kuning sampai agak kehitaman. Warna daging jingga kekuningan dilengkapi dengan bau khas dan rasanya agak pahit dan pedas (Nugroho N. A, 1998).

#### **4. Kandungan Kimia**

Kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat obat, yang disebut kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, desmetoksikumin dan bidesmetoksikurkumin dan zat-zat manfaat lainnya Kandungan Zat :  
 Kurkumin : R1 = R2 = OCH<sub>3</sub> 10 %  
 Demetoksikurkumin : R1 = OCH<sub>3</sub>, R2 = H 1 - 5 %  
 Bisdemetoksikurkumin: R1 = R2 = H. Minyak atsiri sebanyak 6 % / Volatil oil (Keton sesquiterpen, turmeron, tumeon 60%, Zingiberen 25%, felandren, sabinen, borneol, sineil, *zingiberen*, alfa dan beta-turmeone. Lemak 1 -3 %, Karbohidrat 3 %, Protein 30%, Pati 8%, Vitamin

C 45-55%, Garam-garam Mineral (Zat besi, fosfor, dan kalsium)  
(Dalimartha, 2007)

## **5. Khasiat Tumbuhan**

Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. kunyit adalah rempah-rempah yang biasa digunakan dalam masakan di negara-negara Asia. Kunyit sering digunakan dalam masakan sejenis gulai, dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan (Latief, 2001)

Penggunaan kunyit dalam obat teradisional atau jamu : Umbi akar yang berumur lebih dari satu tahun dipakai sebagai obat (umbi akar bersifat mendinginkan, membersihkan, mempengaruhi bagian perut Khususnya pada lambung , merangsang, melepaskan lebihan gas di usus, menghentikan pendarahan dan mencegah penggumpalan darah) selain dari itu juga digunakan sebagai bahan dalam masakan. Kunyit juga digunakan sebagai obat anti gatal dan anti kejang serta mengurangi pembengkakan selaput lendir mulut. Kunyit dikonsumsi dalam bentuk perasan yang disebut filtrat, juga diminum sebagai ekstrak atau diguna sebagai salap untuk mengubati bengkak. Kunyit juga berkhasiat untuk menyembuhkan hidung yang tersumbat, caranya dengan membakar kunyit dan menghirupnya (Winarto 2003)

Kunyit bisa dipakai untuk menyembuhkan beberapa hal yang berkaitan dengan penyimpangan pada kerja ginjal, terutama pada beberapa kasus-kasus yang ditandai dengan bau badan yang tidak sedap dan mata yang tidak tahan terhadap sinar, sebagai antikoagulan, antiedemik, menurunkan tekanan darah, obat malaria, obat cacing, obat sakit perut, memperbanyak ASI, stimulan, mengobati keseleo, memar dan rematik. Kurkuminoid pada kunyit berkhasiat sebagai antihepatotoksik, enthelmintik, antiedemik, analgesic. Selain itu kurkumin juga dapat berfungsi sebagai antiinflamasi, antibakteri dan antioksidan (Latief, 2001)

## ***B. Uraian Kulit***

### **1. Kulit**

Kulit adalah jaringan pelindung yang lentur dan elastis, menutupi seluruh permukaan tubuh dan merupakan 5% berat tubuh (Aiache, 1993). Secara anatomi, kulit terdiri dari banyak lapisan, pada umumnya dibagi menjadi tiga lapisan jaringan: epidermis, dermis, dan lapisan lemak di bawah kulit. Lapisan terluar kulit adalah stratum korneum atau lapisan tanduk yang terdiri dari sel-sel padat mati dan sel-sel keratin yang berlapis-lapis. Nilai koefisien difusinya dalam jaringan ini 1000 kali bahkan lebih kecil dari jaringan kulit lainnya, sehingga menghasilkan daya tahan yang lebih tinggi dan umumnya tidak dapat ditembus (Lachman dkk, 1994).

Fungsi kulit antara lain sebagai berikut:



- mengeluarkan keringat
- pelindung tubuh
- menyimpan kelebihan lemak
- mengatur suhu tubuh, dan
- tempat pembuatan vitamin D dari pro vitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet

## 2. *Susunan Anatomi Fisiologi Kulit*

Kulit merupakan lapisan pelindung tubuh yang sempurna terhadap pengaruh luar, baik pengaruh fisik maupun pengaruh kimia (Tranggono, 2007).


Kulit berfungsi sebagai system epitel pada tubuh untuk menjaga keluarnya substansi-substansi penting dari dalam tubuh dan masuknya substansi-substansi asing ke dalam tubuh (Tranggono, 2007).

Meskipun kulit relative permeabel terhadap senyawa-senyawa kimia, namun dalam keadaan tertentu kulit dapat ditembus oleh senyawa-senyawa obat atau bahan yang berbahaya yang dapat menimbulkan efek terapeutik atau efek toksik baik yang bersifat setempat maupun sistemik

Dari suatu penelitian diketahui bahwa pergerakan air melalui lapisan kulit yang tebal tergantung pada pertahanan lapisan *stratum corneum* yang berfungsi sebagai *rate limiting barrier* pada kulit.

Secara mikroskopik, kulit tersusun dari berbagai lapisan yang berbeda-beda, berturut-turut dari luar ke dalam yaitu lapisan epidermis,

lapisan dermis yang tersusun atas pembuluh darah dan pembuluh getah bening dan lapisan jaringan di bawah kulit yang berlemak atau yang disebut lapisan hipodermis (Soewolo, 2003). Struktur kulit yang terdiri dari lapisan epidermis, dermis dan hipodermis dapat dilihat pada gambar 1.



Kulit merupakan ‘selimut’ yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus (keratinasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar. Selain itu, kulit merupakan suatu kelenjar holokrin yang besar (Tranggono, 2007).

Luas kulit pada manusia rata-rata  $\pm$  2 meter persegi, dengan berat 10 kg jika dengan lemaknya atau 4 kg jika tanpa lemak.

Secara histopologis kulit tersusun atas 3 lapisan utama yaitu (Soewolo, 2003).

**a. *Lapisan Epidermis***

Lapisan Epidermis ini terdiri atas stratum korneum, stratum lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basalis. Stratum korneum (lapisan tanduk) adalah lapisan kulit yang paling luar dan terdiri atas beberapa lapisan sel gepeng yang mati, tidak berinti dan protoplasmanya sudah berubah menjadi keratin (zat tanduk).

Stratum lusidum terdapat langsung dibawah stratum korneum, merupakan lapisan sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma yang telah berubah menjadi protein eleidin. Lapisan ini terdapat jelas ditelapak tangan dan kaki. Stratum granulosum merupakan 2 atau 3 lapisan sel gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti sel diantaranya. Butir-butir kasar ini terdiri atas keratohialin. Mukosa biasanya tidak mempunyai lapisan ini.

Stratum spinosum terdiri atas beberapa lapisan sel berbentuk polygonal dengan ukuran bermacam-macam akibat proses mitosis. Protoplasmanya jernih karena banyak mengandung glikogen dan inti sel terletak ditengah. Sel-sel ini makin dekat dikulit makin gepeng bentuknya.

Stratum basalis terdiri atas sel-sel kubus yang tersusun vertikal dan pada taut dermoepidermal berbaris seperti pagar, lapisan ini merupakan dasar epidermis.

## **b. Lapisan Dermis**

Lapisan ini jauh lebih tebal dari pada epidermis, terbentuk oleh jaringan elastis dan fibrosa padat dengan elemen seluler, kelenjar, dan rambut sebagai adneksa kulit. Lapisan ini terdiri atas:

- a) Pars papilaris, yaitu bagian yang menonjol ke dalam epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah.
- b) Pars Retikularis, yaitu bagian bawah dermis yang berhubungan dengan subkutis, terdiri atas serabut penunjang kolagen, elastin dan retikulin. Dasar lapisan ini terdiri atas cairan kental asam hialuronat dan kondroitin sulfat dan sel-sel fibroblast. Kolagen muda bersifat lentur namun dengan bertambahnya umur menjadi stabil dan keras.

## **c. Lapisan Subkutis**

Lapisan ini merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel lemak merupakan sel bulat, besar, dengan inti terdesak ke pinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan lainnya oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan ini berfungsi sebagai cadangan makan.

Lapisan ini adalah lapisan paling dalam mengandung banyak arteri, vena, kelenjar keringat dan kelenjar sebacea, serta reseptor tekanan. Baik ini banyak mengandung serabut kolagen dan serabut elastis. Di seluruh bagiannya mengandung fibroblast dan sel-sel adipose, berbagai jenis makrofag yang sangat penting pada pertahanan tubuh dan

berbagai jenis sel lainnya. Selain itu banyak pula terdapat pembuluh darah yang memungkinkan berperan dalam melakukan regulasi suhu tubuh. Di lapisan ini juga kaya akan pembuluh limfe dan serabut-serabut saraf, banyak ujung saraf berakhir pada dermis berubah menjadi reseptor khusus, sehingga mampu mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan yang kemudian disampaikan ke otak (Soewolo, 2003).

### **C. Absorpsi Perkutan**

Absorpsi perkutan adalah masuknya molekul obat dari kulit ke dalam jaringan dibawah kulit, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dengan mekanisme difusi pasif.

Mengacu pada Rothaman, penyerapan perkutan merupakan gabungan fenomena penembusan senyawa dari lingkungan luar ke bagian dalam kulit ke dalam peredaran darah dan kelenjar getah bening. Istilah perkutan menunjukkan bahwa penembusan terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapan dapat terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda.

Untuk memasuki sistem sistemik, tahapan pada absorpsi perkutan dapat melalui penetrasi pada permukaan *stratum corneum* di bawah gradien konsentrasi, difusi melalui *stratum corneum*, epidermis dan dermis, kemudian masuknya molekul ke dalam mikrosirkulasi (Chien, 1987).

Penembusan molekul dari luar ke bagian dalam kulit melalui penetrasi *transepidermal* (Boylan, 1995). Kulit merupakan organ yang kemungkinan dapat merubah obat setelah penggunaan secara terdapat dapat berperan sebagai absorpsi perkutan (Swarbrick dan Boylan, 1995).

### 1. Penetrasi *transepidermal*.

Sebagian besar obat berpenetrasi intraselluler dan ekstraselluler. Pada kulit normal, jalur penetrasi obat umumnya melalui (*transepidermal*), dibandingkan penetrasi melalui folikel rambut maupun ngat (*transappendageal*). Pada prinsipnya, masukan adalah adanya koefisien partisi dari penetran. Obat *stratum corneum* melalui rute in secara (Swarbrick dan. pada proses melalui ruang) masuknya penetran ke Obat-obat yang obat-obat yang interselluler. Jalur interselluler yang berliku dapat berperan sebagai rute utama permeasi obat dan penghalang utama dari sebagian besar obat-obatan (Swarbrick dan Boylan, 1995).

### 2. Penetrasi *Transappendageal*.

Penetrasi melalui rute *transapendageal* adalah penetrasi melalui kelenjar-kelenjar dan folikel yang ada pada kulit (Swarbrick dan Boylan, 1995).

Pada penetrasi *transappendageal* akan membawa senyawa obat melalui kelenjar keringat dan folikel rambut yang berhubungan dengan kelenjar sebaceous. Rute *transappendageal* merupakan rute yang sedikit digunakan untuk transport molekul obat, karena hanya mempunyai daerah yang kecil (kurang dari 0,1% dari total permukaan kulit). Akan tetapi, rute ini berperan penting pada beberapa senyawa polar dan molekul ion yang hampir tidak berpenetrasi melalui *stratum corneum* (Moghimi, *et al*, 1999).

Pada rute ini, dapat menghasilkan difusi yang cepat dan segera setelah penggunaan obat karena dapat menghilangkan waktu yang diperlukan oleh obat untuk melintasi *stratum corneum*. Difusi melalui *transapendageal* ini dapat terjadi dalam menit dari pemakaian obat (Swarbrick dan Boylan, 1995).

#### **D. Uraian Infeksi Kulit Oleh Bakteri *Staphylococcus aureus***

Bakteri bersama- sama dengan jamur dan virus, dapat menyebabkan banyak penyakit kulit. Infeksi bakteri pada kulit yang paling sering adalah *pioderma* (Harahap mawali,2000 : 46).

##### **1. Bakteri penyebab**

Infeksi bakteri primer pada kulit sering kali disebabkan oleh *stafilokok* koagulase positif dan *streptokok* beta hemolitik. *Staphylococcus aureus*, suatu bakteri koagulase - positif, merupakan kokus patogen paling utama dalam kulit. Kokus ini adalah gram positif, berbentuk bola dalam bundel- bundel kecil. *Streptokok* adalah bakteri gram positif juga. *Streptokok pyogenes* termasuk kedalam golongan A *streptokokus*.

##### **2. Bentuk infeksi kulit**

###### **a. Infeksi bakteri primer**

Infeksi bakteri primer ialah infeksi yang terjadi pada kulit yang sehat, dengan manifestasi klinik yang khas dan biasanya disebabkan oleh satu jenis bakteri.

###### **b. Infeksi bakteri sekunder**

Infeksi bakteri sekunder adalah infeksi yang terjadi pada bermacam-macam kelainan kulit. Infeksi sekunder dapat disebabkan oleh beberapa bakteri (Harahap mawali, 2000: 47).

### 3. Jenis- jenis infeksi yang disebabkan oleh bakteri *staphylococcus aureus*

#### a. Impetigo

*Impetigo* adalah infeksi piogenik superficial dan mudah menular yang terdapat dipermukaan kulit. Terdapat dua bentuk jenis *impetigo*, yaitu *impetigo kontagiosa* dan *impetigo bulosa*. *Impetigo bulosa* disebabkan oleh *stafilokok* sedangkan *impetigo kontagiosa* dapat disebabkan oleh *staphylococcus aureus* (Harahap mawali,2000:47).

*Impetigo kontagiosa* adalah infeksi kulit yang mudah menular dan terutama mengenai anak- anak yang belum sekolah. Penyakit ini mengenai kedua jenis kelamin, laki- laki dan perempuan, sama banyak. Pada orang dewasa *impetigo* ini sering terdapat pada mereka yang tinggal bersama- sama dalam satu kelompok seperti asrama dan penjara (Harahap mawali,2000:48).

*Impetigo* merupakan proses radang dangkal dengan visiko- pustule unilokuler yang terdapat diantara *stratum granulosum* (Harahap mawali,2000:48).

#### b. *Staphylococcal Scalded Skin Syndrome* (Sindrom Kulit Terkelupas Akibat Stafilokok)



*Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS)* merupakan suatu bentuk penyakit kulit yang berat dan disebabkan oleh eksotoksin eksfoliatif yang dihasilkan *staphylococcus aureus* dan ditandai oleh pembentukan bula dan eksfoliasi yang generalisata (Harahap mawali,2000:49).

Penyakit ini sering menyerang anak- anak berumur 5 tahun. Tetapi kadang- kadang dapat mengenai orang dewasa. Penyakit terjadi mendadak, kadang- kadang muncul beberapa hari sesudah faringitis (Harahap mawali,2000:50).

c. *Folikulitis*

*Folikulitis* adalah peradangan bagian distal folikel rambut yang biasanya hanya mengenai ostium, tapi dapat meluas sedikit ke bawahnya. Sebenarnya folikulitis sering ditemui dan diabaikan oleh penderita jerawat. *Folikulitis* biasanya disebabkan oleh *stafilokok koagulasi positif (Staphylococcus aureus)* (Harahap mawali,2000:51)

d. *Furunkel*

*Furunkel* adalah suatu infeksi nekrotik akut folikel rambut yang dalam. *Furunkel* dapat terjadi sekunder terhadap dermatosis lain. Sering mengenai anak- anak sebagai komplikasi penyakit parasit, seperti scabies. *Frunkel* sering terjadi pada kulit yang sering mendapat gesekan, tekanan dan iritasi local, seperti garukan (Harahap mawali,2000:52).

- Penyebab, *frunkel* ialah *Staphylococcus aureus*.

- Gejala, pada permulaan penderita merasa gatal, lesi menjadi nyeri bila ditekan atau diusap, terdapat benjolan merah kecil (5- 30 mm) yang berisi nanah terasa nyeri dan berdenyut- denyut.
- Tanda – tanda, timbul peradangan folikuler kecil dan merah yang cepat bertambah besar dan membentuk suatu tonjolan berbentuk kerucut dan teraba keras dan dikelilingi oleh warna merah.
- Lokasi lesi, muka (bibir atas, hidung dan telinga), kuduk, pinggul, ketiak, badan dan paha (Harahap mawali,2000:53).

e. *Karbunkel*

*Karbunkel* adalah infeksi bakteri dalam, yang mengenai beberapa folikel rambut yang disertai reaksi inflamasi berat disekelilingnya. Terjadi di penyebaran infeksi sampai pada lapisan di bawah kulit. *Karbunkel* terutama mengenai laki- laki usia pertengahan atau orang tua (Harahap mawali,2000:54).

- Penyebab, *karbunkel* ialah *Staphylococcus aureus*.
- Keluhan, bila diraba terasa sakit, gejala sistemik yang terjadi ialah demam tinggi.
- Tanda- tanda timbul mendadak, biasanya muncul suatu nodul merah, keras dan cepat membesar membentuk suatu bentuk lesi besar dan terasa sakit.

f. *Sikosis Vulgaris*

*Sikosis vulgaris* adalah infeksi *stafilokok* pustule kronik yang mengenai seluruh kedalaman folikel rambut pada laki- laki yang

berumur 30- 40 tahun, terutama didaerah yang berjenggot (Harahap mawali,2000:55).

- Penyebab, *Sikosis vulgaris* disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus*, bakteri berasal dari hidung.
- Keluhan,penderita merasa terbakar dan gatal pada daerah yang terinfeksi.
- Tanda-tanda,mula-mula sebagai kumpulan papula edemastus merah,didaerah tempat tumbuh rambut keluar. Sesudah lesi pecah, terbentukla krusta.
- Lokasi lesi,terutama disekitar bibir atas dekat hidung dan daerah berjenggot.

g. *Paronikia*

*Paronikia* adalah inflamasi atau infeksi lipatan kulit disekeliling kuku. Kelainan ini biasa dibagi 2 jenis, yaitu *paronikia* akut yang disebabkan oleh bakteri dan *paronikia* kronik yang disebabkan oleh jamur. *Paronikia* akut oleh *Staphylococcus aureus*. *Paronikia* akut sering terdapat sebagai pembengkakan jaringan merah yang sakit abses sekitar kuku. *Paronikia* mengenai penderita semua golongan umur, baik laki- laki maupun perempuan, terutama pada mereka yang pekerjaanya sering mencuci tangan atau kerja basah (Harahap mawali,2000: 56).

### ***E. Uraian krim***

Emulsi yang dikenal dengan istilah lotion dan krim, merupakan bentuk sediaan yang paling sering digunakan. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan terlarut terdispersi ke dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi yang relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih dianjurkan untuk penggunaan kosmetika dan estetika (Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995).

Emulsi, adalah sistem dispersi kasar yang secara termodinamika tidak stabil, terdiri dari minimal dua atau lebih cairan yang tidak bercampur satu sama lain. Di mana cairan yang satu terdispersi ke dalam cairan yang lain dan untuk memantapkannya ditambahkan emulgator (Voigth, 1995).

Sistem emulsi banyak digunakan dalam farmasi. Dapat dibedakan antara emulsi cairan, untuk pemakaian dalam (emulsi minyak ikan, emulsi parafin) dan emulsi untuk pemakain luar. Emulsi terdiri dari dua fase yang tidak dapat bercampur satu sama lainnya, di mana yang satu menunjukkan krakter hidrofil, yang lain lipofil. Fase hidrofil umumnya adalah air atau suatu cairan yang dapat bercampur dengan air, sedangkan sebagai fase lipofil adalah minyak mineral atau minyak tumbuhan atau lemak. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, apakah fase hidrofil yang terdispersi ke dalam lipofil ataukah fase lipofil yang terdispersi ke dalam fase hidrofil (Voigth, 1995).

Pada formulasi krim ada dua tipe basis emulsi yang digunakan yaitu minyak dalam air (M/A) dan air dalam minyak (A/M). pemilihan basis didasarkan atas tujuan penggunaannya dan jenis bahan yang akan digunakan (Lahman, 1994).

#### ***F. Uraian Emulgator***

Emulgator adalah bahan aktif permukaan yang mengurangi tegangan antarmuka antara minyak dan air dan mengililingi tetesan-tetesan terdispersi dalam lapisan kuat yang mencegah koalesensi dan pemisahan fase terdispersi (Parrot, 1974).

##### **1. Pembagian Emulgator**

Berdasarkan struktur kimianya emulgator diklasifikasikan menjadi (Gennaro, 1990. Lierbermen, 1988) :

###### **a. Emulgator Alam**

1. Emulgator alam yang membentuk film multimolekuler, misalnya akasia dan gelatin.
2. Emulgator alam yang membentuk film monomolekuler misalnya lesitin, kolesterol.
3. Emulgator yang membentuk film berupa partikel padat misalnya bentonit dan vegum.

- ###### **b. Emulgator sintetik atau surfaktan yang membentuk film monomolekuler.**
- Kelompok bahan aktif permukaan ini dibagi menjadi anionik, kationik, dan nonionik. Tergantung dari muatan yang dimiliki oleh surfaktan.

### 1. Anionik

Surfaktan ini memiliki muatan negatif. Contoh bahannya yaitu kalium, natrium, dan garam ammonium dari asam laurat dan asam oleat yang larut dalam air dan merupakan bahan pengemulsi M/A yang baik. Bahan ini mempunyai rasa yang kurang menyenangkan dan mengiritasi saluran cerna sehingga dibatasi penggunaannya hanya untuk bagian luar.

### 2. Kationik

Aktifitas permukaan bahan kelompok ini terletak pada kation yang bermuatan positif. pH dari sediaan emulsi dengan pengemulsi kationik yaitu antara 4-8. Rentang pH ini juga menguntungkan karena masuk kedalam pH normal kulit. Contohnya yaitu senyawa ammonium kuartener.

### 3. Nonionik

Surfaktan yang luas penggunaannya sebagai bahan pengemulsi karena memiliki keseimbangan hidrofilik dan lipofilik dalam molekulnya. Tidak seperti tipe anionik dan kationik, emulgator nonionik tidak dipengaruhi perubahan pH dan penambahan elektrolit. Contoh yang paling banyak digunakan yaitu ester gliseril, ester asam lemak sorbitan (span) dan turunan polioksietilennya (tween)

## 2. Mekanisme Emulgator

Berdasarkan mekanisme kerjanya, emulgator dibagi menjadi (Gennaro, 1990 : 302) :

### a. Adsorpsi monomolekuler

Surfaktan atau amfibil menurunkan tegangan antar muka karena teradsorpsi pada antarmuka minyak air membentuk film monomolekuler. Film ini membungkus tetes terdispersi dengan suatu lapisan tunggal yang seragam berfungsi mencegah bergabungnya tetesan. Idealnya film ini harus fleksibel sehingga dapat terbentuk kembali jika pecah atau terganggu.

### b. Adsorpsi Multimolekuler

Koloid hidrofil terhidrasi dapat dianggap sebagai bahan aktif permukaan karena terdapat pada antarmuka minyak air tetapi berbeda dengan surfaktan sintetik. Koloid hidrofil tidak menyebabkan penurunan tegangan antarmuka yang nyata tetapi membentuk film multi molekuler pada antarmuka tetesan. Aksi sebagai emulgator terutama disebabkan oleh film yang dibentuknya kuat sehingga mencegah koalesensi. Film multimolekuler ini bersifat hidrofilik sehingga cenderung membentuk minyak dalam air.

### c. Adsorpsi Partikel Padat

Partikel padat yang dibagi halus yang terbasahi oleh minyak dan air dapat bertindak sebagai emulgator membentuk suatu film partikel

halus di sekeliling tetes terdispersi pada antarmuka sehingga mencegah koalesensi.

### 3. Sistem Keseimbangan Hidrofilik-Lipofilik

*Hydrophilic-Lyphophilic Balance* adalah harga yang harus dimiliki oleh sebuah emulgator sehingga pertemuan antara fase lipofil dengan air dapat menghasilkan emulsi dengan tingkat dispersitas dan stabilitas yang optimal (Voigth, 1995).

Sistem keseimbangan hidrofilik-lipofilik digunakan untuk menyatakan perbandingan sifat hidrofilik dan lipofilik dari suatu emulgator. Emulgator dengan nilai HLB rendah, dapat larut atau terdispersi dalam minyak. Sedangkan emulgator dengan nilai HLB tinggi dapat larut atau terdispersi dalam air (Michael, EA. 1988).

Emulgator sering dikombinasikan untuk menggunakan emulsi yang lebih baik yaitu emulgator dengan keseimbangan hidrofilik dan lipofilik yang diinginkan, meningkatkan kestabilan dan sifat kohesi dari lapisan antarmuka serta mempengaruhi konsistensi dan penampakan emulsi (Gennaro, 1990).

Emulgator dengan nilai HLB dibawah 7 umumnya menghasilkan emulsi air dalam minyak (A/M) sedangkan emulgator dengan nilai HLB diatas 7 umumnya menghasilkan emulsi minyak dalam air. Tetapi sistem HLB tidak memberikan indikasi tentang konsentrasi yang digunakan. Sebagai aturan, emulgator dengan konsentrasi 2 % adalah jumlah yang cukup dalam suatu formula walaupun konsentrasi yang lebih kecil dapat



memberikan hasil yang lebih baik. Jika konsentrasi emulgator lebih dari 5 % maka emulgator akan menjadi bagian utama dari formula dan hal ini bukanlah tujuan dari penggunaan emulgator (Martin, 1971).

### ***G. Pembuatan Emulsi***

Tahap awal dalam pembuatan suatu emulsi adalah pemilihan pengemulsi. Agar berguna dalam preparat farmasi, zat pengemulsi mempunyai kualitas tertentu. Dalam sediaan krim pengemulsi dapat bersifat anionik, kationik dan nonionik. Dalam ukuran kecil preparat emulsi yang dibuat dapat dibuat dengan tiga metode yang umum digunakan oleh ahli farmasi di apotek. Ketiga metode tersebut adalah metode kontinental, metode inggris dan metode botol. Dalam metode pertama, zat pengemulsi dicampur dengan minyak sebelum penambahan air. Metode kedua, zat pengemulsi ditambahkan ke air (di mana zat pengemulsi tersebut larut) agar membentuk mucilage, kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Metode botol digunakan untuk minyak-minyak menguap dan minyak-minyak yang kurang kental dan merupakan variasi dari metode pertama dan kedua (Ansel, 2005).

#### **1. Metode Kontinental**

Metode ini di kenal sebagai metode 4:2:1 karena tiap 4 bagian minyak, 2 bagian air dan 1 bagian pengemulsi, misalkan 40 ml minyak, 20 ml air dan 10 ml pengemulsi.

#### **2. Metode Inggris**

Sama halnya pada metode kontinental tapi urutan perbandingan bahan-bahannya berbeda dan urutan pencampurannya yang berbeda.

### 3. Metode Botol

Metode ini digunakan untuk bahan-bahan dari minyak menguap. Dimana pengerjaannya dilakukan dengan menggunakan wadah tertutup sebagai media pencampuran bahan-bahan.

## *H. Evaluasi Kestabilan Emulsi*

Sesudah penyimpanan, kestabilan emulsi dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Bentuk ketidakstabilan emulsi selama penyimpanan ditunjukkan dengan terjadinya kriming, perubahan viskositas, perubahan ukuran tetes terdispersi serta inverse fase (Lahman, 1994).

### 1. Kriming

Kriming adalah naik atau turunnya tetes-tetes terdispersi membentuk suatu lapisan pada permukaan atau dasar dari suatu emulsi. Kriming terjadi karena pengaruh gravitasi bumi dan naik atau turunnya tetesan tergantung pada rapat jenis kedua fase. Bila kriming terjadi tanpa penggabungan, maka emulsi dapat diemulsikan kembali dengan penggocokan.

### 2. Viskositas

Persamaan stokes juga menunjukkan bahwa kecepatan kriming berbanding terbalik dengan viskositas. Viskositas emulsi merupakan kriteria yang penting untuk mempelajari kestabilan emulsi dan tidak berhubungan dengan viskositas absolut tetapi dengan perubahan viskositas pada berbagai periode waktu. Tetesan-tetesan pada emulsi yang dibuat bergabung dengan segera dan menunjukkan peningkatan viskositas.

Setelah perubahan ini kebanyakan emulsi menunjukkan perubahan viskositas yang berhubungan dengan waktu. Jika viskositas tidak berubah dengan waktu diterima, emulsi dianggap ideal meskipun kebanyakan sistem masih dapat diterima kestabilannya bila menunjukkan sedikit kenaikan viskositas dalam waktu 400 hari. Kebanyakan emulsi menjadi encer pada suhu tinggi dan mengental bila ditempatkan pada suhu kamar.

### **3. Perubahan Ukuran Tetes Terdispersi**

Perubahan rata-rata ukuran tetes terdispersi atau distribusi ukuran tetes terdispersi merupakan parameter yang penting untuk mengevaluasi suatu emulsi. Analisis ukuran tetes terdispersi dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satu adalah pengukuran diameter tetes terdispersi dengan mikroskop yang memberikan nilai rata-rata pada jumlah tetes untuk setiap ukuran.

### **4. Inverse fase**

Emulsi dikatakan membalik ketika perubahan emulsi dari M/A ke A/M atau sebaliknya. Inverse kadang-kadang terjadi dengan penambahan elektrolit atau dengan mengubah rasio volume. Inverse dapat dilihat ketika emulsi disiapkan dengan pemanasan dan pencampuran dua fase kemudian didinginkan. Hal ini terjadi kira-kira karena adanya daya larut bahan pengemulsi tergantung pada perubahan temperatur.

#### ***1. Kondisi Penyimpanan Yang Dipercepat***

Salah satu cara evaluasi kestabilan adalah dengan penyimpanan selama beberapa periode waktu pada temperatur yang lebih tinggi dari normal. Tetapi

cara ini khususnya berguna untuk mengevaluasi “shelf life” emulsi dengan siklus antara dua suhu (Gennaro, 1990).

Didalam laboratorium siklus suhu 5° C dan 40° C dalam 24 jam digunakan selama 24 siklus. Sedangkan siklus lainnya 5° C dan 35° C dalam 12 jam digunakan selama 10 siklus (Banker, 1979).

Efek normal penyimpanan suatu emulsi pada suhu yang lebih tinggi biasanya adalah mempercepat koalesensi atau terjadinya kriming dan hal ini biasanya diikuti dengan perubahan kekentalan. Kebanyakan emulsi menjadi lebih encer pada suhu tinggi dan menjadi lebih kental bila dibiarkan mencapai suhu kamar. Pembekuan dapat merusak emulsi dari pada pemanasan, karena kelarutan emulgator baik dalam fase air maupun fase minyak lebih sensitif pada pembekuan dari pada pemanasan (Gennaro, 1990).

## *J. Uraian Antimikroba*

### **1. Pengertian Antimikroba**

Obat- obatan atau bahan- bahan yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotika, antiseptika, disinfektasia dan preservative.

Obat- obatan yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan maupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik mikroorganisme penyebab penyakit tetapi tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes (Djide, M, N, Sartini 2008 : 399).

## **2. Sifat Antimikroba**

### **a. Bakteriostatik**

Zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri). Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi bermultiplikasi dan berkembang biak.

### **b. Bakteriosida**

Zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak (Djide, M, N, Sartini 2008 : 399).

## **3. Prinsip Kerja Antimikroba**

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obat lebih toksik terhadap mikroorganismenya disbanding pada sel hospes. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat pada reaksi biokimia yang penting pada sel parasit lebih unggul dari pada pengaruhnya hospes. Disamping itu struktur sel mikroorganisme berbeda engan struktur sel manusia (Djide, M, N, Sartini 2008 : 340).

## **4. Mekanisme Antimikroba**

### **a. Mengganggu Metabolisme Sel Mikroba**

Pada umumnya bakteri membutuhkan para amino benzoic acid (PABA) untuk mensintesis purin dan pirimidin, bila asam folat tidak

ada, sel- sel tidak dapat tumbuh dan membelah (Mycek. 2001: 284-383).

Antimikroba bekerja dengan cara memblok terhadap metabolik spesifik mikroba, seperti sulfonilamida menghambat pertumbuhan sel dengan menghambat sintesis asam folat, para amino benzoic acid (PABA), dan bekerja secara kompetitif untuk enzim-enzim yang langsung mempersatukan PABA, dan piridin menjadi asam dihidraproad (Djide, M, N, Sartini 2008 : 341).

b. Penghambatan dinding sel

Ada antibiotik yang merusak dinding sel mikroba dengan menghambat sintesis enzim, sehingga menyebabkan hilangnya viabilitas dan sering menyebabkan sel lisis. Antibiotik ini menghambat sintesis dinding sel terutama dengan mengganggu sintesis peptidoglikan (Suwandi : 1992)

Dinding sel bakteri menunjukkan bentuk karakteristik dan berfungsi melindungi bahan dalam sel terhadap perubahan tekanan osmotik dan kondisi lingkungan lainnya. Di dalam sel terdapat sitoplasma yang merupakan tempat berlangsungnya proses biokimia sel (Suwandi : 1992, Mycek. 2001: 284).

c. Penghambatan Terhadap Fungsi Membran Sel

Di bawah dinding sel bakteri adalah lapisan membran sel lipoprotein yang dapat disamakan dengan membrane sel pada manusia. Membran ini mempunyai sifat permeabilitas selektif dan berfungsi

mengontrol keluar masuknya substansi dari luar dan ke dalam sel, serta memelihara tekanan osmotik internal dan ekskresi.

d. Penghambatan Terhadap Sintesis Protein

Hidupnya suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul dalam keadaan alamiah. Suatu kondisi atau substansi mengubah keadaan ini yaitu mendenaturasi protein dengan merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi atau konsentrasi beberapa zat dapat mengakibatkan koagulasi komponen-komponen seluler yang vital ini.

Antimikroba mempunyai fungsi ribosom pada mikroorganisme yang menyebabkan sintesis protein terlambat. Dimana dapat berikatan dengan ribosom 30S yang dapat menyebabkan akumulasi sintesis protein awal yang kompleks, sehingga salah dalam menerjemahkan tanda RNA dan menghasilkan polipeptida yang abnormal. Selain itu juga dapat berikatan dengan ribosom 50S yang dapat menghambat ikatan asam amino baru pada rantai peptide yang memanjang (Ganiswara 1995: 572- 573).

e. Penghambatan Terhadap Sintesis Asam Nukleat

Asam nukleat merupakan bagian yang sangat vital bagi perkembangbiakan sel, untuk pertumbuhannya kebanyakan sel bergantung pada sintesis DNA, sedangkan RNA diperlukan untuk transkripsi dan penentuan informasi sintesis protein dan enzim (Suwandi: 1992).

Begitu pentingnya DNA dan RNA dalam proses kehidupan sel. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel. Dalam hal ini mempengaruhi metabolisme asam nukleat (Pleazer. Michael J dan Chan. E. C. S 2008: 458).

## 5. Metode Uji Antimikroba

Pengujian mikrobiologi memanfaatkan mikroorganisme sebagai indikator pengujian. Dalam hal ini mikroorganisme digunakan sebagai penentu konsentrasi komponen tertentu pada campuran kompleks kimia, untuk mendiagnosis penyakit tertentu, serta untuk menguji bahan kimia guna menentukan potensi mutagenik tertentu suatu bahan. Macam-macam uji yang dapat dilakukan adalah uji antimikroba, bioautografi, uji vitamin dan asam amino, uji Ames, dan penggunaan mikroorganisme sebagai model metabolisme obat mamalia (Pratiwi, 2008).

Konsentrasi minimum penghambatan atau lebih dikenal dengan MIC (Minimum Inhibitory Concentration) adalah konsentrasi terendah dari antibiotika atau antimikrobia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Nilai MIC adalah spesifik untuk tiap-tiap kombinasi dari antibiotika dan mikroba (Greenwood, 1995).

MIC dari sebuah antibiotika terhadap mikroba digunakan untuk mengetahui sensitivitas dari mikroba terhadap antibiotika. Nilai MIC berlawanan dengan sensitivitas mikroba yang



diuji. Semakin rendah nilai MIC dari sebuah antibiotika ,sensitivitas dari bakteri akan semakin besar . MIC dari sebuah antibiotika terhadap spesies mikroba adalah rata-rata MIC terhadap seluruh strain dari spesies tersebut. Strain dari beberapa spesies mikroba adalah sangat berbeda dalam hal sensitivitasnya (Greenwood, 1995).

Metode uji antimikrobal yang sering digunakan adalah metode difusi lempeng agar. Uji ini dilakukan pada permukaan medium padat. Untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Piringan yang berisi antimikroba diletakkan pada media ,agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi kedalam media agar tersebut. Mikroba ditumbuhkan pada permukaan medium dan kertas saring yang berbentuk cakram yang telah mengandung mikroba. Setelah inkubasi diameter zona penghambatan diukur. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media agar. Diameter zona penghambatan merupakan pengukuran MIC secara tidak langsung dari antibiotika terhadap mikroba. Sensitivitas klinik dari mikroba kemudian ditentukan dari tabel klasifikasi (Greenwood, 1995).

**Tabel 1. Klasifikasi respon hambatan pertumbuhan bakteri**  
(Greenwood, 1995)

Dimater Zona Terang	Respon Hambatan Pertumbuhan
...> 20 mm	Kuat
16-20 mm	Sedang

10-15 mm	Lemah
...<>	Tidak Ada

Metode uji antibakterial dan antimikrobial yang lain adalah dengan teknik Tube Dillution Test. Fungsinya untyuk mengetahui hasil MIC secara langsung. Metode yang lain adalah metode E-test, yang merupakan metode uji difusi agar yang dengan mudah dan cepat memperoleh hasil MIC (Greenwood, 1995).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ukuran zona penghambatan dan harus dikontrol adalah :

- a. Konsentrasi mikroba pada ppermukaan medium. Semakin tinggi konsentrasi mikroba maka zona pengahambatan akan semakin kecil.
- b. Kedalaman medium cawan petri.Semakin tebal medium pada cawan petri maka zona penghambatan akan semakin kecil.
- c. Nilai pH dari medium. Beberapa antibiotika bekerja dengan baik pada kondisi asam dann beberapa basa kondisi alkali/basa.
- d. Kondisi aerob/anaerob. Beberapa antibakterial kerja terbaiknya pada kondisi aerob dan yang lainnya pada kondisi aerob (Greenwood, 1995).

## K. Uraian Mikroba Uji

### 1. *Staphylococcus aureus*

#### a. Klasifikasi

Domain	: Bacteria
Phylum	: Firmicutes
Class	: Bacilli
Ordo	: Bacillales
Familia	: <i>Staphylococcaceae</i>
Genus	: <i>Staphylococcus</i>
Spesies	: <i>Staphylococcus aureus</i> (Garrity. G. M., Bell. J A., and Lilburn, 2004 : 24-187).

#### b. Sifat dan morfologi

*Staphylococcus aureus* adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5-1,5  $\mu\text{m}$ , terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Non motil, Tidak diketahui adanya stadium istirahat. Dinding sel mengandung dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam teikoat yang berkaitan dengannya. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi dan fermentatif. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35-40<sup>0</sup>C. Terutama berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas. Kisaran

inangnya luas, dan banyak galur merupakan patogen potensial (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 954-955).

#### **L. Uraian Bahan Tambahan**

1. Asam stearat (Kibbe, 2000)

Rumus molekul:  $C_{18}H_{36}O_2$

Asam stearat adalah campuran asam organik padat yang diperoleh dari lemak. Merupakan zat padat, keras mengkilat, menunjukkan susunan hablur, putih atau kuning pucat, mirip lemak lilin, praktis tidak larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol (95%)P, dalam 2 bagian kloroform P, suhu lebur tidak kurang dari 54°C. Asam stearat merupakan bahan pengemulsi. Digunakan luas secara oral dan topikal dalam bidang farmasi. Untuk penggunaan topikal asam stearat digunakan sebagai bahan pengemulsi. Digunakan umumnya Karena tidak toksik dan tidak mengiritasi.

2. Setil alkohol (Kibbe, 2000)

Rumus molekul:  $C_{16}H_{34}O$

Setil alkohol merupakan lilin, putih, granul atau bersegi. Memiliki bau dan rasa yang khas setil alkohol yang digunakan dalam sediaan farmasi merupakan alkohol alifatik padat pada umumnya. Setil alkohol umumnya digunakan dalam sediaan farmasi dan kosmetik, seperti emulsi, krim dan salep. Dalam emulsi M/A setil alkohol dapat meningkatkan stabilitas dari emulsi. Memiliki titik lebur 45°C-52°C.

3. Paraffin cair (Kibbe, 2000)

Cairan kental transparan, tidak berwarna, bebas dari fluoresensi pada cahaya matahari. Praktis tidak berasa dan tidak berbau ketika dingin dan mempunyai bau lemah ketika dipanaskan. Praktis tidak larut dalam etanol (95%), gliserin dan air. Larut dalam aseton benzene, kloroform, karbon disulfid, eter dan eter minyak tanah. Berfungsi sebagai emollient, pelarut.

4. Adeps lanae (Kibbe, 2000)

Cairan jernih, tidak berasa, tidak berwarna. Praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, mudah larut dalam kloroform dan eter. Berfungsi sebagai peningkat konsistensi.

5. Gliserin (Kibbe, 2000. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1979)

Rumus molekul:  $C_3H_8O_3$

Cairan seperti sirup jernih berwarna, tidak berbau, manis diikuti rasa hangat, higroskopik. Dapat bercampur dengan air dan dengan etanol (95%)P, praktis tidak larut dalam kloroform P, dalam eter P dan dalam minyak lemak. Berfungsi sebagai humektan.

6. Tween 60 (Kibbe, 2000)

Rumus molekul:  $C_{64}H_{126}O_{26}$

Cairan seperti minyak atau semigel, warna kuning hingga jingga, semigel kuning coklat menjadi cairan jernih diatas  $25^{\circ}C$ , mempunyai bau yang khas. Tween 60 dapat bercampur dengan air, alkohol dan etil asetat. Praktis tidak larut dalam paraffin cair dan minyak. Digunakan sebagai bahan pengemulsi nonionik tipe M/A pada konsentrasi 1-15%.

Sedangkan dalam kombinasi 1-10% , memiliki HLB butuh yaitu 14,9 .  
Berfungsi sebagai emulgator untuk fase air.

7. Span 60 (Kibbe, 2000)

Rumus molekul :  $C_7H_{13}O_3$

Berupa butir-butir warna krem hingga coklat. Span 60 larut dalam minyak tumbuhan atau minyak mineral, tidak larut dalam air, alkohol dan propilenglikol. Merupakan bahan pengemulsi nonionik yang dapat dikombinasikan dengan bahan pengemulsi lain dengan konsentrasi 1-10%. Nilai HLB butuhnya adalah 4,7. Span 60 melebur pada suhu 50-53°C. Berfungsi sebagai emulgator fase minyak.

8. Metil paraben (Kibbe, 2000)

Rumus molekul:  $C_8H_8O_3$

Merupakan serbuk putih, berbau, serbuk higroskopik, mudah larut dalam air. Digunakan sebagai pengawet pada kosmetik, makanan dan sediaan farmasetik. Dapat digunakan sendiri, kombinasi dengan pengawet paraben lain atau dengan antimikroba lainnya. Lebih efektif terhadap gram negatif dari pada gram positif. Aktif pada pH antara 4-8. Efektifitas pengawetnya meningkat dengan peningkatan pH. Mempunyai titik lebur 125°- 128° C.

9. Propil paraben (Kibbe, 2000 : 450)

Rumus molekul:  $C_{10}H_{12}O_3$

Merupakan kristal putih, berbau dan berasa. Aktif pada range pH 4-8. Lebih efektif pada gram positif di banding gram negatif. Dapat digunakan

sendiri atau kombinasi dengan pengawet paraben lainnya. Memiliki titik lebur 95-98°C.

#### M. Tinjauan Islam Tentang Penelitian Tanaman Obat

Istilah yang populer tentang obat dalam berbagai teks keagamaan ialah *dawa'* (bentuk tunggal) atau *adwiyah* (bentuk jamak). Sedangkan kata *da'* yang seakar dengan istilah diatas adalah penyakit

Terkait dengan istilah diatas, secara umum dapat ditemukan dallnya pada hadist Nabi yang berbicara tentang penyakit dan obat sebagai berikut :

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya :

Dari jabir, dan Rasulullah saw berkata: Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila didapatkan obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit maka penyakit itu akan hilang seizing ALLAH azza wa jallla." (HR. Muslim).

Meskipun demikian buakan berarti obat- oabt itu yang menyembuhkan melainkan atas izin Allah. Disinilah letak perbedaan antara ahli pengobatan sekuler dengan yang beragama. Setiap pengobatan menghubungkan dengan ajaran agama yakni islam.

Sekelompok orang yang menjadi tenaga ahli pengobatan sudah ada semenjak masa kenabian, juga sebelum itu dan sesudahnya. Salah satu bidang pengobatan yang sudah ada sejak itu adalah ilmu obat alam atau disebut juga dengan farmakognosi. Adapun yang dimaksud dengan farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat/bahan obat yang berasal dari alam baik

dari tumbuhan, hewan maupun mineral. (Abd.Rahim, Tadjuddin Naid, Kamaluddin Abu Nawas 2007, 1)

Para ahli dalam bidang ini mengetahui formula obat-obatan, karakteristik dan cara penggunaannya. Diiringi dengan keyakinan mereka bahwa obat itu hanya penyebab perantara kesembuhan saja. Dan Allah lah yang menjadikan penyebab itu semua. Oleh karena itu, hukumnya boleh mempelajari ilmu pengobatan ini dan berobatlah dengannya. (Ar-Rumaikhon 2008, 99-100)

Firman Allah SWT yang terkait dengan pengobatan tradisional dapat dilihat dalam QS.al-Nahl (16) ; 69

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ  
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya :

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu), dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (Departemen Agama RI 1997, 412).

Dalam Al- Qur'an Allah banyak menyebutkan tentang tanaman-tanaman yang ada dimuka bumi ini. Diantaranya ayat yang dicantumkan tentang tanama- tanaman yang terdapat pada QS.al-A'raf (7) ; 54



إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ  
 عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ  
 مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.

Munculnya berbagai macam penyakit pada zaman modern ini menuuntut manusia untuk mencari berbagai metode pengobatan. Salah satu metode pengobatan yang belakangan ini sering dilakukan adalah pengobatan dengan menggunakan tumbuh- tumbuhan sebagai obatnya. Sejak dahulu manusia telah menemukan tumbuhan dan rumput- rumputan sebagai bahan obat. Sehingga ia, pun mengetahui bahwa tumbuhan dan rumput- rumputan itu memiliki keistimewaan sebagai bahan pengobatan. Allah SWT. Berfirman dalam Q. S. Lukaman / 31 : 10

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَنَهَا ۗ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ  
 فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala

macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Kata *karim* digunakan untuk menyifati segala sesuatu yang baik sesuai objeknya. Pasangan tumbuhan yang berbeda jenisnya yang *karim* adalah yang tumbuh subur dan menghasilkan apa yang diharapkan dari penanamannya (shihab 2002 jilid 11, 119)

Saat ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi satu bahan obat, mengingat bahwa Negara kita kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasanya dikenal dengan obat tradisional (Abdushshamad 2002, 141).

Relevansinya dengan itu, didalam Al- Qur'an Allah SWT Q.S. Qaaf/ 50: 7 yang berbunyi :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Terjemahnya :

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan dibumi itu berbagai macam tumbuh- tumbuhan yang baik ? ( Q.S.Qaaf/ 50: 7 ).

Maksud ayat tersebut adalah menghendaki agar manusia senantiasa bersyukur atas pemberian Allah melalui tumbuh- tumbuhan yang memiliki manfaat untuk kepentingan manusia, tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah SWT.

*Dan kami tumbuhkan di bumi itu berbagai maca tumbuh- tumbuhan yang baik.* Dipahami oleh sebagian ulama dalam arti bahwa Allah SWT. Menumbuhkembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu. Sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga, Allah SWT. Menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya ( shihab 2002 jilid 7, 119 )

Ketika Allah berkehendak berlaku lembut pada hambanya dengan menciptakan penyakit dan obatnya, pada saat yang sama, Allah menciptakan tumbuhan dan rumput- rumputan yang mengandung keistimewaan yang dapat berfungsi sebagai pencegahan dan penyembuhan penyakit manusia. Artinya, Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa makna dan arti. Akan tetapi, Allah menciptakan setiap sesuatu dengan hikmah- hikmah tertentu ( Mahmud 2007, 65- 75 ).

Sebagian orang yang menganggap bahwa agama tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan manusia. Anggapan semacam ini didasari oleh pandangan bahwa agama hanya memperhatikan aspek-aspek rohania belaka tanpa mengindahkan aspek jasmania. Agama hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat ukhrawi dan lalai terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama islam. Sebab pada kenyataannya islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan yaitu kebaikan duniawi dan ukhrawi. Jadi dalam hal ini islam juga sangat memperhatikan tentang kesehatan dan pengobatan. ( Qaradhawi 2001, 157 ).

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخارى)

Artinya :

Dari Abu Hurairah Ra. Dari Nabi Saw. Bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Dia juga yang menurunkan obatnya.”(HR. Bukhari, VII, 12).

Islam sangat menghargai bentuk- bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui : penelitian, dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya (Qaradhawi 2001, 159)

Setiap apa yang diciptakan oleh-Nya kemudian diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini bukan berarti bahwa manusia boleh dengan seenaknya atau semaunya menggunakan apa yang telah diciptakan-Nya itu melainkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Hal ini dapat dilihat dari keanekaan fungsi dan manfaat segala tumbuhan sebagai ciptaan tuhan, yang di jealskan dalam Al- Quran QS. An-Naml (27): 60

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ  
حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَعْزِمْ اللَّهُ بِلَ  
هُمَّ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya :

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun- kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali- kali tidak mampu menumbuhkan pohon- pohonnya ? apakah disamping ALLAH ada Tuhan (yang lain) ? bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang- orang yang menyimpang (dari kebenaran) (QS. An- Namal/ 27 : 60).

Maksud ayat tersebut adalah sesungguhnya kekuasaan Allah itu mampu menumbuhkan pohon- pohon atau tanaman di bumi dengan bantuan sinar matahari dan air hujan dari langit seperti tumbuhan kunyit yang telah tumbuh di bumi ini dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Dalam Al- Qur'an Allah juga menjelaskan tanaman yang berbeda- beda yang terdapat pada Q.S Al- Fathir/ 35: 27- 28

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya :

Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat ( Q. S Al- fathir/ 35: 27 )

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ

مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya :

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-

hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q. S Al- fathir/ 35: 28)

Yang di maksud dengan *ulama* dalam ayat diatas ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa berbagai jenis buah- buahan dan perbedaan warna pegunungan itu berasal dari suatu unsur yang sama yakni buah- buahan berasal dari air dan gunung- gunung yang berasal dari magma, ayat ini juga menjelaskan perbedaan bentuk dan warna makhluk hidup. Ayat diatas menyatakan diantara manusia, binatang- binatang melata dan binatang ternak yakni unta, sapi dan domba bermacam- macam bentuk, ukuran, jenis dan warnanya seperti itu pula. Yakni seperti keragaman tumbuhan dan gunung- gunung. Sebagian dari penyebab perbedaan itu dapat ditangkap maknanya dan karena itu sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba- hambanya hanyalah *ulama*. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (Shihab 2002, 5: 116- 11)

Karena dengan adanya tanaman yang beredar menunjukkan adanya fungsi yang berbeda pula. Salah satu bedanya adalah pengobatan. Salah satu contohnya adalah tanaman kunyit yang biasanya digunakan dimasyarakat sebagai pelengkap bumbu masakan namun dapat pula digunakan sebagai obat antibakteri, khususnya bakteri *staphylococcus aureus* yang menyebabkan gatal- gatal. Seperti yang terdapat dalam QS.An-Nahl (16): 11 yang berbunyi:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam- tanaman: zaitu, korma, anggur dan segala macam buah- buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q. S An- nahl/ 16 : 11)

Q. S An- nahl/ 16 : 11 diatas ditutup dengan kalimat “ bagi orang- orang yang berfikir “. Dengan kalimat tersebut dapat dipahami sebagai isyarat Allah kepada umatnya yang berilmu untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh- tumbuhan, hewan maupun mineral, seperti dari tumbuhan kunyit yang dibuat dalam sediaan krim.

Disinilah Allah SWT memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta Alam dan seluruh isinya sehingga bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan pengobatan dan rekayasa genetik belum mampu melewati ketentuan-ketentuan Sang Pencipta sebab Allah SWT yang mengetahui manusia dan apa yang ada dilangit dan di bumi dengan sedetail-detailnya, sehingga dengan ayat ini sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan agar senantiasa bersyukur dan tidak mengkufurinya serta mengharap ridho-Nya semoga apa yang telah diusahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta sebab segala sesuatunya apa yang ada akan kembali kepada-Nya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Alat dan bahan**

##### **1. Alat Yang Digunakan**

Autoklaf (Memmert), bunzen, cawan petri, gelas Erlenmeyer (Iwaki pyrex), gelas ukur 100 ml (Iwaki pyrex), inkubator (Memmert), jangka sorong (vernier caliper), kertas saring, kompor gas (Rinnai), mikroskop, oven (Memmert), ose bulat, spoit (1ml, 5ml, 10ml), tabung reaksi (Iwaki pyrex), timbangan analitik (Adam AFA-210 LC), toples kaca, dan ose bulat.

##### **2. Bahan Yang Digunakan**

Adeps lanae, air suling, asam stearat, etanol 70%, rimpang kunyit (*Curcuma domesticate rhizoma*), gliserin, metil paraben, Nutrient Agar (NA), propil paraben, paraffin cair, span 60, cetil alkohol, tween 60,  $\alpha$ -tocoferol

#### **B. Posedur Kerja**

##### **1. Pengambilan Sampel**

Sampel rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) diperoleh di desa Sunggumanai Kec. Pattallassang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari dengan cara mengambil atau mencabut tanaman kunyit (*Curcuma domesticae. Val*) lalu



memilih rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) yang tidak rusak untuk dijadikan sampel.

## 2. Pengolahan sampel

Sampel rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) yang telah diambil dicuci bersih dengan air mengalir lalu ditiriskan. Rimpang kunyit yang sudah bersih disortasi basah dan ditimbang. Selanjutnya rimpang diiris tipis dengan ketebalan berkisar 1-3 mm, lalu dikeringkan selama 4 hari dalam Oven dengan suhu  $\pm 40^{\circ}\text{C}$ . Simplisia yang telah kering diblender menjadi serbuk kasar lalu disimpan di dalam wadah plastik bertutup.

## 3. Ekstraksi Sampel (Andayani, 2008)

Serbuk rimpang kunyit (*Curucuma domesticae rhizoma*) ditimbang sebanyak 600 g lalu dibasahi dengan 300 ml etanol 70%, kemudian dimaserasi berulang dengan pelarut etanol 70% selama 3x24 jam. Hasil maserasi kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring lalu ketiga filtrat hasil maserasi digabungkan. Filtrat yang diperoleh dienaptuangkan semalam lalu dipekatkan sehingga diperoleh ekstrak yang kental.

## 4. Sterilisasi alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan sabun, wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi

dan erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca dsterilkan di oven pada suhu  $180^{\circ}\text{C}$  selama 2 jam dan alat plastic yang tidak tahan pemanasan dsterilkan dalam autoklaf pada suhu  $121^{\circ}\text{C}$  selama 15 menit, sedangkan jarum ose dsterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

## 5. Pembuatan medium (Dwyana, 2006 )

### a) Medium Nutrient Agar (NA)

Ekstrak daging	3 gram
Agar	15 gram
Pepton	5 gram
Air suling	1000 ml

#### Cara pembuatan:

Semua bahan dimasukkan kedalam gelas erlenmenyer, kemudian dilarutkan dengan air suling hingga 800 ml, lalu dipanaskan sampai larut. Kemudian dicukupkan dengan air suling hingga 1000 ml, kemudian dsterilkan dalam autoklaf pada suhu  $121^{\circ}\text{C}$  selama 15 menit.

## 6. Penyiapan Bakteri Uji

Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Staphylococcus aureus*. Bakteri yang berasal dari kultur koleksi Laboratorium Mikrobiologi UIN Alauddin Makassar yang diremajakan dalam Medium Glukosa Nutrient Broth (GNB) dan diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu  $37^{\circ}\text{C}$ .

## 7. Pembuatan Krim Ekstrak Etanol Rimpang Kunyit (*Curcuma domesticate rhizoma*)

### a. Rancangan Formula krim ekstrak rimpang kunyit (*Curcuma domesticate. rhizoma*)

No	Nama Bahan	Formula krim (%)		
		I	II	III
1	Ekstrak etanol rimpang kunyit	9	9	9
2	Setil alcohol	3	3	3
3	Asam stearat	5	5	5
4	Gliserin	15	15	15
5	Parafin	5	5	5
6	Adeps lanae	5	5	5
7	Span 60	2	3	4
8	Tween 60	2	3	4
9	Metil paraben	0,1	0,1	0,1
10	Propil paraben	0,05	0,05	0,05
11	Vitamin E	0,05	0,05	0,05
12	Air suling	57,8	57,6	55,8

### b. Cara pembuatan

Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Fase minyak dibuat dengan melebur campuran asam stearat, setil alkohol, adeps lanae, paraffin cair, span 60. Kemudian ditambahkan propil paraben dan vitamin E, kemudian suhu dipertahankan pada 70° C termotet di waterbod. Fase air dibuat dengan melarutkan metil paraben dalam sebagian volume air, pada suhu 90° C dan ditambahkan gliserin, kemudian ditambahkan tween 60 dan dipertahankan pada suhu 70°C termotet di waterbod. Krim dibuat dengan mencampurkan fase minyak ke dalam fase air sambil diaduk aduk dengan kencang selama 3 menit. Kemudian ditambahkan ekstrak etanol rimpang kunyit ( *Curcuma*

*domesticae rhizoma* ) diaduk hingga homogen lalu ditambahkan sebagian volume air, dan diaduk hingga homogen. Kemudian didiamkan selama 20 detik, lalu diaduk kembali sampai terbentuk krim yang homogen.

## 8. Pemeriksaan Hasil Sediaan (Lachman; 1994)

### a. Pengamatan Organoleptis

Pengamatan organoleptis dilakukan terhadap sediaan yang telah dibuat meliputi pengamatan perubahan warna, bau, dan bentuk. Pengamatan ini dilakukan sebelum dan sesudah emulsi diberi kondisi penyimpanan dipercepat

### b. Evaluasi Tipe Emulsi (Martin : 528-529)

#### 1. Metode Pengenceran

Emulsi yang telah dibuat dimasukkan kedalam cawan, kemudian diencerkan dengan ditambahkan air. Jika emulsi dapat diencerkan maka emulsi adalah tipe minyak dalam air

#### 2. Metode Hantaran Listrik

Emulsi yang telah dibuat, dimasukkan dalam gelas kimia, kemudian dimasukkan dua kawat yang dihubungkan dengan lampu dan arus listrik, maka hanya pada emulsi tipe M/A yang akan menghasilkan arus listrik (lampu menyala). Dan air sebagai fase luar dapat menghantarkan arus listrik. (Voigth, 1995 : 443)

### c. Evaluasi Kestabilan Fisik Krim

Evaluasi kestabilan fisik krim dilakukan sebagai berikut:

### 1. Pengukuran Volume Kriming

Krim sebanyak 25 ml, dimasukkan dalam gelas ukur kemudian diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu penyimpanan pada suhu 5° C dan 37°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengamatan volume kriming dihitung dalam % dengan rumus :

$$\text{Volume kriming} : \frac{H_u}{H_o} \times 100 \%$$

Dimana :  $H_u$  = Volume emulsi yang kriming

$H_o$  = Volume total krim

### 2. Pengukuran kekentalan

Pengukuran kekentalan dilakukan terhadap sediaan krim yang telah dibuat sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu pada suhu 5°C dan 35°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengukuran kekentalan dilakukan dengan menggunakan viscometer.

### 3. Pengukuran Tetes Dispersi

Krim dimasukkan kedalam vial kemudian dilakukan pengukuran tetes terdispersi sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat yaitu pada suhu 5°C dan 35°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengamatan ukuran tetes dispersi dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Dengan meneteskan krim pada objek gelas kemudian ditutup dengan deck gelas dan

setelah diperoleh pembesaran yang sesuai maka diamati rentang ukuran partikel tetes terdispersinya.

#### 4. Inverse Fase

Sediaan yang telah jadi diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu penyimpanan pada suhu 5°C dan 35°C masing –masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus, kemudian diuji kembali tipe emulsinya dengan metode pengenceran dan metode hantaran listrik.

### 9. Pengujian efektivitas Sediaan Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*

Dibuat medium NA steril kemudian didinginkan hingga suhu 40-45°C. Sebanyak 10 ml medium NA yang telah dicampur dengan 0,02ml suspensi biakan bakteri dituang kedalam cawan petri yang berisi medium NA tadi, dimana pipet plastik disterilkan terlebih dahulu dengan disemprotkan alkohol dan disemprotkan atau dituangkann sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) secara aseptis. Kemudian cawan petri tersebut ditutup dan diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C, selanjutnya diinkubasi lagi selam 2 x 24 jam, kemudian diukur diameter zona hambatanya.

### 10. Pengumpulan dan Analisa Data

Data hasil pengamatan dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode statistik Rancangan Acak Kelompok (RAK).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

Hasil pengamatan organoleptis, penentuan tipe emulsi, pengukuran volume kriming, pengukuran viskositas, pengukuran tetes terdispersi inverse fase, dan uji efektivitas terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* pada krim ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) yang telah dibuat dan memberikan hasil sebagai berikut :

##### **1. Pengamatan Organoleptis**

Pengamatan organoleptis terhadap sediaan krim ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) yang menggunakan emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) dengan konsentrasi 2%, 3%, dan 4%, diperoleh bahwa pada sediaan krim tidak mengalami perubahan warna dan bau setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Warna sediaan tetap kuning kecoklatan dan berbau ekstrak.

##### **2. Penentuan Tipe Emulsi**

Pada pengujian tipe emulsi krim ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat dengan menggunakan metode uji pengenceran dengan air, memberikan hasil bahwa emulsi tetap homogen (tidak pecah) dan uji hantaran listrik memberikan hasil bahwa sediaan krim dapat menghantarkan arus listrik

yang ditandai dengan lampu menyala, menunjukkan tipe emulsi M/ A (minyak dalam air).

### 3. Evaluasi Kestabilan Fisik

#### a. Volume Kriming

Pada pengukuran volume kriming, untuk krim yang dibuat dengan menggunakan emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) pada konsentrasi 2% dan 3% setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat mengalami kriming, sedangkan pada konsentrasi 4% setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat tidak memperlihatkan adanya kriming. Hasil selengkapnya dapat dilihat gambar 11.

#### b. Viskositas Emulsi

Viskositas emulsi diukur dengan menggunakan Viscometer Brookfield dengan “spindel” no. 6. Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat, viskositas rata-rata dari masing – masing krim adalah krim I : 39, 7 poise, krim II : 57, 7 poise, dan krim III : 51, 7 poise, sedangkan viskositas rata-rata masing- masing krim setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat adalah krim I : 36, 7 poise, krim II : 50 poise, krim III : 61, 3 poise. Hasil dapat dilihat pada tabel 5.

#### c. Ukuran Tetes Terdispersi

Pada pengukuran tetes terdispersi, sebelum kondisi penyimpanan dipercepat diperoleh rata-rata ukuran tetes terdispersi masing- masing krim adalah krim I : 22, 57  $\mu\text{m}$ , krim II : 19, 93  $\mu\text{m}$ , dan krim III : 10, 69  $\mu\text{m}$ . Sedangkan, setelah diberi kondisi



penyimpanan dipercepat rata-rata ukuran tetes terdispersi masing-masing krim adalah, krim I : 25, 20  $\mu\text{m}$ , krim II : 23, 1, dan krim III : 12, 54  $\mu\text{m}$ . hasil dapat dilihat pada tabel 8.

d. Inversi fase

Pada pengujian tipe emulsi krim dengan menggunakan metode uji pengenceran dengan air dan uji hantaran listrik sebelum kondisi penyimpanan dipercepat menunjukkan tipe emulsi minyak dalam air (M/ A). Hal sama juga terjadi pada pengujian ulang tipe emulsi setelah krim diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu tipe minyak dalam air (M/ A). Hal ini berarti tidak terjadi invasi fase pada sediaan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.

**4. Pengukuran Daya Hambat Sediaan Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*.**

**Tabel 2. Diameter Zona Hambat Formula sebelum dan setelah penyimpanan.**

Formula	Diameter Zona Hambat (mm)	
	Sebelum Penyimpanan	Setelah Penyimpanan
Formula krim I	28,68	29,02
Kontrol Formula I	25,02	26,02
Formula krim II	31,68	31,35
Kontrol Formula II	25,02	26,02
Formula krim III	30,02	30,35
Kontrol Formula III	26,02	27,02

## **B. Pembahasan**

Ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) diformulasi menjadi sediaan krim antibakteri yang dikhususkan pada infeksi-infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus* menggunakan emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60). Tween dan Span merupakan surfaktan yang memiliki sifat relative hidrofil/ lipofil atau HLB, makin rendah nilai HLB suatu surfaktan maka akan makin lipofil surfaktan tersebut, sedangkan makin tinggi nilai HLB surfaktan akan makin hidrofil.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan senyawa yang berkhasiat pada rimpang kunyit dalam penelitian ini adalah ekstraksi (maserasi). Ekstraksi adalah proses pemindahan suatu sampel ke suatu pelarut dengan cara mengocok atau melarutkannya. Pemilihan metode ekstraksi dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengaturan bentuk sediaan, dosis/ takaran yang tepat mudah dalam penyimpanan, praktis dalam penyajian dan menjaga keawetan bahan tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan disimpan dalam bentuk mentah (Ibrahim, 2009)

Penggunaan emulgator nonionik gabungan tween 60 dan span 60 dengan HLB butuh 10, 2 dipilih dengan alasan emulgator gabungan dapat menghasilkan pengurangan tegangan antar muka yang lebih besar dibanding penggunaan emulgator tunggal sehingga emulsi yang dibentuk akan lebih stabil dengan karakteristik hidrofilik dan lipofilik yang seimbang, sehingga molekul surfaktan cenderung lebih senang berada pada antar muka (Kamarza mulia, 2010). Disamping itu juga emulgator ini memiliki tingkat iritasi yang

rendah serta tidak sensitif dengan asam, alkali dan garam (Jellineck, 1986 : 59). Penggunaan emulgator ini dipertimbangkan mengingat belum diketahui secara pasti komponen kimia atau senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) yang mungkin dapat berpengaruh jika digunakan emulgator golongan ionik (anionik/kationik).

Hasil pengamatan organoleptis terhadap krim yang mengandung ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) dengan gabungan emulgator nonionik Tween 60 dan Span 60 dari konsentrasi 2%, 3%, dan 4%, tidak menunjukkan perubahan warna dan bau setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Hal ini berarti tidak terjadi reaksi kimia antara ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) dengan bahan pengemulsi nonionik terhadap perubahan organoleptis untuk ketiga krim yang dibuat, karena salah satu tanda terjadinya reaksi kimia terhadap bahan-bahan dalam campuran adalah dengan pembentukan warna. Hal ini kemungkinan disebabkan karena dasar emulgator nonionik bersifat netral terhadap pengaruh kimia, tidak toksik dan mudah bercampur dengan bahan lain serta tidak menyebabkan terjadinya perubahan pH ( Voight, R, 1995 : 418).

Hasil pengujian tipe emulsi krim ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat memperlihatkan bahwa ketiga formula krim (kombinasi emulgator nonionik Tween 60 dan Span 60 dengan konsentrasi 2%, 3%, dan 4%), menghasilkan tipe emulsi minyak dalam air (M/ A). Hal ini disebabkan karena jumlah fase terdispersi (minyak/ lemak) yang digunakan dalam krim lebih

kecil dari fase pendispersi (fase air), sehingga fase minyak akan terdispersi merata kedalam fase air dan membentuk emulsi minyak dalam air dengan bantuan emulgator. Pada emulgator nonionik terlihat bahwa Hidrofilik Lipofilik Balance (HLB) kombinasi yang dibutuhkan adalah 10, 2 yang menurut pernyataan Daviss bahwa emulgator dengan nilai HLB lebih dari 7 akan terdistribusi dalam fase air dan membentuk emulsi tipe M/ A (Lieberman, HA, 1998 : 201).

Hasil pengamatan volume kriming menunjukkan terjadinya kriming pada krim I dan krim II, hal ini disebabkan karena dibandingkan krim III viskositas serta ukuran tetes terdispersi dalam krim I dan krim II sebelum kondisi penyimpanan dipercepat menunjukkan perbesaran ukuran setelah kondisi penyimpanan dipercepat, perbesaran ukuran tetes terdispersi akan meningkatkan laju kriming. Ukuran tetes terdispersi krim I dan krim II lebih besar dari pada krim III, hal ini kemungkinan disebabkan karena surfaktan tidak cukup untuk membentuk tetes terdispersi yang lebih kecil, tidak mampu melindungi tetes terdispersi tersebut dari penyebabnya (koalesensi), kekentalan fase luar tidak cukup untuk menahan perpindahan keatas tetes terdispersi. Kriming adalah perpindahan keatas dari tetesan relatif zat terdispersi ke fase kontinyu. Ketika emulsi mengalami kriming, ia berpisah dalam 2 atau lebih lapisan yang viskositasnya berbeda tetapi dengan pengocokan lapisan menjadi terdispersi dan emulsi menjadi sediaan yang homogen lagi. Kriming bukanlah tanda pecahnya emulsi tetapi secara estestika

tidak menarik untuk dipandang dan tidak elegan sebagai kosmetika (Scovilles, 1995 : 314).

Menurut persamaan stokes laju pemisahan dari fase terdispersi dari suatu emulsi dapat dihubungkan dengan faktor- faktor seperti, ukuran partikel dari fase terdispersi, perbedaan dalam kerapatan antarfase, dan viskositas fase luar. Analisis persamaan menunjukkan bahwa jika fase terdispersi kurang rapat dibandingkan dengan fase kontinyu yang merupakan hal umum dalam emulsi M/ A, kecepatan sedimentasi negatif, yakni dihasilkannya creaming yang mengarah keatas. Jika fase dalam lebih berat dari fase luar, bola- bola akan mengendap. Fenomena ini sering terdapat pada emulsi tipe air dalam minyak (A/M) dimana kriming mengarah kebawah. Makin besar perbedaan kerapatan dari kedua fase tersebut, makin besar bola- bola minyak dan makin menurun viskositas dari fase luar sehingga laju kriming makin besar. Faktor – faktor dalam persamaan stoke's dapat diubah untuk mengurangi laju kriming dalam suatu emulsi. Viskositas dari fase luar dapat ditingkatkan tanpa melewati batas-batas konsistensi yang dapat diterima dengan menambahkan suatu zat pengental (Gennaro AR,1990 : 307).

Hasil pengukuran viskositas masing-masing krim sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat, menunjukkan adanya perubahan viskositas. Hal ini dapat dilihat pada histogram viskositas (gambar 2). Berdasarkan histogram tersebut terjadi penurunan viskositas pada kondisi penyimpanan dipercepat pada krim I dan krim II, sedangkan pada krim III menunjukkan adanya peningkatan viskositas setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Hal

ini mungkin disebabkan karena pengaruh perbedaan konsentrasi emulgator yang digunakan, dimana pada krim I digunakan konsentrasi 2% , krim II digunakan konsentrasi emulgator 3% dan krim III digunakan konsentrasi emulgator 4%. Makin tinggi konsentrasi emulgator yang digunakan maka sedikit jumlah air yang diperlukan untuk mencapai massa krim yang diinginkan, begitu juga sebaliknya makin kecil jumlah konsentrasi emulgator yang digunakan maka makin banyak jumlah yang diperlukan untuk mencapai volume krim yang diinginkan, sehingga terjadilah perbedaan viskositas untuk ketiga krim tersebut. Disamping itu, konsentrasi emulgator yang cukup dapat membentuk lapisan antarmuka yang stabil sehingga viskositas dapat dipertahankan. Hasil analisis statistik rancangan acak kelompok (RAK) pada perubahan viskositas krim kombinasi emulgator nonionik Tween 60 dan Span 60 sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat tidak dipengaruhi oleh variasi konsentrasi emulgator nonionik yang digunakan. Hal ini dapat dilihat (pada tabel 5 – 6) dimana  $F_{hitung} < F_{tabel}$ .

Hasil pengukuran tetes terdispersi yang diperlihatkan pada (tabel 8) dan berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan rancangan acak kelompok (tabel 9) menunjukkan bahwa ukuran tetes terdispersi krim sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat dipengaruhi oleh variasi konsentrasi emulgator nonionik yang digunakan, serta pada saat formulasi terjadi adanya penurunan konsentrasi pada sediaan dengan alasan bahwa adanya bahan tambahan seperti pengental. Hal ini dapat dilihat (tabel 9) dari  $F_{hitung} > F_{tabel}$  namun dilanjutkan kembali dengan analisa uji beda nyata

jujur dapat dilihat pada lampiran 14 (tabel 10). Hasil BNJ menunjukkan bahwa terjadi perbedaan ukuran tetes terdispersi antara ketiga formula. Konsentrasi surfaktan 2% dan 3% tidak mampu mencegah terjadinya koalesensi dari tetes terdispersi, hal ini pula yang menyebabkan terjadinya kriming pada kedua formulasi krim tersebut. Akan tetapi koalesensi pada Formula I, II, dan III tidak terjadi kriming pada sediaan.

Viskositas sediaan krim akan menghambat terbentuknya kriming, akan tetapi perlu diatur agar viskositas sediaan tidak mengganggu ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticate rhizoma*) sediaan (tetap mudah dioleskan). Dari hasil analisis statistik RAK terhadap viskositas setiap pada kriming sebelum dan setelah penyimpanan menunjukkan bahwa variansi konsentrasi surfaktan tidak mempengaruhi viskositas sediaan pada penyimpanan hal ini ditunjukkan pada tabel ANAVA (tabel 6), dimana  $F_{hitung} < F_{tabel}$  taraf 5% dan 1% untuk krim dan kondisi penyimpanan. Stabilitas fisik surfaktan adalah untuk menahan tetes terdispersi dengan koalesensi dan tidak bersifat sebagai penahan viskositas berbeda dengan hal *suspending agent* dari tipe polimer yang menjadi penggunaan tetes terdispersi dan peningkatan viskositas sediaan.

Hasil pengujian efektivitas krim terhadap bakteri *staphylococcus aureus* (tabel 11), menunjukkan bahwa basis krim memberikan aktivitas penghambat terhadap bakteri *staphylococcus aureus* akan tetapi penghambatan bakteri *staphylococcus aureus* untuk krim yang mengandung ekstrak jauh lebih besar. Penghambatan aktivitas terhadap *staphylococcus*

*aureus* oleh basis krim untuk ketiga formula adalah tetap ( $\pm 26$  mm). Hal ini disebabkan oleh kandungan pengawet dalam sediaan yang berefek penghambatan pada *staphylococcus aureus*. Penambahan pengawet pada basis krim mutlak diperlukan untuk menjaga sediaan dari kontaminasi mikroorganisme dan menjaga aktivitas dari bahan aktif. Berdasarkan hasil analisis statistik rancangan acak kelompok (RAK) (tabel 14) terhadap pengaruh diameter zona hambatan krim menunjukkan bahwa F hitung  $>$  F tabel untuk tiap formula pada taraf 5% dan 1% , efektivitas penghambatan tertinggi ditunjukkan pada F II (konsentrasi 3%) Hal ini berarti bahwa efektivitas setiap krim berbeda. Hal ini disebabkan semakin tinggi konsentrasi surfaktan maka tidak mempengaruhi zona hambat oleh kemampuan bahan aktif untuk menembus sel mikroba, sedangkan analisis statistik rancangan acak lengkap pada penyimpanan untuk tiap formula aktivitas penghambatan tidak berubah setelah penyimpanan, dapat dilihat pada tabel dimana F hitung  $<$  F tabel pada taraf 5% dan taraf 1%. Bahan tambahan dalam setiap formula tidak menurunkan aktivitas bahan aktif dalam penggunaan, pengaruh oleh variasi konsentrasi emulgator nonionik yang digunakan. Krim ekstrak etanol pada setiap formula menunjukkan aktivitas bakterisid. Analisis statistik RAK terhadap penghambatan pada 1 dan 2 x 24 jam. Pada formula krim ditunjukkan bahwa F hitung  $<$  F tabel pada taraf 5% dan 1% berarti diameter zona hambat terhadap sediaan pada inkubasi 1 dan 2 x 24 jam tidak berbeda. Dan setelah perlakuan inkubasi selama 2 x 24 jam diameter zona hambatan krim menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan (tabel 14, 15, dan 16)



serta zona hambatan tetap jernih sehingga dapat disimpulkan bahwa krim yang mengandung ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) bersifat bakteriosida (membunuh mikroorganisme).

Dari pembahasan diatas, adanya kondisi penyimpanan yang dipercepat terhadap kondisi krim yang diformulasi menggunakan kombinasi konsentrasi emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) 2 %, 3%, dan 4%. memberikan pengaruh terhadap perubahan organoleptis warna dan bau (tetap), tipe emulsi dan viskositas. Namun mempengaruhi volume kriming serta ukuran tetes terdispersi yang terjadi pada kombinasi emulgator nonionik Tween 60 dan Span 60 pada konsentrasasi 2% dan 3%. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa krim antibakteri yang mengandung ekstrak etanol rimpang kunyit (*Curcuma domesticae rhizoma*) dinyatakan stabil secara fisik, tetapi yang paling stabil dari sisi estetika adalah krim yang diformulasi dengan menggunakan kombinasi emulgator nonionik Tween 60 dan Span 60 dengan konsentrasi 4%. Efektifitas penghambatan terhadap sediaan krim dengan konsentrasi 3% dan bersifat bakterisida.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan organoleptis dan pengukuran volume kriming, viskositas, dan ukuran tetes terdispersi, setelah dianalisis secara statistika dan dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Formula krim yang diformulasi dengan menggunakan konsentrasi 2%, 3% dan 4% emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) stabil secara fisik, adalah krim yang diformulasi dengan menggunakan kombinasi konsentrasi emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) konsentrasi 4%.
2. Krim yang dibuat dengan ekstrak etanol kunyit (*Curcuma domesticae. Val*) memberikan aktifitas bakterisid terhadap bakteri *staphylococcus aureus* dan tidak menurun selama penyimpanan.
3. Agama Islam membuktikan bahwa tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan yang diciptakan oleh ALLAH SWT terhadap kebaikan, salah satunya sebagai bahan obat. Diaman kunyit (*Curcuma domesticae. Val*) dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat terhadap infeksi oleh bakteri *staphylococcus aureus* seperti penyakit gatal- gatal.

### B. Saran

Disarankan untuk dilakukan untuk pengujian stabilitas kimia, pengujian stabilitas lama waktu penyimpanan dan upaya untuk menghilangkan warna ekstrak sediaan agar lebih menarik.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al – Quran Alkarim*

Abdushshamad, Mhhammad, 2002. Mukjizat Ilmiah dala Al- Qur'an, Jakarta : Akbar Media Eka Sarana

Ali al-Ju'aisin, Abdullah. *Kado untuk Orang Sakit*. Mitra Pustaka, Yogyakarta : 2001.

Al- bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah bin Bardazba. *Sahih Al- Bukhari Jilid I*, Bairut: Dar Al- Kutu Allmiyah

Anonim., *Sediaan Galenika*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 2010.

Anonim, 1995. Indeks Tumbuh- Tumbuhan Obat Indonesia, Edisi Ke- 2, PT. Eisai Indonesia, hlm.271

Ansel. C. Howard. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, Jakarta :Universitas Indonesia. 2005.

Dalimarta., Setiawan, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, jilid 3, Trubus Agriwidya, Jakarta.2003.

Dalimartha, Setiawan. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 3*. Jakarta: Puspa Swara. 2007.

Djide, M. N., Sartini dan Syahrudin, K., 2005. *Mikrobiologi Farmasi Terapan*, Laborototium Mikrobiologi dan Bioteknologi Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Djide, M. N., Sartini dan Syahrudin, K., *Analisis Mikrobiologi Farmasi* , Laborototium Mikrobiologi dan Bioteknologi Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin, Makassar.2000.

Depertemen Kesehatan Republik Indonesia. 1979. *Farmakope Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan makanan.


Depertemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. *Farmakope Indonesia, Edisi IV*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan makanan

- Dwyana, Z., 2006. *Penuntun Praktikum Mikrobiologi Farmasi*. Universitas Hasanuddin . Makassar.
- Ganiswara, Sulistia, G., *Farmakologi dan Terapi*, Edisi IV, Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.1995.
- Garrity. G. M., Bell. J. A and Lilburn. T. G. 2004. *Taxonomic Outline Of The Prokaryotes Bergey's Manual Of Systematic Bacteriology, 2th Edition*, United States Of Amerika : Spinger New York Berlin Henderberg.
- Gennaro AR Lund, Walter. 1990. *Remington Pharmaceutical Sciences, eighteenth edition*, Easton Pennsylvania: Mack Publishing Company
- Graf, Jeannette. 2005. *Cosmetic Dermatology*. Germany: Verlag Berlin Heidelberg.
- Greenwood, 1995. Antibiotics Susceptibility (Sensitivity) Test, Antimicrobial and Chemoteraphy
- Harahap mawali. 2000. Ilmu Penyakit Kulit. Jakarta : Hipokrates
- Harmita,. Randji. M.,. 2005. *Buku Ajar Analisis Hayati*. Edisi ke II. Jakarta : Ari Cipta
- Jawetz, E., Melnick, J. L., and Adelberg, E. A., *Mikrobiologi Kedokteran*, Buku & Buku 2, Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga, Penerbit Salemba Medika, Jakarta.2000.
- Jellineck, Stephan. *Formulation and Function Of Cosmetic*. Wiley interscience. New York : 1986
- Kibbe, Arthur .H. 2000. *Handbook Of Pharmaceutical Exipients.3th Edition*. University Of Pharmacy. Pennsylvani.
- Lachman L. Liberman HA & Kaning JL. 1994. *Theory And Practice Of Industrial Pharmacy*. Easton Pennsylvania: Mack Publishing Company
- Latief, Abd. 2001. *Farmakologi Obat Tradisional*. Jakarta
- Liebermen, HA.,Lachman L., Schwariz. 1998.*Pharmaceutical Dosage Form: Dispersi System. Volume I*. Marcel Dekker, Inc.New York..
- Martin Eric.L. 1971 *Dispensing of Madication. 7<sup>th</sup> Edition*. Mack Publishing Company. Easton. Pennsylvania

- Mahmud, Muhammad Mahir Hasan. Al- thib. 2007. *Al Tsimar Wa Al- A'syab Al Waridat Fi Al- Quran Al Karim wa Al- Sunnah Al- Nabawiyah*. Terj. Hamsah Hasan, Lc, Mukjizat Kedokteran Nabi, Jakarta selatan: Qultum Media
- Michael, EA. Pharmaceutics. 1998 *The Science Of Dosage Form Design*. Churchill Livingstone. Edinburgh London.
- Mulia kamarza. *Pengaruh Surfaktan Campuran Pada Pembentukan Emulsi Untuk Ekstraksi Merkuri II dengan Membran Cair Emulsi ( MCEI )*, Departemen Teknik Gas Dan Petrokimia, Fakultas Tehnik Universitas Indonesia ( On Line ). Depak. Email : [kmulia@che. Ui. Edu](mailto:kmulia@che.ui.edu). ( 08 mei 2011)
- Mycek. M. j. 2001. *Farmakologi Ulasan Bergambar, Cetakan 1*, Terjemahan Azwar Agoes, Jakarta : Widya Medika.
- Parrot, Eugena. *Pharmaceutical Technology*. Burgess Publishing Company. Iowa City. Iowa : University Of Iowa, 1974
- Pelczar. Michael J and Chan. E. C. S. 2008. *Dasar- Dasar Microbiologi*, Terjemahan Oleh Hadioetomo, Ratna Sari. Jakarta: Universitas Indonesia
- Pratiwi, Sylvia T. 2008. *Mikrobiologi Farmasi*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Scovilles. 1995. *The Art Of Compounding*, London.
- Sprowls Joseph B. 1970. *Prescription Pharmacy*, J.B. lippincott Company. Philadelphia-Toronto.
- Soewolo. 2003. *Common Textbook Fisiologi Manusia*. Malang: IMSTEP
- Suwandi. U. *Mekanisme Kerja Antibiotic*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan P.T. Kalbe Farma. Jakarta ( On Line ). [http: // www. Kalbe. co.id](http://www.Kalbe.co.id) ( diakses 20 Ootober 2011 )
- Tranggono, R.I, Fatma latifah. 2007. *Buku Pengangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Voigth, R. 1995. *Buku Pelajaran Teknologi farmasi*. Edisi V. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Winarto, W. P. 2003. *Khasiat dan manfaat tumbuhan kunyit*. Agromedia Pustaka : Jakarta


**GAMBAR PENELITIAN**

**Gambar 2. Tanaman kunyit (A) dan kunyit (B)**

**SKEMA KERJA**


**Gambar 3. Skema kerja ekstraksi rimpang kunyit (*Curcuma domesticae* rhizoma)**

### SKEMA KERJA




**Gambar 4. Skema kerja pembuatan krim**





**Gambar 5. Skema pengujian kestabilan krim**



**Gambar 6. Skema Pengujian Daya Hambat Sediaan Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus***

## LAMPIRAN 1.

Tabel 3. Perhitungan Konsentrasi Surfaktan Nonionik

Fase minyak	A (Gram)	HLB Butuh	A x B	A x B Jumlah A (Gram)
<b>Asam Stearat</b>	3	15	45	2,5
<b>Cetyl Alkohol</b>	5	13	65	3,6
<b>Adeps Lanae</b>	5	15	75	4,17
<b>Parafin Cair</b>	5	12	60	3,33
	18			13,6

Tabel 1. Perhitungan Konsentrasi

Jumlah HLB butuh fase minyak 13,6

HLB Span 4,7

HLB Tween 14,9

Tween 60 14,9 8,9

Span 60 4,7 1,3

10,2

a. Formula I

Konsentrasi emulgator 2 %

$$\frac{2}{100} \times 100 \text{ g} = 2 \text{ g}$$

$$\text{Tween 60} \quad \frac{8,9}{10,2} \times 2 \text{ g} = 1,745 \text{ g}$$

$$\text{Span 60} \quad \frac{1,3}{10,2} \times 2 \text{ g} = 0,225 \text{ g}$$

- b. Formula II  
Konsentrasi emulgator 3 %

$$\frac{3}{100} \times 100 \text{ g} = 3 \text{ g}$$

$$\text{Tween 60} \quad \frac{8,9}{10,2} \times 3 \text{ g} = 2,618 \text{ g}$$

$$\text{Span 60} \quad \frac{1,3}{10,2} \times 3 \text{ g} = 0,382 \text{ g}$$

- c. Formula III  
Konsentrasi emulgator 4 %

$$\frac{4}{100} \times 100 \text{ g} = 4 \text{ g}$$

$$\text{Tween 60} \quad \frac{8,9}{10,2} \times 4 \text{ g} = 3,490 \text{ g}$$

$$\text{Span 60} \quad \frac{1,3}{10,2} \times 4 \text{ g} = 0,510 \text{ g}$$

## LAMPIRAN 2

Tabel 4. Hasil Pengamatan Uji Tipe Emulsi

Krim	Tipe emulsi			
	Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat		Setelah kondisi penyimpanan dipercepat	
	Uji pengenceran	Uji hantaran listrik	Uji pengenceran	Uji hantaran listrik
<b>I</b>	M/ A	M/ A	M/ A	M/ A
<b>II</b>	M/ A	M/ A	M/ A	M/ A
<b>III</b>	M/ A	M/ A	M/ A	M/ A

Keterangan :

M/ A = Emulsi tipe minyak dalam air

I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%

II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%

III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%

### LAMPIRAN 3

Tabel 5. Hasil Pengukuran Volume Kriming ( % )

Siklus	Krim		
	I	II	III
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	96	0
7	0	96	0
8	96	92	0
9	96	92	0
10	96	92	0

Keterangan :

Volume awal 25 ml

I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%

II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%

III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%

#### LAMPIRAN 4

Tabel 6. Hasil Pengukuran Viskositas Krim

Krim	Viskositas (poise)	
	Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat	Setelah kondisi penyimpanan dipercepat
I	42	38
	39	36
	38	36
<b>Rata- rata</b>	<b>39,7</b>	<b>36,7</b>
II	56	52
	58	48
	59	50
<b>Rata- rata</b>	<b>57,7</b>	<b>50</b>
III	53	58
	52	63
	50	62
<b>Rata- rata</b>	<b>51,7</b>	<b>61,3</b>

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%

## LAMPIRAN 5

Tabel 7. Analisis Statistika viskositas krim dengan rancangan acak kelompok (RAK)

Viskositas	Formula Krim				
	I	II	III	Total	Rata- rata
<b>Sebelum penyimpanan</b>	39,7	57,7	51,7	149,1	49,70
<b>Setelah penyimpanan</b>	36,7	50	61,3	148	49,3333
<b>Total</b>	76,4	107,7	113	297,1	99,0333
<b>Rata- rata</b>	<b>38,2</b>	<b>53,85</b>	<b>56,5</b>	<b>148,55</b>	<b>49,5167</b>

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(\sum Y)^2}{a \times b} + \frac{(297,1)^2}{3 \times 2} = 14711,40$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total (JKT)} &= (39,7)^2 + (57,7)^2 + (51,7)^2 + (36,7)^2 + (50)^2 + (61,3)^2 - \text{FK} \\ &= 15182,85 - 14711,40 \\ &= 471,45 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Krim (JKK)} &= \frac{(76,4)^2 + (107,7)^2 + (113)^2}{2} - \text{FK} \\ &= 15102,63 - 14711,40 \\ &= 391,23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \frac{(149,1)^2 + (148)^2}{3} - \text{FK} \\ &= 1471,60 - 14711,40 \\ &= 0,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat (JKG)} &= \text{JK Total} - (\text{JK Krim} + \text{JK kondisi}) \\ &= 471,49 - (391,32 + 0,2) \\ &= 471,45 - 391,43 \\ &= 80,02 \end{aligned}$$



## LAMPIRAN 6

Tabel 8. Analisis Varians Viskositas

Rumus Variansi	Db	JK	KT	Fh	Tabel 5%	Tabel 1%
<b>Formula Krim</b>	2	391,23	195,62	4,889	19,00	99,01
<b>Penyimpanan</b>	1	0,2	0,2	0,005	18,51	98,49
<b>Galat</b>	2	80,02	40,01			
<b>Total</b>	5	471,45				

FH 2, 2 ( Formula Krim) = 4, 889

FH 1, 2 ( Penyimpanan) = 0, 005

Untuk FT 5%

Formula Krim = 4, 889 < 19,00 (krim) → Tidak Berbeda (ns)

Penyimpanan = 0, 005 < 18,51 (kondisi) → Tidak Berbeda (ns)

Untuk FT 1%

Formula Krim = 4, 889 < 99,01 (krim) → Tidak Berbeda (ns)

Penyimpanan = 0, 005 < 98, 49 (kondisi) → Tidak Berbeda (ns)

Keterangan :

- Viskositas krim untuk tiap formula tidak berbeda
- Viskositas krim untuk setelah peyimpanan tidak Berbeda

## LAMPIRAN 7

### 1. Krim I

Tabel 9. Rentang Ukuran Tetes Terdispersi

Rentang Ukuran Tetes Terdispersi ( $\mu\text{m}$ )	d ( $\mu\text{m}$ )	Sebelum kondisi dipercepat		Setelah kondisi dipercepat	
		N	n.d	n	n.d
<b>6, 6 – 13, 2</b>	9, 9	70	693	40	396
<b>19, 8 – 26, 4</b>	23, 1	130	3003	150	3465
<b>33 – 39, 6</b>	36, 3	40	1452	40	1452
<b>46, 2 – 52, 8</b>	49, 5	10	495	20	990
<b>Jumlah</b>		<b>250</b>	<b>5643</b>	<b>250</b>	<b>6303</b>

$$Rt_0 = \frac{5643}{250} = 22,57 \text{ (}\mu\text{m)}$$

$$Rt_1 = \frac{6303}{250} = 25,2 \text{ (}\mu\text{m)}$$

### 2. Krim II

Tabel 10. Rentang Ukuran Tetes Terdispersi

Rentang Ukuran Tetes Terdispersi ( $\mu\text{m}$ )	d ( $\mu\text{m}$ )	Sebelum kondisi dipercepat		Setelah kondisi dipercepat	
		N	n.d	n	n.d
<b>6, 6 – 13, 2</b>	9, 9	120	1188	100	990
<b>19, 8 – 26, 4</b>	23, 1	80	1848	60	1386
<b>33 – 39, 6</b>	36, 3	40	1452	80	2904
<b>46, 2 – 52, 8</b>	49, 5	10	495	10	495
<b>Jumlah</b>		<b>250</b>	<b>4983</b>	<b>250</b>	<b>5775</b>

$$Rt_0 = \frac{4983}{250} = 19,93 \text{ (}\mu\text{m)}$$

$$Rt_1 = \frac{5775}{250} = 23,1 \text{ (}\mu\text{m)}$$

## 3. Krim III

Tabel 11. Rentang Ukuran Tetes Terdispersi

Rentang Ukuran Tetes Terdispersi ( $\mu\text{m}$ )	d ( $\mu\text{m}$ )	Sebelum kondisi dipercepat		Setelah kondisi dipercepat	
		n	n.d	n	n.d
<b>6,6 – 13,2</b>	9,9	235	2326,5	215	2128,5
<b>19,8 – 26,4</b>	23,1	15	346,5	20	462
<b>33 – 39,6</b>	36,3	-	-	15	544,5
<b>46,2 – 52,8</b>	49,5	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		250	2672	250	3135

$$Rt_0 = \frac{2672}{250} = 10,69 \text{ (}\mu\text{m)}$$

$$Rt_1 = \frac{3135}{250} = 12,54 \text{ (}\mu\text{m)}$$

## LAMPIRAN 8

Tabel 12. Analisis Statistika Ukuran Tetes Terdispersi ( $\mu\text{m}$ ) Krim Dengan Rancangan Acak Kelompok ( RAK )

Viskositas	Diameter Tetes Terdispersi Formula				
	I	II	III	Total	Rata- rata
<b>Sebelum penyimpanan</b>	22, 57	19, 93	10, 69	53, 19	17, 73
<b>Setelah penyimpanan</b>	25, 20	23, 10	12, 54	60, 84	20, 28
<b>Total</b>	47, 77	43, 03	23, 23	114, 03	38, 01
<b>Rata- rata</b>	23, 89	21, 51	11, 61	57, 02	19, 01

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(\sum Y)^2}{axb} + \frac{(114,03)^2}{3 \times 2} = 2167,14$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total ( JKT )} &= (22,57)^2 + (19,93)^2 + (10,69)^2 + (25,20)^2 + (23,1)^2 + (12,54)^2 - \text{FK} \\ &= 2346,78 - 2167,14 \\ &= 179,64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Krim ( JKK )} &= \frac{(47,77)^2 + (43,03)^2 + (23,23)^2}{2} - \text{FK} \\ &= 2336,59 - 2167,14 \\ &= 169,43 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK kondisi} &= \frac{(53,19)^2 + (60,84)^2}{3} - \text{FK} \\ &= 2176,90 - 2167,14 \\ &= 9,76 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat} &= \text{JK Total} - (\text{JK Krim} + \text{JK Kondisi}) \\ &= 179,64 - (169,43 + 9,76) \\ &= 179,64 - 179,19 \\ &= 0,84 \end{aligned}$$

## LAMPIRAN 9

Tabel 13. Analisis Variansi Tetes Terdispersi

Rumus Variansi	Db	JK	KT	Fh	Tabel 5%	Tabel 1%
<b>Formula Krim</b>	2	169,43	84,72	201,72	19,00	99,00
<b>Penyimpanan</b>	1	9,76	9,76	23,24	18,51	98,49
<b>Galat</b>	2	0,84	0,42			
<b>Total</b>	<b>5</b>					

$$FH_{2,2} (\text{Formula Krim}) = 201,72$$

$$FH_{1,2} (\text{Penyimpanan}) = 23,24$$

Untuk FT 5%

$$\text{Formula Krim} = 201,72 > 19,00 (\text{krim}) \longrightarrow \text{Berbeda nyata (ss)}$$

$$\text{Penyimpanan} = 23,24 > 18,51 (\text{kondisi}) \longrightarrow \text{Berbeda nyata (s)}$$

Untuk FT 1%

$$\text{Formula Krim} = 201,72 > 99,00 (\text{krim}) \longrightarrow \text{Berbeda sangat nyata (ss)}$$

$$\text{Penyimpanan} = 23,24 < 98,49 (\text{kondisi}) \longrightarrow \text{Berbeda nyata (s)}$$

Keterangan :

- Ukuran tetes terdispersi antar formula berbeda Sangat Signifikan
- Ukuran tetes terdispersi sebelum dan setelah penyimpanan berbeda

A. Koefisien Keragaman

$$\begin{aligned} KK &= \frac{\sqrt{KTG}}{\gamma} \times 100 \% \\ &= \frac{\sqrt{0,24}}{19,00} \times 100 \% \\ &= 0,00303 \times 100 \% \end{aligned}$$

$$= 0,303 \%$$

### B. Uji Beda Nyata Jujur

$$\text{Rumus umum dari BNJ } (\acute{o}) : \acute{o} = q \alpha (p,v) \sqrt{\frac{KT \text{ Galat}}{r}}$$

$$1. \text{ BNJ } \alpha = Q (p,v) \sqrt{\frac{KT \text{ Galat}}{r}}$$

$$\text{BNJ } 5\% = 0,05 (4,2) \times \sqrt{\frac{0,42}{3}}$$

$$= 0,05(3,93) \times 0,22$$

$$= 3,93 \times (0,22)$$

$$= 0,864$$

$$\text{BNJ } 1\% = 0,01 (4,2) \times \sqrt{\frac{0,42}{3}}$$

$$= 0,01(6,51) \times 0,22$$

$$= 6,51 \times (0,22)$$

$$= 1,432$$

**Tabel 14. Hasil Uji BNJ Tetes Terdispersi Sediaan Krim**

Formula	Rata- rata	Beda Nyata Ril		
		I	II	III
I	25,20	0		
II	23,10	2,10	0	
III	12,54	12,66	10,56	0
<b>BNJ 5%</b>	<b>= 0,864</b>		<b>BNJ 1%</b>	<b>= 1,432</b>

**LAMPIRAN 10.****Perhitungan Skala Lensa Okuler Dengan Lensa Objektif**

Pembesaran lensa yang digunakan = 10 x 10

Garis mikrometer yang berhimpitan adalah :

Skala pada mikrometer okuler = 10

Skala pada mikrometer objektif = 15

Satuan skala yang tertera pada mikrometer objektif = 0,01 mm

Maka, ukuran 1 skala pada mikrometer okuler adalah =

$$\frac{10}{15} \times 0,01 \text{ mm} = 0,0066 \text{ mm} = 6,6$$

## LAMPIRAN 11

Tabel 15. Hasil Pengukuran Zona Hambatan Krim Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*

Krim	Diameter zona hambat (mm)	
	Sebelum Kondisi	Setelah Kondisi
	Penyimpanan Dipercepat	Penyimpanan Dipercepat
I	29,02	30,02
	27,02	29,02
	30,02	28,02
<b>Rata- rata</b>	<b>28,68</b>	<b>29,02</b>
II	33,02	30,02
	31,02	31,02
	31,02	33,02
<b>Rata- rata</b>	<b>31,68</b>	<b>31,35</b>
III	31,02	29,02
	29,02	31,02
	30,02	31,02
<b>Rata- rata</b>	<b>30,02</b>	<b>30,35</b>
IV	25,02	26,02
	25,02	26,02
	26,02	27,02
<b>Rata- rata</b>	<b>25,35</b>	<b>26,35</b>

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%
- IV = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 (kontrol)



## LAMPIRAN 12

Tabel 16. Analisis Statistika Zona Hambatan (mm) Krim Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Zona Hambat	Formulasi Krim					
	I	II	III	IV	Total	Rata- rata
<b>Sebelum Kondisi dipercepat</b>	28,68	31,68	30,02	25,35	115,73	28,93
<b>Setelah Kondisi dipercepat</b>	29,02	31,35	30,35	26,35	117,07	29,26
<b>Total</b>	57,70	63,03	60,37	51,70	232,80	58,19
<b>Rata- rata</b>	28,85	31,51	30,18	25,85	116,40	29,09

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(\sum Y)^2}{axb} + \frac{(232,80)^2}{4x2} = 6774,48$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total ( JKT )} &= (28,68)^2 + (31,68)^2 + (30,02)^2 + \dots + (26,35)^2 - \text{FK} \\ &= 6810,40 - 6774,48 \\ &= 35,92 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Krim ( JKK )} &= \frac{(57,70)^2 + (63,03)^2 + (60,37)^2 + (51,70)^2}{2} \\ &= 6809,74 - 6774,48 \\ &= 35,26 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Penyimpanan} &= \frac{(115,73)^2 + (117,07)^2}{4} - \text{FK} \\ &= 6774,70 - 6774,48 \\ &= 0,22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat} &= \text{JK Total} - (\text{JK Krim} + \text{JK Kondisi}) \\ &= 35,92 - (35,29 + 0,22) \\ &= 35,92 - 35,51 \\ &= 0,41 \end{aligned}$$

### LAMPIRAN 13

Tabel 17. Analisis Varians Zona Hambatan Krim

Rumus Variansi	Db	JK	KT	Fh	Tabel 5%	Tabel 1%
<b>Formula Krim</b>	3	35,26	11,75	90,38	9,26	29,46
<b>Penyimpanan</b>	1	0,22	0,22	1,69	10,13	34,12
<b>Galat</b>	3	0,41	0,13	-		
<b>Total</b>	7	35,89		-		

FH 3,3 ( Formula Krim ) = 90,38

FH 1, 3 (Penyimpanan) = 1,69

Untuk FT 5%

Formula Krim = 90,38 > 9,26 (krim) → Berbeda nyata (s)

Penyimpanan = 1,69 < 10,13 (kondisi) → Tidak Berbeda nyata (ns)

Untuk FT 1%

Formula Krim = 90,38 > 29,46 (krim) → Berbeda sangat nyata (ss)

Penyimpanan = 1,69 < 34,12 (kondisi) → Tidak Berbeda nyata (ns)

Keterangan :

- Zona hambat (aktivitas hambat terhadap *staphylococcus aureus*) untuk setiap formula berbeda.
- Zona hambat (aktivitas hambat terhadap *staphylococcus aureus*) untuk setiap penyimpana tidak berbeda signifikan sebelum dan setelah penyimpanan.

## A. Koefisien Keragaman

$$\begin{aligned}
 \text{KK} &= \frac{\sqrt{KTG}}{\gamma} \times 100 \% \\
 &= \frac{\sqrt{0,13}}{9,26} \times 100 \% \\
 &= 0,038 \times 100 \% \\
 &= 3,8 \%
 \end{aligned}$$

## B. Uji Beda Nyata Jujur

Rumus umum dari BNJ ( $\omega$ ) :  $\omega = q \alpha (p, v) \sqrt{\frac{KT \text{ Galat}}{r}}$

1. BNJ  $\alpha = Q (p, v) \sqrt{\frac{KT \text{ Galat}}{r}}$

$$\begin{aligned}
 \text{BNJ } 5\% &= 0,05 (4,2) \times \sqrt{\frac{0,13}{4}} \\
 &= 0,05(3,93) \times \frac{\sqrt{0,36}}{4} \\
 &= 3,93 \times (0,09) \\
 &= 0,35
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{BNJ } 1\% &= 0,01 (4,2) \times \sqrt{\frac{0,13}{4}} \\
 &= 0,01(6,51) \times \frac{\sqrt{0,36}}{4} \\
 &= 6,51 \times (0,09) \\
 &= 0,58
 \end{aligned}$$

Tabel 18. Hasil Uji BNJ Zona Hambatan Sediaan Krim

Formula	Rata- rata	Beda Nyata Ril			
		I	II	III	IV
<b>I</b>	<b>29,02</b>	<b>0</b>			
<b>II</b>	<b>31,35</b>	<b>-2,33</b>	<b>0</b>		
<b>III</b>	<b>30,35</b>	<b>-1,33</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>26,35</b>	<b>2,67</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>BNJ 5% = 0,35%</b>		<b>BNJ 1% = 0,58%</b>			

## LAMPIRAN 14

Tabel 19. Hasil Pengukuran Zona Hambatan Krim (mm)

Krim	Setelah Diinkubasi Diameter Zona Hambat (mm)	
	Inkubasi 1 x 24 Jam	Inkubasi 2 x 24 Jam
I	30,02	33,02
	30,02	32,02
	33,02	33,02
<b>Rata- rata</b>	<b>31,02</b>	<b>32,68</b>
II	35,02	35,08
	35,02	38,02
	38,02	42,03
<b>Rata- rata</b>	<b>36,02</b>	<b>38,37</b>
III	32,02	32,02
	30,02	33,02
	33,02	35,02
<b>Rata- rata</b>	<b>31,68</b>	<b>37,70</b>
IV	23,02	25,02
	25,02	27,02
	24,02	26,02
<b>Rata- rata</b>	<b>24,02</b>	<b>26,02</b>

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%
- IV = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 ( kontrol )

## LAMPIRAN 15

Tabel 20. Analisis Statistika Zona Hambatan (mm) Krim Setelah Penyimpanan dengan Inkubasi 1 x 24 jam dan 2 x 24 jam Dengan Rancangan Acak Kelompok ( RAK )

Kondisi	Formulasi Krim					
	I	II	III	IV	Total	Rata- rata
Sebelum Penyimpanan Inkubasi 1 x 24 jam	31,02	36,02	31,68	24,02	122,74	30,68
Setelah penyimpanan Inkubasi 2 x 24 jam	32,68	38,37	37,70	26,02	134,77	33,69
<b>Total</b>	63,70	74,39	69,38	50,04	257,51	64,37
<b>Rata- rata</b>	31,85	37,19	31,69	25,02	128,75	32,18

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(\sum Y)^2}{axb} + \frac{(257,51)^2}{4 \times 2} = 8288,92$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total ( JKT )} &= (31,02)^2 + (36,02)^2 + (31,68)^2 + (32,68)^2 + (38,37)^2 + (37,70)^2 - \text{FK} \\ &= 8478,82 - 8288,92 \\ &= 189,90 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Krim ( JKK )} &= \frac{(68,72)^2 + (74,39)^2 + (64,36)^2}{2} - \text{FK} \\ &= 8454,57 - 8288,92 \\ &= 165,65 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Penyimpanan} &= \frac{(122,74)^2 + (134,77)^2}{4} - \text{FK} \\ &= 8307,01 - 8288,92 \\ &= 18,09 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat} &= \text{JK Total} - (\text{JK Krim} + \text{JK Kondisi}) \\ &= 189,90 - (165,65 + 18,09) \\ &= 189,90 - 183,74 \\ &= 6,16 \end{aligned}$$

## LAMPIRAN 16

Tabel 21. Analisis Varians Zona Hambatan Krim Inkubasi 1 x 24 jam dan 2 x 24 jam

Rumus Variansi	Db	JK	KT	Fh	Tabel 5%	Tabel 1%
<b>Krim</b>	3	165,65	55,21	26,93	9,26	29,46
<b>Kondisi (inkubasi)</b>	1	18,09	18,09	8,82	10,13	34,12
<b>Galat</b>	3	6,16	2,05			
<b>Total</b>	7	189,9				

FH 3,3 (Formula Krim) = 26,93

FH 1, 3 (Kondisi) = 8,82

Untuk FT 5%

Formula Krim = 26,93 > 9,26 (krim) → Berbeda nyata (s)

Kondisi = 8,82 < 10,13 (kondisi) → Tidak Berbeda nyata (ns)

Untuk FT 1%

Formula Krim = 26,93 < 29,46(krim) → Tidak Berbeda nyata (ns)


Kondisi = 8,82 < 34,12(kondisi) → Tidak Berbeda nyata (ns)

### Keterangan :


Zona hambat pada inkubasi 1 x 24 jam dan 2 x 24 jam tidak berbeda nyata artinya bersifat bakteriasid.

## GAMBAR PENELITIAN

### Histogram Krim Sebelum Dan Setelah Kondisi Dipercepat




Gambar 7. Histogram Viskositas Krim (Poise) Sebelum Dan Setelah Kondisi Dipercepat



Gambar 8. Histogram Ukuran Tetes Terdispersi Krim ( $\mu\text{m}$ ) Sebelum Dan Setelah Kondisi Dipercepat






Gambar 9. Histogram Zona Hambatan Krim (mm) Sebelum Dan Setelah Kondisi Dipercepat

Keterangan :


- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%
- IV = Kontrol Untuk Semua Krim

**GAMBAR PENELITIAN****Krim sebelum penyimpanan dipercepat**

Gambar 10. Foto Pengamatan Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat Pada Krim Dengan Kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%


**GAMBAR PENELITIAN****Uji Pengenceran Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat**

Gambar 11: Foto Uji Pengenceran Krim Dengan Kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%

**GAMBAR PENELITIAN**  
**Krim Setelah Penyimpanan Dipercepat**




Gambar 12. Foto Pengamatan Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat Pada Krim Dengan Kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%

## GAMBAR PENELITIAN


### Uji Pengenceran Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat



Gambar 13 : Foto Uji Pengenceran Krim Dengan Kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%

**GAMBAR PENELITIAN****Uji Hantaran Arus Listrik Sebelum Kondisi Penyimpanan Dipercepat**


Gambar 14: Foto Uji Hantaran Listrik Pada Krim Dengan Kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat.

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%

## GAMBAR PENELITIAN


### Uji Hantaran Listrik Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat



Gambar 15 : Foto Uji Hantaran Listrik Pada Krim Dengan Kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat.

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%


**GAMBAR PENELITIAN****Uji Volume Kriming Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat**

Gambar 16. Foto Uji Volume Kriming Pada Krim Dengan Kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%




**GAMBAR PENELITIAN****Uji tetes Terdispersi Sebelum Kondisi Penyimpanan Dipercepat**

Gambar 17: Foto Uji Tetes Terdispersi Pada Krim Dengan Kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%


**GAMBAR PENELITIAN****Uji Tetes Terdispersi Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat**

Gambar 18: Foto Uji Tetes Terdispersi Pada Krim Dengan Kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat


Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%

**GAMBAR PENELITIAN**  
**Uji Efektifitas Sediaan Krim Terhadap *Staphylococcus aureus* Sebelum Kondisi Dipercepat**



Gambar 19. Foto Pengamatan Pada Kondisi Sebelum Peyimpanan Dipercepat. Jam Pada Suhu 37<sup>0</sup> C




Gambar 20. Foto Pengamatan Pada Kondisi Sebelum Peyimpanan Dipercepat. Pada Suhu 37<sup>0</sup> C


Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%
- IV = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi kontrol

**GAMBAR PENELITIAN**  
**Uji Efektifitas Sediaan Krim Terhadap *Staphylococcus aureus* Sebelum Kondisi Dipercepat**



Gambar 21. Foto Pengamatan Pada Kondisi Setelah Peyimpanan Dipercepat. Inkubasi 1 x 24 jam Pada Suhu 37<sup>0</sup> C



Gambar 22. Foto Pengamatan Pada Kondisi Setelah Peyimpanan Dipercepat. Inkubasi 2 x 24 jam Pada Suhu 37<sup>0</sup> C

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%
- IV = Krim dengan kombinasi emulgator Tween 60 dan Span 60 konsentrasi kontrol