

**UJI EFEK PENYEMBUHAN LUKA SAYAT PADA KELINCI
(*Oryctolagus cuniculus*) MENGGUNAKAN GETAH
JARAK PAGAR (*Jathropa curcas* L.) DALAM
BENTUK SEDIAAN GEL**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Farmasi Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

OLEH

A.DHIZA TENRIPADANG

NIM :70100108001

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, September 2012

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
A.Dhiza Tenripadang
70100108001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Efek Penyembuhan Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) Menggunakan Getah Jarak Pagar (*Jathropa curcas* L.) Dalam Bentuk Sediaan Gel ” yang disusun oleh A. Dhiza Tenripadang, NIM: 70100108001, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 14 September 2012 M yang bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1433 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 14 September 2012 M
27 Syawal 1433 H


DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH.Kes** (.....)
Sekretaris : **Drs. Wahyuddin G., M.Ag** (.....)
Pembimbing I : **Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt** (.....)
Pembimbing II : **Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt** (.....)
Penguji I : **Haeria, S.Si., M.Si.** (.....)
Penguji II : **Prof. Dr. Sabri Samin., M.Ag** (.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, M.PH.,MH.Kes.
NIP. 19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt. atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan.

Shalawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang karena cahaya ilmu.

Skripsi dengan judul “Uji Efek Penyembuhan Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) Menggunakan Getah Jarak Pagar (*Jathropha curcas* L.) dalam Bentuk Sediaan Gel ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, baik itu yang bersifat teknis maupun non-teknis. Namun berkat doa, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala-kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Untuk itu penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Drs. A. Syamsul Rizal AM, dan Ibunda Ratna Januarti Soetedja, serta keluarga yang tak putus-putus memberikan restu dan

doanya, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materil selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dekan dan Para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Gemy Nastity Handayany S.Si.,M.Si, Apt sebagai pembimbing pertama serta selaku ketua jurusan farmasi dan Ibu Isriany Ismail S.Si., M.Si, Apt. Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Haeria, S.Si., sebagai Penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan.
6. Bapak Prof.Dr.Sabri Samin, M.Ag, Selaku Penguji Keislaman yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
7. Bapak, Ibu Dosen, serta Seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga selesainya skripsi ini.
8. Aryudi Hidayat yang selalu memberikan bantuan, semangat, kasih sayang serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat terbaik Rini Setianingsih, Winda Triwahyuni, Zaikal Arifin Abbas, Yusrab Ardianto, Galih Dwi Perkasa, Muh. Hadi dan A. Baso M yang selalu memberikan semangat.
10. Kakak-kakak jurusan farmasi angkatan 2005, 2006, dan 2007 yang selalu memberikan bantuan dan bimbingannya baik secara materi maupun secara moril selama penyusunan skripsi ini.
11. Saudara-saudaraku angkatan 2008 yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya.
12. Adik-adik jurusan farmasi angkatan 2009, 2010, dan 2011 yang selalu memberikan bantuan secara moril selama penyusunan skripsi ini.

Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin...

Makassar, September 2012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	4
C. <i>Maksud dan Tujuan Penelitian</i>	4
D. <i>Manfaat Penelitian</i>	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Kulit</i>	6
1. Fungsi Kulit	6
2. Anatomi Fisiologi Kulit	8
3. Absorpsi Obat Melalui Kulit	11
B. <i>Luka</i>	15

C. <i>Penyembuhan Luka</i>	17
D. <i>Uraian Tanaman</i>	18
1. <i>Klasifikasi Tumbuhan</i>	18
2. <i>Nama Daerah</i>	19
3. <i>Morfologi Tumbuhan</i>	19
4. <i>Kandungan Kimia</i>	21
5. <i>Kegunaan Tumbuhan</i>	21
6. <i>Pengolahan Getah</i>	22
E. <i>Gel</i>	22
1. <i>Defenisi Gel</i>	22
2. <i>Komposisi Gel</i>	23
F. <i>Tinjauan Islam Tentang Tanaman Obat</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. <i>Alat dan Bahan</i>	35
B. <i>Metode Kerja</i>	35
1. <i>Penyiapan Sampel</i>	35
2. <i>Pembuatan Sediaan Gel</i>	36
3. <i>Pengujian Efek Penyembuhan Luka Gel Getah Jarak Pagar</i>	37
4. <i>Pengukuran Efek Penyembuhan Luka</i>	38
5. <i>Pengumpulan dan Analisis Data</i>	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
<i>A. Hasil Penelitian</i>	39
<i>B. Pembahasan</i>	39
BAB V PENUTUP	
<i>A. Kesimpulan</i>	45
<i>B. Saran</i>	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komposisi Rancangan Formula Sediaan	36
2. Efek penyembuhan luka gel getah Jarak pagar.....	39
3. Persentase Penyembuhan Luka.....	51
4. Efek Penyembuhan Luka.....	52
5. Hubungan Antara Formula dan Kecepatan Penutupan Luka	53
6. Analisis Ragam Penutupan Luka.....	54
7. BNT Hubungan Antara Formula dan Kecepatan Mulai Menutup Luka	56
8. Hubungan Antara Formula dan Kecepatan Luka Tertutup 100%	57
9. Analisis Ragam Kecepatan Luka Tertutup 100%.....	58
10. BNT Hubungan Antara Formula dan Kecepatan Luka Tertutup 100% .	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Kerja Pengolahan Getah Jarak Pagar (<i>Jathropha curcas</i> L.).....	48
2. Skema Kerja Pembuatan Gel Getah Jarak Pagar (<i>Jathropha curcas</i> L.) .49	
3. Skema Kerja Pengujian Efek Penyembuhan Luka	50
4. Sediaan Gel Getah Jarak Pagar	61
5. Salep Oxytetracycline [®]	61
6. Kelinci yang Telah Dilukai	62
7. Luka Mengalami Reaksi Inflamasi	62
8. Mulai Tertutupnya Luka	63
9. Luka Sembuh 100%.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pengolahan Getah Jarak Pagar (<i>Jathropha curcas</i> L.).....	48
2. Pembuatan Gel Getah Jarak Pagar	49
3. Skema Kerja Pengujian Efek Penyembuhan Luka.....	50
4. Persentase Penyembuhan Luka	51
5. Efek Penyembuhan Luka	52
6. Perhitungan RAL, Hubungan Formula dan Kecepatan Penutupan Luka.....	53
7. Perhitungan RAL, Hubungan Formula dan Kecepatan Luka Tertutup 100%.....	57
8. Gambar Penelitian.....	61

ABSTRAK

Nama Penyusun : A.Dhiza Tenripadang
NIM : 70100108001
Judul Skripsi : Uji Efek Penyembuhan Luka Sayat pada Kelinci
(*Oryctolagus cuniculus*) Menggunakan Getah Jarak
Pagar (*Jathropha curcas* L.) Dalam Bentuk Sediaan
Gel

Telah dilakukan uji efek penyembuhan luka sayat pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) menggunakan getah Jarak Pagar (*Jathropha curcas* L.) dalam bentuk sediaan gel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah getah jarak pagar dalam bentuk gel dapat memberikan efek penyembuhan pada luka sayat serta mengetahui konsentrasi getah Jarak Pagar (*Jathropha curcas* L.) dalam formulasi gel yang efektif menyembuhkan luka sayat pada hewan uji.

Getah diperoleh dengan mematahkan tangkai Jarak Pagar (*Jathropha curcas* L.) lalu ditampung kemudian diformulasi menjadi gel dengan menggunakan basis HPMC dengan konsentrasi getah 4%, 8%, dan 16%. Uji efek penyembuhan luka dilakukan pada Kelinci dengan melukai sepanjang 15 mm dan setiap harinya diolesi dengan gel getah Jarak Pagar dan pembanding salep Oxytetracycline[®] hingga luka sembuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula gel dengan konsentrasi getah Jarak pagar 4% dapat menyembuhkan luka selama 8 hari, konsentrasi 8% menyembuhkan luka selama 7 hari, dan konsentrasi 16% selama 4 hari, sedangkan Oxytetracycline[®] sebagai pembanding menyembuhkan luka selama 6 hari.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa getah Jarak Pagar (*Jathropha curcas* L.) dalam bentuk sediaan gel dapat memberikan efek penyembuhan terbaik pada konsentrasi 16% dengan waktu penyembuhan luka tercepat yaitu 4 hari.

ABSTRACT

Nama Penyusun : A.Dhiza Tenripadang
NIM : 70100108001
Judul Skripsi : Test the Effect of Cuts Healing in Rabbits of
(*Oryctolagus cuniculus*) using Jathropa latex
(*Jathropa curcas L.*) in The Gel Dosage Form

Have tested the effect of cuts healing in Rabbits of (*Oryctolagus cuniculus*) using Jathropa latex (*Jathropa curcas L.*) in the gel dosage form. This study aimed to determine whether the latex of Jatropha in gel form may provide a healing effect on cuts and determine the concentration of the latex of Jatropha (*Jathropa curcas L.*) in the formulation of effective healing cuts in test animals.

The latex is obtained by breaking the stem of Jatropha (*Jathropa curcas L.*) and at capacity, then formulated into a gel using HPMC base with sap concentration of 4%, 8%, and 16%. Effect on wound healing assay performed in Rabbits with injured along the 15mm and each day is smeared with gel latex of Jathropa and comparators Oxytetracycline[®] ointment until the wound healed.

The results showed that the gel formulation with a concentration of 4% Jathropa latex can heal for 8 days, concentration of 8% Jathropa latex heal for 7 days, and the concentration of 16% for 4 days, whereas by contrast Oxytetracycline[®] heal for 6 days.

From the research it can be concluded that the latex of Jathropa in the gel dosage form can provide the best healing effect on the concentration of 16% with the fastest healing time is 4 days.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kulit sebagai sistem organ tubuh yang paling luas tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Kulit membangun sebuah barier yang memisahkan organ-organ internal dengan lingkungan luar, dan turut berpartisipasi dalam banyak fungsi tubuh yang vital. Salah satu fungsi kulit yang sangat berperan adalah sebagai perlindungan yang sangat efektif terhadap invasi bakteri dan benda asing lainnya (Smeltzer, 2002: 1828). Adanya gangguan terhadap kulit akan mempengaruhi fungsi kulit itu sendiri. Hilang atau rusaknya sebagian jaringan kulit yang dapat disebabkan oleh trauma tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, atau gigitan hewan disebut sebagai luka (Pusponegoro. 1997 : 72). Luka didefinisikan sebagai suatu kerusakan integritas epitel dari kulit (Brown, 2004 : 1).

Luka yang terjadi dapat berupa kerusakan pada epidermis saja, mengenai epidermis dan sebagian dermis bahkan menembus kulit melampaui dermis hingga mencapai jaringan subkutan, otot, bahkan tulang tergantung faktor penyebab terjadinya luka. Dalamnya luka akan mempengaruhi kerusakan atau gangguan integritas kulit dan kematian sel-sel (Judd, 2007 : 13).

Luka yang menimpa seseorang dapat dikatakan suatu musibah yang merupakan cobaan dari Allah swt karena terjadi akibat kecelakaan yang tidak

disengaja. Tetapi dengan segala rahmatNya Allah menurunkan penyakit sekaligus obatnya. Obat itupun menjadi rahmat dan keutamaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah radiallahu'anh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخارى)

Artinya :

Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Saw. bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia Juga menurunkan obatnya. (H.R. Al-Bukhari) (Shihab, 1996)

Prinsip dan penanganan luka adalah dengan menghentikan perdarahan, mencegah infeksi karena kulit terbuka yang kemungkinan mudah ditumbuhi mikroorganisme dan memberi kesempatan sisa-sisa epitel untuk berpoliferasi dan menutup permukaan luka. Untuk mengobati luka, masyarakat biasanya menggunakan obat sintetik dan obat yang berasal dari alam. Obat yang berasal dari alam diperoleh dari tanaman-tanaman yang berkhasiat seperti getah Pisang, Lidah Buaya, Binahong, dan Cocor Bebek. Selain itu ditemukan pula satu tanaman yang secara empiris digunakan sebagai penyembuh luka yaitu getah Jarak Pagar.

Di daerah Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, getah jarak mempunyai peran khusus sebagai obat tradisional dalam acara adat Pukul Sapu Lidi. Acara yang digelar setiap 7 hari setelah lebaran ini diawali dengan

pengumpulan peserta yang terdiri dari para pemuda dengan membawa sapu lidi dan pohon jarak di sebuah rumah adat (*Rumah Tua Pesy*), Para pemuda kemudian saling baku pukul dengan menggunakan sapu lidi hingga peserta menjadi luka dan berdarah. Usai pementasan kemudian saling mengobati satu sama lain dengan meneteskan getah jarak pagar ke luka-luka mereka. Para peserta pukul sapu lidi mengaku dalam jangka 3-4 hari luka-luka mereka sembuh tanpa menggunakan obat-obat yang dibeli dari toko. Mereka juga mengaku tidak merasa gatal saat mengolesi getah jarak ke tubuh mereka. Getah jarak pagar juga memiliki sifat antimicrobial melawan bakteri *Streptococcus*, *Staphylococcus*, dan *Eschericia coli* yang merupakan bakteri penyebab infeksi pada luka.

Getah jarak pagar mengandung tanin, saponin, *wax*, dan resin (Siregar, 2007). Tanin diketahui memiliki kemampuan sebagai astringen, menghentikan perdarahan dan mencegah infeksi selama menyembuhkan luka internal , sedangkan saponin mempunyai kemampuan sebagai pembersih dan mampu memicu pembentukan kolagen I yang merupakan suatu protein yang berperan dalam penyembuhan luka. Selain itu ditemukan pula protease curcain yaitu enzim proteolitik yang ditemukan pada getah jarak pagar. Dutta *et al* (2010), melaporkan bahwa curcain yang terkandung dalam getah jarak pagar sebanyak 6% dan dapat menyembuhkan luka dengan konsentrasi 0,5% dan 1,0% (setara dengan getah 8% dan 16%).

Penggunaan getah jarak pagar dalam penyembuhan luka belum maksimal, karena penggunaannya yang kurang praktis jika harus disiapkan dan dioleskan langsung. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu formula yang dapat memudahkan penggunaannya seperti gel. Bentuk sediaan ini lebih mudah digunakan dan penyebarannya di kulit lebih cepat. Selain itu gel mempunyai sifat yang menyejukkan, melembabkan, mudah berpenetrasi pada kulit sehingga memberikan efek penyembuhan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka dilakukan penelitian tentang uji efek penyembuhan luka sayat getah jarak pagar (*Jathropa curcas* L.) dalam bentuk sediaan gel pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul di atas adalah :

1. Apakah getah Jarak pagar (*Jathropa curcas* L.) dalam bentuk sediaan gel dapat memberi efek terhadap penyembuhan luka sayatan?
2. Berapakah konsentrasi getah Jarak pagar (*Jathropa curcas* L.) dalam formulasi gel yang efektif menyembuhkan luka sayat pada hewan uji?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengetahui efek penyembuhan luka sayatan getah Jarak pagar (*Jathropa curcas* L.) dalam bentuk gel.
2. Mengetahui konsentrasi getah Jarak pagar (*Jathropa curcas* L.) dalam formulasi gel yang efektif menyembuhkan luka sayat pada hewan uji.

D. Manfaat Penelitian

1. Pemanfaatan bahan alam sebagai alternatif pengobatan luka sayatan
2. Mendapatkan konsentrasi getah Jarak pagar (*Jathropa curcas* L.) dalam sediaan gel yang memiliki efek penyembuhan luka



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kulit

Kulit merupakan “selimut” yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar (Trenggono, 2007: 11).

1. Fungsi Kulit

Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari mikroba. Selain itu, kulit merupakan suatu kelenjar holokrin yang besar (Trenggono, 2007: 11). Namun secara umum fungsi kulit menurut Djuanda (2001) adalah :

a. Fungsi proteksi

Menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, misalnya zat-zat kimia terutama yang bersifat iritan, gangguan yang bersifat panas, misalnya

radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar terutama kuman maupun jamur.

b. Fungsi absorpsi

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun yang larut lemak.

c. Fungsi ekskresi

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan ammonia.

d. Fungsi persepsi

Kulit mengandung ujung-ujung syaraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin oleh badan Krause. Rabaan diperankan oleh taktil meissner. Terhadap tekanan diperankan oleh badan *vates paccini*.

e. Fungsi pengaturan suhu tubuh

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit.

f. Fungsi pembentukan pigmen

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak dilapisan basal dan sel ini berasal dari rigi syaraf. (Rahman, 2010)

2. Anatomi Fisiologi Kulit

Luas kulit pada manusia kira-kira \pm 2 meter persegi, dengan berat 10 kg jika dengan lemaknya atau 4 kg jika tanpa lemak. Kulit terbagi atas tiga lapisan utama, yaitu :

1. Epidermis (kulit ari), sebagai lapisan yang paling luar.
2. Dermis (korium, kutis, kulit jangat)
3. Di bawah dermis terdapat subkutis atau jaringan lemak bawah kulit.

Para ahli histologi membagi epidermis dari bagian terluar hingga ke dalam menjadi 5 lapisan, yakni :

1. Lapisan tanduk (*stratum corneum*), sebagai lapisan paling atas
2. Lapisan jernih (*stratum lucidum*), disebut juga “lapisan *barrier*”
3. Lapisan berbutir-butir (*stratum granulosum*)
4. Lapisan Malphigi (*stratum spinosum*) yang selnya seperti berduri
5. Lapisan basal (*stratum germinativum*) yang hanya tersusun oleh satu lapisan sel-sel basal (Trenggono, 2007: 12)

a. Epidermis

Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh, yang paling tebal berukuran 1 milimeter, misalnya pada telapak tangan dan telapak kaki, dan lapisan yang tertipis berukuran 0,1 milimeter terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Sel-sel epidermis ini disebut keratinosit.

Lapisan epidermis ini terdiri atas stratum korneum, stratum lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basalis. Lapisan tanduk (stratum korneum) terdiri atas beberapa sel yang pipih, mati, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Lapisan ini sebagian besar terdiri atas keratin, jenis protein yang tidak larut dalam air, dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia. Hal ini berkaitan dengan fungsi kulit untuk memproteksi tubuh dari pengaruh luar. Secara alami, sel-sel yang sudah mati di permukaan kulit akan melepaskan diri untuk berregenerasi. Permukaan stratum korneum dilapisi oleh suatu lapisan pelindung lembap tipis yang bersifat asam, disebut mantel asam kulit.

Stratum lucidum (lapisan jernih) terletak tepat di bawah stratum corneum, merupakan lapisan yang tipis, jernih, mengandung eleiden, sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki.

Stratum granulosum (lapisan berbutir-butir) tersusun oleh sel keratinosit yang berbentuk poligonal, berbutir kasar, berinti mengkerut. Stoughton menemukan bahwa di dalam butir keratohyalin itu terdapat bahan logam, khususnya tembaga yang menjadi katalisator proses pertandukan kulit.

Stratum spinosum (lapisan malphigi) memiliki sel yang berbentuk kubus dan seperti berduri. Intinya besar dan oval. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Cairan limfe masih ditemukan mengitari sel-sel dalam lapisan malphigi ini.

Stratum germinativum (lapisan basal) adalah lapisan terbawah epidermis. Di dalam *stratum germinativum* juga terdapat di sel-sel melanosit, yaitu sel-sel yang tidak mengalami keratinisasi dan fungsi yang hanya membentuk pigmen melanin dan memberikannya kepada sel-sel keratinosit melalui dendrit-dendritnya (Trenggono, 2007: 12).

b. Dermis

Dermis membentuk bagian terbesar kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit. Lapisan ini tersusun dari dua lapisan yaitu papilaris dan retikularis.

Lapisan papilaris dermis berada langsung dibawah epidermis dan tersusun terutama dari sel-sel fibroblast yang dapat menghasilkan salah satu bentuk kolagen, yaitu suatu komponen dari jaringan ikat.

Lapisan retikularis terletak dibawah lapisan papilaris dan juga memproduksi kolagen serta berkas-berkas serabut elastik. Dermis juga tersusun dari pembuluh darah serta limfe, serabut saraf, kelenjar keringat serta sebacea, dan akar rambut. Dermis sering disebut sebagai kulit “sejati” (Smeltzer, 2002 :1825)

c. Subkutis

Menurut Syaifuddin (2003) Lapisan ini merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel lemak merupakan sel bulat, besar, dengan inti terdesak ke pinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. Sel-sel ini

membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan lainnya oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan ini berfungsi sebagai cadangan makan.

Lapisan lemak ini disebut penikulus adiposus yang tebalnya tidak sama pada tiap-tiap tempat dan juga pembagian antara laki-laki dan perempuan tidak sama (berlainan). Guna penikulus adiposus adalah sebagai shock beaker atau pegas bila tekanan trauma mekanis yang menimpa pada kulit, isolator panas atau untuk mempertahankan suhu, penimbunan kalori, dan tambahan untuk kecantikan tubuh. Di bawah subkutis terdapat selaput otot kemudian baru terdapat otot (Rahman, 2010)

3. Absorpsi Obat Melalui Kulit

Absorpsi bahan dari luar kulit kembali ke posisi di bawah kulit tercakup masuk ke dalam aliran darah, disebut sebagai absorpsi perkutan. Pada umumnya, absorpsi perkutan dari bahan obat ada pada preparat dermatologi seperti cairan, gel, salep, krim atau pasta tidak hanya tergantung pada sifat kimia fisika dari bahan obat saja, tapi juga pada sifat apabila dimasukkan ke dalam pembawa farmasetik dan pada kondisi dari kulit. Cukup dikenal bahwa walaupun pembawa farmasetik tidak dapat lebih jauh menembus kulit, atau pembawa bahan obat melalui kulit, terhadap kadar dan tingkat penembus kulit, pembawa tidak mempengaruhi laju dan derajat penetrasi zat obat, dan derajat serta laju penetrasi variasi dengan berbedanya obat dan pembawa. Oleh karena itu untuk absorpsi

perkutan dan efektivitas terapeutik, tiap kombinasi obat pembawa, harus diuji secara sendiri-sendiri (Ansel, 2008: 490-491).

Mungkin obat dapat mempenetrasi kulit yang utuh setelah pemakaian topikal melalui dinding folikel rambut, kelenjer keringat atau kelenjer lemak atau antara sel-sel dari selaput tanduk. Seharusnya bahan obat yang dipakai mudah memasuki kulit yang rusak atau pecah-pecah, akan tetapi sesungguhnya penetrasi semacam itu bukan absorpsi perkutan yang benar (Ansel, 2008: 491).

Apabila kulit utuh, maka cara utama untuk penetrasi obat umumnya melalui lapisan epidermis, lebih baik daripada melalui folikel rambut atau kelenjer keringat, karena luas permukaan yang terakhir ini lebih kecil jika dibandingkan kulit yang tidak mengandung elemen anatomi ini. Selaput yang menutupi lapisan tanduk umumnya tidak terus-menerus dan tidak mempunyai daya tahan terhadap penetrasi. Karena susunan dari bermacam-macam selaput dengan proporsi dan keringat yang diproduksi dan derajat daya pelepasnya melalui pencucian serta penguapan keringat, selaput bukan penghalang yang sesungguhnya terhadap pemindahan obat selama tidak memiliki komposisi, ketebalan atau kelanjutan yang tertentu (Ansel, 2008: 492).

Prinsip absorpsi obat melalui kulit adalah difusi pasif yaitu proses di mana suatu substansi bergerak dari daerah suatu sistem ke daerah lain dan terjadi penurunan kadar gradien diikuti Bergeraknya molekul. Menurut Martin (1993), difusi obat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Konsentrasi obat: semakin besar konsentrasi zat aktif, difusi obat akan semakin baik.
2. Koefisien partisi: perbandingan konsentrasi dalam 2 fase. Semakin besar koefisien partisi dan semakin cepat difusi obat.
3. Koefisien difusi: semakin luas membran, koefisien difusi semakin besar, difusi obat semakin meningkat.
4. Viskositas: semakin besar viskositas suatu zat, koefisien difusi semakin besar, dan difusi akan semakin lambat.
5. Ketebalan membran: semakin tebal membran, difusi akan semakin lambat.

Absorpsi per kutan suatu obat pada umumnya disebabkan oleh penetrasi obat melalui stratum korneum 10-15 μm , tebal lapisan datar mengeringkan sebagian demi sebagian jaringan mati yang membentuk permukaan kulit paling luar. Stratum korneum terdiri dari kurang lebih 40% protein (pada umumnya keratin) dan 40 % air dengan lemak berupa perimbangannya terutama sebagai trigliserida, asam lemak bebas, kolesterol dan fosfat lemak. Kandungan lemak dipekatkan dalam fase ekstraselular dan sebegitu jauh akan membentuk membran yang mengelilingi sel. Komponen lemak dipandang sebagai faktor utama yang secara langsung bertanggung jawab terhadap rendahnya penetrasi obat melalui stratum korneum. Sekali molekul obat melalui stratum korneum kemudian dapat terus melalui jaringan epidermis yang lebih dalam dan masuk ke dalam dermis apabila obat mencapai lapisan pembuluh kulit

maka obat tersebut siap untuk diabsorpsi ke dalam sirkulasi umum (Ansel, 2008: 492).

Stratum korneum sebagai jaringan keratin akan berlaku sebagai membran buatan yang semi permeabel, dan molekul obat mempenetrasi dengan cara difusi pasif. Jadi, jumlah obat yang pindah menyeberangi lapisan kulit tergantung pada konsentrasi obat, kelarutannya dalam air dan koefisien partisi minyak atau airnya. Bahan-bahan yang mempunyai sifat larut dalam keduanya, minyak dan air, merupakan bahan yang baik untuk difusi melalui stratum korneum seperti juga melalui epidermis dan lapisan-lapisan kulit (Ansel, 2008: 492).

Walaupun kulit telah dibagi secara histologi ke dalam stratum korneum, epidermis yang hidup, dan dermis secara bersama-sama dapat dianggap merupakan lapisan penghalang. Penetrasi obat melewati kulit dapat terjadi dengan dua cara :

- 1) Rute Transepidermal, merupakan jalur difusi melalui stratum korneum yang terjadi melalui dua jalur, yaitu jalur *transselular* yang berarti jalur melalui protein di dalam sel dan melewati daerah yang kaya akan lipid, sedangkan jalur interselular yang berarti jalur melalui ruang antarsel. Penetrasi transepidermal berlangsung melalui dua tahap. Pertama, pelepasan obat dari pembawa ke stratum korneum, tergantung dari koefisien partisi obat dalam pembawa dan stratum korneum. Kedua, difusi melalui epidermis dan dermis dibantu oleh aliran pembuluh darah dalam lapisan dermis (Hadyanti,2008).

2) Rute transappendageal, merupakan jalur masuknya obat melalui folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebacea disebabkan adanya pori-pori sehingga memungkinkan obat berpenetrasi. Penetrasi obat melalui jalur transepidermal lebih banyak (99,7% dari daya absorpsi perkutan) daripada jalur transappendageal lebih kecil. Berbagai faktor dapat mempengaruhi absorpsi kulit terhadap obat perkutan, yaitu faktor yang berasal dari tubuh, faktor dari lingkungan tubuh dan faktor obat perkutan yang dipakai. Obat perkutan yang dipakai akan menentukan daya absorpsi perkutan. Hal ini disebabkan karena setiap obat perkutan berbeda dalam cara, waktu, dan tempat pemakaian serta jenisnya. Perbedaan tersebut dapat berupa intensitas pemakaian, keasaman, konsentrasi bahan aktif dalam sediaan, serta jenis pembawa pada sediaan. Daya absorpsi obat perkutan ditentukan pula oleh tempat aplikasi sediaan, luas aplikasi sediaan, umur pemakai, dan struktur kulit yang diaplikasikan (Hadyanti, 2008).

B. Luka

Luka didefinisikan sebagai suatu kerusakan integritas epitel dari kulit. Definisi lain menyebutkan luka sebagai hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh. Keadaan ini dapat disebabkan oleh trauma tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik atau gigitan hewan (Brown, 2004 : Puspongoro, 1997)

Klasifikasi luka berdasarkan waktu terjadinya luka dapat dibagi menjadi luka kontaminasi dan luka infeksi. Pembagian luka ini berdasarkan

waktu kontaminasi (golden periode) yaitu 6-8 jam dimana setelah waktu 6-8 jam setelah terjadi luka maka bakteri yang ada telah mencapai koloni tertentu dan mengadakan invasi ke dalam jaringan sekitar luka atau pembuluh darah. Pada kondisi ini luka disebut sebagai luka infeksi (David, 1996).

Saat kita menentukan usia sebuah luka maka pertama harus ditentukan apakah luka tersebut akut atau kronik. Penentuan dapat menjadi sulit bila hanya berpatokan pada kurun waktu. Selain pertimbangan waktu maka perlu diingat bahwa luka disebut akut bila luka tersebut baru atau mencapai kemajuan penyembuhan luka sesuai yang diharapkan. Sementara luka kronik adalah luka yang tidak sembuh dalam waktu yang diharapkan. Hal yang penting adalah pada luka kronik proses penyembuhan melambat atau berhenti dan luka tidak bertambah kecil atau tidak bertambah dangkal. Meskipun dasar luka tampak merah, lembab dan sehat tetapi bila proses penyembuhan luka tidak mengalami kemajuan maka dikategorikan sebagai luka kronik (Judd, 2003: 30-32).

Luka akut akan mencapai penyembuhan normal melalui proses penyembuhan yang diharapkan dalam waktu tertentu untuk mencapai pemulihan integritas anatomi dan fungsi. Pada luka kronik maka terjadi kegagalan untuk mencapai penyembuhan yang diharapkan dalam waktu tertentu untuk menghasilkan pemulihan integritas anatomi dan fungsi. Penyembuhan luka kronik biasanya berkepanjangan dan tidak lengkap. Luka akut biasanya terjadi pada individu yang normal, sehat dan dapat dilakukan penutupan luka secara primer atau dibiarkan menyembuh secara sekunder.

Sebagian besar luka yang terjadi akibat trauma pada organ atau jaringan dapat dikategorikan sebagai luka akut. Luka kronik terjadi karena kegagalan proses penyembuhan luka akibat ada kondisi patologis yang mendasarinya. Luka kronik tidak akan sembuh bila penyebab yang mendasarinya tidak dikoreksi (Cohen, 1999).

Berdasarkan kedalaman luka maka luka dapat diklasifikasikan menjadi *superficial* yakni hanya mengenai epidermis saja, *partial thickness* yakni mengenai epidermis dan sebagian dermis, atau *full thickness* yakni luka menembus kulit melampaui dermis dapat mencapai jaringan subkutan, otot bahkan tulang (Judd, 2003: 34)

C. Penyembuhan Luka

Secara singkat, proses penyembuhan luka dibagi dalam 3 fase. Fase pertama yaitu fase inflamasi atau fase inisial (*lag phase*) yang berlangsung pada saat terjadinya luka sampai hari ke-5. Pada fase ini terjadi perdarahan, kemudian pembekuan / penghentian perdarahan akibat kontraksi otot polos dinding pembuluh darah yang terluka dan penggumpalan darah oleh trombin dan fibrin. Ikut keluar bahan pertahanan tubuh berupa sel-sel leukosit dan antibodi. Disini terjadi vasodilatasi pembuluh darah, oedema. (Dr. Bisono. 2002: 15)

Fase kedua yaitu fase fibroplasi atau fase proliferasi, berlangsung dari hari ke-6 sampai akhir minggu ke-3. Terjadi proliferasi sel-sel fibroblast yang berasal dari sel-sel mesensim yang belum berdiferensiasi. Terjadi pembentukan jaringan granulasi yang terdiri dari sel-sel fibroblast, serat kolagen yang

dihasilkan oleh sel fibroblast, deposit sel-sel radang, kapiler baru, hasil angiogenesis. Terjadi penciutan luka akibat kontraksi serat-serat kolagen yang mempertautkan tepi luka. Terjadi epitelisasi akibat proses migrasi dan proses mitosis sel-sel stratum basal dan keratinosit lain yang terpapar luka (sel-sel kelenjar sebaceous, kelenjar keringat, dan akar rambut) ke tengah luka.

Semua proses ini akan berhenti bila seluruh permukaan luka sudah tertutup epitel. Orang awam mengatakan luka sudah sembuh/sudah kering. Sebaliknya, proses akan berjalan terus bila permukaan luka belum tertutup epitel.

Fase terakhir adalah fase maturasi atau fase resorpsi saat semua bentukan-bentukan baru akibat proses penyembuhan akan diresorpsi kembali atau mengkerut menjadi matur. Hal ini berlangsung selama 2 bulan atau lebih bahkan bisa sampai 1 tahun. Tanda-tanda yang menunjukkan fase ini sudah berakhir, semua tanda radang hilang, pucat, tak ada rasa sakit/gatal, lemas tak ada indurasi, kempis pembengkakan sudah hilang. (Bisono. 2002:16-17)

D. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi Tumbuhan (Dadang, 2006: 9)

- Divisi : Spermatophyta
- Sub divisi : Angiospermae
- Kelas : Dicotyledonae
- Ordo : Euphorbiales
- Famili : Euphorbiaceae
- Genus : Jatropha

Spesies : *Jatropha curcas* Linn.

2. Nama Daerah (Dadang, 2006: 9)

Jarak budeg, Jarak gundul, Jarak cina (Jawa): Baklawah, Nawaih (NAD): Jarak kosta (Sunda): Paku kare (Timor): Peleng kaliki (Bugis): Kalekhe pagar (Madura): Jarak pager (Bali): Lalu mau, Pak ukase, Jarak pagah (Nusa Tenggara): Kuman nema (Alor): dan Ai huwa kamala, Balacai, Kadoto (Maluku)

3. Morfologi Tumbuhan (Dadang, 2006: 10-12)

Tanaman Jarak pagar berupa perdu dengan tinggi 1-7 m, bercabang tidak teratur. Batangnya berkayu, silindris, dan bila terluka mengeluarkan getah. Bagian-bagian tanaman Jarak pagar adalah sebagai berikut:

a. Daun

Daun tanaman Jarak pagar adalah daun tunggal berlekuk, dan bersudut 3 atau 5. Daun tersebar di sepanjang batang. Permukaan atas dan bawah daun berwarna hijau dengan bagian bawah lebih pucat dibanding permukaan atas. Daunnya lebar dan berbentuk jantung atau bulat telur melebar dengan panjang 5-15 cm. Helai daunnya bertoreh, berlekuk, dan ujungnya meruncing. Tulang daun menjari dengan jumlah 5-7 tulang daun utama. Daunnya dihubungkan dengan tangkai daun. Panjang tangkai daun antara 4-15 cm.

b. Bunga

Bunga tanaman jarak pagar adalah bunga majemuk berbentuk malai, berwarna kuning kehijauan, berkelamin tunggal, dan berumah satu (putik dan benang sari dalam satu tanaman). Bunga betina 4-5 kali lebih banyak dari bunga jantan. Bunga jantan maupun bunga betina tersusun dalam rangkaian berbentuk cawan yang tumbuh di ujung batang atau ketiak daun. Bunganya mempunyai 5 kelopak berbentuk bulat telur dengan panjang kurang lebih 4 mm. Benang sari mengumpul pada pangkal dan berwarna kuning. Tangkai putik pendek berwarna hijau dan kepala putik melengkung keluar berwarna kuning. Bunganya mempunyai 5 mahkota berwarna keunguan. Setiap tandan terdapat lebih dari 15 bunga.

Jarak pagar termasuk tanaman *monoecious* dan bunganya uniseksual. Kadangkala muncul bunga hermaprodit yang berbentuk cawan berwarna hijau kekuningan.

c. Buah

Buah tanaman Jarak pagar berupa buah kotak berbentuk bulat telur dengan diameter 2-4 cm. Panjang buah 2 cm dengan ketebalan sekitar 1 cm. Buah berwarna hijau ketika muda serta abu-abu kecokelatan atau kehitaman ketika masak. Buah jarak terbagi menjadi 3 ruangan, masing-masing ruang berisi satu biji sehingga dalam setiap buah terdapat 3 biji.

Biji berbentuk bulat lonjong dan berwarna coklat kehitaman. Biji inilah yang banyak mengandung minyak dengan rendamen sekitar 30-50% dan mengandung toksin sehingga tidak dapat dimakan.

4. Kandungan Kimia (Sinaga, 2007: Siregar, 2007)

- a. Triakontranol, alfa-amirin, kaempsterol, beta-sitosterol, 7-keto-betasitosterol, stigmasterol, stigmas-5-en-3-beta-7-alfadiol, viteksin, isoviteksin, dan asam sianida (HCN)
- b. Daun mengandung saponin, flavonoida, tannin dan senyawa polifenol
- c. Batang mengandung sponin, flavonoida, tannin dan senyawa-senyawa polifenol.
- d. Getahnya mengandung tannin 11–18 %, saponin, *wax*, resin, dan protease curcain.
- e. Bijinya mengandung berbagai senyawa alkaloida, saponin, dan sejenis protein beracun yang disebut kursin. Biji mengandung 35–45 % minyak lemak, yang terdiri dari berbagai trigliserida asam palmitat, stearat, dan kurkanolat.

5. Kegunaan (Mariam, 2006)

Manfaat dari bagian keseluruhan tanaman yaitu :

- a. Daun : untuk pengembangan ulat sutera (eri silkworm), pengobatan (pencabar, reumatik, malaria, radang), sumber zat anti radang.
- b. Getah : mengandung protease penyembuh luka (curcain), pengobatan (infeksi jamur, sengatan serangga, masalah pencernaan).

- c. Biji : insektisida, makanan/pakan ternak (jika berasal dari varietas yang tidak beracun), produktivitas setelah 5 tahun menghasilkan 5-25 ton/ha/tahun.
- d. Daging buah: bahan bakar, pupuk hijau, produksi biogas.
- e. Minyak biji : produksi sabun, bahan bakar, insektisida, pengobatan (pencahar, kontraseptif, ascites, dsb).

6. Pengolahan Getah

Getah adalah cairan kental yang keluar dari tubuh tumbuhan. Pengolahan getah tanaman dalam pembuatan sediaan dapat dilakukan dengan cara diserbukkan. Berdasarkan penelitian Dutta *et al* (2010), getah jarak pagar dapat diserbukkan dengan penyimpanan pada suhu 5-8 °C selama 24 jam.

E. Gel

1. Definisi Gel

Gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispersi yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan saling diserapi cairan (Ansel,2008: 390). Gel terdiri dari dua fase kontinu yang saling berpenetrasi. Fase yang satu berupa padatan, tersusun dari partikel-partikel yang sangat tidak simetris dengan luas permukaan besar, sedang yang lain adalah cairan (Martin, 1971: 537).

Idealnya pemilihan *gelling agent* dalam sediaan farmasi dan kosmetik harus inert, aman, tidak bereaksi dengan komponen lain.

Penambahan *gelling agent* dalam formula perlu dipertimbangkan yaitu tahan selama penyimpanan dan tekanan tube selama pemakaian topikal. Beberapa gel terutama polisakarida alami peka terhadap derajat mikrobial. Penambahan bahan pengawat perlu untuk mencegah kontaminasi dan hilangnya karakter gel dalam kaitannya dengan mikrobial (Lieberman,1996)

2. Komposisi Gel

a. Basis gel

Berdasarkan komposisinya, basis gel dapat dibedakan menjadi basis gel hidrofobik dan basis gel hidrofilik (Ansel, 2008: 392).

1) Basis gel hidrofobik.

Basis gel hidrofobik terdiri dari partikel-partikel anorganik. Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, bilamana ada, hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan hidrofilik, bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus .

Menurut Allen (2002) Basis gel hidrofobik antara lain petrolatum, *mineral oil*/gel polyethilen, plastibase, alumunium stearat, dan carbowax (Hardiyanti, 2010)

2) Basis gel hidrofilik

Basis gel hidrofilik umumnya adalah molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut. Pada umumnya karena daya tarik menarik pada pelarut dari bahan-bahan

hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik menarik dari bahan hidrofobik, sistem koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar (Ansel: 2008: 392).

Basis gel hidrofilik antara lain bentonit, tragakan, derivat selulosa, karbomer, polivinil alkohol, alginat (Voight, 1995: 341).

Karbomer adalah polimer *carboxyvinyl* yang memiliki berat molekul yang besar. Secara relative karbomer dapat membentuk gel dengan konsentrasi yang rendah. Karbomer digunakan sebagian dalam formulasi sediaan cair atau semisolid sebagai pensuspensi atau peningkat viskositas. Karbomer biasanya digunakan dalam cream, gel, salep untuk preparat mata, rektal, dan sediaan topikal (Kibbe, 2000 & Lund, 1994)

Bentonit adalah alumunium silikat hidrat yang digunakan terutama pada formulasi suspense, gel, dan untuk sediaan topical. Bentonit juga digunakan sebagai serbuk suspense dalam sediaan cair dan sebagai pengemulsi minyak dalam air (O/W). (Kibbe, 2000: 30)

Derivat selulosa digunakan sebagai *gelling agent* baik yang sintetik maupun semisintetik. Kelarutan derivat selulosa dalam air berbeda-beda. Contoh dari derivat selulosa adalah metilselulosa, natrium karboksimetilselulosa, hidroksipropil metilselulosa (*hypromellose*), hidroksietilselulosa, dan mikrokristalin selulosa (Lund, 1994: 149).

Hidroksipropil metilselulosa (HPMC) merupakan salah satu bahan yang bisa digunakan sebagai basis gel. HPMC merupakan serbuk putih atau putih kekuningan, tidak berbau, dan tidak berasa, larut dalam air dingin, membentuk cairan yang kental, praktis tidak larut dalam kloroform, etanol (95%), dan eter. HPMC mempunyai pH 5,5-8,0 biasanya digunakan sebagai emulgator, suspending agent, dan stabilizing agent dalam sediaan salep dan gel topikal (Kibbe, 2000: 252).

HPMC digunakan sebagai pembentuk gel pada produk farmasi dengan konsentrasi 2-10% (Ofner : 1332)

Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pembengkak, air, penahan lembab dan bahan pengawet (Voigt, 1995: 340).

Keuntungan gel hidrofilik antara lain: daya sebar pada kulit baik, efek dingin yang ditimbulkan akibat lambatnya penguapan air pada kulit, tidak menghambat fungsi fisiologis kulit khususnya *respiratio sensibilis* oleh karena tidak melapisi permukaan kulit secara kedap dan tidak menyumbat pori-pori kulit, mudah dicuci dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut dan pelepasan obatnya baik (Voigt, 1995: 335).

b. Humektan (Penahan lembab)

Humektan digunakan untuk mengurangi kehilangan air pada sediaan semisolid. Pemilihan humektan tidak didasarkan hanya pada

pengaruhnya terhadap disposisi air tetapi juga memberikan efek terhadap viskositas dan konsistensi dari produk akhir (Lund, 1994: 150).

Penahan lembab yang ditambahkan, yang juga berfungsi sebagai pembuat lunak harus memenuhi berbagai hal. Pertama, harus mampu meningkatkan kelembutan dan daya sebar sediaan, kedua melindungi dari kemungkinan menjadi kering. Sebagai penahan lembab dapat digunakan gliserol, sorbitol, etilen glikol dan propilen glikol dalam konsentrasi 10-20% (Voigt, 1995: 340-341).

Gliserin digunakan dalam sediaan oral, ophthalmic, topical, dan parenteral. Juga digunakan dalam kosmetik dan tambahan makanan. Pada sediaan farmasi biasanya digunakan sebagai humektan dan pelembut. Konsentrasi yang digunakan sampai 30% (Kibbe, 2000: 220).

c. Pengawet (*Preservatives*)

Disebabkan oleh tingginya kandungan air pada gel, sediaan ini dapat mengalami kontaminasi mikrobial, yang secara efektif dapat dihindari dengan penambahan bahan pengawet. (Voigt, 1995: 335).

Pengawet seharusnya tidak toksik dan tidak memberikan reaksi alergi, dan memiliki kemampuan sebagai bakterisid daripada bakteriostatik. Berikut adalah pengawet yang secara luas digunakan pada krim, gel, dan salep yaitu kloroform: asam organik, contohnya, asam benzoate, dan asam sorbat: senyawa ammonium kuartener, contohnya cetrimide, dan ester hidroksibenzoat seperti metal paraben, etil paraben, propyl paraben dan butyl paraben (Lund, 1994: 152).

Metil paraben digunakan sebagai pengawet pada kosmetik, makanan, dan sediaan farmasetik. Memiliki pemerian, serbuk putih, berbau, higroskopik, dan mudah larut dalam air. Dapat digunakan sendiri, kombinasi dengan pengawet paraben lain atau dengan antimikroba lainnya. Konsentrasi sebagai pengawet 0,02 - 0,3 % (Kibbe, 2000: 340).

F. Tinjauan Islam Tentang Tanaman Obat

Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat di Negara kita banyak ditimpa berbagai penyakit yang disebabkan oleh beberapa hal. Musibah yang datang tersebut merupakan cobaan dari Allah swt. kepada hambaNya akan tetapi dengan segala rahmatNya Allah menurunkan penyakit sekaligus obatnya. Obat itupun menjadi rahmat dan keutamaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah radiallahu' anhu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

Artinya :

Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi saw. bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia Juga menurunkan obatnya. (H.R. Al-Bukhari) (Shihab, 1996)

Dari hadist di atas jelaslah bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga tidak mungkin Allah memberikan penyakit tanpa ada obatnya. Disisi lain Allah juga memberikan anugerah berupa akal pikiran kepada manusia untuk berpikir agar dapat menemukan obat dari berbagai macam penyakit yang diturunkan oleh Allah swt.

Setiap ciptaan Allah itu pasti ada anti penawarnya. Maka setiap penyakit pasti ada obatnya yang menjadi anti penawarnya agar penyakit itu sembuh. Itu merupakan poin lebih dari hanya sekedar keberadaan obat itu. Karena kalau obat itu diberikan dengan cara yang kurang tepat, dengan diberikan dosis yang berlebih dari stadium penyakit dalam pemakaiannya atau jumlah dan kuantitasnya lebih dari yang seharusnya, justru itu bisa menyebabkan munculnya penyakit lain. Namun kalau dosisnya kurang, juga tidak bisa mengobati dan pengobatan seperti ini tidaklah sempurna. Ketika orang yang diobati tidak menerima obat itu, atau obatnya tidak mengenai penyakitnya, maka tidak akan sembuh.

Waktu pemberian yang kurang tepat, juga bisa menyebabkan obat tersebut tidak berefek. Contohnya setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan interaksi obat sehingga efek obat bisa berkurang. Sehingga efek penyembuhan dari obat yang diharapkan tidak tercapai karena tidak ada kesesuaian. Kalau benar-benar ada kesesuaian, penyakit dan obat pasti sembuh dengan izin Allah. (Ar-Rumaikhon,2008)

Obat dari setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Dan Allah menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan di obati sehingga akan mendorong kesembuhan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis yang berasal dari sahabat Jabir ra bahwa Nabi saw. bersabda yang artinya: “Karena setiap penyakit ada obatnya, maka pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Pengobatan yang sesuai

dengan penyakitnya itu akan segera diberi kesembuhan oleh Allah swt.” (HR. MUSLIM).

Dalam sebuah hadis dikatakan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ (رواه النسائي)

Artinya:

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : “Barangsiapa mengobati seseorang, sedangkan dia tidak mengetahui tentang pengobatan sebelumnya, maka dialah yang bertanggung jawab”.

Selain itu, terdapat pula hadis yang diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ إِذْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Jabir dari Rasulullah saw. bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, maka apabila didapati obat yang cocok untuk menyembuhkan sesuatu penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah ‘Azza wajallah (H.R. Muslim).

Firman Allah swt. Q.S. al-Syu’Arā/26:80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku (Dep. Agama, 2009 : 370)

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, menjelaskan kepada kita untuk terus berusaha dan yang menentukan hasilnya adalah Allah swt. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, jika suatu penyakit menyerang kita dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu dengan menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan.

Biasanya setelah berobat ada yang langsung sembuh, dan ada pula yang membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Ini berarti masalah kesembuhan suatu penyakit tergantung pada ridha dan izin Allah swt.

Dewasa ini beragam cara yang digunakan masyarakat untuk berobat, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan karena selain murah juga efek samping yang ditimbulkan sangat jarang. Olehnya itu para peneliti mulai bermunculan untuk melakukan penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat sebagai obat. Apalagi mengingat negara kita yang kaya akan sumber daya alamnya.

Kita sebagai makhluk ciptaan Allah dianjurkan untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah limpahkan kepada kita dengan memanfaatkan ciptaan-Nya dengan baik termasuk tumbuh-tumbuhan yang sengaja Allah ciptakan untuk manusia. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an Q.S. al-Hijr/15:19

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan segala sesuatu menurut ukuran (Dep. Agama, 2009 : 23)

Dipahami oleh sebagian ulama bahwa Allah menumbuh kembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup dan menetapkan bagi sebagian tanaman itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu. Sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga, Allah swt. Menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Tāhā/20:53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

(Tuhan) yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan menurunkan dari air (hujan) dari langit. “Kemudian Kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan (Dep. Agama, 2009 : 315)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa banyak jenis tumbuhan yang mampu tumbuh di bumi ini dengan adanya air hujan, banyak jenis tumbuhan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, ada tumbuhan yang tergolong kedalam tumbuhan tingkat rendah yaitu tumbuhan yang tidak jelas bagian akar, batang dan daunnya. Golongan selanjutnya lebih mengalami perkembangan adalah tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan yang bisa dibedakan secara jelas bagian daun, batang dan akarnya .

Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat adalah bagian daun, batang, akar, rimpang, bunga, buah dan bijinya, tercantum dalam Q.S. al-Syu'arā/26 :7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik? (Dep. Agama, 2009 : 367).

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit, dan ini merupakan anugrah Allah swt. yang harus dipelajari dan dimanfaatkan seperti disebutkan dalam QS. al-Qaṣaṣ/28:57

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا
تُجَبَّىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

Dan mereka berkata: “Jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami,” (Allah berfirman) Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami?. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (Dep. Agama, 2009 : 392).

Ayat tersebut mengisyaratkan agar kita mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi

kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan.

Sebagian orang menganggap bahwa agama tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan umat manusia. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa agama hanya memperhatikan aspek-aspek rohaniyah dan tidak memperhatikan aspek-aspek jasmaniyah. Agama hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat ukhrawi, dan lalai terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Anggapan seperti ini tidak di benarkan dalam ajaran agama islam. Sebab pada kenyataannya islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan yaitu kebaikan dunia dan ukhrawi. Jadi dalam hal ini islam sebenarnya sangat memperhatikan yang namanya kesehatan. Seperti yang terdapat dalam Q.S al-Nahl/16: 11

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir (Dep. Agama, 2009 : 268)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tumbuhan itu terdiri dari berbagai macam jenis. Setiap jenis mempunyai manfaat tersendiri berdasarkan kandungan zat aktif yang terdapat di dalamnya. Seperti tanaman getah jarak pagar yang memiliki banyak kandungan untuk menyembuhkan luka. Manfaat-manfaat tersebut hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mau memikirkan

dan mengkaji secara mendalam tentang kandungannya. Sehingga bisa mempertebal keyakinan akan kebesaran Allah swt. Dan menambah wawasan akan manfaat keanekaragaman tumbuhan untuk kemaslahatan umat manusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat gelas (Iwaki Pyrex), bunsen, cawan porselin, jangka sorong (Sellery[®]), lumpang, penangas air, pisau bedah steril (Braun[®]), thermometer, timbangan analitik (Metler Toledo[®])

2. Bahan

Air suling, Getah Jarak pagar (*Jathropa curcas* L.), Gliserin, HPMC (*Hydroxypropyl Methylcellulose*), Kasa Hydrophille (Tirta Husada[®]), Metil Paraben, Oxytetracycline[®] salep, Plester kain (Hansaplast[®]).

B. Metode Kerja

1. Penyiapan sampel

a. Pengambilan Sampel

Sampel yang diperoleh dari getah Jarak pagar (*Jathropa curcas* L.) diambil dari tanaman Jarak pagar yang tumbuh di daerah Makassar. Pengambilan getah dilakukan dengan cara mematahkan ranting Jarak Pagar kemudian ditampung cairan getah tetes demi tetes ke dalam wadah. Dilakukan pada pagi hari sekitar jam 06.00 agar getah yang diperoleh cukup banyak.

b. Pengolahan sampel

Getah yang diperoleh dikeringkan pada suhu 5-8 °C selama 24 jam.

2. Pembuatan Sediaan Gel

a. Rancangan Formula

Tabel 1. Komposisi formula sediaan gel getah jarak pagar

No.	Nama bahan	Konsentrasi (%)		
		Formula I	Formula II	Formula III
1.	Getah jarak pagar	4	8	16
2.	HPMC	6	6	6
3.	Metil Paraben	0,02	0,02	0,02
4.	Gliserin	20	20	20
5.	Air suling (sampai)	100	100	100

b. Pembuatan formula

Basis HPMC dikembangkan dengan air suling dingin dalam beker gelas. Ditambahkan metil paraben yang sebelumnya telah dilarutkan dalam air suling panas suhu 75⁰ C dihomogenkan. Kemudian getah jarak pagar digerus bersama gliserin dan ditambahkan ke dalam basis, setelah itu dihomogenkan hingga terbentuk gel.

3. Pengujian Efek Penyembuhan Luka Gel Getah Jarak Pagar

a. Penyiapan hewan coba

Kelinci diadaptasikan selama 2 minggu dalam kondisi ruangan laboratorium dengan tetap diberi makanan dan minuman. Kelinci yang digunakan adalah kelinci jantan (*Oryctolagus cuniculus*) sehat dan memiliki berat badan antara 1,5 sampai 2 kg.

b. Pengujian terhadap hewan coba

Efek penyembuhan luka dilakukan terhadap hewan coba kelinci yang sehat, dimana pertama-tama yang dilakukan yaitu dengan mencukur bulu pada bagian yang ingin dilukai, yakni pangkal paha, kemudian dilukai dengan benda tajam (pisau bedah) steril dengan kedalaman luka $\pm 0,5$ cm serta panjang luka 1,5 cm. Digunakan 4 kelinci, masing-masing untuk satu perlakuan dengan pembagian sebagai berikut :

Kelompok I : Luka dioleskan sediaan gel yang mengandung 4% getah Jarak pagar (Formula I) sebanyak 3 gr.

Kelompok II : Luka dioleskan sediaan gel yang mengandung 8% getah Jarak pagar (Formula II) sebanyak 3 gr.

Kelompok III : Luka dioleskan sediaan gel yang mengandung 16% getah Jarak pagar (Formula III) sebanyak 3 gr.

Kelompok IV : Luka dioleskan sediaan Oxytetracycline®

Ditutup dengan kasa steril, diganti dan dioleskan gel getah jarak pagar setiap harinya. Masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3x.

4. Pengukuran Efek Penyembuhan Luka

Pengukuran efek penyembuhan luka dilakukan berdasarkan profil penyembuhan luka antara lain: waktu penutupan luka, dan penurunan panjang luka.

5. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan dan analisis data dilakukan berdasarkan pengukuran penurunan panjang luka serta waktu yang diperlukan hingga luka pada hewan coba sembuh dengan menggunakan formulasi sediaan gel yang mengandung getah Jarak pagar (*Jathropha curcas L.*) pada konsentrasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil uji efek penyembuhan luka sayat gel getah Jarak Pagar (*Jathropa curcas* L.) yaitu :

Tabel 2. Efek penyembuhan luka gel getah Jarak Pagar (*Jathropa curcas* L.)

Hari ke-	Panjang luka (mm)				Lebar luka (mm)				Penyembuhan luka (%)			
	Formula				Formula				Formula			
	I	II	III	P	I	II	III	P	I	II	III	P
1	15	15	15	15	6,9	6,6	6,7	6,6	0	0	0	0
2	12,2	12,6	9,2	11,5	11,1	8,8	4,5	9,9	-60,3	-49,5	33,0	-49,0
3	7,9	7,9	5,2	7,93	9,2	5,9	3,4	7,2	-39,5	11,1	48,2	-9,1
4	6,8	6,0	3,2	5,8	6,6	4,6	2,2	5	4,9	33,1	66,7	24,8
5	5,5	4,4	0,67	4,2	4,8	3,4	0	3,3	30,3	48,6	100	49,1
6	4,6	2,1	0	2,9	3,6	2,1	0	1,5	47,4	68,4	100	76,3
7	2,9	0	0	0	2,1	0	0	0	68,9	100	100	100
8	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100

Keterangan :

I : Gel dengan getah Jarak pagar 4%

II : Gel dengan getah Jarak pagar 8%

III : Gel dengan getah Jarak pagar 16%

P : Oksitetrasiklin

B. Pembahasan

Luka sayat didefinisikan sebagai luka yang disebabkan oleh benda tajam seperti pisau, silet, pecahan kaca,dll (Mitchell,2009:286). Luka sayat yang terjadi akibat trauma tajam dapat menyebabkan pendarahan, infeksi karena kulit terbuka yang kemungkinan mudah ditumbuhi mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan luka menjadi kronik yaitu luka yang tidak sembuh dalam waktu

yang diharapkan (Cohen, 1999). Pada kondisi ini akan terjadi reaksi inflamasi dengan gejala timbulnya *kalor* (panas), *rubor* (kemerahan), *tumor* (bengkak), *dolor* (rasa sakit), dan kehilangan fungsi pada jaringan tersebut.

Jarak pagar (*Jathropha curcas* L.) menghasilkan getah yang oleh masyarakat Morella dimanfaatkan untuk menyembuhkan luka setelah prosesi adat “Pukul Sapu Lidi”. Getah jarak sangat mudah diperoleh karena pohon Jarak Pagar sangat banyak tumbuh liar dipinggir jalan. Getah Jarak pagar diperoleh dengan cara mematahkan rantingnya sehingga cairan getah keluar. Waktu pengambilan dilakukan pada pagi hari pukul 06.00 WITA agar getah yang diperoleh cukup banyak.

Getah jarak pagar memiliki kandungan tanin, saponin, wax, dan resin. Tanin yang memiliki kemampuan sebagai astringen dapat menghentikan pendarahan, dan mencegah terjadinya infeksi, sedangkan saponin mempunyai kemampuan sebagai pembersih dan mampu memicu pembentukan kolagen yang merupakan protein yang berperan dalam penyembuhan luka. Selain itu kandungan protease curcain yaitu enzim proteolitik pada getah jarak pagar dapat mempercepat penyembuhan luka (Dutta K *et al*, 2010).

Getah jarak pagar diformulasi dalam bentuk sediaan gel. Gel mempunyai sifat menyejukkan dan dapat meredam reaksi inflamasi yang terjadi, selain itu gel mudah digunakan, penyebarannya dikulit lebih cepat, mudah berpenetrasi pada kulit sehingga memberikan efek penyembuhan yang baik. Reaksi inflamasi yang terjadi akan mengakibatkan terjadinya panas, kemerahan, rasa sakit dan akhirnya

kehilangan fungsi. Dengan menggunakan gel, yang memiliki sifat menyejukkan memberikan efek dingin sehingga dapat meredam gejala proses terjadinya inflamasi. Reaksi inflamasi terjadi akibat proses pertahanan dasar tubuh terhadap adanya serangan yang mengancam keadaan fisiologis tubuh. Inflamasi dapat diidentifikasi oleh empat tanda utama yaitu kemerahan, nyeri, panas, bengkak, dan kehilangan fungsi (kadang-kadang). Proses peradangan diawali dengan masuknya zat toksin (mikroorganisme) kedalam tubuh akibat luka yang terbuka. Mikroorganisme yang masuk kedalam tubuh umumnya memiliki suatu zat toksin tertentu yang dikenal sebagai pirogen eksogen. Dengan masuknya mikroorganisme tersebut tubuh akan berusaha mencegahnya dengan memerintahkan leukosit untuk memfagositnya. Dengan adanya proses fagositosis ini leukosit akan mengeluarkan zat kimia yang dikenal sebagai pirogen endogen. Hasil akhir respon inflamasi adalah vasodilatasi (pembengkakan pembuluh darah) pada tempat yang terkena. Vasodilatasi meningkatkan permeabilitas dan migrasi sel makrofagosit ke bagian cedera. Kumpulan sel darah putih pada daerah yang cedera dapat dikenal dengan sebagai zat berwarna putih nanah, yaitu kumpulan sel mati dan cairan. Pada beberapa kasus cedera dan inflamasi, suhu tubuh dapat meningkat dari suhu tubuh normal (Watson, 2002 : 409).

Luka yang terjadi setelah kulit kelinci disayat pertama-tama mengalami pendarahan, kemudian hari berikutnya diameter luka membesar akibat terjadinya reaksi inflamasi. Penyebab diameter luka membesar terjadi akibat pembekuan /penghentian perdarahan akibat kontraksi otot polos dinding pembuluh darah yang

terluka dan penggumpalan darah oleh trombin dan fibrin. Ikut keluar bahan pertahanan tubuh berupa sel-sel leukosit dan antibodi. Disini terjadi vasodilatasi pembuluh darah sehingga terjadi oedema.

Basis yang digunakan dalam formulasi getah jarak pagar ini merupakan basis gel hidrofilik yaitu Hidroksipropil metilselulosa (HPMC) yang mempunyai pH 5,5-8,0 agar sesuai dengan pH kulit, jika pH basis terlalu asam atau terlalu basa maka luka akan terasa perih. Basis ini biasanya digunakan sebagai emulgator, suspending agent, dan stabilizing agent dalam sediaan salep dan gel topical. Selain basis di gunakan pula bahan tambahan berupa humektan yang digunakan untuk mengurangi kehilangan air pada sediaan semisolid, pengawet seperti metil paraben yang secara efektif dapat menghilangkan kontaminasi mikroba yang disebabkan oleh tingginya kandungan air pada gel.

Formulasi gel getah Jarak Pagar dibuat dalam 3 konsentrasi yaitu 4%, 8%, dan 16%. Konsentrasi ini didasarkan pada penelitian Dutta *et all* (2010) yang melaporkan bahwa curcain yang terkandung dalam getah Jarak Pagar sebanyak 6% dan dapat mempercepat penyembuhan luka dengan konsentrasi 0,5% dan 1,0%. Sebagai pembanding digunakan salep oxytetracycline[®]. Hal ini dilakukan untuk membandingkan efek penyembuhan gel getah Jarak Pagar (*Jathropha curcas*) dengan obat yang biasa digunakan masyarakat dalam penyembuhan luka yang beredar dipasaran, digunakan salep oxytetracycline[®] yang berfungsi sebagai antiinfeksi, karena tidak adanya obat luka yang beredar di pasaran. Luka dengan fungsi fisiologis kulit dapat sembuh dengan sendirinya, tetapi karena luka

mengakibatkan kulit terbuka maka sangat mudah ditumbuhi mikroorganisme, sehingga obat yang berada dipasaran hanya bersifat sebagai antiinfeksi untuk mencegah terjadinya infeksi yang dapat memperparah luka dan memperlambat proses penyembuhan luka.

Setelah reaksi inflamasi berhenti terjadilah proses penutupan luka. Proses penutupan luka terjadi dimulai dari pembentukan jaringan granular yang terdiri dari sel-sel fibroblast, serat kolagen yang dihasilkan oleh sel fibroblast, deposit sel-sel radang, kapiler baru, hasil angiogenesis. Penciutan luka terjadi akibat kontraksi serat-serat kolagen yang mempertautkan tepi luka, selanjutnya terjadi epitelisasi akibat proses migrasi dan proses mitosis sel-sel stratum basal dan keratinosit lain yang terpapar luka (sel-sel kelenjar sebaceous, kelenjar keringat, dan akar rambut) ke tengah luka.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh rata-rata persentase penyembuhan luka yaitu bahwa ketiga gel ini memberikan efek penutupan luka yang cepat setelah pemberian formula. Efek penyembuhan luka sayat terbaik diberikan oleh gel dengan konsentrasi getah jarak pagar 16%, ini ditandai terjadinya penyembuhan (penutupan luka) 100% pada hari ke-4 untuk konsentrasi 4% penyembuhan (penutupan luka) 100% terjadi pada hari ke-8, sedangkan untuk konsentrasi 8% penyembuhan (penutupan luka 100%) terjadi pada hari ke-6. Untuk salep oxytetracyclin[®] sebagai kontrol penyembuhan (penutupan luka) 100% terjadi pada hari ke-6. Ini berarti proses penyembuhan dengan menggunakan ketiga formula berlangsung lebih cepat dari penyembuhan luka secara normal. Hal

ini disebabkan oleh kandungan kimia dari getah Jarak pagar (*Jathropa curcas* L.) yaitu saponin yang dapat mempercepat pertumbuhan kolagen yang berperan pada proses penciutan luka.

Hasil analisis statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL) uji efek penyembuhan luka gel getah Jarak pagar terhadap kelinci dengan menggunakan gel yang mengandung konsentrasi getah jarak pagar berbeda yaitu 4%, 8%, 16%, dan salep Oxytetracycline[®] menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecepatan penutupan luka (penyembuhan) dari tiap perlakuan, dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ _{0,05} dan _{0,01}. Uji Beda nyata jujur (BNJ) menunjukkan bahwa kecepatan mulai penutupan luka antara gel dengan konsentrasi getah Jarak pagar 4% dan Oxytetracycline[®] memperlihatkan hasil non signifikan (tidak berbeda nyata) sedangkan konsentrasi 8% dan 16% memperlihatkan hasil yang sangat signifikan (sangat berbeda nyata) terhadap Oxytetracycline. Sedangkan hubungan antara formula dan kecepatan luka tertutup 100% menghasilkan data bahwa Oxytetracycline dan formula dengan konsentrasi 8% non signifikan (tidak berbeda nyata), dan Oxytetracycline dengan formula gel getah Jarak Pagar konsentrasi 4% dan 16% sangat signifikan (sangat berbeda nyata). Hal ini berarti gel getah Jarak pagar dengan konsentrasi yang berbeda-beda menghasilkan efek penyembuhan yang sangat berbeda nyata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Getah Jarak Pagar (*Jathropa curcas* L.) yang diformulasi dalam bentuk sediaan gel dapat memberikan efek penyembuhan luka sayat pada hewan uji
2. Sediaan gel getah Jarak Pagar (*Jathropa curcas* L.) pada konsentrasi 16% memberikan efek penyembuhan luka terbaik.


B. Saran


Disarankan untuk penelitian lebih lanjut mengenai stabilitas fisik sediaan dan upaya menghilangkan foam akibat adanya saponin agar gel dapat terlihat lebih menarik.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hilal Qur'an*. 2009. Departemen Agama RI, Bandung : Pustaka ALFATIH
- Ansel, C. Howard. 2008. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Jakarta : UI Press.
- Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman. 2008. *Fikih Pengobatan Islam: Kajian Komprehensif Seputar Berbagai aspek Pengobatan Dalam Perspektif Islam*. Penerjemah, Tim Al-Qawam: Editor, Amir Ghozali, Lc & Effendy Abu Ahmad, Al-Qowam, Solo.
- Banker GS, Rodes CT. 1979. *Modern Pharmaceutics, Drugs And Pharmaceutical Sciences 7th volume*. New York: Marcel Dekker, Inc.
- Bisono, Dr. 2002. *Petunjuk Praktis Operasi Kecil*. Jakarta ; EGC: penerbit buku kedokteran
- Brown DL. 2004. *Wound*. In: Brown DL, Borschel GH, editors. Michigan Manual of Plastic Surgery. 1st ed. Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins. Hal : 1-9
- Cohen IK, Diegelmann RF, Yager DR, Wornum IL, Graham MF, Crossland MC.1999. *Wound Care and Wound Healing*. In : Schwartz SI, Shires GT, Spencer FC, Daly JM, Fischer JE, Galloway AC, editors. Principles of Surgery. 7th ed. NewYork: Mc-Graw Hill. Hal : 263-294
- Dadang. 2006. *Jarak pagar tanaman penghasil biodiesel* . Bogor : Penebar swadaya. Hal: 9-12.
- David V Feliciano. 1996. Trauma. 1st ed. London, UK: Appleton & Lange. Hal : 917-922
- Devappa, Rakshit K, Harinder P.S. Makkar, dan Klaus Becker. 2010. *Nutritional, Biochemical, and Pharmaceutical Potential of Proteins and Peptides from Jatropha*. Jerman : University of Hoheinhem.
- Dutta, S.K. 2010. *Curcain – a Protease Isolated from the Latex of Jathropha curcas Linn*. India : Departement of Pharmaceutical Technology, Jadavpur University.
- Kibbe, Arthur H. 2000. *Handbook of Pharmaceutical Excipients 3ed*. London: Pharmaceutical Press.

- Judd, H. 2007. *Wound care made incredibly easy*. 1st ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Hal : 30-34
- Liebermen, HA. 1988. *Pharmaceutical Dosage Form: Dispersi system. Volume I*. New York: Marcel Dekker, Inc.
- Mariam, siti. 2006. *Potensi Pengembangan Tanaman Jarak Pagar Untuk Sumber Bahan Baku Biofuel*. Bandung : Fakultas Pertanian UNPAD .
- Martin, Eric W. 1971. *Dispensing Of Medication*. Easton : Mack Publishing Company.
- Pusponegoro AD, Bisono. 1997. *Luka, trauma, syok dan bencana alam*. In: Sjamsuhidajat R, De Jong W, editor. Buku ajar Ilmu bedah. edisi revisi. Jakarta : EGC:Penerbit buku kedokteran. Hal : 72-155
- Rahman, Hardiyanti. 2010. *Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Gel Luka Bakar dari Ekstrak Etanol Daun Jambu Mete(Anacardium occidentale)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Shihab, M.Q. 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Sinaga, Ernawati. 2007. *Jatropha curcas L*. UNAS : Pusat Penelitian dan Pengembangan Tumbuhan Obat UNAS.
- Siregar, Fazwishni & Akbar, Soerono S. M. 2007. *Jatropha curcas latex inhibits the release of collagenase by gingival fibroblast*. Med J Indones. Vol 16. Hal : 219
- Smeltzer, Suzanne C. 2002. *Keperawatan Medikal Bedah Vol.3*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Trenggono, Retno Iswari. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Voigt, Rudolf. 1995. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Watson, Roger. 2002. *Anatomi dan Fisiologi untuk Perawat Ed.10*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Lampiran 1. Pengolahan Getah Jarak Pagar (*Jathropha curcas* L.)**Gambar 1. Skema Kerja Pengolahan Getah Jarak Pagar (*Jathropha curcas* L.)**

Lampiran 2. Pembuatan Gel Getah Jarak Pagar (*Jathropha curcas* L.)**Gambar 2. Skema Kerja Pembuatan Gel Getah Jarak Pagar (*Jathropha curcas*)**

Lampiran 3. Skema kerja pengujian efektivitas penyembuhan luka**Gambar 3. Skema kerja pengujian efektivitas penyembuhan luka**

Lampiran 4. Tabel 4. Persentase Penyembuhan Luka

Hari ke-	A Konsentrasi 4%			B Konsentrasi 8%			C Konsentrasi 16%			D Oxytetracyclin [®]		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	0	0	0	0	0	0,	0	0	0	0	0	0
2	-52,77	-94,02	-34,28	-57,14	-31,74	-59,7	37,5	27,7	33,84	-71,4	-38,8	-37,09
3	-13,88	-80,49	-24,28	4,28	14,28	14,92	45,31	48,61	50,76	-18,5	-7,46	-1,61
4	13,88	-10,44	11,42	24,28	36,50	38,80	67,18	65,27	67,69	8,57	40,29	25,80
5	41,6	20,89	28,57	42,85	50,79	52,23	100	100	100	40	68,65	38,70
6	50	52,23	40	71,42	68,25	65,67	100	100	100	62,85	100	66,12
7	68,05	68,65	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Lampiran 5. Tabel. 5. Efek Penyembuhan Luka

Konsentrasi	Replikasi	Hari ke-n	
		Mulai Menutup Luka	Luka Tertutup 100%
4%	1	4	8
	2	5	8
	3	4	8
8%	1	3	7
	2	3	7
	3	3	7
16%	1	2	5
	2	2	5
	3	2	5
Oxytetracyclin®	1	4	7
	2	4	6
	3	4	7

Lampiran 6. Perhitungan RAL, Hubungan antara formula dan kecepatan penutupan luka

Tabel. 6. Hubungan Antara Formula dan Kecepatan Penutupan Luka

Perlakuan	Hari Ke-n mulai menutup luka			Jumlah	Rata-rata
	Replikasi				
	1	2	3		
4%	4	5	4	13	4,33
8%	3	3	3	9	3
16%	2	2	2	6	2
Oxytetracyclin®	4	4	4	12	4
Jumlah	13	14	13	40	

Perhitungan Anova

$$\text{Faktor korelasi} = \frac{(40)^2}{12}$$

$$= 133$$

$$\text{JK Total} = ((4)^2 + (5)^2 + (4)^2 + (3)^2 + (3)^2 + (3)^2 + (2)^2 + (2)^2 + (2)^2 + (4)^2 + (4)^2 + (4)^2) - \text{FK}$$

$$= 144 - 133$$

$$= 11$$

$$\text{JK Perlakuan} = \frac{((13)^2 + (9)^2 + (6)^2 + (12)^2)}{3} - \text{FK}$$

$$= \frac{430}{3} - 133$$

$$= 143 - 133$$

$$= 10$$

$$\text{JK Galat} = \text{JK Total} - \text{JK Perlakuan}$$

$$= 11 - 10$$

$$= 1$$

Tabel 7. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel

Sumber Keragaman (SK)	Jumlah Kuadrat (JK)	Derajat Bebas (db)	Kuadrat Tengah (KT)	F-Hitung	F-Tabel	
					0,05	0,01
Perlakuan	10	3	3,33	26,64**	4,07	7,59
Galat	1	8	0,125			
Total	5	11				

$$F(0,05 ; 3,8) = 4,07$$

$$F(0,01 ; 3,8) = 7,59$$

F hitung > F tabel 0,05 dan 0,01 maka data sangat signifikan (sangat berbeda nyata)

Koefisien Keragaman

$$= \frac{\sqrt{KTG}}{Y} \times 100\%$$

$$= \frac{\sqrt{0,125}}{3,33} \times 100\%$$

$$= \frac{0,353}{3,33} \times 100\%$$

$$= 10,61\%$$

Perhitungan Nilai BNT 0,05

$$LSD = t((0,05), 8) \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$= 2,306 \sqrt{\frac{0,25}{3}}$$

$$= 2,306 \times 0,288$$

$$= 0,665$$

Perhitungan Nilai LSD/ BNT 0,01

$$LSD = t(0,01) ; 8 \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$= 3,355 \sqrt{\frac{0,25}{3}}$$

$$= 3,355 \times 0,288$$

$$= 0,966$$



Tabel. 8. RAL, BNT Hubungan antara formula dan kecepatan mulai penutupan luka

Perlakuan		16%	8%	Oxytetracyclin®	4%
	Rata-rata	2,00	3,00	4,00	4,33
16%	2,00	0			
8%	3,00	1,00**	0		
Oxytetracyclin®	4,00	2,00**	1,00**	0	
4%	4,33	2,33**	1,33**	0,33 ^{Ns}	0

BNT 0,05 = 0,665

BNT 0,01 = 0,996

Keterangan :
 * = Signifikan (Berbeda nyata)
 ** = Sangat Signifikan (Sangat berbeda nyata)
 Ns = Non Signifikan

Lampiran 7. Perhitungan RAL, Hubungan antara formula dan kecepatan luka tertutup 100%

Tabel. 9. Hubungan Antara Formula dan Kecepatan Luka Tertutup 100%

Perlakuan	Hari Ke-n mulai menutup luka			Jumlah	Rata-rata
	Replikasi				
	1	2	3		
4%	8	8	8	24	8
8%	7	7	7	21	7
16%	5	5	5	15	5
Oxytetracyclin®	7	6	7	20	6,67
Jumlah	27	26	27	80	

Perhitungan Anova

$$\begin{aligned} \text{Faktor korelasi} &= \frac{(80)^2}{12} \\ &= 533 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total} &= ((8)^2 + (8)^2 + (8)^2 + (7)^2 + (7)^2 + (7)^2 + (5)^2 + (5)^2 + (5)^2 + (7)^2 + (6)^2 + (7)^2) \\ &\quad - \text{FK} \\ &= 548 - 533 \\ &= 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Perlakuan} &= \frac{((24)^2 + (21)^2 + (15)^2 + (20)^2)}{3} - \text{FK} \\ &= \frac{1642}{3} - 533 \\ &= 547 - 533 \\ &= 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat} &= \text{JK Total} - \text{JK Perlakuan} \\ &= 15 - 14 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Tabel 10. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel

Sumber Keragaman (SK)	Jumlah Kuadrat (JK)	Derajat Bebas (db)	Kuadrat Tengah (KT)	F-Hitung	F-Tabel	
					0,05	0,01
Perlakuan	14	3	4,66	37,28**	4,07	7,59
Galat	1	8	0,125			
Total	15	11				

$$F(0,05 ; 3,8) = 4,07$$

$$F(0,01 ; 3,8) = 7,59$$

F hitung > F tabel 0,05 dan 0,01 maka data sangat signifikan (sangat berbeda nyata)

Koefisien Keragaman

$$= \frac{\sqrt{KTG}}{Y} \times 100\%$$

$$= \frac{\sqrt{0,125}}{5,67} \times 100\%$$

$$= \frac{0,353}{667} \times 100\%$$

$$= 5,29\%$$

Perhitungan Nilai BNT 0,05

$$LSD = t((0,05), 8) \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$= 2,306 \sqrt{\frac{0,25}{3}}$$

$$= 2,306 \times 0,288$$

$$= 0,665$$

Perhitungan Nilai LSD/ BNT 0,01

$$LSD = t(0,01) ; 8 \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$= 3,355 \sqrt{\frac{0,25}{3}}$$

$$= 3,355 \times 0,288$$

$$= 0,966$$



Tabel. 11. RAL, BNT Hubungan antara formula dan kecepatan mulai penutupan luka

Perlakuan		16%	Oxytetracyclin [®]	8%	4%
	Rata-rata	5,00	6,67	7,00	8,00
16%	5,00	0			
Oxytetracyclin [®]	6,67	1,67**	0		
8%	7,00	2,00**	0,33 ^{Ns}	0	
4%	8,00	3,00**	1,33**	1**	0

BNT 0,05 = 0,665

BNT 0,01 = 0,996

Keterangan :
 * = Signifikan (Berbeda nyata)
 ** = Sangat Signifikan (Sangat berbeda nyata)
 Ns = Non Signifikan

Lampiran 8. Gambar Penelitian

Gambar 4. Sediaan Gel Getah Jarak Pagar (*Jathropa curcas* L.)



Gambar 5. Salep Oxytetracycline[®] (Pemanding)



Gambar 6. Kelinci yang Telah Dilukai



▶ Reaksi Inflamasi

Gambar 7. Luka Mengalami Reaksi Inflamasi



Gambar 8. Mulai Tertutup Luka



Gambar 9. Luka Sembuh 100%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A.Dhiza Tenripadang, lahir di Makassar, 10 Desember 1989. Anak ke 2 dari 3 bersaudara ini lahir dari seorang Ayah bernama Drs. A. Syamsul Rizal AM dan seorang ibu bernama Nyi Mas Ratna Januarti S. Memulai pendidikan dasarnya di SDN. Jongaya I, dan melanjutkan sekolahnya di SMP Neg.3 Makassar. Pada tahun 2005 ia melanjutkan sekolahnya di SMAN 3 Makassar, dan lulus pada tahun 2008. Sekarang ia melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sejak kuliah dunia farmasinya di kampus UIN Alauddin Makassar, ia belajar banyak hal mengenai kekompakan dan persaudaraan. Baginya seluruh makhluk penghuni farmasi adalah saudara-saudaranya.

Pesan buat anak-anak farmasi, khususnya Farmasi '08, "Tetap semangat dan tetap kompak,,SALAM JARI KELINGKING!!!"